



越南史集錄 卷之五 北朝 北齊 北周 北隋 北唐 北魏 北齊 北周 北隋 北唐 北魏



扶氏谷病吐劑篇



扶氏各病吐利篇

諸病疾沃冥鳥漢ヲ用ル治驗

沃冥鳥護製法

唇腺腫破経験 ヒーヘラント

月経 疝

頑痼危葛版水治験

衄血治験

舞蹈病治験

羔障眼治験



夜昏眼治驗

直腸流血治驗

腋及上肢贅水腫治驗

胃管瘻瘻瘻瘻治驗

舞蹈病自驚駭未ノ治驗

小兒胃軟症ニ糸

上軟骨水腫様嗽衝経驗シ ゲツキ

顛僂屈壞症全后ノ実驗歟 伝マ

小兒胃軟弱

コレア病

神注衰弱ヨリ消化器ニ及フ治驗

妊婦瘧疾ノ規起尔実又

産婦危篤瘧疾

日ノ輕易瘧疾

瓦秘利泄口微

并鉄塩製法

流礮水製法


越爾實裁集錄

扶氏各病吐利實驗說

余今晨時ノ本說ニ從シ各病吐利ノ適忘スル者  
ト否ラサルトヲ記載シ而一ニ煉熟ニ出ル至要  
ノ說ヲ加フ

熱病

凡ソ諸般ノ熱ニ於テ熱毒釀成スル溷濁ハ恐ク  
ハ心藏近傍ノ神至叢及ヒ肋對神至ニ在リ〇其  
徵熱病發生ノ時キニ生スル感動ニテ確知スヘ



シ論ハ食欲消化カノ  
ノ缺乏其レカリ生シタ  
ル戦粟等咸ナ之ニ属ス  
此ノ如キ從來解シ難キ  
一種ノ神至感動ニ於テハ  
吐劑ノ外処謂神至叢  
上一種ノ機能ス起ス劑  
アルトナシ○故ニ吐劑  
一品ニテ諸熱毒ヲ最初ニ  
於テ能ク撲滅スル普  
通ノ熱病業ト云モ可ナラ  
スヤ○吐劑ヲ少量ニ  
與ヘ強壯ノ吐ヲ取ラサル  
能ク後効ヲ奏スヤ  
メストトル散劑ノ名安  
母担モ能ク此目的ニ  
疾  
ス○然レモ此ニ一腫ノ熱  
病腸胃ノ感動極度  
ヲ得ルノ症アリ只病傍  
刺戟ヨリノ然ルノミ

ナラス其様刺戟ヨリ統  
癸スル諸液ノ腐敗ヨリ  
之ヲ得カ故ニ其病初ラ  
論セス病經過中依然ト  
メ諸症ノ基原ヲ為シ残  
在メ而各病ニ自己ノ腸  
胃性ヲ与フ○全其性ヲ  
腸胃熱ト名ク○此腸胃  
熱癸性ニ就テ臆斷紙上  
ノ論ヲ為シ之ヲ至脹シ  
或ハ之ヲ排斥スル者アリ  
予之ニ管セス上ノ各  
義ヲ与フ何者此ヲ排斥  
スルノ人ノ如キモ煉  
熟原カスト蠶又別メ一  
尚ノ癸明スル処ニ有  
レハ之○確チタル事跡  
尤ノ如シ凡熱病胃疾患  
及ヒ腐敗物ノ諸徴ヲ備  
ヘタル者ニ於テハ吐下

兩劑ノ外生命保護ノ劑アルナシ極度ノ症ニ  
至テハ尚然リ○腸胃症才一ノ指ハ自然良能  
ノ作為テテ知ルヘシ譬ハ嘔吐ノ如シ○医熱病  
ノ初起ニ於テ惡心嘔吐黃色アルハ禍色舌胎  
惡味等ヲ有スル患者ニ吐劑ヲ用ユルヲ怠ルハ  
自然良能ノ作為ヲ誤認ト云フヘシ不幸ノ患者  
又々其録ヲ受フ○故ニ自然吐排泄ヲ希望シ而  
己ニ其用意ヲ為ス時ニ當テ吐劑ヲ与フヘシ  
緊要ナリ○比劑加劑私ノ正言アリ  
加之狀ノ如キニ當テ吐劑ヲ怠ラハ其損再々  
認詳

償フヘカラス○吐劑ヲ正時ニ用ユル時ハ屢々  
其病ヲ初起ニ過正スルモ之レヲ避滯スルキハ  
其病ヲ蔓延重難トナル或ハ全ク不治ニ至ラシ  
ム○這般ノ事件誠實ニ屬スト魚予尙未年少医  
ヲメ全ク能ク曉知セシムルヲ得サル処ナリ  
○医又下劑ヲ以テ能ク吐劑ノ地ニ當ルト考ル  
ト勿レ○凡ソ吐劑ノ能ク排泄スル処ノ者下劑  
敢テ劑泄スル処テ非入予且食物不化ノ停滯物  
四十日ノ間下劑ニ由テ漏レズ尚胃中ニ残在  
シ今ヤ吐劑ヲ得テ初ラ排泄サ、ルヲ見タリ○

且医宜ク妨害ヲ為スヘキ腐敗物ヲ既除スルニ  
吐利ノ偉功アルヲ怠ル、一ナク其汚物ヲ近信  
ノ益ヨリ漏レ出ルヘシ何者汚物腸尙ノ長途ヲ  
通過スル側ニ刺戟衰弱及ヒ吸収等ニ由テ患者  
ニ大害ヲ与レハナリ○此ニ医緊功ニ知得スヘ  
キ一アリ下利ハ胃管等ノ諸神至及ヒ分泌流系  
絶テ安然ノ変草ヲ起ス一能ソス然レモ吐利ハ  
兩機ノ運管ヲ十分ニ変草シ且腸胃汚物ノ原ヲ  
遏止スル者ナリ○然シ吐利ヲ用ユル一必スモ  
常ニ一回ヲ以テ足ルニ非或ハ二三回ニ及フ

○若シ自然良能劑新ニ汚物ノ上ヲ見サ宜ク  
反復シ用ユヘシ○腸胃然ノ合併及ヒ種々ノ形  
容ヲ見ハス者殊ニ注意ヲ要ス○予質ニ就テハ  
之ヲ停滯熱胆液熱粘液熱蛔虫熱ニ於テ分テ容  
子ヲ以テハ之ヲ熾衝熱神熱ニ分ツ熾衝<sub>全身或</sub>  
腸胃熱ト合併スルヤ否ヲ注意スヘシ而  
吐利ヲ用ル前ニ浮血ヲ施シ先之ヲ減損スル一  
ヲ謀ラスニハ有ヘカラス而シテ吐利ヲ用ル前  
ニ浮血ヲ施シ先之ヲ謀スニハ有可カラス○腐  
敗熱神至様ノ合併ニ於テハ勉テ生カラ補助シ



トニ由テ之ヲ比考スルニ心ノ近傷ノ神全叢及  
助尙對神全ニ在テ必セリ衆医能クコノ症ニ吐  
劑ヲ称ス實ニ之ヲ用テ偉功アルハ其說ノ杜撰  
ナラサルヲ確知スヘシ○吐劑ヲ用エルハ発作  
ノ前ヲ可トス屢之ニ目テ其発作ヲ防止スルヲ見ル  
○洵歌熱尋常ノ種類殊ニ春熱ニ於テ吐劑ト之  
ニ交換シテル礪砂ニ由テ屢能ク此症ヲ療スル  
トヲ得○加之我那及消化ニ安キ我那塩ヲ用テ  
熱減退セス却テ強甚トナリ患者何時ト尚不  
快ヲ覺エルト有テミル○是ニ於テ我那ヲ合テ

吐劑ヲ与フ因テ其機瞬時ニ轉革シ之ヨリ始テ  
我那ニ堪エ熱モ亦從テ減却シ遂ニ術ヲ遂ルナ  
リ○予近時吐劑ノ非常ニ有カハ品凡ヲ確定  
セリ  
○一老漢前年重黄疸ヲ患ヘ今市新ニ疾患ニ罹  
ル其症在ノ如シ○才一不眼食欲飲乏困悶呼吸  
困難尙歌ノ脈次第ナク便通頻々復来ノ熱動後  
未ノ時明順○此状態週間達綿タル内甚恐怖  
序ヲ臨セス○疲憊及脱カヲ發見ス○患者方今  
スヘキ卒然ノ疲憊及脱カヲ發見ス○患者方今  
マテ解疑越裁劑礪砂等ヲ用タリ○今ヤ其熱晡

時ニ頸然トシテ癸作順次アリ尚且相過熱流行ス  
ルヲ以テ患者最初ニ毎日天ヨリ次テ八爪ノ  
戎那塩ヲ用○然ルニ戎那塩ノ増用ニ因テ熱大  
ニ増劇ニ遂ニ之ヲ止ルニ至ル○是ニ於テ吐劑  
ヲ用ユヘキ確チタル良能ノ指麾ヲ得タリ○患  
者四爪ノ吐酒石ニ由テ胆汁及粘液ヲ吐クト四  
回浮下スルトニ三回自此ノ熱ノ諸症消散ニ困  
憊窘迫咳嗽等皆減退シ腫眠故ニ復ニ顔色モ亦  
常ニ及ス○如ク忽チ輕易ヲ見リニ幾許ナク大  
終ニ全ク故ニ復スルトヲ得ル者ハ全ク胆汁ノ

蓄積ヲ排泄シ肝系統ノ運営正整次序ヲ得且其  
分泌ノ機更ニ其本然ニ復スルニ因ルナラン○  
予又此ニ曾テ吐劑ノ為ニ鴻ヲ得ル者ヲ揚筆シ  
其有カノ呂々レヲ證ス  
○尙歇熱ノ一症屢一モ次序ナリ一モ頸等ノ尙  
歇ヲ為サス煩期ヲ踏ス、委分替前熱ニ類スル  
者アリ○如ク症ニハ吐劑ヲ与ルニ亘ク之ヲ与  
フモハ則チ其熱顯著ノ尙過ヲ以始テ次第アリ  
尙歇熱ヲ癸見スル者ナリ是ニ於テ幾那ヲ与ヘ  
速ニ之ヲ癸スルトヲ得タリ

傳染熱

凡ソ人傳染熱ヲ感受スル第一ハ胃及ヒ心ノ近  
傍ニ在ル神全ニ於ルヲ疑フ容レハ○傳染病其  
効カラ足スル第一ノ徵ハ吐及腸胃ノ諸症ニ  
発見スルニ由テ知ルヘシ○痘麻疹及傳染神至  
ニ於モ亦然リ○此時期ニ於ハ吐利必要ノ品々  
リ○一ハ吐利ニ由テ傳染毒ヲ排斥シ一ハ其毒  
ヨリ媒起スル枕抵ヲ最初迄ニ変化セシム○予  
此ノ自的ニ因テ如ク諸熱ノ第一時期ニ吐利ヲ  
与全病ヲ減損スル為ニ良効ヲ取ルヲ屢之ア

○加之恐クハ神全熱傳染ナラント疑惑スル如  
時ニ又此利能ク其毒ヲ排泄スルヲ○若シ  
其傳染毒ヲ已ニ深ク感受シテ其功カモ亦既專  
ハラナリ或亦粟疹熱ニ於テ自然ノ利其路ヲ  
皮表ニ啓行セハ之ヲ用ユルヲ切ニ注意セス  
ニハ有ラス○若シ毒發見ノ期已ニ進来シ或ハ  
皮上已ニ發疹スルキハ及ヒ吐利ヲ用ハ之カ為  
ニ内部ニ起ス暴劇ノ變動及ヒ消毒刺戟甚々妨  
害ヲ為シ且ツ皮表外利ニ危嶮ノ障礙ヲ營ム  
屢之アリ○只腸胃汚物現在シヒムヲ得サル

キハ之ヲ与フルヲ免レス○又這般ノ癩疹得深  
熱ノ胎病ノ時期ニ從テ更ニ吐劑ヲ用テ甚偉功  
ヲ得ルヲアリ○他医吐劑ノ奏功ヲ疑フノ症予  
屢比考シ用ルヲ常トス○麻疹從肺中ニ残留  
咳嗽此咳ハ肺中ノ餘毒ヨリ容易ニ肺ニ吐劑ヲ  
与ヘ之ヲ排泄スルヲアリ全ク此劑ノ聖妙ニヨ  
ル○所謂吐劑ノ奏効尤ノ患者ニ於テ明也  
○十二歳ノ女ノ疹ヲ患ヒ幸ニ過ニ痊過ヒ其  
病ニアリテ十日ニ三四日前一病日ニ十計熱減  
退シ食欲頓レ既ニ甚ク怪快ヲ為セリ○然ニ今又

食欲減之ニ咳嗽更ニ劇甚ナリ呼吸困難シ怠惰  
増加シ睡眠安カラズ頭痛シ大便秘結ニ与フル  
下劑モ奏効ナシ○予因テ忽チ吐劑ヲ与フ○患者  
粘液及胆汁ヲ快吐スルヲ六回以ヨリ隨意ナル  
並ニ利ノ下劑ヲ得毎日上圍四五回三四日続ケ  
リ○咳嗽漸散シ食欲生シ生カ未復シ不日ニ十  
分ノ健康ヲ得タリ

咽喉燉衝

凡諸種ノ咽喉燉衝ニ吐劑ヲ用ルテ余カ煉塾ニ  
因レハ普通峻切アル者トス○咽喉ノ燉衝ノ刺

衝及血液循環ノ障碍ヲ速ニ除キ去ラント欲セ  
ハ其部ノ神全及粘液膜上ニ反對刺戟ヲ与フル  
一尺ニ好ムヘキノコナラス其功屢示顯然ナリ  
○嚔下因難ノ症ハ容易ニ休止スヘカラサル者  
トス何者患者百嚔百吐受容ノ機ヲ失ハナリ○予  
吐劑ヲ禁止スルハ独リ極度ノ純粹咽喉焮腫汚  
血ヲ要スルノ時期ニ於テスルノコ  
用ス可ラサル者次條ニ揭示ス  
第一咽喉焮腫自正症腸胃汚物来者ニ於テス其症  
初ヨリ腸胃汚物ノ徵ヲ見ハシ右荅哈モ塗ルカ

如ク口味ヲ失ヒ惡心ニ吐セント欲シ或ハ烈ク  
吐ス○如クノ症ハ腸胃汚物ノ及凹滯上ノ傍症  
ヨリ来ル咽喉焮腫ニ外ナラス故ニ治術モ亦吐  
劑ニ止ルベシ此劑ニ由テ屢諸傍症並子ニ退散  
スルヲアリ第一格魯布ニ於テス此症ニ吐劑ノ  
偉効アルヲ已ニ確論アリ然而予又煉熟ニ由テ  
之ヲ用ルニ殊ニ二期ヲ定ム  
甲咽病初ニ在リ若シ一二ノ某劑格魯布ノ發生  
ヲ防御スルヲ能ワサルノコナラス更ニ之ヲ除  
去スルヲ得サルキハ則其術實ニ吐劑ニ止ル

ナリ此等ノ事余ニ屢頭明ナル処ナリ今此ニ一  
例ヲ挙テ以テ徴トス

○小児年再三歳健康強壯ニシテ多液質ナリ北東  
ニ因テ寒胃シタルノ位三日ノ間烈甚ヲ添ヘ

タル熱状ニ煩タリ而毎夜一時半間裂甚ノ症季  
咳ヲ発シ氣貝絶シト欲シ或ハ其響音狗吠ノ如

ク其発作ヲ亞斯の麻迷兒罹病ト者做テ丁香耳  
乘ヲ交換シ用ルニ至ル○予発病第四日ニ至テ

初テ患者ヲ診スルニ其肌實ニノ数絶ニス咳シ  
呼吸或ハ促迫シ或ハ否ス頸部寬解シ其他患兒

活淡ニメ少食欲頭明唯舌上汚胎ヲ覆ラ○

是字於テ余咽喉嫩腫ノ初起ナラシト察シ呼吸

症之期ヲ踏ヲ発スルニ因テ急ニ尋常ノ吐劑ヲ

知ズ


吐酒石 一匁  
吐根 末一匁  
海葱醋

覆盆子 舍利 絡羊

右能ク混和シ毎日八分時ニ一茶匕ヲ与ヘ吐

ヲ得ルニ至ル

○患者多量ノ粘物ヲ吐クト三回ア后咳嗽從テ  
減退シ安眠スルト時間大ニ発汗セリ○翌朝



ニ及テ咳嗽并窒息ノ状全ク退却シ吉利失私既  
ニ至リ格魯布ノ發生是ニ於テ始テ全治セリ  
〔乙〕期病未ニ在リ〕譬ハ咽喉義膜ヲ生ノ齋脫ノ状  
アルト虽元未々全ク排泄セラル、一ヲ得スシテ  
本患愈窒塞扶ヲ増進スル者ノ如トシ○此ニ於  
テ吐劑唯粘液膜様ノ物ヲ乾逐シ呼吸器ヲ緩延  
ナラシムルニ在リ○予又此ニ一例ヲ挙テ以テ  
徴トス  
○一小兒齡ニ歳居恆ニ健康一時冒寒中暴烈ノ  
格魯布ニ罹ル○余弟二日ノ晚ニ立テ始テ患見

ヲ診ス見時ニ窒塞ノ發作劇甚ナルニ兼テ真咳  
恰モ豹吠ノ如キ呼吸皺雜ノ音ヲナシ動モスレハ  
其頭ヲ高リ保支セン一ヲ欲シ或ハ其頸ヲ延カン  
一ヲ好ミ脈搏一密粗爲ニ有二十度ナリシ○於  
是予頸上ニ水蛭二條ヲ貼シ毎夜半時ニ加魯茂  
兒ヲ与エ醋灌腸ヲ施ス○水蛭ヲ施シ又八日ノ  
カコメルヲ用取<sub>下</sub>ラヒタル右犬ニ輕快ヲ見モ  
午時ニ及ンテハ脈搏九十度ニ復セリ然レモ尚  
喘鳴ノ声唾ス○於是蝟針二條ヲ貼シ八分時毎  
ニ已前ノ吐劑ヲ写テ○其后始テ十分ノ快復ヲ

得〇予更ニ左ノ方ヲ処ス

酒石塩一匁

井水一匁

安瓿没也

酒十

右溶解劑每一時一茶ヒラ与ヘ以テ術ヲ余ス

第三耳后ノ腺疾ニ原ク咽喉焮衝ヲ於テス此症

多クハ流行性ニ見ワシタル者ノ其始ノ基ハ耳腺及

粘液膜等ヲ浸シ室息危篤ノ症ヲ誘ヒ全ク破傷

凡ヲ起ス者ナリ此ニ於テハ唯吐劑ヲ緊要トス

可ノミナラス實ニ救命ノ聖劑之〇輕易ノ症ニ

於ハ普通ニ用ル制焮消散ノ療法ヲ以テ足レリ

トシ病モ亦概ラ粘液様腺様部分ノ輕易焮腫ニ

外ナラス〇然ト虽上ニ処謂極度ノ症ニ於テハ

既ニ此療法ノ及處ニ非ス〇加之海血百朶荒菁

ホ都テ効ヲ奏セス〇此ニ吐劑獨リ絶氣ノ危

救ヲ防ニ足ルノミ〇此ニ疾病ノ尖傳ニ見タリ

因テ左ニ述フ

〇二十六歳ノ婦如此極度ノ頸膜焮衝ヲ〇其症耳

右腺腫起スルノミナラス

詳及ヒ口内粘液膜咽喉腺腺等咸腫脹シ大

ニ困若メ以テ僅ニ些少ノ物ヲ嚥下スルヲ得

呼吸困難ニ兩顎運轉自左ナラス齒牙嚙メ破傷

部合

凡ノ真症現在セリ○如是景况九日間刺絡蟻針ノ屬泡膏水銀刺毬布摩擦ノ類少モ功ヲ奏スル無ク劇熱綿連トノ現在アリ○於是ハ吐劑ノ外他ノ聖劑アルトナシト虽且咽喉全ク閉塞狹窄スルカ為ニ吐劑ノ上方ニ激上スル勢ト汚物ノ上方ニ逆輸セラル作爲ニ因テ通貫自在ナラスマ窒塞ヲ発セシトヲ恐ル、カ故ニ頗精細注意ノ之ヲ与タリ○然シ此劑果々試スレハ有ベカラサル者ニシテ功モ亦彰々タリ○投劑ノ後上輪ニ障碍ヲ受クル畧忽開儘ノ下送ノ容易ナル

一ヲ得○吐容易ニ三回ヲ得多便通アリ尔后直ニ破傷風ノ症及腺腫ノ極度緩急シ嚙下ノ機大ニ通ニ一二日ヲ経ニ十分ノ快復ヲ得タリ○弟此症ノ預防ニ亦能ク吐劑ヲ命ス○予這ノ一般流行病暎乳多ニ於テ病初直ニ用タル吐劑ニ由テハ病後ノ発ヲ防禦シ又即時ノ快復ヲ致サレム

〔第四脱疽性ノ咽喉嫩衝ニ於ス〕此レ尤責重ノ病ナレモ幸ニ其スルト少シ常唯惡性ノ猩々熱ト傍症ヨリ発見シ直ニ咽喉嫩衝ノ発起ト共ニ

腐敗変性ヲ現スナリ此レ亦吐劑ヲ主トス殊  
初発ニ与ルヲ要ス

第丑口腐敗スル症ニ於テ余以症ニ於テ又吐薬  
ノ偉知ヲ称ス且一種俊銳ノ適劑ト為ルナリ○  
屢又浮下劑燉等ノ功ナクメ却ニ吐劑ノ為ニ  
速ニ其因陋惡性ノ病ヲ根治スルヲアリ○余又  
此ニ一言ヲス諸咽喉燉衝ニ於テ若劑燉消散  
ノ劑ヲ酌酌応用ノ疾患尚鮮セント欲セハ窒塞  
危険ノ疾進未セハ吐劑尤急務トス

段肺燉衝

此ニ肺燉衝ノ一種刺絡曰硝石阿芙蓉及ヒ其他  
ノ諸劑少モ相宜セスノ吐劑独リ甚々知驗ヲ奏  
スルノ症アリ是ニ於テハ吐劑實ニ生命保護ノ聖  
劑ナリ○余曩ニ三時限ヲ歴驗ス  
第ニ世医諸肺燉衝ニ刺絡ヲ専称シ他ノ術ヲ用  
サルノ時限  
第ニ阿片及ヒ諸刺戟劑ニ駈驚スル時限  
第ニ唯螟針甘汞ヲ尊崇スル時限  
○此時限中試験ノ誠ヲ積ムニ由テ所謂諸術ノ  
妨害多クメ独リ吐薬ノ啓ヲ之ニ忘スルヲ發明

セリ○近時大ニ声價ヲ高フシタル  
ト云レ既ニ四十年前  
及  
各人  
術  
稱用シタル肺癰腫ニ嘔吐劑ヲ投シ第一吐ヲ取  
リ次ヲ適度ノ浮ヲ促ノ術外ナラス○予此ノ  
如キ症ニ腸胃汚物ヨリ来ル假肺癰腫ト名ク○  
此症固ト腸胃系統ト直ニ根元様ノ關係ヲ為  
之ニ由テ只腸胃疾患ノ感波及ト為スナリ然  
レ共此全ク交感刺戟ニ因テ腫中ニ起レタル  
真ノ緩性弓癆癰腫ニ外ナラス故ニ其治モ亦皮  
表ノ丹毒ト同ク只吐劑ヲ用テ之ヲ斷除スルナラ

得<sup>物毒ヨリ来ル</sup>胃ノ汚○此症純腫癰腫ト異ナル所  
以ノ者ハ其肌硬ナラス抑壓スヘク或軟ニシテ小  
ナル等ハ因ル且其病初ヨリ腸胃汚物ノ微癆見  
シ舌胎茶褐色ニ塗ルカ如ク口惡味殊ニ苦味  
ヲ覺ヘ絶テ食餌ヲ好マズ嘔氣ヲ有シ或ハ吐シ  
心窩困重且痛ニ前頭疼痛シ或ハ時ニ妄語シ口  
困面癰吸眼中癆莫シ概メ病初ヨリ直ニ非常  
ノ疲倦怠惰等癆見スルカ如クハ大率純癰腫ノ異  
ナル也以ナリ○絶癰腫ニ於テ兩腋癆敏疾ニメ  
恙者之カ為ニ呼吟自在ナラス又刺衝劇甚ナル

二因テ吸気毎ヲ怡モ 嗽衝胞腹痛ノ如ク短息困  
難ス○予之ヲ診スルニ 当テ患者上ノ如ク劇甚  
胸患 喘 腸胃汚物充滿ノ諸徴ヲ見フニ即  
茶褐色ノ舌胎 惡心 嘔気 快吐ニ 高壓 迫困 重及ヒ  
女肌硬 十ヲス 冥十ヲサル等ノ 諸症ヲ備ヘリ此  
ニ於テ吐劑ヲ与フルノ 外他ノ術アラサリシ何  
者劇甚ノ 胞患 素腸胃汚物ノ 充滿ト密ニ 關係ヲ  
為シ 冥ニ汚物ヲ致ス 処ナレハナリ○此劑ニ因  
テ 多胆汁様ノ汚物ヲ 咯出ニ 胸痛 兩脇痛 窘迫 困  
童等 屢瞬時ニ 退散スルヲ 驚クヘキ 処ナリ○然

シ又此ノ腸胃汚物ノ 徴候 病初ヨリ 直ニ 眞嗽衝  
ト合儀セラルルニ 一アリ○此ノ如キ 症ニ 於テ 瀉  
血制嗽 治法等ニ 因テ 嗽衝様ノ 徴候ヲ 除去シ 始  
テ 汚物制伏ノ 治ヲ 施スヘシ○凡ソ 腸胃汚物充  
滿ノ 徴ハ 脈硬 冥ナリ 患者若シ 年少ニ 且多血  
質ナラハ 茅一 疔上 刺絡ヲ 施シ 而 后 始テ 吐劑ヲ  
与フヘシ○ 間々又 此汚物ノ 止徴 吐葉ヲ 用スン  
ハアルベカラス○ 全此ニ 又一例ヲ 挙テ 以テ 徴  
トス  
○一婦人 三十五 弦劇熱ニ 侵サレ 兼ルニ 兩脇痛

ノ堪エ可カラサルヲ以テス○加之乾咳短咳、  
呼吸困難短息劇シキ頭痛汚物ノ諸徴実硬ノ脈  
等ヲ兼タリ○是ニ於テ膈上刺絡ヲ施シ多量ノ  
血ヲ洩ラ洩シ且便秘スルカ為ニ右一時許リメ  
其痛大ニ輕快シ復々幾々モ無クノ再登セリ○次  
日ニ於テハ脈狀前數日ニ比スルハ実ニ疾ナリ  
然レモ既ニ硬ラ帶ス頭痛劇甚乾咳愈増加ス又  
肋骨ノ縁肝臟ノ部疼痛セル処ニ腫脹ヲ見ワシ  
之ニ触テ痛ヲ覺ヘ肝亦焮腫ニ罹ルヲ著ク且惡  
心シ各苔茶褐色ニ離脱ノ狀ニ塗ラル○此諸

症ニ因テ焮衝ト腸胃汚物ノ合併症タルヲ顯然  
タリ尚且実脈連綿タルヲ以テ刺絡ヲ施シニ骨  
布ノ血ヲ洩ス現血焮皮疼痛緩弛ストモ惡心増  
加シ難シト吐セント欲ス○是ニ於テ吐洒石ニ  
吐根ヲ合シ久テ數次ニ与テ○其ニ由テ快吐ヲ  
得ルヲ三回胆汁粘液ヲ吐ク○尔后熱勢疼痛考  
ニ文ニ輕快ヲ見フニ之ニ一密扭甸十度  
ノ脈下テ九十六度ニ及ミ此ヨリノ緩下劑ヲ連  
服セシムル中経快日ヲ追テ相從ヒ全ク故ニ復  
シ而メ右劑ヲ止ム上ニ云フ処ノ腸胃汚物ノ症

候必モ常ニ頸処タルニ非間又隱伏假人酪腸胃汚  
物肺炊衝ト各ル者アリ殊ニ精細註用スヘキ症  
トス此汚物ノ徵甚タ分明トラス景現依然タル  
ヲ以之ヲ識別スルト甚タ難シ宜ク炊衝ノ比較  
ニ由テ確子タル鑿為スヘシ○此症至甚ノ刺痛  
至強 肺炊衝困重ノ症ヲ發スト虽脈状此ニ炊  
衝ヲ見ワサス其他ニ般發熱ノ徵モ絶テ有  
十シ○此ノ難矣不明ノ症ニ投ハ已前患フル處  
者譬ハ勞思焦心飲食消化枕者妨碍及ヒ心高ノ  
困重緊張舌状顔面黄色等ヨリノ確子タル正按

ヲ為スヘシ余此困伺ノ症ヲ以隱伏腸胃汚物ノ  
至症トノ殊ニ着眼ヲ為セリ○此困伺ノ症甚極  
度ニ及テアノ宜ク誤テ他ノ炊衝困伺ト相混ス  
ルト勿レ○此症自ラ吐劑ノ緊要タルヲ示ス  
ニ實ニ克ク之ニ由テ退散スルヲ得○其信疑  
次ニ難キモノ、如ハ刺絡ヲ試ルニ宜シ○真炊  
衝ニ原ク者ハ刺絡ト店輕快道ニ相從フ否ヲサ  
ル者ハ喜痛ヲ増加スヘシ此ニ至ハ純粹腸胃ノ  
症タルト疑フ容ス宜ク即時ニ針口ヲ例封スヘ  
シ○間又刺絡ヲ施メ后少時ヲ歴ルカ或ハ直チ

ニ汚物上湧ノ症不意ニ相從ヒ胆汗様物ヲ快吐  
スルヲアリ此レ汚物脱去セント欲スルカナリ  
是ニ於テ直ニ吐劑ヲ与ハ安然ノ功ヲ収ムヘシ  
○此ニ又一種ノ難奇不明ノ症アリ其発病初日  
ニ真性ノ誤リ認メ汚血モ施セ凡胸患少シモ輕  
快ヲ見ケス患者自名トメ誓當熱ヲ特久シ胸患及  
ヒ呼吸困難腸胃汚物ノ微尚連綿トメ現右ニ脈  
状等再田ノ刺絡ヲ禁スル者アリ此ニ生ハ吐劑  
業已ニ其期ニ後ルト虽凡尚能ク大功ヲ呈スル  
トアリ○吐業後期ノ用テ尚能ク大功ヲ奏スル

ヲ以テ見レハ此劑ノ有カニノ真ニ欠如スヘル  
ヲサルトテ保證セリ○此ノ怠慢屢余モ亦從來  
尚之レラ免ル、トテ得ス又燃衝ト汚血トノニ  
ツニ偏倚固著スルノ説屢此腸胃汚物ノ症ヲ輕  
忽ニ看過セシムルトアリ  
○一婦人齒三十歳肺嗽衝ノ諸症ニ促サレ医刺  
絡針浮下ノ劑ヲ施シ諸制嗽ノ内癢ヲ尽スニ  
由テ劇甚症既ニ減スト虽凡頭患尚連綿トメ止  
ラス○予発病第八日ニ始テ之ヲ診ス時患者  
熱勢劇甚刺衝咳止ムヘカラス呼吸困難ニ困憊

間斷ナク相攻メ或ハ換ルニ頭眩ヲ以テシ衰弱  
已甚頭困重シ謔シ脈疾小ニ軟尿溷濁有リ舌  
苔茶褐色之レニ魚ルニ溶崩水泻ヲ以テス○是  
ニ於ヤ果決ス生命ノ存亡ニ飯ニ瞬時ヲ失フヘ  
キナシ○尿状尿色及ヒ咳セスメクク吸氣ヲ為  
ス等ニ由テ其困頓咳嗽呼吸ノ疾患真熾衛ヨリ  
未ラサルヲ頭暈ナリ○生カノ沈重<sup>此</sup>耕<sup>心</sup>經<sup>已</sup>  
甚ノ泄瀉自他ノ衰弱ノ増進スル等<sup>此</sup>家<sup>急</sup>務<sup>ノ</sup>  
正候ノ備々リ○故ニ小量ヲ托歇見散ヲ投シ粘  
滑ノ滯腸ヲ行フ○尔右安静スルヲニ時<sup>間</sup>裁<sup>許</sup>

小疾ニノ倒歇アル肌頭眩大便失禁等ヲ発見ス  
○諸緩和劑ノ効ナリテ胸患連綿増長シ惡心  
スル亦ニ由テ心窩中尚刺衝物ノ残在リ胸患及  
ヒ神全触覚過敏等持長スル主因トナルヲ察  
セリ此危険ヲ救フハ亦唯吐薬ニ在ニテ知ル  
リ○然ルニ患者甚々衰弱シ下痢持重スルカ為  
ニ散テ用ルヲ能ワス○吐劑動モスレハ下劑ト  
ナリ至甚ノ衰弱ヲ起ス者ナリ○因テ之ヲ用ル  
前三時ニ小量ノ托歇見汗散ヲ与ヘ其操作下



医曾テ学校ニ於テ腸胃汚物嫩衝ノ嘔氣ヲ有シ  
 吐セシト欲シ舌上厚ク茶褐色ノ苔ヲ蒙リ心窩  
 膨脹シ動モスレハ午ヲ更上ニ向ント欲スルヲ  
 見テ果テ汚物ナラントラ決シ急ニ吐劑ヲ投ス  
 ○患者之ニ由テ甚多量ノ胆汁様ノ汚物ヲ吐  
 シ遂ニ生ヲ全スルヲ得○是ニ於テ戸價満都  
 籍甚シ将来疾医ノ人望ヲ得タリ  
 ○大各アル一女疾ヲ人ニノ胃子ノ位 於テス  
 ○女疾既ニ十一日未粟疹ヲ挟ミタル胸嫩腫ニ  
 罹ル○医凡ソ当然ノ劑用ヒサル処ナシト虽寸

功無ク危険漸クニ迫ルヲ以活路ヲ啓クヘキ無  
 トス○新来医亦此ニ招ル患者ノ状態已ニ瀕死  
 ノ衰弱ニ在ト虽尚能ク吐劑万一モ助ケ有ン  
 ヲ謀リ急ニ之ヲ與フ○患者忽ニ状吐シ次テ快  
 復ヲ誘ヘリ○其他実験ニ因テ諸胸嫩衝ノ如キ  
 ハ吐酒石<sup>羊</sup><sub>公</sub><sup>水</sup><sub>每</sub>ヲ分<sup>与</sup>フル外安然ニ即切  
 ヲ奏スルノ劑有ルヲ無キヲ證明セリ  
 ○大抵初回ノ量ニテ発吐シ次テ緩下発汗胸部  
 排泄<sup>其</sup>安然ノ諸症ヲ起ストス最モ攻治腸胃  
 汚物ノ症及ヒ許<sup>多</sup>ノ聖京<sup>倭</sup>痲<sup>疹</sup>須<sup>所</sup>等ノ胸嫩衝

ニ於テ甚々歎當セス以ノ如キ諸症ハ泄下ニ益  
ナフシテ一種胸間ニ忘スル劑殊ニ俊功アリト  
ス〇ユノ治アルニ因テ今脚一般採用スル加魯  
蔑尔モ無益ニ飯スル所アリ是亦入ノ幸ナリ

顔面霍斯

霍斯ノ品類甚々多ト虽之ヲ療スルノ術大抵下  
劑ヲ主トス顔面霍斯ニ於テハ殊ニ之ヲ採用シ別  
ニ一種過菜ノ各ヲ下ス〇此症善ク危険ノ極ニ  
陟ルヲアリ〇患者若シ劇熱因尙譫妄及ヒ狂躁  
ノ症ヲ見サハ又毒胸中ニ透フト知ルヘシ〇是

ニ於ハ吐劑性命保護ノ第一ナリ〇予海血常習  
ノ如クニナリ其効ヲ奏セサル者ニ於テ吐菜ヲ  
典へ屢捷末ノ効ヲ取ルヲアリ〇医顧念ヲ候々  
ス速ニ之ヲ与ヘヨ假見ノ血液蓄積ニ疑ヲ入ル  
勿レ一回ニ効無キ者ハ亘ク之ヲ復スヘシ

驚口瘡 スアリ アフリ リ 痛

此症亦吐劑ノ緊要ナルヲラ證明ス〇其因尋常  
胃液ノ変性ニ関係シタル粘液膜ノ失序ノ作為  
ニ在リ〇小兒ニ於ハ常ニ能ク輕易ノ腸胃清劑  
劑ニ因テ之ヲ治ス頑固メ症ニ至テハ吐菜独り

速切ヲ取ルノミ○大人ノ  
亦然リ

病者ニ於テモ

腸胃咳カストリト

一種ノ咳之ヲ腸胃咳ト名ク腸胃汚物充滿顯著  
ノ徵ヨリ生ス論ハ汚穢舌苔食欲缺乏惡心小ヨ  
リ之ヲ知ルヘシ此症ニ於ハ解疑泻下ヲ腸胃劑  
止咳第一者ナリ医動スレハ尋常ノ取京劑ヲ与  
モ無益ノカヲ費モフアリ

百日咳

此咳ハ素嗽衝様ノ病ニ非ス又腸胃ヨリ来ルニ

非ス予己ニ四十年前證明スル如ク心近傍ノ神  
経叢及ヒ肺神全ノ一種傳染様經率様ノ神全病  
ニノ更始ノ熱状嗽衝様ノ感覺ヲ見ワシ尔右漸  
次ニ自己ノ真性症率様ノ裡至症ヲ取所謂兩部  
ノ粘液分泌ニ一種ノ運営ヲ起シ更ニ分泌ヲ増進  
シ重厚ヲ致サシム○是ニ於テ吐痰ノ主余タル  
ヤ二尚ノ目的アリ第一症率様ノ性ヲ鎮静スル者  
カノ消毒性アルニ由ル第二甚々能ク蓄積粘稠  
ヲ排除シ粘液分泌ノ機ヲ変革スルニヨリ  
此等ノ事煉熟ニ因テ能ク證明ヲ為スヘシ○投

与ノ吐劑常ニ一二日間輕快發作ヲ改ム〇若シ  
過宜鎮症劑及ヒ皮表刺戟劑ヲ用ユルノ外吐某ヲ  
交換シ与ハ輕快ヲ嘗ハ一常ニ速ナリトス

肺勞瘵

一般肺勞瘵ノ症ニ於テハ吐劑決メ適當ノ劑ニ外  
ス独リ「五」ナルス人礼度甚々之ヲ緊要ナリト  
稱ス〇其嗽衝性ノ種類及ヒ其發作頻頻ヲ踏ノ  
症及咯血ノ素因アル者ニ於テハ此劑害ヲ与ル  
甚々速ナリ然レ又之ヲ用テ利益アル一兩時有  
第一膿様肺勞瘵嗽衝様ノ諸症ナク痰ノ排世難

痰之カ為ニ咳嗽困悶増進スルハ漸次ニ与ヘル

吐劑甚々輕快ヲ奏ス

才ニ粘液肺勞瘵所謂腸胃咳ノ如ク痰時々粘  
轉其原ヲ肚腹ニ取り飲食消化普尔梳ノ失常及  
蓄積ヲ受ルホヨリ来ル者〇予這般ノ症ニ吐劑  
ヲ反復シ用ヒ甚々顯著ノ効見タリ〇巨細我  
カ書中ニ記ス就テ見ルヘシ

喘息及窒塞咳

喘息ハ危難ノ病ニ屬スルヲ人皆之ヲ知ル此症  
赤吐劑ノ功アルヲ他ノ諸業ニ越タリ〇濕生粘

液様ノ喘息ニ於ハ吐劑恰モ適宜セサルカ如キ  
虫氏漸次ニ之ヲ典ルキハ其輕快ヲ奏スル鮮カラ  
ス○乾性症孛様ノ喘息ニ於テハ我カ見知スル  
諸策中吐劑ノ右ニ出ル者ナシ尚煩劇ヲ蹈ンテ  
頭者ノ間歇ヲ為シ患者ヲノ瞬間ニ危険ニ至ラ  
シムル如キ症ニ於テハ最聖劑トス○ク香耳承ヲ  
用ヒ寸驗ナキ后吐劑ヲ共ニ尚能症幸ヲ鎮止シ  
快後ヲ誘フヲ實驗セリ  
○窒息咳肺癰ノ症ニ於テ吐劑又上下ト同ク相  
宜ス肺ノ麻痺ハ卒中ノ症ト大ニ初ニ唯卒中ニ

於テ腦神經ノ痺ヲ受タル異ナルノ故ニ窒塞  
危急ノ時ニ及ヒ呼吸甚々喘鳴スルト虽腦中  
及ヒ神識ニ從テ些少モ障碍サル、処ナシ○是  
ニ於テハ先刺絡ヲ施シ其后吐劑ヲ与フヘシ奏  
切甚々大ナリ

痢疾及瀉症

痢疾ニ於テ吐劑ハ病初ニ与ル吐根ヲ以テ生ト  
ス○予屢此病ヲ治スルニ初メ吐根ヲ与ヘ次テ  
小量ノ阿片ヲ混シタルアラヒヤコム乳劑ヲ投  
スルノ外他要用ノ品有ルナシ而シテ常ニ最初

ニ与フル吐利術上ニ裨益ヲ惠ミ不日ニ落城ニ  
至ラシム若シ之ヲ怠ラハ他疾ノ如ク捷速ノ功  
ヲ奏スル良劑有テナシ○若シ又之ヲ用シト欲  
セハ宜ク吐根ヲ吐酒石ノ上ニ撰擧スヘシ吐根  
ノ性量ト雖自ラ能ク其効カラ持久スル者之  
○加之吐瀉ノ症譎亂所ニ於テ高且吐利ノ至要  
ナルヲアリ○其症緩和利ヲ投シ極テ速ニ其排泄  
ヲ望ム可コト明ナリト虽然凡或ハ惡心ノ状ヲ  
抱キ飲食不化ノ性及ビ胆汁様ノ腸胃汚物性ヲ  
残留シ其胆汁蓄積更ニ排泄ヲ企ツヘキヲ證ス

ルアリ 倘又其状ニ於テ過度ノ吐利ヲ与ル外  
捷速ニ其全功ヲ取ノ術有テナキヲ証用ス

僕ノ疾

余僕ノ疾斯ノ症ニ吐利ヲ与ルテ僅ニ實驗スル  
ト得若ハ系此症ニ他ノ藥劑ヲ相当トシ胃及  
飲食消化ノ机ニ緊張衰弱等ヲ起サシムルヲ  
要セサレハナリ○予今ニ至テ此症ニ先他ノ諸  
劑ヲ試ミ其奏効ナキニ及テ始テ此療法ニ拠ル  
ヘキヲ説クト虽<sub>以</sub>劑<sub>常</sub>ニ<sub>統</sub>テ<sub>侵</sub>衰<sub>重</sub>食<sub>食</sub>  
ノ實驗ヨリノ僕ノ疾<sub>斯</sub>ニ吐利ノ効カラ違スル

ノ確定セリ

發狂

予發狂ノ症ニ用ル諸右形劑ノ中最モ其功カラ  
暹スル者ハ吐劑ヲ以テ寒瀉法ノ匹敵トス○腦  
ノ病様ノ運営ニ於テ吐劑才一布カノ過劑ニ故  
凡ノ精神ニ關係スル腦患殊ニ劇志尙憂状ノ腦患  
若シ胸腹内ニ在ル神至ノ甚ニキ不運営不知覺  
ト繫累スルト愈々明ニノ其失常ノ平均運管知  
如シ所云發狂ノ宗源トナルト亦益顯著ナルト  
ハ其平均ニ復シ運管ニ倫次ヲ得セシムルト甚

タ所ヲ得タリト云フヘシ○且此ニ一事得アリ  
人甚々之ヲ顧念セハ譬ハ胃神ノ至要ノ如シ此  
神饑ニ由テ或ハ食欲惡心等ニ因テ其至要ナル  
トヲ發明ス○此饑ノ感覺ハ至強感覺ノ一トス  
甚々極度ニ至ラハ暴甚ニメ全肥ニ透徹シ加之  
狂妄癡惑シタル精神ノ中ニテ衰入スル感覺ト  
ナルトハ發狂人ニ嚴ラ起サシムルモ此理ヲ  
○然ル所以ノ者凡ソ人ノ陰具管能及ヒ其他活  
物操作スル者ノ官能減退ノ胃神ト陰具ノ神ト  
ニ在レハナリ○故ニ發狂人ノ精神ノ平生ニ挽

回シ人事ヲ省シハル<sup>ル</sup>第一緊要ノメ常ニ唯々  
確乎トメ飢ヲ与ル術ニ在ト〇然ニ惡心嘔吐ノ  
如<sup>レ</sup>亦此胃神ニ於テ同種ノ則ニ其操作ヲ為者  
ノナリ「<sup>レ</sup>シユトセル」各ノ敗已未此理ニ從テ幾多ノ  
人カ甚々幸ヲ得〇予實驗ニ因テ全ク此事ヲ確  
定ス〇神思尙憂ノ症狂妄ノ症及ヒ  
ニ於テモ吐利甚其功カヲ逞ス〇此ニ又自久ヲ  
好ノ症アリ予此症ヲ見ル<sup>ル</sup>漸次ニ三度ニ過キ  
ス此亦吐利ト同時ニ与ヘシ加刺秩阿刺中和塩  
ヲ用ヒ目久ヲ好ノ思考頓ニ止ニ術上大幸ヲ得

タリ

卒中

卒中ノ症其脈尚実顔面赤色刺絡ノ急裕タルヲ  
見スノ個ハ嚴ニ吐劑ヲ禁スル如ク若シ這般ノ  
症絶テ有サルキハ急ニ之ヲ命スヘシ然ルキハ有  
カノ刺戟發揮ノ劑トナルノミナラス屢尚能ク  
効驗ヲ奏ス〇然シ此症ニ吐劑ノ誤用ヲ為サハ  
患者ニ大害ヲ与ヘ死ヲ促ニ至ル故ニ之ヲ用ル  
時ニ適忘スルキヲ定ム

第一 卒中ノ症腸胃汚物ヨリ来リ論ハ食後胃ノ

飽満或ハ悪ニ快吐汚穢ノ舌苔等ヲ以テ発スル  
者此症ニ於テ吐劑ヲ与ル一術中才一事トス○  
若シ其肌尚実ナルカ或ハ芟血須ノ人ニハ第一  
刺絡ヲ施シ而后ニ吐ヲ与フヘシ  
第一芟血卒中ノ状喚醒スヘカラサル時  
第二神至性ノ卒中初ヨリ肌而弱面色赤豊大  
十ヲス却テ惨澹萎縮スル者○於是ハ其術亦吐  
劑ヲ急トス○上ニ所云卒中付テ論スル事件諸  
種不仁ノ症ニ於モ同ク適當ス○不仁ノ症ニ吐  
劑才一布カノ品タル一屢見知スル所ナリ

假死

初生児ノ衰弱抑屈サレタル生カラ興奮発揮セ  
シムルニハ予カ説ト実験トニ因レハ吐劑ニ  
如ク者有ルヲナシ○何トナレハ是ニ於テハ百事  
只呼吸管ノ運営ト初生ノ血液循環不トテ発動  
セシムルニ在ルハナル吐劑ノ刺戟ハ並ニ横  
膈膜胸筋に肺等ノ上ニ運営ヲ起シ吐ヲ発スル  
シハ胃械不運営ノ着斗タル原因及ヒ其不運ヨ  
リ生シタル窒塞ハ大抵初生児自ラ排除スル  
能ハサル粘液ノ蓄積ヨリ外ナラズ故ニ我カ術

亦只其吐利ニ因テ気管中ノ粘液ヲ消散驅除ス  
ルニアリ然ルニ此ノ初生児ノ生カ喚醒第一ノ  
劑ヲ顧念セサル者多シ嘆スヘキノ甚キ予此理  
ニ因テ大ニ吐利ヲ用ルキ命ス○上件確定ノ方ニ  
証明タル一実験ノ案○一貴婦已ニ児ヲ産スル  
不幸々得ルヲ二回ニ及リ其児強壯ヲ具有スト  
虽毎回生カラ全クセスノ生ル○其児絶テ音聲  
ヲ発セズ偏乏レテ開クモ微々トモ唾スル如キ  
ノミ呼吸モ亦知得スヘキナク女時ヲ歴テ輒テ  
死ニ至ル○良医俊烈覚醒ノ諸劑浴湯空氣ノ吹

入摩擦洗滌灌腸等残ス所ナシト虽絶テ其功ヲ  
見サ、リシ○希望シタル才三産ニ及テ予カ治  
ラ乞フ○予以為ク尔未ノ事跡呼吸障碍ニ吐  
利ヲ用ユヘノ症ナラシト因テ之モヲ豫備セリ  
○見幸ニ容易ク分娩セラル然レモ前回ト諸状  
果ナラス絶テ啼位ヲ発セス呼吸ヲ起コサス稍  
響音ノ唾スルカ如キヲ聞ヘキノミ○予即刻児  
ヲ微温湯ニ入レ一衣ヲ吐根及少ノ加密列笈ヲ  
加タル海葱醋ヲ送下セシム密扭馬ヲ歴テ右  
又此諸件ヲ行ノ而右始テ有カノミヲ発シ粘物

ヲ吐出シ直ニ活潑ノ啼泣ヲ発シ呼レ現ハシ見幸  
ニ救ハルレ〇此ノ如ク百事俊知有リテ此見今ヤ  
健康ノ一丈夫ナリ  
大人ノ假死ニ於テ此鴻益ノ劑小兒ヨリモ尚多  
ク用ヒスレハアル可ス〇上ニ記載スルノ理ト  
可近傍ニ起ル刺戟トニ因テ運営ノ中ニ誘セシ  
メ及肺ヲノ毒物ヨリ寛解セシムルカ為ニ窒塞  
ノ状頭トルヤ否蓋子ニ吐酒石ヲ投スヘシ若  
シ其嚙下因難ナルキハ靜脈ヨリ之ヲ射註ス可  
シ

小兒病

小兒ニ治療ヲ施ス諸菜ノ中予カ説ニ因レハ吐  
劑ヲ以テ諸菜ノ右ニ少サント欲ス〇小兒ノ病毒  
ハ大抵胸胸對神至及ヒ心辺ノ神至叢ニアリマ  
クハ有形毒ナリ〇小兒疾病ヲ起スハ實ニ此神  
全上ニ起ル諸運動一般確乎タル功カラ全軀ニ  
及ス者ナリ〇小兒ノ吐ハ大人ヨリモ却テ容易  
ナリ〇予此諸件ヲ實驗シ得ル一勝數フヘカラ  
ス少幸ニ煉熱シ得タル者ニ就テ一卷ヲ著スモ  
又難カラス〇予幾度カ最初毎ヘタル一吐劑ニ因

テ小兒ノ劇熱ヲ瞬間ニ退却シ屢則喉咽ノ病感  
ノ初起ヲ防止シ劇甚ノ咳嗽他業ニ因テ除キ難  
キヲ制止シ吐及ヒ亦下劑ノ症ヲ治之加之暝寧  
ノ症其源ヲ助間ノ神経統ニ取ルヤ真子ニ亦能  
ク之ニ鎮伏スルヲ得タリ○余カ多年治療場  
終末ノ煉熟ノ如ハ尤ノ如シ○若シ小兒殊ニ  
ハ一歳ノ兒熱病ニ侵サル兼ルニ食欲之缺乏苦  
汚穢ヲ以テ之尚且兒己ニ自ラ吐スルカ或嘔氣  
及吐セント欲スル等ヲ登見セハ決テ吐劑ヲ急ラ  
ズ人能ク此劑ヲ用ヒハ其益鮮カラズ術モ亦之

ニ由テ落成ニ及ヘシ最初ニ之ヲ用ルヲ急ラ  
ハ後他業ノ能ク其損ヲ補フ処ニ非ス况遲期  
ノ用ヒラヤ○若シ兼テ咳嗽及呼吸ノ疾患現  
在セハ宜ク此劑ヲ急ルヲ忽レ其症屢能ク此劑  
ニ由テ排斥セラル○予只小兒昏睡ノ症ヲ兼々  
ル熱ノ為ニ侵サル、其ハ之ヲ禁ス○於是ハ医  
常ニ頭部ノ血液蓄積トシ尚恐クハ激衝腦水ノ  
初起トノ見ルヘシ故ニ吐劑ハ妨害ヲナスヲ明  
ナリ○然シ其他ハ小兒ニ於テスルキノ努力劇  
甚ヲ恐レ且之カ為ニ生スヘク見ルニ頭部へノ



ノ思考ナリ○加之此理ニ因テ既驗ナク毒尚胃  
中ニ在ンテ察知セハ常ニ催吐ノ術ヲ企テ自  
然良能ニ擬ルト云ヘシ○然レ共ニ二箇別アリ  
〔其一〕時トノ酷厉熱禁毒ノ用ヒノ后ニハ吐劑甚  
後烈恐ルヘキ留トナリ予只乳劑及油類多分ノ  
投与フ由テ其酷厉ヲ保護排泄スル外カ為スヘ  
キ所以ヲ知ラス  
〔其二〕時トナハ吐絶テ現レハ僅ニ惡心ヲ現スア  
リ此ノ症殊ニ痲痺毒ニ由テ起ル胃ノ知覺亡失  
甚タシキハ吐酒石ノカ及フ処ニ非ス尚強壯ウノ

ヒツトリムシニキニ批テ効ヲ取テアリ○如以時  
從令コクギンブ胃物ヲ取テ吐劑ニ代ルノ  
說アレモ時ヲ歴試験ノ積ニ非サルヨリハ未タ  
其果テ可ナルヤラ知ラス予以為ク毒既ニ胃ノ  
縁固難變則ニ因着スル者豈一昂械ノボンブノ  
及ブ処ナラスヤ只胃ニ固有ノ宿張カニ因テノ  
ニ能ク此ノ排斥スベシト

越而実哉集録扶氏各病吐劑實驗記終

諸病疾ニ沃実鳥護ヲ用ル治驗

厄那別尔氏ノ至驗ニナリ  
十年二百三十四葉ニ出ツ

沃実鳥護ハ巴私掃蘭察ノ医格烏尔多乙私

谷千八百十三年初テ之ヲ發明ス尔後舎察家相

緬テ其製法益精微ニ至ル

此元素ハ謝当健ノ如キ諸種ノ海草殊ニ扶厘私

歌矢厘魯午私实艾荅扶私律行私薩加里柁斯加

尔須艾涅烏斯繇蒲刺那刷烏斯菲預福尔密私等

ニ之ヲ含ム又鳥尔萃类海綿海水硫黄水坑水等

モ亦此元素ヲ有ス○後世之ヲ検査ニ尚鑛屬及

ト海獸モ此原素ヲ有スルヲ發明セリ

沃実鳥護ハ酸素水素ニ親和シ酸ヲ生スルノ性

ヲ有ス○其酸ヲ生スルヤ水素ト親和スルト甚

シキヲ以テ之コレヲ亞夫儒謨歌独魯沃实厘謨

名ク○此物諸元素ニ飽和スルキハ中和塩トナ

ル其灰汁塩ニ飽和スル者ヲ歌独魯沃实私利及亞

私及ヒ曹達ト名ク專テ医菜ニ供ス○水銀亜鉛

鉄等ニ混和スルモノ各更至用アリ

海綿霜及ヒ諸海草灰ニ療瘵病嚙下妨碍症腺病

ニ屢効ヲ為スヲ実驗ス其功莖那塩ノ尙歌熱ヲ

ニ卓知アル格爾列氏魯刷兒氏ノ二家之ヲ論示  
セリ○麻露腸間 腺ノ豊大ヲ兼ル者肺ノ浩節  
腫及ヒ勞瘵ニモ亦効アリバロシ氏曰ク此劑勞  
祭ニ功ヲナス者ハ其初期ニアリ既ニ時期漸ク  
進ムモノ者未更効ヲ見スト

乳癆及他ノ頑硬腫肬候見様ノ潰瘍ニ之ヲ用ユ  
或ハ全効ヲ奏シ或ハ快復ニ赴リモノアリ  
麻健實ハ曰ク舌上肬屈兒様ノ潰瘍经久治セ  
ス己ニ病院ニ在テ不治トナシタル患婦ニ人ニ  
汰實鳥謨ヲ用テ全治セリト○亞別氏舌瘻腫ニ

之ヲ用テ治シタル説ニ云リ

一男子數三十九歳舌及ヒ下頰腺ノ頑硬腫ニ罹  
リ其舌豊大ニノ平塌ナラス截断術ヲ行ヒ言語  
嚙下共ニ困難灼ガ如キ酷厉液流出シテ休時ナ  
シ仍ラ在ノ方ヲ処シテ

汰實鳥謨一錢 橙皮 洒石葉液各錢

薄荷水ニ若干

右調勻シニ茶ヒツ、与ルテ日ニ四次或ヒハ六  
次

○腺ノ頑硬ノ部ニ汰實鳥謨軟膏ヲ搽入セシム

○又二三日ヲ過ルノ右左ノ含嗽劑ヲ与フ

歌独魯汶多刺萬世斯 羊乳 黑櫻実水ニヨ

酒石菜液 玫瑰密 各半ヨ

右調勻ル含嗽劑トナス

右ノ方法ニ由テ頑硬疼痛著シク減ス舌軟ニメ  
運轉シ安リ遂ニ四週ノ快復シ病院ヲ法ル

痲兒蒲尔屈地侍匡鳥尔滿欲歌独魯汶多刺萬世斯羊乳

ニ家猫脂一ヨ半ヲ和シ軟膏ヲ製シ鶏屈兒様ノ

ノ潰瘍殊ニ他菜ノ絶テ功ナキ症ニモ之ヲ称用

ス○又子宮硬結腫及ヒ撥護ノ暢屈兒ステニ一

次膀胱截刺術ヲ行ヒシ者ニ注射ノ大功ヲ奏セ

リ此劑梅毒ニ用テ功アルト上症ニ異ナラス○

撒兒列氏ハ尤畢凡ノ経久頑腫ニ用テ之ヲ治セ

リ○淋病便毒ニ俾効ヲ奏セル人アリ

白帶下或ハ月経過働ニ用テ布カノ劑トス又々

蒲列刺君ハ疾血殊ニ月経過働ノ合從スルモノ

ニ称用セリ○水腫痲痺輪或皮膚潰瘍等ニモ切

ア) 至今健多林氏痛凡症ニ之ヲ称用ス○密而

侃氏ハ肝脾ノ肥大ニ称用シ加尔的尔氏ハ遺尿

病ニ人ニ用テ効驗ヲ表ハセリ上ニ挙クル諸疾

患ト汝実烏護ノ効カトヲ熟考シ又煉熟ノ諸家  
ノ如ク適当ニ之ヲ行フキハ癰腫ヲ治スル  
体メ却テ又害アルヲ爰ニ論示セントス蓋  
其心ヲ用ルル勿クニ大量ニ之ヲ用ユス  
諸家ノ説ノ如ク害ニ害ヲナスノニニ功アル  
ト絶テ之レナシ  
此劑ニ由テ起ル所ノ害ヲ防ントセハ某劑ノ入  
身ニ効ヲナス如何ト某劑ノ為ニ発スル処ノ顯  
症如何ヲ知ルアリ余思フニ此劑ノ効カニ道  
リ才一小量ニ用ルルキハ消化机ヲ憤起シ食氣ヲ

進ム然レモ大量タルキハ他ノ酪疔毒ト一般ノ  
害ヲナス才ニ血液ノ運行ヲ進メ身体ノ濕燥ヲ  
増ス○水脈諸ニ一種ノ刺戟ヲ施メ可運管ヲ  
充フシ吸収カヲ増進セシム○此劑濫用スルキ  
ハ其効著シク神全ニ及ビ下ニ胎卵ナル惡性ヲ  
発現ス然レモ細心メ之ヲ用ルルキハ其某毒頗ル  
著シカラス  
又量ヲ漸次ニ増加シ持重スルキハ之ヲ休ムヘ  
キノ景况ヲ発ス格即持多氏此ノ景况ヲ各ケテ  
飽和トナス○又景况ハ頗ニ発スルニ非ス漸ク

沃実烏護ヲ持長シ自家諸症見ツシテ後初テ之  
ヲ発スル者ニ

此劑ヲ用ルノ后自家ノ諸症ヲ発スルキハ注意  
メ直ニニ後服ヲ止メ水銀劑ノ頭眩ニ於ル病状  
ニ從ヒテ再ヒ之ヲ用スヘシ茶劑ノ大量ニ過若  
ハ長服スルノ后発ル所ノ諸症才一途中ニ起ス  
ル者ト諸液中ニ吸収セラレテ初テ起ル者ト  
ノ已別アリ才一途中ニ起ル者ハ嘔吐胃痛腸痛  
下利頑固ノ便秘ナリ才二ノ者ハ疾脈心悸動眩  
暈視力聚耗穀多ノ乾咳不寐全身ノ急劑瘦乳房

萎縮脱力脚腫戰振等ナリ全ク用法ヲ誤ル者ハ  
死ニ陥ルヨナラム誤用ニ由テ発シタル上ノ諸  
症ノ例ヲ揭示スルテ難カラスト虽余自ラ之レ  
ヲナスト至テ少ナキカ故ニ爰ニ之ヲ畧シ其害  
ヲ防キ既發シタル諸症ヲ鎮靜スルノ茶劑ヲ説  
示スルモノナリ沃実烏護ノ消毒法トノ唯糊類  
ヲ称用ス〇凡乙尔埜理兒氏曰ク一少年沃実烏  
漢護用ニ由テ劇シキ胃痛ヲ發シ恐憂煩惱セリ  
此症ヨナラムノ誤用ニ由ルノ注意セハ仍茶劑  
ヲ持重スルニ由テ患者ヲ瘦シ劇甚ノ腹痛嘔吐

ヲ癸シ遂ニ血硬ヲ下シ諸種ノ瘥幸来リ麻小且緊ニ  
甚敷顔面腫澹萎悴セリ○是ヲ以テ阿片ヲ配シ  
ヌルキリステールヲ行ヒ然レモ輕快ヲ覺ルテ以  
テ故ニ鎮瘥蒸利ノ胃部ニ施シ浴湯ヲ行ヒ終ニ  
阿芙蓉ヲ用テ諸症鎮静ス然レモ此病態仍舊留  
スルヲ以再ヒ大量ノ阿芙蓉ヲ持長シ漸ク快復  
ニ至ル○尔右患者胃ノ衰弱ヲ覺ユ食毎ニ大ニ  
留意ヒリ然レモヨシウムノ効ニ由テ瘰癧腫ヲ  
免レ健康ニ復ヒリト○又曰クヨシウムニ由テ  
癸スル処ノ諸症ニハ温浴阿芙蓉粘滑菜ヲ用ト

格印埜氏ハ上ノ諸症ニ乳汁殊ニ驢馬乳微温浴阿  
片其他鎮瘥諸菜ヲ稱美セス○私極密多氏ハ續  
草鹿角精菲汰私等ヲ子タリ  
上ノ諸説ニ由テ大量ノ沃実烏護身体ニ如何ト  
ナスヲ明カナリ○此劑大量ヲ頓服シ胃膜ニ害  
ヲナスモキハ粘滑諸菜乳汗ス他緩和ノ諸菜過  
量ナリシ若シ所謂飽和ヨリノ神全症ヲ癸スル  
者ハ上ニ奉ル神全劑ヲ要ス  
諸家沃実烏護ノ用ル法差異アリ其確著シル者  
ヲ尤ニ奉格印氏用法ニ種アリ則内服外用ナリ

此外用ト为モノハ之ヲ摩入シ胃ノ妨害ヲ防クヲ  
要ス○内服劑歌独呈屋托私劑馬亞斯ヲ蒸餾水ニ溶志  
シ者或更切カラ増シカ为ニ更溶劑ニヨヂ  
ウム一ニムヲ加ヌルモノ或ハヨヂウムヲ亞尔  
箇兒ニ溶シタル者ヲ用ユ論ハ左ノ如シ

内服劑

第一單方溶解劑

歌獨呈屋劑馬亞斯 四十八ル

蒸餾水 一ろ

右混和○此溶劑凡ヨヂウム三十六ルヲ含ム

第二複方溶解劑

歌度里屋劑馬亞斯 半匁

蒸餾水 一ろ

ヨヂウム 六ル

右溶和

才三 丁戒去尔

沃実烏護 四サハル

再餽焼酒 一ろ

右混和

諸此溶劑格印氏ハ大人 於テ十滴ツハ日ニ三  
次与へ一週ヲ終ニ五滴ヲ加ス時トナ更カラ増  
ス片ハ廿滴ニ至ルトアリト尙氏大量ヲ要スルナ

リ○此溶劑ハ舍利別或少許ノ砂糖ヲ加ヘタル  
水ニ溶シ用ユ又アヲヒヤム漿ニ加テ尤モ妙之  
外用法

歌独里屋刺馬亞斯 羊毛 家猪脂 一ろ羊

右混和为軟膏○捺実大ヲ取り朝夕患部ニ摩  
入ス此用法ハ胃ノ知覚過敏ナル者或ハ内服

ニ堪サル者緊要ナリ

蒲尔刺氏ハ上ノ方法ノ外一方ヲ製セリ則ヨク  
ウム六氏ヲ硫酸亜的兒一匙ニ溶シ用フ此溶劑  
滴余ニ堪ル者稀ナリ又ヨクウムキムヲ一凡トナ

ニ朝夕之ヲ用フ又ヨクウム羊毛ヲ家猪脂一ろ

羊ニ和シ此レ膏トナセリ○此種ハ梅毒ヲ兼子

タル腺病ニ俾効アリ

薩印魯乙私地病院ノ医律我兒氏千八百廿七年

八月十日ヨリ○同廿八年九月十三日ニ至マテ

腺病百余人ニ此劑ヲ用ヒ良効ヲ奏セリ又方尤

ノ如トシ

内服劑

才一 莖餉水 一ル

素実 十ニル

沃実 羊毛

素魯律兒

才二 莖餉水一匁 沃実三匁 素魯律兒

素実十二匁

才三 莖餉水一匁 沃実一匁 素魯律兒

素実十二匁

右調白十二時間ニ用テ才一法ヲ常ニ用ヒ二ヶ月前ニ才二方ヲ用ルテ稀ナリ才一方ニ至ハ患若委ク要スルヘ非ス又分量ヲ増加スルテ絶テ乏アルトナシ  
外用劑トシ屢々痲瘰癧ニ注射シ或ハ眼劑ニ用ユルニ尤ノ如ク溶解ニ供用ス

才一 莖餉水一匁 沃実二匁

才二 莖餉水一匁 沃実三匁

才三 莖餉水一匁 沃実四匁

頑固腫ニ摩入シ或ハ潰瘍ニ敷スルニ尤ノ膏ヲ良トス

才一 家猪脂ニ七 沃実剝馬亞斯 四匁

沃実四匁

才二 家猪脂ニ七 沃実剝馬亞斯 五匁

沃実十四匁

才三 家猪脂ニ七 沃実剝馬亞斯 五匁

沃実 十六又

右混化膏トナシテ入法外敷但ニ十二時間ニ一  
次行フ沃実烏護製劑ハ上ニ揭示スル分量ヲ以  
テ確定スルカ故ニ余爰ニ多言ヲ贅セス然レモ  
漸ク増量倍加スルニ布サレハ的功ヲ奏スル  
能ハサルト云者アルヲ以再點メ言サルヲ得  
サルナリ○余験スル処ノ一病人アリ歇度里沃  
托斯劑萬里私丁幾三十五滴ヲ服セシメ未功ア  
ラサルヲ以テ漸ク増加メ六十滴ヨリ廿余ニ至  
リ日ニ三次与ルニ亜症少シモ発セサル者アリ

余カ思考ナル所ト衆医ノ説ト全ク差異アル  
ナシテ健氏ハ歇独里沃托斯劑萬里私丁幾  
三幾ヲ用ヒシヲ説明シ特律刷兒氏ハ一婦人  
乳癆ニ沃実烏護ヲ日ニ三回ヨリ三十九回マテ  
加用シニケ月ノ間ニ一子十九回マテ眞ニ殊ニ  
三十回マテ八日間特重セシト余飽過ノ上ニ徴  
少シモ見ハレスト云フ  
ヨヂウムノ功カラ現スレ屢晩キカ故ニ數週數  
日特重スル后始テ二三日間之ヲ体止スヘキ症ヲ  
癸ス○然格印氏歇独里屋劑萬里私丁幾一男

子ニ十滴ツ、日ニ三次与ヘシニ五日ニテ已ニ  
功カヲ現ス者ヲ見ルト云フ是ニ由テ之ヲ見ハ  
ス々感忘機ノ異ナルニ由テ茶利ノ功カモ亦違  
ミアルト明カナリ故ニ此利ヲ用ヒント欲セハ  
女カラ障碍スル諸事ニ注意シ又患者ノ年齢性  
質等ノミナラス尚之ヲ用ニ難キ他病ノ合併ヲ  
才一ニ現除スルヲヲ勒ムヘシ  
此劑ヲ禁止スヘキ諸症左ニ列挙スルカ如シ妊  
婦子宮出血ノ素因アル胸病ノ恐アル者アルハ  
キ之ニ罹ル者消削病遷延熱体格薄弱神全性

或ハ衰弱甚キ者皆之ヲ禁ス○コノ劑ヲ瘰癧ニ  
用ヒント欲セハ病氣管腺ニ在テ痛ナク周縁ノ  
蜂蜜質ニ在ラサル者ヲ撰ムヘシ扶敬蘭土氏ノ  
説 瘰癧疔痛疼アツテ脈管菜統刺衝機高進ヲ  
兼ル者ハ此劑却テ害アリ○全ヨデウムノ説ヲ  
上ニ奉ムル如ク此劑時トノ害ヲ免スルト明カ  
ナルヲ以テ尚細心ノ法則ヲ確定スルト固ヨル  
蛇足ナラス  
沃冥鳥護ノ適症アリト虽日々診スルト能ワ  
サル患者ハ必之ヲ用ル勿レ○病ニ因リ日ニ診

ヲ要セサル者アリト急テ診察ヲ延ス勿レ○  
既ニ薬剤ヲ与ル者ハ毎トニ沃実鳥謨ヨリ強発  
スル傍症ニ注意シ若シ飽過フル者ハ處ニ從服  
ヲ止ムヘシ○余禁止法ニ説示スル夏竹殊ニ壯  
婦ニ在ハ細心ノ之ヲ用ルヲ緊要トス○処女ニ  
在テ極テ止ムヲ得サルニ非レハ之ヲ用ル  
ヲ禁ス尤ニ揭示スル扶歌蘭土ノ治例ノ如クヨ  
ヂウハ乳房ヲ萎華セシムルアルヲ以テナリ  
扶氏曰一女子廿歳体格偏倚ナラス瘰癧腫ニ罹  
ルヲ以テ之ヲ消散セシメン為ニヨヂウム下莪

ヲ持長スルヲ丸六ヶ月ニメ又症治スト虽乳房  
萎華ス○薬剤ヲ止メテ服スト虽乳房日ニ縮  
小シ二年ヲ過ルハ右乳腺少モ蹤跡アルトナシ  
女子此劑ヲ要スル者ハ歌士魯汝柁私ヲ用フル  
獲レリトス聖哉氏ハ此劑萬亞斯ニ由乳汁ヲ萎  
縮スル者ヲ見スト諸明哲ヨリ少ムノ功害ヲ概  
論セシニ由ニ余カ実験ニ益アリ此以テ患者ヲ  
健康ノ域ニ踏ラシム實ニ大幸ト謂ヘシ

沃実鳥謨製法

ヨチウムハ千八百十三年ニ方テ巴里所ノ匠格

尔灵乙私ナル者始メテ発明ス燒テ柁喜及瓦乙  
律薩屈等其質ノ何物タルヲ検査セリ○ヨゲウ  
ムハ素儒誤或ハ剥馬亜私ト供ニ海草及ヒ海岸  
諸草ノ灰中ニ含蓄ス故ニ此諸草ノ灰汗ヨリ製  
造スル者ナリ○其燒灰ヲ水ヲ溶シ沖過メ之ヲ  
蒸發セ而メ芒ノ結ハシム此ノ如クスル一三四  
ニ其刺液ヲ採ル此液ハ汰土素胃膜ツリトニムシ  
ソレニ硫酸石天硫酸刺馬亞斯食塩含硫汝実鳥膜  
炎酸曹達等ヲ含ムカ故ニ未タ清潔ナラス故ニ  
此刺液ニ上好ノ硫酸ヲ混シ蓋キ相埒ニ蒸レハ

含硫黄水素瓦町及ヒ塩酸瓦斯騰去ス其石水酒ヲ  
蒸餾若ク移シ酸化満淹ヲ混メ微火上ニ煖ムレ  
ハ満淹ノ酸素曹胃膜ニ合メ曹達トナリ忽チ酒  
中ノ硫酸ニ溶解シ爰ニ於テヨクウム氫氫遊離  
メ水気ト俱ニ蒸騰メ冷ニ從テ餾器ノ裡面ニ凝  
着ス其色剛鉄ノ如ク且鏡輝アル芒ヲナス○此  
芒ヲ集メ無糊ノ紙間ニ挾ニ掩シ乾シ尚一四周  
封シタル小蒸餾器ヲ以テ之ヲ蒸弁スヘシヨク  
ウムヲ得ルニ海草ノ母滴ヲ蒸乾シ硫酸少許ヲ  
註テ微火ニ上テ所及カ塩酸ヲ分析シ其石酸化

満俺ヲ加テ玳瑁ノ莖縮曼ニ入レ再々硫酸ヲ稍  
多量ニ注テ火ニ煖ムレハ忽莖紫色ノ美烟起  
列馬兎ノ頸及ヒ莖縮曼ニ凝集ス

第五章

再種痘ノ比例

日  
上  
〇  
此  
篇  
ハ  
千  
八  
百  
廿  
三  
年  
布  
魯  
乙  
尔  
所  
回  
陳  
中  
ニ  
於  
テ  
驗  
ス  
ル  
処  
ニ  
ノ  
魯  
茂  
乙  
尔  
人  
名  
ノ  
集  
録  
ナリ

軍陳ニ於テ牛痘ヲ種ルノ法千八百廿一年以來  
稱シテ同三十三年ニ至ハ益稱美メ止マズ同年  
種痘スル所ノ者ヲ算スルニ四万八千四百七十  
八人ナリ是レ皆原ト種痘ヲ行フ者ニメ痘痕ア  
ル者之レ無キ者トアリ則左ニ列スル如シ  
○痘痕明カナル者

三万七千二百八十六人

○痘痕明カラサル者

七千六百四十一人

痘痕全ク無キ者

三千五百五十二人

右ノ人数ニ今種痘ヲ行ヒ又経過ヲ記シ列ス  
ル左ノ如

○経過順正ナル者

一万五千二百六十九人

○経過順正ナラサル者

○痘感セス者

二万一千六十六人

痘感セス者ニ再ヒ種痘ヲ行ヒ又経過ヲ尤ニ  
列ス

○痘感スル者

七百八十四人

○痘感セス者

三千三百七十七人

種痘ノ数ヲ箇ヲ以テ行ヒシニ眞痘ヲ得ルノ  
数尤ノ如シ



ル殊ニ千八百三十三年ニ於テハ才一ハ新軍  
卒ノ隙中ニ未ルノ常ヨリ晚ク軍事ヲ習フ時  
短キヲ以テ之ヲ遺イテ身ヲ医ニ託スルヲ能  
ハス才ニハ種痘ヲ行フ可者数多ナルヲ以  
痘ノ列護華種痘ニ用ル痘ノ之ク殊ニ才六隊  
ノ軍卒ニ於ハ廣ク再種痘ヲ行フヲ企テシ  
ニ障碍有テ行フヲ能ハサル者タリ英牛痘ヲ  
種ムル小兒ノ数少ナリ軍卒ノ再種痘ニ用ヘ  
キ列護巴之キヲ以テ止テ得ス軍中医事ハ  
針金鉄鍼或ハ硝子板間ニ貯タル乾痘ヲ以テ

種痘ヲ行モノニハ大人ヲ形狀經過正シキ真  
牛痘ヲ用ヒ再種痘ヲ行フ者ニハ再種痘ノ形  
狀過正シキ真牛痘ヲ用ルヲ切要トス  
牛痘ヲ貯タル鉄鍼或ハ硝子板間ニ貯タル者  
ヲ以テ再種痘ヲ行フニ切ナキ者屋ヲシ然ル  
ニ其人再々新痘ノ列護華ヲ腕ヨリ腕ニ種ル  
成ハヌハ良痘ヲ見ス  
再種痘ヨリ採ル所列護事ハ初種痘ノ新鮮列護  
華ニ比スレハ切ニ分レリト云フ然レモ亦少兒  
ノ新痘ニ用タル再種痘ノ別ニ異ナルヲナシト

云者ナリ再種痘ヲ行タル大人ノ列護事ヲ以小  
児ニ種痘ヲ行フキハ又痘径過正シク牛痘ト共  
功同シ何トナレハ又見再ヒ初種痘ノ新鮮列護  
巴ヲ以テ種痘ヲ行フニ施テ感受スルアルトナ  
シ軍医再種痘ヲ行フニ表皮内ニ刺種法功種法  
トテ施ス者アリ又其他ノ法ヲ行フ者アリ○ナ  
ニ法中截種法殊ニ大人ニ施メ益アリト云フト虽  
モ概スルニ差異アルヲ視ス依姑訶倫曰截種ハ刺  
種法ニ比スレハ発見ノ数少シト是レ又截口列護筆ヲ  
受クルト十分ナラスノ痘毒感受之キニ起者之

越児実験經驗

脊髄神經嫩衝様

一女子發ヒ才体頗弛緩ニノ脆弱ニ年前痘幸罹  
リ亦九月月前重キ神經熱ニ罹ルト虽幸ニノ全快  
ス五月初旬ニ施テ怪中儘 質初ニ罹ルカ一二  
日発汗劑ヲ用ルニ由テ諸症速ニ緩快ス○同七  
日患者既ニ臥床ヲ離ルノ后足ノ大指ニ施テ劇  
甚ノ楚痛ヲ發シ同八日朝ニ至リ最早又痛兩脚  
及ヒ踝部ニ傳達シ過甚ニノ縱令柔カニ撫スル

モ忍ベカラスノ身体ヲ少シモ運動スルヲ能ス  
患部ニ於テハ腫脹又他明著ナル変化ヲ見ルヲナ  
シ○右ノ諸症ヲ以テ之ヲ考テ窮スレハ此疼痛脊  
髓ニ在ルヲ知ル是ヲ以テ水蛭ヲ脊ノ部ニ貼シ  
小量ノ甘汞ヲ与テ○午后ニ至リ又疼痛蔓シテ  
而全脚ヨリ腰髓ニ至リ又疼痛劇甚ノ患者流ヲ  
愁苦シ恐憂苦酒ヲ扱子顔怒ルカ如ク少シモ運  
動スルヲ能ハス遂ニ全ク枕ニ就テ兩足ヲ以テ  
漸ク辱衾ヲ蹴揚ケ之ヲ撫スルニ少モ耐ユルノ  
シ○患女兩脚劇痛ニ苦ムヲ最モ甚シト虽片破

傷風ノ如ク強直ナラズ強ク屈曲スヘシ脊髓ニ  
於テモ亦同シ全身ノ搐製スルヲエレキヲルニ  
至ルカ如シ○顔面熱シ兩手寒冷ク脈甚ク疾小  
ニテ強意識甚過敏眩トノ速ニ発狂状トナルヲア  
リ脊髓ノ上部全ク痛ナク頭兩腕障碍セラル、  
トナリ○大便軟小便失禁ナラスト虽床中ニ  
漏ス又量甚少シ○九日早朝之診スルニ「メイリ  
チス」リハリス殊ニ「サ」クヲリスヨリ升ナラス  
ヲ以テ脊髓ニ水蛭十二條ヲ置テ原キ午賜ニル  
ヲ容レ脊推ニ寒葶劑ヲ行ヒ

耳聾一丸 右一服トナシ半時毎ニ与フ  
水蛭血ヲ吸フ饒多 若四弘時間安眠スル程ヲ  
疼痛著シク減ス脊髄ヲ按摩スルニ漸ク堪ルニ至  
ル此ヲ以テ

水銀軟膏

二分時毎ニテ擦ス

○十日至リ片痛再ヒ増進ス然レ氏前ノ如ク甚  
シカラス

耳聾ニ丸ヲ与フト虫便秘スルカ故ニ

耳聾ニ丸 葯刺也ハ及ヲ取り一服トシ一時半  
毎ニ與フ此劑ヲ用ルレト三服ニメ大便通フスル

多ク劇キ腹痛アリ○十一日加魯茂兒劑一服テ擦  
刺寒蒸劑持久ニ行ニ由テ疼痛止シ安眠ス是ノ  
大脂初テ動ヲ身体ノ搖製全ク止シ患者アヘケ  
ヘト果実名ヲ食フ○夜ニ至リ疼痛著ク発作ス  
ルカ故ニ亦水蛭ヲ施ス○十二日右脚ヲ既ニ動  
カスト著シキ魚テ丸脚ノ大脂ヲ動カス○全身  
ノ戦慄及ヒ脈状等大ニ快復シ大便自在ニ通ス  
此夜亦疼痛発スルカ故ニ再ヒ水蛭ヲ行フ○十  
三日ヲ患者大ニ軽快ヲシ背脊ヲ跣屈スルヲ得  
而脚痛全無ク運動自由ヲ得食気元ニ復シ之ニ

由テ上ニ列拳スル利ノ量ヲ減シ漸ニ全ニ瘡ス  
ルニ至ル一二日ヲ過ルノ後卧床尙シ速ニ快ヒ  
後

○唇腺腫破經驗トユサヘラント

一男子齡十ニ歳昔時二歳ノ辰誤リ隨サレテ下  
渉スルノ右口腺劇キ頑硬腫疾癢様ノ疹ヲ発ス  
之ニ兼テ唇ノ諸核著ク豊大小ナリ疼痛擴張  
シテ殆ニ破潰ス此ニ由テ拳家内家ノ救業ヲ  
仰クニ至ル翁匠賈某兒ニ治療ヲ託スレヒ効ナ

キカ故ニ余ニ治ヲ請フ其症左ノ如シ下唇全ク  
頑硬腫トナリ凹凸シテ彼此破潰シ一種惡ム可  
キ粘牙ノ物ヲ益発ス○此頑硬腫唇ノ周圍ヲ余  
覆ヒ齒齦ニ蔓延ニシテ之レテ按スレハ痛鮮シト  
虽氏時トノ刺ス如キ痛ヲ覺ルテアリト見ルカ  
云フ之レニ兼テ全頸腺腫ヲ発シ殊ニ下顎舌腺  
腫脹ノ硬ク或ハ彼此破潰ニ及フ物布リ○余上  
戸ノ外科ニ託シ其部ヲ破潰セント欲スレ氏然  
カレ氏腺固有ノ毒勢ニ由テ既ニ根踞スルヲ甚  
シ全唇ヨリ下脛ヲ截リ除リニ非ラサルハ無益

ナリ此載除術ハ果テ行フテ得サル也故ニ先内  
服劑ニ由テ試シテ始ム処方

葇若根 大黃 砂糖 各ニル  
用エ右ニ至テハ夜ニ之ヲ用エ

牛蒡根 羊蹄牡松子 罗羊根 耳草

右飲劑トシ用エ乳製ノ食餅 与フテ八時毎ニ  
水銀劑ヲ与フテ此方法ヲ用ルテ十四日ニテ諸  
症少ク變化ナシ之ニ由テ前散劑ヲ 各ニル 量ヲ加  
ヘ日ニ与フニアラビヤニハ漿ニ之ニ膏腦三戈  
容他ニ外部ニ塗ルテ此方法ヲ行フ右患者 腫

非常ヲ蓋氣ヲ癸シ項ニ疹ヲ癸スルテ饒多然レ  
氏唇ノ頑硬腫變化スルテナシ却テ粘膿ヲ漏シ  
屢出血ス○今ヤ前ノ散劑 各四ル 増与ヘ兼テ腕  
ニカコウハストヲ貼シ打膿セシム此方ヲ行フ  
俗聖日ニ至リ患者衰弱ニ面色慘憺ニノ戰慄ス  
前ノ散劑ヲ隔日ニ服セシム之ニ由テ通利適度  
ヲ得タリ○十四日ヲ歴ヌスルノ後頭ニ疥癬  
ヲ癢スルノ甚唇ノ状態自若トメ変セス然レ氏  
疼痛全ク退リ○十四日ヲ過ルノ右諸變化ナリ  
外部ノ結核痂ヲ結ヒ 動モスレハ出血ニ下頸

腺破潰スルヲ始メ悪性ノ潰瘍ニ変ス○前ノ  
散糸ヲ止メ左ノ劑ヲ投ス処方

失 工キス 金硫黄 カロメル 各五分  
右丸トシ朝夕四丸ツ、一日毎ニ一丸ヲ増シ  
与フ

前ノ煎劑及打膿法ヲ持久シ外敷劑ヲ止メ三週  
ヲ経ル右更頑硬腫少ク小ト成リ疼痛減ス常ニ  
痂ヲ錯ヒ更痂時トメハア、レドベシイ、ンノ痂  
ヲ遣セハ脱落ス前ノ丸糸ヲ用ル一日ニ二次ニ  
メ十五粒ニ至ル今ヤ春ニ至ルニ由テ左ノ方ヲ

処ス

蒲公英 葛苣ゲルホル 碎米菜新絞汁  
一椀ヲ飲シメ外用エキスタラクトサテルニイ  
鉛酷 亜鉛華 各半分 アラゼヤニム漿ニ混和シ  
テ貼ス

○此劑ヲ用ル一三週持重スレハ諸症少クモ変  
セズ之ニ由テ

阿魏 罗羊泉 莖工テス 石氏トシ日ニ三  
次十二片ツ、与フ兼用布連幾貫奉スル水銀片ヲ与  
フサツサス 耳草 失鳩 卷ノ煎劑ヲ与ヘ外用劑

前ニ依ル之ニ由テ頑腫大ニナル〇上ニ拳ル菜  
ノ外ニアシヲモ一酒三十滴日ニ日ニ三次用之  
レヲ待久スル一三週ニ至ル凡諸症変化ナク硬  
腫消散已又頸ノ破潰ノ腺腫モ亦愈ス此ヲ以  
テ水脈及腺質ニ刺戟ノ効ヲ奏スル菜劑ヲ選用  
ス即チ 礮砂 揮発精 十五滴分量ノ水ヲ加ヒ  
日々三次但一日ニ四滴ツ、加増シ与フ兼用  
松茅一握  
右ノ煎劑ヲ与フ此松茅ハ壞血病腺膜ニ卓効ヲ奏  
フスル者也 びイテシナアト新ノ絞汁一椀毎晨

飲シム隔日毎日微ノ石鹼浴ヲ行ハシム  
吐酒石一又水四多溶解之日ニ數回口内ニ含  
亦患部ヲ滋潤ス此劑ヤ解凝ノ効最モハゲシク  
シテ刺戟劑ト謂フトモ可ナリ  
此方法ヲ行フ四週患者著ク輕状シ頑硬腫軟ノ  
小ト其痂メ造ル一減シ凹凸ノ部平塌トナル礮  
砂揮発精ヲ用ル一四日ニ四十滴ニ至レ凡患者少  
モ嫌忌セス之レニ由テ遂次ニ増進シ用ヒ患者  
益状痊シ此ヲ以テ此法ヲ持久ノ唇再ヒ恒ノ状  
態ニ復シ頑硬腺部及ヒ頭腺共ニ大半消散シセリ

フシラシイ一曰ク皮膚清潔劑ト名クル者  
例スルニ

安貞母祖謨硫黃 水銀硫黃合劑ホクスウ

ト サツサフラス サルサハリルラ 牛房根

サリシスアレサリナ 半蹄 杜松木及根及芽

芎半泉荃 榆皮 マセア葉 蒲公英根

葉新後汁 芦根 紫堇葉 ケルホル

碎米菜 草薺葉 破模等ナリ

○月経痲

モ人トヘーステリノ婦人月至ニ当テ痲率ヲ

登スル者ハ月至未ルニ三日前ニカビメルハカ  
ストリユムニ<sup>三</sup>サフニシニ<sup>二</sup>ソイケル<sup>一</sup>反右三包ト  
ナシ臨卧ニ加蜜列漫ヲ以送不ス月至未ラサル  
旬ハアサフ<sup>一</sup>ケリヲ持久シ<sup>二</sup>与<sup>三</sup>此症多血ヨリ  
未ル者ハ豆部ニ<sup>一</sup>放<sup>二</sup>テハ量ノ血ヲ洩シ<sup>三</sup>脚浴ヲ施  
ス一ボラクス<sup>一</sup>ス<sup>二</sup>ニ<sup>三</sup>下劑水ヲ用ユ

○頑痲危篤服水治験

老人ニ登スル服水ハ多クハ危候ニシテ死症タルト固ヨリ論ナシト最モ  
今此ニ萃ル症以病ヲ異察スル死症タルト固ヨリ論ナシト最モ  
ヲ渴示ス

一翁六十九歳肝藏焮衝ヲ病ニ治療其血ヲ得ル

毛然肝藏慢性炊衝及ヒ硬腫ヲ貼遺シ終ニ服  
水ニ轉シ原因甚互ラス肝部ノ近部疼痛知覺敏  
ナルヲ残スト蚕尾石ノ丸ヲ与テ治ス エレテ  
リイセブララルビルレン丸原名  
カロースル一丸 ヒラスエキスニ丸石丸ト  
ナシ三時毎ニ与フ稀硝酸九滴ヨリニ石ノ一盞ノ破  
糖水ニ和シ日ニ三回与フ 患部ニ発泡膏ヲ貼  
ス  
此方法ニ由テ一日間ニ患翁日一日ヨリモ快ヨ  
ク肝藏炊衝全ク治ス后兩脚ノ腫脹ヲ患ヒ終ニ漸

ルヲ明ナリ此危険ナル為ニ再ヒ刺絡術ヲ施シ  
丸ノ解凝利尿導泄丸ヲ与フ

アシモニヤリ子一ヲ 蒲公英エキス  
ヘ子子ア石齡各一丸 海葱末六丸ビルヘイ  
ガラキイルナニ詳 杜松子油適宜

右混和シトハ丸トシ一日ニ五丸ヨリ十丸ヲ  
漸ク増加シ用ユ

外用劑 コロシキハ子下莖 ジギタリス下莖  
海葱下莖各羊 硃砂揮発膏一羊  
右混和シ一日ニ二三回毛布ニ塗り水腫ノ各部

殊ニ小服ニテ入ス○服法方ノ峻効ヲ逞フスル  
ノカラ書頭ワサント欲スレモ欲上ニ尽シ難膏  
等ヲ投スルノミ○没水ノ量著シク増益シカニ  
善キ大便ヲ通スニケ月ヲ過ルノ后再小服内ニ  
彌留セ入陰囊腫モ漸ク除キ兩足ノ浮腫消散シ患  
患者カラ得コアク酒ヲ用食嗜定ス○原効ナ  
キ縛帯モ今ヤ大ニ有益トナツテ日ニ漸次ニ固  
縛シ之ニ由テ水腫全ク消散シ患者升額大ニ  
変快愈ニ赴ク飲食消化大便通利モ共ニ常ノ如  
ク庭外ニ側歩スルニ至ル○五年間ニ全ク康強

二復シ些ノ疾患モナク容貌花麗トナリ遠行モ  
倦勞ヲ覺ヘサルニ至ル

備考此ノ刺腹ノ術ハ膏一旦ノ効ヲ逞スル  
而已ニ非ス他某ト并行フ時ハ此病ヲ根治  
スルノ良術ナルヲ此症ニ於テ徴知スルニ  
足○然モコノ症ニ偉効ヲ卷スル所以ノ者  
ハ特ニ摩擦法ヲ以テ巨擘トス如何ントナレ  
ハ塗擦法ヲ用ル毎ニ小便分利著シク増加ス  
レハナリ尚且以前ニ投スル内服方光此ノ  
外用法ノ諸劑ト配但一樣ナリト云モ此ノ

加キ俊効ヲ頸サ、レハナリ○小腹ニ施ス  
縛帶モ亦外用方利ノ方ヲ輔テ殊ニ水液ノ  
分泌ヲ促シ亦新瀉苗ヲ禦防ス此ノ西効ヲ  
貝布スルナリ

○血治驗

一男子廿歳身体強康劇キ血ヲ護タリ○此患  
若血ニ罹ル一既ニ屢々ト虫疝水ナラス故ニ  
衰弱スルヲ辨シ○今ヤ血ニ二月間持長スルニ由  
テ其ニ親外科ハルトテ治ヲ請フ症左ノ如トシ患  
者灰白色ニメ臥床ニ卧ス言フ一能フス其血

次ニ漫延シテ全軀水腫ト成リ漸ク小腹膨脹シ  
波動ヲ発スルニ至ル之レニ由テ一年間利水鮮  
疑ノ諸利殊ニ加印加根煎ヲ用ユルト虽モ効ナシ  
水腫ノ為ニ死スルノ患者ヲ救フヘキ術窮スルナ  
リ諸愈陰地ニ陟リ小腹内水液蕩々トメ満瀉シ之レ  
ニ由テ膨脹スルヲ尋常ナラス延テ陰囊腫脹シ  
患翁坐臥立歩俱ニ能ワス此ニ由テ患者ニ刺版  
法ヲ施サント欲スレモ翁肯セス由テ懇到告諭  
フ漸ク其術ヲ許ス此術ヤ原ト試験方ナリト虽モ服水ニ罹ル一既ニ  
時ニ水ヲ瀉ス一饒多ニメエムリス桶ノ名

桶ニ及テ此ニ由テ患最甚ニ輕快ニ赴ク○予今  
手術ヲ行フ時ノ患翁ノ諸症ヲ肝列スルモノハ水  
腫常症ヲ踰テ一層危険ノ状態ヲ知ラシメシカ  
為メナリ患者四支膨腫スルヲ常ニ倍ニ陰囊水腫  
スルヲ甚々陰莖囊中ニ陷匿シ小便ヲ通スル毎  
ニ困厄セリ○夜ニ痒痒釣ノ咳嗽ヲ起シ些少ノ  
粘液ヲ吐ス小便亦少渾濁ニメ大便ハ唯下痢ニ  
由テノニ通ス肌膚粗糙ニメ乾燥シ日夜煩渴ス  
小腹四支鉛黑色ノ斑ヲ現シ衰弱ノ運管妨碍セ  
ラル肝臟疾患ヲ受ル最モ著ク終ニ其極度ニ至

ノ勢補ノ嘴栓ヲ脱スル如ク四支寒冷ニメ肌弱  
ク痒痒状ニメ漸ク診シ得ヘシ諸收斂劑頭鼻ニ  
寒卷法ヲ用ヒ收斂薬ニ浸漬スル栓ヲ鼻中ニ挿入  
スト虽凡悉ク知ナリメ出血持去ス○辺兒路回  
斯人ノ方ニ從カヒ二箇ノ撒糸ヲ把リ其一ハ精氣  
劑ヲ塗リ又一ハハハルスヲ塗リ鼻孔内ニ深ク挿  
入シ兼テ孔ヲ前ヨリ壓定ラナス然レ出血仍止マ  
既ニ危地ニ臨ニトス○因テ陰ノ部ニ寒卷法ヲ  
用ルヲ一時許シメ頰ニ全ク止ム此ノ法ヲ用ル  
尚一日ニ及フ○患者ノ諸力甚々脱ヲカ故ニ裁

那鉄劑ヲ与ヒ之ニ由テ漸次ニ快服ス

○舞蹈病治驗

一男子六歳一二週尙劇シキ舞蹈病ニ罹リ由テ外科ニ治ラセテ○之症細虫ニ基因スルヲ以テ屢々駆虫劑ヲ与フ虻虫駆除スト虽氏病治セズ是ヲ以テ免<sup>各人</sup>此症ヲ純粹ノ神至病ト之ノ且精慾ヲ起ス処ノ器械ノ変草元進スルカ故ニ未ル成長ノ如ニ発スル病トシ尤ノ劑ヲ試ム  
亜鉛花 緬<sup>中</sup>漫劑 鹿角精<sup>緬</sup>中未  
カマフ<sup>テ</sup>油 香竈浴 櫛<sup>奇</sup>生 橙葉

竜腦 等ヲ用ユト 蚕悉ク効ナシ

○成長スル年記ニ発スル痙率病ニハ劇劑ヲ与サルヲ定規ナス別ニシトクレフスワルト地名ニ於テ癩癩舞蹈病ニ効アル処ノ孟候設ルヲ試ム  
碓銅<sup>岩</sup>一挂枝水<sup>六</sup> 鹿角<sup>ニ</sup> 麦  
右混合シ日ニ三次五滴ツ、漸ニ加ヘテノ八滴ニ至ル○八日ヲ経ルノ右<sup>又</sup>病症留留並ニ病勢共ニ成少茶劑ノ量ヲ増ヒシ以前諸症増隻セス  
発作時間ト虽凡食妨ケナク皮膚冷ニノ小便透明ニノ水ノ如ク患志癡蒙トナシ氏<sup>又</sup>原病ノ

ニ從ヒ諸他意識ニ係ル症モ亦從テ悉ク消散セリ

○童兒鼓脹治驗

一童兒年甫歲初生時ヨリ其母ト一様ニ便秘スルニ尤モ頑キ易シ予ハ而ニ十六年十一月十二日當リ劇シキ鼓脹ヲ患ヒ再ヒ弟ニ治ラ乞フ之ヲ診スルニ病ノ極度ニ至リ櫻ルヘキ服便ミトメ亮滿ス緊張シテ彈カマリ之レヲ撃テハ其声鳴鼓ヲ撃テカ如ク腸及腹膜間ニ病様ノ養セル凡氣ヲ生ス○耳聾ヲ持久シ与フ此主養トメ患兒ヲ治ヌ又尋

常明養モ効ヲ呈ス硫黃阿魏ノキリステノル非鉄塩丁我等ヲ用ヒ末期ニ至ツテ「キラ、ルイキフ」ルイアンモミルウヒル詳ヲ与フ○腹部ノ快夜ニ向テ秤量ヲ以テ之ヲ言ハハ凡氣許多ノ量ヲ漏ス「ナキ」ニ腹部ノ空潤ナル「實」ニ其ニ彭脹ニ嬰ルノ間ハ漏ス処ノ大便恰モ漆淘菜ノ如シ○此患兒羸瘦骨立シ頭髮脫尽スレ氏餘右療トメ用ニルノ菜劑ヲ三四ノ間持長ニ此劑驚ヘキ効ヲ奏シ食欲増進レ消食機補給カモ故ニ後ニ病全ク愈ユ

○黒障眼治驗

一女子一雷其母卒然トノ死スルニ由テ頓ニ左ノ症ニ罹ル○虚里ノ動劇シク呼吸困難尪憂昏シ頭重クシテ壓スルカ如シ加旃其部動搖スルヲ覺ユ耳騷鳴ス此症速綿トノ明ニ達ス翌朝旦ニ至テ既ニ明ヲ失ス全ク物ヲ弁識スルノ能クス由テ予ニ治ラ乞フ其症尤ノ如シ○腫子甚々散大ニ眼光常ヲ失シ脈實數ニノ緊ナリ予由テ尺沃ニ創口闊大ニシテ刺絡シ大量ノ血ヲ放テ防痙利ヲ内服セシム此日ニ於テ視力漸次ニ故ニ

復シ翌日ニ至テ全ク故ノ如ク状復ス

園下ノ女子五歳尪ト為テ十四日ヲ経歴スルノ後予ニ落ラ乞フ内黒障眼ニノ水様液中ニ水丁ル自翳ヲ浮フヲ見ル此兒十有五日目前疹ニ罹リ疹ヲ発スル時期ニ於テ外氣ニ觸胃シ身軀ヲ寒冷スルニ由テ疹遠ニ消散シ立地ニ尪ト為ル其餘患ル処ナシ処方尤ノ如シ○吐瀉石膏ヲ頂ニ帖シ尤ノ利ヲ内服セシム

右調勻ニ用ユ○兼テ效子ヲ混々ル全身浴  
カロメル 亜兒尼加花 竜腦 金硫黄

ヲ行フ

之ヲ行フ一五日間視力全ク故ニ復シ今ヤ三年ニ及ヘ凡病ハ処無シ

○夜盲眼經驗

一症ニ二十九歳一ニ四日間既ニ夜盲ヲ患ル后治ヲ請フ又症左ノ如シ燈火ニ對シ物ヲ見ルヲ能ハス然レ凡燈暈金黄色ノ如クナルヲ以テ肝臟ニ患害アルヲ思考ス精細ニ之ヲ診スレハ右肋骨少ク起腫ス及フニ疹ヲ発シ痒アリ季助下ニ著硬クメ大ナル肝臟ヲ觸知ス然レ疼痛ナシ尚

且検査スルニ患者半年前ニ肝ノ嫩衝ニ罹ルヲアリ然レ治療ヲ求メス及ヒ口朶若ケノ舌黃胎アリ食欲減損シ屢嘔吐シ而シテ若キ噎氣ヲ発ス大便硬タメ灰白小便金黄色ナリ右肩並ニ同部ノ胸腹鈍痛ヲ覺ヘ右腕強直ナルヲ覺フ患者甚々疲憊シ身体羸瘦シ皮膚黃色ヲ顯シ夢寐煩悩ノ寧カラズ精神尙起状々トノ鬱憂ス患者衰弱甚キニ由テ輕易ヲ解疑劑ヲ与フ又方尤ノ如シ酒石塩液 蒲公英エキス 白屈菜エキス 水製大黃丁莖煎酒石 右茴香水薄荷水ニ

溶シ用ニ

一二迴ヲ過テ劇キ黄疽ノ諸症ヲ発ス傍症年ハ  
減シ亦夜啼ト皮フノ痒疹ハ全ク消散ス患者諸  
カ少ク快俊スルニ由テ患部ニ水銀膏ヲ广捺ス  
内服方ハ

矢鳩谷 耳朶 実芫荽利斯 右調勻シ用

ニ

肝臟硬結腫脹漸ク甚ク増進ス前ニ用ル菜ヲ半  
年間連用スルニ由テ夜啼痒疹消散スレ氏全身  
水腫ヲ起シテ遂ニ死スルニ至ル

○血腸流血治驗

麦酒家ノ一夫齡二十四歳幼ヨリ大便スル毎ニ  
血腸ノ脱垂ヲ患ヒ辛ク以テ推納スルヲ為ス八  
年尔来日ニ大便スル毎ニ下血ヲ患ヒ以前ハ  
血ノ量一茶碗一盃許ハ右漸時ニ増進シテ世三  
盃餘ヨリ半ヒラ目ニ漏出スルニ至ル通スル処  
ノ大便瘡汚ナリト虽氏頻正ナリ然氏甚黒キ血  
ヲ纏繞ノ通利シハ血忽チ凝血スルニ至ル以出  
血ノ症ヲ患ルニ由テ少壯男者衰弱ノ極度ニ至  
リ従前出血スレ氏ハ餘ハ健康ニメ常ノ如クナ

ル者忽于食嗜飲モシ顔灰白色トナリ勢カモ脱  
ノ遂ニ臥床ニ就クニ至ル〇四日間他医諸種ノ  
準繩ニ從テ之ヲ療スルヲ何等ノ病症ナルカ治  
ニ功アルトナシ諸惡性増進スルカ故ニ予ニ治  
ヲ乞フ諸ヲ診スル先ツ指ヲ以テ直腸中ヲ検査  
スルニ種脹硬結等モ未タ搜リ得ス〇内服劑マ  
ハ「ラタニ」アエキスニ膠蓉ヲ加ヒ用ユ〇腸脱虫  
ノ部ハ「ラタア」ニ濃煎ヲ以テ洗ヒ然勢ノ食物  
ヲ禁シ此食物ヲ連用スト虽氏續ヲ逞スル變化  
ナシ〇八日間毎日一匁半尔右ニ匁ノ収斂薬約

兒ヲ白糖ニ加ヘ用ヒ刺達亜厄ノ吉利斯發兒ヲ  
行ヒ右明蓉溶解水ヲ以テ吉利斯發兒ヲ為シ行  
コノ刺刺甚シキカ故ニ鉛糖溶解水ニ轉用シ行  
処ノ諸法方功ヲ奏ヒス衰弱増進シ患者臥床ヲ  
膏ル一能ワス日ニ頭痛發熱其他大吐血ノ止  
マス今ヤ後方ヲ処ス

炭酸鉄<sup>十五</sup> 右日ニ三回<sup>朝夕</sup>ニ用ス二日ヲ  
過ルノ后流出スルト二日間然<sup>氏</sup>其間ハ大便モ  
亦通ルトナシ第三日ニ至テ大便ヲ泄ラスニ唯  
些少ノ血ヲ混ス患者再ヒ大ニ諸カ故ニ夜ニ卧

床ヲ倚ルニ至ル〇炭酸鐵ヲ与ヘ寒水六ヶ月  
ニ二回或ハ三四回腸中ニ注射ス此灌腸法ヲ行ヒ  
實ニ甚肝要ニナリハ五腸ノ衰弱ヲ快復シ一ハ  
三日間漏ナルノ便秘ヲ適宜ニ稀釈シ硬便ニ由  
テ腸膜ノ毀傷スルヲ勿ラシム炭酸鐵ヲ持出ス  
ルノ右患者全ク快復ス頭痛發熱食欲欬亡不眠  
等ノ症者ク消散シ肛門下血ノ症全ク未夕除カ  
サルニ著リ減ス此症硫黄ヲ用ユルニヨツテ  
初テ消散シ前医モ之ヲ用ユレド小量ナルカ故ニ  
功ヲ成サス八日間朝夕六人ノ硫黄ヲ与ヘ又十

四日間夜ニ當テ六人ノ硫黄華ヲ用ユ八日間此  
散菜ヲ用ルノ間ハ毎晨寒水ヲノキリステル  
ヲ施ス之ナリステハ患者ノ全軀殊ニ小服ニ於  
テ大有益アルカ故ニ腸血出ツル右弛緩及ヒ底  
重ノ景況去テサルノ間持長ス之ヲ以テ多年患  
タル虫ノ症全愈セリ

〇服及腹腎水腫治驗

一女子齡十六年腸水ニ罹リ兩股腎ニ至ルコト  
腫脹スルニ甚シ諸ノ利尿劑及ヒ實我答利斯ト  
虫ニ終ニ至テハ効無ク却テ錯誤ニ屬スト〇患

者臥ス<sup>ヘラトリ</sup>能<sup>ヘラトリ</sup>ワス<sup>ヘラトリ</sup>其<sup>ヘラトリ</sup>翳<sup>ヘラトリ</sup>腫<sup>ヘラトリ</sup>脹<sup>ヘラトリ</sup>ノ<sup>ヘラトリ</sup>疼痛<sup>ヘラトリ</sup>甚<sup>ヘラトリ</sup>シ<sup>ヘラトリ</sup>ヘ<sup>ヘラトリ</sup>ラ<sup>ヘラトリ</sup>トリ<sup>ヘラトリ</sup>

子<sup>ヘラトリ</sup>音<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>胃<sup>ヘラトリ</sup>部<sup>ヘラトリ</sup>ニ<sup>ヘラトリ</sup>怙<sup>ヘラトリ</sup>シ<sup>ヘラトリ</sup>利<sup>ヘラトリ</sup>水<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>全<sup>ヘラトリ</sup>治<sup>ヘラトリ</sup>セ<sup>ヘラトリ</sup>リ<sup>ヘラトリ</sup>

○胃管瘵<sup>ヘラトリ</sup>瘵<sup>ヘラトリ</sup>様<sup>ヘラトリ</sup>壅<sup>ヘラトリ</sup>閉<sup>ヘラトリ</sup>治<sup>ヘラトリ</sup>驗<sup>ヘラトリ</sup>

一<sup>ヘラトリ</sup>病人<sup>ヘラトリ</sup>胃<sup>ヘラトリ</sup>管<sup>ヘラトリ</sup>瘵<sup>ヘラトリ</sup>瘵<sup>ヘラトリ</sup>於<sup>ヘラトリ</sup>、壅<sup>ヘラトリ</sup>閉<sup>ヘラトリ</sup>シ<sup>ヘラトリ</sup>之<sup>ヘラトリ</sup>カ<sup>ヘラトリ</sup>為<sup>ヘラトリ</sup>ニ<sup>ヘラトリ</sup>噎<sup>ヘラトリ</sup>下<sup>ヘラトリ</sup>ス<sup>ヘラトリ</sup>ル<sup>ヘラトリ</sup>

一<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>妨<sup>ヘラトリ</sup>ケ<sup>ヘラトリ</sup>リ<sup>ヘラトリ</sup>○<sup>ヘラトリ</sup>諸<sup>ヘラトリ</sup>菜<sup>ヘラトリ</sup>用<sup>ヘラトリ</sup>ル<sup>ヘラトリ</sup>ト<sup>ヘラトリ</sup>虽<sup>ヘラトリ</sup>凡<sup>ヘラトリ</sup>皆<sup>ヘラトリ</sup>効<sup>ヘラトリ</sup>ナ<sup>ヘラトリ</sup>キ<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>以<sup>ヘラトリ</sup>テ<sup>ヘラトリ</sup>工<sup>ヘラトリ</sup>

ニ<sup>ヘラトリ</sup>デ<sup>ヘラトリ</sup>ル<sup>ヘラトリ</sup>マ<sup>ヘラトリ</sup>チ<sup>ヘラトリ</sup>セ<sup>ヘラトリ</sup>ノ<sup>ヘラトリ</sup>ト<sup>ヘラトリ</sup>ウ<sup>ヘラトリ</sup>デ<sup>ヘラトリ</sup>外<sup>ヘラトリ</sup>用<sup>ヘラトリ</sup>方<sup>ヘラトリ</sup>ニ<sup>ヘラトリ</sup>隨<sup>ヘラトリ</sup>テ<sup>ヘラトリ</sup>頸<sup>ヘラトリ</sup>ノ<sup>ヘラトリ</sup>兩<sup>ヘラトリ</sup>

方<sup>ヘラトリ</sup>ニ<sup>ヘラトリ</sup>小<sup>ヘラトリ</sup>瓮<sup>ヘラトリ</sup>泡<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>貼<sup>ヘラトリ</sup>シ<sup>ヘラトリ</sup>其<sup>ヘラトリ</sup>表<sup>ヘラトリ</sup>皮<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>去<sup>ヘラトリ</sup>リ<sup>ヘラトリ</sup>其<sup>ヘラトリ</sup>上<sup>ヘラトリ</sup>ニ<sup>ヘラトリ</sup>硫<sup>ヘラトリ</sup>酸<sup>ヘラトリ</sup>莫<sup>ヘラトリ</sup>

兒<sup>ヘラトリ</sup>比<sup>ヘラトリ</sup>捏<sup>ヘラトリ</sup>干<sup>ヘラトリ</sup>瓜<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>撒<sup>ヘラトリ</sup>敷<sup>ヘラトリ</sup>及<sup>ヘラトリ</sup>ル<sup>ヘラトリ</sup>ト<sup>ヘラトリ</sup>ニ<sup>ヘラトリ</sup>三<sup>ヘラトリ</sup>時<sup>ヘラトリ</sup>ニ<sup>ヘラトリ</sup>ノ<sup>ヘラトリ</sup>病<sup>ヘラトリ</sup>全<sup>ヘラトリ</sup>愈<sup>ヘラトリ</sup>ユ<sup>ヘラトリ</sup>

○<sup>ヘラトリ</sup>舞<sup>ヘラトリ</sup>蹈<sup>ヘラトリ</sup>病<sup>ヘラトリ</sup>自<sup>ヘラトリ</sup>驚<sup>ヘラトリ</sup>尿<sup>ヘラトリ</sup>之<sup>ヘラトリ</sup>治<sup>ヘラトリ</sup>驗<sup>ヘラトリ</sup>

リ<sup>ヘラトリ</sup>或<sup>ヘラトリ</sup>ハ<sup>ヘラトリ</sup>三<sup>ヘラトリ</sup>時<sup>ヘラトリ</sup>四<sup>ヘラトリ</sup>時<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>過<sup>ヘラトリ</sup>ル<sup>ヘラトリ</sup>キ<sup>ヘラトリ</sup>ハ<sup>ヘラトリ</sup>其<sup>ヘラトリ</sup>上<sup>ヘラトリ</sup>面<sup>ヘラトリ</sup>點<sup>ヘラトリ</sup>赭<sup>ヘラトリ</sup>色<sup>ヘラトリ</sup>ニ<sup>ヘラトリ</sup>變<sup>ヘラトリ</sup>

ス<sup>ヘラトリ</sup>○<sup>ヘラトリ</sup>斯<sup>ヘラトリ</sup>ノ<sup>ヘラトリ</sup>如<sup>ヘラトリ</sup>ク<sup>ヘラトリ</sup>塗<sup>ヘラトリ</sup>渣<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>布<sup>ヘラトリ</sup>ス<sup>ヘラトリ</sup>ル<sup>ヘラトリ</sup>小<sup>ヘラトリ</sup>便<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>以<sup>ヘラトリ</sup>テ<sup>ヘラトリ</sup>六<sup>ヘラトリ</sup>寸<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>

納<sup>ヘラトリ</sup>ヘ<sup>ヘラトリ</sup>キ<sup>ヘラトリ</sup>玻<sup>ヘラトリ</sup>璃<sup>ヘラトリ</sup>ニ<sup>ヘラトリ</sup>四<sup>ヘラトリ</sup>分<sup>ヘラトリ</sup>一<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>容<sup>ヘラトリ</sup>納<sup>ヘラトリ</sup>石<sup>ヘラトリ</sup>酸<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>滴<sup>ヘラトリ</sup>ス<sup>ヘラトリ</sup>ル<sup>ヘラトリ</sup>時<sup>ヘラトリ</sup>ハ<sup>ヘラトリ</sup>

塗<sup>ヘラトリ</sup>渣<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>見<sup>ヘラトリ</sup>ス<sup>ヘラトリ</sup>ノ<sup>ヘラトリ</sup>疑<sup>ヘラトリ</sup>シ<sup>ヘラトリ</sup>ク<sup>ヘラトリ</sup>又<sup>ヘラトリ</sup>劇<sup>ヘラトリ</sup>キ<sup>ヘラトリ</sup>炎<sup>ヘラトリ</sup>熱<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>発<sup>ヘラトリ</sup>ス<sup>ヘラトリ</sup>又<sup>ヘラトリ</sup>是<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>

取<sup>ヘラトリ</sup>テ<sup>ヘラトリ</sup>煮<sup>ヘラトリ</sup>ル<sup>ヘラトリ</sup>時<sup>ヘラトリ</sup>ハ<sup>ヘラトリ</sup>底<sup>ヘラトリ</sup>ニ<sup>ヘラトリ</sup>沈<sup>ヘラトリ</sup>ム<sup>ヘラトリ</sup>ノ<sup>ヘラトリ</sup>塗<sup>ヘラトリ</sup>渣<sup>ヘラトリ</sup>片<sup>ヘラトリ</sup>ヒ<sup>ヘラトリ</sup>ト<sup>ヘラトリ</sup>ノ<sup>ヘラトリ</sup>ア<sup>ヘラトリ</sup>カ<sup>ヘラトリ</sup>リ<sup>ヘラトリ</sup>

様<sup>ヘラトリ</sup>ノ<sup>ヘラトリ</sup>硬<sup>ヘラトリ</sup>膜<sup>ヘラトリ</sup>厚<sup>ヘラトリ</sup>サ<sup>ヘラトリ</sup>ニ<sup>ヘラトリ</sup>列<sup>ヘラトリ</sup>能<sup>ヘラトリ</sup>ニ<sup>ヘラトリ</sup>及<sup>ヘラトリ</sup>フ<sup>ヘラトリ</sup>モ<sup>ヘラトリ</sup>ノ<sup>ヘラトリ</sup>布<sup>ヘラトリ</sup>リ<sup>ヘラトリ</sup>○<sup>ヘラトリ</sup>又<sup>ヘラトリ</sup>薑<sup>ヘラトリ</sup>水<sup>ヘラトリ</sup>

管<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>以<sup>ヘラトリ</sup>テ<sup>ヘラトリ</sup>之<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>吹<sup>ヘラトリ</sup>ケ<sup>ヘラトリ</sup>ハ<sup>ヘラトリ</sup>上<sup>ヘラトリ</sup>面<sup>ヘラトリ</sup>ニ<sup>ヘラトリ</sup>沫<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>発<sup>ヘラトリ</sup>シ<sup>ヘラトリ</sup>大<sup>ヘラトリ</sup>ナル<sup>ヘラトリ</sup>球<sup>ヘラトリ</sup>

形<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>浮<sup>ヘラトリ</sup>起<sup>ヘラトリ</sup>ス<sup>ヘラトリ</sup>○<sup>ヘラトリ</sup>一<sup>ヘラトリ</sup>二<sup>ヘラトリ</sup>日<sup>ヘラトリ</sup>以<sup>ヘラトリ</sup>来<sup>ヘラトリ</sup>流<sup>ヘラトリ</sup>涎<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>発<sup>ヘラトリ</sup>ス<sup>ヘラトリ</sup>ル<sup>ヘラトリ</sup>ニ<sup>ヘラトリ</sup>因<sup>ヘラトリ</sup>テ<sup>ヘラトリ</sup>

前<sup>ヘラトリ</sup>ノ<sup>ヘラトリ</sup>耳<sup>ヘラトリ</sup>聾<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>止<sup>ヘラトリ</sup>メ<sup>ヘラトリ</sup>屢<sup>ヘラトリ</sup>吐<sup>ヘラトリ</sup>氣<sup>ヘラトリ</sup>アル<sup>ヘラトリ</sup>ニ<sup>ヘラトリ</sup>因<sup>ヘラトリ</sup>テ<sup>ヘラトリ</sup>三<sup>ヘラトリ</sup>十<sup>ヘラトリ</sup>日<sup>ヘラトリ</sup>ニ<sup>ヘラトリ</sup>至<sup>ヘラトリ</sup>

リ<sup>ヘラトリ</sup>上<sup>ヘラトリ</sup>湧<sup>ヘラトリ</sup>ノ<sup>ヘラトリ</sup>症<sup>ヘラトリ</sup>明<sup>ヘラトリ</sup>ナル<sup>ヘラトリ</sup>ニ<sup>ヘラトリ</sup>因<sup>ヘラトリ</sup>テ<sup>ヘラトリ</sup>吐<sup>ヘラトリ</sup>涎<sup>ヘラトリ</sup>石<sup>ヘラトリ</sup>ハ<sup>ヘラトリ</sup>吐<sup>ヘラトリ</sup>利<sup>ヘラトリ</sup>ヲ<sup>ヘラトリ</sup>与<sup>ヘラトリ</sup>フ

之ニ因テ胆汁ヲ吐スルヲ甚クシ○五月二日  
ニ至リ旃那浸劑ニ靛玉塩ヲ加ヘタル下劑ヲ与ヘ  
膽液様ノモノヲ吐スルニ由テ患者輕快ニ至リ  
今ヤ吐全ク止シ不利減ヌルカ故ニシキタリ  
スレ 服トシ二時毎ニ与フカ便ノ分泌自苦ト  
シテ増スコトナシ五日ヨリ十日ニ至ル迄シギ  
タリス 瓶一服トナシ二時毎ニ与ルト虽モ小便ノ  
分膏更ニ變セヌ而モ小便中ニ蛋清状ヲ顯ツスヘ  
夥クシ而モ小便赤色ナリ全身殊ニ小便ノ小腫逐  
次ニ増進シ兼スルニ纖維壓迫ヲ覺ユ頭門重ノ綿

布ヲ卷如シ眼ノ白膜赤ク脈実緊ニノ屢少ノ血  
血ヲ癸ス別給メハ号ノ血ヲ浮ス内服劑ヲ投ス  
シキタリス 反水ニ浸シ四ツヲ取リ酒石英  
ニシテ 海葱醋蜜 覆盆子舍利別 各半ツ  
右混合シ一時毎ニ一食ヒシ与フ

○同十二日小便ノ量増劇シ十二夜間ニ三ボント  
ニイタリ其色稍赤ク印白負大ニ減耗ス頭部呼  
吸大ニ寛解シ水腫諸症減シ脈軟ニシテ既ニ実ナ  
ラス汗癸起セリ○刺給ノ血燼皮ヲ顯ハシ其色  
白且厚キヲ一列印半許アリ処方非日ノ如シ其

他屈訥元度和婢根 洋芥根杜松子ノ利尿劑ヲ  
典フ○十三日実我荅利私尿管ニ効カラ現ス  
著シキヲ以テ右服ヲ止メ利尿劑トシテ酒石ヲ

典フ  
○十四日脈後クシ実ニノ緊ナリ呼吸困難頭困  
重水腫ノ諸症小便ノ負十一日ニ於テルカ如シ  
再ヒ刺絡ノハテノ血ヲ洩ス○十五日脈軟トナ  
リ胸部頭ノ諸症消散シ汗アリ小便ノ分泌増進  
シ服内ノ水腫從テ減ス小便混濁ニメ少ク雲ル  
尿珉アリ今ハ小便硝石酸ヲ滴スルモ前ノ如ク沈

殿物ヲ見ルナシ昨日洩ス処ノ血嫩皮ナリ又  
ク水液ヲ含メリ処方  
シキタリス反

右浸シテ五ヲ取り後茶  
ヲ加フ 海山硝蜜 テスビシ セルヒシ滓  
右混合シニ取毎ヒ一食ヒヲ与

○十九日小便ノ分泌続テ増進シ十二時尙ニ洩  
ス一五ビントヨリ六ビント 至ル屢汗ヲ発シ  
時トメ吐スルナリ 水腫減シ陰莖陰囊殆ント  
常ノ如シ小腹内ノ膨脹共ニ減シ之ヲ撃テ試ル  
ニ皮動明ナラス 西腿ノ腫著シク減シ脈軟ニメ

緩ナリ

二十二月小便通スルノ前ノ如ク困渴アルシ渣  
注ヲ顯ス屢乾嘔シ或ハ吐シ舌上黄苔アリ是ヲ  
以テ吐酒石ヲ与粘液及膽液ヲ吐スルノ一二次  
昼間汗ヲ発シ小便ノ通利減少ス 処方右ノ如  
シ司キタリス票一ル羊 海葱根羊瓜 白糖羊瓜

右混和シ一服トシ二時毎ニ与フ

二十七日前ノ散菜 時長シ与フト虽氏快服速  
ナラス患者殆ント倦忌シ汗ヲ発スルヲ勉タリ

之ニ由テ小便ノ通利減シ諸症著シク險惡ニ進  
ム処方左之如シ

シキタリス羊瓜 カルシユイヘ子子イ食

右熱湯ニ適宜ニ浸シハダラ取り後件ヲ加

フ 苜蓿エキス 一羊 海山エキス 十六瓜

清淨溺石 ニダ 耳硝石精 ニダ 杜松子精 六ダ

セイテンハム阿芙蓉液羊瓜ヲキシノールニダ

右二時毎ニ一食ヒヲ与フ

三十一日前方ヲ与フ但シ前ノ分量羊瓜 増興フ

之ニ由テ少シク快服ヲ得リ大便不利ナルヲ以

テ神那浸劑ヲ與フニ大月朔日処方  
カルジロエキス 一ヨ 孕答酒石 一ヨ 海中エキス  
六八

右洋芥水六ヨニ溶シ橙皮舍利別一ヨヲ加フ一  
時毎ニ一食ヒヲ与フ  
此劑ヲ与ルニ由テ小便通スルヲ數々ニシ十二時  
間ニ三マートヨリモ多ク水腫消散セリ○小便  
灰白ニシテ少ク雲翳アリ今ヤ蛋清笈ハ絶テ見ル  
トナシ○食氣故ニ夜ニ患者能ク眼リ大便常ノ  
如シ○此劑ヲ与フルト三劑ニテ諸症消散シ唯

両脚ノ水腫ノミ遺點ス小便ノ分利ヲ徒カサシ  
カ為ニ杜松子浸劑ニ揮発劑ヲ擦シ脚部ヲ包縛  
ス○二十四日ニイタリ患者全ク快復スルニ  
イタル

卒中凡

一農夫二十四歳体格長ク胞滿セス生来癡患ナ  
リ凡十年前ニ輕キ卒中凡ニ罹リ此病治スルノ後  
ハ今日ニテ健康ナリ○予八百廿九年八月八日  
穀ヲ負担スルニ當テ頓ニ一身知覺ヲ失シ地土  
ニ仆ル○四分取ヲ過ルノ右意識漸ノ再ヒ復シ

唯頭部ノ重キヲ苦ム全軀疲倦スルヲ覺フ急ニ  
近傍ノ外科医ヲ延テ刺絡クシテ一七半ノ血ヲ  
洩ス直ニ知覺失亡ノ症ヲ再ヒ發ス余異朝患  
者ヲ望ニ生人ヨリハ死人ニ多ク乍タリ寢室ニ延  
暢シ臥ス秋口ノ暑威ニ全身惡ムヘキノ寒冷ヲ  
覺皮ヲ色殆ント屍ノ如ク鼻光リ顔死人ノコト  
ク四支撓屈シ易シ諸筋テ痺シ小便及シ軟ナル大  
便意識從ヌシテ自ラ漏泄ス下顎依齒ニ律啞ヲ  
分泌スルヲ數シク口ヨリ絶エス流出ス眼瞼閉  
闔全ク攪シ腫子散スレ眼目色沢ヲ失シ光輝目ニ

能ルモ瞬カス呼吸甚緩ニ胸中稍喘鳴シ虚里  
ノ動悸ニ忘セス吼甚々緩ニ倫次ナリ且ツ弱  
ニ漸ク診シ得ヘシ〇水漿一道モ飲ムヲ能カ  
ルニ由テ外用法ヲ処ス第一患者ヲ温湯ニ浴シ  
頭髮ヲ剃リ頭ト足ト高下ヲ回シ常規ノ如ク灌  
小法ヲ行セ一桶ノ冷水ヲ頭蓋骨ニ注クト齒氏  
少モ功ナリ患者意識ヲ失スル以前、如ク頭項  
トニ荒菁下莖ヲ加タル癸泡膏ヲ貼ス皮膚赤色  
ヲ生スル時ハ之ヲ取り去ラシテ命ス又他全身  
ニ烙鉄ヲ行フ鼻口内ヲ刺戟セシメシカガニ屢

確破精ヲ嗅シム此ヲ行フ間ハ患者ノ口ヲ塞鼻  
ニテ呼吸スルカ如シ○此方法ヲ行ヒ昨日翌夜  
ニ由ルモ諸法一モ功モ奏セズ烙鉄及荒膏膏モ  
皮フニ抗拒ヲ起サズ確破精ヲ嗅シムルモ刺戟  
ノ徴ナシ患者状態昨日ニエトナルヲナシ○サア  
フ根ヲ研磨シ酢ヲ加ヘ四支ヲ濯ヒ五レニ效子  
泥ヲ交換シ行フコノ法ヲ行マノフ一日ニ一次ニ  
ノ前ノ浴方及シ確破瓦灰及ヒ荒膏膏ヲ持及シ全  
身ニ毎半時烙鉄ヲ行フ一昼裏○是ヲ行フ六  
日六夜間持久シ○八月十九日朝ニ至リ腕及股

ニ烙鉄ノ痕稍干ニ忘スルノ朋ナルヲ覺フ皮膚  
ノ温度モ少ク増息スルカ如ク皮膚ニ至リ不足  
ノ大指ヲ動かカス此ノ諸顯症ニ因レハ勉メテ烙  
鉄ヲ行フ時ハ患者生活セシムヘキノ冀望ヲ起  
ス日日夜半ニ至リ漸クニ全身ノ外部適度ノ運  
動ヲ起ス此ノ景況ニ由テ看護者ニ烙鉄ヲ減シ  
用ユルヲ令ス十六日午後ニ至リ患者稍安靜  
ナラス屢膏膏ヲ塗ス時トメ口ヲ閉ツレ下顎  
常ニ依余セズ亦時トメ津唾ヲ嚥下ス眼尚回未  
夕閉カス傍人強イテ上下眼ヲ距離セシムルハ

亦徐々ニ例テ女ノ状態上臉重キヲ覺ユルカ如  
シ先輝ヲ目ニ触シハ瞳子稍運動ス二日以来大  
便セス蓋シ汝腸中蓄藏スル者ナキニ由ル否ラ  
サレハ大便意識ニ従ハスシテ自ラ漏洩スヘシ  
小便尚矢糞ス○近午ニ烙鉄ノ行フ之最終リニ  
方ヲ患者殊ニ手足ニ動搖ス全身烙鉄ノ痕堆起  
ス之ニ由テ屢四支ヲ一挙ニ動搖ス皮ヲ再ヒ適  
度ノ温ヲ行ヘ肌稍疾ニメ洪然レ氏未々甚軟十  
リ虚里ノ動明カニ午ニ忘スルニ至ル○患者嘔  
下スルヲ得ルニ由テ拂郎斯白葡萄酒ヲ取

リ半時毎ニ一ヒツ、与フ「アルニカ」ノ浸刺ニ年  
酉 加ヘ与フ○八月十八日余寢室ニ  
至リシ取患者初テ余ヲ認ノ知ル言誘困難ニソ  
甚々徐々ニ語ル○患者病ノ発作ヨリ既ニ壓渉  
スルノ諸症ヲ記セス僅ニ即今十二時間ニアル  
ト而已ヲ知ル故ニ先時負擔スル穀物既ニ回團  
ニ轉運シアルヲ知ラス○一二日ヲ過キルノ  
後揮発衝動利ニ強壯刺配伍シテ長用シ○九月  
朔日患者全ク健康トナリ予ノ方法ヲ謝ス  
〔備考〕此症ニ刺絡ヲ施スカ如キ胡乱斗筭ノ匡

世ニ蓋シ鮮カラス後進如覆轍ヲ以テ亀  
鑑トスレハ其益實ニ多シ卒中病ノ刺絡ニ於テ  
ルルヤ其症ニ故当ナルハ之レヲ舎テ佗ニ之カ  
冠タルモノアルト無シ然レモ或ハ症ニ於テ  
刺絡功ナキノミナラス却テ送送冥ニ赴カシ  
ムルノ媒ヲ為ス前症ノ外科医ノ如キ是ト書  
讀テ馬ヲ御スレハ馬情ヲ盡サスト故ニ卒中  
ノ刺絡ヲ於ル固ヨリ柅機ノ準繩々ルモ亦々  
之ニ守採拘泥スルノ勿シテ其症ニ如キ其機  
ヲ察シ適當ノ法方ヲ処スヘシ今又其區別ヲ

揭示ス患者其血ニノ顔赤ク膨脹眼目兀出其他  
血液腦ニ壓迫ノ徵アルモノ高血患者強健ニノ  
短頸ナル者ノ如キ其患者ハ刺絡功ヲ成ス疑ナ  
キ者也身軀羸瘦ニメ長頸往來刺絡ニ憤シサル  
者多クハ其人其血貧ニ非ス殊ニ病ノ初発ニ於  
テ其顔依ト顔ナル者ハ假令少量ノ瀉血タリ  
ト虽害アリ況ンヤ劇キ刺絡ニ於テヤ忽カニス  
ルト勿レタレ

○小兒胃軟胆 マーフルウエーキンク

〔第二〕

小児分 後第一日其産スル容易然ルニ啼號ノ  
休ス時ニ千八百七六年初テ予ニ治ヲ請乞○其  
母ノ景况ヲ尋ルニ從來敬乙私的里ニ罹ノ知覺  
最敏疾ニメ乳房望リ既ニ乳汁ヲ含蓄メ大ニ勃  
起シ哺乳セシムルヲ能ハス是ヲ以テ人ヲメ是  
ヲ吸シメ其勃起ヲ減シ小児ヲメ呼吸安カラシ  
ム之ニ由テ児哺乳シ呼吸啼號頓ニ休シ漸ク徒  
康ニナレリ然レ厄常ニ涎秘シ吉利詞食ルヲ行  
フニ非レハ二日ニ三行其便堅ク且白色ニメ粘  
稠ナリ又夜ニ入テ睡眠安カラス稍痛搦ヲ癸ス

ルナリ是ニ由テ解疑ノ吉利詞食ルヲ行ヒ微温  
浴ヲ施シ左ノ方ヲ典フ

大黃舍利別 滿草

右ニ果適宜ヲ採リ茴香水ニ和シ与フ此方ヲ持  
久シ与フト虽状夜ニ至ラス夜恟安静ナラサ  
ルヲ益増進ス是ヲ以テ益解疑ノ吉利詞食ルヲ  
指又シ行フニ由テ漸ク生育セリ○此兒齡ニ比  
スレハ生神ノ官能稍進シ甚ク刺衝性ニモアラ  
ス亦軟弱ニモアラス夜恟啼號スルノ外母意ト  
スルノ諸症アルヲナシ大便ノ通利漸ク順正ニ

ナリ夜モ又安眠ス然レモ時トシテハ大便緑色  
ナリアリ○毎七日毎八日ニ方テ患者再ヒ夜  
間安眠ナラサルノ諸症ヲ瘥ス又啼啼シテ眠ラ  
ス然レモ蓄榻ナシ○弟三ヶ月ニ至ルマテ健康ニ  
シ能生育セリ然レモ早朝急ニ全ヲ招ク金到ル  
ノ時ハ患者既ニ斃レタリ又景况ヲ親シク尋ニ  
昨夜ヨリ今朝六半内ニ至ルマテ尤安静ナリシ  
ニ頤ニ寤覺シ而メ四肢抽製メ頤ト共ニ冷ヘキ  
取ラ過キ直ニ死セリト云フ  
死后天時ヲ過キ屍ヲ解キ觀ルニ其色灰白ニメ

膨脹スルヲ殆ント水腫ニ於ケルカ如シ諸筋弛  
延セリ又諸管ノ血液稀薄ニシ流利シ易ク腕ヨ  
リ出血ス腦ハ常ノ如ク嫩衝及ヒ溢出シタル蹤  
跡ナク胸腔内モ別ニ非常ノモノヲ易ルナシ  
服腔内ヲ見ルニ胃ノ内面下底ニ方テ傑列乙様  
ノモノ是ヲ覆シ其粘液膜荒穢セラレ且ツ軟柔  
ナルヲ指ラ以テ容易ク鑷透スヘキニ至レリ其  
他諸腸モ又斯ノ如ク柔軟ニメ物ナク唯風氣充  
満セリ肝脾心左腎モ非常ニ柔軟トナレリ  
○門脈ハ赤血ヲ含ミシト赤ヲ注射シタルニ以

タリ然レ疝焮衝ノ蹤跡ナシ  
其母ノ言ヲ聽ニ死スル十四日未屢嘔吐シ又八  
日未乳汁ノ外他ノ餌ヲ与フ又死スル前日乳  
汁ト蒸餅トクヲ用ルノ饒多ナリシニ死ノ半眩前  
皆吐セリ○此症全身及局処ノ疾患モ俱ニ部解  
ニ由テ知ル如ク明ナリ且ツ肆ニ食ヲ嗜モノハ  
全ク萎黄病ニ於ケルカ如シ

〔弟二〕

子八而二十八年十二月十日生シテ弟八日ニ至ル  
一男兒ヲ診ス其症尤ノ如シ身体羸瘦シ茶色

ク三日以来屢嘔吐シ肌疾ニメ小眼目灰白色四  
肢共ニ寒冷嗜眠スレモ呼ハハ若ク醒受ス緑色  
ノ便便フ週スルノ饒多ナリ速ニ羸瘦衰弱ニ至  
ラントス○病發前三日マテハ本兒十全ニ健康  
ナリ然レ疝焮甚シク病發ノ前ニ於テ午少ク灼  
熱ス○其母ニ十六歳ニメ既ニ流産スルノ三回  
身体羸瘦灰白ニメ「ヘイステリイ」ニ罹ル亦小兒  
タル時タル病ヲ患ヒ許家ノ斯ニ至テ天癸不順ナ  
ルヲ數年後タ萎黄病ニカレ○此患兒「マ」ク  
ノルウエノキニクフルヲ診得ルヲ以テ鰥刺矢鳥

私ノ法ニ從テ厄ノ如ク行フ

芎藭煎ニ コロシウマリニイテムヲ和シ与

フ

芳香菓ニ蒲萄酒ヲ加テ腹部ヲ温蒸シ温布ヲ以テ脊ヲテ擦シ精揮ノ微温浴ノ行フ

○右ノ方法ヲ行フ后諸症輕快ヲ得嘔吐止三元

ト灰白ニメ知覚鈍ナル顔面今赤色ヲ顯シ治滯

トナリ綠色ノ大便変シテ常ノ如ク黄色トナリ

諸カ速ニ復ス○終リニ至テ沙列布浴劑ニ大黃

ト莖少許苗香水ヲ内服セシメ鉄浴日ニ三次行

ハシム

○全乳母ニ命スルニ他ノ乳母ヲ取テ養フコトヲ

以テスレモ肯セス以患兒今マテ十月ニ至ヨフ

コトテ又母ノ乳ヲ哺シ消化機少シク飲損シ且ツ

便秘ヲ疾ムノ外認テ健康ニメ齒牙發生ニモ亦

患フ処ナキカ如シ○千八百三十年四月ニ至リ

注意ノ哺乳ヲ禁シタリ○上ニ謂フ処ノ諸症

ハ初生兒ノ分娩后日ニ於テ屢之レアル処ナリ

○同年四月ノ下院ニ至リ注意ノ哺乳ヲ禁シ唯

輕キ乳製ノ食餌ヲ以テ養育ナセリ然ルニ弟八

日 睡<sup>乳ヲ禁</sup> 恐驚スヘキマ<sup>右</sup>一タアルウ<sup>スレ</sup>正<sup>レ</sup>キニ<sup>レ</sup>  
ニ 浸衰セラレタリ<sup>〇</sup>其症速ニ<sup>〇</sup>羸瘦ニ<sup>〇</sup>大渴引<sup>〇</sup>飲食  
養シ<sup>〇</sup>肌疾ニ<sup>〇</sup>嗜眠<sup>〇</sup>吐甚シク<sup>〇</sup>便秘ノ<sup>〇</sup>常慣<sup>〇</sup>今ハ  
緑色黄色様ニ<sup>〇</sup>粘糊ノ<sup>〇</sup>便ヲ<sup>〇</sup>通スルカ<sup>〇</sup>故ニ<sup>〇</sup>余亦  
恐怖ス<sup>〇</sup>是ヲ<sup>〇</sup>以テ<sup>〇</sup>芳香ノ<sup>〇</sup>温浴ヲ<sup>〇</sup>行ヒ<sup>〇</sup>コト<sup>〇</sup>シ<sup>〇</sup>ウ<sup>〇</sup>ム<sup>〇</sup>リ  
ク<sup>〇</sup>イ<sup>〇</sup>ラ<sup>〇</sup>ム<sup>〇</sup>ヲ<sup>〇</sup>用<sup>〇</sup>ユ<sup>〇</sup>ル<sup>〇</sup>一<sup>〇</sup>四<sup>〇</sup>日<sup>〇</sup>ニ<sup>〇</sup>シ<sup>〇</sup>ク<sup>〇</sup>効<sup>〇</sup>アリ<sup>〇</sup>又<sup>〇</sup>赤  
葡萄酒ヲ<sup>〇</sup>用<sup>〇</sup>ル<sup>〇</sup>一<sup>〇</sup>十<sup>〇</sup>二<sup>〇</sup>時<sup>〇</sup>ニ<sup>〇</sup>シ<sup>〇</sup>ク<sup>〇</sup>効<sup>〇</sup>アリ<sup>〇</sup>又<sup>〇</sup>赤  
シ<sup>〇</sup>ク<sup>〇</sup>快<sup>〇</sup>後<sup>〇</sup>ス<sup>〇</sup>〇<sup>〇</sup>翌<sup>〇</sup>日<sup>〇</sup>ニ<sup>〇</sup>後<sup>〇</sup>夕<sup>〇</sup>嗜<sup>〇</sup>眠<sup>〇</sup>ス<sup>〇</sup>左<sup>〇</sup>ノ<sup>〇</sup>方<sup>〇</sup>ヲ<sup>〇</sup>用<sup>〇</sup>ル<sup>〇</sup>  
一<sup>〇</sup>三<sup>〇</sup>服<sup>〇</sup>ニ<sup>〇</sup>シ<sup>〇</sup>ク<sup>〇</sup>患<sup>〇</sup>者<sup>〇</sup>益<sup>〇</sup>快<sup>〇</sup>復<sup>〇</sup>ス<sup>〇</sup>  
可<sup>〇</sup>承<sup>〇</sup> 羊<sup>〇</sup>乳<sup>〇</sup> マ<sup>〇</sup>ク<sup>〇</sup>子<sup>〇</sup>シ<sup>〇</sup>ル<sup>〇</sup>ハ<sup>〇</sup>ア<sup>〇</sup>ラ<sup>〇</sup>ヒ<sup>〇</sup>ア<sup>〇</sup>ユ<sup>〇</sup>白<sup>〇</sup>糖<sup>〇</sup> 各<sup>〇</sup>六<sup>〇</sup>分<sup>〇</sup>

右混和シ調勻シ一時羊毎ニ羊服ヨリ一服ヲ  
与フ

〇大便傑列シ様ニ<sup>〇</sup>粘<sup>〇</sup>ナ<sup>〇</sup>リ<sup>〇</sup>ナ<sup>〇</sup>シ<sup>〇</sup>ク<sup>〇</sup>チ<sup>〇</sup>ユ<sup>〇</sup>ル<sup>〇</sup>〇<sup>〇</sup>子<sup>〇</sup>ル<sup>〇</sup>ワ  
ベ<sup>〇</sup>ス<sup>〇</sup>セ<sup>〇</sup>ヒ<sup>〇</sup>ラ<sup>〇</sup>ヲ<sup>〇</sup>亦<sup>〇</sup>葡<sup>〇</sup>萄<sup>〇</sup>酒<sup>〇</sup>ニ<sup>〇</sup>和<sup>〇</sup>シ<sup>〇</sup>五<sup>〇</sup>滴<sup>〇</sup>ヨ<sup>〇</sup>リ<sup>〇</sup>八<sup>〇</sup>滴<sup>〇</sup>ヲ<sup>〇</sup>  
用<sup>〇</sup>ユ<sup>〇</sup>ル<sup>〇</sup>一<sup>〇</sup>日<sup>〇</sup>ニ<sup>〇</sup>三<sup>〇</sup>次<sup>〇</sup>ニ<sup>〇</sup>シ<sup>〇</sup>ク<sup>〇</sup>患<sup>〇</sup>者<sup>〇</sup>後<sup>〇</sup>夕<sup>〇</sup>全<sup>〇</sup>ク<sup>〇</sup>快<sup>〇</sup>復<sup>〇</sup>ニ<sup>〇</sup>至<sup>〇</sup>ル<sup>〇</sup>  
二<sup>〇</sup>月<sup>〇</sup>二<sup>〇</sup>十<sup>〇</sup>四<sup>〇</sup>日<sup>〇</sup>ニ<sup>〇</sup>至<sup>〇</sup>ル<sup>〇</sup>マ<sup>〇</sup>テ<sup>〇</sup>亦<sup>〇</sup>葡<sup>〇</sup>萄<sup>〇</sup>酒<sup>〇</sup>ヲ<sup>〇</sup>用<sup>〇</sup>ル<sup>〇</sup>一<sup>〇</sup>十<sup>〇</sup>二<sup>〇</sup>  
日<sup>〇</sup>ナ<sup>〇</sup>リ<sup>〇</sup>

越兒實我經驗

○會苗實我五軟骨水腫様、嫩衝經驗

一男子齡三十二歳身体知覚病ニノ恒ニ強徒ナ  
ヲ又三年以前並宜壽胸痛ヲ患ヘ病院ニ詣リ治  
ヲ乞遂ニ全ク状復ス○子八百三十一一年八月廿  
三日劇シク操作シ身体ヲ熱スルノ後偶冒寒ニ  
其宵ニ至テ咽喉口中ニ痛ヲ発シ呼吸嚙下共ニ  
困難夜半ニ及ヒ諸症險地ニ進ミ廿四日早朝ニ  
病院ニ来○其症如左○廿四日四ツ時之レヲ診

スルニ呼吸困難ニシテ結喉ノ上部ニ於テ痛アリ  
 吸気尤困難ニシテ聲ニ響アルノ義咽喉焮衝ノ  
 未咽ニ似タリ而呼吸容易ニシテ聲ニ響アルノ言語  
 嚙下全ク障碍セラレ顔色慘澹憔悴シ戰兢トシテ  
 驚怖スルカ如シ舌上聖京僂様ノ苔アリ咽喉柄  
 焮衝シ脉疾ニシテ端脉石二十動少ク乾咳アリ今  
 朝大便一行小便渾濁皮膚大ニ発汗ス左ノ法ヲ  
 行フ

刺絡シテハノ血ヲ導シ  
 飲刺 芎藭根煎 硝石 接骨 花

イ一ノ

右羊時毎ニニヒヲ与フ緩和瑟布ヲ頸ニ貼ス  
 同日四ツ之レヲ診スルニ刺絡ノ後少クモ輕快  
 ヲ得ス戰兢ノ状態呼吸困難益甚シク將ニ窒息  
 スル恐レ有ルニ至ル○此ヲ以テ一医ニ「ハル」  
 ヲ延テ其ヲ診セシムルニ曰ク此五軟骨ノ水様  
 腫ナルヲ知リ其ヲ以テ指ヲ口内ニ刺入ル、  
 ニ緩和腫ニシテ殆ント喉内ニ塞ラントス○故ニ咽  
 喉針ヲ取り乱刺ヲナシ少シク血様ニ液ヲ漏ス  
 而シテ患者速ニ輕快ヲ覺フ左ノ方ヲ処ス

蜀葵煎 十二分 ラキシメル 一升

右混和シ含漱セシム丸ノ散初ヲ与

甘草 菲沃斯越我斯 各十二分 棘粘石 十分

白糖 二升

石混和シテ十二貼ニ分テ一時毎ニ一貼ヲ与

○晝九ツ半時又之ヲ診ス刺浴血焮衝皮ヲ顯シ局

処ノ疼痛ト噬下稍輕易シ吸氣著ク緩解シ咳嗽

劇シク粘痰 血ヲ交ヘ吐ス脈尚疾有二十動処

方頸ニ水蛭六箇ヲ貼ス○夜四ツ時ニ至テ呼

吸言語及ヒ噬下等快復ス負レトモ顔々ク赤色

膨長シ熱甚著ク脈芤夕疾石三十度動渴甚シク  
 稀薄ノ大便一行〇二十五日朝五ツ時之ヲ診〇  
 前夜能ク睡ル然レトモ今ヤ惡心シテ膽汁ヲ吐  
 ス熱少ク減シ脈百三十動渴甚クシク咳嗽シテ血  
 線ヲ交タルノ粘痰ヲ屢吐出又稀薄ノ大便四行  
 〇患者ノ好ニ從テ前方ヲ投ス〇晝七ツ半時ニ至  
 リ熱猶鬱留ス然レトモ呼吸及嚔下倍緩簡ニ咳  
 嗽連綿トノ粘痰ヲ吐ス稀薄ノ大便一行アリ〇  
 夜五ツ時ニ至リ熱再々發シ諸症盡ノ如シ〇サ  
 六日朝五ツ時ニ至リ之ヲ診ス〇前夜快寢シ

熱減退シテ脈而動トナリ咳嗽稍減シ呼吸及ヒ  
 嚔下常ノ如シ舌苔有テ食氣ナク渴甚シ稀薄ノ  
 大便四行〇前方ヲ与フ〇夜五時ニ至リ熱ノ發  
 作著カシラス咳嗽亘カラス稀薄ノ大便二行〇  
 二七日朝五ツ時之ヲ診ス〇前夜朝咳連綿スル  
 カ故ニ患者不睡熱減シ脈九十度ト成ル呼吸及  
 ヒ嚔下スルニ痛ナク稀薄ノ大便二行改レヲ以  
 テ左ノ方ヲ与フ

甘扁桃油 一匁 雞子黃 一匁 ア、フヒヤコム 半匁  
 ヒヨシヤムス 十二匁 芍藥 舍利別 一匁

冷熱湯十ヲ注キ乳劑トナシ半時毎ニ匙  
ヲ与フ○夜五ツ時ニ至タリ咳嗽少ク減シ粘痰  
ヲ咯出シ痰少ク唯一癆ス○廿八日朝五ツ時之  
レヲ診ス○前夜安睡ニシテ咳嗽少ク熱大ニ減  
ス然レバ口常ニ乾燥シ食慾ナク水様大便四行  
処方 沙判布溶解劑 十二ヲ 地亞古地温 一ヲ

右混和シ半時毎ニ二匙ヲ与テ至リ粘滯  
大便一行痰未タ全ク退カス脈而動トナリ  
吸氣及ヒ嚔下全ク常ノ如シ○廿九日朝五時ニ診

ス脈尚疾ニシテ縮 処方前診中ニラウリールケ  
ルス水ニテ加与フ○二十日今朝諸疾安睡ニ  
シテ熱ナク大便ニ行患者甚タ衰弱ヲ覺フ 処方

蘭苔煎十二ヲウリールケルス水ニテ 地亞  
美地温 一ヲ

右混和シ半時毎ニ一匙ヲ与テ○廿一日諸症  
益快復シ咳嗽全ク止ム然レバ声甚タ暖ス 処方  
方依前○九月朔日患者漸次ニ快復シ衰弱ヲ除  
キハ病患ナシ 処方依前○三日快復愈順整シ  
諸カ四復ス○同五日 病院ヲ辞シ去ル

○歌尔低多負僕低壞症全治ノ実驗  
カコフヘルヘル<sup>ハ</sup>妻歳三十九歳性ニ健強ナリ  
而ノ偏一二日以来腹便秘ニ困シニ子八百二十  
五年七月十五日予ヲ迎ヘテ診治ヲ請フ其病左  
ノ如シ小腹痛アリテ定所ナク又其ノ痛側過シ  
手之レニ觸レハ痛稍増進スレ然レ緊脹硬瑞  
ナラス正ニ坎レ風氣擴充ノ致ス所ナリ又腹ヲ  
壓ス時ハ腹鳴シテ口ヨリ噉氣ヲ漏シ稍愉快ノ  
覺ヲ四日以来屢キリステイルヲ行フトモ  
大便通セス食欲減シ渴増進セス舌白苔アツテ乾

燥セス脈數ニシテ小然レテ患者自謂ソク是レ妊  
娠ナラント意トセス○患精神安靜ニシテ呼吸  
常ノ如ク深息スルモ小腹痛ヲ増サス○胃寒ノ  
外著シキ誘因ヲ覓エス○予顔癯儀ニ羅ルニア  
リヤ否ヲ頻リニ問訊スト妻氏曾テ之レ無コト  
謂ク然ルニ由テ姑ク上ニ肝列スル頸症ニ從テ  
幸急ヨリ起ル凡氣下定ノ缺幸劑及ヒ破氣驅凡  
ノ劑ヲ投ス之レニ由テ少ク輕快ヲ覺フ○廿日  
予再ニ之レヲ診スルニ大便適宜ニ通痢シ腹痛  
ナク臥床ヲ離ルト告ク凡氣ヲ斂越シ食氣故ニ

復ス然レテ患者腹股合縫ノ部ニ疼痛スル強硬  
腫脹ヲ發ス○此腫ハ蓋シ箱傾癯儀係ナラシ乎  
ト疑フト虽確徵ナキニ由テ姑ク腹股合縫ノ燉  
衝ト為シ左ノ方ヲ処ス

水銀膏 ヒヨス 油ヲ和シテ患部ヲ廣擦ス  
○廿二日予又之レヲ診スルニ右ノ腹股合縫ノ  
部ニ於テ稍高スルノ鶏卵状ノ腫アリ此レヲ  
按スルニ殆ント琶布様ニシテ縱徑ニ二枚指半許横  
徑ニ一枚指半許腫ノ表面暗黒色ニシテ豆ノ大サナ  
ル孔ヲ開ク稀薄ノ汚液ヲ湧出ス○少脱瘡状ニ

変シ釣ヲ以テ穿ツニ腸膜及網膜ノ一部脱痼状  
ヲアラワス○腸ノ脱痼状ニ変スルヲ全ク貌倭低  
ヨリ起登スルヲ疑フ容レス然レトモ患者更ニ  
喘レス○即チ銀ヲ以テ脱状ノ部ヲ截除シ其部  
ヲ淨潔 左ノ方ヲ処ス

我那 スコロチム葉煎汁ヲ以テ淨洗ス香  
竈水ニ浮利塩ヲ溶解シ内服セシム淡薄ノ  
食餌ヲ与ヘ且ツ 仰臥スルヲ令ス○二日ヲ経  
テ脱痼状多ク脱落ス周縁ヨリ良膿ヲ漏泄ス創  
底ヲ儉スルニ網膜ノ一部ト蜂巢膜ト愈着シテ

リホウハルト フルチクバンド縛帯ヲ施シ服膜  
ヨリ壓ス時ハ大便上下ヨリ沛然トテ流ホシ  
終イニ縛帯ヲ見得サルニ至ル○汚液服竅ヨリ  
流溢シ○患者衰弱増進スルニ由テ尤ノ方ヲ与  
我那浸劑 前方洗脱劑ニ没菜丁我劑ヲ加  
工用ニ劇ノ周圍ニ蕪合香軟膏ヲ貼ス○二十六  
日創ヨリ汚液流出スルヲ疑シク然レモ悪性ナ  
ラスト虽モ其局部全ク脱痼状ナク創周圍顆粒  
ヲ具スル新肉頭在ス然レトモ全軀ノ景况慢性  
病ニ進ワクニ由テ尤ノ劑ヲ投ス

紗列布煎ニ水製ノ裁那越裁斯ヲ加工与フ  
解疑ノキリステールヲ施ス洗脱劑前ニ依  
ル

八月三日此ノ日ヨリ尔来大便通スルヲ順正ニ  
メ創口ヨリ流出スルヲ大ニ減シ創口互ニ收合  
シ訪症輕怪ニ走ク○最後ニ用ル劑ヲ持長シキ  
リステールヲ施シ創口シラス子マス膏ヲ貼ス  
○七日内用劑無益ナルカ为メ此レヲ休ム○  
十七日以來大便日々順正ニメ創口ヨリ大便流  
出實少ナルヲ著シ創口終ニ頭尖残留スル而已

○一二週間ノ縛帶ヲ施シ消化シ易キ食餌ヲ与  
ヘテ又創口スワルテエツテ未詳 之大サニナリ液  
ヲ漏ス一唯一二滴ノミ大便常ノ如クニナリ食  
氣及諸カ故ニ復シ患者生産ヲ營ニ至ル○創口  
小口收合セシメシカ為メニ消散銀ヲ其部ニ塗  
貼ス○十月ニ至リ患者漸ク快復ニ至リ懐胎第  
四月ニ及ヒ流産シ再ヒ卧床テ就クト虽氏速ニ  
全治ス○此復時アリテ予亦患者ニ邂逅シ快レ  
ヲ診スルニ鬼倭僞ノ部ニ蜂巣膜固着シ創口全  
ク愈着セリ請運管特ニ場ノ運管モ全ノ順正ニ

歸ス

胃軟弱

一嬰兒比久登兒齒齒列齒生シテ十四月ニ至リ  
神志爽快ニメ父母モ康健ナル時之レヲ生ハ  
然レモ兄弟姉三人其ノ二人ハシカルラケシ  
熱ニ罹リ死シ其一人ハ急性頭水腫ヲ病シテ亦  
死ス○其兒今ヤ六齒ヲ生今茲四月乳ヲ齧レキ  
乳粉食ヲ以テ養ハル曾テ良性ノ痘ヲ病テ今其  
死ヲ免ルナリ○五月第七日ニ至リ嘔吐下痢  
ヲ登ヲ其父母治メハ生齒ノ爛ナルカ故ニ更ニ

意トセス○十二日夜ニ方ツテ諸症劇ク患兒卧  
床下仰臥シ服目陥没シ其輪匝鉛色ニメ半眠ス  
ルカ如クアールトハアール未詳ノ如ク口圍一  
異ノ搐掣アリ轉顛反側シ食蓐外ニ足ヲ投シ被  
覆スルヲ欲セス○患兒漸々目ヲ開キ彼此ニ  
回視シテ悲怛ノ状態ヲ顯ス至微之聲ニシテ呻  
吟ス稍啞嗽ヲ為ス酸臭ノ液ヲ勞セスシテ吐出  
セリ患兒舌ニテ唇ヲ舐メ渴甚シキヲ知ラシム  
止ノ後前ノ眠ルカ如キ状態ヲ顯スト齒疳前ノ  
諸症ニ由テ眠ルヲ得ス○嘔吐下痢十二時尙

ニ饒晏ニテ殆ント等ス可カラス其漏泄物雞卵  
ノ如クナルモノ今ヤ水ノ如ク其色灰白様ニテ  
惡臭ナリノ舌苔白クシテ滋潤シ顔色四支温度  
ヲ減脈小而教ノ胃部軟ニテ粘萎シ全ク生活ノ  
ノ運営ナキニ侶タリ此レヲ按スルニ痛ヲ起サ  
ス全身著シク羸瘦シ此レヲ以テ左ノ方法ヲ投  
ス

升鉄塩 四匁  
別一弓 广香 丑匁  
莖飴水 二弓  
橙皮舍利

右混和シ半時毎ニ一茶ヒヲ与フ

揮発膏ヲ胃部ニ广捺シ温暖ナル香竈菜ノ莖漏  
 劑ヲ全服ニ施ス 飲料ニ稀薄ノ芥米汁ヲ与フ  
 ○患者好テ此菜ヲ飲ミ又能ク服スルニ堪工豊  
 日ニ至リ嘔吐下痢前ノ如ク甚シカラス○十五  
 日早朝嘔吐全ク止ニ下痢稀シニ之レ布リ顔常  
 ノ如シ渴減諸症寛快ス丸ノ方ヲ知ス  
 升鍊塩丁裁劑 十三高 裁那越裁斯 ハム 橙花水  
三考 橙花舍利別 ニ考  
 右混和ニ半時毎ニ毬布ヒラ与フ  
 ○广捺莖漏ニ劑前ニ由ル夜ニ至テ諸症変スル

ナク大ニ衰弱スルカガナニ次ノ方ヲ前方ト代  
更ニ用ユ

廣香 ウハ アラビアコム糞ニ 橙皮舍利別格

右混和シ一時毎ニ一匙布ヒ存フ

○翌夜ニ至リ三時間熱嗜シ嘔吐下痢全ク休ム  
○十七日顔色常ノ如ク陥没シタル眼目再ヒ墳  
與シ胃部ノ刺弱減シテ張カラ生ス○本日ヨリ大  
便之ナキニ由テ鉄塩ヲ去リ之ニ換ルニ蒲公英越哉  
斯ヲ加ヘ之ヲ溶解シテ用○前ノ香麝蒸 漏 劑

ヲ止メ前ノ揮発膏ニ換ルニラウケルス膏月

ヲ以テ六擦ス註老利児膏製法名神經膏精淨羊脂分老利児油先ツ羊脂ヲ溶シ次ニ老利児油ヲ加ヘ後余菜ヲ混ソ攪拌ノ冷ルニ至ル○十八日大便稍硬ク一行患者外

見ノ容顔全ク自然ニ復シ食機唯ニ復ス患児爽

状ニ渴消シ胃部ノ状態正整ス処旁前ニ依ル○

十九日口内鶯口瘡ヲ癩スルノ外患フル所布ル

一無シ玫瑰蜜逢破レ也ボラクスヲ加ヘテ陸擦ス而メ此瘡一方ニ

メ全ク愈ユ ○胃軟弱備考口方今病理学家務ナテ

未詳ノ病ヲ検査シテ医門ノ学ヲ富ス所ノ疾患数多ア

リ而メ小兒胃弱軟弱病ニ亦其ノ一ナリ ○此病ハ

古人モ亦経験シ且ツ書ニ著サザルト虽モモルガ  
クニ各カ云所ノ如ク認メテ佗病ト為セリ然レモ  
方今名哲相繼テ之レヲ詳明シ終ニ小兒ノ危病タル  
一ヲ詳瞭メ世ニ公ニス古人ハ此病ヲロンラリ  
インテ一リ等ノ名ヲ与ヘテ頻リニ天札ノ患者  
ヲ救フ一筋ワス胃賁ノ軟弱ハ他病殊ニ義膜咽  
喉嫩衝ノ繼出ニ非ラス全ク人身ノ他器械ヲテモ  
亦生スル所ノ軟弱病ノ類ニ引病ナル一疑ナシ  
○父母ノ病及ヒ小兒ノ倭質斯病ハ謬リ認メテ  
是原因ト為スト虽皆妄誕ノ説也積年ノ実験ニ

基ク幼稚ノ時ト齒牙發生ノ期トヨ遠因トナシ哺  
乳ト食物ノ宜シカラザルトヲ以テ誘回トナス  
○此病ヲ治スル薬剤中ニ於テ初メニホムメ九氏  
多クノ此病ニ用イテ確著ノ効ヲ得ルニ由テ其効  
アルヲ發明スル塩酸鉄及ヒ其製劑乃チヘルル  
ユムミクヤチキムヲキセイダチヨム  
リキン  
アルヘリトヲアトヲキルイダーチリキチヲヘ  
リソクエトヲ以テ第一ノ良効薬ト為ス

○コレア病

一稚女歳九歳エシリックレナル者著シキ原因ナ

クシテ身體ノ右側コレアニ因テ患襲セラレ蓋シ  
此病慢性ニシ其雙親一ノ惡癖ニノ病ニハ非ス  
ト為シ意トセズ此病顔面ノ筋搐掣シ足蹠辛ハ  
物ヲ墜シ運効不自由ニ由テ或ル人葭菥劑ヲ用  
イテ此患ヲ驅除スルヲ勉メタリト云○然ルニ  
今茲十一月病増進シテ此患甚或ハ只室中ト虽ヒ  
蹶トキハ初ハ小針ヲ墜トシ逐ニ食匙它物ホ  
ヲ墜スニ至ル都ヲ嬉戲自由トラス終リニ諸躬  
ノ運営概ノ意ノ如クトラス由テ父母予ニ鑒察  
ヲ乞ス○此病ハ吾僑屢現ル病ニメ殊ニ小兒十四

歳マテ最モ多ク患フル症也而シテ又因リク烟  
蟲燒灸ニ由テ登スルモノ及ヒ色慾初テ萌生ノ期ニ在リテ  
屢得ルノ症アリ○予又家ニ到リ貝サン諸症ヲ訊伺ス  
ニ燒灸トランヲ思フ加故ニ先胡羅富新浸汁ヲ内  
服セシメ又サバシルラ実越我烟ヲ与フ○此女子穿  
踏痛ヲ患アルフ既ニ三年ニメ遂ニ狂妄ノ症ヲ登ス  
レト昨冬サバシルラヲ用ヒテ全治ス○此症ヲ療ス  
ルヤ十二時間飲食ヲ禁シ膏ニ至ラサハシルラヲ  
凡トシ二十四日ヨリヲ与ヘ翌朝ニ至リ下劑ヲ与フ  
○此法ニ由テ烟蟲及ヒ燒灸ヲ漏洩スルヲニ

十條大便及ヒ青色ニテ透明ナル粘液ヲ下ス  
夥シク遂ニ全ク快復ス○此ノ稚女以前ニ直腸  
炎ヲ患フルヲ以テ去冬ノ如キ諸利ヲ処スレト  
モ聊カ功アルヲ無シ其他亞鉛花嶺草及ヒビヨ  
スエキス等ヲ投スレト一モ効ヲ顯サス○此ヲ  
以テ藜芦（ひんり）脈油（みけ）ニ和シ膏ト為シ胡  
桃ノ大サヲ取り脊髓ニ搽スル一日ニ二三次  
此ニ由テ患者始テ漸次ニ快復ニ赴キ顔筋ノ搐搦  
減シ言辭夾辨シ又后身軀下肢ノ筋モ適意ニ而  
後腕手及ヒ手指ノ筋モ卷ク意之如クナリ○患

者漸々快復ニ赴クト虽氏衰弱甚シキ故ニ適連  
浴及ヒモウト浴ヲ行フ此ノ浴方ヲ行フニ先ツ  
テ「（ロ）」ヲ擦シ直ニ浴セシム此法ヲ行フニ宜  
ツテ全体ニエシキケルノ刺戟ヲ免シ屢忍フ可  
カラサルニ至ル○又母及ヒ看護者厚ク此瘵去  
ラ尊禁ニ連用スルニ由テ患者ヲ運動セシムル  
ヲ勸メ屋外ニ逍遙セシム○腕ノ快復ニ赴ノ  
ヤ尙長ナリ指ヲ自左ニ用ルノ最モ遲延ニシテ  
ニ回復シ初メヨリ縫針粗大ノ枝ヲ創メ辛イニ  
至細ノ工巧ヲ能クシ又能ク書スルヲ獲テ○

其冬ニ至リテ全ク恢復ス

モストコレア病其ノ初期ニ於テハ強キ鎮  
蔭及強壯劑ノ及テ病勢ヲ激発シ險地ニ進  
メシム故ニハレリアナ橙葉旃那葉及ヒ吐  
根吐酒石ノ吐劑每一日阿魏ノキリステ  
又ハ香竈浴等ヲ撰用ス可シ亦ハ鉄棒ヲ以  
テ脊髓ニ貼シ毛布ヲ以テ四肢ヲ擦シ或  
ハ鉄劑幾那又ハ諸浴法等宜キニ從テ選擇  
スルヲ要トス  
○婦人腹水腫ノ驗於ル登

一婦人歳四十九往未熱ヲ患ヒ身體衰弱スル  
甚シト多荏苒トメ日ヲ遷シ治療ヲ怠リ今ヤ臥床  
ニ在リ他医久シク策ヲ投スルノ復予ニ治ヲ請  
フ其症如左全身ノ水腫ニメ小腹膨脹シテ硬ク  
腹中波動未夕明ラカナラスト虽腹ニ水アル  
疑ニシ而足水腫シ顔面黄色ニメ膨脹シ他部モ  
水腫シ大便秘結ス身體大ニ衰弱シ起立スル  
能ハス脈弱ニシ徐胸膈部患害ナシ舌清潔安睡ス  
一周間尔未熱ノ発作ナシ小脈ヲ按スルニ痛  
ナシ然レモ恐クハ肝脾ノ拘塞又タハ腸間膜

塞ナラシ且令現ニ顯ル所ノ近因ナク予前ノ翁  
ニ投スル所ノ丸劑ト六擦膏ヲ以テ此ノ患者ニ  
令シテ又夕施シ行フニ由テ確ニ八日ヲ経テ諸  
症大ニ變化シテ輕快ニ赴クハ脈腫脹大ニ減シ  
又兩足ノ腫脹減シ起坐スル自由ヲ得小便亦  
泌非常ニ増進シ此丸劑ノ為メニ下利ヲ免ヌ由  
テ休ム利水菜ヲ茶ニ換テ之ヲ与フテ擦膏ヲ持  
長シ行フテ八日間ニテ患者愈状シ大便ノ通利  
常ノ如クナリ水腫ノ諸症漸散シ小脈中ニ波動  
ヲ顯ハスナリ諸カ快復シ復日冬暑ヲ懼レス

步行スルニ至ル再ヒ前丸劑ヲ用ヒテ患者全ク  
快愈ス

備考此患者全愈ニ至ル所以ノ者ハ外用ノ  
六擦膏ノ峻切ヲ奏スル也此ヨリ以來水腫  
ノ患者ニ遭フ時ハ此ノ法方ヲ試ルトモ凡  
如此切ヲ顯スナキモ独リ小便ノ分泌ハ  
常ニ著シク増進ス患者衰弱ニシテ胃部ノ  
知覚過敏ナル者ハ此膏ニ由テ悪心嘔吐ヲ  
免スル者亦之レアリ  
○ 神圣衰弱ヨリ 消化器ニ及テ治驗

一男子歳三十七賀苗々辺ノ江苗<sup>各人</sup>ナル者アリ  
彼ノ言フ所ヲ以テスレハ以前強健ニメ病ム処ナシ  
然ルニ菜館ニ未リ身体ヲ勞シ意匠ヲ費ス而シテ食  
嗜減損スルカ故ニ身体ヲ強壯ナラシメシ為メニ揮  
斃ノ飲料ヲ好テ喫タリ然ニ食嗜漸々減損シ遂  
ニ衰弱ノ業ヲ勉ル<sup>一</sup>能ハサルニ至ル〇子八布  
三千三年夏ニ至リ予ニ治ヲ請フ一吐<sup>一</sup>補ヲ与ヘ  
後確破ヲ与ヘ以テ患者自謂ラク全ク愈快  
スト〇同年秋ニ至リカステリイヒ熱ニ罹リ再  
ビ病院ニ到リ曰病ニ罹ル<sup>一</sup>醫ニ診治ヲ乞フ速ニ

回復ス〇千八百三十四年初春又予ニ治ヲ請フ  
其症左ノ如シ患者形貌ヲ望ニ灰白ニメ恰モ蠟  
ノ如シ神志鬱憂エル<sup>一</sup>甚々食嗜全ク瘵ニ一切  
ノ食物ヲ嫌惡シ煩悶<sup>一</sup>経久ノ不寝ナリ此症ヲ各  
ラ依<sup>一</sup>剝昆垵里ト謂フ此症ハ乳糜ノ製造機殊ニ  
脾臟ヲ病ノ居宅ト為ス〇予大ニ心ヲ彈ク<sup>一</sup>瘵  
スレ<sup>一</sup>此虫モ切ヲ現サス<sup>一</sup>以テ病症ヲ詳ニセシ  
カ為ニ<sup>一</sup>医ヲ延テ相謀ニ及ビ亦依剝昆垵里ト謂  
〇病既ニ潔白ナルノ後予患者ニ令メ雷達浴ヲ  
行レ<sup>一</sup>ノ白屈菜蒲公英ノ新搾汁ヲ吸レ<sup>一</sup>ムルノ一方

ヲ起ス○患者此方ヲ嫌惡シ且自謂ラク病ト治  
スルヲ決メ不得ト故ニ病院ヲ辞シ去ラント欲ス  
是レ五日ノ初旬也○再ヒ他医ニ診察ヲ受テ其  
言ニ從テカテアヘンヘルク純ノ冷水浴ヲ行フ  
後同年八月廿一日ニ至リ再ヒ病院ニ来ル其症殆  
ト尤ニ重シトス○患者諸療法功ナキ故ニ適意  
ニ從食シ再ヒカステリイセ熱ニ罹ル○患者衰  
弱羸瘦スルヲ甚シキ故ニ卧床ヲ离ラ能サルニ  
至ル○顔面アノ如ク言語低衰シ脈不齊ニメ數  
小腹部稍膨脹シ疼痛ナク内藏ノ腫脹ヲ顯ス

ナク大便硬小便暗赭色ニメ少ク玫瑰ノ如キ塗  
渣ヲ顯ス○此ノカステリイセ病ヲ除去セン為  
メニ吐根ノ浸刺ヲ与ラ其右五兒尼加ニ硝砂ヲ  
加エ与フ此ヲ服スルノ後諸カ績テ脱亡スルニ  
由テアルニカ硝砂加茴香精ヲ与フ○此方ニ由  
テ熱退キ諸カ増加シ然レモ煩悶不寐再ヒ發シ  
精神錯乱セシト為ルノ懼レアルニ至ル此レ明  
カニ全身ノ知覺機侵衰セラルニ由ル也○患  
者灰白色ニメ肌膚汰澤ナク言語遲緩食氣全ク瘵  
ス一切ノ飲食ヲ嫌惡シテ唯水ヲ飲ムノニ大便

通シ難クシテ小便昏火〇此ノ患者ノ為メニ久  
シク諸方法ヲ施スト虽凡功ナシ精思熟考スル  
ニ此レ脊體神経至トシテ害ヲ受ケ叙テ服部ノ  
神経モ俱ニ患累セラル也予幸ニ此ノ時ニ当テ  
ヘラトリ子蒸蘆ノ經驗アルニ由テ此レヲ  
用ヒルヲ決断ス〇九月廿日申デルマテヤ  
ノイトウテ<sup>外用方ノ調ナラ</sup>撰<sup>ラカ</sup>心窩ニ<sup>カ</sup>癸泡ヲ施  
シ<sup>カ</sup>其痕ニ劇痛ヲ癸<sup>カ</sup>真奮カラ癸スル<sup>カ</sup>甚シク  
患者安靜ナラス脉洪ナリ小便通スル疑シク  
又色始ノ濃暗色ナル者今ハ黄色ノ至渣ヲ顯シ

透明光ツテ白ク續テ陣濁ニシ乳酪ノ如ク終リ  
ニ透明水ノ如クナリ患者全ク快復ス

〇妊婦症寧之規 越兎美哉氏

去年八月廿八日夜四ツ半時妊婦ノ天ニ託セラ  
レラ余宜ニ往テ患者ノ臥床側ニ侍坐ス其症左  
ノ如シ顛鈍痛ニ心窩ニ痛ヲ覺ハ煩悶甚シ之ヲ  
按スルニ至ムト止部ニ任シ妊娠間ノ経過ヲ探  
搜スルニ妊婦頭ヲ左方ニ回ラシ妊婦ノ意識ノ  
ミ在ル如ク想像ヲ為スガ故ニ顧ルナリ予亦虞  
ラス患者ト共轉視ス妊婦ヘタラシク<sup>臥布ノ</sup>  
<sup>義未詳ノ</sup>

ヨリ轉墜シテ足ヲ外ニ投ス怖ル可キ搐掣ヲ発  
スルニ由テ余夫患者ヲ荷擔シテ漸ク卧床中ニ  
還卧セシム然ルニ湿順ナリ顔面煩ニ赭色ニ変  
シ膨脹ス眼ノ輪圍兀出シ左方ニ口ヲ曲ケ唇青  
クメ褐色ヲ帯ヒ腫脹シ舌上ニ白漚ヲ覆フテ  
舌ヲ外へ出久ス坎ノ症率一二密粗馬間ニ瘧シ  
亦安静ト為ル○大ニ坎ノ疾率十二密粗馬間連  
讀シテ止ト虽トモ人事不省ナルハ恒ノ如ク  
ナラス如何トキヲト患者昏牒シテ喋々言語  
連綿タレハナリ○噫嘻呻吟ノ顯ス所瘧率諸

症ト昏腦ト交換シ発スル一二回終リノ第四回  
ニ至リ昏睡太タシクシテ恰モ死スルカ如シ  
其夜ハツ羊時患者死ス  
第一心窩ニ於テ疼痛誓留スル者陳痛之前兆ヨ  
リ外ナラス第二子宮内瘧率ヲ発スル時ニ當テ  
産婦安静ナラス恐憂煩間ニ子宮ノ疼痛ヲ困苦  
スルニ一異ノ状態ヲ顯ス  
第三内部ニ陳痛止ムナラデハ外部ノ搐掣ヲ発  
スルヲ始ス

○産婦危篤搐掣諸徴

第一〇 分娩ノ前時不虞 発スル瘧疾並ニ陳痛  
一二 徵候ニ由テ発見スルノ前ノ瘧疾  
第二 患者瘧疾ヲ発シ全ク知覺ヲ失スル者并  
ニ瘧疾休ムノ尙知覺ヲ存セサル者  
第三 瘧疾ヲ発スル毎ニ患者頭ヲ持テ回ラス  
若ハ危篤ニシ且恐懼煩悶ヲシフルス夕トア  
ハアールハルスニ驚起及ヒ撮空摸床後ニ至  
テ瘧疾ヲ発スルノ徵候  
第四 顔面ニ於テ恐ル可キ瘧疾ヲ発スル者張  
目直視シ眼目突出スル者瞳子縮小又ハ散大交換

シ発スル者面部腫脹シ天藍色ト成リ口ヲ瘧疾  
状ニ開キ續ケル者舌ヲ露出シ舌上濃白沫ヲ  
覆フ舌色褐色ナル者唇腫脹シ天藍色ト成ル者  
形貌恰ニ首ヲ蝕ル人ノ如シ或ク如クナラハ頭  
恒ニ復ス

第五ノ四脈瘧疾屈伸スルノ状態虚実ニ性ノ瘧  
疾中等ニアル者

第六 陳痛終ルノ後初テ四支ノ搐掣ヲ発スル  
者並ニ産婦陳痛ニ依テ煩燥甚シキ者

第七 甚々屢子宮症瘧ニ由テ強直ニ成リ分娩ヲ

妨ルモノ

第八 脈小ニテ痙瘲発作極度ニ至テ脈脈シ認メ得サル者

第九 痙瘲発スル毎ニ意識ヲ失シ言語默然トシ難ク昏睡ヲ発スル者

○同ク輕易搐掣諸徴

第一 分娩後或ハ分娩間ニ於テ搐掣ヲ発スル者

第二 搐掣ヲ発ストモ意識ヲ瘳セズ痙瘲尙隱中ニ能ク語ル者

第三 頭頸ヲ回施セス静ニ立シ恆ノ如クナル者

第四 顔色灰白ト成リ陳痛ヲ発スルニ臨ンテ口吻瘳急スル者及ヒ眼瞼ヲ仰テ眼球回轉スル者

第五 四肢ノ瘳急痙痲ノ如ク足ヲ投ケテ動揺スル者

第六 陳痛ト俱ニ痙瘲ヲ発スル者陳痛止メハ瘳瘳モ亦テ止ム者

第七 上ニ臚列スル痙瘲ハ分娩ヲ妨ケサル者

第ハ脈小ニメ強然シトモ常ニ認メ得可キ者  
第九 汝クノ如キ播擧ハ險地ニ進マサル之  
夫レ治療ニ臨テ内部焮衝及内部劇キ神経痛更  
ノ他痙率様ノ感識汝ノ三者ヲ區別スルト甚々  
難クシテ最モ扼要ノ事件ナリ胸部ノ疼痛厥迄  
胃部ノ疼痛小腹ノ疼痛ノ如キモ從令劇キ胸部  
疼痛モ唯ニ痙率様ノ痙率ニメ焮衝ニ非サルト  
尙之レ布リ汝ノ區別ノ如キハト死生ヲ決スルノ  
地位ニメ最モ至重ナリ如何トナラハ焮衝  
ハ刺絡ヲ必要トス痙率ナレハ阿片以テカ冠タリ

若シ焮衝ノ患者ニ阿芙蓉ヲ投スレハ其命期テ  
促シ九泉ニ赴ク一臂ヲ為スノニ慎サル可ンヤ  
汝ヲ以テ診施ノ尙以テ検査スル正表ヲ揭示  
セン第ニ一熱顯然タリ或ハ局部惡寒ヲ以テ始メ  
或ハ熱シテ渴アリ脈度ヲ顯スモノ第ニ脈緊實  
ニメカアリ然ル氏ハ腹焮衝及肺ノ焮衝極度  
ニ至ルモノ以テ徴ヲ缺ク汝ノ如キ時ハ尿ヲ正  
的トス尿ノ赤色ハ焮衝且熱アルヲ顯ス也之レ  
ニ反シテ淡白ニメ水様ナル尿ハ痙率様ノ痙也  
○亦痙率ハ焮衝トシテ正表ハ痛ノ状態ヲ以テ之

ヲ分テハ連綿持久スルノ痛ハ燃衝ナリ間過谷  
唇スルモノハ痙攣也小腹燃衝ニ於ルヤ其外部  
ヲ推シテ之レヲ按レハ之レニ耐ヘ忍フテヲ能  
クシ其痛減スレハ之レ痙攣ニノ燃衝ハ此レニ  
反スルヲ以テ辨知ス可シ然レモ此ニ一大至貴  
ニノ注意ス可キアリ内臓痛様ノ知覚長ク連  
餘タルニ於テハ縱痙攣ナリト虽モ其ノ終リニ  
至テハ

燃衝ヲ發スルニ至ル〇若シ燃疑ノ症ニ遭ヘハ  
局所患害ノ部位ニ於テハ心翼ニトテ少量ノ毒  
血ヲ為セバ之ヲ決定スルニ足ル

〇尾斯多利池四徴

〔膽液〕 先ツ意識ノ感動有テ未止腦病ノ体質古  
苔或ハ黄或ハ褐色頭痛口ニ苦味ヲ覺フ恒ニ惡  
心有テ膽汁ヲ吐シ小腹痛有テ膽汁様ノ下利ヲ  
兼ヌ時ト胆汁酷厉ニテ咽喉ノ侵襲スレハ最  
モ劇キ痙攣ヲ發シ漸ク増遊シテ燃衝ニ至ルハ  
恰モ中毒ノ如ク對抗カラ奮發スルニ至ル

**粘液** 餒餓セス渴亦ナシ上腹壓推スル如ク或ハ充満スルガ如キノ知覚食後殊ニ然リ舌上白クシテ粘膠ヲ覆フ口味粘ナル風葉多ク膨脹ス朝ニ句テ悪心シ頗ル吐セント欲ス全身温度ノ鉄損持ニ胃部ニ於テ頗ル寒冷ヲ覺フ大便粘液様ノ物ヲ通シ或ハ屢秘結ス顔色淡白色ニシテ怠惰知覚鈍ナリ吐下ヲ用フルモ知覚鈍ナリレ以上ノ諸症諸疾ノ症ニ於テ尙ニ之ヲ見ル  
**酸敗液** 恒ニ餓ル如シ或ハ貪餐スルヲ如シ然レモ渴セス嘔氣酸ニシテ呼吸及ヒ風氣酸

臭アリ胃部灼カ如ニノ疝ヲ覺フ舌上汚穢ニノ齒牙ニ酒石ヲ顯ス植物変敗殊ニ乳滓澆ノ酸敗液ヲ造成ス可キ食餌ヲ食フ後諸カノ鉄之然レ肉食ハ反テ食フニ堪フ

升鉄塩 ヘブルリニムサリチス 羅  
リトトニールイゾル 蘭

製法



鉄粉 一匁 長頸ノフレスニ入レ 沙火 内ニ入レニ 二十四ノ水ヲ注キ塩酸 六匁ヲ注キ 鉄ニ十度解スル 鉄ヲ溶解シ再ヒ塩酸ニ注キ 煮干マテ温ナラシム 酒石酸ヲ適宜ニ滴ス右滴スル


1 全ク沸騰止ラ度トス此溶液ニウトアロイ  
ヲ得ル之ヲ陶器又硝子器ニ入レ炭火ニテギ  
餾シ後文火ニ上セ硝子ノ棒ヲ以テギヲ停メズ  
攪和ス此シテ冷凝セシムルニ至テ器ヲ火ヨリ  
下シ茶品ヲ澤挽シ全ク凝固セシメ温ク柔シテ  
硝子器ニ入シ固封シ貯ス  
右升鉄塩一匁ニ水ハツヲ加ヘ  
溶解セシムルヲ度トス収斂鉄液ナリ  
適宜ヲ清シ

硫磺水製法

製法

石灰六匁 硫黄華一匁 硝砒  
石混和シ速ニ硝子場ニ入レ蒸餾水四匁ヲ注キ  
混蕩シ蒸餾錐ヲ接シ接際ヲ密封シ砒火内ニ於  
テ蒸餾シ冷ルヲ待テ硝子場ニ入レ固封シ貯ス





97  
3150

