



謨斯篤梅毒病篇 完





謨私篤梅毒編
完



讀斯篇梅毒病篇次目

病性及其治療總論

證候經過總論


傳染梅毒之主丸性質

梅毒治法總論

梅毒病諸狀之性質治法並其屬症

論

假梅毒病



梅毒篇

川本幸民 卓譯

此病ハ緩病ニメ傳染毒ヨリ生ス其初メ感傳ス
ルヤ皮上ニ焮衝ヲ起ス次テ病毒自ラ其形テラ
成ス此毒ヲ荷フ者ハ粘液膿汁湧ルナリ此毒ニ
感スハキ平康ナル人ニ此液ヲ傳フレハ又同病
ヲ發ス其初メ焮衝ノ部ヨリ水液系ニ傳ヘテ遠
ク他部ニ達ス諸症ヲ起ス末リ終ニ緩病トナリ
全身梅毒性ノ惡液質トナル故ニ局處病ト全身

病トニ分ツ

病性及ヒ治療総論

此病起原ノ説諸般ニメ一定セズ其中ニ就テ信用スヘキ者ハ初頭方土氣候ノ変感ニ依テ千四百九十四年ニ伊答里亞國ニ起リ千五百零五年ニ至ルマテ十一年間諸民ヲ荒乱シテ政羅巴州中ニ普達シ其後テ晚年ニ於テハ許多ノ疑惑ナキニ非ス且諸般ノ病状ニ就テ考フルニ一定難キコアリト雖凡直テニ其傳染毒ニ感受シテ患タリト見フ○又諸國其病状ヲ全フセズ

此病ハ癩病ノ秋テラ変スル者ナリト思フ入アレバ此論ハ暫ラク之ヲ置キ梅毒病政羅巴ニ廣布セシヨリ以來癩病ヲ患ル者甚々鮮キヲ疑ナシ

梅毒病ハ流行病トナリ其後純粹ノ傳染病トナリテ千四百九十四年ヨリ今日ニ至リ漸々輕ク死亡モ少ク病勢自ラ挫ケ終ニ消滅スルトキアルヘキコト疑ヒナシ古区亞細亞多律屈人等此病後世應ニ輕ク為ルヘキコトヲ前言シ今時已ニ其徴アリ

此篇古代ノ猛劇ナル死症ヲ説ケス今時瘡現ス
ル證候ヲ記スルノミ

證候經過総論

初メ、局処病ニメ多クハ傳染スル部ニ梅毒ヲ
瘡ノ所謂疽瘡ノ形ヲナス梅毒アル人ト穴合
シテ陰處ニ瘡シ他部ニ瘡スルコトハ稀ナレハ瘡
科産婆産区謹慎セスメ梅毒病人ヲ療シ或ハ其
病ニ傍フテ已ク序ヲ傷ルコトハ其手ニ傳フコトア
リ
瘡瘡ヲ瘡スルハ傳染後三日ヨリ二十一日マテ

ヲ規則トス此他曾テ早廻アルコトナシトス
最初一赤炊点アリ其周邊帯青赤班ヲ纏フ二三
日後或ハ尚早ク帯青赤泡ヲナシ不透明ナル物
乙ヲ含ム此泡速カニ破綻シ一種ノ瘡トナル其
邊縁白クメ巻起シ其中脉肉状ヲナシ傍側ニ開
大ナルヨリニ深ク侵蝕スルコト甚タシク瘡中不
平ニメ痛強ク咬ムカ如キヲ以テ他ノ瘡瘍ト自
ラ別ナリ
通常瘡瘡ハ多クハ傳染後二日ヨリ十二日ノ間
ニ其病形ヲナス稀ニハ尚晩クメ二十一日ニ至

ル丁アリ 規則ト通常ト分テ説クト虽ヒ前文
至ル者ノ稀ナルヲ説明スルナリ読者之ヲ察
セヨ〔幸民案〕
嚮ニ不淨ナル人ニ交接スレハ此病ヲ登スル
間龜頭皮ニ於テシ或ハ多クハ包皮ノ内面ニ於
テシ殊ニ包皮帶陰差下面ニ包皮及ヒ龜頭ノ大
ナル部ニ於テシ婦人ハ大小陰唇間ニ於テシ間
又痒癢子ニ於テス
陰囊殿間乳頭ノ如キ粘液膜ヲ具セスメ乾燥ス
ル部ニハ疔瘡ヲ初頭ト登スル丁至テ稀ナリ若
シ此部ニ登スレハ其瘡大ナルヲ定規トス乃チ

其泡大ニシ直径半寸ニ至ル丁辱之アリ其泡破
レテ痂ヲ結ヒ痂落テ咬通アル瘡トナリ周邊硬
結シ又辱々痂ヲ生
瘍科区梅毒ニ染ミタル刀喙ヲ以テ自ラ傷キ其
部ニ疔瘡ヲ登スルカ如キハ之ヲ詳辨スル丁至
テ難シ故ニ前徵ノ議スル丁其旨キヲ得ス
媾交ニ由テ陰差ヲ一二処皮ヲ摩破スレハ後テ
十二時西洋時ナリ通中ニ疔瘡ヲ生ス先ッ其部
ニ泡乙胞ヲ登セサル丁辱之アリ
疔瘡ノ膿汁ヲ拭ヒ去ルハ瘡底不平ニメ血出

シ易シ
急疾ニ深ク侵蝕シ且ツ廣大トナリ疼痛劇烈ナル
ト屢多シ之ヲ侵蝕シ疔瘡ト名ク入甚タ硬クメ
深ク皮下ニ蝕入セズ唯緩徐ニ侵蝕シ覺機鋭敏
ナラサルアリ之ヲ朕胝状疔瘡ト名ク又間瘡底
不平ニメ齒牙ノ如シ侵蝕シ大ニ出血シ易ク息
肉アリテ海綿状ナル者アリ之ヲ脈痛状疔瘡ト
名ツク
リフテル
里弗的尔
曰ク疔瘡ハ邊圍廣大ナルニ緩急ア
リ殊ニ清潔ニセサレハ許多ノ疔瘡ヲ容シ包皮

ノ内方ヲ輪匝ヲ終ニ流合シテ全龜頭ナル處
ニフ詞ナレト今略メ龜頭ト譯シテ圍繞スルニ
備ラニ蘭指ヲ表シテ之レヲ分ツテ圍繞スルニ
至リ易シ深蝕疔瘡ハ殊ニ荒乱迅疾ナリ之ニ依
テ龜頭ノ形容ヲ度ス間又暫時ニ之ヲ壞頑ス之
ヨリ又屢非常ノ大奇形ヲ為ス婦人ニ於テハ此
変形殊ニ著シキコアリテ腔ノ下部合際ニ疔
瘡ヲ生スルハ直腸ニ穿蝕シ肛門ヲ破壊シ且ツ
股ノ内部ヲ侵スノ疾ナリト
余親自ラ之ヲ質驗スルニ深蝕疔瘡ト脈痛状疔
瘡トハ多ク區別スヘカラス且ツ兩症共ニ朕胝状

疔瘡ヨリ大ニ稀ニメ又純正ノ梅毒症ナラヌ多
クハ合候病トナリトス
原因疔瘡ト導瘡疔瘡トヲ分辨スルニハ前ニ掲
示スル徴候ニ従フト虽ニ屢甚タ知り難キコ
リ殊ニ非常ノ部ニ瘡ス或ハ陰処ニ瘡スルヲ以
テ患者之ヲ耻テ之ニ先テタル諸状ヲ匿ニ告白
セス或ハ娼婦ニ交ル等ノコアリ英ヒニ病己ニ
久シキヲ經其人惡液復ニメ水銀ヲ多服シ永病
ヲ患ル等皆其弁別シ難キ所以ナリ
予曾テ見ル陰処ニ惡性瘡着クハ甘結兒狀瘡ヲ

瘡ス又良性瘍ヲ瘡シタル者水銀ヲ用ヒスレテ
治スルコト是レ全ク梅毒病ニ非サルナリ○此
瘡ハ梅毒ナキ人ニ交媾スル後テ皮膚剥脱スル
ニ依テ速カニ瘡スルコト常ニ多シ此症癩衝強盛
ナラス豚肉狀ヲナス周邊脱胎狀ヲナス疼
痛少ナシヨク身ヲ淨シ冷水鉛水ヲ用フレハ速
カニ治ス
梅毒瘰ニ又原始疔瘡ノ如ク局処梅毒病トナス
ヘシ然レニ梅毒瘰ト梅毒ニ係ラサル瘰トヲ
別スルニ確徴アルコトナシ此瘰ハ妄リニ急ニ抑

制スルニ非サレハ全身梅毒病トナルコト甚々稀
ナリ○淋ト疳瘡ト同時ニ奇シク発スルコト偶之
アリ之レ梅毒病ノ徴タルコト確然タリ
原始梅毒鼠溪腫即チ毒ヲ局処梅毒病ノ初候トス
ルコトハ梅毒淋ヲ初候トスルコトハヨリニ尚稀
ナリ矣ニ之ヲ初候トスルコトアルヤ否ヤ未タ確
定セス○通常皆是レ次発ノ鼠溪腫ニメ尿道中
ニ潜伏セル疳瘡ニ次チ未レト人輕視シテ之ヲ
認得サル者ナリ
總梅毒病百症中九十六ニ至ルマテ先ツ陰処ノ

疳瘡ヲ患フ○疳瘡ハ數週間只單純ナル局処梅
毒病ニ止ル是レ此傳染毒ハ今日ニ在テハ已ニ
二三百年前ノ如ク張廣スル勢ヒナケレハ也○
殊ニ男子及ヒ老老天性粘液復ニメ嗜好生命ヲ
保ツ者ハ先ツ局処梅毒病ヲ患ヒテ後チ晩ク全
身病トナル其初メ疳瘡ヲ発スルヤ覺梅毒痴鈍ニ
メ臍胎状トナリ徐々ニ深ク侵蝕シ且ツ廣張シ
流血セス息内ヲ生セス
之ニ反メ弱年多血ノ輩童幼覺機敏捷ナル婦人
殊ニ小女若男眼青ク顔白キ者ハ病毒轉從甚々

疾速ニメ疔瘡発現後第十四日ニメ己ニ全身病
トナルコアリ

過度ノ温暖烈飲酒精ノ舞踏劇シキ心志ノ感動迅

疾ナル天氣ノ發冒寒薄衣刺衝性ノ養ヒ多キ肉

食ハ此轉徒ヲ促スノ誘因トナル

局処梅毒病轉メ全身病トナラントスルハ其病

先ツ陰部ニアレハ多クハ便毒ヲ發ス此便毒ハ

ヨク感通便毒ト區別スヘキ者ナリ下ニ詳カナ

便毒原語ハ鼻ニ傳ノ梅毒恰モ局処病ト全身病

トノ中間ニ居ル者ナリ

稀ナリト虽ニ上支初テ毒ニ染テ其部ニ疔瘡ヲ

發スレハ腋下ニ此腫腸ヲ發ス尚且ツ稀有ナリ

ト虽ニ盃碗烟管ヨリ傳フテ口中初テ梅毒瘡ヲ生

スレハ頭ノ水脉腺腫起ス

華設名曰ク梅毒性便毒ハ原始梅毒病ト傳テ全

身梅毒病トノ中間ニ位スルカ故ニ或ハ原始病

ヲ傳テ全身ニ布達スルハ者トナリ或ハ己ニ全

身ニ布蔓スル毒ヲ茲ニ傳テ來ル之ヲ以テ梅毒

ヲ轉輸スル症ナリトス

導怒ノ全身梅毒病ニ早廻怒現スル症候甚々多
シ乃テ口中上顎膜上顎巴丹杏腺食道ノ上部ニ
怒スル疳瘡其後ニハ顔面額頸項ノ腫瘍肛門ノ
蜜果状疣等尚且ツ數年ノ后テ始テ怒スル緩慢
性ノ児疹或ハ班痕或ハ炊赤痒瘡或ハ環癬疥癬
或ハ皮膚炊腫兼テ破裂スル者此他鼻ノ粘液膜
ニ生スル鼻茸全身皮膚ノ疣癩眼炊衝淚囊炊衝
夜骨痛骨炊衝骨膜炊衝畢丸硬結黑障眼骨痛硬
結腫結節腫結腫此三病不知所元假下骨刺骨膿
腐骨疽是ナリ譯早統者任目于傍名

此症アツテ梅毒本性ノ惡液質トナリ水脈系及
ヒ皮系ヲ侵掠スルノミナラス更ニ骨系ヲ襲フ
ニ至レハ必ス惡徵ニメ勞瘵氣管勞肺勞慢性奇
尔贅血液溶崩水腫ニ次キ未リ數年ノ后終ニ
タラル
之ニ及レテ怒病久シカラズ毒尚局処ニ止マリ
或ハ今初メテ全身病トナリ皮膚骨系未タ此毒
ニ染マサル者及ヒ總テ此病ノ他ハ健康ニメ惡
液質ト為ラス又腺病依屈多若クハ痔疾ヲ患ヘ
サル入ハ善徵トス

全身梅毒病ト他ノ皮骨筋帯膜ノ病トヲ識別
スルコト甚々難シ是第一許多ノ患者前未陰部ニ
疾病アルヲ区ニ告ルヲ取テ第二疔瘡著明ナラ
ス輕視シテ知ラズ或ハ尿道中ニ生シテ自カ
ラ之ヲ覺ヘス第三区或ハ瘍科其病局処ヨリ
移ツテ已ニ全身病トナリタルト魚尾適當ノ内
葉及ヒ良食養法ヲ命ス之ヲ治スルコトヲ務メス
唯外療メ疔瘡ヲ治スルコトアレハナリ
又次瘡ノ瘡ヲ唯口ニ生ス之ヲ口喉ノ疔瘡トス
是レ全身梅毒病ノ徵候ナリ○此症嚙下ニ疼ミ

アリ懸壘無上顎台巴丹舌腺咽喉ニ黯赤ナル瘡
衝ナリ或ハ此諸部同時ニ之ヲ患ヒ赤筋恰モ線
状ヲナシテ後部^{咽ノ}後部ニ廣カリ患者ニ抄時間口
ヲ開ケハ灰白色トナリ其後テ劇痛ナク白色豚
肉状ノ瘡トナリ邊周ハ脱胎状ト為ス或ハ速
カニ其周邊ニ延展シテ柔軟ナル部ヲ壞乱シ且
ツ鼻骨上顙骨ヲ侵蝕シ咳シタル鼻声ヲナスニ
至ル是此導管疔瘡ノ常候ナリ
此症矢首児倍苦及ヒ鷲口瘡ニ殊異ナル所以テ
者ハ矢首児倍苦ハ最初齒齦ニ生シ其色黄ニメ

出血シ易ク息肉ヲ生スル等ノ症アリ
鰐口瘡ハ之ニ反メ瘡根豚肉形ヲ為サス瘡數甚タ多クメ
疼痛強ク酸及ヒ塩味ヲ嫌ヒ哥ル費ヲ氣子飲食
消化セズ此諸症ハ尋常梅毒病ニ乏アルコトナシ
昔等ハ哥ル費ヲ梅毒病ノ常候トセリ方今ハ原
始疳瘡ニモ導怒疳瘡ニモ乏アルコトナシ唯稀ニ
便毒ニ兼発ス尚且稀ニ梅毒性ノ皮病斑疹状ヲ
ナシテ數月変セス通常哥ル費ヲ兼サル症ニ偶
之ヲ起スコトアリ又唯惡液瘻ノ極ニ至テハ瘦消
ノ故ヲ以テ慢性哥ル費ヲ発ス

予此條ニ梅毒病ノ諸形状ヲ逐一舉示セズ下條
ニ次ヲ追テ論説スヘキヲ以テナリ又此病形ノ
冗長ナル理解ヲ載セス諸書ニ乏テ拳レモ治術
ニ益ナキヲ以テナリ今茲ニ次ク

傳染梅毒ノ至タル性質

ヲ成輦実験シテ知タルニ從ヒ且ツ時世ノ変革
ニ依テ方今発現スル状ヲ殊テ演説セン
第一此傳染毒ハ方今改羅巴ノ北地及ヒ殊ニ南
境ニ於テハ二百年前ニ比スレハ太ク輕クシ是
一ニハ森林開闢シ氣候柔和シニニハ此毒許多

ノ人体ヲ經歷シテ身ヲ柔和スレハナリ是レ一
二百年前經過疾速ニメ人身ヲ荒敗スル諸症ト
今日患ル所ノ病症トヲ比較シテ定知スル所ナ
リ
第一傳染梅毒ハ他ノ動物性ノ諸毒ノ如ク殊ニ
補復様ヲ侵シ其後テ勉ク皮系及ヒ骨骸ヲ襲
フ○古代ハ皮系先ツ其毒ニ侵サレテ疹ヲ瘡ス
ルコトアリ今時ハ只是レ次瘡ノ症タリ
第二此毒ハ固定ノ傳染毒ニメ空氣ニ因テモ
傳染セズ許多ノ病人回繞スルニ由テモ傳染セ

ス又衣食ニ膿汁ヲ以テ汚ル、ニ非サレハ之ヲ
着テ傳染セズ口直テニ薄キ表皮アル部及ヒ瘡
傷アル処ニ此毒ヲ輸シテ以テ傳染シ而メ其傳
ヒタル休中ニ入テ局処病アリ終ニ全身病トナ
ルノ性アリ
第四此毒ニ感スル所ノ諸部ニ初メテ瘡スル
機管ハ病性刺衝機ニメ終ニ瘡衝ニ至ル者ナリ
而ルニ動脈ノ瘡衝ナルコト至テ稀ニメ多ハ假瘡
衝乃チ例護ニナリ唯是レ誇瘡ノ症ニメ之ヲ除
治スルト益凡決メ此病ヲ治スヘカラス獨リ此

症及ニ其終末ニアル患部ノ漏泄膿潰膨脹潰瘍
ハ唯分離ノ為ニ切要ナルノミ
身五 此毒身中ノ一部ニ感シテ其部ニ止リ全
軀ニ布達スル前ニ我ハク長ク茲ニアルヤ日月
ヲ以テ期ヲ定ムヘカラス ○時節氣候体質四性
相生之ヲ差別ヲ為スド尤モ大ナリ
茲ヲ以テ甲入ハ其毒ノ轉移甚々緩ク乙入ハ同
体質ニメ同処ニ住居スト虽ト速ニ全身ノ病ト
ナル其状如何ン乎ヲ明カニシ難シ實ニ善惡輕
重兩種ノ傳毒アルカ如ク見フニモ説ト

古代ニモ此ノ如キドアリレト見ヘテ梅毒病人
術ノ補助ヲ後々ス自然ノ機カヲ以テ自ラ治ス
ル説アルヲ以テ知ルヘシ 茲ニ列屋亞希里加扭
私以ノ羅甸ノ文ヲ引
之ヲ證ス 方今吾輩又此ノ如キ例ヲ見ルド其數
鮮カラス
之ニ反メ猛烈ナル毒ニ傳染シタル病人ハ曾テ
自然カヲ以テ治スルド能ハス獨リ有カナル人
カノ轉助ニ依テ治ス故ニ輕寛ナル毒ト猛劇ナ
ル毒トヲ已別スルヲ切要ナルトス吾輩茲ニ緊
切ナリトスル徵候ハ諸般ノ對抗機ナリ故ニ患

者ノ体質及ヒ他ノ保護法ハ速ニ全身病トナル
 へキ状アリト虫ニ其毒永ク局処ニ留リ或ハ甚
 タ緩ク全身ニ傳フ或ハ全ク全クニ及ハサル者
 ハ是ニ其輕毒ニ感スルヲ決スヘシ之ニ反スル
 モノハ亦之ニ反ス即チ患者一日疔瘡ヲ瘡ス三
 四日後便毒ヲ瘡ス八日若クハ十日ヲ経テ咽中
 困難ヲ覺ヘ其時咽中ヲ視ルニ疔瘡アリテ不日
 ニ廣ク侵蝕シ懸壅至軟上顎ヲ保護シ難キニ至
 ルコアリ○余親シク此ノ如キ重症ニ逢ヒ其瘡
 現スル諸症ヲヨク実験ス○弟二ノ徵候ハ疔瘡

膿中ノ蠕虫胃積中ノ虫也同名ナリ蒲尔面板屈
 中ノ虫ニ亦同形ト此疔瘡ナリ下條ニ之ヲ詳説ス
 へシ

第六 梅毒ハ常ニ留連スル者ニメ時ヲ後テ瘡
 作消滅スル者ニ非ス故ニ已ニ局処ニ傳染シテ
 局処梅毒病ヲ患ル体中ニ再瘡傳進ス
 此毒ハ數年間人身中ニ潜伏シテ後又新々ニ瘡
 動シ終ニ染ク骨質ヲ荒敗スルニ至ル然レ此毒
 初傳ノ地ヲ去リ了レハ局処病消除シ而メ全身
 病之ニ次ク創スルニ初メ感傳ルタル陰処已ニ

健康ナレハ既ニ媾交スレト婦人ニ傳染スルコトナシ

身七 機性体媒毒ニ新タニ染ムル性ヲ考ルニ一回感傳シ而メ後テ消除シタル病ハ再回之ニ感苦スル者ニアラス是レ猶痘痲ニ於ルカ如ク

ハナリ
梅毒ハ獨リ入身ニ他ノ獸類ヲ侵襲セス

猿属ハ恐クハ此例ニアラス且ツ他人ニ傳染スルニ直チニ其毒ヲ檐輪シ未テ之ニ觸ルニアラサレハ感セス故ニ唯皮膚剥脱シタル処或ハ皮

薄フメ水脈ヲ多ク備ヘタル部ニ未侵スルモノニ傳染ス陰部乳頭肛門眼瞼是ナリ
萃設人曰ク梅毒ヲ傳染常法ハ交媾ニヨル者ヲ切實ナリトス其次ハ産区瘍科手術ヲ施ス其皮膚剥脱スル部直チニ梅毒ニ觸ラズラ受ル者乏ナリ此他又數條ノ傳染路アリ其一乳哺ナリ小児乳婆互ニ其毒ヲ傳フ其二口中梅瘡ヲ啜シタル不淨ナル人ノ合口ナリ其三梅瘡アル人ノ齒ヲ以テ儀齒ヲ造リ用フ其四梅毒アル人ノ用ヒテ尚其毒ニ染ミタル器具ヲ用フ其五汚染セル

煙草管笛盆碗刀箸衣食殊々襦袢便器雪隠産ル
等是ナリ浴湯ニテ傳染スルコトハマレナリト虽
モ予曾テ梅毒眼焮衝ラ患ル者其人自ラ知ルコ
トクメ梅毒病人ノ陰処ヲ洗ヒタル水ニテ眼ヲ
洗ヒタルニ由テ瘡シタルヲ見タリ
第八梅毒ヲ輸送スル者例誤レ巴原始疔瘡ノ膿
汁ハ唸味スルニ舎家所用ノ紙刺屈母私紙ト
ニテ深紙セテ以テスレハ此物ハ再ル加里性ナル
コトヲ見ルヘシト云フ瘡見屈ハノ説ニ此毒ノ原
礎ハ窒素及ヒ炭素ナリトスルヲ比較シテ右説

ヲ主張スルナルヘシ然レモ予輩若シ經久ノ脚
瘍肺瘍肝瘍等ノ梅毒ニ係ラサル者モ共ニ再ル
加里性ノ膿汁ヲ分泌スルヲ知ラサルハ梅毒
瘍ト梅毒性ナラサル瘍トヲ分別スルニ此説尤
モ重要ナルヘキナリ然レモ疔瘡中ニ分泌スル
膿液全ク中和ナルコト間々之アリテ曾テ再ル
加里ヲニ酸ヲニ怒現セス
此膿此ノ如キ中和ナルハ其病治療ヲ怠ルト
モ厄永ク單純ナル局処病ニ留リテ極輕症ナル
コトヲ常ニ実験セリ

這般ノ症ニ於テハ或ハ梅毒ノ成分ヲ疑惑スル
コトアリ且ツ列那ル^ル_ルノ輩ハ其毒体外ヨリ傳
染セスメ屢体中ニ新タニ其形ヲ生スル者ナ
リト主張スタルモ亦此疾ノ症ナリ此症ハ今日
屢々アル者ニメ假令此説ヲ取用スルモ此カニ
假梅毒病ノ單症ニ適當スヘキナリ
第九 梅毒ハ往昔ハ猛烈ニメ方今ハ輕易ナル
者多ク且ツ一般ニ流布シ殆ント滿世界ニ達ス
直ニ其毒ニ觸レハ年齢ト男女トニ拘ラス居
處ト氣候トヲ厭ハス必ス傳染スト^ル此病輕

易ニナルコトノ實驗アルハ毒勢ノ輕知スルニヨ
ルナリ

胎兒ハ此毒ヲ免ル或人ハ謬ツテ既ニ子宮中ニ
在テ此毒ニ染ムコトヲ信用スレバ實ハ梅毒アル
母ノ陰処ヨリ分娩スル中腔ニ觸レテ初メテ傳
染スルナリ

梅毒治法總論

第一 預防法ナリ

梅毒病ハ留連不治ノ毒ニメ裁多ノ人ヲメ生涯
幸福ヲ失ハスメ正シク治療ヲ行ハサレハ極メ

テ悪性不治ノ症トナリ此時ニ方テハ治療ニ只
假リニ良効アルカ如ク見ヘテ莫ハ其毒体中ニ
潜伏シ數月或ハ數年ノ後ケ新タニ復發動シ初
回ヨリニ危劇ナル症ヲ起シテ機晷構造ヲ荒蕪
シ既ニ骨質ヲ侵シタル經久ノ梅毒ハ諸療術モ
効ナキニ至ルカ故ニ預シメ此病ヲ防クノ治ハ
最モ重要トスル所ナリ
梅毒預防法ハ唯少用シヘクメ大用スヘカラサ
ル者アルノミ故ニ乏ヲ用ヒテ全ク世界ノ人ニ
此毒ヲ免レシムルコトモ又唯改羅巴列中ノミ免

ルコト得ヘカラス噴スヘキニ非スヤ
医学剥里^{ホリ}元^リ尚^ホ蘭^蘭譯^邦邦^邦ノ證^證昼^昼ト云^云佛^佛利^利學^學ニ娼^娼家^家ヲ此
病^病流^流布^布ノ洵^洵源^源トナシ娼^娼女^女ノ健康ナル状態ヲ屢
探^探鑿^鑿セリ是レ莫ニ賞^賞祿^祿スヘキコナリト虽^虽凡^凡然
レモ其毒ノ廣布セルヲ倚^倚ルノミニメ敢テ完ク
防^防制^制スルヲ得ス何ントナレハ勇一多クノ遊女
ヨリ一男ニ傳染ス是其女ハ自ラ尚健全ニメ先
キニ他人ニ媾^媾交^交スル片^片腔^腔中^中及ヒ殊ニ腔^腔ノ粘^粘液
窠^窠中ニ傳染毒ヲ殘スコトアリテ乏ラ一男ニ傳ル
ナリ迄時^時恐^恐謾^謾蒲^蒲尔^尔屈^屈人^人ノ厄^厄弗^弗果^果結^結人^人其他ノ病

院ニ於テ幾多ノ梅毒ヲ患ル婦人ノ腔ノ粘液窩
中ニ其孔元アルヲ予ニ知ラシメタリ弟二内科
若クハ瘍科区十分精細ニ昇整セズ弟三郷里
原語^ア_私達^ム多^クル^シ密^シ的^ニ麻^痺負^テ歇^ス多^クト^シト
アリ中^ニ等^大ノ部^落ノヤ^リ今^假リ^ニ譯^スニ
ハ陰^密ニ^ニ媼^ヲ賣^ル者^多ク徘徊^シ謀^計ヲ行^フテ
禁令^ヲ冒^シ此^毒ヲ廣^布スル^{コト}辱^恐怖^スル^ニ堪
タルコナリ

古代ノ疫毒病ノ如ク別ニ梅毒病院ヲ建テ其人
ヲ茲ニ集メ全國ヲ拳テ此毒ヲ遏絶セント欲ス
ル説ハ尤モ良ト至トモ然レニ又町風之ヲ嚴行

スヘカラサルノ虧缺アリ又一ニハ許多ノ梅毒
病人右説^リ行^ハル^ヲ恐^レテ其病ヲ秘スルト
全ク町内ノ大人ノ陰^処數年間毎週連々探視ス
ル^{コト}ヲ為^スヘカラサルカ為^トニ依^テ遂^ニ病根
ヲ断絶スルニ由^ナシ
匠術上ノ防禦法ニハ内外ノ某アリ之ヲ實驗説
ニ徴スルニ亦總テ其効サナシ何トナレハ升汞
醋石灰水明益鉛等ヨリ製シタル洗水モ汞劑ノ
内服モ梅毒アル入ト交媾スルヲ断セサレハ其
傳染ヲ防止スルコト能ハサレハナリ

最良法ハ常ニ交媾前ニ龜頭ヲ固被スルニ具ヘ
タル昆虫誤私製法ト交合後急ニヨク陰処ヲ清
浄ニシ冷水ヲ以テ陰莖ヲ洗フトナリ然レハ此
法又各人ノ傳染ヲ尽ク防禦スルヲ得ス故ニ梅
毒アルスニ親接セサルヲ古今無ニノ預防法ト
ナス

第二 医術治法ナリ

入梅毒ニ傳染スレハ医家其局処癩症ノ各異ナ
ルト病ノ形状ト長短ト患者ノ年齢体質氣候等
ニ從テ大ニ治法ヲ謹慎センコトヲ要ス

入皆知ルカ如ク旧来水銀ヲ梅毒ノ主薬ト為セ
リ矣ニ良処正時ヲ撰ンテ適宜ノ量ヲ用フレハ
不可思議ノ良薬ナリ然レハ此品原未或ハ賞譽
家ノ云フカ如ク諸症状ヲ安セス尽ク良效ヲ奏
セス梅毒病ノ起始ヨリ以未永ク他家ヲ試撰シ
水銀ヲ用ヒサラント欲シテ精神ヲ勞シタル理
ハ分明ナラサルヘシ
華設名曰ク梅毒ヲ治スルクシリヲ多ク撰用シ
尋伐ニ從テ其中幾多ノ品物ヲ称賞セリト云ハ
然レトモ今日此薬ノ名ヲ夫ハサル者ハ唯水銀

ノ一品ヲ残スノミニシテ實ニ此病ヲ制スルノ
基ナリトス然ルニ此説ハ真偽相交ル者ニメ其
是ル所偏執シテ宜キヲ失フ是近代ノ實驗家救
テノ梅毒病入ニ就テ定知スル所ナリ○此義ヲ
精細熟考スルニ次説ヲ採リ用フヘシ

〔三〕今世医家主張スル説分レテニトナル一ハ梅
毒病ヲ尽ク水銀ナシニ治セント欲シ一ハ尽ク
水銀ヲ用ヒント欲シ此兩治法共ニ偏倚スル者
ニメ水銀ノ全効ヲ奏スヘキ症モアリ又之ヲ用
ヒテ効ナキノミナラス却テ害トナルヘキ症ア

ルヘシ

水銀ノ効ナク害トナル症ハ獨ニ都國ノ北地ニ
多ク又例^レ印^シ鳥^ウ歇^ハル^ル私^ス伊^イ太^タ里^リ私^ス巴^バ尼^ニ佛^フ郎^ロ私^ス忽^ク尔^ル
多瓦^タ尔^ルニ最^ニ多^クシ

予之ヲ算スルニ水銀ノ効ア^ル心者ハ一ニ居リ水
銀ナシニ治スルモノ九ニ居ル

之ニ反シテ英國ノ都府龍動ノ病院ニテハ梅毒
病ノ諸症ニ好シテ水銀ヲ用フ若シ原始病ナル
汗ハ所謂青丸ヲ

生水銀一^ニ玫瑰昆施尔布三^ニヲ加ヘテ搗

知レ甘草本一匙ヲ加ヘ五匁ノ丸トナス
朝夕ニ二三丸夕ニ一丸ヲ共ニ病状ニ從フテ三
週ヨリ六週ニ至ルマテ持重ス而メ疔瘡ニ腐蝕
劑ヲ貼セズメ唯單膏ヲ以テス
亞別尔温帝右人ノ行フ所ニ赤石ノ如シ其病尚劇
シキ焮衝アリ或ハ腫瘍侵蝕シ寒壞疽ノ如ク見
ヘ或ハ患者感動甚クシキハ水銀ヲ共ニ此
匠範ハ良善ニメ原始疔瘡ニモ導管疔瘡ニモ並
ヒニ口ヲ開ケル瘡瘍ニモヨク適忌ス
亞私多例同百ルハ侵蝕腐壞セル疔瘡ニ一日

ニ三次ツ、消酸ニ三十滴ヲ水一北ニ加ヘ与フ
又他人ハ薩尔撒巴栗烈煎ヲ此ニ症屢ス

骨病ニハ弁乘ヲ用フ
ニハ青丸或ハ水銀擦劑ヲ用ヒ

之ニ反メ英國ノ司健宮ハ梅毒病ニ水銀ヲ用ヒ
ス防焮ノ食料下劑溶湯ヲ用ヘテ治セリ此諸方
ノ義ハ下ニ詳ニス

〔義〕水銀ハ常ニ人ノ健全ヲ傷リ連用スレハ水銀
病ヲ起スノミナラス且ツ此毒ヲ凝流ニ体ヨリ
掃除ズルヲ能ハサルヲ辱之カルカ故ニ是ヲ恐

レテ用ヒサルモ宜ナル哉水銀病ノ説下ニ詳カ

ナリ

蒲弗涅^{ゴエツ子}ル^ルハ肉眼及ヒ鏡ヲ以テモ共ニ水銀ヲ

多服シタル病人ノ血汗尿管中ニ水銀球粒ヲ成

シテ集ルヲ見タリ盧^{ロレン}連^{ソク}曾^{カク}可^ケ照^ケ人^トモ又水銀粒ヲ

集シテ尿中ニアルヲ現出セリ

水銀ヲ多服シ或ハ多ク皮上ニ擦入シタル梅毒

病人ノ体中ニ水銀再ヒ故ノ全状ニ復リ流動シ

テ骨髓中ニ入り数年或ハ生涯迄ニ止リテ関節

中ニ不治ノ疼痛ヲ起シ假依屈多或ハ梅毒骨痛

ノ名ヲ命スルコト人皆知ル所ニメ解 学科ノ珍

庫ニモ乏ラ證スル骨ヲ藏メタリ

礞^{ロウ}烏^ウ弗^フ利^リ尔^ル及ヒ徒^ト私^シ多^タ共^キニノ塗^ツ擦^サ療^{リョウ}法^{ハフ}ニ鐵^{テツ}鐵^{テツ}

療^{リョウ}法^{ハフ}ヲ兼^{ケン}施^シシ或ハ乏ラ兼^{ケン}用^{ヨウ}セスメ^メ經^{ケイ}久^クノ梅毒

病ヲ治スルニ効ヲ養スルコト能ハス却テ衰^{サイ}啓^{ケイ}ス

ヘキ矣^イ驗^{ケン}アリテ終ニ水銀病及ヒ吐涎病ヲ残ス

コトアリ是水銀ヲ連々久用シテ清食機^{セイシキキ}營^{エイ}養^{ヤウ}機^キ補^ボ

形^{ケイ}機^キヲ喜^キシ終ニ乏ラ復^{フク}治^チセサルヲ得^{トク}サルニヨ

ルナリ予輩^{コノタチ}ハ意^イノ及^キフニ從^ツテ此病人ニ強盛ニ

センコトヲ務^ツム水銀ノ外ニ此ノ如ク人ヲ老ヒタ

キ吾具 内或ラ貴重ノ器ト云ナリ 搆造中ノ生氣ヲ
壓絶シ且ツ全ク妨碍シ滅絶スルヲ莫ニ瞭然々
軟弱ナル草木ニ迄傍ニ少量ノ水銀ヲ置ケハ生
長ヲ妨ケ終ニ凋枯ス又諸小虫子虱体虱頭虱ノ
如キニ蠕虫梅毒膿中ノ如ク速カニ死ス
絨体ノ腸液ニハ千萬無科ノ蠕虫アルヲ常範ト
スル丁男精中ニ乏アルカ如シ究理物産家之ヲ
設ル加里亞ト名ク精中此虫ヲ虧ケハ交媾シテ
胎孕セズ腸液及ニ乳糜中乏テハ消食機及

ニ營養機妨碍セラレ機吾ノ搆造ト成取ラ純ラ
導突梅毒及ニ殊ニ原始疔瘡ノ膿中ニモ亦屢ニ
顕微鏡ヲ照ラメ其固有ノ地形ナル虫ヲ見タリ
○此病人ニ甘汞ヲ与フレハ此虫消滅ス二日後
又生ズ此病人ニ下劑ヲ与ヘ食料ヲ減スレハ此
虫又消滅ス又之ニ菜汁ノ虫ノ成形ニ喜アル者
酷厉性ノ薬剤即チ剥屈忽烏葛薩尔撒巴菜列苗
香阿瓦容山酸等ヲ與フレハ初日ニハ虫ノ勢力
減ス第ニ日ニハ殆ント生ラ夫ニ第三日ニハ全ク

死ス此時ニ方ツテ此劑ヲ止ムル時ハ二三日ヲ
経テ又漸ク之ヲ見ル
日々大便ハ共ニ通利スル虫モ健康ナル入ノ唾
及ヒ乳汁中ノ虫モ亦相同シ予八百倍若ハ十倍
大ノ良顕微鏡ヲ以テ之ヲ見タリ此虫モ日永及
ヒ右ノ酷厲菓ヲ用フレハ死シ有カノ食内及ヒ
多精ノ菓劑ヲ用フレハ此虫ノ數ヲ増加ス
印徒福私ハ自ラ試驗メ水銀ヲ踏ヘテ梅毒ニ
効アル浸劑中ニハ十八月ヲ過ル後ニモ一箇ノ
虫ヲ生セサルコトヲ見タル人ニモ右説ト同様ノ

眞驗ヲナセリ

原始疝瘡ノ虫ハ終身ニ梅毒ヲ傳布スルハ男精
虫ノ胎孕ニ其ルカ如クナル乎予ハ許多ノ顕微
鏡五ノ經驗ニ由テ原始疝瘡ノ初メヨリ虫ナリ
ニ入術ノ補助ヲ以テ之ヲ滅スルモ此虫ナケレ
ハ曾テ全身梅毒病ヲ起サ、ルヲ精細ニ證シ得
タリ此故ニ精密ナル試驗家モ予カ無數ノ試驗
説ノ考究ヲ按定センコトヲ庶幾ス
此原始疝瘡ハ虫ナク或ハ此ニク之アル症ハ予
常ニ其症ノ輕ク経過スルヲ見此症ハ輕キ梅毒

ヨリ起リ来ルヲ知ル此症ニハ余未タ曾テ水銀
ヲ與ヘス唯梅毒ヲ剖スル剖ラテ此剖ハ假令
水銀ノ如ク効力烈シカラスト虽ニ梅毒病人ノ
体中ニ起ル所ノ非常ノ成長成形ヲ制止スル者
ナリ

之ニ反メ予ニ梅毒ノ病膿汁中ニ夥シク出ラ生
シ局処病ヨリ速カニ全身病トナル症ニ水銀ヲ
必要トスル丁速カニ経過スル膜咽喉嗽衝反
レ程々熱ノ劇症ニ於ルカ如シ是レ此諸匹ニ於
テハ成形機駐感ニメ非常ノ物体ヲ生スルカ故

ニ速ニ此機ヲ抑制シテ發生補復機ヲメ多ク進
ムトナカラシムルカ為メナリ

此列蛭沙鳥兎及ヒ勿別尔人名ハ既ニ疔瘡
中ノ虫ヲ論シ密兎屈人名ハ此論及ヒ他ノ梅毒病
性ノ説ヲ擴充シテ曰ク舎密術ニ顯微鏡ニ此毒
本性ノ合和丙性ヲ發現スルノ能ハスト此説吳
ニ真ニ迫ルカ如シ然レモ第一疔瘡ト称スル者
百症ノ中ニ就テ真ノ梅毒病ハニナニ充サルヲ
考ヘ勇ニ方今顯微鏡ノ製造古代ニ踰ヘテ精妙
ヲ極ル方ヲ考レハ則テ今時ハ此虫ノ義ヲ尚ラ

機

詳カニ探索シ假令此病十症ノ中一モ之ヲ見ス
ト虽此虫ハ独リ真株毒疔瘡ニノミ之アリ故
ニ此虫稀ナルコトヲ思フヘキナリトス
智上ニ學示スル所ノ措説ニ就テ考フルニ水銀
ハ梅毒ヲ制スル適薬ニアラスレテ唯總テ非常
ニ旺盛ナル成形。様ヲ抑制スル効アル者ナルコ
ト知ル而シテ他ノ効力緩弱ナリト虽同功ア
リテ害少ク幾多ノ梅毒病ニ水銀ニ代用シテ其
功ヲ補フヘキ薬劑アルコト亦明カナリ
茲ニ屬スル者ハ佛郎私入ノ半錢法防炊劑殊ニ

清凉下劑及ヒ此他葶氣浴若クハ利尿ヲ催促シ
テ過盛ナル成形カヲ抑ヘテ常度ニ還ハシムル
効アル植物ナリ
此法ニ依テ數々ニ梅毒病入根治スルコト八十年
来ノ実験ニテ十分ニ證スル所ナリ○余カ斯ニ
称スル品ハ植酸山酸固性羅屈塩揮發羅屈塩私
百大斯里屈納律誤水蒸山歸未剥屈福多薩尔
撒巴栗列天鳩谷阿芙蓉苜蓿根 胡桃及ヒ
他ノ幾多ノ株毒ニ適薬ト称シテ此下ニ各別ニ
論示スル諸品是ナリ

〔信〕梅毒病ハ非常ニ旺盛ナル成形成ヲ兼ヌル患
ナルコトハ其毒一種ノ刺戟性アリテ常ニ体中諸
部ノ組織中ニ激衝状ヲ引起シ患部ノ殊異ナル
ニ随フテ其形テ自ラ異ナリ而メ其病態動スル
ノ多小ニ從フテ非常ノ症状ヲ出ス未リ皮膚密
果疣骨脹之ニ次テ未ル等ニ依テ知ルヘシ
此故ニ尚久シキヲ經サル局処及ヒ全身ノ梅毒
病ハ唯食料ヲ減ス輕キ防斂劑ヲ與ヘテ營養ト
成長ヲ奪却シ全治スルコト屢之アリ水銀ヲ用ヒ
スメ此法ヲ行フハ晩近称譽スル久甚々多シ

然レモ古疾ニメ全身ノ皮骨中ニ根柢シタル梅
毒ハ水銀ヲ用ヒス唯古劑ヲ以テ治シ得ルコト
問ハ、予等否ト云スヘキナリ〔下條ヲ見ヨ此症
ニハ或ハ水銀擦浴及ヒ鍼灸療法ヲ用ヒ或ハ剝
屈福鳥多薩ル撒巴栗列等ノ瘡疔魚ヲ用フ
弟三梅毒ノ治療ニ諸般ノ法アリ之ヲ總括シテ
考レハ其中一箇ノ法モ全ク廢棄スルヲ得スト
虽トモ其状態ニ從フテ自他互ニ撰用スヘシ爰
ニ此諸法ヲ揭示シテ追次弁明セン
〔天〕輕キ防斂療法ナリ 歇ル屈尊碌鳥私設亞鳥

垣私魯起列私共名初メ之ヲ用ヒ其後ヲ萬謨導
格列屋扁歇乙謨及ヒ他ノ許多ノ入之ヲ用ヘ
強壯多液ノ入及ヒ多血ノ胃子ハ最初適好汚血
シ強盛ナラサル入ハ最初ニ梅那尾老別里塩ノ
下劑ヲ与ヘ糸子ヲ飲食ヲ菲クシ肉食多精ノ者
厚麦酒ヲ禁ス唯一日ニ三次ツ、水蒸汁少許水
或ハ薄キ犢羹汁中ニ煮タル米稜夫大麦ヲ用ヘ之
ニ加フルニ少許ノ白蓋蘇ヲ以テ之此他日之劑
扱水ヲ多飲シ病室ヲ同等ニ温カニシ殊ニ寒冷
ニ過スヘカラス

此療ハ其病状ニ依テ二三週ヨリ五週マテ連々
施用ス
酷厲毒ニ依テ侵サル、コナキ健康ナル人原始
疥瘡等癩便毒梅毒白帶下淋病ヲ患ヒ諸症輕易
ニメ腫瘍徐々ニ經過シ侵蝕セズ其膿汁未或ハ
些カニ出アリ或ハ全ク乏ナク西尔加里性ニモ
酸性ニモ見ヘサル症ニハ右ノ療法ヨク的中ス
更ニ榆皮煎檳皮煎石灰水「ゴ」ラルト水ヲ以テ其
瘡ニ貼スヘシ
巴例斯_都部_私府ノ病院ニ於テハ梅毒病ノ諸新症

ヲ治スルニ殆ント皆此法ヲ用ヒ兼テ芦根山牛
房根等ノ煎汁ヲ共フ
帝粟結名ハ怒謔蒲尔屈名地ノ総病院ニテ多年未
千万無量ノ梅毒病人ニ水銀一ムヲモ用ヒス右
法ヲ行フテ治セリト云フ此入曾テ水銀劑ヲ用
ヒタル後ニ残留スルカ如キ惡症ヲ残スヲ見ス
又此治法ヲ避テ他法ヲ行ハサルハカラサル症
アルヲ見ス許多ノ梅毒病人自ラ水銀ヲ用ヒワ
レハ治スヘカラサル者ナリト思フカ故ニ下劑
ノ方書ノ表ハ病人ノ心ヲ安センカ爲ニ水銀ノ

名ヲ記セリ

原始及ヒ導器疔瘡速カニ周邊ニ蔓延侵蝕シ專
フ別種ノ狀貌ヲ現ハス局処病ヨリ急ニ全身病
ニ轉移スル症ハ此救療法右法ハ体カヲ衰弱
セシム故ニ此名アリ
予此症ニハ每晚甘汞一ムニ阿貝蓉四分ムヲ和
シ与ヘ腫瘍ニハ水銀ヲ用ヒ疔瘡ニハ軟水ニ并
承ヲ加ヘ用ヒ急來ナル荒敗ヲ防禦ス但水銀ヲ
用ヒテ亘シカラサル症候ナキ時ノミ右方ヲ用
スルナリ○總テ此症ニハ所謂拂出療法ニ水銀

ヲ兼用シテ適當ハ下條ヲ見ヨ
予此法ヲ行フニハ常ニ媒毒膿中ノ虫消滅スル
ト復生スルトニ注意シ之ニ從フテ甘草ノ多少
ト速進徐服トヲ定メ或ハ又汞甘ニ交換シテ萃
涅滿溶汞ヲ用フルニ其分量ヲ定ム○隔晩ニ甘
汞半匁ヲリ一匁ヲ与ヘテ足ルコト辱マアリ
○此ニ兼テルニ飲食ヲ節ニシルコト所謂防癩療
法ニ於ルカ如クスヘシ
弗碌弗多謨尊ハ二十四年未水銀ヲ用ヒスメ
梅毒病ヲ療ス皆ヨク良効ヲ得タリ

儒佛林池ノ如ク密捨兒谷ノ説ニハ原始梅毒病
水銀ヲ用ヒスメ施治スル者百四十人ノ中導腎
梅毒病ニ轉スルモノ唯五人アリ又他ノ原始梅
毒病人百五十二人ノ中唯四十一人ノミ水銀ヲ
用ヒ百十一人ハ之ヲ用ヘスメ療シ其水銀ヲ用
ヒタリ病人ノ中ヨリ導腎病ヲ起ス者二人アリ
水銀ヲ用ヒスメ治シタル病人中ニハ導腎梅毒
症ヲ起ス者些カニ三入アリト云
葛沙尔、怒鳥京、私ハ梅毒病水銀ナシニ排除シ
得サル症一ニ之アルコトナシ又臍関節及ヒ骨ノ

梅毒病ニハ水銀適當ニ却テ刺屈福鳥多格児
失屈謨ヨク此症ヲ治スト云

〔地〕 掃出療法ナリ一ニ死救療法ト名ク

此法ハ水銀ヲ尤モ多ク内服シ或ハ間擦劑トメ
外用シ梅毒ヲ制伏スルニ至ルマテ務メテ永ク
吐涎ヲ防キテ其病治スルニ至ルマテ与ルナリ
○此法ハ急速ニ蔓延スル導管病全身ノ梅毒久
シキヲ經タル者皮膚等ニ行フヘシ
茲ニ諸般ノ法アリ

〔日〕 汞劑ヲ用服スル掃出療法ナリ此法最モ多ク

用ヘ易クメ最良ナリ者ナリ之ヲ行フニハ預備
法ヲ要セス故ニ吐涎療法 擦療法 鐵療法ヨ
リモ用ヒ易シ其方

甘汞 半匁 若クハ一匁 至一匁半

阿芙蓉

金硫黃 各四分

右混和シ朝夕ニ用フ

一二日此劑ヲ用フレハ又他ノ水銀劑劑ヲ撰用
シ殊ニ吐涎ノ徴ヲ見ハ朝夕華涅滿溶劑^録半匁ヨ
リ一匁一匁半金硫黃少許ヲ加ヘ与フ其一二日

ヲ経テ復吐涎ヲ徴ラ見ハ汞劑ヲ停メ旋即大黃
ノ下劑ヲ与ヘ兼テ温保シテ汁ヲ飲シ芦根山午
房加列尻私垂列那尔ノ微温煎湯ヲ多服シ
而ルニ局処ノ梅毒症尚消除セリレハ再ヒ上ニ
揚示スル所ノ甘汞散或ハ間又升汞ヲ与フ
此療法成効ノ後ハ穰那微温硫黄浴最後ニ錮鉄
浴湯ヨク適志ス
疔瘡及ヒ他ノ局処病ハ只水銀ヲ用ヒスメ療ス
若シ梅毒悪性ニメ治セサレハ次次テ試ムヘシ
月 擦汞掃毒療法ナリ支格乙温煎烏及ヒ登鴉

納萬入名ノ行フ処ニメ吐涎療法ニ於ルカ如最
初ハ排毒ノ預備法ヲ行ヘ次テ日々水銀軟膏ニ
敷テ取り炭火ニ添テ手足互ヒニ交代シテ擦入
ス其法患者一至ニ蟄居シ身ヲ温保シ芦根薩尔
撒巴栗刺加列尻私垂列那里垂ノ煎汁ヲ飲服シ
吐涎將ニ起ラントスレハ擦膏ヲ止メ登汗瀉下
セシムレハ吐涎全治ス
吐涎ノ徴候尽ク去レハ再ヒ汞膏ヲ擦入シテ復
々吐涎ノ兆ヲ現スニ至ル此兆已ニ現ルレハ又
登汗劑及ヒ下劑ヲ与フ此ノ如ク三週若シクハ

六週ヨリ八週乃至十二週ノ間交換シ二三回ヲ
ノ汞膏ヲ用ヒ既ニ梅毒諸症尽ク消除スル後尚
二週時間連進ス

原始梅毒病ニハ此法適合セス又傳染毒極メラ
惡性ナキハ亦用ヘカラス

〔星〕併合掃毒療法ト名ク内外同時ニ汞劑ヲ用ヒ
テ吐涎ノ兆ヲ現ハスニ至ルヲ云フ乃チ予ハ外
部ニ水銀軟膏ヲ擦リ同時ニ甘汞或ハ華溫滿製
劑ヲ用服セシム

此法ハ全身梅毒病ニ祇用スヘキ者ナリト金地

之ヲ行フコト多キニ過レハ急ニ大吐涎ヲ發シ易
シ故ニ前二法〔星〕〔月〕法ヲ良ナリト其中ニ就テ消
食機ヨク調フテ身体強健ナル人ニハ汞劑ヲ内
服スル掃毒法ヲ良トス消食機宜シカラズ衰弱
セル人ニハ汞ヲ擦入スル掃毒法ヲ撰フ
右三法共ニ其病尚久シキヲ經ケルハ六日ヨ
リ八日マテノ間ニ已ニ吐涎ノ兆ヲ見ハズボト
ニ水銀ヲ多量ニ用フ之ヲ急速治法トス若シ其
病既ニ久シキヲ經ケルハ唯兩三日コトニ内外
ニ汞劑ヲ多量ニ用フ之ヲ急速治法トス若シ其

之ヲ緩慢治法ト名ク

凡一所謂排泄療法ナリ是レ梅毒病ノ古治法ニ
メ唾腺及ヒ皮膚ヨリ梅毒ヲ分音排泄スルヲ主
トス○予輩之ヲ分テ二ト為ス

共一ヲ

排泄療法トス○此法ハ頼ル

ニ足ルサル法ニメ四週間日々頭ヨリ足ニ至ル
マテ灰能汞膏ヲ擦入シ原ト羽衾中ニ平卧シ病
室ヲ列氏驗温器ニ十八度ヨリ三十四度マテノ
暖サニシテ大行大吐涎ヲ起サシムルナリ
ニ百年前ニハ一般ニ此法ヲ取リ行フトモ晩今

ニ至テハ此法ノ悪性癩病無智病水銀骨擦水銀
毒瘍骨膿腐骨ヲ引起スルカ故ニ区家之ヲ採用
セス最之ヲ用レハ許多ノ患者治セスメ梅毒病
ナルカ將々汞毒ナルカラズニ雄キヲ症ヲ起ス
ヲ実験スレハナリ

其ニラ吐涎療法ト名ク足亦上古ノ法ニメ最モ
多ク喜ブリ且ツ尽ク根治スルヲ能ハス故ニ茲
ニ之ヲ畧ス唯的中スヘキ所謂鐵錢療法ヲ論シ
ヘシ

鐵錢療法ヲ行フニハ患者預シメ先ツ八日ヨリ

ニ甚々衰弱シ神五臓ノ感動敏銳ニ過キ子宮衝
逆病依剥昆垵児ヲ患ヒ血液大ニ沸騰シ胸中困
重咯血勞瘵熱水腫失音亦倍苦此下ノ五症ハ内
外共ニ水銀ヲ禁ス司ストトリ患ヒル者ニハ此療
法宜シカラス

妊娠中ニ亦總テ之ヲ禁ス唯止ムコトヲ得サル症
ニハ大ニ勤慎メ之ヲ用フヘキノミ謨私焉曰ク
若シ妊婦ニ擦汞法ヲ用ヒテ流産セサルモ其兒
産後久クメ後テ必ズ死ス多クハ初年ノ間ニ衰
弱及ヒ消耗病ヲ患ヘテ死ス

此療法ヲ行フノ前ニ預備法ヲ処スルハ直チニ
水銀ヲ單用スルヲ禁スル所ノ諸重症ヲ除キ去
テ水銀ヲ用フヘカラシメンカ為ナリ
此預備法ハ人術ヲ以テ機呂ヲ消耗衰弱スル者
ナリ是レ吸收機ヲ増スニ必要ナルコトニメ治療
ハ主トメ此機カニ係在スレハナリ故ニ預備法
ヲ行フノ間モ之ニ次テ内外治法ヲ施ス際ニモ
カメテ多ク孛生ノ食物ヲ禁ス保生ノ為ニ必要
ナル量料ヨリ多ク用フヘカラス即チ鍼灸療法
法ナリ

此故ニ大人ノ食養ニハ日ニ三度四弓ヨリ六弓
マテラ極メテ稀キ肉羹汁ニ少許ノ雀麦大麦等
ヲ加ヘテ製シタル淡薄羹汁或ハ水八弓ニ小麦
銳一弓ヲ加ヘ煮タル羹汁ヲ許ス共フルノミ「謨
私萬曰ク肉羹汁ハ殊ニ蠕虫ヲ生シ易シ而ルニ
出ラ生スル機管ヲ変スルヲ此療法ノ首義トナ
スカ故ニ之ヲ用フレハ茲ニ妨障アルヲ以テ水
製羹汁ヲ亘トス

朝啜羹ニ代ルニ止ムコヲ得サレハ一骨布ノ
骨非ヲ許シ此預備法ヲ行フノ初メ三日間ハ煮

タル甘草少許ヲ許ルスヘシ○他ノ諸食物殊ニ
肉食ハ嚴禁スヘシ

飲料ニハ水ヨリ他ノ物ヲ与ヘス假令与ルモ薩
尔撒巴栗列根山午房根或ハ過尔他根ノ煎汁ヲ
以テスルノミ但消食機ヲ困厄スルヲ避ルカ為
ニ二十四時中ニ三廿ヨリ多キニ過スヘカラス
糝私萬曰ク緩慢ナル梅毒病経久ノ輪癬等ノ患
ヒテ既ニ魯烏弗私尔及ヒ律私多共名ノ擦灰法
鐵錢法ヲ用ヒタル入ニハ甚々稀キ麦酒ノ新ナ
ラス陳ナラス硝子壺中ニヨク貯ヘテ盃ニ移注

スレハ泡沫ヲ起シ茶褐色ナル者ヲ飲料トナシ
共ヘテ曾テ害アルコトナシ
又兼テ一室中ニ閉居シ努メテ寒温氣ヲ避ケ但
温ニテ善ク乾燥スル復日ニハ一二時間開放セ
ル氣中ニ出ルモ可ナリ風日ノ宜シカラサルコ
自ラ明カナリ

此預備治法ハ下劑ヲ共ヘテ大便ヲ通ス其方ハ
患者ノ体質ト年齢トニ從テ配合メ異ニス是腸
胃ノ汚物ヲ掃除ス殊ニ体中ノ液ヲ奪除シテ皮
膚及ヒ内藏ノ吸收カラ盛ニシ水銀ヲ愈多吸收

セシメンカ為ナリ

然レニ此下劑ニハ甘朮ヲ用フヘカラス又茲ニ
浮血法ヲ行フヘカラス但シ恐ルヘキ燄衝若ク
ハ血液鬱滯ヲ兼ル症ハ許シテ血ヲ浮ス
温浴法ハ皮膚ヲ清クシ吸收カラ強クシ固形部
ヲ軟カニシ流体ヲ弛ス易クシ故ニ茲ニ必要ノ
法ナリ○日々單湯浴ヲ行フ其温度ハ患者ノ意
ニ過フヲ良トス但シ列氏驗温器ノ十九度ニ過
クヘカラス有誤○患者此湯中ニ一二時ノ間浴
スヘシ誤私焉曰ク列氏ノ十九度ハ甚ク冷ナリ

恐クハ華散ノ誤ナラン必是二十九度ニウタカ
ヒナシ列氏二十五度ヨリ二十七度マテノ温浴
ラ尚冷ニ過タリトスル入辱之アレハナリ
茲ニ於テ預備法ト下劑ト共ニ歇メテ擦承法
ヲ行フ此下劑ハ十四日間行フヲ常則トス此ニ
次テ行フ所ノ擦承法ヲ良効アルニ右ノ諸法ヲ
嚴シク持重スルニ係ル者ナリ
許多ノ実験ニ從フニ此預備法ヲ行ノ間ニ已ニ
梅毒瘡輕快スルヲ得未タ水銀ヲ用ヒサルニ良
膿ヲ醸シ全病將ニ治セントスルアリ謨私多曰

ク予ニ亦自ラ実験シテ右説ノ予ヲ欺カサルヲ
知ル若シ緩慢ナル病ニメ上頸及ニ懸壘無速カ
ニ荒敗ヲ受ル恐シナキ症ニハ此預備法ヲ首々
ル療法トシ多害毒某ナル水銀ヲ擦入スル法ヲ
取用セズ唯數週此法ヲ持重スヘシ實ニ此法ヲ
行フテ治シタル陳痼梅毒病ヲ例ヲ以テ明カニ
知ル所ナリ
此預備治法ヲヨク持重シ行フテハ愈重要ナリ
ト虽ヒ然レニ患部ノ状態一異変症アレハ則チ
此療法亦変セサルヘカラヌ或ハ唯其期日ヲ短

クシ或ハ全ク此法ヲ用ヒサルナリ乃ケ懸壺
硬上顆軟上顆鼻目等ノ如キ貴重ナル部損失ス
ルノ恐アリテ急ニ之ヲ保護スヘキ症ニハ律私
多クハ此預備法ハ行フ日期ヲ短クシテ四日ニ
縮メ屢良幸ヲ得タリ
之ニ次テ用ル所ノ擦灰法ハ身体諸部子足背巾
ニ尋常ノ水銀膏ヲ取り時日ヲ期シテ須次ニ擦
入スルナリ此法ヲ行フニハ鐵鏡法及ヒ温室間
墊法ヲ續ヒテ施スヘシ○擦入スヘキ軟膏ノ量
ハ大入ニハ常ニ二錢ヲ用フ

之ヲ擦入スヘキ部ノ毛ヲ剃去ルノ後ケ初メハ
朝後ハ晚ニ軟膏ヲ取り最初ニ両脚其次ニ股第
三次ニ両肘ニ掌前ヨリ肩ニ至リ第四次ニ背腋
ヨリ項ニ至ルマテ温手若クハ他人ノ介助アレハ
草球ヲ以テ擦入シテ乾クニ至ルヘシ但シ間日
ニ之ヲ行フ
根治法ニハ十二次ノ擦入ヲ要スルナリ此法
ハ通常廿六日ニメ終ル然レモ一異症状急急大
吐涎アリテ日期ヲ短クスルナリ以上華說此療
法ヲ行ニハ通常十三日ヨリ十六日ノ間ニ始メ

テ吐涎ノ徴ヲ現ハス即チ煩憊不淨呼吸困難
冥舌苔腹脹赤心悸不熟寐屢驚覺シ小便澁小便
秘是ナリ

此急吐涎ノ諸症ハ大ニ行ラザレバ二便快利スレ
ハ則チ速カニ治ス

此諸症ヲ察スル時期ヲ病毒分離ノ時限ト名ク
此時節ニハヨク注意メ寒氣ヲ避ケ葶中ニ居リ
接骨花ノ浸劑ヲ温服シテ徐々ニ行或ハ四時
若クハ六時ヨリ十時ニ至ルマテ続ヒテ察スル
ヲ促スコト臣家ノ専務トス

此行ノ終リニ至テ腹中雷鳴風氣腹痛病毒分
離ノ行ラザレバ行全ク体マサル際ハ臣家下劑
ヲ与ヘテ之ヲ促セハ害アリ葶設ハ曰ク臣家方
術ヲ進行スル前ニヨク注意シテ此病毒分離ノ
症ヲ見ハスヲ待ツヘシ

其後チ通常此療法ヲ行フテヨリ第十六日ニ復
晩ニ遅ク擦法ヲ行ヘ次日下劑ヲ与フ是レ碌島
弗利尔律私多弗設律ハノ經驗ニ從ヒハ其最終
ニ皮上ニ察スル病毒分離ノ諸症之カ為ニ依シ
且ツ之カ為ニ腸ノ排泄直チニ増加スルヲ以テ

次回ニ用ヒタル擦膏ノ全身諸品及ヒ殊ニ強ク
液カ感スタル唾腺上ニ現察スル効カラ劑挫ス
ルニ直シキ片ナレハナリ

此故ニ今マテ行ヒタル朝擦法ヲ晩擦方ニ変シ
二三日コトニ其一次ヲ晩ニ遅クシ間日ノ早朝
ニ下劑ヲ与ヘ三四五次ノ晩擦法ト同敷ノ下劑
ヲ行フヲ以テ此治法ヲ結尾ス然レハ此下劑ヲ
此時限ニ用ルハ努メテ少量ナランコトヲ要ス之
此症多クハ大ニ泻下セントスル勢アレハナリ
○此療法ヲ行フ間ハ始終乾温ナル小室中ニ居

リ必要ナルコトアルニ非サレハ怠ラ開クヘカラ
ス是此時ニ方テハ些微ノ冒寒モ大害ヲナセハ
ナリ

食物モ又上ニ舉示スル法ニ從フヘシ但甚々衰
弱スル入ニハ一卵黃及ヒ一食匙ノ蒲萄酒ヲ刺
歇尼私塩味ナキ無味製法ヲ云フト為シ典ルヲ許スヲ異ト
ス

此療法ヲ行フコト前方ノ如クニメ第二十六日ニ
至レハ此日ニ患者ヲ微温湯ニ浴シ四分時ヨリ
半時ノ間其中ニ止リ燒酒ニ石飲ヲ溶カシ海綿

ヲ浸シ之ヲ以テ全身ヲ洗淨シ温巾ヲ以テ拭
乾カシ而シテ右ノ又他ノ清湯ニ浴シヘシ
若シ諸難症感受穢過敏ニメ消耗セル人ニ殊ニ
乏アリ或ハ急怒大吐涎アリテ尋常ヨリ再ク此
療法ヲ歇メサルヘカラサル片モ亦此浴湯法ヲ
行フ

梅毒病ニ殊ニ侵サレタル部ニ外表ヨリ一種ノ
局処療法ヲ行フトハ此療法ニ兼施スルヲ要ス

以上華説ナリ
薰蒸療法ハ古代ノ雄毒療法ナリ其法軀体ノ患

者ヲ善ク密閉セル箱中ニ居ヒ唯頭頸ヲ出サシ
メ朱砂ヲ熾炭上ニ撒シ其蒸氣ヲ以テ全身ヲ薰
シ四十八時コトニ此法ヲ行フ

此法ヲ行ヒハ多クハ速カニ大吐涎瘞等四支振
搖ヲ起シ或ハ又間卒厥シテ死ス屢又真ノ水銀
汚瘡ヲ瘳ス故ニ今更ハ之ヲ用ルコト甚々稀ナリ
假令之ヲ行フニ全身ニ施スコトナシ唯近世頑固
ナル梅毒瘡疹病骨病及ヒ咽鼻中ニ隱伏シタル
痛瘡ニハ局処薰法ヲ行フテ効ヲ得タリ
咽鼻中ノ痛瘡ニハ尋常ノ烟草ニ朱砂ヲ混ス薰

スレハ甚タ大効アリ其方

煙草一七

朱砂ニ製

右混和シ次ヲヨク乾カス日々之ヲ一二三管
ツ、薰シ其烟ヲ患者ノ鼻ニ通セシム

別尔林地名莫弗扁拔人名モ亦梅毒咽喉瘍及ヒ

殊ニ鼻瘍ニハ水銀ヲ内服シ之ニ加フルニ水銀

烟ヲ含舎セル煙ヤヲ用フレハ弁永ヨリ速カニ

治療スルヲ經驗シタリ此人ハ朱砂ニハヨリ六

分マラヲ以テラ製シテ之ヲ薰セシム

梅毒病ノ治スル良法ニ尚一ニノ異説アリ各症
各箇ノ治法ヲ論示スルニ先ツテ茲ニ之ヲ掲示

凡コトナシ陳地名玄地名ノ古名区名非名謨名利名ノ説ニヨレハ梅毒病

ヲ治スルニハ昆名荅名芩名鳥名謨名ト名機名吾名ノ性名質名ト名考

ヘ名カ名ル名ヘ名カ名ラ名ス名昆名荅名芩名鳥名説名ト名ハ名動名物名ノ名毒名ノ名常

ニ名自名ラ名補名培名シ名テ名傳名染名ス名ル名機名カ名アル名者名ヲ名云名フ名機

器名ノ名性名質名ニ名ハ名唯名其名毒名ニ名十名分名對名抗名セ名ワ名ル名質名アル

カ名故名ニ名諸名般名ノ名状名態名ニ名依名テ名傳名染名ス名ル名ニ名多名少名輕名重

アル名者名ナ名リ

故ニ治療ヲ施スニハ第一務メテ傳染毒ノ勢イ
ト已ニ患ル部ノ毒ノホク患ヘサル部ニ感スル
機動ヲ挫キ局処病ヨリ全身病トナルヲ防禦ス
ヘク第二患者ニ多ク對抗機ヲ付与シヨク其毒
ノ逼迫ニ敵抵セシメンコトヲ務ム

非謨利ハ此病ヲ五等ニ分ツ
第一ハ病尚表面ニ在テ其傳染シタル部ニ留リ
茲ニ粘液ヲ泄ス○此症自ラ治スル者多シ譬ヘ
ハ麻疹ノ如シ氣中ノ酸素及恐クハ尿中ノ尿酸
乏ラ助ケ癒スモノナラン○衰弱スル人ハ這般

ノ麻疾ノ后全身梅毒病ニ轉シ易シ非謨利曰ク
是レ其毒ニ對抗スル力甚々弱キニ坐スルカ故
ニ水銀少許ヲ内服セシム然レモ入ヨク全身ニ
彌蔓セサル麻状ノ酷厲毒ト唯慢リニ瀟厲毒也
トスル処ノ全身梅毒ヲ已別スヘシ是近世起ル
仙滿人ノ專ラ論説スル所ナリ
又梅毒麻ト梅毒ニ拘ラサル麻トテ均矣ニ弁明
スル兆候アルコトナシ唯導路梅毒麻ハ吾代ニハ
多シト魚尾方今梅毒全身毒病ヲ患ル者ハ乏ラ蘇
ルコト至テ稀ニメ假令乏アルモ全身ノ疾患アル

ヲ以テ疑フ容ル、地ヲトニ依テ直テニ安識ス
ヘシ
華設曰ク傳染ノ初メ疔瘡ヲ瘡スル内ハ之ト異
ナリ此症ニ次テ其毒遠ク他部ニ傳連スル者常
ニ多シ然レニ疔瘡ハ初時尚純粹ノ局処病ニシテ
腐蝕劑ノ酸素ヲ含ム者刺必斯如烏私蟄居私縁
青赤降赤ヲ以テ瘡ヲ掃除シ其毒ヲ酸化スレハ
此病ノ瀰曼ヲ抑製シ全身梅毒病トナルヲ防止
スト此説實ニ正理ニメ古買里居的児モ又其医
範中ニ同説ヲ載ス

蘭健別裁^{フシケンヘツキ}及ニ他ノ諸人ハ之ニ反メ腐菜ヲ以
テ外部ノ瘡瘍ヲ蝕スルヲ欲セス唯水銀ヲ内服
セシメ疔瘡ニハ更ニ菜劑ヲ貼セスメ内機ノ進
退ヲ伺フヲ標的トナス
予ハ通常多クハ原始疔瘡ニ腐蝕劑ヲ外敷シ水
銀ヲ内服セス唯減食ト水飲ヲ多クスルトヲ命
ス
第三ニ於テハ病已ニ他部ニ瀰曼ス是レ時期ヲ
以テ定ムハカラズ唯病状ニ其人ノ体性トニ就
テ考究スヘシ此時ニ方テ非讓劑ハ局処々ト

ハ陰莖陰門中ニ水銀膏ヲ擦入シテ傳染毒ヲ
進退セシメ内服ニハ設テ必要トス

〔第三〕ハ病已ニ全身ニ達シ然レニ全身復ホタ
甚タ衰弱スルニ至ラズ患者陰部ニ咽喉ニ痛
瘡ヲ生ス此片ニ方テ非誤劑ハ此瘡急ニ周回ニ
侵蝕シ陰莖懸壘並等ヲ荒敗スルニ非サレハ只
常ニ水銀ヲ内服スルニ若シ右ノ諸部ヲ急ニ
荒敗スル症ニ過ハハ弁求テ外用シテ或ハ葦溜
劑トス或ハ喇劑トス

〔第四〕患者衰弱已ニ甚タシ梅瘡自性ノ形状ヲ變
レ不潔ニメ侵蝕シ己ニ自性ノ圓形ニメ脈肉狀
ナル容テラ夫レ消食機衰弱シ慢性奇ル贅ヲ患
ヘ非誤劑ハ此症ニ水銀必的申セズ唯阿芙蓉キ
ナ龍腦ヲ以テ体カラ強クスヘント云フ其右痛
瘡又自性ノ形状ヲ現スハ甘汞ニ阿芙蓉キナ
龍腦ヲ知レ与フ然レニ此症水銀病ナルコト多シ
乏ラ分矢スルニハ唯此藥功ノ有無ヲ以テ決ス
ハシ

〔第五〕經久ノ梅毒病後新々ニ又毒ニ染ムコトナシ
ト雖ニ餘毒尚体中ニ存スルカ故ニ夜吐ニ依テ

寒温氣ニ由リ鉄劑及ヒ銅氣ヲ含ミタル泉水百
ル門多泉ヲ内服スルニ由テカシク再発スル
アリ非謨利ノ説ニ此症ヲ防クニハ二週未梅毒
諸症消滅スレハ則ケ速カニ水銀ノ内服ヲ止メ
テ休息シ一ニ週ヲ過キテ后再ヒ少量ノ水銀療
法ヲ始ムルヲ以テ經久梅毒症ヲ治スル法トス
ルヲ最良トス此ノ如クスレハ其体再々ヒ大ニ
乏ラ感スル壯ヲ得殊ニ他ノ水銀製劑ヲ撰用ス
ルヲ宜トス假令ハ初メテ弁汞ヲ用フレハ後チ
ニハ一ニ週ノ間々水銀軟膏ヲ擦入シ但吐涎ヲ

起スニ至ルコト勿レト云フ○若シ此療法ヲ怠タ
リ微シク再発スルヲ見ハ衰弱スル患者ニハ水
銀ヲ与ヘス山酸ヲ内服ヒレム
非謨利梅毒諸症ニ首幕トスル方ハ擦汞方華温
満汞及ヒ弁汞ナリ其説ニ曰ク諸水銀製劑中
甲呂ハ乙呂ヨリ多ク金屬狀ニ近キヲ以テ弁
ト○全酸化汞塩ハ半酸化汞全酸化汞ニ比スレ
金屬復ラ去ルコト遠シ
第一其製劑愈多ク金屬復ニ近ケレハ愈吐涎ヲ
起シ易シ故ニ甘汞ハ弁汞ヨリ吐涎ヲ免シ易シ

第一吐涎ヲ怒スル丁ウキ者ハ全身消食機補復
機ヲ侵襲スル愈多キ日々実験シテ知ル所ナ
キ故ニ小兒感性敏銳ニメ薄弱ナル入骨瘵状ニ
見フル人老人妊婦ニハ此汞塩必適當セズ
病諸骨及ヒ総テ第一級ノ諸臭ヲ襲フハ碌烏
弗利尔及ヒ律私多^{共ニ}ノ擦示法ヲ大効アル某
トス然レニ先ツ別尔^人ノ方ニ從フテ赤降汞
二十分^人若クハ十六分^人ヨリ八分^人マテニ阿
芙蓉ヲ加ヘ粘液^人アル某液ニ和シ朝夕与ヘテ
試ムヘシ

碌烏弗利尔及ヒ律私多^{共ニ}ノ療法ハ患者羸瘦
セズ又惡液^人ニナラサル者ニ施スヘシ然レ間
又此病ニ之ヲ用フル丁アリ
諸膜譬ハハ角膜虹彩^人ノ鞅帶多ク患ルハ
独尊^人ノ療法ニ從ヘル^人ヲ用フルヲ相当ト
ス○然尔^人里烏私^人刺私^人製劑ニ又此症ニ用
フ体力尚強キハ殊ニ宜シ
病多ク腺ニアル者ハ殊ニ耳^人ニ夫鳩答阿芙蓉
金硫黄ヲ配ス患者曾テ腺病ヲ患ル者ニハ殊ニ
宜シ

病多ク神五ニ在リ患者脾病状ニメ症瘳ヲ終シ
易キ片ハ亞的尔默尔尼里亞私ヲ与フ

非謨利ト独尊地
ハ最ニ偏シテ梅毒病諸状

取テ論セス尽ク弁承丸ヲ賞登ス其方

弁承 \pm ム
ヲ蒸 錫水 適量 中ニ溶シ 白蒸 餅

心 白砂糖 各適量
ヲ加ヘ分ツテ二百四十

丸ト為シ桂木若クハ石松末ヲ夜トス法ニ

依テ服用ス

此丸ハ各二十分ハノ弁承ヲ含ム者ニメ間日十
毎時午飯後ニ直ニ用フ晚キモ食後四分時若ク

ハ半時ヲ過サス胃中充滿シタル時ニ用ヒテ胃
ヲ害スルコト勿シメ而メ少許ノ水若クハ麦酒ヲ

追飲ス

其初メ四丸ヲ服シ毎服ニ丸ヲ増加ス三十丸ハ

半會弁承ヲ用ルニ至テ此療法ノ終リトス○大


量ヲ服スルニ至レハ之ヲ小分メ五六丸ヨリ八九丸

マテツ、毎次此間ヲ急ニメ連々飲服セシム○

若シ之ヲ服シテ吐逆スレハ其後直チニ同量ニ

丸ヲ取テ阿芙蓉丁裁二滴ヨリ五滴ヲ加ヘ用フ

服后三四五時ニ腹痛ヲ起ス片ハ老連粗槓ニ消



ヨリ六滴ヲ用フ
此一劑ヲ行フ間ハ二十八日原登七日ニ作ナリ
若シ梅毒ノ根治ヲ切實ニセント欲セハ諸症候
ニ拘ラス通シテ此療法ヲ行へルヘシ○若シ
吐涎ヲ起スニ由テ一二日此療法ヲ体ムルハ
其症去テ後再ヒ其体ノタル數ノ丸ヲ与ヘ四週
時ノ日數ヲ滿ツ
兼テ薩ル撒巴粟列ヲ用フ其方此根ヲ細判シ食
ヒ一積ヲ取り八大骨布名水ヲ以テ徐々ニ煮テ
半ヲ取り之ヲ終日ニ服シ尽クヌ冷温ハ其人ノ

意ニ任ス

此全治療中丸薬ヲ用ヒサル日モ断ヘス微々蒸
氣ヲ怒ス且ツ其斯日ノ間ハ食物ノ半ヲ減ス朝
夕少許ノ稀汁ヲ飲マシム○脂油菜ハ尽ク禁ス
且ツ酸ヲ避クヘシ此他禁忌ナシ○腫瘍ヲ治ス
ルニモ局処ニ薬ヲ貼セス
此獨尊地ノ療法ハ一未ハ梅毒病ノアル症ニ有
効ノ薬ニメ一未ハ諸薬ニ越ヘテ大ニ優レリ
第一患者之ヲ用ルニ艱苦ナク天氣良ケレハ密
室中ニ蟄居マレヲ要セス又汚穢ナル標永膏法

ノ如ク嚴密ニ養ヲ禁スルヲ要セス
第ニ食後直ニ之ヲ用ルカ故ニ曾テ消食機ヲ損
セス却テ食氣ヲ進ム予此法ヲ用ヘテ療スルコ
ト多シト至ニ腹痛嘔吐ヲ起ス入アルヲ見ス
故ニ老達扭謨ハ一度モ用ハサル者多シ
第ニ假令療治中ニ不意ニ冒寒スルト至ニ碌鳥
弗刺ル及ヒ律私多谷所用ノ鍼法及ヒ擦灸法
ノ如ク善アルコトナシ
第ニ四冒感甚シキ人及ヒ感動過敏ナル人ハ之レ
ヲ用テ俛吐涎スルコトアリト至ニ升汞ハ原未金

屬質ヲ去ルコト遠キ製劑ナルカ故ニ吐涎ヲ起ス
コト至テ稀ナリ
獨尊地ノ此方ハ新方ニアラサレニ其用法ハ實
ニ新ニ夫ハ者ナリト至ニ梅毒病ノ諸症ニ概シ
テ之ヲ賞シ且ツ偏倚メ夫ニ之ヲ信用スルハ此
入ノ億斷ナリ
他人及ヒ予自親ノ經驗ヲ以テ考ルニ此劑獨ノ
ヨク適中スル者ハ第ニ經久ノ梅毒症瘰癧瘡口
瘡鼻瘍ナリ第ニ輕キ梅毒及ヒ疹及畢丸腫ナリ
○之ニ及メ諸原始病ニシテ梅毒尚局処ニアル

者及ニ弟二度ノ經久梅毒諸病導発病ヲ云フ既ニ骨
質ヲ襲ヘ結腫結節腫骨瘤骨膿腐骨ヲ為ス者ヲ
ハ或ハ効セナク或ハ全ク乏ナク或ハ又大害ヲ
ナス故ニ之ヲ施スヲ禁ス
梅毒性皮膚病ニハ別ル局名ノ赤降療法ノ功ア
ルヲ独尊地丸ニ優レリ是レ別ル局名ノ刺奢里
的病院ニテ名匠律歇名ノ施治セル独尊地丸
ノ無敵ナル試驗ヲ以テ定ムルノミナラス且ツ
予及ニ余カ知巴ノ実験ヲ推テ極ムルトコロナ
リ

余之ヲ證スヘキ五症アリ多年梅毒ヲ患ヒ皮膚
及ヒ骨病ヲ兼テ獨尊地丸ノ療法ヲ行ノニ唯其
症ヲ鎮静スルノミニメ効ナク終ニ鍼灸療法ニ
擦永療法ヲ兼用シ或ハ兼用セスシテ治スルヲ
見タリ○律士名微希私律私多名地ノ匠沙局名施名ノ
説ク所ヲ聞クニ予カ実験ト同一般ノ症ヲ親驗
セリト云フ
覺性旺盛ナル人ハ并承テ内用スルニ独尊地丸
ノ如キモ亦大ニ謹慎メヘシ腹内多血ナル人モ
亦然リ是腸間膜ニ燃衝ヲ起シ顔頸ニ帶赤青班

ヲ悉シ刺衝熱ヲ起シ易ケレハナ
巧謂夫萬滿煎ハ原未經久ノ煤毒病ヲ治スル薬
トシ輓迄ハ緩慢ナル皮膚疹殊ニ輪癬結腫結節腫
ヲ糸タル緩慢性依居萬ニ賞用ス予之ヲ実験ス
ルニ果シテ屢大効アリ
入此矢萬滿煎ヲ分ツラ強緩トス強煎ノ方

薩尔撒巴栗列根 十ニ三

泉水 二十四九

右煮ル丁四分時

一三半

甘草 半斤

秦那佛尔安須護扭 製刮各一斤

此三品ヲ右ノ煎汁ニ加ヘ布疋ニ包ミ捏交メ
溶化シ了リ

旋那葉 三斤

甘草 一三半

亞泥私吳

苗香子 各半斤

右混合シ沙過シテ十六セヲ取り滓ヲ去リ八
硝子曇ニ收メ貯フ之ヲ強煎ト云

緩煎劑ノ方ハ前方ヨリモ又多味ナリ

大葛満強煎汁

薩尔撒巴栗列根 各六分

泉水 二十四分

右煮テ尽ク溶化シ了リ

橙皮

桂支

益智 各細末三分

甘草 本六分

右四味ヲ加ヘ瀘テ十六セヲ取リ滓ヲ去リ八

箇ノ硝子量ニ収ム之ヲ稀薄煎トス

此煎汁ノ用法ハ患者初日ノ朝夕ニ承製清下丸
十六粒ヲ用ヒ次ニ四日間強煎汁一壺ヲ温服シ

午後緩煎汁一壺ヲ冷服ス第六日ニ至テ泻下丸
ヲ服スルヲ初日ノ法ノ如クシ次ノ四日間強緩

二煎汁ヲ服スルヲ又前法ノ如クシ○日々ニ子
ノ弱羊肉及ヒ小麦莖餅ヲ用フ但シ下劑ヲ用ル

日ニハ犢羹汁ニ雀麦大麦等ヲ用フ○此療治中
ハ葷中ニ温保シテ逆氣ヲ催進スヘシ且ツコ

レヲ用ヘ了ルタル后ニ尚暫時室中ニ温保シ

素食ヲ用シ私百矢里局納律謨見テ或ハ薩ル
撒幣粟列根煎ヲ飲服シ
患者一劑ヲ行フテ尚全治セサレハ再々此前方
ヲ行フ若シ其人強壯ナレハ療治ノ身二日ニ尚
一次下劑ヲ童子用フ
瘡瘍ハ此療治中只微温湯ヲ以テ之ヲ洗淨シ乾
撒系ニ緩和軟膏ヲ塗テ之ヲ覆フ
患者衰弱スル片ハ日々此煎汁各半盞ヲ用フ○
之ヲ服シテ惡心嘔吐スル者ハ之ヲ小分ニ与フ
レハ此症則チ治ス

予此方ヲ用ヒテ速カニ吐涎ヲ起ス止ムコトヲ得
ス暫ラク此劑ヲ歇メ阿芙蓉金硫黄キナヲ内服
セシムル症ヲ見ルコト多シ○予ハ通常此劑中ノ
甘承秦那佛尔妥負護扭ヲ除キ二十四日中ニ服
用セシム効驗猶右ノ如シ

梅毒病諸形状ノ性負治法並ヒニ
其属症ヲ論ス

第一梅毒漏精病即淋疾ハヨリ根治スル片ハ次ヲ
全身梅毒病ヲ答スルコト甚タ稀ナリ是粘液ノ泌
別増加スルヲ以テ病毒ヲ分膏排泄スレハナリ

○梅毒瘰ト梅毒ニ因ラサル瘰トヲ弁別スルニ
確乎タル徴候ナシ

予ハ今日ニ至ルマテ粘液瘰ニ蝸虫ノ有無ヲ探
索セサルヲ恨ミトス然レモ今ニシテ其症ニ違ハ
ハ忽ケテ之ヲ探覈スルコトヲ得ヘシ

唯全身梅毒病ヨリ導察スル瘰病ハ他ノ症ト弁
別シ易シ此症ハ全身ノ患ヲ療スルヲ主トス昔
輩原始瘰ヲ療スルニハ多クハ汞劑ヲ用ヒス

〔第二原始梅毒瘰ハ前ニ記載スル原始瘰瘰ノ謂
ニメ局処梅毒病ノ徴候ヲ現ハス自然ノ機力ヲ

ミヲ以テ劑挫スルコト至テ稀ニメ常ニ皆全身梅
毒病トナルモノナリ、

此症ハ治法及ヒ總身梅毒病トナルコトヲ防禦ス

ルコトハ余已ニ前ニ論シテ曰哉多ノ匠輩各瘰瘰

ヲ治スルニ水銀ヲ用ヘスメ素食及ヒ防炊療法

ヲ以テス今日尚之ニ依テ治スト又他匠ハ水銀

ヲ内服セズ只赤降汞ヲ以テ瘰上ヲ腐蝕シ導察

梅毒病ノ兆候ヲ現サ、ル間ハ只素食ヲ命スル

ノミ
又之ニ及スル説ヲ唱フル人アリ乃チ輩設ハ

原始梅毒病ヲ治スル篇中ニ曰ク疔瘡ハ曾テ水銀ヲシニ根治スル者ナシ之ヲ内外ニ用フレハ能ク根治シ若シ梅毒一回体中ニ侵入スレハ則チ必水銀ヲ用ルヲ要ス水銀ヲ用ヒスメ疔瘡ヲ治シタリト云フ説ヲ主張スル人ハ諸実験ニ従フテ考ルニ皆是臆断ニ出ル者ナリ護私多評メ曰ク諸實驗ト云フハ視ル所正シカラサルニ似タリ噫又偏執シテ疔瘡ニ水銀ヲ外傳スルモ亦十全ノ治療トセス又酷烈ナル腐蝕劑ニ由テ疔瘡ノ周邊ノ硬結ヲ溶解シ其瘡ニ痂ヲ結ハシム

ルヲハ右劑ノ効ナリト云ヒ然レニ患者之カ為ニ決シテ治セス早旭ニ危殆ナル症ヲ答スルハ實ニ盛驗シテ知ル所ナリ○之ニ反メ適宜ニ水銀劑ヲ内服スレハ疔瘡ノ周邊大ニ硬脹セス疔瘡ノ惡性ナラサル症ヲ治シヘシ而メ外敷スルニ及ハサルト亦實驗ヲ以テ證スル処ナリト以テ章證ノ如ク相反セル説ニ主張スル者ハ各其實驗ニ原ク者ナリト云ヒ其實驗スル処實ニ自ラ偏執スレハナリ

予カ上ニ攀ルカ若ク梅毒ニ一般ノ種英ヲ建ル
ハ則テ此相反スルカ如ク見ユル説判然トメ解
了スルコトヲ得ン

予カ原始疔瘡ヲ療スル法ハ症状ノ異ナルニ從
テ次ノ差別アリ

[子]原始良疔瘡ハ必ス水銀ヲ内服セシメス只
兩三日毎ニ旋那葉浸劑ニ尾老別里塩ヲ加タル
下劑ヲ処ス素食ヲ命ス飲料ニハ冷水ヲ多服シ
室中ヲ同等ニ温暖ニスルヲ全治法トス初八日
中ハ冷水或ハ鉛水ニ浸シタル撒系ヲ瘡上ニ被

ニ其後ハ乾撒系ヲ以テス或ハ楝皮煎ニ浸シ或
ハ全ク湿フサスメ貼ス

此ノ如ク施治シテ八日内ニ疔瘡治セス却テ益
悪シク或ハ廣大ニナリ尤モ稀ナリト臣ニ便毒
之ニ次キ未ルヤハ瘡中ノ膿汁ヲ捺視シ若シ多
ク蠕虫ヲ生スレハ隔晩ニ日液一ハ阿芙蓉四分
ハヲ知劑メ内服シ六割ヨリ八割ヲ用ヒ兼テ上
ニ云フ処ノ食養ト云ヒ冷泉ノ多服一昼夜ニ八
廿ヨリ十二杯ニ至ルトニ注意シ茶骨非麦酒ハ
適宜ニ飲ミ蒲萄酒及ヒ燒酒ハ嚴禁シ日ニ三度

少量ノ水浸汁ニ古麦銚ハオラ加ヘ与フ○瘡瘍
ハ榆皮或ハ榲皮ノ冷煎汁ヲ以テ被フ
瘡瘡膿中ニハ蠕虫或ハ些シク生ス或ハ全ク之
ナキ者多シ此瘡ハ上ニ所謂下劑素食冷水ノ内
外用ニ依テ治シ少シモ水銀ヲ用ルコナクシテ
全身病ヲ繩終スルコナシ
扶尹的^{モリ}尔^ト 區^ク 賢^{ケン} 己ニ茲ニ見ル処アリテ瘡瘡ハ尽
ク真梅毒病ニアラスト云ヒ扁年^ヒ人亦瘡瘡一百
五症中真梅毒病ハ只二十人ニメ八十五人ハ假
症ナリト云ヒ如尔^ニ密^シ奢^シ兒^ル 名^ナ 又英國ニ於テ水

銀ヲ用ヒテ害アル假梅毒病ヲ真梅毒病ニ比ス
ルニ五ト一トノ如シト云ヘリ○瘍科^ニ板敏^シ 敦
谷^ニハ龍^リ勤^シ 都^ニ府^ノノ病院ニテ陰^ニ処^ニ眼^ノ瘍^ノノ五^ノ異^ノ症
ヲ実験シ精細ニ記録シ諸般ノ療法ヲ行ヘリ
[丑]原始瘡瘡正時ニ十分ノ療治ヲ施サズニ加
フルニ体^ニ負^ニ衰^ニ弱^シ 酷^ニ厉^ニ液^ヲヲ生^ス 或ハ強^ニ猛^{ナル}
毒ニ傳染スルハ惡^ニ性^ノノ原始瘡瘡ヲ起ス此症
ハ方今正治^ノ適^ノ療^ノ方法アルニ由テ至テ稀ナリ
其症諸般ノ別アリ
[乾]侵蝕シ出血シ易ク瘡瘍ニメ首タル瘡瘡ノ徴

候ナレニ不健ナル人衰弱スル人矢苟児倍苦ヲ
患ル人若クハ腺病ヲ患ル人或ハ已ニ永ク消食
機衰弱シ肝病ニ罹ル等ノ人ニ登ス
予此症ニハ稀塩酸二三錢ヲ取り一壺水中ニ和
シ日ニ三次内服シ茶ヲ多養ノ食物ヲ午一且ツ
少許ノ蒲萄酒ニキナ一錢ヲ加ヘ用フ○疔瘡上
ニハ次ノ軟膏ヲ貼ス

西銘花一製

阿芙蓉越幾私六八

剥木萬膏 半子

右精密ニ混合ス

然レ凡此瘡中贅肉ヲ生ス或ハ出血スルハ明
答丹答ノ溶液或ハ稀硫酸ノ漏方ヲ行フ
尋常此ノ如ク疔瘡ノ膿中ニハ虫ヲ見ルコナシ
其後此瘡自往ノ圓形ヲ為シ脈肉状トナルハ
此虫初メテ生ス茲ニ於テ[坤]号ノ療法ヲ行フ
此疔瘡ノ要性ナルハ乏ヨリ全身瘡トナルノ恐
アルトハ傳染毒ノ劇烈ナルニ係ルニアラスメ
患者ノ体負衰弱スルト酷厲液アルトニシテ
者多シ俟又大ニ多孳ナルモ亦此原因トナル龍

勤府ノ病院中ニ夥多ナル梅毒侵蝕瘡乃チ是ナ
リ此症ハ阿芙蓉キナ硫酸ヲ内服シ的列並帝那
油ヲ外用ス

此萎ハ病人ハ多クハ竟勤府ノ平常ノ娼家ヨリ
出ルル真症タル始メ陰処ニ侵蝕瘡ヲ生ス速力
ニ潤大トナリ疼痛焼クカ如ク又刺スカ如ク帶
黄茶褐色ノ膿汁ヲ流シ瘡邊黯赤ニメ速力ニ黒
色ニ変シ終ニ壞疽トナリ其脉小數皮戶乾燥ス
神五病性ノ哥尔贊アリ衰弱脱カス速力ニ過当
ノ劑ヲ用ヒテ救治セサレ死ス

〔坤〕患者体頗強健ナリト虽凡烈シキ傳染毒ニ侵
サレ疔瘡ノ周辺微赤ニメ正中ニ白膿點アリ其
形テ或ハ正圓或ハ楕圓ナリ此瘡熾交后速力ニ
生シ急ニ深ク蝕シ且ツ廣潤ニナリ膿中夥多ノ
虫ヲ生シ粘厚ニメ白色恰モ脂ノ如ク一腫不佳
ナル甘臭アリ其真狀筆記スヘカラスト虫凡一
度之ヲ嗅タル人ハ常ニ之ヲ忌レヌメ又思ヘ出
スヘシ劇烈ナラサル毒ノ疔瘡ニハ此臭氣アル
コナシ

患者瘡瘍ヲ自然ノ機カニ信ヒテ顧ミス食養ヲ

嚴禁スルヲニ注意セサレハ已ニ十四日内ニ便
毒及ヒ咽中疔瘡ヲ生シ梅毒已ニ全身ニ瀰曼シ
ルノ徴ヲ現ハス○通常陰莖ニ許多ノ疔瘡
ヲ同時ニ生スルヲアリ
療法 素食ヲ用ヒ外部ニハ

阿芙蓉越哉私十人

皓谷 一日

軟膏 半斤

右能ク混和シ貼ス

内服ニハ

甘永 二匁 至四匁

清淨阿芙蓉 半匁

アラヒヤコム

白砂糖 各半匁

右混和シ分ツテ四包トシ三四日コトニ晩ニ
其一包ヲ用

通常此散劑只二三ヲ用ヒテ全病治癒シ八日或
ハ十日ヲ過ルノ後瘡瘍癒着シ患者全ク実病ヲ
免ルニ至ル○匹魯乙列ニ又此ノ如キ方ニテ
原始疔瘡ヲ治セリ然レト一劑ニ甘永六匁ヨリ十

凡ニ至ルマテラ手フ是其量甚々多キニ過タリ
療治ヲ行フノ初日第ニ日第四五日ニノミ右ノ
軟膏ヲ以テ瘡上ニ貼ス第三日第六日ニハ微温
湯ヲ以テ瘡中ヲ洗淨シ乾撒糸ヲ被ヒ一二時ヲ
後ニ膿汁ヲ探視シ己ニ虫ヲ見サレハ則テ予ハ
微温湯ヲ以テ其瘡ヲ被ヒ次日ノ日至上ヲ出ラ生ス
ル片ハ尚一度此散一劑ヲ予フヘキ徴トナレ○
通常此後服ノ后ニ一二次下劑ヲ登ス然レハ則
テ吐涎及ヒ水銀毒ノ残留ヲ恐ルヲ要ス
此瘡知覺至テ敏捷ニメ速カニ周回ニ侵蝕ス治

スルコト能ハサル者ハ食養度ヲ失ヒ精氣多キ飲
料ヲ誤用スルニ至スルナリ此症ハ次ニ拳ル軟
膏ヲ毛筆ヲ以テ日ニ一二次瘡瘡ニ捺擦ス其方

弁永 六八

夫鳩谷越炎斯

加密列越炎私 各ニ登

阿芙蓉 羊八

玫瑰密 一多

右混合ス

〔實〕梅毒包茎及ヒ包皮腫別病ナリ○此病ハ嫩衝


性ノ原始病ニメ假令梅毒其原因タリト虽に焮
衝病ノ治法ニ從フテ処置スヘシ故ニ最初冷卷
汰ヲ行ヒ下割ヲ内服シ冷水ヲ多飲シ素食ヲ用
フ

包茎痛劇シクメ出血シ陰茎焮赤腫脹シ防焮衝
法ヲ行ヒトモ治セサルハ包被ヲ裂キ或ハ包
皮腫爛ノ包皮ヲ切截ス護烏刺尔度水老烏扭誤
ヲ以テ其上ヲ被ヒ每晚甘汞一ハニ阿芙蓉半ハ
ヲ加ヘ用ヒ凡ソ六割ヨリ八割ヲ午フ○同時ニ
急シタル原始疳瘡及ヒ痲疾モ亦右法ヲ以テ治

ス

包茎及ヒ包皮腫爛病焮衝劇盛ナラス或ハ已ニ
退余スルハハ涅烏滿ハ布片ニ承軟膏ヲ塗リ
其辺ニ貼シテ大効アリ又載閉法ヲ必要トセス
ト包茎扁ヲ見ヨ

〔卯〕便毒ハ梅毒ノ刺衝ニ由テ鼠蹯腺焮衝腫ヲ起
スナリ是媾交ニ由テ梅毒身体中ニ囊入シテ此
症ヲ急スレハ梅毒病ノ徴候トナスヘキナリ此
他ノ鼠蹯腺腫ヲ依序多腺病百私多哥尔贊ノ徴
トスルニ同シ



梅毒鼠蹠腫ノ位スル地ハ腺ノ組織中ナリ此地
ヲ此傳染毒ノ會処トス然レモ腫瘍ノ所在ハ此
地ノミナラス深淺処置ノ腺ヲ圍抱スル蜂窠織
中ニモ在リ

證據及ヒ経過

梅毒鼠蹠腫ハ炊衝ノ諸時限ヲ經歷スルコト他ノ
諸鼠蹠腫ニ同シ○初起鼠蹠邊ニ孪張ヲ覺ハ骨
ノ運轉及ヒ行歩コトニ孪張倍加ハリ唯艱苦シ
テ腰ヲ尽スレハ此カニ行歩スルヲ得善ク鼠蹠
ヲ探索スレハ已ニ腺腫ヲ觸知スヘシ其後劇痛

ヲ覺シ硬脹シ晩ニ入テ疼痛増加ス歩行スルコ
能ワス大ニ腫脹スルモ予觸ラズ其後皮上
赤色ヲ覺ス常ニ哥ル聲ヲ兼テ晩ニ向テ殊ニ
甚クシ其後速カニ疼痛刺スカ如ク鼓スルカ如
ク硬腫漸ヤク軟解ス推セハ波動ヲ覺ハ正中突
起ス皮肉薄クナリ膿孔メ或ハ自ラ破開シ或ハ
術ヲ行フテ刺開シテ便毒ヨリ導管梅毒瘍ヲ起
シ未ル

辨別

感通便毒ナル者アリ此症間種毒後灰子泥及ヒ

先膏膏ヲ用ルノ後毒虫刺傷后ニ瘡ス殊ニ皮表
ノ感觸敏捷ナル者ニ多シ但シ梅毒性ノ便毒ハ
已往ノ諸行ニ由リ且ツ其腫球状ニメ著ク突起
スルヲ以テ之ヲ已別スヘシ然レ此終リニ載ス
ル形容ハ梅毒ニ起因セラル便毒ニモ同又之ヲ
リ腺病性ノ便毒ハ曾テ梅毒性ノ便毒ノ如ク速
カニ経過スル者ナシ又梅毒ノ如ク疼痛セズ硬
固ナラズ哥ル贅ヲ兼子ニ患者腺病性ノ状態ア
リ唯患者梅毒病ニ由テ腺病ニ罹ル症ハ便毒ヲ
識別スルコト甚ク難シ

倭麻質便毒ニ亦其人曾テ梅毒ニ染ヒタル者ハ
辨別シ難シ
重キ冒寒病ニ次テ聖原侯状咳嗽咽喉焮衝耳腺
焮衝ヲ終スル者亦屢鼠蹊辺腫脹ス
此他鼠蹊辺ノ打撲癰疽節腫等ヨリ終スル症此
病ハ其各症自性ノ先ケタル徴候ニヨリ原始梅
毒治レテ後日久シキニヨリ曾テ梅毒ニ感傳シ
タルコトナキ等ニ依テ已別スヘシ
未熟ナル区ハ獨リ鼠蹊顔倭及ニ股顔倭及ヲ
梅毒性ノ便毒ト混雜スル者アリ是此顔傳已

ニ歲月ヲ経ルトハ患者明カニ乏ヲ告ルカ故ニ
謬ルヲナシ方今生シ未ル者ハ必ス急ニ瘡見ス
多クハ劇シキ体動ノ後ニ生ス新鼠蹯瘡傳ハ其
位置便毒ヨリ高ク股顔瘰癧ハ便毒ヨリ低クシ
又瘰癧瘰癧ハ乏ニ觸テ便毒ノ如ク硬カラス又痛
マス若シ鉗結スル片ハ疼痛アレハ別ニ其自性
ノ症候アリテ乏ヲ安知スヘシ

大腰筋膿瘍亦幾許自性ノ症候アリ即チ患者平
卧スレハ膿腫縮小シ直立スレハ脹大ナリ剥烏
巴尔多瘡明者勒蒂下ニ位シ哥尔贅アリ腫瘍ニ

先チ未リ且ツ身ヲ前ニ屈ルヲ自性トスル等ノ
症アリテ皆梅毒性ノ便毒ト混シ易カラサル徴
ナリ

梅毒性便毒中ノ區別

常ニ便毒ニ先ツテ梅毒ニ傳染スルコトアリト虽
モ其傳染スルコト一樣ナラサルカ故ニ乏ヲ分ツ
テ原始傳染感傳ノ三便毒ト為ス

其二原始便毒ハ究理説ニ從ハハ交媾ノ時直チ
ニ梅毒ヲ此腺ニ吸收シテ茲ニ傳染シ以テ乏ヲ
瘡スル者ナリトスヘシ而ルニ區家ハ多ク此便

毒ノ起因ヲ知ルコトヲ欲セス是他ナシ唯送謬ニ
安ニスルヲ以テナリ其送謬スル所以ハ或時ハ
患者匹ニ對シテ明カニ告ケス或ハ未タ曾テ婦
人ニ交ラスト云ヘ或ハ己ニ原始疔瘡ヲ患ヒタ
ルヲ秘シ其痕己ニ消滅シテ認ムヘカラス或ハ
又唯々痲若クハ尿道中ニ隠伏セル小疔瘡アリ
テ之ヨリ梅毒ヲ廣布スル症ナルコトヲ詳カニス
ルコトヲ得サレハナリ

其二 導管便毒ハ原始疔瘡及ヒ痲病ニ糸子ヲ尿
道ニ疔瘡アル症ニ次テ発ス是此傳染毒ハ水脈

從テ腺ニ傳ヘ此腺ヲ刺衝シテ焮衝スルニ至ル
ナリ

理會シ易キ解剖学理ニ依テ考フレハ男子ノ便
毒ハ上部ノ鼠蹊腺ニ位シ婦人ハ下部ノ鼠蹊腺
ニ發スルヲ知ル

屈律傑^{クワック}ノ説ニハ前未腺病ヲ患ヘタル白色^ケ
ル人及ヒ水様^ケ剖ヲ内服シ湿菴^ケ剖ヲ外用シテ原
始疔瘡ヲ治シタル人ハ此便毒ヲ患ル一種性^ケ
リ乾温^ケ兩剖ヲ交ヘ用ヒタル人ハ之ヲ患ルコト少
ナシト云フ

其三感傳便毒ハ腺ノ感直スル刺衝ヨリ発スル
病ニメ決シテ傳染毒ヲ茲ニ吸收シテ起ルニ非
サルナリ

痲病ヲ療スルニ初時ニ於テ刺衝ニ過ルカ或ハ
患者強烈ナル飲料ヲ服シ舞蹈騎等ニヨツテ自
ラ喜シ私格^シル^ト多^ト奮^トユラ帯ヒ尿道ノ焮衝ニ防焮
療法ヲ行ハサル等ニ次テ之ヲ發スルヲ廢之
リ
此便毒ハ甚々分解シ易シ入術ノ辭助ナシト虽
ニ焮衝ノ劇勢減退スレハ忽テ自ラ消散シ

此便毒ト導発便毒トハ一診シテ識別シ易カラ
ス若シ同時ニ原始疳瘡ヲ患ルハ殊ニ然リ然
レニ予輩ハ梅毒傳染後急ニ發スル便毒ハ皆感
傳症ニメ導発便毒ハタクハ梅毒 治シテ後
チ三四周若クハ八週十週ヲ過テ初メテ發スル
者ナリトス
悪性疳瘡ハ強劇ナル傳染毒ニ次キ来ルニ之ヲ
發スルヲ幸ニメ稀ナリ此症ハ導発便毒ヲ發ス
ルヲ甚々速疾ナリ〔前ニ發ル〕〔丑〕條ノ〔坤〕号ヲ現ヨ
又感傳症ヨリ終ニ導発便毒トナル新々ニ傳染

スルハ殊ニ此 症ヲ尅シ
或ハ感傳便毒ヲ交通機性便毒ト互ニ感機性便
毒ト分ツ交通機性便毒トハ尿道ノ焮衝延テ
此腺ニ及ヒ痲病尚治セサル者ヲ云ヒ互感機性
便毒トハ此焮衝ノ劇シキト他ノ刺戟物トニ依
テ痲病ヲ抑壓シ即今病毒轉移ノ法ニ從フテ此
腺ヲ侵襲シ便毒ヲ生スル者ヲ云
梅毒性便毒ノ前徴ト結尾ヲ論スルニ感傳便毒
ハ前徴良善ナリ且ツ殊ニ梅毒ニ傳染セサル中
ハ常ニ分解シ易キ故ニ輕良ナリトス ○導尅

便毒及ヒ原受便毒ハ前徴甚々互シカラズ是レ
此症分解スルハ虽ニ梅毒除去スルカ否ヲ切實
ニ知ルヘカラサルヲテリ其知ルヘカラサル者
ハ何ソヤ高名ナル諸子ノ説ヲ見レハ梅毒病ハ
十歳ヲ経ル後ニモ亦新々ニ尅起スト云ヲ以テ
ナリ
便毒ハ膿潰スル者最モ多シ此膿瘍ノ噴症ナリ
者ハ四週ヨリ六週ノ際ニ治ス他ノ惡症ニ在テ
ハ數月治セズ之カ為ニ許多ノ病ヲ生ス壞瘍惡
状ヲナシ易ク多少疼痛ヲ苦ニ膿質惡シク臭氣

ラ生ス迄傍ノ侵蝕シ漏管ヲナシ瘡辺臍狀ト
ナル等ノ症アリ○此症ハ衰弱シテ酷厲液ヲ困
ム人ニアルコトニメ茲ニ根柢セル熱ヲ急冷シ良
茶モ之ヲ治スルコト能ハス数年困苦スルコトアリ
○焮衝変シテ硬結腫トナルコト數之アリ殊ニ匹
冢委瀝シ寒温劑ヲ用ヒ或ハ壓抑シテ強ヒテ分
解セシメントスルハ此多シ
此腫瘍或ハ硬キコト石ノ如クニメ何葉モ之ヲ軟
解スルヲ得ス生涯患苦スルコトアリ
又脱疽ニ變スルコトアリ衰弱セル惡液質ノ入夥

多ノ病人充滿スル病院ニ居ル者殊ニ之ヲ患フ
又病院脱疽流行スルハ殊ニ便毒ノ部ノミナ
ラス尚且ツ肢被テ侵襲シテ終ニ死スルニ至ル
コトアリ○空氣ノ質獨リ脱疽ニ移ルノ困トナル
コト聞々之アリ復熱酷烈ナルハ殊ニ多シ
○忽倫^{ホレン}ハ千八百零六年ニ便毒ノ脱疽トナル
モノヲ屢々見タリ

〔療法〕

感便傳毒ニメ此腺ニ梅毒ヲ吸收シタル恐レナキ
症ニハ予輩常ニ介解センコトヲ務ム○病初メニ

ニ在テハ冷水ニ浸シタル草キ壓疔中ヲ其腫上
ニ被ヒ半時コトニ新タニ換代シ以テ之ヲ抑制
シ糸子テ大ニ身ヲ安静ニシ素食シ私格シコレトル多番
ホヲ施スヘシ

焮衝已甚ニメ大ニ腫脹シ疼痛劇シキハ最初
冷卷法ヲ試ムヘシ然レモ之ヲ行フテ十二時中
ニ効ヲ養セワレハ則テ緩和劑ニ非沃斯失亜
密葉及ヒ少許ノ酒石塩緩和劑四ツニ一ツヲ加
ヘタル微温蒸劑ヲ用フ○焮衝ノ程度ニハ蟻針
ヲ施シ消石瀉劑塩ヲ内服シ刺絡スヘシ其後ナ

便毒ノ周圍及ヒ腋ノ上部ニ擦膏法ヲ行ヒ兼テ
其症狀ニ從フテ梅毒ノ内治法ヲ行フ

此等痲病尚治セサルハ温蒸劑ヲ陰生辺ニ用
フヘカラズ之ヲ用フルハ益便毒ヲ催発スレハ
ナリ

若シ其便毒身ニノ發動ナルカ又ハ感傳便毒ナ
ルカヲ詳カニ知ラサルハ譬一ハ同時ニ瘡
尚治セズメ存スルハ隔晩ニ甘汞一ハニ阿芙蓉
四分ハヲ加ヘテ内服シ便毒ヲ癒スルニ導発病
ヲ治スル法ニ從フヘシ

此ノ如キ便毒ニハ焮衝ノ状恰ニ羅斯ニ萎ムル
了アリ此症ハ殊ニ寒温劑ヲ避クヘシ否サレハ
慢狂硬結腫トナリ易キカ故ニ香薷草葉ヲ充
ル麻多刺矢私ラ外部ニ用ヒ内部ニハ少量ノ吐
酒石ニ碯砂及ヒ接骨木花水ヲ如ヘ用ヒテ適宜
トナス

右ニ云フカ如ク誤治ニ係ラスメ梅毒性便毒癩
硬結腫トナリ焮衝疼痛共ニ忒テ腫瘍益硬固ナ
ル了アリ此症ハ竜腦軟膏ニ水銀軟膏ヲ和シ擦
劑トナシ次膏ヲ軟草ニ搽シ便毒及ヒ其近傍ノ

被フヘシ其方
失鳩蓉膏

水銀膏

金密陀膏

昆刺私膏

右混和ス

導怒便毒ノ治法ヲ論スルニ諸般ノ説アリ艾
丹涅尔繆尔刺乙別尔扶子^{的兒私}萬尔^{尼忽倫}及
其他ノ諸人ハ諸便毒殊ニ導怒便毒ヲ分解セシ
ト欲スコレ膿潰スル了甚々難クメ危ク且ツ全

身梅毒病ノ発動ヲ防禦スル劑ナケレハナリ又
便毒分解消散シタル後チ廻ク全身ノ梅毒病ヲ
怒スルコトナシトスヘカラス然レ膿潰スルト虽
凡導発梅毒症ヲ全ク防制スルコト能ハサル例亦
多シ此故ニ分解ヲ最良ノ結尾ナリトメ治療ノ
初メ先ツ常ニ分解法ヲ試ムヘシ但此法常ニ皆
良效ヲ奏セス解凝劑ノ効ニ反シテ膿潰スルコ
アルハ実ニ嗟嘆スルニ堪ヘタリ
此故ニ便毒ノ初起ニハ身ヲ安シシ仰卧シ防痲
療法ヲ行ヒ清涼下劑ヲ用ヘ外部ニハ便毒ノ全

圓ニ氷寒水巻法ヲ施スヲ良法トス ○若シ其疼
増劇スケレハ蝨針法ヲ行ヘ其後灰白膏膏ヲ擦
入ス ○此療法ヲ行フニ時ヲ失ハサレハ八日中
ニ治スルコト辱乏アリ膿潰スレハ八週中ニ治ス
ルコト難シ
痲衝腫痛ノ劇盛ナル症ニハ刺絡素食下劑モ又
必要トス
此症數日間治療ヲ怠ラ棄擲シ或ハ右法ヲ行ヘ
凡分解セス瘍中ニ波動ヲ覺ル片ハ膿潰セス
メ治スルコト能ハス緩起並劑ニ曰ヨク棄失鳩多

嬰栗球ヲ加ヘ用フヘシ
便毒硬固ニメ殆ント疼ナキ者アリ最初ニ此症
ヲ起ス丁ハ甚メ稀ナレバ此症ニハ結倫ホル人
ノ莖劑当過ス其方

黒石鱗 三斗

沛湯 三斗

此莖劑大ニ衝動ノ痛ヲ惹シレハ白芥子ヲ減ス
然レバ膿膜ノ為ニ必要ナル衝動ヲ引起シ嫩衝
ヲ惹シテ緩和莖劑ヲ用フヘキニ至ルマテ之ヲ
連進スヘシ

必要ノ時期アレハ衝動性ノ莖劑ヲ用ルニ兼テ
緩和莖劑ヲ與ヒ膿瘍自ラ破壊スルニ至ル此法
ヲ行フニ十四日若クハ尚其餘ヲ過ル丁癩乏ア
リ
又己ニ承ク波動ヲ覺ヘテ其瘍非常ニ廣濶ニナ
リ而シテ自ラ破潰セラル者終乏アリ此症疼甚

シキハハ葉鍼ヲ以テ刺開シ疼マサルハ小孔
ヲ穿タル硬膏ヲ貼シ其孔中ニ腐葉ヲ傳ヘテ確
綻セシム衝動性ノ莖葉ト草緩如莖葉トハ其瘍
ノ多ク焮痛スルト急鈍ニメ知覺ヲ失スルトニ
從フテ撰用シ破潰ノ後ニ尚多クハ腺ノ大分硬
結スルカ故ニ常ニ長ク連用スヘシ
梅毒性便毒ヲ瘡スル症ニ在テ便毒ハ原始疔瘡
ト導瘡病トノ際ノ病ナリト云凡便毒ハ現存セ
スメ晩ク導瘡ノ患ヒテ喉鼻中ニ瘡スルコアリ
然レニ諸導瘡便毒ヲ尽ク病毒分離ノ症トシテ

膿膿セシムヘシトレ又律私多^人ノ思フカ如ク
膿潰セサル前ニハ汞劑ヲ内服スヘカラストス
ルハ僻論ナルヘシ
實ニ汞劑ノ内服ハ便毒ノ劇シキ焮衝症ニ的中
セス此症ニハ獨リ防焮劑ヲ用ルコト他ノ焮衝性
梅毒諸病ニ於ルカ如シ然レニ焮衝輕微ナルハ
ハ直チニ甘汞ヲ内服シニ三日ヲ過テ華濕滿溶
汞ヲ用ヒ其後晩ク尚他ノ導瘡梅毒症ヲ瘡セス
獨尊地ノ丹汞丸ヲ与フルヲ最良トス
便毒性慢ニメ硬結スル症ハ衝動性ノ莖劑ヲ用

ルノ外更ニ耳朶ニ竜腦阿芙蓉莨菪莫莨莨答里斯
ヲ加ヘ内服スヘシ
己ニ膿潰シタル便毒或ハ漏トナリ或ハ脱肛状
トナリ或ハ脱疽トナルハ外科術ノ法ニ依テ
治スヘシ○脱疽トナリタル症ハ内外共ニ水銀
ヲ処スヘカラサル丁自ラ瞭然タリ
屋扁歌乙謨ハ水銀ヲ用ヘスメ梅毒病ヲ療ス
ル人ニメ諸便毒ヲ分解スル療法ハ尊尚スヘキ
効能アリト云フ其療法常ニ便毒ノ周辺ニ冷奄
方ヲ行ヒ大ニ適宜ノ裁設凡石ヲ腫上ニ置テ之

9
ヲ壓ス其瘍劇痛アリ或ハ己ニ波動ヲ覺ル症ニ
ニ尚之ヲ行ヒ兼テ下劑ヲ與ヘ素食ヲ命スレハ
其腫尚分解スル丁屢之アルヲ見タリ然レニ終
ニ膿膿ヲ防制スル丁能ハサレハ緩和布ヲ貼
シカヲ以テ膿瘍ヲ刺開シ次テ或ハ乾撒系ヲ貼
シ或ハ羅士窩萬兒若クハ石灰水若クハ醋若
クハ稀硫酸ノ溶液ヲ以テ瘡口ヲ封シ其後速ニ
ニ治スルカ為ニ地獄石ヲ以テ瘡縁ニ塗擦スヘ
シ此ノ如クスレハ諸便毒速カニ治ス
余此ノ人療法ニ從フテ許多人梅毒性便毒ヲ分

消セリ案スルニ石壓法ハ傳染毒ノ廣達ヲ防キ
其毒ヲ他部ニ吸收スルヲ制ス故ニ甚々鴻益ヲ
リト見フ蛇蝎蛇等ノ如キ毒傷モ患部ヲ緊紮ス
壓定スルハ其毒ノ普達スルヲ制止スルト曰
一種ナリ

辰^二房^一傳ノ梅瘡ナリ

其二此病初ニハ口中嚙下具鼻中ノ疳瘡トナリ
テ終ス是レ全身梅毒ヲ受クルノ徴ナリ假令全
身ニ瀰曼セザルモ其毒陰処ヨリ傳染シ原始疳
瘡尚現存スルカ或ハ己ニ消除シテヨリ茲ニ傳

布ス故ニ全身梅毒病ノ一徴トナス○此病ノ徴
候ト已別ハ己ニ上ニ記載セリ

若シ此症原始疳瘡區療フ候スレテ治シタル后
六週或ハ十週ヲ経テ終シ唯緩々周辺ニ侵蝕シ
疳瘡本性ノ症候ナク膿中出ラ見ザル片ハ予ハ
水銀ヲ内服セシメス唯日々小麦銚四羅^ト六
十羅^ト出^トマ^トテ^ト用^トフ三日毎ニ瓦老別里塩若
クハ若塩^{洋利塩}其^{佛泉結}名ノ法^{ナリ}欽^科ニ
ハ日々新皮泉水十二^ト十六^ト若クハ二十四^ト
ヲ冷服セシム○此鍼錢療法一名水療法ハ小麦

銚下氷トノ外ニハ曾テ少許ニ患者ニ与フルコ
ナシヨク此方ヲ守レハ多クハ十四日ヨリ二十
一日マテニ根治ス
然レニ強暴ナル毒ニ傳染スルニ由テ原始疔瘡
尚存スル間ニ急ニ導引疔瘡ヲ生スルコアリ此
症ハ速カニ周圍ニ侵蝕シ多ク出テ生ス瘡縁硬
固ニメ其色多クハ鮮紅膿汁白クシテ濃ク遂ニ
骨ヲ侵蝕メ鼻瘡ヲ生ス懸壘無テ荒壞スル等ノ
症ヲ発スルニ至ル
此症始終水銀ヲ用フヘキコ強猛ナル傳染毒ヨ

リ生スタル惡性原始疔瘡ノ治法ニ同シ(上ヲ見
已其法并汞ニ阿芙蓉ヲ加ヘテ内服シ并汞ノ溶
液ヲ嗽劑トシ并汞阿芙蓉越後私天鳩答加密列
及ニ玫瑰蜜ヲ以テ製シタル溶液ヲ毛筆ニテ塗
リ惡性ノ鼻瘡ニハ辰砂ヲ混スタル煙ヲ薰シ
ルヲ主案トス○此諸劑効ナケレハ獨尊地丸ヲ
與フ
口内疔瘡疼劇シク知覺甚々過敏ナルコト時々之
アリ此症先ツ阿芙蓉半匁若クハ一匁ヲ日ニ三
次用ヒ過ル他五根五麻仁菲沃私策ノ含嗽劑ヲ

處ス疼痛熾衝去テ后初メテ内外ニ承劑ヲ与フ
此瘡間又侵蝕瘡状ヲナシ莫ニ急ニ侵蝕スト嵩
梅毒疔瘡ノ本性ヲ其膿中出ラ生セサルコトア
リ此症ハ原始侵蝕疔瘡ノ治法ヲ処シ蘇魯林液
幾那ヲ内服シ胆答一二ルヲ泉水一斗ニ溶シ含
嗽劑トシ其瘡本性ノ豚肉状トナリ此ノ如キ水
銀ヲ含マサル劑己ニ効ヲ奏スヘキ希望ナキニ
至リ初メテ水銀劑ヲ與フヘシ

〔其二〕梅毒皮膚瘡ナリ此病ハ多クハ甚々晩ク生
スル者ニメ最初局処ヲ傳染スル后數月若クハ
數年ヲ経テ初メテ発スルコト屢乏アリ是全身梅
毒ノ緩慢ニメ頑固ナル症ナリ其乏ヲ發スルニ
二様アリ

〔甲〕ハ初メ皮膚ヲ発シ後テ膿潰メ瘡瘍トナル
〔乙〕ハ最初皮上ニ醜惡ナル赤青班ヲ發シ其中點
ニ一小泡ヲ生ス破レテ瘡瘍トナリ初ニハ焚ク
カ如キ疼ミヲ起シ其後テ痛甚シカラズ然レト
モ廣ク侵蝕シテ深ク腐ルコトヤナク漸々廣大ナ
ルニ從フテ辺縁突起シ脂膜ヲ荒壞シ最ニ多ク
前項肩胛胸骨前膊手脛上ニ發シ其狀存シカ

ラス瘡底子滑ナリ後々終ニ其下ニ位スル骨ヲ
剥露シ骨膿病ニ変シ其形ヲ屢甚々大ニナリ粘
濃ニメ豚肉状ナル膿ヲ含ム
通常此瘡ノ隆突シテ硬固ナラサル辺縁上ニ痂
ヲ結シ其痂脱落スレハ其下皮新々ニ又瘡トナ
リ漸次ニ廣濶ヲナス者ナリ

療法總テ導管疔瘡ニ同シ

此瘡癢シテ久シカラス尋常ノ疔瘡状ニメ其体
惡液負ナラサレハ朝夕甘液一ムニ阿芙蓉少量
ヲ加ヘ内服シ六日ノ后之ニ代ルニ華温湯浴液

ヲ以テ兼テ私百失里尼納律謨ヲ与フ○劇痛ア
ル症ニハ莖菜微温浴菲次私菜ノ卷法ヲ行ヘ其
後次ノ莖菜ヲ用フ其方

升汞 二ム

石灰水 一セ

單方阿芙蓉丁幾劑

右混合ス

此瘡己ニ久シキヲ經膿稀クメ臭氣アリ海綿状
ノ肉ヲ生ス体頗弛緩シ惡液負トナリ己ニ水銀
ヲ多服シタル者ハ梅毒病ナル乎將タ永病ナル

予殆ント辨シ難キコトアリ
余思フニ膿中虫ヲ生スルヲ梅毒病ノ確徴トメ
可ナルヘシ然レニ數年未予カ梅毒療治中此ノ
如キ惡性ノ症ヲ見ケルカ故ニ虫ヲ目的トメ兵
別スルハ得ス此故ニ大病院ヲ司トル諸匠
ヨク茲ニ注意シテ此症ニ逢タルハ顕微鏡ヲ以
テ善ク探視シ務メラ速カニ其實驗說ヲ著述シ
世ニ公ニセンコトヲ原哉フ
予ハ此ノ如キ侵蝕瘡ニハ日ニ三四次純硝酸ニ
三十滴ヲ水一サニ和シテ内服シ外部ニハ胆蓉

一匙ヲ泉水六了ニ混和シ綿撒系ヲ浸シ貼シテ
大効ヲ得タリ○其後テ此瘡大ニ治シテ終ニ瘡
瘡ノ本形ヲナスハ甘汞ニ阿芙蓉ヲ伍シテ内
服シ并泉水ニ矢鴉荅越幾斯阿芙蓉ヲ加ヘテ外
用ス

〔巴〕梅毒性ノ有痛息肉ナリ
密泉疣一名息肉ハ形容ニ從テ諸種ノ別アリ
或ハ其帶根細小ナルアリ或ハ廣大ナルアリ多
ハ陰處及ヒ其近傍若クハ肛ニ生シ稀ニハ唇舌
巴且杏腺懸壘重眼脰肛彩子等ニ發ス

屈律傑名ハ甚タヨク務メテ密尿疣ヲ精密ニ安別セリ

疣瘡 ハ乾硬輪状ニメ多クハ同形ノ纖維ヨ

リ成リ其色微灰白ニメ其硬キコ角ノ如キヲ以

テ密尿疣ト自ラ別アリ○痔モ又密尿疣ニ似タ

リ然レモ痔ニハ必先ツ其患症アリ且ツ其球粒

青色ヲ帯テ軟カナルカ故ニ混ス易カラス

密尿疣ト甘結ル状瘡トハ痔ニ於ルヨリ安別シ

難シ龟头及ヒ包皮ニ発スルハ殊ニ然リ然レ

モ甘結ル状ハ臭敗膿ヲ分泌ス劇癢ヲ起シテ甚

夕治シ難ク之ニ先ツテ梅毒ニ傳染スルコトナキ者アリ

子宮口ニハ低甘結ルト混雜スル密尿疣ヲ発ス

ルコアリ疼痛ノ微ナルト血便セラルト一種ノ

惡臭ナキト甘結ルニハ必乏アリ綠色若クハ褐

色ノ膿ヲ流泄セラルト諸此徵候ヲ以テ之ヲ安

識スヘシ

送亦多状肉塊 腫中ノ突起スル肉ノ名盛シ送亦

タル自ラ甚タ大ナル者多シ膚区ハ乏ラ密尿疣

トナスコトアリ然レモ此人ニハ梅毒病諸症ヲ発

ヒス且ツ肉塊ヲ上面ハ疣瘻ノ如ク粗澁ナラニ
又其色近傍ノ皮色ニ同シ疣瘻ハ其色必異ナ
リ
全身ニ普達スル緩慢ナル梅毒性ノ皮疹ヲ密泉
疣ト見誤ルコアリ然レニ此皮疹ハ其初メ皮肉
唯ウシク隆起シ色ヲ変セズ小許ノ液ヲ泌別シ
久シク唯班点形ニ上リ其上面剝テ鱗屑状ヲナ
シテ落テ後ケ小痕ヲ残スル以テ以テ區別スヘシ
有痛疣瘻ノ中ニ細別アリ治療ノ為ニ益ウシト
魚尾梅毒病ヲ論スル諸書ニ哉多ノ種矣ヲ分テ

記スルノミナラズ新著述家モ亦此病ノ新形状
ヲ採用セツ○余輩之ヲ分テ三種ト為ス

〔其二〕有蒂密泉疣ナリ此疣ハ皮中ニ蒂アリテ疣
根ヲナシ長大共ニ増息スルコト莫ニ草木ノ如シ
其上面枝ヲ分ツコト雞冠ノ如シ液ヲ泌別スルコ
廣潤密泉疣ヨリウナク或ハ全ク分泌セラルコト
屢之アリ稀ニハ個々別レ生ス多クハ夥シク叢
積シテ同時ニ発ス而メ曾テ互ニ合一瘡着セズ
廣潤密泉疣ノ如ク傳染ス肉色ノ着ヲナス
〔其二〕廣潤密泉疣ナリ此症ハ根脚廣クメ其廣ク

ノ増息スルコト高長ヨリ甚タシ○其形ヲ圖ニメ
胡桃ノ大アリ或ハ尚大ナルコトアリ但シ其高サハ
二分許ニ過キス○其上面或ハ不子ニメ小凸凹
アリ粘液漏孔其上ニ布満ス或ハ平滑球圓ニメ
赤色也彙帯青白ナルコトアリ或ハ個々散生シ或
ハ互ニ鏈接ス且ツ多数同時ニ発ス
此症ハ梅毒斑疹ヨリ生ス或ハ其斑疹ノ開潤ナ
ルヨリ発スルコト屢之アリ○此症ハ有蒂瘰癧疣
ヨリ多キコト常トス懸壘至及ヒ巴且杏腺ニ生ス
レハ汚灰白色ニ見フ虹彩ニ生スル説ハ尙未決

疔セス

其三 剥尔 設例 尹密 瘰癧 ナリ 佛泉 都谷 初メテ 此
名ヲ命ス ○此症ハ 林設ノ 大サナルハ 小圓泡ヲ
ナス 好シテ 陰門ノ 大唇及ヒ 股ノ 内部ニ 生ス 唱
家ノ 女ハ 最モ 多ク メ 胃子ニ ハ 曾テ 之アルコト
此症 又他ノ 密景 疣ト 同ク 皆是 假令 造物 非肉ニ
云々ニメ 多クハ
ノ 変性 ヨリ 起リ
療治 此症 本病ニメ 梅毒ヨリ 発スル片ハ 殆ト
皆其毒ニ 全身ニ 普達スルナリ 剥尔 福島 多薩
尔 撒巴 栗刺 片萬 滿並 弥ニ 功アリ 若シ 此 剝功ナ

ケレハ別ル所ノ法ニ從テ赤降汞ヲ内服シハ
シ其方

越扶屋布斯安復没担 八月

赤降汞 二ム

白砂糖 二ヌ

右混合シテ散トナシ平等ト分テ十六包トナ
シ朝夕一包ヲ服シ一包ノ分量即チ八分ムノ
一ナリ

此症内服劑ノミヲ以テ治ス易カラス假令治ス
ルモ速カニ再発ス○此症屢新発ノ梅毒病ニ添

テ発ス且ツ原始疔瘡ト同時ニ生ス但シ局処ニ
傳染シテ局処病ナルヲハ至テ稀ナリ
此病ハ格島百ルハ創製ノ缺ヲ以テ功ナリ其後
布列乙別ル所ノ溶液ヲ塗擦シ且ツ布ニ浸シ
テ貼スルヲ宜シトス此溶液ノ方

升汞 一月

皓砒 二ヌ

再鑄燒酒

右混和シ綿撒系ニ浸シ

廣潤密景病ハ新発梅毒症ニ生スルヲ至テ多シ

此症ハ唯内葉ヲ以テ治スルニ足レリヨク朝編
ス○剥ル設例ヲ疣ハ腐葉ヲ以テ全ク除治スハ
シ○虹彩ノ密尿疣ハ次テ失明スル者ナリ吐涎
法ノミ屢之ヲ治ス

午梅毒瘡疹ナリ此病或ハ内塊トナリ水泡トナ
リ或ハ疥癬

熾衝癬及ヒ亀裂脱胎トナ
リ或ハ疔毛病トナリテ瘡ス密尿疣モ本性ノ正
症少ナキハ誤ラ此病ナリトスル者アルヘシ

○此皮疹ハ他ノ慢性皮病ト弁別シ難キヲ常ニ
多シ然レニ乙弗亜兒別ル私ハノ書中ニ廣ク之

ヲ述フ

梅毒班ハ多クハ額顔耳後頸胸陰処前膊手足趾
ニ瘡ス○其色ハ薔薇紅ナリ又屢點赤鋪色ナリ

アリ其大サハ直径一分ヨリ四分ニ至ル些シク
痒アリテ疼痛全クナシ皮上ニ高ク突出セズ漸

々ニ瘡見シ其出ルヤ定時ナク次テ痂ヲ為テ剥
脱シ下皮赤色ナリ而メ又新々ニ瘡見ス頭上鬚

間又瘡ス其部ノ毛髮根死シテ脱落シ許多ノ班
瘡湿润シテ皮瘡トナシ疔根ニ疔瘡ヲ生

スル等ノ症アリ

此病時ヲ経テ重疊錯雜シ発スル者ハ梅毒也
後初テ消散ス
梅毒疹点ハ最モ多ク斑ノ好テ発スル部上ニ発
ス斑ヨリ間之ヲ生スルコトアリ○此疹点ハ小ニ
メ皮上ニ隆起シ赤色ニメ周辺硬ク疼痛シ焚ク
カ如ク夜中殊ニ甚シク其正中ニ膿ヲ醸シテ恰
ニ疥癬ノ如ク経ニ痂ヲ結ヒ痂落テ赤痕ヲ残ス
其後復新々ニ疹点ヲ生ス○此疹点互ニ近接シ
テ環状ヲナシ額及ヒ鼻頭ニ発スルコトアリ故ニ
入之ヲ梅毒冠瘡ト名ツク

此疹ハ傳染シ斑焮熱癬鱗屑瘡ハ否ラズ總テ梅
毒ハ永ク身体中ニ保存スルニハ其傳染力愈々
微弱トナルニ爾ト別ル私
梅毒性輪癬及ヒ疥癬ハ此癩ノ病ト已別シ難シ
此癬ハ顔面ヲ避ケス且ツ其前他ノ梅毒症ヲ発
シ或ハ今尚存スルハ則チ是此癬ハ梅毒性ナ
ルヲ知ルヘシ
〔療法〕総梅毒病ノ療治ニ同シ大萬満煎或ハ別ル
居ノ方割屢大ニ効驗アリ是ニ兼テ微温石鹼浴
并ルテ浴塩酸浴ヲ行フ但シ硫黄浴硫肝浴ハ害ヲ

り此別此他日々微温ナル水及こ醋ヲ以テ
洗濯シ行法ヲ行ヘ
白汞膏ヲ擦入シテ吐涎スルニ至リ殊ニ皮中已
ニ破裂ハ瘡ヲ生セス必要ノ方ナリ素食ヲ命
スル等皆緊要ノ主方ナリ

〔末〕梅毒筋痛ナリ此病ハ殊ニ手足ニ發ス其疼ミ
浮游シ一処ニ定マルコト稀ナリ倭ノ眞私病ト甚
々相似タリ晩及こ夜中ニ疼痛増加ス但シ關節
避ケ多クハ筋腹ニテリ只多クハ經久ノ梅毒ニ
傍ヘ来リ屢又骨痛ト同時ニ發ス

〔療法〕常用ノ微温浴大毒煎阿芙蓉ヲ用取シ極冷
水巻法ヲ用ヒ阿芙蓉膏ヲ擦入スヘシ○疼痛消
散スレハ梅毒病ノ治法ヲ行フヘシ

〔中〕梅毒夜骨痛ナリ此症ハ深ク根柢シタル梅毒
症及こ汞毒惡液病ノ徵候ナリ
頻々患部ヲ洗浴シ晩ニ阿芙蓉ヲ内服シ兼テ消
血劑ヲ用ヒ其後劇痛減スレハ夫萬滿煎ヲ用ル
ヲ主方トス〔骨痛篇ヲ見〕
水銀ノ誤用ニ依テ屢此症ヲ起スヲ以テ其源梅
毒ニヨルカ將タ汞病ナル乎弁別シ難キ故ニ

阿芙蓉剥皮福鳥多薩爾撒巴東列山酸硫黃浴金
効ナキコトヲ證明スルニ非サレハ水銀ヲ用ヘス
酉梅毒眼焮衝ナリ已ニ前ニ記ス別ニ本論アリ
戌梅毒畢丸腫ナリ緩性ノ畢丸腫ハ屢急性畢丸
腫又ハ全身梅毒病ニ次キ未リ膿潰スルコト稀ニ
メ硬結トナルコト屢多シ○兩畢丸若クハ一畢丸
大ニナリ只其重クニ由ル患者直立スルハ殊
ニ牽引シテ不佳ナル感覺ヲ起シ腰腹ニヒキ症
痛ヲ發シ且感機ノ為ニ副畢及ヒ提護腺ヲ侵掠
スル者ハ慢性例誤已實設焮衝ナリ

療法 病尚新タニメ急速ナル症ハ防焮療法ニ直
シ已ニ經久緩慢ナル症ハ獨尊地丸ヲ服シ水銀
軟膏夫鳩答膏水銀膏定定答里私膏次定鳥謨膏
等ヲ典畢丸焮衝提護焮衝篇ヲ見ヨ
亥梅毒骨病ナリ骨瘤硬結骨軟疰梅毒性結腫及
ニ關節強直之ニ屬ス之ニ由テ其骨或ヒハ軟和
シ或ハ脆弱或ハ強直或ハ破摧シ易ク次テ骨膿
ヲ生ス○此症ハ皆深ク根拠セル梅毒病若クハ
水銀ヲ誤用スルヨリ起リ多クハ惡液病英國病
腺病夫苟尔倍及水銀病ヲ患ヒタル人己ニ久シ

ク夜骨痛ヲ苦ムノ後ニ生ス
療法大ニ戒慎スヘシ水銀劇造忌セラル症多シ
患者早ク已ニ水銀ヲ多服シタルハ殊ニ然リ
○山酸ヲ内服シ或ハ之ニ交代シテ剥皮福鳥多
薩尔撒巴栗列煎ヲ用ヒ或ハ同時ニ共ニ与ヘ晚
ニハ托歇尔散ヲ用ヒ失苟児倍苦ヲ患ル入消食
機衰弱スル人ニハ機那菖蒲根蒲萄酒等ヲ与ヘ
兼テ香竈微温浴ヲ行フヲ甚タ良トス○其後水
銀軟膏ヲ試用シ殊ニ失鳩答越哉斯菲私沃越哉
斯ヲ加ヘ結腫及ヒ 辺ニ擦入シ諸骨同時ニ

患ルハ他ノ諸薬皆全ク効ナクンハ碌烏弗利尔
及ヒ律私多^{名共ニ}ノ法ニ從フテ鐵錄療法及ヒ擦
汞汰ヲ用フヘシ○骨嫩衝変メ膿潰スルハ緩
和温卷法及ヒ骨膿ノ療法ヲ行フヘシ
梅毒関節強直病ハ殆ント皆不治ノ症ナリ他ノ
梅毒病本ルト雖ヒ此症残留ス硫黄浴剥皮福鳥
多失鳩答ヲ試用スヘシ
ナリ梅氣アリ母ノ毒ハ子
宮内ノ胎児ニ傳染スルコトナシ此ノ如キ婦人ノ
生ミタル児ハ他病ヲ患ヘ且ツ消能病ニカ、リ

〔第十三〕

其後鼻腺病及ヒ英國病姪中水銀ヲ誤用スルモ
亦此病ヲ誘発スルヲ患ルヲアリト雖ニ其母ノ
梅毒ニ染ミ来ラサルヲ疑ヘナシ

通常兒ノ梅毒ヲ受テ生ル者ハ産出ノ汗腔中
ノ毒ニ觸テ傳染スルナリ是初生兒ノ皮膚ハ甚
々脆軟ナルカ故ニ傳染毒ニ觸タル諸部ハ原始
梅毒病ヲ発スルナリ或ハ又生産ノ片ハ少シモ
傳染セス其後テ母ノ乳頭ヨリ傳フ者時々乏ア
リ
又健康ナル兒梅毒病ノハ梅毒性ノ痲癬ヲ患ヒ

ヒタル乳母ノ乳頭ヨリ傳染スルヲ辱之アリ其
病ヲ誤リ認メテ他病トナシ無事ノ兒或ハ速カ
ニ死ス或ハ生涯不幸ヲ蒙ル

〔證候及ヒ經過〕産出ノ際ニ傳染スルモハ多クハ
其後テ十日ヨリ十四日ノ中ニ其病ヲ発ス其初
メ屢肛門ニ帯青赤班ヲ大凹処ヲ生ス其班紫赤
ナル者最ニ多シ其班処自ラ隆起シ平扁泡トナ
リ之ニ觸テ硬キヲ覺ヘ此病ノ本姓ナル一異種
ノ着ラナシ八日ヨリ十日ノ後ニ此泡陥没シテ
瘍瘡トナリ白色脉肉状ニメ瘡瘡性ノ着ラ為ス

○此病肛門ヨリ傳ヘテ前陰ノ方ニ來ル
若シ産時兒頸久シク産門ニ滯ルハ梅毒病ノ
兆ヲ預込ニ登スルヲ多シ又稀有ナリト虫ニ産
出ノ時梅毒兒ノ眼ニ染ムハ梅毒性ノ
乳婆ノ
ヲ生ス

乳頭ニ瘍瘡アリテ産後晩ク小兒ニ傳染
スルハ先ツ口中ニ病狀ヲ現ハス鴛口瘡ト甚
々混雜シ易シ然レニ精細ニ考究スレハ此症ハ
唇及ヒ頬ノ内面ニ小泡アリ鴛口瘡ハ唯舌上ニ
シ生ス然レニ此病ニ頑固ナルハ梅毒ノ疑

ヒラ容レスニハアルヘカラス

乳兒ノ病急ニ全身病ト為テヨク之ヲ治スルコ
ヲ得サレハ速カニ羸瘦病トナリ扁骨上殊ニ頭
上ニ急ニ腫瘍ヲ生ス其兒ハ尤モ慎テ治療スル
モ又死ス其母梅毒アルヲ以テ小兒生未衰弱多
病ナルハ殊ニ然リ

乳婆ノ乳房ヨリ晩ク傳染シタル小兒ノ病古人
ノ思ヘシ如ク乳汁ヨリ傳染スルニ非スハ總テ
大人ニ於ルヨリモ惡性ナリト虫ニ其前徵用ク
甚々惡カラス是小兒ノ梅毒ハ速カニ諸部ニ廣

カリ易ク且ツ其体猛烈劑ニ感覺スル様カ自ラ
鋭敏ナレハ之

〔療法〕此病ハ速カニ進ムカ故ニ茲ニ水銀ヲ用ヒ
サルヲ得ス然レニ諸水銀劑ヲ撰用シ且ツ服量
ヲ定ムルニハ大ニ謹慎ヲ加ヘシ故ニ精密ニ諸
産ヲ究知スヘシ

〔方〕永塩ハ内服スヘカラスト虽ヒ之ニ及シテ
小児ハ甚タヨク次方ヲ服スルニ堪フ其方

甘汞

金硫黄

各一ル至ニル

麻皮涅矢虫過尔拔

半匙

アラヒヤコム

一匙

白砂糖

一匙半

右混和シテ散トナシ分テ十八包トナス朝夕
一包ヲ取り乳汁ヲ以テ送下ス

此劑ヲ服シ了レハ他ノ永製劑ヲ換ヘ用フ即チ
華涅滿滲劑

每晚唯十二分ルヨリ八分ルマテ用フ然ルニ
哺乳ノ児ハ屢胃中ノ酸敗液ヲ患フルカ故ニ麻
皮涅矢虫過尔拔ヲ加フ

第二 児甚々弱クメ永劑ヲ内服スレハ慢性哥ル
賢ヲ起ス片ハ唯乳母ニ甘永ヲ与へ或ハ葦涅滿
製劑ヲ用ヒ兒ニハ某ヲ与へス是水銀乳母ノ液
ニ混シテ乳汁ヨリ小兒ニ功ヲ養スレハナリ
第三 右法ヲ行ヘ凡梅毒病治セシハ只母若ク
ハ乳母ニ共ル藥ニ托スルノミナラス間々日々
灰白水銀軟膏ヲ兒ノ皮上ニ擦入シ香竈浴ヲ行
フテ奏効ヲ待ツヘシ
第四 梅毒病兒母ナク乳婆之ニ乳セハ其乳頭ヲ
真ケニ兒ノ口中ニ觸シメス彈力強ク華尔斯ヲ

以テ製シタル乳頭帽ヲ被フテ之ニ哺セシメ其
乳婆ニ最初ヨリ甘永半匁ヨリ一匁ヲテ朝夕
ニ服用セシム

第五 児疲瘦シテ乳婆甚々強硬ナレハ數日水銀
劑ヲ用ルヲ止メ乳婆ニ私百先里尼納律護煎ニ
菖蒲根ヲ加ヘ良肉羹汁ニ麦酒汁ヲ与へ兒ニハ
柿ニ續羹汁ニ卵黃ヲ加ヘ攪知シ用フ

假梅毒病

梅毒病ニ多少類似セル諸般ノ緩慢ナル病状ニ
此ノ名ヲ命ス然レモヨク梅毒病ト區別スヘキ
ナリ此病ニ属スル者ヲ掲示スル

第一 印度病ナリ 依亜烏私及ヒ必安私ノ別アリ
亜弗里加州ノ中黒人國及ヒ西印度諸島ニ多シ
○此ニ病共ニ慢性ノ傳染スヘキ疹ニメ諸人ニ
傳染流布ス年齡男女掲ラズ殊ニ小児ニ侵レ一
回患フレハ再感セズ此地ニ生ラ営ム白哲人ハ
之ヲ患ルコト甚々稀ナリ

依重鳥私ハ大ニ瘡ニ似テ終ニ膿ヲ釀ス然レニ
物ニ状ノ起脹ヲナサス入術ノ助ケテ候々スメ
治ス

必妥ハ之ニ反メ大ニ頑固ニメ恰モ惡性ノ輪癬
ニ同ス其流布スル方境至テ快シ即テ^{キユイ}局乙涅ノ
亜海灣之ナリ

此故ニ此ニ病ヲ各別ニ説示ス

其二依重鳥私ハ多クハ癩病前六八週間其前徴
アリテ四支懈怠シ眩寐不安消食機ノ諸病即テ
食氣缺損異嗜便秘等ナリ四支頭背中ニ僅ク皮

私痛アリ心志沉鬱シ錯乱シ悲憂脈遲緩ナリ之
ニ次テ癩疹起脹ス其起脹ノ時期ハ数月連続ス
ルヲ遲^ス之アリ

最初項喉頭ノ近辺股脛ニ赤斑ヲ癩ス漸々水ヲ
為シ水泡トナリ周囲ニ糖状ノ者ヲ癩シ其後諸
処ニ此斑ヲ發シテ終ニ泡トナル次テ頭腫脹シ
眼赤ク皮屑痒ヲ癩ス○此泡起脹シ硬ク青色ニ
ナリ其項上ニ白點ヲ生シ破レテ膿潰ス
膿潰ノ時限多クハ数月留連シ癩ニ似タル小瘍
箇々分散シ生シテ合集スルヲ稀ナリ疼痛甚々

劇シカラス口内頭髮間ニモ又瘡シ瘡辺ノ毛髮
白色トナル

其膿濃厚ニメ淺黄ナルハ輕症ナリ稀薄ニメ臭
氣アルハ諸部ヲ荒蕪シ血管ヲ穿蝕シテ出血シ
ル等ノ症アリ終ニ乾固ノ時限ニ至レハ輕症ハ
厚痂ヲ結テ硬クナリ落テ健全ナル皮膚トナリ
○惡性ナル症ニメ膿稀ク臭氣アルハ其瘡乾カ
ス只益廣大ニナリ縁起脹ス贅肉ヲ生ス靜脈
瘤状ニ張出シ関節ヲ荒乱シ強直ノ症ヲ起シ溶
崩下利慢性哥ル贅水腫ヲ發シテ死ス

依亜島私ハ方土ヲ定メテ他邦ニ及ハス陰處ヲ
侵サス假令之ヲ侵スモ甚々稀ナルト再感セス
人術ヲ假ラスメ治シ水銀ヲ用フレハ惡症ヲ起
ストヲ以テ十分ニ梅毒病ト已別シハシ

此病ハ患者ト健全ナル人ト直チニ相觸接ス或
ハ交媾シ大蝨瘡上ニ赤リ其毒ヲ負テ健全ナル
人ニ傳ルニ由テ終ス我邦ニ於テハ
ニ在テ此丁アルヲ見ル

時期ヲ過ル丁愈速疾ニメ前徵ノ時限愈短ク潰
膿落痂愈好ケレハ病考益輕良ナリトス

屢之ヲ救フコアリ

其二必妥私ノ前徴ハ皮声強痒怠惰疲羸尪憂急
瘦ナリ依亜鳥私ノ如ク四肢及ヒ諸骨ニ倭_レ質
斯痛ヲ發セス次テ迂延神互起ノ徴候ト經過ト
相同レキ哥尔質ヲ發ス

此病最ニ多ク交媾ニ依テ發スルカ故ニ哥尔質
ヲ發スル時限ニ方テ同時ニ処陰ニ糖状ノ輪癬
ヲ生ス痒ク強シ侵蝕ス次テ鼠蹊辺腋下及ヒ身
体中兼テ瘡瘍ヲ患ヒタル部ニ普ク傳布ス
此輪癬ノ中ニ縮鍼頭大ノ赤瘍ヲ發ス次テ白色

トナリ破壊ス然レモ膿ニアラヌメ酷厉ナル黄
色ノ洩シヲ泄ス終ニ一掌大ヲ黄色ニ見フル瘡
トナリ青色ナル海綿状ノ臍肉ヲ生ス其形ヲ佛
刺謨模仙_{ノ景葵ニ似タリ}羅甸名ノ佛刺謨蒲失_ハ亞
沙烏怒傑夫ハ之ヨリ出ツ

此病ニ又依亜鳥夫ノ如ク發疹ヲ病毒分肉トシ
見ルヘシ若シ是ヲ柳壓スレハ危劇ナル轉從病
ヲ起ス是之疹發起スル中ニ諸前徴症消除スヘ
キニ今之ヲ柳壓ムル中ハ劇烈ナル骨痛骨燉衝
骨軟和症ヲ起セハナリ

此疹及ヒ瘡小ナルハ海綿状ノ息内赤色ナリ
若シ其形テ大ナレハ其迹傍白赤色ニ変ス故ニ
赤必安白必安ノ名ナリ○許多ノ瘡集合シテ一
トナリ緩慢瘡トナルハ乳房必安首長必安ト
名ク

此病ノ經過中ニ足底ニ赤乏ヲ患ヒ次テ破壊シ
其中ニ腐蝕ノ膿アリ手足ノ指ニ輪癬状ノ疹ヲ
發シ患部劇痛強硬ス加之加卯涅^人ニ於テハ
ト名リル処ノ甘結ル状瘡ニ次キ来ル○若
シ有カノ人術ヲ以テ割スルヲ得スハ漸々進

ニ次テ消耗病水腫麻痺ヲ起シテ死ス○加卯涅
地ニ於テハ時ニ又赤病ニ変スルヲアリ〔赤癩ノ
見ヨ○必安私ハ傳染シテ患ル丁依西鳥私ニ同
シ

療法侵蝕ニ貴ニ同シ○水銀劑ハ害アリ故ニ私
百夫私里尼納律謨剥尼福鳥多薩尔撒巴栗^ラ西安
須母扭ヲ用フヘシ微温浴箇草^ル滋養ノ食物
ヲ用ヘテ此療ヲ輔ク

〔第二〕傳染梅毒疾ナル此病ハ印度病ニ等第タリ
者ニメ恐クハ梅毒ト癩病ト相混スル者ナラン

是此病ハ東方ヨリ非鳥默^ニ地ノ方ニ送り来ルコ
疑ヒナキヲ以テナリ又矢結尔利忽病ト名ク其
篇ヲ見ヨ

〔第三〕忽尔私的連剥謨默連突多未尔施^{地共ニ中ノ}
未尔私病ナリ此病モ又傳染シテ起ル此病ヲ論
スルニ古史ニ頼ラスメ美飾ヲ加ヘタル諸憶説
アレバ千四百九十四年ニ梅毒病能起メ後同様
ニ傳染スルヲ以テ古等ノ梅毒病ヲ詳カニ穿鑿
シ五ニ比較スルト虫に恐クハ俊智ナル人モ此
病性ヲ安明スル能ハサルヘシ〔矢尔結利忽篇ヲ

比較セヨ

〔第五〕私骨多國ノ失^{シツ}私一名失鳥沕予私ナリ此
病ハ里弗的尔私ノ説ニ從ヘハ其初メ咽喉及ヒ
口中ニ瘡ヲ生ス急ニ侵蝕シテ周辺ニ蔓延シ上
顎巴且杏腺懸壅垂ヲ荒蕪シ且ツ骨ヲ侵シ顔面
ニ出テ眼脰ヲ衰フニ至ル此^ハ方テ或ハ少ク
晚ク殊ニ顔中ニ銅色ノ斑ヲ發シ速カニ大痲ヲ
結ヒ漸々海綿状ノ白色ナル息肉ヲ生ス○劇痛
アル間ニ患部ヨリ臭氣強キ稀膿ヲ出汁シ終ニ
瘡瘍ニ変ス

此病ハ私骨多回及ヒ加那多^{名地}ニノミ之アリ里
弗的尔 之ヲ此病ニ定リタル梅毒病トナセリ
○交媾ニ由テ傳染スル丁締ナリ然レモ母及ヒ
乳母ノ乳頭ヨリ之ヲ傳フ此病ハ遺毒病ナルヘ
シ
療法水銀之ヲ治スル丁締ナリ山酸水葵並及ヒ
他ノ清血煎却テ多ク効ヲ奏ス

〔第五〕

此病モ亦傳染シテ終ス皮膚ノ刺衝癢敏銳ナル
兒女ニ殊ニ多シ胃子ハ唯柔弱ナル皮上若クハ

創傷セル部傳染毒ニ觸レハ之ヲ終スルノミ○
重キ冒寒粗食北地ノ海灣ニ停滞スル等ヨク此
病ニ傳染セシム
或久ハ此病ヲ癩病ノ癩トス突多^名ノ説ニ從ヘ
ハ其病状梅毒病ニ癩スル者アリト云ヒ且ラク
之ニ命スルニ
ノ名ヲ以テス
症候此病ヲ終スルニハ少許ノ聖原候様倭戸後
私患アルノ外別ニ前徴ナシ其病状常ニ同シカ
ラス○手足ニ鉛色若クハ暗赤色ノ斑或ハ結節
ヲ生ス進蝕瘡ニ變ス其綠腫起マル者多シ

○此瘡水様ノ粘液ヲ分泌シ周辺ニ鱗屑状ノ疹
ヲ発シ脈絡膨脹シテ静脈痛状トナリ其後骨ヲ
荒無シ復ニ至ラ自ラ治シ冬ニ至テ再ニ破壊ス
声嘔シ咽喉焮衝シ頰及ヒ唇ヲ侵ス片ハ顔面醜
状ヲ為シ鼻骨前脛骨膊骨ヲ衰フテ骨痛及ヒ骨
膿ヲ起スニ至タル○陰処及ヒ毛髮アル部ハ此
病ヲ免ル○己ニ数月ヲ経且ツ治療ヲ怠レハ消
耗病水腫死凶必ス之ニ次ク病初ニ速治スルコ
ト又難シ
療法内服ニハ甘汞華温滿溶液ヲ少量ニ取り互

ニ交代シ与フ但シ連用セズメ吐涎ヲ催スニ至
ル兼テ私百矢里局納律讀剥屈福鳥多薩尔撒巴
栗烈ノ煎汁ヲ温服シテ蒸氣ヲ登ス微温浴ヲ行
ヒ碯砂ノ溶液玫瑰密没某阿仙某丁莖劑ヲ以テ
瘡処ニ敷キ骨瘤上ニハ水銀膏ヲ貼シ此他素食
ヲ用ヒ大ニ淨潔ニシ塩物酸物薑灸物及ヒ銳烈
ナル飲料ヲ禁ス
第六加那達病又斯多巴鳥律私拔乙病ト名ク私
骨多國ニテ天辨私ト名ツクル病ニ同英國ノ人
原之ヲ此國ニ傳送ス故ニ此邦ノ人ハ之ヲ英國

病ト名ク「弗刺謨蒲矢」無私骨質如ノ條ヲ見ヨ
第七「變形梅毒病」ナリ多年前獨ニ都國ノ英傑ナ
ル大匠令乙「蘇智屈」東都人自述ノ書中ニ明カニ
此病ヲ載ス之ヲ読テ古今ノ記者説ク此ノ變形
梅毒病ヲ如何ニカ理會シテ可ナラン乎ヲ知シ
ルハシ

總テ變形病ヲ識得スルハ「理術」ニヨルニアラス
莫ニ各病共ニ唯其諸各症ヲ集メテ其何病タル
ヲ知ル者ナルカ故ニ其症虧缺スレハヨク之ヲ
考ヘ知ル能ハス然レニ其症現ニ存シテ「吾」

其病ヲ知り得レハ則テ其病ハ己ニ變形病ニア
ラサルナリ

非謨利ハハ次ニ掲示スル梅毒病状ニ變形梅毒
病ノ名ヲ命セリ

其二「交媾」ニ依テ傳染セス只非常ノ路ヨリスル
者乃テ吸口烟管古誇匙箸或ハ口中ニ瘡瘡ヲ生
シタル切載者「王典宗」ノ小兒ノ陰莖ヲ截テ口ニ
テ血ヲ吸出ス人ナリ若クハ外科産科術ヲ行フ
中其手梅毒ニ染ム者之ナリ
其三「交媾」ニ由テ傳染ス極メテ輕少ノ原始病ヲ

起ス共ニ識認シ得ス方今導兇梅毒病ヲ終スル
モノ

其三原始梅毒病ヲ患ヒテ全治セズ数年ヲ経テ
後新タニ傳染スルコトナクメ全身梅毒病ヲ終ス
ル者先ニ梅毒ノ里障眼又之ニ属ス

然レ此諸症ハ一ニ變改梅毒病ト名クハキ者
ニアラス異族梅毒病ト称スヘシ

華設欲曰ク古代ノ匹奈ハ變改梅毒病ト名ク以テ
水銀ヲテ治セラル諸症ニ命シ他人ハ梅毒多キ
間休中ニ潜伏シ久クメ後其本姓ノ勢ヲ終動シ

ル者ニ命セント欲シ又他人ハ諸症梅毒病ニ類
似シル諸病即チ依屈多悪性皮膚疹等若クハ此病
ニ梅毒病ト合併スル者ニ命ス然レ此(其二)ノ説
ハ無拠ノ謬誤ヲ守リ(其二)ノ説ハ全ク習熟スル
実験ニ反シテ論ヲ建テ(其三)ノ説ハ原梅毒病ニ
アラサレハ其症少ク之ニ類似スト虽ニ決シ
テ梅毒病ト名クルヲ得ス且ツ梅毒病ト他病ト
合併スレハ已ニ單一ナル梅毒病ニアラサルカ
故ニ採用ヘカラス此名ニ相当ルノ意味ヲ得セ
シメント欲セハ原始局処病(疔瘡)ヲ只局処ノ方

茶ヲ以テ療シ病尚未タ去ラズ一四隨処視ノ健
康ナル時アリ其後導經梅毒病彼此ノ形容ヲナ
シテ終見シ来ル所ノ症ニ命スヘシ然レハ則テ
近世梅毒病ノ間歇ト名ケント欲スル者ト同義
ヲ徴スヘシ

然レテ予ハ此説ニモ又昔テ定從スルコト能ハス
何トナレハ原始梅毒病ニ次テ導發梅毒病ヲ起
シ来ラサレハ則テ之ヲ変形病ト名クルハ明カ
ニ区ノ推量ナリ之ニ次メ導發病次キ来レハ則
テ其病ハ直正梅毒病ニメ変形病ト云フヘカラ

ス矣ニ此名ハアレニ益ナシ唯主(区)客(病)ノ齟齬
シテ正名ヲ得サルヨリ起リタルナリ

蕨麻ル私名ハ他病ト合併シタル梅毒病ノ水銀
ヲ与フレハ良効アリ鉄劑ヲ用フレハ害アルヨ
リシテ知ルヘキ症ニ此名ヲ命スレニ其定拠ス
ル処ノ基礎固シキヲ大ヘリ故ニ変形梅毒病ノ
名ヲ取用セラルラ宜シトス

〔第八〕水銀病ナリ区家誤ツテ此病ヲ梅毒病トナ
シ頑固ニ水銀ヲ連用スルニ由テ此疾ノ患者ヲ
屢多ク黄泉ニ陥ルコトアルカ故ニ茲ニ此病ヲ

揭示ス水銀ヲ多量ニ用ヒ或ハ擦膏ヲ行フ後テ
速カニ終スル処ノ水銀毒病ノ徴候ハ汞熱ヲ終
シ兼テ口中ニ汞味ヲ覺ヘ耳腺腫脹シ煩悶シ戰
慄頭痛シ脈疾數且ツ其後次テ吐涎スル等ノ症
アルコト已ニ上ニ記載セリ
習熟セル諸医ハ水銀ヲ用フルニ十分ニ吐涎シ
ルニ至ラヌメ傍止スル所以ハ危殆ノ症ヲ終シ
尚且ツ口舌腫脹シテ塞窒スルコトアレハナリ此
他尚恐怖スヘキ汞病アリ即ケ消耗熱 大衰弱
瘦瘠顔色灰白奇形脱肉咽中及ヒ皮上ノ惡性瘍

骨起脹腐蝕全身水腫溶崩下利死斃是ナリ
梅毒病ノ極惡性水銀病トハ屢々別レ難キコトア
リ若シ吐涎先ツ終スルハ則ケ之ヲ知リ易シ
是水銀病之ニ次テ終ス易ケレハナリ
次ノ徴候ヲ以テヨク水銀病ヲ弁スヘシ即ケ陰
処及ヒ口中ノ疳瘡已ニ一回治セントスル者復
變シ其形圓ニメ脈肉状及ヒヘキ者自性ノ着ラ
ズヒ周辺不平ニメ青色ヲ帶ヒ腫タル頰ニ向ヒ
テ齒ノ壓松スル処ニ新瘡ヲ生ス或ハ前未患者
瘡形變ス便毒變惡シ良性ノ膿変シテ惡性トナ

リ已ニ治シタル疥瘡新タニ傳染セスシテ自ラ
破開シ全身皮上ニ疹ヲ発シ速カニ痂ヲ結ヒ
ニ癩似シ殊ニ微腫セル顔面及ヒ頭髮
中ニ生ス

此症ハ十分発動スル梅毒病ニ比スルニ総体ノ
疾患甚ク重シ乃ケ寒氣及ヒ元氣ノ變ニ大ニ感
シ齒根夫苟ル倍苦状ヲナシ振戦シカ脱シ惡心
シ食氣缺乏シ頭鈍痛シ夜骨痛劇烈ナリ又諸処
ノ骨殊ニ前徹骨及ヒ胫骨ニ結節ヲ生ス之ヲ瘰
スルニ毳布状ニメ数月ヲ経テ右破開スレハ已

ニ其下ニ骨膿及ヒ腐骨ヲナスヲ屢乏アリ又間
此瘡ヨリ速カニ脈内状ノ者ヲ現ヤシ急ニ膿ト
共ニ流出スルコトアリ
此瘡瘡ルハ扁平ニ其口ヲ収メテ赤痕ニ残ス
ニ速カニ又再タヒ破綻ス
骨軟和スレハ大ニ上顎骨ヲ荒壞ス齒窠ノ用縁
全ク消滅ス諸齒悉ク落ツ
足脚尸痺耳聾吃言喘息皮上夫苟見倍苦状班ハ
屢此病ヲ導発スルモノタリ
習熟スル実験ニ從テ見ルニ此恐怖スヘキ水銀

病ハ擦膏方若クハ水銀ヲ内服シテ瘡スル真ノ
吐涎病ニ次テ起ルト虽ニ然レモ又之ニ拘ラス
不慮ニ先ツ吐涎スルヲナシニ梅毒ヲ患ル人ニ
之ヲ終ス是区家毒リニ唯梅毒ハ水銀ヲ用フル
ハ治レヘシト思ヘ原始症瘡全治シテ后已ニ十
日若クハ尚其餘ヲ経ルハ尚此毒某ヲ持重シ
テ連進スルニ至スルナリ

口内水銀毒瘡ヲ生ス嚥下困難ヲ昔ニ陰処ノ瘡
瘡惡厲ナルトキハ未熟ノ区家之ヲ導テ梅毒病
トナルトナリト思ヘ変成梅毒病ナリト誤認ス

スル者多シ

此ノ如キ区家ハ患者ノ口中ニ求味アリ氣臭惡
臭アリ齒齦失苟兒倍苦状アリ瘡瘡歷然トメ惡
性ニ變ス豚肉状ヲ着^{之アル}本^{性トス}瘡ヲ失ハ且ツ
周縁全ク圓放ヲ失ヘタルニ注意セス尚水銀ヲ
連用シ又甚シキニ至テハ他ノ水銀劑ヲ用フ
テ交換シ用ヒ疾病日ヲ進テ惡厲ニ進ム此之区
ハ梅毒ヲ根治スルニ必ス一定量ノ水銀ヲ要ス
ル者アリト誤リ認テ感受機補復機ノ度ノ異ナ
ル從フテ甲人ニハ四人ノ水銀ヲ用ヘテ乙人ノ

二十四日服シタルヨリ其功強大ナルヲ辱之
アルヲ考究セサレハナリ○之ヲ以テ不幸ナル
患者ハ此毒瘡治ノ為ニ困メラレ或ハ生涯病身
トナル噴セサルヘケンヤ

瘡治

〔馬〕最初ニ身体内外ニアル水銀劑ヲ尽ク除キ去
ルヘシ其治患者ヲ石鹼微温浴湯ニ入レ体外ニ
残リタル水銀軟膏ヲ洗ハ落シ清潔ナル夜ヲ服
シ若シ水銀ヲ内服スル者ハ蓖麻油下劑ヲ与ヘ
腸中ヲ清潔ニス

〔牛〕患者冒寒ヲ避ケ微温湯ニ

三ツヲ溶シテ日々之ニ溶シ列氏驗温器十四五
度ノ暖室ニ在テ蓆中ニ卧シ輕ク滋養スル墳内
蒸汁ニ卵黄ヲ加ヘ用フ
羊此病尚時日ヲ経サルハ次方ヲ飲服ス其方

無刺此無護謨

護謨達刺促葛

各適宜

右分テ九十九ト為ス十九ヨリ十五丸ヲ服ス
ル丁日ニ三次毎服後次テ醋一食ヒテ飲服ス

且ツ兼テ同時ニ次方ヲ服ス

淨阿芙蓉 羊人

龍腦 ニ人

甘草膏

右混合シ合ツテ八箇ト為ス朝夕其一ヲ用フ

鷄 己ニ右劑ヲ用フ或ハ其病己ニ久シキヲ終ル
中ハ連々硫黄浴ヲ行ヘ且ツ兼テ菖蒲根浸ニキ
テ及ニ阿芙蓉液ヲ加ヘテ内服シ兼テ有カノ内
羹汁炙肉少許ノ蒲萄酒ヲ典フ

犬 水銀瘡ニ外敷シ或ハ合嗽スルニハ胆蓉一二
匙ヲ水一セニ溶シタル液大ニ効アリ緑青溶液

及ニ刺必私卵歇尔那里斯溶液モ又良効アリ

豕 經久ノ水銀病己ニ骨ヲ衰フ中ハ稀消酸二十

滴或ハ二十五滴ヲ燕麦水一骨布中ニ開知シ十
日ニ三次ツ、飲服ス且ツ莖那煎ニ胡桃越莖斯

ヲ加ヘ私百失里屈納律謨ニ菖蒲根ヲ加ヘ或ハ
血驗越乙尔仙年五尔弗 共ニ地名ノ天然硫黄泉ヲ服

スヘシ
第九 全身梅毒病ノ極后症ニメ碌烏弗利尔及ヒ

律私多入名ノ猛烈ナル鍼灸法及ニ擦汞法ヲ行
ヘトモ尚全治セサルカ病アルカ故ニ其餘残ノ
毒ヨリ右晚ク諸症ヲ祭スルコトアリ此時ガテハ
最初山酸ヲ試用シ而シテ奏効ナケレハ暫ラク
列默例^レノ法ニ從フテ録降汞ヲ内服シ其方ハ
水銀加ル幾ト銅トノ和劑ニムヨリ四ムラ丸ト
為シ日ニ二三次与ルナリ〔非謨利^レノ方ナリ〕且
ツ兼テ薩^ル撒^バ粟刺^煎及ヒ〔ホツクホウト煎ヲ
用フ

〔第十〕依剥昆垚里^臣梅毒病アリサキニ^ニ痲病及ヒ

疔瘡ヲ患ヒ其病治メ後尚梅毒ノ根治セサルヲ
疑イ憂^レ苦^シテ其毒尚体中ニ陰伏シ早晚必殆危
ノ症ヲ祭^シルナルヘシト想ヘ大ニ^ニ心神ヲ勞
ムル者ニ此名ヲ命ス
此病入ハ屢時ヲ定メテ恐怖不静血液膨脹心悸
等ヲ患ヒ○予此症ニハ清涼下劑ヲ與フ其後續
ヒテ收斂^臣的^ルヲ用テ常ニ良功ヲ奏セリ
此ノ如キ病人ハ其病状ノ真^レ相^ヲ明白ニ告ケ諭
フ片ハ却テ其区ヲ下ユナリトス他区ニ托シ或
ハ水銀ヲ服シテ大害ヲナスコトアリ故ニ暫ラク

22
5643

謨斯篤梅毒篇 大尾

患者ノ意ニ随フテ梅毒病ナリト云ヒ煎某ヲ用
ルノ后ナ時ヲ経テ已ニ梅毒ノ根治スルヲ明
白ニ論スヘシ

