


獨爾斯尼歌謨索謨著
眼科書

聖謨私見打謨鏤
國譯未定稿










唱蘭斯互歇謨
索謨先生著






垂謨私覓打謨鏤
國譯未定稿

眼球圖畧









眼焮衝統論 ヲツケタルミア

一身諸藏衆器ノ中唯目最焮衝ニ罹リ易シ然ル所以ハ眼ノ質固ヨリ
嬌柔ニメ且外部ニ位スル故ニ外來ノ惡毒偶然侵襲スル寸ハ直ニ之ニ觸レテ焮衝
ヲ発スル一固ヨリナリ。其焮衝ヲ発スル所以ノ因及ビ之ヲ治スル方法太抵他部
ノ焮衝ト相背ス而シテ其徵候モ亦諸他一切焮衝ノ徵候ヲ以テ之ヲ辨別スヘシ
就中尤考据トナスヘキ者ハ疼痛焮赤ナリ或ハ間ニ腫脹ニ由テ鑒定スヘキ者
アリ。○雖然焮赤ト疼痛トヲ抱テ焮衝第一ノ徵候ト為シ難シ何トシテハ焮衝劇
盛ニテ焮赤却テ僅々タル者アリ或ハ全ク色ヲ変セサル者アリ。又其疼痛モ劇盛
ノ焮衝却テ之ヲキ者アリ故ニ之ヲ抱テ確候トナスカラス是以医ノ病ニ臨ム輕症ト
雖モ輕忽スヘカラス必其諸證ヲ參考シテ其證如何ナルヲ決定スヘシ
眼焮衝ニ數種アリ故ニ診施ノ間其所在ノ異ヲ察シ劇易ノ度ヲ計リ焮衝時限
ヲ較ヘ其外ニ在ル旁証ヲ診候シ且其諸般ノ原因ニ最モ注意スヘシ
焮衝ノ劇易ノ度ト其所在ノ深淺トヲ以テ之ヲ分別スルニハ則尋常單眼焮
衝ニ其位スル所結膜ニアリ太抵太々痛マス二日ノ後自ラ消散ス。○二則結膜
ノ全部悉ク焮衝スル者其発スルヤ眼ノ外部痒々燒カ如ク牽張シ且推壓ス

カ如シ既ニ白処變メ鮮紅其色眼角ヨリ始リテ遂ニ玲瓏角膜ノ際ニ及フ此症必ス
淚多シ。○三則結膜焮衝シテ腫脹甚シク遂ニ全面ヨリ起ツテ角膜ヲ被覆シ外ヨ
リ之ヲ望メハ拾モ獨リ一縫隙ノ如キヲ留メ眼胞ヲ合スト雖モ兩眼ノ間尚クク
被ヒ尽スル十ク尺已ニ此劇度ニ至ル者ハ疼痛極テ甚シク切甚ナル所以ハ血結膜中
溢入スルニ過ス。○四則焮衝ノ眼内部ニ位スル者此症赤色腫脹甚シカラスシテ
疼痛眼ト諸運ニ乗戻ト乃チ却テ著大ナリ。○全眼空獨リ痛アルノミナラス蔓
延シテ眉際ニ及ヒ疼痛忍フヘカラス病人自ラ以テ爲ク眼球アルニ延列衣セシ
トスト。○或ハ眼目全球尽ク腫脹シ涙滴ノ淚ヲ漏サル者アリ此症腫孔透
明ニテ舊ニ仍テ開クトイヘ尺ヨリ目蓋ヲ閉セテテ希ナリ這般ノ焮衝ハ大部熱狀
ヲ兼テナル者ナリ又治スヘカラス目蓋ヲ閉セテテ希ナリ這般ノ焮衝ハ大部熱狀
眼焮衝ノ間眼胞モ亦多ク其禍ヲ被ル。○或ハ其内面ノミ獨リ連累セラル者
アリ或ハ其眶際ニ及フ者アリ或ハ全胞悉ク禍ニ罹ル者アリ其外候ヲ以テ之カ
焮衝ヲ多テハ則チ
一乾眼焮衝眼目焮衝シテ淚出テス乾燥スル者ヲ云フ是症ハ眼中燥極リ結膜
鱗屑ノ如キ者ヲ生シ微シク眼ト眼臉トヲ動スト雖モ痛甚シ是種焮衝之
ヲ多淚ノ濕眼焮衝ニ比シハ最劇ナリ而テ動スルハ貫膿ニ至ル

二濕眼熈衝眼目熈衝間淚出テマラス眶際常ニ濕濡スル者ヲ云
三膿眼熈衝熈衝際稠ニ膿如キ者ヲ出ス之ヲ名ク
其時限ノ長短ヲ以テ之ヲ區別スル則チ斬首者久者ノ二候アリ
眼熈衝ノ間最切要ナル者ハ病因ヲ區別スルヨリ急ナル者アラス
原由尋常眼熈衝剝着或ハ眼中脈管虛衰等如キ馬処ノ病因ヨリ
発出ス○其剝着ノ物ハ通知スル處ニ通常病ヲ惹出シ来ル物件癩癧癩等
ノ如キ皆此ニ屬ス○又内因ヨリ熈衝発スル者アリ例スルニ微毒癩癧毒痛風等

熈衝續症太都化膿シ及ヒ頑痼不治眼各逆碎ハ皆眼熈衝續発スル所ト
ス即チ珍瓊角膜曇晶體及自晶囊ノ星翳腫孔窄小葡萄膜角膜炎瘡瘍
黑障等ナリ統テ是ニ至テ明瞭徹底復タ疑フヘキ者ナシ誰カ眼熈衝筆紙ノ
能ク開輸スル所ヲラスト謂フヤ決此理ナキコト可知ナリ○間又眼自動モスレハ
熈衝シ差テ後畫ノ再発スル者アリ此其熈衝ノ間醫師適當ノ劑ヲ處シテ之
ヲ強壯ナラシメハルノ致ス所トス
大凡各種ノ眼熈衝ハ皆下敷ノ治法活套ニ就テ考索スルヲ要ス○凡ソ眼
ノ剝着ヲ増劇スルノ諸件ハ仔細ニ意ヲ用テ一切之ヲ遠クシ是故ニ眼目ヲ

メ大氣ニ中ラシメハルハ其最モ當ニ務ムキ所ナリ之ヲ為サント欲スル者ハ拾護
布列斯ヲ前額ヨリ眼上ニ垂レテ大氣ノ直ニ觸ルヲ防ク○病者居往ス
ルノ房室ハ須ク昏暗ナルヲ要ス○假使ハ病者ノ隻眼熈衝スルトモ被覆ス
ルハ必ス両眼ヲ於テス○毎日細慎シテ病者ノ内皆ヲ啓キ泣淚ノ眼内ニ
積聚スルヲ防キ又穢物ノ中ニ貯積スルヲ拭ヒ去ルシ之ヲ行フニ海綿ヲ温
水或連中浸シテ之ヲ用ルル最良法トス
外用眼目ノ熈衝ノ性狀ト其差等ヲ相テ宜ニ隨テ之ヲ處スヘシ其劑則軟
化定痛ノ茱香茱ノ泡方衝動開解麻酔ノ某點眼撒尔弗茱カヲ填充スル袋
子等ノ輩皆撰ミ用ユヘシ
外用諸劑ノ中點眼水ヲ最良法トス○其撒尔弗ハ眼中ニ穩帖托住セス散茱
ハ酷ク眼中ニ剝着ス○點眼水ヲ行フノ法病人ヲ仰臥セシメ二滴ヲ眼中ニ滴
入スルニ宜シ○間或ハ點眼水ヲ耐忍フコト能ハサル者アリ如此ノ症ハ已ニ必ス速ニ真
茱ノ害アルヲ見ル○點眼水ヲ拾護布列斯ニ浸シ眼上ニ搭掛スヘキノ症アリ
○點眼撒尔弗ハ獨リ眼久熈衝ニシテ之ヲ用ユヘシ
眼熈衝極テ劇シキ者ハ下敷ノ統別ニシテ之ヲ無施スヘシ即チ少量ノ刺絡局処瀉血結
膜ノ印結尔實健消熈之食養地卷荅利斯通尔布列亞加羅茂兒ヲ加或尙

芙蓉劑中ニ安質没担謨諸劑製劑ヲ合スル者ハ泡膏比皆用エヘシ若病人虚衰
スル者ハ強壯劑ニ宜シ

一單眼焮衝 ヲツフタルミアシムアレキス

證候此病之ヲトテ單ト云所以者、焮衝様ヲ除ク外別他證ヲ合併スル
アラハルカ故ナリ。○此症既言單純ト他ノ治法ヲ要スヘキ別因ヲ交雜スルイ
カ改メタホタ純正消焮ノ治法ノミヲ施シテ足リトス。○此病ヲ識別スル者焮
衝候法ヲ以テスヘシ。○此病熱ヲ帶ル者アリ熱ヲ帶サル者アリ或ハ濕滯ノ
者アリ或ハ乾燥者アリ或ハ結膜ノ白處獨リ禍ヲ被ル者アリ其勢暴烈
他部ニ及フ者アリ
原由一身諸部ノ焮衝ヲ免スル者由ハ亦皆此病ノ原由ニ屬ス。○然レモ此焮
衝ハ大都外來諸患ノ免スル所タル者多シ或ハ又外科手法ヲ行フ后ニ免スル者ア
リ
治法此症凡テ消焮治法ヲ行フヘシ。○其勢暴劇脈實數ニ強ル者ハ必ス數次
刺絡シテ其暴勢ヲ退クヘシ是ヲ要最法トス。○如是ニ焮衝去ラハル者ハ局
處瀉血甚タ益アリ但シ是ヲ行者ハ頓ニ多ク其血ヲ洩スヘシ然レハ一旦其積血

微シク去ルト魚尾又随テ新ニ其脈管積聚シテ未タ瀉血セサル寸ニ比スレ其量
更増加スルカ故ナリ。○此症多クハ結膜ヲ切截スルニ宜シ。○此症ハ結膜障翳ニテ積
ノ如ク眼胞間ニテアリ如此者ハ大小兩管ノ處ニテ其積ノ一部ヲ切截スヘシ
内服諸劑中其効アル者ハ硝石ニ如クナシ故ニ刺絡ヲ要スル諸症仍存スル間ハ
必ス硝石ヲ進用スルヲ要ス
這個ノ眼焮衝ハ太緊ニ在再トメ赤色モ亦久ク去ラス脈弱テ病人脱カスルヲ常ト
○此状アル者ハ汞劑向芙蓉劑安質没担劑及ヒ羌膏膏大抵的切トス。○幾那
モ亦此症天功アリ。○總法ヲ行フ外用別法モ亦施スヘシ
焮衝焮熾ナル間ハ錦葵花過ル託聖葉眼聖藥球ニ此子ノ垂麻末鉛糖白百
合由ヲ加ヘテ布トシ半時毎ニ眼上ニ托在シテ尤効アリ。○次テ鉛劑トハ金密
陀醋半ヲ玫瑰水ハ多ク調勻シ用テ尤驗アリ
焮衝治セズ任再持スル者ハ向芙蓉ヲ外用シテ屢太効ヲ奏スル者ヲ見ルル
後幾那煎及ヒ冷水洗方ヲ行テ佳ナリトス。○又眼膏中ニ赤降汞ヲ加ヘテ用
若夜間兩眼封閉開久カラザル者此法ヲ殊ニ佳ナリトス
這樣ノ焮衝或ハ異體ノ物ナキ眼ニ入ヨリ免スル者アリ是如キ者ハ焮衝頓
免ニ確據スヘキノ原由ナク尋常ノ方法ヲ行フト魚尾効アラハルナリ若シ然レ寸

スヘカラク子細其眼中ヲ捨開シ異體ノ物凶ヲ恐ク其中ニ存在セサルヤ
否ヲ驗スルヲ要ス是亦眼科闕カラハルノ要旨トス然レトモ異體者眼ニ飛
入ル者ハ乍ラ疼痛ヲ発シ泣流ルト止マズ遂ニ眼衝ヲナス如此ニ症因
トシテ知ル固ヨリ難カラス○其飛入物酷烈ノ味ナク加ニ其質團十
者ハ其人速ニ眼ヲ閉ル寸ハ泣流ル如クニ便テ之ヲ出シ去ヘシ○但其酷
厉ナル烟ノ類如キ者ハ小毛筆ヲ連中ニ浸シ此ヲ用テ抽捺シ出スニ宜シ或ハ
水鏡ヲ以テ温乳若ク温水ヲ沃テ之ヲ灌セ出スモ亦可ナリ○細碎ノ
木柝殼穂槌打ノ飛片ノ類ハ皆眼中ニ粘定シテ出シ難キ者ナリ如此
類ハ内翳針ヲ以テ之ヲ抽捺シ出スヘシ或ハ細小白シセテ之ヲ用テ之ヲ除
キ去ルモ亦可ナリ○若異體ノ物玲瓏角膜刺入スル者ハ針尖ヲ用テ之ヲ剔
出スヘシ○其刺衝ノモノ若鉄屑ナラハ磁石ヲ用テ是ヲ吸シ去ルニ宜シ

二加太兒刺列眼嫩衝

ラツツタルミアカタルラリス

證候此ノ眼嫩衝太緊其性温濡ニ目寒傷冷熱ヲ兼子発スル
ヲ常トス○其初ハ酷厉水様ノ淚流出シテ止マズ其觸ルルノ眼胞腫
紅シ其近傍ノ部モ亦之カ為ニ腫ヲナシ且赤色ヲ支眼目ノ觸覚過テ

敏銳ニ羞明殊ニ甚シク但其赤色ハ乃チ酷シカラス○二三日後疼痛
止シ泣流其初ハ酷厉ヲ失ヒ粘膩トナル其質膿ヨリモ稠シ○眼胞封閉開
闔スヘカラス然レモ二三日後目ヲ開クシ○因之ニ処スルニ適當ノ薬ヲ以
テセザルノ眼腫痛ヲ生シ易シ或ハ眼胞瘡瘍ヲナスモ亦是アリ
○是症瘡瘍ヲ生スルノ外別ニ危劇ヲ発スルナラハ故ニ医師ヲ救治ヲ要
スルモ亦稀ナリトス

原由這箇ノ嫩衝流行疫トナル者アリ然レモ多クハ天气寒湿ノ時ニ行ハ
ル際スル大氣ノ温度倏忽變化スル者能ク此病ヲ致ス此レ實驗ノ得ル所
ナリ○又互凍ハ大氣ノ体ヲ侵襲シ或ハ胃寒ヲ発スル寸ハ續テ這箇
般ノ眼疾ヲ惹出シ未レ○嬰兒ハ大人ニ比スレハ最此ノ病ニ罹リ易シトス

治法第一時限ハ按時ノ淚ヲ拭テ消滅シ食養ヲ攝シ勉メテ蒸氣ヲ催進スル
ヲ要ス○熱度ノ輕重ニ隨テ内服ノ薬ヲ外ス即チ確破清涼諸薬民埒列
里精安質沒担諸製劑阿芙蓉加羅蔴兒托歇爾散及宜発当茶飲
假使ハ接骨花ノ如ク○若熱勢猛熾ナル者ハ刺絡ニ宜シ腸胃穢毒ヲ拭
ク症アル者ハ輕々ニ吐下スルニ宜シ○若夫外用ノ某物及当行ノ事件ハ即
チ大氣ト光輝トヲ直チ眼ニ觸シスル則チ額ニ格謨布列斯ヲ搭掛シ眼上ヲ被

覆スルヲ要ス又粘膜包摂ノ劑ヲ行テ酷厲ノ涕淚ヲ甘和スルヲ務ムシ○
之ニ次テ垂刺比亜護謨化開水過ル託亞聖粟殼錦葵花煎楳核液亞
麻子ノ輩ノ泡湯ニ向美蓉鉛糖少許ヲ化シ用テ失鳩谷蒸湯方温乳加
泊未藍モ亦用ヘシ○淚出テ止ル者ハ其膏項窩ニ粘シテ長ナリ○第ニ
時限ノ後液已ニ者ハ嫩衝ノ久ク粘厚遲セザラシムルカ爲ニ輕々衝動シ及強
健スルヲ兼テ用ヘシ○但此病第ニ時限ヲ得スメ治スル者多シ

三 儂麻空設及痛風様眼嫩衝

〔證候〕這ハ嫩衝或痛風凡ヲ兼発シ或ハ痛風ノ症ト互ニ相番替シテ発ス或
ハ痛風起伏時ナク遂ニ眼及フ者モ亦アリ○疼痛極テ甚シク又極テ酷厲
ナリ但其赤色酷々甚シカス淚液酷厲ニ滂沱トノ流出ス○此病暫久ノ二種
アリ○其久者ハ最悪性ニテ通常ノ灰翳皆斯ニ根由ス○ホツクホツク
治法太都子之ヲ治スルハ痛風同シ其最モ効アリ者ハ朴窟福鳥篤護謨安
貨没扭諸製劑水銀蜀羊泉莖亞兒爾加雙鸞菊膏等ノ輩ナリ○嫩衝太
夕燥ナル者ハ蜈蚣法ヲ用テ甘和蒸湯方罨法モ亦効アリ但此等ノ法久ク續用
スルハ害アリ○嫩衝少シ減スル者ハ香艸乾者ヲ填充スル代子其膏膏麻性ノ

眼水多クハ地若答利斯布列西ノ丁我劑ニ水ヲ加ヘテ薄クスル者寧
鳥連利規独ニ水少計ヲ加フル者老利兒結兒斯ヲ用テ皆驗アリ○已上
眼水毎日一雙滴ヲ點スヘシ

四 瘰癧性眼嫩衝

〔證候〕此種ノ嫩衝ハ瘰癧病毒勢眼ニ及テ発スル者トス○病人質
大都子虚衰顔面刮口上唇厚大頸腺腫脹鼻モ亦腫レテ且嫩衝ス
ル等皆其候ナリ○此症ノ患ル処ハ最モ眼胞ニアリ其部厚大恰モ腫状
ノ如ク大抵全ク其眼ヲ被テ眼ヲ開ント欲ト雖亦之ヲ啓キ難キ
至ル○眼中ヨリ影饒ニ粘膜ヲ酷厲侵蝕スルノ液ヲ漏シ太々怕日羞明ス
○此症赤色太クカラス又劇痛ナシ○若其眼ヲ揉開シ得ヘキ者ハ之ヲ視
ニ結膜上ニ紅線アリテ從横ニ蔓延シ且腫脹ス○既ニ細小ノ白胞發個ヲ
生シ其胞ハ十膿化シ不通光膜翅肉ヲ生スルノ勢ヲ啓クニ至ル○其嫩
衝ハ性ハ久者ニ屬ス而シテ其度ハ則チ劇者アリ不劇者アリ但其性頑痼難
治者十ニ常八九トス

治法這般嫩衝別ニ治法ナシ唯瘰癧門ノ方法ニ從テ之ヲ治スルニ宜シ乃チ下

方如キ是也テルラホシテロヤカリタア水銀安質設担諸製劑失鳩答
地惹答利所布兒布列里俄那鉄劑強壯食養荒膏膏等比白之三屬ス
○外傳ノ藥ハ乃チ輕々ニ衝動シ及強壯スルノ藥ヲ用ユ
○即チ外來化
水阿芙蓉下莖劑ニ水ヲ和シテ萬クナス者老利兒結児斯クキタリスヒ
ルヒエラ葉泡劑地惹答利斯下莖劑蔓花下莖劑ニ水ヲ和メ稀釈ス
者幾那或水楊皮煎丸石皓答ヲ用テロヤカリタア等ヲ加ヘ或赤降永
撒尔弗拘椽膏ニ阿芙蓉ヲ加フル者ノ如シ○焮衝治シテ後強壯スル方爲
○内服及點洗ノ藥ヲ連用スヘシ

五梅毒眼焮衝

梅毒眼焮衝ニ三種アリ其一ハ乃チ真梅毒眼焮衝ナリ其性緩慢ニ
梅毒全身ニ浸漸スル後旁発スル所ナリ其二ハ乃チ我乃兒魯里設
眼焮衝ナリ其性困劇ナリハ是其常ナリ淋疾内伏ニ発スル所ナリ

真梅毒眼焮衝

證候其原由ヲ識察スルニ殊ニ甚ク難ク但醫師精細ニ眞實ニ患ル處

ヲ候間シテ一切諸症ヲ臆烈スル寸ハ其中三ナリ一ハ症候カ果メ能ク此目疾ヲ
導キ発スルヲ確知スルニ足ラン○這個焮衝候初メ即チ兩胞林方如クニ自癢
○疼痛及其他諸候夜間熾ニ黎明ヨリメ乃チ靜止ス○兩目微焮泣淚
酷厉ニトト參漏ス但此症流淚過多ナラズ唯ニ時限間或ハ之アルニ○珍瓏
角膜ノ色軍鴻腫厚シ竟ニ不通光体トナリ至ル結膜ノ脈管腫脹恰モ
裂ク症ノ如ク淚阜灰色或ハ青色ニ變ス○此症怠慢ニ治寸ハ統テ右ノ癰腫
ヲナシ兩目曇暗不可治ノ症ヲ発シ之班痕ヲ遺ス○眼線最モ善ク此病癰腫
易シ○或ハ結膜ノ上ニ膜様肉ヲ生シ遂ニ壞疽ニ變ス
治法水銀劑ニ強壯ノ藥及福鳥篤飲子ヲ兼用スル者此病ノ重キナリ外
治則灰汞膏ニ阿芙蓉少許ヲ加ヘ調停シ眉邊ニ摩擦ス○又外來ノ軟ナル化
開劑裡ニ就テ亞棘比亞護護漿ニ萃涅滿ノ溶汞ヲ加ヘ或拘椽膏甚大効ヲ
奏ス

我乃兒魯里設眼焮衝

證候這個眼焮衝諸種焮衝中最モ頭等ニ薄ル者ナリ○此症或ハ單焮衝
ノ劇キ者ニ更ニ區別ヲ其間ニ為シ難キ者ナリ○其初テ発スルヤ眼胞甚ク

焚熱之瘡ヲ覺フ○既ニメ疼痛劇シク又苛酷ニ全頭ニ透徹メ刺カ如シ○
或ハ結膜高腫ノ玲瓏角膜面ヲ輪匝シ兩脰間之ヲ被ヒスヘカカサレ
至ル○膿様綠黃ノ眵淚眼中ヨリ流出ス○頃刻ニ角膜其体ヲ失ヒ
通光ニテテスヘカサレノ著目トナル○然ル所以ノ者ハ角膜ノ膿癰
虹彩膜葡萄腫膜様腫及其他變態ハ皆此病ノ続発スル者ナルカ故ナリ○又婦
人梅毒ヨリスル所ヨリ白帶下一時瘥止ニテ遂ニ此種ノ眼癰ヲ起シ来ル
原由此症大抵淋疾ヲ誤治シ或ハ其部ヲ過冷過温スルヨリメ遂ニ其膿ヲ壅止
シ目ヲ以テ之ヲ惹出シ来者多シ○或卒然トシ淋毒ノ飛滴目中ニ割入シ遂ニ
局外ノ傳染ヨリメ眼疾ヲ發スル者間又是アリ
治法ニテ此病ニ臨テ最先ツ施スヘキノ術ハ癰腫ヲ撲滅スルノ法ヲ行テ熾盛ノ
勢ヲ制シ潰膿ニ迄フノ危篤ヲ救拔スル在リ○其要法ハ乃チ刺絡内用ハ消
癰ノ藥及赤劑ヲ与テ截切ヲ行ヒ頓針ヲ貼スル是ナリ○此ノ如キ方法ニ從事シテ
癰腫ノ大勢ヲ減殺スル者ハ医須ラク適切ヲ与テ内伏スル所ノ淋疾ヲ
再ヒ発出シ来ラシムルヲ要スヘシ○外用ニ則チ癰病ノ始メ較化ノ藥聖藥ヲ敷
非至失聖末失鳩若越護規吉化水ニ向テ癰病ノ始メ較化ノ藥聖藥ヲ敷
輕々ニ強壯衝動スル藥ヲ前方ニ加フルニ宜シ例スルニ皓峇ラヒスシヒニユス鉛劑

ノ如シ○或曰此症淋疾ヲ種ルニ宜シ

六痘眼癰衝

ラツフルミアハリヲ昇

證候「痘眼癰衝」二種アリ○痘瘡発見之間這ノ癰衝ヲ獲発スル者アリ
或痘瘡治癒後二週ニ此症ヲ発スル者アリ○其第一症ハ痘眼癰球ヲ穿透シ
テ発スル者是其因ナリ是ニ因テ眼胞多クハ腫脹赤色アリ眼封閉ス○
糊液淺乙色膜線ヨリ滲漏シ兩脰ヲ糊着セシム○癰衝大抵全身ノ症ト經過
同ス但具因別ニ眼本ツテ発スル者ハ全身ノ瘡已ニ收靨落痂ストイハレ亦肉
癰衝ノ勢減スルアルトシ如此キ者ハ其例ニテラス○其他之ヲ患ル後視小
做大之病角膜曇暗葡萄腫等諸患ヲ遺ス者アリ○其第二證ハ則チ痘
癰衝ヲ發スル者ハ其因トナルニ其位經過ノ如キハ全ク久性ノ者ニ類シテ
其性モ亦極テ頑ナリ○然レ小兒ノ如キハ癰衝ニ眼目ヲ摩摺シテ此症ヲ発スル者
アリ或ハ眼中ノ痘加ヨリメ是ヲ生者モ亦之アリ
治法眼癰中痘ヲ生シ是ニ由テ癰衝スル者ハ分解乾愈ノ藥最モ用ユヘキナリ
○此症大抵其將来ノ善惡ヲ判決シ難キ者多シ故ヲ以テ醫務テ是ヲ剝制
スルヲ要スヘシ○其將来ヲ判決スルノ如此シレ難キヲ以テ或ハ毛布片ヲ覆布

羅ヲ捺金シ痘間眼上ニ掛搭セシムル者アリ亦恐ク其故ナリ似タリ○
痘瘡差後眼嫩衝スル者ハ水銀下劑ヲ与スシ○其他安質没担劑金硫黃
加阿芙蓉散散兒散朴鳥篤飲子又温浴就裡孫黃浴最モ佳ナリ打膿及
強壯劑亦用ス○外用ニ則チ子アホリタニ骨圓ヲ眼胞塗擦シ又
症ニ隨テ他ノ適坊ノ藥ヲ用スシ○痘間眼封ヲ彼開スルハ極テ宜アリ但
疹波久ク眼ノ縫隙ニ糊着スルモ亦宜シ方ラストス具以乳汁ヲ温メ大皆及膜
毛ノ際ヨリ仔細ニ是ヲ除キ去ラ集ナリトス

七 麻後眼嫩衝

オツクタルミアモルヒル昇

證候麻疹治後遂ニ頑強多疾ノ眼嫩衝ヲ遺ス者屢々之アリ其症傷冷毒
性者ト大抵相類ス其經過モ亦畧相同シ
治法内服ニ則チ安質没担劑龍腦散散飛窠塩及蒸氣宜導劑皆用
スシ○其外用ハ初起ノ際軟和シテ輕々衝動シ及強壯スルノ藥宜シ○荒
菁膏モ亦毎ニ佳効アリ

八 惡液眼嫩衝

オツクタルミアカデタチカ

這個ノ眼嫩衝モ亦類種アリ假令皮上ノ久性斑疹目信内蔵ノ積聚及敗
關失可見倍苦或ハ腸胃穢毒諸雜症諸虫膿液病等ノ類ニ眼嫩衝ヲ
大者モ多ナリ
治法此ヲ療セント欲スル者ハ須ク先ニ諸種合併ノ病ヲ考索シテ之ヲ除ク
ヲ勉メシ次テ点洗スル藥ヲ用スシ但其病性ト相符スル者ヲ用スル宜シ

九 眼眶腺嫩衝

證候此種ノ嫩衝ハ最モ茂チ各護腺ニ在リ○太率此病ノ初起ハ癢
熱シテ勢カ如クナラ覺ル其後弓狀軟骨ノ故乾燥スル者今ハ則チ赤腫
脹ス○此時嫩衝スル處ノ眼胞ヨリ酷厲白色ノ液ヲ洩シ次ニ其後
漸細糊ニ醜房ナラス黄色ナルノ質ニ変シ遂ニ凝固ラナシ夜間ハ乃チ
眼ヲ封シテ開キ易カラシム○又眼眶上ニ小疹ヲ發シ其頭漸ク腫起シ酷
ク焚熱癢痒ヲ示シ之ニ因テ腫毛脱落ニ或ハ臉胞外翻ス○這個ノ疹
太抵其形癩疹ト相似タリ○大抵白仁モ亦同ク紅赤ヲ做ス但シ癩疹
ヲ生スルノ後皮頃ヲ示レハ此症ヲ発スルアルナシ
者ニ屬ス而シテ其疼痛甚シキアル者少ナシ

原由眼胞焮熱痒癢、此症在テ弓外ノ病ニ属ス全身ノ続症ニ非ス。然
此症或ハ間々癩癧性ヨリ発スル者モ亦アリ微シク癩癧ノ回ヲ扱
者ハ焮熱ト痒癢ヲノ之ニ回テ大盛ナラシメ或ハ之ヲ新ニ発シ来ルニ至ラ
シム
治法焮衝唯弓外ノ疾ヨリ生スル者ハ亜鉛萃ヲ^{ホト}釜^ト爾ノ塩味ナキ者ニ調
停シタル膏劑拘椽膏^{ハル}ハル^ハカ^ハフタル^ハストイ^ハフス^ハヲ用^ハハ^ハ便^ハ千^ハ癢^ハニ^ハ用^ハ
法毎^ハ日^ハ小^ハ算^ハ菜^ハ子^ハヲ大^ハサ^ハラ^ハ取^ハ毛^ハ筆^ハヲ用^ハテ^ハ眼^ハ上^ハニ^ハリ^ハテ^ハ仔^ハ細^ハニ^ハ之^ハヲ^ハ摩^ハ擦^ハス
病癩癧性ヨリ発スル者ハ癩癧ヲ治スル^ハ菜^ハ例^ハスル^ハニ^ハ失^ハ鳩^ハ答^ハ地^ハ若^ハ答^ハ利^ハ斯
箴那安質没扭劑水銀劑等尤用^ハシ^ハ此^ハ病^ハ効^ハヲ^ハ奏^ハス^ハク^ハ速^ハニ^ハ生^ハス^ハル^ハ者^ハアリ
寡^ハシ

十奇醜眼 リビキコト

證候此病太率眼胞焮衝ト酷ク相肖類ス或ハ眼胞焮衝ヨリメ遂ニ此
病続発スル者モ亦多ク之アリ。眼端外翳焮腫シ上ニ粘液ヲ流出ス眼中
常ニ淚アリ
原由強烈ノ飲料ヲ多服スル久此症ニ罹ル者多シ。間人積年ノ癩癧

及惡液家此ヲ患ル者アルヲ見ル。又此症痛風ニ由テスル者屢々アリ
治法内服ニ則^ハ阿^ハ美^ハ答^ハ劑^ハ及^ハ裂^ハ烏^ハ麻^ハ室^ハ斯^ハヲ^ハ治^ハス^ハル^ハニ^ハ菜^ハ皆^ハ用^ハス^ハル^ハニ^ハ又^ハ荒
菁^ハ膏^ハモ^ハ亦^ハ屢^ハ々^ハ巨^ハ功^ハヲ^ハ建^ハツ^ハ外^ハ治^ハニ^ハ則^ハ千^ハ微^ハ々^ハ衝^ハ動^ハニ^ハ菜^ハ假^ハ如^ハ八^ハ承^ハ加
尔^ハ箴^ハ膏^ハ方^ハ亞^ハ鉛^ハ萃^ハ及^ハ鉛^ハ劑^ハニ^ハ阿^ハ美^ハ答^ハヲ^ハ加^ハル^ハ者^ハヲ^ハ与^ハフ^ハル^ハニ^ハ点^ハ洗^ハ諸
菜^ハ皆^ハ謹^ハ慎^ハシ^ハテ^ハ之^ハヲ^ハ用^ハス^ハル^ハニ^ハ要^ハス^ハル^ハニ^ハ

十一生兒眼焮衝 オツツタルミア子ヲナトル云

證候此病太率初生後二日ニ発スルヲ其常トス。眼胞赤色腫脹
目閉蓋ニ開クハカラケルニ至ル。頃之ツテ兩^ハ眼^ハノ^ハ間^ハ多^ハク^ハ膿^ハ様^ハノ^ハ物^ハヲ^ハ滲
漏^ハス^ハ或^ハ其^ハ中^ハ血^ハ脈^ハヲ^ハ交^ハル^ハ者^ハアリ。焮衝速ニ除カ^ハル^ハ者^ハ結^ハ膜^ハ及^ハヒ^ハ眼^ハモ^ハ亦
之^ハカ^ハ爲^ハニ^ハ病^ハシ^ハメ^ハラ^ハ換^ハ口^ハ外^ハニ^ハ向^ハテ^ハ反^ハ花^ハス^ハ。這^ハ個^ハ焮^ハ衝^ハヨ^ハリ^ハメ^ハ動^ハス^ハレ^ハ轉^ハ車
玲^ハ瓊^ハ角^ハ膜^ハニ^ハ曇^ハ暗^ハ腫^ハ癢^ハヲ^ハ生^ハス^ハル^ハ者^ハアリ
原由生兒^ハ楮^ハ毒^ハ様^ハ或^ハ癩^ハ癧^ハ様^ハノ^ハ天^ハ質^ハヲ^ハ稟^ハテ^ハ已^ハニ^ハ伏^ハ目^ハト^ハル^ハ者^ハ一^ハ々^ハニ^ハ感^ハ冒
ヲ^ハ病^ハシ^ハ或^ハハ^ハ割^ハ着^ハ太^ハ過^ハヲ^ハ大^ハ氣^ハニ^ハ觸^ハレ^ハ或^ハハ^ハ分^ハ娩^ハノ^ハ間^ハ因^ハ治^ハ宜^ハヲ^ハ得^ハズ^ハ或^ハハ^ハ体^ハ軀^ハ乾
淨^ハナ^ハラ^ハズ^ハ多^ハク^ハ汚^ハ穢^ハヲ^ハ帶^ハヒ^ハ或^ハハ^ハ目^ハ烈^ハ光^ハニ^ハ觸^ハル^ハ寸^ハハ^ハ千^ハ焮^ハ衝^ハヲ^ハ生^ハス^ハル^ハニ^ハ至^ハル^ハ
又^ハ勞^ハ瘵^ハ質^ハノ^ハ父^ハ母^ハヨ^ハリ^ハ生^ハス^ハル^ハ嬰^ハ兒^ハハ^ハ最^ハ此^ハ病^ハヲ^ハ受^ハケ^ハ易^ハシ

治法 煖衝標毒傳深ヨリ発スル者ハ水銀劑ヲ内服セシムル○外用ニ
微々収瀋スル薬ヲ用ユルヲ要ス○其之ニ属スル者ハ香薷艸ノ温養法及衝
動ノ眼藥ニ粘臍物ヲ加ヘ水鏡ヲ用テ胞間ニ注スル等ナリ又醋岩阿芙蓉
柔化水水眼膏ヲ眼胞ニ摩擦シ榆白皮楊皮ノ煎劑ヲ格護布列斯ニ浸シ
眼上ニ托住スル等皆用ユル

膿眼 イイポペイム

證候 眼目煖衝頭等ニ至ル者太率皆其結症ニテ膿眼ニ変スル者ナリ
其膿獨外部ニ在ル者アリ又眼本質ニ在ル者アリ○其獨リ外部ニ在ル
者モ亦其所在ニテラス○煖衝熾盛ナル者此子ノ膿瘻ヲ結膜ノ上或珍瓏角
膜ノ上ニ生スル者アリ○其ノ角膜上ニ生スル者ハ視力ノ力為ニ天々衰疼痛殊
重シ但シ生ズル膿潰ハ菜セスメ自ラ治スル者アリト雖モ其膿ヲ生スル部
動モスル輒々漏源ヲナシ或ハ突元ヲナス是ニ由テ視官失職ノ諸病ヲ惹
出シ来ルルイ多シ○其煖衝極テ劇シキ者ハ許多ノ膿ヲ角膜ト結膜ト際ニ
蓄聚ス○如此者ハ結膜ノ腫大常ナラスハ一帯スルモ亦其始ニ比スル高腫スル
知ルニ至ル○消息子尖ヲ以テ輕々之ヲ按スル儼然トメ其内ニ膿液ノ波動スル

ヲ覺フ○這ノ膿ハ善ク視官ヲメ全ク其識ヲ曠メ昏暗不明ナルニ至ラ
シムル○是皆結膜廣大ヲナスノ致ス所ニテナル者ナリ○或ハ膿角膜ニ聚
リテ一小点ノ如ク小域ヲ領スル者アリ此ヲ血根翳ト名ク○煖衝間々
眼目劇痛アリテ遂ニ白黃ノ翳ヲ生シ其翳外ニ肉ヲ突起セテ諸部
推壓ヨリメ其初ノ所在ヲ變ズル者アリ○其翳小ナル菜セスメ自ラ消散ス
ル者間々コレアリ然レモ其大ナル者ニ至テハ稀薄ノ部如キハ乃チ諸部ニ滲
ルシ尽サレ独リ其稠部ヲ留テ去ラス遂ニ是カ爲ニ角膜曇暗ニテ
光輝ヲ通サズルニ至ラヌ斯種翳ヲ除クハ太カカシ○或膿性酷厉ニテ
角膜ヲ外ニ穿透シテ遂ニ角膜瘻ヲ成ス者アリ或ハ内ニ肉ヲ侵入シ遂
ニ膿ヲメ眼ノ前室ニ溢入セシムル者アリ○若膿正ニ眼ノ本質所謂前室
或後室ニ累積スル者ハ其煖衝ノ諸候未タ除カサル間中角膜下
際ニ當テ黃白半規復月ノ如キ翳ヲ生シ日ニ積月ニ重クテ漸ク上際ニ衝
薄リ遂ニ全ク角膜ノ後面ニ滲滿シ瞻視ヲメ尽ク瘥スルニ至ラヌ○若擔
閣ニテ其治ヲ怠ルハ則チ角膜漸ク以テ開張シ竟ニ眼球ヲ破損シ病人視
器ヲメ十二ヲモ救スカラハニ至ラシム○故ニ此症ニ臨ムニ手ヲ行フ子ハ
之ヲ他ノ敗關ニ變セシメ以テ其明ヲ復スルニ至ラシムル所謂膿ヲ角膜ニ小

導引眼丸法ヲ行ハハ乃チテ亦難キモノアルナシ
治法膿外ニ在ル者熾盛極衝ノ方法ヲ施スヘシ○之ヲ行フハ膿自ラ消散ス
○膿角膜ノ片ニ相層積スルノ間ニ湊積スル者ニメ医其消散ス可クナルヲ
診シ得ハ便チ手術ヲ施スヲ要ス可キ者少カラストス○如此ノ症ハ須ラキ法
ヲ行フ後角膜上ノ痕々腫孔ヲ障礙セサルノ処ニ於テ小カラシテ刺ス
シテ要スヘシ○膿眼ヲ治スルノ法ニ道アリ其ハ膿ヲ効テ諸部へ令消セ
シテ消法膿眼ヲ治スル者ハ毎先ツ此法ヲ試ムヘシ○極衝ノ度下随テ蟬針吸角
荒菁骨膏清熱下劑等ヲ施スヘシ○爾後微々衝動スルノ別法ヲ施シテ大
効アリ○其之ニ屬スル者ハ亜鉛若水ニ阿芙蓉ヲ加フル者針承水ニ宇鳥連
根ヲ加ヘ又コラーピスシライニスノ溶化劑礮破水石灰水等見欲眼膏等
ノ輩ナリ○其軟化劑ハ裡ニ就テ耶仁ハ錦葵ハ頗ル佳シ○此ノ處ト雖モ眞ノ
膿眼ニ于テハ善巧ヲ奏スル者少ナシ○已上ノ消法已ニ効ナク膿ヲ生スル
愈多ク徐々ニ眼ノ前室後室ニ充塞シ殊ニ眼球ノ力為ニ開張スルノ常ナシ
諸症落々劇シ病ニ當ニ失明スルノ怖レタルミナラス動モスハ是ニ由テ惟命
ヲ須スニ至ラントスル者ハ医速ニ手法ヲ行マテ其大患ヲ掃シ尽シシ積運シテ

日月ヲ玩惕スヘカヲナリ○之ヲ施シテ欲スル者ハ揜翳針或ハヲセツト
ヲ用テ角膜ヲ切截スヘシ○之ヲ切截スルハ内翳ヲ截法ト同シ惟此切開
内翳ノ者ニ比スレバ此如ク大ナラザルヲ要スルノ處切截スルノ後急ニ眼
上ヲ松任シニ時或ハ三時毎ニ其縛ヲ解キ眼ヲ啓テ其瘡処ヲ拭直スヘシ膿
ニ其瘡ヨリ流出ケル數日ニメカ止ム○其截口瘡合ハスル者小カ夫ヲ以テ細
シテ再ヒ其口ヲ開クヘシ○内外ノ用菜ハ手法ヲ行フ間モ亦魚子ヲ行フヘシ○
此法ヲ試ルニ數次瞻視全ク故ニ復スル者モ亦屢々アリ○然レモ或ハ此
截法ヲ行フ後新ニ復々極衝ヲ生シコレヨリノ膿増々多ニ至ル者アリ又此法
行テ後角膜ニ不潔ノ潰瘍ヲ惹出シ来ル者モ亦少カラズ○或ハ手法ヲ行フ
後視官不明ララ致ス者アリ其甚キ者ハ角膜殊ニ曇暗ヲ為ス者アリ又膿
晶囊ノ前膜ヲ侵蝕シ尽ス者アリ○又水様液中ニ動スルハ絲ノ如キ者ヲ費
者モ亦之アリ之ヲ得ル者モ亦瞻視ノ力為ニ障翳セラル○或ハ極衝ノ前徵
ク卒然トシ前後室中ニ膿様ノ物ヲ生スル者アリ此症膿眼ト其回ヲ異ニ
而シ其治法モ亦大三逕度ス之ヲ名ケテ類膿眼ト云フ

二角膜敗羽 マキコラーコル子カ

證候 角膜翳之ヲ鑿識スル一固ヨリ自ラ難ラス○其初テ起ルハ
角膜翳ノ如ク朦朧トシテ灰色ヲナシ仍少シク光輝ヲ通スアカリスカリ已
爾後其部漸ク白色トナリ全ク光ヲ通セス結晶土色或真珠色ヲ為ス或
扁平或突起其高キ一角膜上ニ小白阜ヲ為カキ至ル○已ニ漸々潤
大トナリ竟ニ全ク角膜ヲ掠奪シ尽ス○高年ノ人角膜ノ下際ニ弓様ノ
曇翳ヲナス者アリ此症之ヲ名ケテ翳スル者固ヨリ正理ニアラス○或ハ翳
角膜ニ小所在ヲ占ル者アルヲ親ル
原由 角膜及結膜嫩衝ヲ患ル後其部硬強ヲナシ遂ニ翳ヲ生スルニ至ル者
多シ○又皮上ノ熱疹ノ後或ハ癰瘰及酷厲ノ熱ヨリ生スル所ノ久性眼嫩
衝モ亦毎ニ角膜ノ翳ヲ起シ来ル
治法 角膜翳ヲ生シ不通光付トナル者或ハ治シ易キアリ或ハ治シ易カラザル
者アリ或ハ全ク治スヘカカラザル者アリ○梅毒癰瘰痛凡ノ諸目アリテ内伏ス
ルヨリ生スル者之ヲ獨リ外因ヨリ生スル者ニ比スルニ較治シ易シ○病人
年齒幼弱ニテ翳膜新ナル者治シ易シ翳膜陳久者ハ治スヘカラス○翳
膜稠密ニシテ毛光ヲ通セザル者ハ翳治シ効アルト否ルト倍々期シ易カス
○其他諸種翳ヲ治スルニハ詩多ク日月ヲ須クシ決メ効ヲ一時取ルニ能ハ

升ルナリ○雲翳ヲ掃ハント欲スル者或ハ馬外ノ草ヲ要スル者アリ○假令ハ
列島麻質設痛凡癰瘰様病ヲ合併スル者アルトハ安質及粗利水銀失鳩合良
著トヒユルナリト西見尼加雙鷲菊等大効アルカ如シ○因此種ノ症ニ臨ム
毎ニ先ツ其外候ヲ以テ若ク輕化方利ノ諸藥モ亦用スルキ者ニテハヤ否ヲ
商量一番スルヲ要ス○若外用ノ藥効ヲナス一能ハザル者ハ更ニ別ニ藥ヲ
擇テ之ヲ換用スヘシ分衝動ノ藥最大効アリ○其用法或眼中ニ點テ嫩
衝ヲ生スルニ至ラス病人其痛ヲ耐ヘテ得テ度トス○雲翳ヲ搯スル藥モ
亦上ラズ近時吾邦在テ医家稱シ用テラズ下歎ニ開列シ以テ各家ノ採
修ニ脩フ其藥ハ則由様脂様藥及鼻脂雞卵油骨中ノ髓液及食
子油諸數ノ膽汁裡ニ就テハ目癩ノ膽カムヲ油「リキユカ」ルハキ
スニユステルヲ「フ」ヒア「リ」ス塩劑皓岩蓬沙礞石外赤化開劑密兒聖
那ハ眼膏拘椽膏「オ」フタル「ユ」ム「リ」ユ「リ」ユ「ニ」國「韃」ル「合」丹「燒」過
峇石銅綠「ハ」ル「キ」ニ「シ」ル「ハ」眼嫩ヲ治スル散藥沙糖鹿角精植
物粵幾斯失鳩峇地惹者利斯白屈菜莖若始會ニ他藥ヲ加フル者
麻菜阿芙蓉下幾劑「ラ」ウ「タ」ム「シ」ム「ク」シ「ム」老利兒結兒斯水地惹峇
利斯下幾劑鋒尖銳利「ト」菜印研細シタル硝子錫鑪屑鳥賊骨腐菜刺

此私印收見乃里斯化開劑酪狀安質沒扭是也其腐菜ヲ施ハ醫師謹慎
シテ細毛筆ヲ用テ其少許醃シ翳上ニ捺抹シテ別ニ乳中ニ醃多ク
取テ速ニ之ヲ濯洗スルニ宜シ或ハ角膜上ニ安質沒扭點ニテ膿ヲ打
シテ効ヲ奏スル者アリ○已上ノ諸菜互ニ相配合シ更換シテ之ヲ用ユ
或ハ角膜上ニ星翳外ニテ極テ頑強ノ者ニ遇ハ之ヲ除ク力爲ニ圓針ヲ
以テ之ヲ穿透シ或ハ字石光明塩ヲ用テ之ヲ摩摺シ或ハ之ヲ麻干松首スル者
リ皆良法ヲラス○其醫極テ其シク外ニ云テ突起スル者ハ捺翳針ヲ以
テ其ニ部ヲ除キ去リテ後菜ヲ行テ全治ヲナスモ亦恐クハ宜キ所ナリ

三眼中胛肉翅翳

ベレイキユムパンニユス

證候 結膜ノ角膜ヲ被覆スル一部厚大ヲナス一常ニ異ナル者之ヲ知翳又
胛肉ト名ク其尋常ノ膜翳ト異ナル所者ハ其形ヲ以テ之ヲ弁別スル○
其始テ発スルヤ白キカクニ軟ニ時日ヲ經歷スル後漸ク硬ク幾ニト獸皮
ヲ按カ如シ遂ニ暗ヲ拳テ大ニ視カヲ減シ或ハ之ヲ障碍シ全ク明ヲ得セシメ
サルニ至ル○其胛肉内白クメ少シ厚大ノ間ニ之ヲヘレイキユムト名ク其
已ニ厚クシテ許多ク血脈其上ニ聚蔓スルニ至テハ之ヲロパンニユト名ク○或ハ知翳

ヲ生スルノ部 結膜ノ角膜下固ク膠着スル者アリ或ハ結膜固着セスマニ
推テ寸分ノ動ク者アリ其甚キ者ニ至テハ結膜ノ動ク寸相牽テ皺襞ヲ爲シ
角膜上ニ被念ニ至ル者アリ
原由此病故ト結膜ノ変性ヨリ生スル者ニメ具如此ニ至ル者所以者ハ内瘰
瘰梅毒列鳥麻空設等ノ惡毒ヲ胎スルヨリノ遂ニ慢性ノ眼翳衝ヲ爲シ
是ヨリノ竟ニ啓病之源トナリテ此病ヲ假ニ至ル是ヨリ尋常ノ目ナリ
治法 眼上ノ知翳ハ大率難治ノ病ニ全瘳ヲ得ル者僅ニタルニ唯此病
ヲ得テ久シク時日ヲ經歷セザル者ハ尚治ス可キ機アリ若愈新ナル者ハ愈ニ
其痊愈期ヲマツク知翳ヲ爲スル者ハ近目正ニ珍角膜翳ト近目同ク又
ルヲ以テ其内服外傳ノ菜モ亦彼ノ雀ル者ヲ拳テ此ニ從ヒスルニ可キ但此
病ニ在テハ外用ノ諸方法彼ニ比シテハ較強カラサルハカラス又較劇ク衝動セザ
ルカラザルナリ此ヲ異ニスルニ○其ハ角膜翳ヲ施スノ諸方法ヲ行フト云トモ
効ナクハ能ハサル者ハ午法ヲ行テ之ヲ扶右スルニ宜シ若シ結膜其甚キ處ニ暗
皮ノ如腫狀如キ者ハ午法ニ非ハ之ヲ救フ能ハス午法ヲ行フ後結膜固着
セザル膜上ヲ被テ牽動スルニ至ル者アリ医須ラ豫メ之ヲ知テ後待スルニ
所ナリ○結膜ノ角膜固着スル者ハ午法ヲ行フト云トモ善切ヲ得ル者寡カシ

医午法ヲ行分ルノ前病家ニ對シ後ニ吉凶ヲ道ニト決ス其言諸須ク
些子ノ疑ヲ帶シテ要ス然ル所以ノ者公角膜結膜ト相附着スル故ニ切
截後ニ非レハ其角膜泉ニ些創處十キヲ保スハカヲサレテナリ
午術ハ下歎ニ述ル所口垂屈列見ノ法ヲ最宜トス○其法ニヒンセツヒヲ
用テ結膜ノ牽動スル所口垂屈列見ノ法ヲ最宜トス○其法ニヒンセツヒヲ
スノ後角膜ヲ捺直シ其創處ニ於テ細小ノ銀鈹ヲ用テ角膜ノ周圍ニ備テ輪
角膜ノ外ノ白ヲ圍ハニ於テ細小ノ銀鈹ヲ用テ角膜ノ周圍ニ備テ輪
西シテ之ヲ剪ル○一二日ノ後膜牽キ縮リ一処ニ聚ル是ノ如キ者ハ房水ノ其
筋肉ヲ除キ去ルイヲ得ヘシ○之ヲ行フ間出血アル者ハ医之ヲ止メ去棄
シテ可ナリ○午法ヲ行フ後諸症或ハ鉛利ノ化開方或ハ更ニ鉛膏ヲ用スヘシ
之ヲ施ス寸ハ尋常角膜上面ニ座スル所口膿瘍ヲメ速ニ掃シ尽サシム
ク○又血縷眼中白外ノ諸方ヨリ起シテ筋肉中ヲ把テ者アリ如此者悉
ク之ヲ切漸シテ其血ヲ輸ス道路ヲ截ヘシ但之ヲ截断スル法一次ニ去
ハカラス數次之ヲ施スヘシ或ハ刺比私印邊見乃利斯ノ化開方ヲ行テ膿ヲ
打シ之ニ回テ漸々ニ知肉ヲ消磨スル者アリ此皆考索ノ一助ニ備スヘキ也○
或ハ筋肉唯角膜ニ外ヲ被フ者アリ此如キ者其長大トナルヲ過シカ

為ニ角膜外白ヲ圍ハニ部ニ於テ結膜ヨリ剛膜ニ透テ之ヲ切截ス
○結膜厚大ヲサシテ且弛開シテ之ヲ動スルハ脂肪様小腫癢ヲ發
スル者衝動収瀉ノ策ヲ用テ八種効ヲ奏スルイ難カラズ

四 葡萄腫 スタウツエイロマ

證候 角膜厚大ヲ倣シ内外ニ肉テ太甚ク腫脹シ視官之ニ由テ其職ヲ
曠ラスルニ至ル○尔時角膜上多ク瘰癧肉ヲ生シ内子更更ニテ四陷セス
或ハ其質葡萄子ニ似タリ○或其腫長尖ヲ倣シ兩眼ヲ合ト魚尾之ヲ被
覆シ尺スヘカヲサレニ至ル○其腫初ニ軟ニ柔ニ結テ漸ク硬ク幾ニト軟骨
ノ堅ヲ得ニ至ル○眼中ノ腫處及其小瘰癧肉但無數ノ血管叢ヲ生ラテ常ニ
ル血管中直紅血ヲ輸シ腫脹常ニ非○サ葡萄腫太タ長大トナル者ハ遂
暗ヲ擗テ其明ヲ失ハシテ下檢外ニ肉テ反轉シ淚汪々トメ停マラス是ヨリ眼
皮弛衝シテ腫癢ヲ生ス○其腫大小ニ準シテ其名ヲ合ツハスタウツエイロ
マトカレニハタツフエイロマハルチアレニハスタウツエイロマヲセモシムト名ク
又一種眼中ノ白外ニ暈圍ヲ支腫癢ヲ生者アリ之ヲ鞏膜葡萄腫ト名ク
其色大抵黯黒ヲ常トス或ハ全ク黒色トナル者アリ此皆疼痛ヲ帶フ葡

葡萄腫ト殆ト相同シ
原由通常葡萄腫ノ原由熾盛ノ嫩衝ナリ裡ニ就テ外ヨリ物ニ撞破セ
ラレテ嫩衝ヲナシ遂ニ是ヨリシテ之ヲ奪スル者アリ或ハ痘瘡眼中ニ生スル
嫩衝ヲナシ回テ之ヲ奪スル者アリ○又梅毒瘰癧痛風等ノ眼嫩衝ヨリ
ノ是ラ生スル者アリ○其腫ヲナシ内回ヲ推スニ忌クハ夜眼内ニ停
滞スルヨリシテカ腫ヲナシスニテ之ヲ眼ノ中膜様ニ破裂ヲナシヨリシテ致
シ遂ニ漸クテ長大ヲナステ然リ
治法葡萄腫ノ治法毎其効ヲ建シテ太々難シ而シテ其必効アルヲ
期シ難シ○角膜具素ニ復シ白患尽クテ痊生者塵々ト希ナリ○葡
萄腫一種ニ原自ヨリ奪スル者ナラシテ他ノ眼病ニ根ヲ奪スルノ症
ニ比シテ較治シ易ク下ス其一種ノ原自ヨリ奪スル者其病性相背
スル者ナラシテ投テ之ヲ奪スル者ナラシテ要スル外用ニ強ク收斂ヲ取
結者水外示刺テ新印歌兒乃里私等ノ化開劑裡ニ就テ阿芙蓉
幾有散過明凡沙糖ノ散茶酒石英沙糖石脂散又凡角膜弱ヲ
治スル等ノ諸藥ナリ○古人用テ所ク壓入諸器ハ今ハ全ク棄テ
用テナシテ法ハ葡萄腫性ニ隨テ各其効アリ○若其性ナク

イロマトタレニ屬スル者ハ數滴見滿ル術ヲ用テ細長ニテ切截ス
様液ヲメ其創ヨリ流出セシムル宜シ○角膜開張スル者星ノ收縮ス
但此術ヲ施ス切截ノ間ニテ淺ク創ヲナスヲ要セスハ剛ニテ之ヲ
行フニ○門法連歌ニ護ノ術其中ノ液ヲ漏洩テ久クテ止サシテ
ス方為ニ腫癢ノ側ニテ角膜ノ一片ヲ切去ル者ナリ但此法如キハ
實ニ其標記ニ違スルナシ若其性ナクハイロマトタレニ屬スル者
其根脚少シトナル者ハ或ハ鉸ヲ用テ之ヲ切斷ス然レバ之ヲ截去
ハ又新ニ腫癢ヲ生シ竟ニ惡性ニ變シテ已テ得ズ眼ノ半辺ヲ切斷ス
至ル者モ亦少シトス○如此ノ症ハ灰翳ノ法如ク先ツ角膜ヲ切截シ
鉸ヲ用テ輪狀ニテ之ヲ切抑シ其全圍中ニテテテク變性スルノ部ヲ
キ去ヘシ○又葡萄腫自ニ愧怪ヲ致シ惡性ニ變スル者モ亦此術ヲ施
○又「キ」ニセシテ法ニ循ヒ腫ヲ打タル法ハ効驗多カラス其大効アル者
ハセシニ試驗スル所ノ安質ヲ推シテ適宜ニ之ヲ採上ス○病人少ク疼痛
ヲ酷中腫シ腫癢上ラ車々ニ押推シテ適宜ニ之ヲ採上ス○病人少ク疼痛
ヲ覺ユ等ハ大毛筆ヲ數回乳中ニ蘸テ取テ其粘膩部ヲ洗滌
スシ○此法ヲ行フ間患愈ニ細慎シテ之ヲ施スハ嫩衝ヲ奪スルニ愈

十リトス。○又此法一次効アラハル者ハ數回之ヲ行ヒ其佳効ヲ收メ葡萄腫
全ク消散スルニ至テ止ム。○若此術ヲ行フ間眼瞼ヲ卷セテ下ス者ハ其眼
瞼ヲ消散スルノ法ヲ行ヒ全ク其非ヲ見ハス一十クメ而後又之ヲ施スラ要

一 眼瞼翻花

ユクトロビウム

證候此疾ハ眼瞼眼球ノ上ニ肉テ循ラス及テ頬上ニ懸ルカ如ク干牛リ
○如此者ハ眼胞内面外ニ肉イ翻花ニ眼球ノ下ニ肉テ一面ヲ遮斷シ足ス
テアル一能ス。○之ヲ得者ハ自狀時時ニ常人如クテ此ヨリノ其部ニ
經久眼瞼ヲ繼発ス。○此眼瞼ハ多淚疼痛ノ症ヲ發スルニ至ス。更ニ
又反翻ノ部ニ異常ノ赤色ヲ発シ腫起ヲナス。○此其兼症也。○但眇友花
原由諸般ノ瘡眼瞼上面ノ眼瞼ニ近キ部ニ金刃瘡ヲ得ル者ハ火傷後
者ニ是ナリ。○或ハ諸他疾病類又眼瞼ノ外皮短シテ延長シテ者モ亦皆
其原由ニ屬ス。○又眼瞼内膜異常ノ腫瘍ヲ生シ其性極メテ久性眼
瞼ヲ挾者眼窠中小腫或ハ下瞼内面細小腫起葡萄腫眼胞
閉塞助縦緩若クハ全然麻痺スル者モ亦皆此ヲ則致ス

治法諸種ノ原由ニ隨テ其治法各異ナリ。○若其症瘡瘻ニ原ヒテ発シ
而シ其外皮太ク短縮セザル者ハ徐々ニ其皮ヲ控テ之ヲ伸長シ又軟化劑ヲ
外用シテ之ヲ長カラシムルヲ勉メシ。○然レハ大抵上ニ用ル法ハ少シ其効ヲ奏
スニ過キス。○是症ハ創痕上ヲ截切スルヲ要法トス。○已ニ之ヲ截切スル後其創
口上下ニ絆瘡膏ヲ貼シ互ニ相着着スルヲ勿ラシメ而後其創ヲ愈メシ
○如此ク之ヲ行フ下ニ雖モ其眼瞼肉伸長セザル者ハ更ニ其眼瞼内膜ヲ截リ
テ眼胞内ニ縫合シテ瘻ヲ閉塞スルヲ法トス。○或ハ眼胞内ニ刺テ血ヲ出シ其
膿ヲ疎解スルニ其瘻腫仍愈ヤル者ハ鉸カテ用テ之ヲ截去ヘシ。○其細小腫
瘻ニ亦此法ヲ以テ之ヲ治スヘシ。○若シ葡萄腫ニ原シ者ハ之ヲ治スルニ葡萄腫
述方如クスヘシ。○若其症弛緩ト麻痺自若ハ肉処ハ衝動及強壯劑例
スルニ茴香油先著テ後法ヲ行フ要ス。○其諸病同ヲ合併スル者ハ
各種ノ性隨テ各其病齊合スルノ藥ヲ処スヘシ

二 倒睫

トリケイアシス

證候此病ニ種アリ。○其第一種眼胞全然病ナク睫毛独リ瞼上ヨリ内面ヲ

到其内其毫余眼球ヲ割着スル者ナリ○其第二種病特リ眼胞
何シ胞其内肉ヲ及側シ遂ニ腫毛ヲ球骨ヲ刺戟スル至ラシム者ナリ其
其第一種又コエトロビ云ト名ク耶仁又名ヲ掲ク其症ハ片状軟膏翳花
シ内肉ヲ着ラ付ス○又腫毛偶々トト重ナリ其者アリ之ヲシテギク
ト名クトリゲイアシス按即倒睫ハ毎三不可耐ノ病ナリ此症ヨリノ遂ニ表
明ニ嫌起スルニ至ルイ又少ナカラズトス
原由トトリゲイアシスハ大約久性眼炊ノ結症ナリ○此病ヨク眼胞
腺炊衝醜怪眼悪性痘ヨリ惹出シ来ル者トス○又眼胞内肉小腫
瘡或ハ潰瘍ノ生スル者亦此病ヲ將出シ来ル
治法其第一種ノ證ヲ治スルニ種々有テ法アリ其最第一ノ良法ハ先ッ内倒
脚スルノ腫毛ヲ細小ノ銀子ヲ用テ其根ヲ連子テ之ヲ抜キ去リ其後毛筆
ヲ用テ眼胞内肉半辺刺進印欲見乃粟斯ノ化開水或ハ破積
ヲ搽ルシ○此ヲ施テハ胞内ノ皮強ク腫状ノ如ク是ヲ以テ腫毛ノ新真
挑列ヲ失ノ内ニ生スルヲ妨ケ障ナリ○其法ヲ施ス間謹慎テ之ヲ行
フハ或ハ其嚙曲ノ腫毛ヲ小鉸刀ヲ用テ截去スル者モ亦能時ノ寛解ヲ致
然レ其腫毛復々再ヒ着ル處ニ生シ而シテ其毛始ニ比スハ更ニ強剛ヲ生シ太抵

然リトス○加屋率列見外法ハ勾曲シタル縫合針ヲ穿テ内肉皆ヲ距ル
一冊四等ノ処ニテ眼胞皮ヲ刺シ透シ縫合針ヲ貫キ又一針ヲ内肉皆ノ同ニ距離ニ
貫キ透ス是ニテ西絲ヲ合セ結ヒコシテ切リ別ニ肩下ノ内肉皆ニ透シ縫合針ヲ入
レ右ノ西絲ヲ引テ其上ヲ過キテ上ニ針ヲ刺シ膠膚骨ヲ以テ其端ヲ前額ニ括ス
其絲ヲ引テ軟骨位スル所ノ眼胞ニ三四回ニ截切ス其創處其後自ラ口
ヲ斂メテ瘡ニ加屋率列見又曰其絲ヲ施ス部ニ腫毛外ニ云ト雖モ其他處
ハ仍故ノ如ク内肉ニ倒掛スル者モ亦復々之アリ○渴見涅滿其輕症者ニ遇テ
毎ニ輒々切リ眼胞ノ外皮ヲミ縫合ス其第一種ノ證ニエントロビ云
ムモ亦其原由トラス而シテ治スル法モ其證ニ隨テ亦復々ナリ一能ハ
ナリ○若シ施療間尋常遇テアル者如ク眼胞ノ外皮常度ニ起テ縫合
不收ラ原由トシテ回テ以テ是ヲ痊スル者其胞皮ノ片ヲ切リ去リ絆創膏ヲ
以テ之ヲ瘡合シテ以テ其延長ヲ復ス
治法福鳥雀曰ク扶歌蘭度華尔列斯ノ外科集説ニ俱ニ眼胞内及治法
ヲ載ス其法蓋シハルリ地醫歌兒淋佃ノ説原ク○其法緑凡由取
テ眼胞ノ外面ニ搽リ胞上ニ加テ結シ八日ヲ過テ其痂脱落スル後再ヒ
又之ヲ搽リテ痂ヲ結シム如此スルニ數回眼胞皮常復シテ后ニ止メ大抵此法ヲ

行フ二三回ニテ其故ニ復セザル者ハ

三 上脰搭垂 フトシスフレハロトシス

證候 上脰異常ニ下重シ病人其眼ヲ開ント欲ト雖凡少シモ之ヲ上掲スル
能ク此ヲ上脰搭垂病トス如此脰皮低垂シテカノ能ク之ヲ掲開スル能
ハ者此ヲ病人自ラ其指ヲ以テ微シク之ヲ上支フルニ非ハ眼少シモ物ヲ視
ル能ハス或指ヲ以テ之ヲ上掲セザル寸モ少シク之ヲ視ルト魚尾其全然
ヲ及スル能ハス外ヨリ之ヲ望ム毎ニ睡ル者ノ如シ
原由 上脰癱瘓収ラサル者ハ脰ノ掲開筋脈痺スル者或ハ脰ノ閉筋痙
様ノ短縮ヲ為ス者及眼胞潰瘍皆其原因ニ屬ス

治法 医師診候ノ間脰皮縱緩其糸回タルトハモフハ強烈收因ハ策衝動
下幾先見及衝動膏ヲ行テ且病ヲ去ルヲ務ムシ○但外用之諸策ニテ
其効ヲ奏スルハ稀ナリ是ヲ以テ手法ヲ行フキ者至テヨシ○其法 医先
指或小銀子ヲ以テ脰上有餘ノ皮ヲ横ニ撮テ如クテシテ而シテ
子ヲ用テ其膜ヲ截去シ直ニ創ヲ合シテ糾創膏ヲ用テ之ヲ掩フ○蓋
其脰皮ヲ截リ去ル太クモカハカラス又太ク寡カハカラス是ヲ以テ医脰上

皮ヲ撮横ニ展積ヲナスノ間病人ヲノ試ニ眼ヲ開闔セシメ其的ニ過不及
ナキヲ確知シテ其截去スヘキノ部ヲ方ニ若クテ此手法ヲ行フ者ノ
最モヨシ知ルヘキノ要件ナリ○若此病掲開筋麻木ニ原キ者ハ内外ヨリ衝
動ノ策ヲ施行ス宜シ○此症毎ニ排前導ヲ入者アリ或ハ排治ス公後之ヲ
遺ス者アリ是ノ如キ者ハ約不治ニ屬ス○間々筋道ニ割著ラ物
又ハ蛇虫アリテ遂ニ此證ヲ発者アリ此如キ者ハ各其的當ノ策ヲ用テ之ヲ排
シ除ク宜シ○脰上ノ漏目筋痙様ノ拘平由テ此症ヲ発スル者ハ軟化膏
及ハ阿芙蓉膏ノ摩膏ヲ用テ自ラ解ス又諸種衝動物帶患セラレテ此
症ヲ発スルハ又屢々之アリ之ヲ除クハ各々其病ニ適スル内策ヲ用テ之ヲ治
スルヲ求ムヘシ若其症眼脰上潰瘍ヨリ生ズル者ハ外科ノ方法ニ隨テ之ヲ
置シ以テ之ヲ瘡スニ宜シ○經久癩衝後眼胞ノ内面ニ位スルノ聾膜大ニ
腫脹ラ眼脰間ニ露シ出テコロヨリノ遂ニ脰皮ヲ搭垂ラ致ス者アリ此如キハ
須ラ徐々ニ腫瘍ヲ流解スル所以ノ收斂策及ヒ亂截法ヲ施スニ

四 兔眼 ラゴブハタルモス

證候 此病脰皮下重ト全ク相反對スルノ證ニメ脰皮短縮スル者ナリ是ヲ

クノ法病人ヲメ屢々其臉皮ヲ運動セシメ毛筆ヲ用テ此字ノ鉛糖ヲ時々
眼内ニ搽抹シテ以テ其癢着ヲ防クヘシ生合ヲ防クノ法是ヨリ善ルハシ眼
胞独リ粘膩ノ物ニ由テ封閉スル者アリニテ液汁ヲ用テ濯クハ在テ折開ス

六眼胞癰腫

眼胞ノ癰腫其種モ亦ナラズ

麥粒腫

ポルテオリユム

「證候」麥粒腫ハ小テ鞭ク頑然トメ肉中ニ在テ之ヲ推動ストイハテ敢テ動カス
其結腫ノ状幾ニト麥粒ト相似タルヲ以テ名ク其所在多ク眼胞ノ邊緣ニアリ
其證状又三種アリ一六痲衝ニ貫膿ニ硬腫ニテ而シ六痲衝セス
原由大約此病ハ独リ片外ノ病ニ生ス然レハ或ハ内回ヨリノ之ヲ発スル者アリ裡ニ
就テ另ニ梅毒痛トスヘテ脂腺ニ聚リテ酷厉ノ悪液閉塞シテ莖發元セカレニ
因テ発ス比腫毎小兒ニ在テ多クハ消散セズ潰瘍ヲ爲スナリ
治法其始メ六鉛糖ヲ水ニ和シ時々膜皮ニ搽テ消散セシムルコトヲ要ス○然レハ
尚効ナキ者ハ脂液膏ヲ粘ニテ膿熟セシメ指ヲ以テ徐々ニ推壓シテ其膿汁ヲ

取り去リ其餘硬肉アル者ハ前件ノ膏劑ヲ重リテ全ク消化スルニ至ラズ
内服ハ腸胃中ノ汚物ヲ疎解シ其因ニ本ツイテ菜ヲ与フヘシ

包腫

千ニミレスセイヌ千シ

「證候」眼胞ノ包腫モ亦此名ヲ得ル諸腫物ト相似タル者ニ其位ス所是
抵眼胞ノ外皮下ニ在リ然レハ亦深肉中ニ位ス者亦屢々アリ○大サ大約小葉
葉ノ如ク又黎豆ノ如ク扁桃ノ如ク胡桃ノ如シ○病ヲクハ上胞ニ生ス○若其腫
極テ長大ヲナス者ハ眼胞ノ自在運之方爲ニ妨害セラルニ至ル
治法之ヲ治スル道ニツアリ所謂其初発ニ於テ之ヲ消散スルヲ求ルナリ其
已ニ消分セザル者ハ皮ヲ割キヒライテ其液ヲ出スヘシ之ヲ第一道トス○其二
ノ法ハ一切溶解消散藥ヲ用テ宜シ其最効アル者ハ皓石水食塩民控
列里精ニ牛膽ヲ加フル者蓬砂礞砂水銀膏麻子入ル等ナリ○又腐肉ヲ
用テ其化膿ヲ促スモ亦可ナリ○于法ハ先ツカヲ以テ皮ト囊ヲ連子テ之ヲ
截テ両折トシ而シ後其中ニ空豆所物ヲ壓擽シテ之ヲ出シ後十口ヒンセツテ之ヲ
用テ其囊ヲ上ニ制キ奉テ而シ後切斷シテ之ヲ出スヘシ○眼胞ノ上皮ヲ横ニ
截ルハシ○疣及肉様腫ヲ眼胞上ニ生スル者モ亦上法從テ之ヲ除クニ宜シ○

初生ノ小兒或ハ海棉状ノ赤腫ヲ発スル者アリ之ヲ覆盆腫ト名ク之ヲ截ル寸大タシク出血スルカ故ニ之ヲ切斷スルヲ林示ス唯腐菜ヲ用テ之ヲ消ス

七 淚道病

淚鼻腫脹 エニカンチス

「證候」淚鼻或著ク腫脹シ之ヲ望ミ赤色ノ息肉内背ノ部ニ頭レ出ルカ如キ者アリ其症ハ眼胞ヲ全ク合スルニ能ハル者又ハ淚点ノ淚液ヲ嚙収スル作用ヲ妨碍スルニ至ル○其證三種アリ所謂第一種其部独リ腫脹スル者ナリ第二種ハ其部膿化スル者ナリ第三種ハ其部独リ異常ニ長大ヲナシテ而テ痛キ者ナリ

原由淚鼻ノ腫瘍ハ大約熾盛燧衝ノ属症ナリ然レモ或ハ較然タル瘡目モ十ク之ヲ発シ来リ乍ナク悪性ニ陥リ易キ者亦アリ
治法淚鼻燧衝スル者ヲ治スルニ尋常燧腫ヲ治スルカ如シ○之ヲ行フテ尚効アラザル者ハ乱裁ヲ行フニ速ニ之ヲ除クニ得ヘシ或異質夫形ノ小物斷淚鼻ニ刺入スル者アリ之ヲ知ルニ且タ難シ○淚鼻ノ負膿セニトスル者ハ

決メテ之ヲ催進スヘカラス若ク之ヲ催進スル寸ハ其部乍ナク消耗シテ不治ノ淚崩ヲ続発スルカ故ナリ○若其已ニ淚鼻腫脹スル者ハ速ニ其腫處ヲ破開スヘシ如此寸ハ其腫速ニ消ス淚鼻異常ニ長大ヲナス者ハ抵手法ヲ行フシ○其異常ニ長大ニテ無用ナル部ヲ鉸子ヲ用テ之ヲ剪斷シ其後乾愈ニ草ヲ帖メテ愈スヘシ○此術ヲ行フニ由テ出血甚クハ輕々ニ腐菜ヲ用テ之ヲ止ムヘキ至ルナリ○其長大ヲナス者ト雖モ亦極テ其ニキニ至ラザル寸ハ手術ヲ以テ之ヲ截リ去ルニ多ク外ヨリ収斂ノ策ヲ用ユル寸ハ恐ク自ラ縮小シテ其故ニ復スル者アラシ

淚囊燧衝膿潰 アインゲイロフムアーゲイロフス

「證候」這個燧衝アインゲイロフスノ所在ハ皮下淚癭轉移シ易シ但シ其病已ニ上ニ速ル所ノ部位ニ滋蔓スルトモ其ノ他ノ淚器ニ及無キハ之ヲ治メ寛解ヲ得ルニ亦難キ非ス其燧衝大盛者ハ遂ニ膿ヲ生スルニ至ルアーケイロフスニ其部自ラ潰破スル者ハ其病深ク淚道ニ及分ルニ可知ナリ
原由此病自ラ尋常眼燧衝ノ諸目ト異ナルアルニナリ○然レモ瘰癧性ノ自ラノ之ヲ発スルニ最多シ
治法燧腫ノ初発ハ微々衝動ノ策ニ宜シ外未達破ノ溶化水及ヒ之ニ羅独密寫

ルヲ加フル者ノ如シ若潰瘍ヲ生スル者ハ医ヲ治スルノ天機ニ信セテ潰破
セシムヘシ如此等其瘡大抵速ニ治ス此病潰瘍ニ及テ危篤ヲ生スル罹アルナリ
淚癭 **ロスチユラクリマリ**

證候 淚囊外潰破シテ癭管狀ヲ做ス者ハ之ヲ淚癭ト名クシ○然ルニ古者
リメ凡ソ淚道ノ諸病内淚液ノ嚙収ノ方為ニ妨ケラル者ト及其排泄ノ方為ニ妨
害セラル者ト諸症ヲ一切皆淚癭門ニ属ス是ヲ以テ淚液ノ異常ニ淚囊ニ聚リ
テ腫脹スル證ト淚囊水腫及其癭管潰瘍如キモ亦理ニテラスト金一切皆此
篇ニ等ス○然トモ上文ノ諸病ハ細ニ其形質ヲ論スルハ其性本自ラ大ニ異
ナリ所リ但其度ノ劇易重輕ニ隨テ其名ヲ殊ニスル者過ナリトテ別テ分
ニ掲クル者ハ却テ人ヲ悩然トノ其歸宿スル所ヲ失フニ至ラシム○是ヲ以テ余輩古
人ノ論據リテ同種ノ諸病ハ皆淚癭門ニ收メト云フ○凡ソ癭道ノ諸病劇
易ノ度トテス然レモ世医太約之ヲ分テ四等トス○第一等ハ淚囊獨リ腫脹
ニ疼痛ナク癭管ナキ者ナリ○此症内皆ノ部ト腫團々タルヲ其候ト大腫上
ヲ推スルハ必ス透明水様ノ液ヲ洩ス○此時ニ方ツテ病人多ク淚鼻乾淚
囊非常ニ脹溢スル症アルニ其候ハモ患フル所アルナリ○疾ハ此度ニ

由ルニ數日或ハ恒ニ如此ニテ遂ニ難治ノ病ヲ起サル者アリ又此症治メト雖モ時
ヲ刻定テ又再發ス○病這等ニ在ラナイトロフブスサソクシラクリマリスト名ク
○第二等ハ淚囊ヤ腫脹スルニ甚ク之ヲ按メ前比スレハ較堅キヲ覺ヘ時
癭管ノ赤色アリテ癭管作徒ニ漏泄ノ液膿如シ○此時ニ方テ癭管ヲ切ス
マント欲スル扱ヲ忌ム防スルニアル時ハ病這等ニ至ルト雖モ又自ラ之ニ懸
念シテ其形状ヲ變惡スルナリ○又此症淚囊癭管ト相變換シ易シ○第三等
ハ先ツ熾盛ノ癭管ヲ生スル後其部外潰破シテ癭管ノ瘡口ヲ十ニ其口ヨ
リノ膿淚交々流ル者ナリ此時ニ方ツテ淚液復々癭管ニ滯テ漏ス而鼻
孔モ亦閉塞シテ通スルナリ○病此症ニ至ツテ癭管ノ名義始テ穩當スル
足レ或ハ其初發第一等ヲ歷ルニテ淚道熾盛ノ癭管淚囊外部癭管或
ハ其潰膿ヨリノ癭管ヲ生ス者ナリ○以上ノ諸症ニテ癭管ヲ生スル者
或ハ直ニ淚囊上ニ於テ生ス者アリ或ハ其近傍ヲ生ス者アリ○第四等ハ淚囊
潰破其部ニ海棉様肉ヲ生ス○這樣ノ證ヲ生スル者ハ淚管ヲ切レカ爲ニ帶累
セラレ因テ腐骨ヲ生ス○腐骨一名生スルハ便ナ近傍諸骨ヲ侵蝕シテ遂
ニ危篤ニ陥ルニ至ル但病這等ニ薄ル者ハ觀ルニ希ナク一症トス之ヲ要スルニ久擔
閣ヲ治ニ急ルニテラサレハ此症ヲ生スルナリ

原由此疾ノ通常ノ起回ハ鼻管ノ閉塞ナリ涙液ノ出路妨害セラルナリ而シテ之ヲ燥乾スル者其回又一ナラズ貴傷鼻痔鼻骨ノ破碎ノ類皆其回ニ歸スヘシ又癢管ヲ入スノ回ニ屬スル者ハ酷厲ノ涙液涙囊ヲ刺戟シテ遂ニ其内面ニ輕ニ刺戟ヲ發スル者病極ノ動機涙囊ノ虛衰鼻底ノ微衝或ハ面上ノ微衝ヲ發シ其勢涙道ニ及フ者器質虛衰涙囊固有ノ動機虧損スル者皮上暫久ノ班疹假令ハ痘疹疥癬ノハルカム病梅毒癰疽痛風等ナリ

治法涙液ヲ治セント欲スル者ハ其元ニ求ル原由ハ什麼ニ起リ之ヲ治スル内外諸藥ハ又什麼物ヲ要スルヤ否ヲ仔細察察シ其果ニ這因ニ原ツキヤ否ニ這果能ク之ヲ治スルニ定ム決定スルハ實ニ醫師此病臨矣夫法トスヘシ○内服ニ承劑安貨及扭劑劑亞格尼篤ノキアキニ公失鳩若荒菁膏等皆其回ニ志シテ之ヲ用テ大効アリ○第一等及第二等ノ症外ヨリ施スヘキノ諸竹ハ上下ニ述ル者ノ如キ日淚囊中瀦留ノ液ヲ輕々按摩シ出スヘシ之ヲ行フ間兼テ衝動強壯スルハ大過不及ナキ適切ノ劑ヲ用ユヘシ○其第二等ノ症微衝ヲ生スル者モ亦仍前法ノ如ク効テ之ヲ按シテ其膿ヲ漏スヘシ○其他輕々衝動分消散スルハ某假令ハ鉛筆水蓬汝外赤化水或ハ亞鉛若水民埜列里精ニ失鳩若與發斯地惹若皇斯ヲ加フ者復阿芙蓉膏水銀膏冷水及収斂諸煎也已上ノ諸劑其半ハ亞涅尔ハ小斯トビ

其ヲ用テ之ヲ淚囊ニ注輪シ其半ヲ以テ外ヨリ之ヲ摩擦シ或ハ眼水トシテ日ニ兩回眼角ニ點入スヘシ○淚囊中ノ涙液溢滿シテ害ヲ生セトスルニ至ル者之ヲ緊ク遏絶セント欲スルハ一種壓搾ノ器械ヲ施スヘキ極ニ佳ナリトス○之ヲ施ス間謹慎シテ之ヲ用テ通法トス○脂雨見ノ擦器ハ最適ナリトス○或ヤエルク又ハ海綿ノ小片ヲ取テ其置膠膏ヲ貼テ之ヲ固着セシム守又能按定ノ効アリ○涙液鼻中吸入シテ乃チ通テ○以上ノ諸藥効ナク漸ク進ニテ第三等ニ至ラントスルノ惟アリテ所謂鼻淚癢ニ遷移セント欲スル者手法ヲ行フヘシ○鼻孔閉塞ヲ通スル諸器及諸手法之皆前輩ノ發明ヲ經タリ然レモ太抵皆病情相適セズ動スレハ大害ヲ生スルニ至ル者多シ○諸家手法中ニ其最上者ハア子ルメヤシカニスヲホレトアリサルホウカールウ正コトモイリキルイユリ子コラスソステイニリクトルコルリルコキエルセコソテニ等術ナリ諸家裡ニ就テ令リクトルコツテニ人説ヲ掲ケテ以テ足レリトス其仲ノ諸説ハ之ヲ口演ニ付スト云フ

手法之ヲ行ハント欲スル者先ツ淚囊ヲ外ヨリ透截シ之ヨリメ消息ヲ下ニ透ニ深ク之ヲ輸入シテ鼻孔ニ透徹セシムヘシ○之ヲ施スノ間子細ニ意ヲ用テ之ヲ行ニ夢淚囊ノ後面ヲ毀傷スルコトアルハカラサルナリ○医小カコラシセツタニ接

刀或内翳刀尖ヲ用テ腫大スル所ノ淚囊上ヲ揮テ之ヲ刺ス尔後刀尖ヲ微シク
上ニ輪シ更ニ創ヲ截開テ適宜ニ大ニス○已ニ其口ヲ截開ス少後直ニ淚囊中ニ
綿撒絲ヲ填シメ小鞭膏ヲ其上ニ帖ス此ノ如ク放頓スルノ四五日ハ然ル
所以者ハ嫩衝ヲ生スルノ惟アルヲ以テナリ已ニ其慮ナキヲ知テ後便キ米湯
ノ消息子或ハ莫大小鍼ヲ用テ鼻管ヲ刺シ透スヘシ○消息子鼻管ヲ過テ
已ニ鼻底ニ達スル者ハ病人必ス二滴ノ血ヲ鼻中ヨリ流出ス其微ナリ○已ニ鼻
管ヲ開達スルノ後琴弦ヲ其中ニ刺シ淚囊中ニ綿撒絲ヲ容レ半月形ノ
硬膏ヲ造リ其創口ヲ蓋フ○此時外科第一着ハ鼻管ノ新ニ通スル者ヲメ
漸ク以テ巨大トナラシムアリ之ヲ爲シト欲スル者ハ此部ヲ潰膿セシメ衛
前ニ比シハ巨大琴弦ヲ容ルルヲ須ツヘシ○其法毎朝琴弦ヲ換ヘ新ニテ六日
或ハ八日毎ニ始ヨリモ巨大ナル者ヲ換ヘ入ヘシ○前ノ如ク且テ行フ一三週十守ハ
其終ニ至テ極大ノ琴弦ヲ通スヘキニ至ル○此寸ニ方テ琴弦ヲ更換スルノ毎氣
テ茶汁ヲ注射スヘシ如此ク守ハ體ノ物ノ力ヲ爲シ湯洗シ尽サレテナリ第
四週ニ至テ鼻管ヲ始メテ通スル部ニ約巨大ヲ做ス○此時鼻管ノ瘡ヲ愈ス
力ヲ爲シ乾愈劑ヲ注射シ綿撒絲ヲ代テ鉛製ノ消息子ヲ挿入スヘシ但シ舊
注射法ヲ行フ者ハ必ス其消息子ヲ去テ後ニ此ヲ行フ○芽八週ニ至テ及テ鉛製

息子モ亦之ヲ除キ去リ硬膏ヲ以テ瘡口ヲ蓋フ如此寸ハ二日ニ其瘡自ラ
口ヲ斂ム治法於是方始メテ大成ス○此部ノ説ハハシク之ニ異ナリ先ツ鼻管ヲ
刺シ通スル前法ノ如クメ後金管ヲ造ツテ鼻管中ニ挿入シ淚液金管ニ循テ
適宜ニ流出スルヲ候ヒ金管ヲ去ルノ時メ其創口ヲ斂シ半年ヲ過ル後鼻
管復々閉塞スルノ患ナキヲ察シ再ヒ原外ヨリ截開シテ中ニ容ルル
ノ金管ヲ取出ス亞尔涅滿ハ此法ニ據テ此病ヲ瘡シ大効ヲ収ムト云フ○手法
ヲ行フ後屢々之ニ鏡テ大害ヲ生スルヲ觀ルルアリ例スル淚道瘻ニ或ハ實膿及
淚道至腐化淚崩無止時下臉外反等諸患候ナリ○或思ラク此症ヲ發ス者
ハ此手法ノ外ナリト遂ニ切手法擴付シテ用スルニナシ○其第四等ニ至ル者ハ
淚囊潰瘍ヲ生シトナリケル膏太抵腐骨トナリ○病此度ニ至ル者ハ淚道
淚液ノ通竇ヲ上文掲タル所ノ法ニ隨テ尽ク其故能ニ復スルヲ爲得
ヘカフナル者多シ○太抵此症潰膿スル者ハ尋常用ル所ノ藥劑ヲ以テ之ヲ通
止シ腐骨ヲ生スルノ部ニ之ヲ除キ去リ宜シ若其排ヘキ者アラハ新ニ淚
道ヲ造ツテ淚液ヲ此道ヨリ導キ去リ實ニ這等ノ疾ヲ治スルノ大綱
トス此標記ニ連セト欲スル者ハ其瘻口ヲ截開シ采頭ノ利刃器ヲ用テ
淚骨ヲ鑽開シ腐骨ニ罹ル部ニ之ヲ截リ除クヘシ○其瘻口只綿撒絲或

膀胱皮ヲ帖シ其瘡乾テ全ク愈ルニ至テ止ム○淚道ハタヒ之ヲ開通不
爲ニ妨得セラルル多シ○故ニ此疾ノ治法ハ大細ハ腐骨ノ將ニスニマントスル
勢ヲ遏ムルニ其瘻瘡ノ如キハ終ニ不治ノ症屬ストスラ

淚點淚道諸病

證候淚點及淚道ノ諸病種々ナラス 此部或ハ嫩衛スル者アリ化膿
ル者アリ潰瘍ヲ生スル者アリ遂ニ瘻合スル至ル或ハ癰疹ヲ此部ニ生スル
者アリ腫脹スル者アリ病様ノ動機ヲ做ス者アリ○或ハ此病種々ニ此
諸症尺ク倫ラサル者屢コレアリ○又此部ノ諸病ニ臨テ診決太ク錯誤
ヲ致ス者亦屢コレアリ然レモ患室ヲ被ルノ鼻ノ獨リ乾燥シ淚崩止
時ナク而メ淚囊ノ部ハ却テ自ラ腫脹セザル等ノ諸症ヲ參考スル時ハ自
ラ彼此ノ疾ヲ診決スルヲ得ヘキナリ
治法ノ大細ハ手法ヲ行テ閉塞スルノ部ヲ開通スルニアリ或ハ此ヲ行フカ爲
ニ消息子ヲ用ル者アリ或ハ亞涅兒ノ小瓶トシ篤ヲ用ル者アリ這ノ斯ト
乙篤ノ如キ或ハ尺ク大熱ヲ達スルノ能ハスト雖モ然トモ這個極小ノ細管別

ニ中庸ノ術アリテ以テ之ヲ開通スルノ能ハサルカ故ニ己トテ得ス此射注法ヲ
行フニ若シ若シ淚道ノ疾ハ中庸ノ術ヲ施シテ効ナキ者ハ手術ヲ行テ新ニ其道ヲ
造ルノ說アリ之ヲ行フト金匠大抵良効ヲ收ムルナリ○肺ノ終ニ說ニ新
ニ淚道ヲ造ルノ部ハ淚阜ト下眼ノ上面ノ處ニテスヘシ蓋シ此部ニ新淚道
ヲ開ク時ハ淚液淚囊ニ注ク道極テ順ニメ且ヤスキカ故ナリ

灰翳 カタラクタ

証候「灰翳ハ水晶體或ハ水晶囊ノ病的ノ發質ヨリ生スコレヨリメ上ニ
掲クル諸器通光ノ室體ヲ失ヒ強固ノ質ヲ變シ又并セテ其色沢屢
變スルニ至ル○此症太約徐々ニ生スルヲ其常トス然レモ或ハ乍ラ此病ヲ生シ
預ニ頭等ニ外ル者モ間亦コレアリ○其初テ発スルヤ病人諸物ヲ視ルニ皆
如霧ヲ隔テコレヲ望カ如キヲ覺フ○己ニ如霧ヲ隔テ重テ復テ病人
遂ニ角ヲ隔テ物ヲ見ルカ如シ○終ニメ病人全ク其眼ヲ失ヒ一切目ノ事
物皆之ヲ辨晰スルコトアタス但シ瞽盲ノ極トモ金匠光眼ノ闇黒トテ辨
スルコトハ乃チ皆之ヲ能ス○外ヨリ之ヲ望メハ直ニ瞳孔ノ後ニ白クメ灰色
或ハ黃色ヲ帶フル翳ヲ生スルヲ見ル其翳瞳孔ノ正中ニ於テ益々甚シ

○水晶體ノ周圍外ヨリ之ヲ望ムハ黑環ノ如ク中ニ刮白ノ核実ヲ纏繞スル者
似タリ○鬚ノ所在ニ随テ灰鬚ヲ分ツテ數種トス其尋常善性者ハ
一水晶鬚カタククキリスタル水晶體曇暗スルヲ云○第一水晶鬚
「キリスタルカプス」水晶體本自曇暗セズ其囊獨リ鬚ヲ生
スル者ナリ○第三カタククインテルスナリシ没尔我屈涅液其透明
ヲ失フ者ヲ云フ○太約水晶體ト其囊ト俱ニ曇暗ヲ致ス者多シ○
但シ右ニ指示スル如ク其種一ナラカハ未タ手法ヲ施サズ前コレヲ
診決スト雖氏惟其症ヲ推測スルニ過サナリ○若夫其鬚ノ色沢ト其剛
軟ノ質トヲ以テコレヲ分別スル又亦數種アリ○其色ヲ以テ之ヲ言フ
水晶體ノ中央ノ部位ニ獨リ白処或灰色アルヲ見ル此物一タヒ見レテ復タ
蔓延セス獨リ其処ヲ保ノ動クナシカタククセントラリ或ハ鬚小線ノ
如ク横ニ腫孔ヲ貫ク横線鬚或ハ木柳鬚カタククシシアタカタラクテハ
レシ或ハ小點或ハ線紋ヲ生スル猶這ノ大理石光如キヲ見カタククテハ
ガタ或ハ鬚乳白如キ者アリ○此ヲ名クシ乳鬚ト云カタククヒユレシ
ラシテア此証眞膿ヲ生スル者アリ又水晶體溶解ニ由ル者アリ又其鬚眞
珠色ノ者アリ或ハ其黄ナル琥珀如キ者アリ血紅ノ者アリ緑者アリ黒者アリ

褐ヲ班ヲナス者アリ若夫鬚ノ剛軟ニ就テ之ヲ言フ寸或ハ甚タ堅ク骨
ノ如ク石ノ如クコニ目テ大約尋常者ヨリ小ナリ堅鬚或ハ其鬚中心堅ク
シテ按ヲ藏スルガ如ク而シテ其周圍ノ液ハ頗ル容ケテ傑列シノ如シ常鬚
或ハ其軟ナル新鮮ノ乾酥ノ如キ者アリ乾酥鬚カタククカセラズ或ハ
傑列シノ如キ者アリカタククヒユレシタ或ハ全質尺ク融解スル者アリ
カタククタフリユイタ水晶體或ハ甚タ溶解シテ全然水泡ノ如キニ至ル者
アリカタククセイイナカ又鬚ノ一種震鬚ト名クル者アリカタククモヒリス
トレミユラスリユクキユアシス○此証水晶囊ノ硝子包ニ連者其連接相離ル
ニ回テ乃チ至ス其連接既ニ相離ルカ故ニ水晶體動揺シヤスクヤシク目
ヲ役使シ或ハ身体ヲ動作スト雖氏水晶體乃チ腫孔後ニ於テ震掉遍
スルヲ見ル此症乳鬚ニテ通常觀ル所ナリ○其鬚尚軟ニ堅カラ
サル間ハ之ヲ命シテ未熟ト云フ其較堅ク恰當ヲ得ルニ及テ乃チ之ヲ名ケ
テ始メテ熟ト云フ又鬚ノ周圍一処曇暗セザル者又名ケテ熟鬚
ト云但此鬚法尚未切實トスヘカラス○凡ソ鬚ヲ致スノ原由尺ク去リ
了ル者之ヲ熟ト名クシ其回仍舊遲シテ去サル者ノ如キハ之ヲ未熟
ト名クシ此實ニ第一良法ナリ○或ハ水晶體及ヒ囊外ニ曇暗ヲ生

スル者ヲ見ルルアリ○或ハ膿眼ヲ患フルノ後細線ヲ水晶囊ノ前面ニ生シコ
レヨリノ遂ニ視力昏暗ヲ生スル者アリ○又緑翳初テ生ノ際瞳孔割白ニシテ恰
モ烟霧籠罩スルカ如キノ状ヲ見ス者或ハコレアリ○或硝子液ノ深处水晶囊ヲ
容ルノ部曇暗ヲ為ス者アリカタラフク多クハイアロテ又異常褐色ノ膜水
晶囊前面ニアツテ生シ視力ヲ妨クル者アリカタラフク多クハイアロテ又異常褐色ノ膜水
初延ノ嬰兒瞳孔全ク閉ル者アリカタラフク多クハイアロテ又異常褐色ノ膜水
翳ノ度々タリ而シテ動スレバ迷途ニ陥リヤスシ然レモ細心ニテ之ヲ點檢セバ
翳ノルト至ルトラ剖判スルイマタ難カラシキ○又翳ノ黒翳ヲ合併スル者其
切要ニテ忽ニスヘカラス○而シテ此症手術ノ効驗ヲ建ツル能ハサルニテコレヲ
辨識スルモ復タ太々難キニシ○此症ヲ診スルニ臨ニテハ黒翳ノ本然ノ微候ヲ細
心體會スヘシ○但シ灰翳ノ手法ヲ施スト雖モ黒翳ヲ生スルコトナシ
原由諸種灰翳ヲ生スル遠回ハ水晶體及ヒ囊液衝狀ヲ生スルアリ
一タヒ嫩衝ヲ生スル後其部或ハ強硬或ハ溶解或ハ質膿或ハ潰瘍ヲ生
テ遂ニ本証ヲ成スニ至ルコト大抵然リトス○又局部ノ嫩衝眼上ノ打撲大咳下劇
シキ震掉等々毎ニ灰翳ニ統テ之○又灰翳ノ証傳ワリ伏回ヲナシ其終ヲ
得ルニ至テハ必ラス之ヲ頭ハス者アリ○凡ソ眼目ニ諸液ヲ蓄積シ若クハ嫩衝

ヲ生スルノ諸件譬ハ強テ久シク光輝ヲ見或ハ強烈ノ飲液ヲ過用シ或コレ
ヲ誤用スルニ因テ眼目ヲメタ々虚衰セシムル諸回ハ皆此ヨリノ灰翳ヲ
生ス○又皮上ノ熱性ヲ挾ム癩疹皮膚病ノ轉移痛凡列爲麻室斯密私
ハルヲルム様ノ疹時毒失苟見陪苦様ノ惡液眼ニ轉徙シ或ハ腹中ノ
蓄積ヨリメ毎ニ屢々灰翳ヲ生スルアリ○又灰翳内ヨリ生スルニ至リ
及フ者ハ眼ノ諸症ノ外又他ノ身上ノ諸症ヲ統テ之○又一回ニ黒翳ヲ生スル
有テ更其他ノ一目灰翳ニ罹ル者アリ
治法内翳ハ太約手法ニ非レバ治セサル者タリ○或ハ内翳ヲ治スルニ内服藥
ヲ行ヒ大ニ効驗アリト云テ諸凡ノ治例ヲ掲クル者アリ太約皆病ノ真機ニ
暗キニ坐ス○唯内翳初テ生セントスル際或翳水晶囊ノ曇暗ノミヨリ生メ
已ニ手術ヲ行フ後遺翳ノ生スルヲ防ント欲スル者ノ類ノミテ藥劑ヲ行テ
効アリ○局部ノ方策ハ幾ニト効ナシト云シモ亦可ナリ○古昔ノ眼科核魚
八目鱈等ノ膽ヲ用ユ○蓋當時ノ醫家ノ認メテ灰翳トナス所コト者ハ
即チ眼ノ外病タル一疑ナシ○其内服諸劑ヲ用ヒテ内翳ヲ分消セント欲スル
ヨリハコレヲ生スル所以ノ原由ヲ除キ去リテ遂ニ其翳ヲ全ク化熟スルニ至
ラシメントスルノ標記ヲ以テコレヲ用ユルノ的實ナルニ如カス故ニ體中内翳ヲ

生スル所以ノ原由譬ハ六痛凡梅毒瘰癧疥癬皮膚病内潜久瘡乍愈等ノ如
症アル者ハ各病ニ適當スルノ藥ヲ行フニ宜シ○其佗下ノ衝動劑渾テ大効
リ○即チ未劑安質受切劑麻葉タトハ亞格尼篤其苦若失鳩峇我幾斯劑
匪王失亞密ナリ裡ニ就テ最モ効アル者ハビ元サケルヲ粵幾斯ナリ○又竜腦
揮発硝砂精粵列幾多兒鼠婦モ亦疑ラクハ効アリ○内醫ノ諸症十七
ハ手術ヲ施サル者ナリ○然ル所以ノ者ハ此術實ニ希有ノ一法ニ屬スルヲ以テ
ナリ○然レモ間又此法ヲ行フ者アリ或ハ内醫ノ症ニ此術ヲ施シ難キアリ
其手術ヲ行フ後モ百中必効ヲ保シ難シ或ハ疑似多ク其何ノ症タルヲ
決メ術ヲ施シ難キ者アリ○診候ノ間至佳ノ症ト認メ做ス者モ亦其必
効アルヲ期シ難キカ故ニ其不可ノ間ヲ精漸スル實ニ至重ノ事業ニ屬ス
爾後病人尚幼ナル者ハ病人頭痛ニ眼炯衝ニ毒明ヲ患ヒ在再トモ瘡ハ
或ハ差ト魚疔復発シ今尚其証アリ或ハ今ハ已ニ瘡ニ者モ俱ニ手術ヲ施スヘカラス病
歴節聖言健痛々風齒痛ヲ患フル者咳嗽アル者内醫ニ罹ルノ眼或ハ大ヲ修
小ヲ做ス者内醫ノ諸外虹彩ト相愈合スル者皆マタ手術ヲ施スヘカラス又醫
ヲ得ルト魚疔病人仍尚物ヲ見ル者モ亦術ヲ行フヘカラス蓋ニ手術ニ必効
アルヤ否ヤハ固ヨリ豫メトスヘカラスハ以テナリ又其一目独リ眇スル者モ亦術

ヲ施スヘカレ又又疔翳ヲ得ルノ外更ニ黑翳ヲ狭ム者モ亦同シ○然レモ間
手術ヲ行フニ由テ黑翳再ヒ大効ヲ奏スル者アリ○其手術ヲ施スヘキ
ノ証及ヒ之ヲ行テ後大効ヲ僥倖スヘキノ証ハ乃チ病人内醫ヲ除ク外醫
中別ニ患フル所早キ者内因発動ニ遂ニ眼ニ及フニ証ニアラサル者瞳孔自カラ
縦マニ収張シ其運動敏捷ニ其孔正圓天然ノ本形ヲ失ハサル者翳ト虹
彩ト少シク相愈合スト雖大甚ナリ者ハ手術ヲ行フモ亦自ラ妨ナシ病人
内醫ヲ得ルノ間モ亦頭痛眼炯衝屢々発止スルノキ者病人能ク明暗ヲ
辨別スル者翳虹彩ノ後面過不及ナキノ地ニ位シコレヲ除ク外眼目別ニ患フル
所口クノ平康ナル者等ナリ○中年ノ人ニ手術ヲ行フハ知弱ノ人ニ比スレ最
モ大効アリ○其大効アル者ト魚疔其未タ病サルノ前ニ比スレハ物ヲ見テ精
微ヲ致スヘキ故ニ此人モマタ翳眼鏡ヲ用ユヘシ○病人モト短視ニ
今内醫ニ罹リ手術ヲ行フ者ハ大抵他ノ故ト短視ナラサル人ニ比スレハ其明得
ルニ殊ニ多シ
豫備手術ヲ行フノ前病人ニ豫備スヘキノ法アリト雖トモ病人モシ目疾ヲ除
外更ニ患フル所早キ者ハ必スシモ之ヲ行フヲ須ヒス假令之ヲ行フモ當ニ益ナキ
ノミニ非ス却テ甚タ害ヲ貽スニ至ル○凡ソ手術ヲ行ハント欲スルノ前當ニ為

ヘキノ事件ハ先ツ病人ヲメテ手術ニ由テ善効ヲ收ルヲ希ヒ望マシメテ恐怖憂愁
スルコトアリテシテ必ク為シ醫マシテ須ラク開諭百端其心ヲ効メテ安静ナラシム
ヲ要スヘシ又効メテ忌ムコトヲ守ラシメ諸凡辛熱ノ飲食ヲ謹ミ辟シメ最難化ノ
者ヲ物ヲ禁スヘシ又コレヲ屢々大氣中ニ運動セシムヘシ手術ヲ行フ前半時
許テ向テ芙蓉少許ヲ服セシムルニ宜シ○然レモ病人健全ナラサル者ハ恰當
ノ菜ヲ行テ先ツ其所患ヲ除キ去リ病悉ク瘥ヘテ後始テ手術ニ從事
スヘキナリ但此事ハ皆輕易ナリ知リ易キノ類條ニメ余カ開截ヲ須タス
○手術ヲ行フ四時皆宜シ但病人寒熱身ニ適スルヲ最要トス手術ハ効テ
難事ノ擾攪ヲ省キテ後コレヲ行ハサルハカラス○手術内醫ニ由テ醫官
ヲ致ス者ハ之ヲ除クノ手術ニ道アリ○晶體曇暗者ハ其本ヨリ位スル所ニ
即チ之ヲ眼底ノ下際ニ墜下スル寸ハコレニ由テ光線ノ通路ノ故ト壅塞スル者
今マテ再々管々光輝瞳孔ヲ歴テ内ニ入り来ルコトヲ得ルニ至ル是ヲ第一法トス其處ニ
法ハ角膜ヲ截開スルノ後其翳ヲ為スノ体ヲ拳ケテ及クコレヲ眼内ヨリ抽捨ス
ナリ○其第一法ハ墜下ト名ケ其第二ヲ抽捨ト名ク○以上二道ノ手術各切害
得失アリ

〔墜下〕此術ヲ行フ間用元所ノ器内翳針ノ両刃ニメ其前區平或ハ穴注ヲナス

者一具眼眦ヲ鈎上スルノ鈎子一具○椅子ニ高ク欄ヲ設ケ恰モ背ヲ靠スル痛
ス者脚ヲ置キ病人其上半ニ靠リ坐シテ光輝方ニ鼻上ヲ過テ斜ニ施術セント欲
スル眼内ニ明ニスルコトヲ得セシメ随テ其他ノ眼ヲ紮定シ近ク病人ノ側ニ進
或ハ坐シ或ハ立ツイ意如シ○一々者病人ノ背後ニ立ツ假令ハ其左眼ニ手術ヲ施サ
トスル者ハ必ク右手ヲ病人ノ頭下ニ安シ其頭ヲ以テ者ハ胸上ニ抵テ之ヲ按シテ
動カサラシメ別ニ其左手ヲ以テ病人ノ前額上ニ安置シ其指頭ヲ以テ上眶ヲ按キ開
キ或ハ鈎子ヲ用テコレヲ鈎止ス○是ニ於テ術者左手ノ次指ヲ以テ下眶ヲ下ニ
牽キ右手ノ次指ト次指トヲ用テ前ニ已ニ油ヲ塗タル所ノ擽翳針ヲ按キ
西人ノ羽筆ヲ採ルノ状ノ如クス○是ニ於テ病人ノ眼靜定シテ眸子正ニ術ヲ施ス
ニ適スル處在ヲ領スルヲ候フ後術者乃チ鍼ヲ下ス其部ハ角膜ノ邊緣ヲ距ル
一線眼ノ中心ノ下ニ白處ニ于テス其截口ノ片ハ上ニアリ其一方ハ下ニアリ
如クメ横ニコレヲ刺スル○已ニ鍼ヲ下スノ後一瞬間コレヲ停メテ動カスルコトナシ
ル後鍼腹區平ノ部ヲノ晶体ニ對置スルニ適セシムルカ為ニ之ヲ運動スルコト
回ス○其後鍼ノ眼内ニ入ルノ淺深ヲ考核シテ其術ヲ施スニ足ルノ長サヲ得セシ
ムコトヲ要ス次ニ鍼ノ區平ノ面ヲ以テ晶體ヲ下方及ヒ後面ノ方ニ墜下ス晶
體深ク後部ニ沈ミ潜ミテ瞳孔衝ニ當ラサル寸ハ鍼ヲ抜き去ルコト仍ハ晶体ヲ推

壓シテ又鍼ヲ停メテ動カサル一瞬時ニ晶体ノ一タヒ墜下セラル者ヲ再ヒ
浮ヒ上ルイナカラシメ其必ス浮上スルキヲ候ヒ而後徐々針ヲ抜キ去ル但コレヲ
抜キ去ルノ際ノ針ノ位置ハ始メ刺シタルノ状ノ如クナルヲ要ス○或ハ針ヲ用テ
僅ニ晶体ヲ墜サント欲シテ推ス一推シテ其體滑脱シテ眼ノ前室中ニ入ル
者アリ此証ヲ得ル者ハ抽換ニ宜シ○或ハ一旦晶体ヲ墜下スト魚尾針ヲ
上ル寸ハ体モ亦随テ高ク浮ヒ揚リテ墜下沈着スルヲ得ヘカラサル者ナリ○此
症ハ先ツ針ヲ抜キ去リ再ヒ墜下ノ法ヲ行フニ宜シ○ウヰルヒヒユク曰ク晶體
ハ獨リ其位置ヲ變メ之ヲ更ヘ置ニ宜シ之ヲ抽換スヘカラス始メ本ト其直線
ノ位置ヲ設ケシモノ今ハ更改シテ水準ノ法トナスナリ其法故ト前面ニ
向ヒシ者今ハコレヲ翻シテ上ニ向ハシメ其故ト後面ニ在シモノ今ハ又下ニ向
ハシメ其故ト下ニ向テ位スルノ処ハ今ハコレヲ前ニ向ハシム○此法尋常手術
ニ超ヘテ太々鴻益アリ此法ニ由テ硝子液酷ク其性ヲ變革シ医コレニ由テ破
碎ス○醫ノ左眼ニアル者ハ医宜シク右手ヲ以テ之ヲ行ヒ右眼ニ在ル者ハ又
コレニ反ス○シカルプアノ術ハコレニ異ナリ其法先ツ針ヲ輪基運動シ晶體ノ前面
ノ膜ヲ截リ去リ更ニ針ヲ進メテ水晶體ノ前面ノ半規ヲ把テ其位ヲ更ヘテ
之ヲ外頰ニ向ハシム詳ニコレヲイハル其上際ノ邊緣ハ又仍故ノ如ク上ニ位シ

其下際ノ邊緣ハ又仍故ノ如ク下底ニアラシメ其モト前ニ向イタル一面内ニ
向ハシメテ鼻ノ方ニ其位ヲ變シ其他ノ一面ハ却テ又顛顛ノ方ニ向ソノ位ヲ變セ
シムルノ謂ナリコレイセ曰ク醫ヲ腫孔内ニテ墜下スルノ法ハ先ツ針ヲ以テ
角膜ノ傍側ノ創ヨリ腫孔中ニ進マシメ水晶體ヲ截リ開ヒテ後水晶體ヲ硝子
液内ニ墜落スランゲシヘツクハ先ツ其若ク用テ腫孔ヲ開大セシメ而後其術
ヲ行フ○但シ其手術ノ如キハ人々コレヲ實驗シテ倍々之ヲ擴充スルヲ要スルニ
〔注〕福島萬曰クランゲシヘツク著ス所コトフルハシテリクコトアルニテゲラト子
キスコトアルホルンフリースステトキ此譯シテ角
膜刺論ト云此書モト其國語ヲ用テ著作シ和
蘭語已ニ釋行ス此書ヲ讀マ、自ラ其精説ヲ得テ且此書ニ本アリ彼是矣考
セハ益々其精微ヲ尽スニヨシ○蓋此時角膜刺法ヲ行フ效驗アルノ病人ニメロラ
スナラシランゲシヘツク慨然ト志ヲ勵マシ思フニ銳フニテ終ニ一家ノ法ヲ發明ス
ルニ至ル或ハ曰ク此法モ亦稱善スヘカラサルモナリ此等其書名ヲ以テ購求シテ読ムヘシ
手術ヲ行フ後目上ヲ熱住ス○其小ナル創口ハ太約速ニ治ス○病人二三日間
疾行驟歩頭腦身體ヲ揺動スルノ運動ヲ謹ミ避クヘシ但シ病者寢床ニ其
頭搭掛スルカ如クナラシムルニ宜シカラス且ノ如クナレハ晶體ノ墜下セラル者
乍ナ復々漂ヒ浮シテ故ニ度スルカ故ナリ○咳嗽嘔噦ヲ免スル者ハ手術ヲ行

フ後縫タト虫尾晶体復タ漂ヒ浮フ者アリ○墜下ノ後二日ノ翳再ヒ上騰スル者ハ抽捺ヲ行フニ宜シ○然レモ一旦墜下スルノ後久ヲ経スシテマタ上騰スル者ハ再ヒ墜下ヲ行テ可ナリトス 或墜下スルノ翳再ヒ上騰スル者ハ醋ヲ身ヲ蕩揺スルニ由テマタ自ラ降沈スル者アルヲミル○此等ノ事件ニアルニハ其症ニ應ノ用ユヘキ者アラシ

〔雜候病人或ハ貽翳ヲ得ル者アリ但墜下如キハ水晶囊ヲ弁ヒテ一脊之ヲ排下スルカ故ニ之ヲ得ルヘ希ナリ〕〔貽翳篇參考スヘシ〕○或ハ翳固着スル者アリ○病人此症ニ罹ル者ハ太タ多ク年術モ亦至テ施シ難シ○証ニ随テ鍼灸ヲ晶膜ヲ推スオハ愈着ノ処自ラ分レ離ル者多シ○或ハ翳輕ニ破碎シ易ク術ヲ行フノ間遂ニ外ニ流出スル者アリ○術後眼中渾濁スル者ハ二三日ノ後茶セヌメ自ラ治ス○眼中數多ノ物ヲ残スル此ノ如キ者ハ時日ヲ近握スル一ナク速ニ角膜ヲ開截シ残リ留リタル物ヲ水様液ト俱ニ洩シ除クニ宜シ墜下ノ後黒翳能キ起ル者屢々コレアリ然レモ徐々ニ自カラ消散ス

〔抽捺〕タヒールハ佛蘭西人千七百四十五年始テ此法ヲ發明ス○其法角膜ヲ截開スルノ後晶膜ヲ其囊ト俱ニ抽捺シ或ハ其囊ト俱ニ悉ク其全體ヲ外ニ抽捺ス○病人其目深ク眼窠内ニ位シ眶狹隘ノ者之ヲ治スルヘ每難シ

是ヲ除ク外其翳那個強軟ノ質アルモ皆コレヲ除クヘシ○其強固ノ者却テ術ヲ施シ易シ○術ヲ施スノ間用ユキノ器及眼球ヲ按定シテ動かサラシムルノ器械如キロヲ極メテ之ヲ讚稱スト虫トモ其一ヲ開陳シ其形状ヲ細写スルニ至テハ口陳テアラサレテコレヲ尽スヘキナル○尋常ノ器具ノ如キハ擧翳カニ個ナリ其最佳ナル者ハ刀脊直ニ宛勾セス其刃ノ面ハ其尖ヨリノ己ニ刃ヲ十シ其刃徐々ニ廣潤ナルヲ要スヘシ○擧翳針一本「タヒール」眼匙一柄鈎子一柄上眶ヲ鈎上スルニ用ユ小鈎子一柄眼銀子一柄眼鉸刀直キ者勾ル者各一本○兩眼上ニ托上スルニ供スルコシラズ細長ナル絆創コナリ

〔角膜截法〕医者病者ノ主法ハ皆墜下ノ條ニ具載スル者ノ如シ○眼ヲ鈎上シ及ヒ之ヲ按定スルノ法モ亦前ノ如シ○術ヲ行フ者刀ヲ採ルヘ猶ヲ寫翳ヲ標ルハ伏ノ如クニメキヲ病人ノ頬上ニ安置ス○病人ノ眼轉動已ニ定リ其在ル所口正ニ術ヲ行フニ適當ナルヲ寸ヲ須テ刀ノ脊ヲ上ニテシ刃ヲ下ニ向ハシメ外眥間角膜上白処ヲ距ルヘ半線ニ之ヲ刺シ入レ横ニ之ヲ截テ中央ヨリ過キ去リ前室ノ前邊過シテ内眥ノ同上ノ距離ニ至ル但シ刀柄ヲ前ニ俯セシメテ眼ノ内眥ノ白処ノ上臨分方如クナラサレハ之ヲ截ルヘ外眥ト同シキ寸法ニ至ルヘ能ハサナリ○此截法ニ由テ大抵角膜ノ半部ノカ為ニ截リ開キ尺ニサシ截餘ノ各片怡モ半規ノ状ヲ示

一タヒカヲ刺入スル寸ハ其カノ深サヲ保ス浅深上下スルイ十ク截テ内前ス
シ○若此法ニ欽遵セサル寸ハ未タ悉ク角膜ヲ截リ及サルノ前ニ水様液
截ロヨリ流出シ角膜皺縮シ虹彩前ニ突キ前ニ徑十二刀下ニ薄此ノ
如キ者ハ虹彩損傷ヲ被リ角膜ノ皺縮スルニ由テ截ロノ上下低昂相啓
シカラス終ニ全ク其術ヲ誤ルニ至ル○カヲ下スノ際虹彩刀ニ纏繞スルハ一
悪候ニ諸種ノ自ヨリメ之ヲ導キ起ス者タリ此ノ如キカヲ停メテ動ス
十ク故ト下脥ヲ下ニ割キ取ロ中指ヲステ輕ク角膜上ヲ按摩スル寸ハコレニ
回テ虹彩太約其故ニ復ス○角膜ノ截ロ悞テ太々小ニ或ハ他故ニ回テ狭小
ル者ハ故ト刀背ヲ以テ虹彩ヲ推按シタル者ヲ用テコレヲ切リ開キ或ハ鉸刀
ヲ以テ之ヲ截リ大ヒニスルモ亦得タリ或ハ又然ルイ十クニ速ニ眼ヲ熱定シ
一二日ノ後水様液再ヒ新ニ前室内ニ生スルヲ俟テ更ニ手術ヲ行フ○
モシ截法其宜ヲ得ル者ハ水様液流出ノ後晶體直ニ虹彩ニ薄リ竟ニ
瞳孔中ニ嵌入スルニ至ル○或ハカヲ前室中ニ刺入スルノ間晶體自カラ破綻
シ晶體モ亦自カラ前ニ突出スル者ナリ
截開晶體法ニ角膜ヲ截開スルノ後晶體ヲ外ヨリ壓シテ破綻セシムル
者ハ法ニテ之ヲ慎テ細心ニ之ヲ截開スヘシ○法兩双ノ内翳鉸ヲ以テ斜ノ角膜

ノ下際ノ側ヨリ之ヲ下シ少シク開轉メ瞳孔ノ正中ヨリ之ヲ輪シ入レ既ニ晶
囊ノ上ニ達スルノ後縱横ニ之ヲ刺シ破テ或ハ十字截ヲ行ヒテ最良ナリ或ハ
輪狀ヲ之ヲ截モ亦得タリ○如此ク從事シテ之ヲ行フ寸ハ晶體ノ後翳ス者
便ニ瞳孔中ニ脱出スヘナルノ説ニク晶體ヲ破綻スルハ其所ニメニナラス但
水晶體ヲ連子テ一時ニ之ヲ出シ除クヘシト○其法角膜ヲ截開スルノ後之ヲ
ンセツト様ノ針ヲ瞳孔内ニ刺入レ○尔后針ノ平坦ナル二面ハ上ノ向イ其他ノ
二面ハ下ニ向テ扱セス曲セス其針ノ最モ闊大ノ部ヲ平直ニ晶體中ニ刺
入ス○晶體ヲ把テ徐々ニ上下シテ之ヲ押壓シ其針ヲ轉シテ其平坦ナル二面
内皆ニ向イ他ノ二面ハ外皆ニ向ハシメ又左ニ右徐々ニ往來セシムルイ數遍遂ニ
此器ヲ抜キ去ル○其時指ヲ以テ推シ或ハタヒル匙子ヲ以テ之ヲ扶ケ晶
體ノ翳ヲ連子テ容易ニ抽換シ去ルイヲ得ヘキナリ○然レモ或ハ晶體
質此法ヲ施スヘカヲサル者アリ○其他此法ヲ用テ太々良ナリ
抽出道路内翳ノ腫孔ノ道路ニ循テ抽換スル者太々徐々ニ外ニ曳テ
之ヲ抽キ去ルヲ要ス所以ノ者ハ道路ノ腫孔ニ假テ之ヲ輸出スルノ間其四辺ニ室ヲ
テ腫孔ノ翳ノ力為ニ延長セラレ遂ニ腫孔ヲ破裂シ或ハ麻木スルニ至ルカ故ニ至
慎ニ謹テ之ヲ行ハサルカラス○此故ニ指ヲ以テ輕ク眼上ヲ接シ漸ク之ヲ強ク

シテ醫外ニ抽出シ来ルノ後之ヲ止ム○或ハ角膜ヲ截開スルノ後瞳孔太々收
小スル者アリ○此症病人ヲ閉目一霎時十寸ハ大都復々自ラ開大ス○若夫
抽捺ノ間全ク晶體ヲ出シ除キ去シモ其碎片ヲ中ニ残留スルハ外トシ
ムハカラス此ヲ抽捺ノ普通ノ法ト云○若其内ニ遺ス所ノ物アルハ外トシ
匙或ハ或水鏡法ヲ行テ之ヲ除キ去ルヘシ○若其中ニ小絲ノ如キ晶體ノ
碎片ヲ遺留スル寸ハ小ナル鉤子或ハ細小ノ鉗子ヲ用テ之ヲトリ去ルニ宜シ
行術除諸症細慎至謹ニテ術ヲ行トイヘ凡或ハ硝子囊ノ偶外ニ滑脱
シ出者アリ○其目ノ即チ其眼ヲ押スニ強キニ過ル者眼前ノ急硝子液
太々稀キ者又ハ容解スル者之ニ属ス○或ハ術ヲ行フノ後一二時ヲ仍其
囊外ニ滑脱スル者アリ其原由ハ大都熱住宜キニ適セサルアリ症候諸症
ニ由ルアリ病人ノ動作慎ヲ加ヘサルニ由ルアリ眼胞ヲ不意ニ拵開スル由アリ
七情感動ニ由ルアル等ナリ○大抵此症多クハ惡候ヲ發セス○此ヲ治スル
ハ別ニ術ヲ施スニ十クコレヲ弁置シ平常ノ如ク眼ヲ熱定スルヲ最良法ト
ス○如此スル寸ハ角膜ノ裁口愈合スルニ隨テ遂ニ自ラ脱出ノ部ヲ緊執ス
其部遂ニ脱落ス○或ハ瞳孔常ニ楕圓ヲナス者アリ然レモ病人ノ為ニ別
害アルナシトス○内醫或ハ虹彩ト愈々看シ或ハ硝子包ト愈合スル者アリ

○其第一症ハ手術ノ必効アルヲ期シ難シ其周圍悉ク愈合スル者ハ最難
○愈合未タ甚シカラス瞳孔尚縱收ノ機ヲ存スル者ハ少シク區ニ大ヒニ曲リ
タル消息子ヲ用テ其愈合ノ所ヲ離レシムヘシ又之ヲ扶クルニ鉸刀ヲ以テ
スル者アリ又用ユヘシ○其第二証ハパールノ鍼或ハパール子マシハスクルヲウエ
ルキトイダヲ用ヒ或ハ平常便用スル所ノ内醫針ヲ用ヒテ愈合ノ所ヲ分チ
離スニテ求ムヘシ此等ノ法或ハ大ナル天幸ヲ生スルニ間々コレアリ○晶體ト醫外愈
合スル者アリコレ天幸ノ一症トス何トシハ醫外ト其囊トヲ連子テ容易ク
拳ニ抽捺スヘキカユヘナリ○或ハ細心切慎ニテ術ヲ行トイヘ凡或ハ虹彩ヲ傷損
スル者アリ○這個ノ損傷ハ大抵惡証ヲ生スルニ十シ裡ニ就テ其創若シ研
切スルモノナレハ害ヲ為シ最少シ但虹彩破裂ハ上ニ比スレハ頗害アリ
○紫住術ヲ施ス後病人便チ能ク物ヲ視別スルニ大抵然リトス然レモ其喜ニ
象シテ妄瞻視セシムヘカラス若ニ再々及ブアレハ眼目コレカ為ニ甚タ割着
セラレ易キカユヘナリ○角膜ノ截口ハ外トシテ點ヲ用テ微ク之ヲ按シ其原形
ニ復セシム而シテ後先ツ軟カニ上臉ヲ引テ其上ニ被ラシメ後下臉ヲ合セシ
ムルニ宜シ○其手法ヲ行フタル眼ハ雙葉長ノ織片ニ膠膚膏ヲ攤開シテ
コレヲ貼シ軟タルコムフレスヲ兩眼上ニ輕ク搭掛スヘシ○病人手法ヲ施ス後

術ヲ行フカ故ニ角膜ノ下ノ半面ヲ截ル一十ク獨リ其外ノ半面ヲ截切
○彼方モヘラク此法ヲ行フ者ハ硝子液ノ滑脱シテ外ニ出スルヲ防クカ故
リコヘルハ眼球ノ白外ノ中ノ上部ヲ截リ此道ヨリメ後室ヲ鑽リ窓ヲ
中ニタヒールノ製シタル所ノ匙ヲ入レテ晶体ヲ按ヒ出サント欲ス○此術ヲ
行フ間許多ノ艱厄ノ事件アリテ且ツ切要ノ部ヲ損傷スルニ至ルカ故ニ
行ト難シキユヰリニハオークス子ツヘルヲ用テ其術ヲ行フ然レハ太々其術
ヲ誤リヤスシサンテニルリハ潤大ノフリートハキーノ上ニ高キ椅子ヲ設
ケテ医自ラ其上ニ坐シ○病者ヲメフリートハキーノ上ニ坐シテ病人ノ背ヲ後
ロニ傾ケ仰ヒテ術者ノ方ニ向ハシシ其頭ヲ術者ノ胸ニ帖シテ其術ヲ行フ○
坐法既ニ不便ニ且其姿勢制審因テラス然レ術者自ラ発明スル処ロ又ラ運シ
テ角膜中ノ上部ヲ直線ニ刺シ尔后刀ヲ内ニ拗曲シテ瞳孔中ニ輸入シ晶囊
着処ヲ漸ク離シテ後カラ抜キ去リ指ヲ瞳孔ヨリ医ノ融ヲ按シテ角膜上部
ノ創ヨリシテ之ヲ抽換ス○此法諸般漏脱ヨリ信用シカタシ

膜

カクタラクタメシフヲセア

コノ翳ハ水晶囊ノ渾濁スルナリ○其囊毎次晶融トニ接着シテ離レサル者ア

リ此如キ者ハ之ヲ連子テ抽換スル一尤為シ易シトス○若渾濁ヲナスノミニ
晶体ト接着セサル者ハ手術ヲ行フ間ニ囊破裂スル者多シ若シ其囊ヲ截開
スル者之ヲ出ス間最破レヤスシ○己ニ晶体ヲ抽キ出ス後囊ノ渾濁ノ所腫
孔中ニ掛リ留マルヲ認メ得ル者ハ銀子ヲ以テ之ヲ撰シテ外ニ輸出ス○此手術太
率太々為シヤスクメ且其術最佳ナリ○術ヲ行ハサルノ前既ニ翳ノ囊
上ニアルヲ認メ得ル者ハペールノ法ニ循テ晶融ト其囊トヲ連子テ之ヲ抽換ス
ルニ直シ

潰

カクタラクタメシフヲセア

細心ニ慎ミテ加ヘテ術ヲ行フト魚トモ亦尚此症ヲ遺スヲ免カレサル者ナリ然
所以者ハ手術ニ由テ其部嫩衝ヲ免シ凝固ヲナスノ性ヲ具スルノ列紙把其部ヨリ
滲液シ出サレ繊細ナル組織ヲナシテ瞳孔中ニ固着スルニ由テ免スル者ナリ○
如此ナル者ハ瞳孔コレニ因テ收小ヲナス○或此症貽留セル囊ノ渾濁ヨリ生
スル者ハ太々マレテ粘液ノ渾濁セル者中ニ掛リ留ルヨリ免スル者毎多ク
アリ斯ノ粘液ハ術ヲ行フ間虹彩ノ後晶囊ノ周圍ニ推取スルノ液術後腫
孔ノ中心ニ聚リ凝ツテ此証ヲナス者也○或ハ硝子液膜モ亦次テ渾濁ヲ為シ

ル患ノミヲ除クハ決メ全治ヲナスハ能ハス何者其脱処ヲ把テ内ニ容納ス
ト虫疔腫孔其本態ニ復スルイナク故ノ如ク頑硬ヲ異様ナルノ形横ヲ保ツ
カ故ナリ

瞳孔緊束

ビヒールウカウウサ

此病ヲ診知スルイ故ト難カラズ其瞳孔異常収小ノ者毎ニ視カヲ
減シ其全ク收束シテ開カサル者ハ盲ヲ発ス○己上ノ二症ハ獨リ其斂小ス
ルト全ク緊束ノ開カサルノ差等ニ随テ之カ區別ヲナスノミ其因ハ少シモ
異ルイナリ

原由ニ尋常ノ原由熾盛ノ眼焮衝ヨリ発ス若其焮衝ノ餘勢延テ虹彩ニ及
者ハ最此症ヲ発シ易シ○是以テ内翳ヲ抽発スルノ後モ亦此症ヲ発出ス
ルイアリ○或ハ外ヨリ来ル暴カニ由テ虹彩ノ膜ト角膜トノ辺縁ト相附着ス
ノ部大小ヲ論セス互ニ相離持スルイアリテ其処ニ於テ印圓ノ孔ヲ十ニ
至○此証ノ後縫イテ開テ全ク開カサル者多シ或ハ角膜ノ潤大ナル障翳
ニ由リ腎肉ニ由リ葡萄腫ニ由リテ瞳孔側ニ引カレテ収小スル者アリ○
或ハ病的ノ割網虹彩ノ衝動シテ遂ニ瞳孔ニ痙様ノ運ヲ発シテ斂小ヲ為ス

ニ至ル者アリ○痛凡家ニ内翳ノ術ヲ施ス後此症ヲ発スル者少カラズ凡
ソ光明ノ処ニテ小ナル物ヲ視ントシテ大ニ精神ヲ替メテ注目スルノハ最此病ニ
罹ルイ多シ○或ハ小兒瞳孔ノクシテ生下スル者アリ○或ハ瞳孔ニ異質ノ物ア
ツテ栓塞スル者アリ例スルニ潰翳膿膜眼等ニ発スル所ノ証ノコトシ
治法 痛凡癩癰斑疹等ノ内回ニ由テ此病ヲ発スル者ハ其各病ノ性ト相符ス
ルノ策ヲ行フニ宜シ○其瞳孔痙合セサル者ハ麻劑太効アリ昔良者ヲ最良トス
○或ハ其藥ヲ水ニ泡シ或ハ其下發劑ニ水ヲ加ハ薄クシ用ヒ或ハ每發斯ク以テ
眼水トシ點入ス○大光明ヲ視ルヨリ生スル者ハ先ツ其光明ヲ遮驟シ勉メテ
眼ヲ静息シ錦葵煎或ハ聖藥煎ヲ用テ之ヲ洗湯スヘシ
手術諸種アリケセシテハ始テ虹彩ノ膜ヲ切斷スルヲ發明セシ人ナリ狭長
ノ刀ヲ以テ角膜ノ辺縁ヲ距ルイ一線ニコレヲ刺入レ直キニ及ニ達シ按ニ
此法ニ由テ虹彩縦切リ開カル後面ヨリノ虹彩ノ平線ニ截切ス○此手術多クハ
天幸ヲ得ル者アリ○耶仁ハ内翳ノ術如ク先ツ角膜ヲ截リ細小尖
頭ノ鉸カヲ用テ角膜ノ下辺ヲ直線ニ閉闔セル腫孔ノ側半線ノ処ニ於テ
鉸カヲ以テ虹彩中ニ刺シ透シ上ニ向テコレヲ切截ス此時刀尖腫孔ヲ損
傷攪擾スルイアルイナキヲ要スヘシ○此如クコレヲ行フハ截口自カラ引

テ團圓ヲナシ復々緊閉セス○其斜視ヲナスヲ防クカ為ニ毎ニ又其
瞳孔ノ側ヨリ内眥ノ方ヘ向ツテ之ヲ截ルヲ要スコウユルセルハ内眥刀ヲ
刺スノ内眥術ヲ行フ法ノ如ク角膜ノ中ニ刺シ入レ其尖ヲ虹彩膜ニ送リ
入レ其尖ヲ於テ角膜ニ刺シ入レタル線ノ四ノ三ヲ豁開シ其尖ヲ抜き去リ
尋常内眥ノ法ノ如ク角膜ノ截法ヲ畢フヘシ○如此クシテ後又虹彩ノ
膜中ニ其創口ヲ造ルノ猶角膜ノ創口ト相符スルヲ要ス即チ半月狀ノ
創口造ルノ西膜相同シキヲ謂フナリ其創口側ニ必ラス片截餘ノ膜
ヲ遺スコノ截餘ノ膜肉ハコレヲ切リサレシ○此法諸他ノ法ニ超過シテ善
リ然ル所以ノ者ハ造ル所ノ孔口復々自カラ緊束シテ収閉スルノキカ
ニナリ○キユエリシハ角膜ヲ截リテ後虹彩ノ膜ヲ十字形ニ截リ開キ其
截餘ノ四隅ヲ鉸カテ以テ剪リ去ル○此法コウニスルノ法ニ較ルニ更ニ優
レリ○シカルアノスミツツノニ家ハ虹彩ト髮狀鞅帶トヲ分チ研ル法ト
○若シコレシカルアハ内眥ヲ墜下スルノ法ノ如ク薄キ揜翳針ヲ以テ
眼ノ後室ノ角ヨリ虹彩ヲ刺シ透シ針ヲ運動シテ一上下シ又内眥ヨリ外
眥ノ方ヘ一左右シテ之ヲ分ツノ法ナリ○其ノスミツツノ法ハコレニ及シテ尖
少シク勾リタル揜翳針ヲ以テ墜下ノ法ノ如ク眼ノ後室中ニ入レ毛様環ヲ

距ル一線四分ノ一ノ処ニ于テ虹彩ヨリ刺通シテ前室中ニ徹シ其時針ヲ
徐々ニ牽テ下底ノ方ヘ又後面ノ方ヘ之ヲ運動シ其部分ニ離ルニ及テ方ニ
止ムヘールノ法ハ角膜ヲ截リ開キ其開處ヨリ鉤ヲ以テ虹彩ヲ鉤シテ
コレヲ前ニ曳キテ小阜ノ如クナラシメ其鉤上ニタル尖處ヲ鉸カテ切斷ス○虹
彩ノ嫩衝ニ由テ瞳孔收小スル者ハ晶體ト其裏ト俱ニ渾濁ヲナスノ事○此
証アル者ハ兩物ヲ俱ニ除キ去ルニ宜シ○手術ヲ行フ後病人惡証ヲ免スル
至テ稀ニ多クハ復々其明ヲ復之ケテ得ルヲ太抵然リトス但シ新ニ造
タル瞳孔正圓ナラス又運動スルノキモ害アルナシ○異物瞳孔空塞スル
者ハ遺翳ノ手法ニ著ス所ノ法ニ循テ之ヲ行フニ宜シ

視力病

瞳孔開大

メイテリアニス

證候此病多クハ他病ノ兼発スル処ニ其度数等アリ 其最大見シキ者ハ
角膜ノ周圍ニ僅ニ膜積ル如キ虹彩ヲ留ムルニ至ル○此開大ヲナス時且
年セテ運動ヲナサス或ハ唯少シク運動ノ機ヲ残スノミ○或ハ瞳孔其圓形

ヲ失フ者アリ○或ハ瞳孔兩十カラ開大スル者アリ○瞳孔非常ノ開大ヲ十
スニ由テ過多ノ光輝眼中ヲ透徹シ病人ノ視力未タ全ク瘥セサル者モコレニ
由テ遂ニ全ク盲スルニ至ル
原由此病ヲ發シ来ルノ病原或ハ此病ヲ兼發スル病ハ即黑障ナリ或ハ
眼水腫及頸水腫ナリ由テナリ諸他亞斯の尼設病ナリ○又コルコナセ菜
ヲ慢用シ又昏暗ノ処居位スル人モ亦此病ヲ媒起ス其近因ハ每ニ瞳孔虛衰シテ
麻痺スルノ状ヲナスヨリミテ發スルニアラサル者ナシ
治法此ヲ治スルハ病何ノ由ヨリ發シ来ルヲ知ツテ先ツコレヲ除キサルヲ効ム
ヘキナリ○其外菜ハ衝動強壯ノ劑ニ宜シ列スルニ羌活薄荷ヲ眉上ニ帖シ
揮發油及他強烈ノ精ヲ眉上ニ或ハ傍ニ捺上シ嚏茶寒窶法ヲ前額ニ用
ヒ又越列吉公多兒尾兒法尼斯密斯皆用エシ○此茶効アラハル者ハ
視力ヲ保存スルノ劑ヲ行テ更リトス此症過多ノ光輝ハ論ナシ凡ソ光輝
ノ眼ニ入ルヲ減スヘシ此症「カクシケル」眼屏ノ多「シソンドル」ハルシ眼鏡
ノ名黑箱等ヲ用エシ其黑箱以テ眼ヲ遮ルニ宜シ此ノ如クスル寸ハ光明ノ
地ニ行トイハレ能ク物ヲ視テ得ルニミナラス猶又視力ヲ失フニ至ク懼
アルナシ

晝盲夜盲

クーンタス、シユルナ、アト、ハクナユルナ、

証候凡ソ晝盲ノ証白日或ハ光明ノ処ニテハ明カニ物ヲ觀ルニ能ス昏暗ノ室ニ
テハ却テ能ク觀ルヲ得或ハ光明ノ処ニ在テハ全ク盲如ク昏暗ノ処ニテハ却テ稍
ク少ク物ヲ視別スルヲ云フナリ○夜盲ハ乃チコレニ反ス大光明ノ処及ヒ白日ニ在
テハ能ク物ヲ瞻視シ昏暗ノ処或ハ夜間ニテハ僅ニ少シクコレヲ觀ルニ能ク或ハ全ク瞻ル
テハハサルノ証ナリ
原由晝盲ハ瞳孔ノ對衝ノ処ニテ方テ角膜渾濁ヲナシ或ハ中心翳ヨリコレヲ發ス○
以上ノ兩症大光明ノ処ニテ却テ盲ヲ致ス所以ハ光明ノ處ニ在テ瞳孔収束スルハ
正中ノ渾濁ノ為ニ全ク掩ヒ尽サレテ光輝ヲ中ニ通スルニ能ハス○但其太々光明ナリ
ル処ニテハ瞳孔開大スルニ因テ光線其周圍及ヒ渾濁ノ部ノ邊緣ヨリシテ眼中ニ通ル
テラウナリ 或ハ眼ノ知覺異常太過ニテ瞳孔偶々光明ニ遇ハテテ強ク収束シテ僅ニ
一線光輝ヲ中ニ通スルヲ為シ或ハ全ク光輝ヲ通スルヲ得スニ至テ晝盲ヲ發ス○
夜盲ハ大抵黑障ノ証ニ最モ時日ヲ刻シテ相發ス○或ハ視力虛衰ノ諸症ニ夜盲
ヲ兼子發スル者アリ
治法コレヲ治スルニ每ニ其原由ヲ照シテ方ヲ処スヘシ其外用ハ衝動ノ茶等ヲ卷スル

瞻視虛衰黑障等ノ篇ニ掲載スル者ノコトシ

瞻視虛弱

アテプレイラピア

証候瞻視虚衰ノ証一トラス○其二ノ物ヲ視テ明ヲナラス或ハ模糊ヲナシ或ハ昏暗ヲナス○或ハ晨ニ明ヲナリト金匠晩間視力已ニ衰フルハ萬物皆蒙瓏トメ明カトラス○又一証能ク明カニ万物ヲ視ルト金匠眼ヲ注シテ之ヲ視ルイ能ハス苟クモコレヲ注視スレハ万物皆混同シテ一ノ如ク泣淚汪々トメ止ナシ
原由眼目ノ虚衰ハ要スルニ皆身体ヲ虚衰スルノ原ヨリ生シ来ル又病的ノ割及ニ多ク眼目ヲ使スル等モ亦能ク此症ヲ発ス
治法コレヲ治スルハ先ツ適切ノ藥ヲ行ヒテ其病原ヲ除キ去ルニ在リ○
尔後弓矢衝動ノ藥スヘテ大効ヲ奏ス例スルニ揮発諸油揮発香竈精酒劑ヲ以テ泡出スル劑「耶仁」眼酒ヲ眼ノ周圍ニ擦入スル等ナリ○又収斂ノ煎劑寒罨外赤水蓬破水ナリ眼ヲ過烈ノ光輝ニアタラシメス久シク物ヲ注視スルナシ務メテ眼ヲ逸セシメテ勞動スルコトアラシムカラス

短視

メイラピア

証候此病ヲ患フル人唯其近旁ニ薄ル諸物ヲ視ルト金匠其頗フル隔テタルハアル物方チコレヲ視ルイ明ナラシ○此症病ノ差等モ亦種々トラス○或ハ人アリ短視最甚クニ屈指ノ外ハ明ニ物ヲ視ルイアタハスシテ斜視ヲナス然ル所以者ハ両目ノ視樞切近ノ物ト相均適セサルカニナリ
原由短視ノ眼ハ光線網膜ニ来ラサルノ前既ニ燒心ヲ結ヒ網膜ノ上ニ来ルニ及ニテハ其光既ニ散乱スルカ故ナリ此症角膜中異常ニ過テ或ハ水晶体ノ圓ニ過キ或ハ網膜ノ太ク深奥ノ処ニ在ルノ常ノヨリモ遠ク相隔タルヨリ発ス故ニ幼壯ノ人最此病ニ罹リヤスシ○又習慣ニ由テ短視ヲナス者モ亦多クコレアリ然ル所以者ハ恒ニ近旁ノ物ニ注視スルノ人譬ニ読書家工匠等ノ輩ハ動モスレハ短視ヲナシヤスシ○又眼ノ神経ノ機力一種ノ質ヲナシ眼液ノ質モ亦一種ノ性ヲ得ルニ因テコレヲ発スルモ亦恐クハコレアリ
治法短視ノ白眼形ノ造成ノ過圓ナルニ因ル者ハ天賦ノ然ラシムル所ニシテ治スルコトナシ○壯實多液ノ人歳邁衰衰フルニ及ニテ多ク液減耗スルハ此病自ラ減スル者アリ○若習慣ニ生スル者ハ其人外氣ノ中ニ在テ喜テ隔遠ノ物ヲ細視スルハ其視力ナク故ニ復スル者モ亦コレアリ○凡ソ短視ノ人中窪鏡ヲ用ニシ此眼鏡ハ光線散漫スルニ因テ遠隔ノ物融モ猶自己ニ切近スルノ物如ク仔細ニ眼底ニ照映スルイ

ヲ得ルナリ。但シ其可治ノ目ヨリメ此疾ヲ發スル者ノミ全治ヲ得ヘシ。余ハ
決メ効ナシ。或ハ列鳥麻室設或ハ痛凡其回ヲナスモノアリ如此者世医ノ遍ク
シル所ノニ証ヲ治スルノ禁ヲ用テ之ヲ治スヘシ

遠視 プレスハイオピア

証候 遠視ハ短視ニ反スルノ病ニ老人多クコレ罹ル。其人能ク遠物ヲ認メ
得テ身辺切近ノ物ヲ却テコレヲミルニ能ハス
原由 遠視ハ光線眼中ニ在テ遅ク交ルニ由テ其燒心ヲ結聚セラルノ前此ニ個
膜ニ感スルニ由ルナリ。其故ヲ論スルハ角膜水晶體等太ク過テ扁平ヲ
ナスニ因ル其扁平ヲナスハ老人家又ハ眼質消耗ノ狀ヲナシ又或ハ虛衰ノ病ニ因テ
眼太ク縮瘦スルカ故ナリ。又内醫ニ手法ヲ施シ水晶體ヲ抽換シ去ルノ後
モ亦此症ヲ発ス。又此症或習慣ヨリ発シ来ルモ亦コレアリ。或ハ内因ノ病此症
ニ併合スル者モ亦コレアリ
治法之ヲ救ハ中高鏡ヲ用ルニ宜シ其原由虛衰ニ因テ発スル者ハ銘別ニ
法ノ強壯劑ヲ用ヘシ此病アルノ人ハ効テ近物ヲ視ルニ以テ其瞻視ヲ復
スヘシ。年高ク遠視ヲ病者ハ治メヌシテ自ラ治スル者或ハコレアリ

重形 シグロピア、フヒシヌス、シユプリカチヌス

証候 此病是ヲ患ルニ太ク稀ナリ。其証病人兩眼ヲ用テ物ヲ視ル寸ハ一物ヲ
視テ兩形トナス若唯一目ヲ用テ寸ハ一物ヲ見テ乃チ唯一物ヲ視ルニ或ハ二目ト
兩目トヲ論セス一切ノ物形皆兩形ヲナスモノモ亦コレアリ。又一物數形ヲナ
シ或ハ其形ヲ變シテミル者アリ又此病數等アリ多少一十ヲス病人大抵一切
形狀ヲ見ルニ甚ク明クシテ其重リ出ル者ハコレニ比スレハ明淨ナルニ能ハス
○此病或ハ時コレヲ得久シカラヌメ止者アリ或ハ秘傳ニシテ愈サレ者アリ或
ハ発歇時アル者アリ
原由 角膜水晶體左右齊シカラサル者虹彩ノ膜ニ重孔アル者ハ皆兩
形ヲナシ起シ来ルヘキ者ナリ。然レモ這般ノ証候曾テ已ニ實驗スルヲ
縦ルヤ否ヤ未クコレヲ果ノ信スルニ能ハサルナリ。但兩形ヲ惹起シ来ル
ノ回最ナル者ハ直筋ニ在リ此筋一七ノ其運動ヲ變スル寸ハ視軸モ亦其物
ヲ視テ運用ヲ變スルニ至ル。或ハ此症邪視ノ一症トス。又眼神經ノ上ニ
割着ノ物ヲ生シコレニ因テ神經大ニ知覺ヲ變シ凡百ノ物件ヲ視テ
皆其原形ヲ失フニ至ル重形ノ症ノ如キモ亦此ト異ナルナリ。此ノ如キ

者ハ其曰大約眼上ノ割着底ノ物ニアラスニテ其腹中ニアリ
治法若此症内曰ニ由テ発シ来ルヲ診シ得ル者ハ其目果メ何物ニ由テ
発スルヲ驗査シテコレヲ除クイヲ知ムヘシ其他内外ノ諸症強壯衝動
ノ策ヲ巧合セリトスルイ黒障ニ説クカ如シ

半形

証候病人物ヲ見ント欲メ目ヲ注スト雖氏物ノ全体ヲ見ルイアタハタ
其一部或ハ其十中ノ六七部ヲミル者コレヲ半形病ト云フ其近傍
ト遠隔トヲ論セタ皆然ル者アリ或ハ身ニ切近スル物ニ然ル者アリ
原由此病ハ角膜及水晶体ノ渾濁スルナリ而シテ其渾濁唯其部ノ
一辺ニ偶ヲ領シ瞳孔コレニ目テ尺ク昏暗ヲ十サス唯其一部ニ暗ヲ十
スカ故ナリ○病人這ノ渾濁ヲ得ル者ハ凡テ一切ノ物其身辺ニ切近スルハ
唯其半形ヲ視ル○此病人ハ邪視ニ慣レ発シヤスシ○又瞳孔虹彩ノ中央ニ
位セスメ角膜ノ辺縁ノ処ニ倚側スルイアリ或ハ外來ノ暴勢ニ由テ虹彩
ノ角膜ト相附着スルノ処相分レ離ル等モ亦此症ヲ発ス○或ハ一部ニ
黒障アリテ此証ヲ鏡発スル者アリ此症或は管遲シテ治セズ或ハ一時発

作ス○或ハ網膜ニ斑点ヲ生シ其処光輝ニ感觸セザルニ曰テ此症ヲ発者アリ
治法其始ノ兩回ニ由テ発スル者ハ上文ニ掲示スルノ治法ニ循テコレヲ治
スルニアマウロシスハルキアリスハ真ノ黒障ノ如クコレヲ治スヘシ
膜ニ斑点
アルノ症

眼前視班點及火光

証候此病ヲ得ル人ハ眼前ニ其物アルニアラスニテ唯其象ヲ見ルニ
○其象一ナラス其最常ナル者ハ黒大斑点雀巢蛇線網線蜘蛛
火能光能ヲ視ル者多シ○其眼前ニ現露スルノ状マタナラス或ハ恒ニ
コレヲ視ル者ナリ時ヲ定メテ発散スル者アリ或ハ心ニ物体ノ光明ヲ放
ツ者ヲ觀守ハ乃チ眼前ニ光明ヲ視ルイアリ○或ハ其象運動上下
スル者アリ或ハ一処ヲ定メテ動カサル者アリ眼ヲ轉動シ或ハ眼目ストイ
ハ其象仍故ノ如キモノアリ○其象色彩爛発スル者アリ無色ノ
者アリ其物象焉然トメ影ノ如キ者アリ黧黒ノ者アリ
原由其形象ヲ目前ニ露呈スル所以ノ故ヲ決定スルイ本ト太々難
シ○其マ、真ナルニ似タルノ回ヲ下ニ掲ク即チ眼上ヲ刺戟スルイ太過ニ

メ且ツ管遲ラ去ラサレ諸網膜ノ一隅衰弱麻痺シテ光線ニ感觸
スルイキ者眼中透明ノ部ニ光線ヲ住留シ其仔細ノ形影ヲ網膜上
ニ寫スヘキ者今其二部渾濁スルニ因テ光輝ヲ照映セサル者也又此疾
皮利昆埜兒痔等ノ一症トシテ発スル者アリ
治法此疾或ハ黒障ノ兼発スル所ロシメ動スレハ遂ニ黒障ニ陥ル者アリ
○或此症別ニ他症ヲ流発セズ依然トノ故ノ如クコレニ由テ醫師モ亦亦
置シテ治ラ施ス一キ者多ク之レアリ外科此疾ヲ治シテ間々効アル
者アリ○先ツ其因ノ果メ何ニ原テ発スルヲ察シテ先ツコレヲ除キ去
ルイテ務ムヘシ○若其因精カ衰虚ニ由ル者ハ統別ニ法ノ強壯劑ヲ
用ユヘシ○若其症他病ニ兼発スル者ハ其本病ノ薬ヲ符スルニ宜シ○
其症黒障ノ前徴ヲナスニ似タル者ハ黒障門ニ述ル所ヲ法ニ從テコレ
ヲ防治スヘシ○若眼上ノ器資其性ヲ変スルニ由テ発スル者ハ不治ノ症トス○
其衝動太過ニ由テ生スル者ハ症ニ隨テ衝動ヲ降伏シ軟和シテ排泄スル薬
ヲ用ユヘシ

黒障 アマウロシス キヌタセシテ

証候 黒障ハ視神経ト網膜トノ病ニテ角膜虹彩水晶体及其他眼中
諸液ハ皆依然トシ其故常ヲ變スルイキトス○此病コレヲ他症ト分別スル
一太夕難シトス而毎ニ灰翳ト相交替シテ病者多シ○黒翳本然
ノ証ハ下ニ掲タル症ヲ発シテ視力全ク瘵ス○瞳孔非常ニ潤大シテ少シ運
動ヲナシ或ハ全ク動一トシ然レモ或ハ其常形ヲ失ハス或ハ却テ非常ニ収小
スル者モマタコレアリ○瞳孔徴色ニテ且ツ硝子ノ如ク黒色ヲナス者
アリ或ハ霧ノ籠電冒スルカ如クニメ其色如ク硝子ノ如ク黒色ヲナス者
灰翳ノ初起ト認メテスヘキ者アリ○然レモ灰翳ノ証ハ翳障明ニ眼後部
ニ位スルヲミル而シテ視力減衰スルノ証ヲ視ル一トシコレ其盲ハ刺シテコレヲ
抽換スレハ其明復タ故ニ復スルカ故ナリ○其深ク根蒂ヲナスノ証ハ瞳孔
ノ後ハ尤深キ部分ニ于テ毎ニ白クシテ緑色或ハ灰色ノ翳ヲ見ハシ時トメ
血絡散漫スルヲミル又眼剛堅ニシテ瞳大シ瞬ヲ轉スルイキタハハルニ似タル者太
夕多シ其眼上ノ諸器渾濁シテ盲ヲナス者ハ頗ル能ク邪視シテ其明了ヲ得
ント欲ス然レモ此症ハニ作家ノ述ルトヨク如ク殆ト一定ノ証候トシカク
○若夫黒翳ハ諸般ノ証候及ヒ許多ノ形状ヲ以テ生スル者ナリ○其発スル
一或ハ頓ニ諸証コレカ前導ヲナス一十キ者アリ或ハ日ニ積三月ニ累子テ

徐々全ク盲スル者アリ○或ハ眼ノ種ノ態度ヲ得テ治セズ如此ニシテ久
シク變スルナキ者アリコレヲアマウシイヘルニクダト名ク○其醫障
障ニ至スル者ハ眼目ノ知覺過敏諸証視力歴伏虛衰ノ諸証ヲ以テ
前導ヲナス若シ光明ノ地ニ往ク寸ハ兩目疼痛淚アリ瞳孔異常ニ收小
闇黒ノ地或ハ夜間ハ眼前ニ火光閃亮ニ物ヲ認メテ直ニテ或ハ然ラズシ
テ諸般ノ色彩ヲナシアリ○病人目窠ノ深处ニテ常ニ壓力如キノ疼
痛ヲ覺ヘ眉上ノ前額毎ニ牽張スルヲ覺フ○或ハ眼ノ衝頭痛極メテ
甚シク稀首遷シテ瘥ヘズ遂ニ裏翳ヲナス者アリ○間々癆病ノ前昌亂寒
ノ発作ヲ覺ヘ速ニ黑障ノ証ヲ発スル後其証始メテ解シ去ル者アリ○
此疾大抵兩目俱ニ病ハ其一眼先ツコレニ罹ル者ハ久カラスシテ其ツモ亦コレ
患ラルニ至ル○或ハ順序ヲ保シテ発歇スルノ黑障ヲ經驗スルナリ
原由黑障ヲ発スルハ瞻視ヲナスニ用ユル諸器其病ヲ受テテ発シコレニ
繼テ視神経ト網膜トノ麻痺ヲ発シ末ツテ以テ近回トスルヤ否ヤ本ト自カラ
疑ヲ容ケナシ○黑障ヲナス所以遠回ハ其部ノ器質損傷シコレニ由テ視
神経大ニ其累ヲ被ルニ至ル即チ眼窠ノ深处ニ息骨囊瘍ヲ生シコレニ由
テ視神経ノ壓搾スル者腦ノ質殊ニ視神経ノ根本ノ処ニ水泡脂腫或ハ液ノ

溢泄ヲナシ或ハ其部強靱ヲナス者又腦ト視神経ノ本原ノ処水腫様又ハ溶
解ノ状ヲナシ或ハ異常ニ強硬ヲナスノ類ナリ○又眼目ノ機運癢絶ニ由テ此症
ヲ発スル者モ亦恐クハコレアラシ又此處回ヲ為スニ屬スル者ノ類ハ血ノ頭中ニ
壅積スル者大過ナル者諸般ノ血ヲ頭上ニ上衝スルニ至ラシムル原由ニ由テ視
神経及網膜ノ運用ヲ妨害スル者頭及其近傍ノ部分ヲ震掉スル者第五
偶ノ神經ノ枝梢ヨリ分レテ眉上ニ外ル前額神經ヲ損傷スル者經久ノ要斯的
尼設病太陽ノ大光耀ヲ視テ眼目虛衰スル者光明ノ地ニテ至小物体
ヲ恒ニ注視スル等ナリ又コレニシテ衝觸ヨリメ黑障ヲ生スル者モマタ
少カラス○コレニ屬スル者ハ腹中ニ黑膽液蓄積スル者第一道ノ胆様ノ穢毒
由虫淋毒内攻痛列鳥麻質私密斯痘麻轉移疥癬及經久腫瘤ヲ作
千乾愈スルモノノ類ナリ
治法黑障ハ久性ニメ之ヲ愈スニ至テ難シ○然レモ其症ニカクキ中至難
ト劣易トアリコレ其疾ノ初発ノ状トコレヲ生スルノ回トニ準シテ難易自
カラ殊ナルカニナリ○其作千生シテ明ヲ失フニ至ル者ハ徐々ニ此疾ヲナ
者ニ比スレハ較治シヤスシトス然レモ亦家常ノ鑑識トス○其症何未
路アツテ此疾ヲ惹出シ来ルノ原由自ラ分明ナル者ハ佳候ト云○或ハ其末路

少毛辨スヘカラス病人ノ形体外ヨリ之ヲ望ミ三康健ナルニ似タル者ハ五ニピリ
千セノ葉ヲ与ヘテ其責ヲ塞クヘシ按ニ五ニピリ千共草医ノ回症ヲ論セテコレヲ治スルニ三
道アリ○所謂先ツ其疾ノ何ノ原由ニ本ヒテ発シ来ルヤ否ヤ查點シ而
其回ヲ驅逐スルヲ務ムルナリ○若其中等ニ屬スル者ハ発病ノ初ト病ノ経
歴トノ間ニ発作スルノ諸症ニ拠テ治法ヲ下スシ若其性状ヲ徴スル症候
十ク又其病ノ原由ヲ蹤跡スヘキ者十キ寸ハ五ニピリ千セニ劑ヲ用テ要ス○
原由ヲ治セン欲シ施ス所ノ方法ヲ以テ之ヲ言ハ○其病人ノ畏畏質ノ残
關ニ本ツク者ハ全ク不治トス血ヲ蓄積及ヒ衝動ニ由テ発ス者ハ刺絡ヲ最
第一ノ方トス証ニ隨テ數次之ヲ行フヘシ○若刺絡ヲ行フヘカラス者ハ蠟
針ヲ顯顯ニ行ヒ及角ヲ項上ニ帖スヘシ○此外ニ導洩ノ劑微温脚踏軟化
吉利詞多見排腸上ノコシエールデーノ前額ノ寒寒一ヘルノ洗目器ヲ用
テ目ヲ寒水ニ洗滌スルノ方皆効アリ○若吐血ヲ壓抑スルニ由ル者ハ諸排
泄諸導洩ヲ施スト魚肝其出血再ヒ前額スルニテテハ治スルニ宜シ
シク恰當ノ劑ヲ用ヒテ効メテコレヲ引出スヘシ○此葉ヲ用テルノ後瞻視
故ニ復セサル者ハ衝動劑ヲ与フルニ宜シ裡ニ就テ吐劑安質止反劑ヲ少
量ニ用テ尤大効アリ又強壯別法モ亦此症ニ佳効アリ○障震掉ニ由テ発ス

者ハ大抵治ヲ得ルイ少シ○強精ノ摩方收斂ノ審方芫菁膏内眼スル
清爽ノ劑最効アリ○翳障虛衰ノ回ヨリ生スル者ハ其性ニ種アリ○或ハ揮
身尽ク虚衰スルニ由テコレヲ催キ発スル者アリ或ハ唯目ノ虚衰スルニ
由テ発スル者アリ○其房一症ノ者ハ強壯ノ食養及ヒ芫菁方乃千發那ニ局処
ノ強壯劑ヲ合シテ用テカカシ○其第一二症ハ局処ノ別法最効アリ○裡ニ
就テ其最上者ハ前額ノ寒治寒者芫菁膏芫菁膏ヲ發ノ摩方撒
尔非亞刺賢埜兒精續草泡方ニ強精ノ葉ヲ加フル者茴香油加牙普
的油「ロリスマリニ迷迭香油大効アリ○其回眉創ニ本ツイテ発ス者ハ硝砂
揮発膏水銀膏ヲ外敷シ内服ニハヒルサキルラ白麴莖若失鳩艾草殊ニ大効
ヲ奏ス○創傷ノ部ハ別法ヲ考索シテコレヲ治スヘシ○若眼上局処ノ衝動ニ
由テ黒障ヲナス者ハ眼目ヲ休息シ其患ヲ免カシムルヲ勉ヘシ○累感
ニ由テ黒障ヲナス者ハ衝動ノ性ヲ知道シテコレヲ除クニテ求ム○胆様ノ衝
觸之ニ加ハ者ハ吐下劑ヲ用ユ○腹内ニ積累アル者ハ安條復没扭劑ヲ少量
ニ服用シ又硝砂ヲ酒石酸酸華兒斯解凝真發斯ヲ用テコレヲ除
クヘシ若其回蟲積ニ回ル者ハ驅蟲劑ニ宜シ即千加羅蔑兒全露施那
ヲ連服シ大黃芍刺巴續草皆用スヘシ○皮上ノ癩疹内攻瘡瘍食干乾

愈スル等ハ世人ノ明知スル所ノ的當ノ藥ヲ用ユヘシ○痛風列鳥麻空
設ノ症ニ黒障ヲ兼発スル者ハ痛風ヲ治スルニ藥并ヒニ吐劑硫黃治ヲ
用ユラ要ス○梅毒醫ハ汞劑ヲ以テ用トス○或ハ醫者全ク治スルヲ得
サ者アリ除徳世徳ヲ塵抑シテ発スル者ハ勉メテ再ヒ之ヲ故態ニ復スル
求ムヘシ
原由 茫平トメ辨スヘカヲ升者ハ發明ニ本ツイテ制作スル法又ハ嘗テ經
効スル方ヲ行フニ宜シ○其藥ハスハ千吐劑ヲ少量ニ用テレヲ唯惡心
ヲ発セシムルニ難而シテ各噴霧室斯藥傑兒ノ九子與テ吉多兒尾見法尼
斯密斯モ亦用ユ可ヤ否ヤヲ商榷之シ或ハコトフユリ子私ノ法ニ循テ内外ヨリ
水原尾斯或ハ燃氣ヲ用上又ハ光輝ノ衝動或ハ電透衝動ノ劑御草亞兒
尼加麝香揮発塩實百兒油鹿珥精禪名物考加牙普的油莞菁丁幾
キニアヤキ云利屈福鳥葛 水銀等ナリ又良岩雙鳥菊失鳩谷匪王失亞密斯
ビユルサキルラ白頭翁 ミルペーテス 鹿婦 窠透強精ノ摩方強烈播鼻ノ藥メリク
サツカラチヌニ御草ヲ加ヘケレヘルハノ藥葉眼上ノ蓋氣劑薰烟劑烙鐵淋洗
ナリ又上ニ謂フ所ノ「ムヒリセ劑」中又取捨ヲナシテ彼レ是ヨリ善トスヘキ
者アリ皆深ク思惟考索スヘキ所ナリ

緑翳 カラウコマ カフウセト

証候 ガラウコマハ黒翳ノ一種ナリ○其証眼底ノ深处瞳孔ノ後面綠色ヲ
ナス者ナリ
原由 綠色ノ原由故ト仔細ニ知リカタシ○太抵人皆カモヘラク硝子液病ハ實ニ
此原由ナリト○又此病細膜ニ原ツキ発スルト云者モ亦臆見ニ似タリ
治法 コレヲ療スルニ黒障ノ法ノ如シ其極度ニ至ル者ハ不治トス○水晶液ヲ抽
換スルノ法モ亦此疾ニ于テ恐クハ用ユヘキ者ニ似タリ

邪視 ストラピスミニユス

証候 兩目同一ノ視線ヲ為サス同一ノ運動ヲ為サスシテ一日物ヲ注視スルナ他
目ハ却テ外ニ向テ歪斜スル者コレヲ邪視ト名ク
原由 邪視ノ病ヲ生スル所以ノ理ハ目位目ニ較フレハ太夕虛衰スルアツテ其知
覚モ又太夕減殺スル者又一目ノ造質他目ニ比スレハ太夕殘闕スル者ナトハ
兩目ノ晶体異ナル燒心ヲ有スル類ナリ如此ノ類ハ皆邪視ヲナスニ至ル又邪
視ノ人小兒ヲ弄スルハ兒其目ノ運動ヲ倣ヒ用テ遂ニ邪視ヲ至スル又佗目ヲ

ナ静止シテ交際スルノ如ク獨リ目ノ筋ヲ運用スルニ慣ル者ハ其機カノ習
ヒ慣ル所口遂ニ其性ヲ成シテ又能ク邪視ヲ支アリ又網膜ニ彼是ノ病ヲ受
ル者又能クコレヲ免ス其病ハタトハ黒障ノ症ニ于ルカ如シ又一目他目ニ比ス
ハ頗ル短視ナル者亦コレヲ免ス
治法諸般ノ原由ニ應メ治法ニテラス○此病目質ノ闕損ヨリ生スル者ハ全ク
不治トス○若目ノ視力衰弱ニ由テ生スル者ハ其無病ノ眼ヲ二月ノ間緊緊
メ可ナリ此ノ如クスレハ虚衰シタル一眼前ノ筋自ラ強壯ヲ十ニ當前ノ百物ヲ瞻
視スルニ適シテ邪視自ラ愈ユ○小兒ノ邪視ヲ治スルニ其邪視ヲ挽回スルノ
視線ヲ保タシムルヨウニ爲シ其臥床ヲ鏡面又ハ明窓ニ向シムルナリ
治ス

眼球諸病

眼水腫

証候此疾ニ罹ルハ眼球太ク張大ヲナス然ル所以者ハ固有ノ水液大ニ蓄聚
スルヲ以テナリ○或ハ水様液異常ニ蓄聚スル者ナリ然レモ硝子液此疾ニ

罹ルノ最多数シ此ノ如キ者ハ硝子液其固有ノ稠ヲ失フニ至ル○病人眼球實
滿シテ膨脹シ且ツ隆起スルヲ覺ヘ隨意ニ運轉スルニ能ハス○繼テ角膜腫
脹スルヲ視ル如此ナルハ當前平塌ノ如ク突起ス但虹彩ノ膜ハコレト共ニ前
ニ突出スルニナシ○此時視力減シ去ル但病人昏明ノカニテハ了然タリ而シテ
瞳孔モ亦恒ニ運動ヲ癢スルニナシ○其腫漸ヲ以テ增長スルニ至ルニハ印ノ大サ
如ク腫大ス即チ牛眼ナリ○硝子眼中ニ水液ヲ蓄積守ル眼後部疼痛極メテ甚
シク遂ニ全ク其明ヲ喪フニ至ル○病ノ始ハ瞳孔仍運動ヲ失フトハ其甚クシキ
至テハ虹彩角膜腫大ニ隨テ近ク前ニ突出レ眼球遂ニ異常ニ巨大ヲナス
原由此病約テコレヲ治スルニ甚難シ而シテ屢々不治ニ陥ル者マダコレアリ○若視
力全ク喪亡スル者ハコレヲ一掃シ尽スヲ望ムカラス○假令一旦コレヲ除キ去ルニ
似タルモ其マタ免スルニキキヲ保スヘカヲサナリ○其治法ノ綱要ハ遠目ヲ驗
査シ務メテコレヲ除キ去ルニ在リ○然レモ其病回ハ果メ何者ヨリ免スルヲ查シ
出スル得ルヤ故ト太ク希ナリ如此モノハエヒリナシ劑ヲ用テ之ヲ扶ルニ宜シ其
藥ノ最効アル者ハ利尿劑トス海葱ヲ消石杜松子地蕒荅利斯伍ニ或ハ植酸
ニ飽過セシメタル羅厘塩等ヲ伍シテコレヲ用テ又吐下劑亦劑安質沒担劑羌
菁膏打膿法衝動強烈ニニ香気アル眼劑專刻吉金兒尾見法尼斯密私

己上ノ諸薬釣子寸効ナキ者多シ斯高奇方ノ積水ヲ導泄スル者アリ此法ハ
何ソヤ即チ手術ヲ行フコトナリ○前室ニ水アル者ハラシセツト或ハ擦鬚カヲ用テ
角膜中ヲ微シク截リ開キ水ヲ其截ロヨリ流シ出シムヘシ○病硝子液中
在ル者ハ角膜ノ半辺ヲ截開シテ水晶體ヲ破リ水晶體ヲ前ニ引テ硝子
液中ニ深く陥入スルナカラシムヘシ○手術ノ後病マタ新ニ萌生スル者アリ如此
キ者ハ再ヒ術ヲ行フヲ要ス○水ヲ導キ洩スノ後速ニ強壯劑ヲ灌テ煎法強
精ノ摩法ヲ行フヲ待フニ宜シ○若視機全ク瘵シ眼球其平全ノ者比スル
血ニ張大ヲナス者硝子液ヲ外ニ曳シ去リ義眼ヲ造テコレニ換ヘルニ宜シ最良
法トス○眼窠中ニ腐骨アルヲ少シク診シ得ハ眼球ト其膜トヲ連子テ尽ク
コレヲ扶リ去ルニシ

眼球脱

証候此疾アル者眼球大其常ヲ変スルヲナク又其状別ニ患所アルヲナク但眼
球其常所ヲ保セスシテ或ハ其半截ハ前ニ突キ前シ或ハ全ク眼窠ノ外ニ脱出スルナリ○
其全ク脱出スル者眼球頰上ニ搭掛ス
原由物ノ薄遍ヲナス者ヲ以テ眼窠ト球ト間ニテ分入レコレヲ以テ球ヲ外剔出ス

ラプタルモプトシス
エキスオプタルニア

乃チ眼胞ヲ免ス又異常ノ腫瘍ヲ眼窠中ニ生スル者譬ハ瘰癧腫膿聚積等ナ
リコレ等疾ヲ眼窠内ニ生スル寸コレヲ以テ眼球ヲ外ニ薄リ出ス至ル又上瞼洞中ノ病
モ又コレヲ免スルナリ
治法己上ノ諸証要スル眼球ヲ再ヒ中ニ容納セシムルヲ求ムルニ過サルナリ○若其
部嫩衝ル者外ヨリ分利卷法ヲ施シテコレヲ減スル寸乃チ其故処ニ復スルナ
リ得ヘシ○或眼上ノ筋破裂スルニ固ル者アリ如此者仔細ニ其術ヲ施シテ再ヒ能其
視機ト運動トヲ其故態ニ復ス可キニ至ラシムトイヘ凡之ヲ内ニ保有シテ復タ脱出ス
ルヲ防護スルコトアルヲアタス○又眼窠ノ諸骨病ヲ受ケテ長ク眠ニ延張シ眼球ヲ
容ルニ地ナキニ至ル者骨病ヲ治スルニ非レ決メ脱ヲ容ルルヲアタサルナリ○又眼
目多ク窠外ニ脱出ストイヘトモ幸ニ医家ノ救済ニ由テコレヲ納レテ其故態ニ復ス
ルヲ得ル者モ亦屢ニコレアリ○既コレヲ容納スルノ后凡箇擦創傷嫩衝ノ続
症ヲ治スルニ巧合スルノ薬ヲ行フニ宜シ
瘰癧腫瘍其因ヲナス者ハ法ノ如クコレカ手術ヲ施シ兼テ内服ノ劑ヲ行テコレヲ
扶右スヘシ○上瞼洞ノ張大其禍原ヲナス者ハ術ニ據テ其治ヲ施シ而シテ後眼球
ヲ窠中ニ容納スヘシ

截眼球

五キススケルヘアチヲテキユリ

凡リ眼球ヲ截去スルノ法ヲ行フキ者、即チ眼脱シテ復タ容納スルカニ
ル者、葡萄腫ノ潰膿ヲナス者、眼ノ瑕腫ヲ患フル者等ニテ、眼球ノ全質
結節ノ如クナリテ異常ニ腫大シテ、其椀管破綻スルキニ至リ、眼上ニ生粗肉
行ラ生ズル者、其他一切大ニ其性ヲ変シテ、治術ヲ施スル所ナキニ至ル者、皆這ノ
截割ヲ行フキ者ナリ
至術眼目ノ全球ヲ断割シ去ルキ者、本ト太々稀ナリ、通常前面ト変悪スル
者ヲ截リ去テ可ナル者多シ
コノ術ヲ行フ者、介者ヲノ其上眶ヲ制手トセシメ、術者大捻殺刀ヲ以テ角膜
ヲ截開スル、内翳手法ノ如シ○尔後其変悪スルノ部ヲ把テ、鉸刀ヲ用テ、
クモラ削リ去ル
若其全球ヲ截去スヘキ者、介者、銀子ヲ用テ上眶ヲ上ニ掲ケ、術者比斯篤黎
鉸刀ヲ用テ結膜ヲ截リ透シ、筋ト眼眶トノ附着ノ処ヲ截リ、今ツ下眶モ亦前
ノ法ノ如シ○其后鉸刀ヲ用テ、眼ヲ術マシメ、先視神經ノ処ニ至テ、コレヲ截断ス
○次テ上ヨリ、眼球諸筋、其他球上ニ敷系帯スルノ諸部ヲ、尽ク断截シ去テ、眼球


ヲ切り除クヘシ
如此コレヲ施ス、後眼窠ヲ仔細ニ検査シテ、少シテモ変悪ヲナスノ部アル者、各
クコレヲ除キ去ルヘシ○尔後眼窠中ニ綿撒糸ヲ填テ、繻糸ヲ、鉸糖水ニ醃シテ、コ
レヲ紮住ス○出血、破潰、膿太々劇シキ者、至テ稀ナリ
或ハ潰膿、自海綿肉ヲ生スル者アリ、如此者ハ、微々収斂スルノ糸ヲ要スヘシ、其海
綿肉太多キ者、刀或ハ鉸刀ヲ用テ、コレヲ切り去ルヘシトス
病已ニ愈ル、後義眼ヲ容ル、フヲ得ル者稀ナリ○然ル所以者、大抵眼瞼
瘦削シテ、義眼ヲ容ルト、縫匠内ニ固留シテ、定処ヲ保ヘキニ足ラサルニ至ルカ故ナリ

義眼


義眼ハ、小窪碟子ニシテ、其前面ノ平凹幾許、眼球ノ大小ニ準ス○其前球様
ニ圓ク中心ハ角膜腫孔、虹彩ノ膜ヲ細ニ真眼ニ準擬シテ、コレヲ造ルヘシ○其後
面ハ、凹窪シコレヲ把テ、瞼内ノ眼腔中ニ容納スル寸ノ眼球ノ截餘ノ部、皆其中收
メ蓄フキニ取ル○其質、硝子ヲ用テ造リ、磁器ヲ用テ造リ、又象牙ヲ用テコレヲ
造ル、但象牙ヲ最良トス
義眼ヲ容ル、込大指ト次指ヲ以テ、上眶ノ辺縁ク高ク掲上ス○其他ノ手指以

テ勉テ義眼ヲ上眶内ニ深ク挿入シ更ニ別ニ指ヲ以テ下眶ヲ微シク下ニ擗ク寸
 八自ラ其中ニ拶入スルヲ得ルナリ○若コレヲ除キ去ント欲スル者ハ下眶ノ辺ヲ
 下ニ擗キ消息子尖ノ小膏莖ヲ義眼ノ下ニ挾ミ入レコレヲ引テ外ニ脱出セシム
 或義眼ヲ拶入スル後多少疼痛ヲナス者アリコレ其部ノ抑壓セラルト及ヒ
 眼ノ知覚過鋭ナルノ致ス所トス○然レモ少シク時日ヲ経歴スルノ後ハ自カ妨
 碍ナキヲ覺フルニ至ル
 大約病一時用元所ニ義眼ノ外別ニテ義眼ヲ蓄ヘ備ヘサルハカラス○然
 所以ノ者或偶然トシ眼ノ光落シテコレヲ求ル所ヲ出シテコレヲ代ニ嵌
 スヘシ故ニ別ニ蓄ヘラカサレハ急用ニ供シカタシ○又日々次ツ義眼ヲ脱シテ
 中ヲ淨刷スヘシ

燉衝眼



奇醜眼



膿眼




胬肉翳



角膜翳




葡萄腫



翻花





低垂眼



倒睫




兔眼




兩臉生着




眼胞癢腫




麥粒腫



包腫




淚鼻腫脹





淚囊焮衝膿潰



淚癭



灰翳




白色翳





黄色翳




绿色翳




黑色翳




線條翳




虹彩脫




瞳孔緊束




瞳孔開大




瞳孔縮小





瞳孔異形



黑障




水腫眼



眼球脫




血眼



邪視



眼臉青班




眼緣赤爛





眼臉瘡




眼臉桑椹腫




眼臉瘤




白膜赤班




白膜翳肉



白膜脈腫




角膜污點






角膜曇暗



眼球癌




角膜皺縮





29
591





Handwritten marks, possibly initials or a signature, located in the upper right corner of the right page.



正一位太政大臣源友春公

正二位太政大臣源真信公

正三位大臣源清公

~~源~~

正四位太政大臣源龜廣公

日本外國大將大政入道源熊元公

日本軍度大將藤原大入道
蘭信公

頁

日本大将源入首 曾 曾 危 清公


日本天皇大将 橋 兼 秀 長 公

日本大臣入道 平 大 将 水 军 左 道

源 氏 後 中 友 綱 派


正一位太政大臣源友春公正二位太政源有信公正三位
大臣冠源康清公









東京都中央区銀座西五〇一
 中泉行正様







岡山市小野田町
筒井徳光



学会古書展の準備中多忙のこと、存じます
 別便にて字本一冊お送りしましたから、御教お願ひ
 します。もしも興味もあつば、寄贈致します。
 字本は記者の名なく、口記未定稿となつておりますが
 禁断の書のためワザと書かされたのかも知れず、岡山
 の古本屋で買ったものから、足守、緒方、決庵、か、弟子
 ありの記みとも想像されますが、確実ならず。漢字も
 富士川遊先も末岡の節、オラレか、ステヘンソレ、アケステル
 か、など読んでもらつたこと。岡山の集談会に供覧したこと
 あり。石田憲吾君に貸して同君が更に調べたことあり
 ステヘンソレ、泉若のオラレが記と和記したものとの判り
 ました。字本の最後の章には義眼も出ております
 表紙に消えか、った木梨木貞一とあり。法医学教室で
 字本もこの頃買いました。下の一字の字は確定せず
 裏の色鉛筆の泉書、木梨木貞次郎とあり。その人が
 所有者（或は記者）と思ひますが、調べても不明でした。





緒方富雄教授か知三郎先生か見取頂いたりと
 思いながら、その概を得ず、今日に至りました。好概も
 ありましたら、尚兩人あまは、適者の先生の見取頂いたり
 ちつとはつせり致しませう。尚考考の字、真同封して
 おきます。

ちつと早くお送りしたく思いながら、医師会の負乏ク、こと
 引つ二年未だ未だの形、体系、健康改善、及対、規程、対策、etc
 日々夜追われ、運し、び大変おくれました。

二月中林康教授の原本とお送りした、こと申送りました、り
 貴兄が古書屋のお世話をしておられること、こと、お届り
 申しました。小泉八雲の「眼」について、この「雑文」も、出、笑、見
 に出します。岡山名産、医者の文芸志「綜芸」です。

三月六日

筒井徳丸

中泉学兄

No.