

著者及書名

扶氏經駁遺訓
訂正書寫
今泉元甫

年

番

乾



著者及書名

扶氏經驗遺訓
訂正書寫本
今泉元甫

年
番



著者及書名

扶氏經驗遺訓
訂正書寫本
今泉元甫

年
番







二

一

扶

一

五

三

扶

二

上

四

扶

三

下

六

扶

四

八

六

扶

五

七

扶

六

十

九

扶

七

十一

扶

八

十二

十二

扶

九

十三

扶

十

十四

扶

十一

刑

方

共

扶

十二





扶氏經驗遺訓卷之一



凡例

一此書ハ布律彼邦ニ施地医管扶歌蘭土紀元一千八百三十六年七年保独力乙語以テ之ヲ著和蘭和蘭医管華傑滿二千八百三十八年九年保之ヲ譯スル所ニ原木題又ルニ五十年ノ間經驗ノ遺言ト題ヲ扶氏ノ年末以テシテ審カシル也又十金氏前後ノ著書等ヲ以テ之ヲ考ワルニ當時ノ年行ハ十年ニ下リ且ツ其扶自序ニ曰ク予病一生涯日医小学トニ終リ病ヲ医シ人ヲ教導スルモノ今茲ニ

扶氏經驗遺訓卷之一

五十歳諸病治法ト初学教導ト要録ヲ実驗ニ得ルモ
共ニ其要領ヲ發明セル者ハトモテ則チ今チ其要録ヲ身後遺シ
メナカラス又今之ヲ集録シテ自後ニ遺メ以テ後学ヲ教
導セシメトナリ 教訓セシメト益シ此書ノ旨趣ニ題名ノ由テ出レ所

又曰ク予カ此著述ヤ世人譽譽ニ官セズ唯実驗之レヲ録

ス是レ壯年ハ徒ヨ得テ能ク又ハ所ニ非又幸ニ我老茲

ニ達スルコトヲ得ルハ悦ハシカラスヤ其高老権メ香ル

ハシ而メ扶氏ノ著書頗ル多シ就中原病論神經熱經驗

書撰論等托前人譯又ル所往々我邦ニ濟来ス其理論

總欲ト專ト古今ノ流弊ヲ挽ノ毫モ臆度ヲ交ハス不
了實驗ヲ経ル者ニ非カレハ之ヲ筆セズ是皆医家秘要



而其論理則總欲ヲ蓋シ古今ノ習弊ヲ挽ノ毫モ臆度

メ書タルコト人ノ知ル所ナリ武列篇神經熱經驗書ヲ譯

レ其序ニ贊メ云フ扶氏ノ著書ハヤニ學室ヲ工夫ニ成

ルニ非又皆口ノ病床ノ實驗ニ出ル者ナリト又以テ西

洋一般番之ヲ傳信スルコト知ルハレ而メ其諸著今ヲ距

ルコト三四年ノ前ニ在テ然リ矧ニマ此書ヲ老煉ノ後

ニ成ルヲマ其濟世ニ鳴益アルモノ必セリ予頃日此書

ヲ得テ絶トスルコトニ篇毎病着法及ヒ原病メ確論治

法ノ妙処讀ムニ隨テ曰来ノ疑團頻々氷釈スルモノ少

ナカラス實ニ喜悅ニ堪ハス殆コト寢食ヲ忘ル因テ以

テ之ヲ譯メ之レヲ同志ニ示シバ其喜亦予カ如クナラ

診察ノ法則ヲ示メレ
次ニ各病治法ニ涉リ終
リハ判絡阿某等吐劑
用テ説ト医家ノ聲長戒
トヲ詳説セリ熟読數
回ニ味ヒラ生レ愈玩亦
ハ愈意味ノ深長ヲ覺エ

一

正

ニト此ニ於テ遂ニ固陋ヲ顧ス敢テ梨東ヲ尖テ予固ヨ
上梓シテ中乃希世ノ寶者文多ヲ以テ勿レ
リ文辭ニ爛ハス辭甚殊ニ甚ニ者官華ニ之ヲ怨セヨ

一編中每病必又先以始ニ者法ヲ奉ケ次ニ原病ヲ揚ケ終
リニ治法ヲ示ス者法ハ原語其重儀乃私失本病ヲ安知
スルノ法ヲ示テ原病ハ原語多傑危病ノ起因ヲ推究ス

ルノ法ヲ去治法ハ原語的刺必病ヲ治愈スルノ法則ヲ
示テ扶本乃自序ニ云此論專ラ簡約ヲ旨トス故ニ審法

至ニハ唯其病因布ノ徵候ヲ奉テ他病トノ年別ヲ示又
ソニ原病条ニハ治術ニ益アルモノ、ニ撮レテ之ヲ論

治法条ニハ各病治法ノ基本ヲ示メレ且以自ラ實驗

ヲ經ル者治法ニ非カレハ之ヲ奉ケ又總テ新奇ノ策
方未タ經驗ヲ致サレハ一モ採用セズ其言ノ如ク

一篇中論說ヲ文サラス其要領ヲ掲ク學者其言ノ如ク
重直ニ達セサレハ或ハ約ニ據ラテ然レ熟讀味メ能ク其要ヲ

一編中人身諸器諸核関及ヒ病証等ノ名稱目ニ慣レサル
新名ヲ構成スル者多シ是レ彼邦医道日々隆盛スルニ

從ヒ古人ホメ言ハサル所ヲ云ヒ或ハ旧名草ハルニ傑
ル其名称大抵予カ譯述スル処ノ原病約論中ニ詳説ス

ト魚氏其洩ル所者ハ各名下ニ原語ヲ附レ或ハ註説ヲ
加ヘ以テ考証ニ具ヲ且編中理論ハ出ル者ハ原病學ニ

加ヘ以テ考証ニ具ヲ且編中理論ハ出ル者ハ原病學ニ

得ハ則必ス
際ニ於テ自
ラ知ハレ

百ノ上ノ一
其言ノ如ク
重直ニ達セサレハ或ハ約ニ據ラテ然レ熟讀味メ能ク其要ヲ

一書中余カ愚按ヲ加
ヘテ註釈ヲナス者ハ
皆其上下ニ〇ヲ記
メ分註トセル者ハ別ニ
符ヲ設ケス覽者混
同スルヲ勿レ

一此舊原本初メニ病疾皆自然衰能ニ依テ治スルノ公論
ヲ奉ケ並ニ診察メ法則ヲ示メレ此ニ各病治法ニ涉リ
終リニ刺絡吐衄阿莖啓用法ノ秘決ト医家ノ要務トヲ
説クセリ今先ツ其各病治法ノ篇ヲ譯シテ之ヲ上梓ス
前後ノ余論ハ別ニ抄訳シテ共ニ後ノ附録トセントス
其議論精詳專ラ懇深切ヲ旨トス是又學者讀ニ甘ルハ
トス者法宜其トスルヲ混同スルヲ勿レ

一編中茶島和蘭茶鏡名物考同補遺及ヒ吉靈開宗ニ出ル
者ハ別ニ注釈ヲ加ヘハ名鏡名補舎符早ヲ記シテ檢
索ニ便ニス若シ右ノ書ニ洩ル、処ノ者ハ各々名下ニ
附ヲ記シテ某方篇ト後ニ其製法ニ附録ス

カキサレキナリ

一編中茶島和蘭茶鏡名物考同補遺及ヒ吉靈開宗ニ出ル
者ハ別ニ注釈ヲ加ヘハ名鏡名補舎符早ヲ記シテ檢
索ニ便ニス若シ右ノ書ニ洩ル、処ノ者ハ各々名下ニ
附ヲ記シテ某方篇ト後ニ其製法ニ附録ス

天保壬寅夏五月

章識

一、...
 二、...
 三、...
 四、...
 五、...
 六、...
 七、...
 八、...
 九、...
 十、...

扶氏經驗遺訓目錄

卷之一 第一編

急性熱病

總論 單純熱

神經熱 癩敗熱

卷一眉熱及聖京極熱

傳涼神經熱列漢多疫

癸黃熱 哥鳥埤百松莖

狂大咬傷 恐水病 密尔多扶兒

四十三ノ

卷之三

慢性熱病

間歇熱 遷延熱

卷之四

癩病及血液貯積

總論 腦癩 骨髓癩

口內壞疽癩 舌癩

胸癩 心臟癩

腹內諸臟癩 胃癩

腸癩 肝癩 脾癩

膈膜癩 腸間膜癩

碎癩 腹膜癩 網膜癩

腎癩 膀胱癩

子宮癩 卵巢癩

布蘇乙扶斯 腰至腸內

眼癩 耳癩 羅斯

帶狀羅斯

卷之四六

倭廣諸病

總論 倭廣 膝痛

腰痛

感冒

感冒常痺

卷之五七

第五編

腸胃病

腸胃汚物及諸種腸胃病

卷之六八

第六編

神經病

總論

精神病

依刺昆垵尔及歇以私的里

卷之九

癲癩

垂踏病

秦漢虞

夢中行步

覺不寤

不寐

刺把厄亞

振慄

瘧疾及關緊急

喘息

心悸動

咳嗽

痰咳

嘔吐

吃逆

神經病

瘧病

頭痛

面痛

齒痛

耳痛

胃痛及胃証

嘈雜

心痛

恐水病

渴病

善餓

錯聽

錯視

花風

瘧病

卒中

窒息

昏冒失氣及

卒厥

眩暈

昏睡

弓处麻痺

隔噎

不語呐吃及

瘡疔

胃弱

胃噎

交接无力陰至及七
精不化

里內障

耳聾

失顛及失寐

皮膚不仁

不食淫欲缺足

卷之七

削瘦病

總論

肺膿腐蓋

肺勞

吐膿肺勞

急性勞

咽喉勞

肝勞腎膀晚勞及子宮勞

虛晚勞起因于諸液及精力
脫七ノ者是十ノ

粘液勞

神經勞遺處神經五

脊髓勞

老衰病

粘瘦

肺結核勞

歇屈扶加甲刺戟連綿不止
可起之削瘦病之

卷之八

氣液精聚病

水腫總論

腹水

胎水

心囊水腫

頸水及腦水腫病

皮膚總論

風氣耐毒

穀脹窠積氣腫

子宮氣腫

卷之九

脫血病

總論

失血總論

咯血

吐血

痔疾

里物吐下病

尿血

斑病 血症之屬

脫決病總論

吐涎

脫汗

小便失禁

尿崩

膀胱粘液流泄

粘液淋

遺精

耳濕

完穀利

乳糜利肝崩

泄瀉

痢疾

霍亂

卷之十

閉塞病

總論

便秘吐糞病

尿閉

盈氣閉

卷之十一

皮膚論

總論

痘瘡

類痘

書

五

牛痘種法變痘

麻疹

猩紅疹

律別屋刺猩紅疹一種

越收罗

葛六羅斯粟疹

打撲斑

水泡疹天泡瘡一種

聾口瘡

痘 頑癬

屈臣私多施尔心艾及撒頑癬一種發于額下平眉

癩

皮膚焮赤血氣頑瘡

銅色疹

瘍瘡及瘍疽

皮膚剝爛

夏日班官班一種

默埤越的尔斯

皮膚原硬聾掌以一種

科髮病

痣

禿瘡

潰

卷之十二

液頂變性病

總論

萎黃病

蒼身病

失苟尔倍苦

黃疽

瘰癧

頸腫瘍

英吉利病

痛風

梅毒

脂肪過溢

卷之十三

成形新夕ニ形ヲ結フモノ

尿石 膀胱結石及骨石

胆石

卷之十四

婦人門

婦人病總論 月經論

婦人自固性 月經初末

月經閉塞 月經過未

月經痛 月經初止

妊娠 妊娠授生

妊婦腹痛及齒痛 妊婦搐掣

分娩 產婦固布性

產後治法 葶勞

乳汁初出 乳汁過溢

產後水腫 白帶下

石婦

卷之十五

小兒門

小兒自固性 小兒診法

歲戒總論 小兒授生

初生諸病

卒厥

黃疸爛斑

聾口瘡眼焮衝羅斯

牙關緊急

喘息

梅毒泄瀉

嘔吐瘧疾熱病

胃熱胃熱生瘧熱虫熱焮衝熱發疹熱

齒牙初生

皮疹

義膜咽喉焮衝

急危喘息

腦水腫

疝勞

跛病

卷之十六

藥方篇

總計二百八十方

扶氏經驗遺訓卷之一

足守

備中

緒方章公裁

重譯

第一編

急性熱病 アエブルスアキエターニ

西肥

大友 志 景德

參校

總論

允テ熱病品類多端ナルトモ之ヲ要スルニ皆是一個ノ急
 動ヲ進シ諸器ノ運營増盛シ以テ體温過熱セルノ一
 性病ナルニ其本性血脈系統ノ運營左進ノ急
 諸機威メ増盛シ必ス体温過熱ヲ為シ是故ニ各種ノ熱病
 皆焮衝性ナラサル者ナシ其勢ヒ倦カニ増劇スレハ輒チ
 真焮衝熱ト為シ是故ニ又諸熱病必シモ其區域ヲ固守セ

〇精カハ 旺衰ニ隨ニ生機ノ轉衰ニ應シテ或ハ互ニ
 九生機此ノ如ク无進増進ノ長ク運綿持統スルモノニ非
 交換ニ移リ或ハ速ニ経過シ傳フルハ復故シテ善良ノ
 不必ニ衰敗シテ依ニ死ニ至リ若シクハ復故シテ善良ノ
 分利ヲ得テ健全ニ復シ若クハ轉シテ他病トナル故ニ諸
 熱病更ニ各種ノ熱病ニ変シ或ハ遂次ニ轉變シテ各種ノ
 熱病ヲ経過スルトアリ論ハ小治メ單純熱ナル者熱性ノ
 飲液ニ由テ燄衝熱ニ變シ是ニ於テ淚血過度ナルカ若シ
 之ヲ急タレハ更ニ神昏熱ニ轉シ終ニ復テ間歇熱ニ移ル
 一アルカ如シ割註 前ハ始メ單純熱ナル者熱性ノ飲食ヲ服用メ燄衝熱ニ移リ
 微候 惡寒發熱脈數四肢倦怠小便失常之レヲ熱病ノ通
 証トス而メ其熱一向ニ替留持續スル者アリ或ハ進退弛

〇變形ヲ以テ他病ニ變
 レ或病ニ益劇シテ總身
 ノ生力虚脱シ若クハ貴車
 器其害ヲ被リテ終ニ死
 滅ニ歸ス其全分利ヲ得
 ルト否ラザルトハ殊ニ危
 ト小便トヲ以テ

張ヲ為ス者アリ但シ證
 ニ屬セヌ性熱病ニ屬スル
 九ノ熱病第七日第十四日若シハ第二十一日若シ
 一第ニ十八日ニ至テ始テ解散又故ニ之ヲ分利日ト云フ
 其至過ヲ五期アリ初期曰進期曰退期曰復期曰
 ナリ其遊期則チ是レ分利解散ヲ為スノ期ナリ故ニ此
 於テ其分利全キ者ハ必ス較落ソ排泄テ氣ヲ
 以テ其復期ニ至リ必ス較落ソ排泄テ氣ヲ
 其排泄必ス退期ノ間連綿持統スルナリ其分利全キ
 以テ患部轉移シ病轉移ト云フ
 如キヲ患部轉移ト云フ舊留熱間歇熱ニ變シ
 如キヲ患部轉移ト云フ如キヲ病轉移ト云フ

之ヲ不全分利ト去フ故ニ熱病ノ故轉ハ健全ニ復スルト
 他病ニ轉スルト死ニ陥ルノ至路ニアリ其死ニ陥ル者ハ
 十八全身生カノ虚脱ニ由リ一ハ貴要ノ器病害ヲ受クル
 千由ル全分利ノ確徴ハ皮膚ノ小便トニ在リ則皮膚一様
 二滋潤ヲ得始メ全ツ稀冷ナルカ若クハ溷濁セル者冷其
 上辺證微ニメ麦稗色ト為リ器底白色若クハ帶赤色ノ沈
 逆ヲ見ハハ二渾身普ク溷濁是レ十全ノ回復ヲ得ル者ハ是レ十全ノ回復
 脈動ヲ以テ功実ノ徴トス若シ脈ノ疾數減退テ軟緩トナ
 ルニ非サレハ假令回復ノ諸証具ハリ患者輕快ヲ覺ワレ
 未タ信扱スヤカラス諸証減退レテ脈仍ラナルモノハ必

血管系 心藏及動靜
 二脈ノ拘絆
 神経系 腦髓脊骨筋及
 神至ノ總括

以是レ更ニ他病ニ移ルノ微ナリ故ニ脈度ニ意最確実トシ
 原病 此病ヲ誘來スル者甚々多端ナル者ニ較者凡レ刺
 乾ヲ為シ若シハ運管ノ偏倚ヲ起スモノ悉ク皆其誘因ト
 為ル殊ニ寒暖ノ變更腸胃ノ汚物天行毒及傳染毒等ヲ其
 最ニナルモノトシ其素因ハ殊ニ多ク心藏及心動脈ニ在
 ル者ニメ腦及心神経ニ在ルハ甚々稀ルナリト以故ニ神
 經薄弱ノ徒依剝昆虫介及心歇以私里性ノハ急慢性病
 弱力用急慢性病ニ羅ルル稀ルナリ或ハ以テラシ熱病ハ悉ク皆一部ノ刺
 戟ニ由ル者ナリ此ニ來ルテ多クト重床悉ク皆然リト
 不ルハ則チ總身先現ハル者ナリト此ノ如キ者亦少ナカラニ一様ニ發熱シ一部ノ嫩衝等ハ其

三
 生
 生

余波ニ出ルハ数イ之ヤルハ非

凡諸熱病其本性ハ同一ナリト云凡其起ル所各器其性質

病ニ別ス法ヲ等フセス其類大率左ノ如シ

其一二 体内何ノ部分モ殊ニ侵サル、所ナキ者是也其病患

何ノ種類ニ属スルナキ者之ヲ單純熱ト云フ

其一二 心臓動脈殊ニ侵カサレテ其運管元進シ血質ノ性

力増盛セルヲ如シト云フ

其一二 脳及ニ神經殊ニ侵カサレテ生力ノ運管減性ソ傾

衰弊ニ傾ケル者是

其四 其性カ運管減性ナルカ名ニ血液溶崩スルモノヲ

腐敗熱ト云フ其質溶潰セル者是ナリ

其五 腸胃殊ニ侵カサレテ病毒腸胃内ニ在ル者之ヲ腸胃

熱ト云フ者是ナリ

其六 其熱皮表ヨリ起因ス殊ニ洩乙カ膜

胆液起シ過酒ノ飲衝起ラ起シ腐敗物ノ腐敗熱ヲ起ス

以上六種ノ熱病

其性質

其類大率

單純熱

心臓動脈

脳及ニ神經

血液溶崩

腸胃熱

其熱皮表

洩乙カ膜

其性質

其類大率

單純熱

心臓動脈

胆液起シ過酒ノ飲衝起ラ起シ腐敗物ノ腐敗熱ヲ起ス

自カラス唯其除病的ノ機矣ヲ助ケテ故ニ全ソ分利ヲ得セ
 退ケルニヤラ要也又唯其仿害ヲノ機ヲ扶ケテ全
 カ強キヲ得過タルハ之ヲ退ケ弱キニシテ其害ヲ進メ運
 ハ之ヲ除キ其害ヲ過シ外者之ヲ退ケ其害ヲ進メ運
 管ニ中和ソ適度ヲ守ラレバ外者之ヲ得テ其害ヲ進メ運
 ル者能ク此理ヲ以テ解メ安クニ其害ヲ退ケテ其害ヲ進メ運
 其治法ノ通法左ノ数件ニ属ス

第一 癉因ヲ肥除スヘシ即皮膚ノ蒸氣ヲ南達シ腸胃ノ
 汚物ヲ排泄スル類是レナリ

第二 熱性ヲ察メ各々其治法ヲ立ツヘシ及ヒ防炊衝法
 神聖鎮靜法衝動法強壯法止腐法腸胃掃除法発汗等是レ其

ナ品類ニ隨フ是レナリ

第三 局癉ノ諸患ヲ治スヘシ

第四 自然良能ノ所為ニ注意シ分利ノ機揆ヲ扶助セシ
 一ヲ求ムヘシ

第五 其症ノ变化其病ノ轉徙ニ注意メ預メ其策ヲ廻ラ
 シ

九ノ熱病品類甚々區別紙上ニ論説スルカ如ク較然ナリ然
 者ニ非ラス或ハ互ニ轉徙シ或ハ互ニ相合任スルハ其
 衝熱ト神經熱ト相合シ腸胃熱他熱ヲ夾シ口常ニ之レヲ
 神聖熱ト換以スルカ如ク候リ他熱ノ狀ヲ現スル者アリ
 ルカ如ク或ハ亦僅カニ他ノ熱性ヲ帶スル者アリ即チ諸

与カレ所ニ非
 學者能ク此
 理ヲ解メ我
 リニ人壽ヲ我
 一ノ勿レ

醫文
 六
 生

目夫熱病時ノ品類ヲ果ニスト維生原者一性也
 其病ニ神淫熱症ヲ帯ルマアルヨリ然レモ其行ナリ是
 故ニ連別品類載然タル者ハ固ヨリ對證ノ治法ヲ求スヘ
 キハ常子ニ諸症共ニ熾性ヲ以テ其本體トス念ハシ
 ケレ生石ヲカシ者ハ須ク先ツ防熾法ヲ施シ蔬食ヲ與
 日要又諸論ノ首章ト諸症各症代々異トス至ル必竟其証
 以テ其時ヲ俟ツハ是レ名術ノ大者ナリ
 又得ナルハ爲又ハハナリ是故ニ凡ソ熱病交感トソ其性
 著明ナル者ハ始メヨリ各個リ治法ヲ施スヘキト固トヨ
 リ論ナレト至床然ラサル者ハ須ク防熾衝法ヲ施シ平
 和ナル蔬食ヲ与ヘ以テ其時ヲ俟ツヲ大幸トス
 將息通則七件
 攝養法

第一 臥床ニ就テ靜息セニテヲ要ス熱病ノ患者皆倦怠
 ラ覺ニ是レ臥床ニ就カシムルノ自然良能ナリ其効アル

乃臥メ靜息スレハ
 一 實ニ聲異ハ心乃チ脈動降鎮シテ血行順調シ生カ作用
 遂ソ自然ノ除病機ニ向テ分利ノ機採亦凝滯ナキトテ
 得ル故ニ此節法ハ諸熱病共ニ欠クヘカラサルノ要務ナリ
 第二 飲液多量ヲ許スヘシ是レ分利催進スル要支ナリ
 凡ソ諸熱病ハ必ス陽ヲ兼ル者亦自然自能ナリトス蓋シ
 飲液ハ水ヲ良トス胃弱家又ハ其速カニ血中ニ達セニテ
 欲スル者ハ大麦莖餅林檎蒸ノ煮汁ヲ与フヘシ
 第三 食量ヲ減込シ諸熱病食欲欠ナル者コレ亦自然良
 能ナリ諸機皆分利ノ機採ヲ專ラナルカ故ニ飲食消化ノ
 機力自ラ衰ヘ食スル処ノ物化セスメ胃中ニ停滯レ以テ

此由殊能ク分利催進

腐壞ヲ致スナリ是故ニ強テ之ヲ去フレハ体ヲ養ハス却
テ病ヲ培スルニ足ル但シ稀養汁ニ益飯若クハ蒸麥粉ヲ
加ヘ煮ル者及ヒ煮熟セル菓實ヲ食セシメ凡テ肉食
ヲ禁スルヲ良トス

第^四 室^中ノ大氣ヲ清涼淨潔ニスヘシ此^熱度ヲ減シ燠衝
及ヒ腐敗ヲ預防スルソ要法ナリ室内ノ大氣鬱閉熱蒸ス
レハ則他ノ諸因ナリ氏^{キモ}草化熱ヲ腐敗熱ニ轉セシム故
ニ其^室温度ハ大抵列氏^度温管ノ十四度ニ越エルヲ宜シト
ス^而其^大氣ヲ清淨ニスルノ最モ良法ハ唯新鮮ノ外氣ヲ迎
フルニ在ルニ合^密術ニ由テ硝酸塩等ヲ撒スルノ法ア

リト^氏利^カクメ却テ害多シ殊ニ肺ヲ害ス但シ^酷ヲ取
テ室中ニ撒撥スルハ大ニ^益アリトス

第^五 温覆スヘシト^氏食^薄輕カラニ^テ要ス然^氏羽
毛ヲ充ツル^食薄ハ^宜シカラス唯菓^薄ニ臥メ^毛布^食ヲ
被ルヲ最良トス

第^六 神^淫安^静又^欠ク^ハカ^ラ要ス凡テ^情意ノ^感動ハ^喜怒
^悲愁^共ニ^害アリ

第^七 毎^日上^闇以^ハカ^ラニ^テ要ス^者熟セル^菓實^類
ヲ^食メ^仍シ^便利セ^サル者ハ^毎晚^灌腸^法ヲ^施スヘシトス

單純熱 アブリスレニアプレクスス

微候 熱病ノ常証ヲ辨ツ具フルノモニシテ別ニ定徵アリ

ルコナシ然メ其

此証或ハ十二時間ニ進退シテ分利ヲ遂クルモノアリ之

ヲ一日扱ト云フ 諸部運管

病源 總身覺運過不及ナク中和ソ度ヲ得テ健康ナリシ

モノ善微ノ所由ニアリテ発スル者或ハ健康ソ又卒

カニ傳染毒ニ感メ発スル者即良性瘧疾或ハ又

諸熱病未タ確然タル定徵ヲ見ザル間ハ医先ツ之ヲ單純

熱トメ斡旋スルヲ法トス未タ其定徵ヲ得スレテ侵

諸熱病ノ初起
如キ多ク此熱ニ
屬ス能ハズ

第二ニカノ如キ輕
キ防嗽劑ヲ用ヒ或
ハ酒石酸ヲミシト
ハ且靜息セシメテ
食量ヲ減シ飲液
ヲ多服セシムル等

之ヲ各種ノ熱ナリトシ妄リニ其治法ヲ施ス トカハ其

医治ヲ待タスメ自ラ治スヘキ 者或ハ 之カ為ニ変惡シテ難

治ノ病ニ轉シ或ハ方証全ク相反スルニ至ルトアレハナ

リ喻ハ嗽衝熱ノ初發漫ニ衝動利ヲ投シ或ハ神經熱ノ初

起誤テ清涼法ヲ施ス等ノ變端ニヤサレトセ

治法 總論ノ治法 攝養法皆之レニ的當ス而靜息柳臥也

ハメテ食量ヲ減シ飲液ヲ多服セシメ 飲液多服ノミヲ以

輕井防嗽劑 第一方及日酒石酸 ヲ用フヘシ又芒硝

荅麻林度滿那 色 灌腸法ヲ施スモ大ニ利アリ胃腸ニ汚物

アリテ熱ノ為メニ留滯シ其レヨリ更ニ害ヲ起ス者常ニ

多ケレハナリ

熉衝熱

徵候

初起惡寒甚シク脈強數ニメ翁々発熱シ口渴キ尿

赤ク皮膚古上共ニ乾燥シ脈疫諸証共ニ遑動セズ脈ト呼

吸ト應シ諸証ト脈ト進退ヲ一ニシテ経速クハ以テ

期ノ次序分利ノ日期依リテ発汗利尿若シハ失血ト由テ

十全ノ分利ヲ得ル者是ナリ其終始大抵七日ヲ延ルモ十

四日ヲ越ヘス然レ或ハ又神經熱病致熱等ニ変ル高シ日

ヲ延ル者アリ蓋シ此熱良性ナリ重証モ始ヨリ防

熉衝法ヲ施コセハ治奥ルニ難クモ此熱ハ一部ノ熉衝

ヲ兼子易サトス

原病 近因ハ血質ノ生力過越ノ動脈ヲ運営元盛シテ

血液稠源ヲ致スニ在リ故ニ此病ヲ放テハ脈管ノ裡面

必ス熉衝セザルニ能ハストス遠因ハ乃熉衝性ノ越必

淫蜜質及ヒ其英埜熉衝性ノ稟賦少壯ノ年齡自

ノ高瘦北風東瓜等皆素因トナルヲ起シ又ハ中諸件

加酒勞冒寒外傷常非常ノ感一部ノ熉衝或ハ他熱病其治

日誤テ増劇ナル者等皆誘因ト為ル件皆其誘因トナル

治法 殊ニ心藏動脈ノ生力ヲ減損シ鐵維ヲ弛緩シ血

相

相

相

相

相

ヲ稀渙熱勢シ温疾ヲ退却スルニ在リ其生カヲ減損スルハ瀉
血ヲ行ヒ硝石類ノ清涼茶ヲ与ヘ清涼灌腸法ヲ施スルハ
鐵維ヲ弛緩スルニハ飲液ヲ多服セシメハハ稀渙
スルニハ甘秉ニ胡石刺真亞斯達等ヲ合用ヲ其
疫ヲ退却スルニハ冷氣及ヒ冷水ヲ外服外服ハ道并道并而其
モ主トスヘキ者ハ刺絡ナリ刺絡右ノ功ヲ悉ク兼攝ス
ル者ニテ多少随意ニ生カヲ減殺サレテアル者ナリ乃カ
焮衝ノ劇証ヲ推シハ至リ切ナル
ト多ク此術ヤ細慎メ之ヲ行ハニテ要ス若シ誤テ無益
多量ノ血ヲ奪却スルハ隨テ救フヘカラサルノ大害並ニ

起ル乃血液而或ハ焮衝熱之カ為ニ轉ノ神經熱及ヒ腐敗熱ニ陷
リ或ハ生力之カ為ニ脱亡シテ分利ノ核揆ヲ致ステ能ハ
サルニ至リ或ハ之ニ由テ遷延経久メ衰弱及ヒ難治諸患
ヲ起スニ至ル招ク是故ニ此病ハ其証ノ輕重ヲ分テ治法
ノ緊要ナリトス
輕証 唯食量ヲ減シテ清涼ノ品ヲ与ヘ静息多飲等總テ
總論ノ通法ヲ用ヒ清涼下劑ヲ与ヘ硝石ヲ同服セシムル
ハ乃チ足ルナリ胃弱家及ヒ硝石ニ由テ劇シク下利劇
北者ハ硝石ニ吐酒石ヲ加ヘテ占クハハ硝石四方ノ
硝石ヲ硝砂ニ代ユルカ如シ若シ硝石ヲ連用スヘクメ衰

弱ヲ起スノ恐レアル者ハ硝^消酸^消曹^消達^消ヲ以テ之ニ代フヘシ
即第五方硝石ヲ去テ同量ノ硝^消酸^消曹^消ヲ加フルカ如シ或ハ
其初癸ニ於テ速^消カ^消シテ第六方ノ清涼下劑ヲ与フルモ大ニ
功アリ

重証 諸証劇烈麻痺ニ強實ニメカ有モノ是ナシ此証ハ
唯嚴ニ攝養ヲ慎テ刺絡ヲ行フ外^{他^消丹^消丸^消散^消等^消ヲ要ス}刺絡ノ害^切キ
又用法ト分量トニ係ル^ハ他ノ諸茶ニ於ルト一般^ナナ^ナナ^ナ
ニ過^レハ功ヲナサス多^クニ失スレハ害ヲ生^ズシ^ル能ク法
ニ過^シテ之ヲ行ヘハ唯一回ニ^{其^切力^切ニ}數回又ル^ルヨリ其功
大ニ優^ルル其法左ノ如シ

第一 早ク之ヲ行ニ^テ要^スニ^ハ嫩衝ノ^{初起}神經ニ當テ之ヲ行
フ^ト愈^ム早ケレハ其奏功愈大^{ナリ}嫩衝ノ諸証已ニ^全除^ク
ク癸^レ現^レメ而後ニ之ヲ行フハ三四回^ニ及^ビ且多量ヲ^減ス^ル
無^ニ尚^ラ起^ル一^ニ微^ニ返^スニ^カス

第二 其血量ハ唯嫩衝ヲ除クニ足^ルニ^ハ必^ズ過^度ナ^ル
ハカラス其分量^ヲ定^ムル^ニ於^テ是^ニ過^度ナ^ル者^ハ甚^ク害^ヲ生^ズシ^ル能ク
脈^ニ取^ルル^ニ勿^レシ^テ甲^ハ一^ニ丸^ヲ浮^メ足^ル乙^ハ一^ニ丸^半ヲ^用フ^ニ尚^ホ
ワ多量ヲ浮シテ未タ足ラサル者^ハ施^ス術^中
行^フノ^間數^回脈^ヲ按^シメ其強實ナリ^ニ者^ハ降^鎮シテ軟^緩シ^テ得^ル
ル^ニ至^ルハ^シ然^レ疾^決メ卒^倒スルニ至^ラル^ルト^勿シ^ル已^ニ

相厚トナシハ血液今卒倒ニ由テ循行滯止スレハ凝結メ
 心藏及ヒ若シハ大血脉ノ裡面ニ繫著シ以テ贅肉状ノ者ヲ生
列ヲ謂或ハ肺ニ滯塞メ更ニ肺炊衝ヲ發スルヲアレハ
 ナリ其卒倒ヲ防クニハ仰臥セシメテ之ヲ行ヒ脈不存若
 クハ結代ヲ見ガハ直クニ是ヲ止ムルヲ宜シトス
 第三 血ノ逆出單レ以テ急疾ナルヲ貴フ
 以テ大ナラニテ要以テ其血脈形ヲ為レテ急疾ニ逆射出
 シハ脈管之ヲ為メテ萎縮スルヲ得テ炊衝ヲ撲滅スル
 ニ足ル者レ夫レ後除ニ流出ノ臂ニ浴ヒ或ハ擦出シテ稍
 泄ル者ハ如クハ萎縮スルヲナシ蓋シ急疾ニ逆射スル血ノ

奏スルナシ故ニ急疾ニ逆射スル血一此ハ後徐ニ流泄
 下ルハ後除ニ流泄スル血ノ五四下ヨリ其功大ニ優レリ
 而シテ血ノ三四此ヨリモ其功倍ニ絶ス而シテ其刺處ハ尺
 澤ヲ良トシ以テナリ
 以テナリス其最モ心藏ニ近キヲ以テナリ
 蓋シ患者多血強壯ニメ年齢少壮ニハ三十八歳至ナル者
 刺絡ニ慣ル徒人健令正ニ之ヲ行フハ其期ニ当ル者或ハ
 常ニ痔血衄血等ヲ由テ輕快ヲ覺ル者或ハ已ニ一部炊衝
 見ハス者或ハ數以テ壅塞專ラ炊衝性ナル時或ハ乾燥
 極寒ノ候等皆刺絡必也ト云フ若シ刺絡ノ当否各ニ難
 ク切害預メ決シ得ハカラカハ宜シク此諸件ヲ参考
 スヘシ或ハ試シニ以テ以テ誤血メ其当否ヲ察スルモ亦

可ナリ其法先絡ヲ刺以一二子ノ血ヲ浮^源断ハヌ双^其手ニ
 脈ヲ接メ其双^源手ニ僅カキ一ニ^其ヲ^其細數ニ陷ル者
 ハ直ニ之ヲ止メ其後從テ覺ル者ハ益之ヲ泄スザリ
 刺絡ニ代^等ル^等蜈蚣若クハ吸角^等ヲ^等以テスルハ宜シカ
 ラス^等焮衝ヲ^等拔去シテ之ヲ根治スルニハ^等通射急疾ノ^等浮血
 子由テ^等脈管ノ^等蓄積ヲ^等耗スルニ非サトハ^等切アル者ニ非ズ
 或以テ^等蜈針ト^等蜜氏四十個^等若クハ六十個^等ヲ^等刺^等以テ^等數
 多量^等ノ^等血ヲ^等泄^等又^等得^等ハ^等刺絡ト^等切^等ヲ^等同^等ス^等ヘ^等ト^等決^等以^等然^等ル
 者ニ^等非^等ズ^等唯^等嬰兒^等及^等七^等怯弱^等ノ^等健^等ノ^等一部^等ノ^等焮衝^等ヲ^等患^等ル者^等ニ
 代^等用^等ス^等ハ^等キ^等ノ^等眞^等ノ^等焮衝^等ヲ^等根^等治^等ス^等ルニハ^等通射^等急疾^等ノ^等瀉血^等ニ
 蜈針^等ヲ^等以^等テ^等之^等ニ^等代^等ワ^等ハ^等キ^等ノ^等眞^等ノ^等焮衝^等ヲ^等根^等治^等ス^等ルニハ^等通射^等急疾^等ノ^等瀉血^等ニ

由テ^等脈管^等ノ^等萎縮^等ヲ^等誘^等フ^等ニ^等非^等ズ^等ハ^等必^等ス^等切^等アル者^等ヲ^等見^等ス^等且^等夫
 凡^等ソ^等刺絡^等必^等シ^等モ^等一^等回^等ニ^等メ^等能^等ル者^等ニ^等非^等ズ^等之^等ヲ^等行^等ノ^等後^等焮衝
 未^等夕^等撲^等ス^等ル^等コ^等ヲ^等得^等ス^等四^等時^等六^等時^等若^等ク^等ハ^等十二^等時^等ヲ^等經^等テ^等撲^等更
 増^等盛^等シ^等脈^等故^等ノ^等強^等大^等ニ^等復^等セ^等ハ^等復^等シ^等之^等ヲ^等行^等フ^等ヘ^等シ^等或^等ハ^等三
 回^等モ^等行^等ハ^等サル^等ハ^等カ^等ラ^等オ^等ル^等者^等ニ^等行^等フ^等毎^等ニ^等必^等ス^等細^等慎
 脈^等度^等ニ^等注^等意^等シ^等且^等テ^等浮^等出^等セル^等血^等ノ^等皮^等膜^等ヲ^等参^等考^等メ^等其^等多^等量^等
 ヲ^等定^等ム^等ヘ^等シ^等然^等レ^等唯^等皮^等膜^等ノ^等ミ^等ヲ^等以^等テ^等計^等ト^等ス^等ル^等コ^等勿^等レ^等全^等身
 ノ^等血^等液^等悉^等ク^等浮^等レ^等尽^等シ^等ス^等レ^等皮^等膜^等ヲ^等結^等フ^等者^等亦^等之^等レ^等ア^等レ^等ハ^等ナ
 リ^等○^等刺絡^等ト^等相^等兼^等フ^等若^等ク^等ハ^等刺絡^等後^等直^等チ^等ニ^等清^等涼^等下^等利^等ヲ^等取^等テ
 少^等許^等宛^等之^等ヲ^等与^等ヘ^等以^等テ^等上^等圍^等三^等四^等行^等ヲ^等得^等セ^等レ^等也^等
 下^等利^等ト^等熱^等勢^等ヲ^等増^等進^等シ^等テ^等却^等テ^等害^等ス^等ル^等コ^等故^等ニ^等宜^等シ^等カ^等ラ^等ズ^等ト

單純ノ嗽衝熱ハ治法
右ノ如シメ終始清涼
ノ食養ヲ命レ以テ自然
ノ分利ヲ俟ツヘキノ多
ハ熱証自ラ退散ノ別ニ
他枝ヲ要スルコトナシ然
レ其熱証ノ退散轉
御

而後
以吹ニ硝石二三匙ニ吐酒石少許ヲ加テ一昼夜ニ之ヲ用
ニ或ハ礮砂ヲ与フルノ前証ニ於ケルカ如クスヘシ治法
峻下劑ハ熱勢ヲ増進メ却テ其
大抵此ノ如クシニシテ熱証全ク解散スルヲ常トス終始唯
右ノ諸法ヲ施メ清涼ノ振養ヲ命レ以テ分利ヲ俟ツノ外
曾テ伎倆アル者ニ非ズ
轉徒由由テ熱病退シ者數アリシハ是ハ感冒等由由テ
分利ノ核擦ヲ妨害害スルニ出ス其轉徒其轉徒等由由テ
頭暈者者アリ下ヲ有形轉徒ト云膿腫皮膚疹等ニ轉スル是ナリ
無形轉徒ハ芫菁膏膏膏ヲ貼シハ膿腫ハ消シ疔毒布布布外敷
膿腫ハ緩布ヲ貼シ若ク刺衝葉葉葉外敷ハ膿腫潰破破破ヲ促スナリ佳トス
ハ或ハ刺衝葉葉葉ハ膿腫潰破破破ヲ促スナリ佳トス或ハ熱証連綿

或ハ熱証在莖トメ退カス若シハ嗽衝ノ候ナキニ
心テ退カス或ハ第六七日ニ至テ却テ増熱シ而嗽衝ノ微
候ナリ以テ適宜ノ分利ヲ得得得カレ者者ハ此時時ニ至テハ漸ク進
運治法ヲ轉メ以テ分利ヲ命セシメニコトヲ要ス則民民埜
列利精精精三十滴ヨリ六十滴ヲ至ルレレ取テ每一時之ヲ与
フルニ宜シ然レ謹ニテ強キ衝動茶ヲ投ルコトコト勿レ輕モス
レハ更メ復々嗽衝ヲ癸シ易易易者ナリ而仍仍仍テ功ナキ者ニ
証アリ一ハ嗽衝去テ後心藏血脉ニ虛性ノ感動過敏ヲ殘
セル者ナリ此証ハ民埜列利精ニ老利尔尔尔斯水水水一一昼夜ニ
一昼夜ニ一匙ヲ加ヘ之ヲ与フヘシ一ハ過度ノ瀉血ニ由
テ神經熱腐敗熱若クハ遷延熱等ニ得得得セル者ナリ各對証

ノ治法ヲ処スヘシ

允純一ノ燠衝熱ヲ患シ後ハ強壯ノ治法ヲ要スル者稀ナ
シ殊ニ發那類甚タ宜シカラストスル者動脈更ニ血液ノ
刺衝ヲ喚起スル者ナリ但忽弗滿氏越栗失尔必設刺尔
六十滴ヲ取テ日ニ二次之ヲ与フルハ甚タ宜シトス

神經熱

徵候 初起惡寒燠衝熱ノ如ク已甚タシカラス微々寒戰
熱ト交、発シ始、ヨリ連々神經腦諸患ヲ発現スルヲ其効
頭重、頭痛、憂思、悵悶、眩暈、振慄、昏冒、卒倒等ヲ発シ次テ
嗜眠、内外諸般ノ痛症、抽搐等並起リ而虚脱疲勞ヲ覺ス

燠衝熱ハ脈常ニ強ス
現候脈脈微ニ變易セズ
經過期ヲ守リ諸証互ニ
相應シ就中脈ト呼吸ト常
ニ緩急ヲ等ナス

而ノ現候屢虚動シ脈細數軟弱或ハ緩徐ヲ頻リニ轉易シ

透動シ殊ニ小便定リナシ或ハ赤ク或ハ白ク或ハ黄濁シ

呼吸ト脈ト應セズ諸証内外合致セズ或ハ全ク相反又即

乾渴ナク、發痛ノ諸候亦テ痛ヲ發セズ或ハ病劇シテ

自ラ輕快ヲ覺ス等財ニナシ他ノ熱病ノ定徵ヲ見サ

ス且ツ燠衝熱ノ如キ整存合致ノ諸証ヲ見セザル者是ナ

リ○茲凡亦諸証混同シテ神經熱ト燠衝熱ト別シ難キ

者アリ茲ハ試方ヲ用テ之ヲ弁ズルニ若シ者ナリハ

謹慎ヲ加テ試ミニ刺絡シ一二分ノ血ヲ浮メ以テ其功績

如何ヲ視ルヘシ而脈仍ハ浮大ニシ差ヒニ後從テ覺ル者

ハ燠衝熱ナ微ナシ宜シ尚多量ヲ血ヲ泄スルニ脈若シ

カ為ニ沉テ細数ト為ル者ハ則神經熱タルヲ疑フナリ直
 チニ止ルテ益々神証ヲ治ス法ヲ決スヘシ○諸証混同ノ所ニ
 雜チヨリ或ハ神經熱ニ非ナルヲ神經熱トシ或ハ神經熱
 ヲ以テ他熱トスルモ又ハ誤認毎常少ナカラズ且神經証トシ
 經熱トシ別アル分弁セシハアラハ神經証トシ患者ソ
 神經虛弱ニノ病覺過敏ナルヲ由リ他ノ熱病ニ罹リ皆モ
 神經熱ノ如キ諸証ヲ現シ其ノ神証熱ト非ル者トシ其
 九神經熱ノ經過ハ次序アルヲナレ然レ大抵發病前數日
 若クハ數週頭重眩暈四肢顫振頭痛不寐多夢等ノ前有リ
 リテ其分利大抵二十日或第廿八日ニ於テレ或ハ尚

他年別ニ雜キ
 諸証少ナカラ
 ス須ラク審診
 明カスル

ラ時日ヲ延ク者アリ而^{復故亦}其後治ニ於ルヤ甚ク緩慢ナリ且
 ヲ再發シ易シ劇証ハ治後二三月ヲ以テ漸ク發スル者
 多シ其治スルモ又十全ノ分利ヲ以テスル者少ナク多ハ
 轉徒変形ニ終ルヲ常心トス乃チ或ハ粟疹癩瘡膿腫瘰癧
 痔ヲ發シ退或ハ耳聾眼盲健忘精神疾病等ニ終リ或ハ遷
 延弱久ノ神經病若クハ腦腹ノ諸病等ニ轉ズ其死スル
 者ハ生カスル者ハ腦髓ノ麻痺痲痺若クハ壞疽ト血
 液ノ溶崩癩敗トニ在リ故ニ此ニモアル者ハ其危篤ヲ
 預メ知ル○凡此病者其感覺ヲ錯ルリ諸証遠動シテ定
 リナク内外相反スルヲ以テ故ニ預メ其安危ヲ定ム

ル一甚難レ或ハ外候順良ナル者不意ニ脳髓麻痺ヲ得テ
 斃レ或死微悉ク見ハル者却テ全治得ルニアリ然レモ
 其安危住口諸候ヲ以テ徵スヘシ
 脈動凡脈愈短数ナル者ハ危險愈大ナリ總テ脈穩静ナル
 者ハ危險少ナリトス
 小便極メテ諸証微ナル者或ハ濃厚ニメ褐色若クハ血ヲ
 交エル者或ハ雲翳唯上面ニ浮ヒ若クハ畧底ヨリ出テ上
 ニ向フ者或ハ沉墮甚メ上清澄ナラサル者ハ皆大危
 險ノ徵ナリ原ト膿厚ナリシ者漸ク証微トナリ或ハ原清
 稀ナリシ者差濁濁スルハ其ニ回復シ得ハキ徵ナク若シ

夫レ沉逆適宜而上面在シ証微麦稗色ナル者ハ必治ノ
 徵ナリハ必治ノ徵タルヲ疑ナシ
 脳髓神経之機関 精神恍惚嗜眠睡昏或養餉知ラ失フ者
 病進テ弱知過敏ナル者弓外ノ麻痺ヲ現スル者皆ハ危
 者等ハ皆ハ危險最大ナリ
 皮膚 其温渾身一様ナラス或ハ乾燥或ハ冷或ハ赤
 粘汗流滿シ或ハ早く粟疹ヲ発シ或ハ紫
 班ヲ見ハス等愈多キハ愈惡徵ナリ自餘血液溶崩ノ徵
 ルヲ最ニ危險トス則失血血便血下利紫斑痔瘡局外死壞

總身腐臭等是血液溶崩候者ハ最モ危篤トス而シテ

目覚メ易クシテ忽チ眠リ腹脹満メ溶崩下利候者ハ昏睡鄭声撲理線
鄭声撲理線等ハ此諸証以テ現スル候者ハ死候者ナリ
死徵候トシテ如ク治路モ出ル者ハ死候者ナリ但シ耳聾ハ大
抵善徵ナリトス

此病尋常之中輕快神經熱重証神經熱替留神經熱同往未

急性慢性等ニ區別スル候其合候以テ分ツ者最モ治術ニ

益アリク心藏血脉變動殊ニ甚タレカス他ノ合候病

ナ者ハ之ヲ單純神經熱トシ心藏動脈モ浸カレテ

其運動易盛スル者ハ焮衝性神經熱トシ心藏血脉運管甚ク

衰弱メ血質ノ性力減耗シテ溶崩ニ傾ク者ハ腐敗性神

經熱トシ腸胃ノ病患ヲ兼ル者ハ腸胃神經熱トシ

廣質及ヒ聖京候ヲ兼ル者ハ廣質性神經熱聖京候性神

經熱トシ

原由 近因ハ腦髓神經ノ動亂ニメ其餘弊心藏血脉ニ

及ビ且ツ生力衰弱ヲ傾クニ在リ故ニ神經ニ係ルシ諸患

主証ト為テ血脉ニ係ルノ諸証ヲ兼候以テ或ハ其變動力脈

ニ及ハスルテ脈動体温共ニ常ヲ變セサル者アリ或ハ焮

衝ノ素因ナリテ遂ニ焮衝熱ニ轉ル者アリ或ハ虚性ノ

素因アリテ直チニ腐敗熱ニ陥ル者アリ

十九

此珠三神經カヲ抑損以ル諸許皆此病ノ遠因ト為ルカ
 飲而燥養不結飲湯及七畜大気酸素不足細久雜居セ大気
 不良居室不血液脱世等ノ如キ是ナリ故凡性力過度ヲレ
 神經察等病皆神經熱ニ轉シ或ハ勞動房事温被等ノ過度抑
 性諸菜ノ過用瀉血ノ証ニ瀉血等ノ諸病如ハ人ノ過度刺衝
 他種ノ熱病等ノ如キ刺衝過度ノ諸病
 亦遠因ト為ル故ニ急性諸熱證治メテハ劇証ト為ルニ
 遂ニ此証ニ変又或ハ又憂苦悲愁濕氣寒冷西風如キ性力
 抑壓ノ諸病皆此病ノ遠因トナル或ハ直ニ傳赤毒ニ
 治法 神經ノ運管ヲ調ハ血脉ト神經トノ衝調治スル
 二在リ但シ始病常ニ生カノ衰弱ヲ兼カテ以テ要故ニ
 兼カテ以テ要故ニ

此者モ亦
 之トアリ

注意セニ一ヲ要ス故ニ。

其燠衝性ノ者ハ防燠衝利ヲ用テ血脉運管ヲ減却セサル
 ハカヲ又ト強ク真燠衝熱ノ如ク強ク之ヲ投セ又其衰弱
 大ナル者腐敗ニ傾ク者ハ衝動強壯ノ諸菜ヲ用テ其怪率
 搐掣等甚キ者ハ鎮痙降和ノ治法ヲ施スヘシ且患者ノ体
 質當時ノ越必埤密該察ノ起因等ヲ檢査セサルヘカラス
 殊ニ其傳染病ニ起因セルト内部ヨリ發生セルト等ハ
 要又蓋シ其傳染毒ニ起因セル者ハ辛ルニ發ルカ故ニ
 大率皆燠衝性トシテ内部ヨリ發生セル者ハ神經精カ
 以虚性ニ属ス凡此熱病ハ自然分別ニ作スヘキ者他人熱
 干於ル事リ少ナシ其解散三週以内ニアラス治術ノ要辨

然ノ分科ニ委任スヘキ者少ナシ故ニ治術ノ要ハ努メテ
患者ノ食ヲ其危險ノ時期病初ヨリ第十ヲ保護セシ
ムルニ在而治法ハ立ル大司小異アリ各其証ノ異同ヲ辨ス

輕証神經熱即此神多ハ是レ重証神經熱ノ初起期ナリ神

神經熱ノ通証ハ具レテ其度輕クメ脈甚ク短數ナラス謔語

ヲ發スル或ハ之ヲ發ルモ少烏ニメ止ム者或ハ其

諸証相逐初期ナリ連者ニ現ル者少ク此証ハ妄リニ衆方

ヲ雜強セニヨリ簡易ノ法治法ヲ処センコトヲ要ス此キ尤モ

的当ナル者ハ蘇魯林水附ナリ第七方即日ニ半分ヨリ一

分ヲ追テ与フ以テ静セシメ室中寒暖ノ不同無カラシメ

兼テ足部ニ放子泥名ヲ貼スルヲ良トス予每常唯此法ヲ

用ル須ソレニメ全切ヲ收メシ者少ナカラズ然レ仍功ヲ奏

セサル者ハ額草泡利方ハ民埜列利精忽弗瀉鎮痛液最

醋等ヲ飲液ニ加ヘ用ヒ放子泥微温浴ヲ行ヒ以テ蒸氣ヲ

催進ス以レ皮膚ニ由テ分利ヲ得出ルヲ要ス止ムヤリ也

凡命係病ヲ忽チ看過スルコト勿レバ腸胃汚物ヲ出ル者ハ

吐劑下劑ヲ兼用ハソレ倭廣証アル者ハ民埜列利精安質

没扭等ノ暖和汗劑ヲ兼用スハ類合併証ヲ忽チ見ルコト勿レ

レキ所ニ非ス

重症神經熱 癩腦ノ病患尤モ劇シク謔語昏眠日ニ漸進

少諸節ノ搐搦所見ハル者是ナリ亦此ニ腦攸衝証ト神

腦ノ

怪感動証ノ二般アリ殊ニ弁別セザルハカラス

腦嫩衝証 眼中赤光ヲ帯ヒ顔面紅活盈脹シ頸脈充脹

シ頸部灼熱シ小便赤色ニメ脈甚ク實數ナル者是シナリ

然テ腦髓壓迫セズルニテ尚ラ且當時ノ致必至

蜜ノ嫩衝性患者年若ク少壯等ヲ以テ考證スルハ

雙高ヲ決シテ推シテ而後ニテ方テハ

ナリ乃チ試シテ酒一二盃ヲ与ヘテ謔語教脈増進スル者

ハ嫩衝性タリ兩証共ニ減退スルヲ覺ル者乃チ虛性ナリ

リ或ハ試シテ刺絡メ血少許ヲ泄シテ又可ナリ脈沉細數

トナル者ハ嫩衝法ヲ施スルハ論サレトモ其熱本性

嫩衝証ハ固ヨリ防嫩法ヲ行フヘト雖モ其熱ノ本性ハ

神經ノ衰弱ヲ以テ故ニ始終此ニ注意セニテ要故

ニ刺絡セニヨリハ一部ノ浮血ヲ住トス 即頸項後項窩

施シカ唯患者少壯多血ニテ常ニ刺絡ニ慣シ且其脈強實

ナル者殊ニ病ノ初期ニ於ル者傳染毒ニ起因スル者等ハ

刺絡ヲ施メ可ナシトモ然レモ多量ノ血ヲ泄セズ雖少

許免數回之ヲ泄スラ宜シトス是故ニ硝石モ又宜シカラ

以但ニ硝石及礬酒石ニ吐酒石少許ヲ加ヘテ之ヲ以

テ頭部ヲ冷漏シ氷片ヲ外貼シ一時毎ニ冷浴法ヲ行ヒ酥

三四分ヲ用ヒテ浣腸法ヲ施シ日に數回散子泥ヲ脚腓ニ

貼スル等皆宜シ若シ仍チ頭痛ノ病患速ニ減スルヲ得

干過強ノ刺衝素ヲ用ユルヲ勿レ弱動核ノ亢盛ヌル者ヲ
 以テ動モスレハ為メニ嗽衝証ニ轉スルノ恐レアリ然レ
 揮發鎮症ノ神經劑ハ内外カヲ合セテ用ヒタルヘカヲ不
 但レ其初起輕少ニテ与ヘテ諸証退カナルニ準ヒ漸ク進
 テ強劑ニ移ルヲ佳トス殊ニ脈証ヲ參考シ脈力ヲ得テ諸
 病退ニ至ル迄漸ク其カヲ強メニテ要ムル其法或ハ服量
 ラ増シ或ハ茶味ヲ多シ或ハ其品ヲ交換シ或ハ用法ヲ轉
 スル等是レ茶カヲ強メルノ法アリ而テ始ニ強メテハ其品トス
 通用スヘキ茶劑ハ硫酸^①塩酸^②葡萄酒^③ノ硫酸ハ常用
 飲液ニ加ヘ用ヒ塩酸ハ其下劑ニ傾クテ甚キ者ニ与テ葡

①區強ノ刺衝
 若テ用ルル
 勿レ但レ其初
 起内外カヲ
 合セテ微々ム

○ノ所患退カス脈細數弱
 ナル者ハ絹布羅症等
 劇シク脈細小ニシテ
 帶フル者ハ麝香該語
 症等痰痛吐逆下利
 等劇シク脈沈細數ナ

葡萄酒ハ二十年許徑ル列柳設酒ヲ尤モ佳トス衰弱ノ度ニ
 適フ多少斟酌シ用レハ唯此ノミニス全治ヲ得ル者數之
 ナリ
 其他嶺州白芷^①西爾尼加^②ノ濃浸劑及丸筋^③衰弱尚ヲ増
 進スル者ハ纈草油^④加耶晋的油^⑤等ヲ忽弗滿鎮痛液^⑥
 ニ容ヌ者或ハ鹿琿精^⑦而仍ヲ功ナキ者ハ拔尔撒摸^⑧露
 忽弗滿^⑨拔尔撒摸^⑩非荅^⑪亞的尔^⑫硝石精^⑬過沒^⑭亞的尔^⑮
 等瘧疾劇シ脈細ニ緊ヲ帶ル者ハ麝香尚ヲ衰弱甚メ腦
 病患速カス脈細小軟弱ナル者ハ絹布羅^⑯謹語症^⑰亦手
 痰痛吐逆下利^⑱等劇シク脈沈細數^⑲ナル者ハ葛尔多^⑳傳讓^㉑

醫學書文
 三五
 衛生堂藏書

ル者ハ葛根多傳誤

醫籍

阿芙蓉ヲ治フヘシ阿芙蓉ハ服量ノ多少ニ隨テ或ハ麻痺
茶ト為リ或ハ衝動茶ト為ル故ニ神經病劇キ者ハ多量ヲ
用コヘシ衰弱大ナル者ハ少量ヲ用フヘシ尚シ且芳香茶
ノ蒸湯法心窩ニ施ス或ハ苡子泥日ニ一回重証ハ二回換証ス或強壯茶ノ灌
腸法或ハ香蜜茶ノ微温浴列氏二十八度許之ヲ行フナ
ニコトハ一分ハ半時ノ等強壯衝動外術外行ニ
六十一分ナリ等強壯衝動外術外行ニ食養ニハ葡萄
酒コトハ半時ノ等強壯衝動外術外行ニ或ハ麻角膠ニ如ル者肉美汁等輕キ滋養強壯
ノ品ヲ与フルニ宜シ

癩麻証

嗜眠鄭声昏睡等ノ諸証アリ且各部知覺ヲ失テ
多ハ是ノ前証ノ進息セル者ナリト是ナリ不遂ニ或ハ諸

部ノ括約筋麻痺シテ喉蓋會聲筋者是リ初起自リ此証
アリシテ多ク過敏証ニ進息セ者ナリ諸茶ヲ含多量與ヘ
テ前條ノ諸茶皆含メ之ヲ用ヤハハ尚且ツ礆砂加石灰

精鹽経年ノ葡萄酒画ル爾ル燐素燐素等ヲ用テ新鮮
清涼ノ外氣ヲ迎入スル等欠クヘカラス此時ト當テハ殆
ント消滅スル生機強劇刺衝茶ニ由テ之ヲ持セラレハ実

ニ患者ノ性命医者ノ手中ニ係ルト云フヘシ此証極末
患者全ク脱力テ人更ヲ省セス感覺拳動共絶シ腹肚脹滿

大小便失禁等死徵具ハレル者ト曾テ尤ノ治法ヲ用フテ

其命ヲ挽回スルニ數之ヘアリ則年月経ル口ニ注キ五救ノ芫菁硬膏取テ一ハ

葡萄酒ヲ撰テ一ニ碗口ニ注キ五救ノ芫菁硬膏取テ一ハ

心窩ヲ貼シ餘ハ四肢ニ貼シ香竈強壯ノ本草ヲ葡萄酒或
シハ燒酒ニ浸テ微温浴トシ冷水ノ湯法ヲ少腹ト頭上ニ
施シ且第十一方ノ用利ヲ与ヘ效子死ノ方ヨ頭上ニ艾灸法ヲ行ヘリ
腐敗証ニ赤前証ヨリ移リ来ル者アリ或ハ病初ヨリ也
ヲ発スル者アリ証候治法共ニ後ノ腐敗熱條ニ詳説ス
又腸胃証ヲ兼ル神経熱ニ般アリ一ヲ厄期多里神経熱一
ヲ英底里扶神経熱ト云フ

厄期多里神経熱 腸胃汚物ノ証若域ハ蛔虫証ヲ合併ス
ル者是ナリ治法ハ神経熱治法ニ腸胃熱治法ヲ兼ル神經
熱ニ疏滌茶ヲ合シ也又ルニ在リ但シ疏滌茶ヲ之ニ用ル

神至熱兼腸
痲衝ヲ善

ハ殊ニ注意シテ衰弱ヲ加ハルヲ甚シク要ス腸胃熱條ヲ
又英底里扶神経熱其徵候甚タ矣シ准シ下利シテ少腹鈍
痛シ其病殊ニ左方ニ偏シ或ハ之ヲ按シテ始テ痛ヲ知り
其部精少シ膨脹又ル者是ナリ解尻メ之ヲ檢スルニ腸ノ裏
面殊ニ痲衝シテ小班点ヲ発シ少シ隆隆起シテ潰瘍状ト
為レリ然レ是眞ノ痲衝ニシアラズ只熱毒腸ヲ轉輸シテ
此ニ分セリ者ナルヲ猶腸管ニ我々口瘡ヲ発シ皮膚ニ粟ヲ
生ルト同トナル者ナリ法ハ神経熱治法ノ外患部ニ蟻針
冷温法ヲ施シ蘇魯林水内服ヲ内服セシメハソ頑固証ハ
耳聾三ヨリ六瓜迄ヲ取テ日ニ二三次之ヲ与フヘシ

凡神經契在茸滿滿久レテ已ニ遷延病小為ラントスル者ハ毎日微温浴ヲ行フヨリ的實ノ効ヲ為ス者ナレ病後ノ衰弱ハ麥芽煎汁ヲ以テ微温浴ヲ行フヨリ速ニ其精カヲ復スル者アルコトナシ

腐敗契腐敗契コソトリスルコトナリ極極キテハ神經熱ノ諸証ヲ具ヘ虚脱殊ニ甚クハ脉短遲教弱小ナリ

肌膚異常ノ熱ヲ発ス乃チ手掌ヲ以テ之ヲ觸ルニ刺スカ如ク灼カ如ク悪ムヘキ感觸ヲ覺ヘ久クメ手之ニ慣レヌ却テ其熱ノ増ヲ覺ヘ之ヲ放氏手掌中ノ感觸急ニ去ラス是物体ノ活温ニアラス溶崩腐敗ノ而メ蒸氣呼吸諸排泄物為メニ發スル熱アリ

皆鼻腐敗アリテ油ノ如キ粘汗流漓シ小便濃厚油濁シ粘撲

斑ノ状打撲般良ノ如キ溶崩下劑血尿血便便毒瘡壞疽等溶崩腐敗ノ諸微ヲ現ハス且刺絡心得出ル以ル外ノ血汚乙ト

血肝トニ分離セス混濁シテ糊ノ如シ手人ノ血ヲ取キ器盛リ棄テ塊ヲ稀ナレ精液分レテ其周圍ニ浮フ其

原由 此病大卒皆神經熱ノ結核ナリ他他ノ諸熱殊熱亦モ又熱性ノ諸病ヲ誤用シ不潔ノ室中ニ也居スレハ

終ニ此病ニ轉区或ハ初起ヨリ直チニ腐敗熱ナル者アリ是レ腐敗性ノ傳染毒ニ由テ若シハ体液性惡防ニシテ苟

尔陪苦ノ素因ヲ胎中ニ由リ若シハ汞劑ヲ多服スル等ニ

一ヲ得ス為メニ其運營變動レ遠ク一身血液神經ニ波及
 スル者ナリ其毒外ヨリ来ルアリ内ヨリ生ルアリ其外ヨ
 リ来ル者ハ即飲食ノ多寡性質等宜シキニ適セス又消食
 機ノ力ヲ拒ニ化セズ内停滯セル者ナリ其内ヨリ生セル
 者ハ乃チ腸胃或ハ肝臟等ノ分泌機變動ノ其液胆汁胃液
 常ヲ違テ以テ腸胃ノ内ニ滯滞セル者ナリ其滯滞腸胃外
 クハチモハ間故ニ内ヨリ生ル者ニ於テハ其分泌ノ變動莫
 ニ是第一因ニ又汚物粘液胆ハ其餘弊ナル汚物去ラサ
 レハ熱証去ラス故ニ汚物ヲ以テ其熱ノ近因トス是故ニ
 胃腸胃肝臟等衰弱弛緩ニ或ハ虚性ノ過敏ニ得ル者ハ其
 胃腸胃肝臟等衰弱弛緩ニ或ハ虚性ノ過敏ニ得ル者ハ其

胃腸胃肝臟等衰弱弛緩ニ或ハ虚性ノ過敏ニ得ル者ハ其
 胃腸胃肝臟等衰弱弛緩ニ或ハ虚性ノ過敏ニ得ル者ハ其

上多々生シ易ク胆汁滯滞ト易キ者ハ半入生シ静坐ヲ常
 トスル者飲食節ナリ常ニ消化シ難キ食物ヲ喫スル等各素
 因トシテ少寐而久シク暗シス殊ニ粘液滯滞ニ暑長ク退カス
 胆液滯滞多ク或ハ衆人共ニ不佳ノ飲食ヲ用ヒ或ハ憂
 悲愁ヲ被ムル等此病流行ノ素因ト為ル而シテ飽食勞思
 寒暖不定ノ諸因繁華ノ都下ニ於テハ此病ニ諸因
 痰痛瘴胃等由余刺キ感動總ニ皆其誘因ト為ル諸因
 スルヲ殊ニ多ク而シテ其誘因ハ飽食勞思志來痛感冒
 病多ク皆腸胃ノ合保ヲ得ル者ナリ是故ニ寒暖不
 熱ヲ合併セザル者幾ト希ナリ
 諸因夏秋ノ間繁華ノ都等ニ於テハ此病專ラ流行スル
 毎々多シ

治法 唯腸胃ノ汚物ヲ疏解メ滌除スルニ在リ吐下ニ由

①者ハ先ツ芫青膏ヲ
 胃部ニ貼シ阿芙蓉液ニ
 三滴ヲ内服セシメ而後吐
 劑ヲ行フヘシ取ハ以テ
 ラク吐劑下劑同功ナリ
 吐劑ニ代フルニ下劑ヲ以
 テスルモ可ナリト是豈
 然ランヤ夫ノ自然良能
 ノ吐ニ由テ除カント欲ス
 ル者ハ下劑ノ能ク治ムル
 所ニ非ス且ツ吐劑ハ胃
 肝ノ神經ヲ激動シ其分
 必後ヲ轉變スル也胆液
 ナリ於テ此轉變ヲ以テ
 能ク汚物ノ原ヲ盡シテ下
 劑ハ絶ニ其功ヲ盡ス
 一能ハス之ニ加ルニ其排
 除ノ道路長ク衰弱ヲ起シ汚物ヲ血中ニ輸タス等ノ恐レアルナリ然レト雖便秘甚キ者處カニ吐劑ヲ與シハ動キ
 スレハ吐劑藥病ヲ起スニ至ル宜ク先ツ灌腸法ヲ行テ腸ヲ二掃レ而後吐法ヲ處スヘシ

候病有テ脈緊実ナル者ハ先ツ刺絡シテ後吐劑ヲ与ヘ吐
 劑得テ而後下劑ヲ与フヘシ吐劑ハ微ニ与ヘル
 ニ宜シ胃ノ感動ハ患者各犬ニ差等アル者ニシテ預メ之
 ヲ知ルヲ難シ若レ一頓ニ多量ヲ与ヘテ過度ノ吐ヲ起シ
 テハ危険ニ陥ル者アルハナリ或ハ其感動過敏ナル者吐
 劑易キハ唯海葱蜜（註）ト加蜜列泡劑ト用ルルニシテ
 分ノ吐ヲ得ニ足ル者アル然レ久ク吐劑ヲ急リ胃終ニ汚
 物刺射キ積レ終ニ感動過敏トナリ水瀉ヲ兼ル者ハ少量
 物腹滿ニ腰脊疼痛腹中雷鳴トテ要臭ノ尿氣ヲ吐ル者ハ
 吐劑ヲ起サス却テ下劑ヲ増ス者ナリ此証ハ吐劑一ツヲ
 已テ下劑ヲ起サス此証ハ始メ日下劑トテ吐劑トテハ
 服セシムルニ宜シ此証ハ直レカラス若シ其連動ニ下劑多キ
 然レ又少許定トスルニ良トス而感動過敏ノ者ハ孕婦

第三 下ニ排除セントスル機擦ヲ現スル者ハ腹滿ノ腰痛レ雷鳴ニ惡臭ノ尿氣ヲ吐ラレ
 或ハ自下利ヲ發ス此証ハ俗メヨリ直ニ下劑ヲ用フヘシ然レ此証ハ許死トスル者感動過敏者ニ處

酒石（註） 芒硝（註） 滿那（註） 感動遲鈍ノ者ハ浮利塩孕卷酒石（註） 高
 ヲ遲鈍ナル者ハ之ニ旃那（註） ヲ加ヘ哮喘衰弱甚ク又神經
 証ヲ單ル者ハ大黃百朮亞麻仁油ヲ与フルニ宜シ凡下劑
 ヲ連用スル長短ハ汚物ノ多少ト熱ノ増減トニ準フヘシ
 而此諸証候ノ漸ク減退スル大便仍ヲ穢物ヲ交ル間ハ
 時続メ之ヲ用ヒ以テ諸証全ク去リ食常ニ復スルニ至テ
 始テ漸ク強壯茶ニ移ルヲ法トス然レ大便更ニ水瀉（註） 汚
 物ノ衝動復々現セハ再ニ解凝茶ヲ用ヒ而上下排（註） 機
 吐劑（註） 更ニ復吐劑若シハ下劑ヲ用サレバ得（註） 故ニ
 下劑連用短キハ三日ニメ足ル者アリ凡長キハ三週ニ至

彼邦瓦未之審ニヤ
又其色我邦ノ土盤ノ如
キカ

儂レ廣ク質ニ熱シ聖ノ京ノ屈ニ熱シ
エブリスレウマチカブリス
カタルチリト置コウマチカ
ハ病毒所在ヲ異ニスルカ故ニ各發ノ病患不同ト
スル也元ト是同ト因ノ疾タルカ故ニ德自ニ發
以テ此篇係セ
テ之ヲ論説ス

微候
者法
寒熱交ニ發ス四肢ニ痛シ小便ニ頻ニ數ニ又ハ痛ヲ兼ス
子酒濁ニメ尾色ニ按ニ邦ノ赤ノ沈ニ並ニヲ見ハレ汗ヲスレハ則チ輕
快ヲ覺ハ冷シハ輒チ熱ノ進ムヲ覺ハレ而シテ諸部ニ儂ク廣ク質ニ熱シ
若シハ聖ノ京ノ証ト現レ以テ其ノ証ト同シニ發スルヲ常
トスハ先チ發スルアリ或ハ後レ發スルアリ以テ儂ク廣ク質ニ熱シ
諸部ニ儂ク廣ク質ニ熱シニ疼痛ヲ發ス或ハ腫起シ其痛或ハ一部ニ

停住シ或ハ遊移ス又ハ彼是轉移ス是レ是ナリ若シハ外部ニ遊移ス
部ニ向フ者ハ惡クナリ聖ノ京ノ証ト即チ感冒ノ氣管等ノ粘
液ニ病患ヲ發スル者ナリ而シテ鼻ノ感冒ト名シ其ノ類リニ
嚏ヲ發ス稀薄等屬涕液ヲ流シスル者ハ其ノ液漸ク變リ又
相負膿狀ト為ルニ隨ヒ熱ト諸証ト共ニ漸ク減退ス而シテ
又ハ咽喉ノ感冒或ハ胸ノ感冒ト名シ其ノ咳嗽頻數咽喉乾燥或ハ
声嘎シ或ハ咽痛ニ稀薄ニメ稍苛厉ナル痰ヲ咯出スル者
之レヲ明ニ察ス感冒或ハ胸ノ感冒ト名シ其ノ類リニ
其ノ痰漸ク烹熟メ粘稠膿狀ト為ルニ隨ヒ熱ト諸証ト共ニ漸ク減退ス而シテ
氏亦共ニ減退ス

右ニ証ニ鼻ノ感冒咽多ハ相兼發ス又ハ交互ニ轉換ス

三十四

三十五

七八先ツ刺絡シテ硝石ニ安貨没扭硝石ニ安貨没扭
硝石ニ安貨没扭
 ヲ伍シ五へ兼テ防炊防炊息ヲ命シ居室ヲ熱セシメス寒寒
 不等ナカラシムヘシ熱度熱退スル者或ハ初メヨリ熱劇
 カラサル者ハ刺衝刺衝少キ発汗發汗民怪列里精安貨没扭刺衝
 骨木花骨木花等等外貼スルニ宜シ宜シス宜シ熱尚ラ
 少キ者少キ者布羅ニ硝石ヲ配用配用方方或ハ双蘭菊双蘭菊遠志遠志等
 羊泉羊泉福鳥福鳥脂硫黄等ヲ用用兼テ兼テ芙蓉硬膏芙蓉硬膏ヲ外敷ス
 可シ若シ患者神經質ニメ痙攣狀ノ劇痛アル者ハ阿芙蓉
 ヲ五ルヲ良トス熱血過度過度坏坏ハ此病ヲ遷延遷延外
 久セシム殊ニ患部ニ浮血ハ最モ忌ム可シ但物物痛痛

胸の刺痛

呼吸困難乾咳等ノ諸証アル者兼テ兼肺肺微微衝衝肺勞ノ素因素因
 在テ既ニ肺病ヲ得得者兼テ兼肺肺勞勞ニ轉シ易シ等ハ
 必ス刺絡セサルヘカラス
 俵俵質質熱熱聖聖京京僂僂熱熱共ニ腸胃熱神經熱ヲ合併ス宜ク方
 証証隨テ各身ノ治法ヲ処ス可シ殊ニ伸徑熱ノ合併ハ每當
 甚々多ク危險ニ陥リ易シ最モ注意メ對証ノ治法ヲ施サ
 ニテ要ス尚且聖京僂熱於テハ粘液膜ノ刺戟ヲ覺解
 シ烹熟分利吐ヲ催進吐ル緊要也即テ安貨没扭刺硫
 黄接骨木花苗香湯子百炒等第二十一方及及七緩和粘滑
 ノ飲劑蜜刺詰劑ヲ用ヒ若クハ湯蒸氣ヲ吸入レ或ハ吹テラ

子ル布名ヲ以テ胸部ヲ摩察スル等ハ胸痛在テ刺絡証
 ナキ者ハ其部ニ発泡膏ヲ貼スルハ良シ又尚後ハ
 編ト候考々ハハ倭ノ質証モ亦ワラズ毛布若クハ絹
 布ヲ以テ其部ヲ温覆シ局処ノ発汗分ヲ得セシメ疼痛
 劇キ者ハ近傍ニ芫菁膏ヲ貼メ発泡膿膿セシメ
 微存テ其部発泡腫スル者ハ蜈蚣針及ハ吸角ヲ施シ感
 敏ノ者ハ阿芙蓉軟膏若クハ硬膏ニテ外貼スヘシ
 執証既ニ去テ倭ノ質若クハ聖京倭ノ証尚留連スル者ハ
 後ノ倭ノ質編ニ参考メ各其治法ヲ処スヘシ

傳毒毒 アーニスデーケテコルラ
 微候 九其熱病 只休外味 感深又ハ毒ニ由テ生レ症
 候經過各其毒ニ固有ノ性有テ治法モ亦各自其致ト異ト
 凡ル者是也即傳毒神速也發黃熱腫膿腫瘰癧瘰癧
 瘡麻疹癩疥癬癩疥癬癩疥癬癩疥癬癩疥癬癩疥癬癩疥癬
 原因 進用ハ傳毒毒ハ神速ナリ其毒各人ノ體質ヲ擇ハ
 又同一ノ病ヲ起シ且体内ニ同種ノ毒ヲ醸成セシム其毒
 二般アリ一ハ外生機ノ作用ニ由テ生レシム他ハ身
 傳毒スル者一ハ大氣中ニ生メ人ノ身ヲ侵襲スル者ナリ
 然氏其毒名此ニ契合スル感應性ヲ具フル者ニ非サレハ

其三 傳毒ノ異ナルト
 其毒性ノ各異ト各人ノ感毒力ノ不齊ト隨テ其病狀固
 同シカク即傳毒ノ性異ナル者ハ或ハ直ニ生カチ抑積
 ヲセリ或ハ其毒或ハ直ニ生カチ抑積ヲ成ス或ハ之ヲ積
 揚起スル者アリ等々各其性ヲ侵襲スルアリ各人ノ感毒力ノ異
 ナルハ由テハ同一ノ傳毒毒ヲ受ケルハ或ハ衝熱ヲ発シ乙
 ハ神經熱ヲ患フ西ノ腐敗熱ヲ瀧シ一ハ腸胃熱ヲ病ム等
 アルカ如シ尚且常時ノ流行性ニ各人ノ體質ヲメテ微
 ナ一定ノ素因ヲ有セシムルコトアリ論ハ小或ハ瘡癤麻疹
 神經熱等ノ般ニ放散性ヲ得或ハ一様ニ虛性ヲ帶ヒ或ハ
 一般ニ虛性ヲ來シ或ハ一様ニ實性ヲ帶ヒ或ハ
 一様ニ實性ヲ來シ或ハ一様ニ實性ヲ帶ヒ或ハ

其四 諸傳毒熱皆十全ノ分利ヲ得唯中多ハ發疹者少ハ

發現期 瘡癤ノ如キニ
 在テハ起脹瀰聚スルノ
 期ニハ所謂ハ花実然
 瘡子成ル時トス

變形 徒爾
 患部轉移等ヲ不全分利ヲナスナリ是レ其毒ノ性實異常
 ニメ生カ金ツ之ヲ化シ尽スコト能ハサレハナリ
 其五 凡ハ其毒ノ蓄息瀰滿ハ熱性ノ強弱ニ隨ワテ多
 ヲヤレ且起熱ノ諸因ハ凡ハ皆其毒ヲ増息スレノ解熱諸件
 月故ト諸傳毒熱ハ皆四期ニ經過スル者ト又曰ク感凍
 期ニハ有種ノ時ト又曰ク始テ感凍スルノ期ニハ較著ナル証
 候ヲ以テ其間少較著ノ証候カ
 長キハ十四日ニ及フ且發熱期ニハ抑積ノ期ニハ生カ
 抵抗始メテ憤起ヲ申ス發現期ニハ結晶ノ時トス
 〇長キハ十四日ニ及フ且發熱期ニハ抑積ノ期ニハ生カ
 抵抗始メテ憤起ヲ申ス發現期ニハ結晶ノ時トス

布種ノ
 毒ヲ發起

ノ曰ノ減退期 諸証退散ノ期ニ又所謂ル。
也又凋落死枯ノ時トス

治法 先其熱性ヲ検査シテ各其治法ヲ為シ
性ニ注意又ハ對症ノ法ヲ處セニテ要ス

凡此病熱ハ自然良能病毒ヲ化轉シテ体外ニ排擯セシ
トスルノ機カニ出ツ故ニ其熱度中和ヲ得ル者善性瘧瘧

医行ノ助ヲ俟ス各自確定セル時期ヲ注テ定セル時日ニ至リ
自カヲ全治スルコトヲ得ルナリ

然氏此病差劇ヲメ熱勢確乎多心者ハ各其性ニ隨テ治法
ヲ定ムヘカク固ヨリ論ナシ但シ其初起ハ防微漸法

ヲ用ルニ最良ト又凡此病熱ハ前説ノ如ク病毒排除

ノ核ニ出ツト至氏亦其毒ヲ蓄息又ルメ核トメ考ハニ
要ス熱愈劇タルハ毒ノ増息愈甚キ者ナリ古人此ノ諸

病ニ過熱ヲ用テ其毒ヲ驅除スルヲ以テ法トシレ也是感ヘル
ル甚キ者メ危言ナクテ又トス唯其毒ヲ増進スルニ足

ルノミ又備メ益々之ト又ト故ニ當今ハ務メテ其熱勢
ヲ制スレ以テ毒ノ蓄息ヲ減却スルヲ治法ノ通則トス是

故ニ病室ノ温ハ列氏驗温管ノ十四度ニ越ヘシメス夏日
ハ冷水ヲ器ニ盛ツテ室中ニ置キ且之ヲ室中ニ撒挽シ總

チ羽毛ヲ充ツルノ食蓐ヲ製スルニ羽毛ノ食蓐ハ其熱ヲ增
スルニナラズ患者ノ毒氣

ヲ承ク其中 菜蓐ニ臥ノ輕食ヲ被ヒ尚腐敗アル者ハ尚
ニ含毒ス

冷濁方ヲ施ス等ハカラサルノハ大要也ナリ尚且大
 氣ヲ清鮮ニスルト患者ヲ淨潔ニスルヲ始メキ本々必
 九此患者ハ毒中ニ沈没スル者トシテ復タ
 其体ヨリ侵入スル毒氣更ニ沈没セルカ故ニ意ヲ用
 更ニ毒氣ヲ受ルナリ故ニ意ヲ用テ其毒氣ヲ逐除シ大氣
 ヲ清鮮ニセラルヘカ要ス
 近世舍術ヲ用ヒ殊ニ塩酸硝酸蘇魯林等ヲ薰シテ大氣
 ヲ掃除スル法アリ且皆利益ナク却テ害多ク殊ニ肺ヲ傷
 損害スルヲ特ニ著ルシ
 又大氣ヲ掃除スルニハ牖戸ヲ閉キ風ヲテ新陳代謝セ

レムルヲ最勝ノ法トス但シ其戸ハ天井ニ近ク之ヲ開
 キ以テ斜メニ風ヲ室中ニ過ラシムヘシ腐敗毒氣諸氣ハ重ク
 メ下ニ居リ或ハ輕クメ高ク浮フ者アレハナリ此時患者
 直ク被覆シ直チニ其風ニ觸ラサシテ防タリ尚取敷者一
 室ニ臥ス茶ハハシ稠人ノ雜居ヲ禁シ諸排泄物ハ
 速カニ之ヲ除去スルヲ亦甚ク必要ナリ皆勿ルカセスカラス
 傳染神經熱テイニスコニタキ
 微候 原來傳染赤々感々神經熱腐敗熱ノ諸証ヲ發現
 起因メ發現
 起者ニナリスル者はナリ
 其病初起大抵心又嫩衝性ニメ後始テ神經熱等ハ腐敗

熱ニ移リ或ハ始メ日終リニ至ル口ニ嗽衝性ヲ帯ル
者アリ是患者ノ性質ト当時流越性密體ト其致日異ト
ヲ為ナリ
ノ故ニ嗽衝性腐敗性軍中疫等ヲ差別ヤリ

治法 神經熱ノ治法ヲ施シ兼テ各個ノ病性ニ注意シ且

其初起ノ防嗽衝法ヲ用ヒ神症甚絡著トシ他ト傳染熱ノ治

法通見ニ随フテ殊ニ大氣清淨ナルヲ要ス

腺腫疫列漢多疫ハスチスビホニカ

微候 諸部殊ニ腋下及ヒ鼠蹊ノ腺嗽衝シテ初起ヨリ寒

痘壞状ヲ帯ヒ遂ニ真ノ寒壞疽ニ変ヒ且之ニ兼ヒ皮膚紫

斑ヲ発シ血液皮下ニ汎溢シ急病第六日ヨリ直ニ劇烈ト

ト應当ノ法ヲ行
ハシテ要

勢熾多如
熱ヲ起シ煩悶吐逆、甚シ脳ノ病患 諸語昏 甚シク
真有テ衰弱脱力ノ極ニ至ル 其甚シク 猛烈ナルハ 十二時間
ニ死ヲ致ス者アリ 此尋常第三四日ヲ以テ分利期ト又此氏

其死スル者大抵十之七八ニ居ル

此病原 列漢多ノ海濱ヨリ起リ 殊ラ厄日多 秘密ル那

公松丹扶乃百見 地名ニ行ハレ 傳染ト由テ 諸地ニ汎溢シ 就

中ロニドニゴロニングスベルケニモスコイ等ニ 流行ス

其毒 此病ハ大氣ニ傳ヘス 確直ニ接マレト由テ ヲ感染

ス故ニ其患者ニ接スルニ其毒ヲ且以患者ノ体ニ觸ル 諸物

ヲヤシシハ預メ其傳染ヲ防クヲ得ヘス

全ソ張カヲ失テ指ヲ以テ皮膚ヲ撮起ス且卒厥絶息スルニ至ル其経過甚ク迅速

ナルヲ外多腹腫發熱ノ如ク大抵發病ハ三時間ニ死スル

常トス其極弱ノ者ハ十二時ニ死スル者ハ常ト又其死スル者過

半或ハ三分或ハ吐瀉止ムニ隨テ神經熱状ニ轉テ吐瀉

ヲ死ル者アリ其治ヨル者モ太極皆神經及消食機ノ衰弱

ヲ残スル経日弥久故ニ復セス而死スル者三分ニ或其ノ半ニ居ル

此病始メ東印度ノ海濱及安南南洋生ニ漸ク

傳送メ諸國ニ蔓延シ然ニ全世界致メ所ヤク大派ハ熱

テ西墨里加洲ニ及布連セリ但ニ亦燥ノ諸地ハ之ハ輕ク

瘦ノ如ク甚シカラズ

多シクニフ赤黄熱腫且此病人ニ相傳染ナルハ腹腫

又高熱ノ地ニ多ク

變メ如ク甚シカラズ之ヲ免ルト云發熱列儼

治法 諸証ニ拘ラス其初起直ニ刺絡吐劑ヲ施スヲ以

テ第一トス尺其重價甚ク毒弱ナル者此ニ由テ全ク其発

作ヲ撲滅スルニ足ルコトアリ且之ニ兼テ莖葉心及芳香葉

ノ莖葉劑ヲ心下ニ施シ全直而後作尚連綿セバ日示ヲ与ヘ

冷水ヲ多服セシメ灌腸方ヲ冷用ニ全腹ニ冷湯方ヲ施シ

且大黃ヲ与ヘテ以テ残余ノ胆液ヲ泄除シ尚劇者ハ灌水

方ヲ施スヲ佳トス其

続登ノ神經熱証ハ宜ク神經熱ノ治法ヲ処スヘシ且此時

法

續登ノ神經熱証ハ宜ク神經熱ノ治法ヲ処スヘシ且此時

法

續登ノ神經熱証ハ宜ク神經熱ノ治法ヲ処スヘシ且此時

法

續登ノ神經熱証ハ宜ク神經熱ノ治法ヲ処スヘシ且此時

法

續登ノ神經熱証ハ宜ク神經熱ノ治法ヲ処スヘシ且此時

血液更ニ頭腦ニ滯積シテ刺絡セテ要スルヲサレドヨリ是
亦注思セヨハハカカス

狂犬咬傷毒恐水病

徵候 水及ヒ諸飯液ヲ嚙下スルヲ能ハス

者法 鏡圓等ノ燈光ノ物ヲ視ルヲ嫌ヒ甚キ者ヲ由テ発搐ス

ルニ至リ然レ硬固ノ品ヲ嚙下自在ニ妨クサシ微痛モ

覺ルヲナシ此病ノ本証也或ハ病初ヨリ之ヲ発スルアリ

或ハ先ツ煩悶倦怠諸般ノ神經証不寐悶夢殊ニ大等ノ諸

症有テ而後ニ是ヲ発スアリ而且其恐水病ノ発スルハ共

ニ必ス狂妄ヲ兼発ス其病性急劇ニシテ久シキモ三四日

總テ流體光體ノ發病

ヲ越ヘス尋常播毒若クハ虚性卒中ヲ以テ其死ヲ致タス
ナリ此病多クハ著レキ熱ヲ夾マス

此病ハ間熱日重ルリトヒ此多ハ発熱又ルリトナシト官共

ハ大抵妨ケナク死ニ至ル迄能ク人夏ヲ省ス時ニ狂劇ヲ

発作メ頻リニ唾ヲ散シ食物ヲ擇ハス之ヲ咬ミ吠声ヲ擧

ル其間時々感冒發搐ノ煩悶殊ニ大ナリ且陰器ノ發脹起

テ又ハ嘔吐此病因有レ疾トス固有證トス

原病 此病ノ本症ハ多ク神經其毒ヲ被ムル者ナリ殊ニ

口唇眼瞼鼻孔陰具等ノ如キ皮膚薄弱ノ部に狂火毒ノ侵

入スルヨリ起リ其侵染或ハ直ニ狂犬ノ咬傷ニ由リ或

深スルヨリ起リ又其侵染或ハ直ニ狂犬ノ咬傷ニ由リ或

以ハリノ絶チテハハナシ
治法 其病治法ハハナシト
初起直チ吐利ヲ用ヒ勢豪キ者ハ次ニ腐敗扱ノ治法ヲ尽
シ殊ニ炭那羯布羅^名ヲ用西^名ノ飲料ニ加^リ等是也或ハ亦
酪餘^名ヲ互ヘテ甚タ倍効ヲ奏ヌル^リアリ

壞疽ハ^{切斷}刺破メ防腐腫膿ノ莖漏法ヲ施^行ス直
垂麻仁^名等ノ^等緩和莖漏劑ヲ連用スル^ニニメ全治ヲ得^ル
者屢^テシ^テ實驗セ^リ

扶氏經驗遺訓卷之一終

扶氏經驗遺訓卷之三

足守 縮方章 公裁

第二編 西肥 子方 同譯

慢間歇熱及緩性諸熱病

前條所説ノ急性熱ト其熱証乃チ是本病ナレト此篇論ス
ル^ル者ハ本病他^病在^リテ其熱ハ唯其外証ノ^ニ故ニ経過
長短一定セス治法^也亦十差万端^ニ異^ナリ^テ同^クセス

間歇熱

看法 便寒^熱時^限ヲ限^リテ^開期^ヲ
小便^赤色ノ沈澱ヲ^見シ^テ汗^ヲ其^休歇^ノ時^ニ亦^時刻^定

諸証全ク去テ脉度整齊平常ノ如シ故ニ每^毎皆^皆少^少烏^烏ノ急

生

生

性熱[○]相[○]利[○]者[○]其[○]病[○]之[○]全[○]休[○]ハ[○]此[○]少[○]焉[○]急[○]
性熱[○]區[○]々[○]相[○]連[○]聯[○]以[○]ル[○]者[○]其[○]病[○]之[○]全[○]休[○]ハ[○]此[○]少[○]焉[○]急[○]
性熱[○]區[○]々[○]相[○]連[○]聯[○]以[○]ル[○]者[○]其[○]病[○]之[○]全[○]休[○]ハ[○]此[○]少[○]焉[○]急[○]

差[○]ハ[○]ス[○]或[○]ハ[○]毎[○]十[○]二[○]時[○]日[○]発[○]或[○]ハ[○]毎[○]二[○]十[○]四[○]時[○]日[○]発[○]或[○]ハ[○]又[○]其[○]
或[○]ハ[○]其[○]間[○]歇[○]長[○]フ[○]ル[○]毎[○]七[○]日[○]一[○]発[○]ス[○]ル[○]等[○]者[○]アリ[○]或[○]ハ[○]又[○]其[○]

間歇[○]又[○]此[○]時[○]ノ[○]階[○]別[○]ニ[○]シ[○]テ[○]発[○]ス[○]ル[○]者[○]アリ[○]或[○]ハ[○]又[○]其[○]
謂[○]フ[○]其[○]復[○]起[○]タル[○]ハ[○]此[○]病[○]ノ[○]時[○]刻[○]別[○]ニ[○]シ[○]テ[○]発[○]ス[○]ル[○]者[○]アリ[○]或[○]ハ[○]又[○]其[○]

諸[○]証[○]ノ[○]別[○]ニ[○]シ[○]テ[○]発[○]ス[○]ル[○]者[○]アリ[○]或[○]ハ[○]又[○]其[○]
此[○]病[○]尋[○]常[○]右[○]ノ[○]如[○]ク[○]頭[○]著[○]ノ[○]熱[○]証[○]ヲ[○]発[○]ス[○]ル[○]者[○]アリ[○]或[○]ハ[○]又[○]其[○]

胸[○]欬[○]衝[○]等[○]時[○]刻[○]定[○]テ[○]発[○]ス[○]ル[○]者[○]アリ[○]或[○]ハ[○]又[○]其[○]
胸[○]欬[○]衝[○]等[○]時[○]刻[○]定[○]テ[○]発[○]ス[○]ル[○]者[○]アリ[○]或[○]ハ[○]又[○]其[○]

時三二。

是[○]亦[○]間歇[○]時[○]ノ[○]諸[○]患[○]一[○]掃[○]ス[○]ル[○]者[○]アリ[○]或[○]ハ[○]又[○]其[○]
害[○]ヲ[○]見[○]ル[○]如[○]ク[○]其[○]諸[○]証[○]発[○]ス[○]ル[○]者[○]アリ[○]或[○]ハ[○]又[○]其[○]

此[○]病[○]モ[○]亦[○]單[○]証[○]ト[○]合[○]併[○]証[○]ト[○]ア[○]ル[○]者[○]アリ[○]或[○]ハ[○]又[○]其[○]
以[○]即[○]欬[○]衝[○]性[○]腸[○]胃[○]性[○]痿[○]麻[○]質[○]性[○]神[○]經[○]性[○]等[○]ノ[○]別[○]有[○]テ[○]又[○]急[○]性[○]也[○]

凡[○]此[○]病[○]其[○]経[○]過[○]長[○]短[○]甚[○]々[○]不[○]定[○]也[○]或[○]ハ[○]三[○]四[○]発[○]ニ[○]テ[○]止[○]ム[○]

アリ[○]或[○]ハ[○]久[○]ク[○]連[○]綿[○]ト[○]シ[○]テ[○]週[○]數[○]ノ[○]月[○]若[○]ク[○]ハ[○]數[○]年[○]ニ[○]及[○]ブ[○]アリ[○]

間歇熱ハ原來危險ノ病ニ非カレモ兼発作ノ諸証ニ由リ
 死ヲ致ス或ハ連綿日ヲ経ルニ由テ体液性ヲ變シ若シハ
 腹内諸藏之ヲ為ニ閉塞腫脹ニ若シハ水腫及ニ神経病等
 フ惹出スルニ由テハ終ニ危險ニ陥ル大リ或ハ又其熱性
 良性ニメ頑固ノ旧病之カ為ニ除去スルヲ得ル者アリ
 原病由 間歇熱ハ急性病ト後慢性病トノ混交セル者トス即
 其発作ハ少時ノ急性熱ニメ病根ハ神経証ナリ且定時ハ
 発歇病以テ病ノ本質トシ其熱証ハ其本証ト非ズトス何者
 小トシテ熱病ハ他ノ病証ニカカズ且間歇熱ヲ以テ者轉
 急性熱トナリ或ハ急性熱ヨリ轉メ此熱ニ變ズル等榮之

アレハ十日其熱只定期発歇ニシテ而後一週熱トスルノ
 間歇熱ニシテ其定時発歇ノ原ハ神経質ニ拘ルカ故ニ此病ハ
 其本性ハ神経病ナリトシ其近因ハ有形発熱ト無形
 一合統ナル者トス故ニ間歇熱ハ諸因悉ク具ハルトモ
 神經ノ変動ニ拘ルニ由リテ間歇熱トシテ其熱性ハ
 故ニ此病或ハ急性熱トシテ其熱性ハ急性熱トシテ其
 由テ此病或ハ慢性熱トシテ其熱性ハ慢性熱トシテ其
 連年甚多トシテ其熱性ハ慢性熱トシテ其熱性ハ慢性熱トシテ其
 俟必タリトシテ其熱性ハ慢性熱トシテ其熱性ハ慢性熱トシテ其
 神經ノ変動ニ由リテ其熱性ハ慢性熱トシテ其熱性ハ慢性熱トシテ其
 此病或ハ急性熱トシテ其熱性ハ急性熱トシテ其熱性ハ急性熱トシテ其
 此病或ハ慢性熱トシテ其熱性ハ慢性熱トシテ其熱性ハ慢性熱トシテ其
 此病或ハ急性熱トシテ其熱性ハ急性熱トシテ其熱性ハ急性熱トシテ其
 此病或ハ慢性熱トシテ其熱性ハ慢性熱トシテ其熱性ハ慢性熱トシテ其

醫學雜論

濕地等

三

醫學雜論

魚肉穀過食滯積汚泥ノ氣ヲ受クル等之ヲ其素因トナリ總テ

其病ノ起因トナル者皆此トナリ又神經質ノ右ノ素因ア

ルニ由テ合メ此間歇止ヲ發スルニ至ルナリ即チ飲食ノ

不化感冒腹内諸癥ノ閉塞隱伏諸病毒痛瓜梅及心一部

刺戟枯毒等是カシ但此病箱連綿スルハ必間歇自ヲ病証等

持以神經ノ右ノ素因トナリ又此病ノ素因トナリ又此病ノ素因トナリ

能ノ妙核此ニヨルノ有カ故ニ其熱ヲ抑遏スルハ必ス大害

故ニ其初メハ必解熱ノ効有テ其勢ヲ傾息スルヲ無キ茶劑ヲ用ルニ宜シ即チ毎日確砂四ニ錢ヲ用ヒ発作前ニ〇

テ蒸氣ヲ催進
茶ヲ与リ等也スル等ノ如シ是幾那等ノ解熱茶ヲ用ルニモ亦預爲スルハ要ス
第二則遠因既ニ除去シ後治熱証淹留スル者或ハ遠因ニ
解ス可キ者無キ之ヲキテハ宜ク直ニ近因ヲ除ク可シ即
神經ノ變調ヲ治スルニ在リ但レム

尋常ノ間歇熱ニ別ニ恐ルヘキ餘証ナキ者卒カニ其熱
ヲ抑遏セシヨリハ先ツ五六ノ発作ヲ用ヒ発作前ニ吐劑
ヲ与ヘ加密列花睡菜蒼草等ノ散劑若クハ越哉斯劑ヲ
服セシム可シ然レテ
此ニ由テ其熱仍ヲ去ラズ且傾息之ヲ抑遏スルハ別ト怒
故アル者ハ乃チ
ハキクハ宜ク發熱ヲ抑ヒ其熱ヲ傾挫シテ之ヲ

之ヲ奪除スルヲ曾テ他茶ノ及テ所ニ非ラズ然レ其用法
能ク法ニ適ヒサレハ切ラ得ルヲ能ハス今其適症ト用法
トヲ示ス左ノ如シ

其一胃中汚物ナク右止清潔ナル者ト

其二間歇時毫モ餘証ナク脈常例ノ如クナル者ト

其三毫モ合併病ナルヲナシ純精草一ノ間歇熱ト是ナリ

其發熱先ツ吐劑ヲ与ヘテ而右之ヲ用ヒ其奏功最モ

切實ニメ喜ワシトナキ者トス乃チ

其用法黃發那極末一弓ヲ取テ間歇時中毎ニ時短キ者

ハ半碗トスルヲ第二十三方第二十四方ノ如クハ

醫書文 五 先生堂藏書

且ツ下劑ヲ用ルルハ禁メハシ下劑ニ由テ忽チ再発スル
ノ虞セシアレハナリ

此ルニ發那ヲ用ヒテ後或ハ熱却テ増劇シ煩悶及ヒ胃部

壓重マ覺ク脈動間歇時にモ切ワ數急ナル者星ルハアリ

是レ發那ヲ投ルル早キニ過ルテ微ニ其病急性熱ヲ轉

セントスルハ微ナリ發那ヲ休メテ先ツ吐下ヲ撰用シ

合候病アルコトヲ察セハ先ツ之ヲ除去ル而後更ニ發那ヲ

用ユヘシ或ハ又發那ニ由テ其熱症増劇セサレ亦之ヲ

除治スルコトモ能ハサル者アリ之ハ其終末ノ一服ニ阿

芙蓉一丸ヲ加ヘテ次ノ發作前ニ少前ニ與ルルハ要トス

小兒若クハ發那ヲ内服スルコト能ハサル者ニハ之灌腸劑

造リ且發那末一二ヲニ葡萄酒ヲ加ヘ煮テ胃部及ヒ全腹

ニ貼シ或ハエニテル未扶方英譯見マテ此ニ茶ヲ添メ表皮ヲ剥棄

更ルモラ以テクニ規規一ヲ用ルモ亦同効ヲ數ムルコトヲ得

ハ代用茶ヲ用ヒテ得又即チ揚皮七葉樹皮水楊梅

根等ヲ取テ用法分量發那ノ如ク之ヲ与フヘシ

其他總テ苦味茶神經茶揮發芳香ノ品諸味及ヒ收瀉茶殆

ハ皆詳述ノ切アリ

此病頑固難治ノ者階段ニ或ハ發那ヲ用ユレ其效法ヲ

アリト解スレバ継テ復再
以或ハ去ルト魚也又耳発スル等是也其然ル所以三ツリ帰ス

其下未タ遠因ヲ除去シ尽サスメ早ク發那ヲ用ルニ由ル
宜キヲ撰
其類是ヤリテ更ニ遠因ヲ政治スヘシ

其二深ク体中ニ替伏^{病毒}其^毒ヲ淹滯セシムル病^毒變形梅
アルニ由ル^是其^毒ヲ治法ヲ外スヘシ

其三發那ヲ用ル^一晚キ^ニ過キ且連用足ラ^以其^毒由^毒梅^毒
變^ニカ^ル油^ニ是^必ク^之ヲ^連用^スベシ又

然ルニ右ノ治法皆功ナク^也仍^タ淹滯^ヲ除カサレ者アリ
殊^ニ三日^熱ニ於テ然リ^也其^毒ヲ^主茶^トス^宜ク日^ニ

替留熱合併証

ニ^ヨラ^ハト^フヘ^シ若^シ内^閉塞^ノ徵^{アラ}ハ^日汞^ニ白^瓜

茶越發斯^以劑^ヲ配^合レ^或ハ^鉄劑^殊ニ^確鉄^莖ヲ^糲

用^ハレ^此諸^茶モ^仍ヲ^功ヲ^奏レ^難キ^ヲ見^ハル^也燐^ヲ用^ルニ

此^方ニ^是予^自ラ^經驗^シ其^功ヲ^知ル^者ナ^リ或^ハ此^証ニ

砒^石ヲ^称考^スル^者ア^レバ^此病^ハ危^險ノ^甚ク^性命^ヲ害^ス

ル^トアリ^故ニ^予ハ^常ニ^備テ^足レ^リト^ス

又^聞歇^也替^留熱^ヲ冷^ハシ^者ハ^其原^替留^熱ニ^加ス

動^數ヲ^加ハ^諸証^増劇^{ナル}ナ^リ其^發作^ノ時^刻變^整ナル^ア

怪児ノ状態アツテ急カニ思慮不定殊ニ早朝及ヒ空心早且
ニ患苦多ク且熱ノ増進ヲ覺ヘ食后諸症ノ减退ヲ覺ユ
此病ノ微候也其因ハ諸
此病ハ多ク急性諸熱病殊ニ神經熱ノ餘証ニシテ或ハ勞カ
勞動房事手淫ノ過度等由テ生レ或ハ失血脱液ノ経日殊
々殊ニ帶下久淋下利脱汗等日レモ起因ス
治法宜ク衰弱ノ起因ヲ除キ弱覺様ノ過敏ヲ鎮靜シ適宜
ノ強壯滋養ヲ施スルニ要ス此証ニ切ナル者ハ芳香系ト
麦芽ノ煎汁ヲ以テ微温谷ヲ施シ村落ノ清淨氣ニ適シ
思ハク鼓舞ニ後那及ヒ鉄劑ヲ与ヘ且消化ニ易キ鑛泉

脈象ナラバ
一ハ用ク消化ノ毒ヲ鑛泉トス
者ハ格綸扑水楊梅根ヲ用ヘ尚ク輕ク肉羹汁甘和ヲメカ
アル葡萄酒緩和ノ氣候善ナリ
其二膿旁熱此熱ノ前証ニ比スルニ体温甚々過
レハ灼熱及ヒ灼衝証ヲ発シ其熱食後ニ増進シ手掌煩熱
シ兩頬焮赤シ尚ク且毎朝脱汗シ谷癩証ニ傾クハ他ノ遷
延熱アリ大ナルハ早ク朝脱汗シ谷癩証ニ傾クハ他ノ遷
延熱アリ大ナルハ早ク朝脱汗シ谷癩証ニ傾クハ他ノ遷
後トシテ其熱多クハ非固ク治中後ノ膿旁條ニ詳説
參考スヘシ

熱屈折加チ熱 諸証大抵前証ニ等シ然レ熱度稍多
徴アリテ其熱ハ必
之ニ起因セル者ト
ス後ノ膿旁條ヲロ

熱屈折加チ熱 諸証大抵前証ニ等シ然レ熱度稍多
徴アリテ其熱ハ必
之ニ起因セル者ト
ス後ノ膿旁條ヲロ

輕肉羹汁甘和有力ノ高首
酒ヲ用ヒ

