



外科必読  
オニエウオニエ  
オニエオニエ

算作  
既用  
未定  
訳稿  
禁出





外科必讀卷下之一目錄

第二十七篇眼疾門

眼焮衝振論<sup>一</sup>

單眼焮衝<sup>五</sup>

加太兒刺列眼焮

衝<sup>八</sup>

儂麻室設及痛風樣眼焮衝<sup>十</sup>

療瘰性眼焮衝<sup>十一</sup>

梅毒眼焮衝<sup>十二</sup>

淋疾眼焮衝<sup>十三</sup>

痘眼焮衝<sup>十四</sup>

麻後眼焮衝<sup>十五</sup>

惡液眼焮衝<sup>十六</sup>

眼眶腺焮衝<sup>十六</sup>

奇醜眼<sup>十七</sup>

生兒眼焮衝<sup>十八</sup>

第二十八篇

膿眼<sup>十九</sup>

角膜翳<sup>二十</sup>

眼中胥肉翅翳<sup>二十一</sup>

葡萄腫<sup>二十二</sup>


第二十九篇

眼胞病

眼瞼翻花<sup>二十三</sup>

倒睫<sup>二十四</sup>

兔眼<sup>二十五</sup>



兩瞼生着<sup>三</sup>  
包膿<sup>四</sup>

眼胞癰腫<sup>九</sup>

麥粒腫<sup>九</sup>

第三十篇

淚道病

淚阜腫脹<sup>四</sup>

淚囊焮衝膿潰<sup>三</sup>淚瘻<sup>三</sup>

淚點淚道諸病<sup>五</sup>

○原本數處摘錄治方於寸紙條貼之書脚蓋

芝口先生所用意也今錄於左

焮衝ニ尤効アルモノハ硝石ニシクハナシ<sup>六</sup>

荏苒持久焮腫ニ阿芙蓉<sup>七</sup>

瞼端外反症 亞鉛花及鉍劑阿芙蓉<sup>八</sup>

擦醫藥法 反鼻脂雞卵油<sup>四</sup>

倒睫ニ硝砂精ヲ用<sup>三</sup>

外科必讀卷下之一

咸字箕作 度

未定譯稿



第二十七篇眼疾門

眼焮衝摠論

(ヲプタルミア)

一身諸藏衆器ノ中唯目最焮衝ニ罹リ易シ然ル所  
以ノ者ハ眼目ノ質固ヨリ嬌柔ニメ且外部ニ位ス  
ルカ故ニ外來ノ惡毒偶然侵襲スル寸ハ直ニ之ニ  
觸レテ焮衝ヲ發スルヲ固ヨリ自ラ疑ヲ容レス○  
其焮衝ヲ發スル所以ノ因及ヒ之ヲ治スルノ方法  
太抵他部ノ焮衝ト相符ス而シテ其徵候モ亦諸他  
一切焮衝ノ徵候ヲ以テ之ヲ弁別スベシ裡ニ就テ  
尤モ考據トナスベキ者ハ疼痛焮赤ナリ或ハ間ニ

腫脹ニ由テ之ヲ鑿定スベキモノアリ  
雖然焮赤ト疼痛トヲ把テ焮衝第一ノ徵候ト為シ  
必ス之ヲ以テ之カ弁定ヲ為サント欲スル寸ハ謬  
ヲ遺サ、ル者ホトンド希ナリ何ントナレハ焮衝  
劇盛ニメ焮赤却テ僅ニタル者アリ或ハ全ク色ヲ  
變セサル者アルニ於テオヤ○又其疼痛ノ如キ  
モ亦劇盛ノ焮衝ニ却テ之ヲ兼ルト少キモノアリ  
或ハ全ク之十キモノアリ或ハ全ク之十キモノア  
リ是ニ反シテ焮衝カロキ者ニメ疼痛太甚ナル者  
アルガ故ニ毎ニ之ヲ把テ確候トナスベカラサル  
ナリ是以醫師ノ病ニ臨ム一輕症ニ遇ト雖モ之ヲ  
輕忽スヘカラス必ス其諸證ヲ參考シテ彼是計較

シ其證果ノ如何ヲ決定セサル可ス  
眼焮衝ニ數種アリ故ニ診施ノ間其所在ノ異ヲ察  
シ劇場ノ度ヲ計リ焮衝ノ時限ヲ較ヘ其外ニ在ル  
旁症ニ候診シ且ツ其諸般ノ原因ニ最モ注意スベ  
シ  
焮衝ノ劇易ノ度ト其所在ノ深淺トヲ以テ之ヲ分  
別スル寸ハ一ニハ則尋常暈眼焮衝其位スル所口  
結膜ニアリ太抵太夕痛ス一二日ノ後自ラ消散ス  
○内外眥中ヲ問ス獨リ其一部ノ脈管腫起スル者  
ヲツツナルニアアンギユラリスト名ク  
ニニハ結膜ノ全部悉ク焮衝スル者其癢スルマ眼  
ノ外部痒クメ焼カ如ク牽脹シ且ツ推壓スルガ如  
ニ

シ既ニメ白處變ノ鮮紅其色眼角ヨリ始リテ遂ニ  
玲瓏角膜ノ際ニ及フ此症必ス淚多シニ結膜焮  
衝シテ腫脹甚シク遂ニ四面ヨリ起ツテ角膜ヲ被  
覆シ外ヨリ之ヲ望メハ恰モ獨リ一縫際ノ如キヲ  
留メ眼胞ヲ合スト雖モ兩瞼ノ間尚尽ク之ヲ被ヒ  
尽スヲアル事能ハサル者焮衝既ニ已ニ此劇度ニ  
至ル者ハ疼痛極テ甚シク切カ如ク或亦熱ヲ兼并  
ス○腫脹如是太甚ナル所以ノ者ハ血結膜中ニ溢  
入スルニ過ス  
四焮衝ヲ眼内部ニ位スル者ハ此證赤色腫脹甚シ  
カラスシテ疼痛ト眼ノ諸運ハ乖戾トハ乃チ却テ  
著大ニ○全眼窠獨リ痛アルノミナラス蔓延シテ

眉際ニ及ヒ疼痛忍フベカラズ病人自ラ以為ク眼  
球或ハ逆裂セントス○或ハ眼目ノ全球尽ク腫脹  
シ涓滴ノ淚ヲ漏サ、ル者アリ此症瞳孔透明ニシ  
旧キニ仍テ開クト金氏皆セサル幾ント希ニ這般  
ノ焮衝ハ太都熱ヲ惹出シ來ルノ危篤ヲ弁セサル  
者ナシ  
眼焮衝ノ間眼胞モ亦多ク其禍ヲ被ムル○或ハ其  
内面ノミ獨リ連累セラル、者アリ或ハ其眶際ニ  
及フ者アリ或ハ全胞悉ク禍ニ罹ルモノアリ其外  
候ヲ以テ之カ焮衝ヲ分テハ則チ  
一乾眼焮衝眼目焮衝シテ淚出ス乾燥スル者ヲ云  
フ是症ハ眼中燥極リ結膜鱗屑ノ如キ者ヲ生シ微

シク眼ト眼瞼トヲ動スト雖モ痛已ニ甚シ是種ノ  
焮衝ハ之ヲ多淚ノ濕眼焮衝ニ比スレバ最モ篤劇  
ナリトス而ノ動モスレハ貫膿ニ至リ易シ  
ニ濕眼焮衝眼目焮衝ノ間淚出テヤマス眇際常ニ  
濕濡スルモノヲ云フ  
三膿眼眼目焮衝ノ際稠ニメ膿ノ如キ物ヲ出ス者  
之ヲ名ク  
其時限ノ長短ヲ以テ之ヲ區別スレバ則チ暫者久  
者ノ云候ナリ  
眼焮衝ノ間最切要ナルモノハ病因ヲ區別スルヲ  
リ急ナル者アラス  
原由尋常眼焮衝ハ劓着或ハ眼中脉管ノ虛衰ホノ

如キ局處ノ病因ヨリ發出ス○其劓着ノ物ハ人ノ  
通知スル所口通常ノ病ヲ惹出シ來ル物件ノ類ニ  
觸ルハ等ノ如キ皆之ニ屬ス○又内因ヨリノ焮衝  
ヲ發スル者アリ例スルニ微毒瘰癧毒痛風等アリ  
焮衝之續證(太都化膿)及ヒ頑固不治ノ眼器逆碎  
ハ皆眼焮衝ノ續發スル所トス即チ玲瑯角膜ノ曇  
暗晶体及晶囊ノ星翳瞳孔窄小葡萄角腫角膜炎瘡瘍黑  
障ホナリ説テ是ニ至テ明了徹底復夕疑フベキ者  
ナシ誰カ眼焮衝ハ筆紙ノ能開論スル所ニアラス  
ト謂フヤ決シテ此理ナキヲ知ルヘシ○間又眼目  
動モスレバ焮衝シ差後時日ヲ盡シテ再發スルモ  
ノアリ此其焮衝ノ間醫師適當ノ劑ヲ処シテ之ヲ

ヲ強壯ナラシメサルノ致ス所トス  
大凡各種ノ眼焮衝ハ皆下軟ノ治法括套ニ就テ考  
索スルヲ要スヘシ○凡ソ眼ノ創着ヲ増劇スルノ  
諸件ハ仔細ニ意ヲ用テ一切之ヲ遠クベシ是故ニ  
眼目ヲノ大気ニ中ラシメサルハ其最モマサニ務  
ムヘキノ所ニ之ヲ為ント欲スル者ノ格謨布列斯  
ヲ前額ヨリ眼上ニ垂レテ大気ノ直ニ眼ニ觸ル  
ヲ防クヘシ○病者居住スルノ房室ハ須ク昏暗ナ  
ルヲ要スヘシ假使ハ病者ノ隻眼焮衝スルトモ之  
ヲ被覆スルハ必ス兩眼ニ於テスベシ○毎日細慎  
シテ病者ノ内眥ヲ啓キ泣淚ノ眼内ニ積聚スルヲ  
防キ又穢物ノ中ニ貯積スルヲ拭ヒ去ルヘシ之ヲ

行フニハ海綿ヲ温水或濁中ニ浸シテ之ヲ用ユル  
最良法トス

外用眼目ノ藥焮衝ノ性状ト其差等トヲ見テ宜ニ  
隨フ之ヲ處スヘシ其劑ハ即軟化定痛ノ藥香藥ノ  
泡方衝動開解麻酔藥點眼撒余弗藥草ヲ填充スル  
ノ袋子等ノ輩皆擇ニ用ユヘシ

外用諸劑ノ中唯點眼水ヲ最モ良方トス○其撒余  
弗ハ眼中ニ糸帖托住セス散藥ハ酷夕眼中ヲ創着  
ス○点眼水ヲ行フノ法病人ヲ仰卧セシメ一二滴  
ヲ眼中ニ滴入スルニ宜シ○ニ、或ハ点眼水ヲ耐  
忍フヲ能ハサル者アリ如此ノ證ハ既ニ必ス速ニ  
其藥ノ害アルヲ見ル○点眼水ヲ格謨布列斯  
五

浸シ眼上ニ搭掛スヘキノ疔アリ○点眼撒介弗ハ  
獨リ眼ノ久焮衝ニノミ之ヲ用ユルニ宜シ  
眼焮衝極メテ劇シキモノハ下疑條ノ總別ノニ法ヲ  
魚施スヘシ即小量ノ刺絡局処瀉血結膜ノ印結介  
賓健消焮之食養地惹茶利斯逋介布列亞ニ加羅茂  
兎ヲ加卫或ハ阿芙蓉劑中ニ安質没扭謨諸製劑ヲ  
合スル者癸泡膏皆用ユヘシ若病人虚衰スル者ハ  
強壯劑ニ宜シ

一單眼焮衝 (オソタルミアシムプレキス)

證候此病之ヲ名ケテ單ト云所以ノ者ハ焮衝様ヲ  
除ク外別ニ他證ヲ合併スルヲアラサルカ故ナリ  
○此證既ニ已ニ單純ニシテ他ノ治法ヲ要スヘキラ

別因ヲ夾雜スルヲナキカ故ニ又々亦純正消焮ノ  
治法ノミヲ施シテ足レリトス○此病ヲ識別スル  
ニ諸焮衝ノ候法ヲ以テスヘシ○此病熱ヲ帯ル者  
アリ熱ヲ帯サルモノアリ或ハ濕濡ノ者アリ或ハ  
乾燥スルモノアリ或ハ結膜ノ白処獨リ禍ヲ被ル  
者アリ其勢暴烈ニシテ他部ニ及フモノアリ  
(原由) 一身諸部凡ソ焮衝ヲ癸スルノ原由ハ亦皆此  
病ノ原由ニ屬ス○然レモ此焮衝ハ大都外來諸患  
ヲ癸スル所タル者多シ或ハ又外科手法ヲ行フ后  
ニ癸スルモノアリ  
(治法) 此疔ノ消焮治法ヲ行フベシ○其勢暴劇脈  
實數ニシテ強ナル者ハ必ス數次刺絡シテ其暴勢ヲ

殺クベシ是ヲ要汰トス○如是ニノ焮衝尚サラサ  
ル者ハ曲處渾血甚夕益アリ但シ之ヲ行フ者ハ一  
頻ニ多ク其血ヲ洩スヘシ然ラサレバ一旦其積血  
微ク去ルト雖モ又隨テ新ニ其脉管ニ積聚シ之ヲ  
未夕渾血セサルノ寸ニ比スレバ其量更ニ増加ス  
ルカ故○此症多クハ結膜ヲ切截スルニ宜シ○  
此症ハ結膜隴起シテ襍積ノ如ク眼胞ノ間ニアリ  
如此者ハ大小兩皆ノ處ニ于テ其襍積ノ一部ヲ截  
切スベシ  
内服諸劑ノ中其尤効アルモノハ硝石ニ如クハ十  
シ故ニ刺絡ヲ要スルノ諸症仍存スルノ間ハ必ス  
硝石ヲ連用スルヲ要ス

這個ノ眼焮衝ハ大槩荏苒イエス赤色ニ亦久ク不  
去脈終ニ弱ニ病人脱カスルヲ常トス○此状丁  
ル者ハ汞劑阿芙蓉劑安質沒扭劑及ヒ羌膏膏大抵  
的切トス○幾那モ亦此症ニ太効アリ○總法ヲ行  
フ外外用別法モ亦施スヘシ  
焮衝尚熾ナルノ間ハ錦葵花遏尔託亞葉罌粟總ニ  
些子ノ亞末鉛糖白百合油ヲ加ヘテ罽布トナシ  
半時毎ニ其温メタル一分ヲトリ眼上ニ托在シテ  
尤効アリ○次テ鈇劑タトヘハ金蜜陀醋半ヲ玫瑰  
水六ヲ調勻シ用テ最驗アリ  
焮衝治セス荏苒持久スル者ハ阿芙蓉ヲ外用シテ  
屢太効ヲ奏スルヲ見ル尔後幾那煎及冷水洗方ヲ

行テ佳ナリトス○又眼膏中ニ赤降汞ヲ加フル者  
モ亦用ユヘシ若夜間両眼封閉開クヘカラサル者  
ハ此方ヲ殊ニ佳ナリトス

這樣ノ焮衝或ハ異体ノ物乍チ眼ニ入ヨリ登スル  
者アリ是ノ如キ者ハ焮衝頓ニ登シ確拠スヘキ原  
由ナク尋常ノ方法ヲ行トイエトモ効アラサルナ  
リ若シ然ル寸ハ医スヘカラス子細ニ其眼中ヲ撿  
開シ異体ノ物尚恐クハ其中ニ存在セサルヤ否ヲ  
検査スルヲ要ス須シ是モ亦眼科闕クベカラサル  
ノ要旨トス

然レモ異体ノ物眼ニ飛入スル者ハ其眼乍チ疼痛  
ヲ登シ泣淚汪々ト止ス遂ニ焮衝ヲナス○如此

ノ症ト因トハ之ヲ知ルコト固ヨリ難カラス○其飛  
入ノ物酷烈ノ気味ナク然ノミナラス其質團團ナ  
ル者ハ其火速ニ眼ヲ閉スル寸ハ泣淚流ル、カ如  
クニノ便チ之ヲ出シ除クベシ○但其酷厉ナルコト  
鼻烟ノ類ノ如キモノハ小毛筆ヲ漣中ニ浸シ此ヲ  
用テ抽捲出スルニ宜シ或ハ水銃ヲ以テ温乳若ク  
ハ温水ヲ沃テ之ヲ灌ヒ出スモ亦可也○細碎ノ木  
柝穀穂槌打ノ飛片ノ類ハ皆眼中ニ粘定シテ出シ  
難キ物ト如此ノ類ハ内翳鍼ヲ用テ之ヲ抽捲シ出  
スベシ或ハ細小ノ鑷ニセツヲ用テ之ヲ除キ忒  
モ亦可也

若異体ノ物玲瓏角膜ニ刺入スル者ハ鍼尖ヲ用テ

之ヲ剔出スベシ○其刺衝ノ者若鐵屑ナラハ磁石  
ヲ用テ之ヲ吸シムルニ宜シ

ニ 加太兒刺列眼焮衝(オフタルミアカタルヲリス)

(證候)此ノ眼焮衝ハ大概其性湿濡ニノ胃寒傷冷熱

ニ魚子癸スルヲ常トス○其初ノハ酷厲水様ノ淚

流出シテ止ス其觸ル處ノ眼胞腫紅シ其近旁ノ部

モ亦之カタノニ腫ヲナシ且ツ赤色ヲナス

眼目ノ觸覺過テ敏銳ニノ差明ニ甚シク但其赤色

ハ乃チ酷シカラス○一二日ノ後疼痛ヤミ泣淚其

初ノ酷厲ヲ失ヒ粘臆トナル其質膿ヨリモ糊シ○

驗胞封閉闔スヘカラス然レモ一二日後藥セサル

モ亦自ラ開クベシ○医之ニ処スルニ適當ノ藥ヲ

以テセサル寸ハ眼球ニ腫癰ヲ生シ易シ或ハ眼胞

瘡瘍ヲナスモ亦是ナリ

此症瘡瘍ヲ生スルノ外別ニ危劇ヲ癸スルナラ

故ニ醫師ノ救治ヲ要スルモ亦稀ナリトス

原由這個ノ焮腫流行疫トナルモノ有リ然レモ多

クハ天氣寒湿ノ時ニ行ハル槩スルニ天氣ノ溫度

倏忽變化スルモノ能ク此病ヲ致ス此實驗ノ得ル

所口ナリ○又沍凍ノ大氣人体ヲ侵襲シ或ハ冒寒

ヲ癸スル寸ハ續テ這般ノ眼疾ヲ惹出シ来ル○嬰

兒ハ大人ニ比スレバ最此病ニ罹リ易シトス

治法第一時限ハ按ニ酷厲ノ淚液消焮ノ食養ヲ攝シ勉

メテ蒸氣ヲ催進スルヲ要ス○熱度ノ輕重ニ隨テ

内服ノ藥ヲ處ス即チ硃砂清涼諸監民埵列里精安  
質沒扭諸製劑阿芙蓉加羅茂兒挖歇介散及宜發當  
茶飲使へハ接骨花ノ如シ○若熱勢極熾ナル者ハ  
刺絡ニ宜シ腸胃穢毒ヲ挾ムノ症アル者ハ輕ニ  
吐下スル藥ニ宜シ

若夫外用ノ藥物及當行ノ丁件ハ即チ大氣ト光輝  
トラノ直ニ眼ニ觸レシノス前額ニ格謨布列斯ヲ  
搭拭シ眼上ヲ被覆スルヲ要ス又粘臍包撰ノ劑ヲ  
行テ酷厉ノ涙涕ヲ甘和スルヲ務ムヘシ○之ニ次  
テ亞刺比亞護謨化開水過介託亞嬰粟殼錦葵花煎  
楡持核液亞广子ノ輩ノ泡湯ニ阿芙蓉鈔糖少許ヲ  
化シ用ユ又失鳩荅蒸漏方温乳加雜腹蘭モ亦用ユ

ユヘシ○涙出テ止サル者ハ芫菁膏ヲ項窩ニ帖シ  
テ良シ

第二時限止ノ後液已ノ者ハ焮衝ヲソ久シク枕背遲  
セガラシムルカ為ニ輕ニ衝動シ及強健スルノ藥  
ヲ用ユベシ○但此病第二時限ヲ得スソ治スル者  
多シ

三 倭麻室設及痛風様眼焮衝 (ヲフルミアレウニチカ  
ユトアルトリチカ)

(證候) 這ノ焮衝ハ痛風ト兼發シ或ハ痛風ノ症ト互  
ニ相番替シテ發ス或ハ痛風起伏時十ク遂ニ眼ニ  
及フ者モ亦之アリ○疼痛極テ甚シク又極テ酷厉  
ナリ但其者色酷ク甚シカラズ淚液酷厉ニノ滂沱

トシ流出ス○此病暫久ノ二種アリ○其久者ハ最  
モ惡性ニノ通常ノ灰翳皆斯ニ根由ス

(治法)太都子之ヲ治スルノ痛風ニ同シ其最効アル  
者ハ朴窟福烏蕩趨護安質沒拊諸製劑水銀蜀羊泉  
莖亞兒余加雙鸞菊膏亦ノ輩ニ

焮衝太夕熾ナル者ハ鐵針法ヲ用ユ甘和蒸漏方卷  
法モ亦効アリ但此等ノ法久シク續用スルハ害ア  
リ○焮衝少シク減スルモノハ香中ノ乾者ヲ填充  
スル袋子莞菁膏麻性ノ眼水タトヘハ地惹答利斯  
布余布列亞ノ丁幾劑ニ水ヲ加テ薄クスル者牢烏  
達利規獨ニ水少許ヲ加フル者老利兒結兒斯ヲ用  
テ皆驗アリ○已上ノ眼水毎日一雙滴ヲ点入スヘシ

四 癰癩性眼焮衝 (オフタルミアスコロフユロサ)

(證候)此種ノ焮衝ハ癰癩病ノ毒勢眼ニ及テ發スル  
者トス○病人ノ質太都子虛衰顔面刮白上唇厚大  
恰モ腫狀ノ如ク大抵全ク其眼上ヲ被フテ眼ヲ閉  
カント欲スト蚕モ亦之ヲ啓キ難キニ至ル眼中ヨ  
リ夥饒ニ粘膩ニノ酷厉侵蝕スルノ液ヲ漏シ太夕  
シカラス又劇痛ナシ○若其眼ヲ撲開シ得ヘキ者  
ハ之ヲ視ルニ結膜上紅線アツテ縱横ニ蔓延シ且  
腫脹ス○既ニ細小ノ白胞幾個ヲ生シ其胞乍十  
膿化ノ不通光膜翅肉ヲ生スルノ釁ヲ啓クニ至ル  
○其焮衝ノ性ハ久者ニ屬ス而ノ其度ハ則チ劇者  
アリ不劇者アリ但其性頑痼難治者十常ニ八九トス

(治法) 這般ノ焮衝別ニ治法ナシ唯瘰癧門ノ方治ニ  
從テ之ヲ治スルニ宜シ乃チ下方ノ如キ是ナリテ  
ルヲホントコササリタア水銀安貞沒扭諸製劑失  
鳩荅地惹荅利斯布兒列亞幾那鐵劑強壯食養芫菁  
膏木皆之ニ屬スヘシ

外傳ノ藥ハ乃チ輕々ニ衝動シ及ヒ強壯スルノ藥  
ヲ用ユシ○即チ并柔化水ニ阿芙蓉ヲ加ヘ或ハ阿  
芙蓉粵幾斯溶化水阿芙蓉丁幾劑ニ水ヲ和シテ薄  
クナス者老利兒結兒斯チキタリスビユルビユレ  
ア兼泡劑地惹荅利斯丁幾劑曼陀羅花丁幾劑ニ水  
ヲ和ノ稀釋スル者幾那或水楊皮煎ニ礬石皓荅テ  
ルヲホントドロササリタ一等ヲ加ヘ或ハ赤降汞撒

ル弗拘櫛膏ニ阿芙蓉ヲ加ル者ノ如シ○焮衝治シ  
テ後之ヲ強壯スルカ為ニ尚内服及点洗ノ藥ヲ連  
用スヘシ

### 五 梅毒眼焮衝

梅毒眼焮衝兩種アリ其一ハ乃チ真梅毒眼焮衝也  
其性緩慢ニシテ梅毒全身ニ浸漸スルノ後發スル所  
口ニ其二ハ乃チ我乃兒魯里設眼焮衝ナリ其性ノ  
困劇ナルハ是其常ニ淋疾内伏ノ發スル所トス

### 真梅毒眼焮衝

(證候) 其原由ヲ察識スルニ殊ニ甚ク難シ但醫師精  
細ニ其嘗テ患フル所ヲ候問シテ一切諸症ヲ臚列  
スル寸ハ其中ニ于テ何ノ症候カ果メ能此目疾ヲ

導キ發スルヲ確知スルニ足ラン○這個焮衝ノ候  
初ノハ即チ兩胞焚カ如クニノ且ツ癢シ○疼痛及  
其他諸候夜間熾ニノ黎明ヨリソ乃チ静止ス○兩  
目焮微泣淚酷厉汪ミトノ滲漏ス但此症流淚過多  
ナラス唯一二時限ノ間或ハ之アルノミ○玲瓏角  
膜ノ色渾濁腫厚シ竟ニ不通光体トナルニ至ル結  
膜尿管腫脹恰モ脈裂ノ症ノ如ク淚阜灰色或ハ青  
色ニ變ス  
此證怠慢不治寸續テ乍チ癰膿ヲナシ兩目曇暗不  
可治ノ症ノ症ヲ癸シ又班痕ヲ遺ス○眼腺最善ク  
此病ニ罹リ易シ○或ハ結膜ノ上ニ膜樣努肉ヲ生  
シ遂ニ壞疽ニ變ス

(治法)水銀劑ニ強壯ノ藥及福烏蔦飲子ヲ兼用スル  
者此病ヲ治スルノ聖藥ニ

外治ハ則チ灰汞膏ニ阿芙蓉少許ヲ加テ調停シテ  
眉辺ニ摩擦ス○又外汞ノ膜ナル化開劑裡ニ就テ  
亜辣比亞護膜漿ニ華涅滿ノ溶汞ヲ加工或ハ枸櫞  
膏甚太効ヲ奏ス

我乃魯利護眼焮衝ノ我乃魯利設淋疾也淋毒内攻  
(證候)這個ノ眼焮衝中最モ頭等ニ薄ルモノニ○此  
症或ハ單焮衝ノ劇キ者ニ更ニ區別ヲ其間ニ為  
シ難キ者アリ○其初テ癸スルヤ眼胞甚ク焚熱シ  
癢ヲ覺フ○既ニ疼痛劇シクノ苛酷ニ全頭ニ透  
徹ノ刺カ如シ○或ハ結膜高腫ノ玲瓏角膜ノ四面

ヲ輪匝シ兩脰ノ間之ヲ被ヒ盡スベカラサルニ至  
ル○膿様綠黄ノ眵淚眼中ヨリ流出ス○頃刻ニシテ  
角膜其通光ノ休ヲ失ヒ四五日ニシテ子救藥スヘ  
カラサルノ瞽盲トナル然ル所以ノ者ハ角膜ノ膿  
癰虹彩脱葡萄膜様腫及諸佗變惡ハ皆是病ノ續發  
スル者ナルカ故ニ○又婦人ノ梅毒ヨリ發スル所  
口ノ白帶下一時壅止シテ遂ニ此種ノ眼焮衝ノ起  
シ來ル者アリ

原由此病大抵淋疾ヲ誤治シ或ハ其部ヲ過冷過温  
スルヨリノ遂ニ其膿ヲ壅出シ因テ以テ之ヲ惹出  
シ來ル者多シ○其卒然トシテ淋毒ノ飛滴目中ニ割  
入シ遂ニ局處ノ傳染ヨリノ眼疾ヲ發スル者間又  
是アリ

治法 醫ノ此病ニ臨ニテ最モ先ツ施スヘキノ術ハ  
焮腫ヲ撲滅スルノ法ヲ行テ熾盛ノ勢ヲ製シ潰膿  
ニ迄フノ危篤ヲ救拔スルニ在リ○其要法ハ乃チ  
刺絡内用消焮ノ藥及汞劑ヲ与ヘ截切ヲ行ヒ蟻鉞  
ヲ貼スル是ナリ○此ノ如キ方法ニ從テ之ヲ焮衝  
ノ大勢苟モ減殺スル者ハ医須ラク適切ノ藥ヲ与  
エテ内伏スル所ノ淋疾ヲ再ヒ發出シ來ラシムル  
ヲ要スヘシ

外用ニハ則チ發病ノ始ノニ軟化ノ藥 瞿粟壳 非王  
失亞米 尖鳩 荅 藪 謨 規 吉 化 水ニ 阿 芙 蓉 ヲ 調 停 ス ル  
者ヲ投シ○次に輕キ強壯衝動スルノ藥ヲ前方ニ

加フルニ宜シ例スルニ皓礬ヲ一ヒスジヒニユス  
鍼劑ノ如シ○或曰此症淋疾ヲ種ユルニヨロシ

六痘眼焮衝 (オフクルミアソアリオロサ)

(證候)痘眼焮衝ニ二種アリ○痘瘡發見ノ間這焮衝  
ヲ兼發スルモノアリ或ハ痘落痂後一二週ニシテ此  
症ヲ發スルモノアリ○其第一證ハ痘眼球ヲ穿透  
シテ發スル者是其因ニ是ニ因テ眼胞多クハ腫脹  
シ赤色アリ眼封閉ス○糊液茂乙色漠腺ヨリ滲漏  
シ兩瞼ヲ糊着セシム○焮衝大抵全身ノ症ト經過  
ヲ同フス但其因別ニ眼ニ本ツイテ發スル者ハ全  
身ノ瘡已ニ収靨落痂ストイヘ凡亦尚焮衝ノ勢減  
スルヲアルヲ十シ如是モノハ其例ニアラス○其

他之ヲ患フルノ後視小做大之病角膜曇翳葡萄腫  
等諸患ヲ遺スモノアリ

其第二證ハ則チ痘ハ但焮衝ヲ發スルノ變因トナ  
ルノニ其他經過ノ如キハ全ク久性ノ者ニ類スル  
其性モ亦極テ頑ナリ○然レモ或ハ小兒ノ如キハ  
頻ニ眼目ヲ摩揩シテ此症ヲ發スル者アリ或ハ眼  
中ノ痘痂ヨリメ是ヲ生者モ亦之アリ  
(治法)眼中痘ヲ生シ是ニ由テ焮衝スルモノハ分  
乾愈ノ藥最モ用ユヘキ所ナリ○此症大抵其將來  
ノ善惡ヲ判決シ難キモノ多シ故テ以テ醫務テ之  
ヲ剋制スルヲ要スヘシ○其將來ヲ判決スルヲ如  
此ソレ難キヲ以テ或毛布片ニ羯布羅ニ捺塗シ痘

間眼上ニ掛搭セシムル者アリ亦恐ラクハ其故ナ  
ルニ似タリ  
痘瘡差後眼焮衝スル者水銀劑ヲ興フ可シ○其他  
安質没扭劑金硫黃加阿芙蓉陀歌兒散扑烏篤飲子  
又温浴就裡硫黃浴最モ佳ナリ打膿及強壯劑ヲ用  
ユベシ外用ニハ則チ子アホリタニコム膏涅ヲ眼  
胞ニ塗擦シ又症ニ隨テ他ノ適切ノ藥ヲ処ス  
痘間眼封ヲ折開スルハ極テ害アリ但眇淚久ク眼  
ノ縫際ニ糊着スルモ亦宜シカラストス是以乳汁  
ヲ温メ大眦及ビ瞼毛ノ際ヨリメ仔細ニ之ヲ除キ  
去ラ佳ナリトス

七 麻後眼焮衝 (オブタルミアモルヒルヒルロサ)

(證候) 疔疹治後遂ニ頑強多淚ノ眼焮衝ヲ遺ス者屬  
之アリ其症傷冷毒性ノ者ト大抵相類似ス其經過  
モ亦略相同シ  
(治法) 内服ニハ則チ安質没扭劑竜腦陀歌兒散飛竄  
鹽及蒸氣宣導劑皆用ユベシ○其外用ハ初起ノ際  
ハ緩和シテ輕々衝動シ及強壯スルノ藥ニヨロシ  
○芫菁膏モ亦每每佳効アリ  
八 惡液眼焮衝 (オブタルミアカケクチア)  
這般ノ眼焮衝モ亦數種アリ假令ハ皮上ノ久性斑  
疹月信不調内蔵ノ積聚及敗闕失苟鬼陪苦或ハ腸  
胃穢毒ノ諸雜症諸虫膽液病等ノ類ニシテ眼焮ヲ夾  
ム者皆是ナリ

(治法)此ヲ療セニト欲スル者ハ須ラク先ツ諸種合  
併ノ病ヲ考索シテ之ヲ除クヲ勉ムヘシ次テ点  
洗スル藥ヲ處スベシ但其病性ト相符スル者ヲ用  
ユルニ宜シ

九 眼眶腺焮衝

(證候)此種ノ焮衝ハ最モ茂乙爸謨腺ニアリ○大率  
此病ノ初起ハ癢熱ノ焚カ如クナルヲ覺ハ其後  
狀軟骨ノ故乾燥スル者今ハ則焮赤腫脹ス○此時  
焮衝スル所ノ眼眶ヨリ酷厲白色ノ液ヲ滲漏シ次  
テ其液漸ク稠糊ニシテ酷厲ナラス黄色ナルノ質  
ニ變ニ遂ニ凝固ヲナシ夜間ハ乃チ兩瞼ヲ封シテ  
開キ易カラサラシム○又眼眶上小疹ヲ發シ其頭

漸ク腫起シ酷ク焚熱癢痒ヲナシ之ニ因テ睫毛脱  
落シ或ハ瞼胞外翻ス○這個ノ小疹大抵其形粟疹  
痴ト相肖似ス○太抵白仁モ亦同ク紅赤ヲ做ス但  
焮衝ヲ生ノ後少頃ニアラサレハ此症ヲ發スル  
アルナシ○焮衝ノ性多クハ父者屬ス而ノ其疼  
痛ハ甚シキナルモ少シ  
原由眼眶焮熱痒癢ハ此症ニ在テ局處ノ病ニ屬ス  
全身ノ續症ニアラス○然レモ此症或ハ間癩瘰癧性  
ヨリ發スル者モ亦之アリ微ク癩瘰ノ因ヲ挾ム者  
ハ焮熱ト痒癢ヲ之ニ因テ大盛ナラシノ或ハ之  
ヲノ新ニ發シ來ルニ至ラシム  
(治法)焮衝唯局處ノ疾ヨリ生スル者ハ亞鉉華ヲ

篤余ノ塩味ナキ者ニ調停シタル膏剂枸橼膏ハ  
サムオブタルハストイフエスヲ用ユレハ便チ瘡工  
○用法毎日小葉菜子ノ大サヲ取り毛筆ヲ用テ  
上ニ捺リテ仔細ニ之ヲ摩擦ス  
病癩瘰性ヨリ癸スルモノハ癩瘰ヲ治スルノ藥劑  
スルニ失鳩荅地惹荅利劑斯幾那安負没扭劑水銀  
剂等最用ユシ○此病効ヲ奏スルヲ速ナル力アリ  
者スクナシ

十 奇醜眼 (リビチコト)

(證候) 此病太率眼胞焮衝ト酷相肖ス或ハ眼胞焮  
衝ヨリノ遂ニ此病ヲ續癸スル者モ亦多ク之アリ  
○臉端外靨焮腫シ上ニ粘液ヲ流出ス○眼中常ニ  
淚アリ

(原由) 強烈ノ飲料ヲ多服スルノ人此症ニ罹ル者多  
シ○間又積年ノ癩瘰及惡液家此ヲ患フルモノ有  
アルヲ見ル○又此症痛風ニ根由スル者シハク之  
アリ

(治法) 内服ニハ則チ阿芙蓉劑及列烏麻室斯ヲ治ス  
ルノ藥皆用ユヘシ又芫菁膏モ亦シバ巨功ヲ建  
ツ○外治ニハ則チ微ハ衝動ノ藥假令ハ汞加余幾  
ノ膏方並鉞花及鉞劑ニ阿芙蓉ヲ加ル者ヲ与フ○  
凡ソ點洗ノ諸藥皆謹慎シテ之ヲ用ユルヲ要スヘ  
シ

十一 生兒眼焮衝 オフクルミア子ヲナトルユム

(證候)斯病ハ太率初生後一二日ニ發スルヲ其常ト  
ス○眼胞赤色腫脹目閉闔シテヒラクヘカラサル  
ニ至ル○頃之アツテ兩脰ノ間多膿様ノ物ヲ滲漏  
シ或ハ其中ニ血線ヲ交ルモノアリ焮衝速ニ除カ  
サル者ハ結膜及ヒ頸モ亦之カ為ニ病シメラレ瞼  
口外ニ向テ翻花ス○這箇ノ焮衝ヨリソ動モスレ  
ハ輒チ玲瓏角膜ニ雲翳腫癰ヲ生スルモノアリ  
(原由)生兒梅毒様或療瘡様ノ天質ヲ稟テ已ニ伏因  
トナス者一タビ感冒ヲ病ニ或割着太過ノ大氣ニ  
フレ或分娩ノ間医治宜キヲ得ス或ハ体軀乾淨ナ  
ラス多ク汗穢ヲ帶ヒ或ハ目烈光ニ觸ル寸ハ乍チ  
焮衝ヲ生スルニ至ル○又勞瘵質ノ父母ヨリ生ス

ルノ嬰兒ハ最此病ヲ受ケ易シ

(治法)焮衝梅毒ノ傳染ヨリ發スル者ハ水銀劑ヲ内  
服セシムベシ○外用ニハ微々水瀉スルノ藥ヲ用  
ユルヲ要ス○其之ニ屬スル者ハ香竈草ノ温罨法  
及衝動之眼藥ニ粘臍ノ物ヲ加シ水鏡ヲ用テ胞間  
ニ洗入スル等ニ又皓蒼阿芙蓉升汞化水水銀膏ヲ  
眼胞ニ摩擦シ榆白皮楊皮ノ輩ノ煎劑ヲ格護布列  
斯ニ漫シ眼上ニ托住スル等皆用ユベシ

第二十八篇

一膿眼(イイホベイム)

(證候)眼目焮衝ノ頭等ニ至ル者太率皆其續證ニ于  
テ膿眼ニ變スルモノニ其膿獨リ外部ニアルモノ

アリ又眼ノ本質ニアルモノアリ  
其獨在外部者モ亦其所在一ナラス  
○焮衝熾盛ナ  
ル者ハ些子ノ膿癰ヲ結膜ノ上或玲瓏角膜ノ上ニ  
生スル者アリ○其角膜上ニ生スル者ハ視力之カ  
為ニ太々衰へ疼痛殊ニ甚シ但シ些子ノ膿潰ハ藥  
セスノ自ラ治スル者アリト雖モ其膿ヲ生スルノ  
部ハ動モスレハ輒チ溝渠ニナシ或ハ突兀ヲナス  
是ニ由テ視官失職ノ諸病ヲ惹出シ來ルチ多シ○  
其焮衝極ノテ劇シキ者ハ許多ノ膿ヲ角膜<sup>ニ生</sup>腫大  
常ナラス人一瞥スルモ亦其始ニ比スレハ高腫ス  
ルヲ知ルニ至ル○消息子尖ヲ以テ輕ク之ヲ按ス  
レハ儼然トシ其内ニ膿液ノ波動アルヲ覺フ○這

ノ膿癰ハ善ク視官ヲノ全ク其職ヲ曠フノ昏暗不  
明ナルニ至ラシム而シテ是皆結膜厚大ヲナスノ致  
ス所ニアラサル者ナシ或ハ膿角膜ニ聚リテ一小  
点ノ如ク小域ヲ領スル者アリ此ヲ瓜根翳ト名ク  
○焮衝ノ間眼目劇痛シ遂ニ白黄ノ翳ヲ生シ其翳  
外ニ向テ突起セズ諸部ノ推壓ヨリシ其初ノ在所  
ヲ變スル者アリ○其翳小ナレハ藥セスノ自ラ消  
散スル者間又之アリ然レモ其大ナル者ニ至テハ  
稀薄ノ部ヲ雷メテ去ラス遂ニ之カタノニ角膜曇  
暗シテ光輝ヲ通セサルニ至ラシム斯種ノ翳之ヲ  
除クチ太々難シ  
或ハ膿性酷厉ニシテ角膜ヲ外ニ穿透シテ遂ニ角膜

辛

痿ヲ成ヌモノアリ或ハ内ニ向テ侵蝕シ遂ニ膿ヲ  
ノ眼ノ前室ニ溢入セシムル者アリ○若シ膿ニサ  
ニ眼ノ水質所謂前室或後室ニ累積スル者ハ其焮  
衝ノ諸候未タ除カサルノ間乍チ角膜ノ下際ニ當  
テ黄白半規偃月ノ如キ翳ヲ生シ日ニ積ミ月ニ累  
子テ漸ニ上際シ衝キ薄リ遂ニ全ク角膜ノ後面ヲ  
遮滿シ瞻視ヲノ尽ク瘳スルニ至ラシム○若シ擔閣  
シテ其治ヲ怠ル才ハ則チ角膜漸ヲ以テ開張シ竟  
ニ眼珠ヲ破綻シ病人ノ視益ヲノ十ニ一ヲモ救フ  
ヘカラサルニ至ラシム○故ニ医ノ此症ニ臨ム速ニ  
平治ヲ行フ寸ハ之ヲ他ノ敗闕ニ變セシメ以テ其  
明ヲ復スルヲ能スヘシ所謂膿ヲ角膜ノ一小処

ニ導キ聚ムル法ヲ行ヘハ乃チス赤難キ者アルヲ  
十シ

○治法膿外ニ在ル者ハ熾盛焮衝ノ方治ヲ施スヘシ  
○之ヲ行フ寸ハ膿自ラ消散ス○膿角膜ノ片々相  
層襲スルノ間ニ滲停スル者ニシテ医其消散スベカ  
ラサルヲ診シ得ハ便チ手術ヲ施スヲ要スヘキ者  
亦少カラスト○如此ノ症ハ須ラク手法ヲ行フ後  
角膜上ノ瘢痕瞳孔ヲ障碍セサルノ処ニ於テ小刀  
ヲ用テ之ヲサスヲ要スヘシ  
膿眼ヲ治スルノ法ニ二道アリ其一ハ膿ヲノ勉テ  
諸部ニ分消セシムルニ其弟ニハ手法ヲ行テ之ヲ  
外ニ滲泄スルニ

分消法膿眼ヲ治スル者ハ毎ニマツ此法ヲ試ムヘ  
シ○焮衝ノ度ニ隨テ蠟鍼吸角荒膏清熱下劑等  
ヲホドコスヘシ○尔後微ニ衝動スル別法ヲ施ソ  
大効アリ○其之ニ屬スル者ハ**亞鉛礬水ニ阿芙蓉**  
ヲ加フル者升汞水ニ**牢烏達扭謨**ヲ加エ又**ラリ**  
**スシフイニユス**ノ**溶化劑**礪砂水石灰水ベール各ノ  
**眼膏等ノ輩**ニ○其**軟化劑**ハ**裡ニ就テ**（**邪仁各ノ錦**  
**葵煎ハ頗ル世ノ稱スル所**）ト雖**正真ノ膿眼ニ于**  
テハ善効ヲ奏スル者少シ  
以上ノ分消法已ニ効ナク膿ノ生スルヲ愈多ク除  
クニ眼ノ前後室ニ充塞シ眼紐之カタメニ開張ス  
ルノ常ナラス諸證倍々劇シク病者膏ニ失明スル

ノ怕アルノミナラス動モスレバ是ニ由テ性命ヲ  
殞ニ至ラントスル者ハ医速ニ手法ヲ行テ其大患  
ヲ一掃シツクスベシ**稽遲**シテ日月ヲ玩掲スヘカ  
ラサルナリ○之ヲ施ント欲スル者ハ**撥翳針**或ハ  
ラニセツトヲ用テ角膜ヲ切截スヘシ○之ヲ切截  
スルハ内翳ノ截法ト同シ惟此截開ハ内翳ノ者ニ  
比スレハ大ナラサルヲ異トスルノミ○之ヲ切截  
スルノ後急ニ眼上ヲ紫住シニ時或ハ三時毎ニ其  
縛ヲ解キ眼ヲ啓テ其瘡処ヲ検査スヘシ○膿除  
ニ其瘡口ヨリ流レ出ルヲ数日ニ方ニ止ム○其  
截口瘡合スルモノハ小刀尖ヲ以テ細慎シテ再ヒ  
其口ヲ開クベシ○内外ノ用藥ハ手法ヲ行フノ間

モ亦兼子行フベシ  
此法ヲ試ムルヲ数次瞻視全ク故ニ復スル者モ亦  
シバク之アリ。然レモ或ハ此截法ヲ行フ後新  
ニマタ焮衝ヲ生シコレヨリ膿増多キニ至ル者  
アリ又此法ヲ行テ後角膜ニ不治ノ潰瘍ヲ惹出シ  
來ル者モ亦少カラス。或ハ手法ヲ行フ後視官不  
明了ヲ致スモノアル其甚シキ者ハ角膜殊ニ暈暗  
ヲ為スモノアリ又膿晶囊ノ前膜ヲ侵蝕シツクス  
モノアリ。又水様液中ニ動モスレバ絲ノ如キ者  
ヲ遺スモノモ亦之アリ之ヲ得ル者モ亦瞻視之カ  
タ為ニ障翳セラル。或ハ焮衝ノ前徴十ク卒トシ  
前後室中ニ膿様ノ物ヲ生スルモノアリ此疔膿眼  
ト既ニ其因ヲ異ニシ而メ其治法モ亦大ニ逕達ス  
之ヲ名ケテ類膿眼ト云フ

ニ 角膜翳 (マキスラーコル子ア)

(證候) 角膜ノ翳之ヲ鑒識スルヲ固ヨリ自ラ難カ  
ラス。○其初テ起ル寸ハ角膜霧ノ如ク朦朧トシ灰  
色ヲナシ仍少シク光輝ヲ通ス。アグリスカリコ介  
後其部漸ク白色トナリ全ク光ヲ通セス結麗土色  
色。或ハ真珠色ノ為シ或ハ扁平或突起其高キ角  
膜上ニ白小阜ヲ為カ如キニ至ル。○已ニ漸ニ濁  
大トナリ竟ニ全ク角膜ニ掠略シ尽ス。○高年ノ人  
角膜ノ下際ニ弓様ノ墨翳ヲナスモノアリ此疔之  
ヲ名ケテ翳トスルモノハ固ヨリ正理ニアラス

或ハ翳角膜ニ小所在ラ点ル者アルヲ觀ル  
(原由)角膜及結膜焮衝ヲ患ル後其部硬強ヲナシ遂  
ニ翳ヲ生ニ至ルモノ多シ○又皮上ノ熱疹ノ後或  
瘰癧及酷厉ノ体ヨリ生スル所ノ久性眼焮衝モ亦  
毎ニ角膜ノ翳ヲ起シ来ル  
治法)角膜翳ヲ生シ不通光体トナル者或ハ時ニ治  
シ易キアリ或ハ全ク治スヘカラサルモノアリ○  
梅毒瘰癧痛風ノ諸因アステ内伏スルヨリ發スル  
者ハ之ヲ獨リ外因ヨリソ發スルモノニ比スレハ  
較治シ易シ○病人年齒幼弱ニシテ翳膜新ナルモノ  
ハ治シ易シ年齒幼ニ翳愈新ナル者ハ倍治シ易シ  
○翳膜陳久ノ者ハ治スベカラス○翳膜稠密ニシ

少シモ光ヲ通セサル者ハ医治ノ効アルト否ルト  
倍々期シ易カラス○其他諸種ノ翳ヲ治スルニ必  
ス許多ノ日月ヲ須ツベシ決ノ効ヲ一時ニ取ルコ  
能ハサルナリ  
雲翳ヲ掃ハント欲スル者或ハ局處ノ藥ヲ要スル  
者アリ○假令ハ列烏麻<sup>ウマ</sup>眞<sup>マコ</sup>設痛風樣瘰癧病ヲ合併  
スル者アルトキハ安<sup>ア</sup>貞<sup>マ</sup>汝<sup>ニ</sup>扭<sup>ニ</sup>劑<sup>ニ</sup>水<sup>ニ</sup>銀<sup>ニ</sup>失<sup>ニ</sup>鳩<sup>ニ</sup>荅<sup>ニ</sup>莨<sup>ニ</sup>菖<sup>ニ</sup>苳<sup>ニ</sup>曰<sup>ニ</sup>  
ユルサ<sup>ニ</sup>千<sup>ニ</sup>ル<sup>ニ</sup>ラ<sup>ニ</sup>亞<sup>ニ</sup>兒<sup>ニ</sup>尼<sup>ニ</sup>加<sup>ニ</sup>雙<sup>ニ</sup>鸞<sup>ニ</sup>菊<sup>ニ</sup>木<sup>ニ</sup>大<sup>ニ</sup>効<sup>ニ</sup>アルカ如シ  
外科此種ノ一症ニ臨ム毎ニ先ツ其外候ヲ以テ若  
クハ輕化分利ノ諸藥モ亦用ユベキモノニアラザ  
ルヤ否ヲ商量一番スルヲ要ス○若外用ヲ一藥効  
ヲナスコトアタハサルモノハ更ニ別ニ一藥ヲ擇テ

之ヲ換工用ユ可シ○凡ソ外用ノ劑中分消衝動ノ  
藥最大効アリ○其用法ハ或ハ眼中ニ點シテ嫩衝  
ヲ生スルニ至ラス病人其痛ヲ耐ユルヲ得ラ度  
トス

雲翳ヲ撥スルノ藥モ亦一ナラス近時吾邦ニ在テ  
醫家稱シ用ユルノ藥ヲ下條ニ開列シ以テ各家ノ  
採修ニ備フ其藥ハ乃チ油様脂様ノ藥反鼻脂雞卵  
油骨中ノ髓液沒食子油諸獸ノ胆汁裡ニ就テ八目  
鰻ノ膽カムブラ油リキコオルヘバチキユスミユス  
テルラリフリユヒアチリス塩劑皓礬蓬沙硝砂升  
汞化開劑蜜兒聖那各ノ眼膏枸橼膏オプタルニユム  
リエプリユム温韃爾各粵茂室燒過礬石銅綠バル

チンゲリ各ノ眼嫩ヲ治スル散藥沙糖鹿角精植物  
粵幾斯失鳩荅地惹荅利斯白屈菜菘蓂盧會ニ他藥  
ヲ加フル者麻葉阿芙蓉丁幾劑ラウクニユムリクイ  
シユム老利兒結兒斯水地惹荅利斯丁幾劑鋒尖銳  
利之藥即チ研細シタル硝子錫鑢屑烏賊骨腐藥刺  
比私印協兒乃里斯化開劑酪狀安質沒扭是也其腐  
藥ヲ施スニハ醫師謹慎シテ細毛筆ヲ用テ其藥ヲ  
蘸シ翳上ニ捺抹シテ別ニ筆ノ乳中ニ蘸ス者ヲ  
取リ速ニ之ヲ灌洗スルニ宜シ○或ハ角膜上ニ安  
貞沒扭酪ヲ點シテ膿ヲ打シテ効ヲ奏スル者アリ  
已上ノ諸藥互ニ相配合シ更換シテ之ヲ用ユヘシ  
古人角膜ノ星翳外ニアツテ極メテ頑強ノ者ニ遇

ハ之ヲ除カタメニ圓鍼ヲ以テ之ヲ穿透シ或ハ浮石光明塩ヲ用テ之ヲ摩揩シ或ハ之ヲ磨礮スルモノアリ皆良法ニアラス○其翳極ノテ甚シク外ニ向テ突起スル者ハ捲翳鍼ヲ以テ其一ニ部ヲ除キ去リテ後藥ヲ行テ全治ヲナスモ亦恐ラクハ亘キ所ナラン

三 眼中翳肉翳 (ベトレイキユバンニユス)

(證候) 結膜ノ角膜ヲ被覆スルノ一部厚大ヲナスヲ常ニ異ナル者之ヲ翳肉又翳肉ト名ク其尋常ノ翳膜ト異ナル所ノ者ハ其形ヲ以テ之ヲ辨別スルノミ○其初テ発スルヤ白キカ如クニモ軟ニ時日ヲ經歷スルノ後漸ク硬クメホトント獸皮ヲ按カ如

シ遂ニ睛ヲ攀テ大ニ視カラ減シ或ハ之ヲ障碍シテ全ク明ヲ得セシメサルニ至ル

○其翳肉尚白ニ少シク厚大ナルノ間ハ之ヲ「ベトレイギイユム」ト名ク其已ニ厚クメ許多ノ血縷其上ニ散蔓スルニ至テハ之ヲ「バンユ」ト名ク○或ハ翳肉ヲ生スルノ部ノ結膜角膜ト固ク膠着セスノ之ヲ推ス寸ハ乃チ動ク者アリ其甚者ニ至テハ結膜ノ動ク寸相牽テ皺襞ヲ為シ角膜上ニ被ムルニ至ルモノアリ

(原由) 此病ハ故ト結膜ノ變性ヨリ生スル者ニシテ其如此ニ至ル所以ノ者ハ内ニ瘰癧梅毒列烏麻窒設等ノ惡毒ヲ治スルヨリメ遂ニ久性ノ眼焮衝ヲ發

シ是ヨリノ竟ニ啓病之原トナツテ此病ヲ做スニ  
至ル是尋常ノ因ニ

(治法) 眼上ノ翳太卒難治ノ一病ニ全愈ヲ得ル  
者僅々タルノミ○唯此病ヲ得テ久シク時日ヲ経  
歴セサル者ハ尚治スヘキノ機アリ若愈新ナルモ  
ノハ愈々其痊期ヲ須ヘキノミ  
翳ヲ発スルノ近因ハ正ニ玲瓏角膜翳ト其近因  
ヲ同フスルヲ以テ其内服外傳ノ藥モ亦彼ノ佳十  
ル者ヲ攀テ此ニ從シ処スベキニ但此病ニ在テハ  
外用ノ諸方法彼ニ比スレバ較強カラサルヘカラ  
ス又較々劇ク衝動セサルベカラス此ヲ異トスル  
ノミ

其角膜翳ニ施スノ諸方法ヲ行フト雖モ効ヲナス  
ヲ能ハサル者ハ手法ヲ行テ之ヲ扶在スルニ宜シ  
若シ結膜甚々曇暗獸皮ノ如ク臃狀ノ如キモノハ  
手法ニ非レハ之ヲ救フヲ能ハス手法ヲ行フ後結  
膜固着セズ角膜上ヲ被フテ牽動スルニ至ル者  
ナリ医須ラク預メ之ヲ知テ俟待スヘキノ○結  
膜上角膜ト固着スルモノハ手法ヲ行フト雖モ善  
効ヲ得ルモノ寡シ医手法ヲ行ハサルノ前病家ニ  
對メ預メ吉凶ヲ道ハント欲セハ其言語須ク些子  
ノ疑ヲ帶ンテ要ス然ル所以ノ者ハ角膜結膜ト  
相附着スルカ故ニ切截ノ後ニ非レハ其角膜果シ  
些創処ナキヲ保スベカラサルカ故ニ

手術ハ下敷ニ述フル所口亞屈列兎ノ術ヲ是佳ト  
ス○其法<sup>コ</sup>ンセツテ<sup>レ</sup>ヲ用テ結膜ノ牽動スル所ノ處  
ヲ高ク夾ミ起シテ之ヲ透刺ス○之ヲ刺スノ後角  
膜ヲ検査シ其創尚塵々タル者ハ更ニ手術ヲ施ス  
ヲ要ス於是角膜ノ外ノ白ヲ囲ムノ處ニ於テ細小  
ノ眼鉸ヲ用テ角膜ノ周圍ニ循テ輪匝シテ之ヲ剪  
ル○一二日ノ後膜ヒキ縮テ一處ニ聚ル是ノ如キ  
者ハ勞セスシテ其胛肉ヲ除キ去ルヲ得ベシ○  
之ヲ行フノ間出血アルモノハ医之ヲ止メス委弃  
シテ可シ  
手法ヲ行フ後<sup>的</sup>的<sup>酪</sup>或鉍劑ノ化開方或ハ亞鉛膏ヲ  
用ユヘシ之ヲ施ス寸ハ尋常角膜上面ニ生スル所

口ノ膿瘍ヲ速ニ一掃シ盡サシムルナリ  
又血縷眼中白處ノ諸方ヨリ起テ胛肉中ヲ犯ス者  
アリ如此者ハ悉ク之ヲ切斷シテ其血ヲ輸スノ道  
路ヲ截ヘシ但之ヲ截斷スル法一次ニ止ム可ス  
數以之ヲ施スヘシ或ハ刺必私印歇兒乃利斯ノ化  
開方ヲ行テ膜ヲ打シ之ニ因テ漸々ニ翹肉ヲ消磨  
スル者アリ皆考索ノ一助ニ備フベキ所ニ  
或ハ胛肉唯角膜ノ一處ヲ被フ者アリ此ノ如キ者  
ハ其長大トナルヲ過ムルガ為ニ角膜ノ外白ヲ圍  
ムノ部ニ於テ結膜ヨリ剛膜ニ透テ之ヲ切截スシ  
結膜厚大ヲナシテ且弛開シ之ニ兼テ動モスレハ  
脂肪様ノ小腫癰ヲ発スル者ハ衝動収瀋ノ藥ヲ用  
ス

ユレバ捷効ヲ奏スルヲ難カラス

四 葡萄腫 (スタツフエイロ)

(證候) 角膜厚大ヲ做シ内外ニ向テ太甚タ腫脹シ  
視官是ニ由テ其職ヲ曠スルニ至ル○余時角膜上  
多ハ瘰肉ヲ生シ内硬實ニノ凹陷セス或其質葡萄  
子ニ似タリ○或其腫長大ヲ做シ兩臉ヲ合ト雖モ  
之ヲ被覆シ盡スヘカラザルニ至ル○其腫初ハ軟  
ニノ柔ニ續テ漸ク硬ク幾シト軟骨ノ堅ヲ得ニ至  
ル○眼中ノ腫處及其十瘰肉トモニ無数ノ血管叢  
聚スルヲ常トス其血管中真紅血ヲ輸入シ腫脹常  
ニ非ス○葡萄腫太夕長大トナル者ハ遂ニ睛ヲ奪  
チテ其明ヲ失ハシメ下臉外ニ向テ翻轉シ淚汪汪

トシ停マラス是ヨリノ眶皮焮衝シテ腫癰ヲ生ス  
○其腫ノ大小ニ準シテ其名ヲ分ツ一ハ「スタツフ  
エイロ」ト「タール」ニハ「スタツフエイロ」ハルチア  
レ「三」ラ「スタツフエイロ」ラヒモシコト名ク  
又一種眼中ノ白處ニ暈困ヲナス腫癰ヲ生者アリ  
之ヲ鞏膜葡萄腫ト名ク○其色太抵黯黒ヲ常トス  
或ハ全ク黒色ナルモノアリ皆疼痛ヲ帶フ葡萄腫  
ト殆ト相同シ

(原由) 通常葡萄腫ノ原由ハ熾盛ノ焮衝ナリ裡ニ就  
テ外ヨリ物ニ撞破セラレテ焮衝ヲナシ遂ニ是ヨ  
リメ之ヲ發スル者アリ或ハ瘰ノ眼中ニ生スルヨ  
リメ焮衝ヲナシ因テ之ヲ發スル者アリ○又梅毒

療瘰癧痛風等ノ眼焮衝ヨリノ是ラ生スル者アリ○  
其腫ヲナスノ内因ヲ推スニ恐ラクハ液ノ眼内ニ  
瀦停スルヨリノ力腫ヲナスニアラス眼中ニ膜  
様ノ破裂ヲナスヨリノ之ヲ致シ遂ニ漸ラ以テ長  
大ヲナスヲ然リ

(治法)葡萄腫ノ治法毎ニ其効ヲ建ルヲ太ク難シ而  
シ又其必効アルヲ斯ニ難シ○角膜其素ニ復ソ旧  
患コトクク瘡ル者塵ニトシテ希也

葡萄腫一種ノ原因ヨリ發スル者ハ之ヲ純ラ眼部  
ノ一処ニノ之根シテ發スルノ症ニ比スレハ較治  
シ易シトス○其一種ノ原因ヨリ發スル者ハ其病  
性ト相符スルノ藥ヲ投メ之ヲ愈スヲ要スヘシ

外用ニハ強壯収斂ノ藥ニ宜シ○即チ皓礬水升汞

刺必私印歌兒乃里斯等ノ化開劑裡ニ就テ阿芙蓉

丁幾劑煨過明荖沙糖ノ散藥酒石英沙糖石脂散又

凡角膜翳ヲ治スルノ諸藥等ニ○古人用ユル所口

ノ壓入諸器ハ今ハ全ク廢棄シテ用ユルヲナシ

手法ハ蒲桃腫ノ性ニ隨テ各其分アリ○新法若シ其性

スクツヘイロニトタレニ屬スル者ハ歌汾兒滿人名

ノ術ヲ用テ細長ニ之ヲ切截シ水様液ヲメ其創口

ヨリ流出セシムルニ宜シ○角膜開張ナル者之ヨ

リノ収縮ス○但医ノ此術ヲ施ス切截ノ間ニ于テ

淺ク創口ヲナスヲ要セス心ヲ剛ニシテ之ヲ行フ

ヘシ○門法連歌乙謨ノ術ハ其中ノ液ヲノ漏洩シ

久ラ經テ止サルヲ要スルガ為ニ腫癰ノ側ニ于テ  
角膜ノ一片ヲ截去ル者ナリ但此法ノ如キハ實ニ  
其標記ニ違スルヲナシ

若其性スツペイロマパルチアールニ屬スル者ニ  
ノ其根脚少小ナル者ハ刀或ハ鉸刀ヲ用テ之ヲ切  
斷スベシ然レ之ヲ截去ト雖又新ニ腫癰ヲ生  
シ竟ニ惡性ニ變シ已ヲ得ス眼ノ半邊ヲ切斷ス  
ルニ至ル者モ亦少シトモセス○如此ノ症ハ灰翳  
ノ法ノ如ク先ツ角膜ヲ切截シ尠後鉸刀ヲ用テ輪  
狀ニ之ヲ切斷シ其全圍ノ中ニ于テ盡ク變性スル  
ノ部ヲ除キ去ヘシ○又葡萄腫自ラ醜恠ヲ致シ惡  
性ニ變スル者モ亦此術ヲ施スベシ○又ギユンセ

名人ノ法ニ循ヒ膿ヲ打スルノ法ハ効驗多カラス其  
大効アルノ藥ハ「ヤ」ニ各人試驗スル所ノ安質沒扭  
酪ヲ其最トス

之ヲ用ユル法小毛筆ヲ酪中ニ蘸シ腫癰上ヲ輕々  
ニ押推シテ適宜ク之ヲ搽上ス○病人少シク疼痛  
ヲ覺ユル寸ハ大毛筆ヲ數回乳汁ニ蘸ス者ヲ取テ  
其粘膩酷厲ノ部ヲ洗滌スヘシ○此法ヲ行フノ間  
医愈々細慎シテ之ヲ施ス寸ハ焮衝ヲ發スルヲ愈  
々少ナリトス○又此法一次効アラサル者ハ數回  
之ヲ行ヒ其佳効ヲ収メ葡萄腫全ク消散スルニ至  
テ止ム○若シ之ヲ行ノ間焮衝ヲ發セントスル者  
ハ其焮衝ヲ消散スルノ法ヲ行ヒ全ク其非ヲ見ル

了無シテ而ノ後又之ヲ施スヲ要ス

第九篇 眼胞病

一 眼瞼花 (ユクトロヒウム)

(證候) 此疾ハ眼瞼眼球ノ上ニ向テ循ラズ反テ頰上ニ懸ルガ如クニナルナリ○此ノ如キ者ハ眼胞ノ内面ハ外ニ向テ翳花ニ眼球ノ下際ノ一面ヲ遮翳シ盡スヲアルヲ能ハス○之ヲ得ルモノハ目狀暗恠ニシテ常人ノ如クナラス此ヨリシテ其部ニ經久燃衝ヲ挟ム者眼窠中ノ小腫或ハ下瞼ノ内面細小ノ腫起葡萄腫眼胞ノ閉筋縦緩若クハ全然麻痺スル者モ亦皆此ヲ馴致ス

(治法) 諸種ノ原由ニ隨テ其治法各異ク

若其症瘡痕ニ原ヒテ發シ而シテ其外皮太夕短縮セサル者ハ徐々ニ其皮ヲ控テ之ヲ伸長シ又夕ハ軟化劑ヲ外用シテ之ヲ長カラシムルヲ勉ムヘシ○然レモ大抵上ニ用ユルノ法ハ少シノ其効ヲ奏スルニ過キス如是症ハ創痕上ヲ截切スルヲ要法トス○已ニ之ヲ截切スルノ後其創口ノ上下ニ絆創膏ヲ貼シ互ニ相附着スルヲ莫ラシム而後其創ヲ愈スベシ○如此之ヲ行フトイヘドモ其瞼皮尚伸長セザル者ハ更ニ其瞼ノ内膜ヲキリテ眼胞ノ内ニ斂マルヲ障ルノ餘肉ヲ去ルベシ○或ハ眼胞内ヲ刺シテ血ヲ出シ其周圍ニ水銀膏

或ハ安貞没扭酪ヲ搽ルヘシ若シ其症癰膿ニ原ヒ  
 テ発スルモノハ其膿ヲ疎解スルヲ勉ムヘシ而メ  
 其癰腫仍愈ヘサル者ハ鉸刀ヲ用テ之ヲ截リ去ル  
 ヘシ○其細小ノ腫癰モ亦此法ヲ以テ之ヲ治スヘ  
 シ若葡萄腫ニ原ク者ハ之ヲ治スルヲ蒲菴腫門ニ  
 述ルカ如クスベシ  
 若其症弛緩ト麻痺ニ由ル者ハ局処ノ衝動及強壯  
 劑例スルニ苗香油芫菁丁幾告尔ノ類ヲ行フヲ要  
 ス  
 其諸病因ヲ合併スル者ハ各種ノ性ニ隨テ各其病  
 ニ符合スルノ藥ヲ處スベシ  
 二 倒睫 (トリゲイアシス)

(證候)此病二種アリ○其第一種ハ眼胞全然病ヒナ  
 ク睫毛獨リ脛上ヨリ内ニ向テ倒レ卧シ其毫ノ末  
 眼球ヲ刺着スル者也○其第二種ハ病ヒトリ眼胞  
 ニ位シ胞其内ニ向ヒテ反側シ遂ニ睫毛ヲノ球質  
 ラ刺戟スルニ至ラシムル者ニ其第二種又「エント  
 ロピムムト名ク邪仁各人又一症ヲ掲ク其症ハ弓状  
 軟骨翻花シテ内ニ向フ者ヲ弁ス  
 又睫毛偶然一ノ重サニ生スル者アリ之ヲ「シスチ  
 ギヒアシス」ト名クトリゲイアシス<sub>按即</sub>ハ毎ニ不  
 可耐ノ病ニシテ此症ヨリノ遂ニ喪明ノ媒起スルニ  
 至ルヲ又少ナカラストス  
 (原由)トリゲイアシスハ大約久性眼癩衝ノ續證也

ナリ○此病多クハ眼胞腺焮衝醜恠眼惡性痘ヨリ  
惹出シ來ル者トス○又眼胞ノ内面小腫癰或ハ潰  
癰ヲ生スルモノ也此病ヲ將出シ來ル

(治法) 其第一種ノ證ヲ治スルニ種々ノ套法アリ

其最第一ノ良法ハ先ツ内ニ倒卧スルノ睫毛ヲ細

小ノ鑷子ヲ用テ其根ヲ連子テ之ヲ抜キ去リ其後

毛筆ヲ用テ眼胞邊緣ノ内面ノ半辺ニ刺必私印歇

兒乃粟斯ノ化開水或硃砂精ヲ搽ルベシ

○此ヲ施ス寸ハ胞内ノ皮強靱ノ腫狀ノ如ク是ヲ

以テ睫毛ノ新ニ其排列ヲ失メ内ニ生スルノ妨障

スルナリ○其法ヲ施スノ間谨慎シテ之行フベシ

或ハ其捲曲ノ睫毛ヲ小鉸刀ヲ用テ截リ去ル者モ

赤能一時ノ寛解ヲ致ス然レモ其睫毛復タ再ヒ原

處ニ生シ而シテ其毛始テ比スレハ更ニ強剛ヲナス

カ太抵然リトス

加屋華列兒ノ法ハ勾曲シタル縫合鍼ニ絲ヲ穿

テ外背ヲ距ル一拵四歩ノ二ノ處ニ于テ驗皮毛

ヲ刺シ透シ糸ヲ貫キ又一絲ヲ内背ノ同シ距離ノ

ノ處ニ貫ヌキ透ス是ニ於テ兩絲ヲ合セ結ヒコレ

ヲ切リ別ニ眉下ノ凹處ニ卷キタル物ヲ入レ右ノ

兩絲ヲ引テ其上ヲ過キテ上ニ升リ膠膚膏ヲ以テ

其端ヲ前額ニ貼ス其絲弓狀軟骨位スル所ノ眼瞼

ヲ三四週ノ間ニ截切ス其創處ハ其後自ラ口ヲ歛

メテ瘡ユ加屋華列兒又曰或ハ絲ヲ施ス一ニ回ニ

此法不見  
外眼書

及フヘキ者アリ又曰或絲ヲ施スノ部ノミ睫毛外ニ向ト雖氏其他處ハ仍故ノ如ク内ニ向テ倒臥スル者モ亦復之アリ  
過兎涅滿其輕症ノ者ニ遇フ毎ニ輒チ獨リ眼胞ノ外皮ニノミ絲ヲ貫絆セリ  
其鼻二種ノ證「ゴントロビユム」モ亦其原由一ナラス而メ之ヲ治スルノ法モ其證ニ隨テ亦復タ一ナル  
「能ハガルナリ」○若施療ノ間尋常遇フ「アル者」ノ如ク眼胞ノ外皮常度ニ超過シテ縦緩不収テ原由トシテ因テ以テ是ヲ發スル者ハ其胞皮ノ一片ヲ切り去リ絆創膏ヲ以テ之ヲ瘡合シテ以テ其延長ヲ復スヘシ

註 福鳥篤曰夫歌蘭度華爾列斯ノ外科集説ニ俱ニ眼脰内反ノ治法ヲ載ス其法蓋シ「ヘルリン」  
ノ醫歌兒林伍ノ説ニ原ク  
其法綠礬油ヲ取テ眼胞ノ外面ニ捺リ胞上ニ痂ヲ結ハシメ八日ヲ過テ其痂脱落スルノ后再ヒ之ヲ捺リテ痂ヲ結バシム如此ナル「數回」  
常ニ復シテ後止ム太抵此法ヲ行フ「二三回」ニ  
ノ驗其故ニ復セサル者少シ  
證候 上脰異常ニ下垂シ病人其目開カント欲スト雖モ少シモ之ヲ上掲スル「能ハス」或ハ少シク之ヲ啓クト雖モ全ク眼球ヲ露出スルニ及フ「能ハサル者」此ヲ上脰搭垂病トス此ノ如ク驗皮低垂ノ

カ能ク之ヲ掲開スルヲ能ハサル者ハ病人自ラ其  
指ヲ以テ微ク之ヲ上ニ支ユルニ非レハ眼微シモ  
物ヲ視ル能ハス或指ヲ以テ之ヲ上掲セサル寸モ  
少シク之ヲ視ルト雖モ其全然ヲ盡スル能ワズシ  
テ外ヨリ之ヲ望メハ毎ニ眊ルヲアル者ノ如シ  
(原由)上脰癰瘰収ラザル者脰ノ掲開筋ノ痺スル者  
或ハ脰上ノ閉筋痙様ノ短縮ヲ為ス者及眼胞潰癰  
皆其原由ニ屬ス

(治法)醫師診候ノ間脰皮縦緩其發因タルト以為者  
ハ強烈収固ノ藥衝動了緩出見及衝動硬膏ヲ行テ  
其病ヲ去ルヲ務ムベシ○但外用ノ諸藥ノミテ  
ハ其効ヲ奏スルヲ稀ニ是ヲ以テ手法ヲ行フヘキ

者至テ多○其法先ツ指或ハ小鑷子ヲ以テ脰上  
有餘ノ皮ヲ横ニ撮攀テ襞ノ如クナラシメ而シテ小  
鉸子ヲ用テ其襞ヲ截去シ直ニ創口ヲ合シテ絆創  
膏ヲ用テ之ヲ掩フ蓋シ其脰皮ヲ截リ去ル太夕多  
カルベカラス是ヲ以テ医ノ脰上ノ皮ヲ撮テ横ニ  
襞積ヲ為スノ間病人ヲメ試ニ眼ヲ開闔セシシ其  
的ニ過不及十キヲ確知シテ其截去スベキノ部ハ  
方ニ若干ナルヲ定ムルヲ此手法ヲ行フ者ノ最モ  
當ニ知ルベキノ要件タリ  
若此病掲開筋ノ木ニ原ク者ハ内外ヨリ有力衝動  
ノ藥ヲ施シ行ニ宜シ○此症毎ニ痲ノ前導ヲ作ス  
モノアリ或ハ痲治スル後之ヲ遺スモノアリ是ノ

如キ者ハ大約不治ニ屬ス○間々第一道ニ割着ヲ  
做スノ物又ハ此灸アリテ遂ニ此證ヲ發スルモノ  
アリ此ノ如キモノハ各其的當ノ藥ヲ用テ之ヲ排  
シ除クベシ

脛上ノ闔目筋痙様ノ拘挛ニ由テ此症ヲ發スル者  
ハ軟化膏及阿芙蓉劑ノ摩膏ヲ用ユレハ自ラ解ス  
○又諸種衝動物ニ帶累セラレテ此症ヲ發スル  
又ニバク之アリ之ヲ除クハ各其病ニ適スルノ内  
藥ヲ處シテ之ヲ治スルヲ求ムヘシ

若其證眼脛上ノ潰癰ヨリ生スル者ハ外科ノ方法  
ニ隨テ之ヲ處置シ以テ之ヲ瘥スニヨロシ  
經久焮衝ノ後眼胞ノ内面ニ位スルノ鞏膜大ニ腫

脹シ兩脛ノ間ニ露レ出テコレヨリノ遂ニ脛皮ノ  
捲垂ヲ致スモノアリ此ノ如キハ須ラク徐ニ腫  
癰ヲ疏解スル所以ノ收斂ノ藥及ヒ乱截法ヲ施ス  
ベシ

四 兔眼 (ラポポハタルモス)

證候此病脛皮下垂ト全ク相反對スルノ證ニノ脛  
皮短縮スル者ニ是ヲ以テ病人自ラ其眼ヲ開ント  
欲ト雖モ亦之ヲ闔ルヲ能ハス脛ヲ以テ眼ヲ被ハ  
ント欲ト雖モ亦タ又タ之ヲ掩フヲ能ハサルナリ  
○此病ノ發スル所口ノ證候諸般アリ○但此病ハ  
液ノ滲収之カ為ニ障礙セラレカ故ニ眼目汪々  
常ニ淚ヲ流シテ止ス異体汚穢ノ物眼中ニ摺入シ

易ク又眠ルト雖モ常ニ眼ヲ闔ルヲ能ハス○已上ノ諸件ニ由テ眼目甚タ虚衰シ而シテ又焮衝ヲ生スルニ至ル

(原由)天禀ノ不具眼球異常ノ腫大臉上腫癰瘡痕闔目筋虚衰麻木皆其因ニ屬ス

(治法)兔眼ヲ生スル所以ノ局處ノ起原ヲ除ク寸ハ其症不治シテ自ラ愈ユ○其虚衰ニ本ツク者ハ衝動摩膏ヲ用ユ其瞼ノ外皮實ニ短縮ヲナスニ由テ生スル者ハ瞼皮外反門ニ述ル所ノ手法ヲ行フヘシ○其眼目ハ適切ノ法方ヲ行ヒ夫ヲメ大過ノ光輝ニ觸レシメザルヲ最其治法ノ標的トス

五 兩瞼生着 (アンセイロプレパロニ)

(證候)此病ニ區別アリ其一ハ兩瞼端ノミ獨リ相癒着スルノ疔其ニハ兩瞼端相封合スルノミナラズ其眼胞ノ内膜眼球ト悉ク相癒着ノ合一ヲナス者アリ○其第一證ハ瞼邊太約全ク相癒着セス必ス彼此ノ眼角ニ於テ一線不縫ノ孔ヲ留ムル者多シ(原由)太抵癒合ノ證ハ多ク天禀ニ出ツ○然レ氏間火傷湯泡熾盛ノ焮衝潰癰ヲ得ルノ間医遅延治セサル寸ハ最善ク此疾ヲ致スモノ也

(治法)之ヲ治スルニ必ス手法ヲ要ス○若シ瞼縁悉ク封合セス一線ノ孔隙ヲ留ムル者ハ瘻刀ノ尖端小珠ヲナス者ヲ以テ孔隙ノ中ニ刺シ別ニ左指一雙ヲ以テ眼ノ上下瞼ヲ掣キ分チテ瘻刀ヲ新ニ進

ノ容ル如此シテ其異常封合ノ處ヲ截開スベシ○  
若シ兩瞼ユトクク縫封シテ少シモ孔隙ヲ留サル  
者ハ先ツビニセツテラ用テ其瞼皮ヲ掲ケ起シ刀  
ヲ截入シテ小孔ヲ為シ是ヨリソ薄刀ヲ輸入シ手  
法ヲ行フ前ノ如シ○此症ニ手法ヲ施サントス  
ル者ハ先ツ意ヲ注シテ眼瞼内球トコトクク相瘡  
着スル者ニアラサルヤ否ヤラ検査スベシ○若シ  
病人胞ヲ隔テ、明暗ヲ弁別スルアタハサル者  
ハ手術ヲ施スト雖モ凡ソ効ヲ奏スルナシ何者  
ナレバ明暗ヲ弁スル不能ハサル者ハ其球質モ亦  
病ヲ得ルガ故ニ  
若シ胞球相瘡合スル者ハ其異常瘡着ノ部モ亦刀

ヲ用テ之ヲ截開スベシ○之ヲ行ノ間眼胞ヲ傷ル  
ヘカラス皆意ヲ用テ之ヲナスベシ○手法ヲ行ノ  
後ノ續證又種々ニソ一ナラズ○其瘡着太夕固ク  
一處モ封合セザル所ナキモノハ術ヲ施スト太夕  
難キノミナラズ之ヲ行フト雖モ又無益ニ属ス然  
ル所以ノ者ハ一旦其合処ヲ截開スト雖モ又隨テ  
瘡合シテ故ノ如クナルユエニ  
○之ヲ防クノ法病人ヲシバク其瞼皮ヲ運動セ  
シノ毛筆ヲ用テ些子ノ鉍糖ヲ時々瞼内ニ搽抹シ  
テ以テ其瘡着ヲ防クベシ生合ヲフセグノ法是ヨ  
リ善ナルハナシ  
眼胞ヒトリ黏膩ノ物ニ由テ封閉スルモノアリ其

名モト妥帖セスト虽モ之ノ類瘡合ト名ク此病別  
ニ治法ヲ要セス一ニノ液汁ヲ用テ之ヲ湔濯スル  
寸ハ粘臍乍チ軟和シ封合自ラ折開ス

六 眼胞癰腫

眼胞ノ癰腫其種モ亦一ナラス

一 麥粒腫

〔證候〕麥粒腫ハ小ニシテ韃ク頑然トシ肉中ニ在テ之  
ヲ推動スト虽モ敢テ動カズ其結腫ノ状ホトシド  
麥黏ト相似タルヲ以テ此名ヲ得ルナリ其所在多  
ク眼瞼ノ辺縁ニアリ○其證狀又三種アリ一ニ曰  
焮衝ニニ曰貫膿三ニ曰硬腫シテ而シ焮衝セス  
〔原由〕太約此病ハ獨リ局処ノ病ニ生ス然レモ或ハ

内因ヨリシ之ヲ發スル者アリ裡ニ就テ第一道ノ  
穢毒ニ原ヒテ癸スル者多シトス○婦人月事將ニ  
至ラントスルノ前一二日ニ一種ノ麥粒腫ヲ癸ス  
ル者アリ○酒客最モ此ニ罹リ易シ

〔治法〕麥粒腫焮衝スル者ハ太約赤色アリテ疼痛ス  
此ヲ治スルノ法軟化催膿ノ劑ヲ外用スルニ宜シ

然ル所以ノ者ハ此法ヲ施サバ寸ハ疎解スルナ  
易カラサルガ故ニ○其貫膿スルモノハ韃腫盡ク  
消散スルニテ之ヲ留ムルヲヨロシトス  
韃固麥粒腫ハ焮衝後遺ス所ノ證ナリ是ヲ得ルモ  
ノハ眼目上ニ於テ自ラ厭フベキノ知覺ヲ生シ之  
ヲ分消スルノ諸方法太約効ヲ奏スルヲ寡シ

唯水銀劑ノミ裡ニ就テヤ、効アリトス例スルニ  
華涅滿溶汞膏水銀膏ノ如シ○此藥ヲ与フト雖モ  
尚仍効アラサル者ハ其自熨衝スルノ寸ヲ俟待ス  
ヘシ其已ニ熨衝スルニ及ニテハ勉メテ之ヲメ化  
膿セシメ其軟腫尽ク化シテ軟柔ナルニ至ルマテ  
ハ其膿ヲ留マラシムベシ  
其内因ニ原ツクカ如キハ先ツ其内ヲ除クベシ

ニ 包膿 (チユモレスセイヌチ)

(證候) 眼胞ノ包腫モ亦他ノ此名ヲ得ル諸腫物ト相  
似タル者ニシテ其位スル所口大抵眼胞ノ外皮中ニ  
在リ然レモ亦深ク肉中ニ位スル者亦シバク之ア  
リ○大サ大約小菓菜ノ如ク又黎豆ノ如ク扁桃ノ

如ク胡菔ノ如シ○病多クハ上胞ニ生ス○モシ其  
種極メテ長大ヲナス者ハ眼胞ノ自在ノ運コレガ  
タメニ妨害セララル、ニ至ル

治法之ヲ治スルニ二道アリ所謂其初発ニ於テハ  
之ヲ消散スルヲ求ムルナリ其已ニ分消セサルモ  
ノハ皮ヲ割キヒライテ其核ヲ出スヘシ之ヲ第二  
道トス○其第一道ノ法ニ才井テハ一切溶解消散  
ノ藥ヲ用ユルニ宜シ其最効アル者ハ皓水食塩  
民埴列里精々牛膽ヲ加フル者蓬砂碯砂水銀膏ヲ  
摩入スル等ニ○腐葉ヲ用ヒテ其化膿ヲ促スモ亦  
可也○手法ハ既ニ包腫門ニ述ル所ノ法ニ似テ之  
ヲ施スベシ其法先ツ刀ヲ以テ皮囊ヲ連子テ之ヲ

截テ兩斷トナシ而ソ後其中ニ含ム所ノ物ヲ壓搾  
シテ之ヲ出シ後チロソセツテヲ用テ其囊ヲ上ニ  
掣キ舉テ而後切斷シテ之ヲ出スベシ眼胞ノ上皮  
ヲ横ニ之ヲ截ルベシ  
疣及肉様腫ノ眼胞上ニ生スル者モ亦上法ニ從テ  
之ヲ除クニ宜シ  
初生ノ小兒或ハ海綿狀ノ赤腫ヲ發スル者アリ之  
ヲ覆盆腫ト名ク之ヲ截ル寸ハ太シク出血スルガ  
故ニ之ヲ切斷スルヲ禁ス唯腐藥ヲ用テ之ヲ消ス  
ヘシ

第三十篇 淚道病

一 淚阜腫脹 (エンカンチス)

(證候) 淚阜或ハ著シク腫脹シ之ヲ望ムニ赤色ノ息  
肉内眥ノ部ニ顯レ出ルカ如クナル者ナリ其症一  
ニハ眼胞ヲ全ク合スル一能ハサラシノ一ニハ  
淚點ノ淚液ヲ喩ヌスルノ作用ヲ妨碍スルニ至ル  
○其證三種アリ所謂第一種ハ其部獨リ焮衝スル  
者ナリ第二種ハ其部ヒトリ異常ニ長大ヲナシ而  
ソ痛ナキ者ニ  
(原由) 淚阜ノ腫瘍ハ太約熾盛焮衝ノ屬症ニ然レ  
或ハ較然タル病因ナクノ之ヲ發シ來リ乍チ惡性  
ニ陥リ易キ者亦之アリ  
(治法) 淚阜焮衝スルモノ之ヲ治スル一尋常焮衝ヲ  
治スルカ如シ○之ヲ行テ尚効アラサルモノハ乱

截ヲ行フ寸ハ速ニ之ヲ除クヲ得ヘシ或ハ異質  
尖形ノ小物体淚阜ニ刺入スルモノアリ之ヲ知ル  
ト甚タ難シ○淚阜ノ貫膿セントスルモノハ決テ  
之ヲ催進スヘカラズ若之ヲ催進スル寸ハ其部乍  
チ消耗シテ不治ノ淚崩ヲ續発スルカ故也○若シ  
其既ニ淚阜上ニ膿ヲ醸スルモノハ速ニ其腫処ヲ  
破開スヘシ如此寸ハ其腫速ニ消ス淚阜異常ニ長  
大ヲナスモノハ大抵手法ヲ行フベシ○其法其異  
常ニ長大シテ無用ナルノ部ヲ鉸子ヲ用テ之ヲ剪  
斷シ其後乾愈ノ藥ヲ貼メ之ヲ愈スヘシ○此術ヲ  
行フニ由テ出血太甚シク輕々腐蝕スルノ藥ヲ用  
テ之ヲ止ムベキニ至ルモノアリ

○其長大ヲナス者ト雖モ亦極メテ甚シキニ至ラ  
サル時ハ手術ヲ以テ之ヲ截リ去ルトナクノ外ヨ  
リ収斂ノ藥ヲ用ユル寸ハ恐クハ自ラ縮小シテ其  
故ニ復スル者アリ

ニ 淚囊焮衝膿潰 (アングイロフスアプイロフス)

(證候) 這個焮衝「アングイロフス」ノ所在ハ皮上ト蜂  
窠状肉ノ淚囊上ニアルモノトニアリ○此症速ニ  
淚瘻ニ轉移シ易シ但シ其病已ニ上ニ述ル所ノ部  
位ニ滋蔓スルト雖モ其他ノ淚器ニ及フトナキ者  
ハ之ヲ治ソ寛解ヲ得ルト赤難キ非ス  
○其焮衝太盛ノ者ハ遂ニ膿ヲ生スルニ至ルアリ  
ケイロブス」ニ其部自ラ潰破スル者ハ其病深ク

淚道ニ及ハサルヲ知ベキシ

(原由)此病ノ因ハ尋常眼焮衝ノ諸因ト異ナルヲ無シ  
○然レ疔瘰癧性ノ因ヨリノ之ヲ發スルヲ最多

(治法)焮衝ノ初發ハ微ニ衝動ノ藥ニ宜シ升汞蓬

砂ノ溶化水及ヒ之ニ羅獨窠萬余ヲ加フル者ノ如

シ若潰瘍ヲ生スル者ハ医之ヲ治スルヲ無ク天棧

ニ倍シテ潰破セシムベシ如此才ハ其瘡太抵速ニ

治ス此病淚囊ニ及テ危篤ヲ生スル懼アルヲ十シ

三 淚瘻 (ヒスキユラムクリリス)

(證候)淚囊外ニ潰破シテ瘻管状ヲ做ス者ノ之ヲ

淚瘻ト名クヘシ○然ルニ古來ヨリソ凡ソ淚道ノ

諸病ノ中淚液ノ吸收力為ニ妨ケラル、者ト及

其排泄コレカ為ニ妨害セラル、ノ諸症ヲ一切

皆淚瘻門ニ屬ス是ヲ以テ淚液ノ異常ニ淚囊ニ聚

リテ腫脹スルノ證ト淚囊水腫及ビ其焮衝潰瘍ノ

如キモ赤理ニアラスト雖モ一切皆此篇ニ算入ス

○然レ疔上文ノ諸病ハ細ニ其形質ヲ論スル可ハ

其性本自ラ大ニ異ナル所十ク但其度ノ劇易輕重

ニ隨テ其名ヲ殊ニスル者ニ過サル才ハ之ヲ分テ

別門ヲ掲クル者ハ却テ人ヲノ憫然トシ其歸宿ス

ル所ヲ失フニ至ラシム是ヲ以テ余輩古人ノ成論

ニ據リテ同種ノ諸病ハ皆淚瘻門ニ収ムト云フ

凡ソ淚道ノ諸病劇易ノ度種々一ナラズ然レトモ

世醫大約之ヲ分テ四等トス  
 第一等ハ淚囊ヒトリ腫脹シ疼痛ナク焮衝ナキ者  
 ナリ○此症内皆ノ部小腫圓ビタルヲ其候トス腫  
 上ヲ推ス寸ハ必ス透明水様ノ液ヲ漏ス○此時ニ  
 方ツテ病人多淚鼻乾淚囊非常ニ脹溢スルノ症ア  
 ルノミ其他ハ一モ患フル所アルヲナシ○疾ヒ  
 此度ニ留ルヲ数日或ハ恒ニ如此ニノ遂ニ諸ニ難  
 治ノ病ヲ起サ、ルモノアリ○又此症治スト雖モ  
 時ヲ刻定シテ又再発ス○病這等ニ在ライトロツ  
 ブスサツクシラクリニソト名ク  
 第二等ハ淚囊ヤ、腫脹スルヲ甚シク之ヲ按ス前  
 ニ比スレバ較堅キヲ覺エ時々焮様ノ赤色アリテ  
 発作往來シ漏泄ノ液膿ノ如シ○此時ニ方ツテ焮  
 衝ノ將ニス、マント欲スルノ勢ヲ遏防スルヲア  
 ル寸ハ病這等ニ至ルト雖モ又自ラ久シク懸留シ  
 テ其形狀ヲ惡變スルヲ無シ○又此症淚囊焮衝ト  
 相變換シ易シ  
 第三等ハ先ツ熾盛ノ焮衝ヲ生スルノ後其部外ニ  
 潰破シテ瘻様ノ瘡口ヲナシ其口ヨリノ膿淚交々  
 流ル、者也○此時ニ方ツテハ淚液又淚点ニ循テ  
 漏レス而ノ鼻孔モ亦閉塞ノ通スルヲナシ○病此  
 症ニ至テ淚瘻ノ名儀始テ穩當スルニ足ル或ハ其  
 初發第一二等ヲ経ルヲナク淚道熾盛ノ焮衝淚囊  
 外部焮衝或ハ其潰膿ヨリノ頰ニ瘻ヲナスモノ有

○已上ノ諸證ニオ井テ癢瘡ヲ發スルモノハ或ハ直ニ淚囊上ニ於テスルモノアリ或ハ其近傍ニ於テスルモノアリ

第四等ハ淚囊潰破其部ニ海綿様肉ヲ生ス○這樣ノ證ヲ發ル者ハ淚骨コレガ為ニ帶累セラレ因テ腐骨ヲ生ス○腐骨一タビ生スル寸ハ便チ近傍諸骨ヲ侵蝕シテ遂ニ危篤ニ陥ルニ至ル但此病這等ニ薄ル者ハ靚ルヲ希ナルノ一症トス之ヲ要スルニ久ク擔閣シテ治ニ怠ルニアラサレバ此症ヲ發スルヲ無シ

(原由)此疾ノ通常ノ起因ハ鼻管ノ閉塞ニ淚液ノ出路妨碍セララル、ナリ而シテ之ヲ媒發スル者其因又

一ナラス潰瘍鼻痔鼻骨ノ破碎ノ類皆其因ニ歸スヘシ又癢管ヲナスノ因ニ屬スル者ハ酷厉ノ淚液淚囊ヲ刺戟シテ遂ニ其内面ニ輕々ノ焮衝ヲ發スル者ハ病様ノ動機淚囊ノ虛衰鼻底ノ焮衝或ハ面上焮衝ヲ發シ其勢淚道ニ及フ者器質虛衰淚囊固有ノ動機虧損スル者皮上暫久ク班疹假令ハ痘麻疹癬ハールオルム病梅毒瘰癧痛風等ニ  
(治法) 淚癢ヲ治セント欲スル者ハ其發シ來ルノ原由ハ什麼ニ起リ之ヲ治スルノ内外諸葉ハ又什麼ノ物ヲ要スルヤ否ヲ仔細ニ蹤跡シテ其果ノ這ノ因ニ原ツキ發シ這ノ藥能ク之ヲ治スルニ足ルヲ決定スルヲ實ニ醫師此病ニ臨ム大法トスベシ

○内服ハ汞劑安貞沒扭製劑亞搭尼篤ギニアキシム失鳩答芫菁等皆其因ニ應ノ之ヲ用テ大効アリ  
第一等及第二等ノ症外ヨリ施スベキノ諸件ハ下ニ述ルモノ、如シ毎日淚囊中瀦留ノ液ヲ輕々ニ按シ出ス可シ之ヲ行ノ間兼テ衝動強壯スルニ大過不及ナキ適切ノ劑ヲ用ユベシ○其第二等ノ症炊衝ヲ生スル者モ亦仍前法ノ如ク劬テ之ヲ按シテ其膿ヲ漏スベシ○其他輕ニ衝動分利消散スルノ藥タトヘバ鉛糖水蓬沙升汞化水或ハ亜鉛炭水民埜列里精ニ失鳩答魯發斯地惹答里斯ヲ加フル者阿芙蓉膏水銀膏冷水及収斂諸煎之已上ノ諸劑其半ハ亜涅介ス欲ノ小斯スト乙篤ヲ用テ之淚囊ニ注輸シ其半ヲ以テ外ヨリ之ヲ摩擦シ或ハ眼水トナシテ日ニ一兩回眼角ニ點ス  
淚囊中ニ淚液溢滿シテ害ヲ生セントスルニ至ル者ニ之ヲ緊ク遏絶セント欲スル寸ハ一種壓搾ノ器械ヲ施スフ極ノテ佳ナリトス○之ヲ施スノ間謹慎シテ之ヲ用ユルヲ通法トス○併介兒ノ搾器ハ最適切ナリトス○或ハキエルク又ハ海綿ノ小片ヲ取テ其上ニ置キ膠膚膏ヲ貼ノ之ヲ固着セシムル寸ハ又能ク按定ノ効力アリ○淚液鼻中ニ吸入シテ乃チ通ス  
以上ノ諸藥効ナク漸ク進シテ弟三等ニ至ラントスルノ懼アリテ所諸真淚癭ニ遷移セント欲スル

者ハ手法ヲ行フベシ

鼻孔閉塞ヲ通スルノ諸器及諸手法アツテ皆前輩

ノ發明ヲ經タリ然レモ太抵皆病情ト相適セス動

モスレハ大害ヲ生スルニ至ルモノ多シ

諸家手法ノ中其最ナル者ハ「ア子ル」<sup>カハニス</sup>

「テホレスト」<sup>ブリサルド</sup>「ウオールホウセ」<sup>ラモイリール</sup>「ユ

リ子」<sup>ルオスウステイン</sup>「リクトル」<sup>ベルリール</sup>「シキユルセ」<sup>ワツ</sup>

「テ」<sup>人上</sup>皆等ノ術ナリ○諸家ノ裡ニ就テ今「リクトル

ワツ」<sup>テ</sup>ニ人ノ説ヲ掲ケテ以テ足レリトス其他

ノ諸説ハ之ヲ口演ニ付スト云フ

手法之ヲ行ント欲スル者ハ先淚囊ヲ外ヨリ透截

シ之ヨリノ消息子ヲ下シ遂ニ深ク之ヲ輸入シテ

鼻孔ニ透徹セシムヘシ○之ヲ施スノ間子細ニ意

ヲ用ヒテ之ヲ行フヘシ誤テ淚囊ノ後面ヲ毀傷ス

ル「ア」アルヘカラサルナリ

医小刀「テ」<sup>ンセツト</sup>「瘻刀」或ハ内翳刀尖ヲ用テ腫大

スル所ノ淚囊上ヲ擗テ之ヲサス尔後刀尖ヲ微シ

ク上ニ輸シ消息子ヲ刺入スルニ足ル許ノ大サト為

スベシ○已ニ其口ヲ截開スルノ後直ニ淚囊中ニ

綿撒系ヲ填タシ小靱膏ヲ其上ニ帖ス○此ノ如

クニノ放頓スル「三四日ナルベシ然ル所以ノ者


ハ焮衝ヲ生スルノ懼アルヲ以テナリ已ニ其虞ナ

キラ知テ後便チ米陽各人ノ消息子或ハ莫大小鍼ヲ

用テ鼻管ヲ刺シ透スベシ

哭

○消息子鼻管ヲ過テ既ニ鼻底ニ達スル者ハ病人  
 必ス一雙滴ノ血ヲ鼻中ヨリ流出ス是其徵ナリ  
 ○已ニ鼻管ヲ開達スルノ後琴弦ヲ其中ニ刺シ淚  
 囊中ニハ綿撒絲ヲ容レ半月形ノ硬膏ヲ造リ其瘡  
 ロヲ蓋フ○此時外科ノ第一着ハ鼻管ノ新ニ通ス  
 ル者ヲノ漸ヲ以テ巨大ト做ラシムルニアリ之ヲ  
 為サント欲スルモノハ此部ヲノ潰膿セシメ漸々  
 前ニ比スレバ巨大ノ琴弦ヲ容ルヲマツヘシ  
 ○其法毎朝琴弦ヲ換エ新ニシ六日或ハ八日毎ニ  
 始ヨリモ巨大ナル者ヲ換ヘ容ルヘシ  
 前ノ如ク之ヲ行フ三週ナル寸ハ其終ニ至テ極  
 大ノ琴弦モ亦能ク通スヘキニ至ル此時ニ方テ琴  
 弦ヲ更換スル寸毎ニ葉汁ヲ注射スベシ如此  
 スル寸ハ膿様ノ物之ガタノニ蕩滌シ盡サルニ  
 ○第四週ニ至テ鼻管ノ始テ通スル部大約潤大シ  
 ナス○此時鼻管ノ瘡ヲ愈スカ爲ニ乾愈劑ヲ注射  
 シ綿撒絲ニ代テ鉛製ノ消息子ヲ挿入スベシ但毎  
 日注射法ヲ行フモノハ必ス其消息子ヲ除キ去テ  
 後ニ此ヲ行フ○第八週ニ至ルニ及テ鉛消息子モ  
 亦之ヲ除キ去リ硬膏ヲ以テ瘡口ヲ蓋フ如此スル  
 才ハ一二日ニシテ其瘡自ラ口ヲ斂ム治法於是カ始  
 ヲテ大成ス  
 竊聞各ノ説ハ少シク之ニ異ニ先ツ鼻管ヲ刺シ通  
 スルヲ前法ノ如クニ後金管ヲ造ツテ鼻管中ニ挿  
 罷



入シ淚液金管ニ循テ適宜ニ流出スルノ候七金管  
ヲサルヲ無クシ其瘡口ヲ斂ンシム半年ヲ過ルノ  
後鼻管ニ夕閉塞スルノ患ナキヲ察シ再ビ原処ヲ  
外ヨリ截開シテ故ト容ル、所ノ金管ヲ取り出ス  
亞尔涅滿欲此法ニ依テ此病ヲ療シ大効ヲ収ムト  
云フ

手法ヲ行フ後屢々之ニ續テ大害ヲ生スルヲ觀ル  
トアリ例スルニ淚道瘡合或貫膿及淚道全然腐化  
淚崩垂止寸下臉外反等諸惡候ニ○或ハオモヘラ  
ク此症ヲ發スルモノハ皆手法ノ咎ナリト遂ニ一  
切手法擯斥シテ用ユルヲナシ  
其第四等ニ至ルモノハ淚囊潰瘍ヲ生シナケル骨

大抵腐骨トナル○病此度ニ至ル者ハ淚道ト淚液  
ノ通竇トヲ上文掲クル所ノ法ニ隨テコトクク其  
故態ニ復スルヲナシ得ヘカラザル者多シ○大  
抵此證潰膿スル者ハ尋常用ユル所ノ藥劑ヲ以テ  
之ヲ遏止シ腐骨ヲ生スルノ部ハ之ヲ除キ祛ニ宣  
シ若シ又勢ノ可行者アラバ新ニ淚道ヲ造ツテ淚  
液ヲ此道ヨリ導キ本ルヲ實ニ這等ノ疾ヲ治スル  
大綱トス

此標記ニ達セント欲スル者ハ其瘻口ヲ截開シ尖  
頭ノ利刃器械ヲ用テ淚骨ヲ鑽開シ腐骨ニ罹ルノ  
部ハ之ヲ截リノゾクヘシ○其瘻口ハ綿撒絲或ハ  
膀胱皮ヲ貼シ其瘡乾ヒテ全ク愈ルニ至テ止ム

淚道ニ一タビ之ヲ開通ストイヘ凡太抵ニ夕瘡合  
シテ故ノ如ク閉塞スルヲアリテ遂ニ淚液ノ注輸  
モ亦之カ為ニ妨碍セラルト多シ○故ニ此疾ノ治  
法ノ大綱ハ腐骨ノ將ニス、マントスルノ勢ヲ遏  
ルニアルノミ其瘻瘡ノ如キハ終ニ不治ニ屬スト  
云

#### 四 淚點淚道諸病

(證候) 淚點及ビ淚道ノ諸病種々一十ヲス○此部或  
焮衝スル者アリ化膿スル者アリ潰瘍ヲ生スル者  
アツテ遂ニ瘻合スルニ至ル或ハ又痲狀ノ此部ニ  
生スルモノアリ腫脹スル者アリ病様ノ動機ヲ做  
ス者アリ○或ハ此病種ニノ此諸病ニ臨テ診決大

ニ錯誤ヲ致ス者赤屢ク之アリ然レ凡患害ヲ被ム  
ルノ鼻ノミ獨リ乾燥シ淚崩止寸ナク而シテ淚囊ノ  
部ハ却テ自ラ腫脹セサル等ノ諸証ヲ参考スル寸  
ハ自ラ彼此ノ疾ヲ診決スルヲ得ヘキナリ  
治法ノ大綱ハ手法ヲ行テ閉塞スルノ部ヲ開達ス  
ルニアリ或ハ此ヲ行フカ為ニ消息子ヲ用ル者ア  
リ或ハ亜涅兒ノ小スト乙篤ヲ用ル者アリ  
這ノスト乙篤ノ如キ或ハ盡ク大勲ヲ建ルヲ能ワ  
スト雖モ然レ凡這個極小ノ細管別ニ庸ノ術アツ  
テ以テ之ヲ開達スルヲ能ハサルガ故ニヤムヲヲ  
得ス此注射法ヲ行フノミ若淚道ノ疾中庸ノ術ヲ  
施シテ効ナキ者ハ手術ヲ行テ新ニ其道ヲ造ルノ

説アリ之ヲ行フト虽モ太抵良効ヲ収ル下無シ  
併ル人説ニ曰新ニ淚道ヲ造ルノ部位ハ淚阜ト下  
瞼ノ上面ノ處ニ于テスベシ蓋シ此部ニ新淚道ヲ  
開ク寸ハ淚液淚囊ニ注ク道キワメテ順ニソ且ツ  
ヤスキカ故也

外科必讀卷之下終



25  
1261

