牛山活套

安永八年

香月牛山著

禁帯出



牛山先生活套序

澁谷藏書記

牛山先生活套序

所謂待後世而雲者何言也人
之處世同志者鮮矣雖有載酒問
奇字者而不免玄尚白嘲也況
醫之於道補瀉劑其志不同然
劉李之製方恰似造化之妙一矣蓋
以養氣湯則如春朝見花其心和

暢以通聖散則如夕望雪其心
凜凜方有做也各自家才不為不
多矣夫尋花者擬眸於白雲之横
峯也掉雪者有動思於明月之照沙
也牛山先生物故已久矣其所著
之書隨爺哲輯而術亦奇哉桂
菴木村氏校正其寫本而欲弘于
世焉所謂待後世之予雲者也乞
予作序固辞不許故綴鄙言書其
端云安永戊戌仲冬日
知足散人書

聖云民ノ司命ニ百工ノ毛ニ宰相ノ
云仁ノ術也豈ヲ
貧実而無ク偽性靜而ラ恒ニ
言雷逆ニ我カ二ニ
苦與我無ク実諸招ヲ
賤勿レ擇ニ貧富ニ
免ニ徭ニ書手ニ

識法不議人恭慢不論如葉不務聲名不貪財利不衒術策不逞豪雄不折肱匂折腰惟心叙人為勤如病機稍乖疑滞不見葉功則須戦兢加診察如僧道貧士求望誰之謝賤一毫匂受如寡婦寄宝女匂敬謹匂蕩彼何沈賜官

奏明免矣人不能非而天必鄙之所謂陰徳報耳鳴已知而人不知服之匂歟

元禄己卯臘月朝日

被褐斐等山書

貞庵設盖

牛山先生活套卷之上目錄

感冒一　傷寒四四　時疫温病　九ウ　大頭瘟
中寒十一ウ　中暑中暍汪夏瘟　十二　百合病　蝦蟆瘟
飲食十八　内傷二十　中風十六
咳嗽十三ウ　喘急十五ウ　贅症二十二ウ　痰飲十二ウ
脇痛十九　肩臂痛二十　心痛十八
頭痛項痛二二　痛風三四　腰痛腿痛二十一ウ
痢疾四十ウ　泄瀉四四　背痛二十一　瘧疾三七
膈噎翻胃四八　呃逆五十　脚氣三六　嘔吐四七
健忘五四　怔忡驚悸五五　霍亂四六　虚勞骨蒸五二
補益五十一

牛山先生活套巻之上

被髪翁　貞菴　香月啓益　著

感冒

●四時ノ感冒軽キ症ハ男女老幼ヲ不言先ツ香蘇散ヲ用ユベシ加減委ク方考ニ載ス参考スベシ

凡此書ハ藥方ノ名ヲ記ノ藥味ヲ載スル支ナシ方考ニ藥味及加減等一デモ遂一書載タリ先此書ニテ此病ハ此藥ヲ用ユト云支ノ大綮ヲ知リ究メテ方考ニ見合セテ藥方ヲ撰ラベテ用ユベシ方考ニ出ザル方モ間々アリ其方ハ其後ニ何ノ書ニ出タルトユヘヲコトハリヲクも其書ニヨリテ可ト考

●風寒ニ感冒シ悪寒シ發熱シ頭痛シ鼻塞リ咽痛者ニ男女老幼共ニ人參敗毒散ヲ用ヒ汗出テ解スル也其脉多ク浮數ナルモノ也

●感冒ノ症汗出ル支ナク熱甚ク頭痛破ルカ如ク脉浮緊ニシテ傷寒ノ初發ノ症ノ如クナレハ十神湯ヲ用ベシ

●感冒ノ症熱甚ク悪寒シ咳嗽甚ク咽痛声音重濁或声カレテ不出ノ類ニハ參蘇飲ヲ用ベシ或ハ鼻塞テ咳嗽シ或ハ鼻ニ清涕ヲ流スニモ參蘇飲ニ宜シ其脉多ハ浮濇ナリ

●感冒ノ症寒ミ熱共ニ甚シク頭項苦痛シ腰脊強痛スル者ニ敗毒十神ノ類ヲ用テモ解セサルハ九味羌活湯ヲ用ユベシ其脉ハ緊數ナル者ナリ

●春時ノ感冒ニハ芎芷香蘇散或ハ敗毒散ニ宜シ

●夏時ノ感冒ハ多ハ濕熱ノ類或ハ甜瓜西瓜ノ類ヲ過食シテ内ヲ冷シ外ハ涼臺水館ニ涼ヲ納ル故ニ内外ヨリ感スル者多キ也霍香正氣散ヲ用ユベシ或ハ寒熱甚シク其症瘧ニ似ル二人參養胃湯ヲ用ユ或ハ散邪湯モ宜シ（一回春瘧門ニ出ツ）其脉多ハ浮數ニノ滑ナル勢アル者也

●秋時ノ感冒ハ多ハ收斂清粛ノ殺氣ニ中テ咳嗽スル也參蘇飲ニ宜シ

●冬時ノ感冒ハ多ハ傷寒ニ屬ス十神湯九味羌活湯ヲ用ヘシ冬ハ寒氣血脉ヲ凝澁スル者ナレハ血ヲ活メ發ルニ宜シ五積散ヲ用テ効ヲ取也其脉多ハ浮緊數

●感冒濕ニ屬スル者ハ寒熱往来シ身重ク頭痛腰脚酸痛シ咳嗽メ痰ヲ吐クニ不換金正氣散ニ宜シ又ハ行氣香蘇散ニ蒼朮ヲ加ルモ可也

●四時ノ感冒寒熱往来シ鼻ニ清涕ヲ流シ咽痛咳嗽頭痛シ或ハ咽渇シ悪心嘔吐或ハ泄瀉ナドヲ兼タルハ多ハ外感ニ内傷ヲ夾ム者也藿香正氣散ニ宜シ或ハ行氣香蘇散ヲ用ルモ又可也其脉多ハ浮數ニメ滑ヲ帯也

●老人ノ感冒ハ血ヲ助ケテ發スベシ五積散ニ宜シ

●小児ノ感冒ニハ猩々散ヲ用ベシ或ハ寒熱咳嗽スル者藿香正氣散不換金正氣散ヲ用ベシ虚熱ヲ摠メ小児ノ病ハ十ニメハ九ハ食滞ト痰トヨリ發スト知ルベシ

●虚弱ノ人ノ感冒ニ發散ノ劑ヲ用ル四五貼ニメ解ス汗出テ倦憊ノ體見ユルトキバハ解散ヲ用ベシ虚甚キ者ハ補中益氣湯ニ唐防風羌活茯苓半夏ヲ加テ用ユ或ハ六君子湯ニ桔梗山梔子升麻芷胡ヲ加モ宜シ

感冒約治

●四時ノ感冒推ナメテ香蘇散参蘇飲敗毒散ヲ用ヘシ此等ノ藥ヲ用ル事五六貼ニテモ癒解シ難キ時ハ輕キ感冒トハ云難シ傷寒瘟疫ノ病ニ屬メ治ヲ施スベシ夏月ノ感冒ニ發散ノ劑ヲ用テ解シ難ハ黄連香薷飲ヲ用ベシ其効速也世間往々大家或ハ富家多人ヲ仕フ者藿香正氣散ヲ多ク修合シテ男女老少ヲ不問四時ノ感冒ニ飲シムル支近来ノ風習ナリ此

藥ハ發散ノ劑アリタ有レバ輕者ハ二三貼ニメ愈也庸醫習テ察セズ此藥ハ外感内傷ノ治ヲカ子テ医ヲ知ラヌ俗人ノ藥ト賞美レ已レモ亦好テ此方ヲ用ル者多レ然ル此藥陽明經ヨリ塾ヲ發スル劑ニメ大陽ノ表症ニハ其効ナキノミナラズ腸胃ヲ乾メ其害駭レ医タラン者ハ其脉ヲ察レ症ヲ明メ其經絡ノ客邪ヲ去ルベレ大陽ノ表症ニ發表ノ劑ヲ用テ其邪塾解タルニ津リニ發散ノ劑ヲ用ユレバ表氣虛メ却テ塾出咳嗽再ビ起ル者也此時ニ庸医ハ發散ノ科ト云フコトヲシラズシテ再ビ風ヲ引添タリトテ弥發散ノ劑ヲ用テ其虛ヲ虛ス如是スレバ病者肺肺ノ氣虛レ虛塾骨蒸メ勞咳ノ症トナル藿香正氣散ヲ用ヒ過レテモ又内乾ヒテ虛塾起リテ勞咳トナル共ニ皆其脉細數ナル者也如此ノ症ニ輕キ時ハ六君子湯補中益氣湯ニ加減レテ用ヘシ（方考其条如減運ニ載宜参考）重キ者ハ黄芪鱉甲湯ヲ用ベレ其効如神惣メ發散ノ劑ヲ用タル後ハ六君子湯ヲ用ベレ

傷寒

●冬月正傷寒ノ証汗ナキ者ニ麻黄湯汗アル者ニ桂枝湯ヲ用ト云ハ仲景ノ確論ニメ不及議大陽ノ表証ヲ分別ノ用ベレ近來龔廷賢ノ製スル所ノ麻黄湯桂枝湯（冒春傷寒門出）アリ此方仲景ノ方ニ加減レタル者ナリ是モ亦功能アリテ効ヲ取ルタレ大陽症ヲ分別レテ用ベキ也

●近時ノ俗ノ傷寒ト云ハ多ハ瘟疫ノ病時行ノ塾病ヲ指テ傷寒ト云ナリ此症初發ノ時ハ多ハ感冒ノ治療ニ同ジ塾甚ダ悪

寒シ頭痛裂(サク)カ如ク腰脊強痛スル者ニハ九味羌活湯ヲ用ヘシ蒜
胡蒼朮ヲ加テ其効如神十神湯ヲ用モ可ナリ

●傷寒四五日發表ノ劑ヲ用テ汗出塾未解表上ニハ大塾解スル
ニ似(ニ)テ内塾甚シク目痛鼻痛鼻乾キ煩渇メ眠(ネム)ルヿヲ得ザルハ陽明
經ノ症也升麻葛根湯ノ加減或ハ蒜葛解肌湯又ハ白虎湯ヲ用
ユベシ

●傷寒五七日發(ハツ)表ノ劑ヲ用又ハ陽明ノ藥ヲ用テ後耳鳴(ナリ)耳
聾胸脇痛ミ寒塾ヲ發スル者ハ邪半表半裏ニ在也是ヲ少陽
經ノ症ト云也小蒜胡湯ヲ用ベシ此方ハ仲景ノ妙劑ニメ傷寒温疫
諸ノ塾病ノ類皆此方ニ加減メ治ル也委曲ノ加減ハ方考ニ載ス
參考スベシ

●傷寒七八日發表和解ノ劑ヲ用テ後譫言妄語撮空(サツクウ)ノ症出テ
衣ヲ撒(ヒラ)キ床(トコ)ヲ捜(サグ)リ飲食不入火ニ垂(ナントス)レタル者ニ陶氏升陽散火湯
ヲ用ベシ囲生起(クハイセイキ)ス火ノ妙劑也惣(ソウ)メ傷寒塾病ノ類危症壊(エ)症ヲ治
スル聖劑也此方ヲ用ニ口傳多シ

●傷寒七八日ノ後微塾往来シ虚煩シ飲食不進(スヽマ)夜眠ルヿアタワズ或ハ譫言スル者ハ温膽湯ノ加減或ハ竹茹温膽湯ヲ用ベシ

●傷寒七八日ノ後ニテモ大塾未解胸中煩悶シ譫言妄語スル者ニハ黄連解毒湯或ハ涼膈散ノ加減ヲ用ベシ

●傷寒發表和解メ後塾甚ノ煩心シ氣逆シ或ハ譫言妄語スル者ニ竹葉石羔湯ヲ用ベシ此方ヲ用ル時節アリ口傳多シ

●傷寒十餘日ノ後ニテ大便不通其燥糞ル故ニ塾甚シク譫

言妄語スル者ニハ大芫胡湯調胃兼氣湯大小兼氣湯ノ類ヲ見合テ燥糞ヲ下スナリ然レドモ下ス症ハヨク分別メ脉ト腹トノ體ヲヨク見合テ可ト下也

●傷寒發斑ノ症ニハ小柴胡湯ト升麻葛根湯トヲ合メ連翹或ハ玄參ヲ加テ用ベシ發斑ノ症ハ悪ク治スレバ大変ニ變スルト心得ベシ黒斑ハ治シ難ト知ルベシ又ハ消斑青黛飲（同春傷寒門出）ヲ用ユルモ可也

●傷寒蚘虫トテ白虫ヲ吐スル者アリ胃中ノ寒也理中湯ニ加減メ用ベシ又ハ理中安蛔湯（同春傷寒門出）ヲ用モ可也

●傷寒愈テ後勞動シ或ハ人ニ對メタダ言シ或ハ新ニ瘥テ房事ヲナシテ發熱スル者アリ勞復トタヅク益氣艱神湯ヲ用ベシ或ハ六君子湯ニ當皈山梔子ヲ加用ベシ

●傷寒新ニ瘥テ房事ヲナセバ熱甚ク元ノ如クニ繙又ズル者也能ク能見極テ其変ヲ尋子問テ益氣艱神湯ニ山梔子萇艻ヲ加テ芫胡ヲ倍スベシ

●傷寒瘥テ後必飲食ヲ欲シ飢ヤスキニヨリ病者不覺過食シ傍人ハ食ニアラザレハ羸瘦何ニヨリテカ培艱セントテ強テ食セシム是ニヨッテ大熱ヲ發シ或ハ譫言メ狂人ノ如シ是ヲ食復ノ病ト名ク鹿入エハ驚怖メ療治ヲ辞シ或ハ傍人ハ頃日人參ヲ用タルニ因テ氣上リテノ故カト疑ヒ醫ヲ換ント議ス必驚怖スベカラズ山梔子豆豉湯ヲ用ベシ其効如神傍人ニハ隨分食物ニ氣ヲ付テヒカヘサスレハ愈ル也口傳多シ

●體虛ノ人或ハ勤勞ノ人或ハ老人或ハ夏月ニ勞役メ汗出ルニ過多ニメ寒ニ熱往來シ或ハ初冬ノ寒ニ感メ頭痛發熱スル者ハ俗ニ類傷寒ト云也加味益氣湯ヲ用ベシ

傷寒約治

●凡傷寒ノ病初發二三日ノ間ハ感冒ノ療治ノ如ク發散メ汗ヲ取ベシ麻黄湯桂枝湯敗毒散十神湯九味羌活湯ノ類ヲバ大料トナシテ（貼ノ分量ニ口傳多シ）其症ト脉ヲ考テ其方ヲ撰用スベシ四五日ニ至テ表上ノ熱解スルニ似テ裏熱甚ク譫言妄語目痛三皐乾キ不得眠或ハ煩心煩悶發班等ノ証ヲアラワスハ小茈胡湯白虎湯升麻葛根湯茈葛解肌湯竹葉石羔湯ノ類ヲ以テ其症ト其脉トヲ考合セテ用ユベシ加減委ク方考ニ出考ベシ

十餘日ニ至テ後大便燥結シ燥糞アルニ因テ譫言スル症ハ燥糞ヲ下スベシ大小柔氣調胃柔氣湯大茈胡湯ヲ用ベシ甚シキ者ハ蜜導ヲ用ベシ輕キ時ハ胡麻ノ油或ハ蜂蜜ノ類ヲ肛門ニヌルベシ下ス症ハ容易ニ計リガタシ好脉ト症トヲ見合セ下スベキヿ十分ソナハリタル時ニ下薬ヲ用ベシ（口傳多シ）七八日ノ以後危症ヲアラワシ譫言妄語耳聾シ人支ヲ不知撮空シ床ヲ捜リ衣ヲ撒キ大小便自利スル者ハ悪症也十ニメ七八ハ必ス此症ヲ救ントナラバ獨參湯（分量口傳ヲ大料ニメ陳皮三分ガ一生姜七分ガ一ヲ加テ煎ジ時々是ヲ用ヒ本薬ニハ陶氏升陽散火湯ヲ大料トナメ用ベシ其効如神獨參湯ノ分量散火湯ノ人參黄芪ノ分量ニ口傳アリ此方ハ傷寒危証ヲスクウノ聖劑ニシテ

百發百中其妙不可言也又傷寒汗吐下ノ後壞症ニナリタル者又ハ手足厥冷シ或ハ舌黒ク焦レタルモ此方ヲ用テ取効アリ多シ手足厥冷ニハ理中湯附子理中湯参附湯ヲ用ヒテ元氣ヲ無可有ノ地ヨリ生ズルヿ多シ臨機應變ノ術ハ醫ノ必ズトスル處也平生ニ其心鏡ヲ琢磨メ虚靈物ヲウツスノ器ニ非スンハ傳ヘ難ク傳テ得難ハ傷寒ノ治法ナリ

● 傷寒温熱ノ類ノ火熱ノ病必耳聾ヲナス也藥ヲ用テ耳聾ヲ以テモ開通スレバ藥効ノ機發ト知ルベシ

● 傷寒諸ノ熱病ノ類舌裂舌黒ク口中黒ク大小便自利メ人ヲ見ヲ不知者ハ危篤ノ症ト知ベシ

● 傷寒ノ症危篤ニ至テ石羔ヲ用ルト人参ヲ用ルトノ時節ヲ知リ得ずハ十全ノ効ヲ取ヿ支也是口授傳心ノ神秘也近時ノ庸医多ハ補ニ偏也傷寒ノ危症ヲ見テハ虚實ノ辨モナク大料ノ獨参湯ヲ用ヒ己ガ本藥ノ中ニモ人参ヲ加ル一ト二ト三ニ至テ修合ノ劑ハワツカニ一ト匁ノ内外ノ分量ナル小劑ニ多分ノ人参ヲ入用ルニヨツテ方ノ君臣佐使ノ差別モナク只病人ヲレテ済ニ人参ヲ服セレム故ニ邪氣ヲ補住メ熱洩ルヿアタハズ多ハ灸ニ至ル其中百ニメ一人モ脾胃ツヨク元氣壮ナル者自然ト熱盡テ愈ル類アレバ其レヲ証據ニメ己ガ術ヲ衒ヒ能ヲ矜ル又如是人参ヒタレニメモ灸スル者ハカホドニ大ナル補ヒ湯ヲ用テモ其補及バザレハ術ナレテ己ガ術ノ拙キヲ人参ニテ飾ル病家ハ素ヨリ愚昧ナル者多ケレバ其理ヲサトラズ人参ノ價貴キ物ナレハ其程ノ効ナクテハ叶フ

一ニシト思ヒ世俗ノ風習トナリテ人参ヲ用ル医師ヲ上手ト号メ治ヲ委ル也適此道理ヲ覺リタル病家アレ𪜈医師ノ説ニ此病ハ治スベケレ𪜈病家吝カニメ人参ヲ買サルニヨリ見ス〳〵病者ヲ殺スナドヽ云此時父母ノ病ニアタリテハ否ヽ云ヒ難ク貧家ハ婦ヲ賣リ子ヲ販キテ父母ノ命ヲ救ハントス況ヤ富家ノ財ヲ費スヿアゲテ數ヘ難シ如是金銀ヲ費スノミカ病苦ヲ増シ百年ノ夭數ヲ夭折ス嗚呼可嘆ヽ云ヽ近来如是補薬ヲ用ルヿハ治世ノ人生質虚怯ナルヲ以テノ故也大明三百年ノ治世ニメ人必ス幼ヨリ氣ヲ遣テ形ヲ安逸ニスル故ニ世間ノ人生質虚弱ナル上ニ猶元氣虚怯ス薛已出テ天下大補ヲ用テ其効多シ　日本モ百有餘年ノ治世ナレバ大補行テ其利多シ是ヲ以世醫補ニ偏也然𪜈其

用時節ヲ知ズ謾ニ人参ヲ用ルニヨリテ其害夥シ又カク云バ人参ヲ嫌フ蛇蝎ノ如スル醫アリ是亦瀉ニ偏ニメ其害猶夥シ醫タラン者ハ補瀉ノ間ヲ工夫ヲ詳テメ治療スベシ可怖可愼

●婦人ノ傷寒ノ治方男子ト同シ然𪜈婦人月經アル時ニ風寒ニ感ズレバ熱入血室ノ症トテ大熱ヲ發シ譫言妄語シ危急ノ症ヲアラワス也小茈胡湯ニ四物湯ヲ合シ桃仁紅花藕木ヲ加テ用レバ其熱解スルナリ

●婦人姙娠ノ時ノ傷寒温疫ノ症ハ大熱ニヨツテ必ズ胎墜ルヿ多シ胎禁ノ薬ヲ用ルヿニ心ヲ付ベシ五ケ月ヨリ前ハ胎禁ノ薬ヲ怖ルベシ敗毒散九味羌活湯ヲ用テ發散スベシ其後ハ小茈胡湯ノ類ニ加減メ用ベシ裏熱アリテ譫ニ下スベカラズ大熱

アリトテ謾ニ石羔ノ類ヲ用ヘカラズ六ヶ月ノ後ハ大堅其胎堅固セルハ胎禁ノ剤トテモ害ナキ者ナリ其上内經ニモ有故無損亦無殆トアレバ大熱ノ邪氣ニ其藥應スルニ因テ胎ニハ妨ナレト知ベシ姙婦トテ餘リニ大支ガリ過シテ手ユルキ療治ヲスレバ其熱ツノリテ胎ヲ焼キ落ス類多シヒトリ傷寒瘟疫ノミニアラズ或ハ瘧熱劇熱ノ類ノ症モ心ヲ付テ療治スベキ支也

●小児ノ傷寒ノ療治大人ニ同ジ去ナガラ其藥ノ分量多少ソノ小児ノ年數ノ大小ニ從テ加減アルヿも是モ多ハ發散ノ後ハ小蒜胡湯ヲ本藥トメ加減メ用ベシ分量ノ多少口傳アリ

時疫　瘟疫　大頭瘟　蝦蟆瘟　百合病

●時疫瘟疫ノ病ハ疫癘ノ類ニメ一般ニ流行スル熱病ナリ多ハ温熱ノ邪ニ中リ或ハ山嵐ノ瘴氣ニ感スル也治療ノ法ハ多ハ傷寒初發ノ如ク發散スルニ宜シク風ヨリ濕ニ勝ノ理ナレバ風藥ヲ用レハ濕熱退也但シ濕熱ノ症ハ言語濁リテ靴中ヨリ云ガ如クアリテ熱氣表ニ浮バスメ根ツヨリ底ニ沈ム者ナリ其脉多ハ浮數ノ中ニ輭滑ノ氣味ヲ兼テ強緊ノ勢ナレ發散ノ剤ヲ用ルヿ四五日ニ至テモ熱退キカヌル時ハ胃苓湯ニ蒜胡黄芩ヲ加テ用ベシ其効神ノ如シ加減逐一ニ方考ニ載ス參考スベシ如是メモ熱解セサル者ハ傷寒ノ治法ニ同ク小蒜胡湯或ハ升陽散火湯ノ類ニ加減ノ用ベシ加減委ク方考ニ載ス參考スベシ是亦石羔ト人參ヲ用ル時節アリ口授心傳ノ支也

●大頭瘟ノ症ハ頭腫テ如斗或ハ耳ノ根腫痛レ頭ニ衄ナドヲ

被タルが如ク上カブキニ成テ大熱ヲ發スル也其脉多ハ浮大ニメ數ナリ荊防敗毒散ニ黄芩黄連牛房子ヲ加テ用テ發シ或ハ牛房芩連湯ヲ用共ニ神効アリ

●蝦蟆瘟ノ症ハ両ノ腮ヨリ耳ノ根ニカケテ頬ニデ腫テ蝦蟆ノ狀ノ如ナリテ大熱發ス今時ノ和俗コレヲ江戸挟箱トイフ治法多ハ大頭瘟ニ同シ荊防敗毒散ニ牛房子黄連黄芩ヲ加テ用又ハ牛房芩連湯モ宜シ或ハ老人或ハ血虚ノ人或ハ冬月嚴寒ノ時血澁テ熱發シ難キ類ハ五積散ニ牛房子芩連ヲ加テ用ベシ神効アリ此症右ノ藥方ノ類ヲ十貼計用レバ多ハ愈也但シソレニテモ治シカヌル時ハ茈胡清肝湯清肝益栄湯ヲ用ヒ或ハ加味逍遙散ニ連翹黄芩酒黄連ヲ加テ用ベシ有神効

●大頭瘟蝦蟆瘟ノ症ニ普濟消毒飲ヲ用ヒ防風通聖散ヲ用テ神効アリ

●傷寒百合病トイフ症アリ多ハ傷寒瘟疫ノ後虚勞メ臟腑不平變メ此病トナル其証寒ニ非ス熱ニ非ス飲食セント欲メ食セズ行ント欲メ不行坐セント欲メ不坐薬ヲ服スレバ即吐シ小便赤ク鬼ヲ見ルが如クナルヲ百合病トイフ茈胡百合湯ヲ用ベシ其効如神

●慄メ傷寒瘟疫ノ類諸ノ熱病ヲ治スルノ方ハ多ハ皆小茈胡湯ヨリ變化シ来ノ方ナリ諸ノ熱病ヲ治スル加減委ク方考ニ載タリ可ニ參考一

●諸ノ熱病ノ類ニ發散和解温補滋陰降火ノ劑ヲ用テモ熱退クナク肌膚ノ間ニ熱アリテ烘が如ニメ不止コト一両月或半年ハ

カリモ如キ是モノ有東垣ノ升陽散火湯ヲ用レハ三五貼ニメ其熱解スル也此大秘藏ノ一ニメ奇々妙々東垣ノ流ニ淖泗スル人ニ非スンハ此理ヲサトシ難シ可レ秘

中寒

●中寒ノ證ハ寒ノ氣直ニ榮分ニ入ノ病也口禁メ音ヲ失シ腹痛吐瀉シ四肢強直シタハ四肢厥冷シ其脉多ハ緊滿ナル者ナリ此症体虛労疫勤動ノ人暴卒ニ嚴寒ノ氣ニ中ル也傷寒溫疫ナド、ハ遠テ殊ノ外ナル急証ナレバ油斷スレハ其儘二三日ノ中ニ灰スルモノ也早ク驚キ理中湯ヲ大料ニメ用ベシ必附子肉桂ヲ加ベシ

●中寒ノ症寒ノ熱往来シ身痛腹痛腰脊強痛項背拘攣シ腹痛スルニ者ニハ五積散ヲ用ベシ寒ハ榮分ニツク者ナレバ血分ノ藥ヲ用テ榮分ヲメグラメ温散スレバ寒ノ邪自解スル也頭痛如裂ニハ細辛ヲ加ベシ

●中寒ノ症五積散理中湯ノ類ヲ用ニ汗出寒熱ヤミテ後ニ體憊シ脉微細ナル時ハ六君子湯ニ當皈炮姜ヲ加ヘ或ハ肉桂少許ヲ加テ調理スベシ虛甚キ者ニハ補中益氣湯ニ炮姜肉桂ヲ加テ用ベシ或ハ異功散當皈炮姜ヲ加ルモ佳也

中暑　中暍　注夏病

●暑邪ノ症ニツ有動テ得之ヲ謂中熱或ハ中暍ト名ク靜ニメ得之ヲ謂中暑也皆熟火ノ病也暑ハ氣ヲ傷ル故ニ其脉多ハ虛ス弦乾浮數ヲアラハメ其脉狀無餘モノ也輕キ者ハ香需散ニ香

需ヲ倍加メ用ベシ

●夏ノ時ハ内ハ甜瓜西瓜冷濕ノ麪類過食シ外ハ深堂冷臺水舘ニ凉ヲ納レ富貴ノ家ハ他人ノ揮扇ニヨリ或ハ竹婦人ニ身ヲ冷ニ因テ内外ヨリ冷テ却テ煩也藿香正氣散ヲ與ヘレ多ハ泄瀉ヲカヌルモノ也

●暑邪熱甚キ者ニハ黄連香薷散ヲ用ベシ

●暑熱ノ邪伏メ身體困倦シ神昏ク頭重ク吐利ノ症ヲ兼ルニハ十味香薷飲ヲ用奇効アリ

●暑邪ニ中リ或ハ長夏ノ濕熱ニ感ジ寒ク熱往来シ或ハ譫言汗出テ煩シ精神減少氣高ノ喘シ小便黄ニメ數ク或ハ大便溏泄飲食ヲ不思者ニハ清暑益氣湯ヲ用ベシ此症ニ藿香正氣散ヲ用ルト清暑益氣湯ヲ用ルトノ分別アリ藿香正氣散ハ發メ熱ヲ解スル也清暑益氣湯ハ收テ熱ヲ解スル天壞ノ違ヒ也口授心傳ノ祕也

●暑ニ中リ寒熱シ咽喝シ泄瀉スル者ニ益元散ヲ用ベシ或ハ夏月小便黄ニメ少ク或ハ夏中長途ヲ步行シ或ハ籃輿ニ乘テ旋行スレバ淋病ヲ發スルヿ多シ益元散ヲ用レバ其効如神

●夏月行路ノ旅人炎暑ニ中リ身熱シ口開キ前板歯燥キ舌燥テ胎ヲ生ジ大ニ煩渇シ甚キ者ハ人支ヲ不知ニハ人參白虎湯（四春中暑ニ出ル方モ可ナリ）香薷飲黄連ヲ加テ用ベシ方考白虎湯ノ条下可參考

●老人虚人暑邪ニ中リタルニハ張三錫が近製清暑益氣湯ヲ

用ベシ錢氏白朮散モ可也或ハ生脉散ヲ用ル症モ多シ左考生脉散ノ条下可參考

●暑熱ノ時節霜雨ナド降テ俄ニ冷氣行ルレバ諸人是ニ感ノ一般ニ咳嗽寒熱鼻ニ清涕ヲ流スヲ患也和俗コレヲ寢冷ト云或ハ夜深ニテ軒外庭上ニ納涼シ冷酒ヲ飲テ坐卧シ不覺睡眠シ夜服ヲ覆フヿナケレバ夜氣ニウタレテ是亦前証ノ如シ共ニ寢冷トユル多ハ藿香正氣散ヲ用ヒ愈ル也又ハ八解散ニ葛根炮姜ヲ加テ用モ宜シ又ハ六君子湯ニ羌活蒼朮葛根炮姜ヲ加テ用ユ其効如神

●注夏病トユルハ春ノ末夏ノ初ヨリ頭痛シ身ニ微熱アリテ手足ノ心熱アリ形体倦憊シ小便黄ニ好テ晝寢ヲシテ脚軟弱ニメ行歩ニワカレ面色萎黄ニメ形体羸瘦シ飲食不進也和俗之ヲ夏ビケ又ハ夏ヤセノ病トユル六君子湯炮姜砂仁當歸ヲ加テ用ベシ或ハ異功散ニ升麻葛胡當歸ヲ加ヘ或ハ咽渇スルニハ錢氏白朮散ニ陳皮當歸ヲ加ヘ或ハ生脉散ニ當歸陳皮ヲ加テ用ベシ多ハ虚弱ノ人冬ヽ月ニ房事ヲ不愼ニ因テ春夏ニ此証アリ參歸益元湯（四春中ヲ用テ佳也加減四春ノ門ニ詳也可考

中濕

●中濕ノ症ニハ有内ノ中濕外ノ中濕也外ノ中濕トハ多ハ山嵐ノ瘴氣トテ山谷ノ間ヨリ煙ノ如ク ニ蒸シ立ル氣ニアタリタル症ヲ云或ハ雨濕ノ時ニ旅行シ雨濕蓑衣ヲトヲシ連路ニ水ヲ涉リ或ハ久ク濕地ニ坐シ或ハ濕鞋ヲハキテ遠ク行キ或ハ

汗出テ衣ノ裏ニ通リタルヲヌキカユレバ其汗冷テ濕ト ナリテ此濕ニ感ス或ハ新ニ家ヲ造作メ其壁未乾ニ移リテ其濕ニ感スルノルイ也其症頭重ク目眩キ身体疼痛手足酸輭痲木シ腰膝腫痛シ体重メ如山頭重メ觔ヲ被ルガ如ク寒熱往来シ其脈多ハ濡緩也内ノ中濕トハ生冷水菓濕麪厚味ヲ過食シ醇酒過多ナレバ濕内ヲ傷リ其症或ハ外濕ノ候ノ如シ其濕脾ニ着テ三焦ノ氣不運小腸ノ疝氣出テ偏墜メ睾丸腫痛シテ手足面色浮腫シ目中黄ニ小便赤黄或ハ泄瀉スル其脉多ハ濡緩ニ濇小ヲ兼或ハ滑ヲ帯也

● 外濕ノ者ニハ胃苓湯五苓散ヲ用テ小便ヲ通ズレハ外濕洩ル也或ハ行氣香蘇散ニ蒼朮ヲ加ヘ或ハ敗毒散ノ類ノ風藥ヲ用テ濕ニ勝モ古

● 内濕ノ症ニハ藿香正氣散不換金正氣散ニ加減シ或ハ平胃散ニ加減メ用ベシ

● 濕症内外共ニ滲濕湯（四春中濕門出）加減ノ用ベシ

● 内濕ノ症眼黄ミ腹痛スル者ハ多ハ脹満ニ變スル者也平胃散不換金正氣散ヲ加減メ可用

● 新ニ造ノ家壁未乾ニ移リ其濕ニ中ラレタルハ多ハ浮腫身体ニ廻リ寒熱ヲ發シ眼黄ム類ノ證ヲアラワス也平胃散苓湯等ニ少ク風藥ヲ加テ用ベシ或ハ藿香正氣散ニ蒼朮茵蔯ヲ加テ用モ可也

● 外濕内濕共ニ小腸ニ着テ疝氣ト混メ睾丸腫痛シ或ハ

偏墜シ寒熱ヲ發スルニハ行氣香蘇散ヲ用ベシ加減委痂氣門ニ出スヌハ烏苓通氣散モ可也

● 旅途ノ中或ハ舟中ニテ霜雨ニヲカサルレバ其濕ニアタルヿ多シ不換金正氣散ニ加減メ用ベシ

● 旅ニ住居シ其在所ノ水ニ中ラル、者多シ是ヲ水土ニ服セズトニ多ハ濕ヲ洩メ宜シ不換金ニ加減メ宜

● 今時仕官ノ人或商人モ東武ニ至リテ欝氣シ足膝痿輭ニメ面目虛浮シ飲食不進者ヲ俗ニ江戸煩ト云是皆水土ニ服セザルノ類也故郷ニ皈ルトテ箱根山ヲ越レハ多ハ其病不治メ自ラ平服ス牛山嚮ニ官ニアル時江戸ニテ西國ノ諸候ノ屋敷ヲ見聞スルニ何ノ所ニモ此病アラズトヿナシ多ハ不換金正氣散ヲ用テ宜虛欝ヲ快ム者ハ必ズ妨ス濕ヲ治メ不愈者ハ必速ニ故郷ニ皈ラシムベシ箱根ヲ越レハ自ラ愈ル也一奇支ノ病也國牧ノ傳医タラン者知ラスンバアルベカラズ

● 風濕ニ中テ脚腫痛スル者多シ委ク痛風門ニ載ス可參考

中風

● 中風ノ症真中類中ノ二ツアリ近時ノ中風ハ氣体虛弱ノ人或ハ酒食過度シ或ハ七情ノ大過ニ因テ眞氣耗散メ邪虛ニ乘ズル也卒ニ倒仆メロ眼喎斜シ口噤テ不語痰沫ヲ吐シ或ハ食物ヲ吐出シ人事ヲ不知者ニハ先蘇合香圓延齡丹ノ類ヲ牙歯ニスリヌリ生姜汁ニテ咽ニ入ヨ必ス蘇ルナリ

● 卒中風ノ症ハ先右ノ如ク煉藥ヲ牙ニスリヌリ通關散四香中風門

ヲ鼻中ニ吹入ヨ噦ル者ハ可シ治ス噦ル支ナキ者ハ不可シ治ヲノ次ニ
三生飲ヲ用ベシ如是メモ元氣不ル藥其ヒ鼾睡ノ如ニメ人支ヲ
不知者ハ多ハ夢中ナガラ灰ス如是ノ症ニ烏犀圓和劑ヲ用或
ハ人參三生飲或ハ獨參湯參附湯ノ類ヲ用ヒ破粥摩爛湯ナド
ヲヒ蛤殼ニテ入ヲケバ或ハ四五日六七日ヲ歷テ夢ノ覺タルガ如ニ
メ元氣藥生スル者アリ此時ニ至テ或ハ左半身カ右半身カ不
遂ルヲ覺ル也多ハ男ハ左女ハ右ナルベシ去ナガラ夫モ人ニヨル事
ナリ此時ヨク脉ヲ診メ氣虛血虛ヲ弁シ或ハ痰ヲ兼ルヤ否ヤト
云ヲ辨メ治スベシ

● 中風元氣藥リテ後ハ多ハ氣ヲ順ベシ烏藥順氣散ハ味
順氣散張三錫カ增減順氣ノ類ヲ見合テ用ヘシ加減妻ク

方考ニ載ス可ニ參考一

● 卒中急証痰喘甚キ者ニハ續命湯或ハ導痰湯ノ類ヲ用ヨ
痰喘收リテ後順氣ノ劑ヲ用ベシ

● 中風急証多ハ退テ後但手足不遂或ハ言語蹇澁スルハ氣
血ノ虛也ハ物湯加減加味大補湯五論湯ノ類用ベシ

● 中風氣虛ニ屬スル者ハ補中益氣湯ニ加減スベシ氣虛メ手足
不遂ニハ補中益氣湯ニ木瓜附子ヲ加ベシ氣虛ノ言語蹇澁スル
ニハ補中益氣湯ニ石菖蒲訶子遠志ヲ加ベシ氣虛メ痰アラハ補
中益氣湯ニ茯苓半夏ヲ加ヨ

● 中風氣血虛メ痰ヲ兼ルニハ五積散ニ加減スベシ

● 中風ノ症腎氣虛メ陰血枯竭スル故ニ手足不遂ノ類多シ

六味丸八味丸右皈丸方皈丸ノ類ニ加減メ用ベシ此等ノ藥ニ木
瓜薏苡仁虎脛骨穿山甲ヲ加減スルヿ可秘〳〵口授心傳ノ妙也
●慥メ中風ノ療治ハ多ハ氣血ヲ補テ氣ヲ順シ痰ヲ驅ヘシ大
補湯ニ陳湯ヲ合シ烏藥殭蚕ヲ加テ其効如神
●中風ノ脉ハ浮ヲ吉トス滑ハ痰ヲ兼ル也浮ニメ遲ナル者ハ
吉トス急疾ノ者ハ灸ス
●中風ノ悪症ハ口開キ手ヲ撒キ眼合シ遺尿シ沫ヲハキ直視
上竄シ面ノ色赤ク喉鼾睡ノ如ク卒ニ肉脫シ筋骨痛ヲナシ汗
出テ連珠ノ如ク髮直頭ヲフリ動クすニシキリニ筋痛モノハ灸
証ナリト知ルベシ
○類中風ノ症ハ或ハ寒ニ中テ卒中風ノ如ナルアリ附子理中湯
五積散ヲ用ベシ暑ニ中テ卒中ノ如クナルニハ黄連香薷散ヲ用ヘシ
食滯ニテ卒中ノ如クナルニハ藿香正氣散不換金ノ加減ヲ用ベシ
●預メ中風ヲ防ク一ニ方ヲ諸書ニ出ヒドモ無益也只酒食ヲ愼ミ
房事ヲ愼ムヨリ外預メ防ク術ナシト知ルベシ

飲食

●飲食ニ傷ル者ハ氣口ノ脉緊盛ナル者也食消化セサルモノハ
其脉浮滑ニメ疾急也
●飲食ニ傷レテ寒ク熱ヲ發シ或ハ上吐シ下泻スル者ハ藿香正
氣散ニ加減ノ用ベシ其中吐逆甚キ者ニハ藿香白芷桔梗ヲ去
ベシ不換金正氣散モ可也
●飲食大過メ腹痛シ吐逆スル者ハ不換金ニ加減メ用ベシ

●内ハ生冷ノ食物ヲ大過シ外ハ風寒湿ノ氣ニ感シ腹痛寒熱ヲ發スル者或ハ持病ニ疝氣アル人食滞ニ因テ疝氣起リテ腹痛小腹痛スル者ニハ共ニ行氣香蘇散ヲ用ベシ加減方考ニ載ス

●飲食ヲ大過シ腹痛シ吐逆モナク浮下モナク悶乱苦痛甚シク久頃刻ニアル者ニ香月ノ家傳神通ノ振藥ヲ用ベシ香月兵部少輔經考朝鮮ノ医李整菴ニ傳所ノ神通湯方

良姜　丁香　沉香　木香　陳皮　莪朮　大腹皮
吳茱萸　砒仁　連翹　乾姜　枇杷葉　右十二味

此藥ノ妙ハ連翹ト枇杷葉トニアリ分量ニ口傳アリ其人ニ非ンバ傳ルヿナカレ此振藥ナリ食滞ノミニ限ラズ一切ノ病危急ニメ一息切断ノ時ニ至テ一呷スレバ立ドコロニ神効アリ呼吸シヅマリ其後虚實ヲ分別メ治スベシ其効逐一ニ述ガタシ口授心傳ノ妙方ナリ

●飲食大過メ腹痛甚キ者ハ玉摳丹ヲ用ベシ或ハ勝紅丸神通丸ヲ用ヨ甚キ者ハ備急圓三丁下スベシ

●食滞ノ症吐泻スルヿアタワズ悶乱苦痛メ久頃刻ノ間ニアル者ニハ分心氣飲ヲ用テ胸膈ヲ開ケバ必吐メ危急ヲ救フ其効神ノ如シ大秘事也其人非ンバ傳ルヿナカレ可ヿ秘

●酒傷ノ症ハ平胃散ニ葛根砂仁ヲ加テ用ヨ甚キ者ニハ葛花北鮮醒湯ヲ用ヨ

●強飯餅團子ノ類ヲ過食シ寒熱腹痛セバ平胃散不換

金霍香正氣散ノ類ヲ用ベシ共ニ神麯麥牙砂仁ノ類ヲ加ヨ

● 濕勞ノ類ヲ過食シ腹痛スル者ニハ保和丸ヲ用ヨ不換金ニ神曲砂仁蒼朮ヲ倍加スベシ

● 臭鳥獸ノ肉ヲ過食セハ平胃散ニ山査子ヲ加フ甚キ者ニハ椰攪ヲ加ヘテ用ベシ

● 甜瓜西瓜ノ類或ハ梅桃李杏梨栗柿林檎ノ類ノ菓ニテ食滯セハ平胃散不換金ニ木香正氣散不換金正氣散ノ加減ヲ以テ攻メ取ベシ平胃散香砂平胃散ノ類ヲ以テ消導スベシ食滯猶メクラザル者ハ枳實大黃湯備急圓保和丸ノ類ニテ下メ取ルベシ如是メ後ハ香砂六君子湯六君子湯錢氏白朮散ノ類ヲ加減メ用ベシ

内傷

● 内傷ハ不足ノ病也或ハ飲食ニ傷レテ其病久シケレバ内傷トナリテ四肢懈惰シテ手足ノ心熱シ悪寒微熱泄瀉等ノ症ヲ發スルナリ或ハ形体ヲ労役スレバ脾胃虚羸ノ内傷トナル也或ハ思慮過度スレバ脾ヲ傷リ胃虚ノ内傷ノ症トナル也其脉飲食内傷ノ者ハ滑疾浮沉也勞役ノ内傷ハ數大濇ヲ見ハスナリ氣口ノ脉人迎ヨリ大ナリト知ベシ

● 内傷勞役元氣虚損スル者其脉洪大ニメ虚スル者ニハ補中益氣湯ニ加減ノ用ベシ或ハ升陽順氣湯黃芪人參湯調中益氣湯ノ類ヲ見合テ用ベシ辨惑論脾胃論蘭室祕藏ノ三書

ヲヨク參考スベシ脾胃内傷ノ治方ハトカク東垣ヲ元トスベシ

● 内傷ノ症飲食不甘或ハ泄瀉一両行身体倦懶スル者ニ異功散或ハ六君子湯或ハ七味白朮散參苓白朮散ノ類ヲ見合テ用ベシ食ヲサレハサム者ハ香砂平胃散香砂養胃湯香砂六君子湯ノ類ヲ用ベシ

● 内傷ノ發熱烘カ如クニメヌ又退キ苦寒ノ剤ヲ用テモソノ熱不除補陰降火ヲ用テモ其熱退ク者又アラサルニ東垣ノ升陽散火湯ヲ用レハ其効如神

● 内傷ノ病補藥ヲ用テ胸塞リ飲食進ミ難キニ石菖蒲一味細末ヲ用レバ其効如神

● 内傷ノ症ハ參苓ノ類ノ補藥ヲ用ルコト數十貼ニノ其病漸々三平復スルニ行氣香蘇ヲ二三貼用テ又補藥ヲ用レハ補藥ノ功甚速也此ハ肝氣鬱ノ脾氣メグラザルニ因テ也行氣香蘇散ヲ用テ補藥ノ滞リヲ通ス支ヲ知ベシ大秘事也又逍遥散ニ砂仁薄草ヲカロテ補陰ノ剤ヲ用ユル間ニ服スルニ二三貼スルモ妙也

● 虚弱ノ人形体羸瘦レ飲食不進面色委黄ニノ大便秘泄不時者ヲ脾胃虚労ノ證ト云必ズ咳嗽ヲ發スルナリ鹿茸ハ真ノ労咳虚労ノ證トノ多ハ滋陰降火ヲ用テ效ニ至ル如是ナルニハ六君子湯ニ升麻葛根胡拮梗山梔子ヲ加ヘ或ハ虚甚ニハ補中益氣湯ニ茯苓半夏五味子ヲ加ヘ異功散ニ升麻葛根胡當皈ヲ加テ用ベシ可秘

● 内傷虚弱ノ症形瘦疲レテ床ニ着ケモナクブラ〳〵ト氣色

アレキニ升陽益胃湯ヲ用ベシ又ハ雲林潤身丸（回春内傷門出）ヲ持薬ニ用ルモ古

●内傷ノ證五更ノ時ニ泄瀉スル者アリ多ハ脾腎瀉ニ變メ不救者アリ此病多ハ夜食ヲ過ス故ニ脾胃虛ノ瀉スルナリ東垣ノ升陽湯ヲ用ヒ其効如神

●摠メ内傷ニ屬スル病其品多シ其病證ニシタカツテ治スヘシ其見ル所ノ病ヲ見テ其門ニ求ムベキ也

欝證

●鬱証ハ氣血鬱結ノ不散ノ病ナリ其脉多ハ沈伏スル也

●氣鬱ノ證ニハ分心氣飲ヲ用ベシ多ハ室女寡婦僧尼ノ輩或ハ始メハ富貴ニメ後ニ貧賤ナル者或ハ鰥姑ニ不得シテ婦人或ハ夫婦ノ中不和或ハ勤番近習ノ士或ハ勤学ノ人等多ハ氣鬱メ諸病ニ變也内經ニモ百病ハ氣ヨリ生ストアレバ氣ヲ循スレバ鬱散ル也

●痰鬱ノ症ハ二陳湯四七湯ノ類ニテ胸膈ノ痰ヲ開發スベシ瓜蔞枳實湯（回春鬱証門出）清心抑膽湯ニ加減ノ可用

●血鬱ノ症ハ當歸活血湯（回春鬱門）或ハ正氣天香湯ニ當歸赤芍藥紅花ヲ加テ用ベシ

●食鬱ハ香砂平胃散（回春鬱門）ヲ用或ハ不換金ノ加減ヲ用ヨ

●熱鬱ハ火鬱也火鬱湯（回春鬱門）ヲ用ベシ升陽散火湯モ妙也

●諸ノ鬱症何共見分難キ者也此時ハ六鬱湯ヲ用ヨ此方諸鬱ヲ解スル妙方ナリ可秘

●婦人氣鬱メ血不行月經閉塞レ腹脹鼓脹トナル者ハ多ハ不レ救モノ也指迷七氣湯ヲ用ベシ或ハ丸藥テ用ルモ佳也勝紅丸神通丸モ可也

●尅証肝經ヲ衝テ脫腋疼痛スル者多シ大七氣湯或ハ行氣香蘇散ヲ用ヨ或ハ小芫胡湯ト正氣天香湯ヲ合ノ用ヨ甚ニハ左金丸利氣丸回春氣門ノ類可也芍藥ヲカルヲ妙トス

痰飲

●痰飲ノ病ハ明ノ難シ何ノ病ニモ痰ヲ挾ヘヌハ稀ナリ其脉多ハ滑也多ハ沈弦細ヲ兼ルナリ

●痰飲ノ症ハ頭運ノ目眩シ耳鳴或ハ口眼蠕動シ眉稜骨痛噫氣呑酸心下嘈雜スル類ニハ二陳導痰湯ノ類ニ加減ノ用ベシ

●痰飲アッテ燥ク者ハ瓜蔞枳實湯ヲ用ヨ

●痰心竅ニ迷テ神不守舍狂言妄語スル者ニハ清心抑肝湯ニ宜シ

●痰飲ニテ胸痛スルハ四七湯ヲ用ヘシ

●痰飲ニテ結核ヲ手足ニ出シ或ハ何ノ処ニモ腫出テ不痛不痒者ニハ導痰湯清濕化痰湯清熱道痰湯ニ加減ノ用ベシ外ノ腫タル処ニハ生天南星ノ末ヲ糊ニテヌレテ紙ニウケテ上ヨリ貼スベシ

●頸項ノメクリ瘰癧馬刀ノ類ノ核アル者ハ此痰核多シ芫胡清肝湯ヲ用ベシ其効如神

●痰證實スル者ハ滾痰丸ヲ用ヘシ此方奇妙ノ丁多シ主治

加減等委ク面春ニ載スル可考

○慾メ痰症ハ二陳湯ヲ用ヒ或ハ吐方ヲ用テ痰ヲ吐ベシ痰沫出レハ多ハ快ヨシ万病何共見分難キハ痰ト知ラレテ治セヨト善哉此言也怪病ハ痰ト知レテ治セヨ急病ハ火ト知レテ治セヨト善哉此言也痰飲ノ症咽塞一息切斷ノ時ハ家傳神通ノ振出シヲ用レハ其効如神可祕

咳嗽

○四時ノ感冒多ハ咳嗽ヲ兼ル也發熱悪寒痰ヲ吐クモノハ參蘇飲ヲ用ベシ是肺氣ヲ外ヨリ束ル故ニ咳嗽ヲ發スルナリ

○一切ノ咳嗽上焦ニ痰壅盛スル者ハ清肺湯ヲ用ヘシ

○咳嗽甚キ者ニ分心氣飲ヲ用テ其効ヲ得ル多シ

○咳嗽痰盛ナルハ二陳湯ノ加減或清熱導痰湯ヲ用ヘシ

○咳嗽メ胸膈結痛スル證ニハ瓜蔞枳實湯ヲ用ベシ

○咳嗽久ク不止者ハ脾肺ノ氣必ス損ズ其上ニ發散ノ劑ヲ過用シ或ハ驅痰ノ劑ヲ過用スルニ因テ脾肺ノ氣弥傷損ス六君子湯ニ桔梗山梔子ヲ加テ用レハ其効如神虚甚キ者ハ補中益氣湯ニ麥門冬五味子ヲ加用ベシ

○咳嗽久ク不止風藥ヲ用ルニ大過スレハ盜汗出テ羸瘦加ハル是ヲ風労ノ證ト云黄芪鱉甲湯ヲ用レハ其効如神

○久嗽不止自盜汗出テ虚瘦甚シク潮熱出ル者ハ多ハ労咳ニ變ズル也男女共二十六七ヨリ三十歳ニテハ咳嗽アラハ早止ベシ

滋陰至寶湯滋陰降火湯ノ類ヲ見合テ用ベシ多ハ脉細數ナル者也若脉不細數虛弱ニテ飲食ヒ難キハ脾肺ノ虛ト知ベシ六君子湯補中益氣湯ノ加減ヲ用ベシ

○室女或ハ近習ノ仕官ノ人氣鬱ノ咳嗽ス正氣天香湯ハ前富貴ノ後貧賤ナル者ハ多ハ氣鬱ノ咳嗽ス分心氣飲ヲ用ルハ庸醫モスル所ノ治療ニメ多ハ此等ノ方ニテ愈也然ドモ此証ハ多ハ思テ脾ヲ傷タルナレハ六君子湯加減ニテ多ハ愈也或ハ此證ニ滋陰降火ヲ用ル医アリ地黄ノ苦寒知母黄柏ノ大寒イヨ〳〵脾胃ノ生發ヲ克伐スルニ因テ咳嗽ヲ增ノミナラズ久ニ至レル者多シ能々工夫ヲスヘシ

○老人ノ咳嗽ニハ五積散ニ加減スヘシ冬月ノ咳嗽ニハ此方ヲ用ベシ老人咳嗽ヤミ難ニ藥沈九寶湯 見于入門七卷古方諸話中 ヲ用ベシ其効如神

○小児ノ咳嗽ハ多ハ食ノナス所也藿香正氣散不換金正氣散ヲ用ベシ痰盛ニ吐乳ナドアラハ二陳湯ニ黄芩連翹ヲ加ヘヨ小児ノ嗽ハ多ハ虫氣ヨリ發スル也家傳保童圓ヲ用ヘシ又ハ入門ノ諸咳嗽丸モ可也此等ノ藥ヲ用テ効ナキ者ニハ錢氏白朮散ヲ用ベシ其効如神

○妊婦ノ咳嗽ハ子嗽ト名ク紫蘇葉和氣飲ヲ用テ宜シ

○慇メ咳嗽ノ療治四時共ニ參蘇飲ヲ用テ加減スヘシ夏月ノ暑濕ニ中リ咳嗽甚ク諸方不應ニ黄連香薷飲ヲ用ユレハ其効如神食滯アリテ咳嗽スルニハ藿香正氣散ヲ用ヨ食滯去テモ

咳不止ニハ解散ヲ用ヨ素ヨリ積聚アル人風寒ニ中リテ咳スルニハ行氣香蘇散或ハ大七氣湯ヲ用ベシ何レノ咳嗽ニテモ久ク不止ニハ寒熱虛實ヲ不問六君子湯ノ加減ヲ用ヨ審ニ古方先ツ參蘇飲ヲ載スヿ可考

喘急附吼哮 イキキレノヤマイ

○喘急ハ多ハ其人生質ニ痰アツテ然モ氣上リ安キ性ノ者秋收斂ノ氣ニ遇テ肺氣ヲ束タルニ因テ發スルナレハ先ツ參蘇飲ヲ用發メ取ベシ必ズ愈ルナリ

○喘痰ノ證ハ喘動ク人痰声アルナリ厚朴杏仁實湯ヲ用ヨ

○火上リテ喘スル者ハ食ヲ得レバ減シ食止ハ喘シ頭汗出テ如熏ナル者也清肺湯 間春 喘門 ヲ用ベシ

○喘息虛陽上リ攻ル者ハ蘇子降氣湯ヲ用ベシ或ハ三子類親湯蘇沈九實湯ヲ用ベシ

○喘息短氣ハ呼吸短促ニメ痰声無也四君子湯 間春 喘門 ヲ用ベシ

○吼哮ノ症ハ喘息ニ同シ喉中水雞ノ声ノ如クナルヲ吼哮トユフト正傳ニモ出タリ專ラ肺竅ノ中ニ痰氣アル也五虎二陳湯ヲ用ベシ

○總メ喘息ノ治ハ初發ハ先ツ參蘇飲ヲ用ユベシ其後ハ九寶湯類親湯蘇子降氣湯沈香降氣湯ノ類ヲ用ヒ清神湯ノ類見合テ用ベシ痰喘急促ナル時ニ家傳神通ノ振藥ヲ用ユレハ即時ニ効ヲ取也此藥ヲ用ル時節アリ其時ヲ知ルヿ大秘密ノ妙也其人ニ非レバ傳ルヿナカレ

○持病ニ喘疾アル者平日ニ六味丸ヲ服スレバ腎氣下ニ盛ニメ虚陽上ルヿ無ニ因テ發スル者多シ憊メ喘息ノ持病ハ年老ニナレハ發スルヿ薄シ火攻(セメ)テ上ル氣火キノ故ナリ

腹痛

○腹痛ノ證ハ多ハ食滯ノナス所也其脉多ハ關脉緊小ニシテ急ナル者也九種(クサ)ノ腹痛アリ寒熱血食濕痰虫虛實也入門四春ノ腹痛ヲ見合テ療治スベシ

○腹痛ノ症ヲ治セバ先食傷ノ仕掛(シカケ)ニスベシ家傳神通ノ振藥ヲ用ベシ多ハ愈ル也甚者ハ反魂丹奇應丸奇効丸命藥丸万病解毒丸玉樞丹ノ類ヲ用ユベシ或ハ保和丸勝紅丸神通丸ヲ用ベシ

○腹痛ノ證ハ寒ニ屬スル者ハ溫(アタ)メテ通ラスベシ平胃散ニ木香肉桂良姜呉茱萸ヲ加用ベシ甚(ハナハ)ダ其脉多ハ遲沈(チチム)ナリ

○腹痛熱ニ屬スル者ハ平胃散ニ黄連芍藥川芎枳殻山梔子木香ヲ用ベシ

○腹痛食滯ノ者ハ香砂平胃散不換金ノ加減ヲ用ベシ食滯甚ク痛ムキリナラバ枳實大黄湯ヲ用ヒ或ハ備急圓ヲ用テ下スベシ是即實痛ノ症也

○腹痛ノ證(ショウ)ハ血瘀(ヤミ)血ニテ痛者ハ平胃散ニ酘尾(タウキビ)赤芍牡丹皮玄胡索川芎(カワブキ)茯苓(ブクリヤウ)桃仁紅花肉桂ヲ加テ用ベシ

○腹痛ノ證虫ニ屬スル者ハ平胃散ニ烏梅花椒木香川楝子檳榔使君子ヲ加テ用ベシ

○腹痛虚ニ屬スル者ハ六君子湯ニ木香炮姜良姜ヲ用ユベシ
虚痛ヤミ難ニ黄芪建中湯ヲ用ヘシ此藥ニハ飴ヲ用ルト甘艸ヲ
用ルトニ口傳アリ
○腹痛諸藥不應ニ木香良姜益智三味ヲ用テ煎服スレハ立ド
コロニ止ム藥味少クメ其効專ラ也
●腹痛甚キ者諸藥不應ニ野猪ノ膽五分ヲ用テ煎服スレバ
其効如神熊膽モ可也
○諸ノ食毒或ハ藥毒ナドニ中テ腹痛スルニ白扁豆一味一錢
五分煎服スレハ其効如神生姜五分ヲ加ルモ吉
○婦人ハ怒リヤスク尉レヤスキニ因テ肝氣急縮メ或ハ心腹絞
痛レ脇下急痛ス小茈胡湯ニ黄連木香青皮芍藥ヲ加用ベシ

○妊婦ノ腹痛ニハ妄リニ胎禁ノ藥ヲ用ルヲナカレ多ハ胎動ナレバ
紫蘇和氣飲ヲ加減メ用ベシ
○小児ノ腹痛多ハ食滯ナリ平胃散ヲ用ベシ或ハ虫痛疳癖
ノ痛モアリ保童圓淨府湯ノ類ヲ用ベシ
●寒氣酷烈ノ時ニ寒ニ中テ腹痛スルニハ五積散ニ加減スベシ
又寒氣ニ中テ腹痛手足厥冷スル者ニハ附子理中湯治中湯
ヲ用ベシ丁子肉桂ヲ加テ其効如神
●搗ノ腹痛ノ治法先温石ヲ焼テ腹ヲ熨レ或ハ塩ヲ煎テ中
ニ包テ熨セヨ或ハ瓦土器ヲ焼テ熨モヨシ是亦一ツノ手段也

心痛

○心痛ハ胃脘痛也其脉多ハ微緊急也甚キ者ハ伏入スル也

其治法ハ多ハ腹痛ノ仕掛ノ如スベシ胸膈ノ間ニ痰飲アルニ因テ心痛胸痛ヲ發スル也ニ陳湯ニ加減ノ用ベシ

○心痛痰ニ屬スル者ハ二陳湯四七湯枳縮二陳湯ニ加減レテ用ベレ

○心腹痞滿スル者ハ大七氣湯ニ加減ノ用ベレ

○婦人室女或ハ勤仕ノ人或ハ前貴後賤ノ人等氣鬱ノ心痛スルニハ分心氣飲ヲ用テ効アリ輕キ者ハ香蘇散ニ木香半夏草豆蔻ヲ加テ用ヘレ痛甚キ者ニハ利氣丸(但春氣門)ヲ用ルモ可也

○室女或ハ官女等氣鬱レ心痛スルニハ正氣天香湯ニ山梔子貝母草豆蔻ヲ加テ効アリ

●男女ヲ不問平日思慮ヲカヘ氣不舒長ノ痰心竅ヲ塞キテ心痛スルニハ清心抑膽湯ニ加減ノ用ベレ

○寒氣ニ中リテ心痛スルニハ姜桂湯(但春心痛門)ヲ用ベレ

○虛寒ノ人ノ心痛ニハ理中湯ニ貝母草豆蔻ヲ加テ其効如神

○胸ノ眞中頻リニ痛者或ハ心氣ヲ勞傷ノ痛者ニハ清心抑胆湯ヲ用ベレ或ハ皷脾湯貝母草豆蔻ヲ加モ可也

●胸正中痛甚ク心ニコタヘテ堪ガタキハ大切ノ證ト知ベレ多ハ頓死スル者也又ハ眞心痛ト旦ニ發メタニ死レタニ發メ旦ニ死スルノ類ノ者多レ何ニテモ胸ノ正中痛ム者ハ大切ナル証ト心得ベレ

●勞胃口ヲ傷テ死血胃口ニ留テ心痛スル者アリ多ハ黒血ヲ吐スル者也或ハ嫉妬ノ婦人怒氣過ニメ上リ攻テ此證ニ

變スル者アリ香蘇散ニ當皈川芎大黄黄芩ヲ加テ効ヲ取ル
多シ又韮菜丸（田春心痛門）ヲ用ルモ可也此丸ヲ煎湯ニメ用ルモ可也

◎酒傷ニテ心痛スル者ニハ葛花解醒湯ヲ可用

◎何（イヅレ）ヒト見分ガタキ心痛ニハ先ツ家傳神通ノ振藥ニ生姜ヲスリ
テ加ヘ熨湯ニテ振出ノ用ベシ此藥ヲ用レバ急ナル痛ヲ止ルヿ也ヨ
リ後ニ何ノ症トユヿ（クワシク）ヲ藥方ヲ定（サダ）テ治ヲ施スベシ是（コノ）ヿ也

脇痛（キヤウツウ）

◎脇痛ハ多ハ肝氣ノ鬱滯（ウツタイ）也其脉多ハ强緊急ナルモノナリ先
疎肝飲芫胡苓皈湯（田春脇痛ヲ用ベシ）

◎痰飲ニ因テ脇痛スルニハ平肝流氣飲清皈豁痰湯或ハ清心
抑胆湯ヲ用ベシ

◎氣滯ニ因テ脇痛セバ指迷七氣湯ヲ用ベシ或ハ沈香升降
湯ヲ用ベシ

◎左ノ脇下ニ塊（クワイ）アリテ痛ヲナス者ハ食積也香砂平胃散ニ青
皮木香山査子神麹麥芽乾姜ヲ加テ用ベシ

◎疝氣横逆（ギヤク）メ脇痛スルニハ行氣香蘇散ニ加減スベシ委クハ方
考ニ載ス

◎摠メ脇痛ハ肝經ノ尉也小茈胡湯ニ木香吳茱萸芍藥ヲ
加テ用ベシ怒氣甚（カラ）メ脇痛スルニハ小茈胡湯ニ青皮木香芍藥因

桂ヲカテ妙也

○肝經鬱滞シ脇痛スル二諸藥ヲ用テ効ナキニ肝經ヲユルムレハ其痛ヤム也逍遙散ニ川芎山梔子芍藥ヲカテ用ベシ其効如神

○脇痛甚キ者ニハ龍金丸當飯龍薈丸ヲ用ベシ或ハ楊梅瘡毒ニテ脇痛スル者アリ二方共ニ用テ妙也

○脇痛ノ藥ニ何ノ方ニモ釣藤鉤ヲカテ奇〳〵妙〳〵大秘妙也

肩臂痛

○肩臂痛ハ多ハ痰ニ屬スル也二朮湯（四春臂痛）ヲ用ベシ或ハ二陳湯ニ蒼朮木山薏苡仁枳實釣藤鉤ヲカテ用ベシ奇〳〵妙〳〵

○臂痛風寒濕ニ搏レテ發スル者或ハ睡後手ノ被ノ下ニレキ或ハ乳母臂ヲ以テ兒ノ枕トメ風湿ヲウクル類ノ如キニハ五積散ノ加減ニ宜

○中風ノ臂痛或ハ劒術又ハ拳ナドノ藝ヲ勤ムル人臂痛スルニハ烏藥順氣散ニ加減ノ用ベシ

○肝胆ノ風熱血燥ニテ臂痛スル者ハ蒺藜地黄湯ヲ用ユベシ此藥ハ諸ノ藥劑ヲ用テモ効アラズ或ハ他医ノ種々ノ療治ヲナメモ愈カヌルニ此方ヲ用ベシ奇〳〵妙〳〵ノ大秘方ナリ

○寒ニ因テ臂痛スル者ハ五積散ニ加減ノ用ユベシ

○湿ニ因テ臂痛スル者ハ蠲痺湯（四春臂痛）ヲ用ベシ

背痛

○背痛ハ多ハ痰ノ聚テナス処也參合湯（四春背痛）ヲ用ベシ

○肩背痛甚ク面顧スベカラサルニハ通氣防風湯ヲ用ベシ東垣ノ加減議論妥ク方考ニ載スト考

○肩背痛甚ク腹脹レ痰多キ者ニハ導痰湯ヲ用ベシ 四春 背痛
○痰アリテ肩背痛スルニハ二陳湯ニ木瓜薏苡仁蒼朮海桐皮釣藤鉤ヲ加テ用ベレ其効如神
○寒ニ中リテ背痛セハ五積散ヲ用ベシ
○氣腎ニ因テ背痛セハ分心氣飲或ハ六味腎湯ヲ用ベレ其効如神
○勞腎メ背痛セバ小茴胡湯ニ二陳湯ヲ合レテ蒼朮木瓜山梔子ヲ加テ用ベレ其効如神

腰痛 附腿痛

○腰痛ノ症多ハ腎虚ニ屬スル也其脉多ハ沈々メ緊弦也ニタ風濕ニ中テ腰痛レ或ハ疝氣ニテ腰痛スルモアリ先五積散ヲ與スベシ濕ニテモ腎虚ニテモ多ハ効ヲ得ルナリ

○疝氣發メ腰痛スル者ハ寒熱往来メ頭痛レ腰痛テ如斯ニテメ小腹ニ引筆丸ニ牽キ痛ム也行氣香蘇散ニ疝氣ノ加減ヲ用ベレ委ク方考ニ載ス可考又ハ三和散ヲ用ベレ其効如神
○氣滯テ腰痛スルニハ烏藥順氣散ヲ用ベレ
○瘀血滯テ腰痛スル者ハ調栄活絡湯 四春 腰痛ヲ用ベレ
○濕痰アリテ腰痛スルニハ清濕化痰湯ニ宜レ
○重キ物ヲ持揚ナドレ腰ヲクジキテ腰痛レ或ハ跌躓メ瘀血凝滯メ腰痛スルニハ調栄活絡湯ニ宜レ
○摠メ腰痛腿痛ノ證筋骨疼痛スル者ハ經絡ヲ温散スベレ五積散主方也又ハ趁血湯 四春 腰痛ヲ用レバ多ハ効ヲ得ナリ如是ヲ用テモ効ナキ寸ハ腎虚也ハ物湯ニ杜仲牛膝茴香破胡紙沈

香毋丁子乳香没藥ヲ加ヘ用ヨ

● 腰痛緩クナラバ八味丸六味丸右飲丸左飲丸ノ類ヲ用ヨ

頭痛 附頂痛

● 頭痛ノ證外感内傷何ノ病ニモ兼テ見ハ者ナリ其所々ニ依テ治方ヲ考ベシ多ハ外来ノ風寒暑湿ノ氣ニ感メ致スナレバ發散スル也輕キ者ハ川芎茶調散頭痛ヲ散藥ニメ用レバ効ヲ取也或ハ芎芷香蘇散ヲ用ベシ頭痛ノ脈多ハ弦緊數ヲ見ス也

● 痰厥ノ頭痛ハ眼昏ク頭重ク頭如裂悪心煩滿シ人ニ對スレバ眩暈シ心神顛倒シ常ニ風雲ノ中ニ坐スルガ如ク身重キ丁山ノ如ク言語懶ク何トモ云ニイワレズ心持悪キハ胃虚メ痰停ル也半夏白朮天麻湯ヲ用ヘシ其効如神

● 婦人室女ノ頭痛憩メ氣尅メ心悪キニ半夏白朮天麻湯ヲ用ヒヨ其効如神

● 熱厥ノ頭痛ハ冬ノ天嚴寒ノ時モ風寒ニアタルヿヲ好ミ風ヲ入レバ暫ク止ム煖カナル処ニ来リ或ハ煙火ヲ見レハ痛復作ル也清上瀉火湯 田春 頭痛ヲ用ベシ

● 風ニ中テ頭痛シ熱甚キ者ハ九味羌活湯ニ柴胡蒿本ヲ加テ用ベシ

● 寒ニ中テ頭痛スルニハ五積散ニ蒿本蔓荊子ヲ加テ用ヘシ其キ者手足厥冷吐利セバ理中湯ニ白豆蔻ヲ加フ

● 氣虚ノ頭痛ハ八解散補中益氣湯ニ蔓荊子蒿本白豆蔻ヲ加テ用ベシ

● 血虛ノ頭痛ハ四物湯ニ香附子山梔子黃栢蔓荊子ヲ加テ用ベシ

● 食傷ノ頭痛ハ藿香正氣散不換金正氣散ニ宜シク吐逆アルニハ藿香白芷桔梗ヲ去テ白豆蔻ヲ加ベシ又平胃散ニ蒿本白豆蔻ヲ加テ用ベシ

● 氣血虛メ頭痛シ若クハ諸ノ頭痛ヲ治スル藥劑ヲ用テ効ナキ或頭痛數月ヲ經テモ不止者ニハ十全大補湯ニ白豆蔻蔓荊子天麻ヲ加テ用レハ其効如神

● 頭痛如裂メ熱甚キ者ニハ小柴胡湯ニ蒿本ヲ加テ其効如神

● 頭痛甚キハ石羔ヲ加ヘヨ

● 頭痛甚キ者ハ必ズ吐逆スル者也先家傳神通ノ振藥ヲ用テ吐ヲヤメテ後ニ何ノ證ト云フヲ見分テ治療スベシ

● 頭痛諸藥不應者ニ加味逍遙散ヲ用テ肝經ヲ緩クスレバ其効如神後ニ六味地黃丸ヲ服シテ腎水ヲ生ズレバ甚効ヲ得也是大秘妙也

● 頂痛ノ證ハ頭痛ト同治也其中ニ蒿本柴胡防風ヲ加フベシ

通氣防風湯ヲ用テ其効如神或ハ烏藥順氣散ニ羌活獨活木瓜ヲ加テ用ルモ宜シ

● 眉稜骨痛ハ風熱ト痰トノナス処也選奇湯（囲春頭痛）ヲ用ヘシ其効速カナリ

● 雷頭痛トテ頭面疣癤（ユウセツ）増寒壯熱頭痛如裂（サクカ）傷寒ノ如クナルニ升麻湯（囲春頭痛）ヲ用テ効ヲ取ル多シ此藥ハ藥味少メ其効速カナリ

●真頭痛ノ症トテ旦ニ發メタヽ灸シタヽニ發メ旦ニ灸スルアリ腦痛トテ百會ノ穴ノ邊氣味悪ク痛アリ共ニ治シ難シ五積散ニ細辛ヲ加テ効ヲ取ル多シ二證共ニ真心痛ナンドノ類ニメ治方及カタキ證也

痛風

●痛風ハ遍身骨節走注疼痛スル也痛風ノ脉多ハ浮濇ニメ緊ヲ見シ又ハ沈弦也

●痛風ノ症血氣風濕疾火ニ屬スル者共ニ羌活湯（間春痛風ヲ可用

●痛風熱甚者ニハ敗毒散ニ蒼朮當飯釣藤鉤ヲ加テ用ヨ

●痛風虛寒ニ屬スル者ハ温散スベシ五積散ニ加減メ用ベシ方考ニ委ク載スル加味五積散（四春痛風ヲ用ヘシ

●痛風痰ニ屬スル者ハ胸背疼痛シ背心冷ル皮氷ノ如ニメ喘息咳嗽シ或ハ腫塊ヲナス也清濕化痰湯ニ羌活防風蒼朮乳香沒藥木瓜薏苡仁ヲ加ベシ

●痛風ハ多ハ血拮竭シ風濕相搏テ經絡骨節疼痛スルナリ四物湯ニ羌活防風蒼朮蒼耳子海桐皮沒藥乳香黄柏釣藤鉤牛膝蔵霊仙木瓜ヲ加ベシ牛山常ニ痛風ヲ治スルニ此方ヲ用ル二百發百中ニメ不應者鮮シ

●痛風ノ證晝輕ク夜重キ者多ハ血虛也是酒色過度ノ人筋脉空虛ニメ風寒濕ニ感ズル也疎經活血湯ヲ用ヨ有神効

●痛風諸藥無効者ニ万病解毒丹錦袋子紫金錠ヲ煎服スレバ痛立トコロニ止奇々妙々

○痛風疼痛甚キ者ニ黄柏ヲ酒ニテ炒リ乳香没薬各等分細末メ酒ニテ用レバ其効如神

○痛風諸薬ヲ用テ後疼痛ノ甚キ丁止ムト雖モ行歩カナイ難ク膝腫レ脚脛痩テ鶴膝風トナル者多シ大防風湯ヲ用ベシ神効アリ又ハ物湯ニ蒼朮炙仙鶏藤鉤木瓜薏苡仁牛膝附子紅花ヲ加テ調理スベシ大補湯ニ右ノ加減モヨシ

○白虎歴節風トテ四肢百節甚夕疼痛シ虎ノ噛ガ如クナルニ獨活寄生湯ヲ用レバ其効如神

○痛風諸薬ヲ用テ後痛漸々ニ止ミ或ハ遍身痒ク虫ノ行ガ如クナルハ肝腎ノ虚也六味丸料ヲ用ルニ酒柴胡山梔子鈎藤鉤ヲ加ヘテ其効如神

○痛風ノ症諸薬ヲ用ヒ痛漸々ニ退クトイヘドモ飲食不進四肢無力形體柴痩スル者ハ補中益氣湯ニ木瓜酒芍藥鈎藤鉤ヲ加テ調理スベシ其効如神

脚氣

○脚氣ノ症ハ麻スル者ハ風ニ屬ス痛ム者ハ寒ト知ルベシ腫ル者ハ濕トナメ治スベシ其脈多ハ弦數或ハ結澁ヲ見ス也

○脚氣ノ症風ニ屬スル者ハ寒熱瘧ノ如ク脚腿足踝ノ上燃熱メ赤腫スル者ニハ人参敗毒散ニ蒼朮酒大黄ヲ加テ用ベシ

○脚氣濕熱ニ屬スル者ハ遍身疼痛シ下足脛ニ注キ腫痛メ瘡ヲ生シ赤ク腫テ或ハ癢ク或ハ痛ム者ハ當皈拈痛湯（四春脚氣）ヲ用ベシ又ハ加味二妙丸（同上）ヲ用ユベシ又ハ三妙丸（同上）モ妙也

○脚氣風濕流注シテ両脚酸痛スル者ニハ五積散ニ羌活独活
桃柳子烏藥木香ヲ加テ其効如神又五積散ニ杉節ヲ加ヘ膝瘤
ヲ加テ其効如神奇々妙々可秘
○脚氣轉筋スル者ハ血熱ニ属スル也四物湯ニ酒黄芩紅花ヲ
加ル也其効如神又ハ四物湯ニ黄栢知母牛膝木瓜ヲ加ルモ可也
○脚氣心ニ冲ク者ハ悪候也四物湯ニ酒炒ノ黄栢蒼朮ヲ加ヘテ
其効如神
○婦人両足両ノ腿痛テ日晡ニ熱甚キ者ハ加味逍遥散ニ木瓜
ヲ加テ妙也
○脚心發熱シ癢ヲナシ肌体骨立渇ヲナシ痰ヲ吐ク者ハ脾腎
之虚也補中益氣湯ニ木瓜酒炒ノ黄栢ヲ加ヘ六味丸ヲ兼用ル
ヘシ

●脚氣ノ症久ク不愈者ハ多ハ鶴膝風ニ變ズル者也大防風湯ヲ
用ベシ奇々妙々也
○脚氣ノ症ニ痰下流メ腫痛スル者多シ二陳湯ニ木瓜薏苡仁
蒼朮厚朴山椒ヲ加テ其効如神

瘧疾

○瘧疾ノ症數種アリト雖モ多ハ風寒暑湿ノ氣ニ感シ内飲食
勞倦ニ因テ發ス一日ニ一發スル者ハ治シ易シ一日ヲ隔テ發スル者ハ治シ難シ一日ニ發スル者或
○瘧疾初ノ程ハ熱甚ク傷寒ナドノヤウナル者也夏ノ時初秋ノ
頃ニ如是煩フ時ハ多ハ瘧ニ變ズルト知ベシ先ハ散邪湯柴苓湯
四春ノ類ヲ大料ニメ用テ大ニ汗ノ解スベシ
瘧門

●夏月初秋ノ瘧ニハ黄連香薷飲十味香薷飲ノ類ヲ可用
●瘧疾間日ニ寒熱發シ一二發メノ時ヨリハ人參羸胃湯ヲ用ユベシ
●瘧疾四五六發ノ時ハ七味清脾湯九味清脾湯ヲ見合テ用ユヘシ清中驅瘧飲ヲ用モ可也加減委ク方考ニ載ス
●飲食ヲ兼タル瘧ニハ藿香正氣散ニ麥芽神麴ヲ加ヘ或ハ行氣香蘇散ニ加減スベシ委ク方考ニ載ス或ハ勝紅丸家傳神通丸保和丸ヲ用テ効ヲ得ルヿ多シ
●瘧疾發表シ和解消導ヲメモ其勢甚シク病人生質實ニメ元氣剛強ナル者ハ截藥ヲ用ベシ不二飲截瘧常山飲七寶飲ノ類如是諸方諸書ノ瘧門ニ出ツ可參考ヲ用ベシ百霜草黄丹等分極細末トナメ毎服二文目

發スル日ノ未明ニ冷水又ハ温湯ニテ用テ神効アリサレ氏今時人ハタタク虚弱ナレバ截藥ヲ用ルヿナカレ清脾湯驅邪飲ノ類ヲ用テ見合テ置ベシ漸々ニ勢退テ瘧勢止也又世間ノ人截藥トイヘバ珠ノ外驚キ怖テ服スルヿ無ニ因テ緩々ノ治ヲ施メ壞症トナル者多シ医師モ瘧ハ落ガタキヿヲ知テ説ニトカク瘧ノ療治ハ落ス者ニテ無トムテ元氣サヘスコヤカナレバ瘧ハ自ラ去ナドムテ人參ヲ服セシムルニ因テ邪氣ヲ補住メ勢滯スレヿナク壞症トナル是有故無損トムノ理ヲ知ラズ脉ト病証トヲ考ヘサル鹿工多ケレバ如是也可憐
●瘧疾ノ發スル多ハ湿痰ニヨル故ニ古人ノ説ニモ痰ナケレハ瘧ヲナスヿナレトムリ痰多キ者ニハ二陳湯ニ柴胡黄芩枳實草菓

ヲカテ用ベシ

● 濕ニ因テ瘧ヲ發シ或ハ旅途（リョト）ノ中或ハ船（フナ）中ナドニテ瘧ヲ發シ或ハ水土ニ服セズメ瘧ヲ發スル者ニハ胃苓湯ニ柴胡黄芩草菓烏梅ヲカテ其効如神

● 瘧疾諸藥ヲ用テ無効者ニ何首烏唐物（カラモノ）ヨシ二匁茯苓一匁水煎シ服スレバ其効如神

● 慇懃（インギン）メ瘧疾ノ療治ニ三發マデニハ發散ノ劑ヲ用ベシ散邪散柴苓湯ノ類是ナリ四五發ノ後ハ人參粳胃湯七味九味ノ清脾湯ノ劑ヲ用ベシ不二飲常山飲七寶飲ノ類是也虛弱ナル者ニハ驅瘧飲ノ類ヲ用ヘシ如是ニメモ落（オチ）サル時ハ實剛丸者ニハ截藥（セツヤク）ノ鮮散ニ柴胡黄芩草菓ヲカテ用ヒ或ハ四獸飲尤妙也老瘧數日不愈者ニハ蓽茇（ヒツバツ）瀉甲湯ヲ用テ尤妙也如是次第（シダイ）ニ治方ヲ施ス時ハ治セズトイフコトナシ又如是治ヲ施メ後寒熱瘧勢漸々（ヨウヨウ）ニ退キ和俗ノイフカゲノサストイフガ如クナリテ元氣虛弱形体柴瘦（センソウ）スル者ハ六君子湯ニ木香炮姜草菓當皈ヲ加テ用或ハ補中益氣湯ニ木香炮姜砂仁ヲ加テ用レバ其効如神

● 鬼瘧（キヤク）ノ症トテ初發ヨリ暴（ガウ）發甚ク譫言（センゲン）妄語（モウゴ）鬼神ヲ見ガ如ク邪祟（スイ）病ニ似タル者アリ黄連解毒湯ニ草菓ヲカテ用ベシ其効如神

● 瘧疾ノ寒熱止ミ餘熱（ヨネツ）アリテ煩悶（ハンモン）嘈雜（サウザツ）シ夜眠（ネム）ルコトヲエザル者ニハ竹茹温胆湯高枕無憂散ヲ用テ可也

● 瘧疾寒熱（カンネツ）ノ退（シリゾ）テ後ハ對金飲子ヲ用ベシ四五發ノ時ニ落（オチ）レ

タルニハモトヨリ用ヘシ假令四獸益氣ノ補劑ニテ落タル者ニモ先
二三貼此藥ヲ用ベシ大秘密ノ一也瘧ハトカク痞ヨリ起ル病ニ
メヤミ易スレバ痞リヤスケレバ比方ヲ用テ胸膈ヲ清クスベシ奇々
妙々也

● 瘧痢ノ症トテ初秋ノ比濕熱ニ感メ寒熱ノ瘧必ズ痢ニ變スル
タメシ人參養胃湯ニ黄連ヲ加ヘテ奇効アリ此症ハ多ハ虚証ニ變
テ救ヒカタキニ至ル者ナリイカンントナレバ瘧バカリニテモ暴瘧ノ病ニ
テ元氣ヲ損ズル者也其上ニ痢下ノ元氣ヲ損ズル病ヲ添タルハ宜
ル哉壞症ニ變スルナリ此症久ク不愈ヌハ峻補ノ劑ヲ用イザレバ
救ヒガタシ補中益氣湯ニ白扁豆木香生炮姜砂仁ヲ加テ用
ユベシ有二神効一

● 瘧ハ熱疾ハ汗ヲ發スベシ汗出レハ必ズ愈ル也此症春夏ハ治シ
ヤスシ秋冬ハ治シ難シ別イニ非ズ春夏ハ汗出ヤスク妹冬ハ汗出
ガタキ故也古人モ云ヲカシテ汗ヲ目アテニシタル支瘧テ瘧ノ
藥ヲ用ハ大料ニスベシ一貼ノ分量二タヨリ三タニテノ間ニスベシ
瘧ハ暴瘧ノ邪氣ナレハ小料ノ藥劑ニテハ其藥病勢ニ勝ヌタキ
ト知ベシ

● 姙婦ノ瘧ハ墮甚キヌハ墮胎スル一有者ナリヨクヽ心ヲ付
テ治スベシ五六ケ月ニテハ胎禁ノ藥ヲ犯スベカラズ七ケ月已後ハ
大抵ノ胎禁ノ劑モ苦シカラズ初發ノ時ハ人參養胃湯ニ加減メ
用ベシ大抵有故無損又無損トイヘル理ヲアキラメテ意ヲ以テ
推擴可施治

●婦人月水来ル時ニ瘧ヲ患レハ其塾血室ニ入テ譫言妄語ス
ル甚シ人参養胃湯ニ四物湯ヲ合シ桃仁紅花ヲ加ヘ長キ者
ニハ其上ニ蘇木ヲ加テ用ヒ其効如神
●小児ノ瘧多ハ大人ニ同シ其内剤ノ多少アルベシ種々ノ薬ヲ
用テモ落ガタク毎日〳〵寒熱出テ形体柴瘦スル者ニハ淳腑湯ニ
宜シ倭俗是ヲ虫瘧ト云ヒ又ハ片カイト云フ皆僻ノ病ナリ
家傳保童圓ヲ用テ有神効脾ノ俞章門天樞痞根京門等
ヲ灸メ佳ナリ瘧ハ外邪サヘ去タラハ大人小児共ニ灸治スベシ其
時節ヲ能見合スベシ是口授傳心ノ祕密也

痢疾

●痢疾ハ赤白共ニ濕熱ト十メ治スベシ其脉多ハ滑也細沈ナル
者ハ生キ洪弦ナル者ハ死ス
●痢疾ノ悪証ハ悪心嘔吐スル者呃逆スル者鮮血ヲ下ス者豆腐水
ノ如者屋漏水ノ如者糞色黒焦者ノ類身熱スル者其下ス物甚
臭メ抱壊雞子ノ如ナル者倶ニ治シ難ト知ベシ其中ニモ大便黒キ
者十ニメ七八ハ死證ト知ベシ
●痢疾ノ初發ハ多ハ水瀉ヨリ赤痢ニ変ジ白痢ニ変スル也又初
ヨリ赤痢ヲナスアリ初ヨリ白痢ヲ下スアリ大抵先赤白雜テ下ル裏
急後重ヲナス也泄瀉ヨリ痢ニ變スル者ハ東垣ノ芍薬湯ニ加減
メ用ベシ又ハ芍薬湯ノ加減ヲ用ベシ加減委ク方考ニ載ス
●飲食過多ノ腹脹口渇シ小便澁テ裏急後重シ赤白痢下
スル者ニ胃苓湯ニ黄連芍薬ヲ加テ其効如神裏急甚キ者

二ハ再ト木香挾柳ヲ加ヘヨ

● 痢疾赤白兼下リ裏急後重甚キ者ニハ木香導滯湯 入門 痢門
ヲ用ベシ此方芍藥湯ヨリモ剛劑ニテ實スル者ニ用テ可也

● 痢疾裏急後重甚キ者ニハ香連丸ヲ用ヨ其効如神

● 痢疾下ル日久ク度數モ減ズトイヘドモ止ガタキ者ニハ參
芍藥湯ヲ用ベシ

● 疫痢熱甚キ者ニハ倉廩散ヲ用ベシ

● 噤口痢トテ全ク不食スル者アリ此脾虛胃熱ノ症也多ハ蚊ヒ
ガタシ人參黃連石連肉砂仁砂糖白扁豆各一匁炮姜木香石
菖蒲甘艸各五分水煎シ服シ或ハ細末メ熱湯ニテ用ルも此予
ガ家傳ノ妙方取効甚多シ又丹溪カ方ニ噤口痢ヲ治スルニ活タル
大田螺二枚搗爛シ麝香三分ヲ加ヘ餅ノ煮タル糊ニヨシテセテ臍
ノ間ニ貼スレハ熱氣下行メ即食ヲ思也此方ハレバ〳〵コロニテ効ア
ル也奇〳〵妙〳〵噤口痢ハ多ハ救ガタシ此二方甚妙也可祕

● 搗ノ痢病ノ療治ハ赤白ヲ不問先芍藥湯芍藥湯導滯湯
ノ類ヲ大料ニメ一日一夜二四五貼ホドヅヽセリカケテ用テ腸胃ノ
穢毒ヲ疎濯スベシ去ナガラ虛弱ナ者或ハ高貴ノ人或ハ婦人
氣弱キ類ノ者ニハアラリ大料ノ劑ヲ用ヒ貼數ヲセリカケテ用ルも事ナ
カレ其藥氣ニ堪ガタク却テ吐逆ナトスルヲタシ心得アルベキ也
奴右ノ藥方共ヲ用ユレバ漸々度數減シ平愈スル也痢ノ色赤キ
ヿ減ズレハ内熱モ薄々成ト心得ベシ痢ノ色白キ者ハ多ハ虛寒ニ屬
スル也右ノ藥方ヲ用テモ効ナキすハ參蘇芍藥湯ニ肉桂木香

炮姜白扁豆益智ヲ加テ用ベシ其効速ナリ

● 痢疾諸薬ヲ用テ愈テ後亦十日程（ホド）アツテハ下利シ亦四五日愈テ下利メ數月ヲ經（ヘ）テ愈（イエ）ガタキ者ヲ休息痢（キウソクリ）ト云也此脾胃虚寒スル也七味白朮散參苓白朮散東垣升陽湯補中益氣湯ノ類ヲ用ヒ加減スベシ委ク方考ニ載ス

● 痢疾度數八九十度ヨリ百度ノ余ナラバ寒熱虚實赤白ヲ問（トフ）テナク倉廩散（サウリンサン）ヲ用ベシ人參ノ分量ニ多少アリ其見合口傳アリ此方ハ世間（セケン）ノ医師ハ疫痢熱（エキリネツ）ノ藥ト心得テ上提（ジヤウテイ）ノ義アルノ理ヲ知ズ其辨論委細（イサイ）ニ方考ノ倉廩散ノ条下ニ載（ノセ）ス可ニ參考一

● 痢疾ノ療治ハ補瀉ノ間ニ有口傳一七八日ヲ經（ヘ）テ毒物盡（ツク）ルト

其ノ補藥ヲ用或ハ澁（ヒカ）藥ヲ用テ下リ捨（ステ）ル元氣ヲ補渋（ヒカ）スベシ十余日ノ後トテモ毒物未盡（ツカサ）ヌ者（モノ）ニ渋藥ヲ用或ハ補藥ヲ用レバ邪氣ヲ補住（トヾメ）メ久ス必ズ日數ニカヽハルベカラズ其毒ノ盡ルヲ能見究（ミキハ）ムベシ

● 真人雞藏湯（シンジンケイゾウタウ）　回春門ナドノ類ノ方又ハ訶子肉（カシニク）豆蔻（ヅク）罌粟殻（ヨウシユカク）阿片ナドノ入（イル）ル澁藥ノ類其家々ノ傳ル妙藥都（スベ）テ共ニ多シ其病症ト藥性ト相應（アヒカナ）ノ時ハ其効如神（シンノゴトシ）サレドモ其病証ニ相應（アヒカナ）セザルヲ用ヒ其病ヲ治（ヂ）スル能々眼（メ）ヲツケテ其時節ヲ見究（ミキハ）ムベシ其変口傳多シ其人ニ非（アラ）ンバ傳（ツタ）ルコトナカレ夫（ソレ）故（ユヘ）ニ此書（コノショ）ナレロ授（サヅ）スベシ

● 痢疾諸藥ヲ用テ効ナキ者ニ附子理中湯ニ肉桂益智ヲ加テ効ヲ取ルコト多シ

●諸ノ瘧疾寒熱虚實共ニ天樞ノ穴氣海ノ穴ヲ灸スベシ　裏急後重悉ク止テ愈ルナリ鹿ニハ熱アルニ因テ灸治ヲ忌テ緩々ノ治ヲ施スニ因テ後ニハ壞症トナリ病者元氣虚弱レ灸治ニ堪ガタキニ至ルヿ是亦灸治ノ時節ヲ見合スルニ口傳アリ可ヿ秘

●諸ノ瘧疾ニ藥餌ヲナレテ愈ル者多シ寒晒ノ餅ヲ味噌ニテ煮テ食レ或ハ鮒ノ汁或ハ塩漬ノ海鰍汁鰲ノ塩漬霜梢ノ砂礪漬ニレタル類品々俗用ニスルニ多シ効ヲ取ルヿ速也是亦其時節ヲ能見究ムルニ有リ食餌ノ法ハトカクニ星クスベシ初發ノ時ニ食餌ヲナセバ邪毒ヲ助テ腹痛裏急ヲ增長スルナリ其時節ヲ知ルニ在リ可ヿ秘

●瘧疾愈テ後ハ六君子湯ニ升麻柴胡當歸白扁砂仁ヲ加ヘ補中益氣湯茯苓益智白扁豆ヲ加テ調理スベシ

●小兒ノ瘧疾多ハ大人ノ治ニ同レ劑ニ多少アルヿ之ヲ去瘧ノ色赤ニ減ジ裏急減ゼバ錢氏白木散ニ芍藥當歸砂仁ヲ加テ用ベシ此加減百發百中ノ妙劑也小兒ノ瘧疾愈テ後ハ其脛足ニ心ヲ付テ見ベシ必ズ脾痩テ細ク膝ノ皿大ナル者也之ヲ瘧後ノ鶴膝風ト名付ク又小兒瘧後ニ行歩ニ何トナク足クビケコヤスキアルハ鶴膝風ニ變ズルト知ベシ如是ナルヲ瘧後ニハ病家ニ對テ兼テ尋問ベキ也鶴膝風ノ治方ハ其本条ニ詳ナリ可考

●瘧病ハ暴病ナレバ思ノ外ニ元氣虚憊スルニ因テ壯者ニテモ實性ナル者ニテモ灸ニ至ルヿ多シ又暴病ニメ甚タ羸瘦スレ氏日數ヲ經ザル病ナル故ニ思ノ外ニ灸セザル者多シ此病老人ト小兒トニハ

九十度ホドノ數ヲ下スコアラバ何ホド元氣盛ニ見エルトモ大変ニ變ズルト知ベシ

● 腸風藏毒（ゾウトク）ノ症ハ痢病ニ同シ腹痛泻利膿血ノ如ク裏急窘迫スル也胃風湯ヲ用ユベシ痢疾豆醬汁ノ如クナル者ニモ此方ヲ用テ可也

泄瀉

● 泄瀉ノ症ハ脾胃虚弱ニシテ飲食過度シ外ハ六淫ノ氣ニ感メ發スルナリ其治脾胃ヲ健（スコヤカ）ニシ濕ヲ燥（カワカ）シ小便ヲ利スベシ其脉多ハ沈ナリ

● 脾胃不和メ腹痛泄瀉セバ胃苓湯ニ加減メ用ベシ

● 飲食ニ因テ腹痛泄瀉スル者ニハ不換金正氣散藿香正氣散平胃散香砂六君子湯姜砂六君子湯等ニ加減シテ用ベシ

◎ 濕ニ因テ泄瀉スルニハ五苓散四苓散ニ加減スベシ

◎ 暑ニ因テ泄瀉スルニハ黄連香薷飲十味香薷飲ニ加減スベシ

◎ 寒ニ因テ泄瀉スルニハ理中湯治中湯ニ加減スベシ

◎ 風冷腸胃ニ入テ泄瀉スルニハ胃風湯ニ加減スベシ

◎ 脾胃虚メ久ク泄瀉レ飲食不進（スヽマ）水穀不分者ニハ參苓白朮散七味白朮散ニ加減スベシ

● 脾胃虚弱ニメ大便不實飲食不思或ハ泄瀉腹痛レ或ハ晡晨（アケカタ）ニ泄スル者ハ脾腎泻ト名ク四神丸ヲ用ベシ或ハ東垣ノ升陽湯ヲ用ベシ有神効又參朮健脾丸（四春泄瀉）ヲ用ユルモ

可すり

● 摠メ泄瀉ノ症ハ多ハ飲食ニ傷ラル、ニ因テ發スレバ其食物ノ変ヲ尋問テ塾物ニ傷ルヽすハ寒藥ヲ用ヒ寒冷ノ物ニ傷ルヽすハ熱藥ヲ用ヒタタハ不換金正氣散藿香正氣散香砂平胃散ノ類ニ加減シ用ユベシ如是ノ方ヲ用テモ不止すハ香砂六君子湯ヲ用ヘシ如是ノ方ヲ用テモ不止すハ六君子湯錢氏白朮散ノ類ヲ用ヘシ如是ノ方ヲ用テモ不止すハ脾胃虚寒ノ症ト知ルベシ六君子湯異功散二柴胡升麻白扁豆砂仁ヲ加ヘ或ハ東垣ノ升陽湯参苓白朮散調中益氣湯補中益氣湯升陽益胃湯ノ類ニ加減メ用ヒ夜分ノ食ヲ減ズベシ

● 泄瀉ノ症服藥數貼ヲ用テ其症大半愈テ未全快者ハ湯藥ヲ止メレムベシ参苓白朮散異功散ニ白扁豆山藥砂仁等ヲ加テ極細末メ米飲湯ニテ用ベシ久久湯藥ヲ服スレバ脾胃ニ湿ヲ畜テ泄瀉止ムコトナレ粉藥ヲ用ルコト粥バカリ食セシムレバ是モ亦脾胃ニ湿ヲ畜テ泄瀉スルナレニ度飯ヲ用ルコト大秘密ノコトナリ

霍乱

● 霍乱ノ症ハ卒時ニ心腹疼痛シ上吐シ下瀉シ揮霍ノ間ニ變乱スル也或ハ四肢厥冷六脉沈伏ノ欲絶也此ヲ湿霍乱ト名ク若吐瀉スルコトアタワズ心腹絞痛シ手足厥冷スル者ヲ乾霍乱ト名ク若轉筋腹ニ入ル者ハ必ズ灸スル急証ト知ルベシ

● 湿霍乱吐瀉腹痛スル者ハ其脉多ハ滑也食滞ノ療治ノ仕方ニスベシ不換金正氣散藿香正氣散ニ加減ノ用ベシ甚キ

者ハ吐瀉止カタク手足厥冷シ脈沈伏スルニハ附子理中湯ニ加減ノ用ヘシ

◉夏月暑ニ中リ生冷菓物ヲ過食スレハ多ハ霍乱ノ症ヲナス香需飲十味香薷飲ニ加減ノ用ベシ

◉乾霍乱ノ症心腹飽脹絞痛ノ吐瀉ヲナスコトヲハクシ手足厥冷シ脉沈ニメ絶スル者ニハ先ツ家傳神通ノ振出ヲ用ヒ或ハ三神圓ヲ塩湯ニテ用ヒ急ニ指ヲ得テ咽ニ入テ探リ吐メ理中湯ノ加減ヲ用ベシ

◉霍乱ノ症已ニ灸シ腹ニ暖カナル氣少ニテモアラハ臍中ニ塩ヲ埋テ灸スルヿ七壯ナレハ即甦ルナリ

◉霍乱轉筋スル者ハ蓼一把ヲ煎テ足脛ヲ洗ベシ有効

嘔吐

◉嘔吐ノ証ハ多ハ食滯ノナス所ナレハ其食スル所何物トヲ尋問テ治ヲ施スベシ大抵食物ノ仕掛ニスベシ先ツ家傳神通ノ振藥ヲ用レバ多ハ止ムナリ其後虚實ヲ見定テ治療スベシ不換金正氣散ニ加減シ藿香正氣散ニ加減スベシ嘔吐ノ症ニハ人ニヨリ藿香白芷唐ノ蒼朮ノ香氣ヲ悪者アリ見合テ去ベシ

◉嘔吐止ムヿナク飲食不下者ニハ保中湯（四春嘔吐ニ加減メ用ベシ

◉胃寒メ清水ヲ嘔吐スル者ニハ理中湯ニ陳皮丁子砂仁益智肉桂ヲ加テ用ベシ有ニ神効

◉胃熱シ煩渇シ嘔吐スル者ニハ竹茹温胆湯ニ加減メ用ユヘシ有ニ神効

◎痰延アリテ嘔吐スル者ハ痰火也清熱導痰湯ニ加減ノ用ベシ

◎飽食ノ後嘔吐スル者ニハ香砂平胃散ニ加減メ用ベシ

◎酒傷ノ嘔吐ニハ葛花解醒湯ヲ用ベシ

◎婦人怒氣盛ンニ或ハ嫉妬甚キ者ハ必上逆メ嘔吐スルナリ小柴胡湯ニ木香青皮芎藭山梔子砂仁ヲ加テ用ベシ甚キ者ニハ其上ニ吳茱萸ヲ加レバ其効如神

◎婦人妊娠二三ヶ月ノ時必嘔吐スル者多シ是ヲ悪阻ノ症ト云ニ陳湯ニ紫蘇砂仁黄芩ヲ加テ用レバ其効如神又ハ紫蘇和氣飲ニ加減メ用ルモ佳ナリ

◎小兒ノ嘔吐乳ノ症ハ多ハ食滯ニ因テ胸膈ニ痰アリニ陳湯ニ砂仁木香黄連ヲ加テ用レハ其効如神少シ連翹ヲ加ヘシ（ス）

大人小兒共ニ嘔吐止ガタキニ藥ヲ用ルニハ連翹ヲ何ノ藥方ノ中ニモ加ヘ家傳ノ大秘密也口授心傳其人ニ非ンバ傳ルコトナカレ（レ）

◎久病ノ後胃虚メ嘔吐シ穀ヲ納（ヲサ）メサル者ニハ七味白朮散ニ砂仁連翹ヲ加ヘ或ハ六君子湯ニ砂仁伏龍肝連翹ヲ加ヘ或ハ補中益氣湯ニ茯苓半夏砂仁連翹ヲ加ヘ見合テ用ベシ効アラサルコトナシ

◎嘔吐諸藥方ヲ用テ効ナキヿ数日ニ逍遥散ニ山梔子砂仁連翹ヲ加テ用ヒ肝經ヲ緩（ユル）クスレバ脾胃平和ニナリテ嘔吐止ム者ナリ是大秘密ノ一也

膈噎附翻胃　ヨクセヤマイ　トイヨリサヘヤマイ

◎膈噎翻胃ノ証ハ共ニ七情ノ氣大過シ五藏ノ火動シ津液ヲ薫蒸（クンジヤウ）メ痰益（マス）盛ンニ脾胃漸（ヤヽ）ク衰（オト）ヘ飲食流行スルコトナクメ此病

トナル三十已前ノ者ハ多ハ痰ニ因テ致スナレバ治スベシ四十已後ノ者ハ多ハ氣血枯(コ)衰(スイ)メ津液竭(ツ)メ膈噎スレバ治シ難シ五十已後ノ膈ハ治方ナシト古人モ云置(ヲケ)ルコトナリ其脉多クハ緊濇ナルモノナリ

◉膈噎ノ初証ハ先胸痛テ飲食胸(ムネ)ノ間(アヒダ)ヲカスル如ニメ下ル也ニ陳湯ニ蒼朮厚朴草豆蔻ヲ加或ハ草豆蔻丸ノ類ヲ用テ胸膈ノ痰ヲ去レハ其病自ラ愈也

◉七情多キ人或ハ憂愁多キ人寡婦ノ類思慮多キ人多ハ此症ヲ患ル者也分心氣飲ニ加減メ用ベシ

◉積聚アッテ胸膈ニ攻上(セメホリ)テ此症ヲナス者ハ大七氣湯或ハ利氣丸勝紅丸等ヲ用ベシ

◉胃虚メ食ヲ吐メ不納(イレ)者ニハ安胃湯(四春翻胃ヲ用ベシ

◉痰アッテ胸膈不利此症ヲナス者ニハ滾痰丸(四春痰門ヲ用ベシ其効如神

◉脾胃虚スル者食スルすハ噎スルヿナクメ或ハ半日若ハ一日アッテ後其食物消化(コナ)セズメ其儘吐スル者アリ此ヲ翻胃(ホンヰ)トヽ云治シガタシ七味白朮散六君子湯凝神散補中益氣湯ノ類ニ加減シテ用ベシ

◉五十以上ノ人血液枯燥メ膈噎スルニ四物湯ニ二陳湯ヲ合シ黄柏ヲ加テ用ヘシ有効

◉昔ヨリ本朝ノ武家一國ヲモ知(シ)ホドノ家ヲ起(オコ)ス名ル大将多ハ膈(カクノウレキ)ヲ患ル也是ヲ以テ之ヲ見レハ七情ヲ過シ思慮ヲ廻(メグラ)シ

其上嬉亂ニノ精液ヲ耗散スル故也今世モ如是ノ貴人或ハ高家ニテモ大分ノ業作ヲナス類ノ者此病ヲ生ズル也加様ナル人ニハ六君子湯ニ木香砂仁山梔子石菖蒲ノ類ヲ加テ煎湯ニシテ六味地黄丸ヲ用テ愈ル者十ニノ二三人モアリ病深キ者イカヤウニメモ治シ難キ也和俗ノ諺ニ此病ヲ龍馬ト云将棊ノ駒ニヒトシ角ノ寸ハイヅクスベキ方便モアレ共角ナリテ龍馬ニナリタルハ四角ハ方ニカケアルキテ押ヘ難シトニフ誠ニヲカシキ一ナガラコトハリナル一ナリ

◎腸噎ノ病ニ腹中ニ奇怪ナル蟲アリテ食ヲツキカヘス証アリ此類ノ病者ニ稚児臭ヲ喰シメ或ハ北國ノ海ニアンヤガラ臭トニ物ヲ煎メ飲シムレバ胸膈ヒラケテ食ヲトヲスコトアシ

一ニ摠メ腸噎ノ証ヲ治スルノ傳授アリ食ヲ吐シ食物ノ通リテ通リ兼ル証ナラハ其食物ヲ與ルニ術アリ一日ニ一合ニテモ二合ニテモ其人ノ虚實ヲ見合テ用ルニ譬ヘバ一度ニ五夕食ニテモ一合食ニテモ食スル病者ナラバ一度ノ食ヲ五分ニ分テ少シ宛食セシムベシ此証時ニヨリテ咽潤ヒ食通リ安キ亨アレバ病人モ悦ビ食物ノ通ル寸ニ少モ多ク食スベシトニ脇ノ看病人モ強テ進ムルニヨリテ却テ食過キ下ヨリ衝上テ吐スル也一度ニ一著ホト宛少許食セシメ飢テハ少シ用ヒスレバ吐スルナキ者也加様ニメ虫ヲ殺劑ヲ用レバ實証ナルハ治スル也尤此証痰ニヨリ氣ニヨリ積ニヨリ虫ニヨル者ハ右ノ所ノ如ク食ヲ減ノ薬ヲ用レバ十ニノ二三人モ治スル者アリ五十以上ノ人津液枯竭ノ此病ヲ患ル者ハ一

旦ハ薬ノ効アリト雖モ終ニハ鬼祿ニ上ルト心得ベキ也

呃逆　ヒヤクリ

㊀呃逆ノ証ハ多ハ胃火上衝メ發スル也病者自覚ルニ上膈ヨリ起ルト知ルハ治シ易シ臍下ヨリ衝上ルト覚ル者ハ治シ難キ也其脉多ハ弦急也浮緩ナル者宜

㊀呃逆ノ症胃口虚寒シ手足冷脉沈細是寒逆也理中湯ニ丁子肉桂附子ヲ加テ用ベシ或ハ丁香柿帯湯（田舎呃逆ヲ用ベシ）

㊀痰火ニヨッテ呃逆スル者ニハ二陳湯ニ砂仁山梔子黄連竹茹木香沈香ヲ加テ用ベシ

㊀臍下ノ氣上衝メ呃逆スル者ニハ滋陰降火湯ニ砂仁茴香沈香木香山梔子柿帯ヲ加ヘ甚キ者ニハ辰砂ヲ加ヨ

㊀呃逆ノ症多ハ中氣不足メ發スル也六君子湯ニ升麻柴胡丁子砂仁ヲ加ヘ或ハ補中益氣湯ニ茯苓半夏五味子丁子ヲ加テ用ベシ其効如神

㊀久病ノ人或ハ大病ノ後呃逆發テ不止者ハ悪証ト知ベシ如是症氣海ノ穴ニ灸スルヿ三五壯メ効アリ参附湯或ハ生脉散ナドノ類ノ剤ノ薬味少キヲ大料ニメ先ヅ氣ヲ無何有ノ郷ニ返スノ理アリ可秘

補益

㊀補益トハ病名ニ非ス諸ノ病ニヨリテ虚損スレハ必補薬ヲ用ヒテ元氣ヲ補益スベシ氣虚セバ四君子湯ニ加減メ用ベシ氣虚セバ四物湯ニ加減メ用ベシ脾胃虚セハ六君子湯ニ加減メ用ベシ

氣血兩ナガラ虛セバ八物湯或ハ十全大補湯ニ加減メ用ヘシ腎氣虛セバ六味丸八味丸右皈丸左皈丸ノ類ヲ見合テ用ベシ委ク方考其方ノ条下ニ加減アリ可考

(一)一切ノ虛損ノ症ニハ先ヅ補中益氣湯ニ加減ノ用ベシ

(一)一切ノ虛損ノ症或ハ父母ヨリ稟受スル所ノ元氣虛弱ナル者ニハ諸ノ補益ノ劑多シ見合テ用ベシ延齡固本丹神仙巨勝子圓打老児丸無比山藥圓(是ヲ和俗ハ之字丸ト名クロ授アルナリ)或ハ藥酒ノ方諸ノ方書ニ多ク見ヘタリ考合テ用ベキ也左ハ雖トモケ様ノ藥ハ皆腎水ヲ增シ陽支ヲ發スル藥ナレバ却テ此藥ヲ頼テ情欲ヲ恣ニメ元氣ヲ盡ノ類ノ者多シ医タル者此心ヲヨク知覺メ人ニ教ユベキ一ノ支也

虛勞 附骨蒸

(一)虛労ノ証ハ陰虛メ相火動メ肺金ヲ浸スニ因テ發熱或ハ潮熱自汗盜汗咳嗽吐痰甚キ者ハ吐血咯血スル也其脉多ハ細數ナル者也陰虛火動メ火九泉ヨリ起ル者ハ治シ難シ虛労ノ人藥ヲ用ヘバ泄瀉シ補藥ヲ用レバ泥滯シ苦寒ノ劑又ハ血劑ヲ用ユレバ泄瀉スル者ハ治シ難ト心得ベシ

(一)虛労骨蒸ノ症ニハ世医多ハ滋陰降火湯ヲ用ユ加減委ク方考又ハ回春ニ載ル也可ニ參考一去ナガラ此証ノ始多ハ脾胃ノ氣虛痞メ腎虧メ咳嗽發熱スル也牛山常ニ六君子湯ニ桔梗木香山梔子茱芄柴白皮ヲ加ヘテ或ハ補中益氣湯ニ茯苓半夏貝母五味子麥門冬ヲ加ヘテ効ヲ取ル多シ人參ノ製法黃芪ノ製法

并二分量口傳アリ可ㇾ祕

一骨蒸ノ症熱甚ク咽喉疼痛シ咳嗽甚キ者ニハ蓁艽扶羸湯ヲ用ベシ

一骨蒸ノ症ニ滋陰降火湯或ハ清離滋坎湯（回春 虚勞ノ類 セイリシカン）ハ味丸ノ類ヲ用ルニハ常ニ世医ノ能見及ヒ聞覚（キヽオボ）タルヿナレバ考合テ其症ニ的中スル方ヲ用ベキヿ也加減ノヿハ諸書ニ出タリ參考スベシ

一虚勞骨蒸ノ症初ハ多ハ氣鬱ヨリ發スル者多シ或ハ仕官勤（ツト）労ノ人初ハ王君ニ得ラレテ後寵衰（テウスイ）タル者又ハ室女嬪寡（ヒンクワ）思想カナワズ或ハ婦人ノ男ニ得ラレズ又ハ男姑ニ得ラレザル類ノ者必氣鬱ノ骨蒸労咳トナルケ様ノ症ニ分心氣飲ヲ用テ取効ヿ多シ

一前ニ云所ノ如キ症氣鬱滞ノ虚疹上ヘツテ咳嗽吐痰潮熱盜汗其病狀骨蒸労咳ノ如クナルニギレタル症アリ此症ハ多ハ脉滑數ニメ浮細數ノ狀ナキヲ證據（セウコ）トスベシケ様ナル症ニ滋陰ノ劑ヲ用レハ弥（イヨ）〳〵虚疹メ痰アツマリ熱甚（ダヽ）ク成テ後ニハ真ノ労咳トナリテ救ヒ難ニ至ルヿ也如是ノ症ハ脉ヲヨク診シ得テ病人ノ腹ヲ見出メ大七氣湯或ハ香砂六君子湯（回春 疹門ノ方佳ナリ）ノ類ヲ用レバ疹退テ諸証愈ル也神通丸ヲ兼用ルモ佳也

一疝氣ノ症ニギル、ヿ多シ是又ヨクく脉ヲ診シ極テ行氣香蘇散ニ疝氣ノ加減（方考ニ委ク記ヲ用ベシ）神効アリ婦人ハ正氣天香湯ニテ多ハ効ヲ取ナリ

一骨蒸咳久ク斃アリテ汗多キ者ニハ黄芪鱉甲湯ヲ用ユベシ

其効如神

○骨蒸労瘵ノ症ニハ獺肝ヲ煎テ用或ハ獺肉ヲ味噌汁ニテ煮テ餌セタルモヨシ是物ハ瘵虫ヲ治スルノ妙アル也啓益常ニ用テ効ヲ得タルコト多シ秘蔵ノ一也

○骨蒸労咳ニハ蒸ヲ用テ多ハ効ナキ者也灸治ノ効ヲ取コト多シ膏肓患門四花七九噫嘻ノ穴脾俞腎俞腰眼ヲ灸スベシ腹ニ痞塊アラバ承満中脘天樞ヲ灸スベシ章門京門痞根ヲモ灸スベシ

○薫腑ノ法 入門ニ出ヲ労咳虚労ニ用ル者アレド火ヲタスケテ損アツテ益火キ也啓益ハ心得難ニ因テ此方ヲ施スコト希ナリ去ナガラ咳火ク熱火ク唯ブラくト心持悪ク脾腎ノ陽氣虚怯ナル者ニ此方ヲ施メ効ヲ取コト多シ一聚ニ心得ベカラス

○労咳骨蒸ノ症ニ滋陰降火ノ剤ヲ用テ或ハ泄瀉スル者ニハ参苓白朮散ヲ用ベシ或ハ錢氏白朮散ニ藿香ヲ去テ白扁豆砂仁ヲ加テ用ベシ其効如神

○労咳骨蒸ノ症ニ滋陰降火ノ剤ヲ用テ治スル寸ハ十四五貼モ滋陰ノ剤ヲ用テ一日カ二日カハ香砂六君子湯カ行氣香蘇散カヲ一二貼ホド用テ又滋陰ノ剤ヲ用ル方ノ中ヲ用ニロ傳アリ

○脾胃虚メ心肺不足メ労咳骨蒸ト十ル症アリ此ヲ脾胃虚労ト俗ニ云フ多ハ泄瀉ヲ兼ル也補中益氣湯異功散飯脾湯東垣ノ升陽湯ノ類ニ加減メ用テ効ヲトルコト多シ

一風労ノ症トテ人風寒ニ感シ或ハ四時不正ノ氣ニ中ルニ医師發散ノ剤ヲ用ルヿ過多ナレバ元氣衰弱ニナリテ脾肺ノ氣虚耗メ咳嗽發熱メ必ス労咳骨蒸トナル此ヲ風労ト名ク黄芪鱉甲湯ヲ用レハ其効如神脾肺ノ氣虚スルヿ甚キ者ニハ補中益氣湯ニ茯苓半夏貝母五味子麥門冬ヲ加テ如神又ハ六君子湯ニ桔梗山梔子柴白皮ヲ加ルモ佳也異功散ニ升麻柴胡當帰貝母ヲ加ルモアリ此三方ノ見合ニ口授心傳アリ可ヒ祕

健忘　モノワスレ

一健忘トハ健ハ強ナリトテレイテ物忘ヲスル病ニテ初アリテ終リナクヒカ名ヲモ忘ルヽホドノヿ也此病ハ心氣元ヨリ不足ノ人思慮ヲ過度メ發ス或ハ精神短少ナル者心竅ニ痰ヲアツメテ此病トナル類多シ先サレアテヽ療治セバ皈脾湯ニ加減メ用ベシ或ハ天王補心丹狀元丸（田舎健忘）朱砂安神丸ノ類ヲ加減メ用ベキ也

一痰心竅ニ迷テ健忘スルニハ瓜蒌枳實湯清心抑胆湯ノ類ニ加減メ用ヨ有神効

一腎水枯涸メ心腎既濟セザレハ必健忘スル者多シ晝ハ皈脾湯清心蓮子飲ノ類ヲ加減メ用ヒ夜ハ六味丸ヲ用ヒテ有神効

怔忡　附驚悸　ムナサワギ

一怔忡ハ多ハ思慮過度シ心血不足メ煩ノ水ナキガ如ニ因テ心中動悸（ムナサワギ）メ人ノ捕捉（トラヘドコロ）トスル貌（カタチ）ノ如ク胸サワギスル也四物安神湯（田舎怔忡ニ宜シ）又ハ皈脾湯或ハ補中益氣湯ニ加減ヲ用ベシトカク二遠志酸棗仁石菖蒲茯神ヲ主トメ方ヲ製メ加減メ用ユ

ヘキ厂肝要也

一此症ニモ痰ヲ心ニトゾメテ火ニヨッテ怔忡スル者多シ二陳湯ニ遠志酸棗石菖蒲當皈ヲ加テ効ヲ得厂アリ或ハ枳實姜製ノ黄連酒炒黄連竹茹ノ類ヲ加テ有効或ハ清心抑肝湯ニ加減メ用テ有」効

一驚悸ノ治法モ多ハ怔忡ニ同シ鶏血安神湯（間春驚悸）加減シ或ハ皈脾湯ニ加減シ朱砂安神丸ニ宜シ是モ痰ヲ挟ムノ類多シ二陳湯清心抑肝湯温胆湯ニ加減メ用ベシ

牛山先生活套巻之上終

諸氣一　噯氣（噫雜呑酸）二　痞滿四
積聚　鼓脹五　疝氣三
咳血（咳血嗽血）七　水腫六　五疸七
嘔血（嘔血嗽血）七　汗症十一　癲狂十一
癇症十二　不寐十三　邪祟十三　消渴十五
痙病十六　痲木十七　痿躄十七　鶴膝風十八
鬚髮十九　面病二十　耳病二十一　鼻病二二
口舌二三　牙齒二四　咽喉（喉痺猴核氣）二八
眼目二五　遺溺（遺精）三十一
濁症二九　淋病三十一
小便閉三一　大便閉三四　大小便閉三五　痔漏三六

脱肛 三六ウ
ヌケル

牛山先生活套巻之中

被髪翁　貞菴　香月啓益　著

諸氣

○諸氣ノ病ト号スルハ七情ノ大過ヲ云也其脉多ハ沈伏スルナリ

○男子婦人共ニ諸氣不和憂愁思慮忿怒ニ因テ神ヲ傷リ抑鬱ノ氣留滞メ不散呑酸噫氣嘔噦悪心頭目昏眩シ四肢倦怠シ面色痿黄シ口苦ク舌乾キ飲食減少シ日々羸痩スルノ類ノ症アルヲ氣腦ノ病ヲ云也分心氣飲ニ加減メ用ヘシ委ク方考ニ出ス可参考

○諸氣不和喘咳シ脇肋刺痛シ胸膈痞悶スル者ニハ小降氣

湯沈香降氣湯俞山人降氣湯ノ類ヲ見合テ加減スベシ

○七情ノ氣鬱滯メ順ラズ胸膈痞悶シ面目蘆浮シ四肢腫滿スル者ニハ木香流氣飲ヲ用ベシ或ハ上下分消導氣湯ヲ用ベシ

○七情ノ氣鬱結シ胸膈疼痛シ心腹脇肋刺痛シ眩暈氣惱ノ者ニハ利氣丸大七氣湯ノ類ヲ用ベシ

○七情ノ氣鬱シ痰滯アル者ニハ四七湯ヲ用ベシ

○婦人室女寡尼ノ類ハ七情ノ氣鬱シ易シ正氣天香湯行氣香蘇散ノ類ヲ用ヒ加減メ用ベシ氣惱即解ス

○右ノ藥方ノ類ハ皆七情ノ氣ノ鬱滯ヲ開發スルノ劑也氣ノ實ヲ治スルノ方也氣虛スル者ノ宜キ所ニ非ズ氣虛ニ因テ氣惱シ羸弱スル者ニハ六君子湯ニ木香炮姜砂仁天麻ヲ加ヘ四君子湯異功散補中益氣湯ノ類ニ加減メ用ベシ委クハ補益門ニ出ス可ニ參考一

○痰厥メ氣惱シエモイヘズ心持チ悪キトニ者アリ半夏白朮天麻湯ヲ用ベシ其効如神

○婦人ノ氣惱諸ノ解鬱降氣ノ劑ヲ用テモ愈ガタキ者ニハ逍遙散ニ加減メ用ベシ加味飲脾湯ニ加減メ用ルモ甚効アリ

○憩シテ氣ヨリ生ズルノ病品ニアリ經ニモ百病ハ氣ヨリ生ズトアレバ人ハ此一氣ニ因テ生ヲ保ツ者也唯此氣ハ鬱シ易ク滯リ易シ鬱滯スルヿ久ケレバ虛シ易シ故ニ氣病ヲ治スルハ初ハ先ツ鬱滯ヲ散ズベシ其後ハ氣ヲ順行スベシ其後ハ氣ヲ補フベシ如是治

ヲ施ス時ハ治セズトスルナレ

噫気附噦雜呑酸

○噯気トハ胸膈ノ気ヲ噯ノ上升スルノ症也噦雜トハ胸膈ノ気自ラ不易懊憹煩心レ飢ニ似テ飢ニ非ズ痛ニ似テ痛ニ非ズ食ヲ得レハ暫ク止ム也呑酸トハ胸膈ノ気鬱滞メ水即チ心ヲ刺也此三症ハ多ハ皆膈中ノ病ニメ食ト痰ト火トニ属スルノ病也何レモ二陳湯ニ山梔子砂仁黄連等ノ薬ヲ用ベシ食ニハ香砂平胃散ニ加減メ用ヨ尚ニハ六尊湯平肝飲子ヲ用ベシ痰ニハ涼膈散竹茹温胆湯二陳湯黄連竹茹湯ノ類ヲ用ベシ火ニハ涼膈散竹茹温胆湯ニ黄連黄芩連翹ヲ加ベシ如是ニメモ治シ難キ者ハ是脾胃ノ気虚弱ト知ベシ六君子湯ニ木香砂仁山梔子姜製ノ黄連ヲ加テ用ベシ或ハ補中益気湯ニ黄芩ヲ去テ砂仁半夏山梔子ヲ加テ用ヒ七味白朮散ニ加減メ用ルモ可也

疝氣

○疝氣ノ症ハ七症アリト雖モ多ハ肝腎両經尊滞スルノ病也其脉多ハ強急ナリ

○疝氣ノ症ハ多ハ悪寒戦慄シ小腹疼痛シ睾丸ニ引テ腫痛ス行氣香蘇散ニ加減メ用ベシ委ク方考ニ載ス或ハ神効湯烏苓通氣散(回春疝氣ヲ見合テ用ベシ

○疝氣ノ症甚キ者ニハ三和散加減メ用ベシ

○疝氣ノ症積聚ツヨキ者ニハ大七氣湯ニ加減メ用ベシ利氣丸勝紅丸神通丸ノ類ノ丸薬ヲ用モヨシ

○疝氣偏墜ノ睾丸腫痛スル者ニハ五苓散ニ香蘇散ヲ合シ
茴香山梔子沈香木香橘核ヲ加テ其効如神
○疝氣ノ症熱甚キ者ニハ山梔子炒一味ニ又煎ノ服ス奇
効アリ甚妙ナリ
○老人ノ疝氣ニハ五積散ニ木香茴香沈香ヲ加テ用ベシ其効如
神寒濕ニ中リテ疝痛スルニモ妙ナリ
○老人虚人ノ疝氣踈導ノ劑ヲ用テ効ナキ者ニハ六君子湯
ニ木香茴香山梔子青皮砂仁木通ヲ加テ用ヘシ神効アリ
○諸ノ疝氣ノ症諸藥ヲ用テモ効ナキ時ハ逍遙散ニ木香川
芎茴香山梔子青皮ヲ加テ用テ肝經ヲユルムレバ立ドコロニ効ア
リ此奇ニ妙ニ可祕

痞滿

○痞滿ノ症ハ胸腹飽悶（ホウモン）メ舒暢（ジョチョウ）セザル也其脉多ハ滑大也此七
情ノ氣順（ガ）ラザルト飲食ニ傷ラルヽト脾虚メ運化（ウンクワ）セザルトニ屬スルナリ
先ヅ香砂平胃散香砂藿胃湯ノ類ヲ用ベシ
●七情ノ氣結（キケツ）メ心下痞（ヒ）スルニ分心氣飲ニ加減メ用ヨ
●食積中滿心下痞（ヒ）スルニハ藿胃湯（田舎痞門ニ加減メ用ベシ
●脾胃運化（ウンクワ）セズメ心下痞スルニハ六君子湯ニ木香砂仁炮姜升
麻柴胡青皮ヲ加テ用ベシ有奇効
●脾胃虚弱ニメ運化スルヿ不能メ心下痞スルニハ補中益氣湯ニ
木香砂仁半夏姜製ノ黄連ヲ少許加テ用ベシ其効如神

積聚（シャクジュ）

○五積六聚婦人ノ癥瘕皆同類ニメ氣上食ト二因テ痰アリテ灸
血ヲ積テ此症トナル或ハ婦人月經不通積テ血塊トナル其脉多ハ
沈伏メ骨ニ付ク者也先潰堅湯 回春 積門ヲ用ヒ加減シ痰ヲ消シ氣ヲ
順シ血ヲ活シ脾胃ヲ健カニスルヲ主トスベキ也

○積聚アッテ疼痛スル者ニハ廣茂潰堅湯ニ加減メ用ヨ

○積聚熱ニ屬スル者ニハ柴胡湯 回春 積門ニ加減メ用ベシ

○積聚寒熱ヲ不問大七氣湯ヲ用テ可行此方積聚ヲ治スル
ノ聖薬ナリ

○癒メ積聚アル者ハ煎湯ヲ嫌フ者多シ必ス丸薬ニテ攻ルニ
宜シ勝紅丸神通丸潰堅湯 回春 積門ヲ用ベシ其効如神

○婦人血塊アッテ月經不通腹脹スル者ニハ大七氣湯ヲ丸薬

ニメ用レバ其効如神

○食積ニハ保和丸ニ宜シ氣積ニハ大七氣湯ニ宜シ痰積ニハ滾
痰丸ニ陳湯ニ三稜莪朮貝母天南星ヲ加ヘ血積ニハ眞人化
鐵湯 回春 積門ヲ用ベシ何レモ其効如神

鼓脹

○鼓脹ノ証ハ脾胃ノ氣虛弱ニメ津液精微ヲ運化スルヿアタ
ワズ中空虛ニメ外堅ク鼓ニ似タルヨリ以名ク或ハ形瘦テ如鬼
手足細瘦メ腹大ニ其形蟹蛛ノ如ク脐突出スル者ハ百ニメ一生
モナシ癒テ鼓脹メ症ハ虛ニ屬スル故ニ多ハ富貴奉養ノ家ニ多シ
貧賤メ者ハコレアルヿ少シ其中十ニメ一ニモ生スル者アリ其脉多
ハ弦數ナリ

○脹滿ノ初發ハ先脾濕ヲ燥スベシ分消湯（四春鼓脹）ニ加減シテ用ベシ

○脹滿氣鬱ニ屬スル者ハ分心氣飲ニ加減ノ用ベシ

○脾胃虛弱ニメ脹滿スルニハ補中治濕湯ニ加減メ用ヘシ方考ニ委ク載ス可シ考

○飲食停滯メ脹滿シ積聚甚者ニハ大七氣湯ヲ用ベシ其効如神廣茂潰堅湯（四春鼓脹）モ可也

○婦人月經不通メ腹脹滿スル者多シ大七氣湯ニ蘇木紅花呉茱萸ヲ加テ細末メ梧子ノ大サニ丸シ毎服四五十丸ヲ用レバ其効如神數月服スベシ速効ヲ求ルヿ勿レ

○總メ脹滿ヲ治セバ先ツ疎導ノ利ヲ用テ其鬱滯ノ積聚ヲ去ルベシ其後ニハ六君子湯補中治濕湯補中益氣湯升陽益胃湯ニ加減メ用ヒ其脾胃ヲ補ベシ此其治ナリ

水腫

○水腫ノ証ハ遍身浮腫メ皮薄クメ光アリ手ニテ按ヲ成シ手ヲ擧レバ如本其脉多ハ沈澁ナリ

○水腫ノ疾ハ初發ハ先濕ヲ去リ小便ヲ利シ脾胃ヲ行スベシ實脾飲（四春水腫）ニ加減メ用ベシ或ハ胃苓湯ニ砂仁檳榔大腹皮山查ヲ加テ奇効アリ

○水腫腹ニ塊アル者ハ木香流氣飲ニ加減メ用ベシ

○水腫氣悶ニ屬スル者痰喘氣急ノ者ニハ分心氣飲ニ加減メ用ベシ

○脾胃虛弱中氣不行(メグラ)メ水腫スル二ハ六君子湯ニ沢瀉木通
木香砂仁炮姜ヲ加テ用ヨ神効アリ虛甚キ者ハ補中益氣湯
補中治濕湯茯苓沢瀉車前子砂仁ヲ加ヘ或ハ升陽益胃湯ニ
加減メ用ヨ

○腎水虛竭(カツ)レ水腫スル者ニハ加減金匱腎氣丸(田春補益ニ加減メ
用ベシ其効如神

○小瘡(ヒゼン)ナドヲ病デ外ヨリキビレキ藥ヲナシレ或ハ沐(モク)浴シナ
ドスレバ其瘡内ニ入リ其毒内ヲ攻(セム)端急甚ク遍身浮腫スル
ヿ多シ荊防敗毒散ヲ用テ發スレバ其瘡外ニ出テ腫消(ケス)スル也
又ハ分心氣飲ヲ用ユルモ宜シ熱ツヨク甚キ者ニハ防風通聖散
モ可也其内ニモ虛實ヲ辨ノ治スベシ皮膚ノ氣虛メ小瘡ノ毒

發スルヿアメワザル者アリ是ニハ補中益氣湯ニ羌活獨活連(レン)
ヲ加テ用ヨ其効如神

五疸

○黄疸(ダン)ノ症ハ五疸ノ名アリトイヘ雖(トモ)ニ皆脾胃ノ水穀濕(コクシツ)熱
相蒸(ムシ)テ黄ヲ發スル也先ヅ四苓散五苓散ノ類ニ茵蔯ヲ加テ
濕熱ヲ去ルベシ又ハ胃苓湯ニ茵蔯(インチン)ヲ加ルモ可也

○發黄甚キ者ニハ茵蔯散(田春五疸ニ加減メ用ベシ

○黄疸ノ症大便結實スル者ハ茵蔯大黄湯ヲ用テ下スベシ有ニ
奇効

○黄疸ノ症ニハ補脾ノ劑ヲ用ヒガタシ多ハ胃苓湯香砂平胃
散ノ類ニ加減スベシ其内脾胃(ヒヰ)極(キハ)テ虛弱ナル者ニハ六君子湯ニ

木香蒼朮沢瀉ヲ加テ有神効

○黄疸ノ症ニ生米葉茶壁土灰ノ類ヲ好テ喰フ者アリ田舂ノ四寶丹ニ宜シ加減製法本条ニ詳也可考

○黄疸ノ症黄ナル變ノ黒色ト成ル者ハ必ス死スル也不可治

○黄胖病ト云アリ黄疸ノ種類ニメ脾胃ノ敦阜ニメ濕熱積實ノ病也和俗ヲク病ト云ヒ又奴下ト云平胃散ニ鉄粉ヲ加テ細末メ用ヒ其効如神此症ヲ治スルニ本邦ニ傳来スル所ノ粉薬アリ皆鉄粉ヲ加味スルナリ方考消胖散ノ条下ニ詳ニ載スル可参考

諸血　嗽血　咳血　嘔血　咯血　溺血　便血　腸血　臓血

○諸血ヲ見ス者ハ其脉多ハ芤大ナリ沈細ナル者ハ治スベシ洪大ナル者ハ後必ス治シ難キ也一切ノ血症多ハ熱ニ属スルナレバ其薬多ハ清涼ノ剤ヲ用テ治スベキナリ

○諸ノ血証ノ中ニ吐血ノ証ヲ治シ難トス其中暴カニ紫血ヲ吐スル支多キ者ハ無事ナリ是平日熱傷ノ瘀血胃口ニアリ吐キ盡ノ佳也多ハ多酒ノ人胃口ニ酒熱ノ毒アッテ吐血スル者ナリ若止ムルヿ早ク吐シ盡ザレハ血結ッテ塊トナリテ治シ難キ也吐血ノ証ヲ治セバ犀角地黄湯四春血門ニ加減メ用ベシ此方ハ吐血ノミナラズ衄血咯噦ノ上竅ヨリ出血スル者ニ用ル所ノ主方也

○吐血ノ症血暈シ或ハ人支ヲ不知者ニハ先菩菜湯ニ人参ヲ倍加メ振出メ用ベシ奇々妙々也

○吐衄ノ上竅ヨリ出血メ人支ヲ不知者ニハ生脉散ヲ用

ヘシ奇々妙々

○婦人怒ニ依テ吐血スル者　八小柴胡湯ニ川芎當歸芍藥青皮山梔子ヲ加テ用ベシ奇々妙々逍遥散ニ茯苓（フクリヤウ）山梔子牡丹皮青皮ヲ加テ用モ吉

○先痰ヲ吐メ後血ヲ吐スル者ニハ熱ニ依テ痰火トナル也二陳湯ニ四物湯ヲ合シ山梔子柬白皮酒黄芩側栢葉地榆ヲ加テ用ベシ其効如神

○先ツ吐血アツテ後痰ヲ吐者ハ陰虚火動也滋陰降火湯滋陰至寶湯ノ類ニ加減メ用ベシ有二神効

○怒テ上竅（マト）ヨリ出血スル者ニハ清火滋陰湯（回春血門）ヲ用テ其効如神

○労役（ツカレ）ヲナメ吐衄血者ニハ補中益氣湯ニ麥門冬々五味子遠志茯神山梔子酒芍藥ヲ加テ有二奇効一或ハ加味飯脾湯或ハ痰ヲ挾（サシハサ）ム時ハ六君子湯ニ貝母當歸川芎側栢葉ヲ加テ用ベシ其効多端也

○腎水枯竭（コカツ）メ吐血シ盗汗（ヨウカン）遺溺（イデキ）スル者ニハ六味丸料ニ麥門冬々五味子ヲ加テ用ベシ有二奇効一

○卒（ニハカ）ニ吐血シ人支ヲ不知脈絶スルニハ獨參湯黒姜ノ乾姜ヲ加テ用ベシ有二奇効一

○氣逆上メ上竅ヨリ血ヲ見ル者ニハ諸ノ煎湯ニ童便少許加ヨ妙アルナリ

○衄血モ多ハ吐血ノ治方ニ同シ清衄湯（回春血門）ヲ用ヒ或ハ六稜（ムツカド）ノ

山梔子ヲ埶湯ニツケテ温テ鼻ノ内ヘ入テ塞(フサ)グヘシ其効如神

○咳血ハ清咳湯(回春血門)ヲ用ベシ効ナキ寸ハ六君子湯ニ桔梗貝母山梔子當皈ヲ加テ有奇効

○咯血ト八痰中ニ糸ノ如ク(ラク)ナル筋アルヲ云也是ハ腎中ニ火アル也清咯湯(回春血門)ヲ用ベシ無効寸ハ補中益氣湯ニ茯苓貝母山梔子蓽茇當皈ヲ加テ有奇効

○嗽血モ腎中ノ虛火動スル也清唾(ダ)湯(回春血門)ヲ用ベシ無効寸ハ前ノ補中益氣湯ノ加減ヲ用ベシ

○諸上竅(ト)ノ血出ノ症止テ後ハ調理(テウ)スベシ補栄湯(回春血門ニ加減メ用ヨ或ハ補中益氣湯ニ當皈ヲ倍シ芍藥麥門冬山梔子ヲ加ヨ痰アル者ニハ六君子湯ニ當皈芎藥麥門冬五味子貝母ヲ加テ調理スベシ

○下血不止者諸ノ血劑ヲ用テ無効者或ハ氣ヲ虧(ヘ)シ或役(ヤク)儀(ギ)勤労(キンラウ)ノ人下血スル類ニ香蘘散ニ當皈ヲ加テ用ヨ其効如神大祕密ノ一也黒灰ノ乾姜ヲ加ヘロ傳

○脾氣下陷(カン)シ脾胃虛弱ニメ血ヲ統(スヘ)ル事能(ヨク)ス下血スル者ニハ補中益氣湯ニ川芎地楡側柏葉ヲ加ヨ有奇効

○下血諸藥無効寸或ハ婦人ノ下血ナドニ逍遥散ニ川芎山梔子地楡側柏葉阿膠ヲ加テ有神効

加テ調理スベシ

○便血ハ大便ニ血ヲ出ス下血ニ同ジ多ハ臓腑ニ濕熱ヲ積蘊(セキウン)スル也糞(フン)前糞後ヲ不問或ハ腸風下血ノ類ニ先ヅ清肺湯(回春血門)ニ加減メ用ベシ

○下血不止者諸ノ血劑ヲ用テ無効者或ハ氣ヲ虧シ或役(ヤク)儀(ギ)勤労ノ人下血スル類ニ香蘘散ニ當皈ヲ加テ用ヨ其効如神大祕密ノ一也黒灰ノ乾姜ヲ加ヘロ傳

○脾氣下陷シ脾胃虛弱ニメ血ヲ統ル能ス下血スル者ニハ補中益氣湯ニ川芎地楡側柏葉ヲ加ヨ有奇効

○下血諸藥無効寸或ハ婦人ノ下血ナドニ逍遥散ニ川芎山梔子地楡側柏葉阿膠ヲ加テ有神効

○溺血ハ小便ニ血ヲ出ス也清腸湯（四春血門）ニ加減メ用ベシ逍遙散ニ木通檳榔山梔子車前子（ヤマクチ）ヲ加テ有」効

○溺血ノ症ニ東垣ノ升陽益胃湯ヲ用テ有」効

○夏月溺血スル者益元散ヲ用テ効アルコト多シ

汗証

○汗ノ脉ハ浮虛ヲ見ス也自汗盜汗共ニ多ハ陽盛ンニ陰虛スルノ症也當皈六黃湯ニ加減メ用ベシ此方盜汗ヲ治スルノ聖藥ナリ

○自汗スル者ニハ參芪湯（四春汗症）ニ加減メ用ベシ

○脾胃虛弱ニメ自汗盜汗スル者ニハ補中益氣湯（ホイフ）ニ牡蠣浮小麥（コムキヲ水ニ入ウキタルヲトリアゲ用ル）ヲ加テ用ベシ有奇効

○氣血兩虛ノ者自汗盜汗スルニハ大補湯ニ牡蠣浮小麥龍骨ヲ加テ用ベシ

○腎氣虛弱ニメ盜汗スルニハ六味丸ニ加減メ有」効

○陰虛火動ノ症勞咳自汗盜汗スル者ニハ黃芪鱉甲湯或ハ蓁艽扶羸湯ニ加減メ用ベシ

○風寒ニ感メ發散ノ劑ヲ用ヒ過メ汗出テ不止スハ元氣虛多ニメ風勞ノ証ト𠮟テ多シ六君子湯ニ黃芪當皈ヲ加テ用ヘシ或ハ補中益氣湯或ハ黃芪鱉甲湯ノ類ニ加減メ用ヨ有奇効

○黃汗（カン）ノ症ハ汗出テ衣ノ裏（ウラ）ヲ染（ソム）栢汁（シウ）ノ如シ是濕熱皮表ニ鬱（フセ）スル也茯苓補心湯ヲ用テ有」奇効田春ノ三仙酒ノ方ヲ用ルモ

可也サレ𪜈酒テ煎ル薬ナレバ人ニ依テ胸心悪クメ却テ別症ヲ生スル支アリ斟酌メ用ヨ

●血汗ノ症ト𪜈血ノ如クナル汗出テ衣ノ裏ヲ紅色ニ染ル症アリ多ハ脾胃不和ノ致ス所也補中益氣湯ニ酒芍藥防風益智ヲ加テ有効補心ノ剤モ可也故脾湯有奇効ニ愈テ汗出ル症ニハ生姜ヲ忌ヘレ何方ニモ生姜ヲ去テ用ベキナリ

癲狂

●癲狂ノ症ハ多ハ痰心竅ニ塞テナス所也其脉多ハ弦急滑實ノ類ヲ見ス也艱血清心湯（田春癲狂ニ加減メ用ベシ甚キ者ニハ防風通聖散ニ牡丹皮生地黄桃仁ヲ加テ効アリ

●火熱ニ因テ癲狂スル者ハ黄連解毒湯ニ加減メ用ベシ火熱心ヲ犯スヿハ多ハ笑ヒ狂スル也此方ニ半夏竹瀝姜汁ヲ加テ有効也

●心火ニ因テ發スルニハ朱砂安神丸ニ宜シ

●痰火甚クメ心竅ニ迷ヒ癲狂シ親踈ヲサケズ狂言笑哭スル者ニハ清心柳胆湯ヲ用ベシ有効

●婦人癲狂メ發スルニハ加味逍遙散ヲ用ベシ（田春癲狂）多ハ熱入ニ血室ニ因テナル所也

●熱痰ニ因テ癲狂スル者ニハ清熱導痰湯ニ加減メ用ベシ牛膽南星ヲ用テ効ヲ取ル多端也サレ𪜈牛膽ヲ用ルヿナシ啓益此物ニ換テ用ルニ一種アリ可秘口授心傳スベシ

癇症

○癇症ハ卒時ニ暈倒シ咬牙涎沫ヲ吐シ人声ヲ不省リノ声牛馬羊犬ノ鳴ヲナス火ノ中ニ癲狂メモ其ノキ支ヲ不覚ノ類也和俗此病ヲクツチノ病トシラフ多ハ痰火ナリ二陳湯ニ加減メ清心抑胆湯ヲ用ベシ有ニ奇効ニ

○癇症ニ滾痰丸ヲ用テ効ヲ取ル多シ（癇症門 痰門 春）

○癇症ヲ用モ佳也

○癇症常住ニ安神丸（癇門 春）ヲ用ベシ有ニ効ニ

○癇症ニ毎日薬一貼ヲ煎服スレバ一生涯ノ中癇症不発薬アリ啓益此方ヲ用テ効ヲ取ル多シ何ノ方ニモアレ其證ニ相應スベキ薬方ノ中ニ或ハ一味ヲ加ヘ或ハ二味ヲ加フ奇効此ニ味ノ薬ニアリ口授心傳スベシ其人ニ非レハ勿傳可レ秘

不寐

○不寐ノ症ハ多ハ驚悸怔忡ノ症ヲ兼ル者アリ皆痰涎心ニ沃キ心氣不足ノ所致也或ハ涼剤ヲ服スルヿ大過ヲ以此証ヲ發スル也高枕無憂散ヲ用ユベシ其効速也

○大病ノ後煩燥メ不寐者多シ竹茹温胆湯ヲ用ベシ有ニ神効ニ虚弱ナル者ハ加味飲脾湯ヲ用ヒ或ハ補中益氣湯ニ酸棗仁茯神ヲ加テ用ベシ有効

○多睡（ネムル）或ハ不寐（イネラ）者ニハ共ニ酸棗仁湯（癇 春 不寐ニ加減メ用ヨ）ヲ用ベシ虚ハ不睡寒也酸棗仁ヲ炒黒メ竹葉ノ煎湯ニテ服セヨ膽實ハ多睡ス多睡ハ熱也酸棗仁ヲ生ニテ末ニメ茶姜汁ニ調ヘ

服セヨ

●一不寐ノ症ニ始ハ清心抑胆湯ヲ用ヒ後ニハ艱血安神湯ヲ用ユベシ有効

驚悸

●一虚煩不眠者或ハ思慮ヲ過シ学文ノタメニ神慧倦スル類ノ者必有テ不眠病酸棗仁遠志石菖蒲茯神人参水煎温服スベシ有奇効

邪祟　モノタタリ

●一邪祟ハ衝悪ノ症トテ邪悪鬼魅ノ類ニ衝犯メ或ハ卒ニ顛倒シ人ヲ見ヲ不知或ハ譫言妄語シ高ニ聲テ歌笑スルノ病也其脉乍數乍疎乍大乍小或ハ促ヲ見ス結ヲ見ス者也其始ハ傷寒ニ似キル者也脉ヲ能ク診メ邪祟ニ極リタラバ金銀花一味

一ニ水煎メ用テ見ヨ邪祟ナラバ此藥ニテ火シ静ニナル者十ノ又ハ生大豆ヲ噛テ見ベシ邪祟ニアラザレハ腥トテ吐出ス邪祟ナレバ其辨ヘ十ニヒタト豆ヲ喰フ者也邪祟ニキハ一ツリタラバ巫覡浮圖ノ類ニ命メ祈禱シ又ハ藥ヲ服スベシ面春ノ辟邪丹ヲ用テ効多シ

●一本邦ニテハ多ハ狐狸犬猫ノ類婦人女子ニ妨ヲナメ邪祟ト十ニ或ハ大病ノ後氣血虚乏ノ時邪氣虚ニ乗メ入ル也病者虚羸シ邪氣勝ツ則ハ炙ス早ク祈テ邪ヲ退クベシ筑紫ノ方ニハ河伯ノ邪祟多シ金銀花ノ煎湯ヲ用テ有神効或ハ髪切ト云テ婦人或ハ童男童女ノ髪ヲアタヽカナル風吹来ルト覚テ結節ヨリ髪ヲフツト落メ其跡稠粘テ烏餅ナドヲ付タルヤウニ成テ

卒時ニ絶欠ニ至リ暫時アリテ甦(ヨミカヘ)リ寒熱往来シ傷寒ニ類スル病アリ關東ノ鎌(カマ)倉(クラ)ト云フ悪風ノ類也小柴胡湯ニ陳湯ヲ合シ遠志石菖蒲辰砂ヲ加テ用レバ有ニ奇効一周防長門ニハ犬神(イヌガミ)ト云邪祟アリテ狐ツキノ如クニ人ニ害ヲナス此邪祟ハ甘松香ヲ火ニ焼キ臭ヲ薫(タキ)ズレバ立処(タチドコロ)ニ其邪退ク也犬神ト云ハ犬ヲ殺シテ邪ヲコレラヘタルヲ云唐土(モロコシ)ノ蠱毒ノ類ノ如キ者カ土瓶ト云ハ小蛇ヲ土瓶ノ中ニ畜(タクハ)ヘ置(タクヲ)ク云此両種ノ邪祟ハ甘松香ニテ薫ズレバ其邪立処ニ退ク也周防國ハ代島ノ住医青木道説ト云者啓益ニ語リキ啓益木艸甘松香ノ條ヲ考ニ邪祟ヲ避ルノ能アリ啓益狐付ノ者ヲモ此甘松香ニテ薫ズルニ其効如神啓益又青木道説ニ邪祟ニ金銀花ヲ用ルトヲ傳フ青木氏國ニ皈テ犬神土瓶ノ邪祟ニ金銀花ヲ用ニ其効如神ト書翰ヲ通テ互ニ謝禮セレ也邪祟ノ症ト見キハメタル寸ハ狐ツキニテモ山猱(サル)ノツキタルニテモ猫ニタテモ甘松香ヲ以テ薫レ金銀花ノ煎湯ヲ用ベシ扨(サテ)又浮圖巫覡ニ命メ祈禱スベシ世間ノ医師ハ多ハ丹溪ノ虚病痰病邪祟ニ似タルトヲ云ノ論ヲ確守(カタクマモリ)シテ其ニ此所ニ委ク辨レ置(タク)也

○氣血両ヲ虧(カケ)テ痰心竅ニ迷ヒ痰火上衝メ神明昏乱シ譫言妄語スル者多ハ邪祟ニ似ギルヽ者十リ清心抑胆湯或ハ竹茹温胆湯ニ加減シ用ヨ虚甚キ者ニハ加味飲脾湯又ハ加味逍遙散ノ類ヲ用ベシ此症ヲ邪ヲ以テ治スレバ其害不旋踵(メグリカヘラヌ)也ヨクヽ脈ヲ診スベシ証ヲ辨レテ治スベキ也慎之

消渇（シヤウカツ）

◎消渇ノ症ハ口常ニ渇シ飲食ヲ欲スル也上中下ノ三消共ニ内虚シ熱アル故也小便不利メ渇スル者ハ内ニ燥（カワ）アル也上消ノ者ニハ黄芩湯中消ハ胃火也メ渇スル者ハ内ニ燥（カワ）アル也上消ノ者ニハ黄芩湯中消ハ胃火也人参白虎湯下消ハ腎火也滋陰降火湯已上皆ヲ用テ治スル丁大緊（カイ）也

◎脾胃虚弱ニメ消渇スル者多シ錢氏白朮散ニ麥門冬天花粉藕汁ヲ加テ有効

◎脾氣下陷（カン）メ津液上升スル丁能ハズ消渇スル者ニハ升麻葛根湯ニ四君子湯ヲ合シ當飯麥門冬ヲ加テ有奇効

◎消渇ノ症ハ多ハ腎水枯涸（コカ）メ心腎ノ氣不交（トヽラ）ノ故也六味丸ニ麥門冬五味ヲ加或ハ七飯丸ヲ用テ其効如神

◎消渇ハ血虚ニ屬ス四物湯ニ宜レト丹溪ノ説也加減委ク回春消渇門ニ見ニ考テ治セヨ

◎大病ノ後必津液枯竭（ケツ）メ消渇ヲ發スル丁有リ補中益氣湯ニ葛根麥門天花粉ヲ加テ有奇効

◎啓益常ニ消渇ヲ治スルニ東垣ノ甘露膏ヲ用テ効ヲ取ル多端也蘭室此方世医ノ常ニ不用ノ方也可祕東垣ノ生津甘露湯モ奇也

痓病（ソリヤマイ）

◎痓病ハ多ハ氣血虚シ風痰上リ攻（セム）テ身反吊（ツラ）レ身熱シ足冷卒ニ口噤（ツグム）目脉赤及張シ脚（ヒザ）如弓人ヲ不知和俗ツリケノ病ト

多ハ治シ難キ者也凡此証ハ濕ヲ治メ汗ヲ發スルヿ大過瘡毒ヲ治シ大ニ汗ヲ發シ或ハ婦人産後及小産後血ヲ去ヿ大過或ハ誤テ傷寒ヲ下スヿ大過スレバ必痙病ニ變ズル也又ハ折傷瘡口未合風ニ遭ヒ瘡口内ニ入レバ必ズ痙病ニ變ズル也名破傷風ナリ

●痙病ノ治方田舂ノ參飯類栄湯ヲ主トメ加減ノ用ベシ委クハ田舂ノ本条ニ見エ可考

●痰ト風ト上リ攻テ痙病ヲ發セバ先ツ神通ノ振出ヲ用テ後ニ二陳湯ニ羌活防風木瓜釣藤鉤ヲ加ヘ或ハ瓜蔞枳實湯ニ加減ノ用ヲ有神効

●産後小産後ノ痙病ニハ先ツ菩薬湯ニ釣藤鉤ヲ加テ用ヒ其後ハ蓁艽地黄湯方ヲ用ベシ有神効

●破傷風ニテ痙病ニ變ズル者ハ二陳湯ニ羌活防風殭蚕全蝎南星瓜蔞枳實桔梗黄芩竹瀝姜汁ヲ加テ有効

●痙病ノ類何ニテモ釣藤鉤木瓜ノ二味ヲ用ベシ何ノ薬方ニモ此二味ヲ加ベシ此家傳ノ極祕也此理ノ辨アリ口授心傳ノ祕密也其人ニ非ズ傳ルヿ勿レ

麻木　ナイスクム

●麻木ハ不仁也我身ヲ按スルニ麻痺ノ身ヒ覚ヘメ也十指麻スルモアリ手足麻スルモアリ或ハ手足モ左右ヲ分ツアリ渾身麻スルアリ左ハ血ニ屬スレハ多ハ血虚也右ハ氣ニ配スレハ多ハ氣虚トセヨ其脉多ハ浮ニメ濡也先加味益氣湯ヲ用ヘシ田舂麻木其効多端

●十指麻シ面目ニ至ル者アリ氣虛也補中益氣湯ニ唐羌活唐防風烏藥木香釣藤鉤木瓜ヲ加テ有ニ神効

●遍身麻スルニ烏藥順氣散ハ味順氣散ニ木瓜釣藤鉤ヲ加ヘテ其効多シ

●左半身麻スルハ血虛也四物湯ニ烏藥順氣散ヲ合メ用ヨ有効茯苓補心湯モ可也ハ味丸最好

●濕痺經絡ニアリテ麻痺スルニハ二陳湯ニ蒼朮烏藥木瓜薏苡仁釣藤鉤天麻南星ヲ加テ其効如神麻下ニ有ハ牛膝ヲ加ヘ薏苡仁ヲ倍スベシ

痿躄　テナイアシナイ

●痿躄ノ証ハ内傷虛損ノ所為也切ニ發散スヘカラズ其氣血ヲ補ヒ脾土實スル時ハ四肢運用燥潤ヒ宗筋骨ヲ束ネテ機關通利メ身体堅剛ナレバ何ノ痿ルコカアラント丹溪ノ確論也

●痿証ハ先ヅ參皈艱栄湯（四春痿躄門）ニ加減メ用ベシ

●痿症濕熱ニ屬スル者ニハ疎經活血湯或獨活寄生湯ノ類ニ加減メ用ベシ

●痿症氣虛ニ屬スル者ニハ補中益氣湯ニ木瓜薏苡仁木香釣藤鉤附子ヲ加テ有ニ奇効

●痿症血虛ニ屬スル者ニハ四物湯ニ蒼朮草薢木瓜酒黄栢ヲ加テ有ニ効

●痿症久不愈者ニハ虎潛丸（四春痿躄）ヲ常ニ服ベシ有効

●痿症多ハ腎虛也ハ味丸右皈丸六味丸左皈丸ヲ用ヨ有効

●痿躄ノ症ハ何ノ藥方ヲ用ルトテモ速効ナキ者也服藥日ヲカサ子半ヲ累テ効ヲ取ラントスレバ心長ク療治スベシ其子細ヲ病人ニ能サトメ藥ヲ服セシムベシ

鶴膝風

●脚氣ノ變ノ必鶴膝風トナルモノ多シ或ハ傷寒暑湿ノ邪氣脚膝ニ滞リ或ハ大病ノ後氣血虚弱足膝ノ氣虚弱ナルニ風湿ノ邪虚ニ乗メ此症トナル者多シ或ハ痛風久ク不愈足膝カラナク膝節腫痛シ脛痩テ鶴膝トナルモノ多シ或ハ大人小児共ニ痢病ノ後ニ此症ヲ發スル者多シ或ハ小児癖疳久ク不愈疲極テ此症トナル者多シヨク〳〵其病因ヲ考テ治ヲ施スベシ

●鶴膝風ト見ヘテ膝ノ曲腫痛脛脛痩テ柴ノ如ナルニ至テハ先ヅ大防風湯ヲ用テ加減スベシ方考大防風湯ノ条下ニ加減委ク註スル也多ハ効ヲ取ナリ

●痢後ノ鶴膝風ニ蓁艽地黄湯ヲ用ベシ有効

●風湿ノ邪勝テ氣血未虧者ハ獨活寄生湯疎經活血湯ニ加減メ用ヨ

●腎水虚耗シ或ハ痢後大病後ノ人鶴膝風ヲ患ヘ十全大補湯或ハ八味丸ニ海桐皮蒼耳子蓁艽穿山甲虎脛骨乾姜牛膝木瓜釣藤鉤ノ類ヲ加味メ可用委出方考

●小児疳癖ノ後鶴膝ニ至ル者ハ大防風湯ニテ家傳ノ保童圓ヲ用ベシ其効如神

鬚髪

○鬚髪ノ病ト云ハ別ニ苦ナレ只鬚髪ノ白ヲ世俗嫌(キラ)故ニ諸ノ医書ニ皆白ヲ變(ヘ)レ黒トナスノ方ヲ載ス然レ𪜈老(オイ)テ鬚髪ノ白クナルハ常也何ホド烏髪(ウバツ)ノ藥及酒藥ヲ服メモ多ハ黒ニ変スル事少ナリ諸書ニ白髪ヲ染(ソメ)ノ藥方ヲ載セ或ハ藥肆ニ販(ヒサ)グ其應驗(オウケン)如神サレ𪜈染テ黒メタルモ旬日ホド經レバ其髪根ノヒタル所白キ者也老テ鬚髪ノ白クナルハ血ノ潤沢(ニウヒメノウルヲ)拈涸スルノ支ニシテ冬ニ成テ草木ノ枯槁スルニヒトレケレバ何ホドノ水ヲソヽギ培艹(ウルヲ)メ𪜈枯ル、所ノ草木ニ益ナキニ等(ヒト)シカルベシ摠テ人父母ヨリ禀(リン)受(ウケ)スル所ノ形体自然ト厚薄アル者ニメ其衰ル所モ薄キ所ヨリ始ル者也是故ニ或ハ目ヨリ先ニ衰ル者アリ歯ヨリ先ニ衰(オトロ)ル者アリ耳ヨリ先衰ヘ髪ヨリ先衰ル者アリ是ヲ以テニレハ鬚髪ノ白ト病トナメ治スルニ及ヒジキ(ヒ)ク生ズル者アリ和俗若白髪(ワカジラガ)ト云是不治メ可也四十計ヨリ鬚髪白キ者ハ血虚腎虚ニ属スレバ味丸等ヲ用ベシ諸ノ方書ニ烏鬚髪ノ藥方載ス可参考

○大病ノ後髪頻ニ脱落(タツラク)スル者アリ山梔子一味水煎メ温服シ外ハ真笹葉(サヽノハ)煎(アユスリヨツ)ノ用ヲ煎メ洗ベシ其効如神

○婦人童男童女共ニ髪毛稠粘(シウデン)メ櫛(クシ)ニテトキ分難ク是ヲ洗ヘバ猶更粘(ネバ)ル者アリ脾胃ノ氣不升ノ故也啓益常ニ異功散升麻葛根湯ヲ合シ當帰ヲ加テ用ルニ其効如神可シ祕

面病

○面ニ瘡ヲ生ズルハ上焦ノ火也清上防風湯(面瘡面門)東垣ノ清上

浮火湯或ハ白芷升麻湯ノ類ヲ用ベシ面ノ瘡汁出ル者ニハ荊防敗毒散甚キ者ニハ防風通聖散ヲ用ベシ方考本方ノ條ニ詳ニス可考

●面ノ熨スルハ陽明ノ風熱也升麻黄連湯 同春 面病 面寒スル者ハ陽明經ノ虛寒也升麻附子湯 同上 面紫黒ハ陽明ノ病ナリ升麻白芷湯 同上 此等ノ類見合テ用ベシ

●面ニ粉剌ヲ生ズル者アリ清肺湯 同春 面病 可用

●十五六歳ノ童子ハ月ノ當ニ欲圓日ノ當ニ升ント欲スルノ時ナレバ必面ニ皰ヲ生ズル者多シ滋陰降火湯ヲ用レハ其効如神

●面部兩顴腫テ不痛不痒腫タル所色付ヲナク數日ヲ歴ル者アリ是脾氣不升ノ症也四君子湯ニ升麻葛根湯ヲ合レ黄芪防風柴胡山梔子連翹ヲ加テ用ヨ其効如神

●面部ニ細ナル疣ヲヒレト生ズル者アリ是モ四君子湯ニ升麻葛根湯ヲ合レ酒黄芩連翹山梔子ヲ加テ用ヨ外ハ生天南星ヲ以テトタトヌレバ自然ト疣落失ズル也可秘

●面部ノ瘡或ハ粉剌皰ノ類ニ清上浮火ノ剤ヲ用ルヿ數貼ニメ無効寸ハ四君子湯ニ升麻葛根湯ヲ合レ黄芪防風連翹山梔子當皈酒芩ノ類ヲ用レバ其効如神啓益經驗ノ妙方ニメ世医ノ所不知也可秘

耳病

●耳ノ竅ハ腎ニ通ズレバ耳病ハ腎ノ病也其内腎虛ト腎火トヲ分テ治スベキナリ

○両耳腫痛スルハ多ハ風熱也荊防敗毒散或ハ荊芥連翹湯（回春）耳門ニ加減ノ用ヨ何モ細辛少許ヲ加ヘヨ妙也可秘

○脣味胃火ヲ動シ両耳聾シ或ハ耳ニ瘡ヲ生ズル類ノ者ニハ防風通聖散ニ酒煨ノ大黄ヲ加テ用ヨ其効如神

○両耳俄ニ疼痛シ腫者ニ清上瀉火ノ剤ヲ用テ効ナキヌハ藿香正氣散ニ細辛ヲ加テ有神効

○虚火上升シ痰氣耳中ニ鬱滞シ耳鳴耳聾スル者ニハ通明利氣湯（回春）耳門ヲ用ベシ有効

○上焦熱アツテ耳内膿ヲ生ジ或ハ耳鳴耳聾スル者ニハ蔓荊子散（回春）耳門ヲ用ヨ有効

○停耳ノ症モ蔓荊子散ヲ用テ有効或ハ防風通聖散ナドヲ見合テ用ベシ小児ノ停耳ニハ藿香正氣散ニ宜シ愈テ停耳ノ症ニ諸ノ清火ノ剤ヲ用テ効ナキヌハ升麻葛根湯ニ四君子湯ヲ合シ烏薬連翹防風山梔子當帰川芎ヲ加テ用レバ其効如神

○耳鳴耳聾ノ者ハ多ハ腎虚ニ属ス六味丸ヲ用ベシ腎虚シ火熾者ニハ滋陰降火湯ヲ用ベシ有奇効

○怒氣ニ因テ耳鳴耳聾スル者ニハ小柴胡湯ニ四物湯ヲ合シ龍胆細辛釣藤鈎ヲ加テ其効如神

鼻病

○鼻ニ清涕ヲ流スハ多ハ風寒ニ感冒スル症ナレハ参蘇飲ノ類ヲ用ベシ其薬ニテモ効ナキヌハ陽明ノ實熱ト心得ヘシ藿香正

氣散ヲ用ベシ有神効又ハ升麻葛根湯ヲ用テ効ヲ取ルヲ多シ
加様ノ薬方ヲ用テモ効ナキ寸ハ脾胃虚メ肺氣耗散スト心得テ
異功散六君子湯等ノ方ニ升麻葛根芫胡ヲ加ヘ又ハ補中益氣
湯ニ羌活防風葛根ヲ加ベシ其効如神

○鼻衄血ノ薬ハ失血ノ論中ニ詳ニ出ス可シ考

○鼻淵ノ症ハ鼻ニ濁涕ヲ出メ不止也荊芥連翹湯 咽喉 鼻門 ヲ用
ヘシ有効

○鼻ニ香臭ヲ不聞者ハ肺經ニ風塾アル也麗沢通氣湯 咽喉 鼻門
ヲ用ベシ有効如是ノ方ヲ用テモ効ナキ寸ハ肺ノ虚也補中益氣
湯ニ羌活防風白芷葛根ヲ加テ有神効

○酒齇鼻ハ酒毒ナレバ葛花解醒湯ヲ用ベシ又ハ熱火ニ属ス
レバ防風通聖散ヲ用ヨ有神効外ハ白散ニ軽粉硫黄枯礬ヲ
加テ寒ノ水或ハ臘雪ノ畜水ニ調テ擦ヘシ黄連大黄ヲ加モ最好

○鼻痔ハ肺火也實スル者ハ防風通聖散ニ加減メ用ヨ虚弱ナ
ル者ニハ升麻葛根湯ニ當飯川芎連翹酒芩防風山梔子ヲ
加ヘヨ有効外ヨリ燔針ヲ用テ焼切ベシ杏仁ノ皮尖ヲ去テ半泥
トナシ綿ニ包テ鼻中ニ入ヨ有神効

口舌

○口舌腫痛スル者或ハ口舌瘡ヲ生ズル類ノ者ハ共ニ三焦ノ
實熱也大半皆胃熱ニ属ス分テ之ヲ言バ舌ハ心ニ属スレハ心
火トナメ可治只脾胃ニ属スレバ胃火ニ属シ或ハ中氣ノ不足
トナメ可治

○口舌瘡ヲ生シ咽喉腫痛シ大便閉スル者ハ是三焦ノ實熱ナリ先ズ用テ涼膈散加減スベシ或ハ清胃ヲ用ヒ甚者ハ防風通聖散ヲ用ベシ風邪ノ熱滞ルニ久ク咽痛口瘡ヲ生セハ荊防敗毒散或ハ小柴胡湯ニ連翹防風葛根升麻ヲ用ベシ有効

○口舌ニ瘡ヲ生ジ發熱惡寒労スルすハ体倦テ飲食ヲ思ザルハ中氣ノ虚熱也補中益氣湯ニ麥門冬五味子黄柏ヲ加テ用ベシ有神効或ハ中氣不足メロ舌瘡ヲ生シ口乾キ咽渇シ湯ヲ飲不食セバ錢氏白朮散ヲ用ベシ有神効

○口舌ノ病先ヅ舌ノ尖ヲ刺テ血ヲ出シ其熱毒ヲ泄テ其急ヲ救ノ術也凡口舌ノ病諸ノ涼薬ヲ用テ効ナキすハ必用ニ附子理中湯ベシ其効如神可秘

○口舌ノ瘡ヲ生ズルニ諸ノ涼薬ヲ用テ効ナク又附子理中湯ノ温熱ヲ用テモ効ナキ時ニ加味逍遙散ニ連翹桔梗ヲ加ヘテ用ヨ其効如神

○口舌瘡ヲ生ズルニ以上ノ薬ヲ用テモ効ナキすハ味丸ヲ用ベシ是無根ノ虚火也滋陰降火湯モ有神効

○舌疽ト云病アリテ舌腐爛シ舌根又ハ舌上巖穴ノ如ニメ膿ヲ出ス者ハ不可救多ハ吐血メ炎ズル也此症ハ必固ク辞メ治スベカラス百ニ一生モナキト知ルベシ

牙齒

○牙齒ノ病ハ陽明ノ熱也上下ノ牙齒腫痛不可忍寒熱往来頭腦肩胛ニ牽引シ滿面赤熱スル類ハ多ハ辛熱厚味ノ

ノ物ヲ過食スルノ変熱也清胃散ニ宜シ加減委ク方考ニ載ス可考但春牙歯門ノ清胃散又ハ清胃湯共ニ有効又瀉胃湯モ牙歯ノ痛ヲ治スルヿ如神

○口ヲ開テ風ヲ呷ス二牙歯疼痛シ口ヲ開テ臭氣不可聞者ハ腸胃ノ風邪ト腸胃ノ積熱トナリ共ニ當帰連翹湯（但春牙歯）有効

○蟲食歯痛甚キ者ニ定痛散（但春牙歯）ヲ用ヨ有効慥テ齲歯ハ胃熱也清胃散ニ加減メ用ヨ小児ニ多キ症也小児ノ蟲歯ハ脾胃ノ食尠也藿香正氣散ニ葛根連翹ヲ加テ用ヨ虚弱ナル小児ハ七味白朮散ニ陳皮砂仁連翹ヲ加テ用ヨ大人ニモ最宜シ共ニ有神効ヿ

○齲歯痛甚キすり子ヲ細末メ糊ニテ丸シ蟲食ノ穴中ニ入ヨ有神効又ハ延齢丹ヲ蟲食ノ穴ニ入ヨ有奇効ヿ

○歯ノ縫（スキ）メヨリ血ヲ出ス者ニ蕺東坡（但春牙歯）ヲ用ヨ有神効ヿ

○歯ノ病品多シ共ニ皆胃中ノ熱也諸ノ医書ヲ考テソレ〳〵ノ症ニ相當スベキ薬ヲ見合テ用ヨ如是メ治シ難ハ東垣ノ神効丸ヲ煎湯ニメ用ヨ有奇効加減効能方考ニ詳也可考

○小児走馬牙疳和俗ハクサトニ云牙床一時ニ腐爛シ不救ニ至ル皆上焦ノ濕熱也消疳散（但春牙歯）ヲ牙ニスリヌルベシ有効此症ハ殊外ナル急症ナレバ速ニ治スベシ防風通聖散ヲ用テ有神効ヿ

○歯ハ骨ノ餘テメ腎ニ屬スルナレバ腎虚ノ人多ハ宣露歯齦腫痛シ脱落スルニ至ル房支ヲ愼ミ雪味ヲ禁スベシ晝ハ補中

益氣湯夜ハ六味地黄丸ニ黄柏ヲ加テ用ヨ有神効

○齒動揺メ不固者ハ赤辛螺ノ殻中ニ塩ヲ入テ藜蒸汁モ
ニタルヲ塩ニヌクゲハ塩ノカサヘルヿ也其時ニ又塩ヲ殻ノ中ニツメ
コミテ又藜蒸ノモミ汁ヲヌリ其カサヘリタル時ハ塩ヲ又新
ニ其上ニツメコミテ殻中ハイニナリタル時火ニクベヤキテ殻白
クボロ〳〵トナリタル時取出シサマシ殻共ニ藥研ニテヨロシ
壺中ニ畜ヘ置テ毎朝此細末ノ粉藥ヲ楊枝ニツケテ牙歯
ヲスリ磨ベシ歯弱メ楊枝ヲツカフヿナリ難ハ指ニツケテ牙歯
ヲスルベシ其後涼水ニテ漱ク時ハ自然ト歯固クナル也毎朝
如是ニ此法ヲ懈ラザレバ生涯歯ノ病トミフヿナシ大祕妙也

眼目

○眼目ハ相火ノ上衝ニヨル也熱火ヲ清利スベシ清肝明目湯
ヲ用ベシ一切ノ風熱ニ因テ赤腫疼痛スル者ニ有神効俗ニ云風
眼熱ノ類ナラバ必老若共ニ此方ヲ用ベシ

○風眼甚キ者赤腫テ其痛不可忍頭腦ニ牽引シ眉稜如
裂ナル者ハ王宇泰ノ羌活勝風湯ヲ用ユベシ敗毒敗ニ當皈
芍藥生地黄細辛防風荊芥薄荷ヲ加タル方也其効如神風
眼ノ痛甚キ者ハ必吹破テ瞳子損シテ失明ニ至者多シ是大
疫ノ症ト心得ベシ庸医ハ心ヲ用ルヿ能ハズ鹿暴ニメ風眼ハタヤスキ症
ト思テ治ヲアヤマル類多シ風眼赤暴急痛大便秘ル者ニ防風
通聖散ヲ用ベシ其効如神

○風眼熱眼ニハ家傳ノ洗藥ヲ以テ頻ニ洗セヨ當皈川芎

赤芍藥大黄黄連黄栢連翹薄荷各等分紅花枯巻木賊減半ニメ水煎ジ洗フ毎度重湯ニテ温テ頻ニ洗ベシ其効如神

○風熱ノ眼病以上ノ薬ヲ用ヒ熱退キ眼ノ赤ニ薄ク腫消セバ頻ニ風薬清熱ノ剤ヲ服スベカラズ防風飲子助陽和血湯ノ類ニ加減メ用ベシ有神効

○風眼ニ頻ニ風薬清熱ノ剤ヲ服スルヿ過度シ眼液燥テ涙出ルヿナク難渋メ開キガタク遠視テ見ザルハ虚眼ノ症也加味逍遥散冲和鶏胃湯助陽和血湯ニ血薬ヲ加ヘ甚キ者ニハ大補湯ニ肉桂ヲ去リ蔓荆子白豆蔻ヲ加テ用ヨ或ハ晝ハ補中益氣湯ニ加減メ用ヒ夜ハ六味丸ニ五味子白豆蔻ヲ加テ用ヨ其効如神

○内障ノ青盲ハ療治ナキ者也惣テ内障ハ薬効見ヘ難キ者也多ハ脾腎ノ虚ニ属ス補中益氣湯ニ防風蔓荆子白豆蔻ヲ加ヘ大補湯ニ肉桂ヲ去リ蔓荆子白豆蔻ヲ加ヘ六味丸ニ加減メ用ヨ冲和鶏胃湯モ宜シ外ヨリ眼科針ヲサシテ膿出テ治スル者多シ眼科ノ如キ手ニ非ンバ此術ヲ爰スベカラズ

○外障ノ症ハ先風薬ヲ血薬ニ配剤メ芩連ノ類少許ヲ加テ用ヨ効ナキヲハ加味逍遥散助陽和血湯防風飲子ノ類ヲ用ベシ有神効

○拳毛倒睫ハ何ホド其毛ヲヌキテモ跡ヨリ生ズル者也眼科如神手驗ヨリ血ヲヌキ或ハ眼涯ニ灸ス取効ヿ多シ防風飲子ヲ用ヨ其効如神

●雀目ノ症多ハ小児ニアレ者也小児ナラバ疳氣トナメ治スベシ
家傳保童圓ヲ用ヒ十四五歳ノ童子色欲ヲ過シ雀目トナル沖
和艱胃湯ヲ用ヨ有神効和俗雀目ノ症ニ鯛魚ノ子塩辛ヲ喰
スレバ必有効トテ用ル者アリ温補スル物ナレバ神効アル也可秘又
ハ鰡魚ヲ小児ノ雀目ニ用ル多シ有神効大人小児共ニ鰻鱺魚
腸ヲ用レバ雀目ヲ治スルヿ如神雀目ノ症黄疸ニ変シ黄胖ニ
変スルヿアリ香砂六君子湯補中益氣湯ノ類ヲ用ユベシ有神
効

●憊テ眼目ノ病初發ハ風藥ニテ發散スベシ中ゴロハ風藥ヲ本
トメ血藥ヲ用ベシ助陽和血湯加味逍遙散ノ類ニ宜シ久キ
時ハ補中益氣湯大補湯六味丸四物湯ノ類ニ加減メ用ヨ

眼科ノ者ノ内藥ハ必苦寒ヲ用ルニ偏ナレバ脾胃ヲ損シ元氣ヲ
伐ツ類多シ眼病久ク愈ズンバ東垣ノ蘭室秘藏ニ應驗ノ方
多シ可考眼目ノ論ハ古今医統医學綱目銀海精微等ノ書
ニ詳也考テ治ヲ施スベシ眼目ノ方ハ東垣ニ本ヅキテ治スベシ常
ニ説ガ如ク予カ門ニ遊者ハ東垣ノ治方ニ因テ治スベシ辨惑論脾胃論
ニ非ズ諸病共ニ東垣ノ流ニ滞泃スベシ獨眼病ノ
蘭室秘藏ヲ常ニ誦スベシ世医ハ只東垣ハ医中ノ王道トノミ心
得テ補藥ヲ用ルト計思ヒ補中益氣湯ヨリ外他ノ方ヲ不知類
ノ者多シ東垣ノ血脉ニ不至者也可笑支ナリ予ガ東垣ヲ信
スルヿハ口授心傳多可秘

咽喉附喉痺梅核氣

◎咽喉腫痛シ或ハ瘡ヲ生シ或ハ喉閉塞メ言語スル能ハザル者ハ倶ニ是風熱痰火ノナス所也清涼散（咽喉痺ニ加減メ用ベシ）清胃涼膈散ノ類ヲ見合テ用モ吉

◎咽閉テ飲食不進不能言語ハ急證也其脉両寸洪溢ナル者也急ニ不救ハ必ス急ニ火劇ノ穴（大脂内側ニアリ）ヲ針メ毒血ヲ出スベシ其効如神必痰涎ヲ吐出スルヲ要トスル也

◎咽喉閉塞シ飲食言語不通者急証也吹喉散救急方ニ（咽喉ノ類ヲ用テ速ニ治セヨ多ハ風痰熱火ニ属スル所ナレハ清熱化痰ノ剤ヲ用ベシ

◎喉痺乳鵝ノ症咽塞不通ニ山豆根ノ細末ヲ管ニテ吹入ニ有神効枯礬ノ細末ヲ吹モ有効五倍子ノ細末ヲ吹モ有効熊胆甘艸等分布ニテマブシ含ムベシ有神効（野猪ノ胆モヨシ）

◎喉痺喉風ノ家傳ノ妙方アリ乳香散ト号ス訶子乳香薄荷草紫檀各等分ニメ梅干ノ肉ヲ三分一加ヘ布ニ包テ含ム津口中ニ満ハ吐出スベシ内ニノミテモヨシ有神効奇々妙々可秘

◎喉痛者ハ甘桔湯妙也甘艸桔梗各等分水煎シ服スベシ此方薬品少ク薬効速也其効如神

◎陰虚火動ニ因テ咽痛スル者ニハ四物湯ニ酒黄芩酒黄連ヲ加テ可用或ハ滋陰至宝湯降火湯ノ類ヲ用ベシ奇効アリ

◎咽痛ノ病ニ清冷解毒化痰ノ剤ヲ用テ効ナクハ附子理中湯ヲ用ヨ其効如神

◐咽痛疼甚ハ始ハ參蘘飲ニ桔梗ヲ倍シ用ヒ或ハ二陳湯ニ桔梗黄芩砂仁山梔子蘘荷ヲ加テ用ヒ有二神効一

◐梅核氣ノ症トテ七情ノ氣尊結スルニ因テ痰咽喉ノ間ニアツテ咯(カク)吐不(ト)出嚥(ノム)下不(ト)下咽ノ間ニ梅核(カリ)ノ如クナル者アリ或ハ破絮(キレ)ノ如クナル物アルカ上氣喘急スル者也加味四七湯ヲ用ヒ其効如神此ニモ乳香散ヲ合(フリ)ムベシ其効如神此症ハ婦人尊(タフト)キ人多キ人或ハ飲食ノ時惱怒ニフレテ多ハ此症トナル開鬱順氣利膈化痰清肺ノ劑ヲ用ベシ分心氣飲ニ蘘梗ヲ加(クハ)モ最(モツトモ)有二神効一

濁症

◐便濁ノ症ハ赤白共ニ濕熱ノ所為(ナス)也腎経虛損ノ濁ヲ成(ナス)者多シ痩(ソウ)人ハ虛火ニヨル肥人ハ濕痰ニ属ス多ハ思慮(シリヨ)ノ人憂鬱(ユウウツ)ノ人此症アリ清心蓮子飲ニ加減メ用ベシ有二神効一

◐赤白濁(メハクリ)ヲ治スルニ水火分清飲(四春濁門)ヲ用ヒ有二神効一

◐痩人ノ濁症ニハ滋陰降火湯ニ加減メ有効

◐肥人ノ濁症ニハ二陳湯ニ草蘚(ヒカイ)蒼朮當歸川芎山梔子赤芍藥(ヨクキナ)ヲ加テ有神効

◐白濁ハ腎經虛寒ノ者多シ萆薢益智石菖蒲烏藥各等分水煎シ少許鹽ヲ入テ空心ニ服ス有効

◐脾胃虛寒ノ濁ニハ六君子湯ニテ下セ肝脾鬱滯ニハ六味丸ヲ六君子湯ニテ下セ脾肺ノ氣虛ニハ六味丸ヲ補中益氣湯ニテ下セ有効

◑赤白濁症諸方無効時ニ升麻葛根湯ニ四君子湯ヲ合シ
萆薢石菖蒲達志車前子ヲ加テ有神効
◑赤白濁症種々ノ薬ヲ用テモ効ナキ時ハ加味逍遙散ニ萆
薢石菖蒲車前子ヲ加テ其効如神此奇々妙々ノ秘方也可秘

遺精

◑遺精ノ症ハ多ハ心腎不既濟ノ故也或ハ年火ノ人強テ情慾
ヲ制テ飛ノ滿溢スルカ如クナルハ勿藥可也其外ノ症ハ心熱也
先ヅ清心蓮子飲ニ加減シ清心湯（同書遺精）難心湯（同上）ノ方後ヲ見
合テ加減メ可用皆有効多ハ白濁ノ治方ニ同シ參考メ用ヨ
◑陰虛火動ニ因テ遺精スルニハ滋陰降火湯ニ加減シ保精湯
（即春遺精）ヲ用ヨ有効

◑遺精不止者諸書ノ遺精門ヲ考テ薬ヲ用テモ効ナクバ升麻
葛根湯ニ四君子湯ヲ合シ石蓮肉遠志防風黄芪酸棗仁當帰
ヲ加テ有神効
◑脾胃下陷スレバ必ズ遺精ス補中益氣湯ニ防風車前子石
蓮肉ヲ加テ有神効
◑遺精久ク不止者ハ腎虛ニ屬ス六味丸ヲ可用有神効腎ノ
陽氣衰弱メ遺精スル者ハ八味丸ヲ用ベシ有神効

淋證

◑淋症ハ五名アリト雖モ多ハ心小腸ト膀胱トノ熱也初發ハ
先ヅ五淋散ニ正散龍胆瀉肝湯ノ類ニ加減メ用ヨ委ク方考
ニ載タリ可參考

●熱實ノ淋病ニテ疼痛甚ク血便ヲ下ス者海金砂散 四春淋症ヲ用ヨ其効如神

●熱淋症寒熱往来スルニハ小柴胡湯ニ滑石沢瀉木通ヲ加テ有ヨ効

●三焦ノ實熱ニテ淋病ヲナサバ防風通聖散ヲ用有ヨ効

●食滞久ク不行中脘ニ痞スレバ淋病ヲ發ス藿香正氣散ニ木通沢瀉ヲ加テ用ヨ有神効或ハ行氣香藘散ニ木通沢瀉車前子ヲ加テ用ヨ有神効或ハ疝氣膀胱ニ攻入テ淋病スル者ニハ是モ行氣香藘散ニ疝氣ノ加減メ可用委ク方考ニ出可参考

●七情ノ氣鬱シ或ハ思慮憂愁ノ人淋病ヲ發スル者ニハ分心氣飲ヲ用テ加減スベシ方考ニ詳也釣藤鉤ヲ加ヨ其効如神

●脾胃下陥メ淋病ヲ發スレバ補中益氣湯ニ加減メ用ヨ又ハ四君子湯升麻葛根湯ヲ合方ニメ用ヨ共ニ方考ニ詳也釣藤鉤ヲ加ヨ其効如神

●淋病ノ症世医多ハ通藥ヲ用テ効ナキすハ必術盡テ通藥未足トメ而ニ速通ノ剤ヲ用テ愈其氣下陥ス故ニ淋病即時ニ不愈メ旬日ノ上モ効ナキすハ月ヲ渉リ年ヲ重テ不愈ニ至ル已ガ術ノ拙支ヲ不言メ淋病ハ藥ノキカヌ者ト云也可笑淋病ニ通藥ヲ用テ効ナキすハ氣ノ下陥ト知ルベシ東垣ノ升陽益胃湯ヲ用ヘ委ク方考ニ出ス也可考升陽益胃湯ノ方後ニ小便罷テ病増劇ヲ加ヘバ茯苓沢瀉ヲ去ベシト云東垣ノ説ヲ暁通セザル者ハ淋病ヲ治スル事有ヘカラズ又淋病ニ釣藤鉤ヲ加ヘ用ル事ハ

大祕藏ノ妻也此二義ハ口授心傳ノ祕密ニメ其人ニ非ンハ傳ル
ヿ勿レ可レ祕

○淋病五淋ヲ不問諸藥ヲ用テ効ナキ時ハ逍遙散ニ酒芩車
前子鉤藤鉤ヲ加テ肝經ヲユルムルヿ其効如神世醫ノシラザ
ル所也可レ祕

○淋病諸藥ヲ用テ効ナク痛甚クメ不可忍叫喚メ隣ヲ動ス
類ノ如ニ黄芪建中湯ヲ用ヨ其効如神甘ハ能急ヲ緩スルノ義
也此ヲ發明ニメ世醫ノ所不知也可レ祕

○久淋多ハ腎虚也六味丸八味丸ヲ用ヨ加減金匱腎氣丸モ
有効

遺溺

○遺溺ハ多ハ心腎ノ氣動テ傳送度ヲ失スルノ故ナリ清心蓮
子飲ニ加減メ用ヨ有レ効

○氣虚メ遺溺失禁セバ參芪湯（回春遺溺）ヲ用ヨ有レ神効又ハ補
中益氣湯ニ益智石菖蒲酸棗仁山茱萸ヲ加テ用ユベシ有ニ
神効

○夏月伏暑ノ勢ニ因テ遺溺セバ人參白虎湯ヲ用ヨ効アリ清
暑益氣湯モ可也

○心腎ノ氣不足メ遺溺スル者ハ皷膵湯ヲ以テ六味丸ヲ用ヨ
其効如レ神

○十歳以前ノ小兒ノ遺溺ハ多ハ脾胃ノ虚寒也錢氏白朮
散ニ益智乾姜草薢ヲ加ヘ用ヨ其効如レ神

○老人溺多者ハ虚寒也附子理中湯ニ益智ヲ加テ用ヒヨ其効如神

○壮年多溺者虚寒也滋陰降火湯ヲ用ヒヨ有効

○大人小児共ニ遺溺失禁小便頻數(ヒンサク)ナル者ニ腰眼ノ穴命門ノ穴脾俞腎俞膀胱俞ヲ灸スヘシ其効如神

小便閉

○小便不通者ハ多ハ熱結也通薬ヲ用テ通利スベシ猪苓湯加味五苓散(回春本条ノ類ヲ可用有効

○渇メ小便不利者ハ熱邪上焦ノ分ニ有也清肺飲(回春本条ニ加減メ可用有効

○不渇メ小便閉スルハ熱下焦ノ分ニ有也通關丸(回春本条ヲ用ヨ其効如神

○老人及痩人血虚メ小便閉スルニハ四物湯ニテ通關丸ヲ用テ其効如神

○痰喘メ小便不通者ニハ二陳湯ニ酒芩山梔子木通車白皮木香ヲ加テ用ヒヨ其効如神

○元氣虚弱ノ人或ハ大病ノ後虚損ノ上ニテ小便不通ニハ補中益氣湯ニ車前子ヲ加テ用ヒヨ其効如神

○陰虚メ火盛ニメ小水不通者ニハ滋陰降火湯加味金匱腎氣丸ヲ用ヒヨ有神効

○小便不通ノ症ハ急症ナレバ速カニ治スベシ若嘔噦(モヨヲエツ)メ小便不通者ハ難治ト心得ベシ若中滿皷脹(マンキ)ノ病小便不通モ亦難

治ノ症也辞退ノ仕ニ譲ルベシ

大便閉

○大便閉ハ熱結ニ属スル多ハ大腸ニ熱アリテ津液(シンエキ)枯竭スルニ
先ツ潤腸湯(回春本条ニ加減ノ処ニ委ク回春ニ載ス)カレカワキ
○老人虚人血虚ノ大便閉者加減潤腸湯(回春中風ヲ用テ有ニ
神効ニ)
○痰中脘ニ鬱滞ノ不行大便閉者ハ二陳湯ニ升麻葛根
ヲ加テ其効如神此丹溪先生ノ妙方也小児ノ大便閉ニ此方
ヲ用ヒ保童圓ヲ下セバ其効如神
○汗出ルト多ク津液枯竭シ或ハ産後去血過多ノ津液枯渇
シ共ニ大便結燥(カワク)スル者也四物湯ニ桃仁麻仁人参麥門冬ヲ

加テ其効如神

○虚弱ノ人大便結スルト數日ニメ諸ノ潤燥(ウルオイ)活血ノ剤ヲ用テ
モ効ナキ時ニ補中益氣湯ヲ以テ備急圓(ビキウマン)ヲ下スベシ其効如
神大便通セバ前薬ヲヤメテ八物湯ヲ用ヨ
○大便不通ニハ外ヨリ蜜導(ミツダウ)ノ法香油ヲ谷道(ヤドウ)ニヌリ入レバ即時(ツク)
ニ通ズ其製諸書ニ詳也一方ニ四物湯ニ味噌ヲ藥ノカサホド
入テ水煎シ竹管ニテ肛門ニ吹入レバ必速(ハヤク)効アリ可シ秘
○傷寒熱結大便不通者ハ枳實大黄湯兼氣湯ノ類ノ方
後ニ詳(ツマビラク)也方考ニ載ス諸書ノ傷寒門ニテ可シ治
○老人常ニ大便結スルニハ八物湯ニ桃仁麻仁郁李仁紅花ヲ
加テ服スベシ

大小便閉

○大小便不通者ハ急証也宜ク實大黄湯并氣湯ノ類ニテ速ニ下スヘシ或ハ鐵脚丸顛倒散(本條春ノ類ヲ用ヘシ)

○大小便不通ニ蝸牛膏最妙也蝸牛ヲ殼共ニ研碎キ泥ト十ニ麝香少許入テ臍中ニ填ニ紙ニテ上ヲ貼ス田螺ヲ以テ右ノ如クスルモ佳也共ニ有神効 ○枯茗少許麝香少許臍ニ入ルモ吉 ●琥珀ノ細末ニ麝香ヲ加ヘ糊ニテ丸シテ臍中ニ填ツヘシテヨシ其効如神以上ノ臍ニ入ル藥小便不通ニ用モ亦可也

○夏月伏熱ニ因テ二便不通者ニ白虎湯ヲ以テ益元散ヲ用ヘシ有神効

○冬月寒ニ中リテ二便不通者ニ五積散ヲ以テ木通ノ細末ヲ服スレバ其効如神

○疝氣ニ因テ大小便不通者ニハ行氣香蘇散ニ疝氣ノ加減ノ方ヲ用ヨ有神効神通丸ヲ兼用ルモ佳也方考ニ載ス可考

痔漏

○痔ハ多ハ酒色過度厚味ノ人必腸澼メ痔トナル也先ツ蓁艽防風湯蓁艽羌活湯ノ類ヲ見合テ用ヨ蘭室秘藏ノ中ニ妙方多シ考テ可用

○新久ノ諸痔肛邊腫痛シ或ハ瘡ヲ生シ痒キ時膿血ヲ出ス者ニ當皈連翹湯(回春痔門)ヲ用ヨ有効

○痔疼痛シ不可忍者ニ加味逍遥散ニ蓁艽連翹ヲ加テ用ヨ其効如神

○脾胃虛弱ノ者ノ痔疾脫肛ノ類ノ病ハ下陷ニヨル升提スベシ
提肛散補中益氣湯ニ防風蓁艽連翹益智ヲ加テ用ヨ其効
如神
○痔瘡久ク潰トナリテ肛邊穴ヲ生ジ膿血ヲ出ス者ニハ平臓
九（回春痔門）ヲ用ヨ外ハ驅毒神應膏（外科ヲ貼スベシ有神効
○痔漏膿血ヲ出スニ神雪湯（回春痔門）ヲ用ヨ有奇効

脫肛

○脫肛ハ肺ノ藏ノ虛寒スル故也參芪湯（回春脫肛）ヲ用ヨ有神効
○脫肛ノ病新久ヲ不問提肛散ヲ用ヨ有神効
○氣虛及ヒ脾肺ノ氣虛シテ脫肛スルニハ補中益氣湯ニ防風
益智連翹茯苓酒芩蓁艽ヲ加テ有神効

○久痢久泄ノ後必脫肛スル者也補中益氣湯ニ防風茯苓益
智山藥ヲ加テ用ヨ其効如神
○小兒泄痢ノ後必脫肛ス錢氏白朮散ニ升麻防風ヲ加テ其
効如神疳疾アラバ家傳保童圓ヲ兼用ヨ有奇効
○老人氣血虛メ脫肛セバ大補湯ニ防風升麻附子ヲ加テ用ヨ
有奇効ハ味丸モ佳也
○臨産努力メ產レ畢テ脫肛スル者アリ保產湯ニ升麻防風
ヲ加テ用ヨ氣弱キ產婦ニハ補中益氣湯ニ川芎防風酒芩藥
ヲ加テ用ヨ共ニ有神効

牛山先生活套卷之中終

婦人部一　調經二
帶下四　虛勞五
小產十　產育十二
婦人陰病十八　經閉三
小兒摠論二十一　驚風二十一　血崩三
小兒雜病二十五　痘瘡三　妊娠七
外科三十五　瘡疽三七　乳病十七
便毒三七　下疳瘡三八
疥瘡癬瘡四二　疣疣四三　癖疾四四
小兒麻疹三四八ウ　瘰癧馬刀三七　疔瘡三七
楊梅瘡三九　瞤瘡四一
癩風四　癮風四

折傷（セツ）　四四
毒獸傷（テウジウ）　四七
金瘡　四五
中毒（トク）　四八
救急　五十
破傷風　四六
湯火傷（タウクワ）　四六

被髪翁　眞庵　香月啓益　著

婦人部

○婦人ノ病外感（カン）内傷（シヤウ）共ニ男子ノ病ニ不異（コトナラ）只月經アルヲ以テ其品種々ニ別アリ婦人ノ病ヲ治セハ先ツ月經ノ事ヲ能ク問テ治ヲ施（ホドコ）スベキ也

○室女ハ其病多クハ氣鬱（ウツ）ヨリ發（ハツ）スレバ鬱ヲ開キ氣ヲ順（シタガ）ス ベシ正氣天香湯ノ類ノ方ニ加減メ用ヨ

○寡（クワ）婦（フ）ハ其病欲（ヨク）鬱（ウツ）メ氣順セザルヨリ發スルナリ分心氣飲（ヤモメ）正氣天香湯ノ類ニ加減メ用ヨ

○虚弱ナル婦人ハ逍遥散ニ加減メ用ヨ

○脾胃虚弱ニメ痰アリ常ニ頭痛眩暈スル婦人俗ニ血ノ道煩ト云フ半夏白朮天麻湯ニ加減シ六君子湯ニ當ル

酒芍藥天麻ヲ加テ有効

○婦人産後ハ氣血ヲ補フベシ産後大抵氣色モ能ク床ニツクイモナノブラッキアリテ不足シ血ノ道持ト云テ生涯病者ナル者アリ逍遥散ニ加減シ八物湯ニ加減シ六君子湯ニ加減シ或ハ家傳荅菜湯ノ類ヲ用ベシ

○心脾ノ二藏常ニ婦人ハ虚鬱スル者ナレバ加味歸脾湯ヲ用テ効アリ上ニ載スル所ノ數条先ヅ婦人平生ノ病也此等ノ藥ヲ用テ通治ノ方トナスベシ餘ハ又〳〵門ニテ可参考

調經

○婦人ノ諸病ノ起ハ月經ノ不調ニヨル也經水或ハ前ニ或ハ後ニ或ハ多ク或ハ少ク或ハ月ヲ踰テ来或ハ一月ニ両ビ来類是皆不調ノ故也調氣類血湯千金調經湯旧春調經ノ類ニ加減メ用ヨ有二奇効

○調經ノ主方ハ逍遥散ニ加減スベシ經水期ニ先テ来ル者ハ血熱也本方ニ酒黄芩山梔子泽瀉川芎生地黄阿膠艾葉ヲ加ヨ經水期ヲ過テ不来痛ヲナス者ハ血虚有寒也本方ニ川芎泽瀉草肉桂我朮烏藥木通紅花藘木ヲ加テ經水来ントメ痛ヲナス者ハ血實氣滞也本方ニ川芎生地黄泽瀉草黄連桃仁紅花玄胡索牡丹皮我朮ヲ加ヨ經水来寸

心腹疼痛腰脚ニ攣引スル者ハ瘀血也本方ニ川芎生地
黄桃仁玄胡索莪朮青皮ヲ加ヨ經水行テ後痛ヲ止ス者ハ本
方ニ川芎熟地黄人參白朮黒炒ノ乾姜ヲ加ヨ經水期ヲ過テ
来リ色紫黒ニメ塊ヲ成ス者ハ氣鬱血滞也本方ニ川芎芍藥
草牡丹皮青皮紅花玄胡索生地黄ヲ加ヨ經水期ヲ過テ来
リ色淡キ者ハ痰多シ本方ニ陳湯ヲ合シ川芎生地黄ヲ加ヨ
以上ノ加減調經ノ通治也共ニ有奇効

經閉

○經閉ノ症ハ多ハ氣滞リ血凝ル故也室女寡婦ニ多也先ヅ
鬱氣ヲ開クベシ正氣天香湯ニ四物湯ヲ合シ莪朮青皮紅
花藕朮玄胡索ヲ加テ用ヨ其効如神

○經閉ノ症腹脹満スル者ハ治シ難シ壮盛ノ婦素ヨリ實症ノ
人ナラバ四春ノ通經丸甘露丸等ノ峻剤ニテ押下スベシ此等ノ
藥ハ峻急ニメ毒藥ナレバ容易ニ用ヒ難シ能脉症ヲ詳ニノ此方
ヲ用ベシ虚弱ナル婦人ニ用ルナカレ然ル時ハ有故無損ト云テ病ニ
中テ元氣ニ妨ナキ者ナレバ能病人ヲ診シ得テ峻剤ヲ用ル時ハ
其効速疾也ヨクヽ工夫メ可用キ

○婦人虚弱ニメ經閉スルハ血脉枯竭スル故也通經調氣湯
滋陰百補丸四春經閉ノ類ヲ用テ有効加味逍遥散ニ桃仁紅花
ヲ加ルモ亦有効

○室女經閉メ咳嗽發熱スル者ニハ壮丹皮湯四春經閉ヲ用ヨ滋
陰至宝湯加味逍遥散ニ川芎芍藥草陳皮貝母紅花ヲ加

テ用ベシ有二奇効
○婦人經閉積塊アル者ハ四物調經湯（回春）（經閉）ヲ用ベシ有効
○婦人経閉ノ者加味逍遙散ニ泡（ホウブシ）草川芎紅花ヲ加テ家傳神通丸ヲ用ヨ其効如神

血崩

○血崩ノ症ニ虚實新久ノ不同アリ初テ發メ實症ナラハ清熱解毒ノ剤ヲ用ヨ四物湯ニ黄連解毒湯ヲ合シ或ハ四物湯ニ涼膈散ヲ合メ用ヨ有二奇効
○崩血不（ヤマ）止者ニハ膠艾四物湯ヲ用ヨ其効如神
○崩血不（ヤマ）止者ニ血暈（クラミ）メ人事ヲ不（ヤマ）知類ニハ先ツ蒼莱湯ヲ振出メ用ヒ甚キ者ニハ獨參湯ヲ用テ元氣ヲ無（ムカ）何有ノ地ニカヘシ其後ニ膠艾四物湯ヲ用或ハ逍遙散ニ阿膠艾葉地楡側栢葉ヲ加テ用ベシ其効如神
○崩血ノ勢ヒ緩ニタラバ益母湯（回春）（血崩）ヲ用ヒ或ハ逍遙散ニ地楡阿膠ヲ加テ用ヨ或ハ（ウニモ）物湯ニ黒炒ノ泡（ホウブシ）草阿膠地楡ヲ加テ其効如神
○崩血ノ症面黄三四肢困倦（コンケン）腰膵痛ミ煩（ハン）熱メ不（ヤマ）安者脾氣不行血ヲ統（スベ）ルヿアタハザル故也補中益氣湯ニ防風川芎酒芍藥酒黒炒ノ黄栢ヲ加ヘ或ハ加味歸脾湯ニ阿膠地楡ヲ加ヘ或ハ異功散ニ當歸芍藥阿膠地楡側栢葉ヲ加テ有二奇効共ニ見合テ可（シ）用

帶下

○帯下赤白共ニ月經不調房欲過度ニ因テ發スル或ハ産後血虛ノ胃中ノ濕痰下流スルノ故也先ヅ逍遙散ニ澤瀉地楡ヲ加テ用ヒ或ハ八物湯ニ阿膠黒炒ノ乾姜ヲ加テ用ヒ共ニ神効アリ

○帯下赤白共ニ氣血ノ虛ニ屬スル者ハ加減八物湯（用春帯下）ヲ用ヒ其効如神

○帯下ハ濕寒ニ屬シ及ビ濕痰下流者ハ五積散ニ苡草小茴香吳茱萸ヲ加テ其効如神

○帯下白キ者ニハ加味逍遙散ニ白薇冠花ヲ加テ用ヒ帯下赤キ者ニハ加味逍遙散ニ赤薇冠花ヲ加テ用ヒ共ニ有神効

○帯下アツテ羸痩シ四肢無力困倦スル者ハ脾胃虛弱ニメ濕下流スル也補中益氣湯ニ茯苓半夏ヲ加ヘ加味歸脾湯ニ半夏沢瀉ヲ加ヘ六君子湯ニ升麻柴胡川芎當歸ヲ加テ用ベシ共ニ神効アリ

○帯下ノ症ニハ腰眼脾俞腎俞命門穴天樞痞根ノ諸穴ヲ灸スベシ薫臍ノ法モ可也出于入門可考

虚勞

○婦人ノ虚勞ハ七情ノ氣鬱結メ相火熾盛或ハ経水不調變テ虚勞ト成ル始ハ發熱自汗盜汗咯血漸々ニ羸痩シ咳嗽吐紅ノ不救ニ至ル又産後脱血シ或ハ産後百日ノ中ニ房事ヲ過シ氣血耗散メ前症ニ至ル是ヲ産後ノ蓐勞ト云難治先ヅ逍遙散ニ加減シ滋陰至宝湯滋陰降火湯

大補湯ノ類ニ加減ノ用ヨ共ニ有神効委方考ニ載可参考
○先風寒ニ感シ咳嗽不止日久ノ労咳ノ症ト九ニハ先ツ茯苓補心湯ヲ用ヨ無効ナハ黄芪鱉甲湯ヲ用ヨ共ニ有神効加減委ノ方考ニ載ス可参考
○婦人ノ虚労咳嗽發熱ノ者ニ滋陰ノ劑ヲ用テ効ナキニハ蓁艽扶羸湯ヲ用ヨ有神効此方藥味薄メ病人滋補ノ味厚キ藥ニ飽タル時アレバ飲ヨキニ因テ多ハ驗ヲトルナリ
○室女寡婦慾鬱氣鬱メ虚労ノ症ニ似テ紛乱類多シ分心氣飲ニテ家傳神通丸ヲ下セバ胸膈ノ氣舒暢メ其病自ラ愈ル也可ヒ祕
○脾胃虚弱ナル婦人虚労ノ如ク煩テ大便不調ハ脾胃虚労也補中益氣湯ニ貝母山藥五味麥門益智ヲ加テ有神効参苓白朮散モヨシ六君子湯ニ蓁艽桔梗山藥ヲカルモヨシ

○産後ノ蓐労ニハ大補湯ニ貝母桔梗五味子鱉甲蓁艽ヲ加テ其効如神ハ味丸ヲ常服スベシ有効

求嗣

○求嗣ノ論及藥方諸書ニ載ストイヘ𪜈多ハ虚妄ノコトノミ也啓益豊前ニ在シ時婦人古土富貴草トイフ双紙ヲ作テ印行ス今世間ニ行ル此書ニ求嗣ノ説委ク論ヲ載ス此書ヲ見テ求嗣ノコトヲ知覺スベシ故ニ爰ニ畧ス
○婦人求嗣ノ事ヲ欲セバ先ヅ己ガ心行ヲ慎ミ弟一ニ嫉妬

ノ情ヲ發セズ夫婦共ニ和合シ病アラバ藥ヲ服シ虚損ヲ覚ヘバ夫婦共ニ上手ノ醫師ニ診セラレテ其藏府ノ虚損ヲ補ヒ平日無病ナル時交合スベシ姙セズトイフコトナシ

○下部虚寒スル婦人ハ姙ムコトナシ温泉ニ浴メ子宮煖マリ姙ム者多シ其國々ノ温泉アル所ニ行テ湯治スベシ其効多シ温泉ナキ所ニテハ當帰四五斤ヲ大釜ニテ煎シ居風呂桶ニ入テ浴スベシ此方奇々妙々

○陰虚シタル婦人ハ六味丸ヲ服シ姙ムコト多シ

○精血清冷稟賦薄弱ナル夫婦共ニ固本健陽丹ヲ服シテ効ヲ得ルコト多シ　囲春　求嗣

○求嗣ノ藥方諸書ニ載スルコト夥シ考合テ用ベシサリナガラ多ハ損アリテ益ナシ只房支ヲニタリニ負ルヘカラス夫婦ノ氣血充實スル時交合スレバ多ハ子ヲ生ズ子ナキ者仕官ノ人ハ江戸結ヲシ商人ハ他國ヘ行テ數日逗留シ故國ノ交合スレバ夫婦共ニ氣血充實スル故ニ必ス嬰姙ス是ヲ以テ知覚スベシ

姙娠

○姙娠ハ多ハ脉ニ見ルヽ者也其脉狀諸書ニ詳也可參考惣テ若キ婦人一両月モ経水不来時ハ姙娠アリヤト心ヲ付テ診脉スベシ姙娠ナレバ多ハ脉平和ニメ脉狀不疾者也二三ヶ月ニナレハ惡阻ノ氣ザレアリテ悪心嘔吐万ノ食物ニ臭アリテ好悪ノ差別アル者也如是脉症共嬰胎ニ窮リタラハ大堅ノ病ニハ服薬スベカラズ姙娠ノ疑似時ニ驗胎ノ方ヨリ逐月ノ護胎ノ方

五ケ月帯ノ支總テ産前諸病ノ議論婦人壽岬ノ中ニ委ク
載タリ可二參考一

◎姙婦ノ諸病ハ服藥ヲナサズメ可也サレ𪜈大家富貴ノ人強テ服藥ノ一ヲ望ム者ニハ異功散ニ當皈砂仁黄芩ヲ加テ用ヨ或ハ回春ノ安胎丸ヲ用ベシ共ニ奇効アリ

◎妊婦素ヨリ虚弱ニメ胎孕ヲ榮艱シ難者ニハ補中益氣湯ニ芍藥川芎砂仁黄芩ヲ加テ有二奇効一

◎妊婦悪阻ノ症トテ月經止ルト其儘胸心悪ク鼻ニ物ノ臭ヲ忘リ甚キ者ハ嘔吐悪心ス多ハ三ケ月マデノ煩ニメ其ヲ過レバ治セサレ𪜈必ズ止ム者也人ニヨリテ五ケ月ノ比マデモ止ヌ者モアリ多ハ藥ヲ用テモ効ナク或ハ煎藥ナドハウケツケズメ其ハマヽ吐スル者アリ如二是ナル一ニハ砂仁ヲ押シテ砕トナレテボッくトツヽスレハ藥ノ如クナクレテ能悪阻ノ症ヲ治スル也○悪阻ハ多ハ痰胸膈ニアル故也ニ陳湯ニ黄芩砂仁連翹ヲ加テ用ヨ有神効甚キ者ニハ前藥ニ黄連姜製少許ヲ加ヨ其効如レ神悪阻ノ藥ハ一貼ヲ七分ホドノ分量ニメ一番煎バカリヲ用ベシ一度ニ少ヽツヽ與テ可也霍香ナドノ類惣テ臭ノアル藥ヲ用ユベカラズ

◎子煩ノ症ハ心神悶亂スル也ニ陳湯ニ半夏ヲ去テ麥門冬黄芩砂仁竹葉ヲ加テ有レ効

◎子癎ノ症ハ産婦ノ大凶症也口噤ミ眼目吊鉤スル也羚羊角散（四春姙娠門子癎ニ出ヅ）ヲ用ベシ子癎ノ催アル時ニ此方ヲ用レバ多ハ

收ル也●子癎ノツヨキ症ハ癲癎ノ病ノ如ク反吊シ痰喘急促頻ニ齒ヲ咬ミ口噤眼目吊鉤スル類ニハ先ヅ其標ヲ治スベシ家傳神通ノ振藥ヲ用ヒ二陳湯ニ姜製ノ黄連鈎藤鉤ヲ用ベシ其効如神痰喘退キ其病勢少ク收リ九時ニ羚羊角散ヲ用ベシ子癎ノ治方ニハ種々手段多シ口授心傳ノ大秘支也子癎ノ症ニ頻ニ齒ヲ鼓シ牙ヲカミ舌ヲ出シ病勢ツヨキ者舌ヲカミ切テ灰スルアリ如是キビシキ症ニハ木綿ノ小手拭ヲカマセテ置ベシ必ズ舌ヲクヒ切ノ患ナシ何程勢ツヨキ子癎ノ症モ子産ルレバ必收ルモノナレバ何トゾシテ子ヲ生ズル手段ヲナスベシ是ニ至テ口授心傳アリ其人ニ非ザレハ傳ルコトカレ可シ祕

●子懸ノ症トテ胎動ニヨツテ心胃脹痛スル也紫蘇和気飲ヲ用ヨ惣テ産前ノ諸病ニハ此方ニ因テ可加減

●子腫ノ症ハ妊婦ノ面目虚浮スル也多ハ脾胃虚弱ニ属スル也補中益氣湯ニ黄芩沢瀉砂仁ヲ加テ用ヨ或ハ六君子湯ニ黄芩砂仁沢瀉ヲ加テ用ヨ共ニ有神効

●子氣ノ症ハ両足浮腫スル也夏月ノ妊娠ハ十ニメ八九ハ腰足必腫ル者也皆脾氣虚弱ナル故也補中益氣湯ニ車前子沢瀉ヲ加ヘ或ハ異功散ニ當帰芎藭升麻車前子ヲ加ヘ或ハ回春子氣ノ主方モ可也共ニ有効

●子淋ハ小便渋少也二味安胎飲白朮黄芩ニ赤茯苓木通車前子麥門冬淡竹葉ヲ加テ有ニ奇効此方ヲ四五貼用テモ

効ナクンハ紫蘇和氣飲ヲ用ベシ是ニテモ効ナクンハ胎氣下墜
メ膀胱ヲ妨ゲル故也升提ノ劑ニ宜シク補中益氣湯ニ唐防風
茯苓車前ヲ加ヘ或ハ升陽益胃湯ニ加減シ或ハ升麻葛根
湯ニ四君子湯ヲ合シ蛇胡山梔子防風ヲ加テ用ヒ元氣上升
メ小便自ラ快通スル也是大秘支也議論委ク方考ノ升陽
益胃湯ノ条ニ載ス可ニ参考一

◐胎動スルニ因テ妊婦ノ諸病ヲ生ス紫蘇和氣飲ヲ用テ
胎ヲ安ンズレバ諸病自ラ愈ル十リ

◐轉胞ハ卒ニ小便スルヲ得ザル也二味ノ安胎飲ニ久ク葵子
木通滑石ヲ加テ用ヒ其効如神面春ノ轉脬ノ主方モ可也
如是ニメモ通シ難ニハ二陳湯ニ瓜蒂ヲ加テ煎服シ鳥羽ヲ喉

ニ入テ捜レバ痰ヲ吐出メ小便自ラ通ズ此法尤妙也如是ニノモ通シ
兼バ補中益氣湯ニ防風羌活ヲ加ヘテ中氣ヲ上提スレバ其効
如神

◐妊婦ノ崩漏ハ虚ニ属ス血卒ニ漏下スル也芎歸湯ヲ用ヘシ或
ハ膠艾四物湯ノ類ヲ用ヒ共ニ有神効甚キ者ハ人参ヲ不知口
噤スル也獨参湯ヲ用テ元氣ヲ無可有ノ地ニカヘスベシ此手段ニ
口授心傳ノ秘アリ其人ニアラズンハ傳ヘナカレ可秘

◐妊婦ノ諸病夫々ニ因テ治スベシ但胎禁ノ薬物ニ心ヲ付テ治
ヲ施スベシ妊婦ノ傷寒ハ妊婦ノ瘧妊婦ノ食傷ノ類ハ剛暴ノ病ナ
レバ胎禁ノ薬ヲ厭テ治ヲ緩クニスレバ却テ邪熱ノ為ニ胎ヲ落サ
ル、事ナレバ其門々ノ条ヲ考テ治スベシ素問ニ故アレバ

無損トアリ能ク此理ヲサトリテ治スベシ妊婦五ヶ月ニテ胎落チ安キ者ナレバ必ズ胎禁ノ薬物ヲ斟酌スベシ六ヶ月ノ後ハ胎モ健ナレハ胎禁ノ薬ニ中テモ墮胎ノ患ナシ殊ニ況ヤ産月ノ時ニハ胎禁ノ薬ト云ヘハナレ然ル大毒ノ類ノ薬物ハ斟酌スベシ是ロ授心傳ノ秘也

小産

◐小産ハ五ヶ月ニテノ中ニ必ズ保養ノ法ニ背キ或ハ虚弱ノ人其胎ヲ保ツコトアタハズメ墮ル也古人云小産ハ大産ヨリ重シ大産ハ栗ノ熟メ自脱スルガコトシ小産ハ生栗ヲ採テ其皮殻ヲ破リ其根帯ヲ斷ガ如ク自然ノ支ニアラズト云テ大切ノ支トナセリ保嬰将息大産ヨリ十倍スベシ

◐小産氣虚シ血下支不止モノハ四春補氣嬰血湯ヲ用ベシ此其大概也

◐小産療血ヲツテ心腹疼痛悪寒發熱スルニハ補血定痛湯ヲ用ヘシ此二方小産ヲ治スルノ常法也

◐小産血下ルコト過タナレバ人支ヲ不省口噤痙癖搐搦天吊メ痙病ノ如ク破傷風ノ如シ如是ナルヲハ先ツ荅菜湯龍王湯白朝散十五味湯ノ類ニ人参ヲ倍加シ見合テ用ベシ血暈ヤ三棱癍ヤニテ補氣嬰血湯ヲ用ベシ虚甚クメ前証ヲ見サバ獨参湯ヲ用ヘシ虚甚クメ前証ヲ見サバ獨参湯ヲ用ヒ荅菜湯ト互ニ用ヒハ正氣服ノ其効如神

◐小産ノ後血熱アツテ不止或ハ寒熱往来セバ増損四物湯ヲ用ヨ其効如神

◎小産ニ下血四五日モ不止者ニハ膠艾四物湯ヲ用ベシ其効如神

◎誤テ毒物ヲ食シ或ハ毒藥ヲ服メ胎ヲ墮ス者腹痛メ不可忍或ハ其胎未墜者口噤手強自汗痺痙似ニ中風者毒物ノ致ス所也九灸一生ノ病也世醫多ク不識風トナシテ之ヲ治シ必ズ灸スル也白扁豆一味濃煎メ用ヒバ其病立処ニ愈ル也是大祕藏ノ事也啓益經驗ノ靈方ニメ世医ノ不知処ナリ此一味ノ應驗微妙ノ義理存スル口授心傳ノ矣祕事也

◎小産後諸症退キテハ氣血ヲ補ベシハ物湯大補湯ノ類ニ加減ノ用ヒ又ハ逍遙散ニ加減メ用ヒ脾胃虚弱ノ婦又ハ毒藥毒物ニヨツテ小産シタル後ハ補中益氣湯ニ白扁豆ヲ加テ

調理スベシ

◎小産後腹痛泄瀉スルニハ六君子湯ニ白扁豆砂仁ヲ加ニ用ヒ又ハ東垣ノ升陽湯ヲ用ヒ其効如神

産育

◎産育ハ臨産ノ事諸書ニ詳也婦人壽命ニ委ク其手段ヲ書載タリ常ニ此書ヲ讀テ其事ヲ究メ置ヘキナリ

◎産婦ヲ医ニ委子賴時ハ臨月ニ入ラバ預メ藥ヲ調合メ病家ニ備ヘサセ置ヘシ苦肚湯紫蘇和氣飲苦菜湯安神散等ノ藥方ニワレくノ用ヒヤウ又ハ用ル時節ヲモ上包ニ書付置ベシ出産ノ支ハ昼夜ヲ不弁者ナレハ賴委タル医在宿セザル時モ此藥ヲ用ヒ其間ニ医モ皈来テ其手当ヲ能ク朝鮮ノ

好人参ヲ病家ニ調ヘ置スベキ也
●産婦臨月ニ腰腹痛ムヿアラバ先ヅ紫蘇和氣飲ヲ用テ見合スベシ脉六至已上ニノ胎、谷道ノ邊ニ来リ疼痛頻ニノ漿水破レ下ラバ芎帰湯ヲ用ヨ即産下スル也是平産也
●催生ノ方ハ産セントノ胎産門ニ来リ至リ児ノ頭ヲ見ハメ少時モ出難キ時ニ平胃散ニ滑石冬葵子ヲ加テ用ヨ忽ニ産下スル也和俗ハ産ノ氣付クト其ヤ〳〵医ニ催生藥ヲ乞ヘ圧卒尓ニ催生ノ劑ヲ用ルヿ無レ催生ノ方ハ児ノ頭産門ニ至ラズンハ用ルヿナカレ姑婆ノ類頻ニ催生ノ方ヲ乞望ナラバ紫蘇和氣飲ヲ用テ見合スベシ口授心傳ノ祕也
●妊婦産セント欲メ痛疎カニメ三四日モ産セズ破水先ヅ下リテ産スルヿナケレバ産門乾キ澁テ難産トナル破水下テ一日二日ニハ多ハ氣脱七ハ補中益氣湯ニ酒芍藥川芎木香ヲ加テ用ヒ何日ニテモ産ノアルヲ待ベシ如是スレバ漿水又滋生ノ産道潤ヒ出テ産レ易キ也此大祕妙也
●生産十症トニフヿ諸ノ医書ニ詳ニ載タリ可参考
●難産ニ變レ横産側産ノ類ニハ紫蘇和氣飲二人参ヲ倍加メ用ヨ蛇脱衣一銭焙テ細末メ酒ニテ可用有効
●難産ス胎不下者ニ麝香五分官桂三分細末メ黄酒ニテ用ベシ其効如神
●胎腹中ニ死テ疼痛ノ母死ントス欲スル鹿角ノ黒焼ヲ酒ニテ

服ノ其効如神●又一方熊胆五分水煎服スベシ其効如神

●難産ニ伏龍肝百草霜滑石冬葵子甘艸細末ノ苧飯湯ニテ服スレハ其効如神

産後

●産後ノ脉ハ緩滑沈細ニ宜シ實大弦牢濇疾ハ皆危也

●産後ノ症先虚實ヲ不問古苧飯湯ヲ用ベシ陳皮人參ヲ加ヘ紅花少許ヲ加テ用ヨ其効如神産後ハ何ホド容易ノ産ニテモ血脫スレバ産落スト其ニ苧飯湯ヲ用ベシ人參ヲ加テ氣ヲ補フベシ陳皮ヲ加テ藥滯ヲメグラシ紅花少許ヲ加テ用レハ瘀血ヲヲイ順ス因テ此方ノ藥驗如神

●産ニハ苧飯調血飲ヲ用ベシ古苧飯湯ヲ用ル十一日許ニメ後ニ苧飯調血飲ヲ用ユベシ加減委ク方考ニ載ス可參考

●産弱ノ婦人ノ産後ニハ飯未保産湯ニ加減メ用ユベシ方考ニ載ス可參考

●産後ノ血暈ニ先ツ虚實ヲ不問若菜湯ヲ振出テ用ヨ或ハ白朝散十五味湯龍王湯ノ類ヲ見合テ振出ノ用ベシ又ハ東垣ノ全生活血湯ヲ煎テ用ヨ此五種ノ藥方ハ用ニ口傳多シ産後ノ血暈ニ世医多ハ童便ヲ用テ血塾ヲ下スト云テ推ナベテ童便ヲ用也血塾實ニ属スル者ハ可也虚塾ニ属スル者ニハ全生活血湯ヲ用ベシ委ク此議論方考ニ載ス可參考

●産後大ニ脫血スレバ血暈メ不知人事者必灸ス急ニ救ベシ大料ノ獨參湯ヲ用ベシ若口噤テ牙歯不開藥汁不入ハ獨參湯ヲバ

鼻ノ穴ニ吹入ルベシ咽ニ通テ則甦ルナリ緩クニスレバ必ズ死スルナリ是故ニ産前ヨリ獨參湯ヲ煎ジ置ベキ也産下メ一時二時ノ間ニ大ニ脫血スレバ必ズ血暈メタハ言語レナガラ即死メ不救ナタレ此時ハ大料ノ獨參湯（三匁ヨリ五匁ニ至ル量多少口傳）ナラデハ別ニ治方アラス陽旺ズレハ陰長ジ氣ニ因テ血生ス口授心傳ノ談論アリ其人ニ非ズンバ傳ルコトナカレ可秘

●産後胞衣不下ノ症ハ急症也産下スルト半時ホド過テ下ルヨシ一時ノ余モ不下時ハ芎歸湯ニ肉桂ヲ加テ用ヒ有効半日或ハ一兩日モ不下モアリ一時ノ余モ不下時ハ芎歸湯ニ平胃散ヲ合シ滑石百霜草冬葵子ヲ加テ押下スベシ如是メモ不下時ハ先ツ腎帶ヲ斷テ服藥スベシ此治法緩クナレハ腹脹満シ心胸ニ冲上テ喘急メ急ニ至ル也腎帶ヲ斷テ後モ不下者ハアレ共ソレハ急ニ變症出ルコトナレ産婦ニヨリテ胞衣不下ノ數日ニメ瘀血下ニ從テ水毋ナトヲ刻ニタル如クニナリテ下ル者アリ産毋ニヨク教ヘサトメ心安ノコト知シメテ補氣補血ノ劑ヲ用テ置時ハ自然ニ下ル也

●胞衣不下心腹疼痛シ叫嘯メ隣ヲ動ス類ノ者ニ熊胆五分或一戔水煎服スベシ立チ処ニ下ル也奇々妙々可秘

●産後ノ児枕痛ニハ失笑散ヲ溫水ニテ服スベシ或若菜湯ニ紅花藕木乳香沒藥玄胡索ヲ加テ用ヒ有神効

●産後惡露不盡腰腹疼痛スル者ニハ芎歸湯ニ玄胡索蒲黄乳香沒藥五靈脂烏藥紅花ヲ加テ用ヒ其効如神

●産後崩漏不止者ハ膠艾四物湯ヲ服スベシ有神効

●産後寒熱往來ス其寒如氷其熱如烘ス丸ニハ增損四物湯ヲ用ヒ其効如神

●産後血熱不止者ニ增損四物湯ヲ用テモ不止者ハ當歸補血湯ヲ用ベシ其効如神如是方ヲ用テモ効ナキ時ハ全生活血湯ヲ一貼服スレバ其効如神可秘

●産後或ハ小産後四五日ノ後寒熱往來譫言妄語病邪氣ニ似タル者ハ熱入血室ノ症也四物湯ニ小柴胡湯ヲ合シ桃仁紅花ヲ加テ用ヒ其効如神

●産後血熱ノ症ニ增損四物湯全生活血湯保元湯一名當歸補血湯ノ類ヲ見合テ用ヒ其熱大半退キ余熱アリテ羸勞トナラントスル者ニハ加味逍遙散ヲ用ヒヨ咳嗽アリ滋陰至宝湯ヲ用ヒ

共ニ有神効

●産後ノ腹痛ハ多ハ瘀血也瘀血ヲ遐退ケル劑ヲ用テモ不止時ハ當歸建中湯ヲ用ヒ其効如神外ニハ陳艾ヲ土器ヲ以テ焙乾シ絹ニ包ミテ臍ノ上ヲ熨スベシ艾ノ氣口中ニ通ジテ其痛立處ニ止ム也經驗此方頻ニ試テ有効可秘

●産後泄瀉ハ脾胃虛也芍藥湯ニハ君子湯ヲ合シ白扁豆乾姜ヲ加テ用ヒ有奇効無効ハ東垣ノ升陽湯ヲ用ユベシ其効如神

●産後中風口眼喎斜手足牽引セハ氣血虛ノ風ニ中ルナリ四物湯ニ烏荊順氣散ヲ合ノ用ベシ蓁艽地黃湯ヲ用ルモ亦有効●産後小産後血虛シ瘧病トナルモ又前ノ二方ニ加減

メ用ヨ有神効

● 産後血虚竭メ大便秘結スル者ハ四物湯ニ枳殻麻仁桃仁
雪朴紅花烏藥黄芩ヲ加テ用ヨ其効如神

● 産後尿秘メ不通ニ去白ノ陳皮ノ細末ヲ温酒ニテ一二盞ヲ
服スレバ即通ス奇々妙々可秘 張不愚ガ秘方ナリ

● 産後ノ浮腫ハ多ハ脾胃中ノ血虚也補中益氣湯ニ茯苓車
前子木香砂仁ヲ加テ其効如神補中治濕湯モ可也如是ノ方ヲ
用テモ効ナキ時ハ加減金匱腎氣丸ヲ用ヨ其効如神

● 産後十九症ト云フアリ 四書一見 此妄ヲ常ニ能考ヘ讀覚テ議
論ヲ極ムベシ又ハ婦人壽草ノ産後ノ巻ヲ常ニ讀覧テ諸ノ手
段ヲ能心得テ産後ノ療治ヲナスベシ不可忽也

● 産後ノ諸病ハ丹溪ノ説ノ如ク氣血ヲ補ヲ以テ本トメ余ノ雑
症ハ標ヲ以テ治スベシ是故ニ芎歸調血飲ニ加減メ用ベシ回春ニ
委ク加減ヲ載タリ敗木保産湯モ亦有効壽世保元ニ加減ヲ
委ク載タリ二方共ニ龔氏ガ方ナレ氏其中ニ保産湯ハ虚弱羸
賦ノ婦人ニ宜シ調血飲ハ實体ノ婦人ニ宜シ此二方加減メ用ユル
時ハ雖不中不遠ノ義也余ノ雑病ハ皆ヽ此ノ門ニ因テ見合テ可
施治也

乳病

● 婦人ノ乳病ハ多ハ肝經ノ怒火ヨリ發スル也乳汁不通ハ結核
自成也此結核久ク不消ハ結メ乳癌トナル初メ結核ヲナシテ寒
熱ヲ發セハ速カニ採ヤワラゲテ散スレバ乳汁亦通テ結核自ラ

消スル也

○乳汁不通メ寒熱往来メ結核ヲ生セバ小蒜胡湯ニ白芷青皮木通赤芍藥連翹貝母天花粉ヲカロテ用ヲ其効如神

○乳汁不通ニ先ツ不問悪實未梳ヲ以テ頻ニ乳房ヲカキ刮リ濁泉散ヲ服スベシ回春乳門

○乳病結核ヲヲテ乳癌トナラント欲スル者ニハ白芷貝母各二味細末メ温酒ニテ送リ下スベシ其効如神

○乳癰初發ニ青橘葉白芷防風黄芩連翹生甘草節各等分水煎温服メ外ニハ生天南星黄柏ノ細末ヲ糊ニ押マゼテ貼ク久レ其効如神

○乳吹ノ症トテ小児ノ口氣ニ吹レテ腫痛スル也貝母ノ細末ヲ服レ又ハ鼻中ニ吹入レバ立処ニ効アリ（半夏ヲ細末酒ニテ服スレバ立処ニ効アリ鼻中ニ吹入モ可也外ニハ葱白ヲ搗テ餅トナレ一指ノ厚サ乳ノ上ニヒロゲテ灰火ヲ用テ葱ノ上ヲ熨ス須臾ニメ汗出テ腫痛立処ニ消ス

○婦人ノ乳汁不出ニ露蜂房熟地黄各等分黒焼ニメ糊ニテ丸梧桐子ノ大サニノ毎服五十丸大麥ノ煮タル湯ニテ用レバ二七日ノ中ニ乳汁出テ如湧奇々妙々可レ秘此方啓益常ニ用テ取驗也紫陽ノ野人ノ所傳也

○婦人氣血二サニ盛ニメ乳房腫痛レ或小児ト欠メ乳ヲ飲ーアラズ或ハ乳毋ヲ置テ實毋ノ乳ヲ小児飲ーナケレハ陽明實メ乳房腫痛スル也炙甘草一味毎一戔五分水煎メ服スレバ其乳腫立処ニ

消スル也奇々妙々

○婦人小産後或ハ産後ニ其児夭スレバ乳汁ヲ断ンテヲ欲ス必其時ハ腫痛ヲナス也乳汁ヲアゲンコヲヒ時ニ麥芽一味ニ丸水煎シ服スレバ長ク乳汁ヲ斷也

○乳癌乳岩ノ症初發ニ六十六味逍遥散ニ連翹青皮ヲ加テ用ヒ或ハ破テ後岩凹ノ如ナルニハ加味逍遥散ヲ用ヒ或ハ五積散ヲ用ヒ共ニ有奇効無効ナルハ加味飯匙湯ニ連翹青皮ヲ加テ有奇効

婦人陰病

○婦人ノ陰中ニ瘡ヲ生ズルハ男子ノ下疳瘡ニ同ジ多ハ龍胆瀉肝湯ニ加減メ用ベシ甚キ者ハ防風通聖散ニ加減メ用ユベシ

○血海頻ニ疼痛スル者アリ東垣ノ烏藥湯ヲ用ヒ其効如神

○陰門腫痛スル者ニハ龍胆瀉肝湯ヲ用ヒ外ニハ小麥朴硝白礬五倍子葱白等分水煎シ頻ニ洗ベシ其効如神

○陰門痒者濕熱ニメ虫ヲ生テ陰戸ヲ蝕ム也小茇胡湯ニ山梔子龍胆連翹ヲ加テ有効外ハ蛇床子白礬ヲ水煎メ頻ニ洗ベシ或ハ沢蘭枯礬ヲ用テ水煎メ洗ベシ有効又加味飯匙湯ヲ用ルモ有奇効

○陰門痒メ痛ミ不時水ヲ出スニハ加味飯匙湯ニ宜シ有奇効

○陰門寒冷ニメ帶下ヲ生ズル者ニハ八味丸料ヲ用ヒ有神効

○陰門ヨリ一ツノ肉ヲ挺出スル病アリ陰挺ノ證ト名ク先ッ龍胆瀉肝湯ヲ用テ濕熱ヲ去リ後ニ加味飯匙湯ヲ用ヒ或ハ補

中益氣湯ニ山梔子牡丹皮茯苓川芎黃耆ヲ加テ用ヒ其肉自ヲ消スル也

○婦人交接スル毎ニ血ヲ出シ痛ヲ生ズル症ノ如キハ此肝經ノ虛火脾ヲ動メ血ヲ攝スルノ力ヲ失フ故ナリ補中益氣湯ニ芎藥川芎防風ヲ加テ用ヒ或ハ加味飯脾湯ヲ用ヒ共ニ有神効

○婦人陰門時ニ有聲轉失氣ノ如クナルヲ陰吹ト名ク此症ハ久ク帶下ヲ患ヒ或ハ産後血脱ノ後ニ必多キ症也加味飯脾湯ヲ用ベシ有神効啓益常ニ此症ヲ治スルニ升麻葛根湯ニ四君子湯ヲ合シ當飯川芎達志防風黃芪ヲ加ヘテ用奇効アリ大祕妙也医按委ク遊豊司命錄ニ載スト可參考

○婦人陰風ノ症アル二男子交接スレハ其風男子ノ陰毛ニ傳染シ又女子ノ陰門ノ内ニ入テ半日許ホトヾ置テ一七日メ身中ニハビコリ髮毛眉毛ニデヲ喰ヒ落メ大風ノ形ノ如クニ到ル者也婦人此症アラバ草烏頭一味水煎メ頻リニ陰門ヲ洗ヒ雄黃ノ細末ヲ綿ニ包ミテ陰門ノ内ニ入テ半日許ホトヾ置テ一七日ナレバ其風多ハ灸スル也男子傳染シタルニモ草烏頭ノ煎湯ニテ洗ベシ其後ニ沉香奇南香ノ類ニテ薫ズベシ其風忽灸スル也奇妙ノ一也

小児總論

○小児三歳ヨリ以下ハ脉ヲ診スルヿアラズ病アラバ男子ハ左ノ女子ハ右ノ手ノ虎口ノ三關ヲ見テ其病ヲ知ルベシ三關ト云ハ手ノ第二指ヲ見ルニ第一節ヲ風關ト名ク第二節ヲ氣關ト名ク第三節ヲ命關ト名ク此三關ニ見ル、所ノ筋ノ紋ノ色ヲ見テ

病ヲ知ル也紫ナルハ熱ニ属シ紅ナル者ハ寒ニ属シ青者ハ驚風白キ者ハ疳黒キ者ハ中悪黄ナル者ハ脾胃ノ困也若風關ニ見ル者ハ其病軽シ氣關ニ見ル者ハ其病重シ命關ヲ過ル者ハ治シ難シト知ルベシ

●小児三歳以上ハ医ノ一指ヲ用テ寸關尺ノ三部ヲ按シ診スベシ常ニ六七至ヲ以テ法トス小児ハ純陽ノ者ナレバ其脉至テ急速ナル者也六七至ヨリ増ルすハ熱トシ減ズルすハ寒トシ浮洪ハ風熱盛也數ナルすハ驚風沉遲ヲ虚トシ沉實ハ積トスル也此其大綮也諸ノ方書ノ小児門ニテ可考

●初生ノ小児ニハ黄連甘艸數々根各等分紅ノ綿ニ包ミテ熱湯ニヒタシ其汁ヲ飲シメ乳ニメノ如クニメスワレムベシ委クヲ予ガ著所ノ小児育艸ニ詳ニシルス也平日此書ヲ讀テ初生ノ小児ノ艱育ノ法ヲ知ルベシ

●小児初生十四五日ノ後吐乳スルニアラバ病ノキザストシテ二味湯ニ黄連丁子連翹ヲ加テ用ベシ

●小児ハ大小便サヘ滞リナクヒタト通ズレバ病ナレト知ルベシ少シテモ大小便ノ通ジ滞ルナラバ病アリト知ルベシ小児科ノ家傳ニハ時々下シヲ用テ大便ヲ通スル者アリ是モ亦一術ナリ

●小児大小便通スルニカタク腹脹ル者ニハ升發ニ陳湯ニ加減ノ用ヨ二陳湯ニ升麻芫胡ヲ加ヘタル方也此丹溪ノ妙方也

●小児吐乳セバ先ヅ二陳湯ニ砂仁連翹黄連ヲ加テ用ヨ吐乳ニ連翹ヲ加ルニ大秘密ノ一也其理意味深長ナルヨリ真人ニ

非ズ傳ルニ十カレ

●小児ノ諸病ハ多ハ乳食ヨリ發スルト知ルベシ小児ノ情ハ別ニ十カリ飲食イヽヨリ外他ノコトナシ是故ニ皆食ニ破ル病ト心得ベキ也

●小児ニハ無病ナレ𪜈家傳ノ保童圓ヲ用ルニ一ヶ月二十日カ十五日カ用レバ食ヲ化シ疳虫ヲ除キ滞ル所ノ臓垢ヲ除キテ病ナキナリ

●小児ノ病ニハ始ニ論ズル如ク食ヨリ發ノ痰ヲ兼ルニ多ケレバ二陳湯ニ加減ノ用ヒ或ハ神通丸保和丸等ヲ用ユベキナリ

●小児諸病多ハ大人ニ同ジケレバ其門ニ依テ見合テ治ヲ施スヘシ但剤ノ多少アリ加減アリ是ニ口授心傳多シ可祕

驚風

●驚風ノ症ニ種アリ急驚風アリ慢驚風アリ急驚風ハ牙關緊急ニシテ甚ク頬赤ク上竄直視シテ凝潮ノ如ク涌出ル痰喘急速ニシテ手足搐搦シ又張シ顫動シ唇口紅ヒニメ眉眼引ツリ口中焼ガ如ク大小便閉結シ其脉浮洪數緊也是陽症ニメ内ニ實熱アリ風ヲ挟ム者ハ先ヅ敗毒散ニ春急驚風方ノ加減ヲ用テ風ヲ驅テ搐搦自ラ收ル也痰熱ニ因テ急驚ヲ見サバ二陳湯ニ牛胆南星天麻釣藤鉤ヲ加ヘテ用ヨ或ハ靈砂丹ニ出春ヲ用或ハ方億丸ヲ用テ下メ利ヲ得ルヿ多シ小児科其家ニ傳ル所ノ下ノ方ニ奇妙ナル多シ万億丸ハ囲春小児ノ通治ニ見ヘタリ

●瘡疹或ハ痘瘡出ントス欲スル前ニ必ズ大熱ヲ發シ搐搦スルヿ度ニナバ下ノ剤アリ下時ハ熱解剤メ其痘其疹自ラ出テ熱

鮮ノ搐定ル也

一下ノ方ニ蜈蚣全蝎巴豆牛胆南星朱砂牛黄麝香龍脳姜蚕夜明砂ノ細末ノ錠子トナレ或ハ丸トナレ金箔ノ衣トノ用其効奇妙ニシテ言難シ分量口傳アリ

一急驚下メ後或ハ風ヲ驅テ後急症退ハ二陳湯ニ南星砂仁扁豆ヲ加テ用ベシ惣テ毒藥ヲ用テ病ヲ退タル後ノ調理ニハ必扁豆ヲ用ベシ此我家ノ大祕支也

一慢驚風ノ症ハ或ハ病後吐瀉シ或ハ藥餌ニヨウテ脾胃虚損シ四肢逆冷口鼻ノ氣微ニメ手足痿痺シ昏睛ノ露ス此脾虚ノ風ヲ生ズ無陽ノ症ニメ中氣虚損不足ノ病也故ニ急驚風ハ急危ノ症ナレ共實ニ属スレバ治シ安キナリ慢驚風ハ緩々タル症ニメ急ニ変症ハナケレ共不足ニ属スレバ治シ難キ也

一慢驚風ヲ治セハ醒脾散（四春ニ出）ニ加減ノ用ベシ

一慢驚風ヲ治スルニ啓益常ニ錢氏白木散ニ陳皮砂仁扁豆天麻鈎藤鈎ヲ加テ此煎湯ニテ家傳保童圓ヲ送リ下セヨ天麻鈎藤鈎ヲ加ルニ依リ脾胃甚弱キ者ニハ四君子湯ニ黄蓍天麻ヲ加ヘ甚虚弱ナラバ神中益氣湯ニ天麻鈎藤鈎ヲ加テ共ニ家傳保童圓ヲ用ヨ奇ノ又奇也

一慄テ急驚風ニテモ慢驚風ニテモ病退テ後ハ調理スベシ六君子湯ニ天麻砂仁當帰ヲ加ヘ或ハ補中益氣湯或ハ異功散ヲ用ベシ小児ノ調理ニハ四君子湯異功散ノ類ニ宜シ藥味ノ品スクナキガヨキ也小児ノ藥ハ火服ナレハ藥品多キ方ハ藥氣久クレテ

効ヲ取リ難キ也是極秘ノ妙也京師ノ一リ大医或公家衆ノ
小児ノ脹満ヲ治スル時ニ二十四味流氣飲ヲ用ヒラレタルヨリ
可笑〳〵

疳疾

●小児ノ疳疾ニ五種アリ皮黄肌痩髪直眼白肚大ニメ青筋アリ
好テ食ヲ欲シ泥土炭茶生米ノ類ヲ好ミ食シ或ハ吐シ或ハ泄シ或
ハ大便堅硬秘塞シ腹内ニ積塊アツテ諸虫トナツテ怪キ病ヲナス也
是皆乳母ノ攝養法ニソムキ其乳ヲ飲シムレバ疳虫ヲ生ジテ怪キ
症ヲナス也又ハ久々吐乳ヲナシ久泻久痢ノ後皆津液亡テ濕熱ヲ生シ其濕熱ニ依テ虫ヲ生メ怪キ病トナ
ルナリ漸ク飲食ヲナス時ニ至リテ酒肉油膩ノ物生冷硬物涼水

西瓜甜瓜紅柿糯米砂糖饅頭ノ類ヲ過食シ脾胃ニ積テ久キ
時ハ濕熱トナツテ疳虫ヲ生ズルナリ先ツ大黄ハ田春ノ消疳湯ニ
加減ノ用ヒ消疳丸（田春ニ出）家傳保童圓ヲ用ユベシ其効如神

●小児ノ疳疾ニハ多ハ肥児丸（田春ニ出）四味肥児丸ヲ用ベシ多久煎
湯ヨリ丸薬ニ剤アリ

●疳疾ハ多ハ脾胃ノ實熱ナレバ如何ホドニ痩ツレタリ共補薬ニ
益アラズ只虫ヲ殺ス剤ヲ用ベシ蜈蚣赤殭蠶ノ虫常山ノ虫
山蚕漆葉（此漆葉製法口傳）三稜莪朮胡黄連牛黄糞（此製法口傳）山査肉
丁子人参使君子ヲ調合（分量口傳）瓦器ニ入テ黒焼ニメ塩屋ノ煤
ヲ加テ細末シ丸ジ用ヒ或ハ土用鳥ノ黒焼ヲカルモヨシ此方ハ奇
妙ノ方也去ル比虚症ノ小児ニ用ヒガタシ能ク見合テ用ユベシ

村上一味斎ガ傳也

○疳疾ニハ多ハ保童圓ヲ用テ吉也眼ニ疳氣アリテ赤腫瞼赤キ類ニ保童圓ヲ異功散ノ煎湯ニテ用レバ神効アリ

○疳疾咽渇ノ湯水ヲ多ク飲者ニハ錢氏白木散ニテ保童圓ヲ用ヨ有神効

○疳疾形体栄瘦レ眼赤ク或ハ白膜眼ヲ遮ル者ニハ保童圓ヲ細末ノ鱶臭ノ肉ヲ灸テ此ノ細末ニマゼテ二三切ホド〻食スベシ或ハ鱶臭ノ腸ヲ醤油ニテ煎テ食セシムルモ其効如神

癖疾

○癖疾ハ乳哺慎ニザルニ因テ積聚メ致ス所也此症初ニハ兩眼ニ積癖メ寒熱往来レ飲食減少ス浄府湯ニ加減メ用ベシ有神効

○此症モ治法大槩疳疾ニ同ジ肥児丸磨積圓句保童圓消疳丸千金消疳丸四春ノ類見合テ可用

○總テ癖疾ニハ小児科其家〻ニ傳ル所ノ消癖ノ薬アリ多クハ峻急ノ毒薬也全蝎斑猫蠐螬虫硇砂紅娜子水蛭ナトノ類ヲ用ル也是ホドノ症ニ小児科ニ委テ台スベシ加様ナル症ヲ虚實ヲ不問此等ノ類ノ強剤ヲ過服レ脾胃虚損メ救ハザルニ至ル如是ノ強剤ニテ脾胃虚損セバ朝ニ補中益氣湯六君子湯ノ類ヲ加減メ用ヒタヘニハ保童圓千金消癖丸ノ類ヲ用ベシ有奇効或ハ強剤ヲ過服メ泄瀉スルニハ錢氏白木散ニ陳皮白扁豆砂仁ヲ加テ其効如神

○小兒ノ癖疾寒熱アヲテ或ハ間日ニ發シ或ハ毎日發スル者アリ是ヲ和俗カタカイト名ク淨府湯或ハ七味清脾湯ニ加減メ用ヒ其効如神家傳神通丸ヲ用テ奇〻妙〻

小兒雜病

○小兒ノ病弄舌トテ頻ニ舌ヲ出メビロワカスルアリ是皆心熱ノ致ス所也ニ陳湯ニ黄連薄荷ヲ加テ用ヒ或ハ錢氏白朮散ニ黄連桔梗ヲ加テ用ヒ有神効

○小兒時アヲテ發熱シ天吊スルニ釣藤鉤散（四春小兒雜病ニ出）ヲ用ヒ有神効

○小兒ノ夜啼不止ハ心熱ニ屬ス黄連朱砂ノ細末ヲ水ニテ用ヒ或ハ乳頭ニ右ノ細末ヲツケテ兒ノ口ニテ吮シメヨ有奇効小兒ノ夜啼ハ夜啼鬼トテ鬼祟アルニ似タリ必祝由科ニ因テ治シナヘバ即止也不可疑諸ノ医書ニモ其術ヲ載タリ和俗ニモ種〻ノ術ヲ覺テ祝由スル也医書ニ載タリト雖モ医師タラン者必ス祝由ノ術ヲナスヘカラス祝由ハ本朝ニモ一科ヲ立テ主之可愼也

○鷺口瘡ハ和俗舌シトギトテ云小兒ノ口中白ノ鷺ノ口ニ似タレバ也是胃熱也清胃散ニ加減ノ用ヒ又ハ牛黄散（四春ニ宜シ）或ハ升麻葛根湯ニ桔梗黄連連翹ヲ加テ其効如神又小兒ノ口瘡ヲ治スルニ黄連ノ細末ヲ蜜ニ調テ貼之或ハ黄連ノ細末ヲ寒中ノ雪水ニテ解テ付レバ其効如神寒中ニ雪降時其雪ヲ磁器ニ押付テ入テ口ヲ封メ畜レバ水トナル其水ヲ取テ用ルニ多シ医師タラン者必畜ヘ置ベキ也

○重舌ノ症ハ和俗小舌トユル舌ノ下ニ又舌ノ形ノ如クナル肉ヲ生ズル也是病心脾ノ熱也重舌出来レバ必唇口ノ両傍ニ瘡ヲ生ズルコトアリ又木舌ノ症トテ舌硬腫テ柔和ナラザルアリ是亦心脾ノ實火ヨリ二病共ニ當皆連翹湯ヲ用ヨ 田春 甚キ者ハ黄連解毒湯防風通聖散ヲ用ヨ共ニ有神効或ハ黄栢ノ末ヲ竹瀝ニテ解テ重舌ノ上ニヌルベシ或ハ黄連石羔ノ末ヲ雪水ニテ解キヌルベシ或ハ蒲黄ノ末ヲヌルベシ或ハ百草霜滑石芒硝ノ末ヲヌルベシ或ハ紫雪ヲ舌上ニヌルベシ何レ氏手ヲ不停メヌルベシ一術アリ腮ノ下ノ頓中ニ艾ヲ灸スルニ口傳アリ可祕穴ノ点スルニ口傳アリ可祕

○小児ノ牙腫テ涎ヲ流シ口臭メ鼻ヲ掩フニ至ル甚キ者ハ歯齦脱落シ頰腫腐爛メ不救ニ至ル其速カナルヿ如走馬故ニ走馬牙疳ト名ク和俗ハクサトユ清胃升麻湯 田春 東垣ノ神効散ニ宜シ香蘭葉ヲ煎テ頻ニ口中ニ含ムベシ其効如神

○小児好テ泥土炭生米ノ類ヲ食スルハ脾疳也清胃雞胃湯 田春 用ヨ或ハ平胃散ニ黄芩砂仁ヲ加テ煎服シ保童圓ヲ送リ下スベシ其効如神

○小児丹毒ノ症トテ遍身所〻ニ赤腫テアリ其ハ丹毒アナタコナタ所ヲカヘテ赤ヲ見スル者アリ此火外ニ行ル也和俗赤ノサトユ孿角消毒飲 田春 黄連解毒湯升麻葛根湯ニ孿角連翹ヲ加テ用ヨ其効如神 ○赤游丹毒トテ身ノ内ヲ走リ廻リ赤ノ腫ル、症アリ伏龍肝ヲ鶏子清ニ解テ塗ベシ其効如神

●小児咽喉腫痛スルハ風熱ノ毒也會厭ノ両方腫ハ雙乳蛾ト云治シ易シ一傍腫ルヽハ單乳蛾ト云治シ難シ皆喉痺也甘桔湯ノ方モ吉

●小児眼目腫痛スルニハ熟地黄一両ヲ新汲水ニ浸シ搗爛ラシ脚心ニ貼テ布ニテ包ミ置ケハ有奇効●小児ノ眼ノフチ赤キ者ハ虫氣ノ症也保童圓ヲ錢氏白朮散ノ煎湯ニテ送リ下セヨ其効如神

●小児耳腫痛セバ藿香正氣散ニ烏薬細辛ヲ加テ用ユベシ頭痛耳鳴耳聾ハ腸胃ノ生ズル所ナレバ陽明ヲ發スレバ自ラ愈也家傳玉樞丹ヲ刻用ルモヨシ●停耳ノ病耳中ヨリ膿ヲ出シ或ハ水ヲ出ス藿香正氣散ヲ用ヨ外ニハ五倍子ノ細末ヲ耳中ニ吹入ヨ五倍子ノ黒焼尤妙也鶏ノ子ヲアタヽメテ出タル卵ノ殻ヲ焙テ黄色ニメ香油ニ調テ貼タルモ吉也

●耳聾ハ多ハ停耳ノ後ニ發ル者也棗ヲ食焼タル上ニ置テ蒸シ其肉ヲ取テ木綿ニ捻リツケテ長カラシメ其ヲ耳中ニサシテ半時一時ヅヽ一日ニ両三度スレバ其効如神可秘

●大人小児共ニ耳聾ノ症ニ鶏鵆ノ油ニ磁石麝香少許ヲ入テ煉合テ錠子トナシテ耳内ニ入テ口中ニ生鐵少許ヲ含ムヿ三五度ナレバ其効如神右ノ錠子ヲ綿ニ裹ミタルモ吉シ右ノ方ハ本草綱目ノ鶏鵆ノ条ノ發明ニ見タリ鶏鵆ノ脂日本ニテシ中華ヨリ長崎ニ来ルサレモ甚稀也河内國ニ鶏鵆アリト云人アレドモ其實否ヲシラズ此方耳聾ヲ治スルニ十ニメハ八九ヲ治ス先師ノ益

老人此油ヲ畜ヘテ耳聾ヲ治スルノ名ヲ得其後此油ヲ求得ズ石龜ノ尿ヲ取テ麝香ヲ加ヘ右ノ方ノ如シテ口中ニ鐵ヲ含スレハ其効如神是亦一奇方也可秘

●小兒ノ頭瘡ハ熱毒ナリ或ハ胎毒ニヨリテ也和俗クサトニ云多ハ下シテ利ヲ得ル也保童圓ヲ用テ吉也荊防敗毒散ヲ用モ吉虛ニ属スル者ハ四君子湯ニ升麻葛根湯ヲ合シテ連翹ヲ加ヘテ用ヨ有奇効胎毒ニヨツテノ瘡瘍遍身ニ出来者ニモ治方右ノ如用テヨシ●小兒科ノ家々ニ胎毒下シクサノ類ノ妙方多シ秘ノ不出紫陽ノ野人一方ヲ傳フ白屈菜ヲ陰乾ニメ黒焼ニメ貼之甚有奇効

●腑瘡ハ風濕也小兒腑帶ヲ斷トキ不慎ハ浴スルコトニ其斷目ヨリ水濕入テ腑瘡トナル甚時ハ腑風撮口ノ症トナリテ不救ニ至ル也又脾胃ニ濕熱アリテ腑中ヨリ水ヲ出シ膿ヲ出シ臭氣掩モノアリ錢氏白木散ニ連翹酒芩ヲ加ヘテ用ヨ外ニハ黄柏ノ末龍骨ノ末ヲ腑中ニ入テ填レメヨ有奇効

●諸ノ虫痛ハ胃氣ノ傷テ濕熱ニヨリ虫ヲ生テ痛也使君子檳榔ノ二味水煎シ用ヨ家傳保童圓神通丸肥兒丸ノ類又魂丹玉樞丹ノ類ヲ用ベシ其効速ナリ

●小兒蛔虫ヲ下スニ練陽湯(田舎)ヲ用テ有効●冬月蛔虫ヲ吐スルハ多ハ是胃寒胃虛ノ症也錢氏白朮散ヲ加テ用ヨ有神効

●小兒ノ疝氣陰囊腫痛メ不可忍者ハ此寒氣ニ欝セル也

五倍子ノ黒焼ヲ酒ニテ方寸七ヲ用ヨ其効如神●小児陰嚢腫大ナルニ蝉退半両水一大碗煎湯ニテ腫処ヲ洗フ一度ニナレハ其腫立処ニ止也虫蟻ノ類ニ咬レテ腫痛スルニモ前方甚妙也

●小児ノ脱肛ハ大腸ノ気虚也提肛散ニ宜シ痢後ナドニ必ス肛門脱スルヿ多シ補中益気湯ニ蓁艽防風ヲ加テ用ヨ

●小児ノ遺尿失禁或ハ睡中不自覚メ尿スル類ハ多ハ虚寒也破故紙散桂肝丸共ニ回春ヲ用ヨ多ハ小児夜起ルヿヲ懶ク思テ床上ニ直ニ溺シ其ヿ習テクセト十ナリテ此症ニナルヿ多シ腰眼ノ冗命門ノ冗尾骶骨ニ灸ヲスレバ此症愈ル也

●小児尾骶骨痛ム者アリ此陰虚十リ補陰降火湯回春或ハ右飯丸左飯丸ヲ用テ其効甚多シ

●小児鮮顯ハ顯門ト云テ頭ノ縫ノ不合也此元気ノ虚也ハ物湯ニ加減ノ用ヒ六味丸左飯丸補中益気湯類ニ加減メ用ヒ其間〳〵ニハ保童圓ヲ用ヨ有奇効

●行遅ノ者ハ元気不足也調元散ニ宜シ回春或ハ補中益気湯ニ石菖蒲ヲ加テ用ヨ髪遅者歯遅者共ニ此方ニヨツテ加減スベシ

●語遅者ハ邪衆心也蒲黄丸ニ宜シ

●涎多キ者皆脾濕也涎出テ不止涕出テ不止其鼻涕涎沫ニヨツテ鼻ノ下口ノ両傍赤ノ爛ル者アリ和俗コレヲ赤口ト云又ハヨダト云多ハ無病ノ小児ニアリ七八歳ニナレバ自愈ル者也平胃散ニ連翹車前子ヲ加テ用ヨ外ニハ黄連ノ細末ヲ寒ノ雪水ニテ貼セヨ其効如神

●小児ノ亀胸ハ胸タカクメ掌ヲ覆ガ如シ亀胸丸宜(因春)

●亀背ハ和俗ニセムシト云亀背丸ニ宜シ(因春)●亀胸亀背共ニ腎氣ノ虧損タリ左皈丸ニ加減ノ用ヲ有(効)

●鶴節ハ血氣不(ル)充ノ症也必大病ノ後或ハ痢後瘟疫後ニ足(ノ)脉痩テ如(シ)鶴膝(ノ)當皈地黄丸(因春)或ハ大防風湯ヲ用テ其病愈也

大人モ必有此症後ニハ難治ニ至ル可(シ)慎

瘄瘡

●小児ノ瘄瘡ノ症ハ發(シ)熱甚メ風邪ノ病ニ紛ル(レ)者也疑(シ)似ノ間ニハ先ヅ升麻葛根湯或ハ香蘇散ニ葛根ヲ加ヘ(或ハ)催香正氣散參蘇飲ノ類ヲ見合テ可(シ)用瘄瘡ノ熱ハ何程甚シキトテモ耳ノ尖又ハ手中指冷ルヿ氷ノ如ク腮赤ク眼ノ内赤ク時々欠(伸)

シ驚怖シ搐搦(ケイデキ)スルヲ以テ此症ト知ルベシ其見ヤウ委(クハ)小児養

艸ニ著シ置也可考

●瘄瘡發(シ)熱アラハレ三日ヲ過テ瘄瘡額ノアタリニ蚊(カ)ノ白メノゴトク色好アラハルヲ最上ノ好瘄瘡ト知ベシ發(シ)熱ヲ覺ルト其ヿ一ヿ瘄出見ル或ハ半日一日ノ中ニ瘄出ル(レ)ハ後ニハ必悪症ニ變スル者也油断スベカラズ加味敗毒散(因春瘄瘡)或ハ升麻葛根湯ニ加減メ用ベシ共ニ山査子ヲ加ヨ山査子ハ治瘄毒ノ聖藥也

●瘄瘡ノ亭病ニ發(シ)熱甚ク眼天吊スル者多シ或ハ搐搦上竄驚風ニ似タル者アリ是佳兆(カテウ)也必瘄少々出テ其後ハ苦ナシ升麻葛根湯ニ連翹蝉脱山査子ヲ加テ用ヒ或ハ和解散(保赤全書)ニ加減メ用ベシ

●瘡出テ毒氣甚ク血紅一片ニメ地ヲ不レ分者ニハ神効散（回春）ヲ用ベシ熱甚者ニハ芩連ヲ加ヘ驚怖ノ心アラバ蟬脱連翹ヲ加テ用ベシ山査子ヲ加フ妙トス又解毒疎瘡湯ニ山査子ヲ加テ有二神効一ニ人参羌活湯モ有二奇効一共ニ見二保赤全書一也

●瘡出テ三日ノ内ニ瘡頭黒陥スル者ハ虚ニアラザル也火盛ユヘ也九味神効散ヲ用テ其火毒ヲ退クベシ有レ効

●瘡瘡起脹ノ時節ニ瘡勢弱ク瘡色白メ頂陥者ハ虚症也十全内托散ニ丁子肉桂穿山甲ヲ加テ用ベシ有二神効一或ハ保元湯（保赤全書）丁子肉桂川芎當皈穿山甲ヲ加テ有二神効一共ニ見二保赤全書一

●瘡瘡出テ後ハ閨中ニ乳香ヲ焼ヘシ奇妙也

●瘡出府ノ後三日ヲ大事ノ時分ト知ベシ好瘡ハ膿漿十分ニ満テ山ヲト上ル也其次ハ六七分膿漿也凡ソ瘡ハ膿漿ノ有無ニテ生死判ル者也膿有ル時ハ毒外ヨリ散ス故ニ生ル也膿ナキ寸ハ毒内ニ攻ムル故ニ死スル也托膿引テ瘡痂厚者ハ好瘡ナリ痂薄者ハ其次ナリ

●瘡色紅紫乾枯レ焦黒ナル者ハ毒熾ニメ血凝ル也清毒活血湯ニ宜レ瘡色淡白ニメ尖圓ナラズ根ニ紅暈ナキ者ハ氣虚メ血縮ル也参芪鹿茸湯或ハ保元湯ニ宜レ其方共ニ活幼心法ニ出タリ可考

●瘡瘡大便實スル者ハ宜レ大便泄スル者ハ脾氣虚レ肌肉ノ艱ナキ故ニ多ハ悪症ニ変ズル者ナリ加味四苓散参朮散錢

氏白木散ニ扁豆砂仁山査子ヲ加テ可ㇾ用活幼心法ニ出ス

○痘瘡寒戦咬牙ノ見ルヽヲ悪症トス虚ニ属スル也建中湯（活幼心法）保元湯補中益氣湯ニ加減メ用ヨ

○痘瘡吐逆スル者ニハ二陳湯ニ合升麻葛根湯加連翹山査子其効如神

○痘毒咽喉中ニ出テ腫痛レ飲食ヲ通リガタキニハ利咽解毒湯（活幼心法）ニ連翹山査子ヲ加テ其効如神

○痘瘡ノ餘毒心脾股等ニ滞リ膿血ヲ生レ骨ノ中ニ腐リ入テ手足不ㇾ挙類ノ者多シ大連翹飲ヲ用ベシ或ハ千金内托散ヲ用ヰ共ニ活幼心法ニ出タリ

○痘瘡甚痒キ者ハ表症ト知ルベシ保元湯ニ加減レ或ハ黄芪實表湯（活幼心法）ヲ用ベシ其効如神

○凡痘瘡疥癬ノ類ヲ始ニ煩ヒ又ハ疥癬（ヒセン）ノ類未ㇾ愈ニ痘瘡ヲ患ル者ハ多ハ痒（カキ）塌（フ）メ危症ニ変スル者也和俗ニ之ヲ（コレ）ヲクサケ交ル（マジル）トヽテ甚悪症トス大連翹飲ニ宜レ

○痘瘡ニ麻疹（サヽ）ヲ夾ム者アリ甚危症也玄参升麻湯（活幼心法）ヲ用テ其効如神

○惣テ痘瘡ノ次第俗用ノ手段ヲアガ著ス所ノ小児育艸ニ詳ナリ可ㇾ考

○痘瘡ニ和俗米泔水（イカヽスイ）ヲ沸（フツ）湯トナレテ落痂（ラクカ）ノ時ニ沐浴スルヿアリ中華ノ書ニ此事アルヿヲ未ㇾ得ㇾ考（コヽ）痘瘡色悪ク九時ニ水楊ノ煎湯ニテ瘡ヲ洗ヒ三豆湯ニテ浴スルノ類諸書ニ見ヘタリ

サレドモ日本人ノ如ク推シナベテ俗習トスルコトナシ我多ハ十五六日ノ後ニ洗フベシ危症ノ痘瘡ハ日數ニカヽハル（カラズ）三十余日或ハ五十日ヲモ過テ洗ベシ是日本ノ俗習ナレバ之ニ従ベシ朝鮮國ノ医鄭萬里ニ此事ヲ朝鮮ニテモナスヤト筆談シケレバ朝鮮ニテハ此事ナレトモ荅タリ震旦ト同事ト見タリ

●惣ノ痘瘡ノ治方ヲ考ルニハ保赤全書痘疹全書活幼心法ノ三書ニ委ク備ル也之ニテ考（カンガ）ヘテ己ガ識分次第ニ治ヲ施スベシ

●今時痘瘡ノ治方寒熱虚實ヲ不問始ヨリ多ハ參蕎ノ類ヲ用ル者多シ虚ニ屬スル者ニハ甚効アリ然レドモ痘瘡初發ハ熱毒甚シク風藥ノ類ヲ以テ發散スルヲ以テ補住其邪熱ヲ實スルコトナカレ近代補藥ノ人ノ命ヲ失フ事カギリナシ可愼ム也

麻疹

●夫麻疹ハ痘瘡ニ比スレハ甚カロキ者ナレドモ其症六府ヨリヲコツテ陽症ニメ暴急ノ症也夫ニヨリテ和俗ノ諺ニ痘瘡ハ美目定メ麻疹ハ命定メトイヘテ甚大切ノ一症トスル也其子細ハ急病ナルヲ以テ療治ノ法火ノ急ルヲスハ其変掌ヲ返ガ如クナレバナリ

●麻疹ハ發熱スルコト二三日ニメ出脹共ニ三日ニメ出テ没スル也没シテ又出ルモアリ其發リハ傷寒感冒ノ熱ノ如シ去レドモ此症ハ咳嗽甚クテ咽喉ノ間呼吸短息ニメ不利ニ因テ咀ノ中ハレカキニ因テ和俗ハレカノ病トナヅクル也升麻葛根湯ニ宜シ咳甚クハ二陳湯ヲ合シ桔梗蘇葉ヲ加ヘ或ハ參蘇飲ニ連翹ヲ加ヘ或ハ葛根

湯ニ小茈胡湯ヲ合シ或ハ黄連解毒湯ヲ用ヒ或ハ涼膈散ヲ用テ見合テ療治スベシ

●麻疹ノ症ハタヽク咽不利咽渇スルニ因テ飲水多キ故ニ必痢病ニ変スル者也又ハ麻疹ノ毒内ヨリ下ル者モアリ何ノ道ニテモ大方ハ麻後ニハ必痢病トナル者也升麻葛根湯ニ山査子扁豆砂仁ヲ加ヘ虚スル者ニハ銭氏白朮散ニ連翹白扁豆砂仁升麻ヲ加テ其効如神

●麻疹ノ毒氣流注ノ痢ト成者ニハ清熱導滞湯ニ宜シ方ハ活幼心法ニ出ル也

●麻疹ノ症四ノ大忌アリ是ヲ犯スコトナカレ一ニハ薑韮生冷ノ物ヲ食フコトナカレ風寒ニ中ルコトナカレ二ニハアワテヽ寒涼ノ薬剤ヲ用ルコトナカレ黄連解毒涼膈ノ類是也三ニハ多ハ辛熱ノ薬剤ヲ用ベカラス桂枝湯ノ類又羌活麻黄ノ類是也四ニハ補澁ヲ用ベカラス泄痢ノ症アラハ加味四苓散ニ加減ノ用ヒヨ訶子肉豆蔻参茂ノ類ヲ禁スベシ此四大忌ヲ犯セハ其禍如反掌可慎

補遺

●宝永戊子ノ秋ヨリ冬ニ至リ明ル己丑ノ歳ノ春ニテ日本六十餘州ヲレナメテ麻疹流行メ男女老少ヲ不問一般ノ疫麻也貴トナク賤トナク此患ニテ死スル者多シ予京師ノ高倉ノ旅館ニアツテ此病ヲ治スルコト五百三十余人也其内一人モ死スル者ナシ皆之ヲ治スルノ医或ハ寒涼ヲ過シ或ハ辛熱ヲ用ヒ或ハ補薬ヲ用テ其害殺シ予一方ヲ製ス葛根連翹湯ト名ツク

葛根連翹升麻白芍藥酒芹胡酒黄芩當皈桔梗山査薤梗
山梔子各等分甘艸減半水煎レ服ス紅点出ガタキ者ニハ防
風牛房子ヲ加ヘ泄瀉アル者ニハ扁豆砂仁木通車前子ヲ加ヘ咳
嗽甚キ者ニハ桔梗甘艸ヲ倍レ前胡桑白皮ヲ加フ熱甚キニハ
酒黄栢酒黄連少許ヲ加ヘ或ハ淡竹葉ヲ加ヘ口甚渇スル者ニハ
麥門冬石羔ヲ加ヘ血乾テ大便祕スルニハ川芎生地黄紅花大
黄少許ヲ加フ此方ヲ用ユルニ百發百中奇々妙々其効不可
言也

外科

癤疽

癤疽ノ症ハ多ハ四十已上ノ人ニ發スル者也先ヅ灸ヲナスベレ
外ハ外科ノ專門ニ任スベレサレド毎度腫物ノ善悪ヲ見テ知ベレ初
發ニハ荆防敗毒散追風通氣散ノ類ヲ用ベレ漸潰テ膿血出テ
ハ千金内托散ニ加減ノ用ベレ

癤疽膿血多脱去スレハ氣血甚虚耗ス或ハ八物湯或ハ十全
大補湯補中益氣湯ニ加減ノ用ベレ

癤疽ヲ治スルニハ經絡ヲ分テ治スベレ頭瘡ノ類ニハ芫胡清肝
湯清肝益榮湯ノ類ヲ可レ用

癤疽ノ治方ハ追風通氣散ニ悉ク加減ス但春ニ出之ヲ見合テ
用ヒ其効多キ也

癤疽ノ外治ハ腫物ノ二ワリヲ關藥ニテフセグベレ此關藥家
ノ秘方多レ外科ニモ関藥ヲ言ヒ膏藥ニテセクアレモ悪キ也子細

ハ膏薬ハ身ニ貼テ温ヽリワタレバ膏薬ヲ持チ起メセキ、カヌ者也黄栢揄皮犬山椒ノ葉ヲ陰乾シ右三味細末メ等分水ニテ解腫物ノ亡ワリヲセキテ上ニハ扨原紙ヲサキテ覆フベシ或ハ酢ヲ解タルモヨシ此関薬ヲ用レバ一夜ノ内ニ腫物腫レ起ルナリ奇ヽ妙ヽノ事ナリ

◐外治ノ支南蛮流鴈取流ハ針ヲ以撥潤スル也其上ニ艾灸ヲスルヒ切リテ血ヲ出シ膿ヲ出スガ故ニ治スルヿ早シサレモ虚弱ナル人ハ元氣ヲ撲也阿蘭陀流ハ切ルヿヲ不用艾灸ヲバカリニメ木綿ヲ以テ腫ヲ巻テ温ル也膏薬モ専温散ノ剤ヲ用ルニ因テ老人虚人ニ宜シサレモ實症ノ腫物ヲ木綿ニテ巻ハ實熱ヲ包ミ籠テ悪キ也勿論瘡疽ハ氣血ノ虚ヨリ生ズレバ實ニ属スル者ハ稀ナレドモ其内熱毒ノ深キ腫物ヲ也經曰謂實者病邪ノ實也ト是ヲ以テ可悟

瘰癧馬刀

◐瘰癧ノ症肝經ニ生ズル者也耳後ニ累ヽトメ生ズ多ハ肝鬱ノ症ニメ痰結ノナス所也或ハ氣鬱ヨリ生ズルナレバ十六味流氣飲加味逍遙散芫胡清肝湯益榮湯分心氣飲加味皷脾湯益氣艱榮湯廣茂潰堅湯ノ類ニ加減メ用ベシ其効如神

疔瘡

◐疔瘡ハ手足面部ニ生ズル者也皆多ハ厚味ノ人ニ生ズル者也殊外ナル急症也先ヅ灸火ヲ用ベシ痒キハ灸メ痛ムニ至ル痛ムハ灸メ痒キニ至ルト云テ灸ニ宜キ也内薬ハ追疔奪命湯ニ加

減メ用ベシ外ニハ鱉酥丹ヲ貼ヨ又ハ疔ヌキト云又ハ郡薬ト云薬ヲ敷クベシ　郡上大夫家ノ薬　五八霜　櫻木皮黒焼　熊胆　各等分ニノ細末シ猪ノ油ニテトキ火ニアタヽメテ疔ノ上ニ貼レハ汗出其ヽ治スル也其効如神

◐疔瘡ノ類ニ青筋ノ症トテ急症アリ知ラズンバ有ベカラズ青筋出テ胸咽ノ間ニ攻入リ日本ノ俗ハ日腫ト云此症ヲ治セハ先ヅ病人ノ尺澤ノ穴ヲ見テ針ヲ以テ筋ヲ断切ル寸ハ黒血ヲ出テ神効アリ又紙燭ヲ以テ脊及ヒ手足ヲ見ルニ粟粒許ノ赤点アラハ針ヲ以テ断破スレハ有神効此二ツノ手段奇ヽ妙ヽ也

便毒

◐便毒ハ和俗ニ横根ト云フ両腿ノ合縫ノ間ニ生ズルノ腫物也

神奇散龍胆瀉肝湯（四春本条）ニ加減メ用ベシ

◐初發ノ時ニ實スル者ニハ喬麥麩大黄各等分細末メ酒ニテ毎服二錢ヲ用ベシ小便ヨリ毒下ル也奇ヽ妙ヽ

◐便毒潰テ後ハ實スル者ハ防風通聖散ニ加減スベシ虚スル者ハ加味逍遥散ニ加減メ用ベシ何レモ釣藤鈎ヲ加テ妙トス可秘又茈胡清肝湯ニ加減メ用ベシ

下疳瘡

◐下疳ハ多ハ嫖乱（イヽン）ナル人娼妓（セウギ）ノ類ニ交接メ其臭穢ノ氣ニ撲（ウチ）テ生ズル者也初發ニハ消疳敗毒散（四春本条）ニ加減メ用ヨ或ハ龍胆瀉肝湯防風通聖散ノ類ヲ見合テ用ベシ虚セハ清肝益榮湯茈胡清肝湯逍遥散ヲ見合テ用ヨ或ハ物湯ニ小茈胡湯ヲ

合シ連翹金銀花ヲ加氣虛スル者ニハ補中益氣湯ニ連翹防風青皮ヲカヘテ用ベシ痛甚ク何ノ方ヲ用テモ不止痛苦難忍者ニハ黃芪建中湯ヲ一二貼用レバ其効如神

○外ヨリ蒼朮紫蘇黃芩蛇床子艾葉當皈ヲ等分水煎メ瘡ヲ洗ヒテ其上ニ三白散ヲスリヌルヘシ三白散ハ予家ノ秘方ナリ牡蛎ノ白燒葛根天花粉ノ三味各等分極細末ノ用也平田道仙ガ家ノ秘方ノ白藥ト云ハ三白散ニ龍腦ヲカヘタル者也傳曰此白藥ヲ娼妓ノ類ニ交リタル時ニ自己ノ小便ニテ陰埜ヲ洗ヒ其上ヲ温水ニテ洗ヒテ貼レハ瘡毒ニ中ルヿナシ因テ此藥ヲ瘡毒ヨケト名ツクルナリ可秘

○下疳ノ藥ヲ外治ノ医ハ洗フヿヲ禁スル者多シサレ𪜈瘡愈無ルヿ寸ハ洗藥ニテ洗テ粉藥ヲ貼クベシ膏藥ノ類ハ瘡ヲ蒸ハシテ悪シ痛強ク瘡口大ナラバ三白散或ハ白藥ヲ乳香没藥ヲ加テ麻油ニテ煉テ貼クベシ下疳ノ貼藥ハ隨分極細末スベシ粉藥麁末ナレバ害多シ陰頭ハ其皮薄クアヘ肌モハ粗キ粉ニテハ思ヒアハヌ者也此大祕支也

楊梅瘡

○楊梅ハモト下疳瘡ヲ傳染（テンセン）シタル人之ヲ恥（ハヂ）テ治スルヿ遲滞メ一変メ便毒トナリ便毒一変メ楊梅瘡トナル京都江戸大坂等ノ都會（トクヮイ）ノ所ニ多キ煩（ハンヲヒ）也鄙野（ヒナ）ノ地ニハアルヿ少シ京ニテハ濕氣トスゝ何レモ娼妓（セウギ）ニ交媾（カウグヮ）メ傳染スルノ病也初發ニハ荆防敗毒散消風敗毒散（田舎本条）二十四味風流飲（同上）ニ加減ノ用ベシ

●楊梅瘡經曰不愈者ハ或ハ鼻爛レ鼻柱朽落レ口臭ク唇缺ケ或ハ腕ノ折目膕中ニアツテリ毒氣膿ヲナシ或ハ憊体ノ瘡乾テ懊身疼痛シ或ハ骨ウヅキニナリ或ハ眼ニ毒入リ或ハ耳聾レ種々ニ変化スルニ因テ其人終ニ廢人トナルモノ之ヲ悪三嫌フ大風ニ類スル也此草ノ類ニハ田春ノ通仙五寶丹ヲ用ベシ此方王范泉ガ廣東ヨリ傳来ル妙方也此瘡中華ニモ古ハアルヲナシ近世廣東ヨリ傳染スルニ因テ廣東瘡ト名ツクルト瘡疹全書袁了凡ノ作ニ見ヘタリ和俗此瘡ヲ唐瘡ト云モ廣東瘡ト云フナルベシ唐ト東ト音同キ故カ此五寶丹ニモ家々ノ秘方多シ何ノ方ニテモ真珠ノ真ヲ用ヒザレバ其効ナシ

●楊梅瘡日久ク不愈ニ防風通聖散ヲ五々ガケホドニメ用ヒ効ヲトルヲ多シ又奇驗方トテ近来阿蘭陀外科ノ用ル方アリ何モ山皈来ノ入タル大料也是モ紅毛流其家々ノ秘方多シ可考合又傳来ノ方ヲ諸医ニ逢テ秘方ヲ談ズベシ互ニ交易ノ習フヘキヿ也予カ家ニ傳所ノ奇驗方ノ秘方

皂角刺　皂夾子　薏苡仁　白鮮皮　金銀花　連翹　防風各一々半或二々　白芷各一々半或二々　木瓜　木通　芍藥　何首烏　黄芪　人參　川芎　生地黄　沈香各一々或二々　石調合メ一剤五々或八七々或八十々或十五々ニシ煎法次弟アリ口傳ト様モ口傳アリ又山玄湯トテ予カ家ノ名方アリ　山玄五々日本ノ山皈来イバラノ苗ニ二三月ノ比二尺ホド有ヲトルナリ　山皈来半斤或一斤　黄連　黄芩　人參　當皈　防風　桔梗　川芎　生地黄

芍藥　羌活　荊芥　木通　各一匁
ノ黒焼五分　蝮蛇（マムシ）陰干五匁無スハ津蟹（ツガニ）白花蛇ヲ用ル也
右調合メ七貼ニ分テ
三一貼（ヅヽ）ニ分ケテ入ル也一日ニ一貼ヅヽ用ル也飲毎ニ鷄ヲ煮リタルヲ
二七レヅヽ喰テ薬ヲ服スベシ煎法用法口傳アリ

●楊梅瘡羊經（ヨウケイ）テ愈カヌルニ凝（ヨウシ）薬トテ丸薬アリ　輕粉二匁
上茶一匁　梅干黒焼五分　土茯苓一匁　辰砂五分　右細末シテ
丸スルニ梧桐子ノ大サニメ碾茶（テンチャ）ヲ衣トス用ルすニ歯（ハグキ）ニ中ラザル
ヤウニメ用レバ歯齦（ハグキ）ヨリ血出テ咽燗（ノドクシ）テ病人灸スルホドニ苦ムト雖
モ七日ヲ過レバ食氣出テ本復スル者ナレ多ハ二三日ニノ病人肝（キモ）
ヲツブメ飲得ルコナレ虚弱ナル人ハ必ズ灸スル者也容易ニ用ヒ難
キ方也又輕粉ノ毒ニ中リ内ニ滞リ骨ウヅキニナル者アレハ能〳〵

瘡毒ノ深キコヲ見分テ用ユベシ用ルト其夜ヨリ凝ヲ出シ咽燗
レ痛ニ飲食不ス人言語不聞者也生灸ニツ者ガケト思ハズン
バ不可用

●楊梅瘡羊久ク臭（カヽ）薬トスル方アリ予ガ家ノ秘方ニ水銀二匁
光明朱一匁　鉛（ナマリ）二匁　百草霜見合（ヒヤクソウソウミアハ）ニスル　右ノ薬物ヲ細末シ百草霜
ノ細末ニ入テ一ゼ合セテ厚（ヒヾ）紙ニテ袋ヲコレラ入其袋ノ中ニ右ノ薬
ヲ入テ隨分カタクツメテ長サ七寸ニテ一日ニ一寸宛（ヅヽ）カギ申（ノバ）スヤウ
ニ上ニ刻（キザ）ヲ付テ置キ此藥ニ火ヲ付テ其煙（ケムリ）氣ヲ鼻ニ嗅（カヾ）グナリ
眼ヲ塞ギ口中ニ冷水ヲ含（フヽム）デ嗅（カヾ）ギ也煙ノ外ニ出ヌヤウニ覆（オヽ）ヒヲ
カクベシ其コレラヘヤウ嗅（カヾ）ヤウロ傳多シ一方ニ沈香一匁ヲ加フ
ル好シ此方ハ奇〳〵妙〳〵靈方也又凝薬ナドノヤウニ中ラヌ

モ無キナリ惣ノ楊梅瘡ハアヤレキ療治ニテナケレバ治レ難シト知ルベシ故ニ諸ノ秘方ヲ此ニシルスナリ

瞼瘡

●瞼瘡ハ和俗ニハビキ瘡トイヒ又雁瘡トイヒ毎年八九月ヨリ發リテ二三月ニ愈ルヲ以テ雁ノ故来ニ因テ名付ル也愈カヌル者也此瘡ヲ治セント思ハバ三年ホドセレバ根ヲ切ル者ナリ次第ハ瘡發スルト其ニ〳〵荊防敗毒散ノ四五十貼用テ後白芷升麻湯ノ条下ニ有リ可考是レ其辨方考ノ白芷升麻湯ノ条ノ年モ如是スレバ又其次歳三分ノ一ニ減ル也三年ホド療治スレバ根ヲ切ル也初年ハイツモヨリツヨク發スル者也扨又三年モ治ス

レバ病根ヲ断トイヘドモトクト云聞セテ後可治ス也外治ハ少シ瘡ノカワキメニナリタルヲ三分一ヲ加テ上ヨリ毎度スリヌルベシ惣テ汁ノ多ク出ル瘡ハ濕瘡ナレバ平胃散ノ粉ヲ用ルヲ是予ガ家ノ秘事也可ト秘

●瞼瘡四五月ノ比愈テ後足ノ二陰交ニ灸スベシ奇〳〵妙〳〵

疥癬癬瘡

●疥癬ハ分テ云バ疥ハ皮膚ニアリテ浮淺ナリ多ハ熱ニ属ス癬ハ深沉ニメタ多ハ濕ニ属ス故ニ痒クメ濕ナク班赤点ヲ生ズル也癬ハ痒メ血膿アリ共ニ血熱ノ症也血分熱燥ノ風毒ヲ挾ム也和俗ノ云フ肥癬瘡也初發ニハ荊防敗毒散ヲ用テ發散スベシ久キヲハ荊防敗毒散ニ四物湯ヲ合シ酒芩ヲ酒連ヲ加テ用ベシ

年久キニハ防風通聖散ニ宜シ

● 風齋ニハ去痰捜風湯（回春本条）ヲ用ベシ

● 皮膚鱗（ウロコ）ノ如ク立（タチ）テ痒（カユキ）キ者ニハ浮萍散（回春本条）ヲ用ヨ

● 鶏掌風癬（センソウフウセン）トテ手ノ内側（カタガハ）ニ成（ナル）テ鶏（カシハ）ノ掌（タナゴヽロ）ノ如ク成ル症アリ多ハ虫ヲ生ズル者ナリ和俗ハザクロト云諸ノ方書ニ洗薬ヲ出ス考合テ用ベシ内薬ハ防風通聖散或ハ荊防敗毒散ニ宜シ病人虚弱ナラバ白芷升麻湯ニ宜シ

● 鶏掌風ニハ朝脳（樟脳）ノ一枯礬（明礬焼透）各等分石灰半分酢（ス）ニテトキ貼テ宜シ又川芎ヲ香ノ如ク焼テ毎日三度掌ヲ烘（アブ）ルベシ川芎焼（ヤ）トキ煙ヲ鼻ニ入ラヌヤウニスベシ鼻ヲ紙ニテ塞（フサ）グベシ

瘍瘡

● 瘍瘡ハ和俗シラクモト云フ小児ニ多キ症也陳克ヲ知レハ多クハ不治ノ愈ル也純陽ノ熱毒也荊防敗毒散又ハ防風通聖散ニ加減メ用ヨ多ハ内薬ナレニ貼薬ニテ愈ル也田舎ノ掃雪膏（本条）ヲ貼テ其効如神又一ノ奇方アリ松ノ青キ（マツカサ）ヲ松笠（マツカサ）ノ黒焼（クロヤキ）アセミ（馬酔木ノ変）乾テ各等分細末メ雄黄大黄半分ヲ加テ麻油ニテ解（トキ）テ瘡ヲ剃（カミソリ）刀ニテコソゲテ其上ニ貼ル奇々妙々

● 瘍瘡ハ小児ノ胭（ヒヂ）ノ折目（ヲリメ）ノ横文（ワウモン）ノ内廉（ナイレン）ニ灸スル一ニ各十壮或ハ十五壮スベシ其効如神（陽ノ野人ノ傳也）

癜風

● 癜風ハ和俗ナニヅトゝ云白癜風ハ治シ難シ和俗ハ白癩ト云テ天刑病ノ中ニスル也汗斑（モナニヅ）ハ治シヤスキ也多ハ夏ノ三生スル也蜜陀（ミツダ）

僧ヲ酢ニテ解貼テ宜シ又一奇方爐灰硫黄雄黄樟脳各ホ分
酢ニテトキ貼ベシ其効如神

癘風

●癘風一名癩風又名大風和俗カッタイト云此病人間ノ中天道ニモ放タレタル病ニメ佛氏所謂過去ノ因果ノ悪キ故ニ今病ヲ生ズトゴフ孫真人曰癩風ハ天刑ノ病ニメ治方ナレトアレハ其根ヲ切ル事難キ病也其人色慾ヲ断チ奥肉塩味ヲ断テ保線スレバ生涯見悪ニ不至顔ツキ少シ変イナ者ト人ノ云ホドニテ一生ヲ終ル者也三黄湯トテ黄芩黄連黄柏ノ煎湯ニテ雷丸苦辛ヲ粉ニメ右ノ飲汁ニテ用ル者アリ其効如神

●癘風ノ薬多ハ奇怪ナル薬物ニテ治スル者多シ此一筋ノ療治ヲヨク覚ヘタル者アリ或ハ下シテ虫ヲ取リ或ハ手足面部ニ針ヲ立テ血ヲ出シ或ハ灸治ヲ用ナドシテ治スル事多シ多ハ中古南蛮人渡海ノ時習傳ヘタル家傳ノ人多シ妙方ナル者也諸ノ医書ニモ薬方ヲノス考合ベシ大抵ハ防風通聖散ニテ尊金大黄苦辛皂角子連翹雷丸各等分ニノ粉薬トナシテ一度ニ二匁宛用テ治ス其効如神

折傷

●折傷ハ打身ノ類多シ皆瘀血凝滞スル也打身重キ時ハ大小便不通心腹ヲ攻テ炙ニ至ントス先ヅ通導散（凡打傷ヲ用テ大加テ用ベシ又一奇方芎歸湯ニ蘘木紅花ヲ又大黄一匁水煎服ス何モ右ノ方

孕婦小児虚人ニハ勿用

● 打撲打傷ニハ先ツ蒼菜湯方考ニ出　龍王湯同ヲ振出メ用ユベシ
又青箱子陰干シテ花共ニ一匁人参二分ヲ加テ振出シ用ヒ其効如神

● 諸ノ方書ニ接骨ノ治方多シ皆合テ用ベシ外ヨリハ楊梅皮木瓜各等分粉ニメ紺屋糊ニテ推テセ痛処ニ貼スベシ其効如神
又一奇方鄙臭ヲスリ砕テ貼モヨシ何モ上ニ杉原紙ヲ引サキテ覆フベシ

● 打身ノ妙薬三石見川ト云フ方アリ川骨蒼菜赤小豆半生半炒各二両石見川ハ生ジ名ガヨシ陰干シテメ両　人参一両白芍薬蒲黄石菖蒲百草川芎五味子各一両右細末メ一度三匁ヅヽ酒ニテ用ユ之ヲ打身ノアイズト和俗ニ云也産後ノ血暈金瘧ニモ用ルナリ香月兵部少輔經考ノ家方ナリ予カ家ニ傳来スルナリ

● 高ヨリ墜下メ打撲甚ク瘀血流胸下ニ疼痛不可忍ニ復元活血湯ヲ用ユ酒大黄茈胡當帰各一匁桃仁紅花各三分天花粉穿山甲各七分甘艸三分水前煎シテ服ス其効如神此方古今医統ニ出タリ啓益常ニ用ヒ取験多シ可秘

金瘡

● 金瘡ハ先蒼菜湯龍王湯石見川芎各ノ多少病人勇怯ヲハカリテ治スヘシ血脱ルヽ多キ時ハ先ツ大料ノ独参湯二匁ヨリ五匁ニ至ヲ用ベシ陽長ズレハ陰長ズルノ義ナレバ先ツ元氣

ヲ無何有ノ郷ニ引込スベシ隨分手早ク取廻スベシ湯スル共飲水ヲアタフルヿ勿レ外治ノ医手負ナント七ツ〳〵見付タル者ナラデハ治スルヿアタワズ之ニ因テ外科ノ医ハ氣勇剛ノ者ニ宜シ

● 金瘡ハ先ツ焼酒或ハ温酒ヲ以テ洗フベシ其後鷄子清ヲヌリテ縫合スベシ馬ノ膏ヲヌリタルガヨシ血不止ハ酒ニテヒタト洗フベシ小疵ハ血留ニテ止ベシ大ナル手負ハ血留ニテハ血止ハ者ニテハナシ能〳〵可心得也

● 血留ノ方土用ノ中ノハシブト鳥四季共ヲ取テ首羽毛足ヲ去テ腸ヲ出シ其中ニ當皈川芎蒲黄各一両人参二匁紅花一匁ヘテ糸ヲ以ヌイ合セテ黒焼ニメ一度ニ一匁服スレバ血止ハ也

● 面春ノ止痛生肌散本条ニ見モ妙ナリ

● 少キ切疵ノ血留ニハ鉄蕉ノ木ノ綿ニ蒲黄ヲモミ入テ疵口ニ貼テヨシ華屋ノ華ノカンナクズニ蒲黄ヲモミ入テモヨシ石腸ト云者モヨシ海鰍ノ鰭モヨシ刻烟艸ヲ貼モヨシ何レモ常ニアル者ニメ急ニ備ヘ易シ重宝ナルヿ也何モ可秘

破傷風

● 破傷風ト八金瘡ノ口ニ膏薬ヲ不貼其瘡口ヨリ風邪入テ經脉ニ中リ善テ行テ數〳〵變ズルニ因テ反張痙ノ狀痙病ノ如ク其死生在項刻急〳〵ニ治スベシ先ヅ羌活防風湯四春本条ニ加減メ可用又ハ苦菜湯龍王湯ノ類ヲ可用

● 破傷風裏ニ邪氣入寸ハ疎導ノ剤ヲ用ヨ大芎黄湯四春本条ニ加減ノ用ヨ

湯火傷

●湯火傷ニハ蛤蠣殻ヲ炙リ焦シ黄色ニメ細末メ麻油ニテ貼ベシ其効如神

●湯火ニテ焼タルニハ蜜水ヲヌレバ痛立処ニ止也

●湯火傷共ニ石羔黄丹黄柏榆白皮桐木ノ甘皮各等分末メ麻油ニテ貼ヨ其効如神

●湯火傷共ニ痛甚ク大小便不通者火毒下焦ニ傳フ四物湯ニ黄連木通山梔子赤茯苓連翹ヲ加テ用ヨ其効如神

●湯火傷共ニ肉壊テ痛甚キ者ニハ四物湯ニ人参黄芪白芷連翹甘艸ヲ加テ用ヨ数剤ニメ新肉生ス

蟲獣傷

●狗ノ咬傷ニハ杏仁甘艸ヲ口ニテ咬砕テ痛処ニ貼ヨ又一方杏ヲ研砕テ貼ヨ又一方草麻子ヲ新汲水ニスリテ貼ヨ甚有効又一方蕎葺葉ヲ煎メ洗ヒ甘艸ノ細末ヲ貼ヨ

●狗咬タルニ倉卒ニ無薬ナルハ小便ヲ以洗ヒ百草霜ヲ麻油ニテトキ貼ヨ或ハ牛糞ヲ以貼之

●馬ニ咬レタルニハ寒水石雄黄ヲ細末メ之ヲ貼ヨ其効如神

又一方馬歯莧ヲ杵キ爛シ煎服ス外ニハ益母草ヲ杵テ貼ヨ

●猫ノ咬タルニハ薄苛ノ前火湯ニテ洗ヒ紫金錠万金丹玉掘丹ノ類ヲ用ヨ

●鼠ノ咬タルニハ猫ノ毛ヲ焼テ貼ヨ麝香少許加テ妙也又一方茄葉ヲ煎メ洗テ妙也又一方紫蘇ノ煎湯ニテ洗テ妙ナリ

●蛇ノ咬タルニハ雄黄五靈脂等分細末ノ貼ヨ又一方貝母ヲ好酒ニテ服レタル佳去心細末メ用也又一方白芷ノ細末ヲ麥門冬湯ニテ服スベシ

●蛇ノ咬タルニ日本ニ云所ノ椿ノ葉焼テ灰汁ニタレテ其汁ヲモツテ洗フベシ腫漸〳〵ニ引ナリ扨蛇ノ咬タル所ニ蠅ヲ殺シ五ツ頭糊ニヌレ〳〵ゼテ貼レバ咬タル口目ヨリ汁出テ痛止腫消スルナリ奇〳〵妙〳〵

●蛇ノ咬タルニ藥無キ所ニテハ蒜ノ實ニテモ又ハ葉ニテモ又白莖ニテモ杵爛レ咬口ニ貼テ錠子ノ如クニメ其上ニ艾灸スベシ下ニ火氣通ズルホドスベキ也

●蜘蛛ノ咬タルニハ雄黄細末メ麝香ヲ加テ貼テ宜シ

●蚯蚓ノ咬タルニハ雄黄南星半夏ヲ細末メ貼テ宜シ又一方五倍子阿仙藥細末メ津液ヲ以テ潤メ貼ヨ其効如神又一方ニ先ヅ塩湯ニテ痛処ヲ洗ヒ呉茱萸嚼爛メ貼之或ハ井底ノ泥ヲ貼モ宜シ

●蜂ノサシタルニハ小便ヲ以テ洗ヒ拭ヒ乾メ香油ヲ塗テ宜シ又一方雄黄末ヲ貼テ吉シ又蜂房ノ末ヲ揉テ其効如神

●蜥蜴壁虎ノ咬タルニハ大黄雄黄ノ細末ヲ醋ニ磨メ貼ヨ又白礬ヲヌリタルモヨシ

●蚯蚓ノ毒ニ中リ或ハ此物ニ小便ヲ仕カクレバ陰莖腫痛シ或ハ大風ノ狀ノ如ク眉落ルニ至ル也石灰ヲ熱湯ニ炮シテ冷メ患ル所ヲ洗ヘハ治ス浸之久クメ佳也小児多ク此毒ニ中リテ陰莖陰嚢

共ニ膓テ水炮ノ如クニナル者アリ鴨ノ血ヲ塗レハ立ㇾ処ニ消ス一方ニ塩湯ニテ洗テ其効如ㇾ神

○蚕ノ咬タルニハ苧葉ヲ揉テ貼ㇾ之奇〳〵妙〳〵

○惣テ虫獣ノ咬タルニハ雄黄ヲ貼タルガヨシ或ハ紫金錠玉樞丹ヲ用レ山家又ハ野陳ノ時ハ雄黄麝香ヲ畜テ身ニ帯ベシ邪悪ノ虫獣ノ毒ヲ避ルㇾ奇〳〵妙〳〵可ㇾ秘

中毒付臭骨骾

○諸ノ毒ニ中リタルニハ先ツ白扁豆一味ヲ煎服スベシ多ハ解ス

○中毒ニハ紫金錠玉樞丹錦袋子万金丹等ノ薬ヲ服スベシ五倍子阿仙薬雄黄ノ類毒ヲ解スルノ聖薬也

○諸ノ中毒ニハ甘艸黒豆緑豆ヲ用テ解スベシ万金丹モヨク毒ヲ解スルノ薬也

○砒石ノ毒ニ中リタルハ黄丹水銀青黛菉豆焔硝各等分細末メ調下ス

○誤テ針ヲ呑ム者ニハ蚕豆一名胡麻ヲ煮熟シ韮菜ト同ク吐下セバ針菜ト同ク大便ヨリ出ル也

○誤テ金銀銅鉄ノ物ヲ呑テ不ㇾ能ㇾ化者ニハ砂仁濃煎湯ヲ服スベシ其物自ラ下ル

○誤テ水蛭ヲ呑者ニハ蜜ヲ食フベシ即化ノ水トナル也又濃茶ヲ多服スレハ又効アリ

○誤テ木屑ヲ呑三咽ニアツテ不ㇾ下ハ灸有ㇾ須臾鉄斧ヲ用テ磨水ニ灌キ下セバ立処ニ効アリ

●誤テ麥稍ノ芒(ノギ)針刺木屑金銀銅鉄ノ類或ハ鷄臭ヲ食テ骨咽喉(ムキノイノコ)ニ骾スレバ腫痛レテ炎在須臾ニ四春中毒門ノ白衣丸ヲ用ヒ其効如神

●河豚(カトヒ)臭惣テ臭毒ニ中リタルニハ擽(カヒ)攪(カラ)ノ煎湯ヲ服スベシ山查砂仁ノ煎湯モ奇妙也玉樞丹紫金錠ノ類ヲ用ユレバ其効如神

●茸毒ニハ黒豆汁ヲ用テ奇也紫金万金玉樞丹尤有効

●諸臭ノ骨骾ニハ神仙釣骨丹(四春本条)ヲ用ベシ効ヲ取ルコト多シ

●骨骾ニハ砂仁甘艸ヲ綃ニ包ミテ含(フク)ミタルガヨシ

●骨骾ニハ曹鳥(カヲトドリ)トユフ鳥深山ノ川ニ有ル鳥也頭ノ毛ワカレテ曹(カヲトドリ)ノ如シ羽毛ハ山鳥ノ如シ山家ノ獵(リョウ)士ハヨク知(シル)也鉄鉋(テツホウ)ニテ殺ス也此鳥ヲ腸(ハラワタ)ヲ出シ羽毛共ニ黒焼ニノ咽ニ吹入ル竹ノ管ヲ用ルナリ服メモ佳也奇妙ノ物也啓益初メ　中津候小笠原君ニ仕ヘテ豊前ニ住セシ時此鳥(カヲトリ)ヲ取ルニ假(カリテ)君命(クンメイ)ヲ山川ノ獵士ニ命メ取畜ヘタルガ實永戊子ノ京師ノ火災ニ焼(セウ)失(シツ)ス惜(ヲシ)ムベシ

救急

●暴(ニハカ)ニ卒死五絶ノ類ニハ半夏ノ末黄豆大許鼻中ニ吹入レハ即蘇生(ヨミカヘル)スル也

●自ラ縊(クビ)テ死(シヌ)ル者ハ俄(ニハカ)ニ繩(ナハ)ヲ断(キル)ベカラス衣物ニテ頂(イタヽキ)ト谷道トヲキビレノ厚(アツ)キ処ヲ抱(カヽヘ)テ起テ後繩ヲ解(トク)ベシ扨(サテ)其頂痕(イタヽキアト)ヲ採(モミ)和ゲ鳧(ケリ)ノ子(コ)ヲ取(トリ)其両耳ヲ吹(フキ)テ氣微ク出ル処ヲ鷄冠(ケイクワン)ノ血ヲ刺(サシ)テ口中ニ滴(タラ)シ入レバ即蘇生スル也

●水ニ溺ル、者ハ竈中ノ灰ヲ取リ両垣ニ埋之従頭足ニ至ル如是スレバ水七竅ヨリ出ル也又皂角ノ末ヲ揣テ下部ニ入レバ須臾ニメ水出テ甦生スルナリ又急ニ溺人ノ衣帯ヲトキ脐中ニ灸スルモ又即術ナリ

●冬月凍死ノ者又ハ水ニ墮テ凍死スル者ハ先ヅ火ヲ用テ灸ベシ或ハ布袋ニ熬灰ヲ盛リ心頭ニ放ヲキ冷ヘバ即熬スルニ換テ眼ヲ開ヲ待テ温酒姜湯ヲ用ヘシ

●夏月暑ヲ挾テ死スル者ニハ冷水ヲ以テ冷サシムルヿナカレ熱湯ヲ以テ其心腹ヲ摩リ洗ベシ即甦生スル也或ハ旅途ノ中ニテ急切ノアハ路上ノ熬土ヲ取テ腹脐ノ間ニ置テ其中ニ穴ヲナシテ人ヲメ更ゝ其脐中ニ小便セシムベシ忽甦生スル也

●鬼ニ魘レテ死スル者ハ皂角ノ末大豆許鼻中ニ吹入レバ即蘇生スル也

牛山先生活套巻之下終

牛山先生活套後叙

夫醫之為道也大而其書亦博矣
香月先生尤為醫林瓊枝也嘗著
數篇書其彀盖於世術亦神焉茲
有活套方考二書繕寫而未梓一
日書肆何某過予曰膾炙人口久
矣不若與衆嘗之乎請校正而以
公之予愧短才以固辞之強猶不
許夫以如庸醫不能衷論文意則
不知奏其功也值片言隻字而難
曉則失其病可救也繇此加國字
以使易解而便于昧者也若博覧
士覧之而有鼻魯之差則非先生
罪予肉祖以謝焉昔安永戊戌冬

泉州後學木村桂菴書於平安第

五街之家塾

平安　南窗武吉幹書

牛山方考嗣出

安永八己亥年仲冬十吉旦

浪速　高麗橋一丁目　淺野弥兵衛

京師　佛光寺寺町西入丁　山田三良兵衛

寺町五條上ル町　葛西市良兵衛

堀川佛光寺下ル丁　河南四良右衛門

五條橋通高倉東入丁　北村四良兵衛

寺町通蛸茅師下ル丁　山本平左衛門

92
1059

日

山本幸五郎
浦井兵四郎
門脇右京四郎
浦井兵四郎
山田三良
浦井兵四郎

日

(印)

