醫学源流

金 一二三四

御院敕正醫學源流　金

御院敕正醫學源流　石

御院敕正醫學源流　絲

御院敕正醫學源流　竹

書林積善堂

御院攷正醫學源流 金

御院攷正醫學源流 石

御院攷正醫學源流 絲

御院攷正醫學源流 竹

陳奇泉重梓

御院攷正醫學源流 匏

御院攷正醫學源流 土

御院攷正醫學源流 革

御院攷正醫學源流 木

醫學源流肯綮大成敘

夫醫之爲道。死生所寄。其繫於人也大矣。其傳於世也久矣。粤自軒岐著素問越人作難經。其言陰陽五行之奧。四時氣運之候。廣大精微。靡所不貫。誠爲醫家赤幟。而竟不立方者。何哉。醫尚明理。而方則變化無窮。不可執一論也。嗣後張長沙外感。李東垣內傷。劉河間熱症

朱丹溪雜病迭出。一皆祖述素難。而引伸觸類之耳。亦儒然百世之師也。近代虞搏方廣二先生。以丹溪得考亭之真傳。而心法不足以盡丹溪之餘緒。復拓爲正傳附餘二書。業醫者。樂其軌轍可循。未嘗一涉於理。惟襲糟粕以用於世。醫之術愈趨愈舛矣。嗟夫。醫豈易言哉。余雖不敏。幸承祖父家學。而與有聞焉。

其於素難群書。罔不潛心鑽仰。然詳於論者。畧於方。詳於方者。畧於法。唯正傳則兼有之。而中間未必無闕。奚足爲醫道大成耶。故不揣荒愚。因其脉訣發明者。正有定論。藥性繁雜者。刪有切要。研經有難。設或問數十款於首篇。察病有機。列指南數百言於上截。按以理氣詳於治法。卓有效驗者。削譌辟舛。發古通

今輯爲一十六卷名曰醫學源流肯脊大成雖正後學趨向而躋天下于仁壽亦不過竊比正傳得少補其闕畧耳豈敢妄有所諢哉學者必經儒學而業此焉則庶乎其不差矣苟同志高明復加郢正俾是書爲可大可久之傳茲非余之幸歟

時曆癸未夏四月饒陽余應奎叙

一九諸病總論皆採掇內經要言以爲提綱繼之以歷代名醫可法之語間或附以己意以成篇段謹僭列各病之首

一九脉法皆採掇王叔和脉經要語本經缺者則於歷代名醫諸書採其可法之語以附録之

一九方法備載於脉法之後其傷寒一宗張仲景內傷一宗李東垣小兒科多本於錢仲陽其餘諸病悉以丹溪要語及所著諸方冠於其首次以劉張李三家之方選其精粹者繼之於後外有諸家名医有理妙方又採附於其末以備參攷

一九祖父口傳心授及自己歷年經驗方法不敢私匿悉皆附於諸條之末與衆共施本病無者則缺之

一九自己積年歷試四方之病或用心以變法取巧而治愈者悉附於各條之末俾後人或有可採擇焉無者缺之

一凡集錄諸賢成方蓋為後學設繩墨耳學者不可固執古方以售今病故又以丹溪活套備錄於各條之後欲使後學執中之有權耳

一凡丹溪諸方法見諸盧氏纂要者悉錄之无遺但有增而無減耳惟丹溪醫按不錄非為厭繁將欲採歷代名醫治驗忽成一書名為古今諸賢醫按有志未暇姑俟諸歲月云

一凡古今分兩重數太多難憑修合今悉改為小劑且如一料十貼之數原方用藥一兩一貼止該一錢從其輕重以十取一惟效東垣都在一服之義庶使後學依方修合之便云

一凡古方云吹咀者今悉改為細切庶使後學之易曉也

一凡俯製藥石不別立篇目就於各條藥下細註雖若繁增庶免鹵莽者忽畧以誤人也

一凡用水一盞即今之白茶盞也約計半斤之數餘倣此

一凡醫孝或五十條皆愚意設之以申明先哲言不盡之義是用書字卷之貳之賢者共議耳非敢自以為是煩賢者斤正之勿消愚意

一凡病机見症脉息藥劑要訣採摭古之名醫心法列于一卷上層

津經所関宜熟讀精思慎勿以泛常視之可也

一凡病原出於何經當用某藥某方或見于本門之下或見於某門之中名曰指南列于各門上層以便後之君子括且

一凡病目謹依医學正傳之舊凡有增入者上層註補遺二字下層註附餘二字以別之其間以門而分者庶見病机之同也

一凡病症欠發明處藥方有疑誰處予綴俗說以通之有愚按二字分別倘有差謬後之君子冀賜教焉

九倒終

醫學源流肯綮大成目錄

一卷

病機要訣　四気五臟　六淫五悪　五科七事　十剤七方　労傷六極
欲苦九気　六脱　五按　五勝　五諸
九藏　九候　四因　四因　七損
八益　五虛五實　三陰三陽　四海　五官
四象　四失　五逆　八虛　五色
五氣　五味五神　四傷四病　三虛三實　八脉八要
六部定位　六部生尅　四脉　二神　四取
三持　六察　四明　七表　八裏
九逆　七極　五運　六気　十二経症

二卷

中風門
中腑　中藏　中經脉
濕痰　気血両虚　気虚　痰火
傷寒門
外傷　内傷　外受
發熱　腹痛　自利
陽症　陰症　虚煩
狐惑　陰陽易　験症舌法
験症舌法　食後　労後　結胸
三卷
瘟疫門
腫瘟　辟瘟法　大頭瘟　癰瘟　感冒
瘴気　暑瘟　冬瘟　蝦蟇温
斑疹門
陽斑　陰斑　醋疹　癮疹
内傷門
過食傷　餓飢傷　熱鬱傷
房労傷　飲酒傷　脾肖不和　脾胃虚損　労役傷
脾胃虚寒　脾胃伏火　脾胃中濕　挾痰傷　脾胃停食
中暑門
動而得之　静而得之　挾外感傷
中濕門
外因　内因
燥症門
寒燥　風燥　火燥
火熱門

君火　相火　鬱火
實火　五志之火　虛火

四卷

鬱症門
氣鬱　濕鬱　血鬱
食鬱　痰鬱　火鬱

痰飲門
老痰 附鬱　風痰　痰飲
酒痰　濕痰　寒痰
咳嗽門
外因　火嗽　痰嗽
肺痿　肺脹　肺虛
哮喘門

痰喘　氣喘　火炎上喘　胃虛喘　短氣
癰疽門
外因　內因　虛癰
霍乱門
濕霍乱　乾霍乱　暑霍乱
泄瀉門
濡泄　腸垢泄　鶩泄
痰積泄　虛泄　滑泄　飧泄　食積泄

五卷

痢症門
熱甚內實　挾風邪　傷血分　傷氣分
食積　噤口　滑脫　休息痢　氣血俱傷
嘔吐門　痢後風

胃熱　胃寒　食鬱　氣鬱　痰壅
胃虛
噎膈門
痰氣　火炎　虛症
飢遊門
胃火　陰火　痰氣逆滯　胃寒　病飢
吞酸門
吞酸　吐酸
嘈雜噯門
痰嘈雜　食鬱熱　氣熱　火嘈
痞滿門
中氣不足　食積　濕熱　痰滯
腫脹門

六卷

實腫　陰水浮腫　陽水浮腫　風水腫　皮水腫
裏水腫　虛腫　外感脹　內傷脹　氣脹
水脹　血脹　熱脹　寒脹
積聚門
肝積　心積　脾積　肺積　腎積
聚　癥　瘕
虛損門
陽虛　陰虛　氣血兩虛
勞極門
勞熱　勞嗽　勞咯血　勞損　勞瘵

七卷

眩暈門

外感眩　虛眩　痰火眩
頭痛門
六經痛　虛痛　風濕寒熱　痰痛　眉脽痛
胃脘門
虛痛　實痛　熱厥心痛　寒厥心痛　痰飲食積
腹痛門
熱痛　寒痛　痰痛　積痛　虛痛
实痛　血痛　腸癖痛　積聚痛　陰毒
砂症
腰痛門
腎虛腰痛　腎着腰痛　寒濕腰痛　濕熱腰痛　風熱腰痛
閃挫腰痛　勞役腰痛　氣滯腰痛

脇痛門
肝火　木氣實　死血痛　食積痛　濕熱痛
痰積　氣滯　虛痛

卷
諸氣門
氣虛　氣實　氣滯　氣寒
疝氣門
七疝　木腎　食積濕痰死血　虛疝
脚氣門
受濕　挾寒　挾熱　挾風　食積
痛風門
痰　濕　氣血虛　附死血　風熱
痿症門

血虛　食積　濕熱
諸蟲門
五虫　蛔虫　諸虫
陰蝕虫
九卷
麻木門
五痺名状　風痺　寒痺
耳病門
風耳　熱耳　虛耳
目病門
實熱　虛眼　養陽
口舌門
口舌病　唇舌病
障翳　點洗
氣耳
濕痺
孤惑虫　痔虫

寒痺門
陽症　陰症　瘀症
齒病門
口瘡　風寒　濕熱
鼻病門
鼻塞　鼻瘡癰　鼻孔乾燥　鼻淵　鼻衄
十卷
血症門
欬血　咯血　吐血
便血　衄血　溺血
痔漏門
諸痔瘡　諸漏瘡　脫肛
汗症門

陽虛自汗　濕勝自汗　表虛自汗　虛火自汗　痰症自汗
盜汗　心汗
痙症門
剛痙　柔痙
厥症門
陰厥　陽厥　痰厥
蚘厥　尸厥　氣厥　血厥
頭狂癎門
顛症　狂症　癎症
邪祟門
肝虛　心虛　脾虛
怔忡驚悸健忘門　肺虛
驚悸　怔忡　健忘　胃虛
三消門
消渴　消中　脊消
十一卷
便溏門
赤濁　白濁　膏遺　精滑
淋閉門
血淋　氣淋
膏淋　沙石淋　勞淋
寒淋　熱淋　虛閉　痰閉　熱閉
小便不禁
秘結門
陽結　陰結　風秘　虛秘　氣秘
黃疸門
穀疸　酒疸　女勞疸　黃汗疸　黃疸

溫熱黃　陰黃　瘀血黃　虛黃
癘風門
初起　虫食
跌傷門
內治　外治
破傷風門
內服　外治　奇方

十二卷

瘡瘍門
腦發　髮發　髭鬚發　脊發　背發
脊癰　肩癰　附骨疽　肺癰　腸癰
乳癰　乳岩　惡瘡癰　便毒　瘰癧
馬刀　癭瘤　結核　疔瘡　青疔
赤疔　白疔　黑疔　蛇疔　大泡瘡
骨曹風瘡　臁瘡　湯火瘡　痔瘡　疥瘡
癬瘡　紫白癜瘋　流注風　馬刀下　陰毬瘡　楊梅瘡
楊梅瘋　鵝掌瘋　鎖喉　流注下　紅絲瘡　痤瘡

十三卷

婦人科經候
月水不調　月水不通　室女經閉成癆　月水不利
月水不斷　崩漏　赤白帶
胎前衆疾
惡阻　子腫　子煩　子懸　子淋
子瘖　胎水　胎氣　滿胎　胎動
傷胎　胎冷　兒黤　胎熱　中風
傷寒　傷風　傷食　傷暑　咳嗽

癲疾　泄瀉　痢疾　心痛
腰痛　怔忡　二便不通　霍亂　腹痛　悲傷

十四卷

小產門

通用　一月　二月　三月　四月
五月　六月　七月　八月　九月
束胎
催生　死胎　胞衣不下　斷產　難產

產後衆疾

血暈　失血　惡露　蓐勞　不語
乍見鬼神　無乳　嗆脫　發熱
中風　風痓　傷寒　嗽　瘧疾
泄瀉　下痢　遍身疼　脚疼　口鼻黑作衄

霍乱　氣喘急　鬱冒　心腹痛
汚腫　腹脹嘔吐　淋附胞損　小便不利　脚氣

十五卷

小兒科

初誕　噤風　撮口　臍風
急驚　慢驚　胛風　發搐　驚癇
天釣　內釣　盤腸氣
吐瀉　腹脹　腹痛　驚風
鮮顦　顦填　赤遊風　蚘蟲　語遲　滯顋
龜胸　龜背　鶴膝　行遲　鵝口
重胵　重舌木舌　弄舌　脫肛
頭瘡　顖陷　附顱下　遺尿

十六卷

瘡瘍門
頭面部位　瘡期治法　三法治例　治有五法　當微汗下
妄表妄下　瘡疹驚搐　變黑腰疼　灰白痒塌　音啞作嗆
寒戰咬牙　乾陷倒靨　口乾發渴　咬牀欠漱　發熱生死
報瘡生死　起脹生死　貫膿生死　結靨生死　附遺症治
附遺凶症　辯疑賦　須知啼叫乾陷下
痲疹門
痲疹附餘　辨疑賦　痲疹輕重不治要訣
痲疹源流自啓大成卷之一

太醫院補鑄真定御醫學
太醫院醫官金谿西園龔信編輯
仁和饒濾東余應奎補遺
建邑書林積善堂高泉陳賢繡梓

痲疹指南

四氣五變

夫四氣者春温夏熱秋涼冬寒故春食宜夏食宜秋食温冬食熱謹當調之無使病生○五變者大有金木水火土變也故則生災人身有心肝脾肺腎變則生病故未變逆之逆謂吐之今其條逆也火變發之發謂發汗令其疎

源流問答

或問内經曰知標本者萬舉萬當不知標本者是謂妄行是以當知標本乃醫家之大關節也其旨蓋為我言之曰夫標者如觀察之有標準去處即如病見有形即曰經絡明認得標可以察外而求諸内也夫本者如事物未萌之時而有根本之根可以察隱微而知發露緣五運六氣病之機也即曰運氣明識得本治千人無一損原夫標本之大豈特茲而已哉猶有十二經之標本有

散也土發奪之奪謂下之令無擁塞也金發泄之泄謂滲泄解表利小便也水發抑之抑謂制其中逆也調是五法乃氣可平矣

六淫五惡

夫六淫者風淫於內治以辛涼佐以苦以甘緩之以辛散之熱淫於內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之濕淫於內治以苦燥之以淡泄之火淫於內治以酸收之以苦辛以酸泄之燥淫於內治以苦溫佐以甘辛以苦堅之以辛潤之○五惡者心惡熱肺惡寒肝惡風脾惡濕腎惡燥

五科七事

夫五科者脉病證治

治療之標本有可從不可從之標本有病感于本者而延及于標有邪侵于標而于本者醫當究心經旨臨症洞察治病則如探囊啟鑰然耳不則害生焉夫十二經標本者謂手足三陰三陽之各殊手少陰心爲本火陰肝爲標也足厥陰肝木爲本手厥陰心胞絡爲標也太陽者足膀胱爲本手小腸標也手足太陰脾乃本肺爲標手足陽明大腸本也胃乃標耳手足少陽三焦本也膽乃標耳手足少陰從本從標者謂水火之性照隔故耳手足太陰從乎本治者謂脾與肺體性相連故也手足少陽從乎本治者謂膽係陽木火之本也手足陰陽明不從標本從乎中治者謂胞絡與肝胃與大腸苦無差遠故不從標本從乎中治其治病之標本者謂如先起其病而後變別病則先病爲本後病爲標若邪經者仍以治本爲主標以無之急則治標若後有二便不通并膨脹之急則當先治其標而無其本耳又如傷寒內動氣虛感邪一日二日乃足太陽膀胱經風府風池腰背頭額而入故拘攣是陽犯乎陰襲于表則左手人迎脉浮緊則知太陽之寒侵于手太陽之標陽氣塞而惡寒發熱故宜汗之即火發則發之義耳設無口乾小水赤塞是標本俱病則不宜麻黃桂枝湯葱姜之偏惟宜九味羌活湯內有黃芩生地乃手太陽丙之藥也諸症當以類推焉舉一隅而不以三隅反者不但責無心悟之妙觸類而不能推倣其亦庸也已矣苟不明理冒名而曷利者天何容焉故聖人立端于始表正於終推餘于無窮蓋醫廼古之聖王明之者生命之重係豈容不精微可乎就如近時習針灸者但知按

及其所因七事者所因復分為三故因脉以識病因病以辨症因症以施治又曰既明五科每科須識其要脉有浮沉遲數病有風寒氣冷症有虛實寒熱治有汗下補吐若於二因推明外曰異熱濕風內曰喜怒憂思不內外曰勞逸在強各有症候詳而推之若網在綱有條不紊則醫之能事畢矣

經絡疼痛者宜瀉痺痲者該補殊不知痛有實痛虛痛偶有效者反招益虛矣古之以鍼得名者必脉理明而補瀉當斯効之神矣原鍼之補乃導引抽添曰補非力能資神之謂也瀉者行升陰之法出則搖大其孔以洩其氣出其血瀉乃真也明于脉藥者而行鍼灸則合標本矣不窮經理之虛實只按經絡而鍼灸若是知標而昧本抑亦疎耳茲係仁術慎勿害仁大哉標本以告同志者省焉

或問內經曰五藏配合五行四時五音何謂也曰五行者金木水火土也四時者春夏秋冬也五音者宮商角徵羽也肝主筋其華在爪其藏魂其聲呼其液泣應角音調而直屬木應乎春令其色青其味酸心主血脉其榮在色其藏神其養血其候舌其聲言其液汗應徵音和而長屬火應乎夏令其色赤其味苦肺主鼻其充在皮其藏魄其主聲其哭其液涕應商音輕而勁屬金應乎秋令其色白其味辛腎其華在髮其充在骨其藏精與志其主液其候耳其聲呻其液涎應羽音沉而深屬水應乎冬令其色黑其味鹹脾其華在唇肆白其充在肌其藏意與志其聲歌其液涎應宮音大而和屬土應乎四季月其色黃其味甘是五藏配合五行四時五音也

或問醫孝源流自軒岐以來以醫術鳴世與夫著書立言俾後人之可法者幾何人哉請明以告我曰予嘗隅坐學士宋公景濂之文而得其說矣請陳如左夫黃帝內經雖疑先秦之士依倣而作之其言深而要其旨遂以弘其攷辯信而有徵是為醫家之宗下此則秦越人

十劑七方

論劑者和也不十不足以盡劑之用十劑者宣通補瀉輕重滑澁燥溫也○所謂宣劑者即吐法升而上也內經曰高者因而越之木鬱則達之之謂也○通劑者流通之謂行其滯也○補劑者補其不足也酸苦甘辛鹹各補其藏○瀉劑者世瀉之謂也諸痛為實痛隨利

減內經曰實則瀉之實則達之○輕劑者風寒之邪客於皮膚頭痛身熱宜輕劑以表解之○重劑者氣浮必重竭之如瀉延宜代赭以絕之○滑劑者如大便燥結小便淋澁宜用之礼曰滑以養穀也○澁劑者如寢汗不禁滑泄不已喘欬上奔俱宜澁之○燥劑者如積寒久冷食已不饑吐利腥穢屈伸不便上下所出水液溶澈冷冰此大寒之故宜燥之非大寒不可用若濕病自有滲溫平劑○溫劑者潤澤之謂與滑相類少有不同內經曰辛以潤之辛能散氣能化液故也人有枯涸皴揭之病非獨金化為然蓋有火化乘之非濕劑莫能愈也○方者合也不七不足以盡方之變七方者大小緩急奇偶復也○何謂大和緩和緩無書可傳越人所著八十一難經則憂肇內經之要而推明者也又下此則淳于意華陀陀之熊經鴟顧固亦導引家之一術至於剖腹背俞腸胃而去疾則涉於神怪矣意之醫狀司馬遷備誌之其所流逋風昏風者今人絕不知為何病也況復求其治療之深旨乎又下此則張機之金匱玉函經及傷寒諸論誠千古不刊之奴典第詳於六氣所傷而於嗜慾食飲罷勞之所致者畧而不議蕭之文字鎖簡亦未易以序次求之也又下此則王叔和叔和纂岐伯華陀等書為脉經又陰陽辨內外三部九候人迎氣口條陳十二經絡洎夫三焦五臟六腑之病最為著明惜乎為妄男子括以膚陋之脉歌遂使其本書不盛行于世也又下此則巢元方其病源後編似不為無所見者但言風寒二氣而不着溫熱之文乃其疎也又下此則日水氷雹五運六氣之變撰為天元玉策周詳切密亦人之所難苟泥之則局滯而不通矣又下此則王燾孫思邈思邈以絕人之識操慈仁惻隱之心其叙千金方翌及祖工害人之禍至為憤切後人稍闖其藩垣亦足以其術鳴但不制傷寒之書或不能無遺憾也燾雖聞明外臺秘要所言方証符禁灼炙之詳頗有所祖述然謂鍼能殺生人而不能起死人者則一偏之見也又下此則錢乙龐安時許叔微叔微在準繩尺寸之中而無所發明安時雖能出奇應變而終未離於範圍二人皆得張機之粗者也惟乙深造機之閫奥而擷其精華達為五藏之方各隨所宜謂肝有相火則有瀉皆啓內經之秘尤知者之所取法也世踈以嬰孺醫

目之何其知乙之淺哉其遺書散亡出於閣孝忠所集者多孝忠之意初非乙之本真也又下此則上谷張元素河間劉完素睢水張從政元素之與完素雖設為奇奥人以神其授受實聞乙之風而興起焉若從正則又宗乎完素完素者也元素以古方今病決不能相值治病一切不以方故具書亦不傳其有存於今者皆後來之所附會其學則東垣李杲深得之杲推明內外二陽而多注意於補脾胜設蓋以為一身之主土平則諸藏平矣從正以吐汗下三法風寒暑溫燥火六門為醫之關鍵其治多攻利不善學者殺人完素論風火之病以內經病機氣宜一十九條著為原病式闡奥粹微有非大觀官局諸醫所可髣髴宪其設施則亦不越攻補二者之間也近代名醫若吳中羅益滄洲吕復皆承東垣之餘緒武林羅知悔廾溪朱彥脩各悉完素之流風又若台之朱佐越之滑壽咸有著述未易枚舉嗟乎自有內經以來醫書之藏有司者凡一百七十九家二百有九部一千二百五十九卷亦不為不多矣若夫歷代明醫出處本最者言之耳豈能悉具於斯乎

或問醫學校受之原既得聞命矣未審吾子之學何所適從傳曰醫不三世不服其藥或謂祖父相承謂之三世或謂善讀三世之書則為三世之醫子讀三世之書欤為祖父相承之家學欤請明言其故可乎曰草莽之學其可云乎然醫不止於三世而其書又奚止於三代哉當取其可法者言之耳予同邑廾溪朱彥脩先生上承劉張三家之學而得羅太無為之依歸以醫道大鳴于當世遐迩咸取法焉予故曾叔祖誠齋府君幸與廾溪

方有二說焉有君一臣三佐九使之大方有分兩大而頓服之大方蓋治肝腎在下而遠者宜頓服而數少之大方故病有兼症而邪不專一不可以一二味之大方治者故宜君一臣三佐九使之大方也○小方之說亦有二焉有君一臣二之小方有分兩微而頻服之小方蓋治心肺及在上而近者宜分兩微而少服而數之徐以伸之是此病無兼証邪氣專一可一二味而治者故宜君一臣二之小方然肝之三服可作心之七服脾之七服二服可作肺之七服○緩方之說有五有以緩之之緩方蓋病在胸膈取其能恣也有九以緩之之緩方有品類群衆之緩方有無毒治病之緩方有氣味薄弱之緩方故補上治上制之

以緩下則氣味薄也○急方之說有五有急病急方如心腹暴痛便閉不通借備急丹以攻之此藥用不宜常蓋病不容俟也有湯散湯滌之急方有藥性有毒能上湧下泄可以奪病之大勢之急方有氣味厚藥之急方○奇方之說有二有獨用一物之奇方病在上而近者宜奇方也有數合湯數謂一三五七九之奇方故奇方宜下不宜汗○偶方之說有三有味相配之偶方有兩方相合之偶方有數合偶數如二四六八十之偶方故偶方宜汗不宜下○復方之說有二有二方三方相合之復方有分兩均齊之復方各得分是也

勞傷六極

夫五勞者蓋尽力謀慮勞傷于肝應乎筋

生同世居同鄉於是獲沾親炙之化亦以其術鳴世故予祖父相承家傳之學有所自來予惟愧夫才踈質鈍而不能奉揚箕裘之業為憾耳豈足道哉

或問亢則害承制之義何如曰王安道論之詳矣其間猶有未悉之旨請陳其畧如左黃帝曰願聞地理之應六節氣位何如岐伯曰顯明之右君火之位也君火之右退行一步相火治之復行一步土氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治之復行一步木氣治之復行一步相火之下水氣承之水位之下土氣承之土位之下火氣承之君火之下陰精承之亢則害承制也制則生化外列盛衰害則敗亂生化大病夫五行之木上金木各一惟火有二曰君火曰相火在地理分布六方在歲時分為六氣初氣自丑至卯始于大寒而終于分厥陰風木主之二氣自卯至巳始于春分而終于小滿少陰君火主之三氣自巳至未始于小滿而終于大暑少陽相火主之四氣自未至酉始于大暑而終于秋分太陰濕土主之五氣自酉至亥始于秋分而終于小雪陽明燥金主之終氣自亥至丑始于小雪而終于大寒太陽寒水主之夫所謂顯明者指方位而言日出於卯之地也少陰君火始于此而右遷故曰顯明之右蓋天地左旋六氣右旋故曰退行六位之下各有已所不勝者承之於下奉上故曰承其五行之道不亢則隨之而已一有所亢則起而尅勝之也或曰制者制何事也害者害何物也制者制其氣之太過也害者害承者之元氣也夫所

極曲運神机勞傷乎脾應乎脉極意外過思勞傷乎心應乎肉極預事而憂勞傷乎肺應乎氣極於持志節勞傷乎腎應乎骨極此五勞應乎五極者也然精極者五藏六腑之氣衰形体皆極眼視無明齒焦髮落体重耳聾行履不正邪氣逆於六腑厥于五藏故成精極医經載五勞六極之症非傳尸骨蒸之比大

謂元氣者總而言之謂之一元分而言之謂之六元一元者天一生水水生木木生火火生土土生金金復生水循環無端生生不息六元者水為木之化木為火之化元火為土之化元土為金之化元金為水之化元亦運化而無勞也假如火不亢則所乘之水隨之而已一有亢極則其水起以平之蓋恐害吾金元之氣子來救母之意也六氣皆然此五行勝復之理不期然而然者矣制則生化者言有制之常如亢則制而生化不息何害之有外列盛衰者言所承者力衰而所亢者極盛制之不盡耳在天地則為六淫在人身則為六疾害則敗乱者言無制之變也所承者衰盛而無氣故所亢者其勢縱横而不可遏也在天地則大堤絶滅在人身則病真而死矣大畧如斯未盡詳也孝者宜參考安道之論斯備矣

勞極之脉多弦治法陷其虛實冷熱而調之精極者當補其精也素問六形不足者温之以氣精不足者補之以味○素問云久視傷血勞傷於心也久臥傷氣勞傷於肺也久坐傷肉勞傷於脾也久立傷骨勞傷於腎也久行傷筋勞傷於肝也是為五勞所傷

欲苦九氣

或問丹溪先生格致餘論云陽常有餘陰常不足氣有餘血常不足然先生所著諸方每云有氣虛有血虛有陰虛有陽虛其所以自相矛盾有如是者其義何欤曰其所謂陰陽氣血之虛實而以天地日月對待之優劣論之其理蘊奥雖明非賢者莫能悟其旨也請陳其大略如左夫陽常有餘陰常不足者在天地則該乎萬物而言在人則該乎一體而論非五氣指為陽而血為陰也經曰陽中有陰七中亦有陽正所謂独陽不生獨陰不長是也姑以治法兼證論之曰氣虛者氣中之陰虛也治法用四君子湯以補氣中之陰曰血虛者血中之陰虛也治法用四物湯以補血中之陰曰陽虛者心經之元陽虛也其病多惡寒責其無火治法以補氣藥中加烏附等藥甚者三建湯正陽散之類曰陰虛者腎經

夫五欲者五臟之所欲也故經曰肝欲散急食辛以散之辛甘屬陽故能散也○心欲耎急食酸以耎之酸味柔故能耎也○脾欲緩急食甘以緩之甘性和靜故能緩也○肺欲收急食酸以收之酸性收斂故能收也○腎欲堅急食苦以堅之苦性堅燥故能堅也此五臟之所欲者致如五臟之所苦何如經曰肝苦急食甘以緩之甘肝氣有餘故用甘緩和○心苦緩急食酸以收之心氣虛故用酸收也○脾苦濕急食苦以燥之脾濕氣盛故用苦以乾燥也○肺苦上氣逆急食苦以泄之肺氣有餘故用苦以宣泄也○腎苦燥急食辛以潤之辛性津潤以其能開腠理致津液使肺氣下流于胃七與肺通故能潤之曰善○

明此理其所著明證細者謂近世治病往往見虛證徒

參芪屬氣血者固宜若是血虛豈不助氣而反耗陰血邪是謂血病治氣則血愈虛耗又曰血虛誤服參芪等甘溫之藥則病日增服之過多則死不益甘溫助氣屬陽七旺則陰愈消又曰婦人產後陰血虛陽無所依而浮散於外故多發熱止可用四物湯補陰血而以灸乾姜之苦溫從容而收止浮散使歸依於陰亦戒勿用參芪也卅溪曰產後當以大補氣血為主既曰陽無所歸而浮散於外非參芪等藥何以收救其散失之氣乎噫汝言之謂何其與東垣卅溪俱不合耶世之膠柱鼓瑟者比比皆是予不容不辯也

或問古有四診之法何謂也曰形聲色脉四者而已今人惟效脉法但知其一而遺其三焉請陳其理如左夫形

之真陰虛也其病多壯熱責其無水治法以補血藥曰加知母黃柏等藥或大補陰丸滋陰大補丸之類經曰諸寒之而熱者取之陰熱之而寒者取之陽所謂求其屬也王注曰此言益火之源以消陰翳壯水之主以制陽光也夫真水衰極之候切不可服烏附等補陽之藥恐反助火邪而燥真陰元陽虛甚之軀亦不可投苓芩等辛散淡滲之劑恐反開腠理而泄真氣脉者謂氣虛即陽虛止可用四君子斷不可用苓辛之屬血虛即陰虛止可用四物決不可用參芪之類殊不知東垣有曰陽旺則生陰血（此明陽一字指気血言）又曰血脫益氣古聖人之法也血虛者須以參芪補之陽生陰長之理也惟真

夫九氣者怒喜悲恐
寒暑驚思勞者是也
怒則陽氣逆上而肝
氣乘脾故氣上逆甚
則嘔血及飧泄也○
喜則氣和志達榮衛
通利其氣緩故和矣
○悲則心系急肺布
葉舉而上焦不通榮
衛不散熱氣在中故
氣消矣○恐則傷精
却上而不下流下焦
陰氣亦迴還而不散
故聚而脹也○寒則
腠理閉衛氣沉
有涼腠理閉衛氣沉

診者觀其形以知其病也經曰形氣不足病氣有餘是
邪勝也當瀉不當補形氣有餘病氣不足當補不當瀉
形氣不足病氣有餘病氣不足當補不當瀉此陰陽皆不足也急當補之不可
刺刺之重不足則陰陽俱竭血氣皆盡五藏空
虛筋骨髓枯老者絕滅壯者不復矣形氣有餘病氣有
餘此陰陽皆有餘也急瀉其調其虛實故曰有餘瀉之
不足者補之此之謂也又曰形肉既脫九候雖調者死
又曰頭者精明之府頭傾視深精神將奪矣背者胸中
之府背曲肩重腰將壞矣腰者腎之府轉搖不能腎將
憊矣骨者髓之府不能久立行則振掉骨將憊矣九此
之類皆形診之謂也夫聲診者聽其聲以驗其病也經
曰声如從室中言是中氣之温也言而微終日西復言
者此奪氣也衣被不欲言五臭善惡不避親疎者此神明

故皮膚及肉及診泄
之處皆閉密而氣不
流行衛氣收斂於中
而不散也○暑則腠
理開榮衛通汗大出
故氣泄○驚則心無
所依神無所歸慮無
所定故氣乱矣○思
則心有所存神有所
歸正氣流而不行故
氣結矣○勞則喘息
故氣奔速則陽外發
故汗出內外皆踰越
於常紀故氣耗散也
○凡此七者更相爲

之亂也叔和云久病声啞者不治病經云病聲啞者死
垣曰言語先輕後重高厲有力是為外感有餘之證言
語先重後輕沉困無力是為內傷不足之證九此之類
皆声診之謂也色診者視其面之五色以察其病也經
曰赤欲如帛裹硃不欲如赭白欲如鵝羽不欲如堊青
欲如蒼壁之澤不欲如藍黃欲如羅裹雄黃不欲如黃
土黑欲如重漆色不欲如地蒼又曰青如草茁者死黃
如枳實者死黑如炲者死赤如衃血者死白如茹骨者
死此五色之見死也青如翠羽者生黃如鱓腹者生赤
如鷄冠者生白如豕膏者生黑如烏羽者生此五色之
見生也生於心如繒裹硃生於肺如繒裹紅生於肝如
繒裹紺生於脾如繒裹括蔞實先於腎如繒裹紫此五
藏所生之外榮也欲觀五藏之五邪當辨四時之令色

治故悲可以治怒以
恰悅苦楚之言感之
喜可以治悲以謊誤
裴神之言娛之恐可
以治喜以迫遽死亡
之言怖之怒可以治
思以汚辱欺罔之言
觸之思可以治恐以
慮彼忘此之言奪之
暑可以治寒寒可以
治暑逸可以治勞習
可以治驚委曲乃忽
然之遇便皆見皆聞
而不驚矣經曰驚者
平之

經曰從前來者為實邪子能令毋實也從後來者為虛
邪毋能令毋虛也從所勝來者為微邪妻乘夫位也從
所不勝來者為賊邪鬼邪為害也自病者為正邪本經
自傷也假如春令木旺病者其色青而帶赤是為實邪
雖病易治法曰實者瀉其子其色青而帶黑是為虛邪病
亦易治法曰虛者補其母其色青而帶黃是為微邪尤
為易治法曰微者逆之謂正治也其色青而帶白是為
賊邪難治故多死法曰甚者從之謂反治也若但青加
蒼壁之澤迺是正邪本經自病勿藥而愈四時皆倣此
而推又四時皆帶紅黃為吉青黑為凶若此之類皆邑
診之要訣孝者其可忽乎

或問人身之兩腎猶車之有兩輪其形同色亦無異不知
王叔和何所見而獨謂左腎屬水而右腎屬火又指右腎

六脫

夫脈洪而且而不澤
因知六脫所致六脫
者則為脫氣脫血脫
津脫液脫精脫神

五按

夫藏病身熱而可驗
當求五按須知五按
者膀胱五法也○肺
熱者輕手乃得但微
按全無是腎七然見
於皮毛之上日西元
甚乃皮毛之熱其症

為命門以配三焦之經陽行生之初胎未成之
先生二腎即造化天一生水之義今以水火岐之水成
相友何欲曰予嘗私淑丹溪而得其說矣按內經以心
胞絡為三焦相火之配而並行於經也其兩腎本為一
藏初未嘗有左右之分而越人始分之亦不言其為相
火之藏叔和立說以三焦合命門為表裏亦有深意存
焉蓋謂腎屬陰而本乎靜靜則陽孕於其中陽既孕矣
其能純乎靜而無生氣之動欤若經所謂靜屬水受五
藏六府之精而藏之是陽歸之陰而成孕者也又謂腎
為作強之官伎巧出焉陽出之陰而化生者也是故腎
二象而言者則屬之水矣以其兩腎之形有
根元也以左為陰右為陽陰為水陽為火水為血火為

必見喘咳洒淅寒〇心熱者心主血脈徹按至皮膚之下肌肉之上輕手乃得徹按至皮毛之下則熱火如力按之則全然不熱是熱在血脈也曰中大甚乃心之熱也症煩心心痛掌中熱而嘔〇脾熱者輕手捫之不熱重按至筋骨又不熱不輕不重在輕手重手之間熱在肌肉遇夜尤甚洒洒惡風四肢不收鄉氣以動〇肝或問三焦為府有心胞絡為臟者有命門為臟者有名無實之府藏而其位俱在胸膈之中或謂心胞絡乃胸中之脂膜又或謂之裹心之肉凡此議論不一其孰非而孰是欵請明以告我曰其理蘊奧甚矣難言雖然若夫天人之理不明其可謂之醫乎請略陳其梗槩如左九萬物之有形質者乎地者必有以象應乎天也且以五行之理論之如在地有木火土金水之五形在天則有風熱濕燥寒火之六氣蓋人肖天地其五藏六府之具於身者與天地造化生成之理若合符節是故在天為風在地為木在人藏府為肝為膽在天為熱在地為火在人藏府為心為小腸在天為濕在地為土在人藏府為脾為胃在天為燥在地為金在人藏府為肺為大腸

氣於是左腎之水生脾土脾土生肺金其四藏之於腎猶枝葉之出於根也雖然但不可獨指右腎為命門耳經曰大衝之地名曰少陰少陰之上名曰太陽太陽根起於至陰結於命門按灵註王樞經云命門者目也抑考明堂銅人等經命門穴在脊中行第十四推下陷中兩腎之間夫兩腎固為真元之根本性命之所関雖為水藏而实有相火寓乎其中象水中之龍火因其動而發也愚意當以兩腎總號為命門其命門正象門中之棖関可開闔之象也惟其静而闔涵養乎一明之真水動而開鼓舞乎龍雷之相火夫水者常也火者変也若徒指乎右腎為相火以為三焦之配尚恐立言之未精也未知識者以為何如

五勝

千床

夫五勝者蓋風勝則動熱勝則腫燥勝則乾寒勝則浮濕勝則濡瀉

五諸

夫五諸者即諸痛痒瘡瘍皆屬於心火者諸風掉掉皆屬於肝木諸濕腫滿皆屬於脾土諸氣憤鬱皆屬於肺金諸寒收引皆屬於腎水

九藏

在天為寒在地為水在人藏府為腎為膀胱五者之外又有水火遊行於天地上下氣交之中故合為五運六氣人為之相火亦遊行於腔子之內上下肓膜之間名三焦亦合為五藏六府卅溪曰天非此火不能生物人非此火不能有生夫內經以心胞絡為藏配合三焦而為六藏六府總為十二經也其兩腎本為一藏初無岐右之分慈人始分之亦未嘗言其為相火之藏王叔和始立說以三焦合命門為表裏亦有深意寓焉蓋命門雖為水藏實為相火所寓之地其意蓋謂左屬陽右屬陰左屬血右屬氣左屬水右屬火靜守常而主乎水動變而化為火者也然而相火固無定體在上則寄于肝胆胞絡之間發則如龍火飛曜于霄漢而為雷霆也在下則寓于兩腎之內發則如龍火鼓舞于湖海而為波濤也或曰潛潛之物之名也若大小腸胃膀胱膀胱五府皆有彼受而蛻之者未審三焦為府何所盛乎曰三焦者指腔子而言包絡肓膜也亟乎賅胃之總司也肓中肓膜之上曰上焦肓膜之下脐之上一曰中焦脐之下曰下焦總名曰三焦其可謂之無依受乎其体有脂膜在腔子之內包羅乎五藏六府之外也其心胞膜實乃裹心之絡包于心外故曰心胞絡其系與三焦之系連屬故指相火之藏府皆寄于肓中此知始而未知終也管見如斯顓俟知者再論

九候

夫九候者上部天兩額之動脉在額兩旁動應於手乃足少陽

或問六淫之邪當從內經六氣之太過為是也昔醫和對晉平公之文不曰風寒暑濕燥火而曰陰陽風雨晦明何也曰辭雖異而理實同為彼謂陰淫寒疾者即太陽

寒水之令太過而為寒疾也陽淫熱疾者即少陽相火之令太過而為熱疾也風淫末疾者即厥陰風木之令太過而為末疾也雨淫腹疾者即太陰濕土之令太過而為腹疾也晦淫惑疾者即陽明燥金之令太過而為疫疾也明淫心疾者即少陰君火之令太過而為心疾也又曰陰陽風雨即為寒熱風濕之疾彼此固脗合矣至小崩時太熱惑心志皆非也夫晝明夜晦天道自然之理何淫之有

明當為疫癘之疾山嵐瘴氣是也惑當作疫傳寫之誤耳君火太過熱令早行火為離明之象故曰明淫如內經所謂天明則日月不明是也少陰君火司令故曰心疾然

也又曰陰陽風雨即為寒熱風濕之疾彼此固脗合矣所謂晦淫惑疾與明淫心疾二者似不相符請明以告我己歲金太過燥令大行久晴不雨黃埃蔽空日月昌

脈氣所行也○上部人耳前動脈在耳前陷者中動應於手少陽脈氣之所行也○上部地兩頰之動脈在鼻孔下兩傍近於巨髎之分動脈應於手足陽明脈氣所行也○中部天手太陰也謂肺脈也在掌後寸口中是謂經渠動應於手○中部地手陽明也謂大陽也脈在手大指次指岐骨間合谷之分動應於手也○中部人手少陰也謂心脈也在掌後銳骨之端神門之分動應於手也○下部天足厥陰也謂肝脈也在毛際外矢下半陷中五里之分臥而取之動應於手也女子取太衝在足大指本節後二寸陷中是也○下部地足少陰也謂腎脈也在足內踝後跟骨上陷中太谿之分動應於手也○下部人足

其出竅忘忘者亦改問難經五十三難曰經言亡傳者死閉藏者生然已閉藏者傳其子也何以言之假令心病者傳肺肺病傳肝肝病傳脾脾病傳腎腎病傳心一藏不再傷故言生也夫經文所謂七傳者據其數止六傳而已謂一藏不再傷按其數乃有四藏不再受傷且其間藏之理未聞有發明之旨釋者止是隨文解義而已請明辯以釋吾疑可乎曰夫此條言虛勞之証也真所謂七傳者心病上必脫腎病傳心一句其一藏不再傷當作三藏不再傷皆傳焉之誤耳蓋虛勞之證必始於腎經五藏從相尅而逆傳已盡又復傳於腎與心

太陰也謂脾胃脉也在魚腹上越筋間直五里下笠門之分寸量足單衣沉取乃得之而動應手也候有氣者當取足跗之上衝陽之分穴之中脉動乃應手也

三因

大三因者內因七情也喜怒憂思悲恐驚是也外因六淫也風寒暑濕燥火是也不內外因勞逸作強之

則水絕滅而火大旺故死而不復再傳彼之三藏矣其有從相生而順傳者蓋腎水欲傳心火次第由順行而及於彼之三藏而有生生不息之義故曰間藏者生學者其再思之

或問內經所謂壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣而遂傳肝木然後傳心火次第由順行而及於彼之三藏而有生生不息之義故曰間藏者生學者其再思之

或問內經所謂壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣少火生氣何謂也曰王太僕已有註文但未甚詳耳請陳一得如左夫壯火之氣衰少火之氣壯者言造化勝復之理少而壯壯而衰衰而復生循環無端生生不息經雖不言衰而復生其理實在其中矣壯火食氣者言元氣見食於壯火也壯火食少火者言元氣見助於少火也壯火散氣謂耗散元氣少火生氣謂滋生元氣此二句中明上文二句之言耳蓋火不可無亦可少而不可壯也少則滋助乎真脉壯則燒爍乎元

四因

大四因者因於寒如遘樞起忽如驚神氣乃浮此言冬日在骨蟄虫周密君子居室當深居周密如樞紐之內動不當煩擾筋骨使陽氣發泄於皮膚而傷於寒毒也君傷之則春必溫矣○因於暑汗煩則喘喝靜則多言此言冬不能靜慎傷於寒毒至

氣陰陽造化之理無往不復火壯而衰火壯則衰水以制之經曰亢則害承亟制也又曰制則化生故壯火衰而少火復生是以陰陽調和萬物生旺四時生長化收藏之道即此理也以人論之胚胎未成之初先生二腎以涵養真陰是故名為元氣天一生水之義焉然後肝心脾肺以及五府相繼而生五藏五府之外又有胞絡相火遊行於三焦之間故以三焦為配二者皆有名無實之府藏蓋相火無定位故也抑攷先哲有曰天非此火不能生物人非此火不能有生言其不可無也此非火火生氣之意乎又曰火與元氣不兩立一勝則一負言其不可亢也又非壯火散氣之謂乎管見如斯未知是否

或問中風之候皆半身不遂其有遷延歲月不死者何也

曰如木之根本未甚枯而一遏之枝幹先萎耳經曰根于中者命曰神機神去則機息言動物也根于外者命曰氣立氣止則化絶言植物也夫神機未息亦猶氣化之未絶耳故半身雖不運用然亦未至於機息而死也古所謂癱瘓者亦有深意存焉言癱者坦也筋脉弛縱坦然而不孝也瘓者渙也血氣散漫渙然而不用也或曰其為治之法與諸痺同乎曰不同也經謂風寒濕三氣合而成痺故曰痛痺著而不行曰行痺不定痛曰周痺周身痛皆痺筋攣骨痛曰痹痺也其癱瘓者或血虛或氣虛皆正氣不足之證其治法故不同也惟痿痺屬血虛麻痺屬氣虛與癱瘓治法大同而小異焉孝者宜加詳察毋踳乎

或問傷寒之邪中人固無定體然手足各有六經何故只

傷寒之六經和不及於手之六經何歟

答曰人身氣血乃喝此言人身前氣又見溫熱加之氣濕熱故為肢節腫脹然邪氣漸盛正氣漸微筋骨血肉互相負代故云四維相代也致邪代正氣不宣通衛氣無所從便至衰竭故云陽氣乃竭也

七損

夫女子七歲腎氣盛齒更髮長二七天癸

屬水土木盖水得寒則氷土得寒則坼木得寒則枯手之六經惟屬金與火盖火勝水而能敵寒金得寒而愈堅剛其理甚明將何以諫之乎曰言似近理而實不然者也請陳一得如左盖人之有身頂天履地身半已上天氣主之足以上体多蒙風熱下躰多感寒濕其為六節之氣前三氣時值春夏其氣升浮萬物生長故人之身半已上應之後三氣時值秋冬其氣降沉故人之身半已下應之自十月小雪之後為六氣之終太陽寒水用事旁勞辛苦之人其太陽寒水之氣乘虛而客入於足太陽膀胱之經同氣相求故也又曰熱先於首而寒先於足其義亦通寒邪潛積既久次第而傳於陽明少陽以及三陰之經皆從足

至任脉通大衝脉盛月事以時下故有子三七腎氣均平故真牙生而長極有躰盛壯五七陽明脉衰面始焦髮始墮六七三陽脉衰於上面皆焦髮始白七七任脉虛太衝脉衰少天癸竭地道不通故形壞而無子也損其所當損故云七損也

八益

夫男子八歲腎氣實髮長齒更二八腎氣盛天癸至精氣溢瀉陰陽和故能有子三八肝氣平均筋勁強故真牙生而長極四八筋骨隆盛肌肉滿壯五八腎氣衰髮墮齒槁六八陽氣衰竭於上面焦髮鬢頒白七八肝氣衰筋不能動天癸竭精少腎臟衰形体皆極八八則齒髮去腎者主水受五臟六腑之精而藏之故五臟盛乃能

經傳始而漸及於手之六經而已矣此人身配合天地之理不期然而然也何疑之有哉

或問鶯峯龍氏纂集運氣全書乃撰為傷寒鈐法以病者之所生年月日時合得病之日期推筭五運六氣與傷寒六經証候無不吻合謂某日當得某經當用某藥而以張仲景一百一十有三方按法施治如太陽無汗脉浮緊宜麻黄湯有汗桂枝湯之類使後學能推此法不須問証察脉但推筭病在此經即用此經之藥實為醫家之捷徑妙訣也吾子可不祖述乎曰此馬宗素無稽之術而以世之生靈為戲玩耳竊謂上古聖人仰觀天文俯察地理以干支配而為五運以十二支合而為六氣天以六氣紀之以天之六氣加臨於歲之六節方寓之歲以六氣五行勝復盈虧之理無有不驗薄曰天之高也星辰遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也合病並病而以人之年命合病日而為運氣鈐法取仲景之方以治之是蓋士師移情而就法也殺人多矣知禮君子幸勿蹈其覆轍云

或問龍宏常傷寒總病論所載聖散子方謂出於蘇子瞻尚書所傳又謂其方不知所從來而故人巢君敘世寶之以治瘟疫之疾百不失一安常讀曰自古論病惟傷寒至為危急表裏虛實曰數證候應汗應下之法差之毫釐輒至不救而用聖散子者一切不問陰陽二感或男女相易狀至危篤者連飲數劑則汗出氣通飲漸進神宇完復更不用諸藥連服取差其餘輕者心額微汗正爾無恙藥性少熱而陽毒殘在之類入口即資清涼殆不可以常理論也時疫流行平旦輒煮一釜不問老

瀉益其所當益醫者不可不知也

五虛五實

夫五虛者脉細皮寒氣少泄利前後飲食不入是也將隔入胃泄瀉止則生○五實者脉盛皮熱腹脹前後不通悶瞀是也瀉之而大小便通利而得汗者生

三陰三陽

夫天以六六之節以成一歲一歲之中有六氣焉故曰天度者所以制日月之行也氣數者所以紀化生之用也氣無差則生成之理不替是以人身三陰三陽之脉隨六氣而應旺各旺六十日故平人氣象論云每冬至之後復得甲子少陽旺少陽脉至則乍大乍小乍短乍長復得甲子陽明旺陽明脉至則浮大而短復得甲子太

火良賤各飲一大盞則時氣不入其門平居無病能空腹一服則飲食甘美百疾不生真濟世衛家之寶也吾子何不遵其法多合以濟世之瘟疾豈非積德之一事乎臼子閱其方始與醫道不合蓋其藥味止是燥熱助火之劑別無祛邪除瘴之能如黑附子高良姜芫荽莫石菖蒲麻黃細辛半夏厚朴肉豆蔻防風藿香豈非辛熱燥烈之劑乎其有茯苓蒼白木豪本猪苓澤瀉独活甘草稍温不熱雖有柴胡芍藥枳殼三味之涼恐一杯之水難救一車薪之火大熱藥治熱病素問謂之從治又謂之反治又謂之劫劑然此方必當時適遇瘟疫之身熱無汗或日則已過邪氣欲去正氣將復之際偶投一服二服劫而散之者有之由是衆皆以為得神仙之法尹録其方以傳于世正所謂訛上傳訛也豈可以為

然前輩念一家傳秘不宜可令無知人容服若不執之以理而謂不殺人者予未之信也安常為一代之名醫而載此方於傷寒論中而謂能博施濟衆亦賢者之過焉

或問厄安常傷寒總病論所載時行瘟疫謂春有青筋孕證其候頸背攻筋牽急先寒後熱腰強急脚縮不伸脈中欲折或眼黃項背強直夏有赤脉攢證其候口乾舌裂咽塞戰掉驚動不定秋有白氣徑證其候經絡羸瘦皮毛堅豎發泄体熱生班氣喘引飲冬有黑骨瘟證其候腰痛欲折胸脇如刀刺切痛心腹膨脹四季有黃肉隨証其候頸下結核頭重項直或皮肉強硬而隱隱發熱嘗聞醫有賢愚疾無古今近年以來未嘗有已上諸証何今古之不同敢請明言其故幸甚曰瘟疫之証素

陽旺太陽脉至則洪大而長復得甲子太陰旺太陰脉至則緊大而長復得甲子少陰旺少陰脉至則緊細而微復得甲子厥陰旺厥陰脉至沉短而敦此六脉之旺各六十日六六三百六十日以成一歲此三陰三陽之旺時日大要也

四海

夫四海者悉為隨海

無定体或氣運之變遷或世情之不古愧予年踰八秩畧未見此異証或世有之而予未之見欤抑亦見之而予未之識欤安常禀出類拔萃之資為一代名世之士著述方書以為後孝之矩範豈好為異說以欺世罔俗哉姑録之以俟達者再論

或問躭砂之証古方多不該載世有似寒非寒似熱非熱四体懈怠飲食不甘俗呼為砂病其治或先用熱水蘸搭臂膊而以苧麻刮之甚者或以針刺十指出血或以香油燈照視有背有紅點處皆烙之已上諸法皆能使腠理開通血脉舒暢而愈此為何病又何由而得之乎曰内經名為鮮伤原其所因或傷酒或中温或感風寒或房事過多或婦人經水不調血氣不和皆能為解伤証與厥相似實非真砂病也夫砂病者領南烟瘴之地多有之矣詳江淮間多有之能含砂以射水中人影唐詩云射公巧侯遊人影亦謂此也人不見其形若被其毒輒為寒熱而病一曰蜮如鱉有三足一名射影病瘡如疥坤雅曰有長角橫在口前如弩椎臨其角端曲如上弩以氣為矢因水勢以射人俗呼水弩鵝能食之本草云溪毒砂虱水弩射工蜮短狐鰕鬚之類俱能含砂射人被其毒者則憎寒壯熱若体分解若傷寒初發之狀彼土人治法以手捫摸痛處用芋葉或苴蕨葉搭角入肉以口吸出其砂外用生大蒜搗膏封貼瘡口即愈諸虫惟鰕鬚最毒治不早治十死七八其毒深入於骨若鰕鬚之狀其瘡類乎疔瘡彼地有溪鵝鶵鶵等鳥專食已上諸虫凡遇此病即以此鳥毛糞燒灰服之及籠此鳥於病者

五官

夫五官者鼻者肺之官目者肝之官口唇者脾之官舌者心之官耳者腎之官考其從逆以知其病

四象

夫四象者乃是神聖功巧之道望而知之

謂之神望其五色以知其病也聞而知之謂之聖聞其五音以識其病也問而知之謂之工問其所欲五味以知其病也切而知之謂之巧切脉知三部九候以識其病也

四失

夫四失者謂胗不知陰陽之理此治之一失也受師不孚妄作緣言其道巧名自畔吸之其砭聞氣自出而病安也其他無此諸重之地實非真砭証也管見如斯孝者更宜博訪以長見聞可也

一失

升麻二物用酒製炒更加附子一片以行參芪之氣及引清氣上升而濁氣下降而服參芪非補藥不致滿悶矣孝者其可不知此乎

或問飲食同入於胃而水穀二者何如而分乎且如膀胱上有下口而無上口其水固可出不知從何而入乎又何其如是之清乎白經曰飲食入口滋味先上輸于肺肺氣散精上歸于肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五行陰陽然度以為常也胃為倉廩之官無物不受全藉脾土轉輸而運化蓋水穀入胃其濁者為粗滓下出幽門達大小腸而為糞以出於穀道其清者倏焉而化為氣依脾氣而上升於肺其至清而至精者由肺而灌溉乎四体而為汗液津溢助血脉益氣力而為生生不息之運用也其清中之濁者下入膀胱而為溺以出乎小便耳其未入而在膀胱之外者尚為泄氣既入而在膀胱之內者即化為水是故東垣有曰飲者無形之氣正謂此也蓋肺屬金而覆乎脾胃之上即如天之覆於地之上也經曰清陽為天濁陰為地地氣上而為雲天氣下而為雨水入於胃輸化氣而行功妄用砭石緣通負邪此治之二失也不適寒貧賤之居坐之濕薄形之寒温不適飲食之宜不別人之勇怯不知此類足以自亂不足以自明此治之三失也治胗不問其始暴進飲食之失節起居之過度或傷于毒不先言此卒持寸口何病能中妄言作名為粗所窮此治之四失也孝者不可不知

五逆

夫五逆者腹脹身熱脉大是一逆也腹鳴而滿四肢清泄其脉大是二逆也刺血不止脉大是三逆也咳且溲血脫形甚瘦小劾是四逆也效脫形身熱脉小以疾是謂五逆不過十五日死其腹大脹四末清脫形泄甚是一逆也腹脹便血其脉大時絕是二逆也效溲血形脉肉已去是三逆也喘而肺脹胸脉大而疾是四逆也咳嘔腹脹且飧泄其脉絕是五逆也總此五逆不可不知

八虛

夫八虛者心肺有邪其氣留於兩肘肝有邪其氣留於兩腋脾有邪其氣留於兩髀腎有邪其氣留於兩膕凡此八虛者皆機關之室真氣之所過

上升亦猶天降霖雨於地倏焉化氣上騰而為雲又復化為霖雨而下降也或曰老人與壯年者飲水無異多寡壯年小便甚少而老者小便甚多何也曰壯者如春夏之氣升者多而降者少老人如秋冬之氣降者多而升者少或曰降多即小便多升多者未見其為何物而出於上竅焉曰經曰清陽出上竅濁陰出下竅清陽發腠理濁陰走五藏清陽實四肢濁陰歸六府各從其化也夫大塊之為器不可論其涇容之量人之氣化亦猶是也賢者宜再思之

或問經謂清氣在下則生飧泄濁氣在上則生脹脹夫病在上者法當用木香枳殼等藥以降之病在下者法當用升麻柴胡等藥以提之理宜然也其或泄瀉脫肛後重大孔窾不可忍是為氣陷也法當峯之以升麻柴胡和之以木香枳殼名大四湯同劑不無升降沉浮之妙歸一治病之可也

或問內經有曰陽明病甚則棄衣而走登高而歌或不食數日而踰垣上屋所上之處皆非素所能也素非所能因病而不食反能登非常之處豈有是哉曰難經有云重陷者狂重陷者狂又曰顛多喜而狂多怒所謂重陽者三部陰陽脉皆洪盛而牢故病強健而有力故名曰

血虛之所遊邪氣惡血固不得住留住留則傷經絡骨節机關不得屈伸故病拳也

五色

夫五色者心色如鷄冠之赤吉如血凶肝色如鴈肫之青吉如草滋凶脾色如蠆腹之黃吉如栝實凶肺色如豕膏之白吉如枯骨凶腎色如鴈羽之黑吉如煤炲者凶

五氣

夫五氣者膻氣凑肝焦氣凑心香氣凑脾腥氣凑肺腐氣凑腎也

五味五神

夫陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味言五神所生本資於五味五味宣化各凑於本宮言酸味入肝苦味入心甘味入肝辛味入肺鹹味入

曰必汗養肺以制木使脾無受邪之虛肺以制火使肺得清化之源斷妄想以保毋氣卻鹽味以防助邪以大劑人參白木補脾使脾氣得實自能健遞升降此千載不易之定論萬全之玅法也活人多矣當用此法以治黃腫之證反加悶乱增劇不安改用香附蒼术厚朴之劑反獲全功豈非溫熱傷脾所致何治法之不同與曰夫水腫之証蓋因脾土虛甚而肝木太過故水溫妄行其中雖有清談留飲實無鬱積膠固故以參术為君而煮以利水清金去溫熱之藥此標本兼該之治故有十全之功也彼黃腫者或酒瘟或穀瘟沉積頑痰膠固鬱結於其中故或為弦癖或為積聚是以積於中而形於外蓋因土氣外形而黃也故宜以蒼术厚朴香附陳皮之類以平其土氣之穀皐用鐵

往謂重陰者三部陰阳脉皆沉伏而細故病羸倦而無力故名曰頗嘗見東陽棲民一少年病往一日天風大作忽飛上于邑東之塔巔且歌且哭其塔實無容步之階衆皆以為怪予思龍乃純陽之物伏蟄于海内其有或問所絡治腫脹之証專主乎上敗木賊濕熱相乘為病東垣參主乎寒言病機諸腹脹大皆屬於熱之語乃言傷寒陽明經大實大滿之證也又云熱脹少而寒脹多二說不同其執非而孰是與曰東垣北方人也其地土高燥濕熱少而寒氣多故有是論我丹谿先生生長於東南之地故病此者盡因脾虛受濕肝木大旺故言然也或曰二說不同之義既得聞命矣而丹谿治腫之法

骨則神旺魄充矣然
五神雖因五味以生
亦因五味以損正謂
好而過飫乃見傷也
是故味過於酸肝氣
以津脾氣乃絕味過
於鹹大骨氣勞膚綸
肌短心氣滯不行味
遊於甘心氣喘滿色
黑腎氣不衡味過於
苦脾氣不治胃氣乃
厚味過於辛筋脈沮
弛精神乃央觀此則
人於五味不可以不
節也

傷四病

經曰春傷於風夏必
飧泄夏傷於暑秋必
痎瘧秋傷於濕上氣
而咳又云冬必咳嗽
發為痿厥冬傷於寒
春必病溫此四時氣
更傷五臟之和而成
病也其不即病者謂
旺不受邪故也

三虛三實

夫三虛三實者有脈
之虛實病之虛實於
粉青皮之類以平其木氣之有餘加以曲蘗助脾消積
退黃之後仍用參朮等補脾之劑以收十全之功此標
而本之之治也若二證之藥易而治之禍不旋踵孝者
不可不知

或問饑甚方食而食反不運化多為嘔吐吞酸等證何也
曰饑而即食渴而即飲此造化自然之理也饑不得食
胃氣已損脾氣已傷而中氣大不足矣遇食大嚼過飽
益甚是以大傷胃氣輕則吞酸惡心重則惡寒發熱而
為內傷等病者多矣又或負重遠行辛苦饑甚遇食太過
則四体倦怠矣若又強力復行適遇風雨外袭遂成內
傷挾外感之證或為腫脹危篤之疾養生君子切宜防
微杜漸戒之戒之

或問虛損之疾世俗例用局方十全大補湯以補之其方
實為諸虛之劑也用參茂朮甘等以補氣川芎
歸芍藥地黃肉桂以補血夫吾子將何以議之乎曰此
藥乃氣血兩虛之劑或血虛而氣尚實或氣虛而血尚
充者其可一例施乎內經曰毒藥以治暴病蓋藥性各
有偏毒然中病者藉其能以獲安不中病者徒惹其毒
以增病耳假如心脾二經虛損當以茯苓補之虛而無
汗及小水短少者服之有功虛而小便數者多服則令
人目盲虛而多汗者久服損其氣夫人天年以其味淡
而利竅也又如肺氣弱及元陽虛者當以黃芪補之然
肥白人及氣虛而多汗者服之有功若蒼黑人腎氣有
餘而未甚虛者服之心煩悶不安以其性寒而閉氣也
甘草為健脾補中及瀉火除煩之良劑然嘔吐痞中滿
及嗜酒之人多服必欬膈不行而嘔滿增劇以其氣味

之虛實也虛者言其
五臟自虛真氣奪者
也實者言其邪實陽
人而邪氣甚者也然
脉之虛實看濡而軟
者為虛言指下尋之
似有再再还來按之
依前却去其所主病
則火氣力五心煩熱
腦轉耳鳴下元極冷
豈不為之虛乎此乃
五臟虛真氣奪病自
內出矣緊牢者為實
法曰緊脉常數如轉
索之狀又曰緊之為
之甘緩也川芎為補血行血清利頭目之聖藥然骨蒸
多汗及氣弱人久服則有氣走散而陰愈虛甚以其氣
味之辛散也生地黃能生血脉然胃氣弱者服之防損
胃不食熟黃能養血補血然痰火盛者恐泥膈不行人
參為潤肺健脾之藥若元氣虛損者不可缺也然久嗽
勞欬咯血鬱火在肺分者服之必加嗽增喘而不寧以其
氣味之甘温滯氣然也白芍藥為凉血益血之劑若血
虛腹痛者豈可缺遽然形瘦氣弱票賦素虛寒者服之
恐伐發生之氣以其氣味之酸寒也藥性能毒未易悉
舉孝者宜究本草之詳不可妄施以殺人也

或問雀目之証遇晚則目不見物至曉復明此何病使然
曰是則肝虛之候也或曰肝常慮其有餘然亦有不足
者乎曰邪氣盛則實正氣奪則虛其人素禀血虛適遇

自傷于飢飽寒熱
緊是邪氣甚實自外
而入也如此云緊者
陽也指下尋之三関
逼度按之有餘舉指
其數狀若弦洪曰緊
主風氣伏陽上衝化
為往病非實而何至
者言邪實強甚按之
中堅而名痛是也○
病之虛實者出者為
虛是貧臟自病不中
他邪其病自內而出
於外也若虛勞潮熱
寅申二年火陽相火司天陰氣不在泉火客之
鬱于下夫胞絡相火陰盛則心血沸涸而乾涸經曰天
明則日月不明邪害空竅益心出血肝納血心血既涸
則肝無彼受經又曰目得血而能視緣肝開竅于目肝
既無血則目瞀而不明矣或曰目瞀不明既得聞命矣
其晚暗而晚復明者何也曰木生於亥旺於卯而絶於
申至於酉戌之時木氣衰甚遇亥始生至日出於卯之
地木氣稍盛而見復明矣雖然終不能瞭然如故或曰雀
目之患終変為黃脹而死何也曰木絶於申乃水土長
生之地木氣萎和土氣敢復經謂氣有餘則制己所勝
而侮所不勝此土氣有餘而侮所不勝之木也或曰治
法何如曰先宜地黃等藥以補益其腎肝之不足
次用羊肝蒼术陳皮之類平其土氣之有餘此乃畧示

盜汗者入者為實在
言傷風中者傷冀自
外而入傷於人也言
者為虛是五內自病
故惺靜而言也不言
為實謂邪氣鬱柔於
中氏昏而不言也緩
者為虛言病自內出
徐七而遲非一朝一
夕之病也急者為實
言其外邪如中風傷
寒無執等病兒在六
七日之間也○脹之
虛實者滿者為實痒
者為實痒者為虛謂

端倪耳醫者自宜臨岐斟酌而處治之慎不可按圖而
索驥也
或問痞與痃癖積聚癥瘕病雖似而其名各不同請逐一
條陳其說以曉後學可乎曰痞者否也如易所謂天地
不交之否內柔外剛萬物不通之義也物不可以終否
故痞久則成脹滿而莫能療焉痃癖者懸絕隱僻又玄
妙莫測之名也積者跡也挾痰益以成形跡亦鬱積至
久之謂耳聚者緒也依元氣以為端緒亦聚散不常之意
云癥者徵也又精也以其有所徵驗及久而成精萃也
瘕者假也又遐也以其假借氣血成形及歷年遐遠之
謂也大抵痞與痃聚為肚腹內
之疾其為上中二焦之病故多見于男子其癥與瘕獨
見于臍下是為下焦之疾故常得于婦人大凡腹中有

其氣一脹充其形故
今皮膚作疼痛者實
言其氣不通擁實而
為痛也外痛以快為
外實內虛言是邪氣
客於經絡故外為痛
而邪氣不在內故內
快是外實而內虛也
內痛外快為內實外
虛言是邪氣基于內
而不通故內痛也外
無所苦故外快也故
曰內實外虛是也脹
此三虛三實消息治
之助多矣

塊不問積聚癥瘕痃癖為患俱為惡候切宜辨別而不
求醫早治若待脹滿已成胸腹鼓急雖倉扁復生亦莫
能救其萬一講斯疾者可不懼乎
或問冊谿所謂有外感挾內傷者有內傷挾外邪者其證
何如而見當以何法而治請詳以語之曰假如先因勞
役過度飲食失節而其躰已解仍又為感冒風寒而作
其証必惡寒發熱頭身俱痛右手氣口及關脉則大於
左手人迎及關脉二倍而兩手陽脉俱有緊盛之勢此
內傷重而外感輕謂之內傷挾外邪也治法必以東垣
補中益氣湯為主加以防風羌活柴胡之類或先因秋
冬之月觸冒風寒鬱積已久欲發未發之間而加之飲
食勞倦觸動而發其証必大惡風寒頭身大痛而大發
熱左手人迎及關中脉則大於左手氣口及關脉一二

八脉八要

夫八要者表裏虛實寒熱邪正是也夫百病之機不越乎此苟不知此而妄治安能夠其病之情耶八要者將何以明之下條脈候八脉忝以外症弗缺也八脉者浮沉遲數滑澁大緩是也表者病不在裏也脉浮以別之裏者病不在表也脉沉以別之虛者五虛也脉澁以別之寒者臟腑積冷也脉遲以別之數者臟腑積熱也脉數以別之邪者外邪相干也脉大以別之正者外無邪干也脉緩以別之故洪弦長散浮之類也伏石短牢沉之類也細小微敗遲之類也疾促緊急數之類也動搖流利滑之類也乳虛結滯澁之類也堅實鈎革大之類也濡弱柔

倍而兩手陽脉亦各有緊盛之勢此外感重而內傷輕謂之外感挾內傷也治法必以仲景傷寒論六經見証之藥為主治少加以補中健脾之劑夫外感重者宜先攻而後補陰者汗下之類內傷重者宜先補而後攻二證俱重宜攻補兼施或曰勞倦飲食二者俱甚而為大熱之証胸中恐愈增飽悶欲消導則恐元氣欲補則飲食填塞其將何法以處治乎曰此正王安道所愈虛而病益甚論不足中之有餘証也必宜攻補兼施以補中益氣湯間與升溪導滯補脾飲加神麯麥芽之屬甚者以東垣枳實導滯丸之類與補中益氣湯間而服之食去而虛證亦除是亦攻補兼施之法也醫者誠能斟酌權宜而參裁益物不通而病痛宜緩則凡病痛者例不可用參芪等藥乎曰以上所論諸痛特指其氣實者為言耳如暴傷風寒在表作痛或因七情九氣怫鬱不得宣通而作痛者固不可用補氣藥也若夫勞役傷形致身体解体而作痛者或大便後及大瀉痢後氣血俱虛致身体疼痛及四肢痿痺而痛或婦人產後氣血俱虛致身体疼痛等病其可不用參芪等補氣藥乎孝者可用參芪等藥乎曰以上所論諸痛特指其氣實者為言耳如暴傷風寒在表作痛或因七情九氣怫鬱不得宣通而作痛者固不可用補氣藥也若夫勞役傷形致身体解体而作痛者或大便後及大瀉痢後氣血俱虛致身体疼痛及四肢痿痺而痛或婦人產後氣血俱虛致身体疼痛等病其可不用參芪等補氣藥乎孝者

或問山居野處之地云有瘧癘之患誠有此欤否欤曰妖祟為患者大抵被其惑者皆性淫而氣血虛者也故邪乘虛而入耳未有正人君子血氣充實者而被其惑焉治法必滋補其真陰以壯其正氣安養其心神以禦其

和緩之類也此八者脉之綱領也苟能得其要領而諸脉可以類推而八要從可知矣

六部定位

夫人之臟腑一陰一陽自有定位左寸屬火心與小腸脉所出也左関屬木肝膽脉所出也左尺屬水腎与膀胱脉所出也右寸屬金肺与大腸脉所出也右関屬土脾胃脉所出也右尺亦火手心主之命門與三焦脉所出也觀此則部位之職一定而不可易矣

六部生尅

夫以對待之位言之則左寸火尅右寸金左関木尅右関土左尺水尅右尺火左剛右柔為夫婦之別也然左寸屬陽右手屬陰左手君火以尊而在上右尺相火以卑

淫邪房幃之內鍾隱不通邪何由而入焉若以師巫降童等邪術治之則神愈不安決無可瘳之理遇斯疾者可不謹欤

或問世有巫蠱魘魅之術云可咒人致死果有此乎否乎曰有此事而實無此理也夫蠱毒魘魅之術皆閩廣深山鄙野之俗或因姦或因財及謀產爭婚等事蓋惡欲其死一念之興故無所不用其極參縞仇家之生命或琢木成像書其名庚年命而葬之或畫其像書其名作紙棺以埋之或書符以焚之或咒水以祝之種種不同雖有其事而實無應驗之理夫王帝好生為此者多反受殃或曰既無殺人之驗律法何以該載曰造律之士皆至公仁者深嫉其惡見蓋追其心之不仁而置之極刑於十惡之中而當殺所不原也或曰今之愛寐中而

常脉者似有此神明所附之然而不然也蓋火起於下而疾閉於上心血虛久而心神失守故種種怪異豈有鬼神所附之理哉賢者願無惑焉

或問古者醫家有禁呪一科今何不用曰禁呪科者即素問祝經科也立教於龍樹居士為移情變氣之俗耳可治小病或男女入神廟驚惑成病或山林溪谷衝斥惡氣其証如醉如痴無為邪鬼所附一切心神惶惑之証可以借呪語以解惑安和而已古有龍樹呪法之書行于世今流而為師巫為降童為師婆而為蠱惑人民哄嚇取財之術噫邪術惟邪人用之知理者勿用也

或問鍼法有補瀉迎隨之理固可以平虛實之証其灸法不問虛實寒熱悉令灸之其亦有補瀉之功乎曰虛者灸之使火氣以助元陽也實者灸之使實邪隨火氣而

而在下有君臣之道
又以循環之序言之
蓋以右寸金生左尺
水水又生左関木木
又生左寸火火又復
通右尺相火又生右
関土土又生右寸金
而金復生水此五行
更相生養循環無端
有子母之親蓋子能
令母實母能令子虚
是也治法云虚則補
其母實則瀉其子如
水生木是水為母木
為子木復生火是木

發散也寒者灸之使其氣之復温也熱者刺之引鬱熱之氣外發火就燥之義也其針刺雖有補瀉之法予恐但有瀉而無補焉經謂瀉者迎而奪之以鍼迎其經脉之來氣而出之固可以瀉實也謂補者隨而済之以鍼隨其經脉之去氣而留之未必能補其虚也不然內經何以曰無刺熇熇之熱無刺大勞人無刺大飢人無刺大渇人無刺新飽人無刺大驚人又曰形氣不足病氣不足此陰陽皆不足也不可刺刺之重竭其氣老者絶滅壮者不復矣若此等語皆有瀉而無補之謂也學者不可不知

或問越人難經第一難中所謂十二經皆有動脉獨取寸口以決五藏六府死生吉凶之法又曰寸口者脉之大會手大陰之脉動也夫寸口一脉何以能以藏府死生吉凶乎鍼窓熊氏註為右寸謂右寸之屬肺也四明張氏註為兩寸謂脉會太淵穴也二說不同其孰非而孰是與請明以告我曰古聖立法以三部九候決人生死以六藏六府分配於六部之中故可以驗人藏府之吉凶也殊不知內經言寸口者頗多悉無関尺而言也大聖古人以寸口為六脉之總名耳不然內經何以言寸口之脉中手短者曰頭痛寸口脉中手長者曰足脛痛寸口脉中手促上擊者肩背痛若此之類莫能盡述先哲註謂中手為醫者之中指也然非病者之開脉乎夫越人之難經因內經而作故有是語今之註者皆以已意安釋故與經指不合学者其再思之

或問難經第八難曰寸口脉平而死者何謂也然諸十二經脉者皆係於生氣之源所謂生氣之源者十二經之

受穀氣故水怒而剋
火所謂子逢病氣母
乃力爭火又生土是
火為母土為子土見
火被水剋故怒而剋
水所謂母被鬼傷子
來力救假如肝木有
餘是肺金不足金不
能制木故木無所謂
畏其氣有餘及薄激
而干肺金而乘其脾
土也故曰薄所不勝
而乘其所勝也此五
臟之氣內相淫病為
疾也又如肝木氣火

不及則不能以制土土無畏而遂妄行乃陵其腎水實故曰所勝妄行而所生者受病也肝木之氣不平則肺金之氣自薄故曰所不勝薄之也蓋水氣不平土金交薄相追為疾故曰氣追相生相剋相勝展轉無窮率一以例其餘也

四脉

浮屬陽曰金輕清于

根本也謂腎間動氣也此五藏六府之本十二經之根呼吸之門三焦之源一名守邪之神故氣者人之根本也根絕則莖葉枯矣寸口脉平而死者亦蕙関尺也夫所謂腎間動氣者釋者皆指為兩尺兩尺既絕何謂寸口脉平何不言尺以釋吾疑乎幸甚曰此言寸口脉平而死者亦蕙関尺而論也腎間動氣者膀下氣海毋田之地也或曰膀下中行乃任脉所屬與腎何相干哉曰各開寸半為第二行皆屬足少陰腎經其膀與背後命門穴對各開寸半腎腧穴也故毋田氣海與腎脉相通為腎之根也又若有生之初先生二腎胞系在膀故氣海毋田實為生氣之源十二經之根本也或曰寸口既平奚疑其死乎曰此為病劇形脫者論耳內經曰形肉已脫九侯雖調者

上部下部長在心取象之說蓋陰曰水潤滑化下微弱伏虛由沉生化○遲屬寒白土三至一息內涵四脉滿緩澁結○數屬熱曰火一息六至弦緊緊緊滑大為異

二神

東垣云不病之脉不求其神而神之無不在也有病之脉則當求其神之有無謂之六数也極熱也浮中

矩凡見人之病劇者人形羸瘦肌肉已脫雖六脉平和尤當診候足陽明之衝陽與足少陰之太谿二脉或絕更候臍下腎間之動氣其或動氣未絕猶有可生之理動氣如絕雖三部平和其矩無疑矣醫者其可不詳察或問脉經謂一息四至以上為無病常人之脉今見無病之人或有一息五至有奇者有一息三至無餘者何如是之異乎曰生成之脉豈無緩急遲数之殊耶經曰性急脉亦急性緩脉亦緩大抵脉緩而遲者多寿脉急而数者多夭經曰根于中者命曰神機神去則機息蓋氣血者人身之神也脉急数者氣血易動而神機易息故多夭脉遲緩者氣血和平而神機難損故多壽先哲論江海之潮則天地之噓吸晝夜止二升二降而已人之呼吸晝夜一萬三千五百息故天地之壽悠久而無疆人

有力言有氣即有神矣為泄其氣三遲二敗寒也沉中有力即有神矣為去其寒若數極遲或中不復有力為無神也將何所恃耶前不知此而遽泄之去之神將何所依以為主耶故經曰脉者氣血之先氣血者人之神也善夫

四取

取脉之道理各不同脉之形狀又各非一

浮沉之脉以手輕重而取之也遲數之脉以息呼吸而取之也呼者氣之出陽也吸者氣之入陰也滑溢之脉則察夫往來之形也浮為陽脉在肉上行也輕手乃得而充洪散大長濡弦皆輕手而得之類也沉為陰脉在肉下行也重手乃得而伏石短細牢實皆重手而得之類也遲者脉不急也一息二三至而緩結微弱皆遲之類

之壽延者數亦不滿石也管見如斯未知是否

或問有人寸開尺三部之脉按之絶無形跡而移於手陽明經陽谿與谷之地動者何故曰手太陰經肺與手陽明大腸一藏一府相為表裏其列缺穴乃二經之絡脉故脉從絡而出於陽明之經此為表乘其列缺穴乃二經之絡泰生成無病之脉耳孝者可不曉與

何謂四時之脉曰春弦夏鈎秋毛冬石然春脉弦者謂正月寅二月卯木旺春日脉浮如魚遊在波雖出猶未全浮故其脉弦而長以應東方肝木之氣也夏脉鈎者謂四月巳五月午火土炎夏日在膚陽氣太盛故其脉來有力浮大而散以應南方心火之氣也秋脉毛者謂七月申八月酉金旺而金性輕浮秋日下膚隨陽氣漸降將欲藏去故其脉來浮漉而短以應西方肺金之氣也

冬脉石者謂十月亥十一月子水旺而水性下流冬日在骨陽氣伏藏故其脉沉濡軟滑以應北方腎水之氣也辰戌丑未四季月脉遲緩者謂土惟厚重其脉來和緩而大以應中央脾土之氣也四時之脉雖有弦鈎毛石之分然春三月俱帶浮冬三月俱帶沉六部內按之又無和緩為有胃氣此無病之脉若但見弦鈎毛石而無和緩此是真藏之脉不病而死也大抵脉者氣血之先也氣血盛則脉盛氣血衰則脉衰氣血寒則脉數氣血熱則脉遲氣血壯則脉大氣血微則脉小氣血和則脉平試以脉之大綱言之初持脉輕手候之脉見于皮膚之間者陽也腑也心脉之應也而散者心也浮漉而短者肺也重手按之脉附于肌肉

數者脉頻來也一息六七至而疾促皆數之類至于滑澁之脉則以往來察其形狀也浮為陽在表為風為虛沉為陰在裏為温為實數則在腑為熱為陽為燥渴則在臟為寒為冷為陰滑或問既有三因之病必有三因之脉請論之曰内因脉歌曰喜則傷心蛛蹇思傷脾鮎結中居因憂傷肺脉必濇多血少滑為無有餘濇為氣獨滯是取脉之大要也

三持

持脉之要有三曰尋曰按曰持尋輕手取之曰按重手取之曰尋初持脉輕手候之脉見皮毛之間者陽也腑也亦心肺之應重手得之脉附於肉下者陰也臟也亦肝腎之應也不輕不重中而取之其脉應於血肉之間者陰陽相適中和之應脾胃之候也若浮中沉之不見則委曲而求之

或問寸関尺三脉部位既得聞命矣外有人迎氣口神門三脉其位安在請明以告我曰按活人書左手関前一分人迎是也右手関前一分氣口是也又按脉經謂左手人迎以前寸口脉即知人迎在病人左手関前寸後之位診曰右手食指與中指兩岐之間是也又謂右手氣口以前寸口脉即知氣口在病人右手関前寸後之

之下者陰也臟也肝腎之應也蓋肝腎在下故其脉沉若弦而長者肝也沉而軟滑者腎也不輕不重中而取之脉應乎肌肉之間陰陽相適中和之應脾胃之候也浮為陽在表為風蓋脾居中州故肺緩而大此五臟不病之平脉也診視者必熟知平脉而後可辨病脉也若短小而見于皮膚之間者陰乘陽也洪大而見於肌肉之下者陽乘陰也

尺寸皆然

為傷慾心知六部合脉須當審究使将寒作熱醫不内不外因脉歌曰琴神役虛足傷心虛濇之中子細尋旁濇之中宜忖度疲極筋力便傷肝指下尋之脉弦虛飲食饑飽並傷脾未可輕将一例推飢則緩弦當別諫若然滑實飽無疑吐呼損氣因漏氣燥弱脉中宜熟記能通不内外中因生死吉凶都在是

若隱在顯則陰陽伏匿之脉也三部皆然

六察

察脉須識上下來去至止六字不明何以辨別其陰陽虛實也上者為陽自尺部上於寸口陽生於陰也下者為陰自寸口下於尺部陰生於陽也來者為陽自骨肉之分而出於皮膚之際氣之升也去者為陰自皮膚之際而還於骨肉之分氣之降也應曰至為陽息曰止為陰也

四明

明脉須辨表裏虛實四者不明如夜行無路眉分其內外之病也表陽也腑也凡六淫之邪發於經絡而未入於胃腑及臟皆屬於表也裏陰也臟也凡七情之氣鬱於心腹之內不能飲食五味之傷留於腑臟位診者左手食指與中指兩岐之間是也經又曰兩手神門以後尺中脉即知神門各在病人兩手関後尺前之位診者中指與無名指兩岐之間是也今人多不識此或指人迎於左関或指氣口於右関或指氣口於右寸或指神門於兩関相對者皆非也孝者可不審乎

或問藥性有相畏相惡相反而古方多有同為一劑而用者其理何如曰若夫性畏我者我必惡之我所惡者彼必畏我蓋主治之能在彼故其分兩當彼重我輕制其毒而不得以自縱也且如一劑之中彼雖畏我蓋主治之能在彼故其分兩當彼重我輕制之太過則盡奪其權器將以殺其毒耳設我重彼輕制之太過則盡奪其權而治病之功劣矣然藥性各有能毒其所畏者畏其能制其毒而不得以自縱也且如一劑之中彼雖畏我蓋主治之能在彼故其分兩當彼重我輕制之太過則盡奪其權器將以殺其毒耳如仲景制小柴胡湯用半夏黃芩生姜三物同劑其半夏黃芩畏生姜而生姜

因其分兩適中故但制其僄悍之毒而不減其退寒熱之能也其為性相反者各懷酷毒如兩警相敵決不與之同隊也雖然外有大毒之疾必用大毒之藥以攻之又不可以常理論也如古方感應丸用芒豆牽牛同劑以為攻堅積藥四物湯加人參五灵脂蒲黃以治之血塊舟溪治屍瘵二十四味連心散以丹草芫花同劑而謂妙處在此是蓋賢者真知灼見方可用之昧者固不可妄試以殺人也夫用藥如用兵善用者制之死地而後存若韓信行背水陣也不善者徒取滅亡之禍耳可不慎哉

或問東垣用藥多以升麻益胃昇之而悉以升麻柴胡之類佐之何故曰夫天地四時之令春夏之氣温而升浮

之間不能通泄皆屬於裏也虛者元氣之自虛精神耗散氣力衰竭也實者邪氣之實由正氣之本虛邪得乘之非元氣之自實也故虛者補其正氣實者瀉其邪氣經云邪氣盛則實精氣奪則虛此之謂也

七表

歌曰浮脉不足寸有餘乳脉中空而畔石滑体如珠中有力實或問當歸一物當公謂頭破血身和血尾止血東垣又云則萬物發生秋冬之氣寒而降沉則萬物肅殺人肖天地常欲使胃氣温而升浮而行春夏生發之令不欲使胃氣寒而降沉而行秋冬肅殺之令耳又升麻能令清氣從右而上達柴胡能使清氣從左而上達經曰清氣在下則生飧泄浊氣在上則生脹脹是以清氣一升則濁氣隨降而無已上等証又參芪苓補劑皆味厚而氣滯者若不以升柴苓藥提之何以得行於經絡肌表而滋補哉或曰東垣生於北方天傾西北陽氣下陷此法固宜恐東南方土不宜也曰地不滿東南土氣下陷故脾胃之氣不升脾胃之氣不升則上脘不通穀氣不行而內傷之病作矣是以此法尤利東南方也孝者不可不知此意

形傷上與長俱弦如始按之弦狀柴若罣絕尺索初洪孝按之皆極大此名七表不同途其見于病曰浮為中風乳六血滑吐實熱分明別弦為拘急緊為疼洪大從來偏主熱

八裏

歌曰微來如有又如無沉孝都無按有餘遲緩息間三度至濡來散止細仍虛伏須頭止血身養血尾瀉血二說不同肯無偏一之論乎曰當歸者使氣血各有所歸之功之號也蓋其能逐瘀血生新血使血流通暢與氣並行周流不息故云然又曰中半已上氣脉上行大氣主之中半已下氣脉下行地氣主之身則獨守乎中而不行也故人身之法象亦猶是焉予謂瘀血在上焦與上焦之血少則用去芦上截瘀血在下焦與下焦之血虛則用下截之尾若欲行中焦之瘀與補中焦之血則用中一段之身非獨當歸他如黄芩用上截之虛者以降肺火用下截之實者以瀉大腸之火防風桔梗之類亦然耳或問黄柏地黄之類俱息鉄器蒸搗何歟曰天地黄七柏之類皆腎經藥也錢仲陽謂腎有補而無瀉又曰虛者

切骨沉相類弱脉沉微指下圖濇脉如刀輕刮竹分明入裏坦如途其見於病曰遲寒緩衰微為虛濇因血少沉氣滯伏為積聚濡不足弱則筋痿少精氣

九道

歌曰長脉流利通三部短脉本部不及此虛脉遲大無力軟促脉來數急促软結脉時止兩遲緩代脉千胠以下之風藥也曰順流水者甘性順而下流故瀉以治下焦腰膝之証及通利二便之用也曰逆流水者温流泗瀾之水也以其性逆而倒流故取以調和發吐腐飲之劑也曰半天河水者即長乘君授鶴飲以上池之水乃竹離藩頭管內之水積耳取其清潔自天而降未受下流汚濁之氣故可以為煉丹調仙藥之用也曰春雨水者立春日空中以器盛接之水也其性始得春升生發之氣故可以煮中氣不足清氣不升之藥也古方謂婦人無子者於春日清晨以器盛空中之雨水或此日百草曉露之水夫妻各飲一杯還房當即有孕取其資生發育萬物之義耳曰秋露水者其性稟收斂肅殺之氣故可取以煮煎殺虫之藥及調付殺癩虫亦無諸藥之劑也曰井花水者清晨井中第一汲者補其毋實者瀉其子蓋腎乃陰中之少陰為經養真元之水藏止所以息鐵器者防其伐木瀉肝恐子能令毋好也竟無他說

或問醫家以水煮藥各本草著名類多而未詳其用曰長流水曰順流水曰逆流水曰千里水曰半天河水曰春雨水曰秋露水曰露花水曰井花水曰新汲水曰無根水曰菊英水曰潦水曰井澗水曰月窟水夫何一水之用而有許多之名必其能各有所長請逐一明言其故無吝曰謂長流者即千里之水也但當取其流長而來遠耳不可泥於千里者以其性遠而通達歷科坎已多故取以煎煮手足四肢之病道路遠之藥及通利大小便之用也曰急流水者湍上峻急之流水也以其性速急而達下故特取以煎熬通利二便及足

七極

歌曰崔氏連來三五

豚屋漏半日一點落魚翔似有一似無蝦躍靜中跳一躍彈石噀來毒即散搭指散亂為解索出來金沸湧如煮此脉醫家休下藥

五運主病

丁壬得合為木運主諸風掉眩之候

戊癸得合為火運主諸痛疼瘡瘍之候

甲己得合為土運主諸濕腫滿之候

其天一有精之氣浮結於水面故可以取烹煎補陰之劑及脩煉還丹之用今好清之士每日取以烹春茗而謂清利頭目最宜性味同於雪水也曰菊英水者蜀中有長壽源其源多菊花而流水四季皆菊花香若人飲其水者壽皆二三百歲故陶靖節之流好植菊花日採其花英浸水烹茶期延壽也曰新汲水者井中新汲未經混雜之劑故用以烹煮藥劑也曰隔宿水者盛於以物揚曜使水珠沫液盈於水面其水與月窟水性同取其味甘温而性柔故可以烹傷寒陰證等藥也曰潦水者又名無根水山谷中無人跡去處新上科門中之水也取其性不動搓而有土氣內存故可以煎煮調脾進食以補益中氣之劑也夫本草雖有諸水之名而未詳其言用今故述之以為後學於式云

六氣主病

乙庚得合為金運主諸外情鬱病痰之候

丙辛得合為水運主諸寒收引之候

巳亥厥陰風木乃肝瞻之氣也諸暴強直支痛綿戾裏急筋縮之症形焉

子午少陰君火乃真心小腸之氣也諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓之有声癰疽瘍

或問本草所載竹葉竹瀝皆云用淡竹大竹數頗多未審何竹名為淡竹也曰東坡蘇公之方有云淡竹者對苦竹為文除苦竹之外皆淡竹也我冊谿先生常用早筆俗名雷竹亦淡中之淡者也此竹又名甜竹以其笋之味甜也別有一種水竹其笋味絶淡故已上二竹皆可入藥用緣二笋俱無煩疾之味故知其无毒故也如無二竹亦可伐用餘竹皆不可用也

或問瘴氣之人朝夕常噬檳榔其俗平居無病之地其俗亦然吾儒有仕於彼地者亦隨其俗而噬之果有益乎否乎曰按本草檳榔味辛氣温為純陽之物善驅逐滯氣散邪氣泄胸中至高之氣除痰癖下行谿谷後重脫症之証如果有已上諸疾用之以佐木香等木芳藥無不應驗若無病常和食氣昕夕無故

瘧瘤氣結痎吐下霍
亂脹鬱腫脹鼻塞齆
衄血溢血泄淋閉身
熱惡寒戰慄驚惑悲
笑譫忘衄鮫血污之
症形焉

丑未太陰濕土乃脾
胃之氣也諸痙強直
積飲痞膈吐下霍亂
痿躄中滿体重胕腫
肉如泥按之不起之
症形焉

寅申少陽相火乃心
包絡三焦之氣也諸
驚癇癲狂譫胃昧躁
煩熱悲笑善哭妄言
見鬼附
[illegible]
[illegible]
[illegible]

堅痞癲症腹滿急痛
下利清白食已不饑
厥伸不便厥逆禁固
之症形焉

十二經症

手少陰心經見症消渴面赤脇內痛後廉腰脊痛浸淫善笑善恐善忘上咳吐下氣泄咳小身熱而腹痛心痛掌中熱煩心

手太陽小腸經見症目黃腮頰腫肘臂外後廉痛膺胸內前廉痛

足厥陰肝經見症頭痛脫色善漆耳無聞頰腫肝逆面青目赤腫痛兩脇下痛引小腹胸痛皆下則兩脇腫痛多人小腹腫腰腸痛不可俛仰四肢滿悶挺長熱嘔逆血睪丸腫睪疝縣癢足逆寒脛善瘈節時腫遺溺淋漓便難癃疝疝洞泄大人癲疝眩

胜胎耶噫非神之惑於女乃女之惑於神耳意庵此女年表無夫正所謂思想無窮所願不遂地有道之士幼信乎邪說之惑焉

或問卅餘所謂難產之婦皆是八九個月內不能謹以致夫夫同寢今人未詳此理至於八九個月內猶有房事夫情欲一動氣血隨耗蓋胎孕生於氣血培養氣血既虧則胎息羸弱日月既足子如愛賁郎欲分娩遂註拆胞求路而出胞破之後其胞中之漿水沛然下流胎息強健者即翻身隨漿而下此為易產者也胎息惓弱者猶如龜鼈未醒轉頭遲慢不能隨漿而出胞漿既乾則二汚閉塞其生路是以子無所伺遂生橫生逆產臨產之際若見漿下而未分娩者便當憂恐急服催生之藥

或問婦人產後之證卅餘為當以補氣血為主治雖有雜證以未治之又曰產後中風切不可作風治而用風藥然則產後不問諸證悉宜大補氣血乎曰詳註未二字其義自明若夫氣血大虛諸證雜揉俱虛而無他證者如蜀葵子之類逐去惡血道路通達庶有速產之功效者不可不知此意

合宜大補氣血自愈或因虛而感冒風寒者補氣血藥帶驅風之劑或因脾虛而食傷太陰者補氣血藥加清導之劑或因瘀血惡露未盡而惡寒發熱者必先逐去瘀血惡露然後大補經曰有本而標之者有標而本之者又曰急則治其標緩則治其本卅餘主未二字即標本之意耳臨證之際其於望聞問切之間豈不可辨乎若一例施之以補豈非刻舟求劍之術耶

胃轉筋陰縮兩筋攣善忘胸中喘馬嘗血在脇下喘
足少陽膽經見症口苦馬刀挾瘿胸中肋肋間脇外至所絶骨外踝前諸節痛足外熱寒慄風体無澤善大息
足太陰脾經見症五泄注下五色亡小便不通面黃舌強痛口甘食即吐只不下咽心悸嘈雜心善饑善味不味食不化

或問婦人産後諸疾古方多用四物湯加減調治我朋爺先生独謂芍藥酸寒能伐發生之氣禁而不用何故曰新産之婦血氣俱虛之甚如天地不交之否有降無升但存秋冬肅殺之令而春夏生發之氣未復故産後諸証多不利乎寒涼之藥大宜熱温之劑以助其資始資生之化源也蓋先哲制四物湯方以川芎當歸之温佐以芍藥地黃之寒是以寒温適中為婦人諸疾之妙劑也若或用於産後必取白芍藥以酒重復制炒去其酸寒之毒但存生血活血之能為其不可也後人傳寫既久脫去製炒註文并爺慮七俗醫圖奔不製而用之特拳其為害之由以戒之耳甘能依法製炒為用何害之有哉拳者其只不知此乎

或問小兒氣喘世俗列以為犯土謂犯其上皇也哉 或確

食不化陰虛脾胃肝足背痛煩悶心下怠痛當脇有動氣按之若牢痛心下若痞腹脹腸鳴飧泄不化足不收行善瘈脚下痛九竅不通瘡泄水下後出餅氣則快然飲發中滿食減善噫形酢皮膚濇而短氣肉痛身体不能動搖足胕腫若水
足陽明胃經見症惡烟火聞木声則驚往上發而歌棄衣而走

或作寒或後并起寒開通源流寒熱通小兒純陰云犯上無疑矣信聽術士退土或書符命貼於動土之處或呪法水焚符調服或按家之九宮謂土皇居於何宮太陽落在何宮當取太陽之土與兒飲之能釋土皇之厄而喘定問亦有驗者矣歷代醫書并牛充棟何不該載而遺此証為黃冠之流醫治歟請明以告我曰夫小兒發喘多由風寒外束腠理壅遏而肺氣不得宣通而為病耳治法當用錢氏瀉白散或三拗湯等劑使腠理開通肺氣舒暢而喘息定矣或用吐瀉之後而中氣不足亦使短氣而喘或用伏龍肝湯泡放温飲之其喘立定若有之蓋脾土大虛必借土氣以培益之其術士窺竊此意而巧立名色而謂太陽之土能安土也夫小兒之證不一或慢驚

頰黑不能言唇胗喎
呵欠消穀善飲頸腫
痛乳冲股伏兎胠外
應足跗皆痛胸旁過
乳痛口噤腹大水腫
奔豚腹脹胠內應跗
痛髀不可轉胭如結
腦似裂膝臑腫痛遺
溺失氣善呻數欠癲
瘡溫浸心欲動則閉
戶獨處驚身前熱身
後寒
手太陰肺經見症善
悲欲哭洒洒寒
欬盛中痛胠上肩

痛肩背痛胠右少腹
脹痛小便數澼泄皮
膚痛及痳木喘少氣
頰上氣見交兩手而
瞀
手陽明大腸經見症
手大指次指難用耳
聾煇七焞上耳鳴嘈
七耳後肩臑肘臂外
皆痛氣滿皮膚殼殼
然堅而不痛
足少陰腎經見症面
如漆柱少中清面黑如
炭咳嗽多血渴胠左
脇下有物髀間痛胸

有視而喘或肺脹氣促而喘縱取太陽土盈盈以沃之亦莫能救壯萬一醫者自宜檢方按法調治毋听末流之俗以致惑焉

或問人之壽夭各有天命存焉凡人有生必有死自古皆然竪者何益乎曰夫所謂天命者天地父母之元氣也父為天毋為地父精毋血盛衰不同故人之壽夭亦異其有生之初受氣之兩盛者父毋元氣皆壯盛也余故此當得上中之壽受氣之偏盛者當得中下之壽受氣之兩衰者能保養僅得下壽不然多夭折雖然又不可以常理拘泥論也或風寒暑溫之感於外飢飽勞役之傷乎內豈能一一盡乎所稟之元氣耶故上古神農氏嘗百草製醫藥乃欲扶植乎生民各得尽乎天年也今野人有不信竪而信巫枉死者皆不得盡乎正命而遽云

牆柱稍死者何異焉曰今之推命者皆以所生日時之天上星辰推算其死生安危無不節上應驗子以父毋之元氣為天命恐非至當之語曰天人之理盛衰無不昭合如河出圖洛出書聖人取以畫八卦而成易書凡人之一動一靜與夫吉凶消長之理進退存亡之道用之以卜筮毫髮無差雖然聖賢諄諄教誨必使盡人事以副天意則凶者化吉亡者得存未嘗令人委之於天命也傳曰修身以俟命而已矣是故醫者可以通神明而權造化能使生天者壽而壽者仙醫道其可廢乎

或問人之壽夭不齊何也曰元氣盛衰不同耳夫人有生之初先生二腎號曰命門元氣之所司性命之所繫焉是故腎元盛則壽延腎元衰則壽夭此一定之理也或曰今見肥白之人多壽夭元氣反衰乎瘦黑之人多壽

中滿大小腹痛大便難飢不欲食心懸如飢腹大脛腫喘嗽脊臀股後痛脊中痛股內後廉痛腰冷如冰及腫足痠厥癖不氣逆小腹急痛泄下腫足脛寒而逆腸澼陰下濕四指正黑手指清厥足下熱喜臥坐而欲起東獐下痛喜恐四肢不收四肢不舉

足太陽膀胱經見症頭苦痛目似脫頭兩

延元氣反盛乎曰冊經謂白者肺氣弱黑者腎氣旺又曰肥不如瘦白不如黑或曰四方之人皆同乎曰不同也內經五常政大論云陰精所奉其人壽陽精所降其人夭又曰東南方陽也陽者其精降於下故右熱而左温西北方陰也陰者其精奉於上故左寒而右涼王註曰陰精所奉高之地也陽精所降下之地也陰方之地陽不反泄寒氣外持邪不數中而正氣堅守故壽延陽方之地陽氣耗散發泄無度風温熱中其氣煩渴故夭折或曰常聞天人之理同一揆也今見於天地之四方者既開命矣而見於人之五藏者未之聞也謂申明其說可乎曰西北二方在人為腎水肺金所居之地二藏常恐其不足東南二方在人為肝木心火所處之位二藏常恐其有餘難經曰東方實西方虛瀉南方補北方

等語即此之義也夫腎水實則陰精上奉於心而故東方之木氣不實而西方之金氣不虛此子能令母實使金得以平木也是故水旺以盛而火旺以盛陰精所奉於上而令人壽延也若夫腎水一虧則無以制南方之心火故東方實而西方虛其命門與胞絡之相火皆挾心火之熱而來侮所不勝之水使日水虧而火日盛此陽精所降於下故令人夭折也大抵王氷王天地之四方言越人主人身之五藏論皆不失內經之旨同歸於一理也考者詳之

腫便膿血肌肉爛頃刻拔小腹脹痛按之欲小便不得

手厥陰心胞絡見症笑不休手心熱心中大熱面黃赤心中動

手少陽三焦經見症耳鳴喉痺腫痛耳後連目銳皆痛汗自止痛牖肘臂外皆痠小指次指如廢

中風指南

中腑

中腑者有表症面加五色脉浮弦而惡風寒拘急不仁現六經形症治宜汗之亦不可過汗損其衛気用小續命湯爲主或無汗惡寒者麻黄續命湯鍼大陽至陰穴並見下有汗惡風桂枝續命湯宜鍼風府穴並見下無汗身熱不

中風門

論

内經曰風之傷人也或爲寒熱或爲熱中或爲寒中或爲萬風或爲偏枯又曰風者百病之長也至其変化乃爲他病無常方又曰諸風掉眩皆屬肝木千金云岐伯所謂中風大法有四一曰偏枯謂半身不遂也二曰風癱謂身無疼痛四肢不收也三曰風懿謂奄忽不知人

花溪恒德老人虞　博　天民甫　編集
饒陽烟霞釣叟余應奎　汝文甫　補遺
分水梅坡太醫吳嘉言　孔彰甫　校正
建邑書林積善堂奇泉　陳　賢　梓行

惡寒白虎續命湯鍼陷谷方允二穴並見下無汗身凉附子續命湯刺隱白穴並見下有汗無熱桂枝附子續命湯鍼太谿穴並見下或肢節拳痛麻木不仁羌活連翹續命湯刺大敦灸絶骨穴並見下若初中冱寒頭痛先理氣藿香正氣散傷寒門對星香散爲末順氣散並補遺再者八味順氣散補遺其中臟大便秘者三化湯見下失音者大秦艽湯見下痰涎盛者稀涎散吐之後服竹瀝湯荊瀝湯並見下

補遺星香散　治中風痰甚服熱藥不得者

天南星去皮　八分

南木香　一分

分二服姜三片水煎服

補遺爲藥順氣散先服此藥疏通然後再風藥

也四曰風痺謂諸痺類風狀也是以古之名醫皆以外中風邪立方處治惟河澗劉守真氏所謂中風癱瘓者非爲肝木之風實甚而卒中之亦非外中於風良由將息失宜心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰陽虛實而熱氣拂鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也亦有因喜怒思悲恐五志有所過極而卒中者夫五志過極皆爲熱甚俗云風者言未而忘其本也東垣李之明氏亦謂中風者非外來風邪乃本氣自病也凡人年踰四旬氣衰之際或因憂喜怒怒傷其氣者多有此證壯歲之時無有也若肥盛者則間而有之亦是形盛氣衰故如此耳卅溪先生亦曰有氣虛有血虛有痰盛又曰西北二方真爲風所中者有之東南之人皆是濕上生痰痰生熱上生風也夫上古之論中風一以爲外感風邪之候及乎三先生之論一出皆以風爲痰象而謂內傷正氣爲病然三先生又別各有外感之論而使後學狐疑不決故王安道有論三子主氣主火主濕之不同而與昔人主風之不合而立真中類中之目岐爲二途愚竊疑焉曰卒中曰暴仆曰暴瘖曰蒙昧曰喎僻曰癱瘓不過如此無此候者非中風之病也夫外候既若是之相侔而病因又何其若彼之異耶欲求歸一之論終不可得於是積年歷試四方之病此者若干人盡因風濕痰火挾虛而作何嘗見其有真中類中二者之分哉是以一旦豁然有所感悟未知是否請陳梗槩如左與明達者共議夫中風之證蓋因先傷於內而後感於外之候也但有標本輕重之不同耳假如百病皆有因有證

麻黃去根節
陳皮去白
白朮 白茯苓
青皮 白芷
陳皮去白 白烏
人參各一兩
甘草五錢
每服五錢水煎服
仍以消化蘇合丸
間服妙

補遺八味順氣散
凡中風之人先服
此藥順氣後進風
藥

台烏各二錢
殭蠶去嘴炒斷絲
川芎 白芷
大甘草炙
枳殼去穰麩炒
桔梗各一兩
乾姜炒五錢
每服二錢姜棗煎
温服

中臟

中臟者內閉九竅故
唇緩失音鼻息不聲
目脊大小便閉故可
下之亦不可過下損
其氣血不省人事通

因則爲本證則爲標古人論中風者言其證也三先生
論中風者言其因也知乎此則中風之候可得而詳論
矣其所謂真中風邪者未必不由氣体弱榮衛失調然
後感於外邪也若非體虛所致則西北二方風寒大盛
之地而中風者比比皆是何暇爲他證哉其所謂因火
因氣因濕者亦未必絶無外邪侵侮而作也若無外邪
侵侮則因氣因火因濕各自爲他證豈有歪僻癱瘓暴
仆暴瘖之候乎經曰邪之所奉其氣必虛是也豈可以
一中風之證岐爲二途哉治之之法重於外感者先驅
外邪而後補中氣重於內傷者先補中氣而後驅外邪
或以散風藥爲君而以補損藥爲臣使或以滋補爲君
而以散邪藥爲臣使全在活法量輕重而處治之也內
經曰有取標而得者有本而標之者有
標而本之者又曰急則治其標緩則治其本若大初
暴仆昏悶不省人事或痰涎壅盛舌強不語兩寸脉浮
大而實者急宜以瓜蒂藜蘆等藥吐之以遏其勢或人
迎脉緊盛或六脉俱浮弦者急宜以小續命湯表之蓋
風氣大盛心火暴升而痰涎壅遏於經絡之中於斯時
也豈尋常藥餌而能通達於上下哉故本方用附子以
其藥雄壯之資而有斬關奪將之勢能引人參輩並行
於十二經以追復其散失之元陽又能引麻黃防風杏
仁輩發表開腠理以驅散其在表之風寒引當歸芍藥
川芎輩入血分行血養血以滋養其虧損之真陰或加
石膏知母以降胃火或加黃芩以清肺金看所挾見證
與夫時月寒温加減施治病勢稍退精神稍復輒當改
用丹溪之法而以補氣補血清痰之劑以調養其本氣

頂散補遺鍼中和人
中二穴補遺或半夏
末吹鼻中取嚏死嚏
死中臟無別病大便
秘三化湯見下老弱
者麻仁丸産後下痰
涎甚盛暇汁吐之或
稀涎散見下痰多有
熱荊瀝湯見下中風
不語須灸頂門百會
二穴補遺若口開眼
合撒手遺尿汗出搖
頭直視面赤鼾睡脉
急大实不治

補遺通頂散 治中

而安此急則治其標與夫標而本之之治也凡人手足
漸亮不隨或臂膊及髀股指節麻痺不仁或口眼歪斜
語言蹇澁或胸膈迷悶吐痰相續或六脉弦滑而虛軟
無力雖未致於倒仆其為中風量厥之候可指日而定
矣早當從丹溪之法調治其左手脉不足及左半身不
遂者以四物湯補血之劑為主治右手脉不足及右半
身不遂者以四君子湯補氣之劑為主治痰盛者二陳
導痰等湯兼用氣血兩虛而挾痰者八物湯加南星半
夏枳實竹瀝姜汁之類若夫真元漸復痰飲漸消或兼
有風邪未退者仍以羌活愈風湯防風通聖散之類出
入加減調治而安此緩則治其本與夫本而標之之治
也抑考先哲有云其證有中臟中腑之分證各不同中
腑者多着四肢故面加五色脉浮而惡風寒四肢拘急

風仆遺不知人
藜芦 生甘草
川芎 細辛
人參去芦各一錢
石膏五錢
右末之吹入鼻中
就提頂髮得嚏妙
無嚏难治

補遺中風不省鍼灸
歌訣

中風之症或不省
中冲一穴不須等
先補後瀉如不應
再刺人中立便省
中冲穴在手中指端

不仁或中身之前或中身之側若曰中腑也其治多易
中臟者多滯九竅故辰昏緩失音耳聾鼻塞目昏大小便
秘結皆曰中臟也其治多難大法中腑者小續命等湯
以發其表中臟者三化等湯以通其裏腑臟兼見者又
不可以拘泥或一氣之微汗或一旬之通利又曰治須
少汗亦須少下多汗則虛其衛多下則損其榮斯又不
可不謹或外無六經之形證內無便溺之阻隔但手足
不遂語言蹇澁者此邪中於經也又當從乎中治而不
可以標本論也是宜養血通氣大秦艽湯羌活愈風湯
之類治之夫所謂諸方論治乃先哲立權衡以為後學
之矜式耳其於臨證切脉之際又當順時令而調陰陽
安臟腑以和榮衛察病机審氣宜全在活法以度其輕
重之權量甚無勝柱以調瑟也

去甲針入一分沿脉法

夜向後三分灸三壯治中風不省先補後瀉暴喑先瀉後補心痛不省單瀉人中一穴平鍼三分可灸三壯

人中穴在鼻柱下三分口含水凸珠上是也

補遠中風不語鍼灸歌訣

中風不語最難医頂門髮際亦堪施更向百會明補瀉即時便醒免災危

頂門穴即顖會穴在上星後一寸可灸七壯瀉之中風不省先瀉後補中風

單瀉

百會穴在頂上中央旋毛中有一取法

前以眉心問印堂穴量起後一頂髮際量指折中是穴

鍼入五許中風先補後瀉七多補少頭風宜瀉可灸七壯宜瀉無補

脉經曰脉微而數中風使然〇寸口沉大而滑沉則爲實滑則爲氣氣實相搏入於臟則死入於腑則愈此爲卒厥不知人唇青身冷爲入臟死身温和汗自出爲入腑而復自愈〇脉陽浮而滑陰濡（濡當作輭與軟通下同）而弱或浮而滑或沉而滑或微而虛或微數寸口或浮而緩或緩而遲皆爲中風之證大法浮遲者吉急疾者凶又曰脉浮而遲浮者風也遲者寒也風寒相搏邪氣未解

丹溪方法（丹溪方法先哲有云方者法之体法者用故二者不可偏廢也）

丹溪曰中風大率主血虛有痰或挾火與濕諸方書皆謂外中風和惟刘河間作將息失宜水不制火極是然地有不同不可一途而論西北人外中者亦有東南之人皆是濕土生痰七生熱七生風也真中風初者東垣中血脉中腑中臟之說甚好治法以痰爲先補養次之初中急指人中令省〇予和三法亦可用痰壅盛者口眼歪斜者不能言語者皆當用吐法輕者用瓜蒂散或蝦汁或稀涎散吐之或重而口噤者用熟藍末少加麝香或半錢或一錢灌入鼻內吐之一吐不已再吐亦可氣血虛而不可用吐法者慎吐法詳見痰門

〇半身不遂大率多痰在左屬死血少血宜四物湯加桃仁紅花竹瀝薑汁〇在右屬痰與氣虛宜二陳湯合四君子湯加竹瀝薑汁能食者去竹瀝加荆瀝尤妙肥人多濕少加附子行經

〇氣虛卒倒參芪補之挾痰則濃煎人參湯加竹瀝薑汁血虛者以四物湯補之挾痰者其藥俱用薑汁炒過

中經脉

中經脉者外無六經形症內無便溺阻隔故治之在經無表裡症口眼喎斜半身不遂宜靜勝其燥是養血也大秦艽湯見下汗吐下後初症既定宜大藥養之牛蒡清心丸頭狂門痰涎盛竹瀝湯見下口眼喎斜瓜蒂散吐之即下独聖散或蝦汁吐之或鍼灸頰車地倉三

更加姜汁竹瀝服

○遺尿者屬氣虛多以參芪補之

○凡中風口開手散眼合遺尿吐沫直視喉如鼾睡肉脫不治之證也○若動止筋痛是無血滋筋故痛曰筋

枯不治

筋痛髮直搖頭上竄面赤如狂汗綴如珠皆為中風

大秦艽湯

皆局方千金

○四物湯已上二方並見虛損門

○四君子湯

○二陳湯見痰飲門

○小續命湯俱易若加減法東垣曰中風自汗者不可重發其汗故此藥亦不可輕用也

人參去芦　黄芩　白芍藥

桂枝　川芎各七分　防風去芦

防已

附子去皮臍炮　李仁芳研　甘草各一分

金匱要畧本方有石膏當歸無附子防風防已愚按本方石膏當歸固不可無而附子防風防已尤不可缺者之脫簡耳

右細切作一服水一盞半加生姜五片煎至一盞温服凡中風不審六經之形証加減用藥雖治之不能去其邪也內經曰開則淅然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜先以加減續命湯隨証治之中風無汗惡寒麻黄續命主之

麻黄

麻黄　防風　杏仁

依本方加添一倍宜鍼太陽至陰出血當舉蹻

附錄　太陽二穴在眉後兩額紫脉上至陰穴在足小指外側

穴補遺血虛四物湯

虛損門　吞活絡丹補遺

補遺口眼喎斜鍼灸穴法

若斜于左則鍼灸右邊頰車穴在耳垂下二分是穴灸五壯針三分医如以左手持鍼之如先一補後三瀉俱無指法又地倉穴在口吻傍四分是穴只鍼合谷曲池灸而無鍼與頰車

同甚者加人中穴
鍼與左邊作用同
法承將穴在唇下
宛中與右作用同
法斜於右邊灸左
邊鍼在右也

補遺活絡丹

天南星泡去皮尖
川烏泡去皮尖
草烏泡去皮尖
沒藥另研
乳香各二兩一錢
地龍去土六兩

右末之酒糊為丸桐
子大每服二十九
空心日午冷酒下
荊芥茶亦得

氣虛 附中氣

東垣云中風者皆由
元氣不足則邪奏之
治宜益氣則風自除
故疆仆卒倒皆氣虛
也六君子湯加黃芪
竹瀝薑汁虛煩加或
濃煎人參湯加竹瀝
薑汁血虛八珍湯地
黃用發汗必過恐泥
痰虛損門許孝士云
暴怒傷陰暴喜傷陽

附子 加倍

宜刺隱白去太陰之賊邪也此証太陰經中風也

附餘 隱白穴在兩足大指內側

中風有汗無熱桂枝
桂枝

依本方加一倍宜鍼太谿此証少陰經中風也

附餘 大谿二穴在足內踝骨後陷中

中風六經混淆係之於少陽厥陰或肢節攣痛或麻木
不仁宜羌活連翹續命主之

小續命八千 羌活加四分 連翹加六分

古之續命混淆無六經之別今各分經治療又分經鍼
刺法厥陰之井大敦刺以通其經少陽之經絕骨
灸以引其熱是鍼灸同法象之大体也

崑崙二穴在兩足外踝骨後傍陷中

中風有汗惡風桂枝續命主之

桂枝
依本方加一倍宜鍼風府穴在後髮際門上五分

附餘 風府穴在後髮際門上五分 已上二証皆太陽經中風也

中風無汗身熱不惡寒白虎續命主之

葛根一兩四分
芍藥
杏仁

依本方加一倍宜鍼陷谷刺厲兌鍼陷谷者云陽明
經之賊邪刺厲兌者瀉陽明經之實也已上二証陽
明經之中風也

附餘 陷谷穴在兩足次指外內庭後寸半

厲兌穴在兩足次指次指端

中風無汗身熱不惡寒附子續命主之

要愁不已気多厥逆往七得此疾便死涎潮気宜蚤牙関紫急脉伏匀寒此名中気若中風則匀温為異宜蘇合香丸諸気門灌醒然後調治繆用烏薬順気散或八味順気丸見前補遺或星附湯星附散三生飲並見下滌痰湯痰飲門若肝虚為風邪所干臥則魂散而不守舎狀如驚悸真珠丸補遺

附餘 大敦穴在玉莖毛際各開三寸
絶骨三穴在足外踝上三寸
愚按先哲製小續命湯以治中風初病无汗及手足不利表実時証此為急則治標之藥也後人不分表裏表実通用以治中風之証故張冠李戴其有汗表虚之証雖有加減之法夫中風無汗表実者固宜故悉也

精要○大秦艽湯 中風外無六經之形証内無便溺之閉語宜養血而筋自榮此方主之
秦艽一矛 甘草一矛 川芎一矛 川歸一矛
白芍薬一矛 細辛一分半 羌活五分 防風五分
黄芩五分 石膏一矛 白芷五分 白朮五分
獨活一矛 生地黄五分 熟地黄五分 白茯苓一矛
右細切作一服水煎温服無時如遇天陰加生姜三片同煎如小便不利加茯苓

機要○三化湯 中風外有六經之形証先以加減續命湯隨証治之内有便溺之阻隔復以此藥利之
厚朴去皮 大黄 枳實去瓤 羌活各等分
右細切每服三両重水三升煎至一升半終日服之以微利為度

機要○羌活愈風湯 并加減法療肾肝虚筋骨弱語言蹇澁精神昏憒此藥安心養神調理陰陽使無偏勝治中風内外無邪服此藥以行中道
羌活 防風去芦 蔓荊子

真珠母三矛另研
川當帰酒洗晒乾
熟地黄各一両半
酸棗仁 人参
柏子仁各一両
犀角 茯神
沉香各五矛
為末煉蜜為丸如梧桐子大辰砂為衣每服四五十丸金銭薄荷湯食後吞下日三服

痰火

河間云風病多因熱甚良由將息失宜而心火暴甚胃虛不能制則陰虛陽実而熱氣拂鬱心神昏冒不用故卒倒無知亦因喜怒悲愛恐五者過極而卒中者為熱微則僵仆気血流通筋脉不牽發過如故其則熱気太甚鬱滯不通陰気暴絕陽気後竭而死故痰延者偏枯者口噤者筋急者筋反縱者皆為燥熱之症故主於火也為病在表防風通聖散傷寒門在上涼膈散火熱門便秘三化湯見下自汗昏冒發熱不悪寒不安臥此風熱煩燥也瀉青丸補遺瘀火熾盛煩渴脉數大三黄枳実湯傷寒門清膈化痰丸痰飲門痰壅声如牽鋸服藥不效者宜於関元丹田二穴多灸之

補遺瀉青丸

當歸　川芎　細辛　枳殻去穰　熟地黄
人參去芦　麻黄去根節　薄荷　當歸　知母去毛　黄芪去根　地骨皮去心
獨活　白芷　柴胡去芦　半夏泡去皮　紫厚朴去皮　甘菊花
秦艽　前胡去芦　防已　杏仁去皮尖　白茯苓去皮　杜仲炒去絲　枸杞子
芍藥　四分半　石膏　生地黄　蒼朮五分　桂枝一分半　天陰雨加生姜三片

右細切作一服水二大盞煎至一盞去粗温服〇空心一服嚥下二丹丹〇臨臥一服嚥下四白丹動以安神靜以清肺假令一氣之微汗本方藥一劑加麻黄一錢生姜五片空心服以熱粥投之得微汗則佳如一旬之通利本方藥一劑加大黄三錢如前煎臨臥服得利為度如望春大寒之後加半夏三分人參三分柴胡三分謂迎而奪少陽之氣也望夏之月加石膏三分黄芩三分知母三分謂迎而奪陽明之氣也季夏之月加防已三分白朮三分茯苓三分謂勝脾土之濕也初秋大署之後加厚朴三分藿香三分杜一分半謂迎而奪太陰之氣也霜降之後望冬之月加附子一分半當歸三分謂勝少陰之氣也此雖立四時加減之法更宜臨證審察虛實寒熱土地之宜邪氣之多少可也

〇四白丹　能消肺氣養魄謂中風者多昏冒氣不清利此藥主之

白芷半兩　白檀一錢半　白茯苓半兩　白朮半兩
羌活一錢半　知母二錢　縮砂仁半兩　人參半兩

羌活　山梔子　大黃　防風　龍膽草等風爲末蜜丸彈子大每服一丸竹葉湯化下

愚按此劑乃瀉肝火之藥蓋肝主風風動則木搖故以此藥主之

補遺　声如窓鋸灸穴法

関元穴在臍下三寸是也

丹田穴在臍下二寸

獨活一錢半　防風半兩　甜竹葉二兩　薄荷二錢　細辛二錢　甘草半兩　香附子半兩炒　川芎半兩　麝香一字另研　牛黃半錢另研　藿香一錢半　龍腦半錢

右爲細末煉蜜爲九每兩作十九臨臥嚼一九分五六次嚼以愈風湯送下上清肺氣下強骨髓

愚按此方多輕揚走竄之味雖有參朮茯苓甘草之補益而寡固不可以敵衆也若用之於風痰壅盛昏憒不省人事者固宜其爲血氣虛衰神不守舍而昏迷若則促其死耳學者宜知此意

○二丹丹　治健忘養精神定志和血內安心神外華腠理

丹參一兩半　丹砂一兩另研　遠志五錢去心　熟地黃一兩半　天門冬一兩半去心　麥門冬一兩去心　茯神一兩　人參五錢　菖蒲五錢　炙甘草一兩

右爲細末煉蜜九如梧桐子大每服五十九至一百

丹溪云西北氣寒爲風所中誠有之若東南氣溫而多濕有病風者非風也皆濕生痰七生熱七生風經所謂亢則害承運制也故王乎濕是以口眼喎斜半身不遂涎多不語皆屬濕痰稀涎散吐之見下痰盛胸滿導痰湯痰飲門肥人痰厥口眼喎斜

九空心以愈風湯送下

○防風通聖散併加減法治中風及諸風等證

防風　川芎　芒硝　連翹　白芍藥　大黃　石膏　桔梗　薄荷　麻黃　荊芥穗各二分　黃芩去朽各八分　滑石二錢四分　甘草炙一錢

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞溫服日再服勞汗當風汗出爲皴癬乃痊去芒硝倍加芩藥當歸或生瘡疹赤或白倍加去節麻黃鹽豉葱白發汗罷依前方加四物湯黃連解毒三藥合而飲之日二服小便淋閉去麻黃加活石連翹煎調木杏末一錢七腰脇痛加當歸甘草煎調車前子末海金砂末各一錢七破傷風者如在表則辛

手足麻木疎風化痰
九痰飲門四肢不收
心神恍惚不知人六
君子湯加竹瀝薑汁
盡損門熱多荊瀝湯
見下或加二陳湯痰
飲門或青州白丸子
痰飲門痰火盛便秘
滾痰丸痰飲門或青
州滾痰丸 補遺

補遺 青州滾痰丸
大半夏二兩五錢
天南星五錢
白礬枯五錢半
巴豆二錢四分

以散之在裏則苦以泄之用此以蕪散之汗下後遍
利血氣驅逐風邪如荊芥穗大黃煎調全蝎末一錢
七羌活末一錢七諸風潮搐小兒急慢驚風大便秘
結邪熱暴甚腸胃乾燥寢汗咬牙目睛上竄譫語不
安轉筋驚悸倍大黃梔子煎調茯苓末一錢七如肌
肉蠕動者調羌活末一錢七風傷於肺咳嗽喘急加
半夏桔梗紫苑如打撲傷損肢節疼痛腰中惡血留
滯不下加當歸大黃煎調乳香沒藥各一錢七解利
四時傷寒如益元散半兩加葱白鹽豉生姜水一大
碗煎至五七沸溫服一半以鵝翎探之即吐吐後更
服一半汗出立解如飲酒中風身熱頭痛如加黃連
葱白煎服立愈頭旋腦熱鼻塞濁涕時下加薄荷黃
連煎服內經曰膽移熱於腦則辛頗鼻淵鼻淵者濁

白附子五米半
桔梗二米半
杏仁一兩五米
全蝎七个
為末米糊為丸如
梧桐子每服二十
九化痰止用十九
多則作泄

氣血兩虛

左癱右瘓皆因氣血
兩虛而痰火流注為
病若失之於初痰火
停久便成癖七久便
生痰火故傷氣耗血
氣逆者本方煎調木香末一錢七此方
去氣順風活血壯筋又治痢後脚弱緩
最治痢後鶴膝風良驗

局方○大防風湯
痛不能行履名曰痹風或兩脚腫痛足脛枯腊名曰
鶴膝風一切麻痺痿軟風濕挾虛之候服之其效神
防風去芦一米　川牛膝去芦酒浸　甘草炙各半米　人參去芦半米
白芍藥一米　羌活五分　附子七分半炮去皮
杜仲去粗皮細切姜汁炒絲斷一米　當歸去芦酒浸　黃芪各一米　川芎七分半

右細切作一服水二盞姜五片棗一枚煎至一盞空
心溫服

愚按此方用歸芎芍藥熟地以補血用參芪白朮
甘草以補氣用羌活防風散風濕以利關節用牛
膝杜仲以補腰膝用附子以行參芪之氣而走周

而尤難治矣或疼痛則為實用疎通閉鬱之藥而以腦麝少許為引經如換骨丹之類可取效也見下或舒筋保安散或參連保命宇神益氣湯並見下或於肩髃合谷二穴足三里環跳陽陵泉委中承山五穴灸之鍼之補遺若不疼痛則為虛服疎通閉鬱之藥亦要兼補氣血藥或八物湯虛損門左边身体手足

均脉絡盖治氣血兩虛挾風濕而成痿弱不能行者之聖藥也觀其治痺後風可見矣然可以治不足之痿弱而不可以治有餘之風痺也

治中風痰涎壅盛口眼歪邪牖塞不通

仲景方

〇稀涎散

等證

明白礬一兩半生用半枯　猪牙皂角四莢去皮炙黃

右為細末每服一二錢温水調下以吐為度

治諸風牖実痰盛及諸痼痰飲壅盛等證

孫和方

〇獨聖散

甜瓜蒂一兩炒黃色瓜熟脫落者佳

右為細末每服半錢或一錢量人虛實用之以酸薤汁調下以吐為度凡行吐法宜於天氣清朗之日行之晦日難得吐病暴急者不拘先令病者加全蝎半錢微炒如有虫者加猪油五七點雄黃末一錢甚者加苦花末半錢立吐其虫如濕腫滿者加赤小豆末一錢故此藥不可常用大要攻邪破實之則可用虛而痰火流注於右謂之左病必不可用吐法右病服四物湯一劑虛損門或虎脛骨酒見下神仙飛龍丸補遺或宇神益氣湯加紅花一錢牛膝丹皮一錢桃仁泥七分蒼朮九分春九酒洗一錢臨時加酒一盞童便二盞食遠温服如右邊手体手足拘攣筋急此屬氣虛

附餘

〇竹瀝湯　治中風痰壅六脉沉伏昏不知人

金竹瀝二升生葛汁一升生姜汁三合

相合作三服

附餘

〇荊瀝湯　治中風有痰多熱宜常服此

黃荊瀝二升金竹瀝二升生姜汁二合

相合作四服

附餘

〇星附湯　治中風痰壅六脉沉伏昏不知人

附子生用去皮　南星生用各一兩　南木香半兩不見火

一錢故此藥不可常用大要攻邪破實之則可用虛

〇則不可用吐藥之類可服降火利氣安神定志之藥

〇無服四錢水一大盞姜九片煎七分去渣温服虛寒甚者加天雄川烏名三建湯

愚按風本於熱而生豈有虛寒之理用附子取效者因肥白人多濕故中節耳正丹溪所謂肥白人

之右痰每日服四君子湯一劑盡損門或真方白丸子或大醒風湯或省風湯並補遺或安神益氣湯加木香三分沉香五分真漢防己七分五加皮一錢五分烏藥七分威靈仙七分在下部甚者加木瓜薏苡仁川牛膝若頭目不清及有痰者加曼荊子一錢川芎本一錢細辛三分酒炒枯一錢左同或腦麝

附餘 ○星附散 治中風雖能言口不喎斜而手足顫曳者

天南星姜製半夏姜製 人參去芦 黑附子去皮臍 白茯苓去皮 川烏去皮臍 白殭蠶去嘴

白附子 沒藥 各等分

每服五錢水酒各一盞煎至八分熱服併進得汗為度

附餘 ○三生飲 治卒中風昏迷痰涎壅併口眼歪邪脉沉無熱者可服

天南星生用 川烏生用去皮臍 附子生用去皮臍 木香二錢半

每服五錢水二盞姜十片煎八分温服

附餘 ○滌痰湯 治中風痰迷心竅舌強不能言

天南星姜製半夏湯炮 枳實麩炒 茯苓去皮 人參去芦 甘草炙 各半錢

作一服水二鍾生姜五片煎至一鍾食後通口服

愚按中風不語蓋是痰火上壅如此多有挾虛者此藥豁痰清熱利氣補虛兼備可謂簡而當者也

附餘 ○換骨丹 治癱瘓風中風口眼喎斜半身不遂并一切風癇暗並宜服之

槐角取子 桑白皮去黄皮 仙木去芦 麻黄去節煎膏 川芎大者 香白芷蛀者無用 威靈仙去芦 人參去芦 何首烏 蔓荊子各一兩 苦參去鬚 防風去芦 五味子 廣木香各五錢 麝香少許研 龍腦少許研 硃砂研為衣 右為末桑白皮單搗細秤以麻黄膏和就杵一萬五千下每兩分作十九每服一丸以硬物擊碎温酒半

多濕火用烏頭附子行經是也非肥白人決不可用大三建湯只可用於中寒陰毒之症豈可施於中風陽熱之症乎學者詳之

風九神遺如此則坎補兼施而難瘥可愈矣

補遺 鍼灸難瘥穴法

在上者有顯穴合谷穴在下者三里穴環跳穴陽陵泉穴委中穴承山穴如陽症熱實者於無病手足上先鍼一瀉三補次於有病手足上鍼宜一補三瀉

○有顯二穴在肩骨上巨骨下臑俞取

三陰中鍼入二寸
半灸二七壯
○合谷二穴在手虎口兩指岐骨兩合縫懸五分動脉應手直鍼入一寸半
○三里二穴在膝下三寸大骨外大筋內平鍼入二寸半宜瀉不宜補可灸三七壯
○環跳二穴在骨骨樞硯骨下一指側臥伸下足方可下鍼二寸半深補少瀉多隨症而治可灸三七壯
○陽陵泉二穴在膝外輔骨下一指陷中橫鍼透陰陵泉洩多補少禁灸下則膝孿不能開
○委中二穴在兩膝附餘後腕內胭中橫紋中鍼入一寸半洩禁灸四畔紫脉上甘可用三稜鍼出血絶妙
○承山二穴在外踝

盞浸以物蓋不可透氣食後臨臥一呷嚥之衣蓋覆當自出汗即差

附餘○煎麻黃膏法

採麻黃一秤揀去根一寸長取東流水三石三斗以無油膩鑵量大小盛五七斗者可先煮五沸掠去滓逐旋添水盡至三五斗已來漉去麻黃淘在盆中盪定良久用細羅子濾去滓取清者鑵內再熬至一斗再盪再濾取汁肎熬至升半已來為度只是撓動勿令着底恐焦了熬時忌鷄犬陰人盪時須蓋覆不得飛入塵土其藥放一二年不妨如膏稠用水添熬則愈

附餘○舒筋保安散　治左癱右瘓筋脉拘攣身躰不遂乾濕腳氣及濕滯經絡走注疼痛久不能去用此宣通

木瓜五兩　草薢　五靈脂　牛膝酒浸續斷
松節　烏藥去木　白殭蚕炒白芍　天麻
黃芪　當歸　威靈仙　虎骨酒炙防風酪一
右用無灰酒一斗浸上藥二七日紫封扎壘口待日數足取藥焙乾搗為細末每服二錢用藥酒半盞調下如酒盡用米湯調下　又方金毛狗脊一兩却將乳香白膠香各一兩同研入乾藥末內

附餘○參連保元寧神益氣湯　治一切中風口眼牽引手足搐搦甚有卒暴僵仆不省人事牙関緊急喉中痰聲漬設法將藥灌下或人嘶藥汁於銅管中努力吹衝入咽喉而下妙也

水竹茹三炙人參二炙先將二味同煎沸後入滓藥　遠志甘草水浸去心
黃芪各一炙酸棗仁研二炙柴胡去芦　黃連姜汁拌炒

十八寸瀹腸分肉兩間筋中鍼入二寸半補可灸二七壯

一如半身拘攣筋急先於無病手足一補二瀉之次于有病手足上裒瀉而補之俱以補法然鍼漫上作一遍上一边下則為交經繆刺法也務令患者恬靜絶慾可矣

左右皆同

加減省風湯　治卒

差活各一錢　生甘草三分　明天麻　貝母去芦各一錢　當歸酒洗　川獨活　肥知母各半錢　黄柏酒炒八分　生姜三片燈心七莖水煎設法灌下隨後即以竹瀝以入生姜汁衝開滾湯調三因中和丸末子二錢灌下少頃再煎服又以竹瀝湯調順氣化痰丸末子一錢方見痰喘門　亦隨即灌下又合煎劑深夜服如前竹瀝湯調潤下消痰抑火丸一錢方見痰飲門灌下如大便滑而脉遲微形氣虛寒者減苦連消痰抑火丸以用若熱大便一二日行一次則消痰抑火丸倍服之○春和防風乾葛如嗜酒者四時皆加麥門冬一錢比五味丸粒○秋加黄芩連翹八分○冬加紅棗生姜桂枝三分○口眼喎斜加白芷一錢升麻三分真殭蚕炒者

急中風口噤全不能言口眼喎斜筋脉拘急痛風盛痰实旋暈僵仆頭目眩重胸膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨節疼痛步履艱辛洗漱不定神志昏憒一切風證可服

防風去芦四両　天南星生用四両　半夏白好者湯泡七次去滑生用　枯黄芩去腐一錢洗去絲

附餘○虎脛骨酒　治中風偏枯四肢不遂一切諸風挛拳者並治之

石斛去根　虎脛骨炙石楠葉　川牛膝去芦　川萯蓉　川續斷

防風　茵芋葉　川巴戟去心　當歸去芦　杜仲制去粗皮炒斷絲　金毛狗脊燎去毛各一両

右件剉如豆大以絹囊盛藥用無灰好臘酒一斗浸之十日後每服一盞有量服二三盞温服

○愚按中風癱瘓乃痰火拂鬱於辛涼藥中少加香熱之藥以為向導古方或用腦麝或用烏附或用酒浸正此意耳今児虎脛骨酒最合其宜故特録之以為矜式若夫治風藥與補虛藥中如無烏附腦麝可用酒浸假酒行藥勢及便於服飲也既有烏附腦麝而又用酒浸不无積薪救火乎後孝宜詳之

生甘草各二兩
每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時候

與麻黃湯相合煎服尤妙方見痰飲門

愚按此方散風化痰降火可謂標本兼治者也

新遺神仙飛步丸
治諸風溫瘴等症
蒼木米泔浸八兩 草烏四兩不去皮 與火杜亏 香白芷各一兩

右用生姜連糟約各四兩搗爛和藥末拌勻以磁器築實於內紙封勿令出氣春三日夏二日秋五日冬七日取出晒乾或焙乾與姜煮同爲細末醋丸如梧桐子大每服十五丸空心茶酒任下忌發熱之物加至二十丸孕婦勿用

丹溪曰胃風爲病初飲食訖乘風涼而致其證食飲不下形瘦腹大惡風頭多汗腸塞不通脉右關弦而緩帶浮胃風湯主之

○胃風湯
人參 茯苓 川芎 川歸 桂心 白芍藥各等分

右細切每服八錢入粟米一小撮服如腹痛加木香磨服

丹溪活套

凡中風證悉以二陳湯加姜汁竹瀝爲主○風痰盛喉如拽鋸者加南星枳殼皂角防風括蔞仁○如血虛者加川歸川芎白芍藥生地黃有瘀血加桃仁紅花○如氣虛加人參白朮黃芪自汗者以黃芪爲君少用茯苓半夏或佐以附子○如風邪盛自汗身躰痛者加防風羌活薄桂○頭目不利或頭痛如破加川芎白芷荊芥穗細辛蔓荊子頂痛者去川芎加藁本或加酒炒片芩○如無汗身體痛脉浮緩有力或浮緊或浮弦皆風寒在表之證本方加羌活防風川芎白芷蒼朮麻黃之類或只用小續命湯倍麻黃以表之○如大便秘結不行四物二化湯以微利之三五日一去可也○心血虧欠致心神恍惚本方加黃連遠志石菖蒲或心動悸驚悸者更加酸棗仁茯神側柏葉竹茹連前共作一劑煎服○凡中風小便不利者不可利小便熱退自能利也○凡中風年老虛弱者不可吐氣虛卒倒者不可吐○肥人中風口喎

補遺 真方白丸子
治中風痰涎壅盛口喎不語半身不遂及小兒驚風潮搐初覺中風可常服之永无風疾壅隔之患
大半夏湯泡七次
白附子洗淨畧泡
天南星畧泡
川烏頭去皮泡
天麻 木香
全蝎去毒炒
松殼去穰麩炒各一兩

手足麻木不分左右皆屬痰用貝母括蔞子南星半夏陳皮白朮黃連黃芩黃柏羌活防風荊芥威靈仙薄桂甘草天花粉因麪者加附子竹瀝姜汁入酒一匙行經行火○瘦人中風屬陰虛火熱四物湯加牛膝黃芩黃柏有痰加痰藥入竹瀝姜汁服○遺尿者屬氣虛以參芪大劑補之○右癱者酒芩酒柏酒連防風各半兩半夏一兩羌活半兩人參蒼朮各一兩川歸川芎各半兩麻黃三錢甘草半兩南星一兩附子三片先如彈子大酒化下○肥人憂思氣鬱右手癱口渴補中益氣湯有痰加半夏竹瀝姜汁○中風證口眼歪斜語言不正口角流涎半身不遂或全體不能舉動因元氣虛弱縱酒色之過而更挾外邪用人參防風麻黃羌活升麻桔梗石膏黃芩荊芥天麻

石為細末生姜汁打糊為丸如梧桐子大每服二十丸食後臨臥茶清熟水下○癱瘓風消下日三服小兒驚風薄荷湯下二丸
愚按此方既是散風豁痰又能利氣比青州白丸青州淡痰丸尤為得之

補遺 大醒風湯 治中風痰涎壅盛半身不遂及歷節痛風筋脈拘急

南星薄荷葛根芍藥杏仁川歸川芎白朮細辛皂角等分加姜煎更入竹瀝半盃服外以艾灸治風穴道得微汗而愈○或有因寒而中宜姜附湯每服三錢挾痰挾氣攻刺加芳藥半錢手足不仁加防風挾濕加白朮筋脈牽急加木瓜脚節痛不可忍加薄桂一錢加姜棗水煎服之

補遺 蠲風飲子治中風癱瘓口眼歪斜及一切手足走注疼痛脚弩急麻痺不仁等證

防風去芦 杜仲去塵皮姜汁炒 羌活 香白芷
川歸去芦酒浸炒 川芎去芦酒洗 秦艽 生地黃酒浸洗 白芍藥
革薢 蒼朮米泔浸一宿 何首烏 大楓子肉
威靈仙 白朮去芦 木通去皮
血藤即過山龍也 防己各一兩 丁公藤一兩

天南星生用八两
防風生用四两
獨活生用
附子生去皮脐
全蝎去毒微炒
生甘草各二两
每服四錢水一盞
姜十片煎至七分
温服

補遺腦麝祛風丸
治左癱右瘓最效
白花蛇頭一箇帶
頸三寸酒浸炙
烏稍蛇尾二箇長
七寸酒浸炙
川烏尖七箇去皮
附子底七个去皮
天南星泡
半夏姜水泡七次
白附子 防風
北細辛 天麻
全蝎去毒炒
殭蚕炒去絲嘴
草烏泡各半两
片腦研一分
麝香一分研
右為細末生姜汁
糊為丸如梧桐子
大每服五十丸煎
小續命湯下

荆芥穗 凝桐皮去麤皮 五加皮 天南星煨裂
半夏湯泡七次 橘紅去白 赤茯苓去皮 桑寄生
天麻 殭蚕炒去絲嘴 釣鈎藤各半兩 薄桂去麤皮
草烏頭去皮尖 甘草節 川烏去皮臍 猪牙皂洛二分半
兩頭尖 陰地厥一名地茶 大劄 小劄
理省藤 桑絡藤各一兩半 生姜一兩另研細
右各細切用無灰好酒二斗五升以磁罐一个盛酒
浸藥以皮紙十數重包封罐口冬半月夏七日秋春
十日每日清晨午前午後臨臥各服一大白盞忌鷄
猪魚羊驢馬飛禽鰕蟹等肉味及煎炒油膩水菓生
冷花麥熱麪一切動氣發風之物其效如神萬舉萬
全之藥也

○如神救苦散 治癱瘓手足走痛不止非痛勿用

御米壳蜜炒一錢 陳皮五錢 壁虎炙黄即守宮用紅心
沒藥另研 甘草各二錢半 乳香另研
右為末每服三錢酒調服

○亨長嫂何氏年五十七身肥白春初得中風暴仆不省
人事身僵直口噤不語喉如拽鋸水飲不能入六脉
浮大弦滑右甚於左以熟艾末一錢加麝香少許灌
入鼻竅吐痰一升許始知人事身體略能舉動急煎
小續命湯倍麻黄連進三服覆以衣被得汗漸甦省
能轉側但右手足不遂語言蹇澁後以二陳湯加芎
歸芍藥防風羌活竒藥合竹瀝姜汁日進二三服若
四日大便不去則不能言語即以東垣導滯丸或潤
腸丸微利之則語言復正如此調理至六十四歲得
他病而卒

傷寒指南

外傷

有卒中天地之寒氣者屬外因蓋由胃氣大虛膏腠踈豁故寒和直入於中其病即發手足厥冷脈息細微身倦不熱或有微熱而不渴倦言動者是也當急温之理中湯見下五積散厥痛門若房勞而中寒者厥冷四逆湯見下三

傷寒門

論

內經曰人之傷於寒也則爲病熱熱雖甚不死若兩感於寒者則不免於死矣蓋傷寒之證非若雜病之易知也惟漢張仲景深達是理而爲立法之祖著傷寒論一書載三百九十七法一百一十有三方以爲後學之矜式惜乎其書一變於王叔和之撰次再變於成無己之詮註傳之愈久而愈失其真也考其法與方也何嘗合其數焉且三陰寒證之用熱藥者十居七八其內經所謂傳經之傷寒自三陽而傳入於三陰之經但一於熱耳何由而爲寒哉是以不能不使人之致疑也故後人紛紛之論俾未得其指要愚竊憾焉有至人傳云傷寒

建湯見下温腑法補遺

補遺温腑法　陰毒

及中寒絞腸沙症　脫陽厥逆腹痛

以索繩為首如臂大切去根及青留白二寸許先以火炳一面熱處着病人臍上下以熨之忽併貯火熨之忽併熱氣透入肌肉更作三四併壞則易之良久病人當漸醒手足温有汗即

大法有四曰傳經曰專經曰即病曰鬱病大即病者多為專經鬱病者多為傳經蓋寒邪之中人無有定體或中於陽或中於陰或但中於太陽未及於熱而即發有尾只在本經而不傳變者治宜麻黃桂枝等湯驅散表邪而愈或有從太陽未及鬱熱不從陽明少陽過而遂入於三陰之經者亦有初不曾入於陽經而直傷於三陰之經而即病者因其未曾鬱熱是以一切為寒證焉故多有霜降後至春分前發者是也為其無頭疼無大熱脈沉遲而微故古方又出中寒一條實此證也治宜四逆真武等湯温中通脈而愈若夫始從太陽鬱熱次而傳至於陽明少陽次第傳變於三陰之經者則為傳經之熱證明矣（經曰一日巨陽受之其脈尺寸俱浮二日陽明受之其証頭項痛腰脊強故宜發汗發汗不得臥故宜解肌三日少陽受之其脈尺寸俱弦其

痙續當更以四逆湯見下若厥而手足不温不可治也

內傷

一虛弱人口食生冷寒涼之物手足厥冷臍腹絞疼脉脫或遲人參理中湯姜附湯並見下若因房室內脫白失脉凡三證湯補遺因勞役內傷元氣因重感寒補中益氣湯加姜附虛損門補遺三建湯回陽

惡寒

病人身熱欲漆衣而惡寒者此表熱裏寒也先將陰旦湯攻退其寒補遺次用小柴胡湯加桂枝見下錐熟四肢微厥脉帶沉

固本

大川烏炮去皮
附子去皮臍
天雄炮等分

每服四分姜十五片水二盞煎至一盞溫服

爲三陰不至於有惟厥陰與督脉上行與太陽相接名曰巡經得度傳也夫經所謂兩感傷寒者日傳二經之候也一日太陽與少陰俱病二日陽明與太陰俱病三日少陽與厥陰俱病張仲景無治法惟東垣有治兩感大羌活湯云十可救其一二未能試其驗否愚按仲景傷寒論曰中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變爲温病至夏變爲暑病暑病者熱極重於温也攷之内經有曰春傷於風夏爲飧泄夏傷於暑秋爲痎瘧秋傷於濕冬必咳嗽冬傷於寒春必病温此四時之正病也遍閱内經中但有六經傳變之傷寒而無三陰直傷即病之寒證焉大抵内經以春三月及夏至前發者爲真傷寒張仲景以秋分後至冬三月發者爲真傷寒抑未敢議其孰非而孰是也若夫春爲温病夏

証胷脇痛而耳聾往來寒熱故宜和解四日太陰受之其脉尺寸俱沉細其症腹痛咽乾自利故宜分利五日少陰受之其脉尺寸俱微緩其証口燥舌乾而渴故宜清之六日厥陰受之其脉尺寸俱沉弦其証煩滿而囊縮故宜下之自此以後漸至十三日乃愈故多自春分後至夏至前發者是也夫春夏固無即病專經之寒證而秋冬豈無蟄病傳經之熱證與惟寒邪之傳注經絡實無定體故東垣有曰太陽者巨陽也爲諸陽之首膀胱經病若渴者自入于本也名曰傳本太陽傳陽明胃土者名曰越經傳爲元受病脉浮宜汗太陽傳少陽膽木者名曰表裏傳爲表病急當發汗而反下所以傳也太陽傳太陰脾土者名曰誤下傳爲受病脉緩有汗當用桂枝而反下之所致也當臍成痛四肢沉重太陽傳厥陰肝木者

遲大腸下利清谷不化四逆湯見下感寒脉沉或細又発熱但欲寐者此少陰經病麻黄附子細辛湯頭痛嘔逆悪寒者橘皮竹茹湯見下感寒無汗発熱悪寒此太陽經病也麻黄湯見下無汗悪寒無下利者此太陽例陽明病也葛根湯見下有汗悪寒者此太陽例太陰經病也桂枝湯見下平時感冒悪寒発熱為熱病皆冬受寒邪欝積之又之重病也外有四時感冒新受風寒之輕證亦有頭疼體痛悪寒発熱等候自當作感冒處治非冬傷寒邪過時而発之重病比也今人因借仲景治傷寒法治之獲効遂通謂之四時傷寒實非仲景立法之本意也夫欲治傷寒者切宜潜心洞察不可苟且輕試且如不當汗而汗者為亡陽為畜血為鼻衄為筋惕肉瞤為下厥上竭為咽乾為小便淋閉不當下而下者為結胸為痞氣為懊憹為失血為復熱又陰盛陽虚汗之即愈下之即死陽盛陰虚下之即愈汗之即死又曰桂枝下咽陽盛即斃承氣入胃陰盛乃亡醫者其可輕視之乎

脉法

脉陽浮而陰弱謂之傷風邪在大經俱弦加之○陽浮脉浮緊而無汗謂之傷寒傷榮寒傷榮實則衛盈○陽脉浮頭項痛腰脊強病在太陽

脉長身熱鼻乾口疎不得臥病在陽明

脉弦胷脇痛耳聾往來寒熱病在少陽

脉沉細咽乾腹滿自利病在太陰

脉微緩口燥舌乾而渴病在少陰

脉沉嗇煩滿嚢縮病在厥陰

脉陰陽俱盛重感於寒而緊濇變為濕痺陰陽緊盛傷寒之脉前病熱未已飲復感於寒也

脉陽浮而滑陰濡而弱更遇於風變為風濕陽脉浮滑陰脉濡弱皆風脉也前脉未除風木乘熱也

脉陽洪数陰實大太過濕熱両合変為濕毒洪数實大

資緑散見下千兒厥冷脉息沉細欲絶者此厥陰經病也當歸四逆湯厥症門又氣為衛主護皮毛温肌肉實腠理得和腠理不固悪寒調中益気湯倍加黄芪桂枝内傷門右肺受火就而失所司不能固腠理洒洒悪寒者甘桔湯加酒芩山梔麥門五味棗仁温疫門

補遺陰旦湯

陰旦湯三姜乞芩

二甘芍四桂同臨
棗煎陰毒身疼痛
外熱內寒煩燥侵

發熱

病人身寒不欲着衣
伶坐臥顫縮此表寒
而裏熱也白虎湯加
參先退其熱後用桂
枝麻黃各半湯並見
下四肢時或微厥脉
滑咽焦舌乾踡臥煩
者熱有煩燥宜大柴
胡湯大承氣湯下之
並見下咳嗽潮熱者

皆熱而熱相合也
脉陽濡弱陰弦緊更遇濕氣變為瘟疫
病發熱脉沉細表得太陽名曰痓病
病太陽関節疼痛而煩脉沉細名曰濕痺
病太陽身熱疼痛脉微弱弦乳名曰中喝
若發汗已身灼然熱名曰風濕風濕為病脉陰陽俱浮
自汗出身重多眠睡鼾
語難小便不利譫妄
黃色劇者則驚擲
脉沉細而疾身凉四肢拘攣煩躁不欲飲水狂悶名曰陽
厥傷寒熱盛脉浮大者生沉小者死
汗沉小者
浮大者死

方法

丹溪曰外感無內傷者用仲景法傷寒挾內傷者十居
八九經曰邪之所湊其氣必虛補中益氣湯從六經
所見之證加減用之氣虛甚者少加附子以行參芪

小柴胡加生姜桂皮
白芍湯並見下發熱
自汗表虛者人參白
虎湯見下發熱泄瀉
裏虛者柴葛湯見下
發熱有汗或無汗桂
枝麻黃各半湯見下
發熱脉弦自汗或渴
或利此太陽例火陽
經病也柴胡桂枝湯
補遺

補遺花胡桂枝湯

桂枝三錢
黃芩 人參
白芍各四錢半

之氣○東垣謂內傷者極多外傷者間而有之此發
前人所未發後人狥俗不見真切雷同指為外傷極
謬其或可者蓋亦因其不敢放肆而多用平和之藥
散之耳若粗率者必致殺人有感冒輕病不可便認
為傷寒而北二方極寒肅殺之氣外傷者甚多東南
二方温和之地外傷甚少所謂千百而一二也

○桂枝湯併加減法治太陽經中風發熱自汗鼻鳴乾嘔

桂枝三錢半芍藥一錢半甘草一錢

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水一盞半煎
至一盞去柤温服本方惟冬及春初可行○春末及
夏至前加黃芩一錢○夏至後加知母一錢石膏一
錢或加升麻半錢若病人素虛寒者不用加減小便
數其素飲酒人不喜甘者切不可行桂枝也○如發

甘草炙　半夏
柴胡各四錢
右大棗二枚生姜
三片水煎服
按此出太陽例少
陽經藥也

陰症

陰症身涼二便清病
初自汗少頃終也无
煩燥也無渴脉息沉
微仍可明冒用理中
湯見下兼劑不換金
正氣散見下五積散
腰痛門和解人參葛

汗过多心下悸而欲按者去芍藥姜棗煎服○如傷
風項背強有汗不惡風而變為柔痙者本方中加乾
葛一錢○如汗後身痛脉沉本方中加人參一錢○
如風濕身痛脉浮虛濇多汗本方中加附子半錢○
如関脉沉實大便秘而腹痛者本方中加大黄一錢
半芍藥一錢減甘草半錢○如太陽下之太早成協
熱利不止心下痞表裏不解本方中去芍藥加白朮
人參乾姜各一錢○如太陽汗多成柔痙者本方中
加乾葛桂枝芍藥各半錢括蔞根甘草各一錢○如
太陽脉浮腹痛本方中加芍藥一錢餳糖一匙名小
建中湯○如傷寒汗後身痛脉遲弱本方中加黄芪
一錢餳糖一錢名黄芪建中湯○如太陽發熱無汗
惡寒脉微弱者本方中加麻黄石膏各等分名桂枝

胃苓湯香正氣散並見下治中湯補遺

補遺治中湯　治虛弱人感寒肢体疼痛背寒手痺已服五積不退者
治中參朮与乾姜甘草青陳芩分將白水同前温熱服嘔加半夏与丁香

陽症

陽症身熱頭疼痛身重咽乾譫妄動或有譫語及循衣脉息弦二越婢一湯○如服桂枝後形似瘧日再發或身痒而汗不出者得汗必解本方中加麻黄一錢半杏仁十箇名桂枝麻黄各半湯

○麻黄湯　併加減法治太陽證脉浮頭及身体疼痛惡寒發熱無汗而喘
麻黄去根節二錢　桂枝二錢三分　甘草六分　杏仁十箇
右細切作一服水一盞半先下麻黄煎一沸掠去上沫下餘藥煎八分去柤温服覆取汗盖麻黄湯性熱惟冬及春初蒸病人素有寒者乃用正方夏至後服必發斑黄狂悶○如夏月得太陽證惡寒發熱頭痛脉浮洪盛無汗以子和六神通聖散代之○如太陽發熱無汗惡寒漸變為剛痙者本方中加赤芍藥六分葛根一錢豆豉二錢入葱白同煎○如傷寒中濕

洪宜審用或凉膈散火鬱門或解毒湯大柴胡湯五苓散並見下表劑十神湯升麻葛根湯金沸草散並見下十味苓蘇散補遺和解人參敗毒散瘟疫門柴胡升麻湯玄參升麻湯並見下補遺十味苓蘇散治四時傷寒發熱頭痛川芎七錢乾葛紫蘇葉各半兩桔梗二錢半茯苓去皮柴胡各半兩甘草三錢炙半夏六錢湯炮枳殼去穰炒三錢陳皮三錢半每服三錢姜棗煎

陰症似陽

燥煩面赤小便清滑大便又通渾身微熱尺寸脈沉遲此陰盛格與故身微熱所謂陰症似陽也宜用真

身体疼身目俱黄本方中去桂枝加連翹一錢生桑白皮赤小豆各二錢入生姜大棗同煎○傷寒即病火陰經脉沉微身体痛得汗則已本方中去桂枝杏仁甘草加細辛一錢二分附子一錢○傷寒大下後脉不至咽喉不利唾膿血厥逆泄利不止者雖曰難治本方中去杏仁加升麻當歸各一錢知母黄芩姜朮各半錢石膏白朮芍藥天門冬茯苓乾姜各七分次弟取微汗而愈○即病火陰經無表裏証本方中去桂枝杏仁倍甘草加附子一錢二三服後得微汗而愈○如風濕相搏脉浮一身尽痛本方中去桂枝加薏苡仁一錢得微汗而愈

○葛根湯併加減法治太陽與陽明合病無汗惡風身体肌肉俱痛

葛根半錢桂枝甘草各一錢麻黄分半右細切作一服加生姜三片大棗二枚水一盞半煎先下麻黄葛根一二沸掠去上沫納諸藥煎至一盞去粗温服取微汗即愈○如見陽明正病頭目痛鼻乾無汗肌肉疼痛本房中去麻黄桂枝加升麻一錢半倍芍藥取微汗而愈名升麻葛根湯○如風濕脉浮身重汗出本方中加石膏大青龍膽草姜夏各半錢○如疫癘春感清發熱而渴不惡寒本方中加黄芩六分不問已汗未汗頭痛肌熱者本方中去麻黄甘草桂枝加知母川芎各六分入生姜葱白同煎○如濕毒發斑心煩嘔逆本方中去桂枝芍藥加橘紅杏仁知母黄芩各六分○如太陽誤下之成協熱利不止本方中去麻黄桂枝芍藥加黄連黄芩各三分

武湯或理中湯 並見下若以虛陽上膈發燥為熱反与涼劑則氣消成大病矣

陽症似陰

四肢逆冷身涼小便赤少大便或秘或黑口燥心煩脉息沉数此傷寒失下血氣空伏熱之深故四肢厥逆或指甲時温乃陽症似陰也宜下之三乙承氣湯桃仁承氣湯並見下或竹葉石膏湯見下

腹痛

腹痛須分陰与陽循（陰通）（按痛）以涼按之痛止為陰症四逆湯見下同五積良腰痛門陽症之疾應与異大便不利結于腸按之痛甚知為實用大柴胡生泡黃（大黃也）見下

自利

自利須分熱与寒脉虛下利苦咽乾利而逆不止者本方中去麻黃加附子一錢

○大青龍湯 治傷寒見風或傷風見寒太陽無汗脉浮緊煩躁可服脉弱汗自出不可服

麻黃 五錢　桂枝 石膏 三錢　甘草 各一錢　細辛 五分　乾姜 半夏 各二錢　五味子 半夏

右細切作一服用水三盞先煮麻黃減半盞掠去上沫納諸藥煮取一盞去粗温服連進三服○如表證未解而渴甚者本方中去半夏加括婁根一錢○如嘔而微利熱而咳本方中加芫花龍眼大○如太陽汗後飲水多欬而喘本方中去麻黃加杏仁泥一錢重○如太陽咳嗽表未解心下有水氣而小便不利者本方中去麻黃加茯苓一錢半○如水寒相搏咳甘草只用二分○如太陽與陽明合病不下利但嘔者本方中加製半夏五分

○小青龍湯 併加減法治太陽表證未解心下有水氣乾嘔發熱而咳

麻黃　芍藥 各二錢　細辛　乾姜　甘草　桂枝 各一錢　五味子 半夏 各二錢

右細切作一服用水三盞先煮麻黃減半盞掠去上沫納諸藥煮取一盞去粗温服連進三服○如表證未解而渴甚者本方中去半夏加括婁根一錢○如嘔而微利熱而咳本方中加芫花龍眼大○如太陽汗後飲水多欬而喘本方中去麻黃加杏仁泥一錢重○如太陽咳嗽表未解心下有水氣而小便不利者本方中去麻黃加茯苓一錢半○如水寒相搏咳甘草 各二錢

○小柴胡湯 併加減法治傷寒四五日往來寒熱胃滿脇痛心煩喜嘔風濕身熱和在少陽經病

柴胡 去芦 二錢半　黃芩 人參 各一錢　甘草 五分

讀語有潮熱腸垢焦黃下必安並用調胃承氣湯下之見下利上發熱口中作渴者此太陽少陽合病下利黃芩芍藥湯痢疾門白頭翁湯或葛根芩連湯或三黃熟艾湯並補遺下利鴨溏寒在胃口中不渴須宜記腹中隱痛下青便四逆理中相間治並見下

補遺白頭翁湯 治腸垢腹下熱下利

半夏八分

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水二盞煎至一盞去粗温服○如小便難潮熱腹滿本方中加茯苓一錢○如嘔而發熱胃脇滿小便不利本方中去黃芩加茯苓一錢半○如飲水过多成水結胃本方中去大棗加牡蠣一錢半○如火陽往來寒熱咳嗽胃脇痛者本方中去人參大棗加五味子乾姜各半錢○如往來寒熱而渴甚者本方中去半夏加人參半錢括搂仁一錢○如身熱欲近衣不渴者本方中去人參加桂枝半錢○如病後熱而渴不惡寒而嗽者本方中更加五味子半錢○如痞而胃脇滿小便不利譫語驚狂自汗亡陽煩躁起臥不安一身盡痛本方中加龍骨桂枝鉛丹茯苓牡蠣各半錢大黃七分煎服

○大柴胡湯 治傷寒內實大便難身熱不惡寒反惡熱者

柴胡四錢 黃芩 芍藥各二錢半 半夏一錢

大黃二錢 枳實一錢半

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水二盞煎八分去粗温服以利為度未利再投一服

○調胃承氣湯 治太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘結譫語而嘔日晡潮熱者

而渴

白頭翁可治傷寒主治傷寒熱利安二兩白頭三兩柏秦皮連共水煎飲

補遺葛根芩連湯

太陽中風候下之協熱利不止

葛根黃芩黃連湯

十葛三連二草藏芩尾水煎分二服

傷寒協熱是商方

補遺三黃熟艾湯

傷寒五六日大熱下利諸方不效宜

服除熱止利又治時行毒痢良驗

三黃熟艾是芩連熟艾將軍水芒煎腸垢利而腑下熱此方奇效不虛言

發狂

病人身上發斑如錦紋蕪吐膿血者此傷寒失下熱毒蓄積胃家所謂陽毒發斑也宜玄參升麻湯以解之或陽毒升麻湯並見下或化斑湯斑疹

大黃六錢半 芒硝一錢

右細切水二大盞煎至一盞去柤納芒硝再煎一沸温服

○小承氣湯 六七日不大便腹脹滿悶病在陽明無表證汗後不惡寒潮熱狂言而喘者

大黃七錢 厚朴 枳實各二錢半

右細切作一服水一碗煎至半碗去柤温服以利為度未利再投一服

○大承氣湯 治胃實譫語五六日不大便腹滿煩渴併少陰舌乾口燥日晡發熱脉沉實者

大黃七錢半 厚朴 枳實各一兩 芒硝半合

右細切水三碗先煎枳朴二物取一碗半去柤內大黃再煎至一碗去柤納芒硝更煎一二沸温服以為度未利再投一服

○桃仁承氣湯 外證已解小腹急大便黑小便不利為瘀血證此藥主之

大黃三錢 桃仁十个去皮尖研 桂心去皮 芒硝各一錢半

甘草一錢

右細切水一盞半煎至一盞去柤納芒硝再煎一二沸温服血盡為度未尽再服

○白虎湯 併加減法治陽明證汗後脉洪大而渴及虛煩中暍等證

知母六錢 甘草二錢 石膏一兩三錢 粳米五勺

右細切作一服水二盞煎待米熟去柤温服○如口燥煩渴或發赤斑本方中加人參二錢名化斑湯又名人參白虎湯○如秋感熱之疫癘或陽明下後大

門黑者不治

發黃

病人頭微汗小便利而微發黃者此脾經佛鬱熱盛在表燥而無汗濕熱在裏濕熱相搏故也微者枝子蘗皮湯黃疸門甚者宜因陳湯下五苓散見下

虛煩

傷寒吐下後心中燥煩腹滿坐臥不安者

此虛煩也宜酸棗湯
或加味溫膽湯或梔
子厚朴湯並見下或
溫膽湯驚悸門

結胸

一傷寒結胸症皆因
汗下不得其宜所致
只宜平和之劑調達
之善保守於不虞為
上策慎勿用古方大
小陷胸湯以剥傷也
宜吞三因冲和九数
服最效見下如脉实
按鬱于中者夜服潤
便不固熱不退者或濕溫證熱不退而大便溏者本
方中加蒼朮六錢添水煎名蒼朮白虎湯
動急去白朮加肉桂二錢○如吐多者去白朮加生
姜三錢○如下多者倍白朮人參添水煎○寒多者
加乾姜一錢半○如腹滿下利脉沉遲而微者加炮
附子二錢○如傷冷中寒脉弱氣虛変為陰旦本方
中加茵陳高二錢○如霍乱轉筋本方中加石膏半
兩○如痞而胃寒或霍乱吐瀉不渴胃滿朮盛結胃
者或厥陰飢不能食ヒ即吐蚘用理中丸以本方煎

○理中湯併加減法治即病太陰自利不渴寒多而嘔腹
痛下利鴨溏蚘厥霍乱等證

人參　甘草　乾姜　白朮各二錢半

右細切作一服水二盞煎八分去粗温服○如腎氣
動急去白朮加肉桂二錢○如吐多者去白朮加生
姜三錢○如下多者倍白朮人參添水煎○寒多者
加乾姜一錢半○如腹滿下利脉沉遲而微者加炮
附子二錢○如傷冷中寒脉弱氣虛変為陰旦本方
中加茵陳高二錢○如霍乱轉筋本方中加石膏半
兩○如痞而胃寒或霍乱吐瀉不渴胃滿朮盛結胃
者或厥陰飢不能食ヒ即吐蚘用理中丸以本方煎

下抑火丸相煎一服
見下垂死者近效方
或灸臍法並補遺

補遺近效方　陽症

結胸垂死
用活蚯蚓十条搗
爛入水半碗蜜半
鍾灌下

補遺結胸灸法

巴豆十四粒
黄連大者七十
右為末用津唾和
成膏填入臍心以
艾炷不拘壯数灸
其上候腹中有声
為細末煉蜜為丸如弾子大每用白湯半盞化一丸

○四逆湯　治即病太陰自利不渴及三陰證脉沉細而
遲身体痛者

附子一枚去皮生用作片　甘草炙六錢　乾姜五錢

右細切分作二服每服用水二盞煎至一盞去粗温
服取火汗乃愈

○真武湯　治即病陰證傷寒脉沉細身体痛或發少陰
汗致筋惕肉瞤苛證

茯苓　芍藥　附子炮去皮生用各三錢　白朮二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗服○如渴者
加五味子乾姜細辛各一錢○如小便利者去茯苓
○如下利者去芍藥加乾姜二錢○如嘔者去附子
倍生姜

為度灸畢湯漫用帛拭净恐生瘡

壞症

傷寒當汗而汗不遍宜下而失於下或下輕以至表症裏症皆不清妥熱尤往來痰涎咳逆胸悶脇痛心煩不寧此名壞症宜服鼈甲柴胡飲或壞症奪命散並見下或鼈甲散補遺

補遺鼈甲散　治傷寒發汗吐下後服

○木附湯　治風濕小便自利及濕溫身痛等證

白朮　甘草各二錢　附子炮生姜各二錢半

右細剉作一服水二盞大棗二枚煎至一盞去粗溫服

○小陷胸湯　治小結胸陽證傷寒下之太早變為結胸七中作痛痞滿

黃連一錢　半夏二錢　括蔞子連瓤二錢半

右細切作一服水二盞先煮括蔞取一盞去粗納諸藥再煮至七分一盞去粗溫服未和再投一服

○大陷胸湯　治大結胸併熱實結胸七中大痛高起手不可押摸者

大黃三錢　芒硝二錢半　甘遂一分二重半另末

右細切作一服水二盞先煮大黃至一盞去粗納芒硝煮一二沸納甘遂末服以利為度

諸藥不解者鼈甲散中一法前

苓升犀角鼈同煎四生一草烏梅引

壞症傷寒服自瘥

孤惑

人患傷寒不發汗厥口生瘡声咽名曰孤惑宜服治鼈桃仁湯或雄黃銃散並補遺

補遺治鼈桃仁湯

治鼈桃仁效可誇桃仁熟艾与槐花引宜束子同煎服

○抵當湯　治血結胸諸証因瘀血結於胸中狂言小腹亦滿漱水不欲咽者

水蛭炒黃色　蝱虫各十五枚去翅足炒黃色　桃仁一十箇去皮尖另研

右細切水一盞半煎至一盞去粗服血下止後服

○小半夏茯苓湯　治水結胸

半夏四錢　茯苓三錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗入生姜自然汁半合再煎一二沸溫服

○梔子豉湯　治吐下後心胸懊憹無柰或大下復身熱不去心中痛結

肥梔子四枚香豉半兩

右細切作一服水二盞先煮梔子至一盞內豉同煮至七分去粗溫服得吐止後服

孤惑傷寒用此佳

補遺雄黃銃散

雄黃銃散二青箱
連苦參雄黃共將
一用桃仁煎水服
傷寒狐惑口生瘡

驗症舌法

白胎舌

舌見白胎滑者邪初入裏也毋田有熱

○玄參升麻湯 治發斑咽痛

升麻 玄參 甘草各半兩

右細切水三盞煎至一盞半去粗溫服

○陽毒升麻湯 治陽毒赤斑出狂言吐膿血

升麻二錢半 射干 甘草生用人參鉸各一

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○姜附湯 併加減法治下後復發汗晝不得眠無表證而脉微者

乾姜五錢 附子一枚生用

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗頓服○如下利厥逆脉不至者加甘草五錢倍乾姜添水煎服○如面赤者加葱九莖○嘔者加生姜○咽痛加桔梗○利止脉不出加人參三錢名通脉四逆湯○吐利止汗出而厥四肢拘急脉微欲絶本方煎成五藥加猪膽汁半合攪勻分二服其脉即起○少陰證腹痛或泄利下重本方中加芍藥二錢半

○和劑霍香正氣散 治四時感冒頭痛憎寒壯熱或風濕氣霍乱吐瀉常服除山嵐瘴氣

大腹皮先以手抄扳洗淨曝乾再用烏豆煮汁洗淨焙用 紫蘇連莖葉用 藿香 白芷 茯苓各六分 厚朴姜汁製炒 白朮 陳皮去白 苦梗 半夏各四分 甘草炙二分

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水二盞煎至一盞三分溫服

○和劑不換金正氣散 治四時感冒傷寒瘟疫時行及山嵐瘴氣寒熱往來霍乱吐瀉下利赤白及出遠方不伏水土並皆治之

脉不大實乃是邪陽脉經半表半裏之證也宜用小柴胡湯或梔子豉湯治之庶熱退寒除而白胎沒矣並見下

將瘟舌

純紅

舌見純紅色者此熱蓄於內也不問何經宜用透頂清神散治之見下

中焙舌

舌見純紅色內有黑形如小舌者乃邪熱結於裏也君火熾盛反兼水化宜涼膈散火熱門大芫胡湯下之見下

生斑紅舌

舌見純紅色而又有

小黑色者熱毒乘虛入胃裹熱則生斑矣宜用玄參升麻湯加乾葛見下化斑湯解之門火熱

裹圈舌

舌見淡紅色而中有一紅暈沿皆純黑乃餘毒移於心胞絡之間與邪火鬱結二火亢極故有是證也必調胃承

能於無形之中隨高而走去胸膈中及六經熱也

和劑方

○十神湯 治時令不正瘟疫妄行或四時感冒風熱發熱憎寒頭疼身痛無汗此藥不問陰陽兩感並宜服之

川芎 甘草 麻黃 乾葛

升麻 白芷 赤芍 陳皮 紫蘇 香附各一錢

右細切作一服加生姜三片連鬚葱白三箇如中滿氣實者加枳殼一錢水二大盞煎至一盞三分去柤熱服

○消風百解散 治四時感冒頭疼發熱咳嗽鼻塞聲重喘急等証

荊芥穗 白芷 陳皮 麻黃去節

蒼朮各一錢 甘草五分

厚朴製炒 陳皮去白 半夏湯炮七次 蒼朮米泔浸

藿香各一錢 甘草五分

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水一盞半煎至一盞温服

○東垣加減凉膈散 退六經熱及傷寒餘熱不解胸煩等證

連翹一錢 梔子 薄荷葉 淡竹葉

黃芩 桔梗各半錢 生甘草五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞日三五服熱退即止○易老曰凉膈散減芒硝大黃加桔梗同為舟楫之劑浮而上之治胸膈之與六經熱以其手足少陽之氣俱下胸膈中三焦之氣同相火游行於身之表膈與六經乃至高之分此藥浮載亦至高之劑故

氣湯下之見下



舌見純紅色更有裂紋如人字形者乃君火熾灼熱毒炎上故發裂也宜用涼膈散以利為度

舌見紅點如蟲蝕狀此熱毒熾盛陰陽相迫水火不能相濟宜小承氣湯主之見下

舌中心見乾黑形如烏炭有刺此乃热甚其大便堅金受火制故也宜調胃承氣湯黃連解毒湯調之並見下

右細切作一服加生姜三片葱白三箇水一盞半煎至一盞熱服咳嗽甚者加烏梅一箇同煎服

活人○黃連解毒湯　治傷寒大熱不止乾嘔煩渴錯語呻吟不得安臥

黃連一錢　黃芩　黃柏　梔子各三錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去滓服

活○金沸草散　治傷寒咳嗽頭疼發熱胸膈痰壅喘滿等證

前胡一錢半　半夏七分半　細辛三分　旋覆花一錢半　荊芥穗二錢　赤茯苓一錢

甘草三分

一方無細辛茯苓有麻黃芍藥

右細切作一服加生姜五片大棗一枚水一盞半煎至一盞温服

和○五苓散　治傷寒中暍煩躁小便不利而渴或霍乱吐利不止東垣曰五苓散乃太陽裏之下藥也夫太陽高則汗而發之下則引而竭之渴者邪入太陽本也當下之使邪從膀胱出也其腎燥膀胱熱小便不利此藥主之小便利者不宜用然太陽病熱而渴小便雖利亦宜此藥下之當服不服則穀消水去形亡必就陽明燥火戊胃發黃此太陽入本失下也由不服此藥故也

澤瀉一兩半　白朮去蘆一兩　赤茯苓去皮一兩　猪苓壹兩

肉桂削外皮半兩

右研為細末每服三錢白湯或清米飲調服或細切加姜棗煎服熱甚者去桂加黃芩○如傷寒三四日煩甚者邪入太陰而少陽經病亦在也

舌見淡紅中有大紅星者乃少陰君火熱之甚也所不勝者假火勢以侮脾土幷欲發黃之候也宜川五苓散加茵蔯治之見下

本方合小柴胡名柴苓湯加姜棗煎服以分利其陰陽也

○東垣此事雖知曰經云有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝若誤服則其變不可勝數故立此法不犯三陽禁忌觧利神方此易老之法也名曰九味羌活湯

東垣○九味羌活湯

羌活 治太陽頭痛項強腰脊痛君主之藥也然非無為主也乃發風濕及正之主故大無不通小無不入關節痛非此不能除也

防風 治一身盡痛乃電卒中半下職也

蒼朮 別有雄壯上行之氣能除濕下安太陰脾經

細辛 治足少陰頭痛在腦

川芎 治厥陰頭痛在額

白芷 治陽明頭痛在額

生地黃 治少陰心熱在內

黃芩 治太陰肺熱在胃

甘草 調和諸藥

已上九味雖為一方然亦不可執一執中無權猶執一也當視其經絡前後左右之不同從其輕重大小多少之不一增損用之如神其效細切水煎服若急汗熱服以羹粥投之若緩汗溫服之而不用湯投之也○脉浮而不解者宜先急而後緩○脉沉而不解者宜先急而後緩○此藥不獨解利傷寒治雜病亦有神○中風行經者加附子○中風秘澁者加大黃○中風并三氣合而成痺等證各隨十二經上下內外寒熱溫凉四時六氣加減補瀉用之

○東垣曰經云兩感於寒者死不治一日太陽與少陰俱病頭痛發熱惡寒口乾煩滿而渴太陽者府也自背膂而入人所共知少陰者藏也自鼻息而入人所不知也鼻氣通於天故寒邪無形之氣從鼻而入腎為水也水流濕故腎受之經曰傷于濕者下先受之同

見如絲之形也宜用理中合四逆湯溫之見下

死現舌

舌見黑色水克火明矣傷寒患此者百無一治

黃胎舌

舌見尖白根黃胎者其表邪雖未罷須宜鮮表然後方可攻之如大便秘者用

氣相求耳又云天之邪氣感則害人五臟以是知內外兩感臟腑俱病欲表之則有裏欲下之則有表表裏既不能一治故死矣然所稟有虛實所感有淺深有生者十得二三故立此方以待好生君子用之名曰鮮表飲

易老方

○鮮表兩感神方大羌活湯

防風　羌活　獨活　防己　黃芩　黃連　蒼朮　白朮　甘草炙　細辛各三分　知母　川芎　地黃各一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞半去粗熱飲之未愈再服三四劑病愈則止若有餘邪並依仲景法如

涼膈散加硝黃泡服火熱門小便澁者用五苓散加水通見下合益元散加姜汁少許以白滾湯不拘時調服刺症門

黑心舌

舌見弦白心黑脉沉微者對治亦脉浮滑者可汗沉實者可下始病即發此色

証治

○張子和六神通解散丸治夏月傷寒得太陽陽明二經病汗不出頭項痛腰脊強目疼　乾不得臥代麻黃葛根等湯發表藥也

蒼朮　石膏　滑石　黃芩各一錢半　麻黃七分半　甘草半錢

右細切作一服水二盞煎七分服春加防風一錢

○劉河間守真治傷寒直格要訣（下皆河間方）

傷寒前三日在表法當汗可用雙解散連進數服必愈

○雙解散　即後二方

○防風通聖散　方見中風門

○益元散又名六一散又名天水散方見痢門

二藥合而服之當得汗而解若不解者病已傳服

乃危殆之甚也速進調胃承氣湯下之見下

十五舌

舌見朱白胎二分根黑一分必有身痛惡寒如飲水不至甚者五苓散見下

白汗口渴者白虎湯見下下利者辭毒湯見下此亦危證也

十六舌

舌見白胎中有黑小點亂生者尚有表證其病來之雖宜涼膈散微表之火熱門表退即當下之下用調胃承氣湯見下

十七舌

傷寒後三日在裏法當下若下之太早則表邪乘虛入裏遂成結胸虛痞懊憹斑疹發黃之證輕者必危危者必死但當以平和之藥宣散其表和解其裏病勢或有汗或無汗発熱未愈當用小柴胡涼膈天水合而服之

病若半在表半在裏法亦當和解小柴胡涼膈主之若裏熱微者則當微下大柴胡合解毒湯主之若熱勢未退又以大柴胡合三一承氣下之

○三一承氣湯

大黃　芒硝　厚朴　枳實各五分　甘草一錢

右細切作一服水一大盞姜三片煎七分熱服其病胸膈滿悶或喘或愠陽脉緊盛者宜瓜蒂散吐之汗吐下三法之後別無異證者涼膈散調之

病大熱已去微熱未盡除者以益元散服之無令再發此傷寒治法之大要也

或傷風自汗脉浮緩者雙解散去麻黃以解利之其病半表半裏白虎湯和解之

其病在裏脉沉細者無問風寒暑濕或表裏證俱不見或內外諸邪所傷有汗無汗心腹痛滿譫語煩躁畜熱內盛俱是脉沉者並用承氣合解毒下之

或中暑自汗以白虎湯解之白虎解後以五苓合天水調之多進數服無妨

或腹脹滿脉沉者亦當以承氣合解毒微下之

或發汗之後熱不解脉尚浮者白虎加蒼朮再解之

或裏熱內盛陽厥極深皆因失下而成此證以致身冷脉微昏憒將死切不得以寒藥下之誤下即死有一輩

舌見如灰色中間更有黑暈兩條此熱乘腎与命門也宜急下之服黃連解毒湯下三五次見「遲則難治如初服大黃酒浸泡暈大小用之

十八舌



舌見微黃色者初病即得之發譫語此由火汗表邪入裏庸醫妄言是陰厥便欲投玄武四逆溫熱之劑下咽必死殊不知此證乃陰耗陽竭陰氣極弱謂之耗陽厥極深謂之竭畜熱沸騰將欲絕者當此之際寒劑熱劑俱不可投但進涼膈解毒以養陰退陽宣散畜熱脉氣漸生得大汗而愈亦有無汗氣和而愈者未愈却用解毒合承氣下之次以解毒涼膈天水三藥合而為一調和陰陽洗滌臟腑則其餘別證自不生矣

有大下之後熱不退再三下之熱愈甚若下之不愈脉微氣虛力弱不加以法則無可生之理若輟而不下則邪熱極盛陰氣極衰脉息漸絕必不可救似此之證是下之亦死不下亦死不下亦死醫者到此殺人活人一弹指間其不至手足失措者幾希

試云傷寒汗後汗出不解或反不汗脉尚浮白虎加蒼术湯再解之

十九舌

舌中見白胎外則微黃色者腹必作泄宜服解毒湯見下若惡寒者五苓散見下也必用汗下兼行以双解散而停主之見下每服一兩水一鍾半姜三片煎至八分不拘時服

又按飲論云傷寒汗後白汗虛熱不已白虎加人參一服如神汗出身涼此通用之法也如證則汗下之後熱不退不問有汗無汗並宜白虎加人參湯如服涼膈解毒調之

經云三下而熱不退者死後人有四五次下而生及十數次下而生者此偶然誤中耳活者得一二死者已十百後孝切不可以此為法但當依前法用解毒合涼膈調之使陽熱除退陰脉漸生庶不失人命也

若傷寒不解散成結胸之證臨時擇用大小陷胸湯丸累下之若脉浮者不可下是表證未出小柴胡合小陷胸湯投之脉雖浮而熱大極者承氣徐徐疎利之或有留飲過度濕熱內生自利不止其熱未退解毒湯治之

陽毒生斑涼膈散加當歸

佛黻熱盛在表燥而無汗濕熱在裏不能發於外相搏

二十 舌 微黃

舌見微黃色者表證未罷宜用小柴胡湯見下合天水散主之痢症門每服五錢入姜汁少許白滾湯調各少許白滾湯調服如發表用豆豉葱頭煎湯調服可下者大柴胡湯見下表裏雙除臨證審用之

遂成發黃茵陳湯調五苓散甚者茵陳合承氣下之

○茵陳湯

山茵蔯一兩 大黃半兩 梔子十枚

右細切水二盞煎一盞溫和服以利為度

一心煩不得臥梔子豉湯方見前

○梔子豉湯

一誤下太早遂成結胸虛痞涼膈散加枳殼桔梗

剛柔二痙譫語發狂往踰垣赴井皆陽熱極盛而然承氣合解毒下之

一汗下之後煩渴飲水涼膈散及減桂五苓甘露益元選而用之

○甘露飲

茯苓 澤瀉 甘草 寒水石 石膏各二

一 十 舌 黃 本色

舌中心見黃色者必初白胎而變為黃色此乃由表而傳於裏熱已入陽明胃經宜急下之若下遲必變黑色為惡症為凶害見賊邪氣深也宜用調音承氣湯下之或大柴胡湯亦可並見下

白木 杜衡 名半兩 滑石四兩

右為末每服三錢白湯調或新汲水調姜湯尤妙

一小便不通五苓泄之大便閉結承氣下之更有外證加減防風通聖散方內隨證用藥處治萬無一失也

一婦人證治皆然惟孕婦三四月併七八月不用硝黃其餘月分用之無妨

一小兒減劑服之

此中有古人治傷寒不傳之妙後之學者宜慎寶之

愚按河間已上治傷寒法宜用於春三白及夏至前後溫病及中暑熱傳經之證主按法施治無有不安

附餘

○橘皮竹茹湯治陽證傷寒噦逆惡寒及吐利後胃虛腸熟而效者

橘皮一升 竹茹一升半 甘草二兩半 人參半兩

二十二舌 白胎 本色
舌見白胎而自汗出者不可下宜白虎湯加人參三錢服之見下

二十一舌 白胎 本色
舌見白胎滑者病在肌肉爲邪在半表半裏必往來寒

右細切每服五錢生姜七片棗二枝水一鍾半煎至八分溫服

附餘○香蘇散 治四時傷寒頭疼發熱惡寒
香附子 紫蘇葉 各二兩 陳皮一兩 甘草半兩
右細切每服四錢生姜三片葱頭一箇水一盞煎七分空心熱服如頭痛加川芎白芷名曰芎芷香蘇散

附餘○柴胡升麻湯 治時行瘟疫壯熱惡風頭痛躰疼鼻塞咽乾疼盛咳嗽涕唾稠粘
柴胡去苗 前胡去蘆 乾葛各一兩 荊芥去根一兩半 赤芍藥去苗石膏火炒 升麻半兩 黃芩去皮 桑白皮各六兩半
右細切每服五錢生姜三片淡豆豉十餘粒水一盞煎七分熱服

二十四舌 白胎 本色
舌見白胎滑者此藏結之證和氣併入于藏難治

二十五舌 黃白色
舌見四圍白色而中心黃者必作煩渴

熱宜小柴胡湯和解之見下

附餘○小柴胡生姜橘皮竹茹湯 治陽證咳逆潮熱
柴胡去苗二兩半 黃芩去黑皮 生姜一兩 半夏入分 人參各一兩 甘草五分
右細切水一鍾煎七分溫服

附餘○柴苓湯 治發熱泄瀉裏虛者
柴胡去苗六兩分半 黃芩修實者人參去蘆 甘草各六分 白茯苓去皮 白朮去蘆 豬苓各七分半 澤瀉一兩二分半 桂枝五分
右細切水二盞煎至一盞溫服
○愚按此方即小柴胡湯五苓散相合是也除傷寒表證不治外邪傳半表半裏及內傷發熱雜病發熱無不治也

附餘○人參養胃湯 治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭

嘔家源流
嘔吐之證兼有表者五苓散見下益元散痢門相兼服之須待黃盡方可下也

十二 六 舌

舌見黃色而有小黑點者此乃邪氣遍六腑將入于臟也急服調胃承氣湯下之又進利胸散並見下

十二 七 舌

舌見黃色火白者兼少裹多宜天水散一服痢痘門亦用

十二 八 舌

散二服火熱門合而進之脉弦者宜防風通聖散主之 中風門

目昏疼不問風寒二証夾食停痰俱能治之但感風寒以微寒爲度

半夏湯泡七次 厚朴去皮薑製 蒼朮米泔浸一宿去粗皮炒各一兩 人參去蘆半兩 橘紅七分半 藿香葉去土 草菓去

茯苓去皮各半兩 甘草炙二分半

右細切每服四錢生姜七片烏梅一箇水一盞半煎六分去滓服無時

附○竹葉石膏湯 傷寒時氣表裏俱虛遍身發熱心胸煩悶得汗已解內無痰涎虛羸少氣欲吐及諸虛煩熱與寒相似但不惡寒身不疼頭不痛不可汗不可下者宜服

石膏一兩半 麥門去心半兩 人參去蘆 甘草炙各一分 半夏湯泡七次 粳米一合

右細切水一盞煎七分去滓通口服不拘時

附○梔子厚朴湯 治傷寒下後心煩腹滿坐臥不安若大梔子七箇厚朴薑汁製半兩 枳實二枚

右細切每服五錢入青竹葉五片生姜三片水一盞煎六分去滓入粳米百餘粒再煎米熟去米溫服不拘時候又云竹葉十片

附○酸棗湯 治傷寒吐下後心煩之氣晝夜不眠

酸棗仁炒香一錢 川芎 乾薑炒五分 甘草炙各一分 知母 茯苓去皮

右細切水一盞煎七分溫服

附○加味溫膽湯 治心膽虛怯觸事易驚夢寐不祥異象感惑遂心膽慴氣鬱生涎涎與氣搏亦生諸症

二十九舌

舌見紅黃而澁有隔
辭者熱已入胃邪
毒深矣心火頭渴
急宜大承氣湯下
之見下若身發黃
者用茵蔯湯見下
下血用抵當湯見
下水在脇內十棗
湯痰飲門結胸大
陷胸湯見下痞用
三黃瀉心湯見下

三十舌

舌見黃色而黑點亂
生者其證必渴譫
語脈滑者生脈濇

舌見四邊微紅中央
灰黑色者此由當
下失下所致急用
大承氣湯下之見
下熱退可愈必三
四下熱方退五次
下之而不退者不
治

或短氣悸之或復自汗四肢浮腫飲食無味
枳實麩炒 半夏湯泡七次 竹茹各八兩 橘紅十二兩
白茯苓六兩 甘草炙四兩 香附一斤半人參去蘆
柴胡去芦 麥門冬去心 桔梗各六錢
右細切每服一兩生姜五片棗二枚水二盞煎至一
盞溫服不拘時

附〇三因冲和九 養心扶脾疎肝開胃暢達三焦通異
五臟贊坎離有升降之能和表裏無壅塞之患利用
一元斡旋乾坤家傳四世之秘也
人參末一兩 石斛末一兩 白豆仁末一兩 廣陳皮末一
山查肉末二兩 有如者
已上五味合研勻碗盛碟蓋飯上蒸一飡取起待
冷方開乃調胃補心接丹田之氣也

逐志去骨取末一兩 香附淨米醋炒細末二兩
山梔子去皮焦色取末二兩
此三味再共研勻如法蒸一飡毋令洩氣乃透暢
心胞達膈間之滯氣也

海石末一兩 蒼术米泔水浸一宿洗去浮皮炒黃取末二兩
此二味同蒸乃消痰飲而通內外之用也
川芎末一兩 青黛一兩 北柴胡末一兩
此三味和勻蒸如上法乃疎肝鬱調達者也
大心爲脾母補心則土有力肝爲脾賊平賊則國乃
昌故曰安穀則昌用穀棄取粉打糊爲丸如梧桐子
晒乾用益元散五錢飛過辰砂五錢共研勻爲衣食
後少頃白湯下量人大小輕重丸數服之當用五十
九胃開氣順少覺舒泰則減數服之此丸不犯炎涼

若死循衣摸床者
不治若下之見黑
糞亦不治下宜大
承氣湯見下

三十一 舌

舌見兩邊黃色中央
黑至尖者此熱氣
已深兩感見之十
當九死惡寒甚者
亦死不惡寒而下
利者可治宜用調
胃承氣湯主之見

三十二 舌

舌見四邊淡紅中心
淡黑者如惡風表
未罷急用双解散
加薤毒湯相半服
之取微汗為度並
見下汗罷急下之
宜調胃承氣湯見
下如結胸煩燥目
直視者不治非結
胸者可治

連翹去鼠粘子
右細切入生姜皮一片水二盞煎至七分温服

附餘 ○壞症奪命散 治傷寒汗下後不解或投藥錯誤致
患人困重垂死昏沉或陰陽二症不明七日以後皆
可服

好人參一兩去芦
右為片水二盞於銀石器內煮至一盞温服病人喜
冷以新汲水沉冷服之相再煎服連進數服服至鼻
尖上潤汗出是其應也此藥不拘男婦傷寒時氣疫
症二七三七不解不知人事者並宜服之

附餘 ○透頂清神散 凡瘟疫之家不拘已患未患者皆宜
用之

猪牙皂角 北細辛去土 香白芷 川當歸
久服無妨平康爲度不拘內外諸病服其該科之藥
而蕪此丸每日一服則胃和善宣行諸藥以捷成功
此秘妙之嘱慎毋忽焉

附餘 ○消痰抑火潤下丸

枯礬酒炒取末二兩 山梔子去殼用仁生姜湯拌炒取末一兩 玄明粉五水
青礞石壓之一兩用火硝八兩拌勻入傾銀罐上以石
川大黃末一兩 炉內加炭火煅知金色爲極細末
右藥和勻粥汁爲丸飛過辰砂爲衣食遠白湯送下
每服十五九

附餘 ○鱉甲柴胡飲 治傷寒汗下不明服諸藥未瘥名曰
壞症陽症者通用陰北皆可服

鱉甲醋炙研細二兩 北柴胡去芦一兩 麥門冬去心
人參去芦 山梔子去殼 前胡去芦 知母去毛

三十三　舌

舌見灰色若黃不惡風寒脉浮者可下之大柴胡湯見下若惡風寒者用双解散加解毒湯主之並見下三四下

三十四　舌

ゝ見黃黑不治

三十五　舌

舌見灰黑色而有黑紋者脉實急用大承氣湯下之見下脉浮渴飲水者用涼膈散解之火熱門十可救其二三

舌見根微黑中截淡紅尖黃脉滑者可下之脉浮者當表陰退陽若惡風寒者微汗之用双解

右等分爲細末和勻病人先噙水一口以藥少許吹鼻內吐去水取嚏爲度如未嚏仍用此藥吹入

附餘○和解散　治四時傷寒頭痛煩燥自汗嗽吐痢

陳皮洗淨　厚朴去皮製　各四兩　桔梗去芦　甘草炙

豪本各半斤蒼木去皮一斤

右細切每服三錢生姜二片棗一枚水一盞煎至七分不拘時熱服

附餘○三黃瀉心湯　治心下痞按之濡関上脉浮大病瘥後食復勞復者

大黃　黃連去鬚　黃芩各二錢五分

右水一盞半煎至一盞溫服若有宿食痰飲者加半夏麴二錢

附餘○枳實梔子湯　治大病瘥後食復勞復者

陳枳實三枚　山梔子十四箇　豆豉一升

右細切每服一[illegible]用清漿水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時如有宿食加大黃如棊子大五六片

附餘○增損白木散　治傷寒雜病後一切吐瀉煩渴虛損氣弱保養衰老及治酒積嘔噦

白木去芦　人參去芦　白茯苓去皮　木香不見火　藿香葉去土　葛根去皮　陳皮各一兩　甘草半兩

右細切每服四錢乾生姜一片水大盞煎至七分去滓溫服

附餘○益氣養神湯

人參去芦一錢　麥門冬去心一錢　生甘草三分　前胡去芦七分　知母去毛一錢　白茯苓去心七分　白芍藥一錢升麻三分　當歸一錢　廣陳皮五分　山梔子炒焦一錢

右細切入紅棗一枚水一鍾半煎七分食遠溫服

散見下若下利用解毒湯十生八九也見下

三十六舌



舌見根灰色尖黄隱見或有一紋者若脉実急用大承気湯下之見下若脉浮滑飲水者用涼膈散解之火熱門

十可救其二三已上三十六舌乃傷寒験証之捷臨証用心處治百無一失也

食復

一傷寒纔愈退涼胃遭困熱方疎脾胃尚虚雖消中固宜節食若終食而再熱者曰食復宜服六君子湯一剤於食前虚煩門

乾薤菜泡湯呑三因坤和丸二服於食後見下未效前湯加梔子仁一錢陳枳殻八

附餘

〇白木散　治傷寒病後氣脉不和食復労復病症如初者

白朮去芦四両　白茯苓去皮　桔梗去芦　陳皮水浸去白　青皮去穰　香附子去毛　甘草炙　淮慶山藥

白並各三両　乾姜泡二両

右細切每服五錢姜三片棗三枚乾水瓜一片紫蘇二葉水一盞煎七分食前服〇若吐瀉入白梅〇喘入桑白皮杏仁〇傷寒労復入薄荷〇腸氣入木通三寸射香少許〇中暑嘔逆入香薷〇産後血氣不和入荊芥〇霍乱入藿香〇氣厥為末入塩湯調下

附餘

〇參蘇飲　治感冒風邪発熱頭疼咳嗽声重涕唾稠粘此薬大解肌熱覚中快腸或痰飲或労瘀潮熱往來並能治之

人參去芦　紫蘇葉　半夏湯洗七次焙　前胡去苗　枳殻去穣麩炒　茯苓去皮各七錢半　陳皮去白　甘草炙各半両　木香七錢半　右細切每服四錢生姜三片棗一枚水一盞半煎七分熱服不拘時

附餘

〇冲和散　治感冒風濕之氣頭目不清鼻塞声重肢體倦怠欠伸出涙

蒼朮炒六両　荊芥穂二両　甘草一両一錢半

右細切每服五錢水一盞煎八分熱服不拘時

〇丹溪活套

凡傷寒傳經之症初得太陽經病悪寒発熱頭項強腰脊痛無汗急用東垣九味羌活湯表之而愈或諸痛悉除亦不悪寒但発熱不解或発汗濈濈然出此

分或梔子枳实湯增益白朮散並見下或梔子大黃湯黃疸門

勞復

一傷寒新瘥方起勞動應事或多言勞神而惟復熱者曰勞復宜服益氣養神湯或白朮散並見下或鼠屎豉湯補遺熱氣中胸者青竹茹湯補遺或柴胡六君子湯虛損門

補遺鼠屎豉湯 治傷寒勞復發熱鼠屎豉湯雄鼠屎山梔枳实豉同煮末來忽引治勞復發熱效无方可比

補遺青竹茹湯 治傷寒後勞動太早病復熱氣冲胸青竹茹湯八竹茹三天花粉水同煮傷寒病後更勞復熱氣冲胸宜此與男子病新瘥而與婦

陰陽易

為挾虛證宜用補中益氣湯為主治有汗加桂枝芍藥汗未透脉尚浮緊加羌活蒼朮防風葛根倍升麻柴胡滿悶者去黃芩人參仍頭痛未去加川芎白芷薄荷荊芥細辛葛根如渴加五味子麥門冬天花粉三四日間不宜前藥則以小柴胡湯驗證加減如寒熱脇痛少陽外證悉具只以本方服之若無腹滿自利已見太陰證而少陽證尤未除者本方中加五苓散名柴苓湯熱甚者去桂倍黃芩湯甚者本方去半夏加五味子天花粉五六日不大便潮熱引飲本方中去人參芎藭草加芍藥枳殼厚朴大黃甚者加芒硝或用河間三乙承氣湯七八日過經不解熱不退或黃連解毒湯涼膈散選而用之或仍以小柴胡湯調治而愈或愈後因勞役復熱者仍用補中益氣湯多服數貼自安雖因食後病切不可輕用大黃之類下之蓋病後氣血大虛若復下之必死慎之

又傷寒下後譫語初能認人三五日後妄言不休此神不守舍慎勿復下脉多沉細足冷氣促面青褐色口乾燥宜用補中益氣湯倍人參加竹葉二三十片○內外本弱得汗下後大虛脉細數熱如火炙氣促宜用人參當歸白朮黃芪甘草五味子知母加竹葉數片煎用童便二三貼而安○大病虛脫本是陰虛用艾灸丹田補陽陽生則陰長故也不可用附子止可用參芪多服為佳傷寒已經發汗吐下誤治後三焦生熱脉洪數譫語不顧體晝夜喘息不休衄血熱不解身目俱黃狂叫欲走三黃石膏湯連進三四服而愈○如怯弱人因感寒溫發熱不食數日後不省

人交婦人染病婦人
病新差與男子交男
子染病此所謂陰陽
易也宜用燒褌散補
遺男得病用女褌襠
女得病用男褌襠
補遺燒褌散
燒褌散即是褌襠
主治陰陽二易方
剪取當陰方四寸
燒灰調服自安廣

附傷風

外受

人事言語亂妄神思昏迷面青齒黑人以為必死之
證脉沉細先用小柴胡湯等藥不愈急用四君子湯
加附子數片煎以磁盛放水盆中少時殺其熱性稍
温服之脉與神思即回然後可用別藥此謂之陰症
傷寒○傷寒怫鬱不解三陽併入三陰臟腑結燥面
赤口渴心驚譫語内熱多而外熱少宜用三一承氣
湯或以此藥送下木香檳榔九三五十粒下其燥屎
而安○如汗下後熱未能除用梔子豆豉湯或東垣
加減凉膈散前服以微其邪而愈○凡傷寒身體疼
痛惡風寒過煖則喜脉浮而數必得大汗而愈不問
日數皆以六神通解散煎服如譫語神思不寧蓋熱
邪已入裏不能盡解本方加人參黄連即安服前藥
如汗不透更加紫蘇葉葛根白芷等藥助之當得大

汗去病如掃此張戴仁之法藥劍輕微不知自有神
妙不可易而忽之○傷寒發斑面赤昏嘈譫語脉洪
而虛按之無力或絶不見用人參生地黄各五錢炮
附子一錢大黄二錢半服之不甚瀉夏月服亦不妨
○傷寒發斑生熱用黄瓜根杵汁（黄瓜即黄瓜小者頭生小如龍眼大）
（四月黄瓜生此散出）調伏龍肝服之去斑點甚妙○發斑似傷
寒乃痰熱之病發於外微汗以散之防風通聖散消
息用之
○東陽杜世良乃兄三月間得傷寒證惡寒發熱小便淋
澁大便不行初病時莖中出小精血片如棗核大由
是衆醫皆謂虛勞所致遂作虛證治而用補中益氣
等藥七八日後熱愈甚大渴引飲胃中滿悶語言錯
亂召予診視六脉俱數甚右三部長而沉滑左手要

黃湯見下有汗用桂枝湯見下或發熱惡寒無汗或自汗頭痛項強九味羌活湯此藥不犯三陽禁忌爲四時發散之通劑也見下或服此藥後用六神通聖散見下

內受

土焦原有狹火熾盛肺爲火燥又因衣被厚重上焦熟蟄肺經陽難無外邪風熱表甚故亦有鼻鼾聲

平亦沉實而長予曰此大實大滿證屬陽明經宜大承氣湯衆皆驚愕曰先生誤矣予不聽作大劑連進二服大瀉後熱退氣和病愈十數日後因食鴈肉太多致復熱來問予教用鴨肉燒灰存性生韭汁調下六七錢下黑糞一碗許而安

○東陽戚十八四月間得傷寒證惡寒發大熱而渴舌上白胎三日前身春百節俱痛至第四日惟脇痛而嘔且數甚予曰此本三陽合病今太陽已罷而少陽與陽明仍在與小柴胡合黃連解毒服三服脇痛嘔逆皆除惟熱猶甚九日後漸加氣粟痰響聲如拽鋸出大汗退後而身復熱愈甚法當死看其兩上有紅色榮淨而無賊邪之氣言語清亮間有譫語而不甚

糊予改不解去而後與治用凉膈散倍大黃服二服流清涕咳嗽之症形爲此非外來之風內因也宜以羊涼寒苦薰升散之劑解之或防風通聖散中風門或消風百解散或沖和散並見下或川芎茶調散頭痛門

視其所下仍如前自利清水其痰氣亦不息與大承氣湯二服其所下亦如前予曰此蓋熱結不開而燥屎不來耳後以二方相間日三四服每藥又各服至五帖如得結糞如肥皂子大者十數枚痰氣漸平熱漸減至十五日熱退氣和而愈一知醫者問曰傷寒論謂下後不可再下連日用此峻劑而獲安者何也曰燥屎未下而脉尚實胡爲不可再下是故爲醫者不可膠柱而調瑟也

太醫院補遺真傳醫學源流首卷一卷終

傷風指南畢

瘟疫門

論

內經曰蒼天之氣清淨則志意治順之則陽氣固雖有賊邪弗能害也又曰冬不藏精者春必病溫是以多感於寒疫病曰黃病穢南閩廣等處曰瘴氣蓋指山嵐霧露煙瘴濕熱惡氣而名之也一皆觸冒四時不正之氣而為病焉傷寒論曰春應溫而反熱冬應寒而反溫死安常曰疫氣之發大則流行天下次則一鄉次則偏着一家悉由氣運醫祭有勝有伏盛正退位之所致也祝斯疾者其可不推運

感冒

寒溫不節汗出脫衣巾感冒風寒之氣閉發熱頭疼此傷寒類也但鎖閉氣溫易出汗故多類瘟重則寒熱不退輕則為瘧南方氣升故感南人得此病者多皆胸滿疾延饑不欲飲食不進与北方傷寒总傷表而裏自和者不同治

當解表清執降氣行
疫用羌活拟實半夏
湯此方用於寒涼時
日又在溫暖時而感
冒風寒者九味羌活
湯傷寒門或敗毒敗
毒下溫毒發斑黑奴
見下
九
補遺羌活拟實半夏
湯
羌活一錢五分
蒼术一錢米泔浸
柴胡去苗一錢
枯黃芩一錢
橘紅去白一錢
半夏二錢湯泡
拟实去殼一錢
甘草炙一錢
川芎一錢
右生姜五片水一
鍾煎七分食前温
服渣再煎隨服取
汗出為度

腫瘟

時疫來客頭面洪腫
咽喉塡塞水漿不下
一切惡疫皆此賊
所結熱所発也宜用
漏芦湯治補遺或普

温病八九日頭身不疼目不赤鼻不乾不惡而反利脉洪
牒按之不鼓手時大心下堅十七日死
温病汗不出不至足者死厥逆汗自出脉堅強急者
生虛軟者死
温病下利腹中痛甚者死

方法

毋溪曰衆人病一般者此天行時疫也治有三法宜補
宜散宜降用之若黃芩黃連人參桔黃蒼术防風滑
石香附人中黃神麴糊為丸每服五七十九氣虛以
四君子湯下血虛以四物湯下痰多以二陳湯下熱
甚者加童便（童人中黃者人糞也今人多有以糞缸中清汁麴數一二碗病隨愈然但恐畏其臭穢不能下咽耳故毋溪所取人中黃法於冷月以竹截筒刮去清汁頭留節一頭打通一竅以大竹筒內以竹釘塞其竅投糞缸中二三筒月取出晒乾用）

氣而治之乎陶氏曰夫疫氣之中人輕重不一仲景無
治法後人用敗毒散治甚得理然亦有愈不愈者蓋疫
氣有淺深資稟有壯怯怯而受疠氣之深者雖智者尚
不能治況庸劣之士乎若資稟壯實所感又深則疾甚
可愈切不可作傷寒正治而大汗大下也但當從乎中
治而用少陽陽明二經藥（少陽小柴胡湯陽明升麻葛根湯也）看所中陰
陽經絡脉証而以二方加減和治之殊為切當孝者宜
詳察之毋忽

脉法

脉陽濡弱陰弦緊更遇濕氣変為溫疫

溫病二三日体热腹滿頭痛食飲如故脉直而疾八日
死
瘟病四五日頭痛腹滿而吐脉來細而強十二日死

濟消毒飲子或消毒丸並見下

補遺漏蘆湯

漏蘆　升麻
大黃　黃芩
薤葉　玄參

右等分每服二錢水一鍾煎七分服腫熱甚加竹葉二錢

瘟瘟

時氣發熱變為黃病謂瘟瘟也此受濕熱所致宜治內瀉之

○陶尚文治瘟疫法

若病只在少陽經者小柴胡加防風羌活微發之而愈若病兼陽明經者柴葛二方合服之小柴胡對升麻葛根湯加去黃芩對五若見太陽証便大便泄者以本方小柴胡加去黃芩對五苓散尤當看脉實熱若無實去桂留芩

若小便不利是膀胱本病本方加桂五苓散

若入太陽經無熱証見者用理中湯此證必須腹痛後而瀉明日瀉止痛止仍用小柴胡和之

若入少陰經及厥陰經用陰証傷寒傳經法治之

若初看未端的且先以敗毒散治之看歸在何經再隨施治無不效者

若發黃小柴胡合去桂五苓散未退茯苓渗濕湯

瘟疫作渴本方加石膏知母溫溫飲之

瘟疫發狂不識人大柴胡湯加當歸如大便泄者去

黃石膏湯柴苓湯

瘟疫胸滿悶本方中加枳殼橘紅黃連若大便不

通大柴胡湯

○王黃石膏湯

石膏二兩　黃芩
豉半合　黃連　黃柏各一兩半
麻黃一兩　梔子五枚
右細切作一服水二盞煎至一盞三分連進三五服

愈

○敗毒散　治瘟疫四時通用

羌活　獨活　前胡　柴胡　川芎
枳殼　桔梗　白茯苓　人參　甘草　減半
右為細末每服三錢加生姜三片水一盞半煎至一

服白虎湯有遠

或小柴胡湯合去桂

五苓散亦佳

柴葛湯

葛根　柴胡
黃芩　白芍
白芷　甘草
右等分每服三錢加生姜三片水一盞半煎至一

白虎湯

石膏一兩　知母
甘草　粳米
右為細末每服三錢水一盞半煎至一

黃連解毒湯

黃連一兩　黃芩
黃柏　梔子
右為細末每服三錢水一盞半煎至一

山梔去殼一兩　白木去芦一兩
白茯苓去皮一兩　白芍酒炒一兩半
厚朴姜製一兩　木通去皮一兩
南木香七分　乾葛一兩五分
人參去芦一兩

右生姜三片水一鍾煎七分食前温服滓再煎四分继服

瘴氣

春秋時月人感山嵐瘴霧毒氣發寒熱脇脇飽悶不思飲食此毒氣從鼻口入內也治用升麻蒼术湯補遺以清上焦解內毒行氣降痰不宜發汗或大無神术散見下補遺升麻蒼术湯

升麻一錢五分　蒼术一錢五分米泔浸盡水炒　黄連一錢姜水洗　黄芩一錢酒拌炒　生甘草七分　南木香　桔梗　厚朴姜製　柴胡　枳實麩炒　木通　半夏湯泡各一錢　右姜五片水一鍾煎七分食前温服

大頭瘟

丹溪曰天行大頭病○東垣曰陽明邪熱大甚實火陽相火而為之也温熱盡上塵石為細末煉蜜為丸如彈子大新汲水化服飲水尽微利若不温不可與此藥

○大無神术散　治四時瘟疫頭痛項強憎寒壯熱身痛專主山嵐瘴氣之效劑也

蒼术　厚朴各一錢半　甘草　陳皮二錢　藿香　石菖蒲各一錢半　半夏湯泡七次

右姜五片水一鍾加生姜三片大棗一枚水一盞半煎至一盞去粗温服一方無菖蒲有香附一錢名神术散氣散

附大頭天行病

小麥奴　灶突墨各一錢　大黄三錢

盡温服或沸湯點服亦可此藥治傷寒瘟疫風濕眩四肢痛憎寒壯熱項強睛疼不問老人小兒皆可服或嶺南煙瘴之地或瘟疫時行或人多風痰或嬈為度○一方加薄荷少許每服五錢加姜水煎服

○九味羌活湯方見傷寒門治瘟疫初感一二日間服之取汗而愈其效如神

○黑奴丸　治瘟毒發斑煩躁大渴及時行熱病六七日未得汗脉洪大而數面赤目眩身痛大熱狂言欲走渴甚又云五六日已上不解熱在胷中卽禁不能言足當發寒冀汗出乃瘥若特項不汗再服一丸須臾為壞傷寒賢所不治棄為死人精鼻已竭心下尚温拎開其口灌藥下咽則活

黄芩　釜底煤　芒硝　麻黄

此乃溫熱在高顛之上用瓜蒂散吐法及消炒黃芩治法若太黃陷病加減或殭蠶大黃丸補遺或一黃湯或人黃散並見下

補遺殭蠶大黃丸

入門治疫有仙方
一兩殭蠶二大黃
姜汁為丸如彈子
井花調察使清涼

暑瘟

溫暑之月民病天行瘟疫熱症治宜清熱

東垣○二黃湯　治大頭天行疫病

黃芩酒製炒　黃連酒製炒　生甘草各等分

右細切每服三錢水一盞煎七分溫服徐徐呷之如未退用鼠粘子不拘多少水煎入芒硝等分亦時時少與毋令飲食在後如未已只服前藥取大便和氣已則止○前方宜各少加引經藥陽明渴加石膏火陽渴加瓜蒌根陽明行經升麻芍藥高根甘草太陽行經甘草荊芥防風並與上藥相合用之或云頭痛酒芩

為腫不盛為痛此邪見于頭多在兩耳前後先出皆主其病也治法大不宜藥速匕則過其病所謂上熱未除中寒復生必傷人命宜用緩藥緩服徐徐少與當視其腫勢在何部分隨經震治之陽明為邪者大腫少陽為邪出於耳前後也

東垣○普濟消毒飲子　治大頭瘟

泰和二年四月民多疫疠初亮憎寒壯熱休事次傳頭面腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭傷寒諸藥雖治終莫能俞漸至危篤東垣曰身半已上天之氣也邪熱客於心肺之間上攻頭面而為腫耳須用下項藥其為細末半用湯調時時服之半用窓丸嚥化服尽良俞活者甚衆時人皆曰天方謂天仙所製也遂刻諸石以傳永久

黃芩半兩製炒　黃連半兩製炒　人參三錢　陳皮去白一錢
甘草二錢　連翹一錢　玄參二錢　白殭蠶七分炒
升麻七分　柴胡五分　桔梗三分　板藍根一錢
馬勃一錢　鼠粘子一錢

普濟消毒飲子或三黃石膏湯見下

補遺人參石膏湯

人參一錢五分
桔梗一錢酒炒
知母一錢酒炒
石膏一錢五分
升麻一錢
黃連五分酒炒
生甘草七分
羌活二錢
白芍藥一錢酒炒
生地黃五分酒炒
粉乾葛一錢

右姜三片水一鍾煎七分食前熱服渣再煎四分繼服若胸膈痞滿痰涎壅塞者加枳实半夏各一錢生姜汁三五匙若胖胃不实加白朮一錢五分

冬瘟

冬瘟為病非其時而有其氣也冬時厥寒當君子閉藏而反発於外專用補藥加於外邪內伏氣之類亟指門咽喉腫痛甘桔湯見下頭面腫姜麩散見下

蝦蟇瘟

丹溪曰蝦蟇瘟屬風熱其症耳下頤頷腫是也防風通聖散加減用之中風門或用小柴胡加防風羌活荊芥薄荷桔梗傷寒門外以側柏葉搗汁調大蝦蚯蚓糞付之或用丁香尖附子尖右為末服如上法或加防風川芎薄荷當歸身細切五錢水二盞煎至一盞半時く稍熱服之如大便硬加酒蒸大黄一錢或二錢以利之腫勢者以砭鍼刺之

○甘桔湯　治冬瘟咽侯腫痛

甘草　桔梗各等分

右細切水煎時上頻呷之

○姜麩散　治冬瘟頭面腫

姜麩三分　石膏一分　麻黄　白薇　羌活

杏仁　甘草

右細切作一服水二盞煎至一盞去相日三服

附餘○消毒九

大黄　牡蛎　纏蚕炒

等分為末煉蜜丸彈子大内加桔梗大分子尤妙

○祖傳經驗秘方人黄散　治四時疫癘大頭天行等病

糞缺岸置風露中拌遠者佳冰硝細研一兩雄黄一分

甘草三分　辰砂一分五分

右為細末每服二錢煎薄荷桔梗湯送下　日三五服

煎藥甘草桔梗各半錢水煎服○疫疠夏感寒伏於少陰咽痛次必下利名曰腎傷宜用半夏桔梗甘草各一錢加姜五片煎服○大頭天行病從頤頷腫熱者又名顳顬瘟宜柬垣有方用羌活酒炒黄芩酒蒸大黄加減水煎服十五六日服小柴胡湯不愈者仍用紫蘇陳皮發散而愈又法酒炒黄芩黄連為君炙甘草為佐水煎細ㇾ呷之再加黍粘子酒蒸大黄煎入芒硝亦細ㇾ頻與服之微利為度睡覚後去後三味只服前藥如渴屬陽明加石膏屬

南星醋調之或五葉藤東前草搗付皆效

辟瘟法

凡辟瘟症可與病人同床傳着衣服亦不相染宜先吞雄黃雄黃九補遺

雄黃一兩研　赤小豆一兩炒黃色　鬱金　丹參各三兩　煉蜜為九梔子大空心温水

火陽加瓜婁根若陽明行經加升葛芍藥葛根甘草大陽行經加羌活荊芥防風如頭痛加黃芩葛根身

東陽李文會內子陳氏年二十九三月間得瘟疫証病三日經水適來發熱愈甚至七八日病劇胃中氣築作痛莫能卧衆医伎穷辞去黑夜來迎予診治病者以棉花袋盛托背而坐于床令婢磨胷不息手六脉俱微数極而無倫次又若鰕游狀予問曰恐下早成結胸耳主人曰未曾下予再思之三日而經水適來致中氣乖張與下同用黃龍湯四物湯小陷胸湯共合一剤如姜東前服主人曰此藥何名予曰三合湯也一服而諸病悉減遂能卧再服熱退而病全安愈後又因食粥太多而病復熱又作內傷處治而用補中益氣湯出入加減調理而愈

瘡疹指南

大斑者瘡發掀腫大小有色點而無頭粒屬少陽相火風熱挾痰而作蓋紅赤甚者胃熱也屬陰紫者胃爛也屬陽皆自裏而發外通聖散中消息當以發汗散之切不可下

陽瘡

傷寒發斑有紫斑温毒胃爛之症傷寒一

瘡疹門

論

內經曰少陰所致為瘍疹夫少陰所致者言君火有餘熱令大行戊午之歲也在人則心主之心火太過則制己所勝而燔燎肺金蓋肺主皮毛故紅點如蚤之狀見於皮膚之間心火侮而乘之之色也名曰癮疹或傷寒濕熱病而發斑班如錦文者名曰發斑皆熱毒之所致也其証有陰毒是皆冬應寒而反温人受不正之氣故至春夏而發為斑爛夫陽脉浮數而陰脉實大者名為温毒或為內外結熱極深古卷焦黑鼻若烟煤狂言見鬼面赤而斑爛者名為陽毒如温病下之大早熱氣乘虛入胃或下之太遲熱氣鬱積胃中或醫者誤

二日間身發斑爛或吐下後變成陽毒腰背疼痛而赤狂言下利脉浮大咽痛治用陽毒升麻湯或升麻葛根湯並傷寒門或陽毒梔子湯見下冬月大温人受不正之氣至春發斑如錦紋者此温毒所致也黑膏見下瘟疫發斑極者此時氣也黑奴丸瘟疫門或太青四物或泻毒犀角飲子並見

用熱藥過多胃氣熱甚及內傷熱病虛火燔灼肺之間皆能成發斑也是故發赤斑者半生半死發黑斑者九死一生治法用化斑湯白虎人參升麻湯痛加羌活防風荆芥桂枝芍藥隨宜用之入上藥相合煎服有時疫腫毒丸瘡或藏府積熱發于頭項咽嗌堵塞水漿不下或高赤脉浮洪熱甚漏盧湯治之升麻黄芩大黄各一兩犀角人參各二兩前服

○丹溪活套云衆人病一般者乃天行時疫蓋冬月閉藏之時又行春令温暖於寒而發泄真陰土勝水虧矣所勝者侮之火土有餘也所生者受病所勝者侮之火土勝者妄行土有餘水不長之時無水滋生化源故人病瘟治有三法前春感清氣無汗惡寒為疫疠通用升麻葛根湯○春感清氣發熱而渴不惡寒宜辟

或並進鉤吻湯為藥各一錢麻黄一錢半甘草甘枝各七分半大棗三枚水前服○春温發熱咳嗽身疼口燥渴脉浮洪熱甚宜小柴胡湯加桂枝治之咳嗽加五味子渴去半夏加瓜婁根人參脉實渴宜大柴胡湯去半夏加瓜婁根人參脉實渴宜大柴胡湯去半夏加瓜婁根人參脉實渴宜大柴胡湯

黃連去毛酒浸四兩
橘皮陳久者佳
杏仁去皮尖
梔子水浸去殼
麻黃去節湯泡
葛根各二兩
厚朴去皮姜製
炙甘草各一兩
右水一鍾煎七分
温服滓再煎五分
繼服

陰痘

陰痘發斑者亦出胸背及手足稀少而微紅此無根失守之火○凡疹皆是惡毒熱血鬱於命門遇君相二火合起即聚於胸中上薰肺而為斑如蚊蚋之狀一麻葛根芎辛温入腹者死○有乳孩因胎毒陳腐後腹脹發赤診如震斤取剪刀草折汁調原蚕沙付之而愈○冷丹屬血風血執用通聖散有痰血相搏用蝉蜕殭蚕荆芥南星治之○消風散

荆芥穗 白殭蚕炒 蝉蛻去土炒 防風 川芎 藿香 陳皮去白 厚朴姜炙 人參 茯苓 羌活各等分

右為細末每服二錢煎荆芥湯或茶清調下

痘形門

則壯熱頭痛或寒傷於胃下利膿血或水瀉脉實者宜下之安調中湯大黃三錢葛根黃芩等藥各二錢黑膏黑奴丸之類是皆正治之法也學者宜詳察而用之

脉法

脉陽浮而數陰實而大火盛而表故泊脉浮數下焦実熱故陰脉実大

脉多沉伏或細而散或絶無滑伯仁曰脉者血之波瀾故發斑者血散於肌膚故脉伏

方法

○戴氏曰有色點而無顆粒者曰斑一云發斑似傷寒疾熱之病發于外也

○有毒裹者因胃熱助手少陰火入于太陽陰肺也故紅點如斑生於皮毛間耳伯虎瀉心調胃承氣從長遵

亦不可用寒藥

補遺大建中湯 治陰症發斑無療蟲病小腹急痛遺尿失精流白濁

綿黃芪蜜水炙各二錢 遠志捲去心 川當歸酒洗 澤瀉各一錢二分 人參去蘆甘草炙 龍骨愛吸舌者 白芍各一錢半

右分作二貼生姜三片水一鍾煎七分食前温服

太无○元戎橘根橘皮湯肌膚斑駁冬温始發欬而心悶但嘔清汁

橘根 橘紅 杏仁 知母 甘草各等分 麻黃 黃芩

右細切每服五錢水一盞半煎至一盞温服

活人○陽毒梔子湯 治傷寒壯勢石鄭煩痛身發斑○攔

升麻 梔子仁 黃芩 芍藥各一錢 石膏二錢 知母一錢半 杏仁七分 柴胡一錢半 甘草五分

右細切作一服入姜三片香豉一百粒煎服

和劑○犀角消毒飲 治發斑癮疹等證

牛旁子四分炒 荊芥穗 防風去蘆各二錢 甘草一錢 犀角一錢半另鎊為細末不入湯煎

右細切作一服水一盞煎至一盞調犀角末服

痘疹指南

夫疹者小紅豔有頭粒隨出隨收而復出者是也蓋炎陰君火乃热勞於在肺胃清肺火降痰或解散出汗亦有可下者

酯疹 酒疹

酯疹出不快者升麻葛根湯倣其門毒盛而內火熾者消毒飲子瘟疫門風热並疹毒已置過者防風通

和劑○解毒防風湯 治發斑及癮疹痒痛

防風一錢半 地骨皮 黃芪 芍藥 荊芥穗 枳殼 牛旁子炒各七分半

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗温服

○陰毒升麻鼈甲湯 治陰斑

升麻二錢 當歸 甘草各一錢 鼈甲炙一錢 雄黃四分另研

右細切水二盞煎至一盞去粗調雄黃末服

○加味羌活散 治感四時不正之氣發為癮疹

羌活 前胡 人參 桔梗 枳殼麩炒 川芎 天麻 甘草炙 茯苓各半 蝉蛻

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞温服

全散中風門疹毒不解鼠粘子湯補遺或消風散見下

補遺鼠粘子湯 治痘疹及疽瘡欲出未能得皮膚热甘赤心煩

鼠粘子炒四錢 荊芥穗二錢 防風去芦五分 甘草一錢

右為細末沸湯點服去防風名消毒飲

○調中湯 治內傷外感所發陰斑

蒼朮二錢半 陳皮一錢 砂仁 藿香 芍藥煨 枳殼各七分 川芎伍分 麻黃去节桂枝各三分

右細切作一服加生姜三片水二大盞煎七分温服甘草炙 桔梗去芦半夏湯泡 白芷 羌活

○化斑湯 治傷寒汗吐下後發斑脉伏即傷寒門白虎加人參湯也守其類若又加白朮水煎時時服之

仲景○黑膏 治温毒發斑冬月大温人受不正之氣至春發斑如錦文脉浮數屬陽氷伏

人活○大青四物湯 治温疫發斑

生地黃半斤香豉一斗 屬陰用此以消疫毒之氣

右二味細切以猪膏二斤合煎之取濃汁如膏用椎

黃芩炙各 大青四兩 阿膠炒成珠子 甘草炙各一兩 香豉一合

右細切作一服水煎服之

○祖傳經驗加味敗毒散 治瘟疫及瘧疹等證

羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 枳殼 桔梗

茯苓 人參各五分 甘草 薄荷各二分半

加白朮 防風 荊芥 蒼朮

芩藥 生地黃各伍分

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水煎服此因虛而感冒風濕以致發斑者服之良驗

天癍疹多是脾土虛上在皮膚中不透出者此所謂癍疹也發則多痒或不仁者是兼風濕之殊色紅者兼火化也宜用黃瓜水調伏龍肝末服之不已再服或加味敗毒散見下痒痛者解毒防風湯見下

內傷指南

過食傷

為人勉強飲食過傷心腹滿悶不快麴蘗枳朮丸或青橘皮散或實否丸或大安丸並補遺或枳朮丸或保和丸並見下過食而心孕痛者丁香煽飯丸附餘過傷濕面熱物厚味鼻塞悶亂大安二黃枳實湯或二黃枳朮丸或二黃丸並補遺或白朮丸或枳實導滯丸並見下過傷生冷硬物心腹滿悶疼痛木香見聖丸或二稜消積丸或草豆蔻丸並見下或如意丸或紅丸子並補遺內傷飲食醬結在表白帽發熱小柴胡合二陳湯加枳實山查神麴小柴胡傷寒門二陳湯痰飲門

補遺麴蘗枳朮丸

治強食心腹滿悶

內傷門

論

內經曰陽者天氣也主外陰者地氣也主內故陽道實陰道虛犯賊風虛邪者陽受之飲食不節起居不時者陰受之是故陽受之則入六府陰受之則入五藏此內外陰陽府藏虛實之不同也今世醫者但見惡寒發熱頭目沉重之証更不察內外虛實便作傷寒糢糊起治輒用仲景汗下雙解利之法治之多死良可嘆哉我東垣先生憫生靈之夭枉著內外傷辨惑論脾胃論等書一皆以扶植胃氣為本誠萬世不刊之妙典也其序云告誡之意屢以飲食失節勞役過傷為言而立補中益氣等湯為主治若能確守其法而行之無有不驗楷乎今之醫者多承因習之弊懵然不識机変毗晲其書而不視間有讀者不明脉候虛實不偏於此則偏於彼或遇內傷挾痰與食清氣拂鬱于下濁氣填塞胷中之候輒以補中益氣等藥一試則氣滿痞塞遂謂補藥不宜於此証也次意攻用汗下雙解利之法醫死而不之悔故王安道有內傷不足中有餘者之說此発東垣之所未発者耳李者宜潛心究察其虛實似是之非庶不夭人之天年也東垣辨內外虛實之法李者宜熟玩於胷中臨証之際庶無魯魚亥豕之訛焉抑試辨惑論曰夫外傷風寒有餘之証其発熱惡寒七熱併作其熱也彌七發熱於皮毛之上如羽毛之拂明其熱在皮也其口鼻氣室不通心中煩悶不安其惡風寒也稍似裸体使不能禁雖重衣厚蓋逼近烈火終不能禦其寒一時一

不快
白朮去芦四兩
枳实麩炒二兩
神麯炒一兩
大麥蘗炒一兩
末之荷葉燒飯和
丸如菉豆大每服
五六十丸食遠白
湯下

補遺青橘皮散　治食積飽悶
青橘皮二兩湯浸去瓤炒黃色
葛根去皮一兩
縮砂仁半兩

末之濃茶調一二錢乾舔嗽亦可常服消食醒酒

補遺寬中丸　治胸膈痞悶停滯飲食
山查不拘多少蒸熟去核晒乾
右末糊丸清米飲下七八十丸

補遺大安丸　脾經
消導之藥
山查蒸去核二兩
神麯炒　半夏
茯苓去皮各一兩
蔓荊子　陳皮

內傷或內傷挾外感視其輕重而權宜用藥以施治之庶幾登東垣之堂而為當世之司命矣

脉法

東垣曰右寸氣口脉大於人迎一倍過在陰則二倍太陰則三倍右手三部屬三焦陰在尺上脾胃腎大陰在寸上肺心膻中大熱故脾胃之脉皆深盛飲食失節勞役過甚太盛之脉也

右寸氣口脉急大而數時一代溢溢者肺之本脉代者元氣不相接續此脉急大而數時一代溢溢者肺之本脉代者元氣不相接續此顯緩時一大也此不甚勞役之脉也○右關脾脉大而數謂独大於五脉也　數中而不見但內顯脾脉之大數微緩時一代此飲食不所之脉也○右關胃脉損弱甚則隱沉而滑此宿食不消之脉也

方法

丹溪曰東垣內外傷辨甚詳於之病此者為多但有挾痰者有熱鬱于內而發者皆當以補元

連翹各半兩

白朮二兩

右末粥糊丸服

補遺三黃枳實湯

治傷熱物胸滿脹痛

黃芩炒 黃連炒 甘草炙各五分

大黃煨一錢

厚朴姜炒八分

枳實炒一枚二分

作一帖水煎熱服

補遺三黃丸 治傷熱食痞悶吐欲吐煩亂不安

黃芩二兩 升麻 北柴胡各二兩

黃連酒浸一兩

枳實去穰五枚炒

甘草二兩

末之湯浸蒸餅為丸菉豆大每服五七十丸白湯下或姜湯亦下

補遺三黃枳朮丸

治傷肉食溫麵辛辣味厚之物填塞悶亂不安

黃芩二兩

大黃煨 黃連

氣為主看所挾而兼用藥氣虛甚者必少加附子以行參芪之氣挾痰者補中益氣加半夏更以竹瀝姜汁傳送

戴氏曰凡內外兼證或內傷重而外感輕者為內傷挾外感證治法宜先補益而後散和或以補中益氣為主治加散邪藥當以六經脉證參究各加本經藥治之或外感重而內傷輕者為外感挾內傷証治法宜先散邪而後補益或以辛涼等劑散藥為君而以參朮茯苓等藥為臣使是其治也

東垣補中益氣湯

黃芪一錢 甘草炙伍分或七分 人參病甚者一錢 白朮

當歸各七分 陳皮五分 升麻 柴胡各三分

右細切作一服水二盞煎一盞去粗溫服 脾胃

虛肺氣先絕故用黃芪以益皮毛而閉腠理不令自汗也上喘而氣短損其元氣用人參以補之心火乘脾用炙甘草以緩之緩急用當歸以和血脉橘紅以理脅中之氣又能助陽氣上升以散滯氣助諸甘辛為用或少加黃柏以救腎水而瀉陰中之伏火也表熱者一二服氣和微汗而愈○如咽乾者加乾葛○如心刺痛乃血澁不足加當歸○如精神短少者加人參五味子○如頭痛加蔓荊子痛甚加川芎頂痛腦痛加藁本細辛

神麴炒　白朮
橘皮各一兩　枳實炒半兩
為末湯浸蒸餅九
諸症大白湯下五十九

饑餓傷

荒年缺食或餓或日又致傷脾胃元氣弱四君子湯虛損門或黃氏建中湯傷寒門或補中益氣湯加乾山藥去柴胡見下或六君子湯加神麴山

○有痰加半夏生姜○如咳嗽夏加五味子麥門冬秋冬加減鄧麻黃春加佛耳草款冬花久咳肺中伏火去人參○如食不下乃胷中有寒或氣澁滯加青皮木香陳皮寒月更加益志草豆蔻夏月更加苓連秋更加枳梆砂仁○如心下痞悶加芍藥黃連○如腹脹加枳實木香砂仁厚朴天寒加生姜肉桂○如腹痛加白芍藥甘草有寒加桂心夏加黃芩乾葛芍藥冬加益智草豆蔻半夏○如脇痛或縮急加柴胡甘草○如脇下痛加熟地黃不已乃是寒也加肉桂當歸大黃○如脚軟乏力或痛加黃柏不已更加防己○如氣浮心亂以硃砂安神九鎮固之則愈

右此方加減法是飲食勞倦喜怒不節如病熱中則可用之若未傳寒中則不可用也蓋甘足以泄胃病耳如黃氏人參甘草芍藥等是也見脾胃論之類是也

○硃砂安神丸
黃連一兩　硃砂一兩　酒生地黃　當歸身
炙甘草各五分

右為極細末湯浸蒸餅為丸如黍米大每服十五丸津嚥下食後服一方无地黃歸身用生甘草

○調中益氣湯
其脉弦洪緩而沉按之中之下得時一澁其證四肢倦怠肢節煩疼難以屈伸身体沉重煩心不安忽肥忽瘦口失滋味腹雖脩伸大小便清利而數或上飲下便或大便澁滯不行一二日一見夏月飧滯米穀

挾外感傷

兩手脉俱洪盛而身挾鼻塞口苦無見此內傷挾外感也則於補中益氣湯內見下春加川芎防風芫胡荊芥紫蘇薄荷之類要加葛根石膏甘草薄荷升脾芫胡之類

秋加羌活防風蒼朮
荊芥之類冬加麻黃
桂枝乾姜附子之類
發熱本方加羌活

熱痙湯

其人平素心胸脅悶
手足心發熱小便赤
脈沉數今脈洪數是
也則於補中益氣內
加火醬湯火熱門或
本香當歸散補遺
補遺木香當歸散
實脾順氣消食
川芎 當歸 人參 官桂
三稜炮 莪朮炮 青皮炒 厚朴
麥蘗 乾姜 小茴香炒 木香
陳皮 甘草 神麯炒 枳殼
右等分每服八錢
姜三片棗一枚煎
白三盞水一鍾煎
八分溫服大便閉
倍加枳殼加枳朗
一兩炒去乾姜食
前服

不化或便後見血或見白膿胸滿短氣膈噎不通或
痰嗽稠粘口中沃沫食入反出耳鳴耳聾目中滛火
視物昏花努肉紅絲熱壅頭目不得安卧喘卧無力
此藥主之

人參 甘草 蒼朮 各五分
黃芪一分
柴胡此味為上氣不足胃氣与脾
氣下滛乃補從陰養陽也
橘紅加腹中氣不得
更加一分 升麻 各二分 木香一分或二分
右細切作一服水二盞煎至二盞去柤空心温服宜
心絶思藥必神効蓋病在四肢血脉空心在日是也
○如時頭熱躁乃下元陰火炎上發也加生地黃二
分黃柏三分○大便虛坐不得或了而不了腹中逼
迫血重血溢也加當歸身三分○如身躰沉重雖小
便數多亦加茯苓二分蒼朮一錢澤瀉五分黃柏三
分○如胃氣不和加半夏五分生姜三片有嗽加生
地黃二分以制半夏之毒○如痰厥頭痛非半夏不
能除此足大陰脾經所作也○如煩燥熱加黃柏生
地黃各二分如無已上證只服前藥○如春夏腹痛
加芍藥三分○如惡熱而渴或腹痛者更加白芍藥
伍分生黃芩二分○如惡寒腹中痛加桂心三分去
黃芩名桂枝湯○如冬月腹痛不可用芍藥蓋
其性之大寒也只加乾姜三分或加半夏伍七分以
生姜制之○如秋冬之月胃脉四道為衝脉所逆併胸
下少陽脉二道而反上行病名厥逆內經曰逆氣上
行滿脉去形明七神昏絶離去其形而死矣其正氣上
衝咽不得息而喘息有音不得卧加吳茱萸伍分或
一錢湯泡去苦用觀厥氣多少而用○如憂月有此

挾痰傷

其人肥白平素喘滿吐痰脈沉滑今脈洪滑身熱是也則於補中益氣湯內加半夏竹瀝薑汁之類見下或木香和中丸或黃芪丸並補遺補遺木香和中丸和脾胃消宿食利胸膈化痰涎除膈熱進飲食

南木香 黃芩 青皮 橘紅各半兩 黑牽牛頭末二兩 三棱 滑石二兩 大黃一兩一分 沉香二分

末之水丸如梧桐子大每服五十丸 ○升陽補氣湯 治飲食不時飢飽勞役胃氣不足脾氣下溜氣短無力不能寒熱早飯後轉增昏悶頻要眠睡怠惰倦動作五心煩熱

羌活 白芍藥 獨活 澤瀉各五分 柴胡一分 生地黃半分 生姜三片 大棗二枚 水二盞煎至一盞去粗食前大溫服如腹脹及腹中窄狹加厚朴一

証為大熱也蓋此病隨四時為寒熱溫涼也宜以酒黃芩酒黃連酒知母各等分為細末熱湯為丸如梧桐子大每服三百丸白湯空心送下仍多飲熱湯服畢少時便以羹膳壓之使不用胃中停留耳至下元以瀉衝脉之和也大抵治飲食勞倦所得之病乃虛勞七損証也常用温平甘多辛少之藥治之是其本法也

○升陽順氣湯 治因飲食不節勞役所傷腹脇滿悶短氣遇春則口淡無味遇夏雖熱猶有惡寒飢則嘔如飽不善食冷物

黃芪一分半 甘草炙二分 草豆蔻四分 神麯炒三分 升麻 柴胡各二分 當歸身 陳皮各三分 黃柏一分半 人參三分

挾痰 青皮 橘紅各半兩 黑牽牛頭末二兩 三棱 滑石二兩 大黃一兩一分 沉香二分

末之水丸如梧桐子大每服五十丸 姜湯或茶清下

補遺黃瓜蒌丸 治食積痰壅滯喘急

瓜蒌仁 山查 半夏湯泡切片 姜水製 神麯炒

等分末之瓜蒌水

九該豆大姜湯竹瀝送下二三十丸

勞役傷

夏重作勞致傷元氣補中益氣湯發熱亦同或調中益氣湯並見下或黃芪建中湯

傷寒門或六君子湯

虛損門勞者溫之非溫熱藥宜溫養也

房勞傷

強力入房致傷元氣自汗之力人參養榮

倍如腹中似硬加砂仁三分

○當歸補血湯 治肌熱燥熱煩渴引飲目赤面紅晝夜不息其脉洪大而虛重按全無內經曰脉虛血虛又云血虛發熱證像白虎惟脉不長實為辯耳誤服白虎湯必死此病得之於飢困勞役

黃芪一兩 當歸酒洗二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服

○木香化滯湯 治因受食濕麵結於中脘腹皮抵痛下痞滿不思飲食上之不散常常痞氣或胃脘當心而痛並皆治之

半夏湯泡洗七次 甘草炙各七分半 柴胡去苗六分 木香 橘紅各四分半 枳實麩炒黃色 當歸各三分

酒紅花一分

右細切作一服水二盞生姜五片煎至一盞去滓熱服

飲酒傷

酒乃无形之物大熱有毒若傷之止當發散汗出則愈矣此法最妙其次莫如利小便二者乃上下分消其濕何病之有多飲傷胃嘔吐宜花解醒湯附餘或十全大補湯虛損門因而陽脫三建湯傷寒門急救丹田或氣海自灸可復元發熱補中益氣湯加知母黃柏

右細切作一服水二盞煎至一盞去滓

○升陽益胃湯 脾胃虛則怠惰嗜臥四肢不收時值秋燥令行濕熱少退脉重鼻痛口燥舌乾飲食無味大便不調小便頻數不欲食食不消兼見肺痛洒淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益氣此藥主之

半夏 人參去芦 甘草炙各五分

黃芪一錢半 白朮二分

獨活三分 防風三分四肢不收 羌活各三分 柴胡去芦二分 澤瀉二分不拌秋

白芍藥 何故秋旺用人參白朮芍藥之類反補肺蓋為脾胃虛則肺最受邪故因時而補陽為切 小便利見不渴者細用

右細切作一服生姜五片大棗二枚水二盞煎至一

湯發挽亦同補遺縱
飲熱渴煩燥中酒毒
黃連解毒湯傷寒門
酒積致傷胸膈醉鄉
珍宝看或大枳殼丸
並補遺酒積作瀉長
虹止雨丸補遺令人
不醉葛花散補遺
補遺葛花解醒湯
治飲酒致湿嘔吐
心煩膈塞小便不
利
白豆蔻　砂仁
葛花各半兩
木香五分　陳皮

白茯苓　人參
猪苓各一錢半
青皮去穰二錢
白朮　澤瀉
神麴炒各二錢
每服七錢生姜三
片煎食遠服得微
汗酒湿去矣
補遺醉鄉珍宝昏
治酒積致傷胸膈
陳皮四兩砂仁同
蒼根去皮三兩
紅豆一兩六錢
粉草一兩四錢
白豆蔻　生姜

盡去粗早飯後温服
服藥後如小便罷而病加增剩是皆宜利小便當去茯
苓澤瀉○如方喜食一二日不可飽食恐胃再傷以
藥力尚少脾胃之氣不得轉運升發也須滋味之食
或美食助其藥力益升浮之氣而滋其胃氣慎不可
淡食以損藥力而助邪氣之降況也可以少役形躰
使胃與藥得轉運升發慎毋大勞後使氣復傷若脾
胃得安靜充佳若胃氣稍強少食加菓以助藥力經
云五菓為助是也

○双和散補益氣　治虛勞少力不熱不寒温而有補
白芍藥二錢　熟地黃
黃芪　川芎
川歸各六分　甘草炙
右細切作一服生姜三片大棗二枚水一盞半煎至

一盞温服大病後血虛氣乏者以此調治
○門冬清肺飲　治脾胃虛弱氣促氣喘精神短少或嘔
血吐血等證
紫菀一錢　黃芪
人參　麥門冬
右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗食後温服
○寬中進食丸滋形氣喜飲食
麥蘗麪一兩炒黃　半夏
白茯苓　澤瀉各三錢
神麴五錢　枳實麩炒黃色
甘草炙　人參
右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三十丸
清米飲送下食後服

白芍藥　甘草炙各七分
當歸身各五分　五味子九粒
猪苓去黑皮各七分　草豆蔻湿麪裹煨五分
乾生姜二錢　白朮五錢
青皮各二錢　木香一錢

食鹽各一兩
丁香一錢 巴豆十
四粒用鐵線穿
對細水三碗同巴
豆煮乾去巴豆不
用晒乾食後細嚼
白湯送下

補遺大枳殼丸 治
一切酒食傷胸膈
閉悶痰痞飲食不
消兩脇刺痛嘔逆
惡心並皆治之
蓬莪术煨香熟
厚朴去皮姜汁製
黑牽牛炒人參

○枳實丸 治痞滿消食強胃

枳實麩炒黃色 一兩
白术 二兩
右為細末用沸湯泡青荷葉乾者亦可頃間去葉用湯浸
晚粳米炸粉以原湯煮糊為丸如梧桐子大每服五
十九多至七八十九白湯送下○本方加橘紅一兩
名橘皮枳术丸治元氣虛弱飲食不消心下痞悶○

○白术和胃飲 治病久厭七不能食而臟腑或閉或溏
此胃氣虛弱也常服則和中理氣去濕消痰和脾胃
進飲食

白术一兩半 土炒黃 厚朴姜制 陳皮去白 乾生姜
五分 甘草炙二 枳實麩炒黃色 枳椇各二 木香一
人參五分 錢半

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九

炙去皮青皮
枳殼去穰麩炒
陳皮去白 木香
白术各一兩
枳椇 大黃錦
紋者各二兩
半夏湯泡七次
麥芽微炒三錢
神麴炒黃各一兩
一方有乾姜五分
末之姜汁糊丸如
梧桐子大每服三
四十九姜湯下

補遺葛花散 治飲
酒令人不醉

本方加炒神麴一兩炒麥蘗麥一兩名曲蘗枳术九
治飲食大過致心腹滿悶不快○本方加木香一兩
名木香枳术丸能滯氣消飲食開胃進食○本方加
半夏一兩名半夏枳术丸治因冷食內傷○本方加
酒炒黃連酒蒸大黃炒神麴炒橘紅各貳兩黃芩四
兩名三黃枳术丸治傷肉食濕麵辛辣味厚之物填
塞悶乱不快

○草豆蔻丸 治傷飲食卒心痛甚效或秋冬傷寒冷之
物胃脘當心而痛上支兩脇痛脇噎不通飲食不下

草豆蔻麵裹煨黃色 枳實麩炒黃色 白术各一兩 麥蘗麵炒黃色
半夏湯泡洗 薏苡去朽 神麴炒黃色 橘紅
青皮各二錢 炒鹽五分 乾生姜
右為細末湯浸蒸餅為丸如豌豆大每服五十九白

脾胃不和

脾不和則食不化胃不和則不思食不思脾胃不和也六君子湯虛損門或治中湯補遺脾不和喜食而食不消者枳縮二陳湯附餘或枳术丸九下胃不和平胃散中濕門補遺治中湯治脾胃不和嘔逆霍乱中滿虛脹或泄瀉人參去芦甘草炙乾姜炮白术陳皮去白青皮等分每服三錢水一鍾煎七分空心温服嘔吐不已加半夏等分丁香減半名丁香温中湯

脾胃虛損

脾胃虛損者補中益気湯見下或四君子湯虛損門脾胃虛弱小便不利或滑泄或小腹重墜或大便秘結或小腹痛或腰痛或腰重或腰冷或腰痛如折或腰痛如刺或腰痛如坐石冷或腰痛如坐水濕或腰痛如坐木濕或腰痛如坐土濕或腰痛如坐金濕或腰痛如坐瘀血或腰痛如坐寒濕或腰痛如坐風濕或腰痛如坐熱濕或腰痛如坐虛濕或腰痛如坐實濕或腰痛如坐氣濕或腰痛如坐血濕或腰痛如坐痰濕或腰痛如坐食濕或腰痛如坐鬱濕或腰痛如坐驚濕或腰痛如坐恐濕或腰痛如坐怒濕或腰痛如坐思濕或腰痛如坐憂濕或腰痛如坐悲濕或腰痛如坐喜濕或腰痛如坐笑濕或腰痛如坐哭濕或腰痛如坐罵濕或腰痛如坐打濕或腰痛如坐跌濕或腰痛如坐墜濕或腰痛如坐壓濕或腰痛如坐擠濕或腰痛如坐踏濕或腰痛如坐踩濕或腰痛如坐踢濕或腰痛如坐踹濕或腰痛如坐踏濕或腰痛如坐踩濕或腰痛如坐踢濕或腰痛如坐踹濕

湯送下如冬月不可用黄芩歲火不及又傷冷物加以濕剤是其治也然亦有熱物傷者從權以寒藥治之隨時之宜不可不知也

○枳實導滯丸　治傷濕熱之物不得施化而作痞滿悶乱不安

大黄一兩　枳實去穰多炒　神麯炒各半兩　茯苓去皮　黄芩去朽各二錢　澤瀉二錢　甘草一錢

黄連　白术各一錢　或加木香檳榔各二錢名木香導滯丸

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服七八十九温水送下食遠量強弱加減丸數以利為度

○白术丸　治傷豆粉濕麪油膩之物

白术六兩　枳實炒　半夏泡洗　神麯炒各一兩　橘紅七錢　黄芩五錢　白豬胆三分

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三十九

○木香見現丸　治傷冷硬物心腹悶脹痛

神麯炒　京三稜煨各一兩　石三稜去皮煨　草菓蒻麪裹煨　香附子炒各五錢　升麻　柴胡各三錢　木香一錢

巴苴霜五分

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三十九

○三稜消積丸　治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

京三稜煨　廣术炒各一兩　神麯炒　麥芽炒各七錢　丁香　青皮　茴香炒　陳皮去白

飲食不進嘔吐泄利四肢无力怠惰嗜臥或病後脾胃受傷元氣不足參苓白朮散見下或補脾丸或和中丸並補遺或建中湯傷寒門

補遺補脾丸　有脾虛而惡湯藥者製此丸用湯送下省口苦而易於從也

白朮去芦半斤　蒼朮　茯苓　陳皮各三兩

右為末別糊丸如梧桐子大每服九十丸可作粳生用亦熟甚者加清金丸尤妙

補遺和中丸　治病久虛弱厭食不能食而脹悶或秘或溏此胃氣虛也常服則和中理氣消痰去濕厚腸進飲食

厚朴去皮姜製　半夏製各一兩　白朮一兩二錢　陳皮去白八錢

撲即四分半
枳實炒三分半
甘草炙　木香各
二分半
右為末姜汁浸餅
為丸如梧桐子大
每服三五十丸溫
水下

脾胃停食

脾胃停食不能消導
麯糵積木丸加橘紅
半夏見前或枳桔二
陳湯加山查神曲附
餘或倣和丸見下脾

附餘○如意丸　治氣痞
氣及霍乱吐瀉水穀不消之疾並皆治之
末之蒸餅糊丸如豌豆大每服五十丸白湯送下
半夏湯洗七次三稜　枳殼去白　槟榔
陳皮　乾薑　黃連　蓬木各三兩

附除○紅丸子壯脾胃消宿食并　治冷癖
京三稜水浸一宿炮　蓽术泡裕丁皮
巴豆三十七粒連殼同用前藥醋煮
右除巴豆外餘藥剉如豆大用好酒煮乾用巴豆同
藥焙為末薄糊丸如梧桐子大每服十九加至二十九
用茶清姜湯任下食後溫服孕婦不宜服之

丁香　京三稜泡木香　蓽术泡裕丁皮
甘草炙一錢　益智仁　甘松各三分　香附五分
末之蒸餅糊丸如豌豆大每服五十九白湯送下

附不化伏痰留飲者
二陳湯加羌活猪苓
厚朴蒼术痰飲門或
利膈化痰丸痰飲門
或生胃丹見下食積
氣滿停痰二十四氣
丸補遺

補遺二十四氣丸
扶脾健胃消食化
痰順氣之調經退
黃蘗炙
白术四兩麥麪炒
香附四兩童便炒
蒼术米泔浸
陳皮酒洗去白

附餘○三黃枳术丸　治傷肉湿麪辛辣味厚之物填塞閉
乱不安
黃芩二兩　黃連　大黃煨　神麯炒
乾薑炒　枳實炒半兩　白术　橘皮各一兩
右為末湯浸蒸餅丸如梧桐子大以茜紅為衣每服二
十九食後薑湯下

附餘○人參養榮湯積勞虛損氣血虧肌肉削四肢怠墮
人參　白术　甘草炙　桂心
黃蓍蜜炙　陳皮去白　當歸各一兩　白芍藥三兩
熟地黃　五味子　茯苓七錢半　遠志炒半兩
每八錢薑棗煎服

黃荊實炒熟　厚朴去皮姜製
黃連炒各四兩　烏藥酒炒枳殼炒
當歸酒洗枳實炒　生地酒洗神曲炒
萸蔔子炒米仁炒　白芍藥炒半夏泡
山查蒸去核
右為末酒糊為丸
梗郎炒各二兩　杜仲二兩炒去絲
麥蘗炒一兩半　甘草炙　草果仁
砂仁各一兩
右為末酒糊為丸

附餘○進食散　治脾胃虛冷久病人全不食者
青皮　陳皮　良姜　桂心
甘草炙一兩　川烏　草菓各三个　訶子肉
末之每服二錢食遠姜湯調服煎服亦可

附餘○實脾散　治陰水發腫用此先實脾土
厚朴去皮姜炒　白朮去芦　木瓜去瓤　木香不見火　白茯苓去皮
乾姜炮　草菓仁　大腹皮洛甘草炙半兩

附餘○椒朮養脾丸　治脾胃不和扶脾壯胃順氣溫中藏
寒脾瀉腹痛去椒蒜二味名秉肉平胃丸
平胃一斤　川椒四兩去目及閉口者炒出汗為末　細棗半斤蒸熟
蒜半斤去皮入猪肚煮熟出肚不用
右將蒜棗二味搗膏和平胃散及椒末丸如梧桐子
大每五十丸空心米湯或塩湯下

如梧桐子大或酒或米飲下日進三服每次六七十丸

半饑半飽時候如

胸中有痰氣蕪黃腫者加明礬四兩半生半煅人青礬炒黃爨一升

脾胃虛寒

脾胃有寒脉逆理中湯傷寒門或八味理中丸補遺脾胃虛冷心腹脹滿腰痛厚朴溫中湯痞滿門胃寒

每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎不拘時服

附餘○人參開胃湯　助胃進食
人參　橘紅　丁香　木香　藿香
神麯炒　大麥蘗炒　白朮　茯苓　砂仁
蓮子肉　厚朴　半夏麯　甘草炙等分
每服伍錢生姜三片煎服

附餘○枳梗二陳湯　治寬胸膈化痰氣治痞滿
即二陳湯加枳殼一錢　桔梗八分
作一貼水二鍾生姜三片煎至八分溫服

附餘○參香散　治心氣不足諸虛百損常服調榮衛寧心志去脾胃寒濕進食
蓮肉去心一兩　丁香　人參　白朮
白茯苓各一兩半　甘草炙七錢半　乾薑炮一兩半　檀香二錢半

不進食人參開胃湯 見下脾胃虛冷全不進食香砂養胃湯補遺或進食散 見下

補遺八味理中丸

治脾胃虛寒飲食不化胸膈痞滿或嘔痰水或腸鳴泄瀉

縮砂仁 川姜 炙 各二兩 白茯苓 神麯炒 人參去芦各一兩 雪白术去芦四兩 甘草炙一兩半

為末之如常丸每兩分作十九空心用一九姜湯嚼下或加半夏麯一兩為末入鹽點服亦可

補遺香砂養胃湯

治脾胃虛弱嘔吐不食

人參 薑香 厚朴去皮姜製 蒼术泔浸各一錢 白茯苓一錢二分 陳皮一錢五分 草果仁六分 半夏麯八分

陳皮 白芷 青皮 蓽澄茄 石蓮肉 各兩 南木香三錢

右為末米粉糊丸如菜豆大每服五十九姜湯送下

愚按脾胃氣虛則不能運化水穀停積則為濕痰曰補氣曰消食曰燥濕痰二者不可偏廢也此方人參白术以補氣麥蘗砂仁以消食南星半夏以燥濕痰甘餘茯苓滲濕陳皮青皮利氣白豆蔻蓽澄茄開膈南木香調氣石蓮肉清心可謂周而且備矣肥白人氣虛有濕九宜服之

○祖傳經驗遡源散

凡傷食物致患寒發熱久不愈或傷寒後食諸物致食復潮熱不已必詢問其先食何物所傷或糍粽或肉食則以原食之物燒存性一兩重細研為末別用

山藥 為藥 砂仁 沉香 各二錢 橘紅 薑煮 南木香 各二錢半

右每服四錢水一盞生姜三片棗一枚煎食前服

愚按脾惡濕而好燥古方中多用燥藥為脾溫故也然胃火亢甚口燥咽乾嘔噦不食又當以潤劑治之

治脾胃順氣寬膈消痰飲

附餘 ○枳縮二陳湯 砂仁 枳實 陳皮 茯苓 甘草炙等分 半夏

每服六錢水一盞半生姜五片煎八分溫服

附餘 ○生胃丹 生胃氣消痰沫開胸膈進食

栗米四兩 溫水浸透炊作飯焙乾乘熱用生姜有然汁和泥裹南星一兩次日用生姜有然汁和紙包泥裹南星一兩次日用生姜汁浸一宿

生韭菜連根兼一握杵汁調服過一二時以東垣枳實導滯丸百餘粒催之其所傷之宿食即下熱退而愈

○參苓白朮散　治脾胃虛弱飲食不進或嘔吐瀉利其人參　白朮　白茯苓　乾山藥　甘草　白扁豆去皮薑汁浸炒　桔梗去芦薏苡仁　蓮肉酌二兩半

家傳治瘧口痢用石蓮肉又加石菖蒲一兩或有氣加木香半兩

右爲細末每服二錢棗湯調下噤口痢用粳米湯休息痢用砂糖湯調下又別方縮砂一兩

○社門付氏婦子族姪女也年三十歲因勞倦傷食致腹痛脈浮而虛貫十數日後求予治診得右手氣口脈洪盛而滑右關脈浮診虛大而滑重按則沉實左寸關亦弦滑而無力兩尺皆虛而伏予曰此中氣不足脾氣弱而不磨當補瀉兼施而治初與補中益氣湯二服次日與枳實導滯丸八十九大便去二次次日又與補中益氣湯如此補一日瀉一日二十日服補藥十數貼導滯丸千數丸腹脹漸進而安

○東陽盧廉夫善推明丹溪之學者也自病亦誤治年四十五時正月間因往永康路途跋涉勞倦發熱身躰畏痛而頭不痛自以爲外感而用九味羌活湯三貼汗出熱不退前後又服小柴胡湯五六貼熱愈甚經八日召予診視至卧榻前見煎成湯飲一盞在案問之乃大承氣湯將欲飲診其脈右三部浮洪畏弦而無力左三部畏小而亦浮軟不足予曰汝幾自殺

脾胃伏火

脾胃發火二陳湯加芩連山梔察飲門脾胃虛熱津不足白朮散傷寒門脾胃有熱消穀善飢三黃枳實九見前不能食好食但食後反飽難化此胃火旺脾陰虛也石膏枳朮丸補遺脾熱口瘡渴黃散補遺胃火蒸痛胃湯補遺石膏枳朮丸補遺白芍藥酒炒　枳實去穰麩炒　白朮各一兩半　石膏火煅一兩　人參去芦七錢　生甘草五錢　香附米炒木香　黃連炒各四錢　末之米糊為丸梧桐子大白湯下六七十九

補遺瀉黃散　治脾

熱口氣
山梔仁炒一兩
薑香葉七分
白石膏五分
生甘草三分
末之蜜酒拌畧炒
每服二錢
補遺清胃湯 治胃
火齒痛
升麻 黃連
當歸各一分
牡丹皮二分半
生地黃二分
水一鍾煎七分食
遠温服

失此內傷證服此藥大下必死伊曰我平生元氣頗實素無虛損證明是外感無疑也予曰將欵作陽明內實治而下之欵脉既不沉實而又無目疼鼻乾潮熱譫語等證將欵作大陽表實治而汗之欵脉雖浮洪而且虛又無頭痛脊強等證今經八日不應仍在其表汝欵作何經而處治之乎伊則唯ヒ不語以補中益氣湯加附子三分作大劑與之是夜連進二服天明往診脉畧平和伊言尚未服仍謂前藥無効欵勿外感退熱之藥予曰再飲前藥二服不効當罪我又如前二服脉證俱減半伊始曰我誤失去附子再煎二服與之得熱退氣和而愈予則告回其熱雖退体猶困倦伊如前自合二十餘貼服後方得強健復元而歿

脾胃中濕

脾胃中濕者平胃散
中濕門或參香散見
下脾胃中濕泄利胃
苓湯嘔吐門脾胃虛
濕脾泄者椒术养脾
丸見下脾温腫便濇
五苓散中濕門虛者
实脾散見下实者平
東湯爽飲門

○上湖呂氏子年三十餘九月間因勞倦發熱醫作外感活用小柴胡黃連解毒白虎等湯反加痰氣上壅狂言不識人自赤上視身熱如火衆醫束窮八日後召予診視之脉數疾七八至又三部豁大無力左畧弦而乳予曰此病先因中氣不足又內傷寒涼之物致內虛發熱因與苦寒藥太多爲陰盛隔陽之證幸元氣稍克未死耳以補中益氣加制附子二錢乾姜一錢又加大棗生姜煎服衆醫笑曰此促其死也黃昏時服一劑痰氣遂平而熟寐伊父報曰自病不寐今安卧鼾声如平時至平夜方省始識人而諸病皆減又如前再與一劑至天明時得微汗氣而愈

中暑指南

動而得之

動而得之者有胃暑傷暑二等辛苦人負重作勞勤耕刈役夫暑行途熱氣感人一時即病者故曰動而得之或腹痛水瀉者胃與大腸受之惡心者胃口有痰飲也此二者胃暑也可用黃連香薷飲見下或柱枝白朮散補還有痰

黃連香薷飲加南星半夏虛用者煎湯見下或有表熱頭疼但干煩渴唇焦爛乳不宜者或身如針刺者此為熱傷在肉分傷暑也當以雖書湯白虎湯加柴胡並傷寒門如氣虛者加人參或香薷飲或益元散或黃連香薷飲並見下煩渴泄瀉小便不利五苓散加惠前子傷寒門暑月卒倒不省人事者名

二證而名之曰其避暑於深堂大廈及恣食藏水瓜寒涼之物正所謂自得寒物身犯寒氣之病耳宜當同秋冬即病陰證傷寒處治不可名中暑也此論固是抑亦有未悉之旨也與愚按仲景傷寒論中一証曰中暍即中暑也虛而微弱煩渴引飲躭熱自汗此蓋得勞役躰虛而暑邪干衛之候是宜東垣清暑益氣湯等補益之劑治之而愈一證曰熱病即中熱也脉洪而緊盛頭疼身熱口燥心煩此蓋得之於冬感寒邪鬱積至夏而發乃挾暑而成大熱之候是宜黃連白虎解毒等湯清涼之劑調之而愈曰中暑者陰證內傷之為病也曰陰曰陽豈不於斯而明辨之乎孝者宜再思之

脉法

中暑門

論

內經曰因於暑汗煩則喘喝靜則多言察又曰靜而得之為中暑動而得之於中熱中暑者陰證中熱者陽證又曰暑熱之時無病之人或避暑於深堂大廈得之者名曰中暑其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌膚灼熱無汗於房室之陰寒所遏使周身之陽氣不得伸越大順散等熱藥主之若行人或農夫於日中勞役得之名曰中熱其病必苦頭痛發躁熱惡熱捫之肌膚大熱心大渴引飲汗大泄無氣以動乃為天熱外傷神氣者不可發汗白虎等涼劑主之王安道曰暑熱之氣一也皆夏月中傷其邪而為病焉豈以一暑熱分為陰陽

暑氣也有因火者有因痰者火君相二火也暑天地二火也內外合而炎燥所以卒倒也痰者人自之痰飲也因暑氣入而鼓激痰飲塞碍心之竅道則手足不知動躡而卒倒也此二者皆可吐內經曰火鬱則發之吐即發散也吐醒後可用清劑調治之

補遺 生冬白朮散

治冒暑溫熱吐瀉

經曰脉虛身熱得之傷暑

脉弦細乳溼何也內經（詩孚士云傷暑其脉弦細乳溼形熱傷氣蓋傷氣而不傷形蓋氣消而脉虛所謂弦細乳溼皆虛脉也仲景以弦之為陰朱肱亦曰仲暑脉虛細弱暑脉虛同如此）

脉虛而微弱或浮大而散或隱不見（微弱隱伏皆虛類也）

方法

丹溪曰夏月陽氣盡出於地人之腹蜃地氣陽氣於此時浮於肌表腹中之陰虛矣夏月伏陰在內此陰字有虛之義若作陰冷看誤矣古人治暑有大用順散等劑蓋以涼亭水閣寒涼冰雪之傷不用溫劑病何由安非為伏陰而用也大冷之時流金爍石何陰冷之有孫真人製生脉散治人夏月服之非虛而何

○暑證用黃連香薷飲清暑益氣湯五苓散等藥有挾痰者加南星半夏之類挾虛者加人參黃芪之類

戴氏曰暑有冒有傷有中三者輕重之分或腹痛水瀉者胃與大腸受之悪心者胃口有痰飲二者冒暑也可用黃連香薷飲或黃連退熱香薷消暑氣或身熱頭疼躁亂不寧者或身如針刺者此為挾傷在肉分也當以解毒白虎等湯加柴胡氣虛加人參或咳嗽煩寒熱盜汗此不止脉微者熱在肺絕火乘金也此為中暑宜用清肺湯柴胡天水散之類急治則可

○清暑益氣湯治長夏溫熱大勝人感之多四肢困倦精神短少懶於動作溺黃而數大便溏而頻或泄黃如糜或如泔色或渴或不渴不思飲食自汗躰重或汗少者無先病而氣未病也其脉中得洪緩若溼熱相搏必加之以遲七病雖互換少差其脉暑溼今則一也宜以

生冬 麥冬各五錢
白朮去皮 澤瀉各一兩
甘草炙三錢 井草炙三錢
石膏 寒水石 各二兩滑石四兩

右為末每服二錢熱湯新汲水或生姜湯調下

靜而得之

靜而得之者曰中暑也其脉細弱經所謂

脉虛身熱得之姙富貴人避暑於涼亭廣廈為房室之陰寒所逼暑火不伸又有暑天晒衣即收藏箱內冬時取衣穿而得者發寒熱頭痛似瘧者亦為中暑故曰靜而得之此宜為標熱為本故先以辛温治標繼以清涼治本熱無不愈若使作陰症名之用辛熱剤可乎孝者在臨時參其脉症而治之斯无惑矣

清燥之剤治之

黄芪 汗微一分 人參 蒼朮 各一分 升麻一分

白朮 陳皮 神麯炒 澤瀉 各五分

甘草炙 黄柏酒浸炒川歸 青皮

麥門冬去心 乾葛 各三分 五味子九枚

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗温服

伸景方○白虎湯 治暑熱發渴

河間○益元散一名六一水散 治中暑身熱煩渴小便不利此本故先以辛温治標繼以清涼治本熱無不愈若使作陰症名之用辛熱剤可乎孝者在臨時參其脉症而治之斯无惑矣

局方○香薷飲 治一切暑熱腹痛霍乱吐利煩心等證

香薷三分 厚朴 姜制 白扁豆 炒各半分

右細切作一服水二盞煎七分去粗温服

尼陂遠六順散見下霍乱者六和湯霍乱門或桂苓甘露飲見下五苓散傷寒門煩渴嘔噦頭目昏眩枇杷葉散補遺勞碌內傷復感暑汗泄虛弱脉微清暑益気湯或生脉散並見下泄利厥逆冷香飲子補遺迷悶不省人事蕪荑湯渴煩渴龍蓋散補遺補遺枇杷葉散 治中暑煩渴嘔噦頭目昏眩

局方○黄連香薷飲 治證同前以前方去扁豆加黄連七分半也

○十味香薷飲

香薷一分 人參 陳皮 白朮 白茯苓

白扁豆 黄芪 木瓜 厚朴 甘草

每細切作一服水二盞煎至一盞去粗温服

河間○桂苓甘露飲

桂心 人參 茯苓

白朮 甘草 澤瀉

石膏 寒水石 各一兩 滑石 三兩 葛根

右為細末每服三錢白湯調下

○五苓散 方見傷寒門 本方加茵陳名茵陳五苓散 治濕熱發热黄證最捷

枇杷葉去毛炙　香薷七分半　麥門冬去心　白茅根　乾木瓜　甘草各炙各一兩　陳皮去白丁香　厚朴姜炙各五分

末之毎服二錢如止渴煉去丁香加知母冷水調下

補遺冷香飲子　治伏暑厥逆煩燥

附子泡去皮臍童便煮又一伏時　甘草　乾姜　杏仁　肉桂各等分

右細切水煎憂晝時七代熱水飲之孫真人曰憂月

易老〇大順散

甘草　乾姜　杏仁　肉桂各等分

右先將甘草用白砂同炒次入姜却下杏仁炒過篩去砂同桂研為細末每服二錢白湯調下

王安道曰大順散本為冒暑伏熱引飲过多脾胃受濕嘔吐水穀不分藏府不調所致故耳草乾姜皆經火炒又肉桂而非桂枝蓋温中藥也內有杏仁不過取其能下氣耳若以此藥治靜而得之之證吾恐不能解表反增內煩矣

愚按內經必先先天和其暑月當用此方雖録于此不可輕用也

〇生脉散

人參　五味子　麥門冬各等分

右細切水煎憂晝時七代熱水飲之孫真人曰憂月

必服五味子以補五藏氣東垣曰夏月服生脉散加黃芪甘草令人氣力湧出

〇祖傳經驗秘方

九人夏月衝斥道途或於田野中務農作勞或肥白氣虛之人不能抵當暑熱忽然昏悶運仆其氣將絶如在日中即當移病者於陰處徐徐以温湯水灌之如未甦急灸氣海穴以復其元氣醒後以大劑滋補之切不可灌以凉水即死

愚按內經有曰陽氣者煩勞則張精絶辟積于夏使人煎厥目眞不可以視耳閉不可以聽潰潰乎若壞都汩汩乎不可止是則中暑運厥之候也

摘皮絞分　麥三斤水煎冷服

摘遺龍骨散　一名甘草散

白蔹生一兩　烏梅捣去核　五味子各二兩　甘草一兩半生用　飛羅麪一用

為末入麪拌勻每服二錢新水調下一方加柯子肉

滴水為丸如彈子大細嚼水下名龍涎丸

中濕指南

外因

東南地下多陰雨濕氣必從外入脉浮而緩濕在表也多自下起故重腿脚氣者多治當汗散人則滲泄故在上者羌活勝濕湯見下或羌附湯或升陽除濕湯並補遺在下者小便自利清白大便亦澁身痛微腫此為寒濕所致治宜驅寒燥濕五苓散加附子蒼术木瓜傷寒門或平胃散補遺若風濕勝脉浮汗出身痛防己黃芪湯或茵芎附子湯並見下氣實大小便不通者道水九脚氣門風濕身疼無汗發熱麻黃白术散補遺或五苓散加羌活蒼术以汗之傷寒門發熱惡寒身重腳弱關節疼痛小便不利大便泄者此因坐臥濕地或雨濕寒燥濕五苓散

中濕門

論

內經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰濕勝則濡泄地之濕氣感則害人皮肉筋脉原病式曰諸痙強直積飲疼腫中滿霍乱吐下躭重附腫肉如泥按之不起皆屬於濕夫濕之為病所感不同有從外感而得之者有從內傷而得之者若居處卑濕之地與夫道途衝斥風雨或動作辛苦人汗沾衣皆濕從外感者也或恣飲酒漿醪醴多食柑橘瓜菓之類皆濕從內傷者也大抵宜發汗及大小便使上下分消其濕是其治也經文曰因如濕首如裹濕熱不攘大筋緛短小筋弛長緛短為拘弛長為痿因於氣為腫四維相代陽氣乃傷丹溪釋曰濕者土之濁氣也為諸陽之会其位高其氣清其躰虛故聰明係焉濁氣熏蒸清道不通故沉重不利似乎有物掌之失栗治濕鬱為熱熱留不下熱傷血不能養筋故為拘攣濕傷筋不能束骨故為痿弱王註曰素嘗氣疾濕熱加之氣濕熱爭故為腫也邪氣漸盛正氣漸微陽氣衰少致邪代正氣不宣通故四維發腫諸陽受氣於四肢也但今人見脉間關節腫痛全以為風治者多誤矣學者詳之

脉法

脉經曰濕家為病一身盡疼發熱而身色如薰黃也

脉浮而緩濕在表也脉沉而緩濕在裏也或弦而緩或浮而緩皆風濕相搏也

露所襲而致也若冬
傷濕湯或經驗白朮
酒並見下或受濕腰
痛腿腫者生附湯見
下

補遺羌附湯　治風
濕相搏手足掣痛
不可屈伸或身微
腫

羌活九節者去芦
附子泡去皮臍
雪白朮去芦
甘草炙各等分

右剉每服五錢姜
五片水一鍾煎七

濕在上宜微汗而解經曰上濕甚而熱治以苦濕佐
以甘辛以汗為故而止也不欲汗多故不用麻黃
乾葛等劑

濕在中下宜利小便此淡滲沿濕也一云濕在下宜
升提之

濕有自外而入者有自內得者陰雨濕地皆從外治
宜汗散又則疎通滲泄之

濕上下部都可用一云上焦濕用蒼朮其功
蒼朮治濕通散行濕最妙
甘烈

○二陳湯加酒芩羌活蒼朮木通
○金匱防己黃芪湯　治風濕脉浮身重汗出惡風或周
身痠痛

防己二錢
甘草一錢半　白朮一錢　黃芪三錢半

分濕服

補遺茯苓防除濕湯

蒼朮一兩升麻
柴胡　防風
神麯炒　澤瀉
豬苓各半兩

甘草炙　陳皮
麥芽炒各三錢

每服一兩水煎食
後熱服

補遺平胃散

蒼朮米泔浸五斤
厚朴去皮姜製炒
陳皮各三斤二兩元戎○加味五苓散

甘草炒三十兩

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水二盞煎至
一盞去相濕溫服○喘者加麻黃○胃氣不和加芍藥
○氣上衝加桂枝○下有寒加細辛○濕勝身重陽
微中風則汗出惡風故用黃芪炙甘草以實表防己
白朮以勝濕

仲景○甘草附子湯　治風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈
伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣
或身微腫而痛者

甘草炙二錢　附子一錢半　白朮二錢　桂枝四錢

右細切作一服水煎金匱方桂枝加生姜大棗名白
朮附子湯

本方中加茯苓散　治濕勝身痛小便不利躭重發渴者

右為末每服五錢東垣○除風湿羌活湯
姜三片棗一枚煎　羌活七分　防風
服入塩一撮沸湯　藁本　蒼朮各一錢
點服亦得　右細切作一服水二盞煎至一盞去相温服
補遺痺黄白朮散　治湿相搏一身尽痛
治感風湿身体煩　而不行以風藥散之春痛項強腰似折項似拔此足
疼無汗發熱者　太陽經不通行此藥主之
麻黄去節三兩　羌活　防風
白朮去芦四兩　甘草炙各一錢　藁本
甘草炙二兩　右細切作一服水二盞煎至一盞去相温服
杏仁八雙去皮尖　治湿痺風湿身体煩　川芎各五分　蔓荆子三分
桂心一兩　痛不可回顧此手太陽氣欝　如負重腰痛沉重然經中有兼湿也加酒洗漢防已
每服四錢水一鍾　五分輕者附子五分重者川烏五分
煎至七分空心温　東垣○羌活勝湿湯　治湿欝成黄疸寒热喘吐而渇身体
服

内因

西北地高寒湿人多　面目俱黄小便不利不思飲食莫能安卧
食湿熱潼乳酒醪以　蔓荆
飲多伏食為尚或酒　白朮　栀子　防已
後寒氣怫欝湿不得　枳實各四分赤茯苓　陳皮　青皮
越病從内生肺沉而　猪苓去黒皮一錢　澤瀉各五分　茵陳六分
緩湿在裏也故多腹　右細切作一服水二盞煎至一盞去相温服
皮脹痛水鼓浮腫按　方○茵陳五苓散　治湿熱大勝黄疸發熱五苓散内加
之如泥之病二陳湯　茵陳一倍即是也
加白朮蒼朮痰飲門　祖○經驗白朮酒　治中湿遍身疼痛不能轉側及皮肉
或平胃散見前飲食　痛誰著白朮一兩
内湯字湿腫高腫脹　右細切作一服無灰老酒一盞半煎至一盞温服
発黄肉陳五苓散見　飲○生附湯　治受湿腰痛腿腫
下千尺浮腫小便赤　附子生二錢半　蒼朮炒　杜仲姜炒半兩　牛膝酒浸焙

泄氣急喘滿赤茯苓
九見下或茯苓湯補
遺寔者三花神祐丸
疾飲門或升車丸補
遺右飲酒動濕升而
汗之解醒湯內傷門
小便赤澁大便瀉泄
五苓散傷寒門
補遺茯苓湯　治脾
氣不實手足浮腫
小便赤澁氣急喘
滿
赤茯苓　澤瀉
香附子　陳皮
桑白皮　乾姜
厚朴姜制　乾薑生
甘草炙各二錢半　白朮　茯苓去皮

右細切每服五錢薑三片棗一枚食前煎服
丹溪活套云濕本為土氣火熱則能生濕土故憂熱則
萬物濕潤秋涼則萬物乾燥夫熱而沸騰則生濕也
因濕生痰故用二陳湯加酒芩羌活防風去風行濕
蓋風藥能勝濕也大抵治濕宜利小便為上策故曰
治濕不利小便非其治也○如一身盡痛或無汗是
濕流関節邪氣在表宜五苓散加羌活蒼朮以微汗
之不可太汗發汗去而虛濕仍在也若自汗多者宜白朮
甘草湯○若小便自利清白大便泄瀉身痛自汗此
為寒濕宜五苓散加生附蒼朮木瓜○如風濕身痛
微腫惡風宜杏仁湯官桂五錢天門冬苓藥麻黃各
大腹皮各等分
每服一兩水一鍾
煎至八分溫服不
拘時候
補遺舟車丸
大黃二兩甘遂
大戟　青皮
芫花醋拌炒
陳皮各一兩
黑牽牛頭末四兩
木香半兩
末之水丸如梧桐
子大每服七十丸
白湯下隨症虛實
加減
二錢半杏仁七个水三盞薑十片煎分二服○又治
濕消腫脹和小便健脾胃音蘆木香散音蘆子茯苓
豬苓白朮各一兩木香澤瀉木通甘草桂枝各半兩
滑石三兩為末湯調服○然已上諸方乃舉示其端
倪耳全在活法加減而用之不可執一論也夫治濕
者固當以二木為君以補脾為主治然亦有濕盛氣
滿膨脹者又當以利水行氣為先補脾藥又未可遽
用我以二木為君而利水藥為臣使或以木通澤瀉
葶藶車前子等利水藥為君而以茯苓白朮人參等
補脾藥為臣使有本而標之者亦有標而本之者看
緩急而施治則萬全萬全之功可立而待也

燥症指南

燥症門

寒燥

論

內經曰諸澁枯涸乾勁皴揭皆屬於燥原病式曰經云風熱火同陽也寒燥濕同陰也又燥濕少異也然燥金肺屬秋陰而異乎寒濕故又同其風熱也故又熱勝則金衰而風生緣風能勝濕熱能耗液而反寒陽實陰虛則風熱勝于水濕而為燥也九人風病多因熱甚而風燥者為其兼化以熱為其主也蓋肝主為筋而風氣旦甚又燥熱加之則筋大燥也燥金主於收斂其脉緊澁故為病勁強緊急而口噤也或病燥熱太甚而脾胃乾涸成消渴者或風熱燥甚拂鬱在表而裏氣平者或善伸數次筋脉拘急或時悪寒筋惕而搐又或風熱燥併而鬱甚于裏故炳痛而或秘結也及風痙之發作者由熱甚而風燥為其兼化淫溢膏膈燥爍而痴癍昏冒僵仆也凡此諸証皆由熱甚而生風燥病各有異者由風熱燥各微甚不等故也所謂中風筋緩者因其風熱甚溫而為燥之甚也然筋緩不收而痿痺故諸瘨鬱病疾皆屬於肺金乃燥之化也如秋深燥甚則得草木萎落而不收病之象也是以掌得血而能持足得血而能步夫燥之為病者血液衰少不能榮養百骸故若是也孝者不可不知

脉法

脉緊而澁　或浮而弦　或乳而虛

方法

丹溪曰皮膚皴揭折裂血出大痛或肌膚燥痒者大燥

通幽湯或潤燥湯或潤腸丸或潤腸湯並秘結門或蜜導法補遺

補遺蜜導法

凡諸秘結不通或兼他症又或老弱虛極不可用藥者用蜜熬入皂角末少許乘热搜作兌候冷以導之冷秘生姜兌佳

風燥

夫風勁肅清燥气在

表鍊於皮膚則皮毛燥澁皺揭乾癢瓜枯之病生焉宜除風温之劑血弱不能養觧勌燥手足不能動指瓜枯燥大秦艽湯傷寒門皮燥已氣熱膏或生血潤膚飲並見下或辛潤緩肌湯消渴門燕皎嗽者宜玉膏咳嗽門或天門冬膏見下大腸風秘中燥結者搜風順氣丸附餘或活血潤燥秘結門

肺金燥之甚也宜以四物湯去川芎加麥門冬人參天花粉黃精五味之類治之

治血虛皮膚枯燥及消渴等證

生地黃一斤洗淨細㕮咀 鹿角膠一斤搗碎 生薑二兩搗取自汁 白沙蜜二斤煎一二沸撇去面上沫 真酥油一斤

右先以文武火熬地黃汁數沸以絹濾取淨汁又煎二十沸下鹿角膠次下酥油及蜜同煎良久候稠如餳以磁器收貯每服二匙空心温酒調下

○天門冬膏 治血虛肺燥皮膚折裂及肺痿咳嗽膿血證

天門冬新掘者不拘多少

右一味靜洗去皮心細搗絞取汁澄清以布濾去粗滓用銀鍋或沙鍋慢火熬成膏每用一二匙空心温酒調服

人因七情內自內起及食辛辣味厚之物而助火邪伏於血中耗散真陰津液虛少燥結有時乃為實也宜潤腸開結軟堅如大黃芒硝枳實厚朴之類便溏不通全不思食謂脾約結門內火熾盛燥渴津液煩渴燥甚生津止渴露飲消渴門或白虎湯傷寒門燥熱結者

○地仙煎 治諸燥証

山藥一斤細折 杏仁一斤去皮尖 生牛乳汁二斤

右件將杏仁研細入牛乳山藥拌勻絞取汁用新磁瓶密封重湯煮一日每服一二匙空心温酒或湯調下

附餘○搜風順氣丸

大黃五兩半生半熟 麻仁一斤微炒去殼取仁另研 山茱肉 郁李仁研 兎絲子酒蒸 川牛膝酒浸各一兩 枳殼炒 獨活一兩 防風一分五 車前子二兩半 揀郎 山藥酪各二兩 末之煉蜜丸如梧桐子大每服二三十丸茶酒任下

附餘○半硫丸 治冷秘風秘老人秘結

透明硫黃 半夏

等分末之生薑糊丸如梧桐子大姜湯送下

附餘○清凉飲子

當歸龍膽丸火熱門或清涼飲子附餘或桃仁承氣湯傷寒門下焦燥熱小便澁數者六味地黃丸虛損門陰虛燥火者大補陰丸虛損門虛秘不通宜導法見前或猪膽汁法補遺

補遺猪膽汁導法

用大猪膽一枚瀉汁和醋少許灌穀道中一飯頃大便即通

大黃　赤芍藥　當歸　甘草

頂分水煎食後服

子仲兄悋德處士年四十五平生体瘦弱血少值庚子年歲金大過至秋深燥金用事久晴不雨得燥證皮膚拆裂手足枯燥搔之屑起血出痛楚十指甲厚反而莫能搔痒予製一方名生血潤膚飲服數十貼其病如脫後治十數人皆驗

○生潤膚飲

川歸　生地黃　熟地黃　黃芪各一錢　天門冬一錢半去心　麥門冬一錢去心　五味子九粒　片芩去朽酒洗五分　括蔞仁五分　桃仁泥五分酒紅花一分　升麻二分

右細切作一服水二盞煎至一盞温服如大便結燥加麻仁柏子仁各一錢

火熱門

君火

喘欬嘔吐暴注下迫轉觔小便渾濁腹脹大鼓之如鼓癰疽瘍瘡瘻瘤結核吐下霍乱瘡癰腫脹鼻塞飧泄血溢血泄淋閉昏瞀熱惡寒戰慄驚惑悲笑謏妄飲食呕噦手少陰君火之為病也君火者心火也可以濕伏可以水滅可

論

內經曰諸熱瞀瘈暴喑昧燥擾狂越罵詈歌笑駭附腫疹瘍氣逆衝上禁懷如喪神守健忘善肠鳴侯閉耳鳴耳聾嘔涌溢食不下目昧不明暴注瞤瘈暴疾暴死皆屬于火丹溪曰太極動而生陽靜而生陰陽動而變陰靜而合而生水火木金土各一其性惟火有二曰君火人火也曰相火天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而言形質相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無字位稟命因動而見故謂之相火主生物故恒於動人有此生亦恒於動其所以恒於動者皆相火之為也云又曰五行者之性為物所感不能不

以直折黃連解毒湯傷寒門或三黃丸見下或梔子金花丸即三黃丸加梔子是也實者可用碎黃末水正治洗心散補遺或黃連是也見下君火熾盛甚者用寒藥直折其火轉甚者須用薑汁或酒製炒用則火自伏此寒因熱用之法也

補遺洗心散 治風痙痰滯心經積熱口苦唇燥眼澁多淚大便秘結小便赤

白朮去芦一兩半 麻黃和節 荊芥穗 甘草稍生 白芍藥 當歸洗 大黃麵裹煨切焙各八錢

右為末每服二錢生姜薄荷各少許水一盞煎七分溫服

相火

脉決

脉浮而洪數為虛火 脉沉而實大為實火

洪數見於左寸為心火見為右寸為肺火見為左關為肝火右關為脾火兩尺為腎經命門之火男子兩尺洪

動謂之動者即內經五火也相火易起五性厥陽之火起於妄化莫測無時不有前賢其相煽則妄動矣陰虛則病陰絕則死愚按心為君火而又有相火寄於肝腎二藏即內經一水不能勝二火也五性之火為物所感而動即內經一水不能勝五火也夫五行之理天人所同知乎此則造化陰陽洞明於胷臆之間又能約知其火邪之虛實或補或瀉用藥以平之則愈疾之功如射之中鵠矣孝者其可忽諸

方法

丹溪曰陰虛火動者難治

實火可瀉黃連解毒之類○虛火可補參朮生甘草之類實者抑之虛者正之○鬱火可發當看在何經○風寒外束者可發輕者可降重則從其性而升之

九火盛者不可驟用寒涼必須溫散

火急盛者必緩之生甘草兼瀉兼緩參朮亦可

人壯氣實火盛顛狂者可用正治硝黃冰水之類

人虛火盛狂者以生姜湯與之若投以冰水之類正治立死

有補陰則火自降灸黃柏熟地黃之類

九氣有餘便是火氣從左邊發者肝火也氣從脐下陰火也愚按氣有餘者非真氣也五陽之火動而為邪即氣也

狂越罵詈驚駭附腫酸疫気尚上衝禁慄如喪神守嘘唱瘡瘍喉啞耳鳴及齒噤湧溢食不下目昧不明暴注瞶瘈暴病暴死此皆手少陽相火之為病也相火者龍火也不可以右折之惟其稍可以治之隨其此而伏也若以水水寒涼正治立死宜大補陰丸虛者加門滋腎丸見下気從下而上者內挾相火腎水飲酒人発熱者難治不飲酒人因酒発熱者亦難治輕手按之熱甚重手按之不甚此熱在肌表宜清之地骨皮麥門冬竹茹之類重手按之熱甚而烙手輕手按之不甚熱此病在肌肉之內宜發之東垣升陽散火湯火鬱湯之類煩燥者氣隨火升也木通下行瀉小腸火　人中白瀉肝火　溺垢岸也秋石亦是黃芩黃連以猪膵汁拌炒能瀉肝膵之火黃柏加細辛瀉膀胱之火青代能瀉五藏之鬱火　玄參能瀉無根之游火小便降火極速山梔子能降火從小便中泄去其性能屈曲下行人所不知人有氣如火從脚下起入腹者此虛極也蓋火此於

虛不能制之宜壯水之劑生地黃牡丹皮玄參知母之類

鬱火

鬱火者諸臟之火折遏而不得升也故內經曰火鬱則發之謂發于外也其躁散也不可禁施當看何經四肢発熱肌燥熱骨髓中熱発困熱如燎捫之烙手此血虛而得之也宜用補血之劑

九泉之下也此病十不救一治法以四物湯加降火藥服外以附子末津調貼脚心湧泉穴以引火不行（愚按此条言術未悉者如果労怯陰虛之人有此固當作陰虛治若壯実之人有此則是温鬱成热之候也愚嘗冒雨徒行衣温得此症以医数人皆驗若誤作陰虛治即成痿症剳矣）

○左金丸（一名回令丸）　治肝火

黃連六兩　吳茱萸一兩湯炮浸半時許焙乾用

右為細末粥丸煎白术陳皮湯下

○大補丸　治陰火

黃柏去粗皮細切用新鹽酒炒褐色　知母去皮盛盐酒炒

右為細末粥丸或水丸煎四氣湯送下又云氣虛四君子湯送下血虛四物湯送下

○柳青丸　治肝火

過食冷物抑遏陽氣
於脾土為火鬱之病
以升散之劑發之升
陽散火湯或火鬱湯
主之或瀉陰火升陽
湯並見下或地骨散
補遺若火盛甚而反
惡寒者非寒也元極
反熱水化制之四物
湯加黃芪黃柏黃連
火降惡自止虛損門
若心火亢極鬱熱內
突為陽強之病以酸
冷之劑折之如大承
氣湯之屬陽寒門

黃連不拘多少　為細末粥丸白湯送下

○石膏九瀉胃火併食積痰火
石膏煅為細末醋丸如菉豆大清米飲送下

○四物湯加白馬胫骨降陰火代芩連用

○陰虛發熱四物湯加炒黃柏酒知母乃降火補陰之妙
劑甚者加龜板煎氣虛加參芪白朮

已上見丹溪方○手心熱屬虛當用火鬱湯或用梔子香附白芷半夏川芎麴糊為丸服

東垣○火鬱湯　治四肢及五心煩熱因熱伏土中或血虛得之或胃虛多食冷物抑遏陽氣於脾土之中

升麻　葛根　芍藥　人參各七分
甘草生各三分　防風
蒼白五葉

右細切作一服水一盞半煎至一盞稍熱服

東垣○升陽散火湯　治男子婦人四肢發熱骨間熱肌表熱如火燎抑之烙手此病多因血虛而得之或胃虛過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中火鬱則發之

升麻　葛根　人參各六分　甘草一分　柴胡三分　防風三分　生甘草二分

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞熱服

東垣○瀉陰火升陽湯　治肌熱煩熱面赤食少喘咳痰盛右関脉緩弱或弦或浮而數

熟地　甘草炙　黃芪　蒼术各一分　升麻八分
柴胡半錢　人參　黃芩各七分　黃連酒炒五分　石膏五分

右　細切作一服水二盞煎至一盞温服

東垣○滋腎丸　降腎火

稍遠地骨皮散　治渾身壯熱脉長而滑陽毒火熾發渴

地骨皮去心
茯苓各半兩
生地黃酒洗
柴胡　黃芩
知母各一兩
石膏二兩羌活
麻黃各七錢半有汗並去之

每服一兩入姜煎

五志之火

諸氣憤鬱屬肺火也

怒衰動中火起於肺經云肺若氣上逆急食苦以瀉之黃芩葦薩苦酒是也瀉白散喘喘門清金九補遠或千金麥門冬湯見下或人參瀉肺湯附餘諸風掉眩屬肝火也大怒火起于肝柴胡黃連龍膽瀉之火也酵飽火起於脾芍藥黃芩石膏瀉之瀉熱湯或若膏九並見下

右金九或抑青九並見下諸濕腫滿屬脾河間○三補九瀉三焦火

黃芩　黃柏

右為細末熱水九百沸湯下

梔子　朴硝

右水一盞煎至八分去粗入蜜一匙和勻服

大黃　杏仁各五分　連翹一錢

不渴也右為細末同躰故以寒因熱用之諸病在下焦皆

也桂與火邪同陰以同腎氣故能補腎而瀉下焦火

知母二兩去毛　肉桂一錢去粗皮

酒浸陰乾　酒浸陰乾

黃柏二兩酒拌陰乾

右二味氣味俱

見下共二者痰則起故參看之症瀉心湯見下黃連解毒傷寒門諸逆冲上屬腎火也屬勞則火起於腎惟黃柏知毋順性而伏之也大補陰丸虛損門火起於湯泉者虛之甚也由腎水虛不能以制之補陰丸虛損門或滋腎丸見下

補遺清金丸　治肺火

黃芩炒　巴上用水一石煮至四斗去粗入下項藥

甘草炙八兩　青木香　牛犀角屑　羚羊角屑

沉香各五兩　丁香一兩　升麻　玄參各一斤

巴上再煮至一斗五升入下項藥

硝石二斤若無朴硝亦可朴硝十斤撲碎者

巴上入前藥汁中微火煎柳枝不住手攪候有七斤投放水盆中半日入下項藥攪令勻

硃砂三兩　當門子麝香一兩三次半

右前成霜雪紫色每服一錢或二錢涼水調下大人小兒臨時以意酌酌加減多寡服之並食後服

方○妙香丸　治時疫傷寒解五毒潮熱積熱及小兒驚癎等證

巴豆取淨三百五十粒去皮膜　牛黃　片腦　臙粉

末之水九溫湯下

五十九

虛火

虛火可補宜補中益氣湯加黃柏知母內傷門或龍腦鷄蘇丸補遺入虛火旺者用藥稍加生姜汁製此從治也氣從足上起虛也從足底心起者虛之極也難治大補氣血兼濕散藥大補陰丸虛損門或大補丸補遺治腎水虛煩

射香各七釐　辰砂九兩　金箔九十片

右研極細煉蠟六兩入蜜七錢半同煉令勻每兩作一二十九每服一九小兒菉荳大二九白湯下○按精則殺人慎之

幸方無金箔有水銀硼砂治久遠成積按硼砂不可輕用製煉不

局方○瀉心湯　治心經蘊熱

右以黃連二味為細末水調服之

○千金麥門冬湯　治諸病後火熱乘肺欬唾有血胷脇脹滿上氣喘急羸瘦五心煩熱渴而煩悶

麥門冬　桑白皮　生地黃各七分半夏　紫菀　桔梗　淡竹葉　麻黃各五分　五味子　甘草三分

右生姜三片水一盞煎至一盞溫服

愚按此方曰病後火熱乘肺麻黃其可用乎曰渴而煩悶半夏亦不可用也宜去此二味加具母天門冬方為穩當也

河間○梔子仁湯　治發熱潮熱發狂煩燥面赤咽痛

梔子仁　赤芍藥　大青　知母各五分

升麻　黃芩　石膏各一錢　杏仁七分半

柴胡一錢二分　生甘草一錢　豆豉五十粒

右細切水一盞煎八分去粗溫服

河間○當歸龍會丸　治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋惕搐搦神昏不寧榮衛壅滯頭目昏弦肌肉瞤瞬胃腸咽嗌不利腸胃燥澁操擾狂越罵詈驚駭火執等症

當歸　龍胆　梔子　黃連

黃芩　黃柏　各一兩　大黃

芦薈各半兩　木香一錢　青代　射香五分

黃之屬

補遺 龍腦雞蘇丸 消煩渴凉上膈解酒毒除邪熱并治咳嗽唾血吐血諸淋下血胃熱口臭肺熱喉腥脾熱口苦甜膩熱口苦並宜服之

黃芪去芦一兩 麥門冬去心四兩 阿膠蛤粉炒成珠 甜葉炒各二兩 人參去芦一兩 生地六兩另研細

右為細末煉蜜丸如小豆大每服三十丸姜湯送下

附餘○三黃丸 治三焦火盛消渴不生肌肉

大黃 黃連 薰苓

右為細末煉蜜丸如小豆大每服五丸漸加至十丸服至一月行及奔馬

白湯送下服至一月行及奔馬

附餘○人參瀉肺湯 治肺經積熱上喘咳嗽胸脇脹滿痰多大便澁滯

黃芩 栀子 連翹 杏仁炒去皮 桑白皮炒 大黃 桔梗 每服一兩水二盞煎至一盞去滓食後通

附餘○瀉熱湯 治脾臟熱面黃目赤胸脇痛滿

半夏 姜各八分 枳實 栀子 茯苓 芒硝各三分 細辛五分 白朮 杏仁各四十個 生地一兩八分

右為細末煉蜜丸如小豆大每服三十丸姜湯送下

附餘○龍腦雞蘇丸 消煩渴凉上膈解酒毒除邪熱併治咳嗽唾血吐血諸淋下血胃熱口臭肺熱喉腥脾熱口苦甜膩熱口苦並宜服之

黃耆去芦炙 麥門去心四兩 阿膠炒 甜葉炒各二兩 人參去芦一兩半 柴胡銀州者去芦木通各二兩以湯半升同柴胡浸一二宿取汁為膏 雞蘇薄荷葉一斤

右除別研藥外並搗為末將好蜜三斤先煉一二沸後下生乾地黃末不住手攪令勻取木通柴胡汁慢火熬成膏勿令焦然後將其餘藥末同和為丸如黃豆大每服二十丸嚼破熱水下虛煩消渴鬱悶人參湯下咳嗽唾血鼻衄吐血麥門冬煎湯下惟淋用

每服二十九嚼破熱水下虛煩消渴驚悸人參湯下咳嗽唾血鼻衄吐血麥門冬煎湯下惟林用車前子煎湯下

補遺大補丸 治陰火

黃柏 不拘多少炒褐色

末之粥丸或水丸空心淡鹽湯送下百丸盖養菩薩醋隧入腎經

○丹溪活套云丸去上焦濕熱須酒洗黃芩以瀉肺火如肺有實熱宜用如虛熱而用黃芩則傷肺氣須先用天門冬保定肺氣然後用之○如去中焦濕熱與痛須用黃連以瀉心火若中焦有實熱宜用若脾胃氣虛及中焦有鬱熱者當用茯苓白朮黃芩蒼朮麥門冬煎湯下惟虛煩須用補藥為主人參白朮茵芩為藥茯苓麥門冬大棗之類作下焦有濕熱腫痛併膀胱有火邪者須用酒洗防己草龍胆黃柏知母之類固是捷藥若肥白人氣虛者宜用白朮蒼朮而星滑石茯苓之類○如黑瘦之人下焦有濕熱腫痛者必用當歸紅花桃仁牛膝揀郷等藥○柴胡瀉肝火須用片芩佐之片芩又能瀉肺火須用桑白皮佐之若鼠尾者能瀉大腸

實火

安火可瀉三黃丸見下人壯氣實火盛顛狂者黑奴丸虛疫門梔子仁湯紫雪膏或妙香丸並見下腹痛腸鳴大便秘者大承氣湯傷寒門煩渴熱燥陽明火熾白虎湯傷寒門火盛甚寒涼藥稍加溫劑或酒炒則火易伏當歸龙会丸見下

火熱指南效

之火○黃連瀉心火若用猪膀汁拌炒更以草龍胆佐之大能瀉膀中之火○白芍藥瀉脾火若冬月用泌以酒浸炒益其性之酸寒也○知母黃柏瀉腎火又瀉膀胱之火○梔子瀉三焦之火在上中二焦連用用在下焦須去売水洗去黃漿炒焦色研細用之人中白非獨瀉肝火又能瀉三焦火及膀胱之火從小便中治蓋膀胱乃物之故道也

○祖傳經驗秘方人中白散治陰虛火盛及五心煩熱等症

人中白二兩 黃柏鹽酒拌炒褐色 生甘草 青代各五錢

右為細末每服二錢童子小便調服

○駱氏婦年四十餘夜間發熱早晨退五心煩熱死休止特半年後求予治六脉皆數伏而且牢浮取全不應予與東垣升陽散火湯四貼而熱減大半胸中爽清

或因求謀不遂或因橫逆之來或因貪著所迫或因暴怒所傷或因悲哀所致或因思念太過皆為之氣鬱也其狀胸滿脇痛脉沉而澁二陳湯加香附撫芎蒼朮煞飲門氣實者再加枳實枳殼厚朴姜炒砂仁炒山梔仁青皮木香

鬱症門

論

內經曰木鬱達之火鬱發之土鬱奪之金鬱泄之水鬱折之張子和曰木鬱達之謂汗之令其疎散也土鬱奪之謂下之令無壅礙也金鬱泄之謂滲泄解表利小便也水鬱折之謂抑之制其衝逆也此治五鬱之大要耳我朋溪先生觸類而長之而又著為六鬱之証所謂氣血冲和百病不生一有怫鬱諸病生焉此發前人之所未發者也夫所謂六鬱者氣濕熱痰血食六者是也或七情之抑遏或寒熱之交侵故為九氣怫鬱之候或兩濕之侵或酒漿之積

之類或分心氣飲補遺

補遺分心氣飲 治四氣七情氣滯不散胸滿脇脹噫氣吞酸嘔吐

分心氣飲木通青桑夏半陳桂茯苓羌腹五錢蘇二兩薑姜灯草共煎成

濕鬱

人之体氣虛弱或因雨露所襲或因涉水山嵐或因坐臥濕地或因汗出衣衫俱爲之濕鬱也其狀周身走痛或関節痛遇陰寒則發脉沉而細緩身体重頭重痛是也

白芷蒼朮川芎茯苓香附除濕湯或茯苓滲濕湯並中濕門

血鬱

或感執毒或受濕毒或挾風邪而作者其狀四肢無力能食便血脉沉滿而乳四物

聚故為留飲濕鬱之疾又如執鬱而成痰上鬱而成癖血鬱而成瘀食鬱而成痞滿此必然之理也又氣鬱而濕滯濕滯而成熱熱鬱而成痰痰滯而血不行血滯而不食不消化此六者皆相因而為病者也是以治法皆當以順氣為先消積次之故藥中多因香附撫芎之類至理存焉學者宜知此意

脉法

脉多沉伏　氣鬱則必沉而濇濕鬱則脉必沉而緩熱鬱脉必沉數痰鬱脉必弦滑血鬱脉必乱而結促食鬱脉必沉澁而緊盛鬱在上則見于寸鬱在中則見于関鬱在下則見于尺左右亦然鬱脉或促或結或代滑氏診家樞要曰氣血食積痰飲一有留滞於其間脉必因之而止鄭矣但當求其有神何害之有夫所謂有神者即經所謂有中氣也

方法

丗溪曰氣血冲和百病不生一有怫鬱諸病生焉其証有六曰氣鬱曰濕鬱曰執鬱曰痰鬱曰血鬱曰食鬱

氣鬱戴氏曰肾脇痛脉沉香附（此味能橫行肾臟開必用童便浸炒乾用否則燥）

蒼朮　撫芎（即芎藭芎勞黃頭小塊也氣即上行故能散鬱也）

濕鬱戴氏曰周身走痛或関節痛遇陰寒則發脉沉蒼朮　白芷　川芎　茯苓

執鬱戴氏曰目瞀小便赤脉沉數（丸用）

梔子　青代　香附　蒼朮　撫芎

痰鬱戴氏曰動則喘寸口滑沉滑則喘滑

海石　香附　南星　瓜婁子

血鬱戴氏曰四肢無力能食脉沉無

湯加桃仁紅花青黛
川芎香附虛損門或
越鞠丸或六鬱湯加
桃仁紅花牡丹皮並
見下

痰鬱

人因七情氣鬱結聚
痰涎在胸此痰鬱也
狀若破絮若梅核若
桃膠蜆肉吐不出嚥
不下寸口脉沉而滑
二陳湯加海石南星
香附炒瓜姜仁痰飲
門或四七湯痞滿門

桃仁　紅花　青代　川芎　香附
食鬱戴氏曰嚏酸腹脹不能食
左寸脉平和右寸脉緊盛
香附　蒼术　山查　神麴　針砂
諸鬱藥春加防風夏加苦參秋冬加吳茱萸
凡藥在中焦以蒼术撫芎開提其氣以升之假令食在
氣上氣升則食降餘倣此
○越麴丸越音戈細麴也　能解諸鬱
神麴炒　香附童便浸香　蒼术　川芎　越梔
右為細末水丸菉豆大每服五七十丸温水下
○生韭飲　治食鬱久則胃院有瘀血作痛大能攻開氣血
生韭葉　一握搗取自然汁一盞
右先以生桃仁連皮細嚼十数個後以韭汁送下
○六鬱湯　解諸鬱

或升陽二陳湯見下

火鬱

有陰虛而得之者或
門虛食冷物抑遏陽
氣不舒脾土中者其狀
脉悶小便赤澁脉沉
而数或體中熱肌痺
熱捫之烙手二陳湯
加山梔香附青黛撫
芎白芍蒼术痰飲門
或六鬱湯或升陽散
火湯或瀉熱湯並火
熱門

陳皮去白一錢半　夏湯泡七次　蒼术米泔浸一宿　撫芎各一錢　香附二錢
赤茯苓　梔子炒各七分　甘草炙五分　砂仁研五分
右細切作一服加生姜三片水一盞煎温服○如氣
鬱加烏藥木香檳榔紫蘇乾姜倍香附砂仁○如濕
鬱加白术倍蒼术○如熱鬱加黄連倍梔子○如痰
鬱加南星枳殼小皂莢○如血鬱加桃仁紅花牡丹
皮○如食鬱加山查神麴麥芽麪
紀此方出吳階升發二陳湯　治痰鬱大邪在下焦大小便不
利此藥能使大便潤而小便長
陳皮去白一錢半　夏一錢半　茯苓一錢　甘草五分
撫芎一錢　升麻　防風　柴胡各五分
右細切作一服加姜三片水一盞半煎一盞温服
○一男子年二十九三月間客事後騎馬渡溪遇深淵

食鬱

或過食厚味熏炙熱之物或飲酒太醉所傷皆謂之食鬱也其狀噯酸胸滿腹脹不能食或嘔酸水惡聞食氣人迎脉平和氣口脉盛或沉緩而大二陳湯加神麯麥芽山查針砂香附痰飲門或保和丸內傷門或生韭湯見下

沉沒幸得馬健無事連濕衣行十五里抵家次日增寒壯熱肢節煩疼似瘧非瘧之狀一醫作虛証治而用補氣血藥服月餘不効又易一醫作勞瘵治用四物湯加知栢地骨皮之類及丹溪大補陰丸倍加紫河車服至九月又加滿悶不食乃顧倩有乳婦人在家止喫人乳汁四五杯不喫米粒召予診視六脉皆洪緩重按若牢右手為甚予作濕鬱處治用平胃散倍蒼朮加半夏茯苓白朮川芎香附不通砂仁防風羌活加姜煎服一貼黃昏服一貼一更時又進一貼至半夜遍身發紅丹如癮疹片時隨沒而大汗索粥與歸芪二碗由是前病除減能食仍與前方服三貼後以茯苓滲濕湯倍加白朮服二十餘貼平安

痰飲指南

痰飲

痰乃津液所化因風寒濕熱之感或七情飲食所傷以致氣逆液濁變為痰飲或吐咯上出或凝滯胸膈或留聚胃腸或溜注經絡四肢隨氣升降遍身上下無處不有治法宜先順氣在上者吐之在中者下之又中氣虛者宜固中

痰飲門

論

內經曰諸氣膹鬱皆屬肺金蓋肺氣鬱則成熱火盛則生痰丹溪曰自然成積自積成痰夫挾瘀血遂成窠囊此為痞為痛為噎膈翻胃之次第也王隱君曰痰証古今未詳方書雖有懸飲留飲支飲痰飲諸飲之異而莫知其為病之源或頭風目昏眩運耳鳴或口眼蜗動眉稜耳輪瘙痒或四肢遊風腫硬似痛非痛或為齒痛痒痛不一或噯氣吞酸嘈雜嘔噦或咽嗌不利咯之不出嚥之不下色似煤炲形如破絮挑膈蜆肉之類或心下如停冰雪心頭冷痛時作或憂寐奇怪鬼魅之狀或足腕痠軟腰背牽痛或四肢骨節煩疼並

氣以運痰若攻之太重則胃氣虛而痰愈盛矣是故在膈者瓜蒂散中風門在腸胃滾痰丸見下在經絡及四肢皮裏膜外姜汁竹瀝在脇下白芥子二陳湯治一身痰或導痰湯或隊痰丸或神朮丸並見下或潤下丸見後或却痰丸補遺或清膈化痰丸附餘外受風邪火伏肺中咬咬欬不止雞蘇水梅丸補遺此皆

無常所乃至手痲臂痛狀若挫閃或眷中每有一掌如水凍之寒痛者或渾身青七如虫行者或眼胞浮腫痒口瘡舌爛甚為嗌閉等証又或連項結核似癧非癧或胸腹間如有二氣交紐噎悪煩悶有如烟氣上衝頭面而焚熱或為失志顛狂或為中癰腫或為勞瘵荏苒之疾或為風痺及脚氣之候或心下怔忡驚悸如畏人將捕或喘欬嘔吐或嘔冷涎綠水黒汁甚為肺癰腸毒便膿鬱結固詳不問虛實而以一峻藥攻之恐未中乎肯綮

治痰之要藥也

補遺雞蘇水梅丸

治痰少

雞蘇薄荷三兩　白糖霜八兩　柿霜四兩　紫蘇葉　烏梅姫去核　肥沙各五錢

白葛粉一兩　水片一分　煉蜜為丸

補遺抑痰丸

瓜蒌仁一兩　半夏泡二錢　貝母三錢

脈法

要略云脈双弦者寒飲也或大下後盖虛其脈偏弦者飲也○肺飲不弦但若喘短氣又云脈浮而細滑者傷飲○脉弦数有寒飲春夏難治脈沉而弦者懸飲内痛其人短氣四肢歷節走痛脉沉者有留飲陳無擇云飲脉皆弦微沉滑

老痰

老痰大率飲酒之人多有之酒氣上升為火肺與胃脘甘受火邪鬱滯而成故積久稠粘吐咯不出吞嚥不下用海石香附瓜蔞半夏貝母竹瀝薑汁梗青礞石五倍子之類生攻吉化痰丸附餘或潤下丸兩遺或貫衆石丸重在風化或云左右手關前脉浮弦大而實者膈上有稠痰也宜吐之而愈

病人百藥不効關上脉伏而大者痰也眼胞及眼下如炭烟薰黑者亦痰也

丹溪曰久得濫脉痰飲膠固脉道阻塞也卒誰得開必賴湧而成故積久方法

丹溪曰有熱痰有溫痰有酒痰有食積痰有風痰有寒痰有老痰

(一)寒痰用半夏(虛氏註曰凝結清冷其狀若寒非寒也去亦有用溫藥蓋寒因熱用使引導尤捍格也)

○痰結梗在咽喉欲嘔而不能出化痰藥加酸能軟堅之味如菱仁杏仁海石桔梗連翹少佐以升消若姜汁竭丸

(一)痰在脇下非白芥子不能達痰在四肢非竹瀝不行痰在腸胃間可下而愈痰之為物隨氣升降故無處不到

(一)脉浮當吐痰在膈上必用吐膠固稠濁必用吐痰在經絡中非吐不可吐中就有發散之義

(一)凡吐法宜先升提其氣用防風山梔川芎桔梗芽茶生姜之類或就以吐藥探吐吐時須先以布勒腰腹而於不通風處行之

○吐法用萋苔子半升擂和以漿水一碗去粗入少油與蜜溫服或用鰕半斤入醋葱姜等物料水煮先吃鰕後飲汁少時以鵝翎探吐其鵝翎須先以桐油浸而以皂角水洗晒乾待用如服瓜蒂藜芦等藥不用探

○燥濕痰星下

法自吐

○痰在胸膈間可下而愈

○痰結梗在咽喉欲嘔而不能出化痰藥加酸能軟堅之味如菱仁杏仁海石桔梗連翹少佐以升消若姜汁竭丸

(一)寒痰用半夏(虛氏註曰凝結清冷其狀若寒非寒也去亦有用溫藥蓋寒因熱用使引導尤捍格也)

丹溪曰久得濫脉痰飲膠固脉道阻塞也卒誰得開必賴湧而成故積久

賁調理

病人百藥不効關上脉伏而大者痰也眼胞及眼下如炭烟薰黑者亦痰也

或云左右手關前脉浮弦大而實者膈上有稠痰也宜吐之而愈

老痰

老痰大率飲酒之人多有之酒氣上升為火肺與胃脘甘受火邪鬱滯而成故積久稠粘吐咯不出吞嚥不下用海石香附瓜蔞半夏貝母竹瀝薑汁梗青礞石五倍子之類生攻吉化痰丸附餘或潤下丸兩遺或以鹽湯探吐後用四七湯吞滴門

補遺潤下丸

南星礬水煮透　枯黃芩去腐膜　川黃連各一兩　橘紅半斤以鹽五錢水拌浸濕炒焙　乾水焰煙　半夏二兩姜製　木之烝餅糊丸如

蠹言大每服五七十丸白湯下

風痰

風痰者溫在肝經致令風氣不足外邪凑之故半身不遂口眼喎斜筋掣語澁顛狂痿痺眩暈之病此風痰也治宜散之天麻白附牛黃星夏皂烏牙皂姜蚕天竺黃之類三生散或搜風化痰丸並補遺或青州白丸子或祛風丸並

附餘或千繙湯見下

皆治風痰之藥也丹溪以竹瀝姜汁入痰藥化風痰以稱瀝散吐風痰中風門

補遺三生散

川烏頭 白附子 天南星俱泡去皮各等分

姜三片煎服

補遺搜風化痰丸

楤角子 人參 姜蚕 白蘞 陳皮去白 天麻煨 荊芥各三分

半夏四分姜製

南星 半夏各半兩 海蛤粉三兩

右為細末姜汁浸烝餅為丸青黛為衣如梧桐子大每服五七十丸姜湯送下

○中和丸 治溫痰氣熱

蒼朮 黃芩 半夏 香附各等分

右為細末姜汁調神麯糊為丸如梧桐子大每服五七十丸白湯送下

○小胃丹 上可取胸膈之痰下可利腸胃之痰能損胃不食胃氣虛而少食者不可用

牛膝 蔥熟 去蘆 大戟長流水煮一晌 卓洗淨 晒乾用 芫花醋拌炒黑 勿焦 各一兩 大黃酒浸 再以酒煨 桂心 各半兩

右為細末弱丸麻子大每服十九溫湯送下

○墜痰丸 能利痰從數中出

枳實麩炒黑色 牛膝酒浸一宿 五味子 白蘞生 三兩

右為細末蒸餅為丸如梧桐子大每服五七十丸白湯下

鳳化硝 三錢 袋盛懸井中 一晝夜 出 研如散 入鍋煆黃

猪牙皂角去皮弦炙酥 一本有貝母三兩

右為細末竸丸如梧桐子大每服五十丸白湯下

青礞石丸 礞石 硝石 各等分

鷄鳴時服先見屎次見痰古方無硝石而用水丸分亦不調

青礞石丸 礞石 硝石 各等分

鳳化硝 三錢 袋盛懸井中 一晝夜 出 研如散 入鍋煆黃

青礞石 硝石 各等分

右為細末神麯糊入姜汁為丸如梧桐子大每服三五十丸姜湯送下此藥重在鳳化硝○一方加蒼朮五錢滑石一兩○一方无南星有白朮○一方有枳實炒黑色 牛膝酒浸一宿 五味子 白蘞生 三兩

大抵降上膈熱痰海粉熱痰能降溫痰燥頑痰能消

半夏湯泡 袋盛 黃芩 各五兩

辰砂半刀
末之姜汁浸蒸餅
丸如菉豆大辰砂
為衣姜湯下

火痰

熱在心経謂之火痰
火痰者痰因火盛也
治宜清火為先黄芩
黄連白朮青黛栝
蒌竹瀝薑汁之類
假其降火也痰火丸
附餘眩暈嘈雜火動
其痰二陳湯加山枝
芩連見下痰三呑酸
為〇道痰湯 治風濕痰等証

〇人中黄飯丸如菉豆大每服十数丸白湯送下能降陰
火清痰又治食積
〇凡火病陰火上升津液生痰不生血宜補血制相火其
痰自除血薬必用姜汁導送
〇痰成塊吐咯不出気欝治者難治
〇脾虚者清中気二陳湯加白朮之類兼用提薬
〇実脾土燥脾温是治其本
加引下薬上行
又曰二陳加升提之薬去使大便潤而小便長
陳皮去白 半夏湯泡七次 茯苓各一錢 甘草五分
右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞温
服如久嘔肺燥挑者去半夏加五味子九枚杏仁泥
五分

〇千緡湯 治風痰壅盛

半夏二錢 南星煨裂 橘紅去白 枳殻麩炒黄色 甘草炙 一錢
右細切作一服加生姜五片水一盞半煎至一盞温
服如久嘔肺燥挑者去半夏加五味子九枚杏仁泥
五分

〇利膈化痰丸

南星煨 半夏湯泡七次 皂角一寸去皮 甘草炙一寸
右細切作一服姜三片水一盞煎七分温服

痰因火上逆茶炙九
見下或二陳湯加南
星黄芩黄連青黛見
下火盛生痰者消下
九見前痰挾虫吐咯
不出者火盛則生痰清
膈化痰丸或清心化
痰丸並咽喉咳痰干
金花丸少熱門

補遺痰火丸

大黄四両酒蒸九
次後同黄芩人乳
竹瀝之蒸
黄芩四両水洪浸
一宿晒干酒蒸同

大黃又煮

桔梗去芦青木香各二錢五分
赤茯苓去皮
玄明粉各二兩
半夏牙皂姜汁煮
梔實各一兩半
山豆根陳皮
海蛤粉白朮
鍾乳粉若无以鳖甲代之各一兩
二术五分朋砂
天南星姜水煮
明礬飛过各一刀
礞石二兩廿草

南木香各七錢半
沉香研末为衣
人參各三錢半
焰硝二兩入礶火煅金色後水飛七次为衣用一兩
为末煉蜜丸以時溫水下忌酒及湿麪

補遺煉玄明粉法
芒硝十斤用井水一大桶將硝投入去滓入新鍋内慢火熬至微沸綿入麥白十斤冬瓜五斤豆腐三斤三味

每服五十丸姜湯送下

桔梗去芦青木香各二錢五分
赤茯苓去皮
玄明粉各二兩
半夏牙皂姜汁煮
梔實各一兩半
山豆根陳皮
海蛤粉白朮
鍾乳粉若无以鳖甲代之各一兩
二术五分朋砂
天南星姜水煮
明礬飛过各一刀
礞石二兩廿草

右為細末湯浸蒸餅和丸如梧桐子大每服三五十丸食遠温水下忌酒及湿麪

山楂煉法
山楂不拘多少去核切片焙乾為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸姜湯下

芫花醋炒
甘遂
大戟
右為細末以水一升半煮大棗十枚至八合去棗調藥末強人一錢弱人半錢平旦服之不下更加五分下後以糜粥調養之河間曰芫花之辛以散飲二物之苦以泄水其甘遂直達水氣所結之處乃泄水之聖藥也然亦有大毒人虛者不可輕用

治一切湿熱沉積成窠窠老痰

每服五十丸姜湯送下

○滾痰丸　治湿熱食積成窠窠老痰

大黃酒拌蒸
黃芩去朽各半斤
沉香五分
礞石硝煅黃金色一兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服三五十九量減丸數

治痰飲

生芝蘇五分用水二小盞研取漿汁
大棗十五枚煮研細
蒼木五分
右以蒼木焙乾為末煞後以芝蘇漿及棗肉和勻九

○神术丸

大每服五七九温湯下

除胸中熱利膈上痰

東垣○黃芩利膈丸

炒黃芩各一兩半夏
生黃芩
黃連各五分
大南星煨裂
枳壳麩炒
陳皮去白各三分
白朮二分
白礬五分

右為細末湯浸蒸餅和丸如梧桐子大每服五十丸姜湯下

澤瀉

黑丑半取頭末三兩

右為細末湯浸蒸餅和丸如梧桐子大每服五十丸姜湯下

治懸飲内痛

大戟

芫花

甘遂

右為細末以水一升半煮大棗十枚至八合去棗調藥末強人一錢弱人半錢平旦服之不下更加五分下後以糜粥調養之河間曰芫花之辛以散飲二物之苦以泄水其甘遂直達水氣所結之處乃泄水之聖藥也然亦有大毒人虛者不可輕用

治一切湿熱沉積痰飲變生諸病或風

俱切片投入硝水內煮一日去滓用磁器盛用紵布蓋露待其水結成芽子取下又露以待結盡為度次用荊芥半斤薄荷半斤用水一小桶將三味熬一日去滓將牙子入藥水內熬一日再濾去滓如前露取牙子焙度又用粉草四兩小紅棗半斤用水一小桶煮一日去滓如前露取牙子又用皂角煮水如前法取牙子取出所用後研為末每斤加生熟甘草各一兩和勻初服一錢漸至三錢春冬肝川芎黃芪芍藥湯下夏養心茯苓湯下四季養脾人參白朮湯下秋養肺茯苓桔梗湯下冬養腎肉從蓉烏頭湯下

隨圖造海蛤粉法

熱燥鬱支躰痲痺走注疼痛風痰延嗽氣血壅滯不得宣通若証人壯氣實者可服

大戟 芫花 各半兩 黑丑 二兩 取頭尾 甘遂 大黃一兩 輕粉一錢

右為細末滴水為丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫水下日三服加至快利利後須服至病根尽除為度痰結在胸膈間(○控涎丹 治虛胸背脇頸項及手足腰胯疼痛不忍舉引飲痛時時走易方是痰涎在胸膈間隨氣升降水紆經絡口低眼隔而大便不通誤認為膈痰者

甘遂去心 大戟去皮 白芥子 上三味各研細末糊丸如梧桐子大每服五十丸

右件各等分為細末淡姜湯下食後臨服量病人虛実加減丸数一方名妙應丸治驚痰加砂硃為衣痛甚者加全蝎酒煮雄黃全蝎驚氣痰成塊者加穿山甲燈心灰胡粟逢義木臂痛加木鱉子霜桂心熱痰加盆硝空痰加丁香胡椒肉桂

(○半夏丸 治肺熱痰嗽

瓜蒌仁 半夏 湯泡七次去皮臍 炒乾各一兩

右為細末和勻姜汁打糊為丸服

(○取竹瀝法 大治熱痰及能養益清熱若痰厥不省人事幾死者得竹瀝灌之遂甦誠起回生藥也

用水竹早筆竹(俗名雷竹蘇東坡曰淡竹苦竹為文斗除苦竹之外皆淡竹也我朋溪洗生有日只用哇二竹蓋取其勻齊中之最淡者以其苦味之甘淡也

紫口蛤蜊不計多少三月取炭火煅成粉收貯之候秋深待瓜菱熟時摘取連皮并子搗爛如泥和勻圓如鷄子大穿之懸透風處陰乾次年听用入藥研細入湯不宜細

食積痰

脾胃受傷宜温補下飲食不化痰易生而多者治宜消導如枳朮丸加半夏陳皮茯苓之類是治其本也或枳朮丸加減半夏麴內陽門脾胃虛者六君子湯加升麻虛損門內傷挾痰必用黄芪門木香皮半夏麦汁竹瀝傳送食積痰实者隆痰丸或蠲飲枳实丸並見下虛則補気藥若服胸膈停滯痰飲腹虛鳴食不消化或嘔逆梹榔散補虛食積痰飲湯总黄瓜蒌丸內

枳朮丸 治痰水氣壅盛癖塊吹噦嘔吐痰水澼注心腹痞悶不思飲食

白朮一兩 枳實麩炒半兩

右為末荷葉燒飯和丸如梧子大每服五十丸白湯下

附餘○青州白丸子 治風痰壅盛癖塊吹噦嘔吐痰水澼注心腹痞悶不思飲食

白附子 半夏水浸過 南星各二兩 川烏去皮尖臍各生用半兩

末之以生絹袋於井花水內搖出末更以手捏令出以粗更研再入絹袋搖尽為度放磁器中日晒夜露每日一換新水擠而復澄春五夏三秋七冬十日去水晒乾研細以糯米粉清粥為丸如菉豆大常服二十九生姜湯下不拘時

猪牙皂角 礬金各一兩

末之蒸餅糊丸梧桐子大每服三十丸食前茶湯下

附餘○清膈化痰丸

川連炒 栝蔞各一兩 川黄栢炒 山梔各半兩

截長二尺許每段劈作四片以薄磚二塊排定將片架於磚上兩頭露一二寸下以烈火迫之兩頭以盛瀝六分中加姜汁一分服之熱痰甚者止可加半分耳

取荆竹瀝法 竹瀝治熱痰功勝温但不補耳

附餘○王汝言化痰丸

黄芩酒炒一兩 天門冬去心一兩 桔梗去皮 連翹各五錢

海蛤粉另研二 瓜蒌仁各二錢 香附鹽水制炒五錢

末之煉蜜入生薑汁少許和如黍米大淡姜湯下六十九愚按天門冬黄芩瀉肺火海蛤芒硝咸以軟堅也瓜蒌潤肺降痰香附開鬱降氣連翹開結降火清黛解鬱火故皆不同辛燥之藥

補遺積柳散
杏仁去皮尖炒 旋覆花去枝梗 半夏湯泡二次 枳殼炒 乾姜 橘紅 桔梗炒各一兩 人參 甘草各五錢 每服四錢 姜五片水一鍾煎至七分温服

濕痰

肥人多濕多痰蓋濕勝則生痰多見身軟而重倦怠痰夠泄利腫脹之症燥濕焉先着术白术海粉半夏南星陳皮濕痰之要藥也青礞石丸見下 濕痰盛而急者千緡湯見下 丹溪治濕暖而急油炒半夏粥丸 姜湯下白濁因濕痰者珍珠粉丸補遺温熱蒸風執中和丸或星夏丸或小胃丹並見下

附餘〇清氣化痰丸 半夏湯洗七次 陳皮去白 茯苓去皮各一兩半 甘草炙一兩 荊芥穗炒五錢 黄芩酒炒 連翹 薄荷葉 梔子仁炒 右為末姜汁煎水打糊為丸如梧桐子大每服五十丸食後臥時薑湯下 附餘〇茱萸丸 吳茱萸一兩煮半日 陳皮 蒼术米泔浸各一兩 右為末姜汁煎水打糊為丸如梧桐子大每服五十丸食後臥時薑湯下 各一兩按此方即二陳湯與涼膈散相合是也蓋痰因火動故作胸膈痞滿頭目眩昏今因二陳以活痰利氣涼膈以降火散風熱何病之不瘳哉 治胃中伏痰晝飲噫氣吞酸

黄連二兩陳壁土炒 黄芩一兩 半夏末之神麯糊丸豪豆大每服二三十九食後津液下 海藏五飲湯 一留飲心下二癖脇飲下三痰飲胃中四溢飲腸間上五流飲脇胃凡此五飲酒後傷寒飲冷过多故有此疾 陳皮 枳實 芍藥 旋覆花 人參 白朮 茯苓 厚朴 半夏 甘草 澤瀉 朱砂 仝胡 桂心各等 右剉每兩分四服水盞姜十片同煎六分取清温服 附餘〇丁香半夏丸 不拘時忌食肉先吟滋味等物因酒多加葛根蔔花砂仁 丁香半夏先和劑方治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噫氣心腹痞滿不思飲食 木香 丁香 人參 肉荳蔻

補遺珍珠粉丸
真蛤粉一斤
黃栢一斤炒赤色
末之滴水為丸如梧桐子大空心酒下百丸

酒痰

酒痰者多因飲酒大過有傷脾胃而生也或嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞滿手足戰搖飲食減少小便不利葛花解醒湯 內傷門或海藏五飲湯附餘或青黛瓜蔞丸或半夏湯並見下

寒痰

濕生腎經謂之寒痰脾胃宿冷又感風寒痰停胸膈嘔吐惡心吞酸噫氣其狀青色此寒痰也治宜燥之二陳湯加附子姜桂見下心腹痞滿不思飲食丁香半夏丸附餘

虛痰

陳皮去白各二錢半 藿香葉半兩半夏湯泡七次姜制三兩為末姜汁煮麵糊丸小豆大三四十丸姜湯下

○丹溪云二陳湯一身之痰無所不治但在上加引上藥在下加引下藥如偏頭痛在右本方加川芎白芷防風荊芥薄荷升麻之類在旧本方加四物湯亦並防風荊芥薄荷細辛蔓荊子柴胡酒炒芩之類頂加防風荊芥薄荷細辛蔓荊子柴胡酒炒芩之類頂痛者本方加川芎藁本升麻柴胡蔓荊子細辛薄荷等藥如痰在腰膀膝下墜痛本方加蒼朮防己木通萜萸辛離川牛膝之類○如痰在胸膈中作痛或痞滿本方加白朮神麯麥芽砂仁之類○如痰在脇下作痛或澼有聲本方加柴胡青皮川芎芍藥之類○如痰在胸背手足臂膊作痛者在上加防風羌活經絡中或胸膈下加防己牛膝木通之類冬月加烏附行經威靈仙在下加防己牛膝之類○如風痰壅盛喘急咳嗽不寧本方加防風羌活南星枳殼桔梗甘草之類○如熱痰為病腹脹喘滿本方加黃芩黃連梔子瓜蔞子滑石青黛竹瀝之類○如濕痰身重倦怠本方加蒼朮白朮南星之類○如酒痰本方加蒼朮白朮神麯麥芽之類○寒痰本方加乾姜附子益智草豆蔻之類○氣痰本方加木香枳榔砂仁枳殼烏藥香附之類○燥痰本方加瓜蔞杏仁杏仁貝母五味子之類○陰虛咯血痰嗽本方加天門冬麥門冬知母黃柏貝母款冬花紫菀馬兜鈴之類○如痰在中焦作噯氣吞酸胃脘當心而痛或嘔清水惡心等証本方多加白朮蒼朮神麯麥芽川芎砂仁豆蔻枳實朱砂澤瀉黃連吳茱萸枝子仁木香枳榔之類作丸服

痰症又有挾虛者不可不加補藥焉如挾氣虛加以四君挾血虛加以四物脾虛不進飲食但吐痰水治以六君腎水虛弱則心火上炎以致津液敗濁而為痰症六味地黃丸補腎逐水乃端本之藥也四方並見虛損門

○一尼姪婦何氏在室時四月間因多食青梅得痰飲病日間胸膈中入痛如刀錐至晚胸中痛止而脇髀大痛蓋痰飲隨氣升降故也一醫作胃寒脇乾姜良姜官桂烏附子沉香及煮胡椒粥間與病日劇加之口渴小水淋澁求予治診其六脈洪數而滑予作清痰處治令其急煮竹瀝服三日口不乾小水亦不淋澁但胸中與脇亦痛如舊用蘿蔔子汁研與半碗吐痰半升許至夜痛尤甚如前証毋溪所謂引動其舊症之勢耳次日用人參蘆一兩逆流水煎服不吐又次日與苦參煎湯服又不吐又與附子尖梔芩皆不吐一日清晨啜芦未一錢入射香少許酸漿水調與始得大吐至次日天明吐方定前後得頑痰及稠飲一小桶許其痛如此脫後以軟粥將理而安

外因

冬月感受風寒外來邪傷肺也宜汗之麻黃湯傷寒門若自汗增寒熱煩燥眼中迎淚鼻引清涕鼻息聲重咳而脈浮者此邊風也參蘇飲加桑白取汗或消風百解散並傷寒門口呷無汗惡寒心煩渴咳嗽而脈急者此感寒也

咳嗽門

論

內經曰五臟六腑皆令人咳非獨肺也皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也五藏之咳咳久乃移於六腑間曰咳謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂有痰而有聲蓋因胃無聲而有痰脾濕動而生痰也咳嗽者秋傷於濕積於脾也故內經又曰秋傷於濕冬必咳嗽大抵素秋之氣宜清肅反動之氣必上衝而為咳甚則動於脾濕發而為痰焉又曰寒暑燥濕風火六氣皆令人咳惟濕病痰飲入胃留之而不行止入于肺則為咳嗽假令濕在心經謂之熱痰濕在肝經謂之風痰濕在肺經謂之寒痰

二陳湯加麻黃桔梗杏仁痰飲門或橘蘇湯或紫蘇飲子流附飲或冷沸草散傷寒門或華蓋散或五物湯並補遺或溫肺湯或三拗湯並見下卷

咳者寒包熱也宜細辛半夏生姜辛以散之寒熱往來而嗽小柴胡湯倣寒門久嗽風入肺烟筒哈之見下

補遺華蓋散　治肺感寒初咳嗽聲重

胸悶頭目昏眩　紫蘇子炒　赤茯苓　陳皮去白　桑白皮　杏仁去皮尖炒　麻黃去節各一兩　甘草炙半兩

右為末每服二錢水一盞煎七分食〇風寒者舉發散行痰二陳湯加麻黃杏仁桔梗之類後溫服

補遺五拗湯　治風寒咳嗽肺氣喘急　麻黃　杏仁　生甘草　荊芥穗　桔梗各等分

右姜三片水煎溫〇聲嘔為寒感寒咳嗽加黃芩生姜

為患不同宜隨証而治之是故欬而無痰者以辛甘潤其肺大歛治欬嗽者當以治痰為先治痰者必以順氣為主是以南星半夏勝其痰而咳嗽自愈枳殼橘紅利其氣而痰飲自降痰盛而能食者小承氣湯微下之痰盛而不能食者導痰湯或滾痰丸主之

脉法

肺脉微急為欬而哇血　肺脉緊者為肺寒　双弦者寒熱嗽小柴胡加石膏知母冬月嗽而發寒熱謂之寒嗽小青龍湯加杏仁此治法之大要也孝者不可不知

肺脉浮而數為欬而哇血　肺脉緊者為肺寒　双弦者寒熱嗽小柴胡加石膏知母冬月嗽而發寒熱謂之寒嗽小青龍湯加杏仁此治法之大要也孝者不可不知

肺脉浮而緩者傷風　脉細者濕熱嗽小柴胡加石膏知母冬月嗽而發寒熱謂之寒嗽小青龍湯加杏仁此治法之大要也孝者不可不知

肺脉浮而緊者為虛寒　脉沉數為實熱　脉弦為水飲　脉沉為哮飲　洪滑多痰

欬脉浮直者生　脉浮濡者生　脉緊者死　沉小伏匿者死　欬而脫形發熱脉小堅者死　欬而巔疲脉堅大者死　九肌瘦脫形熱不去欬嘔腹脹且泄脉弦急者皆死証治

方法

丹溪曰欬嗽有風寒有火有勞有痰有肺脹

如芥子大空心清米飲下三十九

右為末糊為丸生姜切作薄片焙乾為末糯米糊為丸

熱而欬此言宜細辛半夏生姜辛以散之

服喘急者前熟○風入肺久嗽者用
加荊芥少許一方
去桔梗荊芥用半
夏枳实等分

火嗽

火嗽者氣動火炎久
嗽无痰脉数燥煩稠
粘涕嗽此傷熱也治
以清熱潤燥爲先古
人參平夏允在所禁
如久連山桅天麥門
冬知母貝母石膏瓜
蒌之類可也人知肺
主皮毛外感風邪爲

○治嗽煙筒用鵝管石椎黄款花佛耳草爲末以鷄子清
刷脣上捲藥末作筒燒烟以口嘬吸烟入喉姜湯送
下

○喘嗽遇冬則発此寒包熱也解表熱自除

枳殼　桔梗　陳皮
甘草　紫蘇　木通　黄芩各等分

如嚴寒去黄芩加杏仁半錢

○感冷則嗽膈上有痰二陳湯加炒殼黄芩枯梗蒼术麻
黄不通生姜

○火者主降火清金化痰黄芩海石瓜蒌青代桔梗半夏
香附詞子青皮之類(戴氏曰有声痰火面赤是也)蜜丸嚼化

○乾欬嗽者係火鬱之甚雖治乃痰鬱火邪在肺中用苦
梗以開之下用補陰降火不已則成劳須行倒倉法
此証不得志者有之

○有痰因火逆上者必先治火然亦看痰火孰急若痰急
先治痰而後降火也

○劳者主補陰清金四物湯加竹瀝姜汁(戴氏曰溢于出多痰多作宗熟是也)

○阴虚火動而嗽四物合二陳順而下之(加炒黄柏如母无効)

○阳虚欬嗽或吐紅者四物湯加知母黄柏五味子人參
麥門冬桑白皮地骨皮

○好色之人元気虚弱咳嗽不愈瓊玉膏最捷

○肺虚甚者人參膏以生姜陳皮佐之有痰加痰藥此好
色脊虚者有之

宜殊不知得裏證又
変爲熱也況肺爲華
蓋而五臟六腑火自
内起重蒸焚灼作欬
嗽者多矣故上半日
嗽多者宵中有火知
母石膏湯之或凉膈
散火熱門午後嗽多
屬阳虚其気自下而
上多重於阳分宜滋
阳降火四物湯加知
母黄柏門冬五味或
百花膏補遺黄昏嗽
多者是火気浮於肺
不宜用凉藥以五味

五倍斂而降之或貝母散補遺或百藥煎附餘五更乃早晨嗽多者此胃中有食積至此時火氣流入肺中以致咳嗽宜治積降火而咳自止以山查麥芽消積知母地骨皮降肺火麟肺有声无痰用苦梗開之後用四物湯加栝山梔竹瀝黃芩或洗肺散去半夏加知母貝母附餘火嗽痰三陳湯去半夏加貝

○久嗽劳嗽用知母貝母各一兩以巴豆同炒黃色去巴豆再用白礬白芨各一兩為末以生姜一片蘸藥舐時嚥化藥尽嚼姜噬之麥門冬陳皮阿膠珠各等分蜜丸嚥化又方有人參五味子

○欬嗽声嘶者乃血虛受热用青代蛤粉蜜調服之

○医說內一方治痰嗽用蚌粉新瓦上炒通紅拌入青代許以淡蒸水滴入麻油数點調服

○痰者主谿痰載氏曰痰動便有痰出来止見也

○痰多喘嗽白本半夏各一兩知母貝母各一兩桔梗各二兩知母一兩拌炒為末生姜汁浸蒸餅為丸服

○一方黃芩一兩半酒洗白芥子去殼滑石各五錢貝母南星各一兩烏化硝二錢半姜汁浸餅為丸青代為衣

○痰多喘嗽白本半夏各一兩黃芩五錢

扁瓜蒌青黛山梔炒黃芩桑白皮痰飲門

補遺百花膏 治喘咳嗽不已或痰中有血

百合蒸焙款冬花等分為末煉蜜丸龍眼大每服一丸食後細嚼姜湯下嚥化尤佳

補遺貝母散 治咳嗽多日不愈

貝母去心五味子甘草各半兩

知母一分五分

為末姜汁調麪糊為丸服

○痰嗽因酒傷肺瓜蒌杏仁俱杵如泥黃連為末以竹瀝入紫蘇葉煎甫入韭汁調丸服○一方用青代瓜蒌蜜丸嚥化以救肺

○久嗽有積痰滯肺脘中如膠氣不能升降或挾濕與酒而作茜根俗名過山龍童便浸僵蚕砂海粉瓜蒌仁蜂房杏仁神麯為末姜汁竹瀝調嚥化

○痰嗽氣急蒼术三兩香附一兩半蘿蔔子蒸杏仁瓜蒌仁半夏一兩黃芩茯苓各五錢川芎三錢丸服

○嗽而有痰宜灸天突穴肺腧穴以泄火熱瀉肺氣

○食積痰嗽發熱半夏南星為君瓜蒌蘿蔔子為臣青代海石礬為使姜汁浸餅丸服

○食積痰嗽三補加二母炒為末丸如椒核大以竹瀝調

款冬花二兩　桑白皮五斗　杏仁三兩去皮尖
每服一兩姜三片食後服

痰嗽

嗽動有声有痰乃出嗽止者此乃秋傷於濕積於脾脾濕動而生痰故謂之痰嗽治宜燥濕清熱不可一味苦寒折之千緡湯或隨痰乃痰飲門有人面青白黃色不常面上如蠟此路一黃一白者是食積也食積停痰亡氣上升以致咳嗽只治其痰消其積而咳自止不必用肺藥以治嗽也枳朮丸加橘皮半夏各一兩甚則保和丸並內傷門痰因火動逆上作嗽者先治火黃柏知母黃芩黃連之類清肺滋陰降火後用瓜蒌貝母青黛海石天花粉治痰或消痰抑火平氣化黃丸

汁吞之三補丸連柏也二母知貝母也戴氏曰動則喘滿氣急自重者是也

○肺脹者主收斂戴氏曰動則喘滿氣急自重者是也
○肺因火傷極遂成癰過脹滿用訶子為君佐以海粉香附青代杏仁之類
○肺脹抑滑不得眠者難治
○凡嗽春是春升之氣夏是火炎於上秋是溫熱傷肺冬是風寒外來用藥發散之後必以半夏等藥逐去其痰度不再作

已上皆川溪法○嗽而失声潤肺散

訶子　五倍子　五味子　黃芩　甘草　各等分
右為細末蜜丸噙化

河間○嗽而無声有痰半夏　白朮　五味子　防風

枳殼　甘草
河間○嗽而有声無痰
生姜　杏仁　五味子　升麻
防風　桔梗　甘草
河間○嗽而有声有痰半夏　五味子　防風
白朮　甘草
久不愈加粟殼阿膠珠
○陰氣在下陽氣在上欬嗽嘔吐喘促瀉白散加青皮五味子人參茯苓粳米
○熟嗽胷滿小陷胸湯方見傷寒門
○治嗽初藥五味子湯
五味子五分　甘草二分半　五味子　風化硝各一分
右為末蜜丸噙化或用訶子百藥煎芥穗蜜丸噙化

補遺治咳抑火平氣

牛黃丸 治咳火

天南星擇嵓白者 井草湯洗淨炒另 研爲末二兩用白 蠟五分爲末生姜二

兩搗取汁入水 一盌煎至水 半盌去滓 ○瓊玉膏 治虛勞乾咳嗽

用皮拌晒丸成餅 蒸半日復入黃柏 末一兩同研勻又 飯上蒸一飧再研 極細

明天麻末一兩川 大黃末二兩用豬 牙皂角五錢煎汁 調天黃二味同成 餅紙包濕煨火頃 取牛黃二分玄明 粉一兩同研又末 和研勻搗梗米糊 爲丸

人參咳嗽門 四

○治嗽最要分肺虛肺實若肺虛久嗽宜五味子款冬花 紫菀馬兜鈴之類補之若肺實有火邪宜黃芩天花 粉桑白皮杏仁之類以瀉之

○東垣曰治嗽必用五味子為君然有外邪者驟用之恐 閉住其邪氣必先發散之而後用之可也

○治嗽用訶子味酸苦有收斂降火之功五味子收肺氣 乃火熱必用之劑杏仁散肺氣風熱然肺實有熱因 於寒者為宜桑白皮瀉肺氣然性不絕良用之多者 當戒

或用馬兜鈴以其去肺熱補肺也多用生姜以其辛 能發散也瓜蒌子并能補肺潤肺降氣胸中有痰者 以肺受火逼失降下之令金得并緩潤下之功則痰 自降宜其為治嗽之要藥也

白砂蜜 五斤煎 滴法滴之

白茯苓 去皮净者 二十五兩

生地黃 去芦净 內杵爛 取自然汁大盌盛 沉香五錢

琥珀五錢臘仙 共為細末 右以人參茯苓沉香琥珀俱為細末先將地黃汁與 白砂蜜攪勻用密絹攞去細相入藥末攪勻入好磁 瓶或銀瓶內川綿紙十數層外加箭箬包封扎瓶口 入砂鍋內或銅鍋內以長流水浸沒瓶頸用桑柴文 武火煮三晝夜取出換蠟封數重包扎瓶口浸沒井 中半日以出火毒提起仍入前鍋內煮半日以出水 氣然後收藏每日清晨及午前後取一二匙用溫酒 飲酒人白湯亦可此法須用不聞鷄犬

右用滑石粉加此
硃以研極細爲衣
食後白湯下三十
丸夜臥時五十丸
痰火腸潤減服

肺脹

肺脹嗽者動則喘滿
氣急宜臥或左或右
不得眠此痰挾瘀血
礙氣而病宜養血以
流動乎氣降火疎肝
以清其痰四物湯加
桃仁紅花訶子青皮
竹瀝姜汁處須門肺

聲処煆煉之及不許孝子婦人見之

細〇九仙散　治一切咳嗽久嗽乃擊其惰歸臭之藥也

人參　款冬花　桑白皮　桔梗　阿膠炒成珠子　五味子各一錢　烏梅一个　貝母五顆　粟殼去穰蒂蓋蜜炙二錢

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞温服

局方〇三拗湯　治風寒咳嗽喘急

麻黄不去根節　甘草生用　杏仁不去皮尖研細各一錢半

右細切作一服加生姜五片棗二枚水一盞半煎至一盞温服

一盞温服痰滑乃止

局方〇温肺湯　治肺感寒邪咳嗽吐痰

半夏泡　陳皮去白五味子　乾姜　桂心各五分　杏仁去皮尖　阿膠炒成珠子　甘草炙各二分

右細切加生姜三片大棗二枚水一盞半煎至一盞

氣上衝喘咳痰涎熱
熱往來盜汗羸弱夏汤
補虛氣充胸膈煩悶
大便不利者此陰氣
在下陽氣在上馮內
散咳喘悶嗽而脇痛
者宜疎肝氣二陳湯
加青皮陳皮香附貝
母薑汁炒飲門一云
實者白芥子之類喘
而心煩不安者六一
散加辰砂中暑門若
肺燥者桔梗大力知
母爲末鷄子清以潤
之

去柤温服愚按此方乃冬月寒冷之時觸冒寒邪而
未鬱熱者極効如久咳鬱熱者切不可用

局方〇杏蘇飲　治上氣喘咳面目浮腫

紫蘇葉七分　五味子　大腹皮酒洗淨　烏梅肉
杏仁泥各五　陳皮去白　桔梗　麻黄去根節
桑白皮蜜炙　阿膠炒成珠各半　紫菀洗焙乾各三分　甘草炙二分
右細切加生姜五片水一盞半煎至一盞温服

附餘〇橘蘇湯　治傷寒咳嗽身熱有汗惡風脉浮数有熱
服杏子湯不得者

紫蘇葉　杏仁去皮尖各二兩　甘草炙半兩　桑白皮炒　貝母去心　五味子各一兩　半夏洗七次

每服四錢水一盞姜五片煎七分温服不拘時

附餘〇紫蘇飲子　治脾肺虛寒痰涎咳嗽

白木　橘紅　

補真金鎖掣夏湯
治痰軟痰延寒熱
久不止
桑白皮一兩半
陳皮去白五味子
紫菀盲紫蘇
半夏湯泡各五錢
杏仁一兩炒
每服五錢姜三片
煎白進三服

肺虛

虛損咳嗽蓋由火克肺金成之者傷其精則陰虛火動耗其血則火亢而金鬱人身之血猶水也血之妄竟非陰虛者精也不謹慾者縱其慾而快其心則精血滲漏故臟腑津液漸燥則火動薰肺而生痰因其燥則痰粘於肺管不利出故嗽而声乾厚乎精乏則陰虛陰虛則相火衝肖而妄飲爲涎也二火煙膈則痰涎返上胃腑不利則多嗽声盖痰因火動嗽因痰起色黃爲有

紫蘇葉　桑白皮　青皮去白　五味子
杏仁　麻黃　甘草　陳皮各五錢
人參　半夏湯泡各二錢
每服一兩生姜三片水二盞煎八分食後温服

附〇洗肺散　治咳嗽痰盛肺氣不利
黃芩二錢　半夏三錢天門冬去心麥門冬去心
五味子各一兩半　甘草半錢　杏仁去皮心
右水一鍾生姜五片煎至七分食後服

附〇利膈丸　拔萃方治風痰實喘滿咳嗽風氣上攻
牽牛四兩生半夏湯泡二　木香半兩　青皮去白一兩
梔角一兩炒皂角去皮炙一兩弦酥加栀柳大黃各五錢
右為末姜麪糊丸梧桐子大每服五十丸生姜湯下

附〇星香丸　治諸氣咳牛痰

半夏三兩用白礬二兩研末浸二宿天南星三兩用生半夏同浸礬水一鍾
陳皮五兩汁浸炒白三兩香附子三兩皂角水浸一日炙黃
右四味不見火為末姜汁糊丸梧桐子大每服五十丸臨卧姜湯下

治痰咽乾敲不出

附〇人參清肺散
人參一錢半陳皮一錢半夏一錢　桔梗一錢
知母一錢　麥門冬五分五味子十个伏苓一錢
甘草五分　地骨皮五分枳殼一錢　貝母一錢半
杏仁一錢　薄荷七分　黃連一錢　桑白皮一錢
右水煎生姜三片食後服

附〇人參潤肺丸
人參　山藥　蓮肉　款冬花　杏仁去皮尖
蛤粉各一兩　藕節五丙紅棗去核半斤大蘿蔔一个煮熟

氣可治狀如品流白
沫者為定氣潮極
也急扶陽利定神救
胃一線命乎人則當
生津養血得復其火
自平如療這等咳嗽
毋高速效宜早服補
陰丸以培於下虛炎
門晚服潤肺湯以和
其中補遺無以請化
潤下丸清乎其上傷
寒門或嗽主膏見下
或人參潤肺丸或人
參紫菀湯附餘若能
以絕慾忘機庶我望

附餘〇人參紫菀湯 治上焦氣不調咳嗽喘急久不愈者

五味子 二十五粒半 杏仁 半兩 人參 紫菀
甘草各二錢 款冬花半兩 杜枝 三分半
罌粟殼去穰蜜製 繖仙各一

右為末藥內先梧子大每服五十丸白湯下食後

附餘〇人參潤肺湯 治肺痿證咳嗽有痰午後熱并散風

人參去芦 甘草 阿膠各一錢 茯苓一錢半
柴胡四錢 五味子 貝母 杏仁仙
桔梗炒 枳实各一錢半 桑白皮二錢

右細剉每服八錢薑三片棗一枚水一盞煎八分食後温服

附餘〇知母茯苓湯 治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

茯苓 甘草炙各一 知母 五味子
人參去芦 薄荷 半夏洗七次 柴胡去苗
白术 款冬花 桔梗 麥門冬去心
黄芩各半兩 川芎 阿膠炒各三分

右細剉每服一兩水二盞姜五片水酒煎八分食後

附餘〇宁肺益氣湯 治久嗽及肺痿等証

白芨 桔梗 小訶子 青木香各七分
紫菀 百合 知母 貝母
人參 當歸 款冬花 生地黄各一

生甘草 二分 御米殼一兩用七細剉三分煎
右水一盞煎半日客熱用
白湯送下

痰行則氣知杯
水而救車薪之火
焉能以撲滅哉
補遺滋陰潤肺湯

人參 不用黄連
五分前汁浸去連

天門冬去心
麥門冬去心
懷生地黄酒洗
紫菀酒洗知母
百合 歸身
白术各一錢
五味子十二粒
生甘草 陳皮
川栢酒炒各五分

貝母去心八分
白茯神去皮六分
右水一鍾煎至七分食後分作二次服○如嫩痰不密而有汗者加黃芪一錢倍五味子十二粒○痰中有紅色者加牡丹皮一錢枯竹瀝茯苓酒炒一錢○漸成勞瘵脚手心熱或骨肉蒸熱加地骨皮二錢秦艽一錢柴胡七分

○丹溪活套云二陳湯治咳嗽去痰伐病根之藥也除陰虛血虛火盛欬嗽吹嗽者勿用○如血虛有痰者本方合四物湯加五味子麥門冬瓜婁仁之類○如傷風邪咳嗽本方加南星枳殼防風荊芥前胡細辛旋覆花之類○如傷寒邪咳嗽本方加麻黃杏仁桔梗乾姜桂枝之類○如傷熱邪咳嗽本方加黃芩薄荷知母石膏桔梗之類○如先傷風寒鬱熱久嗽不已欲成勞者本方加知母貝母欵冬花紫菀五味子天麥二門冬馬兜鈴當歸生地黃之類○如傷寒風喘嗽並作本方加麻黃杏仁防風荊芥枳殼桑白皮桔梗地骨皮紫蘇之類○如吹嗽聲方嘶引胸脇痛不可忍者本方加芎歸芍藥青皮柴胡竜膽黃芩竹茹之類○如年久喘嗽遇風寒則發作者本方加紫菀

肺痿

原夫咳嗽甚至於肺痿而痿及咽喉破漏蓋必因本元真臟之氣薄人又不知求本之治所致然升麥辛燥發表則以降氣導痰攻火速效之藥治之故陰虛火熾焰熏肺葉而成此真病矣其脈數虛滴治法宜用保生地當歸身以滋其血人參黃芪以補其氣天麥門冬潤肺除嗽飲治遠年咳嗽如神

欵冬花桑白皮杏仁五味子知母石膏之類○不問風寒暑熱勞嗽久嗽魯先服麻黃杏仁防風等藥病雖退減而病根未除者本方加粟殼烏梅阿膠五味子瓜婁仁之類可一服而愈○凡諸嗽須分氣虛氣實新久用藥如新咳嗽挾虛者可用人參風寒邪盛者亦不可用如久嗽已虧熱者切不可用人參反增喘滿嗽劇如肺虛久嗽加五味子欵冬花紫菀並馬兜鈴之類以補之若肺實而有火邪者宜桑白皮片黃芩天花粉杏仁枳殼桔梗之類以瀉之

○祖傳經驗潤肺除嗽飲治遠年咳嗽如神

人參　生甘草　薄荷各三分
欵花　麻黃　紫菀茸　陳皮去白
桔梗　半夏　石膏粉　枳殼麩炒

肺而生津知母苦寒滋陰而抑火白木甘草消痰以健胃前胡片芩清肺而去熱紫菀百合以理咳嗽覩人品大小合用藥劑分兩輕重可也或涎陰潤肺汤見前或人參養肺湯或知母麥冬湯或導肺益氣湯並附餘

桑白皮蜜酥炙 栗殼去穰 五味子九粒 烏梅名五分
右細切生姜三片細茶一撮水一盞半煎至一盞服

○祖傳三聖丹治久嗽極効

天南星煨裂 半夏湯泡七次 甘草生用 各一兩半

先以星夏二味研為細末用生姜自然汁拌勻盒作
麵春秋七日冬十日夏五日取出再同甘草共研為
細末別取淡竹瀝一碗將前藥末用竹瀝拌勻捏作
餅子焙乾又將竹瀝沃温又焙乾如此沃焙十數次
待竹瀝盡為度研為極細末用白沙蜜調如湯每臨
卧拗一匙於口內噙化下再用竹瀝淡口嚥之

哮喘指南

痰喘

痰喘有喘動喉中便有痰聲宜先降氣降則痰自清也四磨湯附餘或二母湯補遺一更時服消痰抑火平氣牛黄丸咳嗽門痰上逆而喘者千緡湯或導痰湯或搜風化痰丸並痰飲門陰虛痰喘者四物湯加枳殼羊夏補陰

哮喘門

論

内經曰諸逆衝上皆屬於火又曰夫起居如故而息有音者此肺之絡脉逆也河間曰火氣甚為夏熱寒為冬寒故病寒則氣衰而息微病熱則氣盛而息粗又寒水為陰主乎遲緩熱火為陽主乎急數是以寒則息遲氣微熱則息數氣粗而為喘也大抵哮以聲響名喘以氣息言夫喘促喉中如水鷄聲者謂之哮氣促而連屬不能以息者謂之喘雖然未有不由痰火內鬱風寒外束而致之者與外有陰虛發喘氣從臍下起直衝清道而上者又有氣虛發喘而短氣不能以接續者是故知喘之為証有實有虛治法天淵之隔者也若夫損不足而益

降火虛損門

補遺二母湯　治嗽滿氣喘膈吞微乾貝母甘草湯洗淨知母蜜湯浸去皮各三錢　人參　枝子炒　枯梗　天門冬去心　麥門去心川歸　玄參　枯梗　天花粉各二錢　生甘草三分　雞蘇薄荷七分　石水一鍾煎至七分食後溫服

有餘者醫殺之耳學者不可不詳辨焉

脈法

喘急脈滑而浮者生　滿而數者死

脈宜浮遲不宜急疾

脈數有熱喘咳吐血上氣不得卧者死

上氣面浮腫有息脈浮大不治又加刺尤甚

上氣燥而喘者為肺脹欲作風水發汗則愈一云效而上氣肺脹其脈沉心下有水氣也要略千金外臺作浮寸口伏胷小有逆氣尺寸俱沉關上無有者苦心下喘

方法

丹溪曰喘氣者氣為火所鬱而罰痰在肺胃也有痰者有火炎者有陰虛自小腹下火起而上逆者有氣虛而致氣短而喘者

氣喘

氣喘者呼吸急促而無痰聲是也蘇子降氣湯諸氣門或均氣

八仙湯補遺曰問藥服順氣化痰丸附餘

夜間服清痰抑火丸傷寒門氣實因服補藥喘者三拗湯以瀉之咳嗽門陰虛氣喘者四物湯加陳皮甘草以降氣補陰芩藥須以酒炒虛損門上氣而喘者神秘湯附

○哮專主於痰宜用吐法亦有虛而不可吐者謹之

○治哮必使薄滋味不可純用寒凉藥必兼散表

載氏曰痰者凡喘便有痰聲火炎者乍進乍退得食則減食已則喘大緊胃中有實火膈上有稠痰得食墜下其痰喘則暫止稍久食已入胃反助其火痰再升上喘反火作俗不知此作胃虛治以導熟之藥以火济火也昔葉都督患此証諸醫作胃虛治之不愈後以導水丸利五六次而安氣短喘息者呼吸急促而無痰亦喘者是也

○痰者降痰化氣為主　火炎者降心火清肺金　陰虛火炎四物湯加枳殼半夏一云陰虛氣喘四物湯加陳皮甘草此少以降氣補陰芩藥須以酒浸日乾

○氣虛發喘以參芪補之而愈

○凡人喘未發時以扶正氣為主已發以攻邪為主

○火急甚者不可用苦寒藥火盛故也宜溫劫之劫藥用

餘外感風寒鼻息氣
喘汗痰延壅滯宜汗
之蘇沉十宝湯補遺
或瀉白散見下或祛
和煖衛湯附餘
補遺玉氣八仙湯
治気急嗽喘而不
息者
杏仁　方解石
各三不同研極細
知母三不麻黄
片苦參　生甘草
三味水拌濕透用
桔梗各一不
貝母一不用北細
辛三分煎湯拌炒
知貝二母
水煎食後温服
補遺蘇沉九薑湯
沉香湯磨二服用
紫蘇葉　麻黄
廣陳皮去白
桑白皮蜜炒
杏仁去皮火研
大腹皮甘草湯洗
已上各一不
薄荷葉七分
桂枝三分夏不用
右姜三片白梅一
个水一鍾煎七分

椒目五七錢研為極細末生姜湯調服喘止之後因
痰治痰因火治火
○千緡湯治痰喘不得卧人扶面坐數日一服而安方見痰門
○一方用道痰湯合千緡湯服
○一方用蘿蔔子二兩煮熟皂角五錢燒存性瓜婁仁海
粉南星用白礬入水浸一不半研細各一兩為末煉蜜為丸
啗化一方无南瓜婁海粉南星
○一方治喘而欬用
代皂角為末神麴丸姜湯送下一方有杏仁
○喘用阿膠須分虛實若久病發喘必是肺虛故用阿膠
人參五味子之類補之若新病肺實而發喘者宜桑
白皮葶力子麻黄杏仁之類瀉之東垣曰久欬鬱熱病未成膿者用
人參未知熱是

辛三分煎湯拌炒
知貝二母
水煎食後温服
補遺蘇沉九薑湯
沉香湯磨二服用
紫蘇葉　麻黄
廣陳皮去白
桑白皮蜜炒
杏仁去皮火研
大腹皮甘草湯洗
已上各一不
薄荷葉七分
桂枝三分夏不用
右姜三片白梅一
个水一鍾煎七分

○葶藶大棗瀉肺湯　治肺壅脹胸膈滿悶上氣喘急
身体面目浮腫等証
葶藶子不拘多少炒黄為末
煉蜜丸如彈子大
右以水三盞大棗十枚煎至二盞去棗入葶藶一丸
再煎至一盞温服之
○滌生葶藶散　治過食煎煿或飲酒過度致肺壅喘不
得卧及肺癰咽喉不渇浊涕腥臭
甜葶藶子炒　桔梗去芦　瓜婁子　升麻
意苡仁　桑白皮蜜炙　葛根各八分甘草四分
右細切作一服加生姜五片水一盞半煎至一盞服
○瀉白散　治大人小兒風寒傷肺喘急咳嗽
桑白皮一不　生甘草五分
地骨皮一不
右細切作一服加姜水煎服一方加防風荊芥各

食遠溫服微汗之

火炎上喘

火炎上喘者乍進乍退得食則減食已則喘大率胃中有實火膈上有痰痰得食入咽隧下痰喘即止稍久食已入胃反助其火痰再升上喘反大此有餘之喘也宜水丸利之脚氣門或枳桔二陳湯加黃芩黃連山梔痰飲門或過食前煩或飲酒過

七分半又方加麻黃杏仁各五分其効左捷

附餘○祛邪暖衛湯　治氣虛肺弱腠理後皮毛不密脊背常冷不任風寒暑一感冒即氣喘咳嗽

人參　廣陳皮　麻黃　黃芪
防風　杏仁　桔梗　當歸　蒼朮
甘草　薄桂各三分　桑白皮七分

半夏格一細辛右水一盞半生姜三片煎至七分食遠溫服稍平且住服又以六君子湯兼服順氣化痰九日間食後夜卧時服消痰抑火潤下九俱白湯送下如氣喘者加防風一錢粟殼分

附餘○順氣化痰九

明天麻兩　南星末一兩　貝母末一兩　製半夏末一兩

白礬一兩取金竹瀝半碗將前五味和勻生姜四兩絞汁又搗入井花水一碗又絞汁以湯鏃子盛汁滾湯鍋盪沸投入前五品末子攪如糊樣湯鍋內蒸煮一日入後藥研勻作三餅子用三盞盛之又在飯上蒸一飡

栀子　炒焦　山查肉　薄荷葉　真藕子　炒研
連翹　香附子　片黃芩　酒炒　白芥子　炒研
青黛七錢　薤白　枳實　麩炒　海石各一兩
豬牙皂角七挺末去筋皮

已上品味又同磨極細將前餅子和入衆藥末取麥芽粉四兩打稀糊和丸如菜豆大一樣如麻子大者一樣人之大小均可服也食後白湯吞下中風之痰小兒科驚風等証不省人事牙關緊者研入姜汁竹瀝加湯灌之

胃虛喘

胃虛而喘者搖肩擺項喘而不休此不足之喘也五味子湯加白朮補遺久病氣虛喘者氣不接續也生脈散加阿膠白朮陳

屢發喘不得眠者新生薑搗散見下

陰虛火盛有腎下火起衝於上而喘者宜補陰以降心火四物湯加知母黃柏枳殼黃芩虛損門

皮中暑門素有喘病遇寒而發燕寒熟徃來喘甚者補中益氣湯加麥門五味入附子三分虛損門

補遺五味子湯 治喘促脉伏而數者

五味子半兩　人參　生姜　麥門冬去心　杏仁泡去皮尖　陳皮各半兩　棗子二枚

作二服每服水二盞煎至一盞食後

附餘○神秘湯 上氣喘急不得安卧

陳皮　桔梗　紫蘇　人參各半分　五味子

水二盞煎八分臨卧温服

治感冒風寒氣喘或痰涎壅滯

紫蘇葉有香者一錢　沉香一分　水煎二服用　桑白皮蜜炙一分

薄荷葉七分　杏仁去皮尖研二錢　麻黃去節一分

廣陳皮去白一分　大腹皮洗一分　甘草炙半分

枯黃芩一錢　桂枝三分　夏不用

右水一盞半生姜三片烏梅一個煎七分食遠温服

不宜見風欲微汗之渣再煎

○祖傳經驗秘方治遠年喘急

桑木內蠹屯糞炒一升　羅服子炒　杏仁炒各半升　甘草二兩生用

共為極細末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服五七十

丸淡姜湯送下

○又方治哮喘用苧麻根和炒糖爛煮時時嚼嚥下永絕病根神効

○又方用猫兒頭骨燒灰酒調二三錢一服使止

○又方郭公苗刺根煎服即止而不發

○東陽一羽士年五十餘素有喘病九月間得發熱惡寒証喘甚洪脉盛而似实一醫作傷寒治而用小柴胡湯加枳殼陳皮等藥六月後欲行大承氣一醫曰不可當作傷食治宜用枳實導滯丸爭不决召予視之二醫皆曰脉實氣盛當瀉予為疹後睡之曰此火盛之脉非真實也視其短氣不足以息當作虛治而甩補中益氣湯加麥門冬五味子入附子三分煎服二貼脉收斂四貼而病輕減六貼病痊安

温服

短氣

肺氣太虛氣不能布息呼吸不相接續出多入少名曰短氣此虛之極也六君子湯加五味門冬虛損門

痰氣阻短氣導痰湯

痰飲門腎虛不能攝氣者補腎丸虛損門

看氣欲絶者則汗出如油喘而不休此六陽氣脫也不治

瘧症指南

外因

人於夏日避暑於風涼處閉其汗孔熱不泄作風瘧暑瘧皆當發汗風瘧屬少陽經病小柴胡湯加葛根升麻蒼木川芎傷寒門或草菓飲附餘暑瘧屬厥陰經病无汗小柴胡湯加葛根香薷湯加天花粉傷寒門暑瘧有汗煩渴柴胡白虎湯傷寒門或黃連香薷飲中暑門單寒者是陽氣虛陰勝干陽其脉弦遲表用五積散勝痛門和劑治中湯內傷門截用勝金丹附餘單熱是陰先絕風陽独勝其脉弦數表用柴葛鮮肌湯即小柴胡湯合葛根湯是也傷寒門和劑柴苓湯傷寒門截用七宝飲見下或萬安散常山生用附餘先寒後熱者是

瘧症門

論

內經曰夏傷於暑秋為痎瘧又曰先寒而後熱者名曰寒瘧先熱而後寒者名曰溫瘧其但熱而不寒者名曰癉瘧丹溪曰痎瘧皆生於風痎瘧者老瘧也以其陽二日一作纏綿不去古方多用峻劑恐非稟受怯弱與君病變重者必危　夫三日一作者邪入於三陰經也作於子午卯酉日者少陰瘧也作於寅申巳亥日者厥陰瘧也作於辰戌丑未日者太陰瘧也瘧得於暑當以汗解或因取汗太過汗欝成痰其初感也弱者即病胃氣強者伏而未動至於再感復因內傷其病乃作宜其難差夫感暑與風皆外邪也故非汗多不解今之瘧疾者已經再三劾試胃氣重傷何由得愈欲治此証必先與參朮等補劑為若加柴葛等發散藥漸而收汗得汗而虛又行補養下躰屬陰最難得汗補藥力到汗出至足方是佳兆又有感病極深邪氣必自藏傳出至府其發无時若發於午之後寅之前者血受病也為難愈須漸趲早亦佳兆也治則疾若春夏為易秋冬為難大忌飽食遇發日食飽病愈加重尤當以汗之難易較輕重也內經又曰瘧之且發也陰陽之且移也必從四末始陽已傷陰從之故先其時堅束其屬令邪氣不得入陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血者取之謂用三稜刺瀉孫絡出血直徃而未得併者也故今多以諸般草藥於臂膊內　縛之即此遺意耳外有陰虛証每日午後惡

先感於寒後感於風和瘧於皮膚之中寒爲陰氣風爲陽氣故寒多熱少表用十神湯傷寒門和解入參茶胃湯傷寒門截用四獸飲附餘先執後寒者先傷於風後傷於寒故熱多寒少表劑參蘇飲傷寒門和解清脾飲附餘截用常山飲或六和湯並附餘若初感發熱頭疼身重寒熱交作此挾外感似小傷寒之狀宜服疎和益氣解肌湯從外蠲舊邪起乃少陽領也經當從本治後服二木三仁鱉甲丸並補遺截用不二飲附餘補遺疎邪益氣解肌湯治瘧疾初感發熱頭疼身体拘急憎寒壯熱枯黃芩酒炒蒼术　知母　羌活各一錢　北柴胡一錢五分　乾葛　人參

瘧疾門四卷

寒發熱至晚亦而虛脉不大弦為亦耳若誤作瘧治而用恒山砒丹及柴胡乾葛芽藥多不至救醫者宜以脉証參驗其虛實而療之毋縱巨貼以殺人也

脉法

要畧曰瘧脉自弦弦數多熱弦遲多寒弦而小緊者下之瘧弦遲者宜温弦緊者可發汗針灸浮大者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之脉經云瘧脉自弦微則為虛代散則死

方法

丹溪曰有暑瘧有風瘧有温瘧有痰瘧有食瘧三日一發者受病一年間日一發者受病半年一日一發者受病二日住一日者氣血俱受病俗名脾寒乃因名而迷其實也苟因飲食所傷而得之未必是寒況其他乎

○暑瘧宜人參白虎湯之類

○有痰者二陳湯加恒山草菓柴胡黃芩

○不能食者必於飲食上得之當從食治

○虛者必用人參木一二貼托住其氣不使下陷後用他藥若無汗要有汗散邪為主帶補若有汗要無汗正氣為主帶散

○數發之後便宜截而除之久則發得中氣虛弱病邪已深而難治世有砒丹苛截藥有大毒不可輕用

○大渴大熱用小柴胡去半夏加知母麥門冬黃連黃栢

○梔子天花粉

○瘧渴用生地黃麥門冬天花粉牛膝知母炒黃栢乾葛

白茯苓　陳皮
防風各七分
黃柏去皮酒炒
甘草各五分
春加紫蘇一錢
夏加黃柏五分
麥門冬一錢
秋加薄桂一分
木瓜五分
右姜三片棗一枚
水一鍾煎至七分
乘熱服服下即納
熟烏梅湯半碗服
二貼後未愈則必
分形症歸瘧矣

凡治諸瘧
鱉甲洗刮净醋炙
酥脆三兩研取末
一兩　川常山
黃色者取末三兩
白术二兩炒取末
蒼术二兩炒取末
人參二兩取末
柴御二兩取末
知母二兩取末
黃芩二兩取末
羌活二兩取末
北嬴柴胡五兩取
末各取末一兩

生甘草
○久瘧二陳湯加川芎蒼术柴胡葛根白术一補一瀉藥也
○甚者發寒熱頭痛如破渴而飲水多汗可以參芪參連
梔子
○痰滯胸滿熱多寒少大便燥實大柴胡利之愈
○久瘧不得汗以二陳湯倍加蒼术白术少加柴御
○小兒瘧疾者有痞塊生地黃芩藥各一錢半陳皮川芎
炒黃芩半夏各一錢甘草二分加生姜煎調醋炙鱉
甲末
○瘧母用九藥消導之醋鱉甲為君三稜蓬术香附海粉
紅花神麯麥芽隨証加減為丸醋湯送下
青皮桃仁紅花蒼术白芷黃柏甘草煎露一宿服之
○老瘧係風暑入在陰分宜用血藥引出陽分而散川芎
撫芎當歸紅花蒼术白芷黃柏甘草煎露一宿服之

○疾瘧老瘧也三日一發啥經受病也夫瘧得於暑當以
汗解或取風汗令汗不得泄鬱而成疾又復嗜欲繼
飲及經試劫藥胃氣大傷其病雖愈必先虛參术陳
皮芍藥等劑佐以本經引用之藥若得汗而躰虛又
涙重神俟汗通身不過委中方是佳兆仍節飲食避
風寒遠房勞無不愈者

草菓　棯榔　知母　烏梅

川恒山　穿山甲慢火煨炸
灸甘草
右各等分細切每服五錢水酒各半煎至八分露
星月一宿清晨冷服之欲吐則順之忌熱湯一日然
恒山性暴悍善驅逐瘀飲大傷真氣病人稍虛弱者
戒勿輕用

烏梅三十个　官桂五分
右將各末并和復研勻候已上十二味藥粗淬用水八勉淨雄文武火煎至二勉時濾去滓將藥汁再熬至一碗半入粳米粉熟糊調前藥末為丸如梧桐子大用神砂為衣晒乾先服前劑未獲截效該日清早五更空心白湯吞三錢三分

○截瘧七寶飲

恒山一分　厚朴　青皮　陳皮
炙甘草　檳榔　草果仁　各半分
右細切作一服酒水各半盞寒多加酒熱多加水煎八分露星月一宿空心冷服忌熱茶湯一日至午食温弱

○東垣曰夏月天氣上行秋月天氣下行治者當順天道如先寒後熱太陽陽明病白虎加桂也此天氣上行宜用之若天氣下行則不宜瀉肺宜瀉命門相火則可矣亦有內傷冷物而作者當先調中後定瘧形治隨應見乃得康寧亦有久而不瘥者當求虛實以脉為期虛補實瀉可使欲卻疾此之謂也

太陽証令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熇熇然陽

忌鯽魚并煎炒生冷及黏心等物大人戒房月餘如

內因

惡飲食者必從飲食上得必胸滿噫氣柴胡二陳湯加山查枳實白朮神麴厚朴青皮小柴胡湯傷寒門二陳痰飲門內傷

外邪同發內必生瘀外以汗解二陳湯加柴胡黃芩常山草果疾飲門大抵無痰不

暍然熱止汗出難已羌活加生地黃湯小柴胡加桂湯

陽明証令人先寒洒淅寒甚又乃熱已去汗出喜日月光火氣乃快然桂枝二白虎一湯黃芩芍藥加桂湯

火陽証令人身体解倦寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚小柴胡湯

太陰証令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至則爭嘔嘔已乃衰小建中湯異攻散

少陰証令人甚悶嘔吐多寒熱熱多寒少欲閉戶牖而居其病難已小柴胡加半夏湯

厥陰証令人腰痛小腹滿小便不利如癃快數便思恐慢氣不足腹中悗悗四物玄胡苦練附子湯

活○白虎加桂枝湯　治温瘧

成瘧痰滿於中宜熱不已清脾飲加乾葛薑香芫胡去白朮用蒼朮附餘或導痰湯痰飲門脉滑者常山飲吐之附餘食積瘧胸脹痛紅丸子內傷門大柴胡湯下之傷寒門脾胃不足飲食不運六君子湯痞滿門虛甚汗多体弱補中益氣湯虛損門

虛瘧

虛人瘧飲食不進四肢无力汗多忿惰嗜臥六君子湯虛損門汗多煩燥而渴白虎湯加人參桂枝傷寒門汗多不煩渴柴胡加桂枝湯渴者去半夏人參加天花粉傷寒門載多元氣漸虛不思飲食汗多四獸飲附餘虛瘧日久不止宜養正氣不可截多服補中益氣湯白止虛損門或人參養胃湯加升麻三分柴胡黃芪各一禾傷寒

附餘○草菓飲

草菓 川芎 仁並 紫蘇葉 良姜

各等分水一鍾煎至七分溫服日進三次

附餘○万安散 濟生方

治一切瘴疾得病之初以氣壯進此藥以取效氣虛胃弱及妊婦不宜服之

蒼朮 川浸去皮炒 厚朴 姜制炒 陳皮去白 槟榔 恒山酒浸 甘草炙各一

右水一盞半煎至一盞露一宿當發前作二服忌熱

附餘○四獸飲 簡易方

治五臟氣虛喜怒不節致陰陽相賊結聚涎飲与衛氣相搏發於瘧疾

人參去芦 白朮 茯苓去皮 橘紅 草菓炙

知母四錢 甘草炙各一錢 石羔五錢 桂枝二錢 梗米一錢

右以水三盞煎米至二盞去米入諸藥再煎至一盞溫服三服汗出愈

治久瘧不愈

宝鑑○溫脾散 俗名金樓重

紫河車 菉豆略一合 甘草半兩 信砒一兩半研

右為細末入砒一處研勻每服半錢新汲水少許調下須於発日隔夜夜深服藥忌葷酒瓜菓生冷魚腥鷄肉等物三日孕婦勿服但至誠合此藥與人並不吐此雖有砒一味而有河車菉豆甘草三味及新汲水皆能解毒不妨

按已上二方劫病之捷勝於他方但虛弱或久病羸瘦之人終不可輕用如服上藥吐不止者以生菉豆細研新汲水調飲後即止

問或久法附餘

瘧

瘧者即久瘧也三日一發者受病一年先服加味柴苓湯三貼附餘當日服四相湯補遺二日一發者受病半年先服加味柴苓湯二貼當日服同前一日一發者受病一月先服加味柴苓湯一貼當日服同前午後或夜發者和解分前方加川芎 干夏湯泡棗子 生姜 烏梅去核 甘草炙各等分

右以鹽少許炮令香熟焙乾每服半兩水二盞煎六分未發前併進數服

附餘○清脾飲治瘧疾熱多寒少

柴胡一錢半 夏 黃芩 白朮 陳皮各一錢 厚朴 青皮各八分 草果六分 甘草四分

茯苓 生姜棗子煎服加酒恒山一錢梹榔五分知母七分名不二飲

附餘○六和湯

人參 知母 草果 貝母 烏梅

白芷 梹榔 柴胡各一錢 恒山二錢

右剉姜三片棗一枚酒水同煎露一宿臨發前一時服

當歸酒炒芍藥熟地黃酒炒知母各一錢酒洗紅花酒炒黃柏各四分提起陽分方可截之若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病前方加人參黃芪白茯苓各一錢以補氣川芎芍藥地黃當歸各一錢以補血或補中益氣湯虛損門後用四獸飲截之附餘

補遺四相湯

川常山 梹榔

附餘○恒山飲吐瘧

恒山三分 甘草炙半

末之每五錢水煎空心服得吐出痰自止吐後忌熱粥湯飲大棗一日

附餘○勝金丹截雷如神

川恒山酒煮四分 鷄心梹榔二刃

為細末醋糊丸如菀豆大未發前三更時先吞三十九五更吞五十九冷好酒下

附餘○不二飲截陰瘧老瘧神效

柴胡一錢二分 黃芩 知母 恒山酒煮焙乾各一錢

芍藥各五分 甘草三分 梹榔 青皮各五分

短水白酒二盞煎至八分去柤未發前五個時辰凉服忌熱湯茶飯一日只可吃温凉粥飯茶水

白茯苓　甘草

右等分酒半鍾水半鍾煮柳枝各七寸前至七分用花紅遲起露在星月下五更温服一盞火頃又服一盞藥盡為度前塩魚下免忌食物

瘴瘧　附瘧母

感山嵐瘴氣作瘧瘧香正氣散傷寒門後用四和截瘧丸補遺虛者人參養胃湯傷寒門後

瘧疾久不愈者作左脇下大如杯令人瘧黄寒熱不已宜行氣消堅為主黄芪醫鑑散　附餘或二十四氣丸内傷門

補遺四和截瘧丸

曾服表裏前劑而未取效者宜服之

人參半兩　五朱砂　五朱和勻飯上蒸一

飛川常山内真黄者取净細末一兩

知母一刀判前濃

附餘〇灸法　治瘧疾久不愈

不問男女於太衝第三骨節亦可壯立効或灸第一骨節盡處先針後灸三七

附餘〇加味柴苓湯　治男婦諸瘧

柴胡去芦　白木　蒼木各一錢　陳皮七分　半夏泡七分

茯苓去皮各七分　朱砂　澤瀉各六分　黄芩八分　黄連七分

藿香五分　甘草三分　枝子去殼四分

右姜三片烏梅半边煎服

附餘〇鱉甲散　瘧久不已腹中結塊名曰癥母

鱉甲醋炙白木去芦　黄耆去根　草果去殼　檳榔

陳皮去白　白芍藥　甘草炙　川芎　厚朴各一

姜三片棗一枚烏梅煎服

〇丹溪活套云凡瘧証或連日或間発作惡寒発熱腰背頭項俱痛此屬太陽經瘧也宜二陳湯加麻黄羌活藁本防風之類〇如連日或間日発作先寒後熱或寒多熱少或但熱不寒目痛鼻乳燥此屬陽明經瘧也宜用二陳湯加乾葛升麻石羔知母白芷之類〇連日或間或発作或先寒後熱或寒熱間作脇痛口苦或嘔吐惡心此少陽經瘧也〇宜二陳湯倍加柴胡及黄芩人參青皮之類〇如於子午卯酉日発寒熱嘔吐舌乾口燥此少陰經瘧也宜二陳湯加川芎黄連柴胡之類〇如辰戌丑未日発寒帰川芎黄栢黄連柴胡之類〇如辰戌丑未日発寒熱嘔吐不嗜食或腹滿自利此太陰經瘧也宜二陳湯加蒼白木柴胡芍藥之類〇如於寅申巳亥日発惡寒多熱少或腹痛引陰如淋狀善惡此厥陰經瘧也宜用二陳湯加桂枝附子乾姜之類大抵瘧

汁一盞神常山末
飯丸烝一飡
烏梅七个去核飲
湯煮軟搗爛再加
白米飯一小塊同
搗爛用
右調四味為丸如
梧桐子大百草霜
末為衣晒乾該日
五鼓時白湯下一
百丸忌鷄魚辛苦
有事要早愈者疎
和湯一劑後亦可
服之丸最不傷元
氣

屬三陽宜汗宜吐麻黃葛根柴胡恒山草果烏梅之
屬治之瘧屬三陰宜下宜温宜和大柴胡湯柴胡桂
姜湯柴胡四物湯附子理中湯之類選而用之
○祖傳經驗截法神方
木通　秦艽　恒山　川山甲酯炙黃各一錢
辰砂半錢研　烏梅七个　大棗
右細切以水三盞煎至一盞先以東向辰砂末食後
服藥
○一方用恒山草巢知母柞柳各一錢酒一盞浸一日臨
發日早服
○又方治久瘧不愈一服便止永不發其效如神
恒山一錢半　柞柳一錢　丁香五分　烏梅三个
右細切作一服用好酒一盞浸一宿臨發日清晨空

瘧

表裏俱虛真元未復
疾雖暫止又感新邪
辰轉邪深亂發失期
久而不愈號為瘧瘧
治用芎歸鱉甲散補
遺或沉香鱉甲散
瘧門

補遺芎歸鱉甲散
芎歸鱉甲夏陳青
鱉甲芎歸芍藥各
等分烏梅姜棗引
諸虛勞瘧自安卒

飲之
○予壯年過杭同舟有二男子皆年踰四十五各得疾瘧
三年矣俱發於寅申一人夜發於巳而退於
申一人夜發於亥而退於寅予曰但到杭可買藥俱
與痊可晝發者乃陰中之陽病宜補氣解表與小柴
胡湯倍柴胡參加白术川芎葛根陳皮青皮蒼术
夜發者為陰中之陰病宜補血疎肝用小柴胡合四
物湯加青皮各與十貼教其加姜棗煎於未發前二
時服每日一貼服至八貼同日得大汗而愈永不再
發

霍亂指南

霍亂圖



夫霍亂者揮霍變乱也外有所感內有所傷陰陽乖隔上吐下利躁擾煩悶是也卒然而來宛如風燭得吐利者名曰溫霍乱蓋所傷之物尽出故易治如霍乱吐利身熱頭痛煩多心腹痛者此偏於陰則多寒也香蘇散加烏梅烏藥

霍亂門

論

內經曰歲土不及風乃大行民病飧泄霍乱体重腹痛筋骨繇併陳無擇曰霍乱者心腹卒痛嘔吐下利憎寒壯熱頭痛咳暈先心痛則先吐先腹痛則先利心腹齊吐痛利並作甚則轉火入腹即死蓋陰陽反戾清濁相干陽氣暴升陰氣頓墜陰陽否隔上下奔趨河間曰吐瀉不止者其本在於中焦或因渴而大飲上而過量或因飢而始食食而過飽以致溫熱內甚故陰陽交錯而不和是為吐瀉仲景曰邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則既吐且瀉此為急病也然吐利為急十死其一二如揮霍乱撩而不得吐瀉者此名乾霍乱也多死法曰既有其入必有所出今有其入而不得其出者否塞也故轉筋吐瀉者其氣有三一曰火二曰風三曰溫大抵霍乱吐瀉之証皆風木溫熱之為害耳治法宜分利陰陽散風行溫而降火也又當引清氣上升使濁氣下降無有不安仲景又曰熱多欲飲水五苓散寒多不飲水理中丸河間亦曰九竅此証急用五苓散益元散桂苓甘露飲乃吐瀉之聖藥也慎勿與粟米粥湯入胃必死毋疑曰內有所積外有所感陽不升陰不降乖隔而成非因鬼邪皆飲食所致此先哲確論也切勿與穀食雖米湯一呷下咽立死必待吐瀉止過半日飢甚方可與稀粥少食以漸而將息也孝者詳之

脉法

脉微而澁 或代而散 或隱而伏 或大而虛

霍亂

霍乱吐瀉小便不利腹痛轉筋煩悶欲死宜五苓散加藿香正氣散並傷寒門傷食吐瀉頭痛身熱青蘇散治遺腹痛手足厥冷此偏陰則多寒也理中湯或姜附湯並傷寒門嘔甚丁香治中湯嘔吐門內冷轉筋不已木瓜湯補遺或千金效法見下脚脫內紅筋刺出紫盆灸鹽熨臍霍乱後煩熱多渴小便不利麥門冬湯附餘

補遺青蘇散 治傷

食停寒嘔吐吞酸頭痛加芎並未愈

加神麴麥芽

青蘇散夏紫蘇青香附陳皮半兩稍

甘草一錢姜引治吐因冷食胃中停

補遺木瓜湯 治霍乱吐瀉轉筋擾悶酸木瓜二兩

茴香微炒三錢半 甘草炙二錢

吳茱萸泡炒二兩

每服四錢姜三片紫蘇一葉水煎空

脉右関滑為霍乱吐瀉 脉結促代者不可断以死

脉大者生

脉洪者為熱

氣口脉弦滑膈間有宿食當飲宜順其性以鹽湯探吐之

方法舟溪方法凡七條

舟溪曰大法生姜理中湯最好

有宜吐者雖白吐 利还須以吐法提其氣用二陳湯探吐或樟木屑煎湯或鹽湯皆可吐之

〇一方蒼木厚朴陳皮乾葛各一錢半水煎服

〇或用姜湯下保和九四五十粒

〇轉筋屬熱血四物湯加酒芩紅花蒼术南星煎服

〇轉筋男子以手挽其陰女子以手牽乳両傍此千金妙法也

乾霍乱

乾霍乱者上不得吐下不得利所傷之物不出壅閉正氣関格陰陽其死甚速須用盬湯灌下一碗許探吐得出則胃即進治中湯傷寒門輕者手足温和吐利後漸已甚者腹絞痛厥逆脉脫羊体轉筋當温補回陽復脉理中湯加附子傷寒門更以

心温服

〇乾霍乱忽然心腹痛病欲吐不吐欲瀉雖不瀉者是也俗名病暘泆即是治死在須臾升降不通故也宜吐以提其氣最是良法内有物所傷外為邪氣所遏大法宜発汗有用吐法者即煮発散之義有用温薬解散者二陳湯加川芎蒼术防風白芷芎藭甘草各等分

〇委中穴出血或十指頭出血皆是良法

〇半夏湯 治霍乱轉筋吐瀉不止

半夏麪 茯苓 白术各五錢 淡桂二錢半 炙甘草一錢

右為細末每服二錢渇者以涼水調下不渇者以温水調下不拘時候

局方〇理中丸

白术 人参 乾姜 甘草各等分

右為細末煉蜜為丸如弾子大每服一丸涼水化下

昌案更三四兩同盐一二十兩炒熱熨腑下探吐不得吐者不治

暑霍亂

治暑月多食生冷瓜菜泉水以致食鬱於中而成霍乱者宜辛温散其標寒次以寒凉清其暑熱可也故暑月霍乱吐瀉有熱六和湯瘧疾門熱而燥渴煩悶五苓散或甘露飲並傷寒門或

河間〇六和湯　治霍乱吐瀉不止

白木　半夏　砂仁　杏仁
人參　甘草　各五分赤茯苓　藿香
白扁豆姜汁拌炒　木瓜各一錢香需　厚朴姜汁炒各二錢
右細切加姜三片大棗一枚水二盞煎至一盞温服

抱要〇黎水散　治暴泄如水周身汗出尽冷脉弱不能言語甚而吐逆不止

半夏二錢　附子　乾生姜　炙甘草
桂心各半錢　良姜三分半
右細作一服黎水煎服

附餘〇麥門冬湯　治霍乱已愈煩熱多渴小便不利

麥門冬　去心　橘皮去白　半夏泡七次　白茯苓
白木各一兩　人參去芦　甘草炙　各半　小麥半合

霍乱門四

涼水調益元散痢疾門或二香散補遺

補遺〇二香散　治暑濕相搏霍乱轉筋煩渴悶乱

藿香　半夏
陳皮　桔梗
大腹皮　白术
茯苓　紫蘇
川厚朴去皮
白芷各一兩
甘草二兩半
黄連二兩香需二兩
扁豆半斤
姜三葱一水煎服

右每服四錢水一盞半姜三片烏梅少許煎八分温服

〇祖傳灸法治霍乱已死而胸中尚有暖氣者灸之立甦其法以塩填滿臍孔灸之不計壯数

〇又法治霍乱吐瀉不止灸天樞氣海中脘四穴立愈天樞二穴在臍心兩傍各開二寸　氣海一穴在臍下一寸半　中脘一穴在臍上四寸

〇洗法治霍乱轉筋用大姜一握水煮熏洗立効

〇舟溪活套云凡霍乱不渴用生姜理中湯如渴用五苓散加五味子麥門冬滑石轉筋用四物湯酒芩紅花南星蒼术又云冬月用理中湯夏月用黄連香需湯放井中浸水冷頓服乃効〇一方治吐瀉用藿香蒼术厚朴神仁白芷甘草半夏茯苓人參炒神麴各等分水煎遇寒加姜寒甚加附子

泄瀉指南

濡泄

濡泄者濕自甚也故所下多水小便不利腸鳴矢上有声脉沉緩之候宜升麻除濕湯見下或戊己丸補遺或平胃散中滿門或五苓散傷寒門腹痛胃苓湯加芍藥黃連嘔吐門体重腹滿食穀不化白朮芍藥

泄瀉門

論

內經曰濕勝則濡泄又曰春傷於風夏必飧泄又曰暴注下迫皆屬於熱又曰諸病水液澄徹清冷皆屬於寒叔和云溫多成五淖是故知寒風濕熱皆能令人泄瀉但溫熱良多而風寒差少耳原病式曰瀉白為寒青黃赤黑為熱也大抵瀉利小便清白不澁為寒赤澁為熱又大便完穀不化而色不變吐利不腥穢水夜澁徹清冷小便清白不澁身冷不渴脉遲細而微者皆寒証也凡穀肉消化無間色及他証便澁為熱未盡穀不化而為飧泄者亦有之矣仲有也或作急速傳化失常亦急速傳化失常景曰邪熱不殺穀然熱得溫則為飧泄也寒熱二証

湯見下腸鳴泄瀉自汗滲濕湯中溫門或瘧寒正氣散傷寒門水泄渴而小便赤澁內有熱也益元散水調服痢疾門或溫六九見下

附遺戊己九　治脾經受溫泄瀉不止

米穀不化腸腹刺痛

戊己吳茱萸為藥連等和麵糊丸為丸

濕傷下利皆清穀腸腹空疼尽可蠲

水炭相反治之者差之毫厘謬以千里者也醫者可不謹乎

脉法

內經曰脉細皮寒少氣泄利前後飲食不入是為五虛死其漿粥入胃泄注止則虛者活

脉經曰泄注脉緩時小結者生浮大者死

又洞泄食不化不得留下膿血脉微小流連者生動急者死

脉訣云下利微小則為生脉大浮洪者無差日

方法

丹溪曰泄屬氣虛有火有痰有食積者

○燥濕四苓散加蒼朮倍白朮甚者二尖灸為末米飲調

腸垢泄

腸垢者濕鬱於火熱泄也所下稠粘垢穢小水赤澁脉數之候伏暑養熱水泄煩渴小便不利加味五苓散或胃苓湯

暑門或桂苓甘露飲中

暑門或黃芩芍藥湯

刺疾門或六和湯痛

疾門或通苓散補遺

痛一陣瀉一陣下迫

者痛以瀉火也宜伐火四苓散加黃芩木

服下

○水瀉用蒼朮厚朴陳皮炒麴茯苓朱苓澤瀉地榆甘草冬加乾姜等分煎服

○治泄瀉諸藥多作丸效

○治泄瀉若病久而虛者或可若初得者必

○世俗例用澁藥治瀉若病久而虛者或可若初得者必

變他証為禍不小殊不知瀉多因於濕分利小水為上策也

○清六九　治泄瀉

六一散一料　加紅麴五分

右為細末湯浸蒸餅為丸服

○温六九　治泄瀉或煎嘔吐者

六一散加乾姜或生姜汁亦可蒸餅丸服

○姜麴九　治食積瀉

通濟石栀子傷寒門

協熱自利身熱脉數白頭翁湯或柴苓湯並傷寒門

補遺通苓散　分利水穀解煩熟止泄瀉

通苓散用木苓通茵蘼車前豬澤同灯草炙門冬作丸清煩止瀉妙神功

鶩泄

鶩溏者濕熱於寒此泄也故所下溢穢

陳麴　蒼朮　甘草　各五分　生姜一片

右為細末煮餅為丸

○止瀉方

肉豆蔻五分　白滑石春夏一兩二分半　秋二兩

右為細末姜汁調神麴作糊為丸服

神麴　芍藥並炒各等分

右為細末為丸服

白朮　芍藥並炒各等分

冬加肉豆蔻去芍藥為細末神麴糊為丸服

治困傷冷飲水泄瀉注下一夜十餘次變

東○茯苓湯　治

作白痢或變赤白相雜腹中疞痛食減熱燥四肢沉

困無力

生黃芩一分半　茯苓　豬苓各三分　當歸二分

肉桂各五分　澤瀉五分　芍藥七分半

清冷如鴨糞小便清白脉遲之候胃冷湯加香砂嘔吐門身体怯寒泄利不止臍腹疼痛不温欬逆脉遲理中湯傷寒門或火已寒丸補遺四肢冷寒甚泄不止脉沉遲者木附湯或四逆湯並傷寒門

補遺 火已寒丸 治沉寒痼冷臟腑虛敗心腹疼痛脇肋脹滿腸鳴泄瀉火已寒丸治滑腸

生甘草　蒼木　升麻　柴胡各一錢

右細切作一服水二盞煎一盞稍熱服

東垣○黄芪補胃湯　治一日大便三四次溏而不多有時作泄腹中鳴小便黄

黄芪　柴胡　當帰身　益智

橘紅　半夏各一錢　升麻二錢　炙甘草五分　紅花少許

右細切作一服水二盞煎至一盞稍熱食前服

東垣○升麻除濕湯自下而止者引而去之

蒼木一錢　柴胡　羌活　防風

升麻　神麯　澤瀉　朱苓各五分

炙甘草　陳皮　麥花麪各三分

右細切作一服水二盞煎一盞去柤空心服如胃寒加益智仁半夏各五分生姜三片大棗一枚同

腹寒泄瀉宜姜食四味柱附丸宜糊木飲湯吞或用姜炙甘

所泄者温熱於風故有宜穀不化腸鳴脉弦之候升麻除濕湯或防風芍藥湯或神术散並見下外傷冷風有表証者麻黄湯傷寒門亡氣不足風入於腸胃泄利清血胃風湯中風門或煮木防風湯見下

煎非腸鳴勿用

○刘草窓治痛泄要方

白木二兩炒白芍藥二錢炒　陳皮一錢半　防風一錢

右細切作捌服水煎或丸服久瀉加升麻六錢

機要○白术芍藥湯　治大陰脾絰受温水泄注下体重微滿困弱無力不欲飲食水穀不化宜此和之勞重暴下是大勢來亦宜和

白木　白芍藥各一錢　甘草二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞温服

機要○茯苓湯　治濕瀉又治食積温熱作瀉

白木　茯苓各五錢

右細切作一服水煎食前服一方有方藥三味各等分名白木散為末米飲調下

食積泄

飲食過傷蒸生冷寺物腹痛甚而泄止後而歸止者此食積泄也治宜消導云陳湯加澤瀉蒼术白术山查神麴川芎白芍藥麥芽炒黃連腹中窄狹飽悶再加厚朴枳实木香爽欲開後服青蘇散罹乱門或保和丸內傷門因傷冷欵水泄瀉无度東垣冷湯見下脾胃虛

机要〇蒼术芍藥湯 治証如前

蒼术五分　芍藥二分半　黃芩一分半　淡桂五分

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

机要〇防風芍藥湯 治飧泄身熱腰弦腰痛微汗

防風　芍藥　黃芩各二分

右細切作一服加姜五片水二盞煎一盞食前服

机要〇良方神术散 治春傷於風夏必飧泄之証

蒼术一分半　黃芩　甘草炙三分　細辛二分

右細切作

加生姜三片水二盞煎一盞去相溫

完穀食嗇腸鳴泄瀉

姜桂先見下脾胃實

藜蘆消積泄瀉長虹止雨丸內傷門或平胃散加炙草神麴丁香砂仁中溫門

痰積泄

人久病泄而神瘁小便少而赤脇滿而頗弦肺悶食減因檢此又積成痰流於肺中宜大腸之不固也故有或瀉或不瀉或多或少之候治宜總之

服如欲汗加葱白三莖

附餘〇五味子散 有每日五更初洞瀉服止瀉藥並無效此名脾腎泄宜服此藥

五味子二錢　右二味炒香熟為細末每服二錢陳米飲下

附餘〇衛生湯

即六君子湯去半夏加烏藥薏苡仁澤瀉黃連等分水煎溫服食遠

愚按腎司閉藏今縱欲致虛而腎失職故有此病也

附餘〇二神丸

吳茱萸半兩細粒綠色者

用海粉青黛黃柒神麴湖丸服之在上者用茶葛等作湯溫服一碗許探吐二三次即止在下者宜升提之二陳加升麻防風氣虛二陳加參木炒芍藥升麻煎飲門

虛泄

虛泄有三脾虛腎虛肝虛也脾虛者飲食所傷並脾不能運化腎虛者慾所傷也肝水乘脾土者冬泄瀉春泄肝泄間或有之而脾泄恒多尒脾虛氣弱濶門元氣不足不能泌別水穀衛生湯附餘或脾泄丸見下或參苓白朮散虛猶門自汗沉困脉遲久泄黃氏健中湯篇客門腎虛泄瀉小便頻數盜汗金鎖正元丹遺門脾腎不足久泄不止形瘦六味地黃丸虛損門朝泄

破故紙炒四兩肉豆蔻二兩生右為末以大肥棗四十九枚生姜四兩切同煮棗爛去姜取棗肉研膏入藥和丸梧子大每五十九四五十九湯下

附餘○富歸厚朴湯 治肝經受寒而色青慘厥而泄利

當歸炒 厚朴製各二 官桂三兩 良姜五兩

右剉每三錢水煎食前服

愚按經曰腎司閉藏肝司疎泄肝腎氣虛為病泄瀉何也蓋腎者所處在下大小二便之門戶而肝者又為門戶約束之具肝腎氣實則能閉能束故不泄瀉肝腎氣虛則閉束失職故泄瀉也又肝者脾之賊肝經正虛邪盛未能討賊亦作泄瀉此當歸厚朴湯所以實肝而止瀉也

慾所傷也肝水乘脾土者冬泄瀉春腎泄肝泄間或有之而脾泄恒多尒脾虛氣弱濶門元氣不足不能泌別水穀衛生湯附餘或脾泄丸見下或參苓白朮散虛猶門自汗沉困脉遲久泄黃氏健中湯篇客門腎虛泄瀉小便頻數盜汗金鎖正元丹遺門脾腎不足久泄不止形瘦六味地黃丸虛損門朝泄

附餘○訶子散 治泄瀉久不止者

訶子一兩半生半熟 木香五錢 甘草炙 黃連各三錢

末之前方藥白朮湯調服二錢

附餘○肉豆蔻丸 治脾胃虛弱腹脇脹滿水穀不消臟腑滑泄

蒼朮泔浸二兩炒 乾姜炮 甘草炙 陳皮去白各一兩 肉豆蔻煨 厚朴姜製去皮各二兩

川烏炮去皮 訶子皮各二兩

右為末每服二錢水一盞姜三片棗一枚煎八分溫服

○舟溪活套云泄瀉注下如水用生料五苓散加蒼朮車前子倍白朮為末米湯調服○溫熱甚下泄如熱湯者本方去桂加滑石黃芩梔子木通之類○如腹中疼痛下泄清冷喜熱手溫熨口不燥渴乃寒泄也本

60
L495

暮已久而神萃內能亦脾胥泄也五味子散或以茶散下二神丸並附餘肝經受寒而色青慘而泄利者當歸厚朴湯附餘

滑泄

滑泄者瀉勝氣脫所下不禁大孔如竹同之候訶子散或肉豆蔻丸並附餘老人元氣衰滑泄無禁四君子湯加肉果厚朴訶子盧拍門名久泄胃氣

方倍桂加肉豆蔻有氣加木香病甚者更加丁香附子作丸服○如久泄穀道不合或脫肛此元氣下陷及大腸不行收令而然用白术芍藥神麴陳皮肉豆蔻訶子烏梅為丸以四君子湯加防風升麻前湯送下○如食積時常腹痛瀉積完以木香槟榔丸或東垣枳實導滯丸推逐之而後以四苓加厚朴蒼术神麴麥芽之類作丸服之以安胃氣○如濕水腹不痛者屬氣虛宜四君子湯倍白术加黃芪升麻柴胡防風之類補以提之而愈

○祖傳經驗秘方治暴泄注下用

車前子一兩微炒

右一味研為細末清米飲調服

○又一方治暴痛泄瀉用


inches
cm
Kodak Color Control Patches
© Kodak, 2007 TM: Kodak
Blue
Cyan
Green
Yellow
Red
Magenta
White
3/Color
Black