

醫學源流

石 丑
亥 七
八

痢疾指

濕熱內實

濕熱內實... 痢疾指... 濕熱內實... 痢疾指...

痢疾門

內經曰澁而便膿血知氣行而血止也... 痢疾門... 內經曰澁而便膿血知氣行而血止也...

Large vertical text on the right page, likely bleed-through or a separate column of text.

痢症指南

濕熱內實

初病後重裏急下迫
窮痛此濕熱內甚故
積與氣墜也宜下之
下後餘積未清不可
驟補宜消積理氣滲
濕清熱以升提之則
後重自除大黃湯或
芍藥湯並見下或大
承氣湯傷寒門後痢
水止執甚渴而便赤
黃芩芍藥湯見下腹

大醫院補遺直傳醫

源流肯綮大成卷之五

痢疾門

論

內經曰澁而便膿血知氣行而血止也

愚按經文澁字下必致一澁字

澁即尿也澁澁而便血膿者言病因也蓋血因氣滯而大小二便俱不利耳氣行而血止者言治法也故河間謂明其說所謂和氣則後重自除而用木香枳殼芍藥等藥以和之則此意也

河間曰行血則便膿自愈和氣則後重自除又曰後重則宜下腹痛則宜和身重則除溫脉弦則去風膿血稠粘以重藥竭之身冷自汗以熱藥溫之風邪外束宜汗之驚澇為痢宜溫之又曰在表者發之在裏者下之在上者湧之在下者竭之身表熱者內疎之小便澁者分利之又曰盛者和之去者送之過者止之矣

痛不通快裏急香連
化滯湯補遺或香連
丸見下或木香枳殼
丸諸氣門或三黃丸
火熱門

補遺香連化滯湯

積滯不行裏急後

重頻上圍而去少

青皮 陳皮

厚朴炒 枳實炒

黃芩 黃連

川當歸用炭

白芍藥各一錢

滑石一錢二分

煨榔八分甘草細

南木香五分

水煎溫服

祛風邪

惡寒發熱身首俱痛

此外祛風邪乃表症

也宜先微汗以發散

之神木散泄瀉門後

用痢瘵風邪乘虛入

腸胃下清血胃風湯

傷寒門肌表熱小柴

胡湯或大柴胡湯並

便寒門遍身發丹瘵

者此陽毒也亦宜汗

之九龍湯後服九味

法云避其來銳擊其惰歸此之謂也夫古方以瀉痢

索同論治朱紫泥 看脈不知瀉 屬脾而痢 傳腎賊邪

難愈先膿血者而後水瀉者此腎傳脾微邪易愈是

皆先哲之格言以為後李之繩墨豈者其可不詳究乎

脈法

脈經云腸辟下膿血脈沉小流連者生洪大數身熱

者死又曰腸辟筋挛脈小細安靜者生浮大而紫者死

方法

丹谿曰痢赤屬血自小腸來白屬氣自大腸來

○原病式曰痢為溫熱甚於腸胃佛鬱而成其病皆熱証

也俗以痢白為寒誤也如熱生瘡癩而出白膿可以

白為寒乎陰陽水火一高則一下一盛則一衰若以

白為寒赤為熱則熱赤白者乃寒熱俱甚於腸胃之

間而為病乎况下迫窘痛小便赤澀而痢白者必多

有之為熱明矣世有用辛熱藥而愈者蓋辛甘發散

熱主出行故病微者則鬱結開通氣和而愈若甚病

者鬱結不開其病轉加而死故治痢者必用寒以勝

熱苦以燥溫微加辛熱佐之以為發散開通之用如

此固無不效者

○仲景治痢可下者悉用承氣等湯加減下之大黃之寒

其性善走佐以厚朴之溫善行滯氣緩以甘草之甘

飲以湯液灌滌腸胃滋潤輕快積行即止局方用砒

丹巴礪類聚成丸其氣兇暴其體重滯積氣已行而

毒氣未消猶暴賊手持兵刃使之徘徊瞻顧於堂與

之間縱有愈病之功而腸胃清純之氣寧無損傷之

患乎可溫者乃用姜附溫之局方倒用熱藥為主瀉

槐花散並補遺
補遺九龍湯

升麻 葛根

赤芍 蘇葉

防風 荆芥

川芎 白芷

蒼木各等分

姜三片葱一莖熱服微汗即退

補遺九味槐花散

槐花 白芍

黃連 枳殼

陳皮 青皮

黃芩 烏藥

鷄脚草

藥為佐用之於下利清白者猶可其裏急後重經所謂下迫者皆屬火熱所為加以澁熱之劑非殺而何

○初得一二日間元氣未虛必推蕩之此通因通用之法用大承氣湯或調胃承氣湯下後看氣血調理氣用

參朮血用四物五日後不可下此亦大藥言之氣血柯有下之而安者後

○腹痛以白芍藥甘草為君當歸白朮為佐惡寒者加桂惡熱者加黃柏

○腹痛因肺金之氣鬱在大腸之間以苦梗發之後用痢藥一云實則可下虛則以苦發之

○身熱挾外感者不惡寒用小柴胡去人參發熱惡寒身首俱痛此為表証宜微汗和鮮又蒼木川芎陳皮芍藥甘草生薑煎服愚每以一二方而治痢之

○發熱不止者屬陰虛用寒涼藥必兼溫藥升藥

○大孔痛痢因熱流於下也木香檳榔芍連加炒乾姜

○仲景法治孔痛一曰溫之一曰清之若久病身冷自汗脉沉小宜溫之暴病身熱脉洪大宜清之

○下血者宜涼血活血當歸黃芩桃仁之類或用朴硝有風邪下陷宜升提之蓋風傷肝肝主血故也有溫

傷血宜行溫清熱

○溫執下痢小便澀少煩渴能食脉洪大而緩腹痛後重桂苓其露飲送下保和丸二三十粒

○濕多執少脾胃不和食少腹痛後重夜多利下胃苓湯送下保和丸二三十粒

○氣虛面色痿黃成枯白色人疲倦痢頻併痛後重不食脉細弱或微汗時出黃芪建中湯送下保和丸二三

傷血分

穀芽灯心煎腹痛加沒藥五分另研臨服以滾藥泡服有熱加柴胡頭痛加川芎白芷

下痢純紅者此濕熱

之積傷於血分故也宜涼血以清解之其

痢自愈剪紅湯補遺後重者香薷換即煎

湯下香蓮丸見下下血腹不痛者此濕毒勝也行濕則血自止

升陽除濕湯去麥芽

十粒

神曲加黃連黃芩雞
脚草地榆中溫門下
血腹痛者此執毒勝
也清熱涼血自安三
黃湯加白芍烏藥活
石青皮桃仁地榆茵
陳雞脚草谷芽灯心
火執門下血如雞肝
色者西根丸補遺下
血如字荷汁者此執
毒之甚宜清之以轉
紅乃有可生之机回
生飲補遺若不轉者
難治

○濕熱為痢不渴者建中湯加蒼朮茯苓下保和丸
○脾胃不和食少腹脹痛後重脉弦緊平胃散加芍藥官
桂葛根白朮茯苓下保和丸
○下痢血氣大虛腹痛頻併後重不食或產後得此証用
四君子湯加當歸陳皮下保和丸二三十粒
○下痢白積者用芍藥湯加白朮陳皮甘草滑石桃仁
○下痢赤積身熱一元散加木通炒芍藥炒陳皮白朮煎
湯送下保和丸加黃芩丸
○久下痢已數日不能起床不食疲弱之甚者
白朮一錢黃芪半錢當歸七分芍藥一錢人參
地榆各五分宿砂各五分澤瀉各五分陳皮一錢白苳蔻仁
御米殼醋炙甘草木香升麻各三分

補遺煎紅湯

右細切作一服水一盞半前至一盞去粗溫服

黃連 烏藥
黃芩 白芍
青皮 枳殼
陳皮 地榆
山梔子 雞脚草
右車前葉七片谷
芽一撮灯心一結
前服後重加升麻
枳殼
補遺回生飲
烏藥 桃仁
苦參 黃連
黃芩 黃柏
枳殼 陳皮

○如下墜異常積中有紫黑血而又痛甚者此為死血証
用桃仁細研及活血行之
○血痢久不愈者屬陰虛四物為主
○下痢如豆汁者溫也蓋脾胃為水穀之海無物不受常
蕪四藏故有如五色之相染當先通利此迎而奪之
之義如虛宜審之
○古方用厚朴專為行疑滯之氣滯氣稍行則去之枳殼
雖小緩亦不宜久服只以陳皮和藥可也
○古方多用粟壳治嗽與痢但要先出病根乃收功後
○如力倦氣少惡食此為挾虛証宜用白朮當歸身尾其
者加人參陳皮補之虛回而痢自止
○如久痢體虛氣弱滑泄不止亦當以溫藥止之訶子肉

青皮 白芍

山梔 車前

右谷芽灯心作使

傷氣分

下痢純白如膿者此

濕熱之積傷於氣分

故色白宜順氣藥以

寬利之其疾自愈宜

用木香順氣散補遺

或戊巳丸泄瀉門數

至圓而不去者升麻

枚即煎湯下香連丸

或木香枚即丸諸氣

門一身重痛浮黃下

如言汁者濕也升陽

除濕湯去麥芽神曲

加木香枚柳中溫門

下如鼻涕凍膠脉遲

形體虛怯四肢倦怠

升陽除濕湯中溫門

補遺木香順氣散

烏藥 木香

陳皮 白芍

車前子 黃連

黃芩 枳殼

雞脚草 甘草

檳榔 青皮

右谷芽一撮灯心

一結煎服

苴菟白礬半夏牡蛎之類擇而用之然須以陳皮為

佐恐太泄亦能作疼又甚者須灸天樞氣海穴見攪

○久痢已減十之七八穢積已盡糟粕未實用炒芍藥炒

白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸二三十粒此

丸性燥澀有去濕實腸之功若滯氣未盡除者不可

遽用

○如痢後糞粕未實或食粥稍多或餓甚方食腹中作疼

以白朮陳皮二味煎湯和之自安

○如氣行血和積少但虛坐努積此為無血証倍用歸身

尾芍藥生地黃而以桃仁泥佐之陳皮和血生自安

○如痢後脚弱漸細小用蒼朮二兩白芍藥龜板各二兩

半黃柏五兩粥糊丸以四物湯加陳皮甘草煎湯下

○噤口痢胃口熱甚故也用黃連人參煎湯終日呷之如

吐則再強飲但得一呷下咽便好放用田螺搗碎

中以引下其熱胃中熱結常開以降之人不知此多

用濕藥其味以火濟火以滯益滯也亦有誤服熱毒

之藥犯胃者常推明而祛其毒用黃蠅焙乾為末清

米飲調下一錢七分甚効

○多有時疫作痢傳染相似宜推明運氣之勝復以治之

○小兒痢疾用黃連黃芩大黃甘草煎服赤痢加桃仁紅

花白痢加滑石末同煎

○小兒八歲下痢純血作食積治蒼朮白朮黃芩白芍藥

滑石茯苓甘草陳皮神麩煎湯下保和丸

○凡下痢純血者如塵腐色者如屋漏水者大孔開如竹

筒者唇如珠紅者俱死○如魚腦髓者身熱脉大者俱

半死半生經所謂身涼脉細者生身熱脉大者死是

氣血俱傷

下痢赤白相雜者此濕熱流於腸胃氣血俱病也治宜除濕清熱則氣血和而疾自愈矣木香黃連湯補遺或六神丸或二和湯或四味香連丸並附餘裏急後重者核柳煎湯吞芍藥陳皮丸附餘久不止脉沉細弦促下清涕有紫黑血絲此瘀血痢也四主二佐丸附餘如

亦大醫言之耳不可一途而論也

○一方治熱痢血痢用大黃黃連黃芩黃柏枳殼白芍藥川芎滑石甘草桃仁白木等分神麴丸如梧桐子大每服五十六十九白湯下

○青六丸治血痢神效

○溫六丸治痢汲水瀉皆效已上二方並見世瀉門

肥瀉○固腸丸治濕熱下痢大便血去腸胃陳積之後

用此以燥下濕而突大腸

擣根白皮不拘多少細切畧炒

右一味研為細末米糊為丸如梧桐子大每服三五

十九陳米飲送下或用炒芍藥炒白木炙甘草陳皮

茯苓煎湯

○芍藥湯行血則便膿自愈和氣則後重自除此藥是也

當歸尾

黃連

黃芩

甘草

枳殼

木香

桂心

大黃

白芍藥

一糸

右細切作一服水一盞半煎一盞空心服○如初病

後重窘迫甚者倍大黃加芒硝一錢○如痞滿氣不

宣通加枳實一錢○如藏毒下血加黃柏一錢

○黃芩芍藥湯 治瀉痢腹痛或後身熱久而不愈脉

洪數者及膿血稠粘者

黃芩 芍藥各二糸 甘草一糸

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服腹痛甚加

桂二分稍熱服之

○黃連湯 治大便後下血腹中不痛謂之濕毒下血

黃連 當歸各二糸 右細切作一服一盞半水煎至一盞去粗溫服

○右細切作一服一盞半水煎至一盞去粗溫服

氣行而和積少但服

坐旁置此為無血治

宜四物湯加桃仁泥

陳皮虛損門大孔端

者此濕熱之毒流於

下大腸風熱宜潤大

賜兼升提之則痛自

愈解毒潤腸湯補遺

香連湯

木香 黃連

烏藥 白芍

木通 活石

黃芩 陳皮

青皮 甘草

枳殼 澤瀉

雞脚草

右谷芽灯心煎服

補遺解毒潤腸湯

木香 枳榔

黃芩 黃連

青皮 陳皮

防風 茵陳

車前子 白芍

右入谷芽灯心

食積

下痢如木樨黃柿者
此因先傷濕熱後因
食積而成斯疾宜消
食兼清熱燥濕秘傳

河○芍藥黃連湯 治大便後下血腹中痛者謂之熱毒

下血

芍藥

川歸

黃連各一分 大黃三分

桂心一分半 甘草三分

右細切作一服水一盞煎七分溫服

○大黃湯 治痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無

度脉沉實人不甚困倦者或初得腹痛甚者窘迫不

安者

大黃一兩

右細切作一服用好酒二大盞浸半日煎一盞半去
粗分作二服頓飲之如痢未止再進後服後以芍藥
湯和之又再服黃芩芍藥湯以散其邪此乃蕩滌利
熱之劑用酒煎者蓋欲其上至頂頭外徹皮毛也

香麴枳實湯腹痛飲

食不化脹滿保和丸

內傷門 原有食積腹

脹裏急連化滯湯見

前或通玄一八丹附

餘急痛枳木丸加黃

連木通神曲麥芽為

藥木香枳郎內傷門

或木香枳郎煎湯吞

香連丸見下若口焦

舌黑者不治

補遺香麴枳實湯

山查 神曲

枳實 黃連

蒼朮 厚朴

○香連丸 治下痢膿血赤白相雜裏急後重

黃連 二十兩 淨吳茱萸 十兩 木香 四兩 八錢

右為細末醋調麵糊為丸如梧桐子大每服三五

丸清米飲送下○一方加石連肉半斤治噤口痢

○益元散謂此為治痢之聖藥也其功不能盡述

桂府賦白滑石六兩粉甘草一兩炙

右二味共為極細末每服三錢白水調無時

○神効三香散 治痢疾日久穢積已少腹中不痛或微

痛不後重窘迫但滑瀦不止乃收功之後藥也

粟殼 去穢 兩二錢 陳皮 一兩三錢 肉豆蔻 麩 煨 四錢

茯苓 去皮 白扁豆 炒 各 四錢 木香 人參 各 二錢

右為細末每服一錢七清米飲調下食遠

○苦根丸 治毒痢及蠱注下血如雞肝心煩腹痛

苦根 一兩 白芍 一兩 黃連 一兩 枳實 一兩 厚朴 一兩

黃芩 白芍

木香 陳皮

烏藥 雞脚草

右谷芽灯心煎

噤口痢

噤口痢不飲食者乃胃間結熱毒氣上攻當用苦寒以降火清燥三石竹煎湯補遺或石蓮子煎湯煩飲之若津液竭而舌生黑癥并腹中不痛而滑泄不止者十有九不治或乾嘔呃逆者

苗根洗

川升麻

犀角镑

地榆洗

當歸去芦

黃連去鬚只殼去穢麩炒

白芍藥各等分

右為末醋糊丸梧桐子每服七十九空心米飲下

附六神丸

神曲另為末用麥芽

茯苓

枳殼

木香煨白

黃連赤痢倍之一法用吳茱萸與黃連用熱水拌勻入磁器內置鍋中頓半日曬干去茱萸不用

右等分為細末神曲末打糊為丸每服五十九甘草

姜湯下赤痢甘草湯白痢姜湯下

附二和湯

黃芩

黃連

木香

枳殼

當歸錢各五

白芍二升甘草三升川芎

桃仁各一升五升理血

滑石五分陳皮 蒼朮各一錢五分枳殼一錢

右水煎若食積加山查只實

亦胃中有熱宜降胃

火則呃逆自止三蒂

散補遺

補遺三石竹剪湯

石蓮子 石膏

石菖蒲 竹剪竹

絲塘泥中爛斷竹

頭是也 金涼傘

鷄脚草 烏藥

白芍藥 黃連

枳殼 青皮

木通

右谷芽灯心同煎

少加升麻以提藥

氣上行五更橘葉

附四味香連丸

二服有積自行無積自止止後勿服

黃連十升 木香二升 大黃四升 枳殼一升

右陳麩糊丸如菽豆大每服七十九空心米飲下

附四主二佐丸

治赤白痢久不愈腹痛者

乳香 沒香 桃仁 滑石 木香佐 枳殼佐

右神曲糊丸米湯下百九次下穢如爛魚腸二三升

愈此方每用之不加黃則不下

附通玄一八丹 治積聚止瀉痢之妙藥治積聚清晨

用姜片服之稍瀉一二次即除以粥補之治瀉痢食

後用清茶服之即止

黃連八升 芍藥 當歸 生地黃 烏梅各五

共為細末用椎猪肚一个以藥盛于內以線縫之用

湯下香連丸一百

補遺三蒂散

柿蒂七個 箸蒂七

茄蒂七 沉香

木香 石膏

芫筍根 厚朴

烏藥 竹剪

桑打 一个 莢奴一个

白水煎服

滑脫

久病滑泄不禁氣虛

欲脫訶子散 泄瀉門

元氣脫弱大孔如竹

同真出無禁真人券

菲菜二斤鋪底面于鍋內蒸之候湯乾再添蒸一日

以藥熟為度就將猪肚帶藥用石杵春搗之糜爛為

丸每服七十丸此藥以姜湯服之則行以清茶服之

則止能通能塞故名通玄神效

糾○真人券臟湯和劑方 治大人小兒冷熱不調下痢

赤白或如膿血魚腦髓裏急後重臍腹疼痛如脫肛

墜下酒毒便血並治之

嬰粟殼 去蒂蓋蜜炙

當歸去芦 酒洗六分

木香 二兩四分不見火

甘草 一兩八分不見火

每服四錢水一鍾煎服臟寒者加附子

糾○錢氏白木散 治氣血俱虛神弱之人或瀉痢或吐

白木

人參

甘草

右為粗末每服五錢水一鍾煎七分食前溫服

芍藥 藥皮丸子和方治一切濕熱痢類併窘痛無問膿

與血

芍藥

黃蘗 各一兩當歸

右為末水丸小豆大溫水下三四十九等服忌膩生

冷一切熱物

附○木香散 本事方治隔年痢不止并治血痢尤佳

木香

黃連 各半及一味同炒

嬰粟殼 生姜 各半兩同炒

右為末入麝香少許每服二錢米飲下

○丹谿活套云痢疾乃外感兼內傷之候也須分表裏治

麻湯 餅或神效三

香散或和中飲並見

下滑而脫肛者蓋大

腸有火元氣不足陽

氣下陷也宜升提陽

氣上行後用藥以滋

之則肛自上也資過

關飲兼洗法並補遺

補遺七資過關飲

五倍子 升麻

櫻櫚子 烏梅

乾柿皮 石榴皮

筆頭灰 臨服時放

下蓋滾茶泡之

右谷芽灯心陳廬

米一撮水煎服

補遺洗藥方

五倍子 陳壁土 各一兩 礬五斤

荷葉 一張 葱 三莖

右水五碗煎洗取

效一方香附荆芥

為末每服三匙水

休息痢

下痢久不止者名休

息痢蓋由濕熱傷乎

氣血脾消氣陷故經

年不愈宜調氣血健

脾升氣然後可安十

平湯補遺或三根飲

見下或錢氏白朮散

附餘久病便清血胃

風湯傷寒門倦怠食

不進衛生湯泄瀉門

脾氣陷下虛坐努責

不出補中益氣湯虛

損門

補遺十平湯

砂仁 烏梅

木賊 當歸

黃連 白芍

甘草 川芎

白朮 陳皮

之在表者必惡寒發熱身首俱痛宜以小柴胡湯去

人參棗子加蒼朮川芎陳皮生芍藥微汗以散之在

裡者必後重窘迫腹痛下積早宜以大小承氣河間

酒煎大黃湯之類下之餘邪未盡更以芍藥湯香連

丸之類以散其邪穢積已盡而更衣未息者此大腸

不行收令故也宜以固腸丸三香散之類以止瀉之

禁口者須詳証按法調治切不可輕用粟壳肉豆蔻

訶子之類以試之殺人於反掌之間也但凡痢証不

問輕重若和氣正盛而以粟壳之類止瀉之雖不死

亦成休息痢二三年不能愈也又不可輕用巴豆華

牛等熱毒之藥攻之蓋病因熱毒又得熱毒之劑以

火濟火不死何待

○祖傳經驗秘方和中飲治痢疾不分赤白久近服之无

有不效者但熱痢口不食者不可服

陳皮

白朮

茯苓

芍藥各一兩

草菓仁七分 甘草三分

陳倉米二升 砂糖三升

粟殼細碎一 烏梅一個

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水二盞煎至

一盞去粗温服

○經驗三根飲

治休息痢年久不愈者其效如神

五倍木根

蒼耳草根

臭樗木根刮取白皮

各等分細切每服七錢重加生姜三片大棗一枚大

黑豆三十六粒糯米四十九粒水二盞煎至一盞去

粗温服

○經驗二方飲

治痢後不謹感冒寒湿或涉水履霜以致兩足痛痺如刀割虎咬之狀膝臏腫大不能行動

右公芽一撮生薑
三片水煎服

痢後風

痢後遍身疼痛手足
拘挛不能牽動下床
此因患痢之後不避
風寒以致筋脉不和
氣血凝滯名痢後風
乃濕勝也宜用風藥
以散之蓋風能勝濕
故也行氣和血卻風
湯補遺或經驗二防
飲見下或加味敗毒
散加檳榔木瓜斑痧

門若痢後脚弱漸細
小者蒼白龜板藥皮
丸見下

補遺行氣和血卻風湯	牛膝	當歸
	木防已	防風
	荊芥	黃芩
	木瓜	陳皮
	羌活	茵陳
	薄荷	檳榔
	枳殼	
	右姜三片水煎服	

名鶴膝風此藥效

人參

白朮

黃芪各一糸其草炙半糸

川歸

川芎

芍藥 熟地黃各一糸

防風

防已

羌活 牛膝各七分

杜仲

姜汁拌炒

草薢各一糸

附子 童子尿浸三日去皮

右細切作一服加生薑三片大棗二枚水二盞煎至

一盞去粗空心温服

○仁齋云下痢噤口不食者雖曰脾虛蓋亦熱氣閉膈心

胸間所致也俗用木香則失之温用山藥則失之閉

惟真料參苓白朮散加石菖蒲末以道地粳米飲多

年陳倉米尤佳温調下或人參茯苓石蓮子肉入此

少菖蒲為末與之胸次一開自然思食其參苓白朮

○砂宿或火入木香見內傷門類

一子年將五十夏秋間得痢疾月餘服藥而火愈積已但尽糟粕不食晝夜五六次入厠兼脫肛不安又半月諸藥不效予記祖傳一方用池塘中蟹一個如法修事多用生薑米糲作羹入砂糖一小塊不用鹽醬熟煮吃一二碗三日不登厠大腸自此實矣肛門亦收而不脫夫此証蓋因脾土受震致肺與大腸俱失化源之所滋養是故大腸不行致令也此母能令子虛耳蟹乃介虫屬金而有土性温能補脾肺又能况肺惡寒先得苓連苦寒凉之味已多今用生薑之辛以補肺金用砂糖之甘以補脾土肺氣之實其大腸亦隨而實故得以行收令也故其功效如是之驗焉

嘔吐指南

胃熱

脈浮而洪得食即嘔
此胃受熱邪故也二
陳湯加梔子姜炒茶
連痰飲門或涼膈飲
補遺火上冲食已暴
吐和中桔梗湯或荆
黃散調枳榔末並見
下發熱心煩唇口焦
而喜冷者加味小柴
胡湯補遺水漿不入
食即吐大小便秘結

腹脹時發痠痛此大
小腸膀胱熱結而不
通三一承氣湯傷寒
門或調胃潤下湯補
遺愚按三因方言嘔
吐症忌用利藥此言
其常然大小腸膀胱
熱結而不通上作嘔
吐隔食若不用利藥
開通發泄則嘔吐何
由而止或止嘔吐而
大小便秘澀者此
利藥又當所忌也感
暑致嘔煩渴身熱者
茹飲中暑門

嘔吐門

論

內經曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於火東垣曰夫嘔吐
噦三者皆屬於胃胃者摠司也以其氣血多少為異耳
嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血俱病也
吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲血病也噦者
太陽也少陽多氣少血故有聲無物氣病也河間曰胃
膈熱甚則為嘔火氣炎上之象也吐證有三氣積寒也
皆從三焦論之上焦在胃口上通於天氣主納而不出
中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熟水穀下焦在
臍下下通地氣主出而不納是故上焦吐者皆從於氣
氣者天之陽也其脈浮而洪其証食已即吐渴飲飲水

大便燥結氣上衝胸而發痛其治當降氣和中中焦吐
者皆從於積有陰有陽食與氣相假為積而痛其脈浮
而長其証或先痛而後吐或先吐而後痛治法當以毒
藥去其積枳榔木香行其氣下焦吐者皆從於寒地道
也其脈沉而遲其証朝食暮吐暮食朝吐小便清利大
便秘而不通治法當以毒藥通其秘塞溫其寒氣大便
漸通復以中焦藥和之不令大便秘結而自愈也外有
傷寒陽明實熱大甚而吐逆者始傷飲食填塞大陰以
致胃氣不得宣通而吐者有胃熱而吐者有胃寒而吐
者有久病氣虛胃氣衰甚聞穀氣則嘔噦者有脾濕太
甚不能運化精微致清痰留飲鬱滯上中二焦時之惡
心吐清水者宜各以類推而治之不可執一見也

脈法

嘔吐門五卷

補遺涼膈飲 治熱

鬱中焦而作胸膈

膨悶心不舒暢

梔子炒焦色五分

桔梗 連翹

活石研細各一分

陳枳殼八分

黃連酒炒七分

生甘草 薄荷

各五分 芒硝將

熟時下一分

右水一鍾煎至八

分食遠熱服

補遺調胃潤下湯

治大便乾嘔噦膈

翻者 厚朴

川歸 厚朴

桃仁去皮研如泥

陳皮各一分

大黃酒浸一分

甘草三分芒硝九

水二鍾姜一片先

將歸朴陳莢甘草

煎至八分去渣入

硝黃復煎二沸二

更時熱服

補遺小柴胡加竹茹

湯一治發熱而嘔

柴胡去芦二分

黃芩 人參

脉經曰嘔而脉弱小便復利身有微熱厥者難治

跌傷脉浮者胃氣虛寒氣在上噉氣在下二氣相爭但

其出而不入其人即嘔而不得食恐怖即死寬緩即瘥

脉陽緊陰數其人食已則吐陽浮而數亦為吐

寸口脉緊而乳緊則為寒乳則為虛虛寒相搏脉為陰

秘結而遲人則噎閉上脉數其人則吐 脉弦者虛也

胃氣無餘朝食暮吐暮食朝吐變為反胃寒在於上

醫反下之令脉反弦故名曰虛

寸口脉微而數則無氣无氣則榮虛榮虛則血不足血

不足則胸中冷故吐

方法用溪方法凡一十條

丹谿曰胃中有熱則有痰二陳湯加炒梔子姜炒

連生姜煎服

○凡嘔吐者切不可下逆之故也

○有久病吐者胃氣虛不納穀也生姜人參黃芪白木香

附治之凡痞滿短氣而吐宜補中氣止可用調中益

氣湯

○肝火出胃逆上嘔吐抑青丸方見火門

○夏月嘔吐不止五苓散加姜汁入湯調服

○吐虫而嘔用黑錫炒成灰楨榔末米飲調服

○惡心吐清水者有熱有痰有虛皆用生薑隨証佐藥治

○胃中有熱者二陳湯加姜汁制炒黃連黃芩按虛者加

人參白朮又云胃虛弱嘔者二陳湯加砂仁藿香白朮

○痰飲為患或因多食生冷脾胃不和以致嘔吐惡心或

○頭眩或胃脘懷懷不快或發寒熱二陳湯加丁香烏

○梅生姜煎服心下痞而痛者加草豆蔻仁

甘草各七分半
竹茹一塊橘皮
半夏湯泡各一分
水一盞姜七片煎
七分溫服

胃寒

脈遲食久而作吐者
此胃脘受寒所致理
中湯加半夏木香姜
汁傷寒門大便溏小
便白口左燥棘不效
大丁附治中湯丁香
安胃湯並見下食積
胃氣相飯而吐紫

○痰熱惡心嘔吐氣盛者道痰湯加宿砂姜炒黃連竹茹
○藿香安胃散 治胃氣虛弱不能飲食時時嘔吐惡
心者

藿香

人參

陳皮各一分丁香五分

右細切作一服水一鍾煎七分溫服

○和中桔梗湯 治上焦氣熱上衝食已暴吐脈浮而洪

宜先和

中桔梗半一分半夏麩二分陳皮法白一枳實炒黃

白茯苓一分白木一分半厚朴姜汁拌炒一分

右細切作一服水一盞煎一盞去粗取清汁調木

香散二分空腹服三服後氣漸下吐漸止然後去木

香散加芍藥二錢黃芪一錢半煎服病愈則已如大

便燥結食不下以大承氣湯去芒硝微下之再服

前藥補之如人便復結又依前微下之

○木香散

木香

檳榔

各等分為細末前藥調之服

○荊黃湯 治暴吐上焦熱氣所衝脈浮而洪者

荊芥蕙五分人參半一分甘草一分大黃一分半

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗調檳榔散二

錢空心服

○檳榔散

檳榔三分

木香一分半

輕粉少許

右為細末用前藥調服為丸亦可用水浸蒸餅丸如

小豆大每服二十九食後服

○青鎮丸

治上焦吐頭痛發熱有汗脈弦

補遺丁香散
丁香煮散四丁良
紅豆川芎甘草姜
青橘二胡椒五益

沉丸見下寒嘔吐清
水者二陳湯加丁香
砂仁 痰飲門陽虛嘔
吐冷汗自出手足厥
冷三建湯加丁香胡
椒沉香木香傷寒門
胸膈痞悶心腹刺痛
痰逆惡寒或四肢厥
冷丁香煮散補遺惡
風嘔吐者藿香散補

補遺靈香散
姜盪煎治胃寒源

霍香散二霍陳皮
厚朴三灸北桂枝
夏四考芳姜棗引
惡風嘔吐服之奇

食嘔

食停胃口不化新穀
遇之而反出脉沉瓜
蒂散痰飲門或青蘇
散泄瀉門或藿香平
胃散見下或胃冷湯
內傷門或養胃和中
清道氣饑飲食不

柴胡二兩去黃芩七分半甘草五分 半夏五分
清代二介半人參五分

右為細末姜汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十
丸生姜湯送下食後服

河○白木湯 治胃中虛損及有痰而吐者

半夏麴五介白木二介 檳榔二介半木香一介
甘草一介 茯苓二介

右為細末每服二錢生姜湯調下食前服

河○金花丸 治吐食脉弦者肝乘於脾而吐乃由脾胃

之虛宜治風安脾
半夏湯包七次 檳榔二介 雄黃一介半

右為細末姜汁和蒸餅為丸如梧桐子大小兒丸如
黍米大生姜湯送下從少至多漸加服之以止止為

度無難辨於脾故飲食不

河○紫沉丸治中焦吐食由食積與寒氣相假故吐而痛

宜服此藥
半夏麴二錢 烏梅肉二錢 代赭石三錢 杏仁去皮一錢

破仁三錢 丁香 煨榔路二 沉香 木香各一

陳皮五錢 白木一介 白豈仁半介 巴豈霜另研半錢

右為細末入芭豈霜和勻醋糊麴為丸如黍米大每
服五十九食後生姜湯下吐愈則止小兒另丸如芝

麻大治小兒食積吐食亦大效
仲○小半夏湯治陽明傷寒不納穀而嘔吐不已者
半夏湯泡七次一兩 生姜二兩

右細切水三鍾煎至一鍾去粗分作二服服之
活○生薑汁半夏湯 治胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦

清道靈香散
陳湯加神麴山查姜
炒黃連厚朴枳實痰
飲門飲酒傷胃嘔吐
不止醉鄉珍室屑內
傷門
補遺養胃和中飲
健脾胃止嘔吐消
食化痰
厚朴 陳皮
製半夏 蒼朮
真紫蘇梗
白木各一介
砂仁七粒研
甘草多五分

茯苓七分

右姜三片棗一枚

水一鍾煎八分食

遠溫服輕者只以

三因丸砂仁湯送

下如虛者加人參

七分乾姜炮者五

氣鬱

憂愁思慮七情所感
氣鬱于中心頭作痛
以致嘔吐涎沫或發
寒熱眩暈痞滿不進
飲食此乃肝火衝胃

不噦徹心憤憤然無奈者

半夏湯泡洗七次一兩

右細切作水一盞半生姜自然汁半盞同煎至一盞

溫服仲景曰嘔多雖有陽明証慎不可下孫思邈曰

嘔家多服生姜乃嘔家之聖藥也氣逆者以辛散之故

以生姜為主治之

陳○藿香平胃散 治內傷飲食填塞太陰嘔不已

藿香 厚朴姜制 陳皮 各一兩 蒼朮 一兩半

甘草炙三分 砂仁五分研神麩五分炒

右細切作一服加生姜五片大棗一枚水一鍾半煎

一盞去粗溫服

扁○胃苓湯 治証同前

平胃散加五苓散加姜棗水煎服之

陳○黃連六一湯 治因多食煎炒燥熱之類以致

胃脘當心而痛或嘔吐不已漸成反胃

黃連六分 甘草炙一兩

右細切作一服水一大盞煎至七分去粗溫服

扁○丁附治中湯 治胃傷寒冷之物致心腹疔痛而嘔

噦不止

人參五分 白朮一兩 乾姜一兩 甘草三分炙

陳皮 青皮 丁香各一兩 附子二兩

右細切作一服加生姜五片大棗二枚水一盞半煎

至二盞去粗溫服

溪冊○加味二陳湯 治胃中有伏火膈上有稠痰時當胃

口作痛及惡心吐清水不快

陳皮祛白一兩 半夏泡一兩 茯苓一兩 甘草炙三分

補遺大藿香散

藿香葉洗去土

半夏 白朮

人參去芦 南木香

不見火各一兩

茯苓 去皮 陳皮

桔梗去芦剉細

批把葉掣去毛

甘草炙各半兩

每服五錢水一盞
姜五片煎七分溫
服又棗一枚

補遺快氣湯 治諸

氣心腹脹痛胸膈
噎塞噫氣吞酸胃

中痰逆嘔吐

快氣湯方效比神

一甘草芍二砂仁

八香附子同為末

百沸鹽湯點服類

痰氣

氣滯滯食不下作
二陳湯加竹瀝姜

汁和實瓜麥飲門

或加味二陳湯見下

或旋覆花湯補遺脉

沉瓜蒂散痰飲門痰

在胸中嘔噦溫膽湯

驚悸門有氣逆枳桔

二陳湯內傷門或導

痰湯痰飲門

補遺旋覆花湯 治

中脘伏痰吐逆

旋覆花去梗

半夏湯泡七次

陳皮 乾姜泡

各一兩 枳榔

人參 去苦甘草炙

枝子炒一升 黃連姜汁拌川芎一升 白朮一錢

乾薑炒五分 蒼朮一升 香附一升 牡荊子炒研

挾虛者加人參一升

右細切作一服水二盞加生姜三片煎一盞稍熱服

如胃口痛甚入生薑自然汁一合和勻服

東○丁香安胃湯 治嘔吐噦胃虛寒所致

丁香五分 吳茱萸一升 草豆蔻一升 黃芪二升

人參一升 炙甘草五分 柴胡五分 蒼朮一升

升麻五分 當歸身五分 陳皮五分 黃柏二分

右細切作一服水一大盞煎七分空心溫服

東○茯苓半夏湯 治脾胃虛弱身重有痰惡心欲吐風

邪羈絆於脾胃之間當先實其脾土

白朮一升 茯苓一升 半夏一升 炒糶一升

右細切作一服水一盞半加生姜五片煎一盞熱服

○丹溪活套云胃中有熱膈中有痰令人時常嘔吐清水

作噯氣吞酸等証用二陳湯加姜炒黃連梔子蒼朮

川芎香附砂仁神曲山查少加木香以行滯氣加姜

水煎服○久病虛者加人參白朮○胃寒者加益智

草豆蔻乾姜桂心之類去黃連枝子又甚者加丁香

附子○如脇痛或脾痛右關脉弦嘔吐不已此木來

土之分也本方加人參白朮升麻柴胡青皮芍藥川

芎砂仁神曲之類○如時常吐清水或口其不喜食

冷涎自下而湧上者此脾熱所致也本方加白朮芍

藥升麻土炒本連梔子神曲麥芽乾生薑或丸或煎

皆可○如時常惡心吐清水心胃作痛得食則暫止

白朮各半兩

每服四錢水一盞

姜七片煎服不拘

時候

胃虛

久病後不能納食脉

微而吐者此胃中虛

弱故也六君子湯加

丁香砂仁虛損門或

白朮湯見下飲食傷

脾胃而吐枳木丸內

傷門或枳木二湯加

香砂痰飲門

肝相南

痰氣

五怒七情傷於脾胃

鬱而生痰痰與氣搏

升而不降飲食不下

氣留於咽嗝者五膈

寬中散或五噎散並

補遺因氣滯者脉沉

伏二陳湯加木香砂

仁青皮枳殼或大半

夏湯並痰飲門或木

香調氣飲子補遺內

有痰阻者脉滑而有

饑則甚者此胃中有蛇也本方加苦練根史君子煎

服即愈或用黑錫灰槌榔末等分米飲調下

在城黃氏婦將年三十產後因食傷致胃虛不納穀四

十餘日矣聞穀氣則惡心而嘔聞藥氣亦嘔求予治

予曰藥不能入口又將何法以治之乎懇求不已遂

制一方用人參白朮茯苓各一錢甘草二分陳皮麝

香砂仁各五分炒神麩一錢十年以上陳倉米一合

順流水二大白蠶煎沸泡伏龍肝研細攪渾放澄清

取一盞加姜棗同煎前藥至七分稍冷服此藥遂納

而不吐別以陳倉米煎湯時時與之日進前藥二三

服漸能吃粥而安後以法治十數人皆驗

噎膈門

論

內經曰三陽結謂之膈子和云三陽者大小腸膀胱也

結謂熱結也小腸熱結則血脉燥大腸熱結則不能團腸

膀胱熱結則津液涸三陽既結則前後閉塞下既不通必

反而上行所以噎食不下縱下而復出也此陽火不下

降而上行也故經又曰少陽所至為嘔湧溢食不下此

理明矣又先哲論膈噎及胃大率以血液乾槁其或咽

喉窒塞食不能下其槁在吸門或食下則胃脘當心而

痛須臾吐出食出痛止其槁在賁門此皆上焦之膈噎

也其或食物可下良久復出其槁在幽門此中焦之膈

噎也其或朝食暮吐暮食朝吐其槁在蘭門大小腸之

力二陳湯加枳壳瓜
萎仁竹瀝姜汁或化
痰丸痰飲門或瓜萎
笑丸見下開格者必
用吐提其氣若橫格
不必在於出痰也有
痰亦宜吐二陳湯服
之以鵝翎探吐痰飲
門

補遺五膈寬中散

治七情四氣致傷

脾胃胸膈噎塞

白苳仁研砂仁研

香附子人參

陳皮青皮

甘草

右姜三片水煎

食鹽少許

補遺五噎散 治五

噎食不下胸膈滿

痛

人參 桔梗

白豆蔻 木香

枳頭糠 沉香

葶澄茄 乾姜

半夏湯泡七次

枇杷葉去毛茸

白木各一錢

甘草多五分

問此下焦之膈噎也雖然亦有斯須輕病而為醫所誤
者丹溪論之詳矣謂夫氣之初病其端甚微或因此少
飲食不謹或外冒風雨內傷七情或食味過厚偏助陽
氣積成膈熱或資稟克實表密無汁或性急易怒相火
上發以致津液不行清濁相干惟氣之為病或痞或痛
或不思食或噫腐吞酸或嘈雜痞悶醫者不求其本便
認為寒遽以辛香燥熱之劑投之時暫得快以為神方
厚味仍前不節七情反覆相侵舊病被劫暫開濁液易
於攢聚或半月或一月前証復作如此延蔓自氣成積
自積成痰此為痰為飲為吞酸之由也良工未遇謬藥
又行痰挾瘀血遂成窠囊此為痞為痛為嘔吐膈噎反
胃之次第也醫者尤謂虛而積寒非尋常草木可療竟
以烏附助佐丹劑專意服餌積而久也血液俱耗胃院

入食亦不多名之曰噎其槁在下與胃為近食雖可下
難盡入胃良久復出名之曰膈亦曰反胃大便秘小若
羊屎然名雖不同病出一休又曰噎病生於血乾血陰
也陰生靜內外兩靜則藏府之火不起而金水二藏有
養陰血自生腸胃津液傳化合宜何噎之有醫者當知
此意不可妄以燥熱之劑以火濟火則何以異刺人而
殺之也慎之慎之

脉法

脉經曰寸緊尺澁其人胸滿不能食而吐吐止者為下
之故不能食誤言未止者此為反胃故尺為微澁也
寸口脉緊而乳緊則為寒乳則為虛虛寒相搏脉為陰
結而遲其人則噎閉上脉數其人則吐脉弦者虛也

有妻七序水煎食

後服

補遺木香調氣飲子

治一切氣噎寒痰

飲不下

青皮去穢木香

蓬義木 枳榔

陳皮去白甘草炙

蘿蔔子炒人參

枳殼各五分

藿香 去土一錢

香白芷 二分半

右水煎溫服

火炎

胃氣無餘朝食暮吐暮食朝吐變於胃及寒在於上

醫及下之令脉反弦故名曰虛

跌陽脉而澁浮則虛澁則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐

暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脉緊而澁其病難治

脉瀯而小血不足 脉大而弱氣不足

方法 用溪方法

凡十一條

丹溪曰大率屬血虛氣虛有痰

戴氏曰氣虛者脉必緩而無力血虛者脉必數而無力痰者寸關必沉或伏而大者氣滯結者關沉而滑

○張雞峯曰噎當是神思間病惟內觀以自養可安此言

深中病情

○屎如羊屎者不治 大腸無血故也 年高者不治 年五十餘則

戴氏曰氣血俱虛者則口中多沫但見沫大出者必死不治

○治法用童便韭汁竹瀝姜汁牛羊乳 一本有氣虛入四

因火而成其來有漸

病源不一有因思慮

過度而動脾火者有

因忿怒過度而動肝

火者有因久食煎炒

而生胃火者有因淫

慾忘反而起腎火者

蓋火氣炎上熏蒸沖

逆食不得下而嘔者

脉必數而有力二陳

加竹瀝姜汁炒連山

梔或和中桔梗湯嘔

吐門大便燥結者大

承氣湯微下傷寒門

○一法用黃連三錢炒 山查肉三錢保和丸三錢同為

末糊丸麻子大胭脂胚子為衣人參湯入竹瀝下五

十九

○一方用馬兜兒燒存性陳香湯調服 即野田瓜此方多有

原本書馬兜兒誤也

○一云馬兜兒燒存性一錢好棗肉四枚平胃散二錢溫

酒調服食即可下然後隨病源調理

○一方用吳茱萸黃連貝母瓜萎子牛轉草丸服

○一方用韭汁二兩牛乳一盞生姜半兩搗汁和勻服效

○有氣結者用開導之劑有陰火上炎者作陰虛治有積

血者當消息去之韭汁能下膈上瘀血

冊上方 ○古方用人參以補肺御米以解毒竹瀝以清痰

乾姜以養血粟米以實胃蜜以潤燥姜以去穢有治

或潤腸膏見下或通

幽湯燥症門施之於

前滋陰生精降火之

劑繼之於后當歸活

血潤腸湯補遺或人

參利膈丸見下血少

陰虛火盛不得眠食

入反出硃砂安神丸

驚悸明或四物湯加

黃柏知母姜汁竹瀝

虛損明

補遺當歸活血潤腸

湯一膈有十般

之症皆因動性不

能緩則醫於肝

人之膈以備用

否則木乘土位木

曰曲直作酸然酸

則能收塞胃脘因

之而收小室碍乃

作膈症

當歸酒洗一手半

桃仁去皮尖研泥

黃連葉萸湯拌炒

川朴姜汁拌炒

大腹皮茸草煎湯

洗靜各一手

青色麝陳皮八分

片白木鹽水拌炒

紅花各七分

寒者必為當時有實因於寒者用之也挾寒者間或

有之今人悉因痰氣久誤於醫傳變而成其無寒也

明矣

局○瓜蒌實丸 治膈噎胸膈痞痛徹背脇喘急妨悶

瓜蒌實去壳研積殼去穢麥半夏湯泡七桔梗各一

右為細末姜汁米糊為丸如梧桐子大每服五十九

生姜湯送下

東○寬中進食丸滋形氣喜飲食方見內傷門

東○人參利膈丸 治膈噎胸中不利大便結燥痰嗽喘

滿脾胃滯滯推陳致新膈氣之聖藥也

木香 檳榔各七人參 當歸 厚朴姜制

藿香 甘草 枳實炒 大黃酒浸蒸熟

右為細末滴水為丸如梧桐子大服五十九丸溫水下

便非汁之類為主治○如胸中覺有熱悶本方加土

炒黃連黃芩瓜蒌仁桔梗之類○如血胃瘦弱之人

本方合四物湯少加杏仁泥紅花童便非汁之類仍

不可缺○如飲酒人本方加砂糖駝屎入內服○如

朝食暮吐暮食朝吐或食下須臾即吐者此胃可容

受而脾不能傳送也或大小腸秘結不通食返而上

奔也本方加酒蒸大黃桃仁之類以潤之脾不磨者

本方多加麥蘖麩神麩之類以助化之○如氣虛肥

白人膈噎者本方合四君子湯亦加竹瀝姜汁為要

藥也○有因七情鬱結成氣噎者本方加香附撫弓

木香檳榔括萎仁砂仁之類○凡膈噎大便燥結用

大黃乃急則治其標之劑也仍用四物湯加童便非

汁

汁

汁

汁

汁

汁

汁

汁

炙甘草五分

善酒者加葛七分

右水一鍾煎至七

分食透温服忌厚

味難化之物兼服

三因冲和丸日間

食後少頃時白湯

下五十九傷寒門

夜更用柿蒂七个

煎湯下滾痰丸三

十九腸潤即佳痰

虛症

脈數而无力者此紅

虛也血虛不能營

大腸故便難蓋幽門

不通上冲吸門食不

能納年老若難治少

者皆可保全四物湯

加桃仁紅花麻仁枳

殼結甚者暫加熟大

黃以通其滯量人虛

實用之虛損門中年

人四物湯加蒼朮必

用葶便製過加薑汁

牛半乳竹瀝姜汁氣

虛者脉緩而无力四

君子湯加蘆根童便

或參苓白朮散並虛

汁多飲牛羊乳為上策也但不可以人乳代之蓋人乳內有飲食烹飪之火及七情之火存於中故不可代服也

○祖傳經曰秘方潤腸膏 治膈噎大便燥結飲食良久復出及朝食暮吐暮食朝吐者其功甚捷

新取威靈仙四兩搗汁四五月開花者 生姜四兩搗汁

真麻油二兩 白砂蜜四兩煎沸掠出上

右四味同入銀石器內攪勻慢火煎候如飴時時以筋挑食之一料未愈再服一料决効

○經驗大力奪命丸 治膈噎不下食及翻胃等証 許頭糠 牛轉草各半斤 糯米一斤

右為細末取黃母牛口中涎沫為丸如龍眼大入鍋中慢火煮熟食之加沙糖二三兩入內丸尤佳

○一方 治膈噎久不納食 隔年炊飯乾不拘多少

右一味以急流順水煎煮糜爛取濃汁時時與之待能食後以調脾進食生血順氣之藥調治而安

○稻溪金賢九里年五十三夏秋間得噎証胃脘痛食不下或食下良久復出大便燥結人黑瘦殊甚求予治

診其脉右手關前弦滑而洪關後畧沉小左三部俱沉弦尺帶芤予曰此中氣不足木來侮土上焦濕熱

鬱結成痰下焦血少故大便燥結陰火上衝吸門故食不下用四物以生血用四君子以補氣用二陳以

祛痰三合成劑加姜炒黃連炒枳實括萎仁少加砂仁又間服潤腸丸或服丹溪墜痰丸半年服前藥百

餘貼病全安

指門二虛皆可服三
因冲和虎脂健脾胃
傷寒門 瘀血則脉澀
桃仁承氣湯下之傷
寒門在上犀角地黄
湯血症門

補道三因冲和虎脂
健脾胃 食隔五
噎翻胃俱可服之
以三因冲和在賭
末四兩加乾虎藥
一兩用破罐內水
煮爛搗極細絞汁
同馬兜兒如法丸
之酒炒

飢逆指南

胃火

上逆而餓脉洪大燥
渴便難內熱此胃火
也小半夏茯苓湯加
枳實芍之 痰飲門利
後胃逆而餓橘皮竹
茹湯見下

陰火

氣從脘下逆上而作
飢夜分轉甚者此阴
火上冲也四物湯加

○梅林駱氏婦予妻孀也年四十九身材畧瘦小勤於女
工得膈意証半年矣飲食絕不進而大便結燥不行
者十數日小腹隱隱然疼痛求予治診之六脉皆沉
伏予以生挑仁七個令細嚼杵生韭汁一盞送下片
時許病者云胸中畧見寬舒以四物湯六錢加括蕒
仁一錢堯仁泥半錢酒蒸大黃一錢酒紅花一分煎
成正藥一盞取新温羊乳汁一盞合而服之半日後
下宿糞若干明日腹中痛止漸可進稀粥而少安後
以四物湯出入加減合羊乳汁服五六十貼而安

飢逆門

論

內經曰諸逆衝上皆屬於火丹溪曰飢病氣逆也以其
氣自脘下直衝上出於口之名也東垣謂火与元氣
不兩立又謂火為元氣之賊古方悉以胃弱言之而
不及火且以丁香柿蒂竹茹陳皮等劑治之未審孰
為降火孰為補虛人之陰氣依胃為養胃上損傷則
木來侮之矣謂之土敗木賊也陰為火所乘不得內相
火挾相火之勢故其氣直衝清道而上言胃弱者阴
弱也虛之甚也病者見此似為危証依正法而治之
者尚不能保其一二而况誤醫者乎雖然亦有因寒
而為飢者不可不審或因飲食太過填塞胸中而氣

黃酒知母竹茹陳皮
茯苓 虛損門

痰氣逆滯

无別症忽然發飽此
痰氣逆滯氣從胸中
起中州元氣鬱也小
半夏茯苓湯加枳殼
木香傷寒門或芩白
湯調木香調氣散補
遺痰碍氣逆而飽用
蜜湯探吐
補遺木香調氣散
治氣滯胸膈虛痞
惡心宿食不消心

不得升降者或有痰閉於上火起於下而氣不得伸
越者有為傷寒熱病陽明內實過期而失下清氣不
得升濁氣不得降以致氣不宣通而發飽者凡若此
者皆實証也醫者宜專心致意察審虛實而調治之
不可妄為處治之以天人之天年也幸甚

脈法

脈浮而緩者易治弦急而按之不鼓者難治
脈結或促或微皆可治 脈代者危
右關脈弦者木乘土位難治

方法

丹溪曰大率有痰有氣虛有虛火上衝視有餘不足之
○痰與食在上者吐之入參芩稀涎散之類
○不足者補之入參白朮煎湯下火補丸

南木香不見火

丁香 檀香

白豆蔻仁各二兩

藿香去梗與上

甘草各八兩

縮砂仁四兩

末之每服二錢入

鹽以許沸湯點服

胃寒

脈遲滿手足寒氣逆
作飢无執症者此胃
寒也生姜半夏湯附
餘或橘皮半夏生姜

石或吐或補隨証施治

○痰用此皮... 丹溪法 ○飽逆自利滑石甘草黃柏芍藥人參白朮陳皮

加竹瀝服

○痢疾發飽用人參白朮煎湯調益元散頻服自止

○陳皮竹茹湯 治傷寒餘熱未解氣虛發飽

甘草 錢 人參 二錢 陳皮 錢 白三 青竹茹 四錢

右細切作一服加生姜三片大棗一枚煎服

○橘皮半夏生姜湯 治氣虛有痰發飽

陳皮 半夏 乾生姜 人參 通草

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗煎服

○六君子湯 治痰挾氣虛發熱

陳皮 一錢 半夏 一錢半 茯苓 一錢 甘草 五分

湯或丁香柿蒂湯並
見下吐利後胃虛宗
足厥冷者活附子湯
見下或理中湯加丁
香木香枳殼傷寒門

病後飢

病後元氣不足胃弱
氣閉而發飢又新穀
氣與故氣相拒而
作者加味丁香柿蒂
湯補遺又因服攻病
藥致傷胃氣下陷而
元氣將離以致胃氣
其丹田之氣疲斃或

人參一錢 白朮一錢半

右細切作一服加棗二枚生姜三片新汲水煎服

附○半夏生姜湯 治咳逆欲死

半夏一兩二錢半 生姜一兩

右以水二鍾煎八分去滓分作二服

附○大濟方

人參五白朮八分黃芪五分廣陳皮七分廣木香二分

白豈仁一剉懷山藥八分炙甘草七分石斛七分沉香三分

姜三片棗三枚粳米一撮水一盞煎五分不拘時服

第二三服未效服三因冲和丸三十粒白湯送下

○丹溪活法云凡傷寒發飢有四証不可不辨有中氣不

足脉虛微氣不相續而發飢者宜用補中益氣湯加

生脉散黃柏以降虛火或水加附子服之亦愈

乃三焦元氣與胃氣

愈敗矣乃危亡之兆

也宜服六劑方附錄

或人參理中湯傷寒

門痢後發飢六君子

加柿蒂箸丁虛損門

補遺丁香柿蒂散

丁香九個木香四

枇杷葉去毛茸

柿蒂付五白朮

陳皮各七分

白豈仁五分

右姜三片棗一枚

水煎服

而飲水大過成水結胸而又發飢者宜小陷胸湯或

用小青龍湯去麻黃加附子治水寒相搏發飢大妙

有傳經傷寒熱証醫者誤用姜桂等熱藥助起火邪

痰火相搏而為咳逆者宜用黃連解毒白虎湯及竹

瀝之類治之

祖傳經驗灸逆法

乳根二穴直乳下一寸六分婦人在乳房下起肉處

陷中灸七壯即止其效如神

又氣海一穴直臍下一寸半灸三七壯立止

東陽李氏子病傷寒陽明內實與與補藥治而成發

飢十日後召予診其脈長而實大與大承氣湯大下

之熱退而飢亦止許盤松周氏子得傷寒証七日熱

退而飢連聲不絕幸家傍得召予診脈六脈皆沉細

無力人倦甚以補中益氣湯作大劑如泡附子一錢

一日三貼煎與多乳根氣海二處當日飢止

吞酸指南

吞酸

吞酸者營精之久不能自涌而出伏於肺胃之間略不得上咽不得下肌表得風寒則執愈鬱而酸味刺心肌膚得溫暖則腠理開發或得吞執湯丸則津液流通鬱熱得行亦可暫解蓋標寒而本熱也故素問河間言執者言其本

吞酸門

論

內經曰諸嘔吐酸皆屬於熱惟李東垣獨以為寒誠一偏之見也河間原病式曰酸者肝木之味也由火盛制金不能平木則肝木自甚故為酸也如飲食熱則易于酸矣是以肝熱則口酸也或言為寒者但謂傷生冷硬物而喜噫醋吞酸故俗醫主於溫和脾胃豈知人之傷於寒也則為病熱蓋寒傷皮毛則腠理閉密陽氣怫鬱而為執証故傷寒執在表而以麻黃湯執藥發散使腠理開通汗泄執退而愈也凡內傷冷物者或但陰勝陽而為病寒或寒熱相搏怫鬱而為病熱亦有內傷冷物而反病熱得汗泄執退身涼而病愈也或微而止為中

也東垣言寒者其

標也必務食自養二

陳湯加茱萸黃連順

其性折之佐以蒼朮

茯苓以行其濕熱再

加姜炒黃連痰飲門

或參萸丸見下吞酸

有食不化者平胃散

加山查姜連神麩麥

芽中溫門或黃連而

化補遺或透膈湯附

餘

補遺黃連清化丸

治吞酸食不化者

川連去蘆一兩

酸俗謂之醋心法宜泄酸散之亦微而止為中

若久喜酸否則不宜溫宜以寒藥治之後以涼藥調

之結散熱去則氣和矣所以中酸不宜食粘滑油膩

者謂能令氣鬱不通暢如食物在器覆蓋熱而自酸

宜食粉合菜蔬能令氣之通利也曰寒曰熱於斯明

矣李者詳之

脉法

脉弦而滑 兩手或浮而弦或浮而滑或沉而遲或紫

而洪或洪而數或沉而遲胸中有寒飲洪者痰熱在膈

間時吐酸水欲成胃反也

方法丹溪方法凡七條

○茱萸丸

吳茱萸法梗湯泡 陳皮銚白五 黃芩 陳壁土炒五

吳茱萸法梗湯泡 陳皮銚白五 黃芩 陳壁土炒五

吳茱萸法梗湯泡 陳皮銚白五 黃芩 陳壁土炒五

吳茱萸浸炒一錢

桃仁二十四個研

陳皮去白半兩

半夏一兩半

右為細末神麩糊

丸薑薑大每服百

九姜湯下

吐酸

夫吐酸者平時津液

隨上升之氣鬱之日

久温中生熱而從火

化而作酸味二陳湯

加茱萸黃連山梔

蒼朮厚朴生薑煎飲

黃連土炒一兩

蒼朮米苈浸七錢半

右為細末神麩糊丸如菉豆大每服二三十九津唾

嚥下一方茱萸連二味隨時令寒熱迭為舊宋月倍

相旅蒼朮衣苈為補助湯浸蒸餅為小丸吞之

治酸必用茱萸順其性而折之

○食鬱有痰二陳湯加南星黃芩之類

○加味平胃散治吞酸因食鬱所致

生料平胃散加炒神麩炒麥芽姜棗同煎

○酸味宜節厚味必疏食自養則病易安

○吐清水用蒼朮陳壁土苈苈滑石炒白木陳皮煎服

○參黃丸上可治吞酸下可治自利又云治温而氣滯者

温熱甚者用之為細導

六一散一料只茱萸一兩制右為飯丸服

之物時吐酸水加味

二陳湯見下中脘有

宿食留飲酸味蠶心

或吐酸水如醋之

味重苦牙三因麩木

丸或茱萸更丸並見下

或回食丸補遺胃虛

弱飲食久留嘔吐酸

水霍散安胃散見下

積積可令丸 即茱

連丸瀉肝火行濕

為之反佐開病結

治肝和可助補脾

待腐熟

藿香

丁香

人參各二錢 陳皮 五錢

右為細末每服二錢加生薑水煎温服

○加減二陳湯 治痰飲為患嘔吐頭眩心悸或因食

生冷硬物脾胃不和時吐酸水

丁香五分 半夏二錢 陳皮二錢 茯苓一錢 甘草七分

右細切作一服加生薑三片水煎服

○三因麩木丸 治中脘宿食留飲酸蠶心痛吐清水

神麩炒三兩 蒼朮米泔浸一兩 砂仁一兩 陳皮去白一兩

右為細末生薑汁別煮神麩糊丸如梧桐子大每服

七十九姜湯送下

○透隔湯 治脾胃不和中脘氣滯胸膈滿悶噎塞不

藥

黃連 去鬚六兩
吳茱萸 六兩
右為細末粥丸如
梧桐子大每服百
丸清米飲下○一
方名左金丸治肝
火蒸蕈或半兩水
丸白湯下

六神指南

痰疝雜

痰因火動者脉滑而
數治宜先痰後火二
陳加姜炒連六山梔
為君星夏為佐更加
青黛滋痰脉沉而滑
二陳加二木香附

食鬱熱

食鬱作熱者脈數而
大當治火開導合連
枳朮丸加麩蘆山香

通意氣吞酸脇力刺脹嘔逆痰涎飲食不下

木香 白豆蔻 縮砂仁 枳殼 厚朴 半夏 青皮 陳皮 甘草 大黃 朴硝
右各等分每服一兩二盞生姜三片棗子一枚煎至
一盞去滓通口服食後

○祖傳經驗治吞酸方

用黃連吳茱萸各一兩右以黃連細切同茱萸以井
花水浸七日去連將茱萸焙乾每日清晨以米湯一
四十九粒

嘈雜門

論

內經曰胃為水穀之海無物不受若夫濕麩魚腥水菓
生冷以及烹調飪和粘滑難化等物恣食無節朝傷暮
損而成清痰稠飲滯于中宮故謂嘈雜噯氣吞酸痞滿
甚則為翻胃膈噎即此之由也夫嘈雜之為証也似饑
不饑似痛不痛而有懊懷不自寧之况者是也其証或
兼噯氣或兼痞滿或兼噯心漸至胃腕作痛實痰火之
為患也治法以南星半夏橘紅之類以消其痰芩連梔
子石膏知母之類以降其火蒼朮白朮芍藥之類以健
脾行濕壯其本元又當忌日節慾無有不妥者也

脉法

醫方原流

卷

星夏食鬱不消胸膈
大安丸 並內傷門

氣鬱

氣鬱者脉沉而澁宜
開鬱理氣越鞠丸鬱
症門或二陳加枳桔
香附為藥姜炒連蒼
痰如貝母痰飲門

火嘈

火盛者二陳加蒼連
山梔痰飲門或三補
七火熱門火鬱二陳
如山梔香附等蒼

痞滿指南

中氣不足

中氣不足者不能運
化精微而為痞悶脉
弱无力切不可用利
藥攻之宜補中益氣
湯久服中氣充足清
道律運痞滿自除也
鹿藿門或厚朴温中
湯或大消痞丸並見
下或平補枳朮丸補
遺

補遺平補枳朮丸

有寸關脉緊而滑 兩寸弦滑胸中有雷飲

寸脉橫者膈上有橫積也○右關弦急甚者木乘土位
欲作胃反難治

方法

丹溪曰此為食鬱有熱炒梔子姜炒黃連乃必用之藥

○肥人宜二陳湯少加撫芎蒼朮白朮梔子

○若濕痰氣滯不喜食用三補丸加蒼朮倍香附

○三聖丸 治嘈雜神効

白朮 四兩 黃連 五錢 橘紅 一兩
右為細末神麩糊丸如菘豆大每服五十九津澤下
或姜湯下

或姜湯下

○欲吐者則宜吐之所謂在上者因而越之是也學者宜
詳安焉

痞滿門

脉法

脉經曰痞脉浮堅而下之緊反入裏因作痞

脉濡弱弱反在關濡反在顛微反在上澁反在下微則

陽氣不足澁則無血陽氣反微中風汗出而燥煩澁則

無血厥而且寒陽微不可下下則心下痞堅

右關脉多弦弦而遲者必心下堅 此肝木剋脾土鬱結痰
於臍府氣不行則痞

方法

丹溪曰痞滿與脹滿不同脹滿內脹而外亦形痞則內

查痞悶而外無脹急之形也蓋由陰伏陽蓄氣血不

運而成位心下之中腹滿痞塞皆土邪之所為耳有

因誤下裏氣虛邪乘虛而入於心之分野有因食痰

調中補氣血消痞

清熱

白朮去芦三兩

白芍藥剉碎用酒浸炒一兩半

枳實去穢炒

川黃連酒浸炒

陳皮各一兩

南木香不見火

人參各半兩

右為細末生荷葉

煮濃湯打米糊為

丸如梧桐子大每

服五十九漸加至

米湯下

愚按此方用白朮

三兩以補脾氣為

君用白芍藥一兩

五錢以補脾血為

臣用枳實一兩以

消痞炒黃連一兩

以清熱陳皮一兩

以和胃為佐用木

香半兩以調諸氣

人參半兩以補元

氣為使如此平補

氣血均去痰火兼

通氣道則病邪日

消而脾胃日壯矣

積不能施行而作痞者有溫熱太甚土來心下而為

痞者

○用黃連黃芩枳實之苦以泄之厚朴生姜半夏之辛以

散之人參白朮之甘溫以補之茯苓澤瀉之鹹淡以

滲之大柴與溫同治使上下分消可也

○厚朴溫中湯 溫脾胃虛弱心腹脹滿疼痛時發時止

厚朴姜汁拌一兩 木香各五分 陳皮去白一兩 草豆蔻

甘草各五分 茯苓各五分 乾生薑一兩

右細切水煎服

○木香順氣湯 治腹脹心腹滿悶

木香 益智 陳皮 草豆蔻 蒼朮各五分

厚朴姜製青皮各四分 茯苓 澤瀉 半夏各六分

乾生薑 柴萸各三分 當歸 人參各五分 升麻

右細切作一服水盞半煎一盞溫服

○痞有痰挾血成窠者用桃仁紅花香附子大黃

之類治之

○七氣湯 治七情所傷憂思鬱結府藏氣不和乎心腹

痞悶

半夏 茯苓各二錢 厚朴姜制一兩 紫蘇葉一兩

右細切作一服加生姜三片水盞半煎一盞溫服

○大消痞丸 治一切心下痞及年久不愈者

乾生薑 神麩炒 甘草煨各二兩 半夏湯泡化

澤瀉 厚朴姜汁炒 砂仁各三錢 朱砂二錢

陳皮去白 人參各四錢 枳實五錢 去穢炒

黃連陳壁土 黃芩如連 姜黃 白朮各一兩

白朮各一兩

又何痞滿之足患

食積

人念生冷滯泥之物
內傷不能消化久積
停痰而為痞者枳木
九或和安丸或枳桔
二陳湯加神麩山查
麥芽並內傷門心下
虛痞按之痛者惡食
懶倦右關脉弦治宜
開胃進食枳實消痞
丸即失笑丸或消痞
丸見下

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九
至百丸空心白湯下

堧○失笑丸一名快實消痞丸 治右關脉弦心下虛痞惡食懶倦

開胃進食

乾生姜一錢甘草炙

麥藥炒

白茯苓

白木各二錢半夏麩

人參各三錢厚朴姜制四

枳實麵炒黃黃連各五錢

右為細末蒸餅丸如梧桐子大每服七十八丸白湯下

堧○消痞湯一名木香治因憂氣鬱結中脘腹皮裏微痛

心下痞滿不思飲食

川歸

枳實各四陳皮

生姜

木香各六分柴胡七分

甘草炙

草豆蔻各一火麩包煨

半夏一錢半紅花五分

濕熱

人受濕熱之氣太甚
而腹中痞滿者治宜
滋濕瀉熱痞滿自消
黃連瀉心湯補遺有
熱者三黃瀉心湯傷
寒門火和藥於坤土
之位而作痞者二陳
湯加黃連黃芩瓜麥
仁痰飲門瘧疾日久
腹中結痞疼痛面黃
者二十四氣丸加明
礬四兩又青礬炒黃
麥一升內傷門

○黃連消痞丸

澤瀉

治心下痞滿壅滯不散煩熱嘔促不安

茯苓

姜黃各一錢乾生薑二錢甘草炙

枳實麵炒黃

白木各三錢陳皮五錢

朱苓去黑皮

右為細末蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九湯下

○黃芩利膈丸

生黃芩

治除胸中熱利膈上痰

澤瀉五錢

南星

黃連各五錢

白木二錢

枳殼炒去穢陳皮去白各

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九

白湯下忌酒濕麵魚腥

○丹溪活套云凡心下痞滿須用枳實黃連○如肥人心

補遺黃連瀉心湯

黃連一錢二分

厚朴姜製一錢

人參 白芍藥

乾姜泡各八分

甘草炙五分

右姜三片水一盞

煎七分服

痰滯

痰氣凝滯中州痞滿

者宜下之小陷胸湯

傷寒門或枳桔二陳

湯加黃連瓜蒌仁天

花粉內傷門痰氣壅

滯心胸痞滿不寬導

痰湯痰飲門或玉液

丸補遺或黃連消痞

丸或黃芩利膈丸或

木香順氣湯或七氣

湯並見下或瓜蒌實

丸噎膈門

補遺玉液丸

軟石膏不拘多少

又云火煨紅出火

毒

右為末醋糊丸如

葶豆大服之專能

瀉胃火併治食積

痰火

下痞內有溫飲宜蒼朮半夏礮枳芍滑石之類○

如瘦人心下痞乃鬱熱在上焦宜枳實黃連以導之

葛根升麻以發之○如人飲食後因胃風寒飲食不

消而作痞滿宜吳茱萸礮砂藿香豆蔻之類溫以化

之○如脾氣虛弱轉運不調飲食不化而作痞者宜

白朮山查神麩麥芽之類以消之○又曰痞滿之証

不一有傷寒下早而作痞者枳殼桔梗湯小陷胸湯

之類○有因酒食填塞胸中而作痞者保和丸東垣

枳實導滯丸木香化滯湯之類○傷寒下多則亡陰

而痞者四物湯加人參苓白朮升麻柴胡少佐以陳

皮枳殼之類監之○或大病後元氣未復而胸滿氣

短者補中益氣湯陳皮枳木丸木香枳木丸之類○

夫痞滿之証不可執一全然在活法詳脈証虛而

之可也

山頭沈三十一丈夫年三十餘身材肥盛夏秋間因官差

丈量田地辛苦至冬間得痞滿証兩脇氣攻胸中飽

悶不能臥欲成脹滿証歷數醫者皆以疎氣耗散之

藥皆不效三月初旬召予診治兩手關前皆浮洪而

弦瀉兩關後脈皆沉伏予曰膈上有稠痰脾土之氣

敦阜肝木鬱結而不伸當用吐法木鬱達之之理也

奈何值冬月降沉之令未可行此法且先與豁痰疎

肝氣瀉脾胃敦阜之氣用平胃散加半夏茯苓青皮

川芎草龍胆香附砂仁柴胡黃連瓜蒌子等藥病退

之十有三四待次年二月初旬為行倒倉法平安

腫脹指南

實腫

夫水腫者通身皮膚光腫如泡者是也。以健脾滲水利小便進飲食元氣失者可下禹攻散補遺通利後便收拾用參芪補養脾胃若內有積塊堅痞廣木潰堅湯見下或保安丸內傷門作量法腰已上腫者因受風寒宜汗之麻

中

黃甘草湯後服五皮散並附除腰已下腫者多受溫宜滲利之五苓散傷寒門合五皮散同煎服

補遺禹功散

黑牽牛頭末四兩

小茴香炒一兩

木之白姜汁一二

錢以時服

虛腫

夫虛腫有三風腫者皮癢麻木不仁走注疼痛四君子湯加升

腫脹門

論

內經曰諸溫腫滿皆屬於脾又曰諸脹張大皆屬於熱夫脾虛不能制水水漬妄行故通身面目手足皆浮而腫名曰水腫或腹大如鼓而面目四肢不腫名曰脹滿又名鼓脹皆脾土濕熱為病腫輕而脹重也丹溪曰心肺陽也居上腎肝陰也居下甲居中也亦陰也屬土經曰飲食入胃游溢精氣上升於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾具坤靜之德而有乾健之運故能使心肺之降腎肝之陰升而成天地交之泰是謂平人令也七情內傷六淫外侵飲食不節房勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失脾胃雖受

穀不能運化故陽自升陰自降而成天地不交之否清濁相混緣道壅塞溫鬱為熱又生溫上熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以其外雖堅滿中空無物有似於鼓膠固難治又名蠱者若虫侵蝕有蠱之義理宜補脾又須養肺以制木使脾無賊邪之慮滋腎以制火使肺得清化之令卻益味以防助邪斷妄想以保母氣遠音樂戒暴怒無有不安鑿者不察急於獲效病者苦於脹滿喜行利樂以求通快殊不知寬得一日二日復脹愈甚真氣已傷去死不遠矣俗謂氣無補法者以其痞滿壅塞似難於補不思正氣虛而不能運行邪滯著而不出所以為病經曰壯者氣行則愈怯者著而成病氣虛不補利何由退病何由安且此病之起固非一年根深蒂固欲取速效自求徇耳知王道者可與語此其或受

麻蒼木柴胡防風羌活

活虛損門氣腫者皮

厚四肢瘦削腹脇脹

滿六君子湯加厚朴

木香木通以行其氣

虛損門或加味枳木

湯補遺血腫者皮膚

間有紅縷赤痕四物

湯如苑仁紅花以行

血加厚朴以行氣虛

損門

補遺加味枳木湯

治氣為痰飲所隔

心下堅脹名曰氣

分

枳殼 白木

紫蘇 荳蔻 木香

陳皮 枳即

桔梗 各一條

五靈脂 炒柱

甘草 各三分

赤茯苓 去皮

半夏 各七分半

姜三片 水煎服

陰水腫

脈息沉澁身無熱其

色青白不煩不渴而

瀉小便清澁此陰水

發腫也宜實脾土為

之病淺脾胃尚壯積滯不固者惟可畧與疎導而不可

峻與利也

愚按先生此論詳明殆盡誠千古不易之定識也及

視東垣脈滿論又以藏寒生滿病立說引脈經胃中

寒則脈滿之語以為之証愚恐南北風土寒熱不

同難以一途而論雖然愚嘗按丹溪法活人多矣

是以東垣之論不與略合故不敢採取其言以為後人之惑也

脈法

鍼經曰其脈大堅以瀉者脹也

脈經曰閉上脈虛則內脹 遲而滑者脹

脈盛而緊者脹 虛而緊瀉者脹

或弦而遲或浮而數皆脹也

○丹溪曰水腫脈多沉伏病陽水熱陽証脈必沉數○病

陰水兼陰 証脈必沉澁○煩滿小便赤澁大便秘

結此為陽水不煩滿大便溏小便赤澁而不赤澁此為

陰水

脈沉而滑為風水 脈浮而遲弦而緊皆為腫也

水病腹大如鼓脈實者生虛者死洪大者微細者死

腹脹便血脈大時絕劇脈小疾者死

中惡腹大四肢滿脈大而緩者生浮而緊者死

緊而榮衛俱絕面浮腫者死

唇腫齒焦者死 卒唇腫而蒼黑者死

掌腫無紋者死 臍腫西出者死

缺盆平者死 陰囊並俱腫者死

脈絕口張足腫者死 足跌腫膝如斗者死

方法 丹溪方法凡八條

丹溪曰古方惟禹餘糧丸制肝補脾殊為切當然亦須

隨時隨証加減一友人得脹疾自制此藥服之予曰

先脾土一實能制腎

水則浮腫自消矣笑

脾散內傷門常藤木

香散白木木香散並

見下或續隨子丸補

遺或防己茯苓湯見

後

補遺續隨子丸治

通身虛腫喘悶

續隨子 人參

防己 木香

赤茯苓麩炒

海金砂另研

枳榔各五子

苦亭藤四兩

凡小寒肉在如梧

椰子大每服五十

丸桑白皮湯下

脈有沉數色赤面黃

燥者赤溺口苦咽乾

煩渴咳嗽喘急不得

安眠此陽水發浮也

宜神助散補遺或三

花神祐凡見下或踈

鑿飲子附餘或六君

子湯加苓朴炒山梔

麥門冬 虛損門通身

發瘡者赤小豆湯附

濕熱藥多且煅煉之火尚存宜自加減彼不聽服之

一月口鼻出血骨立而死

○朝寬暮急血虛暮寬朝急氣虛朝暮急氣血俱虛

○治腫脹大法宜補中行濕利小便以人參白朮為君蒼

朮陳皮茯苓為臣黃芩麥門冬為使以制肝木少加

厚朴以消腹脹氣不運加丁香木通氣下陷加升麻

柴胡提之血虛加補血藥痰盛加利痰藥隨証加減

用之無不効者

○盧氏醫鏡以水腫隸於腎肝胃而不及脾又肺金盛而

生水水溢妄行豈理也哉夫脾土受病肺為之子固

不能自盛而生水然肺金氣清而能生水則滋長腎

陰奉行降令為生化之源何病腫之有今為腫之水

乃腐濁之氣滲透經絡流注谿谷灌入縫道而赤因

之而化水欲藉脾土以制之道腎氣以利之殊不知

脾病則金氣衰不寡於畏而來侮土脾欲不病不可

得矣治法宜清心經之火補養脾土全運化之職肺

氣下降滲道開通其精之清者復回而為氣為血

為津液敗濁者在上為汗在下而為溺以漸而斡矣

○東垣曰宜以辛散之以苦瀉之以淡滲利之使上下分

消其濕正所謂開鬼門潔淨府開鬼門者謂發汗也

潔淨府者利小便也

○產後浮腫必大補氣血少佐以蒼朮茯苓使水自降大

劑白朮補脾壅滿者用半夏陳皮香附紫芝有執當

清肺金麥門冬黃芩之屬

○熱水腫用山梔子仁炒為末米飲調下三五子

若胃腕執病在上者連殼用

○溪法

餘小便不利四麥散
加意以山施中濕門

補遺神助散

神助散中六用葶
一牽澤瀉四猪苓
三州椒目并葱白
酒水同煎效可稱

風水腫

中有水氣面目腫大
有熱身體及重而酸
或惡風自汗外痲骨
節疼痛脉浮不渴此
風水腫也宜葶藶桂
枝芎藭補遺或金匱越

○禹餘糧丸 治中滿氣脹喘滿及水氣脹

蛇含石 三兩煨 針砂 五兩 禹餘糧 三兩同針砂炒

已上三味為主其次量入虛實入下項藥

木香 牛膝 蓬莪木 白茯苓

桂心 川芎 茴香 白豆仁

三稜 羌活 茯苓 乾姜

青皮 陳皮 附子 當歸各五分

右為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九空

心溫酒下

○紫矩三和湯

陳皮 去白 紫蘇 甘草 炙各七 厚朴 姜制

板椒 白木 各一 鐵海金砂 四分 木通 三分

右細切作一服加生姜三片水煎服

○濟生紫蘇湯

治憂慮過度致傷脾胃心腹脹滿喘促

治腸鳴食走瀉，有聲大小便不利脉虛而嘔瀉

紫蘇子 研 一升 白木 二升 人參 一升 大腹皮 酒洗

草菓仁 半夏 厚朴 不香

陳皮 枳殼 炒 甘草 炙各五分

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水煎溫服

○木香順氣湯 治濁氣在上則生腹脹

木香 三分 厚朴 四分 青皮 陳皮

益智 茯苓 澤瀉 乾生姜

半夏 各二分 川歸 五分 升麻 一分 吳茱萸 湯泡

柴胡 一分 蒼朮 五分 白朮 一升 草豆蔻 三分

右細切作一服水二盞煎溫服

○中滿分消丸 治中滿鼓脹氣脹水脹熱服

皮水腫

外症附腫按之沒指
不惡風其腹如鼓發
汗之症脉浮此皮水
腫也宜防已茯苓湯

作一服

本前入苦酒相和

桂枝 各三升

黃芪 五升 芍藥

風水脉自沉

熱汗出而渴狀如

治黃汗身體腫發

治黃汗身體腫發

補遺或五皮散附錄

補遺防已茯苓湯

治皮水為病四肢

腫水氣在皮膚中

四肢重者

防已 黃芪

桂枝各三升

茯苓連皮六升

甘草二升

作一貼水煎服

裏水腫
裏水者脈浮外症自
喘金匱越脾湯加
白木補遺

補遺金匱越脾湯

治風水惡風一身

悉腫脈浮不渴續

自汗出無大熱

石膏四升半

大棗二枚 生姜

甘草各二錢

加白木四錢

作一貼水煎服

死感脹

人因病後有失維持

風寒暑濕乘時而發

心腹脹滿有妨飲食

者此外感脹滿也宜

黃芩 去朽細切酒

白木 人參各二

朱苓 去皮乾生薑

厚朴 姜制知母酒炒

石為細末蒸餅糊丸如梧桐子大每服百丸焙熱白

湯或淡姜湯下

東 ○廣末潰堅湯 治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令

人坐臥不寧便澀滯上氣喘促或通身虛腫

厚朴 黃芩

草豈寔 當歸各五分半夏七分

升麻 紅花 吳茱萸各二生甘草

柴胡 澤瀉 神麴炒 青皮

陳皮各三分湯加乾葛

右細切作一服加生薑三片水二盞煎七分滿服在

遠忌酒醋溫麪一服之後中滿減半止有積塊未消

再服後藥

○半夏厚朴湯

紅花 蘇木 各半 木香 青皮 各二分

吳茱萸 乾生薑 黃連 各一分 肉桂

蒼朮 白茯苓 澤瀉 柴胡

陳皮 生黃芩 草豆蔻 生甘草 各三分

京三稜 當歸稍 朱苓 升麻 各四分

神麴 炒六分 厚朴 姜制八分 半夏 湯泡一分 桃仁 七個去

昆布 如渴加乾姜三分

右細切作一服水三盞煎一盞稍熱服上此藥二貼

之後前証又減一半却於前藥中減服之

用藿香麻黃升麻乾
葛桂枝防風蒼朮以
鮮表大正氣散補遺
補遺天正氣散

大正氣三甘桂枝
煨榔姜殼六陳皮
藿香木夏并川朴
姜棗同煎治脹宜

內傷脹

脾胃不和食啖生冷
過飲寒漿有傷脾胃
遂成腹脹心下痞滿
有妨飲食甚則腸痛
此為食脹也宜消殺

為主強中湯補遺有
熟朮香煨榔丸諸氣
門有寒用木香厚朴
丁香砂仁神曲香附
之類以溫之或傷飢
失飽痞滿停酸早食
晚不能食此穀脹也
大異香散補遺

補遺強中湯
白朮 炮炒去油
乾姜 炮各二兩
青皮 去穢人參
丁香 各三兩
附子 炮去皮臍
厚朴 姜炒草果仁

破滯氣湯化一各木香破滯氣散心腹滿悶

甘草 炙一分 白檀香 藿香 陳皮
大腹子 白豆蔻 白茯苓 桔梗 各二分
砂仁 人參 青皮 煨榔
木香 姜黃 白朮 各四分

右細作一服水盞半煎至一盞去粗溫服不拘時候

○草豆蔻湯 治腹中虛脹
澤瀉 一分 木香 三分 神麴 四分 半夏 泡
枳實 炮 草豆蔻 黃芪 春腹 益智
甘草 各五分 青皮 陳皮 各六分 茯苓 當歸 各七分

右細切作一服加生姜三片水二大盞煎一盞溫服
冬月加黃芪六七分春夏止服正藥食遠
○葶藶水香散 治濕熱內外甚水腫腹脹小便赤澀

大便滑泄此藥下水濕滑腫服止瀉利小便
葶藶子 茯苓 去皮 朱苓 去皮 白朮 各二錢
木香 五分 澤瀉 木通 甘草 各五錢
辣桂 二錢 白滑石 三兩

右為細末每服二錢白湯調下食前服
○白朮木香散 治喘嗽腫欬成變水病者不能卧不
敢多食小便閉而不通者

白朮 木朱苓 去皮 澤瀉 甘草
木通 赤茯苓 各五分 木香 煨榔 各三錢
陳皮 錢 白 二官桂 二分 滑石 二錢

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎一盞溫服
○二氣散 治水氣蠱脹滿悶
白丑 黑丑 各二錢

甘草各半兩

每服四錢姜三片

棗一枚水一鍾煎

七分溫服不拘時

候嘔者加半夏或

食麵脹滿加蘿蔔

子各半兩

補遺天異香散

大異香中益智仁

稜蓬香附藿香陳

夏其殼梗煎姜棗

穀脹消之效若神

氣脹

邪乘脾胃頭暈嘔逆

脈來浮弦心腹脹滿

者此氣脹也宜青皮

厚朴香附山梔之類

平肝飲子附餘或木

香順氣湯或濟生聚

蘇飲或禹餘糧丸或

破滯氣湯並見下喘

促坐臥不安者沉香

散補遺氣血凝滯腹

脹者四妙丸補遺

補遺沉香散

沉香散二殼除穢

黑角沉香南木香

四蜀子醫腫脹喘

右為細末外用大麥麩四兩同一處拌勻做燒餅臨

卧用茶清一盞下降氣為驗

間○牽牛丸 治一切濕熱腫滿等証

黑丑 黃芩 大黃 板目 滑石絡等

右為細末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服五丸至七

九生姜湯下食後服看虛實加減丸數

間○三花神祐丸 治中滿腹脹 喘嗽淋瀝一切水濕腫

滿濕熱腸胎陳積變生諸疾久病不已黃瘦困倦氣

血壅滯不得宣通或風熱燥鬱肢體痲痺走注疼痛

風痰涎嗽頭目眩暈瘵疾不已癥瘕積聚堅滿痞悶

酒積食積一切痰飲嘔逆及婦人經病不快帶下淋

瀝無問赤白併男婦傷寒濕熱腹滿實痛久新瘦弱

俗不能辨兼瀉新舊腰痛併一切下痢及小兒驚疳

積熱乳癖腹滿並宜服之

甘遂 大戟各五錢 大黃一兩 芫花醋拌濕炒五錢

輕粉一錢研黑丑二兩取頭末一兩淨

右為細末同輕粉拌勻滴水為丸如小豆大初服五

丸每服五丸溫水下日三服加至快利為度利後却

又常服病去乃止設病愈後惟老弱久病虛人勿服

平人常服保養宣通氣血消進飲食病否悶極其著

便多服則頓攻不開轉加痛悶宜初服二丸每服加

二丸至快利為度以意消息小兒丸如麻子大隨強

弱大小增減丸數三四歲者三四丸依前法服

間○宣明雞屎醴酒詞出素問 治鼓脹旦食則不能暮食

痞悶壅塞難當

大黃 桃仁去皮 乾雞屎

重長刊五卷

水煎引子用生姜

補遺四炒丸 四味

各一兩殼四兩分

味同炒取殼為末

四味煎湯打糊丸

四炒一蒸服子蒼

更煎乾漆與茴香

四求枳殼同分炒

取殼九醫胃脹滿方

水脹

脾土受濕不能制水

水浸腸胃溢於皮膚

腹中脹滿或漉上有

吉征冲帶急此水脹

右各等分為細末每服二盞水一盞生姜三片煎湯

調下食遠臨卧服

附○麻黃甘草湯

麻黃去根節四兩 甘草二兩

每服三錢水一盞煮麻黃再滯後入甘草煎七分取

汁慎冒風老人虛人不可輕用

附○五皮散和濟方治風濕客於脾經氣血凝滯以致面

目虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急

五加皮 地骨皮 生姜皮 大腹皮 茯苓皮

右以細切每服二錢水一盞煎八分熱服不拘時切

忌生冷油膩堅硬等物澹寮去五加皮地骨皮用陳

皮桑白皮

附○赤小豆湯 治年少血氣俱熱遂生瘡疥變為腫滿

或煩或渴小便不利

赤小豆湯赤豆歸 商翹防已芍藥皮

澤猪澤豚姜為引 血熱生瘡浮可醫

附○疎鑿飲子 治水氣通身浮腫喘呼氣急煩燥多渴

二便不利

木瓜 赤小豆炒 商陸 羌活

大伏皮 椒目 木通 秦朮

茯苓皮 煨榔各二錢

右細切分二貼每貼水二鍾生姜三片煎八分食遠

服下

附○平肝飲子 治肝氣不平邪乘脾胃頭暈嘔逆心腹

脹滿

防風去芦 桂心不見火枳壳去穢 赤芍藥

防風去芦

桂心不見火枳壳去穢

赤芍藥

此治宜尋水為先大
半夏湯補遺或中滿
分消丸或禹餘糧丸
或二氣散或牽牛丸
並見下

補遺大半夏湯

大半夏湯半夏陳

茯苓桔梗粉甘枳

姜煎大治腸鳴響

脾土虛而脹滿人

血脹

煩燥驚狂帶息虛汗

厥逆小便多大便黑

婦人月經不利腹脹

脈澁而乳大者此血
脹也治宜破血為主
抵當湯或桃仁承氣
湯並傷寒門或人參
芎歸湯補遺或鷄屎
醴酒或桃奴丸並見

補遺人參芎歸湯

人參芎歸三夏歸
四苓一桂五靈脂
人參三木甘蓬木
烏藥砂仁姜棗兒

執脹

發熱煩渴小便赤必

大便秘滯三焦熱氣
不舒降胸脹滿此陽
突生外熱陰勝生內
熱謂之執脹也治宜
清熱七物厚朴湯或
推氣丸並補遺或中
滿分消丸或繫炬三
和湯並見下

補遺七物厚朴湯

七物三甘與大黃

一官桂二芎同藏

四川朴引生薑棗

熱脹瀕宜用此方

補遺推氣丸

推氣丸中黑丑陳

桔梗去芦甘草炙

人參

枳榔

木香不見火陳皮

當歸去芦酒浸

川芎各半

每服四錢水一盞姜五片煎不拘時服

○丹溪活套云凡腹脹瀕用姜制厚朴肥人腹脹必用利
溫蒼木茯苓滑石海金砂之類○色白人腹脹必是
氣虛用人參白朮白茯苓之類○瘦人腹脹是熱必
用黃連黃芩梔子厚朴之類○如因有故蓄血而腹
脹者用赤白紅花甚者用抵當湯丸之類○如因食
積而腹脹者保和丸加木香枳榔阿魏之類○有熱
鬱而脹者木香枳榔丸之類下之○有寒積鬱結而
脹者局方丁香脾積丸東垣三稜消積丸之類○如
因外寒鬱內熱而腹脹者用霍香官桂升麻乾薑之

類○如因多怒鬱氣而脹者宜用蒼木撫芎香附青
皮芍藥柴胡及龍荟丸之類○凡腹脹初得是氣脹
宜行氣疎導之劑木香枳榔枳殼青皮陳皮厚朴之
類○久則成水脹宜行溫利水之劑

○祖傳經驗雞屎醴治鼓脹氣脹水脹等証

錫雞屎一升

右一味研細炒焦色地上出火毒再研極細百沸湯

三麻淋汁每服一大盞調木香枳榔末各一錢日三

服空腹服以平為期

○又經驗治腫脹或遍身水腫或腹大堅滿

三稜 莪木醋炒陳皮去白 青皮 砂仁

羌活 防已 澤瀉 連喬 枳榔各三錢

甘遂二錢 椒目 木香 乾漆各一錢 白丑

黃芩只殼大黃枳
蜜丸七十湯吞進
熱脹瀆知效比神

寒脹

大小二便通利嘔逆
惡心見喜飲食四肢
厥冷脉浮遲而弱腹
脹者此屬寒也治宜
溫寒為主朴附湯或
順氣木香散並補遺
補遺朴附湯 治老
人虛人中寒心腹
膨脹
朴附湯醫本生涼

腹膨朴附引宜姜
更宜棗子同煎服
或可加此南木香
補遺順氣木香散
治氣不升降嘔逆
惡心脇肋脹滿及
酒食所傷噎氣吞
酸心脾刺痛
順氣木香桔梗良
蒼陳甘朴桂茴香
丁皮南木乾姜等
少許焙煎棗子姜

黑丑各二刀取頭尾九錢 大黃八錢 雙頭連三錢

右研為細末麪糊為丸如梧桐子大每服三錢重空
心溫酒送下以利為度病退即止藥忌甘草菘菜
○又經驗桃奴丸治婦人或室女月經不通漸成脹滿及
男子墜馬跌撲損傷以致瘀血停積成血蠱病皆能

治之

桃奴桃樹乾朽小飛 假鼠糞兩頭尖者是

玄胡索 肉桂 香附子 五靈脂

砂仁 桃仁去皮尖各等分

右為末每服三錢溫酒調下

○予族有一兄素能飲酒年五十得腫脹病通身水腫腹
脹尤甚小便澀而不利大便滑泄召予治予曰若戒
酒色鹽醬此病可保無危不然去生漸遠兄曰自今

日戒起予以用溪之法而以參木為君加利水道
肝木清肺金等藥十貼而小水長大便實腫退而安
又半月有二從弟平日同飲酒者曰天民弟素不飲酒
山中之鹿耳我與兄水中之魚也鹿可無水魚亦可
無水乎三人遂痛飲沉醉而止次日病作甚於前復
來求治予曰不可為矣挨過一月而逝

○梅林妻姪孫駱智二得腫脹証亦令戒前四事用前法
服藥四五十貼而愈頗安五年一日嘆曰人不吃塩
醬與死何異遂開塩十數日後舊病大作再來求治不
許又告欲行倒倉法予曰脾虛之甚此法不可行於
今日也踰月膨脹而死予用卅溪之法治腫脹愈者
多矣不得盡述特書此二人不守禁忌者以為後人
病此者之戒云

大醫院補遺真傳醫學源流肯綮大成卷之五終

火平... 蒼刺... 類... 思... 更... 類...

積聚指南

肝積

積聚脈實與強... 沉而小未為祥... 不散皆成積... 令肺受傷... 木尅土土無正位... 身所土逢季旺傳尅... 難其積及留積在肝... 致成肝積名肥氣... 頭有足皆弦細左... 脇下大如杯痛連小... 腹膀胱內宜服青...

太醫院補遺真傳醫學源流肯綮大成卷之六

積聚門

論

內經曰積聚... 腹滿皆太陰濕土... 者陰氣也聚者陽氣也... 積名曰積氣之所聚... 府所成也夫所謂積者... 其部上下有所終始... 始終無根本其痛或... 定位是故肝之積名... 久不愈令人發欬逆... 痰霍連歲不已心之... 積略伏梁起

九補迂肥氣丸見下

補遺青卷丸

蒼木 米泔浸去皮

當歸頭各一兩半

青皮炒一兩

菽水 三稜

鐵孕粉各三兩半

菽木三稜同人醋

煮一伏時久

蛇含石火煨醋淬

五錢

右為細末醋煮米

糊丸如菽豆大每

服四十九當歸浸

酒下

心積

若因失志傷於腎所

勝傳心頂體認水剋

火方火剋金金逢秋

旺難欺侵反成心積

名伏梁其狀起於臍

之上大如手臂架胸

間脉細而沉咽又乾

腹熱心煩其面赤形

容瘦癯心之積宜服

赤龍丸補迂或伏梁

丸見下

補遺赤龍丸

枳殼 去穢麩炒

臍上大如臂上至心下久不愈令人煩心脾之積名曰痞

氣在胃腕石側覆大如盤久不愈令人四肢不收發黃

疸飲食不為飢膚肺之積名曰息奔在右脇下大如覆

杯久不愈令人洒淅寒熱喘咳發肺壅腎之積名奔豚

在小腹上至心下若豚狀或下或上無時久不愈令人

喘逆骨痠少氣東垣曰鍼經云其成積者蓋厥氣生足

悅足悅生脛寒脛寒則血脉凝澁故寒上入腸胃所以

腹脹腹脹則腸外之汁沫迫聚而不得散日以成積矣

或盛食多飲則脉傷若起居不節用力過度則陽絡脉

傷陽絡脉傷則血外溢血外溢則衄血陰絡脉傷則血

內溢血內溢則便血腸胃之絡脉傷則血溢於腸外腸

外有寒汁沫與血相搏則氣聚而成積矣或外中於寒

內傷於憂怒則氣上逆氣逆則六腑不通溫氣不得凝

心蘊暴不散津液凝滲澁者不去而成積矣又曰生於

陰者蓋憂思傷心重寒傷肺忿怒傷肝醉以入房汗出

當風則傷脾用力過度入浴則傷腎此內外二部之所

生病也故難經中說五積各有其名如肝積曰肥氣在

左脇下如杯而臍左有動氣按之勞若痛者無是非是

也餘積皆然治者當察其所痛以知其應有餘不足可

補則補可瀉則瀉毋逆天時詳藏府之高下如寒者熱

之結者散之客者除之留者行之堅者削之按之摩之

醎以輒之苦以瀉之全其真氣而補益之隨其所利而

行之節飲食慎起居和其中外可使必已不然徒以大

毒之劑攻之積不能除反傷正氣終難復也可不慎與

脉法

脉經曰脉來細而附骨者積也在寸口積在胸中微出

黃卷

茯苓 厚朴
人參 白朮
半夏 三稜
右等分為末麩糊
丸如梧子大米飲
下二十九作散酒
調亦可

脾積

怒傷肝者勝傳脾水
射土者土射水土逢
冬水水旺強不能射
水反為殃反成脾積
名痞氣其狀如杯因
氣聚痞塞不通脉大

半夏湯泡七次
吳茱萸湯洗
桂心 人參
桑白皮 甘草
葶藶各一兩半
每服四錢姜三片
枣一枚水煎食前
服

腎積

思傷脾者勝傳腎土
射水而理為順水射
火而夏得令反成腎
積奔豚名發於小腹
上下奔脉沉而急眼

寸口積在喉中在關上積在臍傍上關上積在心下
微下關積在小腸尺微積在氣衝出在右積在右
脉出在左積在左脉兩出積在中央各以其部處之也
脉來小沉而實者脾胃中有積聚不可食食則吐
肺積脉浮而毛按之辟易 心積脉沉而乳上下無端
肝積脉弦而細 腎積脉沉而急
脉沉重而中散者因寒食成積
脉左轉而沉重者氣癥積在胸中
脉右轉出不至寸口者內有肉癥也

方法

丹溪曰塊乃有形之物氣不能成形痰與食積死血也
在中為痰飲在右為食積在左為死血大法臧以飲
之堅以剛之行氣開痰為主

膚虛腫飲食無味詩証黃疸門

○凡婦人腹中有塊多屬死血

○一方治婦人死血食積痰飲成塊在兩脇動作雷鳴嘈

雜眩運身熱時作時止

黃連 一兩半 一兩以吳茱萸半兩同炒去茱萸

茱萸子 半兩 台芎 三稜 山查 一兩

義木 醋煮 麥麩 桃仁 五錢 香附 童便浸

右為細末蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九瀝下

○一方治婦人血塊如盤有孕難服峻藥

香附 四兩 醋 苑仁 去皮尖 海石 二兩 醋 白朮 一兩

右為細末神麩糊丸服

○凡痞塊在皮裡膜外須用補氣藥及香附開之蕪二陳

湯先須斷厚味為要

中昏飢則見時飽則無小腹裏急腰疼楚口乾久嗽骨如柴此狀腎積之大槩宜服腎氣湯黑龍湯並補還或奔豚湯見下

補遺腎氣湯

口戰去梗二錢

川練子小茴香鹽

以許煎湯拌炒

橘核搗碎牡丹皮

白芍酒炒山藥

青皮各一錢

延胡益水炒八分

木通澤瀉

浮腫膨如鼓時兼吐泄瀉久而肌肉削四肢不卒筋痿弱則臧而飽則見此名脾積宜詳辨服黃丸九補遺痞氣丸見下

補遺黃龍丸

附子炮干姜

赤石脂煨醋淬

川椒炒出汗

桂心各半兩

大烏頭二錢半炮

半皮臍

右為末煉蜜丸如梧子大朱砂為衣

○倒倉法用肥嫩黃牝牛肉二三十斤切成小片去筋膜

長流水煮糜爛以布濾去渣滓取淨汁再入鍋中慢

火熬至琥珀色則成劑矣令病者預先斷慾食淡煎

一日不食晚飯設密屋一間明亮而不通風處行之

置穢桶及木瓦盆貯吐下之物一磁瓶盛所出之逆

令病者入室以汁飲一杯少時又飲一杯積數十杯

寒月則重湯溫而飲之任其吐利病在上者欲其吐

多病在下者欲其利多病在中者及在上復在下者

欲其吐利俱多全在活法而為之緩急多寡也視所

出之物必盡病根乃止吐利後必渴甚不得與湯以

所出之溺飲之名輪迴酒非惟可以止渴抑且可以

蕩滌餘垢行後倦睡覺飢先與稠米飲次與淡稀粥

三日後方可與小菜羹次與厚粥軟飯調米半月

○治積塊方用海石三稜莪朮香附同醋煎桃仁紅花五

靈脂之類為丸石醮白木湯下

○黃蜀葵根煎湯入人參白朮青皮陳皮甘草稍牛膝煎

成膏入細研桃仁玄胡粉各少許熱飲之二服當見

塊下病重者補接之後加減再行

○石醮去痰積食積 洗滌垢膩有功

○瓦壘子能消血塊次消痰瓦壘子即蚌壳也靈尚青移

壳上有稜如瓦故名

○積塊不可專用下藥徒損其氣病亦不去當消導使之

鎔化其死血塊去須大補

○三聖膏 貼積塊

用末化石灰半斤為末瓦上炒微紅提出候熱稍減

入大黃末一两炒熱仍提出入桂心末五錢畧炒以

每服十九米飲下

肺積

喜傷心者勝傳肺臨
症時須用意火剋
金芳金尅木木逢春
旺其身足反成肺積
名息貴形於右脇如
杯類喘息奔隘脉浮
微氣逆皆咳目喜閉
膺冷皮中痛若錐狃
如洒上賊風吹宜服
白龍湯補遺或息本
丸見下

補遺白龍湯

枳柳 白芷各七分

沉香各五分

夏加黃柏酒炒七分

冬加薄桂三分

右水一鍾煎至八分

分沉香磨酒入藥

汁空腹溫服

補遺黑龍湯

甘李根皮焙乾

乾葛各兩二錢半

半夏湯泡川芎

當歸各四兩

白芍藥 甘草各

黃芩各三兩

米醋熬成膏厚攤烘熱貼之

琥珀膏

用入黃朴硝各一兩為末以大蒜搗膏貼之

○阿魏丸 治肉積成塊

阿魏

山查各一兩

連喬五錢

黃連六錢半

右以上三味為細末以阿魏用米醋煮糊為丸如梧桐

子六如每服五十九脾胃虛者以白木三錢陳皮茯苓

苓各一錢煎湯送下○一方加半夏一兩以皂角同

石鹽三錢○又一方以醋煮神麩糊為丸無連喬○

又一方既蕪諸方而又有瓜蒌貝母南星風化硝胡

黃連萊菔子麥蘖麩姜汁浸蒸餅為丸治諸般積聚

用者更宜詳之

○大溫中丸○小溫中丸俱以食積成痞塊面色痿黃肌

或一月自覺精神渙發形体輕健沉痾悉能除矣其
後須忌牛肉數年夫牛坤土也黃土之色也以順為
性而効法乎乾以為功者牡之用也肉者胃之藥也
熟而液無形之物也橫散入肉絡由腸胃而滲透肌
膚毛竅瓜甲無不入也積聚久則形質成依附腸胃
迴薄曲折處以為栖泊之窠白阻碍○血津液薰蒸
燔灼或病自非刮腸部骨之神妙可以鉢兩丸散窺
犯其籬牆戶牖乎肉液之散溢腸胃受之其厚皆倍
於前有似乎腫其迴薄曲折處肉液充滿流行有如
洪水泛漲其浮槎陳朽皆推逐蕩漾順流而不可停
畚在表者因吐而汗其清道者自吐而湧濁道者自
泄而去凡屬滯碍一洗而盡牛肉全重厚和順之性
盎然煥然潤澤枯槁補益虛損寧無精神渙發之樂

每服四錢水煎服

諸聚

人因憂氣又食濕麪結於中脘腹皮底微痛心下痞滿不思飲食上則不散此食聚也木香化滯散補遺或阿魏丸見下或食生冷硬物不能消化心腹滿悶保和丸或青蘇散並內傷門或積木消痞丸痞滿門或佐脾丸補遺若因

者致令飲食減少面黃肌痛磨積丸或無已紫金丸並補遺若因傷酒心腹脹滿噁氣吞酸嘔逆不食脇肋疼痛蠲毒丸補遺或草豆蔻丸見下若因事不遂意氣鬱於中而胃脘作痛大七氣湯補遺男子被跌損打傷瘀血凝積痛不可忍桃仁承氣湯傷寒門或鷄鳴散跌傷門女子行經或受風寒或用冷水

乎正以武王克商散財發粟以賑殷人之仰望也其方得於西域之至人凡人於中年後行一二次亦卻疾養壽之一助也

夫倒倉法全籍自飲輪迴酒十數杯以祛逐餘垢迎接調勻新布榮衛使藏氣育膜生意敷暢有脫胎換骨之功也多嫌其穢因致中綴而功虧一簣若非明物理通造化者其肯視為美醞良味乎此段乃丹溪與人書簡所論也愚按內經謂脾胃者倉廩之官五味出焉大腸者傳道之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉今詳此法名為倒倉謂傾倒倉廩之陳腐也其論中反覆叮嚀之意無非只為腸胃中痰積膠固及化生諸般奇形之虫誠恐固疾難療愚嘗屢試明驗惟脾胃與大小腸有食積痰飲而為腹痛痞癖食癯

黃胖痞滿惡心噁氣嘈雜吞酸等証行之無不應手獲効其餘一應氣血虛損與夫反胃膈噎鼓脹癆瘵大風真病已成及肥白氣虛之人或一切証候脉虛軟無力者切不可輕試以自招咎愆丹溪有謂咯血吐紅久病嘗用此法而愈蓋必其人胃中痰火太盛而其氣壯實未虧亦在丹溪之高見親手用之則可今人效顰而妄以似是而非者行之是乃徒取誚於諸人而反謗以丹溪之法不堪信也慎之慎之

東垣 ○廣末清堅湯 治有積塊堅硬如石形大如盤令人坐卧不安中滿腹脹方見腫脹門

東垣 ○半夏厚朴湯 治証同前方見腫脹門

東垣 ○三因散聚湯 治九氣積聚狀如癥瘕隨其上下發作

以致經水不去腹中
作痛四物湯加桂香
附桃仁紅花虛損門
或烏藥散補遺

補遺木香化滯湯

木香化滯六呆橘

七夏八柴并四枳

一草紅花十草蔻

二歸用引姜錢七

補遺佐脾丸

山查 半夏

茯苓各一兩

連翹 陳皮

蘿蔔子各半兩

右為末粥丸服

補遺積丸

磨積二兩橘紅青

更有陳倉米半升

七粒巴豆同米炒

去巴醋糊共丸成

補遺無忌紫金丸

無忌紫金丸治黃

紫金香附縮砂蒼

針砂稜朴青陳等

醋糊丸吞用醋湯

補遺麩丸

麩丸醫執積纏

三枚巴豆炒黃連

去巴蘇麩連三分

細末將來麩糊丸

有時心腹疔痛攻刺腰脇小腹膜脹大小便不利

半夏

杏仁去破尖

附子泡

吳茱萸湯泡去梗焙乾

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞溫服

○千金硝石止可磨塊不令人困須量虛實用之

硝石六兩

大黃兩 兩另人參

右為細末以三年陳米醋三升置磁器中以竹片作

準每入一升作一刻先入大黃不住手攪使微沸盡

一刻乃下餘藥又盡一刻微火熬使可丸如鷄子黃

大每服一九白湯化下或丸梧桐子大每服三五十

丸服後下如雞肝或如米泔赤黑色等物乃効下後

忌風冷宜軟粥將息

○局方妙香 治久年陳積方見火門

○導氣枳壳丸 治氣結不散心胸痞痛逆氣上攻分氣

逐風功菓盡述

枳壳去皮 木通炒

桑白皮炒

我木煨

右等分為細末姜汁調麩煮糊為丸如梧桐子大每

服二十九煎橘皮湯下

○木香三稜丸 治一切氣悶胸膈痞滿榮衛不和口

吐酸水嘔逆惡心飲食不化脇肋疼痛無問久新並

皆治之

青木香

破故紙

茴香

黑丑

川歸各四分陳皮

枳殼炒 厚朴姜制

大黃酒拌濕蒸半錢或一錢大便利即去之

甘草各三兩

陳皮並去白

黑丑炒

白丑炒

京三稜泡

青皮

萊菔子炒

苗香炒

黑丑炒

黑丑炒

補遺烏藥散

烏藥散中烏藥歸

桃仁蓬桔木青皮

婦人血積攻心痛

熱酒調之痛自除

癥

積聚成塊而不能移

動者謂之癥乃有形

之物痰與食積死血

而成也右關脾胃之

位脾胃歲飲食所以

右邊有積則為食癥

宜小溫中丸大溫中

丸並黃疸門或係和

丸山陽門或水香三

稜丸或草薤丸並

見下或消滯丸補遺

或木香枳殼丸或三

稜煎丸或刺蓬煎丸

並附餘左關肝膽之

位肝膽截血液左邊

有積則為血癥香附

海石丹或二炒黃連

丹或積塊方並見下

中間則為水穀出入

之道路五志之火薰

蒸水穀而為痰飲所

以中間有積則為痰

癥小三稜煎丸或香

甘遂

蓬莪木

巴豆

右細切用好米醋二升除砂仁木香外餘藥入醋中

浸一宿入鍋內煮醋盡乾為度同木香砂仁為細末

醋煮麩糊為丸如棗豆大每服五丸或七丸食後服

看虛實大小加減丸數隨湯水任下

○草豆蔻丸

治酒積或傷寒冷之物胃脘痛咽膈不

通者

草豆蔻

黃芩

青皮

右為細末湯浸蒸餅為丸如棗豆大每服一百丸熱

水下

愚按此方乃飲酒過度恣食寒涼之物有痰癖積飲

在胸腹間作痛者之所宜也

○肥氣丸

治肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭

足久不愈令人發欬逆連痰瘧連歲不已

厚朴

乾姜

廣木

右件除茯苓皂角巴豆霜另研末外諸藥共為極細

末和勻煉蜜為丸如梧子大初服二九日加一九二

日加二九漸七加至大便微澹再從二九起加服之

周而復始積減大半勿服

○伏梁丸

治心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至

芫花

川練子

巴豆

右細切用好米醋二升除砂仁木香外餘藥入醋中

浸一宿入鍋內煮醋盡乾為度同木香砂仁為細末

醋煮麩糊為丸如棗豆大每服五丸或七丸食後服

看虛實大小加減丸數隨湯水任下

○草豆蔻丸

治酒積或傷寒冷之物胃脘痛咽膈不

通者

草豆蔻

黃芩

青皮

右為細末湯浸蒸餅為丸如棗豆大每服一百丸熱

水下

愚按此方乃飲酒過度恣食寒涼之物有痰癖積飲

在胸腹間作痛者之所宜也

○肥氣丸

治肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭

足久不愈令人發欬逆連痰瘧連歲不已

厚朴

乾姜

廣木

右件除茯苓皂角巴豆霜另研末外諸藥共為極細

末和勻煉蜜為丸如梧子大初服二九日加一九二

日加二九漸七加至大便微澹再從二九起加服之

周而復始積減大半勿服

○伏梁丸

治心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至

大戟

葫蘆芭

巴戟

右細切用好米醋二升除砂仁木香外餘藥入醋中

浸一宿入鍋內煮醋盡乾為度同木香砂仁為細末

醋煮麩糊為丸如棗豆大每服五丸或七丸食後服

看虛實大小加減丸數隨湯水任下

○草豆蔻丸

治酒積或傷寒冷之物胃脘痛咽膈不

通者

草豆蔻

黃芩

青皮

右為細末湯浸蒸餅為丸如棗豆大每服一百丸熱

水下

愚按此方乃飲酒過度恣食寒涼之物有痰癖積飲

在胸腹間作痛者之所宜也

○肥氣丸

治肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭

足久不愈令人發欬逆連痰瘧連歲不已

厚朴

乾姜

廣木

右件除茯苓皂角巴豆霜另研末外諸藥共為極細

末和勻煉蜜為丸如梧子大初服二九日加一九二

日加二九漸七加至大便微澹再從二九起加服之

周而復始積減大半勿服

○伏梁丸

治心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至

京三稜

巴戟

砂仁

右細切用好米醋二升除砂仁木香外餘藥入醋中

浸一宿入鍋內煮醋盡乾為度同木香砂仁為細末

醋煮麩糊為丸如棗豆大每服五丸或七丸食後服

看虛實大小加減丸數隨湯水任下

○草豆蔻丸

治酒積或傷寒冷之物胃脘痛咽膈不

通者

草豆蔻

黃芩

青皮

右為細末湯浸蒸餅為丸如棗豆大每服一百丸熱

水下

愚按此方乃飲酒過度恣食寒涼之物有痰癖積飲

在胸腹間作痛者之所宜也

○肥氣丸

治肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭

足久不愈令人發欬逆連痰瘧連歲不已

厚朴

乾姜

廣木

右件除茯苓皂角巴豆霜另研末外諸藥共為極細

末和勻煉蜜為丸如梧子大初服二九日加一九二

日加二九漸七加至大便微澹再從二九起加服之

周而復始積減大半勿服

○伏梁丸

治心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至

稜丸並附餘或青蒙

石丸傷寒門凡人面

上白斑若紅能食心

嘈顏色不常臉上有

蟹爪路者北虫積癥

也萬應丸或化虫丸

並諸虫門

補遺消滯丸 治酒

食所傷心腹痞滿

刺痛積不消

黑牽牛二兩

香附子炒一兩

五靈脂一兩

醋糊為丸食後姜

湯下五十九

中癥積痞塊 治腹

呂萊更三斤搗碎

用酒煮熱以布裹

癥積上冷更炒熱

用之癥移走逐尿

之候消乃止

瘕

假物而成形或有或

無或上或下或左或

右謂之瘕也惟婦人

有此症則由內外不

內外因動傷五臟氣

血而成故伯曰石瘕

心下久不愈令人煩心

黃連一兩半厚朴姜制

桂枝一糸 乾姜泡

紅豆蔻二分川烏頭分

右件除巴豆霜外為細末

另研包巴豆霜旋入未和

勻煉蜜丸如梧子大服如

上法淡黃連湯下

○痞氣丸 治脾之積名曰痞氣

在胃脘右側覆大如

盤久不愈令人四肢不收

發黃疸飲食不為肌膚

厚朴姜制四黃連八糸

萊菔三糸 黃芩二糸

人參 澤瀉各一糸白茯苓

一糸川烏泡五分

川椒五分 茵陳酒炒

乾姜泡 砂仁各一糸

白木二分 巴豆霜四分

桂枝四分

右件除巴豆霜另研茯苓

另末旋入外為細末和勻

煉蜜丸如梧桐子大服如

上法淡甘草湯下

○息奔丸 治肺之積名曰息奔

在右脇下大如覆杯

久不愈令人洒淅寒熱喘

咳發肺壅

厚朴姜制八黃連三糸

乾姜泡 白茯苓

川椒炒 紫苑各三糸

川芎泡 桔梗去芦

白豆蔻 陳皮去白 京三稜

泡 天門冬

人參一錢 青皮五分 巴豆霜四分
右件除茯苓巴豆霜各另研旋入外為細末和勻煉
蜜丸如梧子大服如上法淡姜湯送下巴上四方秋
冬加厚朴減黃連四分之一
○奔豚丸 治腎之積名曰奔豚發於小腹上至心下若
豚伏或上或下無時久不愈令人喘逆骨痠少氣及
治男子內結七疝女人瘕聚帶下

生於胞中寒氣客於
 子門閉塞氣道不通
 惡血當瀉不瀉則以
 留止日以益大狀如
 懷子月事不以時下
 可導而下室蓋曰夫
 膀胱為津液之府氣
 化則能出矣今寒氣
 客於子門則必氣塞
 不痛血壅不流而血
 以上之結硬如石日
 以漸大狀如懷子是
 名石瘕此氣先病而
 血後病故月水不來
 則可宣導而下矣見
 石瘕丸補道氣血瘕
 宣明三稜湯補遺
 補遺五疔石瘕丸
 治血塊小腹疼不
 可忍
 瓦坭子即蟬子
 火煨醋淬之
 海蛤粉醋炙
 蓬莪木醋炙
 三稜 紅卷
 五靈脂 香附
 石瘕各等分
 末之醋糊為丸如
 梧桐子大白木湯

厚朴姜制七 黃連五 白茯苓 澤瀉
 菖蒲各二 川烏泡 丁香各五分 苦練酒煮三
 玄胡索一分 全蝎 附子 獨活各一分
 肉桂一分 巴豆霜五分
 右件除巴豆霜外各另研為末旋入外為細末和
 勻煉蜜丸如梧桐子大淡鹽湯下服如用法
 附○濟生大七氣湯 積聚狀如癥瘕隨氣上下發有轉
 香附一 桔梗 藿香各八 青皮 三稜各
 陳皮 蓬木煨 益智仁 官桂各六 甘草各八
 水煎溫服
 附○木香枳殼丸 治一切酒食所傷胸膈痞悶脇助脹
 滿心腹疼痛飲食不消痰逆嘔吐吞酸並宜服之
 枳殼去 茯苓去 白朮 厚朴去 皮去 姜
 半夏湯泡七 人參去 木香 青皮去
 橘皮去 京三稜炮 義木煨 枳榔
 神曲 麥芽各一 乾生姜半兩 枳實炒半兩
 牽牛微炒 大黃各二兩
 右為細末生薑汁為丸加麩糊如梧子大每服七十
 丸食後姜湯下
 愚按凡人有積病則氣滯而餒此方用藥攻補兼施
 真得古人養正積自除之理有疾病而涉虛者用此
 最當
 附○三稜煎丸 治食積酒癖氣塊血瘕時發刺痛
 京三稜 蓬木略二 芫花五 一方加青皮半兩
 右同入磁器中用醋五升浸封口以灰火煨熟取稜
 莪出將芫花以餘醋炒焦意乾為末醋糊為丸如梧

下

補遺宣明三稜湯

治癥瘕痰癖積聚不散堅滿痞膈

京三稜二兩

白木一兩蓬朮煨

當歸各半兩

木香 不見火

枳朮各二兩

末之每服三錢白

沸湯調下

子大每五十九姜湯下

○小三稜煎 癥瘕積聚化痰飲寬中順氣寬脹軟堅

杏仁 去皮尖 羅蔔子 炒

礞石 加一兩飛煎

京三稜 升石器熬膏

末之三稜膏和丸如梧子大每服十五丸至二十九

食遠米飲湯下

○香稜丸 破痰癖消癥塊及冷氣

木香 丁香 各五冬

枳朮 炒 川練子 茴香 各效一兩

廣木 酒浸一宿用去皮巴

末之醋糊丸如梧子大硃砂為衣姜鹽湯下

虛損指南

陽虛

氣虛脈細或緩而無力右手弱陽虛之症也陽虛之症責任胃蓋飲食勞倦內傷元氣此則真陽下陷內生虛熱故東垣發補中益氣之論用人參黃芪等其溫之藥補其氣而提其下陷此用氣藥以補氣之不足者也 體弱脈虛而

虛損門

論

內經曰飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心持重遠行汗出於胃疾走恐懼汗出於肝搖體勞苦汗出於脾又曰久視傷血久卧傷氣久坐傷肉久立傷骨久行傷筋若夫七情五臟之火飛越男女穀色之愆過淫是皆虛損之所致也機要曰虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰盛損自上而下一損損于肺皮聚而毛落二損損于心血脉虛少不能榮於藏府婦人則月水不通三損損于胃飲食不為肌膚治宜以辛甘淡過于胃則不可治矣感熱則損陰陰虛則陽盛損自下而上 一損損于脊骨痿不能起於床二損損於肝筋

惡風寒者四君子湯
加黃芪桂枝虛甚者
再加熟附子二三片
見下或黃芪建中湯
加附傷寒門桂枝湯
下或六君子湯饒逆
門氣虛挾痰夜多盜
汗羸瘦脚痛不能動
者四白散附餘氣虛
脉浮而軟怔忡無時
補氣湯見下氣弱虛
汗大出不止芪附湯
見下上氣喘急自汗
盜汗頭眩眼花補心
湯補遺或桂枝加龍
骨湯

丹七坊湯或參附湯
並見下 心虛手振經
驗秘方或茯神湯並
見下或首珠丹或加
味歸脾湯並補遺手
足心熱此乃鬱熱火
鬱湯或升陽散火湯
鬱症門
補遺補心湯 治勞
心傷神自汗盜汗
心虛恍惚
栝子仁微炒研
白芍藥 酸棗仁
白茯苓 去骨
生地黃 當歸

緩不能自收持三損損于脾飲食不能消尅治宜以苦
酸醜過於脾則不可治矣又曰心肺損而色紫脊膈損
而形瘦難經曰治損之法損其肺者益其氣損其心者
補其榮血損其脾者調其飲食適其寒温損其肝者緩
其中損其腎者益其精是皆虛損病因治法之大要也
學者詳之

脉法

脉經曰脉來軟者為虛 緩者為虛 微者為虛
弱者為虛 弦者為中虛 脉來細而微者血氣虛
脉小者血氣俱少
要畧曰脉芤者為血虛 脉沉小遲者脫氣
又曰血虛脉大如葱管 又曰脉大而芤者脫血

丹溪曰天為陽而運於地之外地為陰而運於地之內
大氣舉之日實也屬陽而運於月之外月缺也屬陰
稟日之光以為明人受天地之氣以生天之陽氣為
氣地之陰氣為血故陽常有餘而陰常不足氣常有
餘而血常不足也又曰經曰精不足者補之以味味
陰也補精以陰求其本也然味乃如穀粟菓菜出於
天賦自然冲和之味故有食人補陰之功非醢醬烹
飪調和偏厚之味出於人為者也經曰陰之所生本
在五味非天賦之味乎曰陰之五宮傷在五味非人
為之味乎善攝生者不可謂味以補精而遂恣於口
腹以自速其禍也又曰形不足者温之以氣温養也
温存以養使氣自克氣克則形完矣曰補曰温各有
其旨局方悉以温熱藥佐輔名曰温補豈理也哉

麥門冬各一錢

綿黃芪蜜炙

人參各一錢半

蓮蕊七分五味子

春夏十五粒秋冬

七八粒

水煎食前溫服末

收全效夏加酒炒

黃連黃柏各五分

冬加肉桂四分

補遺加味補脾湯

治男子憂思致傷

心脾而心不清胃

不健肢休懈怠志

意不舒食不甘而

氣不暢也

遠志 人參

白朮 黃芪

歸身酒洗各一錢

南木香三分

酸棗仁微炒研錢

右入員眼肉五枚

水一鍾煎七分食

遠溫服

陰虛

血虛脈大或數而無

力左手弱者陰虛之

證也陰虛之證責在

腎蓋勞心好色內傷

又曰人年老或虛損精血俱耗陰不足以配陽孤陽

幾於飛越天生胃氣尚爾雷連又藉水谷之陰故羈

而定耳局方用溫劑却虛蓋脾得溫而食進故亦暫

可夫質有厚薄病有淺深設或失手何以收效吾寧

稍遲計出萬全溫劑補虛決不敢用

○丹溪曰老人虛損但覺小水短少即是病進宜以人參

白朮為君牛膝芍藥為臣陳皮茯苓為佐春加川芎

夏加黃芩麥門冬秋冬加當歸身倍生姜或一日一

貼或二貼小水之長若舊乃止此老人養生之捷法

也此丹溪養母之方也

○四君子湯 治氣虛

人參一錢半 白朮

茯苓各二錢 甘草一錢

右細切作一服水煎如自汗或小水利者去茯苓加

黃芪二錢無汗小水不利者只依本方

愚按白朮則健脾燥濕人參則補肺扶脾茯苓則降

氣滲濕甘草則補胃和中譬如寬厚和平之君子則

不為奸儉卒暴之行也和劑云等分愚以為藥之君

臣劑之大小又人之所處何如也

○四物湯 治血虛

川歸二錢 川芎

芍藥各一錢 熟地黃五錢

右細切作一服水煎服春倍川芎夏倍芍藥秋倍地

黃冬倍當歸

愚按當歸則和血歸經芍藥則涼血補脾生辛則生

血寧心熟辛則補血滋腎芎芎則行血通汗其性不

同所治亦異和劑云等分愚以為隨其所在而輕重

之度得交通之道也

直陰陰血既傷則陽氣偏勝而變為火矣是陰虛火旺勞瘵之證故丹溪發陽有餘陰不足之論用四物湯加黃柏知母苦寒之藥補其陰而火自降此用血藥以補血之不足者也見下骨蒸痿弱咯血下血六味地黃丸或斑龍丸並見下若無執腎虛實精白濁腰背疼痛補腎益智湯補遺或

補遺滋腎百補丸
補陰丸或補腎丸或
補天丸或人參固本
丸並見下或滋腎百
補丸或鹿苑丸或既
補陰丸並補遺或
滋陰丸附餘
補遺滋腎百補丸

○八物湯一治氣血兩虛

四君子合四物湯共為一劑如上法加減煎服

○十全大補 治氣血俱虛而挾寒暑
人參 黃芪 甘草 白茯苓
當歸 白木 白芍藥 肉桂
熟地黃 芩藜 各等分

右細切每分一服一兩重加生薑三片大棗一枚水
二大盞煎至一盞溫服加減法宜詳前論

○大補陰丸 降陰火補腎水

黃柏 監酒半斤 知母 去皮酒拌濕
熟地黃 須用不度者 龜板 酥炙黃各
右細末猪脊骨髓和煉蜜為丸如梧桐子大每服五

丸空心姜盞湯下

○補陰丸 一名

黃柏 監酒半斤 知母 酒炒 熟黃柏 各二
龜板 酥炙 白芍藥 煨
陳皮 牛膝 酪二 虎脰骨 兩 瑣陽 酥炙 當歸 各一

右為細末酒煮羯羊肉為丸鹽湯下冬加乾姜半兩

○加味虎潛丸
人參 黃芪 芍藥 煨 黃柏 監酒 當歸 酒洗
山藥 各一 瑣陽 酥炒 枸杞子 虎脰骨 酥炙 龜板 酥炙
破故紙 煨 杜仲 姜汁 炒 熟地黃 四兩
兔絲子 監酒浸三宿細研 牛膝 去芦酒 煎
右為細末煉蜜和猪脊骨髓為丸如梧桐子大每服五

六十九溫酒或姜盞湯下

○滋陰大補丸

川牛膝 去芦 山藥 酪一兩 杜仲 姜汁 炒 斷 巴戟 去心

熟地黄八兩

川當歸酒浸

兔絲酒炒各四兩

知母酒浸炒

黃柏酒炒褐色

杜仲炒去絲

山藥 菊花

楮實各二兩

青鹽一兩炒

沉香五錢

為末酒糊丸或煉

蜜丸亦可

補遺鹿茸丸 治真

精不足腎水涸燥

頭乾多渴耳鳴頭

暈目視昏花面色

鰲魚腰背疼痛脚

膝痠弱服僭藥不

得者

生鹿角鎊一兩

菟絲子酒蒸搗

二兩

為末酒糊丸梧桐

子大空心食煖蓋

湯下七十九

補遺既香補陰丸

滋陰降火補腎益

精潤肺

黃柏酒浸炒焦黃

知母乳汁拌炒

山茱萸去核五味子

茴香

枸杞子錢五熟地黄二兩

右為細末紅棗肉和煉蜜為丸如梧桐子大每服七

十九淡鹽湯或溫酒空心下與上虎潛丸相間服之

佳所謂補陰和陽生血益精潤肌膚強筋骨性味清

而不寒溫而不熱非連造化之精微者未足以議於

斯也

補腎丸

治痿厥重者湯使與大補丸同此冬令之

正藥春夏去乾姜

黃柏

龜板各二兩杜仲各依前牛膝

陳皮各二兩乾姜五錢冬五味子七余

右為細末姜汁糊或酒糊為丸溫酒或白姜湯空心

送下

○補天丸 治氣血俱虛甚者以此補之多為補腎丸並

行若治虛勞發熱者又當以骨蒸藥佐之

紫河車

一具即產后胞衣也古方不分男女世傳男

女用之不可得但求肥盛婦人無病者俱可用初

取得長流水洗淨去筋膜以篋篋盛之外以紙糊

使不泄氣焙干要用時

以米醋浸一宿焙干用

右以前補腎丸藥為末同河車再研極細酒糊為丸

或新取紫河車蒸熟同藥末搗爛為丸亦可

○虛勞者當以骨蒸藥佐之一云氣虛加補氣藥血

虛加補血藥

○一方用側柏葉烏藥葉俱以酒浸丸曝亦同紫河

車為丸名補腎丸

局○六味地黄丸 治腎經虛損久新憔悴盜汗發熱五

牡丹皮 白茯苓

懷山藥 各三兩

懷生地 八兩酒洗

熟地 八兩

山茱萸肉 四兩

夏加五味 一兩

麥門冬 去心一兩

共為細末煉蜜丸

梧子大清晨搗湯

下一百丸

補遺補腎益智湯

治腎虛遺精白濁

腰背痠痛

益智仁 另研

懷山藥 人參

巴戟肉 白茯苓

川牛膝 去芦酒洗

甘草稍 各一錢

升麻 黃柏酒

浸炒焦各六分

右水一鍾煎七分

加連肉上一枚空

腹溫服更迂助酸

杏仁炒研一匙

補遺加味四物湯

四物湯加

草决明 微炒研

黃芪 蜜炙一錢

甘草 炙三分

藏者損瘦弱虛煩骨蒸痿弱下血咯血等証

乾山藥 四兩 山茱萸 四兩 澤瀉 夫毛 牡丹皮

白茯苓 各二兩 熟地黃 八兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九白湯

局○人參固本丸

天門冬 去心 麥門冬 去心 生地黃 各一兩 熟地黃 二兩

右各焙乾同磨為末勿犯鐵器煉蜜為丸或以天

門冬熟地黃二味量酒浸搗膏同三味末杵干餘下

九如梧桐子大每服五七十九空心姜盞湯下切忌

羅蔔

愚按人心藏血腎藏精血克實則鬚髮不白顏貌

不衰延年益壽其天賜者多由服性熱之藥不能滋

生精血也而藥之滋補精肌者無出於生熟二地黃

世人徒知服二地黃而不知服二門冬為引也蓋生

地黃能生心血用麥門冬引入所生之地熟地黃能

補腎精用天門冬引入所補之地四味互相為用本

草又以人參為通心氣之主故宜加焉如有痰者生

熟地黃各用姜汁炒過恐泥隔故也

湖○人參膏

人參一味不拘多少去芦細切量水於銀石器內慢

火煎如稠錫磁器盛貯每服一二匙白湯點服

東○補中益氣湯 治飲食失節勞後所傷暴傷元氣惡

寒發熱証似傷寒者方見內傷門

東○益胃升陽湯 血脫益氣古聖人之法也先補胃氣

以助生發之氣故曰陽生陰長諸其藥為之先務奉

世皆以為補殊不知其能生血從陽而引陰也故先

酸棗仁 微炒六分

右水一鍾煎至七

分食遠溫服

氣血兩虛

夫氣乃肺主之血乃肝藏之精乃腎主之神乃心主之飲食乃脾胃主之七情則七神主之高違養失和則傷神葉詒胡誦飢而言多則傷氣縱慾相意則傷精又視鬱

怒則傷肝飲食勞倦則傷脾又行傷筋又立傷骨又坐傷肉此五勞七傷之屬也其有果賦素薄之人又兼斷喪太早者其兩根本受虧腎水一虧則火必勝火勝必剋肺金肺主皮毛則腠理不密而鼻不聞香臭火炎上升而致咳嗽甚至腎竭枯肺子能令母虛是也金水既病則五臟六腑皆為火賊此火乃內出

理胃氣蓋人之身穀為主也

柴胡 升麻 各二分

炙甘草 當歸身 酒洗

陳皮 各五分

人參 不用 炒神麩 各七分

白木 半錢

生黃芩 二分

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服○如腹中痛每服叻白木芍藥五分中桂二分如渴或口燥加葛

根三分

○芪附湯

治陽虛氣弱虛汗大出不止肢體倦怠

川附子 炮

黃芪 蜜炙各二錢

右細切作一服加生姜三片大朮一枚水一盞半煎至一盞溫服

○參附湯

治真陽虛之上氣喘急自汗盜汗短氣頭

人參 半兩

川附子 炮去皮

右細切作分三服加姜水煎溫服

○扶神湯

治六脉虛羸咳則心痛喉中介介或睡

扶神

人參

遠志

通草

麥門冬

黃芪

桔梗 各六分

甘草

五味子 各三分

右切作一服加生姜一片水煎服

○補氣湯

治氣虛脉浮而輒怔忡無時

黃芪 二分

人參

甘草 各一分

麥門冬 法桔梗 各七分

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞溫服

○千金延壽冊

治諸虛百損怯弱欲成癆瘵及大虛損

不復凡人於中年後常服可以欲疾延年

生地黄

熟地黄

川牛膝

川歸

山藥

天門冬

麥門冬 略

白茯苓

之火宜補精血而火

自退當服家傳五仁

斑龍膠或秋石丹培

復精神之聖藥也或

五子益腎養心丹或

十五味清上保元丹

或黃芪益損湯或拾

珍丸並補遺或既濟

補陰丸見前或天王

補心丸或十全大補

湯或八物湯並見下

或人參養榮湯內傷

門或三一腎氣丸沉

香水壽丸或瑞蓮丸

或秘傳固本丸或早

還丹或究原丸補丸

或五味子丸或五精

丸或降心丹或未病

蓮心散或平補鎮心

丹或十四友丸或大

真丸並附餘或沉香

大茴香

葛蒲丸即首

覆盆子

五味子

右共磨為細末勿犯

大每服一百丸空心

小便不利加車前子

脂山茱萸肉各五錢

○班龍丸

鹿角膠煉成

熟地黃各半

右磨為細末酒煮米

化為丸如梧桐子大

中有一老人貨出藥

歌曰尾間不禁滄海

頂上珠能補玉堂關

方彼老人化為白鶴

○桂枝加龍骨牡蛎

女人夢交及盜汗自

桂枝錢

右細切作加姜棗水

澤瀉

花椒

枸杞子

兔絲子煮爛

右共磨為細末勿犯

大每服一百丸空心

小便不利加車前子

脂山茱萸肉各五錢

○班龍丸

鹿角膠煉成

熟地黃各半

右磨為細末酒煮米

化為丸如梧桐子大

中有一老人貨出藥

歌曰尾間不禁滄海

頂上珠能補玉堂關

方彼老人化為白鶴

○桂枝加龍骨牡蛎

女人夢交及盜汗自

桂枝錢

右細切作加姜棗水

地骨皮

巴戟去心

栢子仁錢五

兔絲子煮爛

右共磨為細末勿犯

大每服一百丸空心

小便不利加車前子

脂山茱萸肉各五錢

○班龍丸

鹿角膠煉成

熟地黃各半

右磨為細末酒煮米

化為丸如梧桐子大

中有一老人貨出藥

歌曰尾間不禁滄海

頂上珠能補玉堂關

方彼老人化為白鶴

○桂枝加龍骨牡蛎

女人夢交及盜汗自

桂枝錢

右細切作加姜棗水

鹿茸

遠志

杜仲姜汁

兔絲子煮爛

右共磨為細末勿犯

大每服一百丸空心

小便不利加車前子

脂山茱萸肉各五錢

○班龍丸

鹿角膠煉成

熟地黃各半

右磨為細末酒煮米

化為丸如梧桐子大

中有一老人貨出藥

歌曰尾間不禁滄海

頂上珠能補玉堂關

方彼老人化為白鶴

○桂枝加龍骨牡蛎

女人夢交及盜汗自

桂枝錢

右細切作加姜棗水

黃芪

厚朴

益智仁

藿香

白朮

白扁豆

陳皮錢

半夏

白茯苓

人參

烏藥

甘草錢

五芍藥半

白豆蔻仁五錢

附○四白散

治男子婦人諸虛

痛不能行動

黃芪

厚朴

益智仁

藿香

白朮

白茯苓

人參

烏藥

甘草

五芍藥

白豆蔻仁

附○四白散

治男子婦人諸虛

痛不能行動

黃芪

厚朴

益智仁

藿香

白朮

白茯苓

人參

烏藥

甘草

五芍藥

白豆蔻仁

三焦培填五臟補

心腎美顏色却病

延年乃虛損中之

聖藥也

鹿角連腦蓋骨者

佳自解者不用去

蓋至生淨五十兩

截作三寸段新汲

淡泉井水浸洗去

垢吹去角內血腥

穢水淨

人參去芦五兩

天門冬去心皮

麥門冬去心各五

兩

川牛膝去芦五兩

石五味藥同角入

淨罈內注水至罈

有川笄殼油紙封

固罈口大罈內注

水木甑蒸之藥柴

火密蒸三晝夜足

時加入沸湯於罈

內以補乾耗取出

憲去滓將汁復入

潤口砂鍋內熬成

膠聽用和後藥末

其角去外鹿角淨

者乃末名鹿角霜

也

沉香二錢半檀香二錢

右剉每服一兩生姜三片棗一枚水一盞半煎七分

食後溫服

附○還少丸 楊氏方 大補真氣虛損肌體瘦悴目暗耳鳴

氣血凝滯脾胃怯弱飲食無味

牛膝酒浸一乾山藥兩各一熟苧糖白茯苓 去皮

山茱萸肉 楮實 杜仲酒炙和五味子

肉苁蓉酒浸 巴戟去心 遠志去心 茴香 各一

石菖蒲 枸杞子 各半

右為末煉蜜為丸人蒸熟棗肉和勻丸如梧桐子大

每服五十九丸空心溫酒鹽湯下

附○濟陰丸

黃柏酒洗二兩七錢 龜板 各一兩

陳皮 七兩

瑣陽 一兩

杜仲 去皮 五兩

枸杞 五兩

右為末以地黃膏為丸如梧桐子大每服七十九

丸 三一腎丸 古菴方補心腎諸臟精血瀉心腎諸臟濕

愚按人之一身陽常有餘陰常不足氣常有餘血常

不足故滋陰補血之藥自幼至老不可缺也古方知

腎氣丸固本丸補陰丸俱是滋陰補血之劑然固本

丸胸滿有痰者已之補陰丸脾虛有濕者忌之推腎

氣丸專於補血滋陰而兼理痰濕最為切當但品味

數少不足以盡其變將三方合而為一畧用加減名

曰三一腎氣丸其間補瀉兼施庶乎可也

補遺秋石丹

在秋時聚重濁多
着缸盛清晨露水
盛降之時用布二
三尺鋪木卓上一
宿即時濕透撈入
盤內收之如少次
日再收或荷葉上
露水亦可石膏水
飛細末桑枝刀削
直條四者如法煉
就每兩一缸投右
膏末七斤桑條攪
茶二次過半刻許
其精華新沉於底

清液白浮於上候
其澄定將溢傾流
再以便潔滿攪如
前投石膏末混攪
傾上留底俱勿差
違待滿換完清液
傾盡入秋露水一
桶於內亦以桑條
撈之水靜即傾如
此數度淨穢洗絲
鹹味滅除製畢重
紙封面灰漆晒乾
成塊堅凝固取
出其精英之輕清
者自浮結面上質

熟地黄

生地黄

山藥

山茱萸肉

俱不處
各四斤

杜仲皮

瑣陽

赤白茯苓澤瀉

龜板各三
斤

川牛膝

天門冬

枸杞子

麥門冬
五味子各
二斤

人參

黃柏

知母

肉桂各二
斤

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服五十九丸漸加至
六七十九丸空心淡鹽湯下或溫酒下 虛甚加鹿茸
一兩虎脛骨一兩○此藥其間有補有瀉其故何哉
夫五臟藏精血者精血一虛和水乘之而為溫熱補
者所以補其精血也瀉者所以瀉其溫熱也世人徒
知五臟精血虛而生火殊不知五臟精血虛而邪水
得以乘之此方既用知母黃柏以瀉火又用茯苓澤
瀉以滲濕尤為備也
○宛原双補丸 簡易方治一切虛損五勞七傷面色黎

黑唇口乾

口昏耳鳴夜夢驚恐四肢酸疼煩燥汗

鹿角霜

熟地黄

沉香

羌活子

酒浸

覆盆子

去枝

白茯苓

去皮人參

宣木瓜

去枝

薏苡仁

黃耆

茯苓

酒浸

五味子

去枝

石斛

去根炒

當歸

去芦酒

澤瀉

切塊再蒸各一
斤

麝香

研

錢另

硃砂

半斤別研為衣

煉蜜丸

梧桐子大空心鹽湯酒任下

○瑞蓮丸

定心暖腎生血化痰

蒼朮

主脾

一斤內浸酒四兩醋浸破故紙

王腎二
斤

酒

枸杞

主肝

二斤

五味

主肺

二斤

熟地黄

主血二
斤

蓮肉

主心

一斤

去心皮酒浸軟入猪肚肉煮極爛

取出焙

干為膏每一斤約猪肚一個

右為末煮猪肚膏同酒糊丸如梧子大空心溫服酒

下四五十丸

白原石膏末併餘
滓之重濁者並沉
聚底下渣溜而顆
面者留用底者刮
遺製度如斯靈性
完具入藥逐濟滅
養丹田若復入確
固封文火煨煉半
刻色雖白其性却
變溫終不及晒者
優也收置頂謹密
合藥時以少壯婦
人乳汁和之入鹿
角霜內大斑龙秋
石條仙家築基之

○秘傳固本丸 治諸虛生精血補五臟除百病美容
顏進飲食平氣血下元衰虛無不効驗藥性不燥不
熱多服為佳
人參去芦 生地黃酒洗 熟地黃俱懷慶者 麥門冬去心
兔絲子水浸去土用酒 枸杞子甘州 覆盆子
小茴香鹽炒 五味子 肉蓯蓉酒浸 巴戟去心
山茱萸去核 牛膝酒浸 杜仲姜汁炒 當歸去芦酒
茯苓去皮 川椒炒出汗 木通去皮 黃芪蜜炙各
木香一分 官桂半斤 黃柏四斤 知母四斤去
右為細末煉蜜為丸空心溫酒淡鹽湯任下忌豆粉
○草還田 益精髓補脊經固元陽輕腰脚悅顏容烏
鬚髮固齒牙氣冷而腸滑者善延年益壽仙家之良
劑大有驗効

丹非引去病而已
也亦可清晨空腹
降冬醴酒調服二
三匙合斑龍膠大
補
右古歌曰
尾閭不禁滄海竭
九轉靈丹都慢說
惟有斑龍頂上珠
能補玉堂閣下血
補遺五子益腎養心
丸 大補益元氣
培填虛損之聖藥
也其妙不能盡述
即於六味地黃丸

蒼木四兩 破故紙酒浸 川練子各一兩 覆盆子二錢 茴香一錢
木香五錢堅 山藥堅白 穿山甲酥炙 地龍去土
茯苓堅圓者 枸杞子 牛膝各三錢 酒浸
右為細末無灰酒糊為丸如梧桐子大每服三五十
丸溫酒送下或鹽湯亦可乾物壓之空心服畢須行
百步使藥力行日進一服
○五味子丸 理肝腎俱虛收斂精氣補真陽止虛汗
益智仁炒 肉蓯蓉酒浸 川巴戟去心 人參去芦
五味子去枝 骨碎補去毛 土茴香 白木
覆盆子 白龍骨 熟地黃 牡蠣童便煨
兔絲子各等
右為末煉蜜丸梧子大每服三十九空心米湯下

內加五子也

甘枸杞子去蒂

山茱萸肉各四兩

栝子仁微炒另研

楮實子洗去衣炒

羨利子微炒

覆盆子各二兩

懷生地八兩酒洗

蒸如泥金石內搗

牡丹皮 懷山藥

白茯苓各三兩

澤瀉二兩

右為細末用蜜

兩入斑龍膠內先

煉次入浮小麥粉

四兩分四兩

水調亦入膠蜜同

煉熟和諸藥并干

餘下丸如梧桐子

大每日早晨空心

服百丸淡鹽湯

送下

補道十五味清上保

元湯歌曰邪火

即熱偏傷肺弱本

多痰切莫無勿謂

嗽聲難用補富知

根活葉方鮮此名

清上補下王道奇

效者也如果健實

愚按此方專為遺精盜汗已久虛脫者設也

附○五精丸 治腎虛痿弱大補元氣

秋石剛硬 鹿角霜 茯苓去皮 陽起石 山藥各等

右為末酒糊丸如梧子大每服五十九須要常近火

邊使乾燥庶幾服之無恋隔之患

附○降心丹 和劑方 治心腎不交盜汗遺精及服熱藥過

多上盛下虛小便赤白濁氣常服鎮心益血

天門冬去心 麥門冬去心 人參 茯苓去木

茯苓去皮 遠志甘草煮 山藥各二兩 當歸去芦

肉桂去皮各 硃砂研為衣熟地黃 酒浸焙乾

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十九人參湯下

附○未病蓮心散 治虛勞或大病後心虛脾弱盜汗遺精

人參 白茯苓 蓮肉各一兩 白朮 甘草

白扁豆炒 薏苡仁炒 北桔梗炒 乾葛炒 黃耆炒

當歸各半 桑白皮 百合 半夏炒 乾姜炮

山藥炒 五味子 木香 丁香 杏仁去皮

白芷 神麩炒各一兩 右劉每服五錢水一盞姜棗同煎空心溫服

附○平補鎮心丹 和劑方 治心血不足時或怔忡夜多異

夢如墮層崖常服補心腎益榮衛

白茯苓去皮 五味子去梗 車前子 茯苓各一兩

肉桂一兩 麥門冬去心 遠志去心 天門冬

山藥洗姜制 熟芋酒蒸各 酸棗仁炒 人參去芦五

龍齒二兩半 朱砂半兩別研 右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九空心米飲溫

酒任下

之人只因外感風

寒或內傷食類而

氣逆咳嗽喉補或

不必也若係不足

而氣血兩虛之人

决須服之只服嗽

藥定無效断七乎

王道無近功功成

則享無疆之休矣

人參 白朮

茯苓 黃芪

地骨皮 紫苑

懷生地黃 酒洗

片黃芩 酒炒

天門冬 去心

麥門冬 去心

當歸 酒洗各一錢

甘草 炙四分

白芍藥 七分

川芎 九分

右棗一枚燈心七

根水煎食遠温服

附○十四友丸

和劑方 治心腎虛損神志不寧

白茯苓 白茯神

阿膠 蛤粉 黃耆

栝子仁 研肉桂

右為末同別研四味細末煉蜜丸如梧子大每服三

十九食後棗湯下

附○天王補心丹

寧心保神益血固精壯力強志令人

不忘清三焦化痰涎去煩熱除驚悸瘵咽乾養心神

熟地黃 二兩 白茯苓 五錢

石菖蒲 五錢 玄參 五錢

天門冬 去心 兩 丹參 五錢

甘草 炙 二錢 百部 五錢

當歸 酒浸 一兩 杜仲 姜汁 兩 黃連 兩

川牛膝 酒洗 一兩

右為細末者蜜丸如梧子大每兩作十九金箔為

衣每服一丸用灯心棗湯化下食遠臨卧服或作小

丸亦可

附○三才封髓丹

降心火益腎水性熱体虛常宜服之

天門冬 去心 熟地黃 酒洗

砂仁 一兩半 甘草 炙 半一

右為末水糊丸梧子大每服五十九丸用棗容半兩切

作片子酒一盞浸一宿次日煎三四沸去滓空心送

附○明目益腎丸

治虛火上攻两眼怕日羞明

枸杞 其州者 當歸

五味子 半兩 知母

天門冬 去心 山藥

甘菊花 各五錢

兔絲子

川栝 酒炒 各

巴戟 去心

人參 去芦

生苧 各一兩

茯神 一兩

各七分 北五味

甘草 炙各五分

木香 不見火四分

肉桂 去麝皮三分

右姜三片棗一枚

水煎食前服有熱

加柴胡

補遺沉香百補丸

補腎水降心火諸

虛百損

熟地黃 酒洗六兩

兔絲子 四兩

川當歸 酒洗

杜仲 去皮炒斷絲

肉苁蓉 酒洗

山藥 各三兩

右為末煉蜜丸如梧子大空心鹽湯下五十九

附○沉香永壽丸 補元氣益脾胃調順血氣添精補髓

不憊不燥不問老壯並宜服之甚有功效

蓮肉 一斤洗用酒浸一日後裝入雄豬肚內縫合却

茅山蒼朮 一斤分作四分一分酒浸一分酒浸一分

熟地黃 木香 各一兩 五味子 小茴香

川練子 西枸杞 懷山藥 栢子仁

破故紙 用芝麻同故紙一處炒香去

右為細末用酒煮糊和丸如梧子大每服五十九加

至七十九丸空心用溫酒或鹽湯送下以乾物壓之

○祖傳經驗秘方 治心虛手振

川歸身 粉甘草 生地黃 各一兩 人參 一兩

遠志 兩半 酸棗仁 栢子仁 各三兩 射香 一錢 琥珀 三錢

辰砂 五錢 另 金箔 二十片 茯神 七錢 胆南星 半兩 半夏 半兩 石菖蒲 六錢

右為細末蒸餅為丸如菉豆大辰砂為衣每服七十

八十九丸津唾嚥下或姜湯送下

○本邑在城金儒元國子生也年五十余身更瘦十年前

得內傷挾外感証一醫用發表疎利之劑十數日後

熱雖退而虛未復胸中痞滿氣促眩運召予治以補

中益氣湯間與東垣消磨痞丸陳皮枳木丸等藥調

理而安但病根未盡除而住藥故眩運或時而舉不

甚重來允至此年因往杭城跋涉辛苦又兼色慾之

過還家眩運大作歷數醫皆與防風羌活荆芥南星

半夏蒼朮等去風散溫消痰之劑病愈重一日十數

補遺是為雙補丸

平補氣血不燥不

熱

熟地黃 半斤補血

兔絲子 半斤補氣

右為末酒糊丸如

梧桐子每服七十

丸人參湯任下

氣不順沉香湯下

心氣虛茯苓湯下

心氣煩燥不得睡

酸棗仁湯下

腎氣動茴香湯下

小便少車前湯下

小便多益智湯下

補遺十珍丸一治男

婦諸虛之症此丸

善補精血培扶元

氣滋陰降火治嗽

生肉長肌

懷生地好酒洗淨

浸半日烘乾八兩

其枸杞 牡丹皮

山茱萸 去核

懷山藥各四兩

黃柏酒浸一晝夜

炒黃焦色人參

茯苓去木各三兩

知母三兩用青黛

一錢半鎔湯拌炒

此五味二兩

右為細末用浮小

麥麩粉四兩芡實

粉四兩蜜四兩水

三碗先煎蜜熟入

二粉煉熟和藥杵

千餘下丸如梧桐

子大空心淡鹽湯

送下一百丸

次厥去片時復甦凡動或轉側即厥不知人事李家

惶惶叫哭召予治診其六脉皆浮洪而濡予曉之曰

此氣血大虛証幸脉不數而身無大熱不死但恐病

愈後而有數年不能下榻行動病者曰只要有命

亦甘心與大補氣血之藥倍人參黃芪或加附子引

經合大劑一日三貼又煎人參膏及作紫河車丸補

陰丸之類間服如此調理二月余服煎藥二百餘

貼丸藥三五料人參五六斤其証漸不厥飲食如故

但未能行動耳次年聞黃布政汝言往京師道經蘭

溪以舟載去彼俟侯求診王公曰此証陰虛風痰上

壅因誤服參芪多故病久不愈立方以天麻菊花荆

芥川芎等清上之藥亦未見效住藥後越五六年方

得起而步履如初儒元不思昔日病劇而藉參芪等

藥之功遂以王公之語歸咎於子用藥之誤噫彼時

若非峻補何以得一儒元見王公即嗚呼此誠得魚

忘筌得兔忘帶也可勝嘆哉

○東陽邑薛鄒掌教先生一証發大汗戰慄振掉片時

許發燥熱身如火燒又片時許出大汗如雨身體若

水冷而就發寒戰如前寒後又熱七後又汗三病繼

作而晝夜不息痒生盧明夫與作履証治不效召予

診其右手陽脉數而浮洪無力陰脉畧沉而亦虛左

三部比右差小而亦浮軟予曰此陽虛証也用補中

益氣湯倍參芪減升柴一半加尿浸生附子一錢半

炒黃柏三分乾姜薄桂各五分大朮一枚同煎服一

服而病去三分二服而減半四服寒熱止而身尚有

微汗去桂附乾姜一半服二貼全愈

勞極指南

勞熱

勞熱者先服劑蓬前
丸積聚門後服清骨
湯或驚甲地黃湯或
人參散並補遺或人
參地骨皮散附餘或
柴胡散或驚甲散或
蛤蚧飲子並見下骨
蒸熱逍遙散或秦光
驚甲丸或秦光驚甲
湯並補遺或五蒸湯
或射香散並見下或

保壽湯附餘朝熱陰
虛者黃芪驚甲飲見
後柴物湯即小柴胡
湯傷寒門合四物湯
虛損門或地骨皮散
內傷門

補遺清骨散 治男
子婦人五心發熱
欲成勞瘵
北地胡 去芦
生地黃 各二兩
熟地黃 人參
防風 去芦 各一兩
薄荷葉 七錢半
赤茯苓 秦光

勞極門

論

內經曰陰虛生內熱又曰陰氣有靜則神藏燥則消亡
飲食自倍傷胃乃傷又曰有所勞倦形氣衰少穀氣不
盛上焦不行下脘不通而胃氣熱熱氣薰胸中故內熱
是故欲養陰而延生者心神而恬靜而毋躁熱飲食
宜適中而無過傷風寒暑熱之謹避行立坐卧之有常
何勞怯之有哉今也嗜慾無節起居不時七情六慾之
火時動乎中飲食勞倦之過屢傷乎體漸而至於真水
枯竭陰火上炎而發蒸七之燥熱或寒熱進退似瘧非
瘧古方名曰蒸病或二十四種或三十六種名雖不同
証亦少異大抵不過咳嗽發熱咯血吐痰白濁白淫遺

精盜汗或心神恍惚憂與鬼交婦人則月閉不通日漸
虧漸羸成勞極之候夫病此者始多求克姑息日久直
發熱不休形體瘦其直亢已脫然後求醫治療雖倉扁
復生莫能救其萬一良可嘆哉雖然一人未足憐也况
其侍奉親密之人或同氣連枝之屬薰陶日久受其惡
氣多遭傳染名曰傳屍又曰喪屍曰飛屍曰遁屍曰殞
殞曰屍注曰鬼注蓋表其傳注酷虐而神妙莫能以測
之也雖然未有不由氣體虛弱勞傷心腎而得之者初
起於一人不謹而後傳注數十百人甚而至於滅族滅
門者誠有之矣然此病最為可惡其熱毒鬱積之久則
生異物惡虫食人臟腑精乖變生諸般奇狀誠可駭駭
是以勞傷于肝胆者則為毛虫如刺帽瓦蛆之屬食人
筋膜勞傷于心與小腸者則為羽虫如燈蛾蚊虫禽鳥

上尸
彭 鄧
中尸
一 籍
下尸
一 居

尸 蟲 之 名
本 中 見
黃 籍

胡黃連各半兩
每服五錢水一盞
煎七分溫服患骨
熱先服劑逢煎丸
一服使臟腑微利
然後服此
愚按丹溪云蒸已
發熱積病最多此
云前服劑逢煎丸
後服清膏散暗合
其妙
補遺醫甲地黃湯
治虛勞手足煩熱
心下怔悸及婦人
血至枯乾身體羸

瘦飲食不為肌肉
當歸酒浸洗去土
北柴胡去芦
麥門冬去心
鑿甲洗淨醋炙
金釵石斛去芦
白茯苓去皮
熟地黃酒洗焙
白朮去芦剉炒
秦朮去土各一兩
官桂不見火
清河參去芦
甘草炙各半兩
每服一兩姜三片
烏梅一個水一鍾

之形食人血脉勞傷于脾胃者則為保虫如嬰孩蚯蚓
之類食人肌肉勞傷于肺與大腸者則為介虫如龜蟹
蟹蟻之狀食人膚膏勞傷於腎與膀胱者則為鱗虫如
魚龍蛟蜉之形食人骨髓或挾相火之勢亦有羽虫之
酷者鷓鴣之類為狀不一不可勝紀凡人覺有此証便
宜早治緩則不及事矣治之之法一則殺其虫以絕其
根本一則補其虛以復其真元分經用藥各有條理務
如庖丁解牛動中肯綮無有不安者也若待病勢已劇
元氣已脫雖以古法取虫滋補患者不無一生但亦可
絕後人之傳注耳學者察之

脉法
脉經曰男人平人脉大為勞極
虛亦為勞

男子勞乏為病其脉浮大手足煩春夏劇秋冬瘕除寒
精自出足痠軟不能行少陰虛滿
人年五十六十其病脉大者臂俠背行痛苦腸鳴馬刀
挾者為勞之得
男子平人脉虛弱微細者喜盜汗自出也
男子面色薄白主渴及亡血卒喘心悸其脉浮者虛也
男子脉虛沉弦無寒熱短氣裏急小便不利面色白時
時日瞋此人喜衄小腹滿此為勞使之然
男子脉微弱而澁為無子精氣清冷也
夫失精家小腹強急陰頭寒目眶痛一云目弦髮落脉
極虛孔遲為消穀亡血失精
脉得諸孔動微緊男子失精女人夢鬼交通
脉沉小遲者名脫氣其人疾行則喘喝手足逆寒腹

煎七分温服

補遺人參散 治和

熱客於經絡痰嗽

煩熱頭目昏痛夜

多盜汗四肢倦怠

一切虛勞宜服

黃芩 枯者半兩

人參 白朮

茯苓 甘草

赤芍藥 柴胡

半夏麩 當歸

葛根各一兩

每服八錢姜三片

棗一枚水一鍾煎

七分温服

滿甚則溲泄食不消化

脉弦而大弦則為大減則為孔減則為寒孔則為虛七

寒相搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血黥

方法 冊溪方法

丹溪曰此陰虛之極痰與血病多有虫者其傳死一証

不可云無大法四物湯加童便竹瀝姜汁

○身瘦屬火因火燒燦也肉脫甚者難治

○氣血虛甚發熱成勞者補天丸加骨蒸藥佐之 骨蒸藥

補地骨皮麥門冬秦九清膏

○傳屍勞瘵 寒熱交攻久嗽咯血日益羸瘦先以三物

湯次以蓮心散

冊溪方 ○二十四味蓮心散

川歸 黃芪 甘草

前胡 柴胡 獨活 羌活

防風 防已 茯苓 半夏

黃芩 陳皮 阿膠 炒成珠 官桂

芍藥 麻黃 不去根 杏仁 另研 蓮肉 當用童

南星 川芎 枳殼 麩炒各五分 羌花 醋炒黑

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水二盞煎一

盞去粗温服須待吐有異物羌花漸減少蓋羌花反

其草所以殺虫炒之所以斷熱去寒效處在此

○青蒿飲子 治癆瘵

青蒿 一斗五升 童便 三斗

右以文武火熬約童便減去二斗去蒿再熬至一升

入猪胆汁七個或加辰砂煨柳末三五錢再熬數沸

甘草末收之每服抄一匙清湯點服極妙

烏梅 迨去核

知母 各一兩五錢

川黃連 酒炒

川當歸 酒洗

青蒿 各一兩

鮮地骨皮 淨去梗

海羊朮 胡各三兩

驚甲 九勃者佳米

醋炙研末二兩

補遺秦九驚甲丸

治男婦面赤如粧

肌體瘦骨肉蒸熱

夜出盜汗

秦九 洗去芦

人參 各二兩

鮮地骨皮 淨去梗

海羊朮 胡各三兩

驚甲 九勃者佳米

醋炙研末二兩

川當歸 酒洗

青蒿 各一兩

川黃連 酒炒

知母 各一兩五錢

烏梅 迨去核

炙甘草各七錢

右為末煉蜜丸如

梧桐子大每服空

腹淡鹽湯下量人

大小服多寡也

補遺道遺散 治虛

勞骨蒸發熱

當歸 白朮

柴胡 白芍

茯苓各一錢

地骨皮 八分

薄荷 甘草各

六分

作一貼生姜三片

水煎服

治骨蒸壯熱肌肉

消瘦唇紅頰赤困

倦盜汗

地骨皮 此胡

幣各一兩

秦光 知母

當歸各五錢

每服一兩烏梅一

个青蒿數莖煎服

勞嗽

勞嗽者乾嗽也人參

潤肺丸或寧肺湯或

人參欬花膏或潤肺

○白蠟塵一味大殺瘵虫可入丸藥散中用

○秘傳取傳屍勞虫鬼哭飲子

天靈蓋酢炙驚甲酢炙柴胡去苦各阿魏一錢

木香一分訖心一分青蒿半握桃仁一枚

安息香一分貫衆一分甘草一分

右十一味細切杵為粗末先以童便二升隔夜浸露

星月至四更時煎八分去粗分作二服每服調後散

子一貼五更初溫服即穩卧至三點時又進一服至

日出時竟腹中欲利如未利又進一服已利勿服

○散子方

用檳榔二錢辰砂一分射香一分赤脚蜈蚣以

焙乾一條 烏雞糞二錢先將雞糞於五日以前以

右以五味研為細末和勻分為三貼各入前煎

服凡合上藥宜於六甲建日或除日合之服前藥必

利下惡物併虫以盆盛之急用火燒殺之或油煎殺之

其病人所穿衣服及荐褥盡易燒之食葱粥將息以

腹元氣服藥後或夢人哭泣相別是其驗也如取下

虫視其色青赤黃者可愈黑色者難療也雖虫老病

不可療亦能絕後今傳注耳合此藥時不可容孝婦

人雞犬見之及不可令患者知之與聞其氣息虫聞

氣变化難取也

○治瘡瘵取虫經驗天靈蓋散

天靈蓋二指大用白檀香五個為阿魏二錢

射香二分辰砂一分甘遂連珠二安息香三分

右七味各研極細和勻每服三錢後湯調下

薤白二七莖青蒿二握甘草五寸許葱白二七莖

方

青蒿

薤白

葱白

甘草

青蒿

薤白

葱白

膏 補遺 或保和湯

或太平丸 並附錄 或

黃芪散 或嗽門 或蛤

蚶散 或輕骨散 並見

下 或肺痿者 知母 栝

冬湯 嗽門 或栝 梗

湯 瘡湯 門 或秦 芫 扶

羸湯 補遺 或獨 聖 散

見後 痰 盛 咳 嗽 潮 熱

盜汗 秦 芫 蠶 甲 散 或

沉香 消化 丸 並 補 遺

或 黃 芪 飲 子 或 紫 河

車 丹 並 見 下

遺 人 參 潤 肺 丸

治 肺 不 足 咳 嗽 喘

急 日 久 成 勞

人 參 欬 麥 花

細 辛 去 葉 其 草 多

杏 仁 去 皮 尖 各 二 兩

官 桂 去 皮 栝 梗 各

五 兩 知 母 六 兩

末 之 煉 蜜 丸 如 鷄

頭 大 食 後 細 嚼 一

丸 淡 姜 湯 下

補 遺 人 參 欬 花 膏

治 勞 力 冷 嗽 及 衰

年 近 日 一 切 嗽 病

服 諸 藥 不 效 者

欬 冬 花 人 參

比 五 味 紫 苑

桃 枝

梅 枝 俱 取 向 東 南 者

右 九 味 同 童 便 四 升 于 銀 石 器 內 以 文 武 火 煎 至 一

升 去 粗 分 作 三 盞 調 前 藥 末 服 五 更 初 服 一 盞 服 後

如 覺 欲 吐 以 白 梅 肉 噙 止 之 五 更 盡 盞 臟 腑 鳴 須 轉

下 虫 及 惡 物 黃 水 若 一 服 未 下 如 人 行 五 七 里 又 進

一 服 至 天 明 又 進 一 服 如 瀉 不 止 用 龍 骨 黃 連 等 分

為 末 熟 水 調 下 五 錢 或 吃 白 粥 止 之 此 藥 男 病 女 煎

女 病 男 煎 不 可 令 患 者 知 及 不 許 孝 子 僧 人 雞 犬 見

射 香 散 治 男 子 婦 人 骨 蒸 發 熱 五 勞 七 傷 等 証

天 靈 蓋 半 錢 柴 胡 一 兩 犀 角 屑 半 兩 甘 草 三 寸

東 引 桃 枝 東 引 柳 枝 東 引 榴 枝 青 蒿 各 一 握

阿 魏 研 一 錢 另 雄 白 葱 白 格 七 射 香 二 錢 半

右 細 切 杵 為 粗 末 用 童 便 二 升 半 浸 藥 一 宿 明 日 早

煎 至 一 升 半 去 粗 分 作 三 服 每 服 入 楸 柳 細 末 三 錢

溫 服 五 更 初 進 一 服 約 人 行 五 七 里 再 進 一 服 若 惡

心 兀 兀 欲 吐 嚼 白 梅 止 之 三 服 後 瀉 出 惡 物 異 虫 或

身 如 蟻 行 不 可 名 狀 後 用 葱 粥 止 之 忌 風 一 月 及 忌

食 油 膩 溫 麩 醃 酸 併 牛 羊 雞 猪 犬 肉 魚 腥 年 遠 重 病

不 過 二 服 全 安 脩 合 此 藥 時 男 病 女 煎 女 病 男 煎 忌

貓 犬 雞 鷲 鴨 駝 馬 僧 尼 孕 婦 孝 子 見 之 凡 取 虫 後 須

以 後 大 補 扶 神 散 補 之

取 屍 虫 神 仙 秘 方

青 桑 枝 柳 枝

梅 枝

石 榴 枝 各 七 握 俱 長 七

阿 魏 研 一 錢 另 安 息 香 一 錢 去 石

青 蒿 一 握 桃 枝

葱 白 七 握

桑白皮各一兩
為末煉蜜丸鷄頭
實大每服一丸細
嚼姜湯下臨臥食
後服

補遺寧肺湯 治榮
衛俱虛發熱自汗

肺氣喘急癆嗽

人參 去芦 白朮

熟地黃 當歸

白芍藥 川芎

五味子 甘草炙

麥門 去心 桑白皮

白茯苓 各五兩

阿膠 蛤粉 各一兩

每服壹兩 薑二片
水煎食後服

遺潤肺膏 治痰

嗽肺燥肺痿

羊肺 一具 柿霜

杏仁 淨研 真酥

真粉 各一兩

白蜂蜜 二兩

先將羊肺洗淨吹

將五味入水攪粘

灌入肺中水煮熟

如常服食前與勞

嗽藥相間服之

補遺秦片扶羸湯

治肺痿骨蒸已成

右除阿魏安息香二味外余藥用童小便一升半
去一半去粗將藥汁阿魏安息香細研再煎

分作二服調

辰砂末

栴檀末 各五分 射香 少許另研

右三味亦分作二服入前湯五更初進一服三點時
又進一服至巳午晚必取下重其背紅者可治青黑
者不治但可紀後人之傳注耳取重後進軟劑溫和
將息忌食生冷毒物仍服帛九子法凡合此藥不可
令患者先知氣味亦不得令猶犬孕婦孝子信 尼
寺不祥人見之

神授散

此方得之于河南郡王府濟世既久功不可

述也

川椒 二斤 擇去開口者另

右一味為細末每服二錢空心米湯送下或用酒

糊為丸如梧桐子每服二三十丸漸加至八九十九

空心酒下或米湯下凡人得傳屍勞病氣血未甚虛

損元氣未盡脫絕者不須多方服食但誌早用此藥

無有不愈者真濟世之寶也 愚嘗治一婦人用花柳

死 或盡從 大便泄出

治勞極禁方無比丸

一名紫河車丸 一名調胃方

○傳屍勞瘵二司 可愈其餘勞怯

之証 月可安

紫河車 一具 初生者佳或無病壯年婦人者亦可一

味米醋浸 一 犀角屑

茸 羊角屑

蓬義木

硝石 各一

草龍胆

甘草 各二錢

鱉甲 兩

桔梗

胡黃連

大黃 酒拌

苦參

黃栢

秋石 另研不必用煎煉者但尿桶上凝結多年者

勞嗽或熱或寒盛
夏不出體虛自汗

四肢怠惰

柴胡去芦二兩

地骨皮一兩半

驚甲米醋炙

當歸酒洗秦芫

半夏湯泡紫苑茸

甘草各一兩

每服四錢姜三片

烏枚大棗各一枚

水煎食後溫服

補遺秦九驚甲散

治氣血勞傷四肢

倦怠面黃肌瘦骨

節熱痰潮熱盜汗

咳嗽痰唾

秦芫去芦洗

驚甲去裙醋浸炙

荆芥去梗白芷

柴胡去芦前胡

青皮去穢陳皮

貝母去心甘草炙

天仙藤各一兩

乾葛二兩肉桂

羌活各半兩

為末酒調服水煎

熱服不拘

補遺沉香消化丸

治熱痰壅盛

敗鼓皮心尸一本故心証也本草謂故心通靈能逐飛

知母去毛貝母去心各一兩辰砂另研

右共為細末煉蜜為丸如梧桐子大辰砂為衣每服

二十九加至三十九溫酒送下賜熱食前脯熱食後

溫服

青囊方 ○秘傳取勞垂禁方

豚木禽一隻右用硃砂肉兩精猪四兩將肉切作片

子其硃砂杵如菜豆大塊二味拌勻饒禽一晝夜食

肉盡為度以鹽泥固濟其禽在內剛火煨一夜來日

不見太陽取出不得打破埋入地中二尺許一晝夜

取出去鹽泥銀石器內研為細末以無火酒入射香

少許作一服調下置患者在灰帳中四下緊閉用鈇

鉗等候其垂必從口鼻中出即以鉗鉗入沸油中煎

殺之如虫出之後便進局方嘉禾散一服軟弱將息

調理可痊

青囊方 ○紫河車冊 治飛屍鬼注虛勞 羸瘦喘嗽痰氣

寺証其法取首生男子胞衣以皂角水洗淨次放銅

鈔子內以米醋漂洗控乾做一小篋籠子盛之圍以

紙密糊之不令泄氣以烈火焙乾加入後藥

人參一兩半白朮一兩木香

茯苓一兩川歸一兩熟地黃各一兩乳香四錢另

沒藥四錢另硃砂二錢另射香二分

右為細末和勻酒糊為丸如梧桐子大每服五十九

煎人參湯送下日三服空心服之煉蜜為丸服亦可

○治虛勞柴胡湯

柴胡 人參 茯苓 桔梗 芍藥

煎服

治熱痰壅盛

補遺沉香消化丸

治熱痰壅盛

青礬石火煨金色

明礬飛研細

猪牙皂角去勳

南星水炮白茯苓

半夏生姜製

陳皮各二兩

沉香五錢枳殼

枳實各一兩半

薄荷一兩黃芩兩

為末姜汁浸神麩

攪糊為丸梧桐子

大每服一百丸每

夜臨臥錫糖拌吞

次喚嚼太平丸二

勞咯血

勞嗽咯血大平丸或

蠟前散並附餘嗽血

及吐咯血者保和湯

附餘或經驗阿膠丸

補遺血去多者三黃

補血湯或犀角地湯

或四生丸並血疔門

血去多不止者十灰

散附餘或在石散

補遺咯血有潮熱者

人參清肺湯或知母

並補遺勞嗽咯血

焦潮熱盜汗參芪散

青皮去白麥門冬 川歸各二 甘草一分

右共切作一服杵細水一盞煎七分溫服

青囊方

○治虛勞驚甲散

驚甲大者一醋煮柴胡

桔梗 芍藥各壹兩

人參一兩 射香五分

宣黃連銹各二真酥三兩

右為細末用青蒿二斤童便五升熬青蒿汁約二升

濾去粗入酥蜜再熬成膏候冷入藥末搜和為丸如

梧子大每服十五丸溫酒送下米飲亦可日進三服

如秋冬時更入桃柳心七個與前柴胡散同煮間服

○去三屍九虫貫衆丸

貫衆五分殺乾漆三分殺厚朴三分殺白霍三分殺

僵蚕四分殺雷丸六分殺雄黃三分殺狼牙子四分殺

右件焙乾炒令黃色研為細末煉蜜為丸如梧桐子

大新汲水下五丸三服後漸加至十九服之二十口

百病皆愈三屍九虫盡滅更無傳注之患耳

○治勞嗽輕骨散

烏梅去核

知母去毛

柴胡去芦

青蒿酒煮

龍胆草

驚甲酥炙

甘草炙

阿膠炒成珠

胡黃連

桔梗去芦

梔子

杏仁去皮尖

貝母去心

秦艽洗

人參去芦

右件各等分晒乾為末用好京墨一塊以井花水磨
調前藥末作餅子如大指頭大透風處陰乾二七日
每用一餅以井花水磨化又用沒藥五分磨成一盞
更加黃栢二錢同煎數沸傾入盞內頻頻打轉於五

或黃氏驚甲散並補

遺勞傷咳膿咯血寒

熱往來者人參散五

味子散補遺或團參

飲子附餘

補遺河膠丸治勞

嗽并嗽血唾血

卷栢葉山藥

阿膠蛤粉炒成珠

生地酒洗防風

薄荷各一兩

栢子仁炒另研

大薊根五味子

百部洗去心

遠志去心甘草水煮

按苓大皮人參

麥門去心各五錢

為末煉蜜丸彈子

大每服一丸細嚼

小麥湯送下

神遺花蕊石散治

五內崩拾遺瀉出

血斗升用此止之

花蕊石火煨存性

研如粉

右童子小便一鍾

煎溫調末三錢甚

者五錢食後服下

如男用酒一半女

用醋一半與小便

醫家原流

更輕輕服服後就睡仰卧甚者不過三服

○治勞嗽蛤蚧散

白茯苓

知母

甘草

蛤蚧

乳酥

右為末每服二錢水一盞煎至七分和粗服忌油膩

生冷毒物如久患嗽者初服此藥必閉嗽加甚須勤

服久則可安須自保養為妙

○青囊治勞熱蛤蚧飲子

蛤蚧

胡黃連

熟地黃

知母

驚甲

右為細末每服二錢加烏梅姜棗煎服

附蒸餅

○古今錄驗五蒸湯

人參

乾葛

右細切先以水三盞煎小麥二合至二盞去麥煎藥

至二盞溫服隨証加減于后

○實熱加

○虛熱加

黃芩

黃柏

黃連

大黃

烏梅

秦九

柴胡

蛤蚧

桑白皮

杏仁

貝母

秦九

甘草

人參

麻黃

生地黃

柴胡

木香

草龍胆

桔梗

貝母

青蒿

秦九

胡黃連

熟地黃

知母

驚甲

右為細末每服二錢加烏梅姜棗煎服

附蒸餅

○古今錄驗五蒸湯

人參

乾葛

右細切先以水三盞煎小麥二合至二盞去麥煎藥

至二盞溫服隨証加減于后

○實熱加

○虛熱加

黃芩

黃柏

黃連

桑白皮

杏仁

貝母

秦九

甘草

人參

麻黃

生地黃

柴胡

木香

草龍胆

桔梗

貝母

青蒿

秦九

胡黃連

熟地黃

知母

驚甲

右為細末每服二錢加烏梅姜棗煎服

附蒸餅

○古今錄驗五蒸湯

人參

乾葛

右細切先以水三盞煎小麥二合至二盞去麥煎藥

至二盞溫服隨証加減于后

○實熱加

○虛熱加

黃芩

黃柏

黃連

桑白皮

杏仁

貝母

秦九

甘草

人參

麻黃

生地黃

柴胡

木香

草龍胆

桔梗

貝母

青蒿

秦九

胡黃連

熟地黃

知母

驚甲

右為細末每服二錢加烏梅姜棗煎服

附蒸餅

○古今錄驗五蒸湯

人參

乾葛

右細切先以水三盞煎小麥二合至二盞去麥煎藥

至二盞溫服隨証加減于后

○實熱加

○虛熱加

黃芩

黃柏

黃連

一處和藥服便瘰

血化為黃水服此

後以補髓丹補之

補遺人參清肺湯

治肺胃虛熱咳嗽

喘急坐臥不安并

治久年勞嗽唾血

腥臭

阿膠蛤粉炒

杏仁去皮炒

桑白皮 人參

地骨皮 知母

烏梅去核 甘草

鑿栗殼去蒂蓋蜜

炙各等分

水煎食後服

補遺知母散 治虛

勞心肺有熱咳嗽

唾膿血大脉解勞

除熱調順榮衛

清芪一兩蜜炙

白芍藥 知母

生地黃 人參

麥門去心 桔梗

白茯苓去皮

枯冬各七錢半

甘草五錢

每服八錢姜三片

小麥一撮竹葉七

牡丹皮 青蒿 鱉甲

○肺蒸魚乾加

烏梅

天門冬

麥門冬

紫苑茸

大腸右鼻孔

加大黃

芒硝

皮蒸唾血

加石膏

桑白皮

膚蒸昏味

加牡朋皮

氣蒸鼻氣熱

加人參

黃芩

梔子

○心蒸

小腸蒸下唇

加赤茯苓

生地黃

木通

血蒸髮

加生地黃

當歸

桂心

脉蒸白脈絡

加生地黃

加當歸

生地黃

○脾蒸

胃蒸舌

加石膏

粳米

大黃

芒硝

乾葛

肉蒸食無味而嘔

加白芍藥

○肝蒸

胆蒸眼色

加柴胡

括萎

前胡

筋蒸針

加川歸

川芎

三焦蒸作寒

加石膏

竹葉

○腎蒸

膀胱蒸右耳

加澤瀉

茯苓

滑石

腦蒸頭眩

加生地黃

防風

羌活

骨蒸齒黑腰痛足逆

加生地黃

加生地黃

地骨皮

驚蒸中熱

驚甲

當歸

牡丹皮

驚蒸肢細腫

加生地黃

當歸

天門冬

驚蒸肢細腫

加石膏

黃栢

片水煎食後溫服

補遺參芪散 治勞

痰嗽喘咯血黃集

潮熱盜汗

人參 羌活

五味子 防風

杏仁 去皮 欵冬花

驚甲 去鹹醋炙

桑白皮 各五錢半

綿黃芪 蜜炙

阿膠 蛤粉炒

白茯苓 去皮

半夏 水泡姜製

枳殼 去穰麩炒

貝母 去心 桔梗

秦烏洗 柴胡

川當歸 川芎

甘草 炙各五錢

每服八錢生薑三

片棗子一枚水一

鍾煎至八分食後

溫服

補遺黃芪驚甲散

治虛勞客熱肌肉

消瘦四肢煩熱心

悸盜汗減食多渴

救血

驚甲 浸去裙醋炙

天冬 去心各五兩

知母 焙 黃芪

胞蒸赤便

加澤瀉

茯苓

生地黄

活石

沉香

附○人參地骨皮散

拔萃方治藏中積冷

榮中熱按之不

足奉之有餘此乃陰不足陽有餘也

茯苓 鐵皮五知母

石羔各一兩地骨皮

人參 柴胡 云芎 生地黄 黃芪 各一兩

右剉每服一兩姜三片水二盞煎至一盞去滓通口

不拘時服

附○驚甲地黃湯

濟生方治虛勞手足煩熱心下怔悸及

婦人血室枯乾身體羸瘦飲食不為肌肉

柴胡 去芎 當歸 潤浸 麥門冬 去心 驚甲 醋炙

石斛 去根 茯苓 去皮 熟地黄 酒焙 秦光 去土

白朮 各一兩宮桂不見火人參 去芎 甘草 炙各半

每服一兩生薑五片烏梅一個水二盞煎至一盞

附○保真湯 治勞証體虛骨蒸服之決補

當歸 三錢 白朮 生芎 黃芪 甘草 二錢

人參 天門冬 去心 白茯苓 赤茯苓 蓮心 各五

麥門冬 去心 陳皮 白芍藥 知母 黃柏 各一

五味 柴胡 地骨皮 熟芎 各一 赤芍 半

右以水煎生薑三片棗一枚食后服

○驚悸加茯苓遠志栝子仁酸棗仁○淋瀝加草薢

台烏藥朱苓澤瀉○便濁加木通石羔扁蓄○遺精

加龍骨牡蠣蓮鬚蓮子○燥熱加滑石石羔青蒿

甲濇加浮麥子炒牡蠣黃芪麻黃根

附○保和湯 治勞嗽肺成痿者服之決効

知母 貝母 各三 天門冬 三錢 欵冬花 三錢 麥門冬 去

赤芍藥各三兩半

地骨皮 去木

白茯苓 去皮

北柴胡 去芦

秦艽各三兩三錢

生乾地黄 酒洗焙

三兩 桑白皮

半夏 煮 紫苑

甘草 炙各二兩半

人參 肉桂

桔梗 去芦各一兩

六錢半

每服五錢水一鍾

煎至七分食後溫

治男女老稚諸虛

百損氣血勞傷涎

喘咳膿或嗽咯血

寒熱往來夜有盜

汗羸瘦困乏一切

虛損

人參 五味子

熟地黄 酒洗

川當歸 酒洗焙

白茯苓 去皮

白朮 桔梗

甘草 炙各半兩

地骨皮 去木

枳殼 去穢炒

天花粉 薏苡仁

馬兜鈴 紫苑

當歸 生辛

一方無地黃有百部

右以水煎生姜三片入飴糖一匙入藥內服每日三

服食後加減于后○血盛加蒲黃茜根藕節大薊小

薊茅花○痰盛加南星半夏橘紅茯苓枳殼枳實括

藆實○喘盛加桑皮陳皮大腹吹羅蔔子葶藶蘆子

○熱盛加山梔子炒黃連黃柏連翹○風盛加防風

荆芥金沸草甘菊細辛香附子○寒盛加入參芍藥

桂皮五味蠟片

○太平丸 治勞証久嗽肺痿肺癰並皆噲服

天門冬 麥門冬 知母 貝母 款冬花

杏仁 各二兩 當歸 生地黃 熟地黄 阿膠珠

黃連 各一兩半 蒲黃 京墨 桔梗 薄荷 各一

白蜜 四兩 麝香 少許

右為細末和勻用銀石器先下白蜜煉熟後下諸藥

末攪勻再上火入麝香略熬二三沸丸如彈子大每

日三服食後細嚼一九煎薄荷湯緩緩化下次噲一

九臨卧時如痰盛先用錫糖拌消化丸吞下却噲嚼

此丸仰卧使藥流入肺竅則肺清潤其嗽退除七日

病痊凡一切咳嗽只服此藥立愈

○蠟前散 治虛勞久嗽痰多氣喘或咯膿血

杏仁 去皮尖以仁炒黃 人參 去芦 麥門冬 去心

乾山藥 貝母 去心 白茯苓 去皮 百合 去心

黃明鹿角膠 炙如無以阿膠代 甘草 炙各半

分

綿黃芪 蜜炙

前胡 去芦 柴胡

陳皮 水浸去白

桑白皮 各三錢

每服八錢 姜三片

水一鍾 煎至七分

食後溫服 日三頓

渴加烏梅 青蒿煎

咳膿血加知母 阿膠煎尤妙

勞損

勞損虛甚者 八珍湯

虛損門 或人參 養榮湯

易或補中益氣湯

內傷門 血去後肉削

者獨參湯 補遺 虛汗

多者黃芪散 血症門

泄瀉者白木膏 補遺

虛甚瓊玉膏 咳嗽門

或白鳳膏 見下

補遺獨參湯 止血

後服此藥 補之

大人參 去芦二兩

右棗五箇 水煎不

拘時 細細服之 服

後且熟睡 一晝後

服諸藥 除根

補遺白木膏 止瀉

大補脾氣

右為末 將杏仁別研 拌勻 每服二錢 水一盞 入黃蠟

皂角子 大同煎七分 食後服

○團參 飲子 齊生方 治夏思喜怒 饑飽失宜 致傷脾肺

咳嗽膿血 增寒壯熱 漸成勞瘵者

人參 紫苑 茸 洗 阿膠 蛤粉 炒 百合 蒸

細辛 洗 去葉 欵冬 花 杏仁 炒 去皮 天門冬 湯泡

半夏 湯泡 七 經霜 桑葉 五味子 各一 甘草 炙 半兩

每服四錢 水盞半 姜五片 煎七分 食後溫服 ○氣嗽

加木香 唾血而熱 加生地黃 ○唾血而寒 加鍾乳粉

○疲極 咳嗽加黃芪 ○損肺 唾血加沒藥 藕節 ○嘔

吐 肢滿 不食 加白木 ○咳嗽而小便多者 加益智仁

咳而面浮 氣逆 加沉香 橘皮 煎 ○大便溏者 去杏仁

加鍾乳粉

○十灰散 治勞証 嘔血吐血 咯血嗽血 先用此藥 正

大蘗 小蘗 栢葉 荷葉 茅根

茜根 大黃 山枝 牡用皮 棕櫚皮

右等分 各燒灰 存性 研極細 用紙包 碗蓋 於地上一

夕 出火毒 用時 先將白藕 搗絞汁 或蘿蔔汁 磨京墨

半碗 調服 五錢 食後下 如病輕 勢用此 立止 如血出

成升斗者 用花毒 散止之

○白鳳膏 治一切 久怯弱 極虛 憊咳嗽 吐痰 嗽血 熱

黑嘴白鴨 一隻 大京棗 二升

參苓平胃散 一升 陳煮酒 一瓶

右將鴨 縛定 脚量 患人 飲酒 多少 隨量 以酒 盪盪 將

鴨項 割開 滴血 入酒 攪勻 飲之 直入 肺經 潤補 其肺

却將 鴨乾 去毛 於脇 邊開一孔 取其 腸雜 拭乾 次將

白木一斤用水一
升煎至五升濾去
粗復用水五升再
煎去一半去粗將
前後汁併一處慢
火熬成膏每服三
錢白湯點服

勞瘵

勞瘵青膏膏或無北
九或神授散並見下
勞瘵咳不止蛤蚧散
見下取勞虫天靈蓋
散或買袋丸或秘傳
取勞虫禁方或神仙

秘方或散子方或鬼
哭飲子或二十四味
蓮心飲並見下或遇
仙灸或將軍丸補遺
久或勞瘵成肺痿者
紫苑散補遺或劫癆
散附餘或獨聖散補
遺虛羸不足十補散
補遺或十全大補湯
虛損門
補遺遇仙灸 治瘵
捷法取癸亥日二
更後六神皆聚時
解去下衣直身平
立以墨点記腰上

棗子去核每个中定納參苓平胃散填入鴨肚中用
麻扎定以沙瓮一个置鴨在內四圍用火慢煨將陳
酒煮乾作三次添入者乾為度然後食其菓子陰乾
隨意食用參湯送下後服補髓丹則補髓生精和血
順氣

附○補髓丹

治久勞虛敗髓乾精竭血枯氣少服前藥

愈後服此藥
猪脊骨一條 羊脊骨一條 團魚一枚 烏雞一隻
四味製淨去骨存肉用酒一大碗於沙瓮中煮熟搗
細再入後藥
大山藥 五條 蓮肉 半斤 京棗 一百枚 霜柿 十枚
四味脩製淨用井花水一大瓶于沙瓮內煮熟搗細
與前熟肉一處再用慢火熬之却下

明膠四兩

有黃蠟三兩

右二味逐漸下與前八味和一處搗成膏子和平胃
散末四君子湯末知母黃柏末各一兩共一十兩搜
和成劑如十分硬再入白蜜同熬取起 放青石上
木槌打如泥丸如梧桐子大每服一百丸不拘時候
棗湯下

附○劫勞散

治心腎俱虛勞嗽二三声無痰遇夜癸熱
熱過即冷時有盜汗四肢倦怠黃瘦食微嗽唾中有
紅線名曰肺痿若不治便成羸劣之疾

白芍藥 醋黃芪 甘草 人參 半夏洗
白茯苓 熟地黄 當歸 五味子 阿膠 炒各
每服一兩水二盞姜三片棗三枚煎一盞服不拘時
○丹溪活套云勞極之証五藏必竭重於一經假如足胫

兩傍陷處謂之腰

眼穴然後上床合

面臥每穴灸七壯

勞虫或吐或瀉而

出取後用火焚之

棄於江河中恐害

人故也或依崔氏

穴法灸之宜服後

將軍丸

補遺將軍丸 治傳

屍勞瘵

大黃九蒸九曝焙

鱉甲醋炙黃

牙皂 去皮醋炙

桃仁 去皮炒

管仲 按柳

雷丸各一兩

羌莖半兩 麝香一

錢另研

右為末先將高藥

二兩東边桃柳李

桑葉各七片水一

碗煎七分去渣入

蜜一大觔再熬至

成膏入前藥末及

射香安息香鴉九

如梧桐子大每服

三十食前茶湯下

愚按此方追重取

積之藥也

痠疼腰背拘急遺精白濁面色黃黑耳輪焦枯脉沉

細數知其邪在腎也宜以四物湯加知母黃柏五味

子麥門冬天門冬澤瀉杜仲肉桂之類煎入童便韭

汁竹瀝服○其或心神驚惕怔忡無時盜汗自汗心

煩熱悶口舌生瘡咯血面赤脉洪而數知其邪在心

也宜以前方去杜仲澤瀉肉桂加茯神胡黃連蓮心

遠志菖蒲硃砂之類○其或咳嗽喘促衄血嗽血皮

膚枯燥鼻塞澀沉時吐痰沫脉微虛而瀯數知其邪

在肺也宜以四物湯加沙參麥門冬五味子知母貝

母桔梗桑白皮地骨皮款冬花紫苑馬兜鈴百合百

部之類煎入童便竹瀝姜汁韭汁服○其或脇痛目

赤面青頰赤多怒虛陽不斂夢与鬼交甚則外縮筋

急脉弦而數知其邪在肝也宜以四物湯加竹茹草

龍胆柴胡黃芩青皮竹葉之類○其或面色萎黃唇

脣焦燥飲食無味腹痛腸鳴瀉利四肢倦怠脉虛濡

而數知其邪在脾也宜以四君子湯加酒炒白芍藥

蓮肉薏苡乾山藥朱苓澤瀉白扁豆之類○凡骨蒸

勞熱元氣未脫者灸崔氏四花六穴無有不安者也

○灸崔氏四花穴法

先二穴令患人平身正立取一細繩

右脚底貼肉堅踏之其繩前頭與大拇指端齊後頭

循當脚根中心向後引繩從脚端肚貼肉直上至曲

脊中大橫紋截斷

見頭縫面自顙門平分至腦後却平身正坐取向所

截繩一頭令與鼻端齊引繩向上正繩頭縫至腦後

貼肉垂下循脊骨引繩向下至繩盡處當脊骨中以

繩盡處當脊骨中以

補遺紫苑散 治咳

嗽唾中有膿血勞

証肺痿亦癰

紫苑 甘草

阿膠炒各五分

人參 桔梗

白茯苓各一錢

五味子十五粒

肥知母去毛

貝母去心各錢半

水煎食後服

補遺獨參散 治多

年咳嗽成肺痿咯

血紅痰

白及為細末

每服二錢臨睡

米湯調

補遺下補散 補脾

胃益元氣進飲食

扶虛弱及治虛弱

人瀉痢浮腫并嘔

瘵等証

人參 白朮

甘草炙 山藥

白茯苓 蓮肉

薏苡仁 白芍

肉桂削去皮

四花六穴圖

白圈 是穴 黑點 不是 穴



七壯累灸至一百餘仕候多瘡將瘡又依後灸六穴
又次二穴以第二次量日吻繩子於第二次雙繩頭盡處
上當脊骨上下豎點其繩子中心放在墨點上於
上下絕頭盡處以白圈記之是灸處也
以上第三次點二穴也通前共六穴也擇取難
日及火口灸之一應虛勞發熱瘧疾等証灸之立
愈宜濟世之妙法也

墨點記之 墨點不 又取一繩子令患人合口將繩子

按于口上兩頭至吻却釣起繩子中心至鼻孔根下

如公此便齊兩吻截斷將此繩長令直於前量脊骨

上墨點處橫量取平勿令高下 其量口繩子先中指當

脊骨中先點度兩頭是穴也 出以墨記之却展開繩

兩頭以白圈記之 以上第一次點二穴

次二穴令患人平身正坐稍縮臂膊取一繩繞項向前雙

垂頭與鳩尾齊 胸前起骨也 雙頭齊截斷却翻雙繩頭

向後以繩子中心按於喉吻結骨上其繩兩頭雙垂

循脊骨以墨點記之 墨點又取一繩子令患人合

口橫量脊兩吻截斷不干脊骨上墨點橫量如法繩

子兩頭以白圈記之 白圈是

以上第二次點二穴通前共四穴同時灸各三

太醫院補遺真傳醫學源流首卷大成六卷終

眩運指南

外感眩

脉浮自汗或身不
仁氣上冲胸戰搖如
舟車之上此外感風
眩也川芎茶調散傷
寒散並見下
宗頭痛耳鳴耳聾其
脈緊此感寒上厥眩
暈也白附手丸或芎
木除眩湯並附除或
三五七散補遺冒兩

大醫院補遺真傳醫學源流首卷大成卷之七

眩運門

論

內經曰諸風掉眩皆屬肝木又曰歲木太過風氣流行
脾土受邪民病飧泄食減甚則勿愈善怒眩冒巔疾雖為
氣化之所使然未必不由氣體之虛衰耳其為氣虛肥
白之人濕痰滯於上陰火起於下是以痰挾虛火上衝
頭目正氣不能勝敵故忽然眼黑生花若坐舟車而旋
運也甚而至於卒倒無所知者有之丹溪所謂無痰不
能作眩者政謂此也若夫黑瘦之人軀體薄弱真水虧
欠或勞後過度相火上炎亦有時時眩運何濕痰之有
哉大抵人肥白而作眩者治宜清痰降火為先而兼補

中温嘔吐涎沫頭重

不卒脉息細微此傷

温眩暈也三因腎着

湯附餘如弓名除温

湯中温門或弓木湯

見下心中懊悶不忪

脉虛此傷暑火眩暈

也二陳湯加參术梔

連川弓痰飲門或消

暑丸補造

補遺三五七散治

阴虛感寒眩暈

三五散攻阳氣虛

感寒眩暈五山茱

二辛甘附人参持

七藥防風姜棗施

補遺消暑丸治傷

暑眩暈換悶不忪

林虛

消暑丸中夏一斤

重臨醋煮几迴麵

扶甘八兩同為末

姜汁搜成麩糊丸

酒色過度骨虛不能

納氣歸元使氣逆奔

而上此氣虛而眩暈

也四君子湯加天麻

防風虛損門或半夏

氣之藥人黑瘦而作眩者治宜滋陰降火為要而帶抑
肝之劑扣攻內經有曰風勝則地動風木太過之歲亦
有因其氣化而為外感風邪而眩者治法宜祛風順氣
伐肝降火為良策為外有因嘔血而眩者胸中有死
血迭閉心竅而然宜行血清心自安醫者宜各類推
而治無有不痊者也

脉法

左手脉救熱多

右手脉实而痰積

左手人迎脉緩而浮大者屬風

方法

丹溪曰痰在上火在下火炎上而動其痰也此證屬痰
服者多蓋无痰不能作眩也雖有因風者亦必有痰又曰

人動其痰二陳湯加黃芩蒼术羌活挾氣虛者亦以

治痰為主兼補氣降火藥

去血過多而眩運者芎歸湯

眩運不可當者以大黃酒炒為末清茶調下其類治

防風通聖散治風熱眩運方見風中門

半夏白朮天麻湯治風痰眩運方見頭痛門

如味六君子湯治氣虛痰盛兼挾風邪眩運不忪

陳皮一法拍半夏湯炮 茯苓一朮 甘草後半 荆芥穗分

右細切作一服如生姜三片大棗二枚水二盞煎至

一盞去粗入竹瀝一大匙温服

六合湯 治風虛眩運

四物湯加秦艽羌活為佐水煎服之

玉液湯 治七情感動氣鬱生涎隨氣上衝頭目眩

白木天麻湯頭痛

或香櫛散附除或加

味六君子湯見下吐

血虛眩暈也芎藭湯

即四物去地芎藭散

明失血眩暈四物加

焦姜產后血暈清寬

散補遺

補遺清寬散

荆芥穗四兩

川芎二兩澤蘭葉

人參各一兩

甘草各八分

末之熱湯溫酒各

半盞調下二升

痰火眩

氣鬱生痰動火氣隨

上厥眼合眉稜痛寸

口脉多沉伏此屬痰

也治宜順氣驅痰快

胸其眩自愈導痰湯

加天麻蔓京子痰飲

門或玉液散見下濕

痰眩暈一陳湯加酒

芩白木南星天麻蒼

木或青州白丸並痰

運心蠟神悸眉稜骨痛

大半夏湯七升

右以前味薄切成片每服四錢加生姜十片煎久沉

香磨水一呷服大効

芎藭湯治胃雨中濕眩暈嘔逆頭痛不食等證

川芎二分半夏炮透白木一分甘草六分

右細切作一服加生姜七片水一盞半煎至一盞服

本方○川芎散治風眩暈

山茱萸去皮山藥各半小芎藭各半及

茯苓右為細末每服二錢溫酒調下

附○白附子丸治風痰上厥眩暈頭疼

全蠍炒五升白附子炮南星炮半夏

旋覆花甘草天麻川芎

橘紅僵蚕炒乾薑生各一兩

右為末生姜半片取汁打糊丸梧子大煎荆芥湯下

五十九

附○芎藭除眩湯治感寒濕頭目眩暈

甘草炙川芎附子白木官桂等分

右細剉每服三錢姜七片水煎溫服食前

附○三因腎著湯治腎虛有重腰冷如水洗狀不渴漉

利清

茯苓白木各四兩甘草乾薑各二兩

每服四錢水煎空心服加川芎各除濕湯

附○香櫛飲治氣虛眩暈

木香白木半夏麩橘皮

飲門 風痰眩暈半夏

白木天麻湯頭痛門

或獨活散補遺火動

其疾者一陳加蒼連

蒼木羌火盛者酒炒

大黃末茶湯調下

補遺獨活散

獨活去苦旋覆花

防風去苦蔓荊子

藁本去土川芎

細辛去葉各一兩

甘草炙 石膏研

各半兩

每服二升姜三片

頭痛指南

六經痛

惡風寒脉浮緊痛在

顛頂兩額角此太陽

頭痛也葛根湯加葱

活藥本如顛頂不痛

去藥本加川芎白芷

傷寒門往來寒熱脉

弦痛連耳根此少陽

頭痛也小柴胡湯傷

寒門發熱自汗脉浮

長大痛連目背頰齒

此陽明頭痛也升麻

...

...

茯苓

右劉散水二鍾姜五片煎服

血虛眩暈

○丹溪活套云眩暈者中風之漸也如肥白人氣虛而挾

痰者四君子湯倍蜜炙黃芪加半夏橘紅或少加川

芎荈不穗以清利頭目也○如痰盛而挾氣虛者二

陳湯加人參白朮黃芪或山加炮附子煎入竹瀝姜

汁服○如体瘦血虛而痰火兼盛者二陳湯合四物

加片苓薄荷煎入竹瀝姜汁童便服○如諸般眩暈

挾風則加防風荊芥天麻秦艽等藥挾熱加片苓黃

連梔子之類挾寒加乾姜官桂附子之屬無有不妥

者也

頭痛門

論

內經曰心沐中風則為首風又曰首風之狀頭面多汗

思風當先風一日則病甚頭痛不可以出內至其風曰

則病少愈東垣曰金匱真言論曰東風生於春病在肝

膺在頸項故春氣者病在頭又諸陽會於頭百夫風從

上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛

身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則

瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸

胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在耳中過在

手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上不下頭痛癩疾者

下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也

...

...

...

蒼根湯加石膏白芷
忽白傷寒門或石膏
散見下有痰體重或
腹痛脉沉頭重此太
陰頭痛也一陳湯加
蒼木南星川芎蔓菁
痰飲門足寒氣逆為
寒厥脉沉細此少陰
頭痛也麻黃附子細
辛湯見下吐痰沫厥
冷脉浮緩痛弓目系
此厥陰頭痛也吳茱
萸湯見下或加味吳
茱萸湯補遺

如頭半寒痛者先取手少陽七明後取足少陽七明此
偏頭痛也有真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節者死
不治有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓七者以腦為
主腦逆故令頭痛齒亦痛也九頭痛皆以風藥治之者總
其大体而言之也高顛之上惟風可到故味之薄者陰
中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異故太
陽頭痛惡風脉浮緊川芎羌活活麻蔓類為主陽明頭
痛自汗發熱惡寒脉浮緩長實者亦麻葛根石膏白芷
為主太陰頭痛必有痰體虛或腹痛為痰癖其脉沉緩
蒼木半夏南星為主少陰經頭痛三陰三陽經不流行
而足寒氣逆為寒厥其脉沉細麻黃細辛附子為主厥
陰頭痛或吐痰沫厥冷并其脉浮緩吳茱萸湯主之血
虛頭痛川芎川芎為主氣虛頭痛人參黃芪為主氣血

治傷寒頭痛
或痰涎厥冷浮緩
之脉

俱虛頭痛調中益氣湯少加川芎蔓菁荆子細辛其效如
神白木半夏天麻湯治痰厥頭痛藥也清空膏乃風濕
熱頭痛藥也羌活附子湯治厥陰頭痛藥也如濕氣在
頭者以苦藥吐之不可執方而治先師嘗病頭痛發時
面頰青黃壺眩目不欲開頤言身軀沉重元元欲吐潔
古曰此厥陰太陰合病名曰風痰頭痛以局方王壺丸
治之更多俠溪元取愈是知方者軀也法者用也徒執
一而不變乎

吳茱萸 四分
當歸 黃芩
蒼木 一升 麻黃
羌活 各五分
蔓菁 升麻
黃芪 各三分
蔓荆子 川芎
北細辛 柴胡
半夏 泡 紅花
川黃連 各六分
水煎稍熱食後服

脉法
內經曰寸口脉中短者頭痛也
脉經曰陽弦則頭痛又曰寸口脉浮中氣發熱頭痛
脉緊上寸口者傷風頭痛

虛痛

自魚尾上攻頭痛脉
雖數而無功此血虛
也芎歸湯虛損門或
四物湯加酒芩羌活

柴胡蔓荊子虛損門
耳鳴九竅不利腸胃
之所生脉雖強而必
滿此氣虛也四君子
湯虛損門或順氣和
中湯補遺氣血兩虛
而頭痛加味調中益
氣湯見下巔頂痛必
用藥本柴胡防風頭

脉决云頭痛短滿應須死浮滑風痰皆易除

芎法

丹溪曰頭痛多主於痰痛甚者火多宜清痰降火

○勞役下虛之人似傷寒發熱汗出而太陽穴痛甚此相
火下衝上宜補中益氣湯加川芎當歸甚者加知母

蔓荊子細辛

○諸經氣滯亦作頭痛宜分經理氣處治

○偏頭風在右屬痰屬熱痰用蒼木半夏熱用酒制片黃

芩在左屬風及血虛風用荊芥薄荷或云荊芥薄荷

加用血虛用芎歸為藥酒黃柏諸家不分所屬故藥
多不効少陽偏頭痛者多大便秘或可下之

○一方 治風濕熱頭痛神効

片芩一兩酒炙

羌活

防風各五

蒼耳子 三升

細辛 二升

右為細末以生姜一片搗細和藥末三錢搗勻清

酒下有生甘草酒連川芎

○一方 治年久強壯人氣衰有痰或頭暈而重痛立効

大黃 酒拌炒乾再拌二次

右為細末湯清調下

○一方 治眉稜骨痛屬風熱與痰

白芷 片芩酒制炒

各等分為細末每服二錢茶清調下

○選奇湯 治眉骨痛不可忍神効

羌活 防風各二升 甘草一升 酒片芩半升

右細切作一服水一盞煎至一盞食後服

○又方因風寒眉骨痛不止者

補遺順氣和中湯
治氣虛頭痛升陽

補氣頭痛目眩
綿黃芪 一升半

人參 去芦一升

甘草 炙七分

白朮 陳皮

當歸 白芍藥

各五分 升麻

北細辛 柴胡

蔓荊子 川芎各

三分

作一貼水煎食遠

温服

風濕寒熱痛

風熱與濕上壅者清
空膏或六味片今湯
並見下傷風頭痛者

微青膏或川芎散並
見下或薄荷散補遺

或香蘇散加川芎白
芷傷寒門瘦人頭痛

是火酒為主加引
上藥風熱攻上頭痛

者防風通聖散中風
門或川芎茶調散見

下或考之散補遺或

附錄所犯大寒空膏
髓下以腦為主腦逆

故頭痛齒亦痛此寒
厥痛也羌活黑附湯

見下或加減三五七
散附錄或小芎辛湯

或如茶餅子並見下

風熱盛酒炒黃芩夫
麻川芎防風薄荷或

茶調散或羌活湯並
見下熱厥頭痛清上

瀉火湯或白芷散並
見下寒温頭痛者氣

上而不下頭痛巔疾

川烏

草烏各一升已上二味俱用細辛

羌活

片苓酒拌碎甘草炙各半分

右為細末分二服茶清調下

○清空膏

治偏正頭痛年深久不愈者善療風濕熱頭

痛上壅頭目及腦疼不止者除血虛頭痛不治

川芎

五升柴胡七升黃連制炒防風去芦羌活各一

甘草

炙片黃芩三兩切片酒拌濕

右為細末每服二錢熱盞內入清茶少許湯調如膏臨

卧抹口內少用白湯送下如若頭痛每服加細辛二

分如太陰脉緩有痰名痰厥頭痛羌活防風川芎

甘草加半夏麴一兩伍錢如偏正頭痛服之不愈減

羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發熱惡熱而清

自陽明頭痛只服白虎湯加吳白芷立愈

○半夏白朮天麻湯

悶氣促上喘無力以心言神顛倒目不敢開如在風

雲中頭若痛如裂身重如山四肢厥冷不得安卧

黃柏一分

乾姜一分澤瀉

白茯苓

天麻

黃芪

人參

蒼朮各三分神麴炒

白朮各五分

麥蘖麴

半夏湯去橘紅各七分

右細切作一服水二盞加生姜三片煎至一盞去粗

稍熱服食前可一服而愈此頭痛若甚謂之足太陰

痰厥頭痛非半夏不能除眼黑頭旋風虛內作非天

麻不能療黃芪甘温瀉火補氣實表止汗人參甘温

瀉火補中益氣二朮俱若甘温除濕補中澤瀉茯苓

利小便導濕橘皮若温益氣調中神麴消食湯胃中

滯氣大麥蘖寬中助脾乾姜辛熱以滌中寒黃柏若

下虛上實寸在手少

陰巨陽甚則入腎此

腎厥頭痛也玉其九

補遺因氣所觸心腹

脹滿嘔吐酸水頭目

昏眩此氣厥頭痛也

芎藭散補遺近日頭

風痛者芎藭茶調散

或不臥散或四神散

或九危丸或川芎散

並附餘或金花一聖

散或南星蒼朮茶調

散並補遺或川芎神

散或細辛散或一

風感風一切頭痛

甘菊花二兩

北細辛去上半兩

甘草七系半

白芷 羌活

香附子去毛

薄荷各三兩

荆芥二十枝

茵陳蒿半兩

蒼朮米泔浸

川芎各一兩

右為末每服二系

茶清調下婦人產

辛以療冬天小火在泉發躁也

○安神湯 治頭痛頭眩眼黑

生甘草 甘草各二分 防風二分 柴胡 升麻

生地黄酒 知母酒五分 黃柏酒半 羌活各一 黃芪半

右細切作一服水二盞煎至一盞半加蔓荊子五分

川芎二分再煎至一盞去粗臨卧稍熱服

○微青膏

蔓荊子 細辛各一系 薄荷葉 川芎各二系

生甘草 炙甘草各五 藁本 一兩

右為細末每服二錢食後茶清調下

○川芎散 治頭目不清利

川芎五系 柴胡七系 羌活 防風

生地黄 兩半 黃連 兩半 酒片 兩半

右為細末每服二錢食後茶清調下

○白芷散 一名紫金散 治諸苦頭痛

鬱金一系 白芷 石膏各二系 雄黃

芒硝 薄荷葉各三

右為細末口含水鼻內搐之

○羌活清空膏

蔓荊子 黃連三系 羌活 防風 甘草各四

片苓一兩

右為細末每服一錢茶清調下食後或卧服

○清上瀉火湯昔有人年少時氣弱常於氣海三里穴節

次灸之至年若成熟厥頭痛雖冬天太寒喜寒風風

吹之頭痛即愈略來煖處或見烟火其痛復作此灸之

吹之頭痛即愈略來煖處或見烟火其痛復作此灸之

後當歸石膏末調

下

補遺玉真丸 治腎

厥頭痛不可忍其

脉浮之則弦按之

則堅

生硫黃二兩另研

石膏硬者不煨

半夏湯泡七次

硝石另研各一兩

右為末研勻用生

姜汁煮糊丸如梧

子大每服四十九

食前姜湯米飲任

過也

荆芥穗

川芎各二分

當歸身

蒼木各三分

酒黃連

生地黄

藥本各四分

生甘草五分

升麻

防風各三分

酒黃柏

炙甘草

黃芪各五分

酒黃芩

酒知母各七分

羌活八分

柴胡一糸

細辛二分

酒紅花少許

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後稍熱服

陳○細辛散

治偏正頭痛

細辛

瓦松各二分

生黃芩

芍藥各三分

酒黃連

川芎各五分

黃芩

酒甘草

各一分

柴胡

去絲

右細切作一服水一盞半煎至一盞食後服

陳○羌活湯

治風熱壅盛上攻頭目昏眩

天台烏藥散

川芎各等分

右為細末每服二

水臍茶清調服

補遺芎芷散

治風

壅頭痛

川芎

白芷

荆芥穗

軟石膏

右為末每服一糸

食後沸湯調下

補遺金花一聖散

治頭風

川芎

川烏

東○一粒金

治偏頭風

白芷

川芎各一

右為細末無根水為丸每用一丸以無根水化開搗

鼻內外以銅錢咬口內出涎

陳○羌活附子湯

治冬寒犯腦痛及齒亦痛名曰腦風

麻黃不去節

附子炮

防風

白芷

僵蚕

黃柏各七分

羌活

蒼木各五分

升麻二分

黃芪三分

甘草二分

佛耳草

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

仲景○麻黃細辛附子湯

治三陰三陽經不流行而足

白芷各等分

右為末每服二匙

生葱三寸薄荷葉

三四皮同煎食後

溫服

補遺南星蒼木茶調散 治頭風鼻塞

天南星 蒼木

酒黃芩 辛夷

川芎各等分

右為末茶調下

補遺天香散 治年久頭風頭痛不得愈者

香白芷

川烏去皮各等分

每服四匙水一盞

煎一半入姜汁半

盞前八分溫服

補遺灸法 治頭風

宜灸額會百會前

頂上星等穴瘡

庭上五分上星位

額會星上一寸強

會後前頂一寸半

寸半百會居中央

痰厥痛

痰厥頭痛 陳湯加

寒氣逆為寒厥頭痛其脈沉細

麻黃 細辛 各六分 附子 一个去皮

右細切水三升三合先煮麻黃令沸減七合掠去上

沫結諸藥煎取一升去粗分三服

用溪方 ○吳茱萸湯 治厥陰頭項強痛或吐痰沫厥冷其

脈浮緩

吳茱萸 生姜 各半 兩人參 三升半

右細切作一服水二盞大棗一枚煎至一盞溫服

東垣方 ○加味調中益氣湯 治氣血俱虛頭痛其效如神

陳皮 黃柏 酒炒 各升麻 柴胡 去芦 各

人參 炙甘草 蒼木 各六分 黃芪 一升

川芎 六分 蔓荊子 三分 細辛 二分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗服

木香 一分 無名異 一分 入煎服

中逼迫此血虛血澁也加當歸身五分○愚按東垣

謂此方治氣血俱虛頭痛本方加當歸一味雖無已

上證亦恐不可決也

獨○玉壺丸 治風濕頭痛亦治痰患

雄黃 一升 南星 煨裂 半夏 湯炒 天麻 白朮 各二

右為細末姜汁浸熬餅為丸服

獨○川芎茶調散 治諸風上攻頭目昏痛鼻塞聲重

薄荷 四兩 荆芥穗 川芎 略 羌活 白芷

甘草 各一兩 細辛 五分 防風 二升半

右為細末每服二匙食後茶清調下

羅大無方 ○醫壘元戎治三陽頭痛方

羌活 防風 荆芥穗 升麻

入百病通

蒼朮蔓荊子天南星

防風淡飲門或三生

丸見下肥人頭痛是

濕痰上攻治宜燥濕

化痰半夏蒼朮為主

加引經獨守之藥痰

唾稠粘頭旋眼黑頭

苦痛如裂者半夏白

朮天麻湯見下風痰

上攻頭痛白芷芽茶

川芎防風南星半夏

細或青川白丸痰飲

門風痰上盛三生散

痰飲門或茯苓半夏

湯見下或生朱丹或

並梳遺

大川芎九或川芎丸

補遺生朱丹 治諸

風痰盛頭痛目眩

氣鬱積滯胸膈不

利

朱砂一兩二水

白附子炮去皮臍

石膏燒通紅令冷

各半斤 虎腦一

子

右為末燒粟米飯

為丸如小豆大殊

砂為衣每服三十

丸食後或茶或酒

高根

川芎

各等分細切五錢水二盞煎至一盞溫服

間○如聖餅子 治風寒伏留陽經痰飲氣厥頭痛

防風

天麻 各半兩

川芎

甘草 各一兩半夏半兩

右為細末蒸餅糊調捻作餅子如錢樣每用五餅同

荆芥末細嚼茶清送下

○川芎神攻散 治風熱上攻頭目令痛偏正頭痛

川芎

川烏

白芷

南星

麻黃 各一兩甘草五分

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞半煎

至一盞去粗食後溫服

○三因芎半散 治傷風寒生冷及氣虛痰厥頭痛如破

兼眩暈嘔吐

附子去皮臍

烏頭去皮

南星

甘草炙

川芎

細辛 各一兩

乾姜

右細切作一服加生姜五片茶芽少許水二盞煎至

一盞去粗溫服

○小芎辛湯 治風寒在腦或感邪濕頭重而疼眩暈

嘔吐

川芎 二兩

細辛

白朮 各一兩

甘草 五分

右細切作一服加生姜五片茶芽少許水煎服

○寶鑑石膏散 治陽明經頭痛大効

川芎

石膏

白芷 各等分

右為細末每服四錢茶清調下

任下

補遺大川芎丸 治

首風暈眩外合陽

氣風寒相搏胸膈

痰飲偏正頭疼

川芎一斤明天麻

四兩蘄州者

末之煉蜜九分二

百丸每服一九食

後細嚼茶酒下

補遺川芎丸 消風

壅化痰涎利咽膈

清頭目旋暈心忪

煩熱頭項索急肩

背向卷肢本道疾

皮膚癢癢眼昏目

痰鼻塞舌重面上

游風

川芎 薄荷各

七兩半 甘草

細辛 防風各

二兩半 桔梗兩

末之蜜丸兩半作

五下丸食後臨臥

時細嚼一九茶清

送下

眉眶痛

肝虛眉明眉眶痛者

熟地黃丸或上青散

氏痰 ○三生丸 治痰頭痛

半夏

白附子

南星各等分

右為細末生姜自然汁浸蒸餅為丸如棗豆大每服

四五十九食後姜湯送下

○茯苓半夏湯 治風熱痰逆嘔吐頭痛

半夏三升 茯苓各片黃芩 甘草

橘紅各五

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞

○祖傳經驗 治頭風熱痛不可忍者

白芷半兩 細茶芽三升 荆芥穗四升 薄荷葉二升

小川芎一兩片黃芩二兩酒拌濕炒再拌再

右為細末每服二錢白湯或茶清調下

○又經驗敷貼 治頭風熱痛

朴硝 大黃各等分

右為細末用深井底泥和作餅子貼兩大湯穴

○菊花散 治風熱上攻頭痛不止

石膏 甘菊花 防風 旋覆花

枳殼 蔓荊子 甘草 羌活各半

右用水二盞姜五葉煎至一盞去渣溫服

○豆粉丸 治風熱頭痛

川芎 細辛 甘草 白芷

豆粉各二升 薄荷 石膏各半兩 朴硝二升

右為細末煉蜜和丸如彈子大石膏末為衣每服一

九細嚼茶清下

○菊花茶調散 治諸風頭目昏重偏正頭痛頭風塞

菊花 川芎 荆芥穗 羌活 甘草

白芷各二 細辛一兩 防風一兩半 蟬蛻 僵蚕

並補遺風熱盛眉眶

痛不可忍還奇湯即

羌活散見下或茶正

散補遺風痰攻上眉

稜痛者導痰湯或二

陳湯煎卷青川白丸

子並痰飲門寒濕上

攻肩痠痛者考辛散

補遺風執眉眶痛二

烏散見下

補遺熱地黃丸治

肝虛羞明眉眶作

痛

生辛 熟辛

右為細末練蜜和

丸香旦大每服五

十食後茶湯下

補遺上清散 治因

風頭痛眉骨眼眶

俱痛不可忍者

川芎 鬱金

荆芥穗 芍藥

芒硝臨服時加

薄荷葉各二錢

腦子一分半

乳香 沒藥各

五分

右為末每服一字

薄荷各五分

右為細末每服二錢食後用茶清調下

附○不卧散 治頭風痛不可忍者

玄胡索七枚 青黛二升 猪牙皂角肥實者刮去皮及子二兩

右為末用水調丸成小餅子如杏仁大用時令病者

仰臥以水化開用竹管送入男左女右鼻中齋藥味

至喉少酸冷病者坐却令咬定銅錢一箇於當門齒

上當見涎出成盆即愈

附○四神散 治婦人血風眩運頭痛

菊花 當歸 旋覆花 荆芥穗

右等分為細末每服二錢葱白三寸茶末二錢水一

盞半煎至八分去滓食後溫服

川芎 石膏 白芷 全蝎各二錢半

半夏 南星各半兩 加細辛

附○川芎散 治頭風偏正頭痛

羌活 細辛 川芎 香附子 槐花

甘草炙 石膏 荆芥穗 薄荷 菊花

茵陳 防風各一兩

右為末每服二錢茶清調食後服忌動風物

附○加減三五七散 治八風五痺肢體不仁大治風寒

入腦陽虛頭痛畏聞人聲目旋運轉耳內蟬鳴應有

濕痺脚氣緩弱並皆治之

山茱萸去核 細辛半兩 乾姜泡三兩 防風去節

茯苓去皮 附子三箇半炮

去交際

右為末每服一字

鼻內搖之

補遺茶辛散

酒苓 白芷

等分木之茶清湯

調下二錢

補遺茶辛散 治頭

疼因寒濕者亦治

眉眶痛

附子 生去皮尖

烏頭 生去皮

天南星 乾姜

其草 川芎

此細辛等分

每服四錢姜二片

胃脘指南

虛痛

虛弱人心痛錢氏云
心虛痛者炒鹽補之
衍義以貝蠖治虛痛
此義同也以物按注
而痛止者扶虛也二
陳湯加炮姜末和之
痰飲門右手脈緊實
痰積弦大必是久病
元氣虛弱肢體怯薄
手欲按者六君子湯
加砂仁香附虛損門

右為細末每服酒食前調服

○丹溪活套云九治頭風必以二陳湯加川芎白芷為主

○如太陽經頭痛加羌活○陽明經加石膏白芷○

少陽經加柴胡黃芩○太陰經加蒼朮○少陰經加

細辛○厥陰經加吳茱萸○如肥人頭痛必是濕痰

加半夏蒼朮○如瘦人頭痛是熱上壅多加酒洗

片黃芩○如因感冒而頭痛者宜加防風羌活藁朮

升麻柴胡葛根之類○如氣虛而頭痛者宜用黃芪

人參東垣安神湯之類○如風熱在上而頭痛者加

天麻蔓荊子台芎酒片芩之類○如苦頭痛者宜用

細辛○如形瘦色斂而頭痛者是血虛宜用川芎芍

藥酒黃柏之類○如頂顛痛者宜高本酒炒升麻

胃脘門

論

內經曰木鬱之發民病胃脘當心而痛上肢兩脇痛膈
噎不通飲食不下蓋木氣被鬱發則太過故民病有土
敗木賊之候也夫胃為脾之府陽先於陰故藏未病而
府先病也甚而至於脇下如刀割之痛者已連及於藏
矣古方名於脾疼者是也胃之上口名曰胃門脾門與
心相連故經所謂胃脘當心而痛今俗呼為心痛者未
達此義耳雖曰運氣之勝復未有不由清痰食積鬱于
中七情九氣觸于內之所致焉是以清陽不升濁陰不
降而肝木之邪得以乘機侵侮而為病矣更原厥初致
病之由多因縱恣口腹喜好辛酸恣飲熱酒煎燂復食

霍亂痛

因氣怒而飲食卒痛
使閉住悶心胸高起
手不可按者火尖痛
也黃黃丸後以藥本
湯去其餘邪血補道
胃腕濕熱痛小胃丹
下之痰飲門或大陷
腸湯傷室或厚朴
丸補虛

補道者黃丸 治火
尖心痛心胸高起
手不可按者
黃丸一兩

巴豆 五子去以
二味入白麩二兩
研勻水丸梧子大
漿水煮十二丸熟
漉入冷漿水內冷
沉每一時冷漿水
下一丸日盡十二
丸如得利不可再
服宜服藥本湯
補遺藥本湯 治火
實心痛服黃丸
後服此去餘邪
藥本半兩蒼朮未
泔浸炒一兩
作一貼水煎服

寒涼生冷朝傷暮損日積月深自鬱成積自積成痰痰
火煎熱血亦妄行痰血相雜妨碍升降故胃腕疼痛吞
酸噎氣嘈雜惡心皆膈噎反胃之漸者也俗醫不究其
源例以辛香燥熱之劑治之以火濟火遂成危劇良可
痛哉古方九種心痛曰飲曰食曰風曰冷曰熱曰悸曰
虫曰疰曰去來痛夫所謂冷者惟一耳豈可例以熱藥
治之乎詳其所由皆在胃腕而實不在於心也有真心
痛者大寒觸犯心君又曰汚血衝心手足青過節者且
發夕死夕發且死醫者宜區別諸證而治之無有不安
之理也

脈法

脈經曰陽微陰弦則胸痺而痛責其虛也

今陽虛知上焦所以胸痺心痛者以其脈陰弦故也

育痺之病喘息欬唾育痺痛短氣寸口脈沉而遲關上
小緊弦數

心脈微急為痛微大為心痺引脊痛

脈短而數者心痛 濡者心痛 脈浮大弦長者死

方法

卅溪曰心痛即胃腕痛溲分新若明知身犯寒氣口得
寒物而病於初得之時當用溫散溫利之藥若病久
則成鬱矣鬱則成執原病式中備言之矣若欲行溫
散溫利寧無助火添病耶由是古方多用山梔子為
君執藥為之嚮導則邪易伏病易退病安之後若縱
恣不改前非病必再作難治矣此病雖日久不食不
死又曰中宮有食積與痰而生病者胃氣亦賴所養
卒不便虛雖日數多不食不死若痛方止即吃物病

補遺厚朴丸 治翻

胃吐逆飲食噎塞

上冲心腹中結疾

春夏加黃連二兩

秋冬加厚朴二兩

厚朴 去皮黃連

川烏炮各二兩半

吳茱萸湯泡七次

紫苑 柴胡

桔梗 茯苓

乾姜炮 薑蒲

桂去皮 皂角炙

巴豆霜另研

蜀椒炒出汗

和丸梧子大每服

三九漸加之以利

為度

執厥痛

執厥胃脘痛者其人

必縱酒蓄熱在胃偶

遇寒鬱而發故身熱

足寒痛甚則煩躁而

吐額上有汗脈洪大

當灸大谿崑崙表裏

俱濕之補遺金鈴子

散見下痛止服枳木

丸以去餘邪內傷門

必復作勿歸咎於鑿也必須再服三五服藥後以漸

而少介方可獲全安

○心膈大痛攻走腰背發厥嘔吐諸藥不効者就吐中以

鵝翎探之出痰積碗許而痛即止

○一方用黃荊子炒焦為末米飲調服一云上可治心

○一方用藍葉搗細取汁合姜汁服

○一方用青黛以姜汁入湯調服

○一方用海粉佐以香附末以川芎山梔子煎湯入姜汁

調服

○一方無藥處以塩置刀頭燒紅淬入水中乘熱飲之吐

痰而止

此法治絞腸沙大痛幾死者立効

○一方治心痛極者以探之

和之重者加

○一方痛甚者脉必伏宜溫藥附子之類不可用人參白

朮蓋諸痛不可補氣故也

○一方治氣痛者用牡蠣粉一二錢酒溫調下

○一方治濕痰作痛用白螺螄殼去泥沙火煨為細末每

服用七分溫酒調下立止

○一方以物拄按而痛定者屬虛以二陳湯加炒乾姜末

和之而愈

○一方山梔大者七枚或九枚炒焦黃用水一錢煎七分

入生姜自然汁二三匙令辣熱飲之立止

○一方山梔子劫止之後復發者煎藥必不効用去明粉

一錢七白湯送下立止

○一方治死血作痛證用玄胡索一兩半桂心紅花滑石

初痛時以倉蠶湯飲

一盞探吐得吐就發

散心脾痛日久則非

寒也縱有寒亦鬱而

為熱二陳湯加炒山

梔川芎香附痛甚者

加炮姜及佐之 痰飲

門或以山梔一味入

姜汁煎服脈壅實大

便不通大陷胸湯或

大陷胸丸並傷寒門

服溫燥藥痛不止便

結者承氣湯傷寒門

心事不遂而胃脘作

痛者此證人之病也

九種道

補遺灸法

太谿二穴在足內

踝骨後陷中

崑崙二穴在跟陷

踝後

補遺方病丸

黑牽牛一刃半

京山稜 莪木

小皂角去筋

茵陳 大黃

枳即各一刃

右俱生為末用大

皂角一兩煎水去

○又方 治痰積胃脘作痛白螺殼丸

紅麩各五錢桃仁三十箇蒸餅丸服効

白螺殼煨 滑石炒 蒼朮

山梔子

香附童便 南星煨裂各一兩 枳殼黃色 青皮

木香 半夏 砂仁各五

右為末春加川芎夏加黃連秋冬加吳茱萸用生姜

汁浸蒸餅為丸如菘且大每服五十九

○連附六一湯 治胃脘痛甚諸藥不効者天因熱用妨

黃連六分 附子炮去皮

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞半煎

至一盞去粗稍熱服

○草豆蔻丸 治客寒犯胃作痛或因溫熱鬱結作痛

草豆蔻煨 枳殼煨 白朮

白殭蚕 黃芪 益智仁各八 生甘草

炙甘草 當歸身 青皮各六分 澤瀉小便多

半夏各一刃 桃仁去皮尖 麥蘗麵一刃 神麩炒 黃

柴胡煨不痛 姜黃各四兩

右為細末桃仁另研如泥入諸藥中和勻再研湯浸

蒸餅為丸如梧桐子大每服三十九白湯送下食後

○麻黃豆蔻丸 治客寒犯胃心頭大痛不可忍

麻黃 豆蔻 青皮 紅花 厚朴姜制各

木香 蘇木分三 葶澄茄分四 升麻 半夏湯炒

麥蘗麩 砂仁 黃芪 白朮

陳皮白去 柴胡 炙甘草 吳茱萸

當歸身絡五 益智仁分六 神麩炒 麻黃不去煎

滓打米糊為丸如
梧桐子大每服六
七十橘葉七片山
枝仁參子煎湯下
如食積曲湯下老
人便秘栞仁麻仁
湯下

寒厥痛

寒厥胃脘痛者手足
厥逆遍身冷汗甚則
手足甲青黑小便清
白不渴氣微力薄脉
沉細而微者木附湯
見下

也丹溪云明知身受
寒氣口食寒物初病
當以溫散溫利之藥
草薏苡丸或麻黃苴
薏丸或三因倉卒散
並見下 大便秘結不
通者元戎厚朴丸實
痛補遺下或却痛散
主之補遺外傷寒和
內傷冷物心痛手足
冷者感應丸附餘心
氣痛嘔吐湯藥不能
下者蕪手足厥冷蘇
合香丸諸氣門

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九
白湯下或細嚼白湯送下亦可

東
○木香化滯湯 治因憂食溫麪結於胃脘腹皮抵痛
心下硬微滿不思飲食食之不散常吐痞氣不安方
見痞滿門

○三因蒼卒散 治氣自腰腹間攻心痛不可忍腹中水
冷自汗如洗手足拳急厥冷

山梔子 大者四十五枚 連皮槌碎炒焦 附子 一枚 去皮臍
右為末每服二匙酒一盞煎八分溫服

○金鈴子散 治熱厥心痛
金鈴子 玄胡索 各一升

右為細末每服二匙溫酒調下白湯亦可
○神聖代鍼散 治心腹諸痛

乳香 沒藥 當歸 白芷
川芎 各半兩 元青 一兩 去
右為細末每服一分病甚者半升先點好茶一盞次
搽藥末在茶上不得吹境立地細細呷之心痛欲死
者服之立効小腸氣痛如角弓膀胱腫硬一切氣刺
虛痛併婦人血癖血迷血運血刺痛衝心胎衣不下
難產但是一切因血作痛之疾服之大有神効

○木附湯 治寒厥暴痛脉微氣弱
附子 炮五 白朮 二升 甘草 一升
右細切作一服水一盞半入生姜五片大棗二枚煎
至一盞去粗溫服此藥又治風濕相搏身重煩疼不
能轉側不嘔不渴大便堅實小便自利及風虛頭目
眩運不知食味煖肌補中助陽氣止有汗之聖藥也

活
○木附湯 治寒厥暴痛脉微氣弱
附子 炮五 白朮 二升 甘草 一升
右細切作一服水一盞半入生姜五片大棗二枚煎
至一盞去粗溫服此藥又治風濕相搏身重煩疼不
能轉側不嘔不渴大便堅實小便自利及風虛頭目
眩運不知食味煖肌補中助陽氣止有汗之聖藥也

補遺却痛散 治心

氣冷痛不可忍

五靈脂 當歸

蒲黃炒 桂

石菖蒲 胡椒

南木香各一兩

川烏泡七手半

每服四子入塩醋

少許煎服

痰飲食積

痰飲積滯於胃脘當

心而痛者白螺殼丸

見下有痰作痛明鑿

丸如雞頭大姜

湯下食積痛感應丸

附餘淡姜湯下或青

蘇散內傷門或黃連

六一湯嘔吐門或水

香化滯湯痞滿門或

加味枳木丸見下

瘀血痛

平昔喜食熱物致死

血流於胃曰作痛者

脉沉而氣逆在胃者

以桃仁承氣湯下之

傷寒門或四物湯加

桃仁紅花玄胡索枳

殼丹皮 虛損門輕者

附○感應丸 治停積宿食冷物不能消化或瀉莫如抱

壞鷄子或下利膿血心腹刺痛不止

百草霜二兩 丁香半兩 乾姜兩 南木香半兩

杏仁去皮尖肉苳蔻仁煨巴豆皮心膜祛

除巴豆杏仁百草霜末之先黃蠟六兩將好酒一升

煮過取蠟春夏入清油一兩秋冬入清油一兩半熬

令香熟次下酒煮蠟四兩同化作汁乘熱和分作小

錠子以油單紙裹旋丸如梧桐子大空心姜湯下三

十九

○丹溪活套云草豆蔻一味性温能散滯氣利膈上痰若

胃脘果因寒而作痛用之如鼓應桴若温痰鬱結成痛者

服之多効若因執鬱而痛者理固不當用此但宜以

涼藥盜制如木連旋子之屬其功尤速東垣單宜

丸懸執心痛大獲奇功但因執者不可多服久服

有積温成熟之患耳若久病鬱熱已膠固者斷不可

用此味也○胃中若有流清上痰作痛腹中漉漉有

声及手足寒痛或腰膝春脇抽掣作痛者用小胃丹

或三花神祐丸或控涎丹漸漸服之能徹去病根即止

○祖傳經驗加味枳木丸 治清痰食積酒積茶積肉積

在胃脘當心而痛及痞滿惡心嘈奈噯氣吞酸吐嘔

脾疼等證其効如神

白木兩枳實煨炒蒼木米泔浸猪苓去黑皮

麥蘗炒黃神麴炒微半夏湯泡澤瀉去毛

赤茯苓去皮川芎 黃連陳壁土白螺殼煨各

縮砂仁 草豆蔻 黃芩陳壁土青皮去白

萊菔子炒 乾生姜各五 陳皮去白 香附米童便

非汗括梗開之虛者
玄胡桂紅花紅曲桃
仁活石重則桃仁承
氣湯傷寒

蟲痛

蛇虫攻人胃脘痛者
痛定便能食面上有
白斑唇紅二陳加苦
練錫灰疼飲門或集
効左或化虫丸並諸
虫門蛇虫攻心痛
惡心而吐川椒湯下
烏梅丸諸虫門

腹痛指南

熱痛

特痛時上而腹滿堅
結痛脈數此熱痛也
故胸中有熱胃中有
邪腹痛欲嘔治宜清
之黃連湯見下腹痛
麻法熱也黃芩芍藥
湯刺症門常有熱而
腹中作痛此積熱也
宜下之調胃承氣湯
傷寒門寒邪及熱傳
裏腹痛便瀉而厥四

瓜蒌子

厚朴制炒

枳殼炒

木香

甘草各二錢

吞酸加吳茱萸湯泡寒月五錢熱月二

錢半○久病挾虛加人參白扁豆石蓮肉各五錢○

時常口吐清水加枳滑石一两牡蠣五錢○右為細

末用青荷葉泡湯浸脫粳米研粉作糊為丸如梧桐

子每服七十九多至一百丸清米飲送下

男子年三十五胃脘作痛久矣人形黃瘦食少而胸

中常若食飽來求治與加味枳木丸服不効而日漸

大痛叫號聲聞四鄰別父母妻子囑付後事欲自殺

予與桃仁承氣湯作大劑與之連二服大下瘀血四

五碗許困倦不能言語者三日教以稀粥少食漸上
將理全安復壯如舊

腹痛門

論

內經曰寒氣入經而稽遲泣腫而不行客於脉外則血
少客於脉中則氣不通故卒然而痛云按內經卒痛
論言寒邪外客而痛者甚未詳來未能盡述學者自宜
檢閱外有因虛因實因傷寒因痰火因食積因死箸種
種不同亦當表而出之疾使卒者易為參考焉東垣曰
腹中諸痛皆由勞後過甚飲食失節中氣不足寒邪乘
虛而客入之故卒然而作大痛經云得靈則止此事難
知集論曰傷寒中脘痛大陰也理中湯黃芪建中湯之
類臍腹痛者少陰也四物湯真武湯附子湯之類小腹
痛厥陰也重則正陽散回陽丹輕則當歸四逆湯之類

逆散補遺腹滿時痛
桂枝加大黃湯治症
門腹痛大便結脈
有大者大承氣湯下
之傷寒門夏月傷暑
而腹中作痛者香薷
湯吞香連丸痢症門
腹痛響鼻雷鳴者此
水激火響也大黃湯
見下

補遺四逆散 治陽

厥腹痛四肢逆脉

數

甘草炙 柴胡

右為末每服二錢

米湯下

寒痛

腹中綿七增痛而無
臧者此寒痛也是故
傷寒下利腹痛四肢
逆冷四逆湯傷寒門
腹痛厥冷欲死者薤
白散見下腹痛下利
四肢沉重者真武湯
傷寒門霍亂身寒腹
痛厥逆理中湯傷寒
門或高良姜湯見下

太陰連少陰痛甚者當變為下利不止若夫雜病腹痛

四物苦練湯酒者當歸丸之類夏月腹痛肌熱惡熱脉

洪數屬手太陰足陽明黃芩芍藥湯主之秋月腹痛肌

寒惡寒脉沉疾屬足太陰足少陰桂枝芍藥湯主之四時

腹痛芍藥甘草湯主之原病式曰執鬱于內則腹滿堅

結而痛不可例言為寒也成無已曰陰寒為邪者則腹

滿而吐食不下自利益甚腹癢痛太陰證也發汗不解

醫及下之因而腹滿時痛者屬太陽也桂枝加芍藥湯

主之大實而痛者加桂加大黃湯主之又曰邪氣聚於

下焦則津液不得宜通氣血不得流行或渴溢或血流

滯於下而生脹滿硬痛也若從心下至小腹皆鞭滿而

痛者是邪實者須以大陷胸湯下之若但小腹鞭滿而

痛小便利者則是自血之證小便不利者則為溺澀之

證也其有血虛瘦弱之人津液枯涸傳送失常鬱火燥

熱煎成結糞滯於大小腸之間阻氣不運而作痛者宜

以枳實導滯丸倍急大黃丸之類先通其滯止其痛然

後用四物等生血潤燥之劑以治其本外有卒然心腹

大痛欲吐不得吐欲瀉不得瀉唇青厥逆死在須臾此

內因食積外感寒邪是名乾霍亂之候也宜急以鹽湯

灌之而以鵝翎探吐取涎而愈若夫清痰留滯于胸腹

之間食積鬱結於腸胃之內皆能令人腹痛清疼作痛

者控涎丹小胃丹之類食積為患者保和丸枳木丸之

類消之枳實導滯丸木香枳柳丸之類下之濁氣在上

者湧之清氣在下者提之寒者溫之熱者清之虛者培

之實者瀉之結者散之留者行之此治法之大要也學

者詳之

小腹痛酒煮當歸脉法

九見下因感山嵐瘴

氣霍亂腹痛身不厥

冷者正氣散補遺小

腹滿痛脉弱桂枝加

芍藥湯痢症門因服

寒藥過多腹痛不止

者益胃散見下

補遺正氣散逐寒

邪驅嵐瘴止霍亂

除濕和中正氣療

腹痛

藿葉去土一錢

厚朴去皮姜製

東坡各一錢半

半夏一錢一分

甘草五分

如蒼木錢半名不

換金正氣散

右作一貼生姜三

片棗一枚水一鍾

煎至七分溫服

痰痛

濕痰痛者凡痛大小

便不利丹溪云清痰

多作腹痛脉滑痰因

氣滯而聚凝其道路

不得通故也宜導痰

解鬱其氣順而痛自

脉經曰脉細小緊急病進在中腹中刺痛

陰弦則腹痛 弦急小腹痛 尺脉實小腹痛當利

心腹痛不得息脉細小浮者生脉大而疾者死

腹痛脉反浮大而長者死

方法

丹溪曰腹痛有寒有積熱有食積有痰有死血脉弦者

多屬食宜溫散之蓋食得寒則滯得熱則行更宜以

行氣則氣若助之無不愈者○脉滑者是痰七因氣

滯而聚阻礙道路氣不得宣通而痛宜導痰解鬱○

九痛必用溫散以其鬱結不行阻氣不運故也○臍

下忽大痛人中黑色者多死○腹中水鳴乃火擊動

其水也

綿氏曰腹痛無增減者是寒也時痛時止者是熱也其痛動者是死血也

○治腹痛用台芎蒼木香附白芷為末姜汁入湯調服

○白芍藥止能治血虛腹痛餘俱不治以其酸寒收斂而無溫散之功者也

○如飲食過傷而腹痛者宜木香枳榔下之

○如氣虛之人傷飲食而腹痛宜調補胃氣併消導藥用

人參白朮山查神麴枳實麥芽木香砂仁之類

○如腹中常有熱而痛此為積熱宜調胃承氣湯下之

○小腹實痛青皮以行其氣

○小腹因寒而痛宜肉桂吳茱萸

○因寒氣作痛者宜小建中湯加乾姜官桂台芎蒼木白

芷香附

○因熱而痛者二陳湯加黃芪黃連梔子痛甚者加炒乾

痞二陳湯如口苦蒼
木南木香白芷香附
末之姜湯調服
門或小胃丹內傷門
肥人腹痛多氣虛蕪
濕痰二陳湯加二木
芳藥飲門

積痛

痛甚即欲大便便後
痛即減者此食積腹
痛也脈弦而有力宜
溫散以行氣保和丸
或如笑導滯湯並內

時痛六君子湯加炒
蘇芍藥虛損門因酒
所傷以致心腹痛者
神妙列仙散內傷門

虛痛

素弱人全不思食腹
冷痛養胃湯加肉桂
牙黃木香或理中湯
傷寒門或小建中湯
附餘腹痛欲以手按
按之即止者屬虛參
木姜桂之類血虛腹
痛須用白芍藥或四

姜從之

已上皆用 ○若腹痛不禁下者宜川芎蒼木湯以治之川

芎蒼木香附白芷茯苓滑石加姜水煎服

東 ○高良姜湯 治因寒心腹大痛

高良姜 厚朴 官桂 各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗熱服

東 ○草豆蔻湯 治臍痛虛脹作痛

澤瀉 一錢 木香 三分 神麴 四分 半夏 草豆蔻

枳實 黃芪 益智仁 甘草 各五分 青皮

陳皮 各六分 川歸 茯苓 各七分

東 ○益胃散 治因服寒藥過多致腹痛不止

右細切作一服加生姜三片水一盞煎至一盞溫服

厚朴 甘草 白豆蔻 澤瀉 三分

姜黃 知仁 砂仁 黃芪 各七分

右細切作一服加生姜水煎服

東 ○厚朴溫中湯 治胃虛冷脹滿疼痛

厚朴 陳皮 茯苓 草豆蔻

甘草 木香 乾姜 各二分 加姜水煎服之

河 ○六合散 治一切燥熱鬱結汗後餘熱宣轉不

通併治小腸氣結心腹滿悶中痞結走注疼痛

大黃 并蒸白丑 黑丑 各二分

枳榔 輕粉 各一分

右為細末每服一匙蜜水調下量虛實加減服

可 ○沒藥散 治一切心腹疼痛不可忍

沒藥 另研 乳香 另研 各山甲 五斤 碎木鱉子 四斤

物湯加焦炒乾姜必倍加芍藥虛損門虛冷脹痛者厚朴溫中湯或厚朴煎湯並見下

實痛

凡腹痛脹滿手不可按大實也大承氣湯傷寒門初得腹痛元氣未虛宜推瀉之此通因通用痛隨利減也桂枝加大黃湯傷寒門飲食停滯腹痛脹滿厚朴香枳實

血痛

因跌撲瘀滯腹痛脉乾桃仁承氣湯加蘇木紅花傷寒門女人經閉血積滯腹中痛玉燭散或笑散並補遺或通經散附餘補遺玉燭散大承氣湯對四物湯是也小煎服補遺笑散治產後心腹絞痛欲死

右細末每服半匙或一匙酒大半盞煎五分沸服

阿○木香換柳丸 治食鬱氣滯作痛

木香 三匙 換柳 三匙 青皮 陳皮 各五匙

麥蘖麩七 枳實六匙 炒 黃色 白木五 厚朴六匙 姜制

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九

溫水下食遠

疎○枳木導滯丸 治食傷濕熱之物不得施化腹痛滿

悶不安以利為度方見內傷門

○瓜蒂散 治食傷太陰填塞悶亂不快甚則心胃大痛

兀兀欲吐着方見中風門

東○霹靂散 治腹痛脉微欲絕

附子 一枚炮 取出以冷 灰焙之去皮臍

右以一味取五匙重入直熨茶一匙同研細末分作

一服每服用水一匙煎七分去粗入蜜一匙利冷服

東○酒煮當歸丸 治小腹寒痛及婦人白帶赤癩大寒

等證

茴香 五匙 黑附子炮 良姜 各七 當歸 一

右四味細切以上好無灰酒一升半煮至酒乾盡焙

乾入後藥

炙甘草 苦練生用 丁香 各五 木香

柴胡 二匙 炒黃蘗 全蝎 各三 玄胡索 四匙

右與前四味同研為細末酒煮麥麩糊為丸如梧桐

子大每服五七十九空心淡醋湯下忌油膩冷物及

酒溫煖

阿○黃連湯 治胸中有熱胃中有邪氣腹內痛甚時欲

嘔吐此藥升降陰陽

及兒枕冷痛
蒲黃炒 五靈脂
等分末之醋調二
手熬成膏湯化下

腸癰痛

腸癰者腹大痛身甲
錯小便如淋腹皮急
按之濡如腫狀脉托
數也或搭膈有疔積
冷炒附子温之積熱
地黃下之膿大出參
芪補之

積聚痛

即長常積面痛二至
音積聚用或下未脾
積充補遺或木香枳
枳丸見下食積痞塊
作痛阿魏丸積聚門
或保和丸內傷門
補遺丁香脾積丸
治諸般食積氣滯
胸膈脹滿心膈刺
痛
丁香 木香
巴豆去心膜
良姜醋煎各兩半
莪朮三又二移及

黃連 甘草炙 乾姜 桂枝各五升
人參二升 半夏半合湯炮七 去皮脩

右細切入大棗二枚量水煎服
問○芍藥甘草湯 治四時腹痛

白芍藥 甘草炙

各等分每服五升細切入生姜三片水一盞半煎至
一盞温服○醫壘元戎云腹痛脉弦傷氣用本藥○
脉洪傷金加黃芩○脉緩傷水加桂枝○脉瀦傷血
加當歸脉遲傷寒加乾姜

問○加减小柴胡湯 治寒熱脉弦腹痛本方去黃芩加

白芍藥

○四物苦練湯 治痞下虛冷腹痛

四物湯各五 加玄胡索 苦練各一

右細切水二盞煎至一盞温服

問○增損當歸丸 治三陰受邪心腹疼痛

四物湯各五 防風 獨活 全蝎絡五

續斷 茴香各一 苦練 玄胡索

木香 丁香絡二

右為細末酒糊為丸如梧桐子每服五十九白湯下

問○苦練丸 治奔膠小腹作痛方見疝氣門

玄胡索 川練子 全蝎去毒 茴香

各等分為細末每服二錢七熱酒調下神驗

○通經散

當歸尾五 川芎一 桃仁去皮尖 紅花酒洗

陳皮一 其逐包不要透 水浸 乾一 日

○通經散

皂角 二十八

青皮 一及

右入百草霜三匙

同研末糊和麻子

大白湯 十九

陰毒

四肢逆痛甚喉不利

或心下脹神昏

汗狂言面色俱青

積於下陽消於上腸

痛絕脈沉爪青

陰毒也回陽丹補

或真武湯加吳門

補遺回陽丹 治陰

毒厥冷腹痛

不灰木燒牡蠣燒

高良姜炒川烏

白芍藥各一水

射香 少許

末之每用一及男

用女津調麝腎

女用男津 兩

砂症

忽然腹中大痛嘔吐

脈沉砂症也正氣散

每服七錢水二鍾入好酒煎服

○小建中湯

芍藥 三及

桂枝 一及

右剉每服五錢水盞半姜三片大棗一箇煎八分去

滓下飴膠兩匙許再煎化溫服

○丹溪活套云凡腹痛多是血脈凝滯不行必用酒炒白

芍藥惡寒而痛加桂惡熱而痛加黃柏○如腹痛欲

以物控按者屬虛用人參白朮乾姜官桂之類○如

腹痛于不可按者屬實宜用建中湯加大黃或調胃

承氣湯加桂枝類下之而愈○如因飲食過傷而作

痛者必問因傷何物如傷生冷硬物而作痛者東垣

木香見兜丸三棱消積丸之類如傷熱物而作痛者

枳實導滯丸三黃枳朮丸之類看強弱緩急用而下

之○如氣虛之人因飲食過傷而腹痛者宜補瀉兼

施用二陳湯加川芎白朮神麩麥芽人參蒼朮之類

或送下前推積疴九子以下之○如腹中常覺有熱

而暴痛暴止者此謂積熱宜調胃承氣湯之類下之○

如因跌撲損傷而作痛者此瘀血證宜桃仁承氣湯

抵當湯之類逐去其血即愈○如因事損傷或酒后

涉水血凝腹痛者承氣湯加桂

○一黃氏婦年五十餘小腹有塊作痛二月餘一醫作死

血治與四物加桃仁等藥不效又以五靈脂玄胡索

乳香沒藥三稜義木等作丸服又不效召予治診其

六脈皆沉伏兩尺絕無予曰乃結糞在下焦作痛耳

非死血也用金城稻葉燒灰淋濃汁一盞服之過一

日復痛用之

加香砂 見前 手足冷
 特筋理中湯 傷寒門
 小腹引等丸 痛如氣
 入腹中痛 沉弦補
 腎湯補遺
 補遺補腎丸 治寒
 疝入腹疼痛作瀉
 人參 茯苓
 黃芪 附子炮
 白木 各一兩
 木瓜 一及半
 沉香 四錢 羌活 五
 蘇麻 二錢 甘草 炙
 川芎 各二錢
 薑棗煎服

腰痛指南

腎虛腰痛

腰痛悠悠不已 脈息
 沉弦而大者 此屬腎
 虛宜補腎而痛自安
 青娥丸或補骨脂丸
 或摩腰膏或独活寄
 生湯 並見下 丹溪補
 腎丸補陰丸 並虛損
 門或煨腎丸或立安
 丸或三因安腎丸 並
 見下 或溫腎散或無
 敵丸 並附餘 或補髓

腰痛門

論

內經曰是太陽脉令人腰痛引項脊尻背如腫狀少陽
 腰痛就如以針刺其皮中循循然不可以俯仰不可以
 顧陽明腰痛不可以顧顧如有見者善悲足少陰腰痛
 痛引足內臑厥陰腰痛腰中如張弓弩弦太陰腰痛下
 如有橫木居其中繼則遺洩又曰太陽所致為腰痛巨
 陽虛則腰背頸項痛是重則病項如拔俠脊痛腰似折
 解不可以曲又曰腰者腎之府轉搖不能腎將僞矣脉
 經曰凡有所用力卒重若入房過度汗出如浴水則傷
 腎腎脹者腹滿引背央央然腰節痛又有腎着之病從
 腰以下冷腰重如帶五千錢若夫腰痛之証雖有六經

時許典枳實導滯丸一百粒催之下黑糞如梅核者
 一碗許痛遂止後與生血潤腸之藥十數貼調理安
 一壯年男子寒月入水網魚飢甚遇涼粥食之腹大痛
 二晝夜不止一醫先與大黃丸不通又與大承氣湯
 下糞水而痛愈甚召予治診其脉皆沉伏而實面青
 黑色予曰此大寒證及下焦有燥尿作痛先與丁附
 治中湯一貼又與炙氣海穴二十一壯痛減半繼以
 江子加沉香作丸如菘豆大生姜汁送下五粒下五
 七次平安

醫源流

腰痛門二卷

十七

冊補遺

補遺補髓丹 升降

水火補益心腎強筋壯骨治腎虛腰痛

沒藥一兩另研

杜仲去皮炒去銀

絲十兩 鹿茸二

兩煉去皮酒炙

補骨脂十兩用芝

麻五兩同炒以芝

麻黑色無聲為度

篩去芝麻不用

右將杜仲補骨脂

鹿茸一處為末入

沈香和勻去月胡

桃肉三干箇湯泡

去皮杵為膏入麩

少許酒煮糊丸如

梧桐子大每服一

百丸溫酒盪湯任

下

腎着腰痛

躄重腰冷如水飲食

如故腰重如帶五千

錢者此腎着也治宜

流濕兼用溫暖之藥

以散之則痛自已腎

着湯見下如痛不已

腰疼

見候之不同對閃腎之或異或瘀血或風寒或溫痰流

注種種不一原其所由未必不因房室過度負重勞傷

之所致也經曰邪之所湊其氣必虛是也治法虛者補

之杜仲黃柏肉桂當歸五味兔絲子天門冬熟地黃之

類風者散之麻黃防風羌活獨活之類寒者溫之肉桂

乾姜附子之類挫閃者行之當歸蘇木乳香沒藥桃仁

紅花之類瘀血者逐之大黃牽牛桃仁水蛭蝮虫之類

溫痰流注者消導之蒼朮蕪荳香附白芷枳實椿紅半

夏茯苓之類宜各類推而治之不可執一論也

脉法

脉經曰尺脉沉腰背痛九腰痛時時失精飲食減少其

脉沉滑而遲此為可治

腰痛之脉皆沉弦沉弦而緊者為寒沉弦而浮者為風

沉弦而濡細者為濕沉弦而實者為挫閃

丹溪曰脉必沉而弦沉為滯弦為虛瀯者是瘀血緩者

是濕滑者伏者是疼大者是腎虛也

丹溪曰有腎虛有瘀血有濕熱有倒閃有疼諸腰痛不

可用補氣藥亦不宜峻用寒涼藥

腎虛腰痛用杜仲黃柏龜板知母枸杞子五味子猪脊

骨髓丸服

瘀血宜行血順氣用補陰丸加桃仁紅花外用三稜針

於委中穴出血以其血滯於下也

濕宜燥濕行氣用黃柏杜仲蒼朮川芎之類

戴氏血疼之不已於腎虛也日輕夜重者

是瘀血也遇天陰及久坐而疼者是濕也

疼宜南星半夏加快氣藥佐之使疼隨氣運

腰疼

服牛膝酒久服最妙

補遺

補遺牛膝酒 治腎

傷風毒攻刺腰痛

川牛膝 去芦酒洗

地骨皮 去骨

五加皮 川芎

薏苡仁 甘草

海桐皮 羌活

生地黃 酒洗淨各

一兩

用絹帛裹入無灰

酒內浸春五夏三

秋七冬十日每服

一盃日三四服長

令酒氣不絕

寒濕腰痛

遇天陰寒冷或久雨

陰濕腰痛晴暖即減

脈息沉弦而緊此寒

濕所致也治宜溫寒

參濕為主五續散加

芍藥黃杜仲或蒼朮

復煎散並見下或麻

黃蒼朮湯附錄或天

麻湯補遺或二陳湯

加麻黃蒼朮川芎白

芷防風羌活獨活桑

飲門

○腰曲不能伸者針人中立愈

○腎着為病真軀重腰冷如冰飲食如故小便自利腰以

下冷痛而重治宜流濕兼用溫藥

○腎着湯 治腎着腰痛

三因方

乾姜 泡

茯苓 各一錢半

甘草 炙半錢

白朮 二錢半

○三因青娥丸 治腎虛腰痛常服壯筋補虛

杜仲 一斤

生薑 十兩

破故紙 一斤

右為細末用胡桃肉一百二十箇湯浸去皮膜研為膏煉蜜些少丸如梧桐子大每服五十九丸鹽湯姜湯任下

任下

○三因立安丸 治五種腰痛常服溫補腎元壯健腰脚

破故紙

乾木瓜 各一兩

牛膝 酒洗一兩

萆薢 二兩

杜仲 姜汁炒續斷各一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九丸溫酒下

○補骨脂丸 治腎虛及寒濕一切腰痛

杜仲 四兩炒

補骨脂 三兩炒香

胡桃肉 八兩浸去油

萆薢 四兩用鹽湯浸一兩用酒浸各一兩

右以前三味細研為末不犯鐵器入胡桃仁用水拌搗千餘下以糯米糊為丸秋冬以陳蜜為丸如梧桐子大每服五十九丸空心溫酒下乾物壓之

○獨活湯 治勞後腰痛如折

羌活

防風

獨活

澤瀉

肉桂 各三錢

大黃 酒浸

甘草 各二錢

川歸 五錢

連翹 五錢

防己 酒炒

黃柏 酒炒各二錢

桃仁 二十個

每服一兩酒水煎服

○摩腰丹 治寒熱腰痛

治寒熱腰痛

補遺天麻湯 治腰

背或遇勞心力天

陰下雨之時則作

痛尤甚

明天麻 羌活

川草解 蒼朮

川牛膝 人參

黃芪各一各半

川續斷 茯苓

巴戟 去心各一各

炙甘草 升麻各

五分 桂心二

石生薑三片水二

鍾前至一鍾空腹

温服

濕熱腰痛

腰痛不能俯仰小便

赤大便泄或走注痛

脉沉弦而濡細者此

濕熱所致也治宜燥

濕清熱二妙散補遺

或健步丸見附錄或

粘痛湯或蒼朮湯並

見下或濕痰流注作

痛者脉必伏宜導之

二陳湯加南星蒼朮

折芍白芷枳實痰飲

附子尖 烏頭尖 南星各二各半 硃砂 乾姜各一

樟腦 雄黃 丁香各半 射香 當附子五粒

右為末蜜丸如龍眼大每用丸生薑汁化開如厚粥

樣烘熱置掌中摩腰上冷盡粘着肉烘綿衣縛定腰

熱如火間三日用一丸妙或加吳茱萸桂皮

局 ○煨腎丸 治腎虛腰痛

杜仲 炒絲斷

右為細末以猪腰子一隻薄批作五七塊以椒鹽淹

去腥水搽藥末在內以荷葉包裹更加濕紙二三重

外包微火煨熟食之無灰酒送下

○蒼朮湯 治濕熱腰痛腿疼痛

防風 黃柏各一 柴胡 二各 蒼朮 三各

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗温服

東 ○川芎肉桂湯 治瘀血在足太陽足少陰足少陽三

經腰痛

酒防已 防風 三分 炒神麴 獨活 各五分

川芎 柴胡 肉桂 當歸 各

炙甘草 蒼朮 各一 羌活 桃仁 五个 去

右細切作一服好酒二盞煎至一盞稍熱服食遠

東 ○地龍散 治腰脊痛或打損傷或從高墜下惡血在

太陽經令人腰脊痛或脾股脛膈中痛不可忍

當歸 稍分 中桂 地龍 各四分 麻黃 分

蘇木 分 獨活 黃柏 炒 甘草 各八

羌活 二分 桃仁 去皮尖另 研細六箇

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗温服

東 ○粘痛湯 治濕熱為病肩背沉重肢節腰脇疼痛胸

痛者脉必伏宜導之

門

補遺二妙散 治一切濕熱痛痺除濕

熱之聖藥

川黃連酒炒

蒼朮 米泔浸炒

等分末之酒調或

溫水調下作丸名

一妙丸

風執腰痛

腰痛如掣脈息沉弦而浮者此因風執所傳也小續命湯傷寒明或張子壽生湯見

風濕腰痛牛膝酒

見前蓄熱者三因熟

大黃湯補遺

補遺三因熟大黃湯

治風濕腰痛蕪墜

墮挫閃腰疼不能

屈伸

大黃酒浸煨

生黃各半兩

水浸一宿五更去

粗頭服之

閃挫腰痛

板疼挽仰艱難脈息沉弦而安者此閃挫

膈不利

白朮四分

人參去芦

升麻

苦參酒炒

葛根

蒼朮各五分

防風去芦

知母酒浸

澤瀉

黃芩

猪苓去毛

當歸各六分

炙甘草

生黃芩酒

茵陳酒

羌活各八分

右細切作一服水二盞前至一盞去粗溫服

○蒼朮復前散 治寒濕相合腦後痛患寒項筋脊骨

強肩背燃眼痛腰痛膝痛無力行步沉重

紅花一分

黃柏三分

柴胡法

槲木

澤瀉

白朮

升麻各五分

羌活一分

蒼朮四兩

右細切先以蒼朮一味用水二大盞前至一盞去粗入前藥後煎至一盞去粗空心稍執服取微汗為效忌酒及葱

一粒金丹

治腰膝走注疼痛如帶咬之狀不可忍

草烏頭

五靈脂各兩

木鱉子一分

白膠香兩地龍去泥土

京墨三分

乳香二分

當歸五分

沒藥五分射香二分

右為細末再研千餘下糯米糊為丸如梧桐子大每服一九或二九多至三九溫酒下服藥後微汗神驗

○元戎加味四物湯 治瘀血腰痛

本方加桃仁泥酒紅花二味煎服

○三因安腎丸 治腎虛腰痛

本方加桃仁酒紅花二味煎服

○三因安腎丸 治腎虛腰痛

破故紙炒 胡芩色炒 茴香炒

桃仁炒

杏仁炒

山藥

茯苓各二兩

川苦練炒 續斷炒各

右為細末煉蜜為丸梧桐子大每服五十九塩湯下

腰痛也調榮活絡丹
補遺或菴蘭丸附餘
或復元通氣散諸氣
門或五積散加牽牛
頭末桃仁或如神湯
並見下

川歸 肉桂 玄胡索 各一分

右為細末每服二錢七熱酒調下細切酒煎亦可

獨活寄生湯 治因腎虛坐卧冷濕當風所得

獨活 一糸 桑寄生 杜仲 炒 細辛

牛膝 秦光 茯苓 白芍藥

桂心 川芎 防風 炙甘草

人參 熟地黄 當歸 各五分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

五積散 治寒濕及清痰流注經絡腰膝背脇疼痛

白芷 川芎 桔梗 芍藥

陳皮 厚朴 茯苓 甘草

麻黃 乾姜 官桂 川歸

懷生地黃酒洗各

一分 川芎 一

分半 桂枝 三

右水一鍾半煎至

八分食前溫服

勞役腰痛

腰痛因勞役而得者

獨活湯見下 挾風者

獨活寄生湯見下 或

打損傷或從高墜下

脉滿此瘀血積注而

腰痛也四物湯加桃

仁紅花蘇木虛損門

半夏 蒼朮

右細切作一服加生薑二片水二盞煎至一盞溫服

無敵丸 治腰疼腎虛

虎骨 續斷 酒浸 川華 各一兩 川山甲 各半兩

乳香 沒藥 半糸 茴香 狗脊

當歸 砂仁 炒 鹿茸 各一兩 杜仲 各三兩 炒

地龍 去土七 青鹽 去土七 兔絲子 各四兩 酒浸

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十九丸空心鹽酒

附○麻黃蒼朮湯 治寒濕所客身體沉重腰痛面黃

麻黃 澤瀉 白茯苓 炒神麩 陳皮 各一

蒼朮 二糸 杏仁 針 桂枝 草豆蔻 半夏 炮七

猪苓 各五 黃芪 三分 甘草 炙

水煎食前服

或川芎肉桂湯或地龍散並見下

氣滯腰痛

氣滯不行流注而腰作痛者治宜順氣其痛自除木香調氣散壹隔門或小七香丸補遺因鬱怒憂思氣不舒暢而腰痛者宜開鬱以寬氣枳殼湯補遺

補遺小七香丸 治

煩悶憂思或閃挫類藥一切氣滯腰痛

痛

丁香 香附

甘草各一兩二錢

甘松八錢蓬木

砂仁各二錢

益智仁六錢

末之蒸餅糊丸棗

萱大每服二三十

丸米飲下

補遺枳殼湯 治腰

背氣動發痛服此

藥後臥少時

枳殼五兩 甘草兩

末之葱白湯調下

○溫腎散 治腎經虛寒腰脊重痛四肢乏力面少顏色並皆治之

熟地黃洗斤牛膝

杜仲三兩 甘草炙

乾姜各五 麥門冬八兩

右為細末每服二錢空心溫酒調下

○健步丸 治下虛濕熱腰腿痛沉重行步艱難

菴活

瓜蒌根酒洗 防風

酒防已一兩 肉桂五分

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十丸煎愈風藥

○菴間丸 治墜墮閃的氣血凝滯腰痛

菴間子半 沒藥半

乳香半 補骨脂半

威靈草洗去 杜仲絲 官桂不見火 川當歸酒浸

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十丸鹽酒湯下

○丹溪活套云凡因房室辛苦而腹痛者四物湯加知母

黃柏五味子杜仲之類吞補腎丸或大補陰丸○因

風寒濕流注經絡而作痛者二陳湯加麻黃蒼朮川

芎白芷防風羌活獨活之類○因對閃跌撲致死血流

于本經而作痛者四物湯加桃仁紅花蘇木之類脉

實人壯盛者大承氣湯加桂下之安○又因醉飽入

房大甚而酒食之積 虛流入於本經致腰痛難以

俛仰四物湯合二陳湯加麥芽神麩杜仲黃柏官桂

砂仁葛花枳梗之類

砂仁葛花枳梗之類

脇痛指南

肝火

脇痛甚者肝火其也
脉沉弦有力便尖者
當歸龍骨是 見下輕
者小柴胡湯加黃連
醋炒青皮龍胆白芍
傷寒門左脇痛者乃
怒氣傷肝疎肝飲補
遺或枳芍散見下右
脇痛者乃肝木凌脾
稼穡湯補遺火盛者
宜伐火左金丸見下

脇痛門

論

內經曰肝病者兩脇下痛引小腹令人喜怒虛則目眩
暈無所見耳無所聞善恐如人將捕之又曰怒則氣逆
虛則嘔血及殮泄故氣上矣蓋心出血肝納血因大怒
而血不歸經或隨氣而上出於口鼻或留於本經而為
脇痛又或歲木太過而本氣自甚或歲金有餘而木氣
被鬱皆能令人脇痛經曰病脇不滿氣逆二三歲不已
病名曰息積是亦肝木有餘之証也外有傷寒發寒熱
而脇痛者足少陽膽足厥陰肝二經病也治以小柴胡
湯無有不効者或有清痰食積流注脇下而為痛者或
有登高墜仆死血阻帶而為痛者又有飲食失節勞役

補遺疎肝散 治怒

氣傷肝左脇痛

黃連 吳茱萸湯并

炒二子 當歸

柴胡各一子半

桃仁 研如泥

青皮 醋炒各一子

白芍 藥生用

川芎 各七分

紅花 五分

水煎食遠溫服

補遺稼穡湯 治肝

木凌脾右脇痛

山梔仁 炒一子半

殼芽 枳 蒼朮

脉法

過度以致脾土虛乏肝木得以乘其土位而為胃脘
當心而痛上肢兩脇痛膈噎不通飲食不下之証醫
者直於各類推而治之毋認假以為真也

脉經曰肝脉搏堅而長色不清當病墜墮者搏因血在
脇下令人喘逆若輒而散 輒輻蠕軟古通用其色澤
者當病益飲益飲者暴渴多飲而溢入於肌膚腸外
肝脉沉之而急浮之亦然若脇下痛有氣支滿引小腹
而痛時小便難苦目弦頭痛腰痛是為逆寒時癢
婦人月水不來時無時有得之少時有所墜墮
脉雙弦者肝氣有餘兩脇作痛

方法

丹溪曰屬肝木氣實 因怒氣大逆 肝氣鬱甚 謀慮不決 風中
入肝皆使木氣大實故火盛肝氣怒

甜葶藶子炒研

陳皮各一升

白豆蔻仁研

蘇梗

人參各七分

甘草各三分

右姜三片棗一枚

水煎食遠溫服

木氣實

脇痛脉弦數木氣實

也蒼木川芎醋炒青

皮當歸芍藥柴胡稍

或小柴胡湯加醋炒

青皮山芎草龍貼傷

或柳青丸火熱

因如大便數日不通

因而脇痛甚手不可

近大柴胡湯傷寒門

死血痛

脇痛目輕夜重或午

後熱脉溢瘀血也四

物湯加青皮柴胡桃

仁紅花虛損門或控

涎丹痰飲門死血行

氣藥中加桃仁紅花

香附或打傷跌撲惡

血留於脇下痛不可

忍若復元活血湯補

丹

有死血因惡血停留於肝若於三下而痛病則自肝一甚按之益甚也

痰流注因痰下流注於厥明之至亦能使助下痛病則咳嗽氣急引血痛

簡○當歸龍會丸瀉肝火大盛之要藥因內有濕熱兩脇

痛甚伐肝木之氣肝實宜之

當歸 龍胆 梔子仁 黃連 蘆薈

大黃酒浸青代各伍木香半二射香五分另

右為細末神麩糊丸如梧桐子大每服二十九姜湯

○一方加柴胡伍錢青皮一兩熟甚者烘熱服

○一方木氣實者用川芎蒼朮青皮芍藥柴胡甘草龍

胆草各等分水煎服

○左金丸瀉肝火行濕為熱甚之反佐

黃連 六分 吳茱萸 一分

右為細末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服三五

淡姜湯下

○一方破血行氣 治死血作痛之証

桃仁去皮另研 紅花酒拌焙乾 川芎 香附童便 青皮各等

右細切水煎服之

○加味二陳湯 治濕痰流注脇內作痛

本方加南星蒼朮川芎姜朮煎服

○肝苦急急食辛以散之用無等蒼朮或用小柴胡湯

蓋本方為脇痛發寒熱者必用之要藥也

○左脇痛以柴胡為君加佐使藥川芎青皮草龍胆類

○兩脇走痛或用控涎丹因清痰流注作痛者可用蓋痰在脇下非白芥子不能去方見痰門

○治咳嗽脇痛者二陳湯加南星青皮香附青代姜汁

一云四物湯加青皮等藥以疎肝氣

○氣弱之人脇下痛脉細緊或弦多從勞役怒氣得之

丹

丹

丹

丹

丹

丹

丹

丹

遺

補遺復元活血湯

治從高墜下惡血

留於脇下痛不可

忍

柴胡 五子當歸

天花粉各三升

大黃酒浸二兩

川山甲三升土炒

桃仁五十箇酒浸

研如泥 紅花

甘草各一升

每服一兩水一盞

酒半盞加桃仁泥

煎至八分服以利

人物湯加木香青皮或加桂心水煎服之

○去滯氣用青皮蓋青皮乃肝胆二經藥人多怒脇下有

爵責固宜以解二經之實者若二經氣血不足先當

補氣血少加青皮可也 此承上條意思言也

○肥白人氣虛發氣熱而脇下痛用參芪補氣柴胡黃

芩退熱木香青皮調

○瘦弱人寒熱脇痛多怒傷必有瘀血宜桃仁紅花柴

胡青皮大黃之類行之

○發寒熱脇痛似有積塊必是飲食大飽勞力所致

必用龍會丸治之

○鮮痛治標藥外用琥珀膏貼之○又方用芥菜子水

研付○又方以吳茱萸研水調付○又方以韭菜

搗細炒熱貼而以熨斗盛火熨之

為度

食積痛

脇下一條打起作痛

者此食積也保和丸

內傷門或吳茱萸炒

黃連神麩麥芽山查

逐水青皮寒熱脇

痛似有積塊當痛

龍會丸見下

濕熱痛

濕熱甚而兩脇痛者

先以琥珀膏貼痛處

補遺後以淡姜湯吞

○推氣散 治石脇痛甚脹滿不食

片姜

右為細末每服二錢姜湯調下水煎亦可

枳實炒麩 治左脇疼痛不可忍

枳實炒麩

右為細末每服二錢姜末湯或酒調下

異香散

治腹脇膨脹痞悶噎塞腹脇疼痛

蓬莪木

右細切作一服加生姜三片大棗一枚白鹽少許水

一盞半煎至一盞去粗溫服

○分氣紫蘇飲 治腹脇疼痛氣促喘急

五味子

桔梗 紫蘇葉 桑白皮 草菓仁

枳殼炒 桂心各伍分 甘草炙三升

川芎各五升 甘草炙三升

陳皮各五分 石蓮肉 厚朴姜制

蓬莪木 荆三稜各一

當歸龍會丸或小柴胡湯加蒼木青皮黃連傷寒四

補遺琥珀膏

大黃 朴硝

各一兩末之用大蒜搗膏和貼

痰積痛

痰積脇下作痛者控涎丹或十棗湯或二陳湯加南星蒼木川芎柴胡白芥子炒山

陳皮 大腹皮 瀉茯苓

右細切作一服加生姜三片白塩少許水一大盞煎

七分去粗空心温服

問河 ○芎藭湯 治脇下痰痛不可忍者

桂枝 川芎 細辛 乾葛

防風 芍藥 枳殼 麻黃

人參 甘草 各四分

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞去

滓温服

附 ○沉香升氣丸 治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈痞

塞

沉香 檳榔 各二分 人參 訶子 煨去核

大腹皮 炒略白朮 紫蘇葉 香附子 炒

氣滯痛

氣滯痛者推氣散或異香散或分氣紫蘇飲並見下或沉香升氣丸附餘或復元通氣散 諸氣門或木香調氣散 噎膈門或控涎丹治一身氣痛

虛痛

肝血不足悠悠痛不止者四物加柴胡稍或柴胡四物湯有因

神麴 炒

甘草 炒

益智 炒去殼 厚朴 去皮姜製 各二兩

右細對每服三錢水一盞煎七分不拘時温服

○丹溪活套云凡脇痛者多是肝木自餘也宜用小柴胡

加青皮川芎芍藥草龍胆甚者煎成正藥入青代射

香 ○痰流注者本方倍半夏加橘紅南星蒼木茯苓

苓川芎之類 ○瘀血作痛者小柴胡合四物湯加桃

仁紅花或乳香沒藥煎服痛甚而元氣壯盛者桃仁

承氣湯下之而愈 ○性急多怒之人時常腹脇作痛

者小柴胡加川芎芍藥青皮之類煎服甚者以前藥

送下當歸龍會丸其効甚速

○金氏子年四十餘因騎馬跌撲次年左脇脹痛醫與小

酒色勞損太過脇下
一點痛不止名乾脇
痛甚危當大補血氣
尚難為也肥白人氣
虛發熱脇疼四君子
湯加胡黃芪木香

柴胡湯加草龍胆青皮等藥不効來求治診其脈左
尺寸尺皆弦數而滿關脈亢而急數右三惟數而虛
予曰明是瘀血証用抵當丸一劑下黑血二升許後
以四物湯加減調理而安
大醫院補遺直傳醫學源流肯脊大成七卷終

甘草
姜黃各四兩 京三麥
麥冬
烏藥各一兩 刺楸
大醫院補遺直傳醫學源流肯脊大成七卷終

諸氣指南

氣虛

勞後傷氣中氣不足
補中益氣湯或補氣
湯或四君子湯見虛
損門氣虛脈沉神
衰短氣不足息人參
養胃湯傷寒門或生
脈散中暑門氣血兩
虛自汗實急脈細十
全大補湯虛損門

氣實

大醫院補遺直傳醫學源流肯脊大成卷之八

諸氣門

論

內經曰百病皆生於氣也故怒則氣上喜則氣緩悲則
氣消恐則氣下寒則氣收溫則氣泄驚則氣亂憂則氣
沉一曰勞思則氣結夫人身之正氣為血為配血行脈
中氣行脈外一呼脈行三寸一吸脈行三寸氣血並行
周流乎一身之中灌漑乎百骸之內循環無端運氣不
悖而為生生不息之妙用也經曰一息不運則機絀窮
一毫不續則窮壞判若內無七情之所傷外無六淫之
所感何氣病之有哉其不善攝生者五志之火無時不
起五味之偏無日而不傷是以醜成膠痰罔積留滯於

氣實者邪氣實當從
火治氣有餘便是火
氣實痞悶四青飲補
遺氣實脹滿二陳湯
加枳桔香附痰飲門
或四七湯噎膈門或
蘇子降氣湯或沉香
降氣湯並見下挾火
者四七湯加芩連山
扼挾痰者加瓜蒌貝
母杏附海石氣實龍
會丸腸痛門痞塞不
通胸膈膨脹大小便
不利是引推氣丸或
思沉通氣湯並補遺

或木香湯氣飲或水
香枳榔丸並見下
補遺四青飲
青皮 枳實炒
枳殼炒 陳皮
等分水煎服
補遺是齋推氣丸
治三焦痞塞氣不
升降胸膈脹滿大
便秘泄小便赤少
大黃 陳皮
枳榔 枳實
牽牛等分
末之煉蜜丸如梧
子大每服五十九

六府壽火邪氣克塞乎三焦使氣血失其常候府藏不
能傳導是故外邪得以乘虛而姿襲矣以致清陽不升
濁陰不降而諸般氣痛朝輟暮作而為膠固之疾非良
工妙手莫易治焉若夫為脇痛為心腰痛為周身刺痛
甚則為反胃為膈噎等証即此之由也大抵男子屬陽
得氣易散女子屬陰遇氣多鬱是以男子之氣病者常
少女子之氣病者常多故治法曰婦人宜調其血以耗
其氣男子宜調其氣以養其血此之謂也學者宜致思
脉法

脉經曰脉滑者多血少氣滿者少血多氣大者血氣俱
多脉來大而堅者氣血俱實小者血氣俱少
脉來細而緩者血氣俱虛 代者氣衰 細者氣少
浮而絕者氣散絕 辟大而滑中有短氣

尺脉滿而堅為血實氣虛尺脉細而微血氣俱不足也
劉立之曰下手脉沉便知是氣 沉極則伏 潘弱難
愈其或沉滑氣兼痰飲病也

方法

丹溪曰周流乎一身以為生者氣也苟內無所傷外無
所感何氣病之有今冷氣滯氣逆氣上氣皆是肺受
火邪氣得炎上之化有升無降薰蒸清道甚而轉成
劇病局方列用辛香燥熱之劑以火制火外將誰執
又曰氣無補法世俗之論也以其為病痞滿壅塞似
難於補不思正氣虛者不能運行邪滯着而不出所
以為病經曰壯者氣得則愈怯者着而為病苟或氣
怯不用補法氣何由行又曰冷生氣者出於高陽生
之謬言也病人自覺冷氣從下而上者非其冷也蓋

滾水下量人加減
補遺紫沉通氣湯

治三焦氣滯不能
宣通腹脇脹大便
秘

紫蘇葉 甘草炙

枳殼麩炒 檳榔

赤茯苓 去皮

陳皮 去白各一兩

沉香 木香

五味子 黃芪

荆芥穗 枳實

薄荷葉 乾生薑

麥門冬 去心

桑白皮 各五錢

每服半兩水煎空
心溫服

氣滯

氣滯者鬱而不伸也
破滯氣在上桔梗枳

殼香附砂仁在中厚

朴枳實三稜蓬朮在

下青皮木香檳榔在

內相火上冲如氣滯

者知母黃柏麥連赤

附濕熱氣滯清膈化

見下陰虛氣滯四物

湯加知母黃柏虛損

門因怒氣滯不行二

上升之氣自肝而出中挾相火自下而上其熱為甚
火極似水陽亢陰微又曰九氣有餘便是火是皆為
治之正論也可不究與

○調氣用木香然木香味辛氣能上升如氣鬱而不達固
宜用之若陰火衝上而用之則反助火邪而病甚矣
故常用黃柏知母而少用木香佐之

○稟受素壯而氣刺痛常用枳殼烏藥若因氣不舒而刺
痛常用木香調達之

○若肥白人氣刺痛者宜與人參白朮加枳殼木香
○一方解五藏諸氣益少陰經血用梔子炒令將黑為末
以生薑汁入湯同煎飲之其效甚捷

○清膈丸 治因濕熱氣滯
黃芩 黃連 各五錢 香附 一兩 蒼朮 二兩
右為細末新取紅熟瓜萎去皮搗爛和丸如菜豆大
每服三五丸白湯下

○正氣天香湯 治婦人一切諸氣作痛或上湊心胸
或攻築脇肋腹中結塊發渴刺痛月水因之而不調
或眩暈嘔吐往來寒熱無問胎前產後一切氣候並
皆治之

烏藥 一錢 香附 六錢 陳皮 六分 紫蘇 六分 乾姜 六分
右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗稍熱服

○子和木香檳榔丸此藥流濕潤燥推陳致新滋陰抑陽
散鬱破結活血通經治男子婦人嘔吐酸水痰涎不
利頭目昏眩併一切酒毒食積及米穀不化或下痢

膿血大便秘塞風壅積熱口苦煩渴涕唾稠粘膨脹
氣滿等証

陳湯加山梔香附痰
飲門氣滯作痛再加
木香烏藥或木香破
氣散補遺氣滯不行
腸中水声嘔吐痰逆
不思飲食木香順氣
九附餘或分心氣飲
補遺氣滯喘急面目
虛浮手足微腫大小
便不利紫蘇子湯或
流氣飲子並補遺或
傷損或挫閃氣滯於
血分周身走痛復元
通氣散見下

名不老湯
南不香 不升火
甘草各半兩
香附子四兩
天台烏藥去木
片姜黃各二兩
右為末每服二錢
鹽湯空心調下
補遺分心氣飲 治
四氣七情氣滯不
散胸膈膨脹噯氣
吞酸嘔吐心痛甚
者加良姜草果石
菖蒲
分心氣飲木通青

諸藥門心

木香 換榔 青皮 去穢 陳皮 去白
黃栢 義木 枳殼 黃連
大黃 黑丑 香附 各一兩 當歸 半兩
右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五七十九早
水以利為度
局 ○蘇合香丸大能順氣化痰併治傳屍骨蒸勞瘵卒吳
心痛小兒驚搐大人中風卒屍等証
沉香 另研 射香 另研 柯子 去核 丁香
葶揆 白木 白檀香 各一 薰陸香 另研
蘇合油 和入安龍腦 另研 各珠砂 另研
木香 一兩 安息香 另研 為末用無天
右為細末研極勻入安息膏及煉蜜和勻丸如梧桐
子大空心溫酒化下四九白湯亦可

局 ○蘇子降氣湯 治氣不升降痰涎壅塞氣滿氣痛等証
川歸 去頭 苴草 炙 前胡 去芦 厚朴 姜制 各
肉桂 去些皮 陳皮 去白 各半 半夏 一錢 紫蘇子 另研
右為細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞半
煎至一盞去粗不拘時候服
局 ○異香散 治胃氣不和飲食不化腹脇膨脹一切冷
氣結聚等証 方見胸膈門
局 ○沉香降氣湯 治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞悶噯
醋 蒜 酸
沉香 四錢 砂仁 五錢 甘草 炙 一兩 香附 童便 浸
右為細末每服二錢入塩少許白湯調下
局 ○復元通氣散 治跌撲損傷或負重坐閃致氣滯於
血分作痛併一切氣不宣通瘀血凝滯周身走痛等証

桑夏耳陳桂赤苓
羌段五錢蘇二兩
薑姜灯草共煎成
補遺蘇飲子治

夏思過度和傷脾
肺心腹膨脹喘急
胸滿腸鳴氣走瀉

瀉有聲大小便秘
脉虛寒而滿
紫蘇子二腹皮通

木夏朴呆梗橘紅
一用人參并枳實
五姜二棗水煎攻

補遺沅氣飲子治
氣滯不快腹脇膨

脹喘促而目虛浮
手足微腫或脚腫
或氣攻肩背脇肋

疼痛
流氣三陳二草當
烏芪梗實茯苓防

紫蘇半夏青皮芍
四腹子皮一木香
利氣寬膨消水腫

寬腸下食利膀胱
氣攻肩背皆能療
拔萃方加枳殼柳

氣寒者身受寒氣口

氣寒

白芷 甘草炙 玄胡索
令加乳香 沒藥各少許
右為細末每服二錢熱酒調下不飲酒人白湯下病
在上食後病在下食前服

木香流氣飲 治諸氣痞塞不通胸膈膨脹面目虛浮
四肢腫滿口苦咽渴大小便不利

香附去毛 木香不見火 厚朴姜制 青皮去白
陳皮去白 麥門冬去白 白芷各七 甘草五分

藿香葉一錢 大腹皮酒洗 乾木瓜一人參去芦
蓬莪木煨 丁香皮不見火 半夏泡七各二分 赤茯苓去皮

石菖蒲各三分 草菓仁五分 紫蘇葉 檳榔
白木 肉桂 木通各六分 沉香七分半

右細切作一服每服加生姜三片大棗一枚水一盞
半煎至一盞去粗溫服

木香順氣丸

木香半兩 枳殼炒 陳皮 補骨脂
香附子各一兩 牽牛六兩炒 大腹皮 蘿蔔子各半

右為末水丸如桐子大每服五十九溫水下不拘服
愚按氣病用氣藥而不効者氣之所藏無以收也蓋
肺主氣腎藏氣此方用補骨脂所以使氣升降而歸
於腎臟也

○丹溪活套云蒼天之氣貴乎清淨若浩然克塞乎宇宙
之間以為生生不息之運用者此一元之正氣也彼
為雲為霧為風雹為雷霆鼓舞於天地之間者皆山
澤濕熱鬱蒸之氣也在人者亦由是焉其清純之元

食寒物在表身熱麻
黃桂枝之類寒氣犯
胃作痛草薏蔻九胃
腕門寒在腹作痛作
嘔作瀉厥逆者理中
湯傷寒門寒氣犯腦
作痛活活附子湯頭
痛門寒氣在小腹作
痛脉沉遲厥冷四逆
加吳茱萸或理中加吳
茱並傷寒門或蘇合
香丸見下寒氣及勝
脫氣發攻刺痛並胎
前產後血氣刺痛葱
白散前氣門

痧氣指南

七疝

形症俱詳於下而無
治病之方今開陳數
方以備參用寒疝者
是外受寒邪也而內
實非寒丹溪所謂標
寒本熱明矣寒疝手
足逆冷不仁疝脹痛
及身痛烏頭桂枝湯
補遺或沉香桂附丸
或三因葱白散並見
下寒疝入腹痛小腹

氣與血並行循環無端未嘗有盈虧也彼衝擊橫行
于藏府之間而為痛為痞滿為積聚等証者亦由天
地間雲雷之鼓舞因濕熱鬱蒸而發者也濕熱鬱蒸
之久在天地則為霖雨雹雪等物在人身者為積聚
為痞癥為痰氣痞滿之類治之之法在胸臆之間而
為痞滿刺痛伏梁等証者二陳湯加枳殼黃連桔梗
瓜蒌仁木香之類在下焦而為奔豚疝等証若本
方加桃仁山查梔子枳核茴香川煉荔枝之類在兩
脇攻築作痛者本方加青皮柴胡芍藥草龍胆之類
在中焦而為痞滿脹急者本方加木香厚朴枳榔枳
殼或用平胃散以平其敦阜之氣惟婦人胎前產後
一切氣疾作楚者俱用四物湯為主治加疎利行氣
之藥此治氣之大法也學者宜細詳之

疝氣門

論

內經曰肝脉大急沉皆為疝又曰三陽急為瘕三陰急
為疝難經曰任脉之為病其內苦結男子為七疝夫所
謂七疝者寒水筋血氣狐癩七者是也子和曰寒疝者
囊冷結硬如石陰莖不舉或控辜丸而痛得之於坐卧
濕地或寒月涉水或值雨雪或坐卧磚石或風冷處使
內過房宜以溫劑下之久而無子水疝者其狀腎囊腫
狀如水晶或囊疝而孤出黃水或小腹按之作水聲得
之於飲水醉酒使內也勞汗出而過風寒濕之氣聚於
囊中故冰冷令人為卒疝宜以逐水之劑下之
不筋疝者其狀陰莖腫脹或潰而為膿裏急筋縮或

引翠丸痛泄利胸滿
補腎湯腹痛門或腎
虛寒疝偏大者茱萸
內消丸附餘或烏藥
通氣散補遺或吳茱
萸湯見下水疝加味
五苓散或葵子湯或
茴香練實丸並見下
或煨腎散補遺或金
鈴丸附餘筋疝腎氣
方或葫蘆巴丸並附
餘或猪脬丸補遺或
丁香練實丸或香殼
散並見下血疝治疝
方茱萸內消丸附餘

或治疝方或疾梨湯
或三因効白散並見
下氣疝烏藥散或氣
疝方或不香散並見
下或青木香丸補遺
疝疝一埋金散諸氣
門或川練子散補遺
或蘆巴丸附餘又
不能自強曰癩疝只
在小腹結痛又曰小
腸疝氣癩疝方或加
末也黃丸並補遺或
守效丸附餘或馬蘭
花丸或陰囊腫脹方
並見下

莖中作痛七極則產或挺縱不收或出白物如精隨溲而
下得之於房室勞傷及邪術所使宜以降心火之劑下
之血疝者其狀如黃瓜在小腹兩傍橫骨兩端約絞中
俗名便癰得之於重感春夏大燠勞於使內氣血流溢
滲入脬囊留而不去結成癰腫膿少血多宜以和血之
劑下之氣疝者其狀上連腎脬下及陰囊多得於號哭
忿怒則氣鬱之而脹號哭怒罷即氣散者是也有一治
法以針出氣而愈蓋針有得失宜以散氣之藥下也或
小兒亦有此疾俗名偏墜得之於父已年老或年少多
病陰痿精怯強力入房因而有子稟胎病也此証難治
惟築賓一穴有灸之而愈者穴法宜狐疝者其狀如仰
瓦卧則入小腹行立則出腹入囊中如狐晝出穴而溺
夜入穴而不溺此疝出入往來上下正與狐相類也亦

與氣疝大同小異宜以逐氣流經之劑下之癩疝者其
狀陰囊大如升斗不痒不痛者是也得之於地氣卑濕
故江淮之間多有之宜以去濕之劑下之女子陰戶凸
出雖亦此類乃熱則不禁固也不可便認爲虛寒而溫
之補之本名曰瘕宜以苦藥下之以苦堅之愚按子和
論七疝病源至爲詳悉但其處方一以攻下之法爲主
治不能使人無疑耳既曰多由房勞致虛而作其可一
例施之以攻下之法乎大抵七疝爲病若非房勞所致
即是遠行辛苦涉水履水熱血得寒而凝滯於小腸膀胱
之分或溫熱乘虛而流入於足厥陰之經古方一以
爲寒而純用烏附等熱藥爲治我丹溪先生獨斷爲溫
熱此發古人之所未發者也夫熱鬱于中而寒束于外
宜其有非常之痛故治法宜驅逐本經之溫熱消導下

補遺烏頭桂枝湯

治寒疝腹中痛逆

冷身疼

烏頭五分蜜一斤

煎減半去渣

每用桂枝湯五升

入蜜半兩煎每服

二合得吐為中病

自汗脉沉者止用

烏頭煎

補遺烏冬通氣散

治一切疝疾無問

遠近寒熱風濕氣

滯

烏藥

當歸

白芍藥

香附

山查

陳皮各

一升

白朮

枳殼各七分

玄胡索

澤瀉

赤茯苓各五分

南木香

甘草

猪苓各三分

姜三片水煎溫服

如惡寒脉沉細加

吳茱萸

補遺煨腎散 泔水

疝

公猪腰子一箇去

筋膜 玄胡索

焦之痰血而以寒因熱用之法立方屬治即邪易伏而
病易退也其攻下之法愚故未敢試而行之以俟識者
再論學者宜致思焉

脉法

內經曰肝脉大急沉皆為疝心脉滑搏急為心疝

肺脉沉搏為肺疝○又三陽急為瘕三陰急為疝○

又則病脾風疝陽明脉滑則病心風疝大陽脉浮則

病腎風疝少陽脉浮則病肝風疝

脉經曰寸口

脉弦而緊弦則衛風不行衛風不行則惡

寒緊則不飲食弦緊相搏則為寒疝

厥陽脉浮而遲浮則為風風遲則為寒疝統臍痛若

發則自汗出乎足受寒其脉沉脉者烏頭湯主之

方法

○丹溪曰疝氣者舉丸連小腹急痛也有痛在舉丸者有

痛在五樞穴邊者皆足厥陰之經也或無形或無聲

或有形如瓜或有聲如蛙自素問而下皆以為寒蓋

寒主收引經絡得寒則收而不行所以作痛然亦有

履水涉水終身不病此者無熱故也大抵此証始於

濕熱在經鬱而至久又得寒氣外束不得疎散所以

作痛若只作寒論恐為未備或曰厥陰經鬱積濕熱

何由而致予曰大勞則火起於筋醉飽則火起於胃

房勞則火起於腎大怒則火起於肝積之父母能令

子虛氣氣便盛濁液凝聚併入血緣流于厥陰厥陰

屬木係于肝為將軍之官其性急速火性又暴為寒

所束宜其痛之太暴也有以烏頭梔子作湯服之其

効亦捷後用此方隨形証加減與之無不驗但濕熱

黑牽牛各半兩末

右將腰子切作二

片入藥末在內濕

紙裹煨熟不要焦

空心鹽酒連藥嚼

下必瀉下惡物忌

食生冷

補遺猪肝丸 治疝

氣腫墜疼痛

猪肝一箇去尿以

小箇大箇破故紙

川練子等分填入

半滿入青鹽一塊

縛定好酒煮熟先

食將以酒下之

將內藥曬乾或焙

乾碾為末酒糊為

丸梧子大空心溫

酒下五六十丸或

鹽湯亦可

補遺青木香丸 治

腎冷氣疝脹疼

吳茱萸二兩分作

二分酒醋各浸一

宿香附一兩重澄

加青木香各半兩

為末米糊丸梧子

大空心鹽湯下七

十九丸或乳香葱白

湯亦可

又當分多少而治濕則腫多癩病是也又有挾虛而

發者當以參朮為君疎導藥佐之脉甚沉緊而謔大

無方者是也其痛亦輕但重墜牽引耳專主肝經與

腎絕無相干切不可下劫藥神効蓋濕熱因寒鬱而

作用梔子以降濕熱為頭以破寒鬱况二物皆下焦

之藥而烏頭為梔子之所引其性急速不容胃中停

留也又謂按之不痛者屬虛須加肉桂以姜汁丸服

○一方疝痛用海石香附為末姜汁調下

○又方治諸疝定痛速効用枳核梔子糖棗卸山茱萸各

炒溫盛者加荔枝核炒為末丸服或用長流水調末

子空心服一二錢一本有川練子

○又方 治食積與瘀血成痛者一云少腸痛者有

梔子仁 桃仁 山楂 枳實 茱萸

右為末順流水入姜汁作湯調服

○又方 治陽明經受濕熱傳入大腸惡寒發熱小腹連

毛際結核悶痛不可忍用山梔桃仁枳核並炒 山楂

等分入姜汁煎服

○按之不痛者屬虛必用桂枝山梔子炒 烏頭炮 右伴為

細末姜汁打糊丸如桐子大每服四五十九丸劫痛効

○一方 治癩腰痛一本腸不痛者 蒼朮南星白芷山查

半夏川芎枳實神麩糊丸服

○諸疝發時用海石香附二味為末生姜汁入湯調服亦

治心痛因清痰而作痛者

○又治疝方橘核炒 桃仁 研梔子炒 茱萸炒 川烏炮

水煎食前溫服

○劫疝藥用烏頭梔子炒 搗細順流水入姜汁調服

補遺川練子散 治

狐疝

川練子用巴豆十

粒搗碎同川練炒

黃色去巴豆

小茴香鹽炒黃去

鹽 木香不

見火各一兩

末之空心溫酒調

服二錢食前亦可

補遺癩疔方

天南星 山查

蒼朮各二兩

半夏製 白芷

橘核 神麩各

一兩 海藻

昆布各酒洗半兩

吳茱萸焙炒

玄明粉各二兩

末之酒糊丸空腹

鹽湯下五十九

補遺加味地黃丸

六味地黃丸一料

加人參 其枸杞

巴戟淨肉各三兩

懷生地 六兩用桂

一兩酒二碗煎一

碗拌地黃蒸之

破故紙 二兩用水

三碗大小茴香各

○陰囊腫脹大小便不通

白牽牛兩 桑白皮 白朮 木通法 陳皮各半

右為細末每服二錢姜湯調下空心服

○凡疝氣挾虛者必以參朮為君佐以疎道之藥加川練

子茴香枳實山查梔子之類

○三因葱白散 治一切寒症作痛

川芎 當歸 枳殼炒 厚朴炒

官桂 青皮 乾姜 茴香炒

茯苓 川練 麥蘖炒 神麩炒

三稜泡 義朮 熟地黃 白芍藥

木香 人參各等分

右細切每服五錢加葱白三莖鹽少許水煎空心服

○又方挑仁十四箇枸橛子十四箇瓦上炒山梔子九枚

去吳茱萸七十粒山查子十四箇並炒生薑一指

搗細以順流水一鍾盪起煎數沸連粗服

○又方 治疝不痛丹蒼朮神麩白芷山查川芎梔子

半夏入姜煎服

○凡癩証非痛斷房事與厚味不可用藥

○凡治七疝須先灸大敦穴一名大順在之大拇指離用如

○治疝氣神方其病甚至氣上衝如有物築塞心膈欲死

手足冷者二三服除根

硫黃不拘多少火中焙化 荔枝核為末炒 陳皮

右三味各等分為末飯丸如梧桐子大每服十四五

九酒下其痛立止自己竟疼甚不能支持畧用五六

九再不可多也

○又治疝方

用

○又治疝方

一兩青鹽三升煎
至一碗半同拌巴
戟故紙四味同炒
同用也

右為木酒糊丸空
心益湯下一百丸

木腎

心火下降則腎水不
惠其不溫真陽下行
則腎氣不患其不和
溫而且和安有所謂
木強者其蓋木腎不
可絕用燥藥恐傷行溫
利以逐其和則

蒼木

香附各鹽

黃柏酒炒已青皮去絨

玄胡索

益智

桃仁配土茴香

附子鹽炒

甘草炙已上

右細切每服五錢順流水煎服

外集 ○五葉湯洗疝痛立効

枇杷葉

野蘇葉

椒葉

蒼耳草葉

水晶浦挑葉

右五味不拘多少量水煎湯浴洗

冊 ○一方肥人腫亦作痛發熱惡寒

五苓散加茴香煎服神驗

東 ○吳茱萸湯 治厥疝腹中冷痛積氣上逆致冷寒

吳茱萸半斤

川烏頭泡去皮

細辛各七分

良姜

當歸

乾姜炮

官桂各二分

右細切作一服水一盞煎七分溫服日進三服不痛

東 ○茴香練實丸

治控羣小腸痛結上而不下痛衝臍

茴香炒

練實去核

食茱萸

陳皮略一

馬蘭花醋炒

芫花醋炒

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服十九至二十

丸空心溫酒下

鑿 ○蒺藜湯 治陰疝牽引小腹痛諸厥疝即陰疝也喜

故房勞痛不可忍

蒺藜去刺

附子炮去 梔子

右細切作一服水一盞煎至六分食前溫服一治則

控羣紅

東 ○木香散 治心疝小腹痛悶不已

木香

陳皮略 五良姜

訶子皮 赤芍藥

補遺 枸杞子丸

枸杞子 半夏

遺 丹補遺 陰囊溫瘰是

虛先藥方補遺小兒

外腎偏墜牡丹散補

痛者三陽開泰散或

金鈴子丸並補遺溫

痒抓成瘡癰者奪命

酒糊丸梧子大空心

愈不痛者枸杞子丸

補遺 補遺 補遺 補遺

天南星 山查

黃栢酒炒 白芷

蒼木鹽炒 昆布

吳茱萸 神麩炒

滑石炒等分

末之酒糊九空心

鹽湯下七十

補遺三陽開泰散

小茴香 青皮

荔枝核炮碎等分

炒出火毒

末之空心酒調服

二錢食前亦可

補遺金鈴子九 治

釣氣偏隊痛

川練子五兩對作

五分製 一分用

雜糖一箇去足翅

同炒去班猫 一

分用蓋五分茴香

一錢炒熱去鹽留

茴香入藥 一分

用黑草牛三錢同

炒去牽牛 一分

用破故帛三錢同

炒留故帛為藥

一分用羅蔔子一

錢同炒去羅白子

右將練子去核同

破紙炒香焙乾為

枳實各二分半 草豆蔻

川芎 黑丑各一分

右細切水一盞煎七分去粗溫服

方局 ○香殼散 治小腸氣臍腹疝痛筋急陰股中痛悶暈

不省人事

舶上面香鹽炒 枳殼炒 沒藥兩半

右為細末每服一錢溫酒調下不拘時併進二三服

○室鑑沉香桂附丸 治中氣虛弱甚脾胃虛寒藏府積

冷心脇疼痛手足厥逆冷便利無度七疝引痛喜熱

物礙溫証

沉香 附子炮 川烏炮 乾姜炮

良姜 官桂 吳茱萸湯炮 茴香炒

右為細末醋煮麪糊為丸如桐子大每服五十九至

七十九空心米飲下

○元戎加味五苓散 治疝氣卒痛小便秘澀

本方加川練子一分

右為細末每服二錢空心米飲調下

○茴香練寶丸 治陰疝痛不可忍及小腸氣痛

川練子炒 茴香炒 山茱萸 食茱萸 青皮

吳茱萸 陳皮 羌花醋煮 馬蘭花各等分

較之前方多吳茱萸青皮

右為細末醋糊丸如桐子大每服三十九空心溫酒

○天台烏藥散 治小腸疝氣牽引臍腹疼痛

烏藥 木香 茴香炒 青皮

良姜炒各半兩 檳榔 二錢 川練子 五枚 巴菝 七十枚

右先以巴菝微打破用川練子麩炒黑去麩及巴菝

不用其餘藥同為細末每服一錢溫酒調下甚者姜

末酒糊丸空腹温

酒下三十九

補遺奪命丹 治遠

近疝氣臍下撮痛

偏墜腫硬濕痒抓

成瘡癬

吳茱萸一斤酒浸

四兩醋浸四兩湯

浸四兩童便浸四

兩一宿焙乾

澤瀉去灰上二兩

末之酒煮麩糊為

丸食前温酒鹽湯

任下五十九

洗藥方 治陰

湯調下

○濟生葵子湯 治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾

燥膀胱作痛

赤茯苓

猪苓

冬葵子

枳實

瞿麥

木通

黃芩

車錢子

滑石

各五分

甘草半

右細切作一服加生姜三片水煎空心服

○丁香練實丸

治男子七疝痛不可忍婦人瘦聚帶下

皆任脉所主陰經病也乃腎

受邪故治同法

當歸

附子

各一

右細切用好酒三升同煮酒盡為度焙乾為細末每

末子一兩入

丁香

木香

各五分

玄胡索

各五分

全蝎十三箇

右為末與前藥同拌勻酒糊為丸如梧桐子大每服

囊濕痒是腎虛也

節欲有壽

青木香 二兩

五倍子 五錢

吳茱萸 白礬 各

三錢 黃栢

苦參 荆芥 各

一兩

右用布包裏煮少

頃洗之祖再煎三

次又煮此時常七

洗如法

補遺聖丹散 治小

兒外腎偏墜

牡丹散 治小兒万

三十九丸加至一百丸空心温酒送下

○捏金散丸 治七疝及奔豚氣痛不可忍神効

外集 方見氣門

○茱萸內消丸

治腎經虛弱膀胱為邪氣所搏結成

寒疝陰囊偏墜痛引臍腹或生瘡瘍時出黃水

山茱萸

去核

桔梗

水浸一

川烏

炮去

茴香

炒用

白蒺藜

去刺

青皮

去白

吳茱萸

湯炮七

肉桂

去皮各

大腹皮

酒洗

五味子

揀淨

海藻

先焙

玄胡索

各一

木香

半兩

川練子

炒二

桃仁

去皮煎

食茱萸

二兩

枳實

去穢

陳皮

去白各

右為末酒糊丸如桐子大每服三十九丸空心温酒下

○金鈴丸

治膀胱腫痛及小腸氣陰囊腫毛間水出

茴香

馬蘭花

炒

海蛤

破故紙

兔絲子

淨

等分丹皮及有防
能治小兒陰卵腫
研調酒下或鹽湯

食積濕痰血

食積死血成痛疝
梔子桃仁散或加香
附苗香見下痰飲流
下蘆葦囊中作疝疝
木海石南星山查橘
核青皮山梔姜煎服
濕盛小便澀五苓散
加揀實傷寒門濕痰
疝疝橘核散補遺
疝疝橘核散 治濕

海帶 各三
木香 不見
丁香 各一
金鈴子肉 五兩

右為末麩糊丸如桐子大每服五十九溫酒鹽湯下

附○腎氣方 治筋疝

小茴香 破故紙 萊菔 胡蘆巴 木香

右為末羅蔔搗汁丸鹽湯下

附○葫蘆巴丸 治大人小兒小腸蟠腸氣奔豚氣疝氣

偏陰腫小腹痛形如卵上下走痛不可忍

葫蘆巴 一兩 茴香 二兩 天巴戟 川烏 各火兩

川練子 炒片 吳茱萸 湯洗七次

右為末酒煮麩糊丸如桐子大每服十五丸空心溫

酒下小兒五丸茴香湯吞下一方加黑牽牛

附○守效丸 治癩之要藥不痛者

蒼朮 南星 白芷 散水 山查 各一兩

熱因寒鬱而發疝

止痛

橘核 桃仁

山梔子 吳茱萸

川烏 細切炒等分

每服七錢水煎服

虛疝

諸疝挾虛者其氣沉
弦滑大參木為君佐
以疎導加枳實青皮
山查練子橘核按之
不定屬虛桂枝炒山
梔烏頭末之糊丸服
最能劫疝虛而疝痛

川芎 枳核 又云枳 半夏 各半兩

秋冬加吳茱萸依鉢有山梔子

右為末神麩糊丸服○又云有熱加山梔子 一兩 堅

硬加朴硝半兩○又或加青皮荔枝核

○丹溪活套云九治七疝多用熱藥而獲效者即內經彼

治之法耳須用寒涼藥監制之不可純用大熱之劑

如烏頭附子之類令人久服多服必變劇不可治矣

但宜以二陳湯加枳實橘核梔子山查等藥煎入生

姜汁熱辣飲之○恐有瘀血作痛者本方加玄胡索

桃仁泥○如有氣作痛者本方加木香茴香練實等

藥○如六脈沉細手足厥冷者本方加附子乾姜肉

桂之類以佐之○如羣丸痛甚者加荔枝核乳香沒

藥為細末調入本方煎藥內或另用順流水調服亦

醫家源流
橋核散加蒼朮見前
虛而挾熱疔梔子飲
補遺

補遺 梔子飲 治陽

明受濕熱傳入太

陽惡寒發熱小腹

連毛際間悶痛不

可忍

山梔炒

枳殼炒

右等分研入姜汁

用順流水盪起同

煎沸熱服一方加

茶葉

挑仁炒

山查

可○如木腎腫大如升斗者本方去甘草加海藻昆
布荔枝核茴香川練等藥為末順流水調服作九子
亦可

○祖傳經驗馬蘭花丸 治七疝癩氣及婦人陰癩墜下

小兒偏墜等証無有不効者

馬蘭花

醋炒

川練子

橘核

海藻

海帶

昆布

桃仁

去皮尖厚朴 姜制

木通

枳實

玄胡索

肉桂

木香

檳榔 各半兩

脈沉細手足冷冷者加川烏頭一箇 五錢

右為細末酒糊丸如梧桐子大每服五七十九或酒

或姜塩湯送下

脚氣指南

受濕

足重痛或脛腫脉滯

者此濕勝也活宜燥

之防已飲或除濕丹

並見下或沉香大腹

皮散附餘或越痛散

補遺濕勝心下痞滿

開結導飲丸見下

補遺越痛散 治濕

氣攻注腰脚疼痛

行步少力

川當歸酒洗焙

脚氣門

論

內經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰傷于濕者下先受之
盖脾主四肢足居於下而多受其濕上鬱成熱濕熱相
搏其病作矣是以先從氣衝穴隱核痛起及兩足脛紅
腫或惡寒發熱狀若傷寒筋攣掣痛是其候也或一旬
或半月復作如故漸上而致於足筋腫大如病瓠者多
有之矣東南卑濕之地比比皆是西北高燥之方鮮或
有之古方名為緩風絲宋元以來呼為脚氣原其所由
非止一端有從外感而得者有從內傷而致者所感雖有
內外之殊其為濕熱之患則一也故異法方宜論云北
方者其地高陵居風寒水冽俗飲醢酪而肉食皆以飲

肉桂去支 蕪蘚

沒藥 玄胡索

各二兩 杜仲去

皮炒斷絲一兩半

右為末每服三錢

空心溫酒送下

挾寒

足腫痛跡遲澁者此

濕挾寒也驅寒滲濕

則痛自除六物附子

湯或五積散並腹痛

門或導芫湯或搜風

散或攢風散並補遺

腎虛足弱有寒濕者

健水九見下或加味

四斤九補遺

補遺遺氣湯 治寒

濕脚氣赤腫疼痛

心腹膨脹頭目手

足浮腫身腰膝皆

疼痛並皆治之

川羌活 獨活

官木瓜 青皮

薏苡仁 陳皮

桑白皮 枳殼

大腹皮 枳榔

青木香 紫蘇

大腹子 甘草

赤茯苓 木通

十五

多速飲為能經曰因而大飲則氣逆夫乳酪醇酒者濕熱之物飲之屬也加以奉養太過又滋其濕水性順下氣不能响故下注於足脛積久而為腫滿疼痛此飲食下流之所致也東南地勢卑下濕氣迷滿山澤行履坐卧無處不有若稟壯而氣實者不能侵賊其氣虛血少之人或遇房勞及負重遠行衝冒雨雪寒濕乘虛而客襲於足而成此証是外感寒濕之所致也大抵病因有內外之殊而治法無表裏之異耳故為治者宜通用蒼朮白朮之類以治其濕知母黃柏條芩之類以去其熱當歸芍藥生地黃之類以調其血木瓜枳榔之類以行其氣羌活獨活以利關節而散風濕兼用木通防已川牛膝之類引藥下行及消腫去瀉以為此証大法不過如此東垣曰濕淫所勝治以苦溫以苦辛發之透關節

勝濕為佐以苦寒泄之流濕清熱為臣故立當歸粘痛膏以治之其効捷如影響針經曰有道以來必有道以去治宜多矣病多為佳以導引其濕熱之氣外出也孝者宜詳究焉

脉法

脉弦者風濡弱者濕洪數者熱遲澁者寒微滑者虛牢堅者結實則因氣散則因憂繫則因怒細則因悲

方法

丹溪曰脚氣從濕從下須提起其濕在下之藥隨氣血用入心則恍惚謬妄嘔吐食不入眠卧不安左寸脉乍大乍小或乍有乍無者死○入腎則腰脚腫小便不通呻吟目與額皆黑氣衝胸而喘左尺脉絕者死

○治濕熱脚氣方

等分水煎服熱加

大黃寒加蒼木

補遺攢風散 專治

寒濕脚氣先以此

發散

麻黃 不去節

甘草 不去皮

川萹解 淮烏

杏仁 等分

每服四錢水一盞

煎服不可多進

補遺攢風散 治寒

濕脚氣愈後可常

服之

白芷 川芎

甘草 芍藥

當歸 各一兩半

麻黃 去根節

陳皮 枳殼

乾姜 白朮

厚朴 去皮各二兩

桔梗 三兩半

蒼朮 十二兩酒浸

去皮 桂一兩

每服五錢姜四片

水一盞煎服此

方即五積散去半

夏加白朮是也

補遺加味四斤丸

紫蘇

黃栢 鹽酒炒芍藥

木通

防已 枳殼 蒼木

甘草 炙

香附 羌活

痛加木香腫甚加大腹皮發熱加黃連大黃

右細切水煎服痛除腫退則住服

○防已飲

黃栢 酒炒

蒼木 鹽水炒

白朮

防已 各七分

生地黃 枳殼

川芎 各五分

犀角屑

甘草 木通

黃連 各二分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗食前溫服

○有熱加黃芩○熱甚及天令暄熱加石膏○有痰

加竹瀝姜汁或南星○便秘加桃仁○小便秘澀加

牛膝○如常腫者專主乎溫熱肥人如痰藥

○健步丸

蒼朮

當歸尾 生地黃

陳皮 各一兩半

芍藥 各一兩半

川牛膝 細大腹子 錢條 各五分

桂心 一錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服四百丸

白朮 木通 送下食前服

○加味四物湯 治脚氣衝心

本方加炒黃栢煎服更於勇泉穴用附子末津調捏

作餅子貼穴上以艾炷灸灸以泄引其熱下行

○蒼朮防已丸 治食積流注用

蒼朮 防已

黃栢 酒炒

南星

川芎 白芷

犀角 枳殼

血虛加川牛膝龜板酒糊為丸服

冊溪云○轉筋屬血熱四物湯加酒芩紅花煎服○有筋

治肝腎俱虛精血

不足足膝酸疼步

履不隨如受風寒

濕氣以致脚痛者

最宜服之

虎脰骨酥炙

肉苁蓉酒浸焙

川烏泡去皮

天麻各一兩

宣木瓜一箇蒸

川牛膝去芦酒浸

一兩半 沒藥

乳香各另研半兩

右為末入木瓜膏

和酒糊打搗為丸

如梧子大每服七

十九空心溫酒盪

湯任下

挾熱

足痛脈洪數者此濕

挾熱也治宜退熱除

濕當歸粘痛湯或脚

氣方並見下濕熱甚

大便不通三花神佑

丸 痰飲門 或導水丸

或大黃左經湯或羌

活道滯湯並見下四

肢結成腫核不散赤

動於足大指上至大腿近腰結了此奉養厚因風寒

而作又當加蒼朮南星

○羌活導滯湯 治脚氣初發一身及痛或肢節腫痛

瀉阻膈先以此藥導之後用當歸粘痛湯以徹其邪

羌活 獨活各一分 防已

大黃四分 枳實五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗空心溫服

○當歸粘痛湯 治濕熱脚氣為病肢節煩疼肩背沉重

膏脇不利兼遍身疼痛下注足脛腫痛脚膝生瘡赤

腫及裏外生瘡膿水不絕或痒或痛宜服之

羌活 一錢 人參 苦參 升麻 蒼朮 各四

蒼朮 兩 甘草 炙 黃芩 酒炒 茵陳 各一

當歸 身 酒 知母 酒 澤瀉 猪苓 去皮 白朮 各五

右細切作一服二盞煎至一盞去粗空心溫服臨卧

再進一服

○開結道引丸 治脚氣飲食不消心下痞悶

白朮 橘紅 澤瀉 茯苓

神麩 炒 麥芽 麩 炒 半夏 海七次 枳實 炒

芭苴 霜 各二 青皮 乾生姜 各五錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九

或七八十九溫水下

○麻黃左經湯 治風寒濕流注足太陽經腰脚攣痺

關節重痛增寒壯熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛脚

軟等証並皆治之

麻黃 乾葛 細辛 白朮 茯苓

防已 肉桂 羌活 各伍 甘草 防風 各伍

防風 各伍

防風 各伍

味敗毒散並補正

補遺耳遂散 治脚

氣上攻流注四肢

結成腫核不散赤

熱掀痛及癢一切

腫毒

其遂為末以水調

傳腫處却濃其草

湯服之其腫即散

二物本相反須兩

人看各處安頓不

可相和則不驗清

流中子韓詠苦此

只一服病者十去

七八再服而愈

石細切作一服加生姜三片大棗一枚水煎服

○半夏左經湯

治足少陽經為風寒濕流注發熱腰脇

疼痛頭目眩暈嘔吐不食熱悶煩心腿髀緩縱不能

行步

半夏

細辛

白朮

麥門冬

茯苓

肉桂

防風

乾姜

黃芩各半

小蘗

甘草

柴胡各三分

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞半煎

至一盞溫服如熱悶加竹瀝喘急加杏仁桑白皮

○六物附子湯

治四氣流注於足太陰經骨節煩疼

四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫

附子炮

肉桂

防已

甘草

各五分

白朮

茯苓

各七分

補遺加味敗毒散

治足三陽經受熱

毒氣流注脚膝上

嫩赤腫痛寒熱如

瘡自汗惡風或无

汗惡寒

川羌活 獨活

北柴胡 前胡

清河參 甘草

川大黃 蒼朮

陳枳殼 桔梗

赤茯苓 川芎

等分每服半兩姜

一片水一鍾煎七

分食前熱服

右細切作一服加生姜三片水一盞煎至一盞溫服

○局方換腿丸

治足三陰經為四氣所乘發為攣痺緩

縱上攻背脇肩背下注脚膝疼痛足心發熱行步艱

○薏苡仁

南星炮

石南葉

石斛

枳榔

單解

川牛膝洗

羌活

防風

木瓜各四

黃芪

當歸尾

天麻

續斷各一

右細末酒糊為丸如桐子大每服五十九丸溫湯下

○五積散

治寒濕流注經絡脚膝腫滿痠痛等証方

見腹痛門

○導水丸

治脚氣跗腫疼痛或發熱惡寒濕熱大盛者

大黃

黃芩各二兩

黑丑取頭末

滑石各四兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服四五十九溫

水送下以利為度

扶風

凡腫重痛增寒壯熱
脈息浮弦者此濕挾
風也治宜去濕散風
麻黃左經湯見下腰
足拘挛大小便秘泄
大料神秘左經湯附
餘風濕痺痛足弱卒
步艱難独活寄生湯
腰痛門或半夏左經
湯見下或加減地仙
丹或活血應痛丸並
補遺

附○除濕丹

治諸濕病腰膝腫痛足脛浮腫筋脉勁急

津液凝澁便溺不利等証

換榔 甘草 威靈仙 赤芍藥

澤瀉 厚樸子各二 乳香 沒藥各一兩

黑丑半兩 大戟炒三兩 陳皮四兩

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服五十九溫水

下以利為度

附○三花神祐丸 治濕熱流注足膝浮腫肢節煩疼行

步重墜等証方見痰飲門

附○沉香大腹皮散 治濕氣鬱滯經絡以成脚氣腫滿

疼痛筋脉不利

大腹皮二兩 沉香 桑白皮炒 換榔

茴香炒 木通 白茯苓 去皮 荊芥穗

治風冷邪濕留滯

下焦足膝拘挛腫

滿疼痛

地龙炒去土

五靈脂去石

白膠香別研

椒紅炒出汗

黑豆炒去皮

木鼈子去殼油

蒼朮出浸去皮炒

赤小豆炒川烏包

木耒去穢五加皮

威靈仙烏藥

天仙藤等分

右為末酒糊和丸

紫蘇子炒 蘇葉各一 甘草炒 陳皮去白

烏藥各一 乾木瓜 去穢 枳殼去穢炒

每服五錢水一盞姜五片乾蘿蔔五大片同煎七分

溫服如無蘿蔔用羅蔔子一錢微炒搗碎同煎如葶

大腸乾燥即服加減神效攻丸

附○大黃左經湯 治風寒暑濕流注足陽明經使腰脚

赤腫痛不可大行小秘或惡聞食氣喘滿口汗

細辛去苗 茯苓 羌活 大黃蒸

甘草炙 前胡 枳殼去穢炒 黃芩

厚朴去皮炒 杏仁 去皮尖別 研各等分

每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎至七分空心熱

服腹痛加芍藥秘結加阿膠喘急加桑白皮紫蘇小

便澁少加澤瀉四肢瘡瘍浸淫加升麻並等分

如梧子大每服七

十九空心鹽湯

酒任下

補遺活血應痛丸

治風濕客於腎經

血脈凝滯脚重疼

痛項背拘挛不得

轉側常服活血脈

壯筋骨

狗脊去毛四个

香附子去毛炒七

斤半

蒼朮

浸一宿去皮六斤

陳皮去白五斤

草烏頭一斤半

○大料神秘左經湯 治風寒暑濕流注三陽經腰足

拘挛大小便秘澁喘滿煩悶並皆治之

半夏湯炮七次乾高細辛麻黃去節麥門冬法

小草即遠志苗白姜厚朴姜制茯苓防已

枳殼去穢甘草桂心羌活防風

柴胡各等分

右細切每服四錢水一盞姜三片棗二枚煎服自汗

加牡蠣白木去麻黃腫加澤瀉木通熱甚無汗減

挂加挂皮前胡升麻腹痛或利去黃芩加芍藥附子

大便秘加大黃竹瀝喘滿加杏仁桑白皮紫蘇並等

分對証加減尤宜審之

○祖傳經驗杉木節飲 治脚氣發作惡寒發熱兩足腫

大心煩体痛欲死者

浸藥 十兩另研

石乃末酒糊丸

如梧桐子大每服

二十九食前溫酒

孰承任下

食積

食積流注於下脚氣

腫痛治宜消積兼除

滋其痛即安倉小防

已九見下食不消胸

膈痞塞脚氣痛者開

結導飲丸見下

杉木節四兩棋榔七枚大腹皮酒洗青橘葉四十一

右細切作一服順用流水三升煎至一升分作三服

一日服盡如大便通利黃水其病除根未愈過數日

再前一劑服之病根去為度外以杉木橘葉不拘多

少煎湯洗之神効

○又經驗勝溫餅子 治遠年脚氣足脛腫如瓜瓠者

黑丑一兩取頭白丑一兩取頭其遂連珠者五斤

右三味并同研極細外用舊麥麩一兩半連藥末和

勻水調捏為餅子如折三錢大放飯上蒸熟每服一

併空心嚼茶清送下以利為度未利又服一餅忌其

草菘菜生冷油膩魚腥等物

痛風指南

痰痛

痛風因痰者二陳湯
加酒芍羌活南星蒼
木竹瀝麥汁痰飲門
臂痛者多濕痰二陳
湯加酒栢酒威靈仙
蒼木羌活甘草乾姜
陳皮芍藥痰飲門痰
挾死血一身走痛者
控涎疔痰飲門

濕痛

痛風因濕在下焦者
二木加羌活白芷黃
桂防風竹瀝姜汁或
二妙散見下走注痛
者四妙散或上中下
痛風方或威靈蒼木
湯並見下肢節腫痛
脈滑者蒼木南星木
香枳殼枳櫛防已黃
栢或加味二妙丸或
麻黃赤芍湯並見下
風濕相搏痛者甜瓜
子丸補遺或防風大
麻散或木通湯或大
羌活湯或定痛丸並

痛風門

論

內經曰諸風掉眩強直支痛痠戾裏急筋縮皆足厥陰
風木之位肝膽之氣也又曰風寒濕三氣雜至合而為
痺其風氣勝者為行痺寒氣勝者為痛痺濕氣勝者為
著痺以冬遇此為骨痺以春遇此為筋痺以夏遇此為
脈痺以至陰六月也遇此為肌痺以秋遇此為皮痺夫
古之所謂痛痺者即今之痛風也諸方書又謂之白虎
歷節風以其走痛於四肢骨節如虎咬之狀而以其名
名之耳丹溪曰大率因血虛受熱其血已自沸騰或加
之以涉水受濕熱血得寒汚濁凝滯不得運行所以作
痛夜則痛甚行於陰也治以辛溫益以辛涼流散寒濕

開通鬱結使血行氣更能慎口節慾无有不妥者也

脉法

脉經曰脉溢而緊者痺少陰脉浮而弱也則血不足浮
則為風上血相搏則疼痛如掣
或人脉濇小短氣自汗出歷節疼不可屈伸此皆飲酒
汗出當風所致也
寸口脉沉而弦沉則主骨弦則主筋沉則為腎弦則為
肝汗出入水中因水傷心歷節痛而黃汗出故曰歷
節風也
味酸則傷筋上傷則緩名曰泄味鹹則傷骨上傷則矮
名曰枯上泄相搏名斷泄榮氣不通衛不独行榮衛
俱微一焦无御四屬斷絕身體羸瘦独足腫大黃汗
出脛冷假令發執變為歷節風疼痛不可屈伸

見下

補遺甜瓜子丸 治風濕相搏相脚疼

痛

甜瓜子一乃妙黃

乾木瓜一兩半

威靈仙一兩

川烏五錢泡

未之酒糊為丸每

服三十酒下避風

汗出忌執及相友

藥上下前同

血虛

附死血

皆手足肢節疼痛

方法

丹溪曰因濕痰濁血沉注為病以其在下焦道路遠非

烏附氣壯不能行故用為引經若以為主治之非惟

无益而有殺人之毒此病必行氣流濕舒風導滯血

補新血降陽升陰治有先后須明分腫与不腫可也

不可食肉肉属陽大能助火素有火盛者小水不能

制若食肉厚味下有遺溺上有痞悶須將魚脰麩醬

酒醋皆断去之先以二陳湯加酒浸白芍藥以佐以

黃連降心火看作何應又為區處也

○大法用蒼木兩星川芎白芷當歸酒芍在上者加羌活

桂枝枯梗威靈仙在下者加川牛膝防已木通黃柏

○加味四物湯 治白虎歷節風証本方加

桃仁 牛膝 陳皮 茯苓

耳草

白芷

草龍胆

如痛在上者属風加羌活桂枝威靈仙○在下者属

濕加牛膝防已木通黃柏○氣虛者加人參白朮龜

板○有痰者加南星半夏生姜○血虛者倍川歸川

芎佐以桃仁紅花水煎服之

○因濕者用蒼木白木佐以竹瀝姜汁及行氣之藥○或

曰有濕鬱而周身走痛或關節間痛遇寒即發當

濕鬱治或用白木一味酒煎服之其痛立愈

○肥人多是濕与痰飲流注經絡脉必滑瘦人多是血虛

與熱脉必澀

○下部有濕腫痛用防已龍胆草黃柏知母固是捷藥若

肥人病此宜蒼木白木南星滑石茯苓之類瘦人宜

用當歸紅花桃仁牛膝栝榔等藥

乃血虛弱經絡枯澀
寢滯而太也于后夜
痛甚者血弱脉虛午
前早上甚者氣滯脉
弱痛甚者乃曰白虎
歷節風走注風膝大
胫瘦曰鶴膝風俱服
三伍秦朮湯補遺血
虛痛芎歸湯加桃仁
紅花傳桂威靈仙取
橫行手膊催生下或
替行散見下肢節腫
痛脉澀死血四物湯
加桃仁紅花虛損門
寒濕相搏無帶經絡

作痛者麒麟竭散補
遺或舒筋湯見下
跌
躓傷損落馬墜車痛
不可忍者乳香定痛
散補遺

補遺三五秦光湯

秦光 去芦洗淨

川牛膝 去芦酒洗

羌活各一升五分

黃連姜汁拌炒

黑狗脊 洗去根土

人參 當歸

綿黃芪 酒炒

五加皮 各二升

紅花 八分 浸酒拌

黃芩 一升五分同

川獨活 冊

黃栢 酒拌炒焦

懷生地 酒洗

蒼朮 章便洗去皮

川草薢 各一升

杜仲 每一兩用小

尚一升 益一升水

三鍾 拌炒二升

赤芍藥 酒炒七分

川芎 七分 甘草 分

右水二鍾 桃枝 七

段 每段一錢半 燈

心七莖 前至七分

入童便 白酒各三

○薄桂味淡者能橫行手臂煩南星蒼朮等藥至痛處

○威靈仙治上躄痛風人虛弱勿用

○一方 治上中下痛風

黃連 酒炒 南星 各二 神麩 炒 台芎 各一 防已

白芷 桃仁 各五 威靈仙 酒炒 桂枝 橫行 手足 羌活 各二

酒紅花 五分 龍膽 五分 蒼朮 米泔浸

右為細泉神麩糊丸如梧桐子大每服一百丸空腹

○大羌活湯 治風濕相搏肢節疼痛

羌活 升麻 各一 獨活 炒 蒼朮 防已

威靈仙 川芎 茯苓 澤瀉 各五

右細切作一服水一盞前至一盞去粗空腹溫服

東垣○四妙散 治走注疼痛

威靈仙 酒浸 乾五升 羯羊角 灰 三 蒼耳子 半 白芥子 炒 一升

右為細末每服一錢生姜湯調下

一方 治飲酒濕疼痛風

黃栢 酒炒 威靈仙 酒炒 蒼朮 米泔浸 羌活 各三

甘草 炙三 陳皮 去白 芍藥 各

右為細末每服一錢七生姜湯調下

冊○九因久痢后兩脚痠軟疼痛或膝腫如鼓槌者此亡

陰也宜以芎歸熟地黃等補血藥治之自愈挾氣虛

者加參芪挾風濕者加羌活防風白朮之類切不可

純作風治反燥其血終不能愈

冊○氣血兩虛有痰濁陰大痛風

人參 山藥 海石 南星 各一 白朮

熟地黃 黃栢 酒炒 龜板 酥炙 乾姜 燒存 瑣陽 各五

右為酒糊為丸服

受腹濕服渣再煎二次忌麪酒鯉魚羊糖如遇天將乍雨陰晦時日而預先煮痛甚者加防風天麻升麻午後夜甚者加升麻五分牡丹皮一升早上甚者加連翹沉香五分竹瀝乳汁各半杯此症乃筋与骨病幼者乃外淫侵入大人及年近衰者不善養而得蓋筋屬肝血

○肢節腫痛七屬火腫屬濕蓋受風寒而發動於經絡之中濕熱流注於肢節之間而無已也

麻黃去根 赤芍藥各一 防風 荊芥

羌活 獨活 白芷 蒼朮

威靈仙 片苓酒浸 枳實 桔梗

葛根 川芎各半 甘草 當歸稍

升麻各三分 下焦加酒黃柏○婦人加酒紅花○腫多加袞榔大腹皮澤瀉更加沒藥一錢定痛亦妙○

一云脉澁濕者有疼血宜用桃仁紅花芎歸加大黃

微利之

○二妙散 治脚膝下焦濕熱成痛

黃柏酒浸焙 蒼朮米泔浸春秋二宿 右為細末沸湯入姜汁調服或用蒸餅為丸姜鹽湯

骨屬腎水內損所致耳

補遺耳塞竭散 治寒濕積於經絡以致氣血凝滯疼痛不可忍者

血竭 乳香 白芍 沒藥 水蛭炒令煙尽 當歸各二 麝香五分 虎腔骨 蘇合黃半兩

右為末每服三錢 食前溫酒調下

補遺乳香定痛散

送下二味皆有雄壯之氣表實氣實者加酒少許佐之有氣加氣藥血虛加補血藥痛甚者加生姜汁

○潛行散用黃柏一味酒浸曝乾為細末每服方寸匕煎四物湯調下治血虛陰火痛風藥也多服貼數效

○手臂痛是上焦濕痰橫行經絡中作痛也

半夏 酒苧 白朮 南星 香附各

陳皮 蒼朮各五 蒼朮半 威靈仙和 甘草三分

右細切作一服加生姜五片水二盞煎至一盞食後

○加味二陳湯 治臂痛

本方加酒苧羌活威靈仙入姜水煎食後溫服

○一方 治痛風神效

赤芍藥 青皮各一 紫威 台芎各七

威靈仙半 木鱉子半 防風七分 甘草五分

治打撲損傷落馬
墜車一切疼痛不
可忍者

乳香 沒藥

川芎 白芷

芍藥 甘草

牡丹皮 去骨

生地黄 酒洗焙乾

右為細末每服二

錢溫酒對童便調

下不拘時候

風熱

因感風熱而身作痛
者小續命湯去附加

右細切作一服酒煎服之

○治婦人背脊脇走痛

赤芍藥 一枝枝

炒黃柏 各一 甘草 五分

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

○治走注疼痛方

威靈仙 蒼朮

生桃仁 七个 甘草 二錢

右細切作一服加生姜五片水二盞煎至一盞入童

便竹瀝各半盞再煎至一盞熱服忌猪羊鷄肉魚腥

○定痛丸 治風濕一切痛

乳香 沒藥

五靈脂 木鱉子 去殼

金星草

地龍 去上泥

香方風酒客在上痛

威靈仙桂枝在下痛

牛膝防已黃柏傷寒

門或獨活寄生湯腰

痛門風邪乘虛攻注

經絡之間痛無常處

拘挛不得屈伸

書謂夜其虎骨散補

黃走注歷節諸風雜

痺軟痛天麻丹或越

痛丸並補遺濕熱作

痛者當歸粘痛湯脚

氣門瘦入肢節疼痛

厲血虛風邪乘虛而

入四物湯加羌柏本

右各等分為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸溫

酒磨化下或只作小丸溫酒送下亦可

○世俗有用草藥而獲速効者如用石絲以為之君過

山龍寺以為之佐皆性急而燥者不能養筋滋陰俱

能燥濕病之淺者濕痰得燥而開瘀血得熱而行故

有速効若病之深而血少者愈劫愈虛而病愈深矣

戒之戒之

○黃芪酒 治風寒濕痺身軀頑麻皮膚燥痒筋脉攣急

語言蹇澁手足不遂等証

黃芪

草薢

當歸

木香

防風

石斛

白朮

甘草

桂枝

虎脛骨 酥炙

雲母粉

仙靈皮

天麻

白芍藥

茵芋葉

川續斷 各一

防柴胡虎骨門風寒

濕痺筋脉拘攣手足

不遂黃芪酒見下

補遺虎骨散 治風

毒邪氣乘虛攻注

經絡之間痛牙常

處書靜夜其筋脉

拘攣不得屈伸

虎脛骨酥炙

龜板酥炙各二兩

蒼耳子微炒

骨碎補 沒藥

赤芍藥 白芷

防風去苦當歸

白蜈蚣醋碎細研

右細切以生絹袋盛用無灰好酒一斗以藥罐浸之

包封罐口勿令泄氣春五夏三秋七冬十日每服一

盞溫飲之不拘時候

獨活寄生湯 治肝腎虛弱感冒風濕致痿痺兩足

緩縱軟弱不仁 方見腰痛門

防風天麻散 治風濕麻痺肢節走注疼痛中風偏枯

或暴不語內外風熱壅滯昏眩

防風 天麻 川芎 羌活

白芷 草烏頭 白附子 荊芥穗

當歸 甘草 白滑石 二兩

右為細末每服半錢加至一錢熱酒化蜜少許調下

藥力運行微麻為度或煉蜜為丸如彈子大每服

半丸至一丸熱酒化下白湯亦可此藥散鬱閉結宜

肉桂去粗皮

麒麟竭細研

白附子泡各三兩

五加皮 天麻

川羌活 去芦

枳殼各一兩

川牛膝 去苗二兩

為末溫酒調下一

錢不拘時候

補遺天麻丹 治諸

風難瘥及白虎歷

節風

川烏頭 八兩

蒼朮 四兩 全蝎 兩

荊芥 防風

風通氣之妙劑也

獨活寄生湯 治臂痛不能舉蓋是氣血凝滯經絡不行

所致一名通氣飲子一名五痺湯其効如神

甘草 羌活 海桐皮 白木 各一錢

當歸 去頭 赤芍藥 各一錢 片子姜黃 二錢

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞去

粗磨沉香少許入內溫服九腰已上痛食後腰以

下痛食前服

祖傳經驗九藤酒 治遠年痛風及中風左癱右瘓筋

脉拘急日夜作痛叫呼不已等証其功甚速

青藤 鈎鈎藤 紅藤 丁公藤 各二

桑絡藤 兔絲藤 天仙藤 忍冬藤 各二

五味子藤 俗名紅 陰地厥 根四兩

天麻各二兩

右為末用豆腐和勻作餅入銅銚以水滿煮藥至半沉半浮存性為度取出待半乾為丸梧子大硃砂為衣臨臥先嚼木瓜一片以好酒下二三九服後竟昏沉吐涎痰一二時為効

補遺越痛丸

治走注歷節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷損

川烏頭三兩連皮

熟地黃或用生者

半夏麩 南星

白僵蚕洗去此屑

烏藥去木各半兩

並乾

右為細末酒煮麩

糊和丸如梧桐子

大晒乾每服五七

丸空心溫酒下如

跌撲傷損姜汁和

酒研十數丸塗傷

處如卒中倒地姜

汁茶清研五七丸

灌下立醒

右細切以無灰老酒一大斗用磁罐一箇盛酒其藥

用真綿包裹放酒中浸之密封罐口不可泄氣春秋

七日冬十日夏五日每服一盞日三服病在上食後

及卧後服病在下空心食前服

○經驗加味二妙丸 治兩足濕痺疼痛或如火燎從足

跗熱起漸至腰膝或麻痺痿軟皆是濕為病此藥之

蒼木四兩米 黃柏二兩酒 川牛膝一兩 當歸尾一兩

川草薢一兩 防己一兩 龜板酥炙

右為細末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服一百丸

空心姜塩湯下

○經驗川木通湯一男子年四十歲因感風濕得白虎歷

節風証遍身抽掣疼痛足不能履地者三年百方不

効身軀羸瘦骨立自分於死一日夢與木通湯服愈

遂以四物湯加木通服不効後以木通二兩剉細長

流水煎汁頓服七後一特許變身痒甚上体發紅丹

如小豆大粒舉家驚惶隨手沒去出汗至腰而止上

軀不痛矣次日又如前煎服身体又發紅丹方出汗

至足底汗乾後通身舒暢而無痛矣一月後人壯氣

復步履如初後以此法治數人皆驗故錄於此以示

後學

○經驗薰洗痛風法治手足冷痛如虎咬者

用樟木屑一斗以急流水一擔熬沸以樟木屑置於

大桶內桶邊放一瓦甃用前沸湯炮之桶內安一矮

甃子令人坐桶邊放脚在內外以草薦一領圍之勿

令湯氣入眼恐壞眼其功甚捷

痿症指南

血虛

痿者手足不能牽搏是也又名軟風下身疲弱不能趨步及手戰搖不能握物此症屬血虛血虛則陰虛陰虛生內熱則筋弛步履艱難而手足軟弱乃血氣兩虛風濕之症加減獨活寄生湯補遺宜灸膏肓曲池三里絕骨之穴補

痿症門

論

內經曰肺熱葉焦五藏因而受之發為痿躄心氣熱為脉痿則經縱而不任地肝氣熱為筋痿故筋急而攣脾氣熱為肉痿則胃乾而渴肌肉不仁腎氣熱為骨痿則腰膝不舉骨枯而髓減又曰治痿者獨取陽明一經陽明者五藏六府之海主潤宗筋能束而利機關也衝脉者經脉之海也主滲灌谿谷與陽明合於宗筋陰陽總宗筋之會七於氣衝而陽明為之長皆屬於帶脉而絡於督脉故陽明虛則宗筋弛縱帶脉下引故足痿不用也治法各補其宗而通其腠調其虛實和其逆順筋脉骨肉各以其時受月言治諸痿直調補各藏以待其旺月而病安也丹溪曰內

四物湯加參芪黃柏知母熟多加黃芩並虛損門或加味四物湯見下血虛四物湯加黃柏蒼木丹溪補陰丸氣虛四君子湯加參芪黃柏蒼木並虛損門或鹿角膠丸見下補遺加減獨活寄生湯
川獨活一兩五分
當歸身一兩五分
人參去蘆二兩

經謂諸痿起於肺熱又謂治痿獨取陽明一經蓋肺金體燥居上而主氣畏火者也脾土性溫居中而主四肢畏木者也火性炎上可嗜慾無節則水失所養火寡于畏而侮所勝肺得火邪而熱矣木性剛急肺受熱則金失所養木寡于思而侮所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管攝一身脾傷則四肢不能為用而諸痿作矣瀉南方則肺金清而木方不實何脾傷之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿之法無出於此雖然太產作跌厚味發熱亢病痿者若不淡薄食味吾必不能保其安全也又曰內經論風論痿各有篇目源流不同治法迥異局方以治風藥七通治諸痿何其罔故按丹溪此論一出掃盡千古之弊李老晚而不視則為懶者之雷震

桑寄生 黃連 姜
酒拌半日炒

白朮 芍藥

稷藜 茯苓

川牛膝 去芦百片

生地黄 酒洗

黃柏 酒炒各一升

甘草 生炙各二分

升麻 五分

右水煎食遠服

補遺灸法

膏肓二穴在脊骨

第四椎兩傍

曲池二穴在手曲

肘骨橫紋中以手

替者之日月耳夫醫為人之司命其可不盡心於此乎
脉法

脉經曰肺痿脉必浮而弱其人欬欬不得欬欬則出乾
沫久久則小便不利

寸口脉不出反為發汗陽脉早索脉不澁三焦踈
入而不出陰脉不澁身體反冷其內反煩多噦辰燥

小便反難此為肺痿傷于津液便如爛瓜亦如豚膏
但因誤發汗故也

方法

丹溪曰有濕熱有痰有血虛有氣虛亦有死血者有食

積妨礙升降者盧氏曰上文論痰起於肺執痰之
以其痰而為病所因所執或有
不同而主治亦當各著其重也

東垣取黃柏為君黃芪等補藥為輔佐以治諸痿元一

揣胸取之

三里二穴在膝下

三寸大骨外大筋

內

絕骨二穴在足外

踝上三寸

食積

食積於血妨礙不得

降者四物湯對二陳

湯加桃仁紅花黃柏

神效痰者二陳湯

加蒼朮黃柏白朮黃

芩竹瀝姜汁食積者

二陳湯加蒼朮神效

定之方有兼痰積者有濕多者有熱多者有濕熱相

并有挾氣者臨病制方其善於治痿者乎

○濕熱用東垣健步丸加燥濕降火之劑黃柏黃芩蒼朮

之類

○濕熱用二陳湯加蒼朮白朮黃芩黃柏之類入竹瀝姜汁

○血虛用四物湯加蒼朮黃柏下補陰丸

○氣虛用四君子湯加蒼朮黃芩黃柏

○黃柏蒼朮治痿之要藥也

○虎潛丸補腎丸皆可治痿

丹溪加四物湯 治諸痿四肢軟弱不卒動

○當歸身 熟地黃 白芍藥 川芎 各五分 五味子 枳

麥門冬 各一分 人參 黃連 各五分 黃芩 蒼朮 各一

知母 三分 杜仲 七分 牛膝 三分 足不

山查黃芪枳實

濕熱

濕熱成痿二妙散或

東垣健步丸加燥濕

降陰火蒼木黃柏黃

芩牛膝之類並脚氣

門六七月間濕熱成

痿清燥湯補遺東垣

治痿多用黃柏取其

燥濕故也

補遺清燥湯 治濕

熱成痿以燥金受

濕熱之和絕寒水

生化之源七絕則

右為細切水二盞煎至一盞空心溫服酒糊為丸服

亦可一云血虛者以四物湯加黃柏蒼木下補陰丸

東垣健步丸 治膝中無力屈伸不便脚皆腿脚沉重行

步艱難

羌活

滑石 炒

甘草 炙

瓜蒌根

酒洗肉桂 各五

防風 三斤

川烏 各三斤

澤瀉 三斤

苦參 酒浸各

防已 酒洗

右為細末湯煮麩糊為丸如梧桐子大每服七十九

煎愈風湯下

湯一云荆芥湯下 煎愈風湯也

○大風湯治兩足痿弱或沉重麻痺不能行動兩膝虛

腫名白鶴膝風等証方見中風門

○祖傳經驗 治兩足痿弱軟痛或如火焙從足踝下上

衝腿膝等証因濕熱所成者

腎虧痿作矣腰以

下痿不用

黃耆 一斤半

白朮 陳皮

澤瀉 各五分

白茯苓 人參

升麻 三分

麥門冬 麩末

當歸身 猪苓

生地黄 各二分

黃柏 酒炒柴胡

黃連 各一分

五味 九粒蒼木錢

甘草 炙二分

水調食遠服

蒼朮

米泔浸 一宿四兩黃柏

酒浸日 兩兩牛膝 去芦

二兩 龜板 酥炙

虎脛骨 酥炙防已

各一 當歸尾 二兩

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服七十九或一

百九空心姜塩湯下一方加炮附子五錢

○又經驗鹿魚膠丸 治血氣虛弱兩足痿軟不能行動

久卧床褥之証神効

鹿角膠 斤

鹿角霜

熟地黄 各半

川牛膝

白茯苓

兔絲子

人參 各一

當歸身 四

白朮

杜仲 各二兩

虎脛骨 酥炙龜板

酥炙各 一兩

右為細末另將鹿角膠用無灰酒二盞烱化為丸如

梧桐子大每服一百丸空心姜塩湯下

諸虫指南

五蟲

心勞發熱心裏有長虫名曰蠱虫長一尺許雷公丸見下其者食心足底穿膝虛腫再造散疔風門肝勞熱生長虫四五尺餘在肝為病令人恐畏不安眼中赤纏五鳳丸見下甚則食肝眉落再造散疔風門脾勞身熱內有蠅虫狀

諸蟲門

論

內經曰腸胃為市無物不受无物不包又曰飲食自倍腸胃以傷若夫飲食不能謹節則朝損暮傷自傷成積積久成熱濕熱相生而諸般奇形之虫各從五行之氣而化生矣若腐草為螢之類是也外臺秘要所謂九虫者皆能食人府藏一曰伏虫長四寸許二曰蛔虫長尺許三曰白虫長四五尺餘四曰肉虫狀若爛杏五曰肺虫其狀如蚕六曰蝟虫狀如蝦蟇七曰弱虫又名臍虫狀如瓜瓣八曰赤虫狀如生肉九曰蛭虫狀如菜虫形至細微其伏虫又為諸虫之主也蛔虫生虫生發多則胃心即殺入白虫母子相生其形轉大而長亦能殺人

如蝦蟇令人好嘔而胸中咳嘔而不生前胡湯見下甚則食脾声啞再造散疔風門或茱萸根湯見下肺勞熱瘦損內有肺虫其狀如蚕在肺為病令人咳逆氣喘或為愛念氣腸寒或為勞之所生名曰膏肓脈多不着五膈下氣化或三聖飲子並見下其者食肺鼻崩再造散疔風門腎勞熱四肢腫急內有蠅

因虫食人令人煩滿肺虫令人咳嗽蝟虫令人嘔吐奴逆喜噦弱虫令人多唾赤虫令人腸鳴蛭虫居廣腸多則為痔痢則為癩因人瘡處以生諸癰疽癬癩疔毒蝟虫若虫之類無所不為人亦不必尽有亦不必甚多或偏有或偏無皆能為害者也九此諸虫依附腸胃之間若元氣尚實未為大害稍有虛損遂能侵蝕隨其虫動而變生諸病也若夫膈噎癆瘵癩風蠱服狐惑傷寒等証无不生虫又如蟻鼠應声虫之類未易悉舉医者宜於各類推而治之可也

脉法

脉沉實者生虛大者死 尺脉沉而滑者為寸白虫 懸鍾阴疔脉虛小者生勁急者死 外臺云虫脉當沉弱而弦今反洪大即知蛔虫甚也

醫字源流
狀如菜虫形至細
微在腎為病耳鳴或
上耳生瘡或癰或
痛如針刺狀千金散
見下甚者食腎多則
為痔劇則顯聚再造
散方風門

諸蟲

不問男子婦人小兒
外感內傷以致水穀
停留腸胃生蟲成積
惡心嘔吐若酸糟雜
瘡痲黃疸水腫鼓脹
膈噎翻胃及婦人癥

方法

丹溪曰濕熱之生虫藏府虛則侵蝕上半月虫頭向上
易治下半月虫頭向下難治已上二月字恐並當作
日字蓋虫无半月一轉
頭也先以蜜或砂糖或炒吃引虫頭向上然後用殺
虫藥

○腹內熱腸胃虛虫行求食上唇有瘡曰或虫食其藏下
唇有瘡曰狐虫食其肛

○治懸桃仁湯 治狐或唇口生瘡上唇虫食其藏上
唇虫食其肛

桃仁 艾各五錢 入東十五枚
用水二盞半煎至一盞半分二服

○雄黃蠶散 治前証
雄黃 青箱子 苦參 黃連各二 桃仁二錢

右為末搗新艾汁和捏如小指頭大納穀道中消虫
食其肛也

○室鑑化虫丸 治諸虫

鶴虱 去上 檳榔 胡粉 炒各 明白礬 炒二
苦練根 去上 引各

右為細末末糊為丸如梧桐子大一歲兒服五丸量
人大小加減丸數温漿水入生麻油三四點打勻送
下清米飲亦可不拘時候其虫細小者皆化為水大
者自下

○集効丸

木香 鶴虱 炒 檳榔 訶子 去核 羌活 炒
附子 炮去膽 乾姜 子 八黃 半 烏梅 去核
右為末煉蜜為膏 子大陳皮湯或醋湯下一方加

醫學源流

嘔積聚心腹疼痛小
兒疳疔面黃肌瘦肚
大脚細一切蟲積八
仙妙立丹補遺或室
鑑化虫丸或万應左
並見下

補遺八仙妙應丹

雞心檳榔十二兩

黑牽牛頭末三兩

不見火 雷丸

白朮 大黃

木香不見火

史君子肉各一兩

錫灰一兩半

右為末葱白一斤

者沸露一宿和丸

如粟米八每服四

錢忽白湯送下或

木香湯下十五歲

以上者可服三歲

七歲者服一錢早

晨冷下務在房內

坐棉不要見風出

外通泄或見積如

絮動不斷或如爛

魚腸肚或如鷄彈

黃色或如未泔水

色稠粘不斷或如

馬尾虫或血蟄虫

或胡蚕虫或蝦蟇

黃連黃柏格

○萬應丸

煨榔 五兩

皂莢 十兩 不

苦練根皮 一斤

右先以皂莢苦練用水二大碗熬成膏一處搜和藥

末為丸如梧桐子大又以沉香木香雷丸各一兩為

末為衣先以沉香衣次用雷丸衣又次用木香衣每

服三九四更時用砂糖水送下

○一方用鷄子炒白臘塵酒糊丸服治寸白虫

○一方黑鉛炒成灰煨榔末等分和勻米飲調下

○化虫丸能化虫為水

硫黃 兩

木香 五兩

蜜陀僧

附子 一枚 炮

右先以附子末醋一盞熬膏餘藥研為細末以附子

即出有虫即取下虫

有積即取下積有虫

即消了虫必效之藥

加以礶砂甘遂尤妙

如虛老之人用此推

蕩後服四君子湯數

帖尤好

蛔虫

胃脘作痛惡心而吐

痛定即能食面有白

班唇紅色比蛔虫攻

人心也廣濟蛔虫方

或苦練粥或集效方

膏和勻丸如菴豆大每服二十九荆芥茶清下

○一方用苦樹根煨榔鶴虱三味濃煎湯飲之

○前胡湯 治痺勞身熱內有白虫在痺為病令人好嘔

而胃中咳嘔而不出

前胡

杏仁 去皮尖

常山

草龍膽 各一

枳實

松蘿 各七

竹葉 七片

旋覆花 五分

右細切作一服水二大盞煎至一盞去粗溫服○若

腹中熱滿悶加芒硝半錢梔子黃芩苦參各半錢加

水煎忌桃李雀肉醋生葱菜等物

○茱萸根湯

治痺勞熱內有白虫食肝為病與前同

茱萸 一兩

火麻子 八兩

陳皮 一兩半

右三味細切水煎服或下虫或下黃汁丸合此藥禁

並見下或川椒湯吞

烏梅丸補遺

補遺烏梅丸 治

厥

烏梅七十五箇

附子泡 細辛

人參 黃柏

桂枝各一兩半

乾姜 二兩半

黃連 四兩

末之以苦酒漬烏

梅一宿去核蒸爛

杵成膏少加蜜和

丸梧子大食前服

十九日三加至三

聲勿語虫覺便無効此方治虫甚驗

外 〇五膈下氣丸 治肺勞熱瘦積內有肺虫在肺病

令人咳逆氣喘或謂憂忿氣膈寒熱皆從勞之所生

名曰膏肓疾針灸不着

麥門冬五兩 蜀椒炒出汗 遠志肉 附子 甘草各半

乾生姜兩半 人參七錢 桂心一兩 百部 白朮

黃芪各七兩半 細辛半兩 杏仁去皮尖及雙仁

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸徐化

蠶汁忌豬肉冷水海藻松菜生葱桃李雀肉等物

外 〇千金散 療腎勞熱四肢腫急蟻虫生於腎中為病

買穀三兩 乾漆三兩 蕪荑 胡粉

槐白皮各一兩 吳茱萸五兩 杏仁四十五粒

右為細末平旦以井花調服方寸匕增之以病瘥止

十九

狐惑蟲

人病傷寒不發汗腹

內熱腸胃虛虫行來

食上唇有瘡曰惑虫

食其臍下唇有瘡曰

狐虫食其肛治惡桃

仁湯或雄黃散並

見下

疳虫

小兒飲食無節腹中

生虫當口淡而沫有

出發痛有時蓋胃寒

外 〇三聖飲子 治勞熱生虫在肺為病

茱萸根東引者 桑白皮東引者 狼茅子二兩

右三味細切以酒七升煮取一升半平旦服盡

外 〇五鳳丸 治肝勞熱生長虫在肝為病令人恐畏不

安眼中赤壅

烏鷄卵五枚 黃蠟三兩 乾漆四兩 粳米粉半斤

東引吳茱萸根切三升

右五味以茱萸根乾漆杵為細末和入銅鈔中火煉

可丸如菴豈大隔宿勿食後飯早晨以米飲下一百

二十九小兒五十九虫即爛盡

外 〇雷公丸 治心勞發熱心裏有長虫名曰蠱虫長一

尺許買心即死

雷丸炒 五枚 陳皮

貫衆 蕪荑

故虫動而心頭疼與
癩畧相似但目不斜
而手不搖耳人休消
瘦核柳散補遺或核
柳丸或集效丸並見
下或香蟾丸諸拜門
或安虫散吐瀉門
補遺核柳散
核柳散貫練雄黃
萬史君雷漆水香
巴豆錫灰輕鶴虱
黃丹調用肉煎湯

陰蝕蟲
婦人陰戶中有細虫
乾漆
青箱子
桃仁各一兩二錢半
去皮尖另研
疆蚕十四枚
炒 亂髮如鷄子大塊
火內燒存性
右為細末煉蜜丸小豈大空心温酒送下二十九日
三服有前用湯以下七分治五藏勞
重方也當與前勞極方互用
外
○廣濟療蛔虫方
酸石榴根東引者
切三升 核柳十枚
細切
右二味以水七升煮取二升半去粗以粳米煮稀粥
平日空腹食之少間虫並死快利神効
外
○又治蛔虫方
用苦練根生者東引
不出土者 刮去外塵皮取肉白皮二兩
以水三碗煮取一碗半去粗用晚粳米三合煮糜粥
空心先以炒肉一二片吃引虫向上然後進藥粥一
二口少頃又吃一二口漸漸加至一碗或二碗其虫

蝕痒不可當手不能
抓食久臟腑即死令
人發寒熱與癆症相
似用猪肝切大片以
花椒葱拌猪油煎乾
待冷納陰戶中少頃
取出再換一片其虫
俱入肝盡出為度再
以洗楊散洗淨補遺
或用生牛肉帶血者
切片納陰戶內三次
虫盡引出後用板礬
煎水洗或蛇床子煎
湯洗樟樹皮末擦之
見下

畫下而愈
○祖傳經驗核柳丸 治小兒疳病積氣塊痛腹大有虫
等証
三稜細切醋
炒五錢 義木細切醋
炒五錢 核柳 一兩
青皮去穢
炒黃色
陳皮半兩
各 蕪荑二錢 雷丸 五錢 鶴虱三錢
炒
乾漆五錢
無烟炒 木香三錢
不見火 良姜二錢
陳皮炒 砂仁一錢
去壳
麥蘖炒半兩 胡黃連二兩 甘草炙三錢 神麩五錢
炒黃色
右為細末醋米糊丸如葦豈大每服三五十九空心
淡姜湯下今加史均子肉五錢尤妙
○又經驗治婦人陰蝕瘡陰戶中有細虫其痒不可飲食
入臟腑即死令人發寒熱與勞証相似
先用蛇麻子煎湯洗淨搥乾付後藥 梓樹皮不拘
多少
右焙乾為末入枯礬四分之一射香少許付之立効

