

醫學源流

九  
木  
十  
三  
絲



大醫院補遺真傳醫學源流肯綮大成卷之九

麻木指南

風痺

脉尺寸俱浮微身伏  
不仁此風勝濕者行  
痺上下左右無留礙  
所至作指莖桂枝五  
物湯即桂枝湯中湯  
去甘草湯傷寒月血  
氣弱手足拘空風  
痺氣痺之疾三痺湯  
附餘或補氣湯或和  
中補氣湯或升陽和  
中湯或人參益氣湯

麻木門

論

內經曰風寒濕三氣合而為痺故寒氣勝者為痛痺濕  
氣勝者為着痺河間曰留者不去四肢麻木拘攣也經  
又曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久  
入深榮衛之行澁經絡時疎故不痛皮膚不榮故為不  
仁非所謂不仁者或周身或四肢唧唧然麻木不知痛  
痺如繩扎縛初解之狀古方名為麻痺者是也丹溪曰  
麻是氣虛木是濕痰死血然則曰麻曰木者以不仁中  
而分為二也雖然亦有氣血俱虛但麻而不木者亦有  
虛而感濕麻木兼作者又有因虛而風寒濕三氣乘之

或導氣湯益見下血

痺皮膚不仁防風湯

補遺風寒濕氣客留

於手足緩弱頑痺不

仁者五痺湯補遺或

補遺防風湯見下

赤茯苓 當歸

赤芍藥 秦光

黃芩各七分半

桂心 杏仁

甘草各三分半

獨活七分半

姜五片水煎服

補遺五痺湯

羌活 白朮

黃芩洗去上

防已各一錢

甘草八五分

姜三片水煎服在

上食後任下食前

痺

脈急而浮四肢尚卷

浮腫痛甚此與氣盛

為痛痺也茯苓湯補

遺身休煩疼項背拘

急或重或痛舉體艱

難手足冷痺腰腿沉

難

故周身掣痛蒸麻木併作者古方謂之周痺治法宜先

汗而後補也醫者宜各以類推而治之不可執一見也

脈法

脈浮而濡屬氣虛閉前得之麻在上躰閉後得之麻在

下躰也

脈浮而緩屬溫為麻痺脈緊而浮屬寒為痛痺脈澀而

芫屬死血為木不知痛痺

方法

丹溪曰十指麻木是胃中有溫痰死血宜二陳湯加蒼

木白木桃仁紅花少加附子行經

○人參七溫氣湯 治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜卧

熟傷元氣也

黃芪二錢 炙甘草 升麻各半 五味子粒

柴胡 六分 生甘草 人參 各一分半 白芍藥 七分

右細切一服水二盞去粗稍熟服

○導氣湯 治兩腿麻木沉重

黃芪二錢 甘草半 青皮一錢 升麻 柴胡

當歸稍 澤瀉各半 陳皮 紅花少許 五味子碎

右細切作一服水二盞前至一盞溫服

○天麻苗芪湯 治未有風証因連日醉飲其証復來

右口角併眼牽引側視及左手脚腿麻木疼痛

天麻 芍藥 神麴 羌活 肢節不

茯苓各三分 人參 黃連各四分 川歸 五分

黃芪 甘草 升麻 葛根

黃柏 蒼木 各六分 澤瀉 各七分 柴胡 九分

或加猪苓 六分

難

重無力者蠲痺湯補遺骨節疼痛皮膚不仁肌肉重著及四肢緩縱不仁者附子湯補遺或麻黃桂枝升麻湯

補遺蠲痺湯

當歸身 酒洗

片子姜黃 洗去土

赤芍藥 黃芪

川羌活 各五錢

甘草 一錢

分作二服姜棗水

前服

補遺茯苓湯

赤茯苓 去皮

桑白皮 各一兩

官桂 去皮 防風

麻黃 去節 川芎

赤芍藥 各兩半

每服五錢姜棗水

前服

補遺附子湯

附子 生二錢

白芍藥 官桂

赤茯苓 去皮

人參 各一錢

白朮 去芦六分

甘草 五分

姜棗煎服

右細切作一服水二盞前至一盞去粗溫服

○補氣升陽和中湯一婦人病診得六脉俱中得弦洪

緩相合按之無力弦在上是風熱下陷入陰中陽道

不行其診閉目則渾身麻木晝減而夜甚竟而開目

則麻木漸退又則絕止當開目則此証不忤是以不

敢合限致不得卧身體皆重時有咳嗽竟胸中不利

煩燥氣短喘促肌膚克盛飲食不減大小便如常此

非風和乃氣不行也治宜補益肺氣自愈如經脉中

陰火乘其陽入火動為麻木者當蕪去其陰火則矣

生甘草 黃芪 白茯苓 澤瀉 蒼朮 首朮 陳皮

升麻 柴胡 蒼朮 白朮 白芍藥 炙甘草 黃芪

陳皮 佛耳草 炙甘草 黃芪

右細切作一服水二盞煎至一盞食後服

○麻黃桂枝升麻湯 治婦人先患渾身麻木轉愈則小

減開目則已其証愈後又因心中煩惱遍身骨節疼

痛身軀沉重飲食減少腹中氣轉運

木香 生薑 桂枝 半夏 陳皮

草豆蔻 厚朴 黃柏 炙甘草 升麻

白朮 茯苓 澤瀉 黃芪 麻黃

人參 黑附子 白芍藥

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後服

○神効黃芪湯 治渾身麻木不仁或頭面手足肘背

眼脚麻木並皆治之及兩目羞明畏日隱澁難開視

物昏花睛痛亦皆治之

蔓荊子 陳皮 人參 炙甘草

蔓荊子 陳皮 人參 炙甘草

蔓荊子 陳皮 人參 炙甘草

蔓荊子 陳皮 人參 炙甘草

濕痺

濕勝脈沉緩留注不去四肢麻木拘急浮腫按冷湯加當歸其草見前風濕痺脚膝痛腫行步艱難腰膝聲聾大骨痛蒼朮散補遺手足流注疼痛麻痺不仁難以屈伸意以仁湯補遺腿膝足胫濕熱不痛走注當歸粘痛湯脚氣門或三妙丸見下補遺蒼朮散

蒼朮 米泔浸鹽炒  
川柏酒浸一宿炒  
各四兩 防風 一兩  
虎胫骨 酥炙二兩  
末之溫水調二錢  
補遺意以仁湯  
蒼朮 淋炙炒四兩  
薏苡仁 當歸  
芍藥 麻黃  
官桂 去粗皮  
甘草 各一兩  
每服七錢半姜七片水煎服自汗減麻黃執減桂

白芍藥 一錢 黃芪 二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞臨卧稍熱服如麻木不仁雖有熱不加黃柏只加黃芪一錢通三錢如麻木甚者加芍藥一錢通二錢如小便淋澀加澤瀉五分一服去則止如有大熱証加酒洗黃柏三分

○補氣湯 治皮膚麻木神効

黃芪 陳皮 甘草各二錢 澤瀉六分 芍藥八分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○中和補氣湯 治合眼則麻目開則不麻四肢無力痿

厥醋心日昏頭眩神効

羌活七分 獨活 川歸 黃柏各三分

柴胡 神麩 木香 草薺各三分

人參 白朮 澤瀉 猪苓各一錢

升麻各五 芍藥 一錢 黃連 麻黃不去刺

右細切作二服每用水二盞半煎至一盞溫服

○三痺湯 治男婦血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺

川續斷 杜仲姜炒 防風 桂心

細辛 人參 茯苓 當歸酒浸

甘草 芍藥各錢半 秦艽 生地黄

川芎 獨活各一錢 牛膝酒浸 黃芪二錢

每服七錢姜東煎服

○祖傳經驗三妙丸 治溫熱下流兩脚麻木或如火烙

川牛膝去芦 黃柏酒洗四兩去皮炒 蒼朮六兩米泔浸二

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服五七十九空

心姜塩湯下忌魚蟹着麥熟麩煎炒等物

耳病指南

風耳

耳為宗脉之所附脉  
虛而風邪乘之風入  
於耳脉使經氣痞而  
不宣是謂風聾必有  
頭痛之症也腎脉必  
浮宜疎散之桂香散  
附錄 又有耳觸風邪  
與氣相搏其聲嘈嘈  
而鳴眼中流火謂之  
虛聾通聖散 中風門  
風人耳中虛鳴等症

散即桂香去麻黃當  
歸白羨黎南星加蒼  
朮陳皮厚朴半夏耳  
間有津液乾則不能  
為害若瓜熟轉之津  
液結脚成核塞於耳  
竅亦令暴聾為之肝  
耳生猪脂地龍金底  
墨等分細研葱汁和  
捏如枣大綿裹塞耳  
中數日待軟即挑出  
或茶胡聰耳湯見下  
聾耳有腫及黃水紅  
綿散見下

耳病門

論

內經曰腎者作強之官技巧出焉又曰耳為腎之外候  
一曰腎通竅于耳一曰心通竅于耳夫腎之為藏水藏  
也天一生水故有生之初先生于腎而一陰藏焉而又  
有相火存乎命門之中也每挾君火之勢而侮所不勝  
經所謂一水不能勝二火是也其或嗜慾無節勞後過  
度或中年之後大病之餘腎水枯涸陰火上炎故耳岸  
耳鳴無日而不作也或如蟬噪之聲或如鐘鼓之響甚  
為可惡早而不治漸而至於龍鍾良可嘆哉治法宜瀉  
南方之火補北方之水無有不安者焉錢仲陽曰腎者  
補而無瀉厥有肯哉

脉法

兩寸脉浮洪上魚為溢兩尺脉短而微或大而數皆屬  
陰虛法當補陰抑陽  
左寸洪數心火上炎兩尺脉洪者或數者相火上炎其  
人必遺精夢與鬼交兩耳蟬鳴或聾

方法

丹溪曰大病後耳聾及陰虛火動而聾者宜補陰降火  
四物湯加黃柏主之

○耳鳴宜當歸龍薈丸多飲酒人宜木香枳榔丸

○耳聾以萊菔烏頭尖大黃三味為末津調貼湧泉穴以  
引火下行

○又方 治耳痛以白礬枯吹入耳中及青礬燒灰吹之皆  
效

○紅綿散 治耳痛及聾耳用桑螵蛸多黃為末加射香

熱耳

熱氣乘虛隨脈入耳  
熱聚不散膿汁出謂  
之膿耳腎脈必數宜  
清利之蔓荊子散見  
下或桃花散補遺少  
陰厥陰熱多耳聾者  
通聖散中風門若耳  
鳴酒渴者通聖散加  
枳桔柴胡乾葛南星  
陰虛火動耳鳴者四  
物湯加黃柏知母虛  
損門痰氣耳鳴者滾  
痰丸痰飲門

少許吹入耳中極效或用臙脂胚子蛙竹末加射香  
少許吹入妙

○又方治諸虫入耳用香油滴入耳中其虫即出或死於  
耳中或用驢牛乳或鷄冠血滴入皆好

○又方治諸虫入耳用桃葉捲作角子切齊其頭納入耳  
中其虫從角走出

○大補丸治耳鳴欲聾用黃柏一味不拘多少細切塩酒  
拌新瓦上炒褐色為細末滴水丸如梧桐子大每服  
一百丸如氣虛以四君子湯下血虛以四物湯下

東垣○滋腎丸 治耳鳴耳聾  
黃精酒炒 知母去毛酒 肉桂半錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九淡塩  
湯下

補遺桃花散 治耳

中出膿

白礬火煨過

乾胭脂各一錢

麝香一字

末之綿子杖蘸藥

挑之

虛耳

耳所上者精上氣謂  
和氣充足則耳聞  
而聰若勞傷氣血風  
邪乘虛侵精脫腎急  
則耳轉而聾是腎虛  
耳聾也味必清弱治

東垣○柴胡聰耳湯 治耳中乾結耳鳴而聾

連翹四錢 柴胡三錢 炙甘草 當歸身

人參各一錢 水蛭五分炒 蜜虫三个去壳 射香足炒另研

右除後三味另研外其餘細切作一服加生姜三片

水二盞煎至一盞去粗入三味末子再煎一二沸食

遠服

東垣○蔓荊子散 治上焦熱耳鳴而聾及出膿汗

炙甘草 升麻 木通 赤芍藥

桑白皮制 麥門冬 生地黃 前胡

甘菊花 赤茯苓 蔓荊子各半錢

右細切作一服加生姜三片大束一枚水一盞煎至

一盞去粗食後服

東垣○黍粘子湯 治耳痛生瘡

宜補之益腎散補造

或滋腎丸見下有勞

碌傷於血氣淫慾耗

其精元瘦悴力疲昏

昏潰是謂勞傷地

黃丸附餘或人參養

榮湯內傷門天痰後

元氣損傷精血虛耗

耳聾或鳴調中益氣

湯多服自巳內傷門

補遺益腎散 治腎

虛耳聾

磁石火煨醋淬七

次巴戟去

心各一兩沉香

川椒去目炒出汗

石菖蒲各三兩

末之每服二錢用

猪脊一枚細切和

以葱白少鹽并漿

川濕紙十重裹煨

令熱空心嚼以酒

送下

十二經脉上絡於耳

其陰陽諸經通有交

併則臟氣逆而厥也

氣傳久耳是謂厥聾

脉必沉滯宜開導之

氣耳

昆布

草龍胆

炙甘草

紅花女許

右細切作一服水二盞煎至一盞稍熟食後服忌寒

藥利大便

桂香散 治風虛耳聾

辣桂

木香

南星炮

每服二錢葱二莖水煎服

清神散 治風氣壅上頭目不清耳常重聽

薑黍炒去

乾菊花各一

荆芥穗

羌活

木通

石菖蒲去毛

甘草各三錢

右為末每服三錢食後臨卧茶清調下

復聰湯 治痰火上攻耳龍耳鳴

半夏制

陳皮去白

白茯苓去皮

甘草

右用水二鍾生姜三片煎至一鍾空心臨卧各一服

犀角鎊

葛蒲

赤芍藥

赤小豆炒

甘草炙半兩

每服四錢水一盞半生姜三片煎七分温服

地黃丸 治勞損耳聾

當歸

蘇木 生甘草 蒲黃 連翹各三

黍粘子 生地黄 當歸稍 黃芩

黃連各三 柴胡 黃芪各四 桔梗一錢

桃仁三个去皮 尖另研

川芎 當歸 細辛 石菖蒲

木通 白芷各四 紫蘇一錢 麻黃去節 甘草各二

香附去毛 防風

兔絲子酒

和劑流氣飲附餘氣

壅於上而耳聾者清

神散附餘氣實人耳

毒或鳴者栴柳丸諸

氣閉或神等丸補遺

氣閉耳聾用其逐為

丸如塞大塞耳內服

甘草湯或通耳湯見

補遺神等丸 治氣

實人耳聾

大黃 黃芩

牽牛 活石

等分末之滴水為

丸

### 目病指南

#### 實熱

人之兩目總統於肝  
白人屬肺若白睛赤  
赤火乘於肺也肉輪  
屬脾土下綱赤腫者  
火乘於脾也神光屬  
肝青睛被翳肝虛火  
旺也赤脉屬心目中  
血貫痛流火自甚也  
凡暴赤腫痛赤翳若  
明淚出不止隱翳難  
開胃味不明者火為

川椒

故紙

白蒺藜

胡巴豆

杜仲火各

石菖蒲

白芷各三

磁石火燒

末之煉蜜丸如梧桐子大每服五十九丸葱白温酒下

附○和劑流氣飲

治氣厥耳聾

陳皮

青皮

甘草

厚朴

姜制香附炒

紫蘇各四

木通三

大腹皮

丁香

栴柳

木香

草菓

義木炮

藿香

桂各一兩

麥門冬法

白朮

白木

木瓜

赤茯苓

石菖蒲

白芷

半夏

枳殼各一

每服三錢

生姜三片

葱二枚

葱白二莖煎服

祖傳經驗秘方

治耳內忽大痛如有虫在內奔走或有血水流或乾痛不可忍者用蛇退皮燒存性細研以鷄翎管吹入耳中立愈

### 目病門

論

東垣曰按陰陽應象論云諸脉者皆屬於目又曰目得血而能視五藏六府之精氣皆上注於目而為之睛睛之窠為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為目窠之總絡氣之精為白眼肌肉之精則為約束裏擷筋骨血氣之精而與睛併而為系上屬於腦後出於項是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脉法於陽故陰陽合德而為精明也是以五藏六府十二經脉三百六十五絡其血氣皆稟受於脾土而上貫於目而為明故目者心之使也心者神之舍也故精神亂而不守卒然見非常之怪若和中其睛則精散精散則視文觀一物為兩也因事

病經云熱盛則腫是也如暴發赤腫疼痛不可忍者瀉熱黃連湯補遺或救苦湯見下腫痛難開大便秘結瀉肝散補遺上焦壅熱鼻塞頭目不清利上清散補遺肝火盛目赤溢痛多淚龍會丸瀉痛門或洗肝散或四物龍膽湯並補遺或上清丸附餘或歸煖湯見下肺經瀉熱白人赤腫宜瀉肺入濟生桑白皮散

煩擾飲食失節勞役過度致脾胃虛弱心火大盛則百脉沸騰血脉逆行經曰天明則日月不明和害空竅是也夫脾者諸陰之自目者血脉之宗也故脾虛則五藏之行氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也主藏神明宜靜而安相火化行其令相火乃包絡之火主百脉皆榮於目髓勞後妄動及因和氣所併而損血脉是故諸病生焉醫目者若不先理脾胃及養血安神乃治標不治本是不明至理者也孝者其可不用心乎

脉法  
左寸脉洪數心火炎也關弦而洪肝火盛也  
右寸關俱弦洪肝木挾相火之勢而天侮所不勝之金而制已所勝之土也

或明目細辛湯並見下小子赤海導赤散補遺風熱上攻目腫痛赤醫勞肉攀睛痒游羞明多淚始則昏花漸成內障治宜消風退熱决明子散附餘或黃連膏見下小兒病眼流膿生醫消積久而自痊左胆飲子見下

肝溪曰目病屬風熱血少神勞腎虛  
○河間曰在府則為表當除風散熱在藏則為裏當養血安神如暴失明昏澁翳膜膠淚斑入眼皆風熱也一云斑入眼此肝氣盛而發在標也宜表散以去之如昏弱不欲視物內障見黑花瞳子散皆裏也血少神勞腎虛也宜養血補水安神以調之

○瞳子散大皆辛熱所為也辛主散熱乘之當除風熱涼血益血以收耗散之氣芩連苦寒除邪氣之盛為君當歸身生地黃養血涼血為臣五味子酸寒体浮收瞳子散大地骨皮天門冬瀉熱補氣或用滋阴地黄丸最妙

○久病昏暗以熟地黄當歸根為君菟活防風甘菊花之類佐之

補遺瀉肝散 治肝

瀉肝散 治肝

結

瀉肝三桔梗文參

二大黃硝辛与苓

四麥門冬前水服

肝經濕熱与攻心

補迂上清散 治上

熱壅熱鼻塞頭目

不清

盆硝 石膏

桔梗各一兩

川芎 荆芥

薄荷各半兩

右為細末每用一

字口噙水以藥鼻

內搐之或加龍腦

三分

補迂洗肝散 治風

毒攻上暴作赤目

腫痛隱溢多淚

薄荷葉 川芎

川芎 薄荷用鬚

川芎 防风 去芦

羌活 甘草

大黃各一兩

右為末每服三不

後熱水調下

補迂四物九膽湯

治目赤暴發雲翳

疼痛不可忍

川芎 當歸

○暴發赤腫以黃芩防风為君以瀉之黃連當歸為臣以

養血羌活柴胡升麻白芷甘草為使白睛紅加白豆

蔻少許

○又方治血熱壅痛四物湯如草龍膽防已防风羌活一

云實熱上衝眼痛用黃連瀉火當歸補血

○勞後飲食不節內障昏暗蔓荆子湯

蔓荆子

人參

黃柏 白芍藥 酒炒

右細切水煎溫服

○又方治眼痛用生地黄酒浸搗爛會眼上又用草烏南

星乾姜桂枝為末醋調占兩足心時用十膝膏洗眼

○肥人風熱上壅眼目疼痛

防风 羌活

荆芥 酒芩

水煎食後溫服

○瘦人目痛乃是血少熱須用養血藥少加風藥

當歸 生地黄 酒洗 玄參

防风 荆芥 菊花 川芎

右細切水煎食後溫服

東垣○滋陰地黃丸

熟地黃一兩 生地黃半兩 柴胡八錢 天門冬

炙甘草 枳殼 地骨皮 黃連

五味子各三錢 人參二錢 當歸身 酒浸 黃芩各五錢

右為細末煉蜜為丸如菜豆大每服一百丸茶清下

東垣○秘傳撥雲退翳丸 又名神仙 治一切內外障膜遮睛

昏暗大効

瓜蒌根 枳實 甘草炙 蔓荆子

瓜蒌根 枳實 甘草炙 蔓荆子

瓜蒌根 枳實 甘草炙 蔓荆子

瓜蒌根 枳實

甘草炙 蔓荆子

芍藥 地黃各半兩 羌活

防風 去芦各三升 草尾胆去土

防已各二升 每服七升半水煎

食 補遺毒散 治目

痛赤溢瀉小腸火 利水道

川木通 去皮 生地黃 四升

甘草二升 右水一鍾前七分

食後熱服

渡箭 各五

川芎

木賊 童便浸一宿 去節焙乾

密蒙花

荊芥穗

地骨皮

甘菊花

白蒺藜

羌活 各一兩

蛇蛻

蟬蛻

黃連 各三

川椒 七升半 去日炒

當歸 酒浸洗 草決明 五錢 炒

右為細末煉蜜為丸每兩分作十九丸每服一丸食後臨卧服 暹三服翳障米飲下晴暗當歸湯下内障

木香湯下

兩无蔓荆子甘草川椒婦人當歸

○羊肝丸

治一切目疾不問内外翳障青盲等証

黃連 兩

甘菊花

防風

渡箭 去梗

荊芥穗

羌活

當歸

川芎 各三

白乳羊肝 一具 功竹 去膜

右為細末將羊肝蒸熟同藥末杵爛為丸漿水下

○春雪膏點赤服効 朴硝 不拘 置豆付上蒸化待流下以麪器盛之

虛眼

黑小屬腎五色花翳 遠黑精腎不足也及

父病昏暗雀目不能 遠視及内障昏朦五

色花翳迎風出淚頭 昏目眩皆血虛之候

宜壯水滋陰可也明 目地黃丸補遺能近

視不能遠視地多丸 見下能遠視不能近

視定志丸補遺肝血 不足眼昏生花久視

無力生眩者養肝丸

爛翳驗方

用茜草根燒灰以燈心點之須臾大痛以竹節草

○神効明目湯 治眼櫻緊急致倒睫拳毛及上下臉

皆赤爛晴疼昏暗晝則冷淚常流夜則眼澁難開

細辛 二分 蔓荆子 五分 防風 一錢 苧根 一錢半

甘草 三錢 一方加黃芪 一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗臨卧温服

○明日細辛湯 治兩目發赤微痛羞明畏日怯風寒怕

火光眼腫成紐收糊多隱澁難開眉攢腫悶鼻塞涕

睡稠粘大便微硬

川芎 二 生地黃 酒浸 蔓荆子 各三 當歸身 稍

白茯苓 藥本 各四分 荊芥穗 五分 防風 細辛 少許 紅花 少許

麻黃根 羌活 各八分

補遺或羊肝丸見下

腎水不足目昏視不

分明漸成內障東垣

熟乾地黄丸補遺或

濟本滋腎丸或加味

滋腎丸或滋陰地黄

丸並見下或明目益

腎丸虛損門或滋陰

腎氣丸見下

補遺明目地黄丸

治肝腎俱虛風邪

所乘熱氣上攻目

翳澁淚

川牛膝酒洗三兩

枳殼炒石斛

杏仁去皮尖炒

防風各四兩

生熟地黄各半斤

末之煉蜜和丸每

服三十丸食前鹽

湯下

補遺更志丸治目

能遠視不能近視

熱心氣不足恍惚

多忘

遠志二兩去心

白茯苓三兩

人參去芦一兩

蒲黃二兩

川椒四粒

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗臨卧稍熱

服忌酒醋温麪

○復明散治內障

青皮法根陳皮去白川芎

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱服忌酒

醋温麪辛熱大斜物之類

○助陽和血湯治眼發之後微有上熱白睛紅隱

難開睡多眵淚

蔓荊子分香白芷分柴胡

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗稍熱服

多甘草

○歸葵湯喬欽子治目中溜火惡日與火光

小角緊視物昏花迎風有淚

柴胡分生甘草 蔓荊子 連翹 生地黃

當歸身 紅葵花 人參各四分黃芪 酒黃芪

防風 羌活各七分升麻一錢

右細切作一服水一盞煎至一盞去粗食後服

○救苦湯治眼暴發赤腫臉高苦疼不可忍

桔梗 連翹 紅花 細辛各一分

當歸身夏月減半甘草各一錢蒼朮 草龍胆各半

羌活太陽升麻陽明柴胡太陽防風

藁本 黃連各二錢黃柏 生地黃

黃芩 知母各三分川芎六分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後服若苦

未之煉蜜和丸如

梧桐子大辰砂為衣每服三十九米

湯下

補遺養肝丸 治肝

血不足眼目昏花或生眵淚流久視無方

川當歸酒洗

車前子酒蒸

麩仁湯泡去皮

熟地黃酒蒸焙

白芍藥酒洗

楮實子 川芎

等分末之煉蜜和丸如梧子大每服

疾則多用苦寒藥兼治本經之藥再行加減如睛昏加知母黃柏

東○益陰腎氣丸 此壯水之主以鎮陽光

澤瀉 茯苓 各二錢 生地黃 洗酒 牡丹皮 山茱萸

當歸 稍洗 五味子 乾山藥 柴胡 各五錢 熟地黃 兩

右為細末勿犯鐵器蒸槽煉蜜丸如梧桐子大每服

五十九丸空心淡鹽湯下

東○當歸龍胆湯 治眼中白翳

防風 石羔 各二錢 柴胡 羌活 五味子

升麻 各三錢 甘草 酒黃連 黃芪 各四錢 黃芩 酒炒

黃柏 酒炒 當歸 身洗 草龍胆 洗酒 芍藥 各七分半

右細切作一服水二盞煎至一盞入酒少許熱服

東○瀉陰火丸 各連恒益陰丸

七十丸食後白湯

下

補遺羊肝丸 治肝

經有熱目赤睛疼

視物昏澁

羊肝一具生用

黃連 去鬚另研末

右先將羊肝共飴

膜於沙盆內搗爛

入黃連末研和丸

如梧子大每服五

十丸熱水送下利

濟方用白羊子肝

補遺東垣熟地黃

丸 治血少神勞

石決明 三錢 羌活

當歸 稍 五味子

條黃芩 黃連 酒炒

右為細末煉蜜為丸如菽豆大每服五十九丸茶清下

東○療本滋腎丸

黃柏 酒炒 知母 酒炒

各等分為細末滴水為丸如梧桐子大每服一百丸

至一百五十九丸空心淡鹽湯下

東○加味滋腎丸

肉桂 二分 黃連 一錢 姜黃 一錢 苦參 三錢

苦葶藶 酒洗 石羔 勿用 黃柏 酒炒 知母 酒炒

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服一日九白湯

送下空心服以食壓之

腎虛眼目昏黑

熟地黃 一兩

生地黃 一兩半

北柴胡 八錢

地耳皮 去水

川黃連 去鬚

枳殼 去穢炒

天門冬 共草

五味子 各三錢

清河參 二錢

當歸身 酒浸焙乾

黃芩 各五錢

右為末煉蜜和丸  
如菘豆大每服看  
丸茶清下

○退翳膏 治黑白翳

麩仁

青皮 各四

荆芥穗 水半

右細末水一碗煎至半碗去粗更上火煎半盞入荆

芥水兩匙入蜜少許再上火熬勻磁器盛貯頻點之

○龍胆飲子 治疳眼流膿生疔翳濕熱為病

穀精草 川鬱金 蛇蛻

升麻 二錢 青礬粉 草龍胆 黃芩 炒 羌活

右為細末每服一錢溫茶清調下

○還睛紫金丹 治日睡眼赤赤爛俗呼為赤睛是也當以

三稜銼刺目眦外以濕溫熱如眼生倒睫拳毛兩目

緊蓋內伏火熱而攻陰氣法當去其熱內火和眼皮

養陽

渾身及手足麻木不

仁兩目緊急縮小羞

明畏日或視物無力

黃芪湯補遺內傷脾

胃不足內障耳鳴多

年自昏不能視物益

氣聰明湯補遺陰虛

陽虛九竅不利青白

翳見於大昏補陽湯

附餘亦有服寒涼太

過以致陽虛其火轉

盛目益昏其則當溫

劑從治其次自降目

刺之出血

緩則毛立山翳膜亦退用手法剪山內膜何外以

白砂蜜 二十 黃丹 六兩

白丁香 五分 輕粉 一字

芎藭石 水內 厚水 浸半日

右將白砂蜜於砂石器內慢火熬掠去沫下其石次

下冊以柳枝撓次下餘藥以不粘手為度作丸如鷄

頭實大每用一九溫水化開洗之

○重明散 治一切風熱內外障膜眼疾

川獨活 川羌活 川芎 吳射干 仙靈脾

防風 甘草 井泉石 蒼朮 各半 丹參

白木 石決明 草決明 各三錢

右為細末每服二錢水盞半前至一盞溫服日三服

目明或勞役所傷飲  
食不節內障昏暗服

人參養胃湯補遺

補遺黃芪湯 治渾

身麻木不仁兩目

緊急縮小羞明畏

日視物無力

綿黃芪 二兩

白芍藥 甘草皮

各一兩 清河參

去芦八錢 陳皮去

白半兩 蔓荊子

二錢

每服五錢水一鍾

煎七分食後服

補遺蒸氣膠明湯

治飲食勞後所傷

脾胃不足內障耳

鳴或多年昏暗視

物不明服此令目

廣天內無翳障耳

無鳴奪之患

綿黃芪 甘草

人參各半兩

升麻 蒼根各

三錢 芍藥

川黃柏去皮酒炒

蔓荊子各一錢

每服三錢水一鍾

煎七分臨臥服

○石羔羌活散 治久病雙目不明遠年近日內外翳

障風熱昏暗倒睫拳毛一切眼疾頭風並皆治之

羌活治風熱 蜜蒙花治翳 木賊治翳 白芷清利

乾菜子治翳 細辛治翳 麻子起拳 川芎治翳

蒼朮明目 黃芩退熱 甘菊花 荊芥穗治日

石羔治頭痛 甘草解毒 藜蘆治偏頭風

右各等分為細末每服一錢至二錢食後臨卧用蜜

水調下茶清亦可日進三服服至十日漸明二十日

平安

○黃連膏 治一切眼目疼痛赤肉扳睛風痒淚落不

黃連半斤朴硝以水淘 白丁香五升水一斗淘

右量水入醋香釜內熬至七分淘出令經宿水面浮

牙者取出控乾以帛袋子盛風中懸至風化將黃連

細末熬湯汁晒乾入風中更加半斤胆和

眼極妙

○滌昏膏 治一切風壅眼目疼痛不可忍者

白砂蜜一斤黃連一兩沒藥半兩黃丹紫金

右以蜜同黃丹熬黑以水二大盞煎黃連成稠汁去

粗入前丹蜜內煎熬稠更入沒藥末同煎數沸慮去

粗洗眼甚妙

○金絲膏 治一切目疾昏暗視物如絲膜所遮或痒

或痛

白砂蜜 兩白礬一字 山梔子二錢碎入前黃連汁

井鹽一分如石以青鹽代之 宣黃連半兩細切水一盞浸一宿取汁再

右用銀磁器煎藥十餘沸用上細生絹加帛數重再

瀘過銀錐子盛貯時常點眼

近五更再服

補遺人參補胃湯

治服寒涼藥太過

以致陽虛火盛目

益昏甚熱飲食勞

役所傷內障昏暗

羞明

人參 去芦八錢

黃芪 甘草炙

白芍藥各一兩

黃芩 二錢

陳皮 二錢半

川黃柏酒洗一兩

每服五錢水一鍾

煎七分食後服

### 障翳

肝經精熱肺受風邪

眼赤色有花黑白紅

不等治宜驅精熱逐

風邪熱退風消障翳

自散內服經驗固本

還睛丸或撥雲退翳

丸或復明散或當歸

龍胆湯或萬局羊肝

丸並見下或還睛丸

附錄外點退翳膏或

復明膏並見下自赤

昏暗漸生昏膜治眼

赤爛蟬花無比丸補

東○地芝丸

治不能遠視而能近視以此除風熱

生地黄

右為末煉蜜丸茶酒任下

○眼睫方 即到睫拳毛也

木鱉子

去殼為末綿裹塞鼻中左目塞右右目

塞左二夜其睫自正

○點眼光明丹

治一切風熱上壅兩目赤腫澁痛風弦

爛眼及內外翳障等証

辰砂一兩 鵬砂二錢

輕粉五分 射香一分 片腦三分

白爐甘石一兩以黃連半兩煎濃汁瀝去相用炭火煨

始赤眼腫痛加乳香沒藥各五分內外翳障如玳珠

半錢鴨嘴膽各二分能胆二分爛弦風眼加銅青半

錢飛丹半錢或以諸藥總合為一以治諸般眼疾右

各研為極細末一服利刀研一二日無聲

貯密封口不可令泄氣點眼極妙

○濟生桑白皮散

肺氣壅毒上攻白睛赤腫日夜痛

玄參

桑白皮

枳殼炒

升麻

杏仁

旋覆花

防風

赤芍藥

甜葶藶

甘草炙

黃芩

每服半兩入姜三片煎服

附○决明子散

風熱毒上攻目腫痛卒翳赤脉努肉痒

澁羞明多淚始則昏花漸成內障但是暴風客熱

黃芩

其菊花

木賊

决明子

石膏

赤芍藥

川芎

羌活

甘草

蔓荊子

石决明 等分

每服七錢姜水煎

或點眼光明丹或  
回本還睛丸

風熱上攻目赤障翳

腫痛多淚羞明蟬花

散補遺風毒赤腫障

腎痛腫脹淚昏暗內

積風熱也秦皮散補

遺或重明散或退賢

丸並見下

補遺蟬花無比丸

治風毒傷肝目暗

生醫治腫赤爛又

患頭風牽搖眼漸

縮小

蟬統去足二兩

蒼朮 十二兩

赤芍藥 十兩

茯苓 其草多

防風 各四兩

蛇退 二兩 石決明

鹽水煮研如粉

川芎 卷活

當歸 各三兩

蒺藜 炒半兩

末之糊丸食後茶

湯下三升

補遺蟬花散 治風

熱昏瞽及肝經纏

熱毒氣上攻目腫

多淚羞明畏日

○上清丸 治風熱上壅眼目昏花迎風冷淚羞明

羚羊角 犀角 黃連 厚朴 各一兩

黃芩 川芎 羌活 蟬退 白芷

菊花 大黃 防風 草決明 地膚子

滑石 各五錢 生地黃 熟地 各七錢 牽牛 八錢半

右為末煉蜜丸如桐子大每服三五丸茶清下後

○補陽湯 陰盛陽虧九竅不通青白翳見干大皆

羌活 獨活 甘草 人參 熟地黃

黃耆 白朮 各一兩 澤瀉 陳皮 各半兩 生地黃

白茯苓 知母 各三錢 柴胡 三錢 防風 白芍藥 兩

肉桂 一錢 當歸 酒制 每服半兩水煎空心服

○還精丸 治眼內赤腫有花或黑或白或紅

人參 去芦 桔梗 黃芩

防風 去芦 羌活 車前子 知母 各

細辛 去土 五味子 各二兩 玄參 半兩

未之煉蜜丸如梧子大每服二十九空心湯下

○金帶路膏 除昏退翳截赤定痛

麝香 一錢 黃丹 各一兩 蜜 六兩 黃連 半兩

將蜜溶化下黃丹攪勻下長流水四升以嫩柳枝六

七莖一把定攪之次下麝香候滾十數沸又下黃連

不住手攪熬至升七八合絹襪紙傾藥在紙上慢慢

滴下勿令塵汚如有瘀血加硃砂一錢火上慢開入

前膏子內用

○珍珠散 治點一切眼

朴硝 穿者 蘆葇石 各分龍腦 少許 射香 少許

精草 蟬蛻

甘菊花 羌活

草龍膽 川芎

白蒺藜 防風

草決明 黃芩

蜜蒙花 木賊

蔓荊子 甘草

山梔仁 荆芥

等分末之食後茶

湯調下二錢

補遺秦皮散 治風

毒赤眼腫痛障溢

眵淚昏暗羞明

秦皮 滑石

黃連等分

禾之每用半錢沸

湯泡出味乘熱洗

**點洗**

肝經火上壅目赤澁

痛湯泡散洗之補遺

風熱攻目隱澁難開

羞明立勝散補遺或

珍珠散點附餘昏暗

視物如絲膜所遮或

痒或痛金絲膏見下

除感管或赤疔痛金

露膏 或復明膏

點見下 風熱春雪膏

明下 或芫其石散點

研極細點眼用黃連煎濃汁芫其石燒淬滲黃連乾

○芫其石散 洗一切眼

芫其石 六錢 黃連 八錢

用銀石器內者去黃連晒乾細研入腦子半錢同細

研每服半字湯泡洗眼

○丹溪活套云東垣謂目能遠視不能近視火盛而水虧

也法當補腎六味地黃丸主之目能近視而不能遠

視有水而無火也法當補心定志丸加茯苓主之又

曰不能近視晨服地黃丸不能遠視卧服定志丸是

皆通手足少陰經也是以知不能遠視者心血不足

也不能近視者腎水虧欠也 九日暴發赤腫宜用

熟活防風柴胡白芷升麻酒制芩連其草生地黃當

歸身白睛紅少加白薑麩又曰九眼暴發赤腫須以

防風黃芩為君當歸生地黃連和血瀉火藥

使 九日久痛或內障昏暗須以熟地黃當歸為

君以羌活防風荆芥穗生甘草菊花之類為佐使也

○祖傳經驗固本還睛丸 治遠年一切目疾內外翳膜

遮睛風弦爛眼及老弱人目眵多糊迎風冷淚視物

昏花等証悉皆治之

人參 白茯苓

天門冬 去皮心酒浸

熟地 酒洗淨用砂鍋蒸勿

杏仁 去皮研 草決明 微炒

甘菊花 用小金錢者

青箱子 微炒 防風 去芦

五味子 焙乾 甘草 炙

乾山藥 枸杞子 各一

生地 酒浸焙 麥門冬 去心

石 酒洗 川牛膝 酒洗

兔絲子 用酒好酒浸三

羚羊角 淨木八錢

烏犀角 細剉取淨

白蒺藜 剉去鬚 黃連 去鬚

附錄或條昏膏見下

歲久目眶赤爛還睛

紫金丹見下

補遺湯泡散 洗風

熱眼

赤芍藥 當歸

黃連 等分

湯泡執洗

補遺立勝散 洗風

執效眼隱澁羞明

腫痛

黃連 秦皮

防風 黃芩

等分水煎用新羊

毫筆蘸刷洗眼

### 口舌指南

### 口病

左寸脉洪救而口苦

者心熱也瀉心湯火

執門口瘡黃相飲哈

之補遺或碧雪見下

口舌生瘡柳花散或

水藥丸 並補遺內服

甘桔湯 溫疫門存寸

脉浮數而口辛者肺

熱也瀉白散 吹喉門

上熱口瘡及咽腫痛

升麻湯或天竺散或

川芎 各七

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十九塩

湯下

○經驗復明膏 去翳膜立効

人參

川歸

鵬砂 生各一 青塩

乳香 另研

沒藥 另研

蘆薈 各一

珍珠 半錢

射香 半錢

黃丹 一兩水

海漂硝 五錢

黃連 四錢

黃栢 大錢

赤苧甘石 各半

白沙蜜 半斤 麩仁 去殼

白歛 一錢半

右件各研為極細末先將白蜜煎沸掠去上沫再熬  
滴水中沉碗底不散可用然後入前藥未畧沸撓勻  
磁器收貯日三五次點之効

### 口舌門

論

內經曰中央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾故病  
在舌舌之為病或為重舌木舌或於糜爛生瘡或見酸  
苦其辛鹹味原其所因未有不由于七情煩擾五味過傷  
之所致也經曰陰之五宮本在五味陰之五宮傷在五  
味是也是以肝熱則口酸心熱則口苦脾熱則口甘肺  
熱則口辛腎熱則口鹹有口淡者知胃熱也外有謀慮  
不決肝移熱於膽而口苦者亦有脾胃氣弱木乘土位  
而口酸者或膀胱移熱於小腸腸腸不便上為口糜生  
瘡潰爛則傷寒狐惑之証上唇生瘡重食其藏下唇生  
瘡重食其肝其偽口之為病種種不同醫者宜各類推

薄荷煎並附餘或清

神湯補遺或礪砂散

見下口瘡爛具瘡瘰

赴庭散補遺或柴胡

地骨湯或蓋微湯漱

之並見下或黃丹散

補遺口熱臭氣苦並

散耳病門右閃脈沉

突而口甘者此脾胃

有寒熱也三黃丸見

下或平胃散中濕門

唇口開動或生核意

效仁湯補遺左閃脈

洪而天口峻肝熱也

瀉肝目病門或小柴

胡湯傷寒門脈弦數

而口苦者膽虛也益

膽湯見下溫膽湯驚

悸門左尺脈洪數而

口鹹者腎經熱也大

補丸虛損門

補遺黃種散

川楝去皮一糸

細剉以米醋浸一

二箇時啗之即愈

補遺柳花散 治口

古瘡

玄胡索一刃

川黃柏去粗皮

黃連各半刃

而治之无有不安者也

脈法

經曰左寸洪數心熱苦 右寸浮數肺熱口辛

左關弦數而虛胆虛口苦甚洪而突肝熱口酸

右關沉突脾脊有突熱口甘並洪數者口瘡或為重

舌木舌脈虛者中氣不足口瘡若服涼藥不愈宜理

中湯

方法

丹溪曰脾熱口甘三黃丸主之

○三黃丸煎治五勞七傷消渴不生肌肉

黃芩春四夏秋 黃連春四夏五 大黃春三秋夏

石三味煉蜜為丸如梧桐子大每服五丸末知加至

七九日三服一月病愈久服行及奔馬數按此方世罕也

○熱口苦謀慮不決所致小柴胡湯加麥門冬酸棗仁

地骨皮遠志煎服

○益膽湯 治謀慮不決肝胆虛氣上溢則口苦証

黃芩去根 甘草炙 人參各 官桂半糸

苦參 茯神各一分 遠志取肉去

右細切作一服水一盞半煎一盞去粗溫服

○柴胡地骨皮湯 治膀胱移熱於小腸腸腸不便工

為口糜生瘡潰爛心胃壅熱水穀不化等証

柴胡去芦 地骨皮各等分

右細切每服五錢水一盞半至一盞食後溫服如病

人大段突者加大黃朴硝以利

○治口瘡用西瓜漿水徐徐飲之无瓜時以瓜皮燒灰之

○又方細辛黃柏炒各等分為末搽舌上吐涎乃愈

青黑 蜜陀僧 各二承

木之類擦

補遺水藥丸 治口

舌生瘡

礪砂 黃栢

薄荷等分片腦

木之生蜜九如彈

子大每一九噙化

補遺清神湯 治口

舌瘡及咽中瘡

桔梗去芦二刀

甘草炙一兩半

防風去芦半刀

只故炒二承半

水煎三錢服

補遺瘡藥散

治口瘡疼痛

五味子一兩

黃栢去皮蜜炒

滑石研各半兩

右為末每服五分

乾搽瘡上良久便

可飲食

補遺黃丹散 治蒲

口瘡爛

黃丹 蜂蜜

等分去麤齧內蒸

一伏時趁熱刮上

補遺慈苳仁湯 治

○又方用焰砂鵬砂含口勿開外以南星為末醋調貼足

心湧潔冗上神効

○又方用好酒煮黃連成汁呷下即愈

○又方用五倍子一兩黃栢蜜炙滑石各半兩銅綠半兩

射香一字為末搽之極効

○凡口瘡服涼藥不愈者乃中氣不足虛火泛上无制用

理中湯及治之而愈甚者加附子或用官桂嚙之亦妙

○又方 治赤口瘡

白礬 沒藥

白礬 沒藥

沒藥

乳香

銅綠

右為細末搽之

○又方 治白口瘡

雄黃 沒藥

乳香 輕粉

巴豆霜

右為細末搽之

治宮熱口中生瘡用 涼膈散 并枯湯皆効

○一 小兒口瘡不下食眾以狐惑治之必死後以糞湯

於脚上浸半日頓寬更以黃栢蜜炒蠶蚕炒為末付

之而愈

又方治唇紫燥裂生瘡用青皮燒灰付之立愈

又方治唇紫以皮紙撫於刀上薰取瀝付立効

又方治口瘡用野薔薇花根煎湯漱之根并汁付之

又方治口內生瘡用

明礬 黃丹 射香 白梅 人中白 綠

右為細末乾搽口內甚者加鵬砂半錢片腦一分

○鵬砂散 治口舌生瘡及咽喉腫痛皆効

鵬砂 馬牙硝 活石 寒水石

白礬 各二承 片腦 二分

活石 寒水石

白礬 各二承 片腦 二分

風熱有脾唇口腫

動或結腫或為浮腫

慧苡仁炒防己

赤小豆 甘草

右等分每服八分

姜三片水煎食遠

溫服

### 唇舌病

舌忽然腫硬如石忽

血出如瀉急用黃散

補虛或經驗方見下

舌衄齒衄必勝散補

貴舌上執瘡陰陽散

右為細末每服半錢許食後新汲水調下

○碧璽 治口瘡及咽喉腫痛神效

蒲黃 青黛 鵬砂 煇硝 生甘草

各等分為細末付之咽喉腫痛管吹入

○升麻湯 治上膈壅毒口舌生瘡咽喉腫痛

甘草生用 升麻 赤芍藥 人參

桔梗 乾葛 各一兩

每服四錢水一鍾半姜五片煎八分溫服

○薄荷煎 治口舌生瘡痰涎壅塞咽喉腫痛

薄荷取頭末 川芎十兩取末 腦子半斤 砂仁半兩取末

右為末入腦子和勻煉蜜成劑任意點嚼和劑方無

腦子有桔梗

○天竺散 治臟腑積熱煩燥多局口舌生瘡咽喉腫痛

山梔子 去殼連殼 甘草 芩金 用皂角水煮熟

瓜蒌 六兩 芩金 片煎熟三分

右為細末每服一錢食後臨睡新汲水調下

○黃栢散 治重唇

黃栢 二兩 五倍子 三子 蜜陀僧 二子 甘草 少許

除黃栢三味為末水調塗黃栢上火炙乾再塗炙藥

末將黃栢剖成片貼唇上

○瀉黃飲子 治風熱蘊於脾經唇燥折裂口舌生瘡

白芷 升麻 枳殼 去白炒黃芩

防風 半夏 湯洗 石斛 各一兩 甘草 炙五分

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服

○祖傳經驗方活腫大塞口不通飲食者

真蒲黃 一味 頻刷舌上自退若能藥即以黃連一

補遺必勝散 治舌

右為末付舌上血

止腫消

腫硬血出如湧泉

蒲黃炒 烏賊骨

去殼等分

補遺必勝散 治舌

補黃妙 經青

等分末之擦出血

灰少時盪湯漱之

補遺陰陽散 治舌

上熱瘡

乾麥 黃連

末之乾擦舌上

補遺綠雲散 治舌

瘡爛臭久不愈

黃柏 蜜炙五分

青黛 一分

末之臨睡少許擦

舌上

味煎濃汁細細呷之以瀉心經之火則愈

○丹溪活套云肝膽有實熱令人口酸而苦小柴胡湯加

甘草龍胆青皮之類甚者當歸龍會丸若謀慮不決

肝胆虛而苦者人參遠志茯神甘草為君柴胡草龍

胆為佐使甚者錢氏地黃丸虛者補其母也○心熱

而口苦或口舌生瘡黃連瀉心湯牛黃清心丸涼膈

散之類○脾熱而口甘者三黃丸平胃散之類○肺

熱而口辛者其桔湯瀉白散金沸草散之類○腎熱

而口鹹者滋腎丸大補陰丸滋陰大補丸之類

### 咽喉指南

#### 陽症

單蛾風者其形圓如小筋頭生於咽喉或左或右雙蛾風兩箇生於喉間在閉上者可治用鋒快麥葉刀做成一筆頭內只說以筆點藥喉蛾上用筆刀者實刺破妙也先服清咽抑火湯後服三參飲子次用礪

### 咽喉門

論

內經曰一陰一陽結謂之喉痺王註謂一陰即厥陰肝與胞絡是也一陽即少陽胆與三焦是也四經皆有相火存焉子和曰胆與三焦尋火治肝和胞絡都無異東垣曰火與元氣不兩立一勝則一負蓋元氣一虛則相火隨起而喉痺苛暴病作矣夫喉之為會厭者經謂之吸門是也以其司呼吸主升降為人身繫關之橐籥門戶也若夫卒然腫痛水漿不入言語不通死在頃臾誠可驚駭其會厭之兩傍腫者俗謂之雙乳蛾湯治會厭之一邊腫者俗謂之單乳蛾難治古方通謂之喉痺皆相火之所衝逆耳經曰一水不能勝二火又曰一水不

砂散吹之或二聖散  
並補遺或奪命丹

餘在開下者不見難  
治用苦管削尖快令

病人含水一口從鼻  
孔手於苦管進擊一

下出血妙舌下再生  
一舌者俗名重舌此

蟬舌風也如聖金錠  
附餘牙斷上腫盛聚

毒成癆此名牙蠅風  
也牛旁子散附餘其

舌腫大如煮猪舌不  
能轉動此木舌風也

碧玉丸或奪命丹並  
附餘舌上腫痛黃色

此舌黃風也其露內  
消丸附餘口如魚吸

水者此魚風也不治  
喉痺聚毒噎啞稠突

而發寒熱此寒喉風  
也利膈湯或通關散

並附絲上腫腫水食  
不下形如鷄卵此懸

蟻蠱毒風也吹喉散  
或雄黃解毒丸並附

餘或食鯉鱉慈物口  
中發泡此捨食風也

用針出血即消腫煩  
結腫牙盡處腫破此

能勝五火甚言其真水之易虧而相火之易動也如大  
怒則火起於肝房勞則火起於腎飲食失節則火起于

脾胃之類是故知火者痰之本痰者火之標火性急速  
故病發則暴悍治之之法必先大湧其痰或以鉞鍼刺

其腫處此急則治標之法也用藥者必須以內經從治  
之法而以桔梗甘草玄參升麻防風羌活荆芥人參白

朮茯苓之類少加乾姜附子等藥為嚮道徐上類與不  
可頓服此為治之大法也初不可驟服寒涼之藥非徒

無益而且促其死耳俗人未識此理而峻用芬連枝栢  
之類而正治之又甚者裸進以大寒草藥頗與頓服但

竟腫勢稍退語言畧通而醫者病者皆為獲効而喜殊  
不知上熱未除中寒復生其毒氣乘虛而入腹漸而至

於發喘不休不可治矣良可嘆哉外有天行一種名曰  
大頭病俗呼為捏頸噎其証甚為凶惡染此者十死八

九宜推運氣治之治法亦不甚相遠也東垣普濟消毒  
飲子甚妙實為百發百中之劑學者再宜詳究而擴克

之務活人於斯世也幸甚

脈法  
兩寸脈浮洪而溢者喉痺也 脈微而伏者死

丹溪曰喉痺多屬痰宜用吐法或只以桐油燈脚用鵝  
翎探吐之病輕者新取園中李實根嚼之更研水於

項上付之

盧氏曰按本草蠶矢根即馬蘭草根也龍骨治喉痺  
此方多有之也又曰園中李實根未知孰是

○纏喉風屬痰熱亦宜吐之  
○又方用遠志去心為末水調付項上

獵類風也牛蒡子散  
附餘風自願纏繞赤

色寒熱喉閉卒然失  
音牙關緊急不醒人

事喉涎壅盛此纏喉  
風也解毒雄黃丸或

一字散並附餘或桔  
梗湯見下口內滿喉

赤如猪肝張口吐物  
則氣逆閉閉飲食不

能此松子風也通氣  
湯附餘自舌下牙斷

上睡赤口內如湯熱  
牙斷漸爛亦能脫齒

此崩砂其口風也射  
下湯附餘自舌下起

初一箇又起一箇而  
其者至三五七箇此

連珠風也普濟消毒  
散子瘟疫門臉腮上

生毒痒爛或在喉閉  
舌下作瘡其色黃如

蜂此蜂子毒也射香  
珠砂丸附餘頸項結

核五七箇皮疔赤腫  
作疔執此瘰癧風也

馬兜鈴黃荆燒灰煎  
膏敷頭上即愈或破

結散瘡湯門  
補遺清因抑火湯

○又方用燈心草燒灰吹入喉中  
○一方治咽喉腫痛

荆芥穗 當歸身 桔梗 甘草 各等分  
右細切水煎放溫漱而服之有熱加黃芩枳殼宜刺

少商出血立愈  
○又方治喉乾燥痛用四物湯加桔梗荆芥黃柏知母

立已  
○又方治喉瘡痛者多屬虛火遊行無制用人參黃柏

蜜荆芥 虛火用人參竹瀝血虛用四物湯加竹瀝  
○又方治黃瘡即根搗刺入好酒少許研汁滴入喉中

○又方以燈籠草炒焦為末酒調付喉中  
○又方以燈籠草炒焦為末姜汁蜜調噙化

○又方以燈籠草炒焦為末姜汁蜜調噙化  
○又方以燈籠草炒焦為末姜汁蜜調噙化

微甚故也微而輕者可以緩治重而急者惟用此  
刺血最為上策

○通關飲 治喉痺腫痛不能語言者但可進藥無不  
不愈者此從治之法也一方有黍粘子無白木茯苓

人參 白木 茯苓 炙甘草 錢  
桔梗 去葉 防風 去葉 荆芥 錢

乾姜 炮 五 或加附子 炮 五分

右為細切作一服水二盞七分徐徐與之  
○又方治喉痺用鴨嘴膽三分或半錢吹入喉中吐

痰愈  
○普濟消毒散子治天行喉痛等証方見瘟疫門

○桔梗湯 治咽喉微覺腫痛聲破難語

黃柏五分 桔梗

連翹各一禾五分

生甘草 薄荷葉

各七分 防風

知母 片苓

牛蒡子 炒黃連

玄參 旋子

大黃 朴硝各

一錢 確臨時煎

右水煎更初熱服

再與食後少頃服

之間有生過楊梅

瘡者加硬飯二兩

服過前劑多不效

再不可服 確藥乃

是皆虛寒於肺也

宜服後飲

補遺三參飲子

沙參 人參

玄參 知母

黃芪 當歸

黃柏酒炒 金銀花

白芍藥 天門冬

麥門冬 去心各錢

北五味 十一粒

生甘草 五分

水煎食後溫服

補遺 硼砂散

硼砂 飛過一錢

真輕粉 五分

當歸身

麻黃 去節五分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○又治喉痺方新取青艾葉杵汁灌入喉中即愈

○又方用蛇床子於有嘴甌中燒令病者以甌嘴布口中

吸煙入喉內立愈

吹喉散 治咽喉一切腫痛

朴硝二錢 半銅青一錢 輕粉五分 青代火

巴豆七粒 去壳 綠礬半兩 別用青魚胆一個

右將胆礬同巴豆肉於銅鈔內飛過去巴豆合朴硝

已下四味再加射香少許研勻每用一字吹入喉中

吐山痰血立愈

○聖煙同 治喉痺單麻子取肉碎紙卷作筒燒煙吸

○奪命丹 治喉痺用醋水吞服

紫荷車 蜜陀僧 各半 砂仁 管竹

羌蠶直者 烏魚骨 茯苓 各一錢 射香 少許

右為細末麪糊為丸如彈子大陰乾用一九無根水

浸一時類食一九作二服神効

○如聖金錠 治乳鵝結喉木舌重舌

硫黃細研 川芎 煨茶 薄荷葉

川烏炮 硝石 生地黄 等分

末之用生葱汁搜和為錠每用一錠先以凉水灌漱

次可嚼薄荷葉七八片却用藥同嚼極爛以井花水

蘸下甚者連進三服併含之

○十莖子散 治風熱上壅咽喉腫痛生乳鵝

牛蒡子 研 玄參 升麻 桔梗

餘

因

因

因

五倍 煨存性三分

冰片 半分

右研勻先以甘草湯漱口以長筒管吹前未凉

補遺三聖散 治癰

喉風急喉痺

膽礬 二錢半

白僵蚕 炒去絲半

末之少許吹入喉

中

**陰症**

瘡疔病更為興及及

脈微細而沉自汗咽

痛不利名腎傷寒等

夏桂耳湯補遺或苦

酒湯腫脹門臟寒喉

閉吞吐不利用大附

子一個去皮臍切作

大片蜜茶亥含黃每

含一片嚙汁并味盡

再易一片甚效

補遺半夏桂耳湯

半夏 桂枝

甘草等分姜煎服

**痰症**

犀角

黃芩

木通

甘草

每服半錢生薑三片煎徐心細嚙服

附○碧玉丸 治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不

下或生瘡癰重舌木舌並宜服之

青黛

益硝

蒲黃

甘草 未各

右同研勻用沙糖為丸每兩作五十九丸每服一九陰

化或用乾藥末按咽喉膈內亦好

附○甘露內消丸 治咽喉腫痛口舌生瘡

薄荷葉 一兩 川芎 二錢 桔梗 去芦頭 人參

甘草 錢 柯子 各五分

右為細末煉蜜為丸如皂角子大朱砂為衣每服一

丸嚙化下無特

雞蘇葉

荆芥穗

防風

人參

牛旁子 燻紙

甘草 各一兩

右為細末每服一錢沸湯點服如咽痛口瘡甚者加

姜蚕一兩

附○吹喉散 治咽喉腫痛急慢喉閉懸癰乳鴉燕物不

胆礬 一錢

白礬 半錢

牛旁子

甘草

薄荷 各五

黃芩

酒浸一宿曬乾訶子 一兩醋浸一宿去核曬乾

右為末先用好生薑擦舌上每用藥一錢管吹入

喉中吐出涎痰便用熱茶喫下打吹第二次便用熱

粥三次再吹用熱茶或熱粥乘熱食之加朴硝末少

許如白舌生瘡用藥吹之口中立去痰涎為妙

附○解毒雄黃丸

治纏喉風急喉風雙蛾腫痛湯藥不

雄黃 一兩

巴苳

去油一王金 一錢

附○雄黃丸

巴苳 去油一王金 一錢

喉風喉痺及一應

喉症牙關緊急痰涎

壅盛者必用吐法

去痰即寬用珠子草

一名猪鬃草俗名五

爪龍草取根搗入陳

米醋調灌下用皂角

桐油鵝翎探吐一切

喉風急症腫塞水漿

不下危急干兩金丸

補遺吐後服加味甘

桔湯補遺

補遺干兩金丸

銅青 大黃

牙硝各五錢木之

以白狗肉搗爛和

作十九新綿裹嚙

化有頑涎吐出

補遺加味甘桔湯

治一切喉症

生甘草 薄荷葉

各七分 桔梗去

芦三錢 玄參和

貝母一錢五分

知母去毛一錢

右水一鍾煎至七

分慢上少嚙之温

服

未之醋糊丸如菘且大熱茶湯下七丸吐出頑涎即

甦大效口禁以物斡開灌之

附○通氣湯 治喉痺疼痛水漿不下痰涎壅盛

牽牛頭末一兩 鼠粘子二錢 防風分半 枳殼分半

甘草半生用

右為細末每服三錢沸湯點服

附○射干湯 治咽喉因風熱腫痛

馬牙硝三錢 馬勃三錢

水煎七錢服

附○射香珠黃丸 治咽喉腫閉或出瘡或舌根腫痛

馬蹄硝七錢 鉛白霜 龍腦各三 硼砂二兩

寒水石燒 射香二錢 硃砂半兩 甘草熟

細末甘草膏和丸桐子大珠砂為衣含化一二丸

附○通關散 治驚風搐搦閉不通

南星錢一 射一字 猪牙皂用律 僵蚕炒一錢

右將赤蜈蚣一條炙同上為末以手點姜汁蘸

附○一字散 治時氣纏喉風牙關緊急不省人事

枯白礬 梨芦 雄黃 蝎稍 猪牙皂角

等分末之每服一且大鼻內搯之立効

附○祖傳經驗秘方 治喉痺神効

馬蘭菊 五介龍草 車前草俗名蝦

右以三味杵汁徐徐飲之

又方治喉痺及喉中熱痛等証用上好消梨杵汁頻上

飲之如患者能自嚼嚙下亦可多食為良大解熱毒

惟金瘡產婦及諸脫血証不可食以其破血故也其

餘一應癰疽發背等証多食極妙

齒病指南

風寒

牙痛之在其人腸胃素  
素有濕熱上出於牙  
齦之間適被風寒或  
飲冷所鬱則濕熱不  
得外達故作痛也寒  
是標也藥宜辛溫以  
散寒開鬱羌活散或  
草薢散並見下或消  
風定痛散補遺大寒  
犯腦連齒痛者白芷  
散附餘或元戎桐栝

廣濟虛齒黑爛腫痛  
安骨丸或牢牙散並  
補遺

補遺消風定痛散

治牙齒疼痛風熱

攻注齶肉腫悶

荆芥四白芷

防風 細辛

全蝎 升麻

川芎各二分

膽礬二分 朴硝

青黛各八分

右為末每用一指  
蘸藥擦於牙上噙

齒病門

論

內經曰百病之起有生於本者有生於標者夫齒者賢  
之標骨之餘也足陽明胃之脉貫絡於齒上巔手陽明  
大腸之脉貫絡於齒下齦手陽明惡寒飲而喜熱飲足  
陽明惡熱飲而喜寒飲故其為痛有惡寒惡熱之不同  
也有開口呬風則痛甚者腸胃中有風邪也有開口則  
穢臭不可近者腸胃中有積熱也或謂痛而齒動搖或  
謂痛而重侵蝕又有齒縫疎豁飲食不便者此是也  
大抵齒巔宜露而動搖者腎元虛也治宜滋陰補腎為  
要槽寒惡熱而口臭穢者胃氣熱也治宜安胃瀉火為  
良其所謂風邪重蝕之証蓋因熱生風而風生虫也腸  
胃之火愈平更加以擦牙誅虫之藥以治其本則不  
不安之理也學者詳之

脉法

右寸關脉洪數或弦而洪腸胃中有風熱齒痛

尺脉洪大而虛者腎虛主齒動搖踈豁相火上炎而痛

方法

丹溪曰牙疼或出血屬熱胃中有熱有風寒有重有濕

執實熱腰痛調胃承氣加黃連又用升麻白芷防風

荆芥薄荷甘草桔梗之類外用梧桐淚射香擦之

灸法上引痛灸足三里二穴在足陽明經膝下三寸脘胃

下引痛灸手三間二穴在手大指次指本節後內側

○治重牙痛用韭菜子以黃蠟包之外以瓦片燒紅將

子蠟丸置為其上又別糊一紙袋如巨螺樣上以小

半時有津吐出

補遺元戎桐栝淚散

治陽明風熱齒齦

攻注腫痛煩悶

桐栝淚 石膽礬

黃礬 蘆花

升麻各半兩

硃砂 細辛

當歸 川芎

牛膝各二兩半

亂髮灰 麝香各

一分

末之先以甘草湯

漱口後用藥付之

常用擦牙甚妙

補遺姜黃散 治牙

疼不可忍

姜黃 細辛

白芷等分

末之擦患處須臾

吐涎溢湯漱口

補遺安骨丸 治骨

虛牙齒腫痛

肉發容酒浸

桃仁 去皮尖炒

補骨脂炒白木

懷山藥 石斛

白茯苓炒去刺

川烏去皮臍

巴戟去皮心

竹管為袋嘴將袋覆於蠟丸上以竹管柱於齒齦中

接烟薰之其虫即死而愈

治走馬牙疳方其效如神

乾姜

南棗各燒

枯白礬

右件各等分為末付之即愈

小兒走馬牙疳床一齊腐爛即死此方神效

婦人尿桶中白垢火煨一錢入銅綠三分射香一分

半付之立愈

射香散

治熱多寒少齒齦露肉脫血出牙動款落

熟地黃二分

益智仁二分當歸身

生地黄

酒浸防已

人參各五分

升麻一分

麻黃根

黃連

射香少許

草豆蔻

右為末先用溫水漱口

草豆蔻散 治寒多熱少牙齒疼痛

細辛葉

防風各二分

羊脛骨灰

當歸六分

草豆蔻

黃連各一分

升麻二分

右為細末如前法擦之

熟活散

治客寒犯腦及風寒凌襲腦痛頸筋急牙齒

痛動掙肉齦袒脫疼痛

藁本

香白芷

桂枝各三分

蒼朮

升麻各五

當歸身各六分

草豆蔻

熟活

錢

防風各三分

柴胡五分

細辛少許

麻黃去根即

右為細末如前法擦之立愈

白芷散

升麻一分

石膏一分

射香

羊脛骨灰

白芷七分

升麻一分

石膏一分

射香

羊脛骨灰

川薑解等分

末之煉蜜為丸梧

子大每服七十九

鹽湯下

補遺牢牙散 注類

補骨牢牙固齒

北細辛 去土

青鹽 各七糸

川當歸 酒洗

川芎 各一兩

末之每用少許早

晨擦牙漱滿口連

藥燕之

濕熱

士節齋曰牙床腫痛

齒動搖或黑爛脫

落世人皆作腎虛治

殊不知此屬陽明濕

熱蓋齒雖屬腎而生

於牙床上下床屬陽

明大腸與胃枕木生

於土也腸胃傷於美

酒厚味膏粱其滑之

物以致濕熱上攻則

牙床不清而為腫為

痛或出血或生虫由

是齒不得安而動搖

黑爛脫落也治宜瀉

陽明之濕熱則牙床

右為細末如前法擦之立効

獨聖散 治一切牙痛風疳等証

北地蒺藜 不拘多

右為細末每用刷牙以熱漿水漱牙外塵末敷漿水

刷牙大有神効

立効散 治牙齒痛不可忍微惡寒飲大惡寒飲其

脈上中下三部陰盛陽虛是五藏內盛六府陽道脉

微小小便滑數

細辛 炙甘草 升麻 防風 各一兩 酒洗

右為細末切一服水一盞煎至七分去粗以匙抄在

口中嚼痛處待少時則止 如多惡熱飲更加草龍

胆一錢此法不定隨寒熱多少臨加減 若更惡風

作痛加荳蔻黃連各五分勿加草龍胆

牢牙散 治牙齦肉綻有根牙動牙痛

落牙齒不長牙黃口臭

羌活 一兩 草龍胆 酒洗 羊脛骨灰 二兩 麻黃 四兩

右為細末臨卧時貼牙齦上

清胃散 治因服熱藥或食辛熱之物致使上下牙

疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛足陽明之別

絡入腦喜寒惡熱乃是手陽明經中熱盛而作也其

齒喜冷惡熱

當歸身 黃連 酒洗 生地 酒制 牡丹皮 升麻 各一兩

右為細末作一服水一盞半煎至二盞瀝去粗帶

神功丸 治多食肉人口臭不可近牙齒疳腫牙齦

肉將脫牙齒落血不止

當歸身 藿香葉 木香 各一兩 升麻 一兩 生地 酒洗

清寧而齒自然安固  
矣獨活散附餘因服  
熱藥上下齒疼不可  
忍引頭腦痛兩面發  
熱喜寒惡熱清胃散  
見下陽明受風引煙  
熏之挽煩煩車連口  
唇腫痛犀角升麻湯  
補遺齒斷出血口氣  
乃胃熱也用黃荆瀝  
姜汁時含見下或涼  
隔散加石膏知母升  
麻火熱門出牙天仙  
子燒煙竹管抵牙引  
煙熏之或砂糖丸塞

補遺風蛀牙痛腮頰  
浮腫細辛散或玉池  
散並附餘或立效散  
補遺牙齒研蝕肉縱  
動搖欲落東垣牢牙  
散或麝香散或神功  
丸並見下走馬牙疳  
姜棗白礬丹或人中  
白散並見下  
補遺犀角升麻湯  
犀角七水半  
升麻五水 防風  
羌活各五水半  
川芎 白芷  
黃芩 白附子

甘草絡 三宿砂仁 黃連酒洗 蘭香葉如无藿香代之一分  
右共為細末湯浸蒸餅為丸如菜豆大每服一百丸  
或加至二百丸止白湯下食遠服○此藥兼治血痢  
及血崩及血下不止血下褐色或紫色或黑色及腸  
癖下血空心服米湯下其脉洪大而緩者及治麻木  
血氣上衝逆氣上行夜聞夜見者皆效  
○白芷散 大寒犯腦牙痛  
羌活 八分 麻黃 草豆蔻五分 黃芪  
升麻 吳茱萸 白芷四分 當歸  
熟苧五分 薑木三分 桂枝二分半  
末之水漱淨擦之  
○獨活散 治陽明經不利邪毒攻注牙齒斷內腫浮  
宣露腿下動搖發痛清頭目發散風熱

川芎 獨活 羌活  
細辛七分 薄荷 生地黃 荆芥各一分  
水煎食後溫服日進三兩服愈  
○細辛散 治風蛀牙疼腮頰腫脹  
荆芥穗 細辛各一分 砂仁半兩 白芷 紅川椒  
草烏各二兩 鶴虱 華擦各半 猪牙皂角半兩  
右為細末少許頻擦患處  
○玉池散 治風蛀牙疼腫痒動搖潰爛宣露出血氣  
附餘  
地骨皮 白芷 升麻 防風 細辛去土  
川芎 槐花 當歸 藁本 甘草各等分  
右末每用一字措之痛甚取二錢水一鍾半黑豆半  
合姜三片煎服  
○祖傳經驗秘方 治胃有實熱齒痛或上牙痛老其者

水泡各二升半

甘草一升半

每服七升水煎食

後漱服

補遺砂糖丸

礪石灰不拘多少

末之砂糖和丸如

米粒大塞蛙孔中

補遺立效散

露蜂房炒黃

川椒炒出汗

青鹽等分

末之水煎數沸熱

漱即止

用涼膈散以大黄酒蒸為君加知母石羔升麻為佐

類類含嚙即愈

○又方 治胃執齒痛口臭穢不可近者用大黃荆條一

二十升於火上煮漚入姜汁六分之一時上含執

○又擦牙止痛方

用黃蠶蜂窠一箇以川椒填滿其竅更以白塩一錢

封口燒存性入香白芷羊脛骨灰各一錢同研為細

末先以清茶漱口淨然後以此藥擦之及付痛處如

有虫蛀孔作痛以小許塞於孔中立愈

○又灸法亦妙

列缺二穴在手大陰肺經與陽明經相連又手取穴

中指盡處又看其浮脉寸口之間灸七壯其痛立止

永不月發

### 鼻病指南

#### 鼻塞

外感風寒鼻塞聲重

脉浮有表症參蘇飲

傷寒門內火熾盛上

乾肺金肺受風熱鼻

塞聲重失音脉浮而

數風熱壅盛故也防

風通聖散 中風門頭

腦項被風或夜臥不

慎護以致鼻塞不聞

香臭通草膏附餘或

麗澤通氣湯或温肺

### 鼻病門

論

內經曰西方白色入通於肺開竅于鼻又曰鼻者肺之

外候丹溪曰肺之為藏其位高其體脆性惡寒又惡熱

是故好飲熱酒者始則傷于肺藏鬱熱久則見於外而

為鼻齋准赤之候得熱愈紅得寒則黑此謂熱極是水

之象亢則害承迺制也其或觸冒風寒始則傷于皮毛

而成鼻塞不通之候或為濁涕或流清汁久而不已名

曰鼻淵此為外寒束內熱之証也原病式曰肺熱則出

涕是也又有膽移熱於腦則為辛頰鼻淵鼻中濁涕如

湧泉不滲而下久而不已則為鼻衄血衄血塞肉鼻癢等

証醫者宜各以類推而治之無忽也

証醫者宜各以類推而治之無忽也

湯或禦寒湯並見下

### 鼻瘡癰

鼻中生瘡辛夷為末入腦麝少許綿裹塞鼻中或枇杷葉拭去毛煎湯調消風散附餘鼻癰有瘰肉不開香臭通草膏附餘鼻中瘰肉漸大名曰鼻痔內服清金丸外以海蛤丹貼之或其遂九塞之並補遺

補遺清金丸

交回冬 方氣

皂角刺 大黃

土木鱉 杏仁上

三味入酒少許等

分同研爛飯上蒸

一食 人參

黃芪 黃連

中苓 四味末和勻

同蒸

右末粥糊九一更

時白湯下九十忌

姜蒜椒辣

補遺海蛤丹

烏梅肉 五倍子

各五錢用水一碗

同煎成膏半盃

脉法

右寸脉浮洪而數為鼻呖鼻疏  
左寸脉浮緩為傷風鼻寒鼻涕

方法

丹溪曰鼻為肺之竅固心肺上病而不利也有寒有熱無的傷于皮毛氣不利而壅塞熱壅清道氣不宜通寒則表之麻黃桂枝之類熱則清之芩連枝子之類  
○面鼻紫黑面為陽中之陽鼻居面之中一身之血運到面鼻皆為至清至精之血多酒之人酒氣薰蒸面鼻得酒血為極熱熱血得寒汚濁凝結而不行故色紫黑治宜化滯血生新血四物加片芩酒炒紅花酒洗  
陳皮甘草生薑煎調五靈脂末服氣弱者加黃芪酒  
○又方用山流黃煎調乳香粉烏頭尖酥調付或用

胆礬付之

○又方用山梔為末蜜蠟丸如彈子大空心罈一丸白湯

○瓮鼻塞肉乃肺氣盛用枯礬研為末面脂綿裹塞鼻中

數日自消

○又方木通細辛附子炮蜜和綿裹塞鼻中又用防風通

聖散加荆三稜山茱萸肉海藻並用酒浸炒為末每

服一錢半酒調服之

○鼻淵膽移熱於腦則辛額鼻淵防風通聖散一兩加

薄荷黃連各二錢半水煎服

○宣明防風湯 治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已

必成衄血之疾

黃芩 人參 甘草 川芎

防風 兩半 麥門冬 一兩

同煎成膏半盃

薦蒼 胆蓉

枯蓉 輕粉各

一錢 水片

熊膽各五分

為末入膏內以薄

油紙包裹將油紙

攤膏抵鼻內痔上

日換一次忌厚味

戒色慾

補遺 甘遂丸

瓜蒂 甘遂各

二錢 枯蓉

螺青 草烏各

二錢半 末之麻

由和丸內鼻中痔

右為細末每服二錢沸湯調服食後服日三服

○麗澤通氣湯 治鼻不聞香臭

黃芪 八分 蒼木

防風 升麻 葛根 獨活

川椒 麻黃 冬月加白芷 各二分

右細切作一服加生姜三片寒二枚菘白三寸水二

盞煎至一盞食遠服忌一切冷物及風寒涼處坐卧

○溫肺湯 治鼻不聞香臭多眵淚

丁香 二分 防風 炙甘草 葛根

羌活 各半錢 升麻 黃芪 各半 麻黃 各半

○禦寒湯 治寒氣風邪傷于皮毛令鼻壅塞咳嗽上喘

黃連 黃柏 羌活 各三 炙甘草 白芷

佛耳草 款冬花 防風 升麻

陳皮 絡五 蒼木 七分 黃芪 一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服

○通草膏 治鼻內有息肉不知臭香

通草 附子 細辛 各等分

未之煉蜜丸綿裹內鼻中

○消風散 治一切風熱

荆芥穗 甘草 川芎 羌活

人參 茯苓 白僵蚕 防風

霍香 蟬退 陳皮 厚朴 姜製

右等分末之每服二錢荆芥湯或茶湯調下

○千金細辛膏 治鼻寒腦流清涕

黑附片 川椒 川芎 細辛

鼻辨翳

鼻中流水不止名鼻

翳千金細辛膏附餘

肺熱鼻塞流清水抑

金散附餘鼻翳不止

犀角地黃湯血症門

火盛者涼膈散加當

歸生地黃火熱門

鼻淵涕不止名曰

鼻淵辛夷荆芥散或

蒼耳散並附餘或防

鼻淵翳肉

風湯見下或防風通  
聖散中風門鼻中癰  
內田胃中食積熱痰  
流注故濁氣凝結而  
生也輕黃散經鼻中  
附餘

### 鼻瘡

夫鼻為肺之竅所以  
可嗅也鼻竅赤鼻也  
田飲酒血熱薰肺外  
遇風寒血凝不散而  
赤色亦有不飲自赤  
者肺風血熱故也四  
物湯如酒本酒前

入酒數滴調炒五靈  
脂末服虛損門或硫  
黃散補遺或白龍丸  
附餘一方用桐油木  
入黃連末及天吊藤  
燒灰存性調付甚效  
補遺硫黃散 治酒  
瘡鼻及女人鼻疥  
向上黑粉刺  
硫黃 輕粉  
薑黃各一錢  
杏仁四十去皮研  
末為末用杏仁和  
藥作餅狀時塗  
點鼻上早晚洗去

吳茱萸

乾姜一錢

桂心三錢

尖角屑錢七

右用猪脂

兩煎油先一宿用米醋浸藥取入猪油

內同煎以附子色黃為度用綿裹包塞鼻中

細辛

白芷

防風

羌活

當歸

半夏

川芎

桔梗

陳皮

茯苓等分

每服七錢加薄荷姜煎服

○辛荑荊芥散 治鼻淵

辛荑

荊芥

黃芩

酒炒

神麩

南星

半夏

蒼朮

白芷

等分白水煎食後時溫服

○蒼耳散 治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

蒼耳子炒

辛荑二碎

香白芷

薄荷等分

右為末每服三錢熱茶清下

○輕黃散 治鼻中瘰肉

杏仁去皮

輕粉各一錢

雄黃五分

射香少許

石研細末夜臥時以筋點一類米大許于鼻中

○白龍丸 治酒瘡鼻并滿面紫赤酒刺

川芎

藜蘆

細辛

白芷

甘草等分

右為末每四兩入煨石膏末一斤水丸逐日用此丸

未洗面如滌豆法更灑少特方用湯洗去

○祖傳經驗秘方 治鼻中時時流臭黃水甚者腦亦時

痛俗名控腦砂有虫食腦中用絲瓜藤近根三五尺

許燒存性為細末酒調服之即愈

○又方用治白牛毛根葉如白楊木葉焙乾為末吹入

中立愈

太醫院補遺真傳醫學源流首卷大成九卷終

### 血症指南

### 咳血

咳血者嗽而血出此  
出於肺經也茯苓補  
心湯補遺或雞蘇散  
或意苡仁散或東垣  
方並見下咳血成勞  
者黃芪散見下痰嗽  
吐血者紅花凡見下  
痰盛心熱是血虛也  
先服青黛散麥凡見  
下後服八物湯虛損  
門

### 血症門

論  
內經曰大怒則形氣絕而血死於上又曰怒則氣逆甚  
則吐血又曰陽明厥逆喘欬身熱善驚衄吐血又曰溫  
淫汗出為訕衄又曰脾移熱于肝則為驚衄胞移熱于  
膀胱則癢而溺血又曰結陰者便血一升再結二升三  
結三升又曰卧則血歸肝肝受血而能視一云目得無  
肺者蓋日為足受血而能步掌受血而能握指受血而  
能攝又曰心出血肝納血肺出氣腎納氣夫人身之氣  
血者精性之所依附並行不悖循環無端經曰一息不  
連則機絀窮一毫不續則穹壤判若夫暴喜傷心則氣

黃芪散見下  
茯苓補心湯  
雞蘇散  
意苡仁散  
東垣方

大醫院補遺真傳醫學源流首卷大成九卷終

補遺扶參補心湯

治心氣虛耗不能

藏血以致面色黃

瘁五心煩執咳嗽

唾血及婦人懷孕

惡阻嘔吐皆治

半夏湯泡七次

前胡 白茯苓

人參各七錢五分

枳殼炒紫蘇

甘草炙 桔梗

乾葛去粗皮

陳皮各五錢

白芍藥二兩

熟地黃一兩五錢

當歸一兩二錢

川芎七錢五分

每服五錢姜五片

棗一枚水一鍾煎

七分溫服

**咯血**

咯血痰中帶血痰咯

出於脊也鬱執盛咯

血或吐衄生地黃散

聖餅子 並見下咯血

及痰中血絲四物湯

加姜汁竹歷牛膝重

便青黛 蓋損門痰中

血橘紅清肺飲或天

緩而心不出血故肝無所受或暴怒傷肝則氣逆而肝

不納血故其血無所歸又苦勞過度以致陰火沸騰

血從火起故錯經而妄行也是以從肺而上溢于鼻者

曰衄血從胃而上溢于口者曰嘔血夫所謂咯血唾血

者出于腎也咳血嗽血者出于肺也又有痰帶血絲出

者或從腎或從肺來也其血出于小便者曰溺血曰血

淋出于大便者曰腸風痔血糞前來者曰近血糞後來

者曰遠血流結于腸胃之間而成積者曰血瘕血蠟大

抵血從下流者為順湯治血從上溢者為逆維治丹溪

曰口鼻出血皆是陽盛陰虛有升無降血隨氣上越出

上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經又曰諸見血為熱

証正經所謂知其要者一言而終不知其要者流散無

窮此之謂也

**脈法**

內經曰脈來如懸鉤為衄血常脈脈至而搏血衄身熱

者死腸澀下膿血脈弦絕則死滑大則生血溫身熱

者死

脈經曰脈得諸澁濡弱為亡血 脈來輕七在肌肉尺

中自浮目睛暈黃衄血未止

太陽脈大而浮必衄吐血 病人面無血色無寒熱

脈沉弦者衄也

脈浮弱手按之絕者下血煩欬者必吐血

脈極虛芤遲為清穀亡血失精

脈乳為失血 瀯為少血 脈弦而緊脇痛肝藏傷

主有瘀血 吐血唾血脈滑小弱者生實大者死

唾血脈堅強者死滑濡者生

門冬丸或阿膠柳桂方法

湯血補遺東垣方見

下虛嗽咯血太平丸

附餘勞瘵咯血詳勞

極門本條下凡畜血

在上喜忘犀角地黃

湯見下

補遺橘紅清肺飲

治痰中血

橘紅二錢半夏

人參各五分

青黛五分茯苓

枳殼炒 白木

桑白皮 桔梗

古黃芩各一錢

五才十五分

止早三分

薑三片水煎溫服

補遺天門冬丸止

咯血吐血潤肺止

嗽

天門冬 去心一兩

阿膠炒 甘草

杏仁炒 貝母

茯苓 各半兩

末之蜜丸彈子大

每服一丸噙化

補遺阿膠柳桂湯

治咯血

桑白皮 一錢半

丹溪曰口鼻血出皆是陰虛陽盛有升無降血隨氣上

越出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經

按此語雖見前論蓋一章之大旨故重以示學者

○一方用荊芥穗研服或用蘿蔔上半段杵汁服又以汁

滴入鼻竅中或炙大椎及啞門穴二三壯俱可止之

○本草衍義以萱草葉洗淨研汁一盞入生姜汁三分之

一細細呷之治大熱衄血

○吐血是火載火上錯經妄行脉必大而孔大則發熱若

一方用韭汁或見血逆行或吐血或唾血童便姜汁

磨入鬱金飲之其血自清如無鬱金以山茶花代之

一云用鬱金末以姜汁童便和好酒調服

○又方童便調姜附末服之

○又方童便二分酒一分抽側柏葉溫飲之

○吐血因有亦怒而得者經曰怒則氣逆甚則嘔血

○一方治吐血不止用乾姜炮為末童便調服

○山梔子最能清胃脫之血

○有先吐血後有痰者是陰虛火盛四物湯為主加痰火

藥若先吐痰而後血多者是積熱降痰火為急

○有暴吐紫血成塊者是熱傷血結于中上出為好用四

物湯加清熱等藥調之

○唾血鮮血隨出出于腎亦有痰血內積肺氣壅遏不能下

降用天門冬麥門冬知母貝母桔梗黃柏熟地黃遠

志或加乾姜

○咳血咳出痰盛心熱多是血虛用青黛瓜萎仁柯子

貝母海石山枝子為末姜汁蜜丸噙化嗽盛者加杏

半夏泡 知母

貝母 茯苓

生干 各一錢

陳皮一錢 桔梗

山梔子各八分

阿膠蛤粉炒

其草各七分

杏仁炒九個

柳桂四分即桂細

嫩稍也

右姜三片水煎服

**吐血**

吐血嘔全血也從胃

而上溢於口此火載

血上四物湯加山梔

童便姜汁竹瀝虛指

門或四生丸見下熱

熾者黃芩芍藥湯

疾門或雙荷散或涼

血生地黃湯並補遺

或空心吞五子益腎

丸或平順補陰丸並

虛損門夜服潤下抑

火丸傷寒門百發百

中探囊取物也或四

物湯加荊芥阿膠蒲

黃虛損門血鬱於經

絡清道閉滯犀角地

黃湯見下若暑毒攻

仁後以八物湯加減調理痰盛者宜更加涼藥

○咯血用姜汁童便青黛入血藥中用四物湯地黃膏牛

膝膏之類有咯血痰帶血絲出者同治但宜加痰藥

○舌上無故出血如線用槐花炒為末摻之一方用蒲黃

炒焦為末付之極妙

○大便下血有熱有虛熱用四物加炒山梔子升麻秦艽

阿膠虛用四物湯加乾姜炮升麻

○便血用白芷五倍子為丸服効

○便血有風和下隔者蓋風傷肝肝生血故也宜升提之

四物湯加防風荆芥升麻柴胡秦艽槐花條芩地榆

枳殼煎服

○有濕傷血者宜行溫濟熱蒼木白木黃連黃柏當歸川

芎藭藥地榆槐花水煎服之

○因積熱下血用蒼木陳皮各一兩半連翹九分

芩黃柏各七錢半炒為末生地黃膏丸服

○腸風下血一方用大黃煨桃仁去尖各三錢枳殼角

仁當歸黃柏荆芥穗枳殼各五錢蠟皮黃連以秦

芩梔角子各一兩

右為末麩糊為丸如梧桐子大每服五十九白湯送

下如鮮血下甚者棕枳灰蓮房灰各五錢

○九經血逆行或血腥或吐血唾血用韭汁服清

燥已上皆○人參飲子 治衄血

麥門冬 當歸身 甘草各一錢人參

黃芪各一錢半 白芍藥錢 五味子九枚

右細切作一服水一盞半前至一盞溫服

○痰涎雜血出于脾葛根黃芪芍藥黃連川歸沉香末

心嘔血吐散中暑

門谷吐血不止藕汁

散補遺初見血去多

三黃補血湯見下見

血後脾胃弱精神少

血不止參芪補血湯

或麥門冬飲並補遺

或生脉散暑門飲酒

傷胃吐衄者理中湯

加川芎乾葛傷寒門

補遺雙荷散治卒

暴吐血

藕節連鬚者七個

荷葉頂七個

右同鑿細水二

鍾前入分法洋油

服或研木蜜調下

補遺清血牛地黃湯

治吐血咯血

生地酒洗牡丹皮

茅根各二斤

扁柏葉三斤水煎

一沸後入衆藥

天門冬去心

片黃芩酒炒

川黃連酒炒

知母各一斤

黃柏酒炒五分

白芍七分犀角乳

汁磨臨服入藥

甘草水煎服

東○三黃補血湯

治吐血

黃芪

川歸

柴胡

熟地黃

川芎各半

生地黃

芍藥各三

牡丹皮

升麻各五

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

一方治痰嗽吐血

紅花

杏仁

去皮煎

紫葳茸

鹿茸各

木通各一

大黃

枇杷葉

拭去毛一兩

右為細末蜜丸如龍眼大噙化

東○黃芪散

治咳血成勞

黃芪

麥門冬

熟地黃

桔梗

白芍藥各一

甘草五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

東○一方

治痰帶血咳出

白木

川歸

芍藥

牡丹皮各

桃仁

麥門冬各五

右細切水一盞半煎至一盞去粗溫服

生濟

○雞蘇散

治勞傷肺經咳嗽有血

雞蘇

即薄荷

黃芪

生地黃

阿膠珠

具母

白茅根各一

桔梗

麥門冬

浦黃

炒黑

甘草各伍

右細切水煎溫服

東○薏苡仁散

治肺損嗽血

薏苡仁

不拘

右一味研為細末以豬肺一箇煮熟蘸藥食之

又方用猪心一箇竹刀批開入沉香末一錢重大半

右水一鍾煎至七分食遠溫服

補遺藕汁散 治吐血不止

生藕汁 大煎汁

生地黄汁各三合

生蜜半匙

右件藥汁調和令

勻每服一小鍾不

拘時服

補遺參芪補血湯

見血後脾胃弱精

神少血尚不止

人參 當歸身

白芍藥各一水

麥門冬 去心

甘草各五分

五味子十二个

玉金六分

水煎溫服

補遺麥門冬飲子

治脾胃虛弱精神

短少吐血吐血

人參 去芦 五味子

各五錢 麥門冬

當歸身各五分

作二服食後服

血

夏七箇入在中心紙包數重外以童子小便沃濕漫

火煨熟取去半夏吃之嗽血吐血皆効

丹 〇一方 治弱血山 拖子飲

拖子 不拘多少

右為細末水煎連粗服之

丹 〇一方用 小薊根 琥珀二味為末水煎服之蓋二物能

治下焦熱結血淋

〇小薊飲下焦熱結血淋

治弱血神効

生地黄 四分 小薊根

蒲黃 炒 淡竹葉

山拖子 炒 黑甘草 七

右細切作一服水二盞前茶一盞去粗溫服

丹 〇一方治弱血用五苓散合四物湯

丹 〇九用血藥不可單行單止又不可純用寒涼藥必加

辛溫升藥如加涼藥用酒煮酒炒之類乃寒因熱用

之法也

方 〇一方 治小兒栗血用甘草升麻煎湯調益元散

方 〇犀角地黃湯 治衄血及吐紅

犀角 鎊 赤芍藥 牡丹皮 生地黄 錢一

右細末作一服水煎食後服

方 〇四生丸 治吐血衄血陽乘於陰血熱妄行

生荷葉 生艾葉 生地黄 生側柏葉

右各等分細研為丸如彈子大每服一丸水煎或塩

湯下化

丹 〇聖餅子 治咯血

丹 〇聖餅子 治咯血

丹 〇聖餅子 治咯血

丹 〇聖餅子 治咯血

衄血者鼻中出血從

肺而上溢於鼻也亦

火載血上宜涼血行

血為主涼血生地黃

湯加山梔子二錢煎

參一錢玄參一錢見

下衄血不止龍骨散

或麝香散或犀角地

黃湯加鬱金並見下

或黃芩芍藥湯痢疾

門或止衄散或芎附

飲並補遺衄血無時

苦梅丸補遺久不止

者清肺飲補遺

青黛一升 本二十四夜以黃芪煎火炒黃色

右研杏仁細入青黛捏作餅子用時以柿餅一箇破

開以藥餅置於柿中合宜濕紙炮包煨連柿研細米調

東○地榆湯 治結陰便血不止漸而極多

地榆四錢 生甘草一錢 炙甘草一錢 確砂七枚

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

東○結陰丹 治結陰腸風藏毒下血等証

枳殼 威靈仙 黃芪 陳皮

樗根及 何首烏 荆芥穗各等

右細末酒糊為丸如梧桐子大每服五七十九清米

飲入醋少許送下

○椿皮散 治血痢及腸風下血神驗

樗根白皮二槐角仁四 椿白皮二 炙甘草一兩

右為細末每服一錢酒下

○烏梅丸 治大便下血如神

疆蚕一兩 烏梅肉半兩

右為細末醋糊為丸醋湯下三五十九空心服

○槐花散 治腸風藏毒下血

槐花炒 側柏葉 荆芥穗 枳殼炒

右各等分為末每服二錢空心米飲調下

東○加減四物湯 治腸風下血

側柏葉 生地黃 當歸 川芎各八

枳殼炒 荆芥穗 槐花炒 甘草各

地榆 條黃芪 防風各六 烏梅大者

右細切作一服加生姜三片煎至一盞去粗空心服

東○當歸和血湯 治腸澼濕毒下血

當歸 芍藥 生地黃 川芎 枳殼 槐花 烏梅

右各等分為末每服二錢空心米飲調下

東○當歸和血湯 治腸澼濕毒下血

當歸 芍藥 生地黃 川芎 枳殼 槐花 烏梅

右各等分為末每服二錢空心米飲調下

東○當歸和血湯 治腸澼濕毒下血

當歸 芍藥 生地黃 川芎 枳殼 槐花 烏梅

而不效者以其血之所藏無以養也夫心主血肝藏血此方用川芎所以和血通肝而使血歸於肝臟也用香附所以開鬱行氣而使火散經絡也血歸火散何病之不止哉

補遺黃梅丸 治明

血無時發者服此即愈

烏梅肉 炒乾半兩

茜根草 艾葉各

一兩

右為極細末煉蜜

丸如梧桐子大每

服三十九丸烏梅煎

湯下

補遺清肺飲 治血

血吐血久不愈者

五味子 十箇

綿黃芪 二斤

麥門冬 去心

川當歸 用身

清河參 去芦

生地黃 各五分

右作一服水二鍾

煎三鍾去滓食後

槐花 炒

川芎 四分

右為細末每服三錢清米飲調下

○枳殼散 枳殼曰血清而色鮮者腸風血濁而黯者為臟毒 薑前來者為近血薑後來者為遠血此藥並皆治之

枳殼 十兩 麩

甘草 三斤 炙

右為細末每服一錢空心米飲調送下

○酒煮黃連丸

黃連 二兩 去鬚

好酒 五升

右將黃連細切以銀石器盛酒煮黃待乾盡為度焙

乾為末麩糊為丸如梧桐子大每服三十九空心服

○秘方枳殼湯

枳殼 一兩 麩

治大便秘結下血

右二味量水煎服

○槐角丸

槐角 二兩 炒

地榆

黃芩

當歸

防風

右等分為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九

空心清水飲送

○升陽去熱和血湯 治腸澀下血另作一派其唧唧

然出者有力而遠四散如筋腸腹中作痛熱毒所作

陳皮 二

熟地黃

當歸身

蒼朮

秦艽

肉桂 各三

生地黃 五分

牡丹皮 五分

生甘草 五分

升麻 七分

炙甘草

黃芪 各一

白芍藥 半

右細切作一服水二盞煎至一盞食前稍熱服

○生地黃散

治鬱熱衄血咯血吐血等証

温服用三稜針氣  
街出血立愈

**溺血**

溺血小便中出血亦  
陰虛之甚強力房勞  
之致涌黃散補虛涼

血生地黄湯加川牛  
膝一錢木瓜七分條  
芩荊芥穗地榆黃柏

每貼用人參三錢空  
心服吐血條下或補

陰丸或四物湯加牛  
膝膏並虛損門虛甚

末空心服下隨約重

便半鍾突者用當歸  
承氣湯下之傷寒門

後以四物湯加山梔  
小蘗琥珀治之虛損

門或山梔子飲見下

小兒尿血甘草升麻  
煎湯調益元散痢疾

門婦人小便出血當  
歸散補遺老人尿血

六味地黄丸虛損門  
血淋莖中小便痛者

小蘗琥珀散或小蘗  
飲並見下

補遺蒲黃散治溺

枸杞子

柴胡

黃連

地骨皮

天門冬

甘草

黃芩

白芍藥

生地黄

黃芪

熟地黄各五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞温服

○玉屑膏治熱血

黃芪 人參

右二味等分為末用蘿蔔大者切片厚一指許四五  
片蜜淹少時蘸蜜炙乾盡蜜二兩為度勿令焦點藥  
末吃不拘時仍用塩湯送下

○龍骨散治衄血不止凡九竅出血皆可止之

龍骨不拘多少

右一味研細末吹入鼻中即止

○付香散治鼻閉不止

白礬

龍骨

射干

右各另研和勻每用時先以冷水洗鼻孔淨然後用  
藥吹入孔內或以濕紙捲蘸入亦妙

○斷紅丸經驗方治瀉血

百藥煎內以半兩燒灰存性

右共研細飯丸如梧桐子大每服三四十九或以米  
湯調下末子二三錢亦可

○又方治前証用乾柿餅燒灰存性清米飲調下二三

錢立止

○桃仁承氣湯治男子婦人血結育手不可近及中焦

畜血妄言見鬼昏迷如狂及久病胃脘疼痛畜血等証

○抵當湯治下部畜血臍下結痛滿硬等証傷寒門

○椿皮丸治便血久遠傷血致虛

血

破故紙炒蒲黃炒

千年石灰炒等分

末之每服三錢空

心熱酒調下

補遺當歸散 治婦

人小便出血或時

尿血

當歸 赤芍藥

羚羊角骨 各半兩

生地黃一兩

刺薊葉七錢半

每服八錢水一鍾

半煎至八分去滓

通口服食

龜板酥炙

升麻

香附各半

芍藥 兩半

側柏葉一兩

椿根白皮七錢

末之粥丸如梧桐子大每服六十九以四物湯加白

木黃連甘草陳皮作末調湯送下

附○三黃丸積熱便血

蒼朮

陳皮各二

川黃連

黃柏各七

連翹 半兩

右為細末

生芋膏六兩梧子大每服五七十九白下

附○茄梔散

治腸風下血不愈

茄蒂燒灰

梔子黑

附○地榆丸

緩大口渴血色紫黑肉挾濕者

白朮半兩

黃柏炒

生芋

芍藥各二

為末每服二錢食煎米飲湯調下

附○地榆丸緩大口渴血色紫黑肉挾濕者

白朮半兩

黃柏炒

生芋

芍藥各二

地榆二錢

黃芩

香附各二

芍藥各二

便血

便血大便出血也血

清而色鮮者名腸風

下血獨在胃與大腸

出用黃芩秦朮槐角

升麻若蕪風者蒼朮

秦朮香附之類或槐

角秦朮湯補遺或加

減四物湯或秘方只

壳湯或槐角丸並見

下或胃風湯中風門

便血久遠傷血致虛

并麻風癰瘡見於面

者椿皮丸附餘或滑

附○參芪槐角湯 益氣涼血

人參

黃耆 益氣

生芋 涼血

川芎

當歸 和血

升麻 升腸

條芩 涼大

枳殼 寬腸

川黃連

槐角 涼血

水煎食前溫服

附○平胃地榆湯 治陰便血

白朮

陳皮

白芍藥

厚朴

葛根 各五

地榆 七分

茯苓

甘草 炙

當歸

炒麩

乾姜 三分

人參

益智仁 各三

蒼朮

附子 炮

升麻 各一

作一貼

水煎加姜枣食前服

○丹溪活套云九諸見血証皆是陽盛陰虛君相二火亢

甚煎迫其血而出諸竅也悉宜四物湯加知母黃柏

者椿皮丸附餘或滑

石散補遺或椿皮散

下以四物湯加

刺蝟蓋頂門又方腸

風下血香附一兩枳

殼七錢炒芍歸各五

錢梔角其草一錢姜

棗煎服寒食積毒於

腸日久始發血濁而

黯者為膿毒下血腹

中痛者此執毒所致

也涼血地黃湯加地

榆一錢黃連一錢梔

花八分烏梅一錢煎

芥七分善酒者倍加

錢五分虛甚加人參

一錢黃芪一錢見前

或升麻去執和血湯

或酒者黃連九並煎

下執熾四物加升苧

何榆全連血虛去多

加干姜下血腹不痛

者此是毒所致也黃

連為君九門或當歸

和血散或地榆

九附餘協寒敗毒散

或不換金正氣散並

傷寒門坎以芍歸湯

調之執加茯苓槐花

冷加木香茯苓小蘆

補陰降火之劑為主治○如衄血咳血或痰帶血絲

出者皆從肺中來也本方加酒洗薄黃芩茅花等藥

以瀉肺火如嘔血吐血咯血及潮熱咳血此血從腎

中來也本方用梔栢皆當以塩酒炒更加肉桂一分

許以瀉腎火如小便血於溺竅中出澁數成淋作痛

或雜尿而出者從此膀胱中來也本方加梔子仁瞿

麥牛膝滑石之類以瀉膀胱之火○如小便出血不

痛者心移熱於小腸故曰血從精竅中出也本方

加黃連梔子條芩之類以瀉本經之火○大便未糞

而血先來者謂之近血知其從大腸中來也本方加

煨栢枳實條芩槐花之類以瀉大腸之火○如大便

糞而血來者謂之遠血知其從小腸中來也本方加

木前所引以黃連之類以瀉小腸之火○夫血出於心

鼻者或加犀角之類以瀉心火○夫血出於肝

招灰炒蒲黃之類以止之或加韭汁童便山茶花牡

丹皮之類以消之○其血出於大便者或加枸杞側

栢葉條芩之類以清之或加地榆荆芥白芷茅根之

類以止之○其血出於小便者或加瞿麥麥門冬梔

子之類以清或加滑石木通大小蘆之類以行之或

行之或清之或止之皆當視其所緩急而施治之俱

以四物為君主之藥也

○祖傳經驗方

治小便溺血用車前草葉金陵草葉俗各墨一味搗

取自然汁一盞空腹飲之立止

○又髮灰丸

用小兒胎髮如無以壯年無病人頭髮剪下者為上

醫源流

門收功四物湯虛損

門參芪槐角湯附餘

結陰便血地榆平胃

湯附餘血不止烏梅

丸見下

補遺槐角秦朮湯

槐角 秦朮

黃芩 升麻

青黛

等分水煎溫服

補遺滑石散

滑石 當歸

生苳 黃芩

甘草 蒼朮

### 痔漏指南

### 諸痔

蓋人之臟腑本虛外傷風濕內蘊熱毒醉飽交接多怒有戕以致氣血墜下結聚肛門宿滯不散衝突為痔故專以涼血為主內治參芪槐角湯血瘰門或清涼飲子附餘痔及腸風下血脫肛槐角丸血証門痔瘡下血不止芎歸丸

### 痔漏門

論

經曰因而飽食筋脉橫解腸辟為痔又曰脾胃者倉廩之官五味出焉大腸者傳道之官變化出焉若夫飽食太過則脾氣倦甚不能運化精微朝傷暮損清濁混淆故食積下流於大腸之間而為病也蓋脾胃一虛肺氣亦乏而大腸之氣亦從而虛其肝木得以乘虛下流而為腸風病則是皆金失所養木寡于畏之所為耳其為變見名狀種上不同曰牛妳曰鼠妳曰鷄心曰鷄冠曰蓮花曰翻花曰蜂窠曰穿腸曰外痔曰雖為狀不一而其因則同焉治法以苦寒瀉火芩連梔子槐花之類以辛溫和血川歸川芎桃仁之類風邪在下以秦朮防風升

自落者次之燒灰細研用新取側柏葉搗汁調糯米粉打糊為丸如梧桐子大每服五十九丸白湯送下或煎四物湯送下尤妙空心服之  
 ○又方治大便下血用篋竹葉燒灰存性米糊為丸如梧桐子大每服七八十九空心米飲送下  
 ○一男子四十餘素年飲酒無度得大便下血証一日如廁二三次每次便血一升許予以四物湯加條芩防風荆芥白芷槐花等藥連日與服不効後用橡斗燒灰二錢七分調入煎藥汁內服之又與灸脊中對脊一穴血遂止而平安其病自此不發

附餘酒痔乾葛湯  
遺消痔瘡橘皮湯  
餘腸漏大便常有血

黃米米飲調方寸  
七日三次五漏必用

滋陰地黃丸附餘外  
治董洗方補遺痔瘡

有頭羌花膏補遺翻  
花痔荆芥朴硝煎湯

洗次用木鱉齧金末  
入龍腦傳或以龍膽

片腦和勻貼之或以  
米醋沃燒新磚熏之

日三五度  
補遺痔瘡方台西

乾葛 枳殼炒  
半夏 袞冬  
生芋 杏仁  
黃琴 甘草

等分每三錢黑豆  
白梅生薑煎服

補遺薑洗方  
五倍子 朴硝

桑寄生 蓮房  
加荆芥煎湯先熏

後洗又冬瓜藤亦  
好 又大腸熱腫

者用木鱉齧五倍  
子研細末調傳

麻之類提之燥熱沸爵以大黃枳壳麻仁之類調之  
此疾者有宜慎口節欲依法調治無有不安者也

脉法  
脉沉小實者易治浮洪而軟弱者難愈

方法  
一丹溪曰痔病因風熱燥歸于大腸也治血為主大法

用荅涼大腸人參黃連生地黃槐角涼血生血當歸  
和血川芎升麻枳壳寬腸

漏瘡先須用補藥以補氣血參芪歸木為主大劑服之  
以附子為末津和作餅子如錢厚以艾多灸之漏大

者艾炷亦大漏小者艾炷亦小灸令微熱不可令痛  
餅乾即易之再和再灸又以補氣血藥作膏察貼之

方台痔瘡腫痛用獨牛  
用香油浸蝸牛月餘而以其油沐之亦效

又方治痔瘡風腫疼痛用胡麻子煎湯洗之其腫即消  
又方用木鱉子五倍子共為細末調付

塞藥用炉其石煨以童子尿淬之牡蠣煨共為末付之  
又方用馬蘭草根研細付上片特看肉平藥稍遲恐肉

反出  
秦光 羌活湯 治痔漏成塊下垂不任其痒

秦光 羌活 秦光 黃芪 防風 柴胡

升麻 炙甘草 麻黃 紅花

藥本分 細辛 紅花 許

右細切作一服水煎服忌寒風處大小便  
秦光蒼木湯 治痔核已破謂之痔漏大便秘澀必

作大痛此溫熱風燥四氣合而為病故大腸頭成塊

痔頭向上是大腸  
熱甚收縮而上用  
四物湯鮮薑湯加  
枳殼白木槐角秦  
朮

補遺羌花膏 治痔  
瘡有頭

羌花入土根洗淨  
木白搗以少水絞  
汁於銀銅器內慢  
火煎成膏將絲線  
於膏內度過繫痔  
瘡頭繫時微痛候  
心躁痔落時以紙  
然蘸膏於瘡內

**諸漏**

凡諸瘡久不愈必至  
穿腸而為漏此因痔  
而成漏也丹溪云漏  
須大補氣血附子水  
艾炙之見下極痛者  
或椒櫬丹或鮫魚方  
並補遺或洗漏瘡方  
補遺或熏漏瘡方或  
蛇蛻散並附餘鼠耳  
痔漏回效散補遺重  
翻花漏瘡方補遺者  
人原有痔又於肛邊

者濕也作大痛者風也大便秘結者蕪受火和也其  
西方肺金主氣其体收下亦助病為邪須當用破氣  
藥蕪之其効如神

皂角仁性燥存 桃仁去皮尖 秦朮去芦各 蒼朮米泔

防風各七分 黃栢酒浸五分 當歸稍酒浸 澤瀉各三分

枳榔另研二分 大黃酒亦不可多用

右件除枳榔桃仁皂角仁三味另研外餘藥細切作  
一服水三盞煎至一盞二分去粗入枳榔等三味末  
子再上火煎至一盞空心熱服待少時以米膳壓之  
不犯胃氣也服藥日忌生冷硬物及酒溫麪大料椒  
姜等物若犯之其藥無効如有白膿加白葵花頭五  
朮去毒心青皮半錢入正藥中同煎木香三分為細  
末同與即等三味衣煎服再吞入治此疾多必愈

月待除之惟此藥一服即愈

東○秦朮當歸湯 治痔漏大便結燥疼痛

大黃煨 秦朮去 枳實各 澤瀉 當歸稍

皂角仁 白木各五分 紅花少許 桃仁二十個去

右細切作一服水三盞煎至一盞食前服忌如前

東○秦朮防風湯 治痔漏每日大便時發疼痛如無疼

痛者非痔漏也此藥主之

秦朮 防風 當歸身 白木各半 炙甘草

澤瀉各六分 黃栢酒洗五分 大黃煨 陳皮各三分 柴胡

升麻各二分 紅花少許 桃仁三十個去

右細切作一服水三盞煎至一盞去粗稍熱空心服  
之避風寒忌房事酒溫麪大辛熱之物

東○當歸郁李仁湯 治痔漏大便硬努出大腸頭下血

生一塊皮厚腫痛

作膿就在痔孔中

出者當作食積注

下治之黃連散附

餘諸痔出血裏急

欲成漏蠟皮丸附

餘大便秘結出膿

血疼痛者秦光蒼

木湯或秦光當歸

湯或七聖丸或秦

元白木丸並見下

如不痛者秦光防

風湯見下痔漏成

塊下重不任其痒

秦光蒼舌易見下

下血苦痛者當歸和

李仁湯見下經年不

愈者紅花桃仁湯見

下

補遺穢攪丹 治痔

並漏極痛立愈

一錢 穢攪 燒灰存性

冰片三分 熊膽五分

右為細末先將冬

瓜皮煎湯洗淨如

無臭桐葉將指蘸

藥抹上一二以即

愈

苦痛

郁李仁

麻仁

大黃煨

右細切作一服除皂角仁為末用水三盞煎至一盞

去粗入皂角仁末和勻空心服忌如前

○紅花桃仁湯

治痔漏經年因而飽食筋脉橫解腸

僻為痔治法當補北方瀉中央

黃柏一錢 生地黃一錢 澤瀉八分 蒼朮六分

當歸稍 漢防已 防風稍 猪苓各五

麻仁二分 紅花少許 桃仁十

右細切作一服水三盞煎至一盞去粗稍熟服忌煎

立紀綱

苞活一兩 大黃煨八

木香 川芎各五

右除郁李仁另研細入外其餘共為細末煉蜜為丸

如梧桐子大每服三五十九白湯下食前服取微利

一服而愈切禁不得多利大便秘其痛滋甚

○秦元白木丸 治痔疾并漏有膿血大便硬燥疼痛

不可忍

皂角仁 桃仁 秦元 當歸稍 酒浸

澤瀉 枳實 白木 地榆 三錢

右為細和桃仁泥再研勻麪糊為丸如鷄頭實大令

藥光滑焙乾每服五七十丸白湯空心下待少時以

愈

又方

將活鮎魚兩三尾

取來用一尾以白

粗布洗過曬乾包

裹一層置患處騎

坐任其腫撲其毒

垂有出鑽入魚身

少頃又將一尾如

此對坐甚者不能

三尾即愈

補遺重男婦翻花漏

瘡方

車麻子去殼

天南星 防風

煨爛上片器具盡

之留一孔坐孔上

重之

補遺洗漏瘡方 治

漏瘡孔中多有惡

穢常須避風洗淨

漏瘡旁白芷煎湯

洗 或大腹皮苦

參煎湯洗

右洗畢拭乾先用

東向石榴皮晒為

末乾搽以殺活虫

少頃俾瘡

補遺而効散 治鼠

姪痔漏

美膳歷之忌生冷硬物冷水冷菜之類并酒温麪及  
辛辣大料熱物犯之則藥無驗也

○脫疔証

在背下部痛

○治脫疔方以陳壁土炮湯先薰後洗

○又方以鯨頭燒存性為末真麻油調付即收龜頭亦可

○清涼飲子 治痔漏涼血大便燥結頻數頻渴

羌活

柴胡

甘草

知母 酒製 黃芩 酒製

黃芪 酒各 甘草 生

漢防已

生地黃 酒製 防風 各五

當歸身 六石羔

草龍胆 酒製 黃柏 各五 升麻 四

紅花 少許 杏仁 五

桃仁 十個

水煎入酒此少服

○芍歸丸

治痔下血不止

川芎

當歸

黃芪

中曲 炒 也 何

末之煉蜜丸梧子大每服五十九食前米湯下

○橘皮湯

治氣痔

橘皮

枳壳

川芎

槐花 炒子 檳榔

木香

桃仁 去皮 香附

甘草 炙 紫蘇 葉

每服三錢生姜三片棗二枚煎服

○地黃丸

治五痔滋陰必用之

槐角

黃柏 炒

杜仲 炒 去

白芷 各一 山藥

山茱萸

獨活 各八

澤瀉

牡丹皮 茯苓 各六

黃芪 半兩

白附子 錢二

地黃 酒蒸 兩六錢

末之煉蜜丸如梧子大每服五十九米湯下

○董瀉瘡方

艾葉

五倍子

白膠香

苦練根 各半

蜜陀僧二錢

麝香 片腦各五分

右為末先用溫水洗拭乾敷

脫肛

氣虛不能收斂脈虛

或久病後脫肛補中

益氣湯虛損門丹溪

云氣虛者宜大補元

氣兼升提公參黃芪

川芎當歸芍藥升麻

柴胡外肥皂水洗之

氣執身有熱厥數

者二神丸火神丸

柴胡升麻又有氣執

盛而脫肛者條芩六

兩升麻一兩神曲糊

九空心白湯下血虛

脉孔瀆河物加羌昇

柴胡虛損門外用五

倍為末空之以手托

上待收乃止內原有

執症血虛脈數而虛

者四物湯加炒黃柏

柴胡防風秦元升麻

虛損門或涼血地黃

湯加升麻防風秦元

柴胡血虛門

右剉碎如燒香法置長桶內坐薰瘡處

附餘 ○蛇蛻散 治漏瘡血水不止

蛇皮 焙焦 五倍子 龍骨各二錢續斷五分

右為末入射香少許津唾調傅

附餘 ○黃連散 元有痔漏肛門邊又生一塊皮厚腫痛作

膿就在痔孔中出當作食積注下治

黃連 阿魏 神麩 山查

桃仁 連翹 槐角 犀角

寺分末之以少許置掌中時時舐之津液咽下

附餘 ○蛻皮丸

槐角 艾葉 枳壳 地榆

富歸 川芎 黃芪 白芍藥

皂角黃去皮 貫衆 附子一兩 真桑葉三錢

末之煉蜜丸如梧子大每服五十九食前米湯下

○祖傳經驗秘方七花丸 治腸風下血又痔皆效

山茶花 芙蓉花 石榴花 檢漆花

白茅花俱燒存性 松花各一兩 槐花二兩炒 枳殼一兩炒

甘草多半 地榆一錢 槐柳二錢

右為細末醋調麩糊為丸如梧子大每服七八十九

煎烏梅湯下

○又方 治腸風下血等証

酒瓶箬包酒過一年者或燒存性 乾柿餅燒存性 烏梅燒存性

百藥煎子多焦黃代之以五倍 槐花炒焦 枳壳各半兩

右為細末醋麩為丸如梧子大每服七八十九醋湯

下或加槐柳半兩

汗症指南

陽虛自汗

陽氣虛弱自汗者此  
衛氣不能固欽也黃  
芪建中湯傷寒門或  
麥煎湯見下外用溫  
粉撲補遺

治自汗不止

白朮 藁本

川芎 白芷

牡蠣煨 麻黃根

鉄皮 糯米

未之再入糯米粉  
一半此以撲之

濕勝自汗

濕勝自汗者調衛湯  
是下風濕防已黃芪  
湯中濕門

表虛自汗

表虛自汗惡寒者桂  
枝湯以實其表外以  
溫粉撲見前飲酒中  
風多汗食即汗出白  
朮散見下

汗症門

論

內經曰心之液為汗原病式曰心熱則出汗東垣曰西  
南神土也在人則為脾胃夫人之汗猶天地之雨陰滋  
其濕則為霧露為雨也據內經獨主於心而東垣又指  
脾胃而言何也蓋心為君火主執脾胃屬土主溫濕熱  
相搏為汗明矣亦如地之濕氣為雲霧而上升其天地  
若不升降則不能成霖雨也又如醝中燒酒若非湯火  
蒸淘則不能成汗液也夫各藏皆能令人出汗獨心與  
脾胃主溫熱乃總司耳故內經又曰飲食飽甚汗出於  
胃驚而奪精汗出於心持重遠行汗出於腎疾走恐懼  
汗出於肝蓋本方者汗出於心脾胃主於土土主濕  
似而實不同也其有汗者無汗者皆然也  
屬陽虛胃氣之所司也盜汗者寐中而通身如浴竟來  
方知屬陰虛榮血之所主也大抵自汗宜補陽調衛盜  
汗宜補陰降火則火法心虛而冷汗自出者埋宜補肝  
益火之原以消陰翳也陰虛火炎者法當補腎壯水之  
主以制陽光也醫者宜詳辨之無錯

脈法

脈大而虛浮而懦者汗 在寸為自汗在尺為盜汗  
傷寒脈陰陽俱緊當無若自汗者曰亡陽不治

方法

丹溪曰自汗屬氣虛屬濕與執盜汗屬血與陰虛

○治自汗用人參黃芪少佐以桂枝陽虛者附子亦可用  
○麥煎湯 治諸虛不足及新病暴虛津液虧欠體常

虛火自汗

有火氣上重胃中濕而有汗不止玉屏風散補遺或涼膈散火執門

補遺玉屏風散治

虛火自汗

白木二兩防風

黃芪各一兩

每服三錢姜三片

煎服

痰症自汗

痰症自汗二東易如

貝母白木海粉黃芪

牛膽南星痰飲門虛

甚大補黃芪湯補遺

補遺天補黃芪湯

治虛弱人自汗

黃芪蜜炙防風

當歸身 川芎

山茱萸 白木炒

五味子 肉桂

甘草炙 人參已

上十味各一兩

白茯苓一兩半

熟地黃二兩

肉桂各五錢

每服五錢姜三片

自汗夜臥則甚久而不止体瘦心忪驚惕短氣疲倦

牡蠣

黃芪

麻黃根各一錢

右細切作一服入小麥百餘粒水煎服

東

○調衛湯

治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任風証

黃芪

麻黃根各一

羌活二分

生甘草

當歸稍各五分

生地黃

麥門冬各三分

生黃芩

半夏各五分

猪苓分

蘇木

紅花各二分

五味子

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞去粗

稍執服

愚恐自汗陽虛之証不應下羌活半夏生姜二味并

散發表之劑恐傳寫之誤姑存之

河

○當歸六黃湯

盜汗之聖藥也

當歸

生地黃

黃芩各七分

黃芪一錢

黃連

黃芩各七分

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服小兒減

半又曰小兒不須治小兒雖能自愈終不治

東

○四制白木散

治盜汗

白木四兩內一兩以黃芪同炒一兩以石解同炒一兩以牡蠣同炒一兩以麩皮同炒者皆去之

右取白木一味為末每服三錢粟米湯調下

東

○正氣湯

治盜汗

黃栢

知母各一錢半

甘草炙五分

右細切水煎服之

東

○白木散

治飲酒中風多汗食即汗出如油漏又不

治必成消渴

牡蠣二錢

白木一兩二防風半兩

秦一枚水煎服

盜汗

盜汗屬陰虛血虛當歸芍藥湯見下人虛無大執盜汗黃芪六一湯補遺盜汗發熱

因陰虛者四物加知

柏氣虛加參芪白木

虛損門盜汗不止四

炒白朮丸或正氣湯

並見下麥煎散補遺

補遺黃芪六一湯

黃芪麥冬六錢

甘草一錢水煎服

地骨皮 知母

赤芍藥 石膏

白茯苓 活石

麻黃根 杏仁

甘草炙 人參

甜葶藶等分為末

麥煎湯下一錢

心汗

心汗者獨心孔有汗思慮多致也以艾煎湯調茯苓末一錢服又用青桑焙乾末之空心米飲下

右為細末每服一錢溫水調服不拘時侯如惡風倍防風白朮如多汗面腫倍牡蠣

○丹溪活套云仲景桂枝湯治外感風邪自汗之聖藥也

黃芪建中湯治外感挾氣虛自汗之劑也東垣補中益氣湯內治傷寒氣虛自汗之妙劑也甚者六脉浮濡而虛本方加附子以治陽虛其效如鼓應桴○如

左寸脉浮洪而自汗者心火炎也本方加參芪麥門冬黃連五味子各半錢○如左關脉浮弦而自汗者

挾風邪也本方加桂枝芍藥各半錢若不陰虛只有桂枝湯可用也○右關脉浮洪無力而自汗者只宜

本方倍參芪而自愈○右尺脉洪數無力而自汗者或盜汗相火挾君火之勢而尅伐脉金也本方加黃

連黃芪黃柏各半錢○如左寸脉浮洪而自汗者

洪無力而自汗者水虛火盛也本方加

半錢熟地黃一錢壯水之主以制陽光也○凡內傷

及一切虛損之証自汗不休者總用補中益氣湯少

加附子麻黃根浮小麥其效捷如影響但升麻柴胡

俱用蜜水制炒以殺其升發勇悍之性又歆其引參

芪等藥至肌表故不可缺也○凡上所云管指內傷

虛損自汗之証故皆以補中益氣為主治之藥也

○上湖呂俊文得內傷虛証發熱自汗如雨不止服補中

益氣湯十數貼不効予以前方加減每貼用蜜制黃

芪一錢半人參一錢白朮甘草陳皮各七分當歸白芍藥各一錢升麻柴胡各一分加桂枝三分麻黃根七分浮小麥一撮炮附子三分三貼而汗止熱亦退而安

痙症指南

剛痙

病人無汗而身體角弓反張不知人事手反瘳痺此剛痙也高根湯傷寒門或神水散補遺或白水湯補遺增寒壯熱大便秘者下之小承氣湯瀉重虛寒而用或小續命湯加葛根麻黃或桂枝並傷寒門

痙症門

論

內經曰諸痙皆屬於濕項強皆屬於濕直而不柔和也夫肝木屬風而土筋經曰諸暴強直屬風理宜然也其所謂諸痙項強而屬於濕者何與蓋太陽陰濕甚則蕪風化亢則害承適制也是故知痙之為病濕為本風為標耳故仲景有剛柔二痙之分不可不辨蓋剛為陽痙而柔為陰痙也若夫太陽發惡熱無汗惡寒脈弦長脈急胸滿口禁手足拳急咬牙甚則搖擗弓角反張此為剛痙太陽微熱多汗不惡寒脈遲濡弦細四本不收此為柔痙太陽微熱多汗不惡寒脈遲濡弦細四本不收此為柔痙

發熱增其身體疼痛傷寒鼻息重

咳嗽頭昏

蒼朮 一宿

待乾薄切焙五兩

藜蘆 蒸活

北細辛 白芷

川芎 各二兩

每服四錢姜三片

葱白三寸水煎熱

服以汗出為度為

末葱白生薑湯調

服善酒者執酒下

濕二氣聚於太陽之經也剛痙風性剛急故也濕氣勝者為柔痙濕性柔和故也外有諸虛之候表虛不任風寒亦能成痙是以或產後或金瘡或跌仆撲傷癰疽潰膿之後一切去血過多之証皆能成此疾也是乃虛為本而風為標耳亦有絕無風邪而亦能使人筋脈拳急而為角弓反張之候者血脫無以養筋故也丹溪甚言不可作風治而用風藥恐反燥其餘血而致不救也可不慎與

脈法

脈經曰太陽病發其脈沉而細者為痙

痙脈來按之築築然而弦直上下行

痙家其脈伏堅直上

痙病發其汗已其脈潑灑然而蛇暴腹脹大為欲解

亦可

補遺白木湯 治大

汗不止筋牽搐搦

及治柔瘧

白木二錢半

葛根去皮二錢

升麻綠色者一錢

黃芩一錢七分半

芍藥二錢半

甘草炙一錢

加桂心二錢

黃芪二錢

右細切分作二服

水一鍾煎至七分

溫服

**柔瘧**

筋牽發搐不省人事

汗多者此柔瘧也防

風當歸散見下或白

木湯見剛瘧條或桂

枝湯加葛根傷其門

或括搯桂枝湯見下

大便秘者承氣湯傷

寒門或小續命湯去

麻黃加桂枝此藥真

有續命之功須臨時

加減用之傷寒門或

代赭石散補遺去血

過多因無血養筋令

筋牽發搐

脉如故反伏弦者必瘧 此瘧字恐當作死字

太陽脉其証備身體強凡凡然脉沉遲此為瘧

方法

丹溪曰大率與癘相似此癘為虛切不可作風治而純

用風藥多屬氣血虛有火有痰宜補兼降痰火參芪

芎歸竹瀝之類

活人 ○括萎桂枝湯 治太陽傷寒成瘧

括萎根 甘草炙各三錢

生姜各三兩大棗十二枚

右六味細切作一服以水九升煮取三升作三服連

飲取微汗如汗不出以熱粥湯發之

活人 ○麻黃葛根湯 治剛瘧無汗惡寒

麻黃 赤芍藥各三錢 葛根四錢 桂枝半合

右細切作一服水二大盞煮取一盞溫服

金

○防風當歸散 治發汗過多發熱頭暈口噤背反張

者宜去風養血

防風 當歸 川芎 生地黄 各二錢半

右細切作一服水煎服

東

○當歸補血湯 治一切去血過多因無血養筋令人

四肢掣急口噤如瘧

黃芪 一兩 當歸 五錢 酒洗淨

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服 ○如挾風或

兼破傷風者加防風羌活各一錢 荆芥穗一錢半 甘

草半錢 減去黃芪一半煎服

○活人舉卿舉敗散 治新產血虛發瘧者汗後中風發

熱亦然

○活人舉卿舉敗散 治新產血虛發瘧者汗後中風發

熱亦然

八四肢寧急口噤如

瘕當歸補血湯見下

婦人產後發瘕活人

李知本敗散見下

補遺代赭石散治

陰陽癰

代赭石酢淬七次

右為細末每服半

錢金銀器或金銀

簪放瓶中水煎入

金箔調下

荆芥穗不拘多少微炒

右為末每服三五錢外以大豈黃卷以熱酒沃之去

黃卷用汁調下其効如神

○丹溪活套云昔之所謂剛柔二瘕者當以虛實論之是

也一屬外感一屬內傷屬外感者為剛瘕宜用麻黃

葛根湯括萎桂枝湯小續命湯在裏者大承氣湯之

類○屬內傷者為柔瘕宜用補中益氣湯八物湯四

物湯之類如以風濕一事分剛柔而治恐誤醫者不

勝其多今以虛實分治其理昭然無疑矣

○陶氏婦年三十餘身材小瑣形瘦弱月經數忽後日發

瘕口噤手足牽縮角弓反張予知其去血過多風和

乘虛而入用四物湯加防風羌活荆芥少加附子行

經二貼病成半六貼病全安

### 厥症指南

### 陰厥

夫陰厥者始因泄利  
身寒厥冷足踈臥唇  
口青自利溲白不渴  
脉遲而微冷過膝者  
理中湯或四逆湯並  
傷寒門或五味子湯  
見下灸關元穴五十  
壯吐利手足厥冷煩  
燥欲死吳茱萸湯或  
當歸四逆加茱萸生  
姜湯並見下

### 厥症門

論

內經曰陽氣衰為下則於寒厥陰氣衰於下則為熱厥  
又曰寒厥者此人質壯以秋冬奪於所用下氣上爭不  
能復精氣溢下和氣因從之而上也氣因於中由陽衰  
不能滲營其經絡陽氣日損陰氣獨在故手足為之寒  
也熱厥者此人必醉飽入房精氣中虛酒入於胃則絡  
脉滿而經脉虛脾主於胃行其津液者也陰氣虛則陽  
氣入陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不  
能滲營其四肢也氣聚於脾中不得散酒氣與穀氣相  
薄熱盛於中故熱通於身內熱而溺赤也胃氣日衰陽  
氣獨盛故手足為之熱也又陰氣盛於上則下虛下虛

**陽厥**

夫陽厥者脈數而沉  
陰衰陽勝元則害承  
廼制火腫似水蓋陰  
陽相勝則血氣不  
得相和亦作逆冷但  
寒不過膝冷亦不久  
大便堅小便赤而煩  
渴大柴胡湯其則承  
氣湯並傷寒門如服  
過涼藥而不解者升  
陽散火湯火熱門大  
便不大結而渴甚者  
白虎湯傷寒門下刊

**痰厥**

因痰而厥者其人或  
因勞後動其君相二  
火一時急湧絡不  
通痰涎壅塞心胸隨  
道不行四肢厥冷僵  
仆卒倒不知人先用  
湯調化蘇合香丸一  
丸灌之醒後察脈用

則腹脹滿則下氣重上而邪氣厥厥則陽氣亂陽氣亂  
則令人暴仆不知人或至半日遠至一日乃知人也名  
曰尸厥考之張仲景傷寒論陰陽二厥之証皆指手足  
逆冷而言也河間原病式曰陰厥者原病脈候皆為陰  
証身涼不渴脈遲而微陽厥者原病脈候皆為陽証煩  
渴燥妄身熱而脈數若陽厥極深或失下而至於身冷  
反見陰証脈微欲絕而死者止為極熱而然俗醫妄謂  
變化陰証急用熱藥助其陽氣以致十無一生也愚按  
內經謂寒熱二厥者皆常病虛損証也並宜補益之法  
但熱厥補陰寒厥當補陽耳正經所謂壯水之主以鎮  
陽光之益火之原以消陰翳也若夫傷寒論所謂陰陽  
二厥者冰炭殊途治法亦異診察之間死生反掌醫者  
其可不盡心乎

脈經曰寸口沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏  
血氣入於藏則死入於府則愈此為卒厥不知人唇清  
身冷為入藏即死如身溫和汗自出為入府而後自愈  
活人書云陽厥脈滑而沉實陰厥脈細而沉伏

方法

丹溪曰厥因氣虛血虛者多氣虛脈細血虛脈穴如葱  
管熱厥脈數外感脈浮而實有痰者脈弦熱用承氣  
湯痰用白木竹瀝外感宜解散藥中加姜汁服  
○活人書曰初得病身熱頭痛大便秘小便赤或畏熱或  
飲水或揚手擲足煩燥不得安卧胆語昏憤而厥此  
陽厥也大柴胡湯大小承氣湯治之渴者白虎湯妙  
○手足厥冷脈乍熱結此邪氣結在胸心下煩滿肌

他藥諸氣門若脉沉滑宜清痰順氣白丸于潤下抑火丸並痰飲門或姜附湯或星香散並中風門或順元散附餘痰厥不醒稀涎散中風門或導痰湯痰飲門

**氣厥**

其人素性暴遇爭觸心即發手足厥冷不省人事身冷脉伏則肝與心胞標本俱逆急以蘇合香丸生薑湯化灌之

已針內關穴在手掌橫紋後二寸兩筋間或四七湯醫症門或調氣散呃逆門若因勞傷氣弱不能運行逆冷者入味順氣散中風門

**血厥**

夫血虛而厥者因血天迫故也脉必芤瀟

不能食瓜蒂散吐之○寒熱而厥面色不澤胃脉兩手忽無脉或一手無脉必是有正汗也多用綿衣包手足急服五味湯或煎與桂枝麻黃各半湯須臾大汗而解○傷寒厥逆心下怔忡者宜先治水茯苓甘草湯主之○如得病後四肢逆冷脉沉而細足挛卧而惡寒引衣蓋覆不欲水或下利清穀而厥逆者陰厥也四厥湯白通湯厥逆脉不至者通脉四逆湯手足指頭微寒者謂之清理中湯無熱症而厥當歸四逆加茱萸生薑湯喘促脉伏而厥五味子湯吐利手足厥冷煩燥欬死吳茱萸湯

活○五味子湯 治陰厥脉伏手足逆冷  
五味子 兩 人參 麥門冬 杏仁 陳皮已上各半  
右細切用水三盞生薑十片棗二枚煎至一盞半去粗分作二服

○桂枝麻黃各半湯

○茯苓甘草湯 治陽厥怔忡手足厥逆心下有水氣

茯苓 各二錢 甘草 一錢 生姜 三兩  
右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

○通脉四逆湯 治証陽厥下利清穀四肢逆冷脉微

甘草 六錢半 附子大者一枚生用 乾姜 一兩

如面赤者加葱九莖嘔者加生薑咽痛加桔梗利止脉不出加人參用水三大盞煎至一盞半去粗分作二服

○當歸四逆加茱萸生薑湯 治無熱証而厥

川當歸 芍藥 桂枝 細辛 各二兩

甘草 通草各六錢 吳茱萸 三錢 生薑 六錢

此婦人多有之蒼公  
散附錄 或產後胃弱  
脈微多汗亡血而血  
厥者白薇湯附錄

**虬厥**

夫虬厥者胃寒虬蟲  
攻胃手足厥逆吐蚘  
理中湯 陽寒門 加丹  
椒 枳 即煎吞烏梅丸  
血症門 不止用烏梅  
川椒黃柏煎服蓋遇  
後則安愚若則寧

**尸厥**

尸厥者冒犯不正  
之氣忽然手足厥冷  
膚起粟頭面青黑  
妄言口噤昏不知人  
或因吊喪間疾入廟  
登塚而得蘇合香丸  
諸氣門 調氣散 死逆  
門 或平胃散 中氣門

右細切水三升煮至一升半分三服

○吳茱萸湯 治陰厥吐利手足逆冷煩燥欲死

○吳茱萸 生姜 各五錢 人參 二錢半

右細切作一服水二盞煎至一盞半大棗一枚服

○蘇合香丸 治卒厥不知人未詳風痰氣厥先與此

藥極妙每用一九以湯調化灌之即醒醒後察脈後

用他藥

○順元散 治痰厥氣虛身微冷面淡白昏不知人和

一切氣通血脉無出此藥

○倉公散 治血厥

瓜蒂 藜蘆 礬石 煨 雄黃

右等分末之每用少許吹鼻取

○白薇湯 治血厥及產後胃弱不食味酸多汗亡血

故多厥逆

白薇 當歸 各六錢 人參 三錢 甘草 炙 錢半

右分二貼水一盞煎至七分溫服

○丹溪活套云熱厥四肢煩熱蓋濕熱鬱於脾土之中治

用東垣升陽散火湯火鬱湯之類寒厥手足逆冷者

多是氣血不足補氣血藥加附子飲酒人或體肥盛

人手足熱者濕痰鬱火盛也二陳湯加芩連梔子之

類若忽然手足逆冷卒厥不知人者多屬痰火亦有

陰先虧而陽暴熱者宜多用參膏點竹瀝姜汁與之

人瘦弱者雖無痰而火亦盛也服竹瀝亦能養血而

降火

癩狂癩症指南

癩症

癩者神不守舍癩狂如有所見經年不愈心經有損是為真病若悲哭呻吟為邪所憑者非狂也燒蚕布灰即蚕故紙也好酒調服二錢癩風麻仁湯補遺發則腦痛耳鳴用天門冬去心日乾作末酒服方寸匕

癩狂癩症門

論

內經曰巨陽之厥則腫首頭重足不能行發為胸仆其目而暴仆也蓋陽氣逆亂故令人卒然暴仆而不知人氣復則甦此則癩之類也又曰陽明之厥則癩疾欲走呼腹滿不得卧面赤而熱妄見妄言又曰其則棄衣而走登高而歌踰垣上屋罵詈不避親疎是蓋得之於陽氣太盛胃與大腸實熱燥火鬱結於中而為之耳此則癩狂之候也曰癩曰狂分而言之亦有異乎辨經謂重陰者癩重陽者狂素問註云多喜為癩多怒為狂然則喜屬於心而怒屬於肝乃二藏相火有餘之証難經陰陽之說恐非理也夫狂之証多為心火不足

補心氣之藥

麻仁四升以水六升猛火煮人于生去滓煎七合空心服發與木發或多言勿怪之但摩手足須定進三劑愈

狂症

夫狂邪者發作無時披頭天叶不避水火欲殺人踰垣上屋棄衣奔走苦參丸補遺或控涎丹痰飲門或牛黃瀉心湯見下若

為求望高遠不得志者之類也治法癩宜乎吐狂宜乎下顛則宜乎安神芥子煎所作也治法癩宜乎吐狂宜乎下顛則宜乎安神芥子煎兼降痰火雖然此三証者若神脫而目瞪如愚痴者縱有千金我酬吾末如之何也已矣

脈法

脈大堅疾者顛狂

脈虛弦為驚為風癩

脈沉數為痰熱

脈大滑者自已

沉小急疾者死

虛而弦急者死

寸口沉大而滑沉則為痰滑則為氣突氣相搏入藏則死

入府則愈

○丹溪曰癩狂脈虛易治實者難治

方法

○丹溪曰癩証大率屬痰與熱不必分五等大法行痰為

卒狂妄言者針大拇  
指甲上去一莖葉許  
或牛黃清心丸並見  
下或葉氏雄朱丸補  
遺大抵狂病宜大吐  
下則可愈婦人執久  
血室發狂不認人者  
牛黃膏補遺

補遺苦參丸 治狂  
和發五時披頭大  
叫欲殺人不避水  
火

苦參不拘多少  
末之煉蜜為丸梧  
桐子大每服十五

凡前清濁湯下  
補遺葉氏雄朱丸  
治因驚憂失心或  
思慮過多氣結不  
散積成痰涎留在  
心胞穢塞心竅狂  
言妄語叫呼奔走  
雄黃明淨者  
顆硃砂各一錢半  
白附子一錢  
為末以猪心血和  
丸如梧桐子大別  
用硃砂為衣每三  
粒用人參膏浦煎  
湯下常服一粒能

主藥用黃連南星瓜萎半夏尋火尋痰分多少治無  
不愈者有熱者用涼藥以清心有痰者必用吐吐後

用東垣安神丸及平肝之藥青代柴胡川芎之類

○癲狂原病式所論甚精蓋以世以重陰為癲重陽為狂

誤也大槩皆熱耳虛氏曰重明重陽之分雖經之言  
怒為狂吾志所發皆謂熱也心熱甚則多喜火狂制  
金不得平木則肝突而多怒也又發熱于中則多于  
陽明經謂陽明之厥則顛疾又謂服膏深芳草石藥  
則熱氣燥悍而為顛狂此原病式本素問之論以明  
顛狂俱是熱病而  
重明之說非也

○大率多因痰結於心膏間宜開痰鎮心神亦有中和者  
以治和法治之

○神不守舍狂言妄作經年不愈如心經蓄熱當清心除  
熱如痰迷心竅當去痰寧心宜大吐大下愈

內以新升盛火炙令乾此  
作四服氣弱及年幼者作五服空心白湯調下

○龍腦安神丸 治男女五般顛癩无問遠近發作無時

茯神 三人參 地骨皮 其草 麥門冬  
桑白皮 各二錢 馬牙硝 二龍腦  
硃砂 半錢 烏犀角 兩 金鉤 五片  
射香 各三 牛黃 五牙

右為細末煉蜜為丸如彈子大金鉤為衣如風癩病

冬月溫水化下夏月凉水化下不拘時二三歲者日

進一服大人每服一九小兒一九分作二九服虛勞

發熱咳嗽新汲水化下

○神應丹 治諸癇

辰砂不拘多少細研  
右以猪心血和得所以蒸餅裹劑蒸熟取出就丸如

安寃定魄補心益

氣

補遺半黃膏 治婦

人熱入血室發狂

不認人者

牛黃 三不半

牡丹皮 硃砂

鬱金 各三不

腦子 一不 甘草

右為細末煉蜜為

丸如皂子大每服

一九新水化下

癩症

梧桐子大每服一九食後臨卧煎人參湯下

○錢氏五色丸 治諸癩

硃砂半兩水銀二不珍珠另研雄黃煎各三兩

右和勻再研極細麩糊為丸如麻子大每服三四丸

別煎金銀薄荷湯送下

○元戎二白丸 治痰涎為病患以致癩癩狂妄驚悸等

白礬一兩輕粉一字或半錢

右用生蒸餅劑蒸熟去皮可丸入輕粉丸如梧桐

子大每服二三十丸生薑湯下小兒如黍米大

○拔萃妙香丸

辰砂另研龍腦

牛黃五錢金箔九片巴豆二百二十五

右合研勻煉蜜為丸每兩分作三一九次下

○子和硃砂丸 治癩癩

硃砂

右為細末研蒜膏為丸如菜豆大每服三十九食後

劑芥湯下

○局方碧霞丹 治痰涎壅塞牙關緊急目睛上視癩癩

狂妄等証

石綠半兩附子大烏頭尖蝎稍各二

右為末入石綠令勻麩糊為丸如鷄頭實大每服一

九薄荷湯化下更以溫酒半合飲之須臾吐出痰涎

然後隨症以他藥治之如口噤者擗開灌之

○牛黃瀉心湯 治心經和執狂言妄語心神不安

腦子另研牛黃另研硃砂另研大黃生一

為細末和勻再研每服三錢涼生薑蜜水調下

龍腦安神丸或拔萃

門或寧神丹補遺或

芎藭胡尾會丸火熱

用平肝青黛黃連川

多瘦人火多宜吐後

赤脉散大抵肥人痰

或元戎二白丸並見

真在月



末之媽糊為丸黍  
 米大礪砂為衣姜  
 湯二十九  
 補遺鎮心丸 治心  
 癩驚悸煩心吐舌  
 面赤目眩  
 遠志根去心  
 雄黃 鐵粉  
 琥珀各二斤  
 辰砂一斤射五分  
 金銀白二十斤  
 極細末束肉丸黃  
 實大每服一九麥  
 明冬湯下

察其由以平之怒傷於肝者為狂為癩以憂勝之以  
 恐解之喜傷于心者為顛為癩以恐勝之以怒解之  
 憂傷于肺者為癩為顛以喜勝之以怒解之思傷于  
 脾者為癩為顛為狂以怒勝之以喜解之恐傷于腎  
 者為顛為癩以思勝之以憂解之驚傷于胆者為顛  
 以憂勝之以恐解之悲傷于心胞者為顛以恐勝之  
 以怒解之此法惟賢者能之耳

○祖傳經驗秘方 治癩癩神効  
 九節菖蒲一味 不拘多少不聞鷄  
 石以木臼杵為細末不能犯鉄器用黑犢猪心以竹  
 刀批開沙礪者湯送下每日空心服二三錢

邪崇指南

心虛

素問遺篇曰人憂愁  
 思慮則傷心又驚而  
 奪汗出於心或遇少  
 陰司天天所不及因  
 而三虛神明失守蓋  
 心為君主之官神明  
 出焉神既失守神光  
 不聚却遇火不及歲  
 有黑死鬼見之令人  
 暴亡治去刺手少陽  
 之所過陽池穴也復

邪崇門

論

內經曰和氣盛則實正氣奪則虛夫經之所謂和者風  
 寒暑濕燥火有餘之淫和耳非若世俗所謂鬼神之妖  
 怪也病有心虛驚惕如醉如痴如為和鬼所附或陽明  
 內實以致登高而歌棄衣而走皆痰火之所為實非妖  
 邪崇之所迷也古方有禁呪一科及龍樹呪法之治皆  
 移精變氣之術但可解疑釋惑以使心神之歸正耳何  
 邪崇之可祛哉丹溪曰血氣者心之神也神既衰之和  
 因而入理或有之按此恐指山谷  
 而孤懸而言若夫血氣兩虛痰虛  
 心腎妨碍升降不得運行以致十二官各失其職視所  
 言動皆為虛妄以和治之其人必死可不審乎

刺心膻即生

### 脾虛

人飲食勞倦則勞脾  
又飲食飽甚汗出於  
胃醉飽入房汗出於  
脾或遇太陰司天  
數不及因而三虛脾  
神不守蓋脾胃諫  
之官志意出焉神既  
失守神光不聚却遇  
土不及歲有青尸鬼  
見之令人暴亡可刺  
足陽明之所過衝陽

### 腎虛

人久坐濕地強力入  
水則傷腎又遇持重  
遠行汗出於腎或遇  
太陽司天天數不及  
因而三虛腎神不守  
蓋腎為作強之官技  
巧出焉神既失守神  
光不聚却遇水不及  
歲有黃屍鬼見之令  
人暴亡可刺足太陽  
之所過京骨穴也復  
刺腎膻即生

脈法

脈乍疎乍數炸乍小或促或結皆和脈也  
脈緊而急者遁屍

方法

丹溪曰俗云衝惡者謂衝斥和惡鬼崇而病也如病此  
者未有不因氣血先虧而致者焉

○五和刺法

○肝虛見白屍鬼而後暴厥不知人名曰卒屍五和病目  
中神彩不変四肢雖冷心腹尚温口中無涎舌不卷  
知不縮者可刺之復甦

○丘墟二穴在足外踈下下如前陷中去臨泣穴五寸足

少陽之原也以毫鍼刺入三分得氣則補留三呼徐  
余出咸安

○用膻二穴在背第九椎下

分得氣則補留三呼次進二分留三呼復取針至三  
分留一呼徐徐出鍼氣及即甦

○心虛見黑屍鬼而後暴厥不知人四肢雖冷目中精彩  
不変氣雖閉絕舌不卷知不縮末出一時可治刺之

復甦陽池也二穴在手表腕陷中手少陽之原也用  
毫鍼刺入二分得氣則補留七呼次進一分留三呼

復退留一呼徐徐出鍼手捫其穴更刺心膻

○心膻二穴在背第五椎下兩傍各一寸半用毫針刺入  
七分得氣則補留一呼次進一分留一呼退至二分

留三呼徐徐出鍼以手捫其穴即甦

○脾虛見青屍鬼而後暴厥不知人四肢冷而身温唇温  
不出一時可治

肝虛

人喜怒氣逆則傷肝  
又遇疾走恐懼汗出  
於肝或遇厥陰司天  
天數不及因而三虛  
肝神不守蓋肝為將  
軍之官謀慮出焉神  
既失守神光不聚却  
遇木不及歲有白屍  
鬼見之令人暴亡可  
刺足少陽之所過立  
墟穴也復刺肝膈即  
生

肺虛

人形寒飲食則傷肺  
復登高疾走喘出於  
肺或遇陽明司天  
數不及因而三虛肺  
神不守蓋肺為相傳  
之官治節出焉神既  
失守神光不聚却遇  
金不及歲有赤屍鬼  
見之令人暴亡可刺  
手陽明之所過合谷  
穴也復刺肺膈即生  
愚按人見五色非  
常之鬼皆自己精

○衝陽二穴在足跌上骨間動脈去陷谷三寸足陽明之  
原以毫鍼刺三分得氣則補留三呼次進二分留一  
呼徐徐退鍼以手捫之復刺脾膈

○脾膈二穴在背第十推下兩傍各一寸半以毫鍼刺入  
三分得氣則補留二呼進二分動氣至徐徐出鍼即  
醒

○肺虛見赤屍鬼而後暴厥不知人雖無氣手足冷心腹  
溫鼻微溫目中神彩不變口中無涎舌不卷死不縮  
者未出一時可治

○合谷二穴在手大指兩岐骨間手陽明之原也用毫針  
刺入三分得氣則補留一呼復退一分留一呼徐徐  
出鍼以手捫其穴復刺肺膈

○市膈二穴在背第十推下各一寸半以毫針刺入一  
半得氣則補留三呼次進二分留一呼徐徐出鍼以  
手捫穴即甦

○腎虛見黃屍鬼而後暴厥不知人氣絕四肢厥冷心腹  
微溫目中精彩不變唇舌不黑口中無涎可救  
○京骨二穴在足外則大骨下赤白肉際陷中足太陽之  
原用毫鍼刺入一分半得氣則補留三呼進至三分  
留一呼徐徐出針以手捫穴復刺足少陽之膈

○足少陽之膈在背第十推下兩傍各一寸半用毫針刺  
入三分得氣則補留三呼次又進五分留三呼徐徐  
出針以手捫其穴即甦凡已上刺法必先以口含針  
緩而刺之則經脈之氣無拒逆也

○丹溪治一婦人如癰或作或輟恍惚不省人事一日畧  
甦醒診視聞忽聞床上有香氣繼又無所知識丹溪

神不守神光不完  
故耳實非外邪所  
侮乃元氣極虛之  
候也因患者親目  
所視故實信直為  
邪鬼所迷但當推  
其同行同坐者不  
見有物足可以決  
此疑耳

一婦人年二十七美  
貌得一証如醉如  
痴頰赤面青羸有  
潮熱飲食不美其  
脉乍疎乍數而虛  
每夜見白衣少年

與雜一醫與八物  
湯服數十貼不效  
召子治之見其家  
有白犬臥枕戶闕  
予曰必此犬作怪  
命殺犬取其心血  
及膽汁丸安神定  
志之藥以八物湯  
吞下服藥十數貼  
九蒸一料以安其  
神藥用遠志石菖  
蒲川歸黃連茯苓  
硃砂側柏葉草龍  
膽等藥

曰氣因血虛亦從而虛和因虛入理或有之遂以秦  
承祖灸鬼法灸治病者哀告曰我自去我自去即愈  
○秦承祖灸鬼法治一切驚狂譫妄踰垣上屋罵詈不避  
親疎等証

以病者两手大拇指用細麻繩扎縛定以大艾炷置  
於其中兩介甲及兩指角肉四處着火一處不着即  
無效灸七壯神驗

○還魂丹 治中惡已死

麻黃 三兩 桂枝 二錢 杏仁 十二粒

右作一服水煎灌下即醒

○桃双丸 治心氣虛怯有熱屍注魔憂驚癩等証

辰砂 半兩 桃仁 十四個 玳瑁 另研 琥珀 另研

烏犀角 石上磨 安石 香灰 研

乾菴 十二月 收七個另研

右以安息香同桃仁琥珀同熬成膏和諸藥末為丸

如鷄頭實大陰乾每服一九人參湯化下

○蘇合香丸 治諸般怪疾 方見氣門

○一方治魔死不用半夏末不拘多少吹入鼻中即醒

○祖傳經驗辟邪丹 治衝惡怪疾及山谷間九尾狐精

為患

人參 茯神 遠志 鬼箭羽

九節菖蒲 白朮 蒼朮 當歸 各一

桃双 五錢 雄黃 另研 辰砂 另研 牛黃 另研

金箔 二十片 或加射香 一錢

右件以桃仁奴已上諸藥為細末入牛黃辰砂雄黃

驚悸指南

夫人之所主者心  
之所養者血心血一  
虛神氣失守神去則  
舍空舍空則鬱而停  
痰痰居心位此驚悸

之所以肇端也或耳  
聞大聲目擊異物遇  
險臨危觸事喪志則  
心為之忤使人有惕  
惕之狀血虛者四物  
湯加貝母橘紅黃連  
山梔 藍根門或安神  
丸見下 氣血兩虛者

益榮湯或寧志丸  
附錄或養心湯見下  
或天王補心丸 虛損  
門 驚悸心煩恍惚不  
安者鎮心丸 癲狂門  
痰迷心膈驚悸者八  
物定志丸加玉金瓊  
珀丸 痰因火動時  
作時止二陳湯去半  
夏加貝母黃芩山梔  
竹瀝姜汁痰飲門温  
膽湯見下

怔忡

始則為驚悸久而心

三味末子和勻以酒調米粉打糊為丸如龍眼大金  
箔為衣臨卧以木香湯化下一丸諸和不敢近体更  
以絳紗囊盛五七丸懸床帳中尤妙

驚悸怔忡健忘門

內經曰心者君主之官神明出焉夫怔忡驚悸之候或  
因怒氣傷肝或因驚氣入膽母能令子虛因而心血為  
之不足又或遇事繁冗想思無窮則心君亦為之不寧  
故神明不安而怔忡驚悸之証作矣夫所謂怔忡者心  
中惕惕然動搖而不得安靜無時而作者是也驚悸者  
驚然而跳躍驚動而有欲厥之狀有時而作者是也若  
夫二証之因不一而治法亦異

者又不可固執以為心虛而治之  
其的而藥之母認非以為是也慎之慎之

脈法

寸口脈動而弱動為驚弱為悸  
跌陽脈微而浮浮為胃氣虛微則不能食  
寸口脈緊跌陽脈浮胃氣則虛是以悸  
肝脈動暴有所驚核

方法

丹溪曰屬血虛有慮便動屬虛時作時止者痰因火動  
瘦人多是血少肥人只是痰多時驚心跳者亦是血  
虛怔忡無時驚悸有時而作

○一方 治勞役大虛心跳

硃砂 白芍藥 當歸身 側柏葉各三

虛傳飲水氣承心胸  
中滲漉虛氣流動水  
既上乘心火畏之心  
不自安故快快然而  
怔忡也怔忡無時多  
有思慮便動屬虛益  
榮湯附餘或龍齒湯  
補遺痰火其時作時  
正者溫膽湯炒黃連  
山梔當歸貝母或東  
垣安神丸並見下或  
天王補心丸虛損門  
驚悸怔忡不安者是  
志丸見下水氣承心  
而作怔忡未雀丸見

川芎 甘草 陳皮各一 炒黃連  
右為細末豬心血為丸如黍米大每服五六十丸津  
唾化下或少用白湯一口送下食後臨卧服  
弱○驚悸養心湯 治肥人因痰火而心惕然跳動驚起  
黃芪 扶神 半夏麴 川芎各半兩  
遠志 桂心 栝子仁 酸棗仁 炒  
五味子 人參各三分  
右細切作一服生姜三片大棗一枚水一盞煎至七  
分服如神水加扶神栝柳各三味同煎  
○安神丸  
黃連酒洗破砂炒 生地黃酒洗當歸身酒洗甘草各  
右為細末湯浸蒸餅為丸如黍米大每服十五丸食  
後服

於心下而作怔忡者  
四七湯加竹瀝姜汁  
補遺龍齒湯 理心  
下怔忡常懷憂慮  
神思多驚如墮險  
地小便或赤或濁  
龍齒研 官桂  
人參 去芦 桔梗  
白茯苓 當歸  
枳殼 去核 麩炒  
遠志 各一兩半  
甘草 炙一兩半  
半夏 二兩 湯泡

○溫膽湯 治心忪  
半夏 竹茹 枳殼實錄 生薑 四錢  
陳皮 三錢 甘草 一錢  
右細切作一服水一盞煎至一盞去粗食後溫服  
○定志丸 治心氣不足恍惚多忘及怔忡驚悸等症  
人參 白茯苓 略三 遠志 去心 石菖蒲 各二  
右為細末煉蜜為丸如梧子大硃砂為末每服五十  
丸食後白湯下  
○朱雀丸 治怔忡驚悸等症  
茯神 二兩 沉香 半兩 硃砂 半兩  
右為細末蒸餅丸如梧子大每服五十丸人參湯下  
○八物定志丸 平補心氣安神鎮驚除隔間痰熱  
遠志 去破心 石菖蒲 兩 麥門冬 兩 茯神 一兩

綿黃氏家方

扶神去木各一兩

右為末每服二錢

姜三片棗一枚梗

米百粒水一鍾煎

六分溫服

**健忘**

精神短少心氣空虛

神不清而生痰痰迷

心竅則遺事多忘亦

因思慮過度病在心

脾故令轉購遺忘名

健忘歸脾湯見下

白木 半兩

煉蜜丸如梧子大

歸脾湯 治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

白木 茯神

酸棗仁 各一

右姜三片棗一枚水一盞煎八分溫服

附○益榮湯 治思慮傷心怔忡恍惚悲憂少顏無寐

當歸 黃芪 小阜

栢子仁 茯神 去末

木香 人參 甘草 各三

姜棗煎服

附○寧志丸 心虛血虛多驚

白茯苓 一兩

人參 半兩

牛黃 二錢

黃芪 龍眼肉

木香 各五分

甘草 各二分

紫石英 芍藥 各八

熟地 各兩

天門冬 一兩

麥門冬 一兩

石菖蒲 二錢

酸棗仁 去殼 各半

末之煉蜜丸如梧子大食後寒湯下三十丸

附○二卅丸 治健忘內安心神外謹腠理

丹參 遠志 去心 珠砂 各半

白茯苓 一兩

末之煉蜜丸如桐子大空心愈風湯下五十丸

祖傳經驗秘方 治憂愁思慮傷心令人惕然心跳動

驚悸不安之症

川歸 酒洗 生地 黃 酒洗 遠志 去心 茯神 各五

石菖蒲 煎

黃連 各二 牛黃 一錢 辰砂 二錢 金箔 十五

右以前六味研細入牛黃辰砂二味末子猪心血丸

如黍米大金箔為衣每服五十丸煎湯心湯送下

神衰遇事多忘二丹

丸附餘 痰多鬱滯於

心脾而善忘者溫膽

湯加竹瀝姜汁見下

或導痰湯加竹瀝姜

汁痰飲門 怒氣滯滯

內痰痰逆而善忘事

者四七湯加竹瀝姜

汁牛膽南星瓜萎鬱

三消指南

消渴

人恣厚味油膩煎炙火氣上騰心受之遂亡津液痰壅清化之道故煩渴引飲小便頻數而多曰消渴治宜升腎肝是有得其源矣天一生津飲或用浮天乳膏或用黃連并補遺或錢氏白朮散去乾姜加乾葛瀉痢門或玉泉丸

湯傷寒門或生酒并露飲或猪肚丸或和血益氣湯或絳雪散或麥門冬飲子或大黃其草飲子並見下或地黃飲子附餘消渴症纔愈止有口乾辛潤緩肌湯見下

補遺天一生津飲治口渴上焦消元乎五液腎主之也水出昆侖元氣升也所以藉戊合癸而騰上肝木引而

三消門

論

內經曰二陽結謂之消又曰痺成為消中東垣曰二陽者陽明也手陽明大腸主津液若消則日黃口乾乃津液不足也足陽明胃主血若熱則消穀善饑血中伏火乃血不足也結者津液不足結而不潤皆燥熱為病也此因飲食甘美而多肥故其氣上溢轉為消渴治當以蘭陰陳氣也不可服膏粱芳草石藥其氣慳悍能助燥熱也岐伯曰味實病久可治脉弦小病久不可治當分三消而治之消者舌上赤裂大渴引飲經曰心移熱於肺傳為膈消者是也以白虎加人參功治之中消者養食而腹自汗大便硬小便數又云口乾飲水多也

濕痺成消消中者是也

治者煩渴引飲耳輪焦乾小便如膏叔和云焦煩水劫鬪腎消也以六味地黃丸治之總錄所謂未傳能食者必發腦疽背難不能食者必傳中滿鼓脹皆為不治之症也張潔古分而治之能食而渴者白虎加人參湯不能食而渴者錢氏白朮散倍加葛根治之上中既平不復轉下消矣先哲用藥厥有旨哉然藏府有遠近亦宜斟酌如心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制大其服皆適其志所為故如過與不及皆誅罰無過之地也治斯疾者宜審焉

脉法

脉經曰厥陰之為病消渴氣上衝心心中疼熱飢而不欲食食則吐下之不肯上寸口脉浮而遂浮則為虛

通津蓋諸陰至頭

而還獨足厥陰肝

本立至頭也所以

木上有酸水能生

津正如易之水風

曰井上出則為功

矣凡治渴須升腎

肝是有得其源矣

大門冬去心

人參去芦各二錢

懷生地黃酒洗

知母各一錢半

麥門冬去心

白芍藥 當歸

升麻各一錢

生甘草五分

木瓜八分

善酒者加乾葛天

花粉各八分

石水一鍾煎八分

合遠溫服

補遺丹溪人乳膏

治消渴

人乳汁 黃連末

天花粉末 藕汁

生地汁

右後二汁為膏

前三味搜和佐以

姜汁此少和蜜為

丸徐三留舌上以

遲則為虛勞則衛氣不足遲則榮氣竭

跌陽脈浮而數浮則為氣數則消穀而緊要舉作消氣

盛則澁數則緊要舉作澁數相搏則為消渴男子消渴

小便反多以致一斗小便一斗腎氣丸主之

心脈滑為渴滑者陽心脈微小為消痺消痺脈實大病

久可治懸小堅急病久不可治

脈數大者生沉小者生實而堅大者死細而浮短者死

方法

丹溪曰養氣降火生血為主分上中下治

上焦者肺也多飲水而少食小便如常

中中焦者胃也多飲食而小便赤黃

下焦者腎也小便濁淋如膏之狀

○大法黃連天花粉二味為末藕汁人乳十生地黃汁佐

以蜜姜汁為清和一二米留舌上徐以白湯送下

下能食者加石膏

○猪肚丸

黃連五兩 麥門冬 知母 括麥根各四

右為細末入雄猪肚內縫熟葉熟於石臼中搗爛如

乾加煉蜜丸如梧子大每服一百丸食後米飲下可

以清心止渴

○天花粉 治消渴之聖藥也 凡消渴藥中大禁半夏

及不可發汗

消者瓊玉膏最妙 方見咳嗽門

○和血益氣湯 治口乾舌乾小便數舌上赤脈此藥

生津液除乾燥生肌肉

柴胡 炙甘草 生甘草 麻黃根各三

分

白湯少許送下

補遺黃連丸 治渴

川黃連五分

麥門冬去心

天花粉各二水半

末之生地黃汁并

牛乳挾和搗丸如

梧桐子大每服三

十九米湯下

消中

人因心事妄動三焦

之火脾受之使陽蒸

胃消穀善飢能食肌

瘦不甚渴更紋曰消

中治宜清心升痰真

為主黃連白木飲或

東垣蘭香飲并並諸

遺或人參白木湯或

生津甘露湯或麥門

冬飲子並見下亦清

涼飲子痔漏門或人

參白虎湯傷寒門或

三黃丸火熱門便結

調胃承氣湯傷寒門

或酒煮黃連丸血症

門口乾舌燥眼溢雜

開便秘當歸潤燥湯

見下

補遺黃連白木飲

當歸稍酒洗四分 知母酒洗五分 黃連酒洗八分 黃柏酒洗一分

石膏一分 生地黃酒洗 漢防已酒洗五分 羌活五分

升麻一分 杏仁研去皮另六分 紅花少許 桃仁研去皮另六分

右細切水二盞煎至一盞溫服忌酒醋濕熱麪

○當歸潤燥湯 治小便多大便便秘澀燥渴喜好溫飲陰

頭退縮舌燥口乾眼澀難開及於黑處見浮雲

細辛 生甘草 炙甘草 熟地各三 柴胡去芦七分

黃柏酒洗 知母酒洗 石膏 桃仁泥 當歸身

麻仁 荊芥穗 防風各一 升麻一分 紅花少許

小椒三粒 杏仁研為泥

右細切作一服水二盞煎至一盞熱服食遠忌辛物

○生津甘露湯一名清涼 治消中能食而瘦口舌乾自汗

升麻四分

生地黃各三 當歸身六分 柴胡 羌活

炙甘草 黃芪 酒知母 酒黃芩各二

酒草龍胆 石膏 黃柏各一分 紅花少許

桃仁五子 杏仁研十個

右細切作一服水二盞煎至一盞加蜜一匙稍熱服

東○辛潤緩肌湯一名精神 前消渴証絕愈止有口乾腹

不能努以藥主之

生地黃 細辛各一分 熟地黃 石膏四分 黃柏酒洗

黃連 生甘草 知母各五分 柴胡去芦 當歸身

荊穗各一 升麻一分 桃仁泥 防風各一 杏仁六個

紅花少許 小椒一粒

右細切作一服水二盞煎至一盞稍熱食遠服

治消中脾胃虛則倍食而不飢也

川黃連酒炒

黃芩酒炒各一升

懷生地黃酒洗

白木各一升半

人參去芦七分

生甘草三分

金釵石斛八分

石水一鍾煎至六分食遠溫服

補遺東垣蘭香飲子

治渴飲水及其善

食而瘦大便結燥

自汗小便數

聖石膏三升

肥知母去毛酒製

川防風去芦

生甘草各一升

甘草炙 人參

蘭香 升麻

連翹去穢 桔梗

白豆蔻仁各五分

半夏泡二分

末之葱餅糊和勻

成劑捏作薄片子

晒乾為末每服二

升食後淡生薑湯

調下

生津甘露飲子 治消渴上下齒皆麻舌根腫退腫痛

食不能下時有腹脹或泄黃如糜名曰飧泄渾身色

黃目睛黃甚四肢痿弱前陰如水尻髻腰背寒面生

蟹色脇下急痛忿嚏喜怒不常健忘

藿香二分

柴胡

黃連

木香各三

白葵花

麥門冬

當歸身

蘭香各五

車澄茄

生甘草

山梔子

白豆仁

白芷

連翹

姜黃絡一

石羔二分

杏仁 去皮

酒黃柏各一

炙甘草

酒知母

升麻 右為細末湯浸蒸餅和勻成劑捏作片子日中晒半

乾擦碎如黍米大每服一錢津唾下或白湯送下食

黃芪飲 治三消

黃芪六錢

炙甘草一兩

每服二錢水煎服

東○人參白木湯 治胃膈痺熱煩滿肌不飲食痺成為

消中善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲水而小便

數蕪療一切陰虛陽實風熱燥鬱頭目昏眩中風偏

枯酒過積毒腸胃燥澁併傷寒雜病產後煩渴氣液

不得宣通

人參

白木

當歸

芍藥

大黃

梔子

荊芥穗

薄荷

桔梗

知母

澤瀉各五錢

茯苓

連翹

括麥根

乾葛各

甘草三兩

藿香葉

青木香

官桂各

石羔四兩

寒水石兩

白滑半斤

腎消

人因熱伏於下腎受之  
眼膝枯細骨節痠痛  
精竭髓枯引水自出  
飲而隨溺稠濁而  
出曰腎渴蓋由真陽  
之氣一亡則所升之  
矣故滲漏而頻洩下  
元虛也宜填精升陽  
為主約腎湯補遺或  
五子益腎丸以斑龍  
膠和丸煎服尤取效  
之速也或補陰丸並  
盟損門或人參散見

下腎虛六味地黃丸  
虛損門腎消小便白  
如膏多羸丸或清心  
蓮子飲並補遺便秘  
大承氣湯傷寒門  
補遺約腎湯治小  
水頻頻去白消腎  
水責上升則為既  
濟今頻頻滲下為  
未濟也  
懷山藥 人參  
綿黃芪 各二錢  
益智仁 研碎  
枸杞子 各一錢  
升麻 五升

右為細末每服杪五錢水一盞入盆砂半兩生姜三片煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加至十餘錢得臟腑流利取效如常服以意加減如腸胃鬱結溫熱內甚有利者去大黃芒硝服

東○絳雪散 治消渴飲水無度小便數者大有神功  
黃芩 黃丹 漢防已 括萎根 各等

右為細末每服二錢溫漿水調下臨卧時併進三服即止

東○人參散 治腎消善飲而食小便頻數白濁如膏  
人參 白木 澤瀉 括萎根 桔梗

白茯苓 蓮翹 各三錢 黃芩 大黃  
薄荷 各五分 甘草 七分 石膏 一錢 寒水石

右細切作一服為末水再煎二兩沸腎消食前上消食後服

河○大黃甘草飲子 治男子婦人一切消渴不能止者  
大黃 五升 先煮二三日 甘草 四兩 長四寸

右用井水一桶將前藥同煮三五時如稠強更添水者宜軟熟為度盛於盆中放冷令病人食宜渴飲湯汁無時侯食盡如燥渴止罷藥未上依前再煮食之不過三劑其病悉愈

河○麥門冬飲子 治心移熱於肺名曰膈消心膈有熱久則引飲為消渴

括萎根 知母 甘草 五味子 生地黃  
人參 葛根 茯神 麥門冬 去心 一錢

右細切作一服加竹葉七片用水一盞煎七分溫服

右水一鍾煎八分

食前溫服

補遺玄菟丸 三消

通用亦治白濁

莢絲子酒浸十兩

北五味十兩

白茯苓五兩

石蓮肉三兩

蜜丸如梧桐子大

每五十丸米湯下

補遺清心蓮子飲

上盛下虛心火炎

上口苦咽乾煩渴

小便赤澀成淋

白茯苓 黃芪

人參各七錢半

炙甘草 地骨皮

麥門冬 車前子

黃芩各五錢

每服五錢水煎食

前服三次

附○玉泉丸 治煩渴口乾

麥門冬 去心 人參

茯苓

黃芪 半生半

烏梅 焙 去核

甘草 各一兩

瓜蒌根

乾葛 各一兩半

末之蜜丸彈子大每服一丸溫湯嚼下

附○地黃飲子 治渴咽乾面赤煩燥

甘草

人參

生苳

熟苳

黃芪

天門冬 去心 麥門冬 去心 澤瀉

石斛

枇杷葉 炒

右各等分每服五錢水煎食遠溫服

○丹溪活套云三消者多屬血虛不生津液俱宜四物湯

為主治上消者本方加人參五味子麥門冬天花粉

前入生藕汁生地黃汁人乳飲酒人加生薑汁○中消

者本方加知母石膏滑石寒水石以降胃火○下消

者本方加黃柏知母熟地黃五味子之類以滋腎水

又問當飲綠綠湯為一第

○經驗原蚕蜜湯治腎消白濁及上中二消飢渴不生肌

肉其効如神蓋此物屬火有陰之用大能瀉膀胱中

相火引陰水上潮于口而不渴也

原蚕 却用米泔水洗其殼其殼綠湯極效如無

綠湯以蠶殼綠綿煎湯皆可代之

便濁指南

赤濁

赤濁者濕熱乘於血  
力宜燥濕降火兼升  
提之二陳易加二木  
升柴白芍 痰飲門或  
八正散 淋閉門或導  
赤散加黃連酒炒二  
禾竹葉十片 日病門  
或四物湯對二陳湯  
加貝母椿根白皮青  
黛活石虛弱者補陰  
丸 虛損門或參茸白

太醫院補遺真傳醫學淵源百病大成卷之十一

便濁門

論

內經曰諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱夫便濁之証因  
脾胃之濕熱下流滲入膀胱故使便溼或白或赤而渾  
濁不清也原病式曰如夏月天氣熱甚則水液渾濁林  
木流津是也血虛而熱甚者則為赤濁此心與小腸主  
病屬火故也氣虛而熱微者則為白濁肺與大腸主病  
屬金故也丹溪曰大率多是濕痰流注直燥中宮之濕  
又曰治宜燥濕降火兼升舉之法此皆至要之語也外  
有遺精滑泄之候與濁相類不可例而推夫遺精者多  
夢與鬼交而泄名曰夢遺或隨溲濁而出謂之精滑亦

水加升麻柴胡以升其清氣

### 白濁

濕痰干於氣分故胃

中濁液下流滲入膀胱而為白濁治宜燥

濕清痰兼升提之二

陳湯加柴胡升麻二

木痰飲門或半苓丸

見下相火盛者珍珠

粉丸見下氣虛者清

心蓮子飲三消門陰

火盛大補陰丸虛損

腎虛人小便白如

有思想无窮所願不遂而得之者治宜安心神以降火  
又有因好色太過房勞致虛而得之者治法宜滋水藏  
以復真陰是皆千古不易之定論也李者詳之

脉法

兩尺脉洪數必便濁失精

女人尺脉濇而弱者或洪數而促者皆為便濁白帶

心脉短小因心虛所致必遺精便濁

方法

丹溪曰便濁屬溫熱有痰有虛赤屬血由小腸屬故也

白濁屬氣由大腸屬金故也

○大率皆是溫痰流注宜燥中宮之濕赤者乃是溫傷血

○一人便濁嘗有半年或時夢遺形瘦作心虛主治以珍

珠粉丸和定志丸服效見

湖光影不定疑如膏

糊為矣蓋因色慾過

度下虛勝脫弱而陰

寒生若此者十无一

二非尋常白濁之比

當審而辨之分清飲

見下

### 夢遺

夢遺者夜夢交感而

泄是也此因相火所

動其病在心葉氏

定心湯附金或安神

丸帶補或定志丸並

驚悸門或秘真丸見

○夢遺主熟料滑石湯

○內傷氣血虛不能固守當補以八物湯加減石檮木根

○大法用青代海石黃栢

○一方治精滑用良姜三斤芍藥黃栢炒焦各二斤檮根

白皮一兩伍斤為末糊丸每服三十九

○一方治便毒丸藥

檮白皮 黃栢炒

滑石 蛤粉炒

右等分神麩糊為丸服之

戴氏曰黃栢治溫熱青代解熱蛤粉賦寒入腎滑石

附靈炒干姜味若款肺氣下降使陰血生且能監制

○二陳湯治濁加升提之藥使大便潤而小便長

○珍珠粉丸 治精滑白濁等証

黃栢

真蛤粉各一 珍珠三錢一方无此

下火盛者定珠  
珠粉丸見下  
心不寧

温膽湯去竹茹加人

參遠志蓮肉棗仁茯

神驚悸門腎虛者目

眩耳鳴夜夢遺精小

兔絲子丸補遺或六

味地黄丸或丹溪補

陰丸並虛損門精不

固金櫻子膏或固本

鎖精丹並補遺

補遺小兒兔絲子丸

治腎氣虛損目眩

耳鳴四肢倦怠夜

夢遺精

兔絲子酒焙五兩

石蓮肉二兩

白茯苓焙一兩

懷山藥一兩內將

分半打粉

右未用山藥糊搜

和丸如梧子大每

服五十九空心温

酒送湯任下如脚

膝無力木瓜湯下

補遺金櫻子膏固

精止濁帶

金櫻子十斤以利

刀剖作兩片取出

子與毛木白內并

右為末水和丸如梧桐子大每服一百丸空心温酒

下或加樗根白皮滑石青代等藥

○半苓丸 治白濁

神麩 半夏燥温 猪苓分水

○虛勞者用補陰藥胃弱者兼用人參及升麻柴胡升胃

中之清氣

○張子元氣血兩虛有痰浊陰火痛風

人參一兩 白木半兩 熟地黄 黃柏炒黑 山藥

海石 瑣陽各半兩 乾姜半兩 南星煨 龜板酥炙

右為細末酒麩糊丸如梧桐子大每服一百丸姜鹽

湯下

○燥熱痰台口中如味干或舌紅或心火

可純涼藥寒涼藥故用炒和之類

○妙香散 治心虛遺精白濁

射香另研 人參另研 木香半兩 茯苓

扶神 黃芪 遠志去心炒 桔梗

甘草絡二 辰砂另研 山藥二兩 姜

右為細末每服二匙温酒調服不拘時

○秘真丸 治思想无窮所願不遂意淫干外入房太

甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫及白物随溲而下

或夢與陰人通泄耳

白龍骨另研 訶子皮大者 縮砂仁半兩 硃砂另研

右為細末麵糊為丸如棗豆大每服一九空心温酒

下冷水亦不可多服大秘或用葱白茶湯下

碎用水二斗砂鍋  
內煎至一斗濾去  
粗再用水二斗復  
煎至一斗去粗不  
用將前汁併一處

慢火煎以視枝不  
住手搖即成膏如  
稠糊滴水不散為  
度收貯瓶內久出

火氣方可服每服  
二大匙空心臨睡  
各進一次白沸湯

或好酒調下一方  
用雞頭肉為末將  
比膏和丸名水空

補遺固本鎖精丹  
治元陽虛備精氣  
不固夢寐遺精夜  
多盜汗

黃芪 人參  
海蛤粉 石蓮肉  
各二兩半 枸杞子

鎖陽 山藥  
五味子 黃柏酒  
拌晒乾炒赤色各  
二兩

右為末用白木六  
兩水五碗煎至二

楊氏家傳 ○草薺分清飲 治真元不足下焦虛寒小便白濁

頻數无度旋面如油光彩不定旋脚登下結如膏糊  
之狀

石菖蒲 烏藥 益智仁 川草薺

白茯苓 一甘草稍 右細切作一服水盞半入鹽一匙煎至一盞空心服

陳 ○治濁固本丸

蓮花鬚 黃連 炒各一 茯苓 砂仁 益智  
半夏 黃柏 炒各一 甘草 煨三 猪苓 二兩 五子

溪 ○九龍丹 治精滑

枸杞子 金櫻子 山查 蓮肉 熟地黃  
芡實 白茯苓 川歸 佛座鬚 蓮花心也

倍常行步輕健婦人厭產者二三服便住孕

錄 ○水陸二仙丹 治遺精白濁夢泄脫精等証

金櫻子 一 芡實 二  
右以芡實去壳杵為細末取金櫻子黃熟者用藍盛  
於水中杵去刺又於石臼中杵碎去核淨再杵細絞  
取自然汁煎熬成飴糖和芡實末為丸如梧桐子大  
每服五七十九空心姜鹽湯送下

溪 ○定志珍珠粉丸 治心虛夢泄

人參 白茯苓 各三 遠志 去心 石菖蒲 各二  
海蛤粉 黃柏 炒各三 焦栲根皮 二 青黛 二兩

右為細末麪糊為丸青黛為衣如梧子大每服五十  
丸空心姜鹽湯下

碗瀝過另放再用  
水四碗煎木相至  
二碗去滓與前二  
碗同熬至一碗如  
膏搜和前藥末為  
丸如梧桐子大空  
心溫酒下五十

**精滑**

精滑者不因交感而  
泄者是也先服妙香  
散見下或威喜丸補  
遺或水陸二仙丹或  
九龍丹或治濁固本  
丸或分清飲加五倍

子壯精滑因相火動  
見下精滑因相火動  
者用知母黃柏降火  
牡蛎蛤粉燥濕白朮  
同法珍珠粉丸見下  
或大補陰丸虛損門  
好色昏虛遺精夢泄  
八味地黄丸三消門  
久不止必用龍骨牡  
蛎藥澁之或金鎖正  
元丹附餘或因精丸  
補遺或秘真丹見下  
補遺威喜丸  
茯苓 四兩用衛卷  
一分磁器內同煮

附○葉氏定心湯 理心氣不足榮血衰少精神恍惚

中失精

人參去芦 白茯苓去皮 黃芪蜜炙 茯神去木各  
厚朴制 川芎 赤石脂研 白木各二兩  
紫苑茸 防風去芦 甘草炙各 官桂半兩  
麥門冬去心

每服三錢水一盞赤小豆七十粒煎六分食後服

附○金鎖正元丹 治真氣不足呼吸四肢倦怠脚膝酸

疼目暗耳鳴遺精盜汗

紫巴戟一兩 補骨脂酒浸 硃砂二兩 龍骨二錢  
肉蓯蓉兩 熟地兩 熟地兩 熟地兩 熟地兩 熟地兩  
右為末酒糊丸如梧子空心溫酒鹽湯任下二十九

○丹溪活命丹

二陳湯加升麻黃柏黃劑子之類或有挾寒者不  
熱加蒼朮白朮炒黃柏黃劑子之類或有挾寒者不  
方加炒乾姜肉桂甚者加附子○有心虛不能固守  
及平素虛寒之人本方加草薢石菖蒲益智仁炒乾  
姜牡蠣龍骨之類○氣虛者本方加黃芪白石人參  
或加附子之類○赤者多有血虛瘦弱之大行之宜  
四物湯加酒知母酒炒黃柏煎湯送下珍珠粉丸○  
赤白濁小腹疼痛不可忍者宜作寒治東垣酒煮當  
歸丸最妙方見婦人門

○祖傳經驗秘真丹 治好色腎虛遺精夢泄白淫白濁

等証

兔絲子 韭子 栲子仁各一兩 龍骨  
牡蛎 山茱萸去核 赤石脂各半 補骨脂一兩

二十沸日乾

溶黃蠟四兩和丸

彈子大空心細嚼

一丸連液嚥下便

清為度忌醋腥物

補遺固精丸

知母去毛酒炒

黃柏酒炒各一兩

牡蠣煨 茯苓

蓮蕊 茯苓

遠志甘草煮去心

山茱萸肉各二兩

煑山藥糊為丸梧

子大硃砂為衣空

心益湯下五下

淋閉指南

血淋

小便壅中不痛為溺

血痛者血淋也通咽

散附餘或白散散補

遺或小前湯或號地

散並見下或亂髮燒

灰入膏少許醋湯下

酒麪過度勞後小

便血來乃精竭火動

故也當補腎精而利

小便不可純用利藥

宜茯苓補血湯見下

遠志

黃柏鹽酒炒

鹿角膠一兩半

杜仲姜汁炒斷

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸空心

姜鹽湯下

○蓮塘朱顯二里病遺精潮熱不起床三月矣召予治脉

之左右寸關皆浮虛無力兩尺洪大而軟與補中益

氣湯加熟地黃知母黃柏地骨皮煎吞下玕珠粉丸

外佐小篋籠一箇以籠陰莖勿使搭肉服藥三十餘

貼一月平安

淋閉門

論

內經曰飲食入胃游溢精氣上輸於脾氣散精上歸於肺道調水道下輸膀胱夫膀胱者主是太陽寒水之化其体有下口而无上口者也長生在申是故西方肺金以為之母而資其化也肺金清肅則水道通調而滲營於下耳然肺金又籍脾土健旺以資化源而清氣得以上升而歸於肺以運行也故經又曰清陽出上竅濁陰出下竅故清陽不升則濁陰不降而成淋閉之患矣先哲以滴水之器譬之上竅閉則下竅不出此理甚明故東垣使炙百合穴用溪使吐以提其氣之橫格是皆開上竅之法也原其為病之由皆膏粱之味溫熱之物或燒

死血作淋牛膝膏  
下血瘀漢椒根煎服  
關隨百散散 治血  
淋執淋

白薇 赤芍藥  
等分末之每服三  
匙溫酒調下

**氣淋**

小便澀痛常有餘瀝  
不盡乃厥陰氣滯無  
其氣耳沉香散或木  
香散並附餘或二子  
報恩湯補遺存因房

市陽水料米偶坐阻  
滯未過以致小便壅  
中作痛內有粉條從  
出莖口有一點白膿  
閉塞小便甚難服藥  
不愈須行房事數次  
即安此乃得效之良  
方也

補遺三子報恩湯  
大香附七個晚間  
用酒一碗浸一宿  
次早煎滾將鷄卵  
一個打下煎熟去  
香附食卵與酒第  
二日香附十四個

酒炙肉之類鬱遏成痰以致脾土受害乏力不能運化  
精微清濁相混故使肺金無助而水道不清漸成淋閉  
之候或謂用心太過房勞無節以致心腎不交水火无  
制清陽不升濁陰不降而成天地不交之否皆先哲之  
法言也古方有五淋之別氣砂血膏勞是也若夫氣淋  
為病小便澀滯常有餘瀝不盡砂淋為病陰莖中有砂  
石而痛溺不得卒出砂出痛止膏淋為病溺濁如膏勞  
淋為病遇房勞即發痛引氣冲血淋為病遇熱則發甚  
則溺血候其鼻準色黃者知其為小便澀也東垣分在  
氣在血而治之以渴身不渴而辨之耳如渴而小便不  
利者熱在上焦氣分肺金主之宜用淡滲之藥茯苓澤  
瀉琥珀燈心草車前子葵麥補蓄之類以清肺金之氣  
瀉其火以滋水之上源也

焦血分有血則淋之類滋脊凡是也除其熱泄其閉塞以滋膀胱腎水之  
下元也治淋之法无越於此者不可不知

**脉法**

脉經曰少陰脉數婦人則陰中生瘡男子則為氣淋脉  
細而數○脉盛大而實者生虛細而澀者死

**方法**

卅溪曰淋雖有五皆屬於熱宜鮮熱利小水山梔子之  
類不可發汗汗之必便血

○淋澀有血因火燥下焦無血氣不得降而滲泄之令不  
行也宜補陰降火以四物湯加知母黃柏或用四物  
湯煎滋腎丸

○小便因執鬱成淋不通用赤茯苓黃芩澤瀉車前子麥

如前法第三日香  
附十一个每日加  
起七個五七朝即  
愈

### 膏淋

濕熱流注下焦氣不  
施化小便赤澀淋瀝  
或出如膏治宜滲濕  
清熱海金沙散補遺

補遺海金沙散

海金沙散治膏淋

四海金沙活共臨

一用粉其甘另末

交易調下效殊深

### 沙石淋

沙石淋者小便混濁

如稠漿腐敗濃汁又

有努出粒如沙如塊

色如馬腦者又有大

而如粉條者初出粉

紅少頃則如白膿漿

矣此因少年斷喪所

致宜服琥珀斑丸膠

丸虛損門或清陽復

氣湯補遺或草豈飲

附餘或石首魚散見

下或用萱草根搗汁

服之或茜根汁亦可

門冬肉桂滑石木通甘草稍氣血加黃芪木香淋痛  
加黃栢生地黃夏月煎調益元散

○參苓琥珀湯 治小便淋澀莖中痛相引脇下不烈者

人參

茯苓 五琥珀

柴胡

川歸尾

澤瀉 各三 川練子 磁玄胡索 生甘草稍 各七

右細切作一服水一盞半加燈心十數根煎一盞服

○琥珀散 治五種淋疼痛小便有膿血出証

琥珀

煅藥

海金沙

蒲黃 各一 月

右為細末每服三錢空心煎草湯調下

○傷寒後脫陽小便不通用生薑自然汁調面香末數

匙小腹大又復益志面香丸調益元散送下

○小便黃用黃栢如齒數加澤瀉若濕熱流注下焦而小

便黃亦宜文

利之

○下焦無血小便澀數而黃者用四物湯加黃栢知母牛

膝甘草稍

○通關丸 即滋腎丸治不渴而小便閉熱在下焦血分

黃栢 酒洗

知母 酒洗

肉桂 五分

右為末熟水丸如梧子大每服百丸空心白湯下

服後須頓兩足令藥易下行也如小便已利幸中如

刀刺痛當有惡物下為驗

○清肺飲 治渴而小便而閉澀不利邪熱在上焦氣

燈心 分

通草 分

澤瀉

瞿麥

琥珀 各半

右細切作一服水一盞半煎一盞空心稍熟服

○導氣除燥湯 治小便閉塞不通乃血澀致氣不運而

下或用萱草根搗汁

服之或茜根汁亦可

又方人煨凝水石細研水飛過溫水調服

補遺清陽復氣湯  
人參去芦川牛膝各二升初服一二帖用士牛膝

牡丹皮 黃芪

懷山藥 知母

木瓜 石斛

甘草梢 仙茅

桃仁 去皮尖同真

青黛研如泥各一錢

右水一鍾半煎空

一鍾食前服五仁

龍膠半酒盞入極

細琥珀末子三分

即合五仁斑龍膠

加陰秋石丹調和

五子益腎丸用膠

角膠為丸早晨淡

鹽湯下一百丸

勞淋為病遇房勞即

發痛引氣衝蓋因火

燥下焦血氣不得降

而滲泄之令不行宜

滋陰以降火四物湯

竅澀也

茯苓皮去

右細切作一服水二盞煎至一盞空心稍熱服

羌活

升麻一升

白茯苓二分

葛根五分

右細切作一服水二盞煎一盞食前稍熱服

小劑湯

生地黄

蒲黃

淡竹葉

常歸稍

生藕節

滑石各五分

木通

瞿麥

車前子

梔子仁

甘草各等

滑石

右四切每服五錢重入灯心七莖水煎服

○牛膝膏用川牛膝一合細切以新汲水五大盞煎耗其

四入射香少許空心服或單以酒煮亦可

○茯苓湯 治胃道陽明積熱食已輒飢面色黃瘦胃

滿脇脹小便閉澀

赤茯苓 陳皮去白

澤瀉

桑白皮各三分  
赤芍藥 白朮 人參 官桂各二分  
石膏八分 病甚者加 大黃 朴硝各一升  
右細切作一服加生姜五片水一盞半煎一盞溫服

○倒換散 治无間久新癰閉大小便不通小腹急痛

加知母黃柏石膏活

石琥珀虛損門或滋

陰降火湯補貴或八

味九驚悸門或六味

地黃丸虛損門氣血

虛八物湯虛損門小

便淋澀莖中痛相引

脇下痛不可忍者參

苓琥珀湯見下

補遺滋陰降火湯

人參去芦二升

懷慶生地黃

天花粉乾葛

知母各一升

五味子十二粒

川水龍八分

黃柏 甘草稍

各七分

右水一鍾煎七分

食前服

**寒淋**

小便不通數中疼痛

澀寒涼多因飲水

寸度或為寒澀心虛

志耗者皆有是症水

香附餘或生附湯補

遺疑白如油草解分

清飲便濁門或鹿角

霜丸附餘

**肛門腫痛**

大黃小便不通

荊芥穗大便不通

右各別研為細末每服二升溫水調下臨時加減服

○葵子散 治小便不通

黃蜀葵子細研 赤茯苓各二

右作一服水一煎二三沸食前服

○琥珀散 治五淋

滑石二升 木通 當歸 木香

蔚金 蘆薈各 琥珀

右作一服為末用蘆薈葉同煎水一盞半煎數沸食

前溫服

○鐵服丸 治大小便不神效

大皂角燒存

右一味不拘多少燒存

丸白湯下

○廣濟雞蘊飲子 治小便不通

雞蘊二兩 生地黄 通草各四 滑石

杏仁去皮 冬葵子各二 石葦各二

右七味細切以水六升煎二升半去粗分三服空心

進一服如人行四五里又進一服必通

○又方 治小便不通

冬葵子 滑石各二 通草 赤茯苓各一

茅根二升 芒硝一升

右細切以水六升煎至二升去粗納芒硝分作三服

連進即通

○集驗方 治小便淋瀝不通

補清生附湯

生附三瞿麥夏通

二川附子活相同

冷淋數痛滑者

姜蜜灯心煎去攻

熱淋

小便赤澀淋痛甚者

曰熱淋宜八正散見

下或益元散加梔子

仁木通或車前草汁

或菴蓄汁夏月以菴

香湯調益元散服痢

疾門或石葦散或秘

傳方並見下或車前

滑石半斤

石葦三刀

通草四刀

榆莢

冬葵子詳

一方加

黃芩二刀

右細切以水一斗煎取三升分作三服頓飲

河○石葦散 治小便不利葦中作痛

石葦去毛瞿麥一滑石五車前子三冬葵子三

右為細末每服方寸七日三服

餘○通閉散 治血淋

香附末陳皮末赤茯苓

右等分末之每服二匙水煎空心温服

附○茯苓調血湯 治酒麪過度房勞後小便下血

赤茯苓一赤芍藥一川芎一半夏五前胡

柴胡一青皮一枳壳一北胡一秦皮一

白茅根一灯心一

每服薄姜三片蜜一匙水煎服

餘○沉香散 治氣淋因鬱小腹脹便溺不通

沉香一石葦去毛滑石一當歸各半葵子一

芍藥七甘草三陳皮一王不留行兩

末之每服三錢前天麥湯調下

餘○木香散 冷氣凝滯小便淋澀作痛身體冷

木香一木通一檳榔一大茴香炒當歸一

赤芍藥一青皮一澤瀉一橘皮一甘草等分

每三錢生姜八桂少許煎服

附○草豆飲 治沙石淋

黑豆一百生粉草一寸

水煎乘熱入滑石末一錢空心服

附○鹿角霜丸 治膏淋多因憂思失志濁氣干清小便

子散補遺胃中濕熱

而清濁不分者

散加車前末通滑石

燈心瞿麥菴蓄木之

蜜水調下中濕門或

五淋散附余

補遺車前子散 治

諸淋小便痛不可

忍 車前子 淡竹葉

赤茯苓 荆芥

燈心各半兩

作二貼水煎食前

温服

虛閉

氣虛不能施化小水不通者四君子湯加升麻先服後吐之

不通參朮中帶木通

梔子之屬四物湯加

黃氏人參吞滋腎丸

五淋損門血虛而小

水不通者四物湯或

芩歸湯先服後吐並

虛損門血溢致氣不

運而發瀉導氣除燥

易武四兩虛者入

痰閉

痰熱隔滯中焦閉滯下焦小水不通者三

陳湯加木通香附煎

服探吐之以提其氣

痰飲門或草蜜湯頓

顛服之補遺或蒲黃

湯附餘痰盛則滿人

導痰湯取吐即通痰

補遺草蜜湯

治心腎有執小便不通生車前草搗自然

淋閉黧如膏脂疲劇筋力或傷寒多有此証  
鹿角霜 秋石 白茯苓 各等

右為末麩糊丸如梧子大每服五十九丸空心米湯下

○五淋散 治諸淋

赤茯苓 赤芍藥 山梔仁 生甘草 兩半

當歸 五錢 加黃芩 五錢

每服五錢水煎空心服

○蒲黃湯 治心腎有熱小便不通

赤茯苓 木通 車前子 桑白皮 荆芥

燈心 赤芍藥 甘草稍 生蒲黃 滑石

右等分末之每二錢紫蘇湯心頭煎服

○通小便法 治小便不通諸藥無效或轉脬至死者

者取龍一筒

根細細扎定筒口于用細木

取口胞頭吹滿氣繫定口再用手捻定筒根頭放了

黃蠟堵塞其筒筒放在小便龜口中放開筒筒根手

其氣透裡自然小便即出大有神効

又法以猪胆汁卷在小便少時汁入自出矣

○家韭子丸 治下元虛冷小便不禁或成白濁

韭子 炒六兩 鹿茸 四兩 巴戟 去心 兔絲子 酒浸

熟羊 當歸 各二兩 菴蓉 酒浸 牛膝 二兩

杜仲 石斛 乾姜 炮 桂心 各

未之酒糊丸如梧子大每服一百丸空心湯酒任下

○祖傳經驗秘方 治小便淋閉莖中作痛神効

石葦 去毛 滑石 瞿麥 地膚草

冬葵子 木通 王不留行 篇蓄 各等分



同內虛濕熱小便不  
禁遺瀉者六味地黃  
丸虛損門或一大地  
黃丸去附子加杜仲  
牛膝補骨脂三味三  
消門虛寒用桂附或  
三因葶子丸附餘虛  
寒而小便不禁自汗  
脈弱者秘元丹即秘  
真丸便濁門若虛熱  
而小便不禁者補腎  
丸加益智仁人參山  
藥虛損門

**秘結指南**

**陽結**

脈見沉實而洪數或  
口渴又能食小便赤  
澀而大便秘結者此  
陽結之証也宜用胃  
承氣湯或小承氣湯  
或大承氣湯或堯仁  
承氣湯並傷寒門

**陰結**

脈見沉伏而遲不能  
食口不渴或喜熱飲

格不必在出痰也用二陳湯探而吐之吐中便有格  
○有氣虛不運者補氣藥中升降用補中益氣湯加枳  
使清氣升而濁氣降也

○治閉格証吐逆而小便不利急宜先灸氣海天樞等穴  
各三七壯其吐必止然後以益元散等藥以利小便  
○祖傳經驗秘方治閉格吐逆小便不通用藿香平胃散  
合五苓散加姜棗煎服立効

予長老脩德翁年七十秋間患小便不通二十餘  
日百方不効後得一方取地膚草搗自然汁服之  
遂通雖至微之物而有迴生起死之功故錄于此  
以為濟利之一助云地膚草俗云白地是也

**秘結門**

論

內經曰北方黑色入通於腎開竅於二陰藏精於骨夫  
腎主五液故腎實則津液足而大便滋潤腎虛則津液  
竭而大便燥結原其所由皆房勞過度飲食失節或恣  
飲酒漿過食辛熱飲食之火起於脾胃逆慾之火起於  
命門以致火盛水虧津液不生故傳道失常漸成結燥  
之証是故有風燥有熱燥有陽結有陰結有氣滯結又  
有年高血少津液枯涸或因有所脫血津液暴竭種種  
不同固難一例而推焉經云腎惡燥急食辛以潤之以  
苦泄之陽結者散之陰結者溫之大法治燥者潤之以  
大黃當歸桃仁麻子仁郁李仁之類風燥者加以防風

小便清利而大便秘結者此陰結之症也治宜溫之麻黃白木湯見下

### 風秘

外受風邪火伏於肺肺與大腸為表裏故腸胃熱燥大便秘結緣風能燥物宜搜風順氣丸燥症門或加防風羌活秦艽皂莢之類或脾約丸補遺附餘或枳殼丸補遺或三化湯中風門或

瀉湯丸或活血潤燥丸並見下婦人風秘火麻仁丸附餘補遺枳殼丸治腸胃風氣壅盛大便

### 秘矣

枳殼去穢炒  
川大黃 羌活  
南木香 不見火  
香白芷 橘紅  
桑白皮 蜜炙各二兩  
皂角 一握去黑皮炒  
末之煉蜜為丸梧  
子大空心米飲下  
七十九姜湯亦可

羌活秦艽皂莢之屬凡以煉蜜取其潤燥以助傳道之勢故結散而疎通矣仍多服補血生津之劑助其真陰固其根本庶無再結之患切勿以巴豆牽牛等峻劑攻下錯嘗得通快必致再結愈甚反釀成病根脾固卒難調治或有血虛脈大如怒管發熱而大便結燥者慎不可發汗汗之則重亡津液閉結而死此鑿鑿之耳活人書有脾約証謂胃強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱故小便數而大便難制脾約丸以下脾之結燥使腸潤結化津流人胃而愈丹溪曰然既曰脾約必陰血枯稿內火燔炙熱傷元氣故肺受火和而津竭必竊母氣以自救夫金耗則土受木傷脾失轉輸肺失傳化宜其大便閉而難小便數而無藏蓄也理宜滋養陰血使陽火不熾金行青化脾土定正

矣今以此丸用之於東南方人身熱雖盛而氣血不者无有不安若用之於東南方人身熱雖盛而氣血不實者雖得暫通將見脾愈弱而腸愈燥矣須知在西北以開結為主在東南以潤燥為要孝者其可不知此乎

### 脈法

脈多沉伏而結 陽結脈沉實而數 陰結脈伏而遲  
或結老人虛人便結脈雀啄者不治

### 方法

丹溪曰有虛有風有濕有火有津液不足者有寒者有氣結者切不可例用芒硝大黃及巴豆牽牛等利藥○久病腹中有實熱大便不通宜用潤腸丸微利之不宜用峻利之藥

麻仁 一兩半用生絹袋盛百沸湯浸袋令濕  
中與水而差一匙許次日燥乾者之粒止皆完

虛秘

人或因病久飲食少  
進或因年高將息失  
宜此是血液枯涸燥  
結无時乃為虛也虛  
則宜滋養陰血潤燥  
散熱如當歸地黃桃  
仁條芩潤燥湯之類  
或通幽湯或活血潤  
燥丸或潤腸湯或潤  
體丸並見下或滋腸  
五仁丸或滋血麻仁  
丸或參地飲並補道  
補道滋腸五仁丸

治津液枯竭大腸  
秘澀道艱難  
栝子仁半升  
杏仁炒去皮尖  
麩仁各一升  
陳皮四升另為末  
松子仁一升一分  
柳李仁炒二升  
右將五仁另研為  
膏入陳皮末研勻  
煉蜜丸梧子大空  
心未飲下五十九  
補遺活血麻仁丸  
不拘男婦及老人  
腸燥皆可服稍潤

枳實熬炒 厚朴姜制 芍藥各三 大黃四升酒

右為末煉蜜為丸梧子大每服三十九溫水下

○通幽湯 治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不  
便燥閉氣不得下治在幽門以辛潤之

升麻 桃仁泥 當歸身絡 生地黃 熟地黃各五

右細切作一服水一盞半煎一盞去粗調換柳細末  
五分食前稍熱服

○潤燥湯 升麻 生地黃分 熟地黃 當歸稍 大黃酒浸

生甘草 桃仁泥 麻仁絡 紅花分

入桃仁用酒煎之  
○潤腸丸 治脾胃中伏火大便閉澀或乾燥咽塞不  
通全不思食及風結血閉皆能治之

兼活 當歸稍 大黃酒浸 桃仁湯泡去

麻仁去壳各 右除桃仁麻仁另研如泥外其餘杵為細末煉蜜為  
丸如梧桐子大每服三十五十九空心白湯下○如

風澀而大便不行加煨皂角仁大黃秦羌以利之○  
如脉澀竟身有氣澀而大便結者加柳李仁大黃以

除氣澀燥 麻黃白木湯 治大便不通五日一次小便黃赤渾

身腫面上及腹尤甚其色黃麻木身重如山沉困无  
力四肢痿軟不能舉動喘促不安

即減服

當歸酒洗乾末一升

懷生地黃一升酒

洗搗爛 杏仁去

皮尖七子研爛

麻子仁一升微炒

另研爛 川大黃

一升五子同麻杏

二仁又共研勻

煉蜜為九梧子六

二更時白湯下三

四十九

補遺參地飭 治虛

人苦於腸燥利便

除熱

清河參 懷生地

枳殼 大黃

杏仁去皮尖另研

巨鼓各一錢

川當歸二錢

甘草三分

右為梅一個生姜

一片水煎二更時

乘熱服

氣秘

人因七情之氣結於

五臟不能流通以致

脾胃不和心腹痞滿

大便秘澁三和散補

青皮去穢二分 酒黃連二分 黃芪

白木 厚朴姜制 柴胡

酒黃柏 陳皮去白 甘草半炙 升麻各三分 吳茱萸

白茯苓 澤瀉各五分 白豆蔻 神曲各六分 杏仁四個

麻黃去節

右細切作二服每服水二盞先煎麻黃金沸掠去沫

入諸藥同煎至一盞去粗稍熱服

疎○升陽瀉熱湯 治腸噎不通逆氣乘急大便不行

青皮 梔子各一分 生地黃 熟地黃

黃柏各一分 當歸身 升麻七分 黃芪一分 桃仁一個去皮 升麻一分 黃芪一分 桃仁一個去皮

右細切作一服入桃仁泥水二盞煎一盞食前熱服

當歸科 皂角仁燒存性一兩五分 桃仁二兩去殼研

右除桃仁麻仁另研外共為細末煉蜜為丸如梧子

大每服五十九白湯下三兩服後須以麻子仁煮粥

每日早晚食之大便須日久再不結燥也此丸藥以

磁罐盛之紙包封毋令見風

疎○潤腸湯 治大便燥不通

熟地黃 當歸稍 大黃各五分 麻子仁 升麻

桃仁各一分 紅花三分 生地黃 生甘草各三分

右細切作一服水二盞煎一盞去粗空心服

疎○潤脾丸 能潤血燥治大便不通

麻仁 當歸稍 生地黃 桃仁

右為細末煉蜜為丸服

枳壳各一分

遺膈噎不通氣逆大

便不行升陽瀉熱湯

或枳殼丸並見下胃

中停滯寒涼之物腹

痛大便不行備急天

黃丸力湯胃傷熱

物氣滯胸腹作疼大

便秘結枳實散

內傷門老人氣秘後

杏丸或紫蘇散仁強

並補遺

補遺三和散 治七

情氣鬱不通脾胃

不和心腹痞閉大

便秘瀉

派活 紫蘇葉

官木瓜 薄切焙

沉香各一兩

南木香 白木

甘草炙 枳殼

陳皮各七手半

大腹皮一子

芫勞 三兩

每服五錢水一盞

煎至六分不拘時

服

補遺橘香丸 治老

人氣秘大腑不便

枳殼丸 治三焦約大小便不通穀氣不得下行

枳殼 二兩 陳皮 二兩 枳殼 半兩 木香 二錢

黑丸 四兩 一半生用半炒熟

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服十五丸姜湯下

附 脾約麻仁丸 治腸胃燥熱大便秘結

厚朴 去皮 枳實 去穢 白芍藥 各八

麻仁 五錢 各 大黃 兩六錢 杏仁 炒 去皮尖

右為末蜜和丸如五子大每服二十九臨卧溫水下

大便通利即止

附 火麻仁丸 治婦人腸胃風結大便常秘

大黃 錢二 枳殼 木香 枳殼 兩

火麻仁 二錢 去壳 研膏 右為末與林二研勻

丸食前白湯下

○本色趙德秀才之母年五十餘身材瘦小得大便燥

結不通飲食少進小腹脹痛予診治六脉皆沉

伏而結澀予作血虛治用四物湯加桃仁麻仁煨

大黃等藥數服不通反加滿悶與東垣枳實瀉滯

丸及備急大黃丸等藥下咽片時即吐出蓋胃氣

惡而不能久留性速之藥耳隨以備急大黃丸外

以黃蠟包之又以細針穿一竅令服三丸蓋以蠟

賈者制其不犯胃氣故得出幽門達大小腸取効

也明日下燥屎一升許繼以四物湯加減作湯使

吞潤腸丸如此調理月餘得大便如常飲食進而

平安

○予族姪百一通判之子因出痘大便閉結不通况醫

治法

末之煉蜜為丸梧  
子大空心米飲下  
七九 此治脉浮  
書便難者如脉沉  
夜便難用苑仁橘  
仁  
補遺紫蘇麻仁粥  
老人服之能順氣  
滑大便  
紫蘇子 麻子仁  
右二味不拘多少  
研爛水瀝取汁煮  
粥食之

黃疸指南

殺疸

夫穀疴者其飲食已  
頭眩心中拂鬱不安  
蓋由傷飢失飽所致  
胃氣燻蒸而黃也濟  
生穀疸丸補遺或小  
柴胡湯加穀芽枳實  
厚朴山梔大黃傷寒  
門  
補遺濟生殺疸丸  
苦參二兩牛膽  
龍胆草各一兩

云便實為佳兆自病至疸瘡愈後不如廁者凡三五  
日肛門連大腸不勝其痛叫號聲達四隣外醫及  
予二三人議藥調治用皂角末及蜜煎導法服以  
大小承氣湯及枳實導滯丸倫急丸皆不效計無  
所出予曰此疸瘡餘毒鬱熱結滯於大小腸之間  
而然以香油一大盞令飲自朝至暮亦不效予畫  
一計令侍婢口含香油以小竹筒一箇套入肛門  
以油吹入肛內過半時許病者自云其油入腸內  
如蚯蚓漸上行再過片時許下黑糞二三升止  
困眠而安

黃疸門

論

內經曰中央葉色入通於脾又曰諸濕腫滿皆屬脾土  
夫黃疸為病肌肉必虛腫色黃蓋濕熱鬱積于脾胃之  
中久而不散故其土色形于面與肌膚也蓋脾主肌  
肉肺主皮毛母能令子虛母病子亦病矣是故有諸中  
者必形諸外耳其証有五曰黃汗曰黃疸曰酒疸曰穀  
疸曰女勞疸雖有五者之分終無寒熱之異丹溪曰不  
必分五同是濕熱如會曲相似正經所謂知其要者一  
言而終是也外有傷寒熱病陽明內實當下而不得下  
當汗而不得汗當分利而不得分利故使濕熱拂鬱內  
其昏能令人發黃病也先哲制茵陳五苓散茵陳湯茯苓

末之用牛膽汁入  
煉蜜和丸梧子大  
空心熟水下五干  
丸或生薑耳草湯  
任下

### 酒疸

夫病酒發黃必小便  
不利其候身目俱黃  
心中熱足下熱脘滿  
又心中懊懣而熱不  
能食時欲吐之即  
愈名曰酒疸蓋因酒  
後胃熱醉臥當風水  
濕得之也小柴胡湯

本於濕湯之類無不應手獲效故曰治濕不利小便非  
其治也又曰濕在上宜發汗濕在下宜利小便或二法  
宜用使上下分消其濕則病無有不安者也學者詳之  
脈法

脈經曰凡黃候寸口脈近掌無脈口鼻黑色並不可治  
脈沉欲飲水小便不利者必發黃也

酒疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐鼻燥其脈浮者先  
吐之沉弦者先下之

酒疸下之久久為黑疸目清面黑心頭如噉蒜芥之狀  
大便正黑皮膚四肢不仁其脈浮弱頰黑微黃故知

#### 難治

穀疸寸口脈微而弱微則惡寒弱則發熱當發不發骨  
節痠痛當煩不煩而極則必死也

#### 強飽則煩

#### 瘦名曰穀疸

陽明病脈遲者食難用飽則發寒熱頭眩者必小便

難此故作穀疸雖下之腹滿如故

跌傷脈緊而數則為熱則消穀緊則為寒食則

尺脈浮為傷腎跌傷脈緊為傷脾風寒相傳食已則眩

穀氣不消胃中着泔濁氣下流小便不通陰被其寒

熱流膀胱身體尽黃名曰穀疸

#### 方法

丹溪曰不必分五同是濕熱如會麩相似輕者小温中

丸重者大温中丸熱多加黃連温多者茵陳五苓散

#### 加食積藥

戴氏曰食積者量其虛實下之其餘但利便小便  
清利黃自退或曰黃疸宜用利法又曰黃疸

加茵陳日鼓大黃七

因白木湯或高根湯

並補遺有熱梔子大

黃湯無執半濕半熱

湯或當歸白木湯並

見下

補遺三因白木湯

桂心 乾葛

白木 各二錢半

巨鼓 杏仁

甘草 各五字

枳實 每七分半

右水煎熱服 治酒

因下後又變黑

如咳逆壅於大便

黑小便赤或亦黑

脈微數

高根湯用二山梔

淡豆豉同實其施

二篇一其煎熱服

用醫酒裡效堪期

### 女勞疸

日晡當發熱而反惡

寒勝脫急小腹滿一

身及黃額上黑微汗

手足心熱因作黑疸

其後小便水狀大便

必黑時澀小便自利

名口女勞疸也腹滿

者硝石礬石散或腎

疸湯並見下或大麥

絡石石膏三味末之

白湯調下

### 黃汗疸

夫黃汗者汗出如柏

子染衣黃不渴因脾

熱汗出入水澡浴所

致濟生黃芪散補遺

補遺濟生黃芪散

治黃汗疸

急脾胃不和食小用  
苓湯小便如滑石

○一方 治黃疸

黃芩

黃連

梔子

茵陳

猪苓

澤瀉

蒼朮

青皮

草龍胆

各五

穀疸加三稜莪朮縮砂陳皮神麩

右細切一服水煎服之

○又方 治氣實傷濕渾身發黃宜吐法

撫芎

梔子

桔梗

各三

右細切一服加姜煎入薑汁服探吐之

○小濕中丸 治黃疸與食積又可制肝燥脾七虛者須

以白木作湯使

苦參

山查

柴更

各半斤

白木

山查

柴更

各半斤

香附米浸一宿

右為細末醋糊丸如梧子大每服七八十丸食前溫

湯下○一方無白木山查苦參柴更有枝子

○大濕中丸

針砂

陳皮

蒼朮

青皮

厚朴

三稜

義木

黃連

苦參

白木

甘草

香附

右為細末醋糊為丸○一方無黃連苦參同前一方

又無甘草名濕中丸

○調胃承氣湯 方見陽寒門

叔和曰腹滿舌痿煩燥不得睡屬黃家又曰病黃疸

發熱煩喘胸滿口燥者以發病時火劫其汗雨熱相

傳然黃家所得從濕故一身及發熱而黃如壯熱者

綿黃芪 赤芍藥 茵陳各二兩

石羔 四兩 麥門冬 巨鼓各一兩

甘草 炙半兩 每服五錢 姜三片

水煎食前服

### 黃疸

夫黃疸者 遍身面目 乘諸於金 食後即飢

蓋因以食酒 穀停留 宿食積中 積積後感

濕熱外和 熱氣鬱蒸 則

散 並補遺 或茯苓湯 補遺 攝寒瓜蒂散

治黃疸 遍身如金 色黑効

瓜蒂 二錢 母丁香 一錢

赤小豆 半錢 赤小豆 半錢

先將瓜蒂 為末 次 入三味 再碾 至夜

令病人 先含水一

熱在裏也 當下之安用 調胃承氣湯

○又曰黃疸之病 當以十八日為期 治之十日以上為差

又劇者為難治 ○又曰病疸而渴者 其病難治 疸而不渴者 其病易治 發於陰部 其人必嘔 發於陽部 其人振寒而發熱也 師曰 諸黃家病 但宜利小便 假令脈浮 當以汗解之 宜桂枝加芍藥湯 又名黃芪建中湯

○又曰男子黃 小便利 自當與小建中湯 ○又曰黃疸腹滿 小便不利 而利自汗止 此為表和裏實 當下之用大黃 七栢枝子 芒消湯

○大黃黃栢枝子芒消湯

黃栢 芒消 大黃 各四 枝子 三枚

○又曰黃疸病 小便色不變 故自利 小便不利 則熱除 必噦者 宜服小半夏湯

○硝石礬石散 右以二石各等分 燒煨為末 每服二錢 以大麥粥湯和服 白三服 取汗 愈若小腸滿急 小便不利 用滑石

石膏各二錢 入粳米一撮 同煎服之

○胃苓湯 治脾胃不和 黃腫如小便赤澀 加滑石

○腎疸湯 治腎疸 目黃或渾身黃 小便赤澀

羌活 柴胡 各五 蒼朮 一錢 獨活 防風 藁本 升麻 各五 黃芩 二分 葛根 五分 澤瀉 三分 白朮 五分 神麴 分 黃連 二分 人參 三分

獨活 柴胡 各五 蒼朮 一錢 獨活 防風 藁本 升麻 各五 黃芩 二分 葛根 五分 澤瀉 三分 白朮 五分 神麴 分 黃連 二分 人參 三分

葛根 澤瀉 白朮 神麴 黃連 人參

神麴 黃連 人參

黃連 人參

人參

人參

口將藥半字插入

鼻內待下或吐去

水便睡至半夜或

次日取下黃水直

候利水止即服黃

連散或茵陳五苓

散

補遺黃連散 治黃

疸大小便秘澀臌

腑壅蒸

川黃連二兩

川大黃好醋拌炒

黃芩去黑心

甘草各一兩

右為細末每服二

錢食後溫水調下

### 濕熱黃

濕熱發黃小便不利

大便反泄者五苓散

傷寒則或扼子栝皮

湯見下或扶苓透濕

湯中身門虛者三因

白木湯酒下寒者

大便不通小便赤澀

內熱調胃承氣湯傷

寒門或茵陳湯或亭

麻苦參散或金砂丸

或大黃黃栝枝子芒

硝湯並見下傷寒大

人活

右細切作一服水一盞半煎一盞去粗溫服

○茵陳五苓散 治傷寒或伏暑發黃小便不利煩渴

等証

本方加倍茵陳入姜棗煎服之

○茵陳茯苓湯 治發黃脈沉細數四肢冷小便澀燥

而渴

茯苓 桂枝 猪苓 各一兩 滑石 半斤 茵陳 二錢

右細切作一服水一盞半煎一盞服如脈未出加當

歸一錢半

○枝子大黃湯 治酒疸心中懊憹或熱而痛

枳實 五枚 巨鼓 一升

右作一服用水五升煎至二升分三服

○半溫湯

半夏 茯苓 白木 各七

前胡 枳殼 各三

甘草 炙 大戟 各五 黃芩 茵陳 當歸 各三

右細切作一服入生姜三片水二盞煎至一盞溫服

○茵陳蒿湯 治身黃乾汗出陽氣上奔小便赤澀不

利溫熱發黃

茵陳蒿 一兩 大枝子 三枚 大黃 半斤

右細切作一服水三盞煎至一盞半溫服

○茵陳大黃湯 治傷寒大熱發黃面目俱黃小便澀

茵陳蒿 柴胡 黃栝

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○枝子栝皮湯 治身熱不去大便利而煩熱身黃

黃芩 升麻 大黃 各七 草龍胆 半

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○枝子栝皮湯 治身熱不去大便利而煩熱身黃

黃芩 升麻 大黃 各七 草龍胆 半

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

熱發黃因陳大黃湯  
或因陳五苓散並見

### 陰黃

陰黃脈息沉遲四肢  
冷自汗泄利小便清

白茵陳四逆湯或小  
茵陳湯並見下服四

逆身又冷汗不止者  
茵陳附子湯或因陳  
菜黃湯並補遺

補遺茵陳附子湯

茵陳附子六乾姜  
八附五茵治性涼

自汗發熱身休以  
水煎熱服可回陽

補遺茵陳菜黃湯

茵陳菜黃用三歸  
六用茵陳姜共施

八附四通吳萸等  
性寒黃疸脈沉微

### 瘀血黃

瘀血黃者熱鬱內結  
身黃則發熱狂言譫

語小便利大便反  
黑脈有乳澁是也抵

當湯或桃仁承氣湯  
並傷寒門量人虛寒

枝子 黃栢 黃連 各半  
右細切一服水一盞半煎至一盞溫服

活 ○小茵陳湯 治發黃脈沉細而遲遍身冷  
附子 一枚作 甘草 兩 茵陳 二兩

活 ○茵陳四逆湯 治發黃脈沉細而遲肢體逆冷腰以  
上自汗

甘草 兩 乾姜 兩半 附子 一枚作 茵陳 三兩

活 ○葶藶苦參散 治溫熱內甚小便赤澁大便時秘飲  
食少進諸藥不效因為久黃

苦參 黃連 瓜蒂 黃栢

活 ○當歸白木湯 治酒疸發黃心下有瘀癥堅滿身體  
沉重妨害飲食小便赤黃此因內虛飲食生冷脾胃  
痰結所致

白木 茯苓 各一 當歸 黃芩 茵陳 各二  
前胡 枳實 甘草 杏仁 各六 半夏 八分

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎一盞溫服

活 ○針砂丸 治穀疸酒疸溫熱發黃等証  
針砂 半斤 醋 蒼木 四兩 香附 四兩 童 神曲 炒微

茵陳 炒 麥蘖 各二兩 芍藥 當歸 去酒洗

生地黃 川芎 青皮 去穢炒各一  
陳皮 去白 義木 醋煮 三稜 醋煮各 梔子 去壳

用之

# 虛黃

虛黃耳鳴口淡怔忡  
 微熱四肢乏力怠惰  
 嗜臥脚軟脈沉細四  
 君子湯虛損門或秦  
 芫飲子補遺若煎食  
 積發黃者小温中丸  
 或大温中丸並見下  
 或用六君子湯加茵  
 陳蒼朮山藥虛損門  
 退黃腫綠礬丸或東  
 礬丸或提金丸並見  
 下

補遺秦芫飲子治  
 五疳疔口淡咽  
 乾發黃微紫  
 秦芫共子白芍藥  
 當歸酒浸川芎  
 熟地黃酒蒸  
 茯苓去皮陳皮  
 半夏湯泡七次  
 小車條遠志前  
 官桂去皮不見火  
 白朮各一兩  
 甘草炙半兩  
 每服四錢姜五片  
 水一多煎七分温  
 服

## 姜黃

## 升麻

乾漆各半兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服六七十丸姜  
 湯送下

集

### ○綠礬丸

治黃腫病最捷

### 五倍子

半斤 炒黑綠礬四兩 炒白針砂四兩 醋神麩半斤 炒  
 右為細末生薑汁煮紅棗肉為丸如梧子大每服六

七十九温酒下不能飲酒米湯亦可終身忌食蕎麥

麩犯之再發難治

鑑

### ○東礬丸

治食勞身目俱黃

綠礬半斤 炒

右研細紅棗肉為丸如梧桐子大每服五十九或酒  
 或姜湯下

○祖傳經驗退金丸

### 蒼朮

白朮

### 陳皮

針砂

### 麥蘖麩

義木

右為細末麩糊為丸服忌魚腥温麩生冷菓等物

○一男子年三十餘得穀疸症求予治以胃苓湯去桂加

茵陳數十貼黃退自以為安不服藥十數日後至晚

目盲不見物予曰此名雀目蓋濕痰盛而肝火有餘也

用獾猪肝煮熟和夜明砂作丸服之目隨明如故來

謝予曰未也不早服制肝補脾消痰之濟必則盡服

伊不信半月後腹漸脹痞滿復來治予仍以胃苓湯

倍二朮加木通麥門冬煎湯下退金丸一月平安

癘風指南

初起

愚按大風症者所因不一或因色慾當風或因醉臥濕地或乘熱脫衣或汗出入水或空心飢餓山行感山嵐瘴氣或勞役奔走途中冒寒兩陰露皆由內傷形躰不知避忌外感風濕毒氣入於皮毛血脈肌肉筋骨之間當時罔覺

失於驅散傳積既久以致榮衛不行內外薰蒸內則生虫外則生瘡而臟腑經絡皆受患矣古人謂大風疾三因五死三因者一曰風毒二曰濕毒三曰傳染五死者一曰皮死筋木不仁二曰脈死血潰成膿三曰肉死割切不痛四曰筋死手足緩縱五曰骨死鼻閉朋場與夫石落眼昏唇翻舌噴甚可畏也所以然

癘風門

論

內經曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癩風又曰癩者因榮衛熱腐其氣不清故使其鼻柱壞而色敗皮膚腐潰風寒客於脉而不去名曰厲風丹溪曰是受天地間殺物之風故也然近見病此者原其所由多是熱血得寒所致或夏月勞甚而入寒泉澡浴或冬月酒後而乃踴水履霜及久水取魚由是溫熱鬱于內而不散風寒客于外而不行內外拂鬱既久而漸成肌膚之敗腐矣經所謂熱勝則肉腐是也大抵此証肺歸於重手足陽明之經蓋手足陽明者胃與大腸上之脾肺二經也

藏病也經又曰凡風之傷人必先取陽明而後及于毒積于中而形於外耳故治法必先取陽明而後及于太陰亦本而標之之義也又溫熱甚必生風風甚則生虫如腐草為螢之類又治法必先殺其虫瀉其火然後主血涼血祛風導滯降陽升陰皆為之治急務也治雖多門大畧不越乎此也學者詳之

脉法

脉兩寸浮而緊 或浮而洪 陽脉浮弦陰脉實大 脉浮緩者易治 洪大而數者難愈 沉實者難愈 脉溢者病在上 脉浮者病在下皆為不治之証也

方法

丹溪曰大風病是受天地間殺物之風古人謂之厲風者以其酷烈暴悍可畏耳人得之分在上在下氣受之

者雷邪正交攻氣血沸騰而濕痰死血充滿於經絡之中故生重生瘡痛痺麻木也治瘡大法內通膈腑外發經絡而重瘡痛痺麻木自出矣亦須首尾斷酒戒色忌食發風動氣葷腥蓋醫家傳生於之物清心寡慾方保无虞也  
初一日服消風散初二日服追風散初三日服磨風丸精壯者十日三服拾弱者十日一服稍痊如壯健人十日內三服每月後二十日一服須要記其日數凡老弱者難治五十歲以下者可治後用洗藥或敷藥或薰方並補劑或先服加減通聖散後服神效紫花丸並見下或升麻散或黃柏丸並補劑或烏蛇丸補劑取汗浮萍散或委香花散或四神丹並補劑或瀉青丸火熱門或灸伏兔穴三

則在上血受之則在下氣血俱受則在上復在下然皆不外乎陽明一經陽明者胃與大腸也無物不受治之者須致意看其疙瘩與瘡上躰先見者多者在上也下躰先見者多者在下也在上者以醉仙散取涎血于齒縫中出在下者以通天再造散取惡物重積於穀道中出後用防風通聖散調之更用三棱劍於委中出血夫上下同得者甚重自非醫者神手病者缺心罕能免也夫從上或從下以漸而來者皆是可治之証人見其病勢之緩多忽之以法治之雖已全愈若不絕味斷慾管不免再發而終於不救也予治五人矣其不死者惟一婦人因貧甚無物可食耳余皆三四年後再發孫真人云嘗治四五百人終無一人免於死非其人不能治也

本病外又服百餘劑加減如法十分安愈

○醉仙散須量人大小虛實與之証候重而急者須先以再造散下之候補養得完復與此藥須斷絕醬醋諸魚椒果煎炒燒炙等物止可淡粥及淡者熟特菜雖茄亦不可食惟烏梢蛇菜花蛇淡酒蒸熟食之可以助藥力也

○外科精要為諸瘡立法而不及厲風蓋風為百病之長以其殘害膏體去死不遠一有染此鮮能免者比之瘡瘍治法為難乃不言及夫八方之風起因為八方應其時則物生違其時則殺物人之稟受有殺氣者則感而受之如持虛受物後又因起居飲食男女游成鬱氣二氣積于厥躬脾先受之乃為溫病溫積之

里八風市穴曲池穴

列缺穴並補遺

補遺消風散 第一

日服

香白芷 全蝎

人參各一兩

右末每服二錢先

一日午間宜喫粥

忌薑椒葱蒜之屬

晚間不可飲食次

早空心溫酒調下

竟漸身漬燥為妙

種遺追風散 第二

日服瀉血追虫

大黃錦紋者六兩

枳實 小者兩八

皂角刺 一兩半

末之每服六錢大

楓油錢半淨朴硝

少許入內好酒一

碗調化五更溫服

待辰時又如前調

藥一研入熟蜜少

許勿令患人知先

以水與患人盥漱

淨然後服藥必以

蜜餅日良久腹疼

為妙候瀉十數次

以薄粥補之

補遺磨風丸 第三

久火氣出焉火氣滋蔓氣濁血汚結其氣不化生

諸虫以次傳歷臟腑必死之病而有可生之理其始

病者胃氣微傷脾主肌肉流行甚緩傳變以漸或可

藉醫藥之功而免謂之必死非惟醫不知藥悉是不

能禁慈可哀也夫

○近見粗工用藥佐以大楓子油殊不知此藥性熱有燥

痰之功而傷血至有病將愈而先失明者

○宋洞虛云大風有丘黑色不治余皆可治虫食肝眉落

食肺鼻崩食脾散啞食心足底穿膝虛腫食腎耳鳴

啾七耳弦生瘡或痺或痛如針刺狀食身則皮痒如

虫行自頭清面黃者為順風自足起者為逆風多因感

寒熱於脈流雜氣而成治法先以雷公散細研下之

或以利不必忙快也思此風之

或齒縫中出臭水血絲或言不得或悶而死難以飲

食只以稀粥用箸灌入或一旬或半月一月面漸白

而安重者又與換肌散

○換肌散 治六風年深不愈者以致眉毛脫落鼻梁崩

塌服此藥不踰月取效如神

黑花蛇 地龍 去土

白花蛇 皆斷黃者並用酒 浸一宿各三兩

當歸 細辛 白芷 天麻

蔓荊子 威靈仙 荆芥穗 甘草花

苦參 紫參 沙參 木賊

不灰木 炙甘草 白蒺藜 天門冬

赤芍藥 何首烏 石菖蒲 胡麻子

草烏頭 去皮 蒼朮 去皮 川芎 木鱉子

日服日進二次

川當歸 川芎

葳靈仙 羌活

何首烏 独活

石荆子 天麻

牛蒡子 防風

車前子 荆芥

比細辛 麻黃

皴面草即地松

蒼耳子各一兩

右晒乾為末酒煮

麩糊和丸梧子大

食前溫酒下三十

服後更添重洗

補遺諸方

苦參五錢 蒼木兩

大黃 半夏

雄黃各二錢

為末分作四筒加

熟艾以紙捲筒每

筒薰一筒

補遺洗藥

地骨皮 荆芥

比細辛 苦參

右各五錢水煎熏

洗遍身血出為効

如洗務要湯寬浸

洗良久方佳

補遺敷藥 第四日

治瘡爛遍身塗之

定風草按本草即天麻也今皆用野天麻也

右為細末每服五錢溫酒調下酒多為妙

○醉仙散

胡麻子 牛蒡子 蔓荆子 枸杞子四味俱

白蒺藜 苦參 瓜蒞子 防風各五錢五分前

右為細末每一兩半入輕粉一錢拌勻每服一錢茶

清調下晨午夕各一服後五七日先于牙縫內出臭

涎渾身疼痛昏悶如醉後利下膿血惡臭屎為効

○通天再造散

鬱金半兩 皂角刺一兩独生 大黃炒各

白丑頭末六錢

右為末每服五錢日未出時以無灰酒調而東服之

年赤色乃見效

○愈風丹

治癘疾手足麻木落眉脫遍身瘡疹皮膚癢

痒爬之成瘡及一切疥癬風疾皆効

苦參一斤研取 烏梢蛇各一條並

土桃蛇一條酒浸二三日

右為細末以皂角一斤剉長寸許段無灰酒浸一宿

去酒以新水一碗操取濃汁去粗銀石器內熬膏枯

前末丸如梧桐子大每服六七十丸煎防風通聖散

送下粥飯噉之日三服三日浴以大汗出為應再三

日又浴取大汗三浴乃安浴法見後條

○一法用挑柳桑槐楮五般枝濃煎湯大缸浸坐沒頸一

日俟湯如油安矣○本草治惡疾遍身生瘡濃煎前萍

湯浴浸半日大效此神方也○又以荆芥穗大黃枝

黑狗脊二兩知無以杜仲代之

蛇床子一兩

寒水石 硫黃

白礬 枯各二兩

朴硝少許

末之臘猪油或香

油調敷不爛免敷

補遺烏蛇丸

烏蛇肉酒浸去骨

蒼耳 浮萍

鼠粘子等分

巨林酒炒焙乾

末之糊九梧子大

巨林酒下百丸

補遺浮萍散 治癩

疾風癬

浮萍一兩 荆芥

麻黃去根 川芎

甘草各半兩

或加當歸芍藥

末之每服一兩水

二鍾入葱白豆豉

前服汗出則愈

補遺凌霄花散 治

厲風

凌霄花半兩

蟬蛻去箔翅足

地龍去土炒

僵蚕洗去糞炒

子蔚金地黃杜仲防風羌活獨活白蒺藜等分為細末以大楓子油入熟蜜丸如梧子大每服茶清送下四五十九一日二服須守戒三五年日誦觀音千萬声以攝其心禁其慾乃安也

○一法以苦參五斤好酒三斗漬一月每服一合日三服常與不絕竟脾既安細末服之亦良尤治癰疹方出圖經陶隱居以酒漬飲治惡瘡久服輕身日華子以為殺虫本草除伏熱養肝胆氣予嘗以蒼耳葉為君以此物為佐更以酒煮烏蠱魚代補蛇之或缺研細糊丸如梧子大每服五六十九加至七八十九熱茶清送下日三服一二月而安若入紫萍尤捷紫萍多水蛭須寒月於山沼取之淨洗去泥畧蒸透乾用○一法治手足瘡由脚間痛甚新至新者用此丸

黃連劉如耽豆大各一兩水一升小煎液者及三秋冬五日取草麻瓜破平旦時面東以浸藥水服一粒漸加至四五粒微利不妨忌猪肉魚腥宜茹淡累獲神効

冊上法○一法先服加減通聖散大瀉惡毒穢積又用三

稜針着肉黑處及委中紫脉刺出死血不可令出太過恐損真氣後服神仙紫花丸

防風去芦 川芎 荊芥穗 桔梗 枳殼去穢

石膏各五錢 黃芩三錢 芫胡 黃連 羌活各五

連翹去蒂 白芍藥 當歸洗酒浸 麻黃 枝子去壳

甘草 滑石 黃柏各三錢 薄荷錢二 生地黃酒

熟地黃洗酒錦大黃兩芒硝兩 皂角刺去尖

生地黃酒洗各三錢半

全蝎各七箇

末之每服二錢酒

調下于浴室內坐

湯中住一時然後

服藥

補遺東坡四神丹

治大風

羌活 玄參

當歸 熟羊

等分末之蜜丸梧

子大每服七十九

酒送

補遺灸法

伏兔二穴在膝上

陰市三寸上是也

○三里二穴在膝下

三寸大骨外大筋

內平鍼入二寸半

宜瀉不宜補可灸

三七壯

○風市二穴在膝外

廉下七寸垂手點

點到處是也灸三

七壯鍼入二寸半

多補少瀉先減後

補

○曲池二穴在手曲

肘骨內橫紋中以

手橫胸取之是也

直鍼入一寸半灸

右細切分八服每服用水一碗半煎一碗空心服日

進二服五六日後又進二服待補養完又行二次然

後服後九藥

外錄集

○神仙紫花丸 治癘風及諸般惡瘡風瘡其効

如神但要藥真無有不效者輕者一料可愈重者二

三料除根

白花蛇一具出蕪黃州黑質白皎龍頭尾虎口背上一

何首烏一兩為牽連皮骨用去頭尾各四 荆芥穗 威靈仙略 麻黃連根節

胡麻子一錢 蛇床子二錢

右六味細切同蛇用無灰酒一大碗浸一宿去蛇

床子通晒乾仍還原酒內再浸再晒酒盡為度待晒

極乾共為細末另包

木香

沉香各半 胡天麻錢五 猪牙皂角五 射香各半 射香重者倍之 明雄黃 辰砂各五分

乳香 沒藥各一 天麻半 草決明一兩 辰砂大塊佳

肉豆蔻一枚 石射香至辰砂五味各另研極細不見火其餘草木

末亦另研細羅過車前五味和勻另包

防風 羌活 甘草 細辛 川芎

獨活 蒼朮一宿 批把葉毛法 白芍藥 白蒺藜

金銀花 五加皮 香白芷 苦參各五 胡麻子

白附子浸 麻黃 川牛膝 草頭烏浸 川烏浸

右昌蒲各二 右為細末另包

○局方升麻散

附

三七壯

○列缺穴在右手寸

口定關頭處

### 更食

食肝胃滯食肺蠱頭

換肌散或愈風湯並

見下食心指頭潰脚

底穿破者曰漏底以

蘆茸散敷之殺虫生

肌收口補遺三症俱

先服醉仙散後服再

造散亦可見宋洞盪

補遺靈丹散

熟蘆葶石 一錢

乳香 杏仁去

皮尖各 盛五分

同研爛 直蘆葶

大黃末 各五分

直輕粉 三錢

共研極細先以藥

湯洗拭乾濕則乾

捺燥則用黃蠟酥

油溶化調敷

### 跌傷指南

#### 內治

凡跌傷以去瘀血為

白芷

當歸

熟半夏法製 茯苓各三

蒼朮

乾葛

桔梗去芦 升麻各一兩

熟枳殼去穢 乾姜各五

大黃兩 芍藥七子

陳皮半斤 甘草五子

每服四錢生姜三片灯心二十根同煎服

附○黃精丸

蒼耳葉

大力子

紫背浮萍等分

烏蛇肉中年酒浸

黃精倍前三味生搗汁

末之神麴糊丸如梧桐子大每服五七十九温酒下

一方加炒栝生地甘草節

摠合法治用大楓子三斤新鮮者佳 油黃以磁確一

個盛之少入無灰酒以皮紙竹箬重重包口勿令泄

氣頓滾湯中勿令及口外以物

武火蒸似黑爛為度

分入第二號藥八錢重第一號藥六錢重第三號藥

一兩五錢重和勻加糯米飯搗極膠粘如梧桐子大

晒乾勿見火每服二十九漸加至五六十雞鳴時

午時臨臥時各一服茶清送下忌房勞醃酸酒醋糟

淹猪羊雞馬驢肉魚醒前炒水菓五辛姜椒大料辛

辣熱物蕎麥粟豆之類若不忘口斷慈則藥無功雖

愈再發其餘肉味病愈後一年可食但猪羊雞肉終

身用忌此法乃治癩之神方也不可輕忽

#### 跌傷方法

○治跌撲損傷用蘓木以活血黃連以降火白朮以和

中童便煎為妙在下者可下瘀血但先須補托在上

者宜飲韭汁或和粥吃切不可飲冷水蓋血得寒則

主桃仁承氣湯加蘇木紅花下之傷寒門或元戎接骨丹或歸厚湯或雞鳴散或乳香散並見下或乳香黃芪散或接骨散並除

**外治**

補遺走馬散 治折傷接骨  
栢葉生少用 皂角生多用 骨碎補去毛 荷葉生各等分

右為末於折傷處 猶定入原位以姜汁調藥加糊攤在紙上貼骨斷處用杉木片子夾定以繩縛之莫令搖動三五日後開看以溫葱湯洗之復再貼藥復夾七日如痛甚加沒藥 補遺活絡膏 能療風濕肢節疼痛并折傷皆治 當歸尾 蘇木 川羌活 蒼朮

凝但一絲血入心則死

○骨損者用古文錢五分醋浸乳香沒藥各一錢酒研服 或用接骨散

○元戎接骨丹

沒藥 乳香 當歸 川椒 自然銅煨 赤芍藥 骨碎補酒炙 敗龜板酥炙 鹿脰骨 白芷 千金藤即郁李仁已上各等分

右為細末化蠟五錢九如彈子大每服一丸好酒半升化開煎用向東南柳枝撓散熱服○一方加龍骨

○凡治損傷或在補氣血俗工不知惟在速効多用自然銅以接骨然此藥必煨煉方可服新出火者其火毒與金毒相扇挾香熱藥毒雖有接骨之功其燥散之禍甚於刀劍成之成之

○治金瘡急以石末付之

石末付之

○又方老杉木皮為末付之

○凡跌撲損傷腹痛者知有瘀血用桃仁承氣湯加蘊木

紅花下之

○當歸道滯湯 治跌撲損傷瘀滯不行等証

大黃 當歸在上用銀在中用身在下用尾遍身

右細切等分每服一兩重酒煎服

○雞鳴散 治從高墜下及木石所壓一切損傷瘀血

疑積痛不可忍並以此藥推陳致新

大黃 杏仁皮尖另研

右為末大碗煎七分濾去粗雞鳴時服至晚必取下

瘀血即愈

真膏 各二兩

香白芷 大黃

單麻子 去殼用淨  
肉各一兩

右細剉杵碎用芝麻油二斤浸晝夜

用文武火熬膏以

筋撓之煎至一斤

時用麻布濾過瀝

乾用蜜陀僧研極

細末一兩入油不

住手攪熬至二十

兩時入後藥末時

不可猛火惟只溶

化而已用好白膠

松香為細末罌過

二斤取葱頭搗爛

絞取自然汁一碗

拌松香末攤曬乾

復杵細又取生薑

薄切搗爛絞自然

汁亦拌松香攤晒

乾聽用

大川烏 一兩為末

南星末 血竭末

草烏末 半夏末

乳香炒過另研

沒藥 炒過另研各

二兩 天麻末 官桂末 乾姜末

愚按此方用杏仁而不用桃仁者蓋痛乃血入氣分  
改用杏仁以行氣中之血矣

○沒藥乳香散 治跌撲損傷痛不可忍

白朮 炒五兩 當歸 焙 甘草 炙 白芷

沒藥 另研各 肉桂 皮去麋 乳香 另研各

右為末和勻再研極細每服二錢溫酒調下

○乳香黃芪散 治跌撲折傷止痛瀉血

乳香 另研 沒藥 另研 黃芪 甘草 麻黃 酒浸

赤芍藥 川芎 陳皮 各一 粟壳 蜜炒 人參 去片

石為散每料分作十服每服用水二錢煎至一盞去

滓溫服

忍若此藥能接骨止痛

定粉 二兩 當歸 二兩 胡砂 二兩

右為末每服二錢煎蘇木湯調下服後時上建蘊酥

○杖瘡膏藥方一治受杖責後如死血痛腫宜先刺出惡

血然後以此膏貼之三四日平復或早失調埋成癰

者貼之即散及治諸般癰疽瘡癤毒已潰未潰貼之

無有不効

甘草 肉桂 蛇蛻 蟬蛻 露蜂房

連翹 白芷 白芨 白欬 白朮

蒼朮 人參 玄參 苦參 芍藥

南星 升麻 厚朴 枝子 百合

金銀花 天花粉 川歸 川芎 穿山甲 另

羌活 獨活 黃連 黃芩 黃柏

三類末 防已末  
比細辛末各一兩  
右藥末入製松香  
和勻漸漸入藥油  
攪化即傾出小鉢  
內倘冬月膏硬難  
貼可用麻油四兩  
蘇木二兩慢火煎  
至二兩加此入膏  
蒸化攪勻中和可  
也

### 破傷指南

#### 內服

凡破傷風初傳在表  
治宜發散羌活防風  
湯見下服前藥汗出  
不止者白朮防風湯  
見下在表者或天麻  
雄黃散或防風湯吞  
大蜈蚣散並見下直  
視在裡者左龍丸後  
服小菴活湯或養血  
當歸地黃湯並見下  
在半表半裡者小柴

破傷門五

大黃 生地黄 紅花 蘇木 苡胡  
驚甲鱗鱗 青木香 何首烏 荆芥穗 雲母石  
花蕊石 藿香 防風略一 亂髮壯年无病男  
鳳凰胎一隻即壳中不轉頭 乾蟾一隻即  
右桃柳桑枝各五莖各細切用香油六斤重浸藥三  
五日入鍋內熬色去粗入黃芩三斤別用槐柳枝不  
住手攪膏成候溫入後藥末  
乳香 沒藥 龍骨 輕粉 血竭各一 麝香仁  
右攪勻磁器收貯臨期看瘡大小攤貼  
○沒藥散 治刀箭傷止血住痛  
風化石末 定粉各一 朴白礬另研 乳香另研  
沒藥另研

### 破傷風門

論

內經曰風者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風  
苛毒而弗能為害也若夫破傷風証因事擊破皮肉往  
往視為尋常殊不知風邪乘虛而客襲之漸而變為惡  
候又諸瘡久不合口風邪亦能內襲或用湯淋洗或用  
艾焚灸其湯火之毒氣亦與破傷風邪無異其為証也  
皆能傳繇經絡燒瘖真氣是以寒熱間作甚則口噤目  
斜身體強直如角弓反張之狀死在旦夕誠可哀憫治  
之之法當同傷寒處治因其有在表在裏半表半裏三者  
之不同故不離乎汗下和三法也是故在表汗之在裏  
者下之在表裏之間者宜和解之又不可過其法也間

破傷門上

十五

胡湯傷寒門頭上有汗者地榆防風散或大卷活湯並見下篇

熱在表禮秘者江鏢丸見下內執筮者大

芎黃湯或小芎黃湯並見下風熱熾盛者防風通聖散中風門

破傷風發熱者用蟬蛻去嘴翅足畧炒研細酒調一錢服効大

抵破傷風症類傷寒在表者汗之在裡者下之乎表半裡者和

### 外治

初破傷風發熱紅腫風邪將欲傳播絡而木入深者發驗秘傳方見下又新諸瘡破傷風項強反折不語通身抽搐直視喉中響如鋸聲急風散內服外傳即白礬散喉病閉牙閉緊不能開用蜈蚣一條焙焦研細末擦牙上吐涎立駐因瘡中風用鼠一頭炙焦末之以臘

問野人多不識此証殺人之易早不求醫治療而袖手待斃哀哉

### 脈法

表脈浮而無力太陽也

脈長有力陽明也

河間曰太陽宜汗陽明宜下少陽宜和

而治不中病者未之有也愚按河間先生論破傷風証脈不及於三陰蓋風邪在三陽之經便宜按法早治而愈若傳入三陰其証已危或腹滿自利口燥舌乾舌卷知縮皆不可生之証故置而勿論也

### 方法

丹溪曰破傷風同傷寒壞証治看有在何經而用本經藥驅逐之誤則殺人劉河間有法有方宜選而用之

羌活

防風

芍藥

甘草

地榆

細辛

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗熱服不拘時候量緊慢加減用之熱則加大黃一錢大便秘只加大黃五分緩七令通

○白朮防風湯

若服前藥太過令自汗者宜服此藥

白朮

防風

黃芪

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服不拘時臧府和而自有汗可用此藥破傷風臧府秘小便赤自汗不止者因服熱藥汗出不休者故知無寒也宜速下之先用小芎黃湯二三服後用大芎黃湯下之

○小芎黃湯

川芎

黃芩

甘草

五分

猪脂和敷即愈狗咬  
破傷風人參不拘多  
少乘火上燒煙盡研  
為粉上仍以魚鱉殼  
令煇封固破傷處甚  
妙不然其瘡入風誰  
為瘡也或將魚鱉燒  
灰入麝香少許酒調  
服之亦可

**奇方**

破傷風口噤反張者  
全錫稍七個焙焦末  
之以熱酒調下或奪  
命散或神效天麻丸

並補遺或小蜈蚣散  
見下破傷風大汗不  
上手足筋掣搖擗者  
白木湯見下破傷風  
欲死三生散加天麻  
末之每服六錢用豆  
淋酒調下即醒中風  
門或元戎方補遺破  
傷風血凝心者以鷄  
翎不拘多寡燒灰存  
性研為細末用好酒  
燒溫調下錢湯下血  
即消散破傷風發熱  
瓜萎子湯補遺或用  
黑豆二十粒硃砂二

右細切作一服水一盞半煎一盞溫服不拘時候三  
服即止再用後藥

間河 ○大芎黃湯

川芎各一分 羌活 黃芩 大黃各一分

右細切作一服水一盞溫服宜和為度

間河 ○發表雄黃散

防風二錢 雄黃 草烏各一分

右為細末每服一字溫酒調下裏和至愈可服裏未

和不可服

間河 ○大蜈蚣散

蜈蚣黃赤足條 鱉魚五錢 炒左蟠龍五錢 炒烟盡為

右為細末每服一錢清酒調下治法依前用裏和至

愈可服但有表証不可服

巴豆霜半錢飯丸如豆且入每服一丸  
丸清酒調蜈蚣散少許送下宜利為度內外風去可

服羌活湯緩緩而治不拘時候服之羌活湯者治半

在表半在裏之藥也

○大羌活湯

羌活 菊花 麻黃 川芎 石膏

防風 前胡 黃芩 白茯苓 蔓荊子

細辛 甘草 枳殼各四分 薄荷 白芷各二分

右細切作一服入生姜五片水一盞半煎至一盞

熱服不拘時日進二服

間河 ○防風湯 治破傷風同傷寒表証未傳入裏宜服此藥

防風 羌活 獨活 川芎各一分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

十文研為極細末好  
未調下不拘時候或  
得命丹補遺

補遺奪命散 治破

傷風角子及張牙

關緊急

明天麻 白芷

川烏 去皮各二錢

草烏 明雄黃

各一錢

右為細末好酒煮

糊和丸如梧桐子

大每服十九溫酒

送下不拘時候

補遺天麻丸 治破

傷風神効

川烏 去生皮三錢

天麻 煨 草烏 生

明雄黃各一錢

右為細末酒煮糊

丸如梧桐子大每

服十九溫酒下不

拘時候

補遺元戎方 治破

傷風欲死者

天南星 川烏

半夏 並生用

天麻 去片

右等分為細末每

服一錢豆淋酒調

○小蜈蚣散

蜈蚣 黃赤足 江鯨 三錢

右為細末用防風湯調下如前藥解表不已覺轉入

表當服左龍丸漸漸看大便硬軟加巴豆霜服之

左龍丸

左蟠龍 炒 五錢 白僵蚕 五錢 江鯨 炒 兩 雄黃

右同為細末飲丸如梧桐子大每服十五丸溫酒下

如裏証不已當為左龍丸末一半內入巴豆霜五分

飲丸如梧桐子大每服一丸漸加至以利為度若利後

更服後藥若瀉痊不已亦宜服後藥羌活湯也

○小羌活湯

羌活

獨活

防風

地榆 各一錢

右細切作一服水一盞半煎一盞溫服如行水如

養血為度

○養血當歸地黃湯

當歸 地黃

芍藥

芍藥

川芎

葉本

防風

白芷 錢各

細辛 五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞服

○雄黃散 治表藥

南星 三錢 半夏

天麻 錢五

雄黃 半錢

右為細末每服一錢溫酒調下如有涎於此藥中加

大黃為下藥

○地榆防風散 治破傷風中風半在表半在裏頭微

汗身無汗不可發汗宜以表裏治之

地榆

防風

地丁香

馬齒見 各等

下稍溫服以酒

三三

續豆瓜麥子湯 治

破傷風發熱

瓜麥子九錢

白活石一錢半

天南星 蒼朮

赤芍藥 去芦

陳皮各一錢

川黃連 黃芩

茵陳炒 香白芷

各五分 甘草少

許

右分二服每生薑

一片水煎溫服

傷風

麝香另研辰砂

川烏 去皮尖

大半夏 各二錢

藜蘆 去上二錢

明雄黃 五分

右為細末棗肉和

丸如雞頭大每

服一丸嚼細溫酒

下若牙關緊以剪

刀斡開灌下吐涎

為妙如吐以生葱

湯止之不吐更用

半丸

右為細末每服三錢溫米飲調下

○白木湯 治破傷風大汗不止筋牽手足搐搦

白木

芍藥 四錢

右細切作一服水一盞半煎一盞溫服不拘時候

○江鯽丸 治破傷風驚而發搐藏府秘泄知病在裏

宜以此藥下之

江鯽 兩

野鴉糞 炒半

雄黃 一錢

白殭 蚕 兩

右為細末分作三分用二分以燒飯為丸如梧桐子

大硃砂為衣用一分入巴豆霜一錢同和亦以燒飯

為丸如梧桐子大不用硃砂為衣每服以前硃砂衣

○祖傳經驗秘方 治初破傷風發熱紅腫風邪將欲傳

播經絡而未入深者屢驗

杏仁 去皮

羅白麩 各等

右以二味和勻用新汲水調和如膏付傷處

○安文陳玆四兄因勸闖歐眉稜骨被打破得破傷風頭

面大腫發熱予適在彼家以九味羌活湯服取汗外

用杏仁搗爛入白麩少許新汲水調付瘡上腫消熱

退而愈後以此法治者千人皆驗

○附翻花瘡

川芎

辰砂 一分

右為細末蒸餅丸如梧桐子或如菉豆大每服八分

天花粉 各五

麝香 五分

輕粉 五分

雄黃

温酒下日三服  
○一方無川芎天花粉二味亦効

院補遺真傳醫學源流肯督大成十一卷

瘡癩指南

腦發

夫腦發者伏陽結滯  
邪毒上壅或生疔  
之端或在風也形如  
硬癬漸次潰爛龜生  
痛如刀刺亦腫无膿  
治法前當歸連翹散  
下解毒丸疎通並補  
遺然後服乳香黃芪  
散跌撲門瘡口上瘡  
酥丸用神礁膏貼之  
並補遺或量瘡大小

大醫院補遺真傳醫學源流肯督大成卷之十二

瘡瘍門

論

內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又曰膏梁之變足生大  
丁榮氣不從逆於肉理乃生癰腫東垣謂榮氣即胃氣  
也蓋胃氣調和則榮衛之氣皆順流而無逆於肉理耳  
若夫飲食失節肥甘過傷以致濕熱蘊積於腸胃之間  
燒燂府藏煎熬真陰此經之所謂陰之五宮傷在五味  
味焉發熱久而增氣故温熱之氣聚於下焦陰火熾盛  
蓄於八脉八脉沸騰逆於經絡氣凝血滯故其滋養  
精微之氣不能如常榮於肉理是以結聚而成癰腫矣  
經曰熱勝則肉腐是也法當視其所發之地各從其經



疔瘡內毒不破用

針刺破燃藥在內

上用神應膏貼之

其瘡即痊

蟾酥

五分

明信

麝香各一錢

巴豆十五箇去油

右為末用寒食麪

三錢滴水丸量人

大小為度

乳香拔毒散

治一切癰腫瘡癤消毒

止痛

可攷學者其可不詳察乎

脈法

脈經曰脈數身無熱內有癰也一云腹無積聚身無熱

脈數此為腸中有膿意以附子敗醬湯主之

諸浮數脈應當發熱而反洒淅惡寒苦有痛處當發癰

膿脈微而遲反發熱弱而數反振寒當發癰腫

脈浮而數身無熱形黑嘿胸中微燥不知痛之所在

此人當發腫癰

脈滑而數數則為熱滑則為實滑則主榮發則主衛榮

衛相逢則結為癰熱之所過則為膿也

羽林婦病醫者脈之知婦人腸中有膿為下之即愈蓋

寸口脈滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮數則

為衛衛數下降榮滑上升榮衛相干血為虫收小便

痞堅小便或澁或時汗出或復惡寒脈為已成言脈

遲緊聚於瘀血下之則愈

腸澼之為病其身體甲錯復皮急按之軟如腫狀

夫腸澼者小腹腫按之則痛小便數如淋時時發熱自

汗出復惡寒其脈遲緊者膿未成可下之當有血脈

洪數者膿已成不可下也大黃牡丹湯主之

方法

丹溪曰癰疽因陰陽相滯而生蓋氣陽也血陰也血行

脈內氣行脈外相並周流寒與溫搏之則凝滯而行

遲為不及熱與火搏之則沸騰而行速為太過氣得

邪而鬱津液稠粘為痰為飲積久滲入脈中血為之

濁此明滯於陽也血得邪而鬱繼道阻隔或溢或結

積久滲出脈外氣為之亂此陽滯於陰也百病皆由

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

黃柏 黃芩 各二兩 乳香 沒藥各一錢 地骨皮一兩 末之用井水調搗 紙上貼瘡腫處即愈

補遺追毒烏金散 治一切瘡肉惡肉 寒食麪二兩 巴豆五錢 右用水調搗打作餅子將巴豆包定 林教透氣以文武 火燒黑色為末量

脈法

脈經曰脈數身無熱內有癰也一云腹無積聚身無熱

脈數此為腸中有膿意以附子敗醬湯主之

諸浮數脈應當發熱而反洒淅惡寒苦有痛處當發癰

膿脈微而遲反發熱弱而數反振寒當發癰腫

脈浮而數身無熱形黑嘿胸中微燥不知痛之所在

此人當發腫癰

脈滑而數數則為熱滑則為實滑則主榮發則主衛榮

衛相逢則結為癰熱之所過則為膿也

羽林婦病醫者脈之知婦人腸中有膿為下之即愈蓋

寸口脈滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮數則

為衛衛數下降榮滑上升榮衛相干血為虫收小便

痞堅小便或澁或時汗出或復惡寒脈為已成言脈

遲緊聚於瘀血下之則愈

腸澼之為病其身體甲錯復皮急按之軟如腫狀

夫腸澼者小腹腫按之則痛小便數如淋時時發熱自

汗出復惡寒其脈遲緊者膿未成可下之當有血脈

洪數者膿已成不可下也大黃牡丹湯主之

方法

丹溪曰癰疽因陰陽相滯而生蓋氣陽也血陰也血行

脈內氣行脈外相並周流寒與溫搏之則凝滯而行

遲為不及熱與火搏之則沸騰而行速為太過氣得

邪而鬱津液稠粘為痰為飲積久滲入脈中血為之

濁此明滯於陽也血得邪而鬱繼道阻隔或溢或結

積久滲出脈外氣為之亂此陽滯於陰也百病皆由

瘡口用乾貼之

補遺桃花散 治一切惡瘡生肌活血

去風

寒水石 白芨

地骨皮 白欬

白石脂 赤石脂

各半兩 虎骨

烏魚骨 龍骨

黃丹各半兩

為末量瘡擦之

補遺遇仙神應膏

治一切毒氣攻心

疼痛活血破膿去

風生肌救瘡貼之

大效

楮枝

挑枝

槐枝

血餘

乳香

血竭

當歸

防風

黃丹

木鱉子

右將沒乳雄血另

研末先將香油一

斤鍋內慢火熬次

下五枝却下木鱉

於此又不止于癰疽而已

○癰疽因積毒在藏府當先助胃壯氣使根本堅固而行經活血藥為佐參以經絡時使毒氣外發施治之早可以內消上此內托之意也

○或問內托之法予曰河間治腫愀于外根盤不深形証在表其脉多浮病在皮肉非氣盛則必侵于內急須內托宜復煎散除温散鬱使胃氣和平如或未已再煎半料飲之如大便閉及寒熱少服黃連湯如微利及煩熱已退却與復煎散如此使榮衛俱行邪氣不能內傷也

○外科精要謂排膿內補十宣散治未成者速散已成者速潰誠哉是言也若用之于小瘡癰與冬月亦可轉重就輕後深居淺若瀉湯與夏月用之温散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難為倚杖也世人用此不分輕重時令經絡前後正若有人騎瞎馬半夜臨深池危哉

○諸經與少陽厥陰二經生癰疽宜預防之以其多氣少血也血少而肌肉難長瘡久未合必成死証苟不知此遽用驅逐利藥以伐其阴分之血禍不旋踵

○腫瘍內外皆壅宜以托裏表散為主如欲用大黃者宜戒猛浪之非

○潰瘍內外皆虛宜以補接為主如欲用香散者宜戒虛上之失

○外科精要一書惟務紀錄舊方應酬輕小証候耳

○癰疽始發即以艾多灸之可使輕淺騎竹馬灸法最妙蓋艾火暢達接引毒毒出從治之意惟頭為諸陽所

羌獨歸防煎去渣

不用將油又熬下

蛇皮血餘黃丹乳

沒雄血不用槐枝

不住手攪待丹性

紫色滴水中不散

成珠為度

補遺內托千金散

治腦背癰疽乳便

等惡瘡

綿黃氏 白芷

金銀花 人參

括樓根 川芎

川防風 甘草

為藥 官桂

桔梗各等分

水煎入酒半盞再

前沸溫服如痛甚

倍加當歸芍藥又

加乳香

**髮發**

夫髮發者風邪積毒

手陽明胃經客於會

合之前濯在關後形

如米粒漸次赤腫遍

身執瘡尖有膿血沉

困頭眩生吐逆治法

先服當歸連翹散下

解毒丸疎利並見前

聚艾炷宜小而少若身上必痛灸至不痛不痛灸至

痛亦有因灸而死者益虛甚孤陰將絕其脈必浮數

而大且不鼓精神必短而昏無以抵當火氣宜其危

也○按河間灸刺法曰凡瘡瘍須分經絡部分血氣

多少腧穴遠近從背出者當從太陽經五穴選用至

陰過谷束骨崑崙委中是也從髮出者當從少陽經

五穴選用竅陰夾谿臨泣陽輔陽陵泉是也從鼻出者

當從陽明經五穴選用厲兌內庭陷谷衝陽解谿是

也從腦出者則以絕骨一穴治之各穴點法俱見銅

府者徒竭其血於外無益也人對灸經處不再具

○外施貼藥亦發表之意精要謂貼冷藥有神効夫氣得熱

則散得冷則收何謂神効經曰發表不寒也

藥毒可也

○外科針烙得膿後服神仙追毒丸此藥能下積取毒無

取膿之功若血氣壯實則膿自出當以和氣活血藥

佐參芪補劑服之

○腫瘍用手按之熱則有膿不熱則無膿

○膿出而反痛者此為虛也宜補之亦有穢氣所觸而作

痛者宜和解之風冷所逼者宜溫養之

○疽發深不痛者胃氣大虛必死肉多而不知痛也

○腫瘍時嘔者當作毒氣上攻治之潰後當作陰虛補之

若年老潰後發嘔不食又宜參芪白朮膏峻補隨証

加佐使藥河間謂瘡瘍嘔者濕氣侵于胃也宜倍白

朮

○癰疽發渴乃血氣兩虛用參芪以補氣當歸地黃以養

血

五

後服消風散 方風門

去其風熱瘡口上用

追毒散貼之補貴

補真追毒散 治一

切惡瘡追毒去死

肉

巴豆 五子 雄黃

百粉各三子

右為末量瘡大小

乾貼之

夫此藥者脾胃虛熱

心肝和氣上攻禾膠

之端多在承漿之側

形如羊刺四邊腫硬

痛難禁黃水流時淋

痺增寒生吐逆治法

先服當歸連翹散見

前瘡口微擦破上貼

針頭散補遺神應膏

見前如腫執大調乳

香接毒散貼之見前

痰者用乳香黃芪散

見前

補遺針頭散 治一

切惡瘡追毒去死

血

人言 雄黃各

五錢 乳香錢

血或忍冬丸黃芪六一湯皆効

○加味十全大補湯治癰疽潰後補氣血進飲食實為切

要凡膿血出多陰陽兩虛此藥有迎生起死之功但

不分經絡不載時令醫者觸類而長之可也或見腫

平痛寬遊以為安慢不知省無補接調養之功愈後

虛証復見因而轉為他病而危劇者多矣

○蒲公英化熱毒消惡腫散結核有奇功田間路側皆有

之三四月開黃花似菊花味其衍義補遺云四時常

花花罷飛絮節葉間折之有白汁出者是能解食毒

散帶氣可入陽明太陰二經同忍冬藤煎以少酒佐

而服之揭爛盒之亦妙

○白蟻屬金粟收斂堅凝之氣外科之要藥也生肌止血

定痛接骨續筋補虛當與合歡皮同入長肉膏藥用

之有神効但未試其可服否若合歡皮常服之則失

○單麻子性善收能追膿取毒亦要藥也

○癰疽已破未破用皂角刺能鑽引至痛處

取刺骨法

已上皆 冊溪法 ○取久疽久疔漏中朽骨俗名用心骨雞脛骨以信

砒實之鹽泥固濟火煨通紅地上出火毒用骨研細

飯丸如粟米大以皮紙撚送入竅外以拔毒高藥

封之其骨自出

惡瘡發背腦疽等証方法

○升陽益胃散 治一切惡瘡發背腦疽等証

羌活 藁本 黃芪 甘草各獨活

防風 黃柏 防風稍 當歸稍 酒防已

人參 陳皮 蘓木各五 生地黃 知母

醫家源流  
沒藥少許

右為未擦瘡口上  
用神在膏封之

### 背發

夫背發者風執邪毒  
灌於筋骨之間發在  
榮衛俱虛有痰直氣  
衰殘毒攻發治法  
與腦發同

### 脊癰

背發七脾肚在肩下  
脊上因飲食而感其

毒廣一尺深一寸雖  
潰在骨不穿膜不死  
急治脾肚之毒內當  
托裏護心散見下外  
當拔毒散見前內外  
夾攻之若死於右脾  
中恐其毒奔心大要  
服藥截住不令攻心  
如通脊輩腫者不可  
救也

### 肩癰

右搭肩發骨上生者  
以動之處可治難安  
若串於左肩難治左

黃芩

連翹

生甘草

桔梗

當歸

黃連半錢澤瀉七分

右細切分作二服每服用水二大盞浸半日前至一  
盞滴酒數十點去粗臨臥溫服忌飲水再作膿効遲  
初患二三日者服之立消作膿者立潰隨病上下食  
前後服一人患腦疽第八日腫硬如拳即日晚服此  
藥一劑次日便平復腫勢消更不 疼痛又服半劑  
七日全愈如當明之言九瘡皆明中之陽陽中之陰  
二証而已我治此瘡陽藥七分陰藥三分名曰升陽  
益胃散勝十宣也老人宜之亦名復前散或加乳香  
沒藥各一錢尤如

○當歸熟活湯

治腦疽証

黃芩酒炒

黃連酒炒

澤瀉五分

黃柏酒炒

連翹

防風

羌活

山枝子

甘草後各一

當歸身二多獨活七分

薔本七分

右細切作一服水二盞先浸一時許入酒一匙煎至  
八分去粗食後稍熱服日進二服三日盡六服俱將  
藥清汁調下後項栴榔散

○栴榔散

大欵瘡口

栴榔

木香絡三

右為細末用前藥調下或欵瘡口用之決無疼痛以  
蠟油調塗瘡口生肌欵肉甚速別無惡肉瘡口易合  
平復膏梁瘡所宜用也貧人寒地及寒濕外來之寒  
瘡禁不可多用

背疽方法

○千金托裏散

治背疽併諸惡瘡如三日以裏未針灸

搭肩癸骨上以動處  
可治串於右肩難治  
二症可用雄黃散及  
紫焙乾為末乾則油  
調擦濕則乾擦附餘

### 附骨疽

夫附骨疽者皮膚上  
不見起形按之覺有  
癢勢乃風毒和熱外  
侵寒鬱在內故血凝  
氣滯徹骨酸疼痺悶  
自然腫痛難禁此屬

足少陰有經病也治  
宜溫經活血為主先  
用獨蒜頭三片攤如  
品字樣着于其上炙  
之三七壯開引毒出  
外此其藥劑切過二  
三日可愈消散若活  
連翹湯補遺蕪以白  
湯吞入仙解毒丹癩  
癩條下外貼千鎚琥  
珀膏附餘其勢若日  
甚則四圍又敷神消  
散常以葱醋潤之  
補遺中治內托消毒  
散末治內托裏散並

兩利大便者則可消矣

羌活

藥本

黃芪

炙甘草

酒防已

木猪苓

人參各半

防風酒洗

防風稍

當歸補

生甘草

五味子

酒黃柏

陳皮

蘇木各五

當歸身

連翹

酒大黃

黃芩各三

生地黃

酒黃連

枝子

桔梗各一

麥門冬各二

右細切分作三服每服用水三大盞浸半日煎至一

盞稍熱服後一服如前併粗再煎服忌冷水此方如

覺病即便服無不効者若踰勢已發三四日或成

膿則不消也惟經歷發背疽皆得此方而愈

附

○雄黃散

治瘡諸毒有惡肉不能去者

雄黃

巴豆一个

右同研如泥入乳香沒藥各少許再研勻細火上煎

肉自去

○丹溪治背疽方用大黃防風羌活甘草節生地黃當歸

身貝母白芷赤芍藥皂角刺黃芩作大劑煎服氣虛

加人參黃芪瘡潰亦宜加之

附骨疽方法

○丹溪曰附骨疽者皆因久得厚味及勞後與酒後涉水

得此陽滯於陰之証也又曰環跳穴痛不止防生附

骨疽以蒼朮為君佐以黃柏之苦行以青皮冬加桂

枝夏加條芩體虛者加杜仲牛膝以生甘草為使作

大料煎入姜汁食前飲之痛甚者恐煎藥十數貼發不

動少加麻黃一二貼又不動者恐疽將成急按地坑

以火煨坑通紅沃以小便令患赤體坐於坑中以席

或綿衣圍抱下體使熱氣薰蒸腠理開氣血通暢而

補遺或羌活防已湯

或托裏黃芪湯或內

托黃芪酒或黃芪消

毒或內托黃芪柴胡

湯並見下

補遺羌活連翹湯

治癰疽疔毒未成

膿者皆可服之

羌活 連翹

皂角刺 當歸

玄參 各一分五分

川大黃 二分

天花粉 防風

金銀花 紅花

歲靈仙 貝母 各

一錢

三個去殼研爛

水煎臨時服加酒

宜器裝服此即以

白湯吞八仙餅毒

丹丸七十

補遺內托消癰散

治癰疽其勢已成

必須待出膿方了

其毒宜服

當歸 酒洗 人參

黃芩 酒炒 羌活

廣陳皮 紅花

川山甲 蚌粉炒研

末各一錢 甘草生

愈

○羌活防已湯

治附骨疽初發太

陽厥陰太陰分者

羌活 川芎

木香 連翹

白芍藥 木通

右細切水酒各一

大盞煎七分食前

服羌活防已湯

治骨疽初發於足

少陽七分食前服

羌活防已湯

治骨疽初發於足

少陽七分食前服

愈

○托裏黃芪湯

治骨疽初發於足

少陽七分食前服

羌活 川芎

木香 連翹

白芍藥 木通

右細切水酒各一

大盞煎七分食前

服羌活防已湯

治骨疽初發於足

少陽七分食前服

羌活防已湯

治骨疽初發於足

少陽七分食前服

愈

○內托黃芪酒煎湯

治瘡生腿外側或

因寒濕得附

骨疽於足少陽經

分微侵足陽明經

堅波漫腫行收

膳壓之

右細切作一服酒

一盞水一盞半煎

一盞空心服美

膳壓之

右細切作一服酒

愈

○首芪消毒飲

治附骨疽

黃連 黃芩

黃柏 黃蘗

防已 各五分

生地黃 知母

獨活 防風

連翹 各四分

當歸尾 各四分

羌活 一錢

黃芪 各四分

澤瀉 各二分

陳皮 二分

甘草 三分

蘓木

右細切作一服水

煎服一老人年七

十因寒濕地氣

得附骨疽於左腿

外側少陽經之分

微侵足陽明

經分濶六七寸長

一小尺紫硬漫腫

不辨肉色皮澤

但行步作痛以指

按至骨太痛與此

藥一服即止

次

九

九

九

九

炙各二分 皂角刺

二錢 貝母去

心一錢五分

膿出紅眼多減去

羌活加桂心二分

木香芍藥各三分

右水煎食遠服便

瘡空心溫服外貼

比天膏見后

補遺內托裏散 治

癰疽已破疑結如

絲桐子縲起或

被已去敗肉者先

貼比天膏後附餘

若覺要好肉時貼

日堅軟腫消而愈

東○內托苗芪此胡湯 治附骨疽

生地黄分黃柏 肉桂各二分 羌活五分 當歸七分

土瓜根洗 訛胡一精各 錢連翹三分 黃芪二錢

右細切作一服酒一盞水二盞煎一盞去粗空心熱

服賈德茂小男於大腿近膝股內出附骨疽不辨肉

色漫腫光澤木硬瘡勢甚又其左腿乃肝之體上出

在足厥陰肝經之分少侵足太陰脾經之分其脈左

二部細而弦按之洪緩微有力與此藥而安

腎癰方法

○丹溪曰腎癰者腎居小腹之後在下此阴中之阴道遠

位僻難曰 太陰多血然氣運不到血亦罕來中年

後尤慮患此緣有腫痛赤脈証但見虛弱便此液

補血氣可保終身若元氣補之其功多矣

後或半年已來乃病多致失手慎之慎之

東○內托羌活湯 治足太陽經中左右尺脉俱緊按之

无力尻腎生癰堅硬腫痛大作

羌活 黃柏 酒炒各 防風 藁本

當歸尾 肉桂 三分 連翹 甘草 炙

蒼朮 陳皮 各五分 黃芪 半錢

右細切作一服水二盞酒一盞前一盞去粗稍熱空

心服以衣覆蓋癰上使藥力行去衣

內疽方法

○丹溪曰內疽者皆因飲食之火挾七情之火相鬱而發

飲食者陰受之七情者藏府受之宜其發在腔子而

頭向外非干腸胃育膜也宜以內托之藥托出于外

太平膏 見后

人參 歸身

黃芪用桂三分煎

湯拌炒各二錢

白茯苓 去皮 川芎

防風各一錢

炙甘草 五分

右水一鍾煎七分

食遠溫服

肺癰

夫肺癰者口中辟七

燥效胸中隱七痛連

中府痛吐咯膿血臭

穢咽乾而渴大小便  
澁脉數實而滑欲辨  
其的將吐其痰血置  
水中沉底者是不沉  
者非或以生豆豉之  
如啖熟者一般不覺  
腥者是也須滋益直  
陰保固肺氣降火發  
痰不使火痰上以射  
金剛肺自清若潰破  
宜大補肺氣滋阴血  
以復其原搜風湯主  
之傷寒門或服太乙  
膏丸見下肺癰已破  
入風者不治肺癰咳

以針開之而愈先用四物湯加桔梗香附生薑煎服  
膿出後亦用四物湯調理而安

肺癰方法

○丹溪肺癰先須發表千金方曰病咳嚔膿血其脉數實  
或口中咳胸中隱隱痛脉反滑數者為肺癰其脉數  
數為膿未成緊去而但數者膿已成也

○黃昏湯 治脘中甲錯隱痛知為肺癰

合歡木皮 一掌大

右以水三盞煮取一盞半分二服

○葶藶大棗瀉肺湯 治肺癰或肺脹喘促不得卧

葶藶 煉一兩炒黃研為細末 大棗 十枚

右以水三盞煎大棗至三盞去棗入葶力一九再煎  
至一盞攪勻服之

膿咽乾煩渴大便

○葶藶湯 治嗽有微熱煩燥骨心甲錯 出千金方

秘者桔梗湯見下初

葶藶 二升 薏以仁 伴 桃仁 伍十 瓜瓣 半斤

起用醫壘元戎搜風

右以水一斗先煮葶藶至五升去粗入諸藥煮取二

丸中風門或小青龍

分温再服當吐痰如粥而愈

湯一帖以解裏之風

○桔梗湯 治肺癰心脘氣壅咳膿血心神悶咽乾

邪傷寒門或用神仙

多渴兩脚腫滿小便赤黃大便多澁

大乙膏在如梧桐子

枳壳 炒 桑白皮 防已 各五 桔梗

下或用白芨為末不

貝母 各一 瓜蒌子 當歸 各八 薏苡仁 八分

時用白沸湯調一錢

黃芪 伍 杏仁 去皮炒 甘草 節 百合 各三

食後服七情傷及飢

若細切作一服水一盞半加生薑五片煎八分去粗

飽失宜致傷脾肺咳

温服不拘時若大便秘澁者加大黃小便澁加木通

膿血團參飲子瘡瘰

○又方 治前証

門或黃昏湯見下後

瓜蒌子 當歸 桔梗 貝母

服寧肺湯瘡瘰門喘

當歸 桔梗 貝母

急不得臥者蕁麻大  
寒瀉腸湯見下有微  
熱煩燥骨心中錯葦  
葉湯見下吐膿血如  
肺癰狀口臭他方不  
應者消風散入死病  
男子髮灰米飲調下  
一服可愈蕁麻門

### 腸癰

夫腸癰者濕熱毒氣  
流行傳至脾經腸內  
無氣滯過迴運度  
不能相通聚結成癰  
因腫痛脈訣卒要

曰腸癰惟知脈滑可  
推數而不熱腸癰何  
疑遲緊未膿下以平  
之洪數膿成不下為  
宜治法先服當歸連  
翹散下解毒丸見前  
或五香連翹湯及蜈  
蚣酒見下次服乳香  
黃耆散下之見前或  
薏苡附子敗醬散或  
大黃牡丹湯並見下  
消腫止痛復元通氣  
散補遺  
補遺復元通氣散  
青皮 陳皮各

白芷 甘草各一  
若細切作一服水一盞食後服一方無貝母白芷有  
蕁麻子

○祖傳經驗秘方 治肺癰未成膿者立消已成膿者立  
潰其効如神用章漆樹葉一名接骨木又名繼骨樹  
又名野黃楊田堪路側皆有之右一味細研入瀝  
過以好酒服下飲酒人入生姜研服

### 腸癰方法

○丹溪曰腸癰當作濕熱積治入風難治  
○千金謂腸癰妄治必殺人其病小腹重強按之則痛小  
便數淋時汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫狀  
脈數者微有膿也巢云洪數已有膿脈若遲緊者未  
有膿甚者腹脹大轉側有水声或連臍生瘡或膿自

臍出或大便膿血前附法下

○腸癰治法要畧以薏苡附子敗醬散千金以大黃牡蠣

○灸法治屈兩肘正肘頭蛇骨端灸一百壯下膿而安

○薏苡附子敗醬散

薏苡仁 一錢 炮附子 一分 敗醬 三分

右為細末每取方寸七水二盞煎一盞連相頓服之

小便當下膿血而愈

○大黃牡丹湯

大黃 四分 牡丹皮 一兩 芒硝 三分 瓜蒌子 半斤

桃仁 三十枚去

右細切用水六升煎取一升去粗入碎硝再煎一沸

分三服頓服之有膿即下膿无膿即下血

○東陽呂俊文得潮熱微以瘡伏小腹右邊有一塊大如

二兩 苳萸根

山川甲 炮各一兩

甘草 生熟各七手

加金銀花連翹各

五錢為末每服二

錢熱酒調下

### 乳癰

乳癰病式已詳于下  
但四十前者易治五  
十內外者難愈緣足  
陽明胃經與足厥陰  
肝經衰故耳宜疎肝  
經之滯清胃經之熱  
初乳梗腫痛欲成癰

### 乳梗方法

○丹溪曰乳梗多因乳母不知調養所致蓋乳房陽明所  
經乳頭厥陰所屬忿怒所逆鬱悶所遏厚味所釀以  
致厥陰之氣不行故窠閉而汗不通陽明之血沸騰  
故熱甚而化成膿或因所乳之子膈有滯痰含乳而  
睡口氣熾熱所炊而成結核初便忍疼揉令核軟吃  
令汁透可散否則結成矣治法以青皮疎厥陰之滯  
石膏清陽明之熱生甘草節行汚濁之血瓜蒌子消

者升麻托裏湯或平

六味流氣飲或青皮

湯或橘葉散並見下

或苳萸飲子補遺即

用白湯下八仙解毒

丸五十揚梅瘡癩癩

以葱汁米醋調神消

散敷之或湧泉散附

餘乳癰穿破不能收

功者衝脉飲子補遺

或丁香散見下若大

便不通衝脉飲子加

績麻子炒研二黍黃

連酒炒一糸外貼太

平膏見後補遺

導腫毒或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸或

湯或散須以少酒佐之若加艾火二三壯於痛處灸

之尤妙彼粗工使用針刀必成拙病

○乳癰用蒲公英同忍冬藤入少酒煎服即欲腫是其

效也

乳癰未潰以青皮瓜蒌桃仁連翹川芎橘葉皂角刺甘

草郎隨証加減煎服已潰以人參黃芪川芎當歸白

芍藥青皮連翹瓜蒌甘草節煎服

○東垣升麻托裏湯 治婦人曲乳間出黑頭瘡七項陷

下作黑眼子其脉弦洪按之細小

黃柏 肉桂 各二 黍粘子 五 炙甘草 當歸身

黃芪 絡一連翹 升麻 葛根 各一 糸

右細切作一服水一盞酒半盞同煎一盞食後熱服

補遺 慈嬰飲子

大茨葉連殼洗淨

紙包火內煨熟去

紙連皮并穢子全

搗每一帖用半個

玄參 扁尾

連翹各二錢

天花粉 白芷各

一錢半 桔梗

柴胡 青皮

知母 木通

玄乎索研末

山川甲剉碎壁土

炒研細各一錢

土木醬二個研爛

升麻五分

水煎食後少間服

補遺 衝脉飲子 治

五十外乳癰初已

而又致穿破不得

收功者

黃芪 每一兩用桂

一錢煎湯拌芪碎

盛飯上蒸熟每貼

用二茶 川歸同

白芍 酒炒

懷生地 酒洗潤

川芎 白朮

皂角子 各一茶

人參 一茶五分

妳岩方法

○石香程氏曰妳岩始有核腫結如鷺葦子大不痛不痒

五七年方成瘡初便宜多服疎氣行血之藥須情思

如意則可愈如成瘡之後則如岩穴之凹或如人口

有唇赤汁膿水浸淫胸脇氣攻疼痛用五灰膏金室

膏去其膏肉生新肉漸收斂此疾多生於憂鬱積

忿中年婦人未破者尚可治 成瘡者終不可治

局○十六味流氣飲 治妳岩

人參

黃芪

肉桂

桔梗三分

芍藥

右細切作一服或加青皮一錢水二大盞煎一盞服

川歸各

厚朴

防風

枳殼

木香

治婦人百不如意久積

有核如鷺葦子

每服用青皮四錢細切以水一盞半煎一盞日二服

已上二方間至核消住藥

橘葉散 治証如前

甘草節

石膏

沒藥各五

瓜蒌子

右細切作一服加青橘葉一小握以酒一盞半煎一

淺盞食後或卧時服

丁香散 治乳頭破裂或因小兒吹乳血乾自裂開

多痛

丁香 不拘

右一味為末乾付裂處如燥唾津調付

白茯苓七分

比柴胡去芦

青皮各五分

宣木瓜四分

甘草三分

水煎食後温服

囊腫

外腎陰癢名囊腫又  
名懸癰明囊上腫痛  
乃膀胱与腎經及足  
厥阴肝經感寒湿邪  
氣偏腎於阴之經絡  
致血氣凝滯寒湿氣  
不散作為此病即服

附○秘傳湧泉散

治乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡

凝滯妳乳脹痛或作壅腫

王不留行

白丁香

漏芦

天花粉

白殭蚕

川山甲

火煨黃色  
各七粒

右為細末每服四錢用猪蹄湯調下

囊腫方法

○丹溪曰囊腫者湿熱下注也有作膿者此濁氣順下將  
流入滲道因閉道或虧水道不利而然膿尽自安不  
藥可也惟在善於調攝耳又有因腹腫漸流入囊腫  
甚而囊自裂開舉丸懸掛水出以輔炭末付之外以  
紫蘆葉包裹仰卧養之  
○癰疽入囊者曾治數人悉由濕熱入肝經處治而用  
補明藥佐之雖膿潰皮脫舉丸懸掛者皆不死

托裏散加重則不通

淡竹葉牽牛何首烏

見下復用內消散

骨補遺或內疎黃連

湯附餘及桃花散

瘡下此症外潰去陰

子亦无害也

便毒

夫便毒者膀胱虛熱  
腎臟邪風壅結氣海  
之間發在丹田之側  
高火盛伏鬱氣結於  
膏肓坎水虛殘和熱  
攻乎肌体或因感而

○一方用野紫蘇葉面青背紅焙乾為細末付之如燥以

香油調付囊脫無皮者外以青荷葉包之其皮自生

附○內疎黃連湯 瘡皮色腫硬發熱而嘔便秘脉洪實

黃連

芍藥

嵩歸

枳殼

木香

黃芩

枝子

薄荷

桔梗

甘草各一

連翹二兩

大黃半兩

每服一兩入姜棗煎温服

丹溪便毒方法

○便毒是厥陰經濕熱因勞倦而發用射干三寸同生薑

煎食前服得利二三行効射干開紫花者是紅花者

勿用

○一方用破故紙黍粘子微炒黑丑炒大黃酒蒸焙乾各

等分為末每服一兩酒調下

發小腹下腿縫中硬

起如肥皂形長條俗

名瘰癧治宜發表為

先十神湯加蒼朮羌

活傷寒門或一味干

金散立效

葱白炒熟熨之知冷

再執熨三五次後敷

消毒消腫藥加大黃

木鑿南星草烏敷之

若腫不散服即火消

瘡飲附餘白湯吞入

仙解毒丹三錢楊梅

瘡條貼琥珀膏後附

餘圍神消散後補遺

○石香程氏日便毒一名驕馬癰此奇經衝任為病而癰

見於厥陰經之分野其經多血又名血疔或先有疔

瘡而發或卒然起核疼痛而發皆熱鬱血聚而成也

初發宜疎利之

○瘡方散 治便毒

木鑿子 去壳

當歸尾 芍藥

粉甘草 川芎

射干 忍冬花 即金

川山甲 煨 大黃

沒藥 蘊木 各六

右細切作一服水酒各一

盞煎至一盞食前服

若已結成膿則穿之

○玉燭散

當服獨活祛痺湯則

川芎 當歸 生地黄 赤芍藥

易愈而免致時瘡果

朴硝 大黃 甘草 各八

子也 補遺 破後貼太

右細切作一服水煎食前服

平膏 參紫蛤散 並後

○牡礪大黃湯

補遺 或蘇方散 玉燭

大黃 牡礪 各二錢 甘草 一錢 瓜蒌 一個 去

散 牡蠣 大黃 湯 選用

右細切作一服水二盞煎一盞溫服

並見下

○抑火消瘡飲 治便毒魚口初起未成膿者

補遺 獨活 祛痺 湯

當歸尾 連翹 土木鱉 玄參 各二

川獨活 知母

天花粉 川獨活 生枝子 知母 各一

宣木瓜 防風

宣木瓜 木通 黃柏 酒 澤瀉 威靈仙

生地 酒洗 當歸 各

白芷 各一 甘草 稍 分

一錢 黃芪

水一盞半煎至一盞空腹乘熱服

川牛膝 各二錢

人參 一錢半

沉香 川芎

甘草節 各五分

水煎空心溫服

瘰癧

夫瘰癧者生于頸項者是也乃手少陽三焦足少陽膽經蘊火所致也此二經多氣少血所以結核堅而不潰也延蔓串通陽明經則潰矣治法法風熱漬堅結消痰火則腫消而核散矣涼血疎肝飲或蟾酥餅

綱○一味千金散 治下疳瘡揭起者黑蜘蛛一不道街者為妙入在碗中研爛熱酒攪勻通口服  
瘰癧方法

○丹溪曰瘰癧必起於少陽一經不守禁忌延及陽明大抵食味之厚鬱氣之積曰風曰熱皆此二端拓引變換須分虛實者者忽治虛者可慮以其屬經主決斷有相火且氣多血少婦人見此若月經不作寒熱便生稍久轉為潮熱危矣自非斷熱食淡神仙不治也

○本草云夏枯草大治瘰癧散結氣有補養厥陰血脈之功而經不言其能退寒熱虛者可依右實者以行散之藥佐之外以艾灸亦漸効

○治血少馬刀瘰癧 瘰癧泄以四物湯倍酒炒芍藥牡蛎

粉陳皮柴胡甘草黃連玄參炒神效桑根膏

貼于錢琥珀膏後附  
瘰癧四圍貼神消散後  
補遺其母瘰不能消  
去者宜點藥取之或  
藥線爛並補遺外以  
太平膏掩口紫蛤散  
長肉收口並後補遺  
全愈了可服八物湯  
二三服 虛損門 形氣  
壯強者不必服或皂  
子丸或瞿麥飲或連  
翹散或無比丸並補  
遺或蟾酥膏或綠雲  
膏或金至膏或龍珠

○石香程氏曰瘰癧之証內經謂之結核者是也結核有大小如大豆銀杏連串而生者形大如刀馬者謂之馬刀瘰癧別為火類夫火亢之甚必兼水化制之其核故結也凡瘰癧之起始生於耳後是陽明少陽二經浸淫于太陽之經漸隨經流注于腋脇手足皆有也治法以火針刺入核中不可透底納蟾酥膏于中外用綠雲膏貼之三日後取去核中稠膿盡取去核外薄膜先破初起之核一枚以絕其源服藥後出者皆愈或不肯收如銀杏者盡皆開了用藥取之其自潰者猶如木菓之腐熟肉雖潰而核猶存故膿水淋漓久難得愈治者用鉄烙燒赤烙去其破核猶存者併肉潰處次用金寶膏龍珠膏等藥追去毒惡之

膏或救苦化堅湯或散腫潰堅湯或升陽

調經湯或三聖丸或大聖散或玉屑妙靈散或六丁神散任選用並見下

補遺涼血疎肝飲

治瘰癧未破已破

潮熱往來

牡丹皮 紅花

北柴胡 當歸

川防風 白芷

川羌活 連翹

龍膽草酒洗

生地黄酒洗

玄參各一錢

小川芎八分

甘草節三分

水煎食後乘熱服

補遺醪酢解毒丸

治瘰癧未破已破

真麝酥一錢用乳

汁磨化 明雄黃

末二分同研勻

天麻末五子

皂角刺末一兩

土木鱉去殼新白

者一兩研極細入

前四味同研勻以

後稟膏和為丸

根遂能長肉而愈隨經絡証候服除風熱煎引經之藥以除根本可獲全功也

○蟾酥膏

蟾酥 白丁香十五 寒水石 巴豆五 寒食麪

右各另研和作方用研煉蜜為丸如棗豆大每用一

丸或二三丸納入針竅中如膿未盡再用數丸以膿

盡為度

○綠雲膏

黃連 大黃 黃芩 玄參

黃柏 木鱉子去壳以上

右細切用香油一兩同煎焦色去藥入淨松香五兩

再前成膏瀝入水中扯拔令金色入鈹再熬放溫入

猪膽汁三個 銅綠三錢 醋浸

右用竹筴帶溫攪勻然後如常攤貼兼治瘡口不乾

加乳香沒藥輕粉尤妙

○金寶膏

去腐肉朽肉不傷良肉新肉

桑朮灰 五碗用沸湯十碗淋汁用草紙一層 艾葉

穿山甲二兩 信砒二錢 杏仁七枚去皮同信

生地黄二兩 辰砂一錢 粉霜另研 射香各五

右將灰汁瀝澄清下鍋煎濃下甲末候焦乾一半下

射香次下粉霜乾及九分下辰砂候成膏下炒石灰

末以成塊子即收入小罐內勿見風

○龍珠膏

龍牙草五兩 棘棗根 蘇木各半 海藻二錢

右細切量水二十碗煎至十二三碗瀝粗又用

桑朮灰二碗 石灰 蒼耳草各二

黃連酒炒末二兩

直蘆冬之干

紫胡五兩當歸

玄參各四兩

右伍味用水五升

煎至三碗去渣將

三碗慢火熬成膏

加此米粉入膏和

前藥末為丸如菜

首天用飛過硃砂

為大臨臥時痛栢

葉煎湯送下一百

丸大小增減服之

忌諸發物但可用

肺白養魚蔬菜

可矣

補遺藥方

赤砒 明礬各

一兩 雄黃

雌黃各一錢

共為細末用銅鈞

火上煨煉待藥枯

燥為度研細用灰

汁水調成小餅安

在歷頭上艾火在

藥上灸七壯常時

插點艾條與灸苑

上先多漸洋進以

綿拭流水時漬

以草帛二層皮帛二層放羅底次置灰於上用煎湯

執淋取灰汁十碗許澄清入鍋內煎成膏用巴豆霜

白丁香石羔射香輕粉磁罐子收貯每用取付核上

再付即去確藥併蟹再上新藥其核即潰而愈根小

者但只付藥於根上其核自潰

○救苦化堅湯 治療瘰馬刀挾瘦在耳下或耳後下頸

至肩或入缺盆中乃手足少陽之經分其瘰瘰在

頰下或至頰車乃陽明之經分受心脾之邪而作也

今將二証合而治之

黃芪 一錢 護皮毛 補勝理虛及活血氣為

人參 三分 補肺氣之藥也如氣 炙甘草 五分 能調中

和中諸藥去火益胃 真蘆 升麻 各一

葛根 五分 此三味俱足 牡丹皮 三分 去腸胃

當歸身 三分 生地黃 二分 熟地 煎血活血生血藥也

連翹 一錢 此一味乃十二經膏中之藥不可無

白芍 藥之靈治腹痛必用之其味酸氣其能補中益氣

肉桂 一分 大辛熱能散結積陰虛膏易煎當少用之

有煩燥者去之 柴胡 八分 同連翹去之

黍粘子 腫不用 羌活 一錢 獨活

防風 五分 已上三味必問手足太陽証脊痛項強不

溫如蒸紅兩已上無手足太陽經 荆三稜 抱二

証如當川之為能散結去上部風邪 廣木 炮二分

昆布 二分 味太硬者 麥蘆 二錢 腹中食吐

若瘡空硬者用之如 益智 一分 如聖灸者胃不消也或病人吐

黃連 三分 治 厚朴 如腹脹者加之二分 神麩 炒二分

化者 黃柏 如腹脹者加之二分 神麩 炒二分

用之 黃柏 如腹脹者加之二分 神麩 炒二分

取出其核如內有  
未盡處以鷄毛挑  
藥末入厚肉內  
上搽此以盡為度  
外以太平膏掩其  
口

一藥線即以此點  
末可用糯米糝尖  
七個研爛將點塞  
末研磨為線條兩  
頭尖如針直排待  
乾燥以竹筒盛之  
補遺旱子丸  
旱子一升玄參  
連翹各一兩

水五升慢火熬水  
盡為度先揀旱子  
軟者每服三粒食  
後臨臥細嚼津下  
硬者搗爛蜜丸如  
棒子大每夜含一  
丸半月效治瘰癧  
結核腫痛不破  
補遺豐麥飲 治瘰  
癧馬刀結核多服  
可使消散  
連翹一斤 瞿麥穗  
半斤  
每服五錢水煎食  
後服

也更宜加之  
無則勿用

右件共為細末湯浸蒸餅捏作餅子日乾搗如米粒  
大每服三錢白湯送下○如氣不順加橘紅甚者加  
木香少許量病人虛實臨時斟酌與之母令藥多妨  
其飲食此為大治之法也○如出在陽明於去芫胡  
黍粘子二味餘皆用之○如在少陽分為馬刀挾瘦  
者去獨活漏芦升麻葛根更加瞿麥三分○如本人  
素氣弱其病勢來時氣盛而不短促者不可考其平  
素宜作氣盛而從病變之權也宜加黃芩黃連黃柏  
知母防已之類視和氣在上中下而用之○假令在  
上焦加黃芩半酒洗在中焦加黃連半酒洗在下焦  
則加酒制黃柏知母防已之類選而用之○如大便  
不通而滋其邪盛者加酒制大黃以利之○如血燥

而大便乾燥者加桃仁泥酒制大黃二味○如風  
燥不行者加麻仁大黃以潤之○如風澁而大便不  
行加煨皂角仁大黃秦艽以利之○如脈澁養身有  
氣澁而大便不通者加郁李仁大黃以除風燥也○  
如陰寒之病為寒結秘而大便不通以局房中半兩  
丸或加炮附子干姜煎水冷服之○大抵用藥之法  
不惟瘡瘍一家諸疾病重人素氣弱者當去苦寒之  
藥多加人參黃芪甘草之類瀉火而先補其元氣餘  
○芫胡連翹湯 治男子婦人馬刀瘡  
中桂一分 當歸稍二分 黍粘子 炙甘草  
酒黃柏 生地黃各一錢 柴胡半錢 黃芩炒  
酒知母 連翹各一錢 瞿麥一錢  
右細切作一服水二盞稍熱服

補遺遇仙無比丸

治瘰癧

雪白木 檳榔

蜜陀僧 甘草

川防風 去芦

郁李仁 去皮

黑牽牛 半生半炒

斑蝥 去翅足同搗

米炒去米各等分

末之糊丸梧子大

每服二十九早晚

煎茸草換即湯下

服至一月後覺腹

中痛於小便中取

下癰子毒物有如

東○消腫湯 治馬刀瘡

黍粘子 炒

瓜萎根

連翹 二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗稍熟服

東○柴胡通經湯 治小兒項側有核堅而不潰名曰馬

刀瘡

柴胡 去芦

桔梗 絡二

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後稍熟服

思苦藥泄大便

○散腫潰堅湯 治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆

中或有上或脇下皆手足少陽經中及腰膝遍于頰

或至頰車堅而不潰在足陽明經中所出或二証瘡

已破流膿水並皆治之

黃芩 八分 酒洗

黃柏 酒制炒

黃芩 半炒半生

黃柏 酒制炒

黃芩 四分

連翹 各三

黃連 各三

升麻 各一

右細切作一服水二盞先浸半日煎至一盞去粗食

後稍熟服於卧處伸足在高處頭低垂每含一口作

十次嚥下服畢少頃依常安卧取藥在隔上停蓄故

也另備一料作細末煉蜜為丸如菉豆大每服百餘

丸以前藥送下或加海藻五分炒入亦妙其草此東

世至莫曉也

世至莫曉也

世至莫曉也

世至莫曉也

世至莫曉也

世至莫曉也

馬刀

耳下至缺盆肩上有

核而不散者名馬刀

也散腫潰空湯或消

腫湯或柴胡連翹湯

並見下不潰救苦化

堅湯或連翹散空湯

並見下或海藻一斤

酒漬飲之大蜘蛛搗

末酥酒調服小兒馬

刀瘡柴胡通經湯見

下

**流注**

補遺活絡流氣飲

治流注塊或痛或不痛者或癢下寒

午執赤曰流注風

紅藍花 連翹

川羌活 當歸

土木鱉研細

紫胡各一錢

威靈仙八分

白芷 桔梗

薄荷 川芎

猪牙皂角煨去皮

白通草各七分

生甘草四分

升麻五分

素稟虛弱而脉微

細者加人參黃芪

脉洪大者加玄參

天花粉水煎服食

遠加酒半盞如心

事苦而不悅者蕪

三因中和丸傷寒

門大便有壅者

蕪脹消痰抑火潤

下丸咳嗽門平日

有痰者蕪服順氣

化痰丸咳嗽門痲

上加黑虎膏補遺

○升陽調經湯 治瘰癧遠頸或至頰重此皆出足陽明

胃經中來若瘡深遠隱曲肉底是足少陽經腎中來

乃戊脾傳於發腎是夫傳與妻俱作塊子堅硬大小

不等並皆治之或作丸亦妙

升麻八分 葛根 草龍胆酒炒 黃芩酒炒

廣木酒炒 京三稜酒炒 炙甘草四分 當歸稍

芍藥各三分 黃柏酒炒 知母酒炒

右細切作一服水二盞先浸半日煎一盞去粗臨卧

稍熱服外另稱十貼之數為細末煉蜜丸如菉豆大

每服一百丸服藥時足高去枕仰臥噙一口作十次

嚥之留一口在後送下丸藥服畢安卧如常

○連翹散堅湯 治耳下或至缺盆或肩有生瘡堅硬

如石動之無根名曰馬刀瘡從手足少陽經中來也

或生兩脇下或已流膿作瘡未破並皆治之

柴胡二錢 草龍胆酒制 土瓜根 黃芩酒炒

當歸稍 生黃芩 廣木 京三稜酒炒

連翹 白芍藥各五分 炙甘草三分 黃連酒炒

蒼木米泔浸各二分

右細切作一服外另稱十貼之數為細末煉蜜丸如

菉豆大每服百餘丸煎者用水二盞先浸大半日煎

至一盞去粗臨卧稍熱服去枕仰卧每口作十次嚥

之留一口送下丸藥服畢如常安卧更以後藥塗之

○龍泉散

龍泉粉石上磨也 瓦粉 廣木

京三稜酒洗 昆布各五錢

右同為細末煎熟水調塗之用此藥去疾尤速

醫李源流  
補遺墨虎膏

草烏末四兩  
五倍子炒焦色為末三兩同菜豆炒焦五兩為末  
天南星末半夏末各二兩 大黃  
黃柏 姜黃各一兩 乾生薑末五兩  
右和勻用葱汁水醋調成膏燒上時常以葱醋潤之毋令燥其膏一日又取下如此新的復

○三聖丸 治瘰癧神效劫藥

丁香五十粒 斑猫十個去翅麝香一錢  
右為末用鹽鼓五十粒湯浸爛研如泥和前藥末九如菜豆大每服七丸食前温酒送下日三服至五七日覺小便淋瀝是藥之効便如服或小便下如青筋膜之狀乃病之根也忌温麪毒食

瘰癧 ○立驗大聖散 治瘰癧劫藥

斑猫大者三十箇去頭及翅足糯米 京芥穗一錢  
右為細末每服一錢空心無灰老酒下服此藥須忌魚肉酒醋鹽醬及發風動氣等物止可吃菜蔬白粥且如次早服藥隔夜不吃夜粥黃昏煎川木通湯調下王聖妙靈散一錢重次日五更酒調立驗大聖散

研再貼以消為度  
不拘癰疽瘰癧一切無名腫毒楊梅瘰亦用此神效

鎖喉

夫鎖喉者心經毒氣  
小腸邪風發於聽會  
初生如瘰癧漸次腫  
破結癰毒氣相疑閉  
塞咽喉先服當歸連  
翹散瘡上貼乳香拔  
毒散如成膿以針刺  
破上以蟾酥丸追毒

一貼如不能飲酒用燈心木通湯調下至日中齊小腹痛小便澀痛又用燈心湯調下琥珀末一錢或王屑妙靈散亦可當利惡物從小便中出如蒲萄肉伏中有疑血一點或未下三日後可再服至日中前用六丁神散一服催之必然自下五六日後再催一服以病根除盡為度如項上有瘰一枚取下惡物十枚則盡病根如有小腹攻急莖中澀痛之腦不必驚恐過後便自平復無事

○王屑妙靈散

活石細研為末每服一錢煎川木通湯調下

瘰癧 ○六丁神散

苦丁香六枚或秤 白丁香錢 苦參末伍 赤小豆一  
磨刀泥清石者佳 大班猫頭凡炒 白姜蚕去

散膏藥貼之並腦

發下

### 瘦瘤

夫瘦有五種其肉色不變者謂肉瘦其筋脉現露者謂之筋瘦若赤脉交絡者謂之血瘦若隨憂惱而消長者名曰氣瘦若堅硬而不可移者名曰石瘦此則喜怒所生多著於項皮寬不急捷而垂是也然瘦氣決不可破破則瘡瘍

右共為細末每服一錢重空心無灰酒調下

### 瘦瘤方法

大成方

○破結散

治石瘦氣金瘦血肉瘦馬刀瘰癧等証

海藻酒洗

龍胆草酒洗

通草

貝母去心

昆布酒洗

礬石各

麥麩微炒 半夏麩 錢松羅今以

桑寄生代効

右為細末每服二錢熱酒調食後服忌甘草鯽魚雞肉五辛生菓○有人於項上生瘰大如茄子潮熱不食形瘦日久百方不効後得此方去松羅加直桑寄生一倍服三五日後其瘰軟而散熱退而愈屢驗救人皆効

瘡瘍

○南星散

治皮膚項項面上瘰大者如拳小者如

粟或軟或硬不痒不痛宜用此藥切不可輒用針火

多致不救

生南星火者一枚

右細研爛入好醋五七點杵如膏如無生者即以乾者為末醋調如膏先以細針刺急處令氣透却以膏藥攤貼瘡痒則頻換貼取効

○開結散 頃下瘦疾不問遠近

沉香二錢

木香三錢

陳皮四兩 珍珠四十九个炒過

猪鬃肉子生下附猪頂下夾夾絲一枚如棗大

微匾色紅取四十九个瓦上焙乾

未之每服二銅錢臨卧冷酒調徐上噙下用除日修

合者有奇効

○五海飲

海帶

海昆布

海蝶蛸

海藻

海粉各半

懷州潰多致天柱  
但當破氣斃痰鹹劑  
以軟其堅結自然消  
散破結散見下或開  
結散附餘項下結核  
如梅李不消以大燉  
蛛好酒浸研爛臨臥  
酒調服或昆布一兩  
切碎醋浸徐徐嚥下  
自消或五海飲附餘  
瘰有六種曰管瘰曰  
脂瘰曰肉瘰曰膿瘰  
曰血瘰曰石瘰此遍  
頭面手足隨處往初  
作如梅李狀皮嫩而

光漸如杯卵是也皆因氣血凝滯結成大如拳小如粟或軟或硬不可驟用針破南星膏貼之見下或惡珠膏瘰癧條或昆布丸附餘或十六味流氣飲乳癰條或剪刀草冷水調付之或荒花根淨洗取汁浸線繫之即落然六瘤中惟脂瘤可破去脂粉則愈餘皆慎之

**結核**

夫結核者火因痰注而不散鬱結空硬如菓中之核或在頸項額脇或在手足臂腋不紅不痛不作膿不必潰但令熱氣散則核自消治法宜二陳湯加竹瀝多服妙手足有核開氣消痰湯附餘頸項下結核二陳湯加酒炒大黃連翹桔梗柴胡腫痛者夏枯草不拘多少水煎頻服之即愈疔核作痛方耳後頂門

木香 三稜 莪朮 桔梗 細辛

香附 猪膽子炆去油燻乾 右為末每服七分半食遠米湯下

附 ○昆布丸 一切癭瘤 昆布 海藻俱洗小麥醋

末之煉蜜如杏核大每服一丸食後嚼嚥 ○凡癭氣先須斷厚味用海藻一兩黃柏二兩為末置掌中時舐之以津唾嚥下待消三分之二止藥

結核方法

附 ○開氣消痰湯 治胸中胃腕至咽門窄狹如線疼痛及手足但有核如胡莩者

陳皮 枳殼 香附 桔梗 僵蚕 前胡 枳實

羌活 荆芥 威靈仙 射干 甘草

木香 五分 右剉一劑生姜三片水煎服 婦人遍身痰核不紅腫不疼痛內消之劑

陳皮 半夏 茯苓 甘草 川芎 白芍 枳實 黃連

香附 桔梗 連翹 防己 羌活 柴胡 龍胆草 當歸

右剉生薑煎服 附 ○山藥草麻散 治項後側少陽經中疣瘡不變肉色

不問大小及年月深淺或赤硬腫痛外敷之劑 生山藥 去皮草麻子 去壳 右二味共研勻攤帛上貼之即消

核方並見下一身是  
陳加炒白芥子  
身痰核十六味飲子  
外敷山藥草麻散並  
附餘

### 疔毒

夫疔毒者乃真心經  
蓄熱所出其痛異樣  
者難忍使嚙生豆不  
醒則是矣以拔疔解  
瘡膏貼之補遺貼上  
覺痛輕不必割破取  
疔若貼上稍又痛甚

則以磁瓦片鋒破  
疔頭使親人以甘草  
湯漱口吸出毒血又  
貼前膏服護心解毒  
湯補遺即以白湯吞  
八仙解毒丸七十楊  
梅瘡條貼琥珀膏後  
附餘此百中苟方也  
又疔初見增寒執赤  
芍藥湯附餘十三種  
疔瘡指掌該竟丹紫  
金丹並後補遺或透  
竟丹下毒氣入裏  
煩悶食不下疔紫黑  
暗光危奪命丹后補

○又方治臂核作痛用二陳湯加連翹川芎皂角刺防風  
黃芩酒炒蒼木煎服

○治耳後頂門各有一核用炒姜蚕酒蒸大黃青黛半胆  
南星為末蜜丸噙化

### 疔腫方法

○石香程氏曰疔腫之証皆蓄熱毒之深而成者也近者  
多見因食炭牛疫馬之肉而成此証其形有十三種  
皆以形而名之耳一曰麻子疔二曰石疔三曰雄疔  
四曰雌疔五曰火疔六曰爛疔七曰三十六種疔八  
曰蛇眼疔九曰盪膚疔十曰水洗疔十一曰刀鑣疔  
十二曰浮鷗疔十三曰牛狗疔惟三十六種疔最為  
可畏其狀頭黑浮起形如黑豆四畔赤色今日生  
一明日生二後日生三乃至十數九為可治若滿三

十六則為不治之証也夫十三種疔其形狀雖各不  
同而其所由皆熱毒之甚也治法並急用奪命丹下  
之去其毒之銳勢次服化毒丸及內托散二活散雄  
射湯隨証經絡病勢緩急用引經藥斟酌施治如無  
他証有熱即退熱有腫則退腫如身冷自汗嘔逆燥  
喘狂喝妄語視者皆毒氣入內不可治矣如疔已  
拔去用金銀白芷散加減十宣散調之方獲全安也  
今將十三種疔証候問列于後

○一曰麻子疔其狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤多  
痒忌食麻子近油衣布衣并入麻油中行

○二曰石疔其狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不入肉  
微痛忌瓦礫磚石之屬

○三曰雄疔其狀飽頭黑靨四畔仰飽聚起有水出色黃

遺或奪命丹或十全  
漏蘆湯或雄黃丸或  
化毒丸或雄射湯或  
二活散或解毒丸或  
蓋先生解毒丸或萬  
病解毒丸或破毒散  
並見下疔始發脈洪  
弦洪實腫甚欲作膿  
托裏湯難消者  
奪命丹或返魂丹並  
見下取疔散或拔疔  
法或取疔腫方並見  
下或蟾酥丹或三神  
丹極妙並補遺疔腫  
用蒼老根汁一合去

淨敷之不過三五度  
即差或用雄雌二黃  
末先以針刺四圍及  
中醋和塗之或獨蟾  
丸見下或紫金散敷  
或寸金錠子磨付並  
補遺疔瘡危篤昏  
提疔錠子補遺疔瘡  
疔頭深黑破之黃水  
出四畔浮漿蛇蛻燒  
灰雞子清調付取疔  
根蒼耳散或蟾酥丹  
並補遺或附子末  
酥和塗乾再付去反  
肉生肌紅玉錠子補

大如錢孔形高者忌房事

○四曰疔其狀瘡稍黃向裏壓亦以灸瘡四面乾漿起  
心凹色赤如錢孔者忌房室

○五曰火疔其狀如湯火燒灼瘡頭黑糜四邊有烟焰又  
如赤粟米者忌火燒烙

○六曰爛疔其狀色稍黑有白斑瘡中潰有膿水流出瘡  
形大小如匙面者忌沸熱食爛物

○七曰三十六疔其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤色  
今日生一明日生二及至十數未滿三十六猶可施

治着滿三十六藥所不能治也忌嗔怒蓄積怨恨  
○八曰蛇眼疔其狀瘡頭黑皮浮生形如小狀且狀似蛇  
眼大休硬忌惡眼人看併嫉妬人見忌毒藥

○九曰蓋膚疔其狀大如匙面四邊皆赤有黑粟粒起大  
忌食鹽物

忌食鹽物

○十曰水洗疔其狀大如錢形中如錢孔瘡頭白裏黑糜  
汁出中硬忌飲漿水水洗渡河

○十一曰刀鑷疔其狀闊狹如薤葉大長一寸左側肉黑  
如燒烙忌刺及刀鑷切割鉄刀所傷可以藥治不可  
乱攻

○十二曰浮濕疔其狀瘡体曲圓少許不合長而狹如薤  
葉大肉黃外黑黑處刺之不痛黃處刺之痛

○十三曰牛狗疔其狀肉色乾起插不破  
右十三種疔瘡初起瘡心先痒後痛先寒後熱上定

則寒多四肢沉重心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆  
者難治其麻子疔一種始末惟痒初錄忌者不得觸

犯觸犯者發作難治其浮濕疔牛狗疔兩種麻林忌

補遺後疥癬毒膏

直蟾酥乳汁磨化

一子 水片

直半黃各五分

麝香二分

三味同酥汁調勻

貼方上

補遺護心解毒湯

遠志去心一兩

川羌活二子

黃連 木通

生地酒洗各一子

赤茯苓七分

生甘草五分

赤小豆一合

右水煎渣下者食

前服上者食後服

補遺蟾酥丹

蟾酥一枚末之以

白麵黃丹搜作丸

如麥類大針破患

處以一枚內之神

効

補遺三神丹 治疔

瘡疔蓋少鐵锈多

牡蠣中末之用燈

盞內油手心調藥

豆大將瘡挑破以

一粒內之可止

縱不療亦不能殺人其狀寒熱與諸疔不同皆宜將

護依法治瘡禁已不得觸犯若或觸犯脊強瘡痛極

甚不可忍者是也又云疔腫初發時突起如釘或謂

之疔令人惡心惡寒四肢強痛一日瘡變為焦黑色

腫大光起根硬刺之不瘥痛皆其候也在手足頭面

胸背骨節間最急其餘處則可治毒入腹則煩悶恍

惚似醉如此者二三日間死矣皆不可不速治也

○返魂丹 經云汗之則瘡愈必用此藥汗之

乳香

沒藥

辰砂

雄黃各一錢

輕粉

片腦

射香各五

海羊 即爛牛

蟾酥

青黛

粉草

明砂各一錢

右為細末用海羊搗膏為丸如雞丸加酒麪糊此少

丸如彈子大每服一九煎生葱頭二三個細嚼下

下疔腫及癰腫毒氣入膈者得微汗即解○一方加

銅綠寒水石輕粉枯礬各一錢重按上藥皆非發汗

焙乾與稀簽草葉等分為細末先用竹筒兩頭去節

一頭解十字路將不解頭套在疔上以線索縛竹筒

陷入肉內為度以前藥末一匙滴水和之放于筒四

少時藥滾起則疔自拔起若一次未効漸加度數其

疔必拔也

○奪命丹

巴豆

一兩去壳

黃丹 三錢

硃砂

雄黃

各三錢

鬱金 各五

大黃

輕粉

二十

蟾酥 半錢

飛羅麩 三兩

補遺藥金散

信一錢 雄黃  
明砂各半  
末之際開瘡口貼  
之不過二次差

補遺寸金錠子治

疥瘡惡毒  
硃砂二錢 黃丹  
明礬粉 砒霜  
輕粉 花鈇  
白芨各半

酥汁 腦子  
麝香各少許

末之糊和為錠  
獨提丁錠子治

疥瘡疥癬發昏兼治瘰癧

雄黃 硃砂各  
二錢 青鹽  
白丁香 砒霜  
班狗 去足翅  
輕粉各一錢半

單麻子三七粒  
蟾酥乳汁磨化  
麝香各一分

末之于銀石器內  
先將黃蠟鎔開和  
前藥捻作錠子用  
針刺破疥瘡放一  
錠子瘡上又刺四

疥瘡疥癬發昏兼治瘰癧

右為細末蠟水糊為丸如菉豆大隨身年分虛富加  
減丸數服之以其毒如無奪命丹雄黃丸代之亦效

○雄黃丸

雄黃

鬱金各一

巴豆 十四枚 去壳

射香 少許

皂角

全蝎 各一

右為細末滴水為丸如菉豆大每服二十九丸清茶送  
下亦看大小虛實斟酌加減丸數

○化毒丹

片腦

射香 各五

硃砂

硃砂

雄黃 錢

輕粉 十兩

蟬蛻 二十枚 去上

右為細末新收蟬酥為丸如菉豆大每用一丸放於  
舌上取涎而愈

○獨蟬丸 借取蟬酥法

拿取活蟬

即世蟹蟻通身有傀儡者俗名

捉住後脚以大葉葉或油單紙包掩其頭用鉄鉗一  
個括取眉間白汗濺于葉上凝結如濕真粉就丸如

菉豆大一蟬或作一丸多者作三丸懸當風處曬乾  
如患疔腫者即以一二丸置舌尖上仰臥片時其苦

水滿口就以水嚥下或以鉞針刺開疔腫頭上納  
藥一丸於中外以薄皮紙貼護之勿令藥脫落背癰

及一切癰腫初起時亦可依此法治之神效蟬酥之  
法切防入眼

○雄射湯

鮮疔毒如神

凡鮮毒不可

雄黃

硃砂 另研各

真菉豆粉 錢二

射香 另研

乳香

白芷

茜根草

地丁香 各二

牡蠣

姜蚕

牛蒡子

大黃

邊五七下惡血出  
為妙却用神應膏  
貼之內服蟾酥丸  
並腦發條

補遺蒼耳散

蒼耳根辛苗子燒  
灰末之醋泔綻如  
泥塗上乾即拔根  
出神驗

補遺紅玉錠子

治  
疔去反肉生肌  
乾胭脂 枯礬各  
三錢 輕粉  
生砒霜 黃丹  
腦子 麝香各

金銀花

青木香

枝子

荆芥穗

朴硝

甘草露

胡桃

右以白芷以後一十四味細切用無灰酒一碗浸少  
時搗細又加水一碗同煎至一碗去粗及濁脚入前  
雄黃等五味調勻作一服更審患處經絡分野依東  
垣引經瀉火藥加之尤妙欲利倍加大黃朴硝二味  
臨後下○茜草即過山龍地疔即大蘗也草開黃花  
者各黃花地丁開紫  
花者各紫花地丁

○二活散

獨活 當歸 烏藥  
赤芍藥 金銀花 酒洗 連翹 天花粉  
甘草 白芷 錢五 紅花 蘆木  
荆芥 蟬蛻 乾葛 錢三 檀香 二錢

少許

未之稠糊和錠子  
用之

青疔

夫青疔者肝臟毒氣  
騰腑邪風灌於經絡  
之間發於筋骨之內  
離火盛舌強語澀神  
昏坎水虛寒熱燥煩  
先服當歸連翹散下  
解毒丸疎其內後酒  
服乳香黃芪散為金  
散去其毒桃花散收  
斂之並腦發條

○取疔散

雄黃 硃砂 蟬酥 信石 錢各

右為細末每服三錢煎蒼耳湯調下

巴豆 十粒 輕粉

○解毒丸

白芷 十兩 丁香 五兩 羅蔔子 去壳醋浸炒另研  
京墨 八錢 硃砂 六分 朴硝 四兩 買衆 取新者  
細乾并末 秤各四兩

右和勻糯米糊丸如龍眼大青代為衣陰乾每服一  
丸無灰酒磨化下

○賀藍先生解毒丸

解毒藥毒及山嵐瘴氣尖牛馬瘡

赤疔

夫赤疔者心大邪熱必發驚狂先疎通其後治其外方法如前腦發條

黃疔

夫黃疔者脾中受熱胃氣邪風起於唇齒之端發在人中之側初生黃色四邊麻木如疔手足難握煩燥心驚嘔逆治法與前疔同以透骨膏貼之

羊肉毒魚腥麩菜毒暑熱濕毒傷寒濕毒小兒斑疹喉痺急証紅赤癰腫及諸般無名腫毒

黃栢 買衆 茯苓 藍根 蒿根

生地黃 雄黑豆 甘草 滑石 硝砂

陰地蕨 菠苜 各三 益智 大黃 寒水石

紫河車 馬勃 草龍胆 卷蚕 煎 百藥煎

山枝子 各一兩

右為細末煉蜜丸每一兩分作十九細嚼新汲水送下小兒驚風菠苜湯調蜜水浸蒸餅為丸亦可或加

黃連白芷

局○萬病解毒丸

射干 文蛤 即五倍 杏仁 石膏

續隨子 去油 蚕休 即金線 土硃 大戟

山豆根

山茨菰

白藥子

大黃 酒洗 各二兩

射香 二錢

青黛

威靈仙

白芷 各一兩

黃連

風化硝 各半

右為末糯米糊為丸如彈子大者代活石細研為衣陰乾此藥解一切毒蠱毒蠱毒氣奔豚毒魚毒菌毒疫

死牛馬肉毒喉痺骨鯁竹鯁刺毒並用急流水磨下

癰疽發背疔腫瘡瘍毒蛇大蛇蜈蚣蜂蝎螫毒刀斧

湯火傷並用井花磨下併塗併如婦人鬼胎思氣積

塊虫積心胸痞滿肚腹膨脹並脹好酒磨下

千金漏蘆湯

治疔腫神效

黃芩

白欬

漏蘆

連翹

麻黃 去根

朴硝 各一兩

枳壳

升麻

地丁 金銀花 各半

大黃

地丁

金銀花 各半

補遺透骨散 治疔 瘡腫毒有效

角回 一個陰乾

巴豆 十粒研如泥

硃砂 三分半

真輕粉 二分

真蟾酥 五分

麝香 一分

右研細末以油紙

裹定或遇疔瘡諸

惡瘡用針微刺破

沾藥少許其瘡自

然散如不散者一

帖追毒藥即潰

白疔

夫白疔者大腸虛熱肺臟和風外乘皮肉之間發於毛竅之內初生白色瘰癧走亂膿泡咳唾稠粘鼻口乾咽喉燥熱凡此症屬肺臟受病宜調和血氣先服乳香黃芪散外用針頭散髮條或蟾酥丸瘡用烏金散並腦發條

黑疔

夫黑疔者勝肌虛熱腎臟和風外攻兩耳之端發在毛竅之內初生黑色麻木硬似石磚恍惚心驚沉困神昏貧睡治与前同服當歸連翹散腦發條外貼透骨膏見前補毒

骨槽風瘡

夫骨槽風瘡者太陽受症結於大腸之間邪毒交乘灌於經絡之內牙根作痛如刀

右除朴硝外為細末後入硝和勻每服三錢水一盞半姜三片薄荷三葉煎至七分空心溫服利下惡物止藥

赤芍藥湯 治一切疔腫癰疽初發憎寒頭痛

金銀花 赤芍藥 各二錢 大黃 三錢 括蕒 一个

當歸 甘草 枳壳 各一分

分作二貼每貼水酒各一盞煎不拘時服

取疔腫方 青木香根 五木香 雄黃 甘草 各一錢

右為末湯調下以利去毒氣四五行即愈

破毒散 信石 硃砂 黃丹 雄黃

乳香 各一 班貓 五個 去射香 少許

右為末取新蟬酥和丸菴豆大以銀針破開疔頭納藥一丸在內外以膏藥護之如無蟾酥加麩糊少許

灸法以大蒜爛搗成膏塗瘡四圍留瘡頂以艾炷灸之以爆為度如不爆稍難愈宜多灸百餘壯無不愈者

祖傳經驗秘方治食火牛馬肉成疔腫欲死者以柏油木葉馮絞取真汁一二碗頓服之得大瀉毒氣而愈

如冬月無葉時取嫩根研水服之亦效未利再服以利為度

諸瘡方法

活寬丹 治一切惡瘡大有神效

血竭 乳香 沒藥 銅綠

枯白礬 黃丹 蟬酥 輕粉 各五分

穿山甲 煨 射香 少許

脚風執相凝堵塞咽  
喉連腮腫乳香畢搽  
散補遺

補遺乳香畢搽散

天麻防風草烏草

搽乳香川芎硼砂

細辛薄荷麝香為

末口噙溫水漱之

### 天泡瘡

天泡瘡外行風熱所  
致防風通聖散中風  
門炒大黃為末水調  
搽爛者乾熱或青黛  
塗之即愈

右為細末用蝸牛搗膏為丸如菉豆大每服一九重  
者二丸又用葱白一寸爛爛煨藥熱酒送下食前服

○又方用真姜蚕蝉蛻二味等分為末香油調付按疔效

○治諸般惡瘡

經霜芭蕉葉為末香油調付先用忍冬藤葱椒蒼耳

草煎湯洗瘡淨挹乾付藥外以油紙掩之

○又方治諸般惡瘡用松木上白蚊泥黃丹各等分炒黑

香油調付用油紙夾上日易後用龙骨沒藥欵瘡口

收肉

○又方治惡瘡用黃丹入香油煎入朴硝抹之

○天泡瘡服以風通聖散及用蚯蚓糞炒蜜調付之從肚

皮上起者裏熱發外还用通聖散藥效

○又方治天泡瘡用野菊花東木根煎湯洗黃栢滑石末付

### 臙瘡

夫臙瘡者腎臟虛寒

邪毒併攻三里之傍

陰交之側下焦久損

漸次潰爛難擡風濕

相合骨肉損傷治法

先用洗毒散洗淨瘡

口搽麝香輕粉散附

餘神應膏腦等下或

夾紙膏補遺

補遺夾紙膏 治臙

瘡久不愈者

黃連 黃栢各

二兩 大黃

○治脚上沙瘡清水出者用紫燕窠泥畧炒黃栢二味共

為末香油調付

○治臙瘡用白膠香二兩黃栢石膏各一兩青代五錢龍

骨五分為末香油調付

○又治臙瘡方以香油一兩入胎髮如梅大煎焦烱去粗

入白膠香黃蠟各一兩煉化入生龍骨赤石脂血竭

炒各一兩撈勻候冷磁器盛捏作薄片貼瘡上外以

竹箬包之三日後番過藥再貼以活血藥煎湯洗之

○又治臙瘡方用箭箬剪去兩頭以黃栢煮汁令調和白

膠香草麻子同搗成膏攤箬糙面折縛光面貼之先

以清茶放溫洗挹乾貼之

○又方治外臙脚瘡用龜心黃土研極細入黃栢赤石脂

黃丹各半兩輕粉乳香沒藥各一錢細研和勻以清

黃丹各一兩

得金 牡蠣各

五錢 沒藥四錢

乳香三錢另研

血竭二錢半

麝香一錢五分

輕粉三十貼

末之清油調勻攤

油紙上夾紙以線

縫四邊針刺眼透

藥氣縛在瘡上每

一個貼三日每日

以冷水洗一次膏

藥拭去污其末包

### 湯火瘡

補遺瘡方

螺螄殼多年乾白

者火煨為末瘡破

乾摻不破輕粉清

油調付之

又方用楊梅樹根皮

燒存性一兩大黃

黃連連梔子各

五錢赤石脂三錢

為末破則乾摻末

### 下疳瘡

油調和如膏以油絹攤藥將絹面貼於瘡上外以油

紙掩之扎縛定縱痒不可開視數日後未愈再換藥

緊縛直待結痂去藥必先以茶清洗瘡淨付藥

○洗毒散 治一切惡瘡多時不效風毒寒久冷

麻黃 地骨皮 蛇床子 紫地丁草

右等分水煎溫洗之

○射香輕粉散 治一切疳陰蝕兼耳疳惡瘡

輕粉五錢 乳香 沒藥 白礬各一 射香五錢

右為末貼瘡口上

○桃花散 治一切瘡生肌藥

白芨 白歛 黃栢 黃連

乳香另研 射香另研 黃丹各等分

右為細末摻於瘡上二三日生肌平滿如故

○治火燒及湯泡瘡用經霜桑葉焙乾燒存性為細末香

油調付或乾付二三日結痂平復

○又方治湯泡火燒瘡時取黃蜀葵花以香油浸之其花

日漸煇於油中以此油付瘡上即愈或只收花焙乾

為末香油調付亦妙

○赤石脂散 治湯火所傷赤爛熱痛

赤石脂 寒水石 大黃各等分

右為末以新汲水調塗瘡處

○冰霜散 治火燒損傷熱油澆傷皮肉大痛

寒水石 牡蠣 明朴硝 青黛各一 輕粉

右為末新水調或油調濕貼乾則痛處即止如神

○下疳瘡用青黛海蛤粉蜜陀僧黃連為末付之

○又方以雞內金燒存性為末付之

疥瘡者因婦人房事  
後又與人交感毒氣  
相染而生独活祛痺  
散便毒條用酒栢其  
草煎湯洗拭乾九明  
膏貼后補遺三雜方  
見下爛去一段者用  
蜜糖煎黃連湯洗煎  
服敷貼同前或聖粉  
散或秘方附餘

### 紅絲瘡

夫紅絲瘡者心与小  
腸風熱相乘積毒貫  
血相凝灌於經絡之

間發在肌膚之上紅  
絲貫穿或及或痒血  
筋行時軍到心間人  
必死先用針于瘡首  
微刺出血貼針頭散  
歸靈條當歸連翹散  
下鮮毒丹腦發條

### 疥瘡

疥瘡有五乾疥開齋  
為主吳茱萸散附餘  
或黃連大黃末猪膽  
調敷濕疥燥濕為主  
一上散附餘虫疥思  
熱殺虫為主水銀膏

○又方治下疳瘡用鳳凰退燒存性研極細香油調付外  
看瘡大小剪壳中白膜貼之須靜坐一日不動即結  
痂矣

○聖粉散 治下注疳瘡臭腐爛疼痛不可忍者

黃栢蜜炙 蜜佗僧 黃丹 高末茶

乳香各三錢 輕粉一錢 麝香少許

右為末用葱湯洗瘡後次貼此藥兼治小兒疳瘡

○治下疳秘方

旱田螺燒灰 腦子 麝香 輕粉少許

右為末香油調傳患處即愈

○頭瘡用猪油一錢半 麝香 黃水銀各二錢半和勻付之

○金絲瘡其狀如繩線巨細不一上下行至心即死可于

瘡頭上截經刺之以出血後嚼萍草根付之立愈

○疔瘡用皂角枯礬輕粉黃連黃栢為末付之

諸瘡痛不可忍者用苦參藥可施于資稟厚薄者若稟

氣薄者宜於補中益氣湯中加苦寒藥也若血熱之

人瘡痛宜四物湯加黃芩鼠粘子連翹在下加黃栢

若肥人濕熱瘡痛宜防風羌活荆芥白芷蓋風能勝

濕故也

疥瘡馬疥瘡用馬鞭草不犯鐵器搗取自然汁半盞飲

盡十日為內愈神效

○當歸飲子 治瘡疥風癬濕毒燥痒瘡瘍

當歸 白芍藥 生地黄 白蒺藜炒 川芎

防風 荆芥略 何首烏 綿黃芪 甘草各半兩

每服一兩水煎溫服

○吳茱萸散 治乾疥及春天發瘡以開齋為主

附錄或一掃膏補遺

少瘡活血清心為主

煎草散附餘膿瘡

除熱燥濕為主三黃

散補貴或松香末裝

入炭葉內縛兩頭湯

煮三五沸取出研末

兩半枯礬四牙平胃

散中濕門消風散方

風門各四錢和勻敷

如乾疥小油調敷諸

疥久不愈升麻和氣

飲或當歸飲子並附

餘或四物湯盧損門

補遺一掃膏

芙蓉黃

黃栢

輕粉

附○水銀膏

楓子

樟腦

附○升麻和氣飲

甘草

蒼木

茯苓

右列每服一兩水煎服

附○一上散

雄黃

白礬

大黃

枳殼

此藥會稽徐彥制傳大効

輕粉

水銀

附○升麻和氣飲

陳皮

桔梗

白芷

右列每服一兩水煎服

附○一上散

寒水石

寒水石

硫黃

樟腦

此藥會稽徐彥制傳大効

水銀

附○升麻和氣飲

大黃

當歸

升麻

乾姜

右列每服一兩水煎服

附○一上散

白膠香

蛇床

厚朴

白礬

此藥會稽徐彥制傳大効

水銀

附○升麻和氣飲

乾姜

升麻

乾姜

右列每服一兩水煎服

附○一上散

黑狗脊

一掃膏方效且奇

五分輕粉一分砒

五錢活石三錢倍

細末油調搽疥瘡

補遺三黃散

軟石膏 魚夷

枯礬 大黃

樟腦各半兩

蛇床子 貫衆各

一兩 硫黃

雄黃各一分半

刺破油調末敷

癬瘡

癬瘡有五風癬頑癬

蛇床

硫黃

末之和勻洗瘡令湯透去亦用臘脂油調手中心擦

熱鼻中嗅二三次却擦上一上即愈

砂瘡用榻地藤燒灰付之

附○剪草散

寒水石

吳茱萸

雄黃

右末之油調敷

治風癬疔瘡

梓樹葉木棉子羯羊屎鼠屎合漚付之

治癬瘡用浮萍末一兩蒼耳子蒼木各二兩苦參一兩

白礬

斑蝥

末之和勻洗瘡令湯透去亦用臘脂油調手中心擦

熱鼻中嗅二三次却擦上一上即愈

砂瘡用榻地藤燒灰付之

附○剪草散

寒水石

吳茱萸

雄黃

右末之油調敷

治風癬疔瘡

梓樹葉木棉子羯羊屎鼠屎合漚付之

治癬瘡用浮萍末一兩蒼耳子蒼木各二兩苦參一兩

黃連

斑蝥

末之和勻洗瘡令湯透去亦用臘脂油調手中心擦

熱鼻中嗅二三次却擦上一上即愈

砂瘡用榻地藤燒灰付之

附○剪草散

寒水石

吳茱萸

雄黃

右末之油調敷

治風癬疔瘡

梓樹葉木棉子羯羊屎鼠屎合漚付之

治癬瘡用浮萍末一兩蒼耳子蒼木各二兩苦參一兩

濕癬其癬牛皮癬之  
 列皆由肺受邪毒連  
 干四肢以生肉癩治  
 宜清熱驅濕疎風散  
 鬱血殺虫無有不  
 効風癬如聖散或連  
 粉文並附錄 頑癬聖  
 玉散附錄 濕癬連粉  
 散附錄 馬癬羊蹄根  
 汁調膩粉塗之或狼  
 巴草川槿海桐皮為  
 末醋調湯類如膏敷  
 上或白膠香末入輕  
 粉少許油調擦之或  
 鐵綉油調塗之牛皮

半香附二錢半黃芩五錢煎洗之  
 綉○碧玉散 治頑癬  
 銅綠 研砂 白礬各半  
 右為細末香油調搽  
 附連粉散 風癬濕癬並皆治之  
 黃連一分 輕粉五分 膩粉 黃柏  
 黃丹 枯白礬各 右骨 芦耳石各三  
 右為細末每用少許濕則乾搽乾則香油調搽  
 如聖散 治疥風癬  
 蛇床子 黃柏 苦參 藜蘆 前草各五分  
 白礬 狗脊 輕粉各二分 胡粉 分半  
 右為細末清油調搽

遺毒散補遺  
 土大黃 蘆薈末  
 各五錢 水銀五  
 錢先將鉛四錢用  
 鐵杓鎔化投入水  
 銀傾出待凝同大  
 川槿皮取末一兩  
 枯礬三小 胆礬三  
 用猪胰子搗爛調  
 末藥搽之忌厚味  
 姜蒜椒菜物  
 陰蝕瘡  
 夫陰蝕瘡者臟中虛

○身上虛痒用四物湯加前草煎調浮萍末一錢服  
 ○又方治通身痒用塔子花為末酒調服一錢  
 ○秘傳一擦光治疥瘡及婦人陰蝕瘡漆瘡天火丹諸般  
 惡瘡神効  
 蛇床子 苦參 蕪荑各一兩 雄黃 半兩  
 枯礬二兩 硫黃 輕粉 二錢 樟腦 二錢  
 大楓子 取肉 川椒 半兩  
 右為細末生猪油調付  
 ○又方 治証如前兼小兒癩頭瘡治之  
 蛇床子 硫黃 黃柏 黃丹 各一兩  
 雄黃 五小 枯丸 二兩 大楓子 取肉 川椒 各半兩  
 輕粉 二錢 另 牛皮岸 薰牛皮烟岸也如死  
 右為細末生猪油調付

祛腎氣衰殘風邪入  
腑毒感損傷榮衛无  
時痛痒漸成癩作疔  
膿水流先用蛇床子  
地骨皮煎湯頻洗後  
以胡粉散擦之附餘

### 癩風

夫紫白癩風皆因心  
苦汗出及醉飽及浴  
後毛孔開時乘風拽  
扇得之扇風侵逆皮  
腠所致內服胡麻散  
附餘外搽五神散補  
遺或三白散附餘

附○胡粉散 治月蝕瘡

胡粉炒微

枯礬

黃丹煨

黃連

輕粉各一錢 胭脂五分

射香少許

末之溫漿水入盥洗淨拭乾付之乾者調付

○白癩風癬以小麥攤石上以鉄器燒紅壓出油搽之立效

○治紫白癩風用禿菜根白礬五倍子無名異米醋同搗

先以草麻刮熱擦之後用餅藥塗之

附○胡麻散 治紫白癩風併癬面上酒瘡又名粉瘡面

刺俱可服之

胡麻子

赤色偏者佳 另研五兩

白芷洗

何首烏

威靈仙

防風

升麻

川當歸

牛旁子

微炒 另研薄荷葉

片苓酒炒

白芍藥酒炒

補遺五神散 搽紫

白殿風

雄黃 雌黃

硫黃 白砒

白礬並用明透者 佳等分

附○三白散 治紫白癩風并汗斑擦之神效

白砒一兩 另光粉 五錢

白欬末五錢

鉛五錢鎔化入水銀五錢共研勻用黑雄猪白胰子

一個搗爛用末藥三錢三分入胰以絹包裹先浴身

擦滿身斑處陰囊處莫到餘著實搓摩之良久即以

苦參二兩五倍子一兩布包煎熟湯洗浴妙

○治楊梅瘡

○巫峯湯

楊梅瘡者因服涼藥過多吃線雞即止

### 楊梅瘡

夫楊梅瘡者因形相

右研為細末每用  
時預先一浴令通  
身出汗次搗生薑  
拌藥布包于患處  
擦之良久以熱湯  
淋洗

似乃氣受之故堅實  
凸起又名綿花瘡乃  
血受之其形扁指而  
清自致者重傳染者  
輕蓋白致者淫慾太  
妄以至陰處起火及  
縱口恣味三焦皆熱  
青而血結清滯諸經  
而成者也先服入仙  
鮮痔丹補遺以服巫  
峯湯有餘瘡起高瘡  
者用百草霜銅綠共  
研不見綠為度香油  
調搽有膿水者乾擦  
次日紅藥後服巫

厚朴剉去皮 桔梗各四兩 白芷三兩 不通二兩  
防風兩半 連翹去核 金銀花各一兩 肉桂八錢  
當歸 川芎五錢  
每服三錢土茯苓二兩脚上多者加木瓜牛膝各兩  
附○紅藥 搽楊梅瘡  
赤石脂二兩 胎元一錢  
其為細末搽上如乾仍用香油調搽為高墩不平者  
用白信下黑藥去核入信用火煨去烟為度香油調  
搽上  
附○巫峯九 治楊梅瘡  
蒼木半 當歸 地黃 芍藥  
川芎 厚朴去皮 陳皮各一兩 防風  
羌活 白芷 金銀花各一兩

峯九並附餘切忌輕  
粉并燻藥以求速效  
恐有楊梅風與鴉掌  
風亦不可服涼藥  
之如有楊梅瘋癩更  
藥按毒膏並附餘  
掌風四參清心解毒  
湯摩風膏並附餘  
補遺八仙解毒丹  
治一切腫毒熱  
疼癩癩作未潰膿  
者並服之神效  
樟桃皮細剉  
皂角刺并  
天花粉 當歸

石用硬飯五斤晒乾為丸梧桐子大花椒湯下日服  
三次如成毒者先用信煨爛開乃上紅藥煎藥九子  
同前亦要食飢止痛若無硬飯用松樹嫩根火炒七  
次梅樹嫩根炒一次用藥三錢煎服  
附○楊梅瘋癩煎藥  
甘草節五 金銀花 薑芪酒炒 當歸 赤芍藥  
川芎 木瓜 薏苡仁 連翹 紅花  
川獨活 牡丹皮 白芷各一 大長皂角子一錢五分  
人參 黃連好酒浸炒 羌活各一  
右土茯苓每貼加入二兩乾者一兩水煎服渣再煎  
附○按毒膏  
用菘豆一升炒焦黑研末用時以葱頭搗絞汁加米  
醋調膏貼在硬瘋癩上効

川羌活 玄參

連翹 各一斤

防風 牙皂

川連 金銀花 各半斤

剉碎用新汲井水

三十斤入磁缸將

煎至十五斤絞去

滓將藥汁再煎至

五斤時用大瓶慢

火熬至一斤成膏

調後藥為丸

川大黃 末一斤

五半黃 一兩另研

細入大黃內

土水糖 去殼新松

脆者另搗爛入

明礬 三兩搗入

共研勻以前膏和

杵為丸硃砂為衣

驗每上下大小多

寡服之

附方

補遺神效散 敷圍

一切腫毒善消定

附○四參清心解毒湯 治鵝掌瘋起于手心足心乃心

胞腎元所屬蓋有火毒積滯於厥陰少陰之經血熱

而皮頑也宜忌葱蒜椒姜及發邪殺物炙烤之類有

効而或曾患時瘡求速愈隱而不洩所致亦有四腕

風及牛皮風癬皆妙

丹參 酒洗 玄參 苦參 酒炒 人參 酒浸炒

枝子仁 炒 麥門冬 去心 生地黃 酒浸 黃連 酒浸炒

連翹 各一錢 地膚子 甘草 各二錢 黃柏 酒炒七

皂角子樹根白皮 二錢 右水煎食遠乘熱服之渣再煎二次外用擦之

附○摩風膏 治鵝掌瘋并治諸癬尤妙治鵝掌瘋後藥

用糟多些治癬用糟少些 玄明粉 胆礬 青木香 末 枯礬

蘆薈 各三 雌黃 一錢五 川大黃 末 川槿皮 末

杏仁 去皮 大楓子肉 水銀 各五 鉛 四錢 硃 七

猪牙皂角 木五 雄黃 二兩 以杏楓銀鉛同研細爛前藥俱極細細和研勻用時

取雄猪白腴子一件研爛細入藥一半復搗勻摩擦

手足瘋上又以前藥渣和入葱醋者湯洗之將膏擦

搽先服煎劑後搽之

○凡先哲治癰疽要方俱採摭于後以備選用

外科 精要 ○五香連翹湯 治癰疽未成膿者服之可散但當

看時令及資稟加減用之

乳香 木香 沉香 丁香

連翹 射干 升麻 木通

桑寄生 射香 獨活 大黃 各等分

痛

姜黃 白芨

黃柏末 白芷

川烏 半夏

木猪腰子

五倍子炒焦

黃連另取木

在豈粉炒焦黑

天南星 朴硝

威靈仙 大黃

蛇含石 火煨通紅

即投米醋內浸又

煨又投醋以踈為

度另研極細

磁石 赤知蛇含石

右細切每服三錢水一大盞煎七分去粗溫服

○內托復煎散 托裏健胃

地骨皮 黃芩 茯苓 芍藥 人參

黃芪 白朮 桂心 甘草 防已

當歸各半 防風 一兩 蒼朮 半斤

右細切先以蒼朮用水五升煎至三升去木入前上

二味再煎至三四盞取清汁作三四次終日飲之又

煎蒼朮粗如前再煎諸藥粗服之

○白芷升麻湯 治手陽明經分臂上生癰左右寸部

脈皆短得之俱弦按之洪緩有力此得之八風之者

白芷 升麻 桔梗 甘草 各五分

黃芪 四錢 酒黃芩 四錢 生黃芩 三錢 紅花 五分

石細切分二服水酒各一盞煎至一盞溫服

火煨醋製另研末

野菊花根 鮮者搗

爛絞汁入藥九炒

上木驚 去殼另搗

爛臨時和入衆藥

末內 乾生薑

乳香 沒藥

味炒過研

以上藥品或各五

錢或各一兩為末

看腫每大小用藥

末多少以葱頭搗

爛絞汁和酸米醋

各半調末藥如膏

敷貼在腫毒上膏

○托裏散

治一切惡瘍發背疔腫便毒始發腫

數弦實腫甚將作膿者三服消盡

大黃 牡蠣 瓜蒌根 皂角刺

朴硝 連翹 各六分 金銀花 當歸 各二錢

赤芍藥 黃芩 各四分

○又托裏散

右細切作一服水酒各一盞煎至一盞四分服

黃芪 當歸 金銀花 甘草 各等分

右細切每服一兩酒水合煎更詳部位各加引經藥

○烏金散

治癰疽疔腫特毒附骨疽諸惡瘡等証

若瘡黑陷如石堅四肢冷脈細或時昏冒謔語循衣

煩渴危篤服此汗之即瘡起

以綿紙浸葱汁醋

在藥上潤之毋令

乾燥藥力行矣若

腫毒勢大了毒上

貼千鎰琥珀膏附

下四圍敷此藥散

去熱毒

補遺黑虎膏 治前

邊服過輕粉者發

出瘋癩腫毒作瘰

癧

草烏 四兩不去皮

尖剉炒焦研細末

真巨粉八兩炒焦

黑待冷研細

蒼耳頭五月五日午時收

木賊去下

右晒乾各等分同入磁器內塩泥固濟烈火煨從早至

申時如黑煤色為度研為末每服二錢病重者三錢

熱酒調下未汗再進一服如汗已乾却服解毒利之藥

如修合此藥必選天時清明好日於靜室中合勿令

雞犬猫畜及陰人孝子見之

東○黃氏六一湯 治癰疽發渴

黃芪六兩蜜炙 甘草一兩炙

右細切水煎不拘時服

精○一方 治一切瘡癤癰疽發背殊効亦能下瘀血

大黃三錢 甘草

右為細末酒調服

草烏頭 火麻頭

樺皮即 蘇炙 蘇黃 去根即

右晒乾各等分同入磁器內塩泥固濟烈火煨從早至

申時如黑煤色為度研為末每服二錢病重者三錢

熱酒調下未汗再進一服如汗已乾却服解毒利之藥

如修合此藥必選天時清明好日於靜室中合勿令

雞犬猫畜及陰人孝子見之

東○黃氏六一湯 治癰疽發渴

黃芪六兩蜜炙 甘草一兩炙

右細切水煎不拘時服

精○一方 治一切瘡癤癰疽發背殊効亦能下瘀血

大黃三錢 甘草

右為細末酒調服

精○內托護心散

乳香一兩 真象巨粉四兩一方

右為細末每服二三錢煎甘草湯或新汲水調下

瘡癤 ○小五香湯

木香 沉香 乳香 藿香

連翹各二錢 射香研火

右為細末每服二錢水一盞煎七分温服

局○復元通氣散

當歸 天花粉炙 川芎各一兩 青皮 陳皮各一兩

黑丑頭 大黃 甘草 穿山甲炙 各半兩

右為細末每服二錢温酒調

東○金銀白芷散

黃芪 當歸各一兩 枳榔 川芎各五分

肌長肉收斂可以

搽于患內或搽在

太平膏藥上貼之

俱好

紫降真香八兩酒

要番降紫者

佳淡紅者不用

極薄上判之研極

細用極密絹羅取

極細末四兩其餘

粗四兩砂鍋內炒

焦色復研極細末

羅取三兩共七兩

伍倍子淨八兩初

搗如言大炒不住

手攪待焦研極細

羅末

上好官揀人參三

兩判碎以水三碗

煎至一碗瀘去渣

將汁再煨至平碗

甘草

白芷各一錢 天花粉五分 乳香

沒藥

防風各三分 皂角刺去尖 金銀花各一錢半

右為細末分三服每服水酒各半盞煎連粗服

瘡瘍 ○正鉄籛散

貝母大心

白芷

蒼耳草灰

或加龍骨二錢尤妙

右為細末水調或香油調貼瘡上

瘡瘍 ○大鉄籛散

木鱉子

猪卷皮

芙蓉各四兩

白芷

寒水石

黃柏

赤豆

白欬各二兩

紫荆皮

大黃

羌活各一兩

防風半兩

貝母

真地青

白芨各一兩

右為細末凉水調圍癰四畔如肉脆去白芨白欬加

持藥末勿曬乾

細聽用

補遺太平膏 善生

肌長肉收欬

川當歸 川芎

懷生地 赤芍

清河參 黃芪各

四兩 蘇木

生甘草 白芨

白欬 黃柏

女貞實 防風

金銀淨花各二兩

宣木瓜 一兩

右件碎用芝麻油

五斤浸三晝夜緩

加生地黄地榆用芭蕉油調付熱甚者用三消散

○三消散 退極熱証赤腫焮開者

朴硝

大黃

焰硝

枝子炒黑色

寒水石

南星各等分

右為末生地黄汁調塗疔美容藥汁調亦可

瘡瘍 ○雲母膏 治一切癰疽瘡癩折傷等証

蜀椒去目及開口者微炒

白芷

沒藥

赤芍藥

麒麟竭

黃芪

白芨

菖蒲

肉桂

當歸

鹽花

芫芩

木香

龍胆草

白欬

防風

厚朴

射香

桔梗

柴胡

松脂

人參

蒼朮

黃芪

乳香

附香子

茯苓

緩文武火煎膏搥  
轉前乾去油一斤  
半時濾去滓淨了  
又熬去半斤用上  
上號燒銀韶粉一  
斤半揉細炒黃色  
研羅過漸漸入油  
鍋不住手攪膏以  
滴水試看如將成  
膏加入白蠟二兩  
黃蠟二兩好了收  
貯新磁瓶內臨用  
攤之或加紫蛤散  
揆上貼之尤妙  
治一切瘡毒

良姜 合歡皮各半 硝石 甘草  
雲母各四 栝葉 桑白皮 槐枝  
柳枝 陳皮各二 清油四十兩 黃丹二十  
水銀以絹另包待膏成以手細  
右除雲母硝石麒麟竭乳香沒藥射香黃丹鹽花八  
味另研外余藥並細切入油浸七日文火煎以柳枝  
不住手攪候匝沸乃下火沸定又上火如此者三次  
以藥黑色為度去粗再熬後入丹與八味末仍不住  
手以槐柳枝攪滴水中成珠不軟不硬為度磁器收  
貯候溫將水銀彈上用時先刮去 水銀或蠟貼隨  
宜用之其功甚大也  
○太乙膏 治一切癰疽瘡癤貼之神効亦可內服須詳  
証經絡作湯使送下

切切  
不切者此膏粘貼  
上即有神効又可  
點風油爛眼點之  
且明目功  
千里光 一十斤一  
名鷄腸草一名九  
里明  
青木香 十兩  
俱用清水洗過  
斷杵爛淨七鍋入  
淨水緩緩煎之前  
至一炷香濾過絞  
出渣七用滾湯泡  
之又以布絞取汁

玄參 白芷 當歸 肉桂  
大黃 赤芍藥 生地黄各一 黃丹  
真麻油 二斤  
右細切入油浸夏三日冬十日者秋七日文火煎黑  
色去粗入黃丹再熬以槐柳枝不住手攪滴水中成  
珠不軟不硬磁器收貯  
○神異膏 治諸般癰腫癩毒殊効  
露蜂房有蜂兒多者 玄參 半兩 黃芪 七錢  
金蛇退半兩用鹽 杏仁 一兩去尖 黃丹 五兩  
香油兩 亂髮如雞子大一塊无病狀年男子  
右先將香油入亂髮於銚中文火熬候髮燻烺盡以  
杏仁投入候杏仁黑色用真綿濾出粗再將油入銚  
中然後下黃芪玄參二味文火熬一二時久住火候

同前汁加入盧茶  
五錢緩文武火  
熬至如砂糖樣時  
用上好磁罐盛之聽  
用一切諸瘡只以  
本膏搽貼之即効  
如治疔瘡治疔楊  
梅綿花瘡臙瘡加  
入杏仁二十一粒  
去皮尖者研爛加  
滴乳一錢同杏仁  
再研揀實自去掃  
盆真正輕粉三錢  
取鵝膽三小冰片  
三分研用九明膏

片時火力稍息旋入露蜂房蛇退二味以柳枝不住  
手撓慢火熬至紫黑色又將用綿漚過去粗入炒中  
文武火熬下冊急撓千餘轉滴水成珠子膏即成  
矣冬月畧嫩此夏月畧硬此磁器盛貯隨意攤貼  
經○萬槌青雲膏 治諸般癰腫未成膿者貼散已成膿  
者拔毒追膿腹中痞塊止瀉疾貼大推及身柱其效  
如神  
白松香 一斤去  
杏仁 三百粒  
去壳  
草麻子 三百粒  
去壳  
輕粉 二錢  
銅青 三兩  
乳香  
沒藥 各兩  
右共作一處用鉄槌木砧干日中搗成膏如燥火加  
香油杵之或用石臼木杵搗亦可用磁器盛研搗  
貼湯中佐不見火  
經方  
○一方 治背癰附骨疽乳癰及一切癰腫未成

二兩持勺用黃栢  
甘草煎湯洗過紙  
拭乾搽貼之以綿  
紙或油紙掩之  
補遺催消散 搽在  
比天膏藥上者  
麝香 冰片各  
一錢  
鬱金末  
三錢即姜黃內長  
者是價不甚貴  
蟾酥 一兩研細  
用乳汁一乘熬蒸  
化  
川山甲  
剉炒成珠研末三  
手入蟾酥乳汁搽

者發散極効  
槐花 一兩炒  
黑一兩炒  
胡桃 十個新鮮不油者連  
壳細火煨熟去壳  
右二味於沙盆中研爛如泥熱酒調和粗温服如能  
飲酒人多飲 愈效一醉後而癰腫散矣  
附○千銀琥珀膏 治一切癰疽腫癩核瘤癰毒勢甚者  
貼之神効未潰膿者即消有膿者易穿  
極細麝香當門子 三錢 淨乳香 待冷細研  
真正蟾酥 一兩  
右細剉用人乳汁煨溶撓爛同射香研入舌上稍噉  
極麻方真草麻子去壳淨肉四兩白松香細末十五  
兩麟麒血竭三兩崧而打指大細者佳同松香搗細  
羅過乳香未亦和入竭香肉於淨石研先將草麻子  
杵之漸加入前品杵之一二十銀通紅如膏磁盂殘

勻研極細血竭三

滴乳炒過待冷研

沒藥炒過研各五

共為細末磁罐盛

之安涼外搽在比

天膏藥上

補遺精寧遠魂丹

治十三種疔瘡

雄黃 枯礬各

二兩 麝少許

血竭 銅綠

蝸牛各一兩

硃砂 膽礬

海粉 沒藥

之碟蓋以蠟固封其縫臨用時微火邊烘之取起藥  
合該大小多少貼之半日後取下來其膏復揉勻再  
貼之

附

○五紫比天膏 善抽拔一切癰疽腫毒癩瘰

紫荊皮 紫微花 紫草 牡丹皮 紫花地丁

生地黃 赤芍藥 小川芎 紅花 升麻

漢防已 土牛膝 桑漂鮑 蒼耳子 木猪腰子

僵蚕 希慈草 蒲公英 血餘即胎髮如火 威靈仙

明天麻 藜木 金星鳳尾草 羌活 大川烏

川山甲別炒成珠 當歸尾 荊活 天南星取鮮者制

乾姜 姜黃 白芷 苦參 黃柏 遠志

兩頭犬附白 大黃 蘇木 麻黃 伍倍子

草烏頭 黃連 連翹各二兩 蟬蛻去土 生半夏二兩 凌霄花五

草麻子去壳研 木鱉子去壳研爛 紫河車一

名金線重樓一名七葉一枝花三兩

以上藥品伍拾味剉碎用一二年陳其芝麻油十

斤浸七晝夜每日日夜七撓轉勻於淨室處所煎

熬雞大婦人不容進見叅雜用有耳大鉗鍋慢七文

武火煎之手執柳棍或堅小竹不住手撓鍋內油藥

一日待畧涼些以麻布瀝掛過夜待油瀝出乾將鍋

刷淨次日用上好蜜佗僧如雌黃色者八兩研極細

入藥油不住手撓之慢文武火熬至已時分柳竹

棍上藥油滴冷水碗中試油不走故撈油珠指上看粘

如糖樣者取起半碗防天膏硬則加些入膏和軟好

貼餘者方可下飛丹不住手撓下飛丹完頻嘗以適

蟾酥各五兩

乘之和搗蝸牛蟾

蘇極爛如芡實大

每服一九令病人

先嚼葱白三寸吐

在手心將藥丸裹

舊葱白用熟酒吞

下如重車行五里

許有汗出即差

補遺紫金丹 治十

三種痔瘡

白明礬四兩

黃丹二兩

右銀石器內溶礬

作汁入丹用銀釵

予搗之令紫色用文武火无令火過不及先以針周迴挑破用津液調藥敷上數度无令乾其滄潰動用下出也如不潰入信一系雄黃綱砂各五分貼之即潰

**補遺飛丸奪命丹**  
治一切疔瘡患腫癰疽初發或發而黑陷毒氣內陷者天南星 雄黃 巴豆各一子

膏於冷水試真是成膏了住火亦撓不住手待將凉疑入水麝末藥

一飛丹二斤半再用滾湯一鉢將丹投入撓之待澄下傾出清水淨鍋炒紫色漸入藥油

其松去土淨樟水同 三賴末二兩  
真正當門子麝香 冰片 牛黃三品各

真婢酥伍子剉薄細乳汁煨撓化同硃砂五子明雄黃五子三品同研極細方加入水麝牛黃樟腦復同研又加入其松三賴細辛末又同研候膏好了撓起鍋不住手撓待凉稍凝厚時不住手着力撓將生黃水麝末漸漸搽膏內勻勻將膏傾在三四個好宜以罐盛之封固口用一罐了又開一罐來用做膏藥時不可在火上煨只烘膏藥面上畧軟則以竹篾括

綱砂 黃丹  
信石 乳香各五分 麝少許  
斑蝥十箇去頭是未之取蟾酥和為丸如黃黍米大每服十一二丸或十四五丸看瘡大小上下多寡用之食後好酒送下

軟膏攤之又膏藥上再搽催消散效

○稀簽散 治癰疽發背及一切癰瘡等証效如神  
稀簽草其葉長如牛舌其齒如雀巢者小蘗根 生大蒜 五爪龍即五

右四味各等分細研用酒和勻瀝去粗服一碗得大汗通身而愈

○又方 治諸般癰腫神効方上並祖  
新搗天門冬一味約三五兩洗淨入沙盆內研細以好酒盪起瀝去粗類服未効再一二服必愈

太醫院補遺直傳醫學源流肯綮大成十二卷終



