

醫學源流

十三
十四
十五
十六
作

經水指南

月水不調

夫月水不調者蓋由
憂思色慾過度勞傷
血氣致令体虛風冷
邪氣乘虛而入客於
胞內傷於衝任手太
陽少陰之經欬衝任
二脉為經血之海手
太陽小腸之經手少
陰心之經此二經為
表裡主上為乳汁下
為月水然則月水是

婦人科

月經

論
內經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳
為風消為息奔者死不治難經曰心出血肝納血肺出
氣腎納氣蓋婦人百病皆自心生如五志之火一起則
心火亦從而熾若夫經閉不通之証先因心事不足由
是心血虧耗故乏血以歸肝而出納之用已竭經曰母
令胎子虛是以脾不磨而食亦少所謂二陽之病發心
脾者此也二陽者因食少故肺金亦失所養而氣滯不
行則無以滋腎陰况月經全藉腎水施化腎水既乏則
經血日以乾涸以致或先或后淋瀝無時若不早治漸

治先期而行者乃
屬虛屬熱或晚間

有熱

當歸頭身二錢

白芍藥 川芎

熟地 人參

川續斷 山藥

白片木 黃芪

條黃芩 酒炒

知母各一錢

黃連 美夏 湯藥少

北北胡各七分

升麻 三分

右水煎空腹溫服
如血來紫黑色加

寸口脉沉而數數則為出沉則為入出則為陽實入則

為陰結跌陽脉微而弦微則無胃氣弦則不得息少

陰脉沉而滑沉則為在裏滑則為實沉滑相搏血結

胞門其截不瀉經絡不通名曰血分○經水前斷後

病水名曰血分此病難治先病水後經斷名曰水分

此病易治

婦人帶下六極之病脉浮則為腸鳴腹滿緊則為腹中

痛數則為陰中痒痛則生瘡弦則陰戶掣痛

婦人帶下脉浮惡寒漏下者不治

婦人寸口脉浮而弱浮則為虛弱則為血浮則短氣弱

則有熱而自汗出

厥陽脉浮而滑浮則氣滿滑則有寒喜噫吞酸其氣時

下小腹則寒

炒黃連如小腹作

疼加炒黑山梔仁

補遺清肝飲 治經

水逆期

當歸 一系二分

白芍藥 川芎

熟地黃 童便浸

生地黃 酒浸

黃芩 酒炒 紫胡

前茶穗 知母

懷山藥 人參

白片木 土炒

川續斷 各三分

木瓜 七分 升麻

吉梗 酒炒 各五分

少阴脉滑而數者陰中生瘡

少陰脉數則氣淋陰中生瘡

少阴脉弦者白腸必挺核

少陰脉浮而動浮則為虛動則為漏婦人則脫下

婦人漏血下赤白日下血數升脉急疾者死遲者生

婦人漏下赤白不止脉小虛滑者生大紫實數者死

婦人疝瘕積聚脉弦急者生虛弱小者死

少陰脉浮而紫紫則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮則亡

血惡寒絕產

肥人脉細胞中有寒故令少子其色黃者胸中有寒

婦人月經一月再來者經來其脉欲自如常而反微不

利不汗出者其經二月必來

方法

白茯苓 六分
生苧草 三分

右藥束 救灯心七
根水煎食前温服

補遺 疎肝順榮湯
治經候過期不來

或來作痛
川當歸 用身尾

川芎 各二分
白芍藥 紅花

香附子 蘇木
桃仁 各一分

地黃 姜汁酒各半
丹之炒烘 各一分

麝香 陳皮 各一分

玄胡索 研碎小筒
香加鹽少許煎湯

詳之炒二分
木香 四分

右水煎食前温服
冬時加肉桂五分

炮姜五分

月水不通

夫月水不調者蓋血
因寒凝滯不通腸鳴

氣胸病本在胃脘氣
虛不能消化水公使

津液不生血氣也或
醉後行房氣竭傷肝

丹溪曰經候有枯閉不通者有不及期与过期者有妄

行者有色紫黑及淡者有成塊者有作疼者夫經不

通或因墮胎及多產傷血或因久患潮熱銷血或因

久勞盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而不生血

或因病疾失血治宜生血補血除熱調味之劑隨証

用之或因七情傷心心氣傳結故血閉而不行宜調

心氣通心經使血生而經自行矣

○肥人少子亦由痰多脂膜閉塞子宮不能受精而施化

也宜服上藥

○瘦人子宮无血精氣不聚亦令无子以

四物湯養血養陰等藥

○夫血為氣之配因氣而行成塊者氣之疑將行而痛者

氣之滯行後作疼者氣血虛也色淡者亦虛也而有

水以混之也 錯經妄行者氣之乱也 察者氣之熱黑

者熱之甚也 今人悉指為風冷而行温熱之劑 猶不踴

○調經散 治經水或前或後或多或少或踰月不至或

一月兩皆可服

川芎 酒洗一分 麥門冬 去心二分 人參 去芦 半夏 湯泡

白芍藥 川芎 各一分 牡丹皮 去心 肉桂 五分

阿膠珠 甘草 各七分 吳茱萸 擇去閉日者姜湯

右作一服水二盞姜三片煎至一盞空心稍熱服

○月經過期不行宜服

當歸 半斤 熟地黃 白芍藥 香附米

蓬義木 蘇木 各一分 川芎 熟桂

其草 各五分 木通 八分 紅花 三分 莖仁 二十个

右細切作一服水一盞半煎至一盞空心温服

致使月水衰少不來

名曰血枯若因唾吐

下血之後謂之脫血

凡此致者皆與云衰

少津液內竭而致也

宜生津液滋氣血其

經自行因從容居或

乾地黃湯血補遺或

四物湯加莖仁紅花

見下虛中有熱月事

不來四物湯加黃芩

治之見下血積血癥

增味四物湯或通經

丸或地黃通經丸或

水府丹或經驗秘方

○月經先期而來宜服

婦身半 川芎

甘草

香附

右細切作一服水煎空心服

○經不通用馬鞭草杵汁熟膏為丸或燒存性為丸紅花

當歸煎湯送下

○固經丸 治經水過多不止

黃芩

黃柏炒

香附薑便浸一宿

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十丸白湯

○崩漏有虛有熱虛則下溜熱則流通急則治其標用白

芷湯調下百草霜服或棕櫚灰或狗頭骨燒存性

五靈脂半生半炒俱以酒調服後以四物湯加乾姜

調讓之緩則治其本四物湯加芩連參芪香附乾姜

之類

○崩漏多因氣所使而下香附末一錢炒黑婦身一錢白

芍藥一錢酒炒熟地黃一錢川芎黃芪蒲黃地榆人

參各伍分白朮一錢升麻三分煎服甚者加棕櫚灰

為末酒調服

婦人血病宜用當歸若肥白人与人参黃芪同用瘦黑

人定与生地黃香附同用

○帶下是胃中痰積流下滲入膀胱當升之无人知此以

二陳湯加蒼白朮升麻柴胡甚者上用吐法以提其

氣下用二陳加二朮仍用瓦壺子以燥其濕痰

○一方 治白帶

不能飲食泄血不

醒腦氣唾血日眩

婦人胸肋支滿悶

補遺南棗若丸 治

香附桃仁紅花 見下

湯加木香枳殼枳實

人經閉是氣滯四物

如用必以姜汁炒瘦

可服地黃泥痰故也

黃連川芎痰飲門不

閉早痰腫瘰癧湯加

星哥丸補遺肥人經

必漸成肥人多有之

海地何因而下多日

通見 痰粘住血

巳日久血枯

勾花蓉酒浸

熟地黃 白茯苓

兔系子制附子炮

白石英 當歸

禹餘糧 制研

烏賊魚骨 去甲

五味子各一兩

人參 五子

右為末煉蜜丸如

梧桐子大酒下三

十九空腹服

補遺乾地黃湯

乾地黃 澤蔞葉

白茯苓 人參

五味子 附子炮

禹餘糧 制當歸

等分每服三錢姜

三片水煎空腹服

補遺星苧丸 治婦

人因脂肥痰多粘

住血海地位因而

下多者目必漸昏

天南星 明礬黃

蒼水 米泔浸去皮

川芎 香附

右等分為細末蒸

餅丸如棗豆大每

服百丸空心白湯

下

樗白皮

山茱萸

苦參

香附

各五

龜板 酥炙

枳子 略二

黃柏 一兩

乾姜

具母 略二

白芍 七手

右為細末酒糊為丸服

○又方

白芷

四兩以石灰半斤淹三宿去灰以白

○又方以黃芩子一味炒焦為末米飲調服止可治心痛

不可治白帶以其能燥濕痰也

○羅先生治帶用十束湯神祐丸玉蝕散此法實者可

虛者不可峻攻

○帶下必須斷厚味凡用藥寒月少加姜附燻机應變之

○一人上有頭風鼻下有白帶用南星蒼水黃芩辛夷

川芎黃柏 炒焦 滑石半夏牡礪粉丸服

肥上法 ○四物湯乃婦人衆疾之總司也

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

右細切等分水煎服

○東垣治崩漏帶下多主於寒孝者宜再思之不可一途

而論經曰陰虛陽搏謂之崩觀此可知

○東垣曰葵花白者治白帶赤者治赤帶用之果驗

○東垣調經升陽除濕湯治女子漏下惡血月事不調或

暴崩不止多下水漿之物皆因飲酒不節勞倦所傷

或素有心氣不足致令心火乘脾必怠惰嗜卧困倦

之力氣短氣急脾主滋榮周身者也脾胃虛而心胞

乘之故漏下月水不調也况脾胃為血氣陰陽之根

蒂也當除濕去熱抑風氣上伸以勝其濕又云火鬱

則發之

當歸酒洗

升麻 一兩

独活 五分

蔓荊子 七分

室女經閉

夫室女經閉成勞者蓋憂愁思慮則傷心心傷則血逆竭血逆竭則神色先散而月水先閉也火既受病不能榮養其子故下者食脾既虛則金氣虛故發嗽也既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒髮髮焦筋痿切不可用青蒿等涼藥治之蓋血得熱則行冷則凝治宜

滋養氣血抑肝補脾清熱為主通散或劫勞散並勞瘵門或滋血湯或麥煎散並補遺或牡丹散附餘大抵與勞瘵門參用補遺滋血湯治婦人血熱氣虛經候不調血聚四肢或為浮腫肌體發熱疑為勞瘵宜以此藥滋養通利丹皮一兩馬鞭草荆芥穗各四兩枳壳去穢炒

防風

炙甘草

藁本各一

柴胡

羌活

蒼朮

黃芪各半

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗空心溫服少時以乾飯壓之可一服而已○如多足太陰脾經中血海穴三七壯亦已○此藥乃從權之法因風勝濕為胃氣下陷而氣迫於下以救其血之暴崩也住後必須服黃芪人參炙甘草當歸之類數服以補之於補氣升陽湯中加和血藥便是也若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此湯一服立止○涼血地黃湯治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守胞絡相火故血走而崩也

告水

細辛

川芎各二

黃連

羌活

柴胡

升麻

防風各三

生地黃

當歸各五

甘草

紅花少許

右細切作一服水二大盞煎至一盞去粗空心稍熱○酒煮當歸丸治疝白帶下疝脚氣腰以下如在冰雪中居火炕以厚衣重蓋猶寒肌肉消瘦小便與白帶長流而不禁固面白目青目眦无所見身重如山行步歌側腿膝枯細大便閉澀心下痞悶懊懷食不下面垢背寒此上中下三陽俱虛脉沉紫而逆按之空虛洪而无力尤為中寒之証乃氣血俱虛之極也

茴香

五子

黑附子炒

良姜各七

當歸一兩

右四味

細切以好酒一升半煮至酒尽焙乾

炙甘草

苦練生用

丁香各半

木香

升麻各一

柴胡一兩

炒黃塩

全蝎各三

玄胡索

四子

當歸 去芦炒

肉桂 去皮赤芍藥

川芎 各一兩

每服四錢水一盞

烏梅 一辺煎服以

經調為度

補遺麥煎散 治少

男室女骨蒸婦人

血風攻症四肢心

胸煩壅

驚悸 醋炙常山

赤茯苓 柴胡

白芍藥 當歸

生地黃 石膏

乾漆 炒烟灰

大黃 煨各一兩

甘草 半兩

每服一兩小麥五

十粒水一鍾煎七

分溫服

月水不利

夫月水不利者風冷

客於經脈和搏於血

血得冷則壅滯故令

月水不利常患小腹

疼氣引腰脊或上攻

胸膈或寒熱注末或

腹中結塊或疲乏力

或痛行時作或治宜

右與前四味同研為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子
大每服五七十丸空心淡醋湯送下忌油膩冷物及

酒濕麩等

○固真丸 治白帶久下不止臍腹冷痛陰中亦忽目中

溜火視物昏花齒惡熱飲但喜乾食此皆寒濕乘於

胞內肝經陰火上溢故目中溜火其惡熱飲者陽明

經中伏火也法當大瀉寒濕以此丸治之

黃柏 酒洗

乾姜 炮

右除左骨石脂水飛日乾另研外餘共為細末麵糊

為丸如鷄頭仁大日乾空心白湯下以時以早飯

之是不令熱藥犯胃也忌生冷硬物酒濕麩

○烏藥湯 治婦人血海疼痛

當歸 一兩 甘草

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服

○紅花當歸散 治婦人血藏虛竭經候不調或漸續

不止或積癩塊腰腹刺痛肢體瘦弱

劉寄奴草 兩 當歸 去芦 牛膝 酒浸各兩 桂 去皮

紅花 白芷 各一兩 甘草 各二兩 赤芍藥 一兩

紫葳 花 蘇木 各二兩

右為末每服二錢空心熱酒調下如經閉濃煎紅花

酒調下

○溫經湯 治婦人血海虛寒月水不利

當歸 川芎 芍藥 桂心 牡丹皮

義木 略半 人參 甘草 牛膝 略一

每服五錢水一盞半煎至八分溫服不拘時

劉寄奴草 炒 芥子 炒 中 芥 炒

行氣調血為先調至

潤紅湯或延胡索散

並補遺或紅花當歸散或溫經湯並附餘

或香附一物九或交

附九並見下經信經

期以致鼻衄錯經妄行婦苦桃仁湯補遺

有經水未行臨經將

來作痛者血突也一

豆於血鬱滯也四物湯如杏仁香附黃連

紅花或加延胡索義

水木香有熱加柴胡

黃琴見下經後行過

而作痛者氣血俱虛

也八物湯虛損門

補遺調至潤紅湯

治月水不調或過

期不行小腹急痛

牡丹皮一各五分

生地黃二各二味

用酒同浸半日

白芍藥一各便酒麥

紅蘭花 川當歸

各一各 川芎

蘇木 羌活各

廣陳皮七分

青皮去核五分

桂四分

○助陽丹 治白帶下陰戶中痛空心面怠痛身黃皮

緩身重如山陰寒如水

生黃芩 橘紅各五分 防風 高良姜 乾姜

柳杏仁 甘草各一 柴胡三各 白葵花

右細切分作二服每服水二盞煎至一盞去粗食前

稍執服

○丁香膠艾湯 治崩漏不止蓋心氣不足勞後及飲

食不節所得其脉兩尺俱弦緊法按之無力自竟脘

下如冰冷白帶及白滑之物多間有如屋漏水下時

或有鮮血右尺脉時或浮洪

熟地黃 白芍藥各三 川芎 丁香各四

阿膠珠六分 生艾葉一各 當歸二各

右以川芎地黃丁香另為細末其當歸為藥之葉各

細切連前共六味入水五大盞煎至一盞半去粗入

阿膠再上火煎至一大盞稍熱空心服

○伏龙肝散 治氣血勞傷冲任經虛血非時崩下脘

腹疼痛脉沉弱食少或赤白帶下

伏龙肝 赤石脂 麥門冬各二 甘草炙半 川芎 三兩

當歸七各 乾姜七各 桂半兩 熟地黃四 艾葉 三兩

每服四錢入水煎服

○水府丹 治婦人久虛積冷經候不行癥瘕痞塊腹中

暴痛面有黧黯黎黑羸瘦

硃砂各隔 紅豆五粒 桂心各為 木香

乾姜各一 砂仁二兩 花蕊石 煨研斑蝥去頭尾

生地黃汁 童子尿各一 臘月狗胆散 元靖去頭尾

米同炒美 色去米

甘草三分

右水一鍾煎八分

食前温服

補遺延胡索散治

榮衛不調血攻

心刺痛

延胡索研一升半

川當歸酒洗

白芍藥酒炒

生地黄酒浸微炒

桃仁泥各一升

枳壳炒八分

木香四分桂五分

右麥三片水一鍾

煎八分温服

補遺漏言桃仁湯

治經信愆期以致

鼻衄錯經妄行

川歸酒洗一升半

白芍藥酒炒

大黃酒拌爛

桃仁去尖

山柰二升焦

川芎各一升

甘草三分

右水一鍾煎八分

食後換服臨服加

童便一盞

月水不斷

右九味為細末同三汁熬為膏和丸如鷄頭實大硃砂為衣每服一九食前細嚼温酒送下米飲亦可

東垣

○黃芪當歸人參湯 治婦人經水暴崩不止先因損

身失血自後一次縮一十日而未其後暴崩不止蓋

因其人心竅性急多驚而心氣不足及飲食不節得

之診得掌中寒脉沉細而緩帶數九竅不利四肢无

力上喘氣從口鼻氣不調脾胃虛弱胃脫當心而痛

左肋縮急當脐有動氣腹鳴下氣大便難宜先治其

本餘証可去安心定志和脾胃益元氣補血養神以

大熱劑去其寒少加生地黄去命門相火不令四肢

痿弱

黃連二分

桂枝各五分

生地黄三分炒神麩

草豆蔻八分黃芪

橘紅

人參

麻黃不去節各一升歸身半升杏仁五枚另研如泥

右細切作一服水二盞半先煎麻黃令沸掠去沫煎

至二盞下諸藥同煎至一盞食前服立止又以草豆

蔻丸五十九粒以上胃脘客寒之痛再與肝積之藥除

其病根

東垣

○當歸芍藥湯 治婦人經水漏下不止其色鮮紅時

值炎月先因勞後脾胃虛弱氣短氣逆自汗不止身

熱悶乱不思飲食四肢困倦大便時泄後復因心氣

不足經水暴下不止微資氣下行氣逆氣短懶於語

言此藥主之

柴胡二分

熟地各五分

炙甘草

蒼朮炒

生地黄

白芍

黃芪

川歸

陳皮去白

白朮各一

右細切作一服水二盞煎至一盞空心温服

愚按經水淋瀝不

者此足厥陰肝經太

陰脾經病也蓋肝主

藏血脾主統血女子

心事不遂終朝憂鬱

怒氣傷肝故肝實不

能藏血肝木盛則凌

脾土故脾土虛不能

統血是以月水不

也古謂勞傷經脈中

任氣虛不能約制其

血又謂血熱皆非也

治宜伐肝補脾兼順

氣止血則血歸正絡

月信自然依期矣

金不易湯或一秤丸

並補遺或當歸芍藥

湯或柴胡調經湯或

升陽舉經湯或死仁

散或膠艾湯或固經

丸或四物湯加煎芥

穗條等並見下

補遺千金不易湯

治婦人血去不止

黃瘦少食腰痛此

抑肝補脾之藥也

白朮一錢二分

當歸頭 白芍

熟地黃各一錢 香附子 烏藥

東○柴胡調經湯

治經水不止其色鮮紅項筋急腦痛

春骨強痛不安

甘草炙 梔身

升麻各五分 柴胡七分 羌活

右細切作一服水二盞煎至一盞空心溫服取微汗

立止

東○益胃升陽湯

治婦人經候凝結黑血成塊左廂有

血瘕水泄不止食有時不化後血塊暴下并水泄俱

作是前後二陰有形血脫竭於下既久經候執不調

水泄日三四行食罨煩心飲食減少人形瘦弱血脫

益氣古聖人之法也先補胃氣以助生發之氣故曰

陽生陰長諸其藥為之先務也其能生血陽生陰長

之理也人身以谷氣為室故先理胃氣為要

柴胡 升麻各五分 甘草炙

人參有脂炒 薤各錢 黃芪半一錢 白朮二錢 生黃芪分

右細切作一服水二大盞煎至一盞去粗熱服○如

腹中痛加白芍藥三分中桂少許○如渴或口乾加

高根三分不拘時候服

東○升陽舉經湯

治經水不止右尺脈按之空虛是氣

血俱脫大寒之症輕手其脈數疾舉止弦緊或澀皆

陽脫之症陰火亦亡見熱症於口鼻眼或渴此皆陰

燥陽欲先去也當溫之舉之升之浮之燥之此法乃

大升浮血氣補命門之下脫

肉桂 覆朮 白芍 紅花 半份 細辛 三分 人參 半份

熟地黃 各半錢 羌活 當歸 黃芪 柴胡 各錢 桃仁 泥 防風 錢 一

九

神麴 地榆各

八分 陳皮

白茯苓 山查各

七分 甘草

杜仲炒去絲五分

白水煎食前服

補遺二種丸

白木二兩麥麩炒

枳實去穢炒

杜仲鹽炒去絲

烏藥酒炒青皮

白茯苓 山查

神曲炒 麥芽炒

陳皮各一兩

香附二兩童便浸

川芎 半分獨活根七分

右細切分作二服每服用水二盞煎至一盞空心

○當歸附子湯 治臍下冷痛赤白帶下

當歸四分炒鹽三分蠟稍 升麻各五分 甘草各六分

柴胡七分黃柏少許附子炮 乾姜炮 良姜

右細切作一服水三盞煎至一盞去粗稍熱服或為

細末酒麩糊為丸亦可

○調經補真湯 冬後一月微有地泥水泮其白帶下

陰戶中寒一服立止

獨活 乾姜炮 藁本 防風 蒼朮各二分

麻黃各七分 炙甘草 人參去芦 歸身 白木

生黃芩 升麻各五分 黃芪七分 良姜 澤瀉

羌活各一分 柴胡四分 杏仁研枚 桂枝少許 白茯苓各七分

右細切作一服除黃芩麻黃另外先以水三大盞煎

麻黃一味令沸掠去沫入餘藥同煎至二盞再入生

黃芩煎至一盞空心服之候一時許可食早飯

○柴胡丁香湯 治婦人年三十歲左右臨經腰膈痛

甚則腹中亦痛經縮三二日

生地黃五分 丁香四分 歸身 防風

羌活各一分 柴胡二錢 全蝎一枚

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食前稍熱

○延胡苦練湯 治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下

黃柏一分 延胡索 苦練子各二分 附子

肉桂各三分 炙甘草五分 熟地黃一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服

○桂附湯 治白帶腥臭多悲不樂大寒症

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

愚按血屬陰也靜則循經動則錯經妄行蓋女子七情過極則動五志之火五志之火亢甚則經血暴下失期而來久而

崩漏

常歸酒洗川芎 地黃酒洗蒸 白芍酒炒各兩半 甘草五錢 右為細末早米糊丸米湯不拘時服 下七十九

不止謂之崩中如風
動木搖火燃水沸類
也治崩中初用止
血以塞其流中用清
熱涼血以澄其源未
用補血以還其舊若
止塞其流而不澄其
源則滔天之勢不能
遏若止澄其源而不
復其舊則孤子之陽
無以立故本末勿遺
前後罔紊方可言治
也初用荆芥散或如
不散或小煎湯並補
遺中用涼血地黃湯

見下陽痿陰虛血熱
弗溢黃芩湯補遺至
漏下血脈虛洪其血
紫黑成塊此乃熱極
反蕪水化制之生地
黃散補遺或四物湯
加芩連知母黃柏見
下因勞損衝任脈虛
血非時下脘腹冷痛
崩中脉遲弱伏龍肝
散附餘先因勞役脾
胃虛損氣短氣逆自
汗身熱瀨食大便或
泄或秘体倦尤力崩
中不止當燻芍藥湯

黃栢鵝引 知母各五 肉桂五分 附子炮

右細切作一服水二盞煎至一盞空心溫服○如少
食常胞腹中滿悶加白芍藥五分○如不思飲食加

五味子二十箇○如煩惱面上如虫行乃胃中元氣
極虛加黃芪一錢半人參七分多甘草升麻各五分

○人參補氣湯 治四肢懶倦自汗無力
丁香末二分生甘草 甘草後發生地黃 白芍各五

黃栢七分熟黃六分人參 去毒防風 去芦羌活
知母 歸身 升麻各七 柴胡一錢黃芪半錢

全蝎 五味子 二十 升麻 各七 柴胡 一錢 黃芪 半錢
右細切作一服水二大盞煎至一盞空心稍熱服

○黃芪白朮湯 治婦人四肢沉重自汗上至頭頸惡
風頭痛燥熱

細辛二分 吳茱萸 川芎各三分 柴胡 升麻各四分

當歸六分 黃栢 酒炒 甘草炙 羌活各八分 五味子 各四分

白朮 人參 各錢 黃芪 半錢
右細切作一服水二大盞生姜五片煎至一盞去粗

食前稍熱服
○增味四物湯 治婦人血積血痕

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃

京三稜 乾漆 炒烟 炙 肉桂 去皮 廣茂 各等分

右細切每服五錢水二大盞煎至一盞去粗空心服
○補經真固湯 治婦人白帶下流不止其心胞天脉

微細蓋始病血崩久則血少復亡其陽故曰滑之物
下流不止正所謂崩中日久為白帶也乃本經血海

枯竭津液復亡不能滋養筋骨以本部行經藥為引

或人參補氣湯見下
勞損氣血兩虛黃芪
當歸人參湯或升陽
本至湯並見下惡露
去多心神恍惚戰栗
虛量復元養榮湯補
貴或千金不易湯或
一秤丸並見前

補遺劑不散 治崩
中不止
劑芥不拘多少于
麻油燈上燒焦研
為細末

每服三錢童便下
補遺如聖散 治血

出册
棕櫚燒存性
烏梅肉各一兩
乾姜一兩五錢並
燒存性末之

每服二錢烏梅酒
調空心食遠服

補遺小煎湯 治崩
中不止
小煎草葉 汁一盞
生地黃 汁一盞
白木 半兩

右水一盞煎七分
温服

補遺黃芩湯 治崩

用以大辛其油膩之藥潤其枯而滋津液以大辛熱
之藥補其陽道生其血脈以苦寒之藥泄其肺而救
上熱傷氣以人參補之以微苦温之藥為引而益元
白葵花研爛四分陳皮五分不生黃芩細研郁李仁去皮
炙甘草 柴胡各一乾姜細末人參二錢
右細切除黃芩外以水三盞煎至一盞半入黃芩同
煎至一盞去粗空心熱服少時以早飯壓之

○温胃補血湯 治婦人耳鳴鼻不聞香臭口不知谷味
胃氣不快四肢困倦行步歌側髮脫落食不下膝冷
陰汗帶下喉中吟吟不得吐口咽乾太息頭不可
以回頷項筋緊急春骨強痛頭旋眼黑頭痛噴嚏

生地黃 白朮 藿香 黃柏各二
牡丹皮 蒼朮 王瓜根 陳皮

茱萸各三 歸身四分 柴胡 人參

炙甘草 地骨皮各五 升麻 生甘草
黃芪一錢 丁香一箇 桃仁三箇 白葵花

右細切作一服水二大盞煎至一盞食前熱服

○立効散 治婦人血崩不止
當歸 蓮花心 白綿子 紅花 茅花各一

右剉如豆大白紙包裹泥固火煨存性為細末每服
三錢○如乾血氣研血竭為引温酒調服或加輕粉
五分如血崩甚不止加射香為引温酒調服

○四聖散 治婦人赤白帶下
川烏 生白礬各一 紅娘子 三箇 斑蝥 十箇

右為細末煉蜜為丸如皂子大塞陰戶中
○三黃三白丸 白帶因七情所傷而脉數者

中下血脈乘經

血沸溢

黃芩不拘多少

細末

每服一二錢燒秤

鍾淬酒下

補遺生地黄散 治

鬱熱衄血咯血吐

血及至漏下血脈

洪血色紫黑

生地黃 柴胡

熟地黃 黃連

地骨皮 去木

天門冬 去心

白芍藥 甘草

匾栢酒蒸

黃栢炒各

香附醋炒

白芍藥

白朮各一

白芷洗性

椿根皮炒二

黃連炒半

末之粥丸桐子大每服七十九食前米湯下

附○白朮丸 治赤白帶先以小胃丹半飢半飽津液下

數丸候鬱開却宜此補之

白朮一兩

黃芩半兩

紅白葵花半一錢

白芍藥七錢

末之蒸餅糊丸空心煎四物湯下五十九

附○元戎六合湯 治帶下脈沉微腹及陰中痛

四物湯四兩

加桂附子炒五錢

每五錢水煎服

○溫經除濕湯 治婦人值冬月四肢無力乃痿厥濕熱

在下焦也 語心者是濁氣不下降欲為中滿也合眼

麻木作者陽道不行也惡風寒者上焦之分皮膚

氣不行也開目不麻者陽道少行而陰寒之氣

黃芩 黃芩

地榆

水煎食前溫服

補遺伏元養血湯

治血山崩惡露去

多心神恍惚戰栗

虛暈

人參一兩半

酸棗仁炒黃芪

白芍藥 地榆

川當歸用頭

白朮各一兩

荆芥八分甘草分

遠志去心五分

右紅棗一枚水一

也頭旋目眩者風氣下陷於血分不得伸越而作也

近火則有之

黃連二分

柴胡

草豆蔻

神麩炒

木香各三

麻黃枝去

當歸身

獨活

黃栢

升麻

羌活各五

炙甘草

人參

白朮

猪苓

澤瀉各七

黃芪

陳皮

蒼朮各一

白芍藥一錢

右細切作一服水二大盞煎至一盞食遠服治肢節

疼痛無力之勝藥也

○桃仁散 治婦人月水不調或淋瀝不斷上後復來

狀如泄水虛弱不進飲食腹中堅痛不可行動月水

或前或后或經月不來身體沉重惟欲眠卧多思

或前或后或經月不來身體沉重惟欲眠卧多思

鍾煎八分温服如
虛極發暈不省人
事噤去急以米醋
噴其面又將鉄錘
燒通紅浸入醋碗
內沸起醋氣重本
婦鼻边此產後通
用法也

赤白帶

婦人下白而不其稠
者曰白淫身男子白
濁同也係出於相火
屬於足少阴太陽治
當清補為主其下赤

白稠粘者謂之帶下
屬於心胞手厥阴少
阳即若男子自遺之
精此屬於虛宜當補
赤確然矣六九固本
丸或十六味保元湯
主之並補遺或金鎖
正元丹便濁門或東
垣固真丸或補經固
真湯並見下若便澀
而燥者夜服消痰抑
火潤下片痰飲門得
通後復又乾結不通
乃血少火燥阳明也
四物湯加麻仁同川

甘草多 半夏各三 赤芍 生地各一 澤蘭葉

川牛膝 當歸 桂心 牡丹皮 人參

蒲黃 川芎各七 桃仁去皮尖炒另

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞空心
温服

○通經下取方曾試驗神効

海蛤粉五錢 苦蕒藤 牙皂錢各二 巴豆膠去

天花粉 苦丁香 紅娘子錢半 射香

右為細末每用一錢葱涎同搗為丸薄綿裹以五寸
竹管納陰戶中候熱時先通黃水次則經行

○通空丸 治婦人室女片信不通或成血瘕疼痛

桂心 青皮 大黃酒溫 蘇椒

義木 乾姜 川烏去皮 乾漆

當歸 桃仁去皮尖炒

右為細末將四分之一以米醋熬成膏和餘藥末成

劑臼中杵勻丸如梧桐子大每服二十九空心淡醋

湯下漸加至三四十丸温酒亦可下性畏漆者入鷄

子清和藥內

○牡丹散 治血氣虛損內則月水不行外發潮熱肌

體羸困漸成骨蒸並宜服之

桂心 牡丹皮 芍藥 延胡索炒

沒藥別研 陳皮去白各 真蓬義木 鬼箭各二

當歸去芦 紅花各二 乾漆炒半 蘇木三手

甘草一兩 烏藥一兩

每服三錢水一盞煎七分不拘時

○膠艾湯 治勞傷氣血冲任虛損月水過多淋漓不

醫家海源

夜熱服之見下胸膈

迷悶胃弱者兼服和

中健脾胃食後服之

內傷門久帶下服前

藥不能收效者亦必

宜服六九固本丸可

也丹溪專主濕熱為

病白屬氣赤屬血以

二陳湯加蒼朮治濕

為主氣虛入參木血

虛入芎歸痰飲門閉

戶痛身黃皮緩身重

陰中如水濕東垣調

經升陽除濕湯或溫

經除濕湯或助阻丹

並見下內執赤白帶

下不止枸杞根一兩

生黃五兩酒一斗煮

至三升分六七次服

火盛陰虛煩熱三黃

三白丸附餘或益母

丸或苦練丸並見下

或白芷散附餘肥人

多是濕痰用海石半

夏南星黃柏芥木川

芎香附神皮冬加乾

姜瘦人少有此病有

者是熱以活石神皮

川芎海石青黛丸服

阿膠必成珠川芎

艾葉各七熟地黄

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服○一方加

地榆黃蘗方見胎前門

根○加減四物湯 治經候微少漸至不通手足煩痛形

瘦潮熱脉息微數

本方去地黃川芎加澤蘭葉三倍甘草半分如經候

過多本方去熟地黃加生地黃如經行身熱脉數頭

昏本方加柴胡黃芩如經行微少或脹或痛四肢疼

痛本方加延胡索沒藥白芷共為末以淡醋湯調下

如經候不調心腹疼痛只用芎歸二味煎服名君臣

散以歸倍於芎也

元戎如味四物湯因氣冲經脉故凡經類併濟下

本方加白芍藥○如經欲行腹痛者本方加玄胡

苦練枳椇小香○如經水過多本方加黃芩白朮○

如經水遊少本方加葵花紅花○如經水滴末滴斷

或性來寒熱宜先服小柴胡湯以去寒熱然後以四

物湯和之或以二方併服名柴胡四物湯

○香附一物丸 治經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭

眩惡心崩漏帶下並宜治之

香附子杵去皮毛 杵多 少米醋浸 杵一夜用瓦 餅煮冷熱焙乾

右為細末醋糊為丸如梧桐子大日乾每服五十九

淡醋湯下

○艾附丸 治症如前

香附子杵去皮毛 杵多 少米醋浸 杵一夜用瓦 餅煮冷熱焙乾

右為細末醋糊為丸服

艾葉各七四兩 當歸二兩

右為細末醋糊為丸服

濕痰結注於下白帶

淋漓先以小胃丹開

導津液嘔下痰飲門

候積下鬱開後以補

藥調治白木左附餘

白帶腥臭多悲不樂

者寒也桂附湯見下

赤白帶下脉息沉微

腹痛閉中亦痛元戎

六合湯併餘或當歸

附子湯或調經補真

湯或玄胡苦練湯也

補遺六九固本丸

生血固真補心益

帶不漏則經水自

調凡產後虛者血

崩崩並服

懷山藥 巴戟天

山茱萸肉 各四兩

川練子肉 二兩

小茴香 一兩食鹽

二子煎湯拌練肉

同炒乾 補骨脂

湯拌半日搓去皮

賦皮用川柏五斤

酒一鍾煎至半鍾

拌補骨脂淨子炒

人參 蓮肉

○地黃通經丸 治婦人經候不行結成血瘕在臍下

如覆杯

熟地黃 三兩 童重 法炒

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心

溫酒下未知加至七八十丸

○益母丸 治婦人赤白帶惡露時下不止及治婦人

胎前產後及經中諸般奇病無所不療

益母草 一名益母 子紫花方莖俗名對天麻五月採

大每服一丸用熱酒加童便化下 蒸氣下木香湯化

下或只以末子每服二錢或酒或童便調下治婦人

之聖藥也

○苦練丸 治赤白帶下最妙

苦練 酒 茴香 炒 當歸 各等分

右為 末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九空心

溫酒送下

○白芷散 治赤白帶下

白芷 一兩 胎髮燒 團 海螵蛸 二個

右為細末空心溫酒調下

○竹茹圓 治婦人崩中赤白帶下

當歸 白朮 青木香 蚕蛻 煨

墨棕刷 煨 川山甲 煨 各一兩 地榆 粉草 竹茹 血餘

川芎 白茯苓 牡蠣 煨 綿子 煨 各半兩 熟地黃 四兩 赤石脂 煨 各

石七味煨藥用綿子裹定入甌子內用鹽泥固濟用

炭則煨存性却同前藥碾為細末煉蜜圓如梧桐子

大每服四十九空心溫酒吞下

○乳香散 治赤白帶下

乳香 沒藥 煨 各一兩 地榆 粉草 竹茹 血餘

黃芪 各二兩

木瓜 一兩 用水二

鍾煎至一鍾 拌上

三味 微炒乾

懷生地 當歸身

各二兩 川芎

白芍藥 各一兩 四

味用童便二鍾 河

清酒一鍾 拌浸一

日 煖又浸待汁盈

焙乾用

右為末 用五仁班

龍膠二料 和丸 梧

桐子 太空心 淡鹽

湯送下 百丸

補遺 十六味保元湯

骨碎補 火塔粗布

搗去毛茸 黃芪

歸頭身 懷山藥

蓮蕊 川椒活

各二兩 貫衆去

根去洗淨 三錢

人參 巴戟肉

各二兩 杜仲小

苜蓿湯 拌抄 半

黃柏 酒拌炒 八分

石斛 升麻

白茯苓 各七分

生甘草 三分

圓眼肉 三枚

草果 一個 去皮入乳香一小塊 用麩餅

右為細末 每服二錢 陳米飲調下 重者

破故紙散 治赤白帶下

破故紙 石菖蒲 等分並

右為細末 每服二錢 用菖蒲浸酒調溫服 更入斑貓

五分 去翅頭足糯米

丹溪活套

凡婦人經候不調 皆當以四物湯為主 治如經候

過而腹中作痛 綿七無休息者 屬血虛 本方倍當歸

熟地黃 兼氣虛者 本方加人參 黃芪 挾寒者 加乾姜

○如經候將來 腹中陣七痛 乍作乍止者 血氣實也

本方用生地黃 加黃連 香附子 桃仁 紅花 玄胡 索牡

丹皮之類 ○如經水常不及期 而行者 血熱也 本方

用生地黃 加黃連 黃芩 白芷之類 ○如經水常過期

而來者 瘦人多 應是血少 本方倍當歸 熟地黃 加黃

芪 甘草 少佐以紅花 莖仁 泥以為生血之引用也 ○

肥人大 際是氣虛 挾痰 阻滯 升降 然也 本方去地黃

加參 芪 草 苁蓉 半夏 陳皮 香附 等藥 ○常過期而

紫黑 成塊者 血熱也 多作腹痛 本方用生地黃 加香

附黃連 玄胡 索五 靈脂 乳香 沒藥 之類 ○過期而血

淡色者 痰多 血少也 本方用生地黃 合二陳 湯煎服

○肥盛婦人 或二三箇月 一行者 痰盛而 軀脂 閉塞

經水 脉以導痰 湯加苁蓉 歸香 附蒼水 白朮 之類 ○如

經水 適來 適斷 往來 寒熱 如癰者 本方合小柴胡煎

服 ○如經行 過三五日 腹中 綿七 走痛者 此血行而

帶 未及行也 本方加水香 檳榔 煎服 立愈

水煎空腹溫服○
潮熱加柴胡八分
黃芩酒炒一升○
帶者月至必少其
有聚而反多者或
紫或適未適斷瀉
瀉落上而不淨者
加荆芥一升黃連
酒炒七分地榆八
分○若五心煩熱
而口舌乾者加
母一升麥門冬去
心一升地骨皮去
水一錢

胎前指南

患阻

妊娠二三月以來吐
逆不食心虛煩悶者
名曰患阻是病其狀
顏色如故脉息和順
但竟瘦体沉重頭目
昏眩擇食惡聞食氣
好食酸醜甚者或作
寒熱心中憤悶嘔吐
痰水胸膈煩滿恍惚
不能支持不拘初孕
但疾苦有輕重耳輕

○祖傳經驗秘方治婦人室女月經不通漸成脹滿及治
男子墜馬跌撲損傷以致瘀血停積欲成血靈病者
悉皆治之名曰桃双飲子

玄胡索

肉桂

香附子

五灵脂

砂仁

桃仁去破火

猴鼠糞即雄鼠糞也

莢双桃樹上嫩桃乾朽不

右各等分為細末每服三錢空心溫酒調下

○又方治月經不通只以鼠糞一合畧炒研細溫酒下効

○又方治婦人血崩不止用蒼耳草燒存性好酒調服立

止或調入四物湯中亦効

○一老婦人年五十三血崩久不止諸藥不効予以橡斗

蒼耳草根二物燒存性用四物湯加白芷茅菴乾等

煎湯調服

婦人科

胎前吸吸

論

內經曰陰搏陽別謂之有子謂陰脉搏乎其是為血氣
和平陽施而陰化也蓋為人之夫婦猶天地然天地之
道陰陽和而後萬物育夫婦之道陰陽和而後男女生
是故欲求嗣者先須調其婦之經脉經脉既調則氣血
和平氣血和平則百病不生而樂乎有子矣脉經曰診
其手少陰之脉動甚者始子也蓋手少陰心脉也心主
也脉故也又腎為胞門子戶尺中腎脉按之不絕當妊
子也又曰婦人妊娠一月之時足厥陰脉養之二月足
少陽脉養之三月手少陰脉養之四月手少陽脉養之
五月足太陰脉養之六月足陽明脉養之七月手太陰

者不服藥亦不妨重
者須治以藥人參橘
皮湯主之或半夏茯苓
湯去半夏以其有
動胎之性故也並見
下或蘇木飲補遺丹
溪云肥人惡阻因痰
二陳湯加黃芩白朮
竹茹貝母去半夏痰
飲門又方以白朮為
丸服瘦人是火前方
再加黃連山梔仁怒
氣所激者茯苓湯下
抑青丸火熱門
補遺蘇木飲 治孕

婦嘔吐惡心

人參 一錢五分

蒼朮 鹽水拌炒

廣陳皮 白朮

厚朴 去粗皮姜汁

拌炒各一錢

白茯苓 八分

白茯苓 去皮七分

炙甘草 五分

右姜三片棗一枚

水煎溫服

子腫

妊娠五六月以來浮腫如水者名曰子

脉養之八月手陽明脉養之九月足少陰脉養之十月
足太陽脉養之是以諸經脉各養三十日也若夫至期
當養之經虛實不調則胎孕為之不安甚則下血而墮
矣夫手足十二經氣血盈虧不同如手足厥陰太陽少
氣多血手足太陰少陰少血多氣手足少陽氣多血少
手足陽明氣盛血多安胎之法宜各按月依經視其氣
血虛實而調之因無胎墮之患其或感冒風寒別生異
証又宜各按法而調治之機要曰治胎產之病當從厥
陰經論之母犯胃氣及上二焦謂之三禁不可汗不可
下不可利小便若發汗者如傷寒下早之証利大便秘
則脉數已動干脾胃利小便者則內亡津液胃中枯燥刺
方之法能不犯三禁則榮衛自手而寒熱止矣皆鑿者
之繩墨也其為妊娠之婦早當絕去嗜慾安養胎元

宜靜而不宜燥体宜動而不宜分藥宜涼而不宜
宜溫而不宜寒母久立母久坐母久行母久卧又宜
去一切甜其煎燻油膩辛鹹酸物水菓魚蟹狐兔鴿雀
之類即死胎漏胎痛胎動下血子腫子癰等証及橫產
逆生胎死腹中之患矣丹溪曰難產之婦皆是八九箇
月內不能謹慾以致氣血虛故也傳曰古者婦人妊子
寢不側坐不偏立不蹕不食和味割不正不食席不正
不坐目不視和色耳不聽淫声口不出傲言夜則令瞽
誦詩道正事則生子形容端正才過人矣古所謂胎教
也妊娠之婦可不慎與

附期嗣論

夫人欲求嗣必先視其婦之至脉調否其或未調必以
藥而調之经脉既調宜以人事副之按其法而行之庶

腫為濕也蓋由臟氣
本弱因產重虛上不
剋水血散入四肢遂
致腹脹手足面目皆
浮腫小便秘澀防已
湯主之補遺或木通
散或全生白朮散或
產寶澤瀉方或鯉魚
湯或天仙膠散並見
下或用山梔一合炒
為末米飲調下丸服
亦可

防已二錢七分
桑白皮 赤茯苓
紫蘇各三錢六分
木香九分
右水煎溫服

子煩

妊娠五六月乃少陰
君火以養精六七月
乃少陽相火以養氣
平素有火人內外火
相感而作煩燥悶亂
不安者名曰子煩是
肺臟虛而熱乘於心
則令心煩也麥門冬

不失其候也訣云三十時中兩日半二十八九君酒筭
落紅滿地是佳期金水過時空霍亂^七之時枉費工
樹頭樹底覓殘紅但解開花能結子何愁丹桂不成叢
此蓋婦人月經方絕金水繞生此時子宮正開乃受精
結胎之候妙合太和之時過此佳期則子宮閉而不受
胎矣然男女之分各有要妙存焉如月候方經一日三
日五日交會者成男二日四日六日交會者成女過此
則不孕矣又曰陰血先至陽精後冲縱氣來乘血開裏
精陰外陽內則成坎卦之象而為男若陽精先入陰血
後參橫氣來助精開裏血陰內陽外則成離卦之象而
為女若成胎三月之內男女未分之時亦有轉女為男之
術其法以鉄斧一柄置於妊婦床席之下勿令人見知
更佩雄黃一二兩於孕婦身左或佩萱花亦可已上三
法皆驗不可輕忽傳曰不孝有三死後為大古訓云死
官一身輕有子万事足誠哉是言也死嗣者宜深思之
無怠

脉法
脉經曰婦人三部脉浮沉正等按之無絕者妊娠也○
妊娠初時寸微小呼吸五至至三月而尺數也○脉
滑疾重以手按之散者胎已三月也脉重手按之不
散俱疾不滑者五月也○妊娠四月脉左疾為男右
疾為女俱疾為生二子○又法得太陰脉為男得太
陽脉為女○又法左手沉實為男右手浮大為女左
右手俱沉實猥生二男左右手俱浮大猥生二女○
又法尺脉左偏大為男右偏大為女左右手俱大生
二男^{大者如}○又法左右尺俱浮^{當存}為生二男不

合前月三

湯主之補遺或安神
九驚悸門或麥門知
母湯或犀角散或當
歸飲或竹瀝湯並見

補遺麥門冬湯治

妊娠五六月煩悶
不安名子煩

麥門冬去心

防風 茯苓

黃芩各三錢半

淡竹葉一錢

分二貼水煎溫服

子懸

妊娠至四五箇月以

來者相二火養胎平

素有熱故胎熱氣逆

不安胎上湊心不安

胸膈脹滿名曰子懸

嚴氏紫蘇飲加炒山

梔黃芩香附之類見

下或君公下氣湯補

遺

補遺為公下氣湯

治胎氣上衝胸膈

膨悶

半夏姜汁拌炒

羌活各一錢

大腹皮 桑白皮

爾則女作男生左右尺俱沉濇當作為產二女不尔則

男作女生也此男女兼形之說也

○婦人懷孕脉離空而浮設腹痛引腰脊為欲生也

○又法婦人欲生其脉離空半夜竟日中即生也○

懷娠六七月脉實大牢強弦緊者生沉細者死○懷

娠至六七月暴下斗餘水其胎必倚而墮此非時孤

衆預下故也○寸口脉洪而濇洪則為氣濇則為血

氣動丹田其形則温濇在於下胎冷若水陽氣胎活

陰氣必終洪則為氣者死欲別陰陽其下必殛假令

陽至畜血若杯陰為胎問婦人雙生其一独死其

一独生醫為下其死者其病則愈然後竟免軀其脉

何以別之師曰寸口脉衛氣平調榮氣緩舒陽施陰

化精盛有餘陰陽俱盛故知雙軀今少陰微紫血則

獨疑經養不周胎則偏大小腹冷滿膝酸寒痲

起難此為血理若不早去害母失胎○婦人經自斷

而有軀其脉反弦恐其后必大下不成胎也大下猶

方法

丹溪曰婦人無子者多由血少不能抃精俗鑿悉謂子

宮虛冷投以辛熱之藥煎熬臟腑血氣沸騰禍不旋

踵或服艾者不知艾性至熱入火多則下行入藥服

則上行多服則致毒咎將誰挽

○瘦怯婦人子宮乾澁宜滋宮養血四物加香附黃芩之

類肥盛者乃軀脂滿溢閉塞子宮宜行温燥疾南早

半夏川芎滑石防風羌活一本竹卷不防風羌活或導痰湯類

○墮胎乃血氣虛損不能榮養胎元而自墮耳猶枝枯則

果落幹萎則花墜也又曰恚怒傷情內火便動亦能

枳即各八分

紫蘇葉七分

赤茯苓去皮

青皮各六分

桂心四分甘草三分

右姜皮三片棗一

枚水一鍾煎八分

服

子淋

婦人因酒色過度內傷胞門或飲食積滯水道閉澀小便淋瀝澀痛者名曰子淋蓋

或地膚子湯或一味地膚草湯或冬葵子散或車前草散或志憂散並見下虛者入味丸消渴門內熱而淋者五淋散淋症門

子痛

妊娠三五個月以來忽覺失音不能言語者名曰子痛內經云子痛者此由胞胎繫腎筋脈繫于舌胎氣使然本草無治法當

墮胎猶風折其木人折其枝也火能銷物造化自然

病源乃謂風冷傷於子臟未得病情者也大抵屬虛

屬熱二者又當視其輕重而治之

○一婦有胎即墮其脉左大無力重取則滿乃血少也以

其少年與補中氣使血自榮濃煎白朮湯調黃芩末

一錢服未至三四兩得保全而生

○固胎飲

熟地黃 當身尾 人參 白朮

白芍 川芎 陳皮 甘草

桑樹上羊兒膝七乘圓者愚恐當作如砂禁葉員者節俗名疾各也直象奇生志如

少加黃連黃柏入糯米五十七粒煎服血虛不安者

加阿膠珠胎氣痛者加宿砂

○安胎飲 孕成之後覺胎氣不安或腹微痛或腰間作

疼或飲食不羨宜服或至五六箇月常服數

白朮 當歸 白芍 熟地黃各五錢

人參 川芎 條黃芩 陳皮各五

甘草 紫蘇 砂仁各

右細切作一服水加生薑三片水煎服

○安胎丸

白朮 條芩 神麴炒各三

右為細末粥丸每服五十九丸清米湯下蓋白朮條芩

乃安胎之聖藥也

○丹溪曰天行不息所以生生而無窮荒蕪子活血行氣

有補陰之妙命名益母以其行中有補也故曰胎前

無滯產後無虛○條芩仁朮乃安胎之聖藥俗以黃

芩為寒而不用反謂溫熱藥能養胎殊不知胎孕宜

十月復非奇燎故不必服藥真待分娩之後即自能言也

胎水

婦人胎孕至五六月月以來腹大異常不分胸肚脹滿氣逆不安者此胸中畜水也名曰胎水若不早治之決然其子手足軟短形体殘疾或生下地即死此症候人多不識須服鯉魚湯泄水見下

胎氣

妊娠七八月以來胎氣漸重兩足浮腫頭目不浮者名曰胎氣直至分娩方消此由婦人素有風氣或衝任至有血風未可妄投藥湯只宜平胃散中混門懷孕五六月兩足腫上膝腿或足指間出黃水名曰水氣天仙藤散見下

漏胎

清熱養血使血循經而不妄行乃能養胎黃芩必取細挺沉實者用之○縮砂安胎以其止痛行氣故也○懷妊嗜物乃一藏之虛如受酸物乃行藏上能養胎而虛也

○胎動者因火逼動胎逆上作喘息用條芩香附之類
○胎漏謂有胎而血漏下也屬氣虛有熱用四物湯加阿膠珠白木條芩縮砂炒香附加糯米白水煎服

○又方治胎漏下血
條芩五錢 白朮一兩 砂仁炒 阿膠炒成珠
右為細末每服二錢艾湯調服水煎服亦可

○又方
枳壳炒 黃芩 白朮
水煎食前溫服

○胎痛宜用當歸地黃湯
當歸一錢 熟地黃二錢

右細切水一盞半煎至一盞溫服
○心腹諸痛凡妊婦偶有所傷腹痛不安或從高墜下重物所壓觸動胎元痛不可忍及下血者甚效
砂仁不拘 和皮畧炒勿令十分焦黑去皮取仁為末熱酒調服不飲酒者米飲或艾湯鹽湯皆可調服

如竟胎中執其胎却安矣此方即驗大抵妊婦不可缺此常服安胎易產
○凡妊娠二三箇月忽心腹疼痛不安用
當歸三錢 阿膠炒 甘草炙各 葱白四根

右細切分作二服每服用水二盞煎至一小盞溫服
○凡妊婦四五箇月忽腹心疼痛

有妊之婦至水所以斷者畜之養胎擁之以為乳汁也或至血不特而來者名曰漏胎此由冲任脉虛則胞內泄不能制手太陽少阴之至血故也白朮條芩砂仁阿膠為末文湯調見下

下血不止胎上冲心四肢厥冷悶仆欲死阿膠蜜茹湯見下

益者四君子湯加黃芩阿膠黃芩門血虛者四物湯加白朮阿膠

膠之藥者附月不門或加味四物見下血

熱者經水必多內熱脉經四物湯加白朮黃芩黃連益母草至門下血如月信來者地黃乾姜散見下

又有妊婦月信不絕而胎不損蓋由婦人血盛氣衰其人必肥故既妊之後月信常來而胎不動也不藥自安切不可作漏胎治若作漏胎治則胎必墮有榮不為風

大棗十四枚炒 鹽一分炒

右為末取一撮許酒調服之即愈

○治妊娠心腹大痛氣欲絕者

川芎 茯苓 厚朴各一分

右細切作一服用水三升煎至一升分二服立飲効

○川芎散 治婦素有冷氣冲心如刀刺者

川芎 一升 吳茱萸 人參 各五 茯苓 桔梗 各四分

當歸 一升 製朴 五分 芍藥 七分 枳殼 甘草 各二分

右細切作一服水一盞半煎至一盞稍熱服

○妊娠腰痛如折不能轉側

鹿角 五升 右以火烧令赤酒淬再燒再淬以碎為度細末酒服

○治妊娠腰脚腫痛

白茯苓 白朮 乾姜 枳殼 各一分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○半夏茯苓湯 治惡阻不食吐逆頭眩四肢怠墮煩疼

惡痰自汗用 生姜 一錢 茯苓 七分 熟地黄 陳皮

桔梗 覆花不用 人參 芍藥

并草 川芎各五分 半夏湯炮七次清過宿姜汁拌炒黃色一錢

右細切水煎空心服○千金方有紫蘇細辛各五分

婦孕兩月嘔吐頭眩暈以參朮川芎陳皮茯苓服之

愈重脉弦左為甚此惡阻病必怒氣所激問之果然

肝氣既道又夾胎氣參朮之補大非所宜以茯苓湯

下抑青丸二十四粒五服稍安脉畧數口苦乾食即

口酸意其隔間滯氣未盡行以川芎陳皮桂子生姜

合前門

所勝則至血喜來則
所來者非養胎之血
宜以一藥治風經信
可止寄生散加葱白
防風見下或不眠茶
胎亦无恙若因房室
不節或驚動而血來
者須作漏胎治之此
又不可不審也

胎動

妊婦胎動不安蓋由
衝任至虛以致胞門
子也固并有飲酒
過度有所損動

或喜怒不常氣守不
舒傷於心肝能動血
脈或因登高上廁風
攻陰戶入於子宮如
此皆令胎不安也已
有所見者考婦湯加
阿膠斷文見下無所
見者安胎飲見下發
熱本方加柴胡一錢
氣脹胸脇滿加大腹
皮三分元氣虛者加
人參白朮內原有熱
繼而受孕以致內火
胎氣不安丹溪安胎
丸見下氣血虛而不

茯苓煎湯下抑青丸十五粒而愈但口酸易飢此肝
熱未平以熱湯下抑青丸愈後兩手脈平和而右甚
弱其胎必墮此時肝氣既平可用參朮以防之服一
日而胎自安

○參橘散

治妊娠三月內惡阻吐逆不食或心虛煩悶

橘紅

茯苓

麥門冬

白朮

厚朴 姜製

甘草 各五分

右細切作一服加生姜三片竹茹一錢或加人參一

錢水一盞煎七分溫服

○小膠艾湯

治妊婦因頓仆挫跌胎動不安或胎捨上

逼心或腹痛血下

阿膠 一兩 成珠

艾葉 二兩

指迷方加秦芫 一兩

右細末用水三升煎至一升半分三服

○膠艾湯

不問月數淺深安胎極妙

熟地黃

艾葉

當歸

甘草 炙

川芎

阿膠 各五錢

黃芪 二分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○治妊娠下血不止胎上冲心四肢厥冷悶仆欲死

阿膠 炒

艾葉 各一兩

竹茹 如拳

白砂密 二合

右用水二升煎至一升入密更煎一二沸分二服

○治妊娠下血如月信來者若致胞乾非特損子亦能

損母

熟地黃

乾姜 炮各一兩

右為細末每服三錢一日夜三四服

○治胎孕無故下血腹痛不可忍或下黃汁如漆如水

如豆汁者

能養胎氣不安者
入珍湯加紫蘇梗七
分砂仁五分虛損門
氣滯不順胎不安者
紫蘇飲加砂仁枳殼
木香香附以行其氣
見下又有因母病而
動者但療母疾其胎
自安若胎不堅固自
動致母有疾唯當安
胎母疾自愈若胎動
終不能安者則可下
之免累妊婦也

胎冷

婦人懷孕不受禁忌
縱恣口腹過食生冷
瓜桃梨果及當風取
涼以致胎冷不安肚
腹脹或痛腸吐虛鳴
胎孕冷伏四肢拘急
便泄欲死安胎和氣
飲見下

胎熱

妊娠將及臨月兩眼
失明不見灯火頭痛
眩暈腮頰腫痛不能
轉項此肝至熱毒上
攻蓋是姜椒熱酒腥

野苧根炒

金根各一兩

右用水酒各一盞煎至一盞去粗分作二服不拘時

○胎動冲心煩悶欲死安胎止痛

當歸酒浸

川芎

人參

阿膠

甘草各一兩

葱白切一升

右用水七升煎至三升分三服

○妊娠因舉重仆跌損傷胎氣不安或子死腹中

川芎一兩

右為細末每服一匙連進三服死胎即下

○治妊娠遺尿失禁

白薇

白芍藥各半

右為細末酒調方寸七日三服

○子煩妊娠苦煩悶不安又曰心煩熱悶謂之子煩

麥門冬

茯苓

防風

知母

右細切作一服用水二盞煎至一盞入竹瀝一二服

○犀角散 治子煩

犀角屑

地骨皮

條芩

麥門冬

赤茯苓各一 甘草五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞入竹瀝一合服

○當歸飲 治子煩

當歸半

川芎

阿膠珠

豆豉

桑寄生各七 葱白七

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○竹瀝湯 治子煩

竹瀝一合

麥門冬

黃芩

防風各

白茯苓

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗入竹瀝再

多燭熱積於中也消
風散或天門冬飲並
見下四物湯加荆芥
防風黃芩黃連月全

兒暈

婦人妊娠七八月以
未忽然卒倒短仆不
知人事頃刻即甦者
名曰兒暈為根湯見
下或來甦散小產門
若氣血兩虛因而卒
倒者八珍湯加黃芪
鹿角膠或時心補

亂恍惚等量謂血去
養胎心肝之血神魂
不寧故耳寧神養榮
湯補遺宜戒欲恬靜
補益可也
補遺宜神養榮湯
當歸身 人參
麥門冬 天心
遠志去梗甘草湯
拌炒各一子半
白茯苓 去心
懷生地黃 酒洗
白芍藥 各一子
條黃芩 酒炒
白木 各八分

煎數沸溫服

○產室澤瀉方

治妊娠氣壅身軀腹脇浮腫喘急促小
便閉澀不利謂之子滿

澤瀉

桑白皮

枳殼麩炒

檳榔

木通

赤茯苓各等分

右細切每服四錢加生姜五片水一盞煎八分溫服

金

○張仲景曰婦人本肌肉肥盛頭暈目滿今反羸瘦頭

暈中隆胞系子戾亦多致此病但利小便即愈宜服

腎氣丸蓋藥中有茯苓故也地黃為君功在補胞

良

○水通散

治妊娠身軀浮腫四肢脹急小便不利謂
之子腫

木通

香薷各一

柯子皮

木香各三分

枳殼炒

檳榔各五分

桑白皮

一條五分

紫蘇葉一錢

右細切作一服加生姜三片水一盞煎八分溫服

○全生白木散

治妊婦面目虛浮肢軀腫脹名曰子腫

白木 一兩

生姜皮

大腹皮

陳皮

茯苓各五子 指迷方用茯苓皮多桑白皮無木

右為細末每服二錢米飲調下

產

○鯉魚湯

治妊娠腹脹滿或通身浮腫小便不利或
胎死腹中此方甚驗

當歸

白芍各一子

白茯苓一子

白木二子

橘紅五分

鯉魚一尾不

右細切作一服將鯉魚去鱗腸白水者熟去魚用汁

一盞半生姜七片煎至一盞空心服當見胎水下如

水去未及或胎死腹中脹悶未除再合一劑服之水

尺脹除為度

右圓眼肉五枚水
一鍾煎至七分食
遠溫服

傷胎

婦人因填什腰腹疼
或勞動不安或高下
閃動誤謂其胎以致
胎上捨心去血腹痛
呵膠受湯或小膠受
湯並見下或吳梅坡
安胎飲補遺妊娠自
高墜下或為重物所
壓傷動胎氣腹痛下
血身重區宿少月二

○紫蘇飲 治胎氣不和湊上心腹脹滿疼痛謂之子懸

大腹皮

川芎

白芍

陳皮

紫蘇葉

當歸 各六分

人參

甘草 各三分

右細切作一服如生姜三片葱五莖水煎服

○天仙藤散 治妊娠三月成胎之後兩足自脚面漸腫

至膝行步艰难喘悶妨食若水腫甚至足指間有黃

水出者謂之子氣

香附子

陳皮

甘草

烏藥

水香

天仙藤

洗淨燥炒即青木
香藤也各等分

右細切每服三錢加生姜三片紫蘇五葉水煎日三

服腫消止藥

○安胎散 治妊娠小便澁少遂成淋瀝謂之子淋

燈心草

甘草

人參

川芎

右為細末每服二錢煎麥門冬湯調下○此方恐滑

石大重而滑胎若胎信月可用若六七箇月已前俱

不可輕用宜去此味或加枝子扁蓄石榆之類最穩

瞿麥亦能損胎不可用也

○地膚子湯 治子淋小便澁數

車前子

知母

黃芩

赤茯苓

枳殼

白芍

升麻

通草

甘草

地膚草 與芥菜相似俗
各地皆有一子

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○又方 治子淋

地膚草

右以水四升煮取二升分三服或新取

地膚草搗取自然汁服亦可不獨治子淋凡小便淋

黃芩 酒少一子半
白芍 各二分

其胎或房室損動

或高下閃動誤觸

治孕婦勞動不安

補遺秘授安胎飲

赤出者母死子活也
俱死面青舌赤口中
青兩邊赤出者子母
俱死面青舌赤口中
赤出者母死子活也

白芍藥 歸身

懷山藥 知母

砂仁研 人參

杜仲 荆芥

阿膠珠 蘇梗七分

右艾葉七片水一

鍾煎八分不拘時

服○如下身發腫

名曰胎氣加水瓜

七分使活意以仁

蒼木各一子○如

前經小產過者宜

預服此散內加黃

芪錢酒炒黃芩

五分

中風

妊娠中風頭項強直

筋牽語澀痰涎壅盛

人事不省者名白子

癰癘羊角散或防已

湯並見下中風筋牽

強直不省人事昏悶

口牽者寧輕古拜散

主之即煎芥穗一味

焙燥末之豆淋湯調

傷寒

閉服之無不效驗

久葵子散 治子淋小腹疼痛胎動不安

赤芍藥 柴胡去芦 桑白皮 赤茯苓

右細切每服四錢水一盞半加生姜三片葱白七寸

煎至一盞去粗溫服

外○車前散 治子淋或小便不通下焦有熱

換柳 木通 陳皮去白 赤茯苓 赤芍

車前子 當歸 滑石 石菖 炙去毛

右各等分每服伍錢水一盞半煎至一盞溫服

聖○忘憂散 治妊娠心經蘊熱小便赤澀不利淋瀝痛

琥珀不拘 萱草根一握

右二味共研為細末每服五分濃煎

附○大腹皮散 妊娠若小便赤澀不通

枳殼炒 大腹皮 甘草炙各 赤茯苓半

末之每服三錢葱白煎湯食遠調服

附○冬葵子湯 妊娠小便不利身重惡寒起則頭眩

冬葵子 牛兩 茯苓二兩

末之每服三錢米湯食遠服下

方局○葛根湯 治妊娠臨月忽發風痙悶亂不省人事吐

逆睡少時醒後復發謂之子癰

具母 葛根 牡丹皮 防已 防風

當歸 川芎 桂心 茯苓 澤瀉各五

甘草半 獨活 石膏 人參各一

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服日三服其貝

母令人易產未臨月者以升麻代之忌菘菜

妊娠外傷寒和頭痛

身熱无汗輕則芍藥散見下重則十神湯

汗之汗后熱不解者

黃龍湯即小柴胡湯

去半夏若胸滿嘔逆

口苦或寒熱來往本

方加枳壳枳實發熱

无汗不得汗本方加

家葛煇湯再加天花

粉胸滿加枳實黃連

如自汗身熱煩渴唇

焦舌燥識人參白虎

湯並湯寒門大熱煩

渴語呻吟乾匾黃

其不退胎動不安者

單胎散附餘如五六

日不解大便不通不

惡寒反熱或日晡

潮熱此寒者大柴

○防已湯 治妊娠中風口噤四肢強直角弓反張

防已 五錢 羌活 一錢

右為細末別用黑豆一合炒焦黑投好酒中沸定去

豆調藥末擗開口灌之稍醒再灌有効

○消風散 治妊娠頭眩日眩視物不見顛煩腫核

石膏 煨 羌活 甘草 防風 去芦 荆芥穗

羚羊角 川芎 大豆黃卷 炒

當歸 酒 白芷 各五 甘草 二分

右為細末作一服加芽茶伍分水一盞半煎至一盞

食後溫服

○天門冬飲 治妊娠外感風寒久嗽不已謂之子嗽

天門冬 一錢 紫苑茸 一錢 知母 去毛酒 錢 桑白皮 密炙

五味子 桔梗 去芦各

右細切作一服水一盞半煎至一盞嘔血者加阿膠

五分大便澀者加苦亭歷伍分

○百合散 治妊娠咳嗽心煩不欲飲食

百合 紫苑茸 麥門冬 桔梗 去芦

桑白皮 竹茹 各一 甘草 五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞入密半匙再煎

二三沸去粗溫服

○丹溪參朮飲 治妊娠轉胞

四物湯加 人參 白朮

陳皮 甘草 半夏 湯炮

右為細末加生姜水煎服

○丹溪曰轉胞之証胎婦之稟受弱者憂悶多者性急燥

者食味厚者庸或有之古方皆用滑利藥鮮有應効

胎活人方三個見下

傷寒發汗升麻六物湯見下

傷風

妊娠傷風頭痛鼻塞
聲重咳嗽甚至發熱
者參蘇飲去半夏取
微汗傷寒門如肺火
旺盛風熱不清滯熱
於肺亦有頭痛身熱
鼻息聲重咳嗽音啞
流涕之候雙解散去
硝黃石膏傷寒門

傷食

妊娠傷飲食胸滿助
痛右手寸口脈弦盛
枳木湯加山查神效
麥芽黃連厚朴內傷
門如傷冷物而胸膈
劣悶欲吐脉遲本方
加砂仁木香丁香嘔
吐如生姜

傷暑

妊娠正當炎暑忽冒
暑氣煩渴悶亂不安
香薷飲加黃連白朮
人參或十味香薷飲
並中暑同渴甚熱極

因思胞不自轉為胎所壓轉在一邊胞系子矣不通
耳胎若牽起居於其中胞系自踈水道自利夫胎之
墜下必有其由吳宅危人患此两手脉似瀉重按似
弦左稍和予曰此得之憂患瀉為血少氣多則胎氣
弱而不能牽弦為有飲血少則胎弱氣多有飲中焦
不清而隘則胞知所避而就下乃以已上藥與服隨
以指探喉中吐出藥汁侯少頃氣定又與之次早亦
然至八貼安循恐此法偶中後又治數人亦効
○安胎散 治妊娠胎寒腹痛胎熱多驚卒動腰痛腹滿
胞急卒有所下或因頓仆閃肭或食毒物或感冒時
疾寒熱往來致傷胎藏並皆治之
川芎 枳壳各錢半熟地黄三錢糯米一合
右細切作一服水一盞半生姜三片大棗一枚更加

金銀三五錢同煎至一盞溫服

○如聖散 治妊娠腹痛胎動不安

鯉魚皮 當歸 熟地黄 阿膠珠

白芍 川芎 川續斷酒浸碎各分

右細切每服四錢水一盞半生姜三片苧麻根伍分

許煎至一盞溫服○一方加乾姜竹茹無續斷

○加味四物湯 治妊娠下血不止

本方加艾葉 十片 阿膠珠 一錢

右細切每服四錢水一盞半加烏梅肉少許同煎至

一盞熟服連進三四服即止

○苧根湯 止血安胎

野苧一兩

用酒水各一盞入金同煎至一盞溫服

者加麥門冬五味子
石膏黃芩白朮知母
天花粉

咳嗽

妊娠咳嗽因外感風
寒者參蘇飲去半夏
加桑白皮杏仁傷寒
門或天門冬飲或百
合散並見下火乘肺
金而咳嗽者二陳湯
加黃芩黃連枳殼桔
梗貝母去半夏有痰
加瓜蒌前胡桑白皮
痰飲門痰嗽見紅產

○桑寄生散 治妊娠下血不止胎動不安

桑寄生 川歸 川續斷 川芎 香附子

阿膠炒 茯神 白朮 人參 甘草各五

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞

○羚羊角散 治妊娠中風頭項強直筋脈掣急言語

寒澁痰涎壅盛或時發搐不省人事謂之子癇

羚羊角 獨活 酸棗仁炒 五加皮各八

薏苡仁 防風 當歸 川芎

茯神 杏仁各四 木香 甘草各二

右細切作一服加生姜三片水煎服

○歸涼節命散 治妊娠面赤口苦舌乾心煩腹脹疴

川芎 苧根 白芍 麥門冬 川歸

白朮 糯米 荆芥穗 甘草各五

右細切作一服水一盞半煎至一盞入

○香蓮化滯湯 積滯不行裏急後重頻上圓而去少

青皮 陳皮 厚朴炒 枳實炒

黃芩 黃連 當歸 芍藥各一

滑石分錢一 枳榔 八分 木香 五分 甘草 四分

水煎溫服

○白扁豆散 治妊娠悞服草藥及諸般毒藥毒物

白扁豆 生去皮

右為細末清米飲調方寸神效

○芎藭補中湯 養新血去瘀血補虛扶危

阿膠珠 五味子 乾姜各四 黃芪 蜜炙

川歸酒浸 白朮 川芎 赤芍各七

人參 杜仲炙 甘草各三

癰疾

妊娠癰名曰子癰
加味柴苓湯去半夏
截用四相湯癰疾門
熱多寒少者清脾飲
去半夏癰疾門寒多
熱少者人參養胃湯
去半夏傷寒門虛者
四獸飲或勝金丹截
之並癰疾門

泄瀉

妊娠泄瀉不渴小便

清白者三白散加砂仁厚朴蒼朮甘草附餘若世瀉腸垢小便赤澀煩渴內執者黃芩芍藥湯加白朮木通茯苓痢疾門腹痛加芍藥炒砂仁炒黃連

痢疾

妊娠痢疾初起腹中痛後重裏急者香連化滯湯兩餘或當歸芍藥湯見下執甚下白蒼朮裏急黃芩芍藥湯兩非門日久不止元氣漸虛者胃風湯中風門或香連丸痢疾門或芍木香連丸見下

心痛

妊娠心痛是胃脘痛有客熱客寒者客寒犯胃而痛者火龍湯補遺或草薏苡丸胃脘門客熱犯胃而痛者二陳湯加炒山梔香附白朮黃芩蒼朮去半夏痰飲門素有

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服後有一方名同多木香治小產

○當歸芍藥湯 治妊娠下痢赤白腹中疝痛

白芍一錢 當歸 白茯苓 澤瀉 白朮

條芩各五 甘草 黃連 木香 檳榔各三

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服如白痢腹痛甚者恐有寒也去苓連加乾姜三分

○芍木香連丸 治証同前

阿膠珠 白朮各半 乳香 木香各二 枳殼 麩炒

乾姜二錢 砂仁 炒 川芎 各半 黃連 一兩 莖 同炒

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十九丸白湯

○安胎和氣飲 治妊娠泄瀉兩脇虛鳴臍下冷痛由食

瓜菓生冷等物及當風取涼所致者

瓜菓生 陳皮 良姜

木香 白芍 酒炒 甘草 各五分 肉苳蔻 各五分

右細切加生姜五片水一盞半煎至一盞溫服

○三白散

白芍藥 炒 白朮 各三錢 白茯苓 去皮 二

作一貼水煎食遠溫服

○芍蘇散 治妊娠外感風寒渾身壯熱頭目眩運

紫蘇葉 川芎 白芍

麥門冬 陳皮 乾葛 各六分 甘草 三分

右細切作一服加生姜五片葱白三寸水一盞半煎

至一盞服不拘時候

○升麻六物湯 治妊娠六七箇月傷寒壯熱或發赤

升麻 二錢 枝子 杏仁 小草 甘草 各一

方良

去半夏 痰飲門 素有

冷氣冲心如刀刺者

川芎散見下

補遺火龍湯 治妊

娠心痛

艾葉二升半 鹽炒

小茴香炒 川練肉

炒各二升半

水煎空心服

腹痛

妊娠腹痛須辨其寒

熱虛實寒者理中湯

加砂仁香附傷寒門

熱者黃芩芍藥湯加

白木桂枝痢疾門虛

有四君子湯加芍藥

炒當歸月經門買者

香殼湯補遺大便不

通加厚朴芍藥黃芩

補遺香殼湯 治妊

娠氣實腹痛

香附去毛五錢

枳殼炒四錢

末之每服二錢空

心白湯服下

腰痛

妊娠腰痛最為緊要

蓋女人胞繫於腰故

腰痛酸急者必欲產

右細切作一服加葱白三寸水一盞半煎至一盞服

○妊娠傷寒百節疼痛壯熱不急治即落胎

柴胡

乾葛

知母

石膏各六錢

大青八錢

梔子一兩

升麻八錢

葱白十四

右細切用水七盞煎至三盞分分四服

○傷寒安胎

白木

黃芩各等分新

右細切每服三錢加生姜三片水煎服

○治妊娠傷寒

柴胡一錢

前胡

當歸各七

人參四分

芍藥

生地黃各六

甘草三分

右細切作一服加生姜三片葱白三莖水一盞半煎

至一盞去粗品服

○單胎散

妊娠傷寒大熱悶亂

蛤粉五錢

嫩捲荷葉一兩

末之每服三錢蜜少許溫水調下

○催生散

治妊娠傷寒熱病胎死腹中身冷唇青不

能自出

蒼朮一錢

桔梗五分

橘紅三分

白芷

桂心去皮

甘草各一分

當歸酒浸

乾姜炒

厚朴

芍藥

半夏泡

川芎

枳殼

炒各二分

南木香

杏仁炒各

右細切作一服水一盞半生姜三片大棗一枚煎至

一盞溫服末下再進一服

○紫苑麥門冬湯

紫苑茸

麥門冬各一錢

白皮

杏仁炒去

也若坐悶氣不行腰
痛者通氣散補遺腰
痛如折不能轉側產
室鹿角散見下

補遺通氣散 治妊
娠腰痛
補骨脂瓦上炒
木之爵胡桃肉一
箇空心温酒調下
二錢

怔忡

妊娠怔忡脉乱驚悸
不安夜臥不寧恍惚
驚悸門

餘血少神虚心不寧
者益榮湯火盛安神
丸並驚悸門虛而心
不寧怔忡者是志丸
驚悸門

二便不通

妊娠大小便不通者
乃臟腑積熱所致也
大腹皮散附餘或四
物湯加枳實厚朴黃
芩月經門若小水不
通者胞中有熱故也
冬葵子湯附餘

炙甘草各二分 桔梗二分

右細切加生姜三片竹茹一塊彈子大用水一盞半
煎至一盞去粗入白密一蛤殼許再煎數沸温服

○妊娠痰嗽見紅

歸身 熟地黄 天門冬 麥門冬

紫苑各五分 桑白皮密炙 杏仁 炙甘草

桔梗 片黃芩 五味子 阿膠炒成珠

○人參散 治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參去芦 厚朴姜製 橘紅各一分 當歸炒

乾姜炮 甘草各半

每服四錢水一盞東三枚煎至六分無時温服

○木瓜散 治妊娠霍亂吐瀉轉筋入腹則悶絕

吳茱萸湯洗七次 生姜一分 木瓜一分

一方有茴香一分甘草一分

右細剉水一盞煎一盞二分去滓分三服無時熱服

○大棗湯 治妊娠無故悲傷淚下不止如有幽憑比

臟燥悲傷欲哭象如神灵歎欠者皆主之

甘草三兩 小麥一升 大棗十枚

右咬咀以水六升煮取三升去滓分温三服

○補遺淡竹茹湯 治妊娠心虛驚悸臟燥悲傷正

又治虛煩甚効

麥門冬去心 小麥 半夏湯泡各 人參

白茯苓各七分 甘草二分

右姜五片棗二枚淡竹茹一塊如指大同煎温服

大醫院補遺真傳醫學源流肯齋大成十三卷終

小產指南

通用

妊娠胎氣不固時常
小產宜固胎元安榮
湯見下小產後去瘀
血養新血補虛扶危
考窮補中湯胎前門
小產後下血不止錄
驗方見下小產心腹
疼痛錄驗方見下

一月

妊娠一月陰陽新合

大醫完補遺書傳醫學源流月曆大成卷之十四

婦人科

小產

論

夫陽施陰化故得有胎榮衛調和則經養周足故胎得
安則能成長若氣血虛損者子臟為風寒所苦則血氣
不足故不能養所以數墮胎也醫者宜診察脈候可安
則安不能安者則下之不可執一以傷妊婦也

脈法見胎前下

方法

補胎方

治漏胎

地細辛一兩

防風二兩

烏梅一升

吳茱萸五合

乾地黄

白朮一兩

大麥五合

生姜四兩

為胎寒多為痛熱多
卒驚卒重腰痛腹內
胞急卒有所下當預
安之宜服烏雄雞湯
補遺者曾傷一月胎
者當預服補胎方附
餘

補遺烏雄雞湯

烏雄雞壹隻

吳茱萸一升

白茯苓去皮

阿膠珠各二兩

麥門冬五合去心

生薑 甘草各

一兩 人參

白芍藥 白朮各

三兩

右拾味細切以水

一斗二升煮雞取

汁六升去雞下藥

煮取三升內酒三

升并膠烱盡取三

升去渣溫服壹升

日三服

二月

妊娠二月始陰陽踞
經有寒多壞不成有
熱即養平中風寒有
所動搖心滿臍下懸

右水七升煮取貳升半去滓分溫三服若寒多者倍
細辛茱萸熟多渴者去細辛茱萸加括萎根二兩若
有所思去大麥加栝子仁三合一方有人參一兩

黃連湯

治傷胎胎者

黃連

生薑三兩

當歸半兩

人參略一

吳茱萸五

生地黄

右切以醋漿七升者取三升肆服日三夜一每十日
一作若煩竟不安加烏梅一升不用漿直用水耳

扶神湯

治傷

扶神

丹參

龍腦略二阿膠

當歸

甘草炙

人參略二

大棗十枚擘赤小豆二粒

又醋漿一斗者取三升分四服七日後服一劑腰痛
者加桑寄生二兩師方有雄白二兩麻子一升

調中湯

治傷四月胎者

芍藥四兩

甘草炙

芎藭

續斷各一兩

柴胡

白朮略三

烏梅一升

生李根白皮

當歸半兩

生薑四兩

厚朴炙

枳實各二兩

右細切以水一斗煮取三升分四服日三夜一搗日
服一劑一方有半夏二兩

安中湯

治傷胎胎者

甘草炙

芍藥略三

當歸

人參

乾地黄

芎藭略二

五味子

五合生薑六兩

麥門冬一升去心大麻仁五合大棗二十枚製黃芩一兩

右細切水七升清酒五升者取三升半分四服日三

夜一七日再服一劑忌如前

安胎當歸湯

瘠妊五月卒動驚愕胎動不安下在

急腰背強痲痺有所
下作寒乍熱熱艾湯
主之補遺若骨傷三
月胎者當預服重連
湯附餘

丹參 三兩 當歸

艾葉 洗炒 人參

阿膠 蛤粉 炒成珠

麻黃 去節 各二兩

甘草 炙 一兩

大棗 十二枚

生姜 六兩

右九味細切酒三

升水一斗內藥煮

狗半去滓內膠煎取

三月

妊娠三月為定形有

寒大便青有熱小便

難不赤即黃疸驚恐

憂愁煩悲喜煩仆動

於經脈腹滿繞臍苦

痛腰背痲卒有所下

雄雞湯 補遺 若骨傷

三月胎者當預服艾

補遺雄雞湯

雄雞 一隻 甘草 炙

小腹痲引腰胎小便疼下血

當歸

棗 十二枚

艾 一虎

右細切酒水各三升合煮至三升半去滓內膠令烊

分三服腹中當安小便緩也古今錄驗救急同一方

有甘草無姜棗

柴胡湯

柴胡 四兩

麥門冬 四兩 洗心

生姜 六兩

右水一斗者取三升分四服日三夜一中間進糜粥

勿食生冷及堅強之物七日更服一劑

旋覆花湯

旋覆花 及厚朴

茯苓 各三

右細切以水一升煮取二升半先食分五服日三

杏仁湯

甘草 炙

五味子

右細切以水八升煮取三升半分四服日三夜一中

間進食七日服一劑

附 葵子湯

甘草 炙

芍藥 各二

右細切水九升煮取三升分三服日二夜一

附 猪腎湯

治傷胎胎者

治傷胎胎者

阿膠

芍藥 一虎

白朮

甘草 炙

乾地黃 五兩

茯苓 人參

阿膠珠 各二兩

黃芩 生薑

白朮 各一兩

白芍藥 四兩

麥門冬 去心 五合

右細切水一斗五

升煮雞臍半內漿

煮取一半入清酒

三升并膠再煎取

三升分三服一日

及之當溫臥

胃

妊娠四月始受水精

以成血脈有寒心下

溫上欲嘔胸膈滿不

飲食有熱小便難數

數如淋肚臍不苦急

卒中風寒頸項強痛

寒熱或驚動身軀腰

背腹痛往來有時胎

上迫胸煩不得安卒

有所下菊花湯補遺

若曾傷四月胎者當

預服調中湯附餘

補遺菊花湯

菊花 甘草 炙

阿膠 蛤粉 炒成珠

半夏 湯泡 當歸

猪腎 一具

茯苓

乾地黄 酒洗

附子 中者一

右細切水一斗煮腎令熟去腎內諸葉煎取三升半

分四服日三夜十日更一劑

○小產後下血不止

人參

白芍

川芎

右各等分白朮煎服

○小產後心腹疼痛

當歸

玄胡索 七分

青皮 炒黑

○安榮湯 治胎氣不固時常小產宜預服此以固胎

四物湯加阿膠珠香附子白朮條芩砂仁糯米桑寄

生白朮煎服

○治兒在腹中叫

用多年空屋下鼠穴中土一合令妊婦噙之即止

一云臍帶上疣瘡乃兒口中含者因妊婦登高取物

脫落兒口以此作聲令妊婦曲腰向地拾物使兒復

得含入口中即止

○丹溪東胎丸 至七八箇月內服之

黃芩 炒夏一 忍秋

右為細末粥丸如梧子大每服三四十九白湯下

○達生散 治孕至八九箇月內服十數貼甚好易產

桑寄生

乾姜

雪白朮 四兩

附子 炮

大豈 三合

右細切水一斗煮腎令熟去腎內諸葉煎取三升半

分四服日三夜十日更一劑

○小產後下血不止

黃芪

艾葉

青皮

右各等分白朮煎服

○小產後心腹疼痛

川芎

玄胡索 七分

澤蘭

○安榮湯 治胎氣不固時常小產宜預服此以固胎

四物湯加阿膠珠香附子白朮條芩砂仁糯米桑寄

生白朮煎服

○治兒在腹中叫

用多年空屋下鼠穴中土一合令妊婦噙之即止

一云臍帶上疣瘡乃兒口中含者因妊婦登高取物

脫落兒口以此作聲令妊婦曲腰向地拾物使兒復

得含入口中即止

○丹溪東胎丸 至七八箇月內服之

黃芩 炒夏一 忍秋

右為細末粥丸如梧子大每服三四十九白湯下

○達生散 治孕至八九箇月內服十數貼甚好易產

麥門冬 去心

桑寄生

雪白朮 四兩

附子 炮

大豈 三合

右細切水一斗煮腎令熟去腎內諸葉煎取三升半

分四服日三夜十日更一劑

○小產後下血不止

黃芪

艾葉

青皮

右各等分白朮煎服

○小產後心腹疼痛

川芎

玄胡索 七分

澤蘭

○安榮湯 治胎氣不固時常小產宜預服此以固胎

四物湯加阿膠珠香附子白朮條芩砂仁糯米桑寄

生白朮煎服

○治兒在腹中叫

用多年空屋下鼠穴中土一合令妊婦噙之即止

一云臍帶上疣瘡乃兒口中含者因妊婦登高取物

脫落兒口以此作聲令妊婦曲腰向地拾物使兒復

得含入口中即止

○丹溪東胎丸 至七八箇月內服之

黃芩 炒夏一 忍秋

右為細末粥丸如梧子大每服三四十九白湯下

○達生散 治孕至八九箇月內服十數貼甚好易產

麻黃去節各二兩

麥門冬去心一升

人參一兩半

大棗十二枚劈

生姜五兩

右細剉以水八升

煮減一半內清酒

三升并阿膠煎取

三升分三服溫臥

當以粉撲之護

風寒四五日

五月

妊娠五月毛髮初生

有胎若頭眩心痛嘔

吐胸膈滿痛小便難

數卒有恐怖四肢疼

痛寒熱胎動无常如

腹悶煩欲仆卒有所

下阿膠湯補遺若曾

傷五月胎者當預服

安中湯或安胎當歸

湯並附餘

補遺阿膠湯

阿膠珠四兩

人參一兩 生姜三兩

旋覆花 當歸

芍藥 甘草炙

黃芩各二兩

麥門冬去心五合

腹少痛

白芍

白朮

當歸各一 甘草各二 人參

紫蘇連莖 陳皮各五 大腹皮原用三升恐太多今用

右細切作一服外入黃楊腦七箇食少胎瘦者不須用 葱五葉

夏加黃芩黃連五味子春加川芎防風秋加澤瀉冬

加砂仁或通加枳壳砂仁胎動不安加金銀三五錢

野苧麻根一錢氣上通心加紫蘇地黃性急加柴胡

多怒或加黃芩佐之食少加砂仁神麴渴加麥門冬

黃芩能食倍加黃楊腦胎不長 有痰加半夏黃芩

丹○胎月用以養胎方

當歸

川芎

黃芩

陳皮

白朮

香附各一

白芷三分

甘草二分

右細切水煎調益元散一錢服虛者加人參七分

丹○催生散

白芷炒焦

百草霜

白滑石

右為細末煎芎歸湯調下二三服

丹○紅苋菜及馬齒莧俱能隨胎妊婦四忌臨產用以催

生者食亦効

丹○難產多是氣血壅亦有氣血凝滯而不能轉運者亦

有因八九箇月內不能謹愍者

丹○難產多見於安逸爵悶之人富貴奉養之婦其貧賤

者禾之有也古方瘦胎飲本為湖陽公主設蓋以其

奉養厚而氣突故為此方以耗其氣使氣血和平而

易產也非至論也

仲○金匱當歸散 安胎養血清熱孕婦時常宜服

當歸

川芎

芍藥

白朮

條芩各半

吳茱萸七合

右細切以水九升

煮取一半內清酒

三升并膠微火煎

取三升分四服日

參夜一

育

妊娠六月卒有所動

不安寒熱往來腹內

脹滿身體腫痛怖忽

刺所下腹痛如欲產

手足煩疼麥門冬湯

補遺若曾傷六月胎

常須服此胡易或旋

覆心湯並附餘

麥門冬去心一升

生薑六兩甘草多

人參各一兩

乾地黄三兩

條黃芩二兩

阿膠蛤粉炒四兩

大棗十五枚擘

右八味細切以水

柒升煮減半內清

酒貳升并膠煎取

三升分三服每如

人行三四里中間

進糜粥

右為細末每服二錢溫酒或湯調下

○金液丸 治橫生倒產

飛生毛火燒樹下者尤佳血餘死病女人髮燒灰公母羊糞已上各五分

伏龍肝錢黑鉛半錢急攪成砂子傾出用研

右為細末用粽子尖為丸如菜豆大遇難產以順流

水下五丸兒身自順而正產子母俱活矣

○催生鉛丹 治橫生逆產

異鉛一各

右以小銚子火上鎔花投入水銀二錢急攪結成砂

子傾出用熟絹細作丸子如菜豆大臨時以香水送

下立產

○如神丹 治難產用巴豆三枚草麻子七枚合去研入

射香少許但依餅子粘齊

詩曰巴三草七脫衣袋 細搗如泥入餅香

捏作餅兒臍下貼 瀕臍子母便分張

○催生如聖散 用黃蜀葵子下拘多

右為細末每服二錢熱酒調下如不飲酒熱湯調亦

可或以蜀葵花焙乾熱酒調下一錢亦効

詩曰黃葵子炒百餘粒 研爛酒調濟君急

若還臨危難產時 免得全家俱哭泣

○神應散 治難產橫逆或破胞于腹此如魚得水决

自轉生

白芷 百草霜

等分末之童便米醋調下三二錢沸湯泡溫服畢

又用蜀葵子四十九粒滑石末二錢順流水煎湯調

下即生

七月

妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脉若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頭項腰背強葱白湯補

遺老魯傷七月胎者當預服杏仁湯附餘補遺葱白湯

葱白十四枚長三四寸 半夏炮

麥門去心各一兩 生姜八兩 甘草炙

當歸各三兩 阿膠蛤粉炒四兩

人參一兩半 條黃芩一兩

旋覆花一把 右細切以水八升

煮取半內清酒參升并膠煎取肆升

溫服壹升日六夜一溫以當汗出若

不出者加麻黃二兩煮服如前法若

秋後勿強責汗

八月

附餘 ○催生龍蛇散

大蛇蛇存性 蟬蛻存性 滑石 五斤 葵子炒 一升

末之每服一升順流水煎湯服

○香桂散 下死胎 射香五分 官桂三斤 為末

○來甦散 治孕婦欲產未產之時忽然暈悶不省人事 木香 神麴炒 陳皮去白 麥蘖炒

黃芪去毛 生薑切碎 阿膠珠 白芍各五

糯米一合 荜根一升 甘草三分 右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗擗開口灌下未醒再煎一服連接灌之即

青口中沃沫子母俱殞命在須臾若兩臉微紅母活急用此藥救之

蛇退一錢 千里馬路上左足草鞋 金銀箔各

髮灰一錢 黑鉛七分半炒成砂 蚕退紙燒灰

乳香五錢 另研 右共為細末以積猪心血和丸如梧子大每服二丸

倒流水送下如灌不下化開灌之修合此藥時勿令婦人孝子雞犬見

○無憂散 治分娩難產及胞衣不下等証 預服此藥口進二服則子易生而胞易落也

當歸酒洗 川芎 白芍各七 木香不見

甘草各五 枳壳炒黃 乳香各一 血餘灰四分

右細末分作二服水一盞煎至八分瀝去粗溫服不

妊娠八月中風寒有

所犯觸身軀盡痛乍

寒乍熱胎動不安常

著頭眩痛繞臍下寒

時時小便自如米汁

或青或黃或使寒慄

腰背苦冷痛而目視

茫茫為深湯補遺谷

曾傷八月胎者當預

服葵子湯附餘

補遺芍藥湯

白芍藥一兩

人參 當歸

甘草各二兩

厚朴炙二兩

瀝白切二升

生姜四兩

右細切以水五升

酒四升合煮取三

升分三服日二夜

九月

妊娠九月若卒下痢

腰痛急胎上衝腰

背痛不可轉側短氣

平夏湯補遺谷傷

九月胎者當預服猪

腎湯附餘

拘時侯

○催生奪命如神丹

牡丹皮

枳殼燒炒

阿膠珠

管衆各五分

右為細末煉蜜丸彈子大臨產細嚼一九東湯送下

○芎歸湯一名佛手散

露安行疼痛不已口禁欲絕用此藥探之若子死腹中惡

中立便逐下若腹痛隨止子母俱安又治臨產難生

胞衣不下及產後血暈不省人事狀如中風加煎煎

露不止腹中血刺疔痛血滯浮腫入心經語言顛倒

如見鬼神血風相搏身熱頭暈或以產非產一以治

前產後危急狼狽垂死時証並皆治之

當歸酒洗去

右細切分作四服每服一盞用水煎水將乾投酒一

盞半煎五七沸溫服如口禁拊開灌之如人行五里

許再灌盡此四服便省立產神驗

○奪命丹

為血所脹塞故不得下頂更冲上逼心即死急服

黑附子五錢 牡丹皮 一兩 乾漆二錢五分研細

右為細末用米醋一升大黃末一兩同煮成膏和前

藥末為丸如梧子大每服五七丸溫酒下

○黑龍丹

治難產及胞衣不下血迷血暈等証

當歸 五靈脂 川芎 良姜

生地黃已上各二錢細研入鷄子壳內 百草霜一兩

補遺辛夏湯

半夏泡 麥門冬
去心各五合

乾姜一兩 當歸

阿膠蛤粉炒成珠

吳茱萸各三兩

大棗十二枚擘

右細切以水九升

煮取三升去滓內

白蜜八合微火上

温分四服痢即上

求胎

狂風已滿十月五藏
俱備六腑亦過納天

瓊黃

乳香各二

琥珀

花蕊石各一

右件連前藥共為細末酒米糊為丸如彈子大如用

時將一二丸仍用火煨紅為末以童子小便合酒調

灌下垂死者灌三四丸即活其功不可盡述

○一方 治胞衣不下

川牛膝錢二 當歸半 木通三錢 滑石四錢 黃葵子半

右用水煎連進三四服立下

○枳壳散 妊娠八九箇月內胎氣壅滿常宜服之滑

胎易產安和子臟益血舒氣

枳壳五兩 粉甘草一 香附子

右為細末每服二錢空心沸湯熱服日進三服一方

加糯米炒同為末白湯熱服令兒易產初生胎氣微

黑百日後肥白此為古方之冠若妊婦情懷憂

不見火如此用之則陽不致強陰不致弱二氣調和

有益胎嗣

○自妊娠初得以至臨月藥石禁忌歌

歌曰 玃班水蛭及蚕虫 烏頭附子與天雄

野葛水銀并巴豆 牛膝薏苡連蜈蚣

三稜代赭羌花射 大戟蛇蛻黃雌雄

牙硝芒硝牡丹桂 槐花牽牛皂角同

半夏南星與通草 瞿麥乾姜蟹甲瓜

礞砂乾漆蕪莖仁 地胆茅根莫用好

○飲食禁忌

鷄肉合糯米食令子生寸白蟲○食犬肉令子無聲

○鮎鯉同鷄子食令子生疳蝕瘡○食兔子肉令子

地氣相...

節人神皆倍但俟時

而生宜服養胎方或

金匱當歸散並見下

胎肥大者宜東其胎

達生散或求胎丸並

見下奉承太過安逸

之人膏梁身肥胎又

不運必然難產須服

無憂散即瘦胎散見

下或吳梅坡達生散

補遺氣不運動積感

故見下

道梅坡達生散

治膏梁之婦或謹

守太嚴者恐閉絡
閉塞而眼之併胎
氣下身腫亦宜服
當歸身二錢
廣陳皮 川獨活
山查肉各一錢
枳殼 木通
大腹皮 蘇梗
桔梗各八分
生甘草三分
右水一鍾煎八分
食遠溫服

難產

有成形塊為兒枕子
欲生時枕破與敗血
裹其子故難產宜服
勝金丹或榆白皮散
並補遺若坐草努力
太早兒轉不速或胞
破水乾難產者滑胎
散補遺或紅驗秘方
或兔猶二骨散並見
下若橫逆及胞乾難
產神應散補遺二服
如魚得水決自轉生
或于或足先來用草
麻子七個去殼研如
泥分開產婦頭髮以

缺唇○食羊肝令子多厄難○食鯨肉令子項短縮
頭○鴨子與桑椹同食令子倒生心寒○鮮魚同田
雞食令子瘡痘○雀肉同豆醬食令子面生雀卵斑
點○食螃蠏橫生○食姜芽令子多指○食冰漿令
母絕產○食雀肉飲酒令子多淫無耻○食茨菰消
胎氣○食驢馬肉過月難產○豆醬合霍菜食隨胎
○食山羊肉令子多病○食鯁鱈無鱗魚難產○食
諸般菌生子驚風而夭○食雀腦令子患雀目○勿
妄服湯藥勿妄亂針灸勿過飲酒漿勿舉重登高陟
險心有火驚子必癩癩勿多睡臥須時時少步動和
血味勿勞力過傷使腎氣不足子必解頰腦破不合
○衣母太溫食母太飽若脾胃不和榮衛虛損子必

臨產須知

○一臨月不可洗頭以免橫生前產
○一懷娘十月已滿陰陽氣足忽然臍腹陣痛胎孕偏陷
腰間重腹鼓道挺近漿水淋下其兒遂生此乃正生
若當生自有其時如瓜熟蒂懸栗熟自落之類
○一凡臨產宜擇年高有識穩婆及純謹婦人三四人扶
持一應外來閑雜之人喪服穢濁之婦預宜杜絕勿
令觸犯胎氣致產不利產後客氣犯兒亦主傷害
○一凡臨產房中不得喧鬧宜緊閉門戶靜以待生
○一月歲滿足方資腹痛不可驚動太早早則舉家霍亂
卜筮問神巫覡之流稱說鬼神多方哄嚇媒利產婦
聞之恐怖犬恐則氣怯氣怯則上焦閉下焦脹氣乃
不行以致難產如犯此宜服紫蘇以寬其氣

草麻泥塗在頂心手足即時收上然後看生婆通順生下廢子母俱全或催生丹溫水服下即產兒手中握出藥丸為驗也補遺或催生龍蛇散附餘或金液丸或催生鉛丹或阿膠四味湯並見下或產不下及矮石人交骨不開等婦湯具下

補遺勝金丹

麝香一錢研

以乳鉢研細

右為未取秤鍾煨

紅以酒淬之調下

一大錢

補遺榆白皮散

治

妊婦難產服此滑

胎易生

榆白皮 洗淨

其早各二錢

葵子一錢

右細剉水一鍾煎

至七分溫服

遺遺催生丹

治婦

人生理不順或橫

○一凡臨月忽然腹痛或作或止或一日二日三日五日

胎水已來腹痛不止者名曰弄痛非當產也又有一

月前忽然腹痛如欲便產却又不產者名曰試月非

當產也不問胎水來與不來俱不妨事但當寬心候

時若果當產時腰腹痛及不已穀道挺進眼中火出

其暈便產豈有或痛不痛欲產不產之候耶人多於

此胡行亂做枉了性命可不慎欵

○一凡初覺腹痛而腰不甚痛者未產也且扶行熟忍若

行不得則凭物而立行得又行

○一世人不知但見腹痛繞作便謂生產生婆踈狂者不

候時至便言試水試水併胞漿先破風入產戶以致

腫脹門戶狹小乾澁難產

○一將產之時產母其痛不肯行申行動因先由腰底

胎元輒動到生門已破通則又難

無力決至難產

○一腹覺不痛且當任意坐卧勉強飲食母致臨產乏力

○一凡產母初覺欲生便須惜力調養不可妄亂用力兒

身方轉便使用力一遍令兒錯路以致橫逆須待臨

到產門用力一遍兒即下生此所當用力也譬如登

廁時候未至用力何益

○一凡產母如覺心中憤悶可取白蜜一匙溫水調服

○一產母如覺飢餓可進以軟白粥不令飢渴以致乏力

亦不可食硬飯糗粽恐產後有傷食之病

○一未產之先或煩渴欲飲水只可與清米湯飲之為佳

○一凡產不可服催生符水况血得寒即疑血一疑則胎

滯而反致難產夫催生符蓋是野道士求食媒利

或逆產育艱難者

兔腦髓研如泥

滴乳香五分

麝香五分另研

母丁香二錢半

末之以兔腦和丸

如交實大陰乾油

希裏威母一丸温

水下即產兒手中

握出此丹為驗

催生

夫催生者言婦人欲

產漿破血下臍腹作

重數逆逆已見是

正產之候但兒却未

生即可服藥以催之

忽有經及數日產母

困苦已分明見得是

正產之候但兒子難

生亦可服藥以助催

母之正氣令兒速得

離胎催生如意散補

遺或如神丹或催生

如聖散或催生奪命

如神丹並見下岩坐

草時胞水來切勿可

用收生婆動手只服

芩歸湯見下服後若

之設有何益哉

○一凡產婦胞漿未下但當穩守無妨胞漿既破一飯時候不生便當服催生藥要緊夫胞漿者本胞內養兒之水也兒既折胞其水既下胎隨水而下則為易生胎元無力轉頭遲慢漿水即血來閉塞道路令子無路可通故難產也如用蜀葵子等破血之藥逐去惡血兒得路而生故曰催生藥也

○一凡催生多用滑利迅速之藥如

兔腦

筆頭灰

弩牙

蛇退之類是也

○一凡催生若見水血先下子道乾澀不能下者如

猪脂

葵子

牛乳

榆白皮

葱白

油

蜜

酒

滑石之類是也

○一凡催生若言言事勞力之入風冷寒虛人於此

血氣滯而難產者如

牛膝

葱

桂

五積散 順元散之類

是也

○一凡催生有觸犯惡氣心煩燥悶難產者如

射香

硃砂

乳香

青竹茹之類是也

○夫產育之難者皆由產婦不曾預聞講說生育道理臨事倉惶用力失宜遂有難產之厄是故有逆產者則先露足有橫生者則先露手坐生者則先露臀此皆用力太早之過夫當臍腹痛之初兒身繞轉而未順用力一遍遂致橫逆若手足先露者用細針刺兒手足必一二分深三四刺之以塩塗其上輕輕送入兒得痛驚轉一縮即順生之矣或兒脚先下者謂之蹈蓮花生急以塩塗兒脚底又可急搔之併以塩摩

安靜也且少飲不必

慌張縱有脆口外之

清汁下也無妨果真

正兒將來身近牝戶

痛極水又來多本方

加桃仁泥二錢小茴

香一錢冬月加桂一

錢臨服加重便一盞

酒一盞如見兒在門

數日不能產下必其

人受勞苦而氣血虛

矣方內加入參二錢

如服煎湯兒又不下

宜服催生丸補遺

單麻子研如泥全產

婦脚心即下

補遺如意散 治妊

娠臨產腰痛方可

服之

黃陳參 去芦

乳香 各一錢

辰砂 五分

右用鷄子清一個

調藥再用生姜湯

調下

補遺催生丸

肉桂末 大黃末

桃仁肉 各一錢上

三味同研細

當門麝 三分

母腹上則正生矣

○灸法治難產及胞衣不下急於產母右臍小指尖頭上

灸三壯炷如小麥大立產

○几橫倒難產用蛇蛻一條全者蚕退紙一方右以二物

入新甕甕中塩泥固濟燒存性為末煎榆白皮湯入

乳香同調服下則順生

○阿膠四味湯 治橫生先露手足

阿膠炒 滑石 一兩 冬葵子 一合 酥油 一兩

每服四錢水一大盞煎至七分連進二三服

○伏龍肝飲 治橫逆不順子死腹中用

伏龍肝土也 紅

右為細末温酒調下一二錢其兒頭戴上而出甚驗

○疑產

凡兒身以順門戶俱正兒已露頂而不能生

身回轉肚帶攀住兒肩不能下也治凡急令產母仰

卧輕輕推兒向上徐徐引手以中指按兒肩下其臍

帶須候兒身為順產母用力一送兒即下生○又法

令穩婆款款分開臍帶外將紙然

○凡兒身向未順生路未正被產母用力一逼令兒偏生

或左腿或右腿或臀或左右額角雖兒身已逼產門

而不能下但云兒已露頂非頂也治法當令產母仰

卧看生人輕輕推兒近上以手正其頭用力一逼即

下若是頭之後骨偏住穀道兒則露額當令看生人

以綿衣灸令温暖裹手急於穀道外傍輕輕推兒頭

令正然后用力一送兒即下生

○治盤腸產法

當門麝 三分

水銀二錢上二味
入糯米粽同研化

水銀

右五味同再研爛

細為丸晒乾就用

芫歸湯送下○如

胞衣不能下者亦

極妙

死胎

夫產難子死腹中者

多因驚動太早或觸

犯禁忌致令產難穢

天先下產時未到微

露已盡而胎枯燥故

子死腹中其候產母

面赤舌青黑及腰上

冷者子已死矣或指

甲青舌青脹悶甚者

口中作屎臭先以平

胃散投朴硝半兩酒

與水各一鍾煎服胎

化血水下中濕門或

香桂散或霹靂奪命

丹或瞿麥飲或牛膝

丸或牡丹皮散或牛

尿方或雞子黃散並

見下熱病子死腹中

者產寶催生散見下

○有臨產則子陽先出甚可驚恐治法以盆盛溫水溫潤

其腸令產母仰卧且以言語安慰其心却用好米醋

半盞和新汲水七分攪勻忽嚙產母面或背則打頓

而收每一嚙令一縮三嚙三縮腸則盡收矣合用參

芪當歸等大劑補藥加升柴防風之類以升舉之未

有不妥者也○又法急以單麻子去壳研細貼產母

額頂上即收

○凡凍產蓋言三冬之月天氣寒冷產母經血得冷則凝

結而不散因至兒子不能生下此之一弊為害最深

然世人不知覺若冬月產婦下部不可脫去綿衣并

不坐卧寒冷之處常令產母背身向火令脐下腿膝

間常有暖氣貴其血得熱則流散使兒易生也

○凡熱產蓋言盛夏之月欲產之婦當更其品涼所不

可因熱恣意取涼又有傷也

多着人數切恐人多熱氣逼襲產母蓋產母氣虛人

氣若逼則其血沸溢而血得熱則上蒸能令產母發

熱頭扁面赤昏昏如醉乃至不知人事世有名血暈

者緣此而成也

○凡坐產蓋言見子之欲生當從高處牢繫一條手巾令

產母以手攀之輕輕屈足坐身令兒生下非令產母

臨生兒時坐着一物此名坐產若是產母兒將欲生

却令生着一物即抵着兒路不能生也

○瞿麥飲 治產難數日子死腹中不出母氣欲絕

瞿麥 六兩 通草 三兩 桂心 三兩 牛膝 四兩

榆白皮 四兩 一方無榆白皮有天花粉研大觔墮胎

右細切用水九升煎取三升去粗分三服頓飲即下

小產門下

或鹿角散補遺者橫

逆不順子死腹者伏

龍肝散見下

補遺鹿角散 治妊

娠因執病子死腹

中

鹿角 用鐵錘細

末一兩

右葱七莖豉一撮

水一鍾煎至七分

溫服

胞衣不下

夫兒出胞衣不下者

蓋為血入胞中上中

胸氣血服則不出

欲死者必用逐其無

酒煎紅花服或朴硝

散補遺或產寶活石

煎或三退飲甚則奪

命丹 並見下 胞衣不

下 臍腹堅脹急痛欲

死牛膝湯服即爛下

補遺產後一切危急

症候及胞衣不下急

症者黑龍丹見下

補遺朴硝散 下死

胎取胞衣產後敗

血 朴硝參錢

○又方牛膝九下死胎

牡牛膝 三兩 紫金藤 七錢 肉桂 二錢

蜀葵根 七錢 射香 五分 當歸 四兩

右為末米糊為丸如梧子大硃砂為衣每服五十九

乳香湯送下

○又方 治子死腹中不出

用黃牯牛屎不拘多少塗母腹上立出○一云以牛

屎炒令大熟入醋半盞以青布包裹於母臍上下熨

之立下

○雞黃散 治子死腹中用雞子黃一箇生姜有然汁一

合調勻頓服分娩後用芸薹粥補之

○牡丹皮散 生子下血過多子死腹中增寒手指甲青

面生黃黑合上合心則心火正合下

或食毒物或飲用

安若已死即下極妙

牡丹皮 赤芍 桂心 薤仁 白茯苓

右各等分為細末練蜜為丸如彈子八每服一九細

嚼淡醋湯送下連服數丸立驗

○丹溪活套云

凡婦人胎前諸疾只須以四物湯為主治看証加減

調治○如齋腹中煩悶口苦厭食不問月數多少本

方加白朮條芩砂仁煎服○如五六箇月後胎動不

安或逆搶逼心本方加阿膠砂仁條芩枳殼白朮野

苧根艾葉入金銀同煎服○如氣血虛心煩脈虛天

無力或怔忡手戰及時有微熱本方加人參白朮黃

芩甘草酸棗仁遠志麥門冬地骨皮等藥○如五六

末之用熱酒對童

便調下

補遺牛膝湯 治胞

衣不出脰腹堅脹

急痛服此即爛化

成血水下

川牛膝去芦酒洗

鹽麥各四兩

川當歸尾三兩

川通草六兩

白滑石八兩

葵子五兩

右細切以水九升

莫取三升分三次

斷產

婦因臨產艱難或生

育不已或不正之屬

為泥為媾不欲受孕

而欲斷之者小品方

或千金方補遺如有

孕欲落者廣濟落胎

方或千金去胎方

補遺小品方 斷產

故蚕紙方圓一尺

燒為末酒調服終

身不復懷孕也

補遺千金方

油煎水銀一日方

箇月前無故下血或因事下血謂之汛聆本方加條

芩其草白木白芷茅根地榆桑寄生之類○如七八

箇月前後面耳及四肢浮腫本方加茯苓澤瀉白木

條芩炒梔子厚朴其草稍麥門冬之類○如孕中忽

然口噤吐沫不省人事言語錯亂本方合二陳湯加

麥門冬竹茹遠志石菖蒲之類○如感冒風寒頭痛

發熱或身軀疼痛本方合小柴胡湯或更加細辛白

芷防風羌活等藥○如二三個月內白吐惡心不納

飲食謂之惡阻本方去地黃加陳皮半夏縮砂仁神

麴霍香麥芽陳蒼朮白木之類○或因事動胎致胎

不安動撞不已及下血欲墮本方加人參白朮白芍

苓條芩白芷桑寄生砂仁阿膠珠甘草等藥○或特

有白濁白帶本方加白茯苓陳皮木香等藥

不安本方加白朮茯苓條芩澤瀉蒼朮柯子皮砂仁

神麴乾姜之類

祖傳經驗秘方治難產瀝漿胞乾胎不得下用香油蜂

窠各一碗和勻用銅銚慢火煎一二沸掠去沫調滑

石末一兩重攪勻填服外以油蜜於母臍臍上下用

之立產

○又方產主曾試甚驗用兔頭骨家猫頭骨各一箇烈火

煨地上出火毒研為極細末每服二三錢濃煎膏歸

湯調下即產

○又方 治胞衣不下三退飲

蛇退

全看

蚕退紙一方

蟬退四箇

用瓷瓶盛燒存性細研順流水調服立下

息空心服如棗大

一圓水斷不損人

補遺廣濟胎方

枯接根兩四瞿麥兩

肉桂五兩牛膝兩

右水七升煎二升

三合分三服服後

如人行五里又進

一服無忌

補遺千金去胎方

大麩五升漬酒一

斗煮一沸分五服

知勿動再服其子

如墜下令母肥盛

無疾苦

產後指南

血暈

產後去血多暈悶不

醒者芎歸湯催生下

產後血氣暴虛未得

安靜火載血上血迷

血暈昏不知人嚴氏

清魂散加當歸見下

產後氣血俱虛痰火

泛上作暈者二陳湯

道痰湯隨血氣加減

並痰飲門或麥門冬

湯下硃砂安神丸亦

○御知縣傳方 療死胎不出

朴峭為末每用二錢溫童子小便調下知洪州進賢

曾通任定來云昔為豐城尉時有箇孕五子一子已

生四子死腹中啼哭歎死試問醫者令用此藥灌之

死子即下猶得再生後有一牛亦如此用此法亦活

僕為兒時曾有一親戚胎死腹中不下數日百計已

窮記意我先人用朴峭半兩末以童更調下胎即產

○繆宅歎息孺人杜氏生產數日不下坐婆魂童救療皆

無刀召僕診之僕曰產前脉不可考但當察色而知

之遂揭帳眺燭以察之其面色赤舌色青見此者知

胎已死母却無憂矣或問曰何以知之予答曰面亦

舌青者子死母活明矣供自以證氏方貳超服死胎

即落矣以此見古人處方神速

婦人科

論

內經曰一息不運則机絨窮一毫不續則窮壞判所

氣血周流循環無端少有不續則身危矣若夫妊娠之婦

子在腹中母子一氣流通全賴漿水滋養十月數足血

氣完全形神俱備忽如夢覺自能用手折胞求路而出

既出胞外母子分躰呼吸殊息其可久驚於內而使其

氣化不運不續哉夫胎元壯健者胞既折即隨漿而下

故易產也其困弱者轉頭遲慢胞漿既乾汗血來塞道

路凝滯是以橫生逆產子死腹中而產母之命死在須

臆可不畏乎凡見將生之際胞漿既下踰時尚未分娩

便當傍惶設計用藥逐去惡血使子路通暢而無難產

可附餘或人參紫蘇
飲見下惡血冲心悶
絕者獨行散補遺血
暈如不醒以韭菜一
二斤搗爛盛於有嘴
瓶中以滾醋泛之急
封瓶口以瓶嘴納產
婦鼻中熏之即更或
用秤錘及磚石燒紅
投醋中熏之或用炭
火醋淬熏之或用乾
漆燒烟令聞煙如不
醒急指人中提項心
中頭髮灌以童便姜
汁亦良法也

產後失血

產後失血過多腹痛
身熱有汗者當歸黃
芪湯見下若去血多
眩暈者考歸湯催生
下虛者加焦炒乾
乾姜人參腹痛者香
桂散下死胎餘失血

之患豈可袖手以待斃哉是故催生之藥即高歸益母
草冬葵子之類皆使之逐去汚血者也若腰腹未甚痛
漿水少淋瀝而下名為試漿實非胞內直漿也且宜寬
心守待切不可輕易便令穩婆接取產母用力逼胎太
早多致橫逆不順切須謹慎其或先見手足不順者額
偏露者但當以手輕輕撥正以待其自下可也若分娩
之后胞衣未下者猶為可慎宜多方用藥逐下甚不可
令粗率之婦摘取嘗見有斃破尿脛致終身之害者有
取下肝葉而產母隨時殞命者可不謹歟若夫難產之
婦皆是產前恣慾所致非獨難產且產後諸疾皆由是
而生焉或有乍寒乍熱似癰非癰或大熱頭痛身疼如
傷寒狀或卒中口禁如瘖如癱或左癱右瘓角弓反張
或妄言見鬼心中惶惑或耳目口鼻忽不覺動

之狀或喉中作痛綿綿不絕已上諸病者
即是勞傷血氣大虛之証丹溪曰凡產前當清執養血
為主產後宜太補氣血為要雖有雜症以未治之此萬
世不易之確論也雖然亦有離釋太平或澡浴身垢以
致感冒風濕或多啖鷄子糞糝雜消之物皆能惡風發
執更証多端醫者宜潛心診察脉候以扶危拯急不可
苟且妄治以夭折人之天年也

脉法
脉經曰新產婦人有三病一者病痊二者病鬱胃三者
大便澁云師曰亡津液胃燥故大便難產婦鬱胃其
脉微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛
而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽
上出故但頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣

過虛熱太甚目睛神昏手足冷苦歸姜桂人參汗多加黃芪或益母丸加重便自汗氣欲脫黃芪湯見下產後去血多心虛怔忡錯語茯苓散見下產後去血多陰內熱心煩短氣有汗當歸建中湯附餘或人參當歸散見下

惡露

血捨心悶成狂喘滿欲絕者蒲黃散附餘

惡露不盡心腹痛黑神散或定痛散並見下惡露不盡見枕疼當歸失笑散或三聖散或四物一黃散並見下

產後虛勞

新產後目干肢體軟痛虛眩無力者名曰虛勞當歸羊肉湯或脊子飲並見下產後血氣大傷失於將理自汗發熱虛羸飲食不消時效發渴者增

獨盛故當汗出陰陽乃復所以便堅者嘔不能食也小柴胡湯主之病解能食七八日而更發熱者此為胃熱氣失承氣湯主之

○婦人產後七八日無太陽症小腹堅痛此為惡露不盡四五日不大便跌陽脈微突再倍其人發熱日晡所煩燥者謔語不能食利之即愈宜承氣湯以熱在裏結在膀胱也

後丹溪曰產後宜大補血氣為主雖有藥症以未治之及日產後不可汗下叔和以中景法傷寒法用承氣氣小柴胡湯藥致退產後之熱恐非致到可法之語也
丹溪曰產前脈細小產後脈洪數皆死又曰產前脈當洪數既產而洪數如故豈得不死此亦大槩言之今見產後豈無脈洪數而生者

丹溪曰產後當大補氣血為主
○產後補虛用參朮黃芪陳皮歸身尾川芎炙甘草如發熱輕則加茯苓淡滲之其熱自除重則加乾姜或云大熱而用乾姜何也曰此熱非有餘之和熱乃陰虛生內熱耳蓋乾姜能入肺分利肺氣又能入肝分引眾藥生血然必與補陰血而用之此造化之妙非天下之至神其孰能與於此哉

○產後發熱惡寒或口眼歪斜等症皆是血氣虛甚當以大補氣血為主治左手脈不足補血藥多於補氣藥右手脈不足補氣藥多於補血藥切不可用小續命湯表散之劑

○產後惡寒發熱腹痛者當去惡血若腹不滿者非惡血也
○惡露不盡小腹作痛名見枕痛用五靈脂香附為末醋

益柴胡湯補遺或人參
參煎散附餘發寒
熱加味三之一湯補
遺或石子湯或知母
湯並附餘

補遺增損柴胡湯

柴胡 廣陳皮

人參 當歸

白芍藥各一錢

山杏肉 二分

生甘草 四分

姜三片棗一枚水

一鍾煎八分溫服

補遺加味三之一湯

治產後虛勞目眩

久其以尚浮發寒

發熱

人參 當歸

北柴胡去芦

生地黃酒浸晒乾

荆芥各一分

黃芩 酒炒半夏

白芍藥各八分

大川芎 七分

甘草 三分

右姜三片棗一枚

水一鍾煎八分食

遠服

產後中風

糊丸甚者加搗尖桃仁一云用神麩糊丸白木陳皮湯

下氣虛者四君子湯下

治血刺痛用當歸乃和藥之法若因積血而刺痛者宜

桃仁紅花當歸頭之類血在下焦當用歸尾

又方用鹿角一段燒存性出火研為末酒調滾下即愈

○硃砂安神丸

硃砂 半錢

黃連 酒洗一錢

甘草 炙五分

○人參紫蘇飲 治血暈

人參 一兩

紫蘇 五錢

嚴氏清菟散 治產後血暈昏不知人

澤蘭葉

右為細末每服二錢溫酒入童便調下更用漆器燒

烟薰之類置醋灰更服此藥

○愈風湯

反張

荆芥穗

右為細末每服三錢豆淋酒調下童便亦可○豆淋

酒用大黑豆不拘多少炒焦投好酒中

○大豆子湯 治產後中風角弓反張口噤涎潮

黑豆 半斤炒令焦

以無灰酒二升沃之入磁器內每用此酒半斤入獨

活五錢同煎溫服

○血風湯 治產後諸風痿弱筋掣無力

產後中風口禁牙閉

蔡急手足攣攣者卒

輕古拜散胎前中風

條產後血大損經絡

空虛勞碌太早風邪

乘虛而入者小續命

湯傷寒門或愈風湯

見下中風角弓反張

涎流大豆子易附餘

產後風痙

產後諸風痿弱筋挛

無力者血風湯補遺

產後血虛氣弱汗多

風痺之而成痙口禁

身強汗出不止

者親治大聖散加川

烏黃氏胎前怔忡下

產後不語

產後敗血停畜上下

於心氣閉澁故舌

強不能言語者八珍

散虛損門或七珍散

或交感地黃煎丸並

見下產後內因痰氣

鬱滯閉目不語者用

好白明礬一錢為末

白沸湯調服

秦艽

羌活

防風

白芷

川芎

芍藥

白朮

當歸

地黃

茯苓

半夏

黃芪

未之一半為丸蜜和梧子大温酒下五十九一半為

散空心温酒調下

○新產後不可用芍藥以其酸寒能伐發生之氣也

○產後乳汁不通用通草七分瞿麥柴胡天花粉各一

錢桔梗二錢青皮白芷木通赤芍連翹甘草各五分

作一貼水煎食後細上飲之更摩乳房或無子食乳

者要消乳用麥蘗二兩炒分作四服白湯調下

○產後泄瀉利用陳皮白朮茯苓川芎酒炒芍藥黃芩

滑石炙甘草煎服立効○一方無甘草有乾姜物皆

不可缺

○凡乳母似覺小水短少即以此藥生飲之

見飲乳母安兒安方患未形治法之善者也

○有產婦因收生者不謹損破尿管而致淋瀝不禁因

思肌肉破常可完補診其脉虛甚蓋維產因氣血

故產後猶虛試與峻補以參朮為君芍歸為臣飛仁

陳皮黃芪茯苓為佐以猪羊脬煎湯熬汁極飢飲之

一月而安蓋氣血驟長其脬即完恐稍遲亦難成也

○茅根湯 產後諸淋無問冷熱膏石氣肉等淋

白茅根 五錢 瞿麥 白茯苓 二兩 葵子

人參 錢二 蒲黃 桃膠 滑石 七錢

半夏 五分 紫貝 一個 石膏 石砂

分二貼加姜三片燈心二十莖温服

○牡礪散 產後惡悶淋瀝不絕四肢之弱

附○產後月四

乍見鬼神

產後乍見鬼神者由血虛勞動肝心敗血攻冲邪淫於心胡言亂語如崇非風邪也調經散少加龍腦或黑龍丹酒調下或琥珀散並見下或辰砂妙香散加當歸黃連地黃附餘產後謔言妄語皆心血虧欠柏子仁散見下

產後無乳

產後乳汁不通有二弱瘦人氣虛血少脉並不行乳汁絕少局方用通草瞿麥天花粉桂枝青皮白芷木通赤芍連翹甘草水煎服或漏蘆湯調鍾乳散服或母猪蹄湯並見下肥盛婦人氣脉壅滯乳汁不通或留結為癰腫將欲成膿者漏蘆湯見下并外科乳癰方參用

產後陰脫

外科乳癰方參用

牡蠣粉

川芎

熟棗

白茯苓

龍骨各二錢

續斷

當歸

艾葉酒炒

人參

五味子

地榆各一錢

甘草各五分

分二貼姜枣煎空心服

附餘○參木膏 產後胞損成淋瀝証

人參二錢

白木二錢

桃仁

陳皮

茯苓各一錢

黃芪半錢

甘草各五分

水煎猪羊胞入藥煎服

○黑神散 治產後惡露不盡或胎衣不下血氣攻冲

心腹疼痛及血迷血暈等症

黑豆炒半斤

熟地黄

當歸酒洗

肉桂去粗皮

乾姜炮

甘草炙

白芍

蒲黃各四兩

齊生方有蒲黃無附子

右為細末每用二錢煎服

附餘○蒲黃散 產後惡露不快血上搶心煩悶喘急昏迷

不肯人事或任言妄語氣喘欲絕

乾荷葉炙

玄胡索

牡丹皮

生地黄

甘草炙各二錢

蒲黃生六錢

分二貼水煎入蜜少許溫服

產○人參當歸散 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛

生內熱令人心煩短氣自汗頭痛

熟地黄

人參

當歸身

肉桂

麥門冬

白芍炒各一錢

右細切作一服入淡竹葉五片生姜三片水煎服

產○當歸黃芪湯 治產後失血過多腰痛身熱自汗

當歸身三錢

黃芪二錢

白芍半斤

產後陰脫謂陰戶宮

中脫下即生腸不收

也蓋因生產後氣血

俱虛又立所致當歸

黃芪飲或當歸散並

見下或陳口殼煎湯

受之良久即收或五

倍子白芨煎湯浸之

亦可或燒雄鼠糞烟

熏之即產後陰疼煩

悶赤仁膏產後玉門

不斂硫黃湯洗之自

斂見下或硫黃五分

烏賊骨五分五味子

二分半為末搽患處

產後發熱

產後發熱頭痛自汗

心煩短氣者骨節煩

疼此生產去血太多

血虛則發熱虛生

內熱故也人多

散見下產後陰虛不

足發熱日輕夜重情

寒者四物湯加焦姜

或柴胡湯去半夏傷

寒門小熱加茯苓產

後蒸乳發熱者四物

湯加黃芪人參白朮

天花粉盧根門產後

右細切作一服水一盞半加生薑三片煎至一盞服

○當歸建中湯 產後勞傷虛羸不足腹中隱痛吸上

少氣小腹急痛連腰背時自汗出不思飲食

當歸 四兩 肉桂 三兩 甘草 二兩 白芍藥 六兩

每服五錢食前姜末煎服

○失笑散 治產後心腹疼痛欲死及兒枕痛

蒲黃 炒 五靈脂 各等分

右為細末每服二錢熬成膏白湯化下

○大岩蜜湯 治產後大虛寒搏于血血凝其氣迷上

沖心之絡脉故作心痛

熟地黄 蒸 當歸 酒浸 獨活 乾姜 炮 吳茱萸

桂心 白芍藥 小草 各半 甘草 炙 細辛 各八

分二貼水煎食遠溫服

○玄胡索湯 治產後七情傷風血氣不和

玄胡索 當歸身 芍藥 厚朴 製 義木 炒

川練子 三稜 煨 木香 川芎 桔梗

黃芩 甘草 換柳 等分

水煎食遠溫服

三聖散 治兒枕痛

當歸 肉桂 玄胡索 各等分

右為細末每服二錢熱酒或童便調下

○抵聖湯 治產後血氣傷於脾胃腹脇滿悶嘔逆惡心

赤芍藥 半夏 澤蘭葉 陳皮

人參 各二 甘草 炙 一

右細切作一服入生薑三片水煎服之

○當歸羊肉湯 治產後發熱自汗肢躄疼痛日久不愈

當歸 羊肉 各一斤 水煎服之

十三

氣血兩虛或湯洗手
足太早或身風惡寒
發熱或服時黑神散
乾姜多而反生大熱
或因欲消痰強加納
酒致發潮熱口燥咽
乾生津清涼飲

補遺生津清涼飲

麥門冬去心

人參二斤

黃芩酒炒

荆芥當歸

白芍藥一斤

知母八斤柴胡一斤

生甘草三分

右水一斗煎八分

不拘時服若服有

刀身拘急而頭又

疼加川芎七分羌

活一錢

產後傷寒

產後血氣大虧縱有

寒邪不可大發汗若

燭湯加人參紫蘇干

葛微汗之產生下熱

不止蓄龍湯即小柴

胡湯去半夏加芎喘

傷寒門大熱加知母

黃連可攻可溫者臨

名曰葶勞

當歸身

人參各七

黃芪一兩

生姜五斤

右細切用羯羊肉一片煮取清汁五大盞去肉相入

煎藥慢火煮取四盞分六服徐七飲之

煎藥慢火煮取四盞分六服徐七飲之

渴盜汗寒熱如瘧臂搏拘急

人參

桂心

桑寄生

當歸

白茯苓

白芍藥

桃仁去皮

熟干

麥門冬

甘草炙

續斷半斤

牛膝七斤

鱉甲炙

黃芪一兩

末之猪脊一對去脂膜用水二盞生姜二片大棗三

枚煮一盞入藥末二錢葱三寸烏梅半箇荆芥五種

水煎空心服

附○石子湯

猪腎切作四破

分作二貼每用水三升煮升半分三服

附○趁痛散

治產後走動氣血升降失常留滯關節已

脉引急故遍身疼痛甚則腰背強不能俯仰手足不

能屈伸

川牛膝酒浸當歸酒浸

官桂

白木

黃芪

獨活

生姜各五

薤白各半

分二貼水煎食遠服加桑寄生尤妙

○茯苓散

治產後心虛怔忡不定言語錯亂

人參

甘草

山藥

當歸各一

遠志

茯苓

桂心

麥門冬各五

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞半煎

至一盞去粗溫服

時斟酌不可妄用峻劑耗損真元也

產後咳嗽

產後惡露上攻入肺經咳嗽二母散付余血風感寒熱濕氣咳嗽痰涎坐臥不寧旋復花散見下時感傷風咳嗽有外邪惡風寒發熱參蘇飲傷寒門虛熱咳嗽加味六君子湯

附○養心湯 治心虛血少驚悸不寧

黃芪炙 白茯苓 茯神 半夏麩 當歸

川芎各半 遠志去心 辣桂 栝子仁 酸棗仁炒

五味子 人參半錢 甘草四手

每服三錢姜煎食前服

產○當歸散 治產後氣血俱虛恐增客熱宜服此以去

惡露 當歸 白芍 川芎 黃芩略 白木五手

右為細末每服二錢童便入溫酒調下

產○黃芪湯 治產後虛汗不止

黃芪 二手 白木 防風 熟地黄

牡蠣粉旦 白茯苓 麥門冬 炙甘草各五分

右細切作一服加大棗一枚水煎服

良○增損四物湯 治產後陰虛發熱或日閉

寒熱 當歸 川芎 生地黄 柴胡各等分

右細切每服五錢水一盞半煎至一盞溫服

附○知母湯 產後乍寒乍熱通身溫壯心腦煩悶

知母四兩 赤芍藥 黃芩三錢 桂心八分 甘草炙一錢

分作二貼水煎食遠溫服

良○四物一黃散 治產後腹中血塊作痛

當歸 川芎炒 熟地黄 白芍各五錢 蒲黃炒半錢

右為細末每服二錢空心溫酒調下

○產室黑龍丹 治產後一切血疼垂死者但灌藥得下

無有不安者 五靈脂 生地黄 當歸 高良姜 川芎略

產後瘧疾

產後瘧疾寒熱相半

前八分食遠執服

右姜三片水一鐘

炙甘草四分

北柴胡六分

白茯苓各七分

黃芩酒拌炒

廣陳皮八分

半夏各一錢

雪白水去芦熬炒

清河參去芦

或執多草果飲子或
清脾飲去青皮厚朴
並瘧疾門寒多人參
養胃湯傷寒門或四
獸飲瘧疾門久不已
勝金丹捷瘧疾門

產後泄瀉

產後泄瀉君苓湯補
汗或調中湯見下按
寒腹痛腸鳴小水清
白不渴加肉豆蔻煨
桂芍藥炒用如執泄
腸垢便澀痛一陣泄
一車口渴加黃連炒

木通或益元散痢疾
門濕熱水瀉胃苓湯
中瀉
補遺
止瀉和中
即四君子湯對四
苓散

產後下痢

產後留血不消積聚
作塊急下疼痛下痢
四牛散見下產後下
痢腹痛裏急後重至
圍不能便者連散
加入參當歸神麩麥

右細切用砂窩一箇盛藥外以赤石脂為細末醋調
封縫又以紙筋塩泥固濟文武火煨過置地上出火
毒研細入後藥

雄黃一錢

花蕊石另研一錢

乳香另研一錢

琥珀另研一錢

右同煎藥共為細末醋糊為丸如彈子大每服一丸

用生姜自然汁無灰酒各一合童便半盞合和將藥
於炭火上燒紅投入姜酒內研散頓服立効

烏金散

治產後血迷血運敗血不止淋瀝不斷臍

腹痛頭目昏眩多汗無力及治崩中下血不止

麒麟竭皂莢水先淨

亂髮皂莢水先淨

松墨煨醋

百草霜

當歸去芦

肉桂去粗皮

赤芍

延胡索

鯉魚鱗燒存性

右各等分為細末每服二錢温酒調下

產

調經散

治產後虛浮蓋收血乘虛停積行或流下

肌肉腐填成水令人面目四肢腫痛不可忍
泄利之藥是謂重虛其虛多致天亡此藥主之

沒藥另研

琥珀另研各一錢

桂心

赤芍藥

當歸各一兩

細辛

射香五分

右為細末每服一錢七姜汁温酒童便和調服之

產

正脾散

治產後通身浮腫及治婦人大病後脾氣

虛弱中滿腹脹等病

蓬義木

香附童便

茴香

甘草炙

陳皮

右各等分為細末每服二錢燈草木通湯下
○栝子仁散 治產後謔言妄語皆心血虧欠心神不

守所致

栝子仁

遠志去心

人參去芦

桑寄生

防風去芦

琥珀另研

當歸

熟地黄

甘草炙

芽炒有執如黃連厚
朴炒附餘病久不已
四君子湯加當歸芍
藥地藥陳皮木香黃
連虛損門

產後身疼

因產走動氣血升降
失常留滯於關節間
脈引急或手足拘
挛不能屈伸故遍身
肢節走痛者起痛散
附餘血不流于
偏身肢即腰脚關節
如作疼如神湯補通

後餘血不盡流入
腰脚疼痛
厚朴姜製木香
半夏湯泡官桂
芍藥陳皮
枳殼炒白姜各
小茴香炒人參
香附炒川芎
白茯苓白芷
炙甘草當歸
桔梗木瓜
桃仁炒去皮尖各
分二貼生薑三片
水煎食前服

右各等分細切每服五錢先用白羊心一枚而此煮
汁一盞前藥至一盞去羊心及粗溫服不拘時

琥珀散 治產後瘀血攻心迷悶妄言見鬼

琥珀 鐵 各一錢 人參 阿膠珠 生地黄

扶神 各七錢半 硃砂 五錢 甘草 射香 各一錢

右為細末和勻每服一錢用金銀煎湯調下

附除○辰砂妙香散

射香 研一錢 山藥 姜汁 茯苓 扶神

遠志 炒 黃芪 各兩 人參 桔梗

甘草 各半 木香 煨二錢 辰砂 三錢

末之每服二錢臨卧或食後溫酒送下

良方○交感地黃煎丸 治產後舌強不語眼見黑花或發

狂見鬼及抱衣不下心腹脹滿等症

當歸 生地黄 新者 生姜 各一斤 各用石臼杵細以布

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九煎當歸湯

化下食前服

高方○七珍散 治散後不語

人參 石菖蒲 川芎 熟地黃 各一

細辛 一錢 防風 五錢 去羌

右為細末每服一錢用薄荷湯調下不拘時服

高良姜 當歸 桂心 白芍

附子 炮去 川芎 各一 甘草 炙五

右細切作一服如生姜五片水一盞半煎至一盞服

方○定痛散 治產後惡血不止腹中作痛

水煎食前服

水煎食前服

產後頭疼

產後頭痛有血虛者有氣弱者痰癖者寒厥者諸頭痛加減四物湯隨病加減月經條下產後感於異証

手足牽搐咬牙頭痛昏冒先服加減四物湯吹服養光丸附餘

產後口鼻黑

產後氣消血敗榮衛不理散亂入於諸經不得還元故口鼻黑

施乃方書此因產後虛熱變成此症為胃絕肺敗多死犀角地黄湯用之十可救一血症門

產後霍亂

產後霍亂瀉而飲水者五苓散中溫門寒多不渴者人參理中湯吐利厥冷者加附子傷寒門腹痛甚手足寒者高良姜散附餘轉筋者木瓜散附餘不止辣蓼草湯洗

當歸

右細切作一服酒水合一盞姜五片煎一盞溫服

麻仁枳殼丸

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九白湯下未通漸加丸數以便潤為度

羊肉湯

治產後腹中虛痛氣血不足羸弱力倦及寒月中生產寒氣入於產門臍下脹滿手不可犯此寒疝也此藥主之

精羯羊肉

右細切用水三碗酒一盞煎至一碗去粗分二服加葱鹽亦可

滋腸五仁丸

治產後血氣虛弱大便閉結

杏仁

右五仁另研為膏合橘皮末和勻再研煉蜜丸如梧桐子大每服三十九加至五十九食前清米飲下一方加當歸稍五錢

蘇麻粥方

治產後有三疾鬱冒則多汗汗則大便難不可用藥妄下

紫蘇子

右二味不拘多少研爛水瀝取汁煮粥食

固經丸

治產後血氣未復而有房事及勞役損傷致血暴崩或淋瀝不止

沒藥

赤石脂 補骨脂 木賊 附子 右為細末米糊為丸如梧桐子大每服二十九溫酒

產後月一四

產後月一四

十八

產後喘急

產後氣喘由榮血暴竭氣无所主濁聚於肺故令喘急也此孤陽絕陰難以藥療于死一生之候也若敗血停滯上朝於肺而作喘者返魂丹無蝎射沒藥糊丸如前法服

產後鬱胃

產後鬱胃由胃弱不食多汗故血虛必厥厥必鬱胃白微湯厥証明產後有三疾鬱胃則多汗多汗則大便便秘結此皆血去多故也難以藥治蘇蘇粥附餘或滋腸五仁丸見下

心腹刺痛

產後敗血凝聚氣上冲心作痛犬岩蜜湯附餘定痛散見下七情相于与氣併心痛文胡索湯附餘敗血散攻刺心腹痛失笑散

下或陳米飲下

○熟乾地黄散 治症同前亦治婦人一切崩中下血不止頭目沉重

熟地黄半錢

甘草一分

桂心二分

當歸一錢

右細切作一服入竹茹一錢用水二盞煎至一盞服

○拒勝湯 治產後腹脹滿悶嘔吐不定蓋敗血入於脾胃而脾不能運化故胃不能納穀以致嘔吐腹脹等症

赤芍 半夏 澤蘭葉 人參 去芦

陳皮 去皮各 甘草 分

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞服

汗一百日內常服此藥氣血具易成行

人參 去芦 乾姜 炮 砂仁 白茯苓

神麴 炒各 甘草 炙 白木 兩

右為細末米糊為丸如梧桐子大每服三十九食前

姜湯下有痰者宜加半夏麴

○旋覆花湯 治產後感冒風寒咳嗽喘急痰涎壅塞坐卧不能

柴胡 麻黃 去節 杏仁 炒 五味子 茯苓

甘草 炙 旋覆花 半夏 麴 荆芥穗 赤芍 分

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞半煎

至一盞去粗温服

○二母散 治產後惡露上攻流入肺經咳嗽

知母 具母 人參 白茯苓

附餘

○二母散

治產後惡露上攻流入肺經咳嗽

知母 具母 人參 白茯苓

或當歸養血丸並見
下寒氣腹痛理中湯
傷寒門或羊肉湯見
下

產後怔忡

產後血少怔忡恍惚
驚悸睡不安寧者心
虛怔忡語言錯亂良
方茯苓散見下產後
因受虧惡露去多寒
熱發較慳心神恍惚

桃仁去皮 杏仁去皮

末之每服七錢水煎食遠溫服

○四神散 治產後留血不消積聚作塊急意疼痛下

利不止

當歸去芦 乾姜泡 川芎 赤芍各五分

右為細末每服三錢溫酒調下

○香連散 治產後痢疾

木香 滑石各一錢 黃連炒 白朮炒

芍藥各二錢 甘草各五分

作二貼水煎溫服

○當歸養血丸 治產後惡血不散發熱腹痛及惡露

不盡臍腹堅脹兼治婦人室女經候不調治白帶下
腹脇痠痛

當歸去芦亦為兩 牡丹皮

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九或酒或

米湯任下

○猪腎子飲 治產後羸勞寒熱如瘧咳嗽頭疼自汗

瘦腹中疼痛

猪腰子切作四片 當歸 白芍各一兩

右以當歸白芍二味細切用水三碗煮至二碗去粗

將腰子切碎如骰子狀入前藥汁內用晚粳米一合

香鼓一兩葱白五七根同煮糜爛空服食之日進服

○秦光丸 治產後血氣大虛因風入血分苦痛

當歸頭酒洗 川芎各五錢 秦光酒洗 荆芥穗二錢

末之酒糊丸如菉豆大空心白湯下

○當歸黃芪飲 治產後陰脫○謂陰戶宮中脫下也

拾珍湯 懷抱驚
驚胸膈若飢若飽或
時發熱煩燥心神不
寧此病在心脾也加
味歸脾湯補遺
補遺加味歸脾湯
黃芪 人參
當歸 白朮
白芍各一錢
遠志甘草湯浸搗
去心 嫩柴胡
山梔仁炒各八分
酸棗仁微炒
葛根各七分
炙甘草三木香

白茯苓六分

右加蓮肉去心皮

五枚員眼肉五枚

水一鍾煎八分食

產後浮腫

產後敗血停畜五臟

循經沉入於四肢化

為水因或虛浮腫者

調經散或正脾散並

見下產後血氣大虛

肢體浮腫者不可利

水通利峻劑直大補

氣血四君子湯加蒼

產後嘔吐

產後魚露下少敗血

乘虛散入于脾為脹

滿胃受之則嘔吐抵

聖湯見下產後腹脹

而嘔逆者蓋敗血入

于脾胃而脾胃不能

運化故胃不能納谷

以致嘔吐腹脹等症

枳梗半夏湯主之補

遺或拒勝湯或入味

理中湯並見下

補積枳梗半夏湯

當歸 白芍 黃芪 人參 各二升 麻半錢

右細切作一服水煎溫服未收再服

當歸散 治婦人陰脫又名疝癰

當歸 黃芪 白芍 略一 蝟皮 半兩 牡蛎 兩

右為細末溫酒或米湯調下忌登高牽重

○棗仁膏 治產後陰疼煩悶

桃仁 五味子 枯礬

右為末研桃仁膏拌服

○硫黃湯 治產後玉門不斂

硫黃 四兩 吳茱萸 兔絲子 各半 蛇床子 一兩

右細切每服四錢水一碗煎湯頓洗之自斂

○婦人乳汁不通有二種有血氣壅盛乳脉滯而不行者

有血氣虛弱乳十絕少者夫虛者補之用重乳分

見于後

○漏蘆湯 治婦人肥盛氣脉壅滯乳汁不通或留結

為壅腫將欲成膿者

漏蘆 二兩 蛇退 一條 土瓜根 十根 切

候士瓜當作王瓜記月令四月王瓜生即以此物也

其尖如瓜萎而小如荔枝色黃藤葉葉員无缺者是

○鍾乳散 治婦人氣虛血少脉澁不行乳汁絕少

鍾乳粉 細研

○母猪蹄湯 治乳汁不通

母猪蹄 一隻 通草 四兩

○用水一斗煮取四五升取汁飲之未下更作一料服

產後月十四日

補積枳梗半夏湯

產後調和氣血治

腹脹嘔逆

桔梗 半夏 泡

陳皮各半兩

右分二貼薑三片

水一鍾煎至八分

熱服不拘時候

產後胞損

產後諸淋赤根附餘

產後敗血不止淋瀝

不斷烏金散見下或

四物膠艾湯補遺林

久不止四肢乏力沉

甲杜瀉散附餘產後

血氣未復而有房事

及勞役損傷致血暴

崩或淋瀝不斷固經

九製乾地黄散並見

下生時時穩婆候損

其尿胞以致日夜淋

瀝者參朮膏附餘

補遺四物膠艾湯

治血山崩或時來

或住幾時又復來

主也黃姜汁并炒

黃連酒炒各錢半

人參去芦二錢

黃芩酒炒 當歸

阿膠炙炒 艾葉

縮○涼血飲

治血熱心煩口乾煩燥及經水不調血熱

黃芩

赤芍藥

川芎 錢二

甘草 錢一

生苜 錢二

麥門冬 去心 括萋根

分作二貼竹葉四十片燈心十四根水煎溫服

熟乾地黄湯 產後虛獨渴口少氣脚弱眼昏頭暈

熟黃 酒浸 晒 人參 四錢 麥門冬 三錢 甘草 錢一

括萋根 六錢

分二貼糯米一撮姜枣煎服

良姜 產後霍亂吐瀉腹中疼痛

末之每服一錢米湯調下

木瓜散 霍亂吐瀉轉筋擾悶

木瓜 錢一 茴香 炒

紫蘇葉 五分 甘草 錢三

吳茱萸 炒 一錢

作一服薑玉片水煎服

縮○木通散 產後小便不通

木通

麻子仁

葵子

滑石

枳殼 錢二

甘草 五錢

分二貼水煎食遠溫服

縮○千金萸方 治產後遺尿不知出

白薇

芍藥

等分為末酒服方寸七日參

縮○又方

桑螵蛸 炒 兩 龍骨 一兩

為末食前粥飲調二錢

縮○鷄內金散 治產後溺床失禁

煉藥 荆芥

綿黃芪 蜜炙

地榆 各一錢

白芍藥 水浸過炒

防風 去芦各八分

白木 熬炒去油

川芎 各七分

生甘草 三分

右生薑三片 炙子

一枚 水一鍾 煎至

八分 不拘時服 空

心 兼服 旺龍鹿角

膠 尤其效 尤速

產後 小便

小兒指南

初誕

凡嬰童初離母體口
有液毒啼聲未出急
用軟綿裹指拭去口
中惡汁得免痘疹瘡
毒之患或有不及如
法者古人有黃連法
硃砂法甘草法牛黃
法用之殊佳 並補遺
免使惡物下伏之
於心 遇天行時氣久
熱不除 乃乘於心

以雄雞脛胫一具 陽洗燒為末 酒調服 方寸匕

治小便利血方

亂髮 淨洗 燒

米飲調服 方寸匕 一方有滑石 等分 每服一錢 地黄

汁調下

療產後大小便不利下血

車前子

牡礪

右為細末 空心米飲服 方寸匕 忌麪蒜

冊溪活套云

斷產不可用為藥 以其酸寒能伐發生之氣 內日之

只以黃芪四物湯為補虛之要藥 以黃芪易為藥 是

也 如氣虛者 本方加參朮 大抵本方宜早服 宜

大醫防初誕 宜早服 宜早服 宜早服

小兒門

論

嘗聞小方脉科 古人謂之唾科 最費調治 誠哉是言也
蓋以嬰之流難問 証難察 脉耳 且臟腑脆嫩 而孟浪
之劑 與夫峻寒峻熱之藥 俱不可輕用 試詳論之 夫
子之在襁褓中 也 內無七情六慾之 交戰 外無大風大
寒之相侵 奚其幼科之 疾若 是之繁且甚 與 抑攷其証
天半胎毒而少半傷食也 其外感風寒之証 什一而已
曰 變蒸 曰 痘疹 曰 班爛 曰 驚悸 曰 風癇 曰 發搐 曰 痰壅
曰 赤瘤 曰 白禿 曰 鮮顛 曰 重舌 木舌 已上設証 豈非孕
母不謹 胎毒之所致 與夫小兒之在胎也 母饑亦饑 母

主血脉得熱而散流
溢於胃而胃主肌內
發出於外故成瘡疹
之候楊氏云初生拭
口不則惡穢入腹則
腹滿氣短不能飲乳
者宜用茯苓圓加減
治之附餘又法下胎
毒臨產落草時濃煎
淡豆豉汁服極好不
可與砂黃連車粉
等

補通硃蜜法 小兒
初生先用黃連耳
草法拭口吐其惡

汁稍時更與硃蜜

定魄安神

硃砂一大豆許

右細研以蜜一規

殼許和硃砂抹口

中非獨鎮心安神

能解惡毒之物一

生免痘疹之患

補遺黃蓮法

臨月用黃蓮細切

抱碎綿裹百沸湯

泡拭口

補遺甘草法

預以其草細切少

許產臥時以綿裹

飽亦飽辛辣適口胎氣隨熱情慙動中胎息輟躁或多
食爛燻或恣味辛酸或嗜慾無節或喜怒不常皆能令
子受患其為母者胎前既不能謹節胎後又不能調護
是以惟務姑息不能防微杜漸或未滿百晷而遂與醜
酸之味或未穀週歲而輒與肥甘之物百病由是而生
馬曰吐瀉曰黃疸曰五疳曰腹脹曰腹痛曰水腫曰瘡
曰痢曰痰喘豈非喫食過傷調養失宜之所致與先正
所謂古者婦人妊子寢不側坐不過立不蹕不食爪味
等語厥有旨哉其餘飲食男女養胎幼幼之法必深得
造化生生不息之意故古人多壽考兒少夭折者即此
之由也嘗見今有稟性溫良之婦有娠不嗜慾縱口生
子少病而痘疹亦稀亦可以為師法矣為兒醫者臨証
之際宜察色觀形不可拘於如額亦知心也

脾熱左腮青知為月不飽右腮白知為月不乳
為腎虛之類更參之以虎口三關之脉其小兒之病情
斯過半矣傳曰幼吾幼以及人之幼仁人之心斯言其
可忽諸

又論交蒸

夫小兒之初生血氣未足陰陽未和臟腑未實骨格未全
有交蒸之候每三十二日一發熱或吐或汗或呻吟不
食此為長血脉全智慧之常候不須治而自愈按諸家
所論皆謂乃小兒長骨脉臟腑與神智也自生之日始
每三十二日一變凡人有三百六十五骨除手足四十
五碎骨外止有三百二十骨自生下骨而上一日十骨
三十二日乃為一變骨氣始全一變生一藏或一府十
變則藏府始足每變發為虛熱諸証亦有胎氣壯實暗

沸湯泡蓋內蓋定
收生之際急以軟

綿裹指離甘草汁

拭其口次用黃連

法硃蜜法

補遺牛黃法

與硃蜜同少加牛

黃益肝膽除熱定

精神止譙邪辟惡

氣除小兒百病

噤風

夫噤風者眼閉口噤

啼聲不出舌上聚肉

如粟米伏吮乳不得

口吐白沫大小便皆

通蓋由胎中感受熱

氣流毒於心脾故形

見於喉舌間也抑亦

生下復為風邪擊搏

所致自滿月至百二

十日見此名曰犯風

噤依法將護防於未

然則無此患治風噤

用控痰散吐風痰附

餘不若其草湯極穩

補遺然後和胃益脾

散加減用或牛黃散

補遺又用辰砂膏

和驚即命附餅或手

變而無發熱症者此骨節藏府由變而全胎毒亦因變
而散也為兒醫者可不審乎

脈法總論

按古法曰凡小兒證候難以手太陰尺寸脈診如一歲

至六歲曰嬰孩惟以男左女右手次指三關之脈以為

驗病輕重死生之訣第一節名風關無脈則無病有脈

則病輕 第二節名氣關脈見則病 重尚可以藥治

而已第三節名命關脈見則病劇乃九死一生之惡候

也多不可治七歲八歲曰齒九歲十歲曰髻始可以一

指探掌後尺寸三部之脈而以一息七八至為無病之

常脈十一歲至十四歲曰童少而以一息五六至為常

脈也數則為熱遲則為寒浮則為虛為風沉則為實為

積為痛浮而數者為熱而沉者為寒而數者為實而沉者

為虛而實者為風關勞而虛者為便和沙而可治之

為腹痛緊而弦者為氣急為風寒洪數者為熱伏結為

傷食軟細者為虫疳若氣促脈代散亂無倫次者死在

須臾而不治也業幼科者其可不忍心於此乎

今將手指三關之脈繪圖分注開列于后



一風關易治

二氣關病重

三命關死候

三關青是四足驚 三關赤是水驚 三關黑是人驚

如有此三關通度脈候是極重之証必死餘並可治

風關如魚刺易治乃初驚之候也黑色難治

氣關如魚刺主治勞身熱易治

命關如魚刺主虛風和傳脾難治

握拳噤口不聞者不

治

兩道耳草湯 治揚

口取吐風痰

生甘草一錢

右到水煎服令吐

出痰涎却以豬乳

點入口中即瘥

補遺益脾散

白茯苓 人參

草果煨 木香

甘草 陳皮

厚朴姜製 蘇子炒

石等分為末每二

錢姜東煎服

補遺牛黃散 治七

日口噤

牛黃一錢

未之以竹瀝調一

字灌之更以豬乳

吃

撮口

撮口者旬日黃赤

氣息喘急蹄声不出

蓋由胎氣挾熱薰風

邪入脐流毒心脾之

經故令舌強唇青聚

口撮面飲乳有妨若

口出白沫而四肢冷

風闕盲黑色如懸針主水驚易治

氣闕赤色如懸針主痺病兼肺藏積熱猶為可治

命闕凡有此脉不問五色皆是死候

又三闕通度如懸針者主慢驚風難治

水風闕如水字主驚風入肺咳嗽面赤

氣闕如水字主驚風極夾驚候不拘五色三闕通度

者不治

乙風闕如乙字主肺藏驚風易治

氣闕如乙字主驚風病重

命闕如乙字青黑色主慢驚風難治

風闕如曲虫主痺病積聚胸前而橫排箕子壯皮殼

胖猪脬

氣闕如曲虫主大腸有積積

命闕如曲虫主心腎俱病

風闕如環主肝藏有病積積聚

氣闕如環主疳入胃吐逆不治

命闕如環候惡不治

豔此紋若在風氣二闕易治若在命闕通度難治

此紋若在手上或面上或左右腹脇上

脉曲向裏者是氣疳

脉曲向外者是風疳

脉斜向右者是傷寒身熱不食無汗

脉斜向左者是傷風身熱不食有汗

雙鉤脉者是傷寒

三曲如長虫者是傷硬物

巨兩曲如鉤者是傷冷物

者不可救其或肚脹
青筋吊腸疝疝內氣
引痛皆腸胃鬱結不
通致之治法貴乎疎
利撮口最為惡候一
脈內見之尤急撮風
散或蒸餅散並附絲
或天麻防風湯或強
參膏並補實

補天麻防風湯

明天麻 茯苓去

皮各七分 甘草

細辛多三分

清河參 錢

防風去老羌活

白朮各五分

冬月加桂枝一分

右姜三片水一鍾

煎七分茶匙灌下

補遺蠶毒膏 治撮

口

直蠶毒 白者二枚

去紫蠶毒

右為末蜜調傅唇

口中

臍風

天臍風者斷臍之後
為水濕風冷所乘風
濕之氣入於臍而流

臍一頭如環有獨脚者是傷冷

面上有此點子必是再發之候

受九頭面上或肚腹上有大脉併青筋如此者並是食毒

物及驚積難治

脉如亂虫是當疳亦有虫疳蛇疳食積之疳此日可治

凡脉微細不足者並是風氣俱宜消疳然後取虫積肥

孩兒是良法也

附湯氏察小兒神色總斷

凡看小兒病宜先觀形証神色然後察脉假如肝之為

病則面青心之為病則面赤脾之為病則面黃肺之

為病則面白腎之為病則面黑先要分別五藏形在

次看稟受虧胎氣虛實明其標本而治之無不效

面上諸候形証歌五言

痢疾有頭皺驚風面刺紅消來帶赤亦驚風

又七言

山根若見脉橫青此病明知兩度驚赤黑困疲時吐瀉

色紅啼夜不曾停

又

青脉生於左太陽瀆驚一度見推詳赤是傷寒微燥熱

黑青知是乳多傷

又

右邊青脉不須多有則頻驚寒素何紅赤為風抽眼目

黑青三日見關羅

又

指甲青蕪黑暗多辰青惡逆病多嗟忽作鴉声心氣急

此時端的命難過

於心脾遂令肚脹臍
腫身體重著四肢柔
自日夜多啼不能吮
乳天麻丸附錄甚則

發為風搐若臍邊青
黑撮口不開是為疳
搐不治爪甲黑者即
死矣治臍風用瓜蒂

散麥飲門湯氏治嬰
兒因剪臍傷於外風
致臍瘡不乾用白礬
龍骨為末少許付之

又用舊綿少許燒灰
為末乾摻之或用五
倍子燒存性為末敷

封之初生之兒有熱
在胸堂則劫伸引呃
呃作聲努脹其氣亦

令臍突腫赤虛大可
畏無識之者將謂斷
臍不利而使之然者

非也此乃由胎中母
多驚悸或因食熱毒
之物所作用取下胎

毒天麻丸或定命丹
或硃銀丸之類可量
與之並附錄千金論
云小兒始生其氣尚

盛若有微恙即瀕下
之若不時下遂成大

又
○虬虫出口有三般口鼻中來大不堪如或白虫兼黑色
靈丹縱服病難安

又
○四肢瘡痛不為祥下氣冲心兼滑腸氣喘汗流身不熱
手拿胸臆定遭殃
內八段錦

○血淨為安不用驚若逢紅黑便難寧更加紅亂青尤甚
取下風痰病立輕

○赤色輕微是外驚若如米粒勢難輕紅散多因乘怒亂
更加搐搦實難平

○小兒初誕月胎身瘦兩眉鬢號盤腸氣時啼哭又呻吟
如反目仰視者天吊風也

○小兒初誕月胎身瘦兩眉鬢號盤腸氣時啼哭又呻吟
如反目仰視者天吊風也

外八段錦
○先望孩兒眼色青次看背上冷如水陽男搐左無妨事
搐右令人甚可驚女搐右邊尤可治若逢搐左疾非
輕歪斜口眼終為害縱有仙丹也莫平

○眼中赤脉實難量大數元來一不祥最怕亂紋鋪目下
更兼赤脉貫童光
○顛門腫起定為風此候應知最是凶忽陷成坑如盡足
未過七日命須終
○鼻門黑燥渴難禁面黑唇青命莫存肚大筋青俱惡候
更嫌腹有直身紋
○忽見眉間紫帶青看來立便見風生青紅碎襍風將起
必見疳癥膈氣形

疾疾成則難療矣紫
霜丸可量與之痘疹
門或千金龍膽湯得
利即止直指方加防
風麥門冬以導心熱
黃芩減半北棗煎服
去蟻蝦亦可急慢驚
下或大連翹湯其熱
自散其脈歸本不必
以藥付之願填條下
此証亦宜早治久則
難療也又有一法小
兒脈風撮口初生七
口內患此証者看兒
額上有小泡子如

○亂紋交錯紫嫩青急急求醫免命傾盛紫再加身體熱
須知藏府惡風生
○紫少紅多六畜驚紫紅相等即疳成紫點有形如米粒
傷寒夾食証堪評
○紫散風傳脾藏問紫青口渴是風痼紫隱深沉難治療
風痰祛散命須還
○黑輕可治死還生紅赤傷寒痰積停赤青脾受風邪証
青黑脾風作慢驚
○紅赤連今赤藥輕必然乳母不相應兩手忽然無脉薄
定知衝惡祀神靈
初誕方法
○茯苓丸 治小兒初生拭口不及惡積入腹則腹滿
氣短不能飲乳

粟以油少煎熟
暴指擦破即開口便
安不用服藥亦良法
也安胎散治胎中汁
出補遺 或赤腫用白
石脂末日三度傳之
或湯髮灰或當歸末
付亦任或蝎稍散補
遺傷食不消化消乳
丸附錄
補遺安胎散 小兒
斷胎後便付之
赤脚蜈蚣 一寸多
羚羊角 一 系 裏 煨
存性 射少許

禁風方法
○控痰散 治風噤先用控痰散吐風涎
蝎尾 銅青各五 硃砂 一 系 膩粉 一 字 射香 少許
右為末每服一字茶清調下或用后甘草湯吐痰可
○辰砂膏 治噤風白沫大小便皆通
辰砂 三 系 礪砂
全蝎 各一 系 玄明粉 二 錢 射香 一 字
馬牙消 直珠末
右好油紙封裏自然成膏每服一豆許諸驚金銀薄
苛湯下潮熱甘草湯下乳汁調傳乳上令兒送下
撮口方法
○蚕號散 治初生兒七日不食乳各撮口

乳髮一團燒存性

雀甕一枚

右為末斷勝後付

於臍上

補遺蠅稍散 治百

日撮口瘡風及胎

風

蝎稍四十九个

姜蚕四十九个

腦子另研射少許

另研

先將蝎逐不用薄

荷葉包扎定炒薄

荷葉乾共研細入

磁射末研勻用紫

雄黃用二片煎湯

調下

變蒸

小兒變蒸骨熱煩啼

不已者紫胡湯補遺

變蒸發熱或咳嗽痰

涎鼻塞或挾瘡疹作

熱者怪上散補遺解

利批氣或紫陽里散

附餘變蒸有寒无熱

内必原有寒當歸散

附餘變蒸吐瀉不食

乳者調氣散附餘變

蒸發不鮮并挾寒或

醫者原充

僵蚕四个去茯苓少許

右為末蜜稠調抹兒口内

射香一字 治撮口

全蝎稍 真僵蚕焙 硃砂

釣藤 赤脚蜈蚣各半條

右末每服一字取竹瀝調下竹瀝解熱

○蜈蚣散 治小兒臍風撮口因臍斷傷風或尿在胞中

遂成臍風發熱面赤啼声不出名曰撮口風

赤脚金頭蜈蚣一條瞿麥五分蝎稍四个僵蚕七个

右為末搗毛管吹些少入鼻中如噴嚏叶声可治後

用薄荷汁調與服之

臍風方法

○天麻丸 治臍風又利驚化痰化疳的功

南星焙 白附子焙 輕粉五分 巴霜一字

五灵脂 全蝎焙各一 輕粉五分 巴霜一字

右為末稀糊為丸麻子大每服三丸薄荷姜湯送下

○定命丸 治急驚天鈞撮口通利痰熱

全蝎七个南星炮 白附子焙 天麻各二 硃砂

青代各半 輕粉 射香各五分 片腦一字

右為末粟米糊丸菴豆大每服一丸荊芥薄荷湯化

下先研半丸吹入鼻中一方無腦子

○銀珠丸 治臍風壯熱痰盛翻眼中噤取下胎中蟲

受之毒以利為度

水銀蒸束肉 白附子半 全蝎 硃砂各一

天漿子去壳 牛黃 芦会各二 鈎霜和水

片腦一字 射香各五分 真僵蚕个 南星一字

有食積留乳者

九痘疹或消乳丸

附風條下

往來者利漿飲

補遺柴胡湯

兒變蒸骨熱心煩

啼叫不已

柴胡去芦三糸

清河參去芦

麥門冬去心

甘草各各二糸

川防風去芦

首龍胆各一糸

每服三錢水五分

煎三分服

右為末粟米糊丸芥子大每服一圓薄荷湯下

附○消乳丸又名消食丸治小兒乳哺飲食生冷過度冷氣積

於脾胃為脈沉者傷食不化故也

確砂仁 陳皮 京三稜煨 蓬木煨

神麩炒 麥蘖炒各半 香附子炒一

右為末麩糊丸如麻子大食后白湯送下

變蒸方法

附○當歸散 治小兒胎中受寒而青四肢厥便青心腹

疼內癩

當歸 官桂去皮 川芎 白姜炮

香附 木香 甘草等分

末之每服一字以乳汁調下日三服

附○紫陽里散

補遺糧散 治小

兒變蒸發熱或咳

嗽痰涎壅塞背腫

瘡疹作熱

清河參去芦

雪白水去芦

白茯苓去皮

北細辛去土

芍藥 甘草

桔梗 天花粉

右等分每服二糸

姜煎服有熱加柴

胡

附○梨漿飲

右燒灰存性為末每服一字水煎服抱兒于溫處連

服之有微汗身涼愈

附○調氣散 治變蒸吐瀉不乳多啼

木香 香附 人參 陳皮

藿香 甘草等分

每服一糸姜二片棗一枚水煎服

附○梨漿飲 治小兒潮熱積熱瘡

青蒿取花頭及葉曬干 柴胡 人參

黃芩 全胡 秦 甘草等分

一歲兒五分兩歲一錢生梨一片薄荷一葉生地黃

一寸生藕一片同煎服

急慢驚風方法

急慢驚風

夫急驚風者因聞大論

聲及大驚而發搐發過則如故此元明也當下利驚丸主之以除其熱痰見下不可與巴豆及溫藥大下之恐搖虛熱不消也其候牙關緊急壯熱涎潮竄視及張搐搦顛動驚者十指問合唇口眉眼引頻併口中熱氣頰赤唇紅大小便黃赤其脈浮數洪緊蓋由內有實熱外挾風邪心經受熱而積熱肝經生風而發搐治法宜清涼苦寒瀉氣之藥通關以後且與截風定搐痰熱尚作下之痰熱一泄又須急與和胃定心之劑如搖定而痰熱少者則但用輕藥消痰除熱可也蓋急驚須當下切不可過用寒涼及銀粉巴硝輩蕩滌太驟此等重劑醫家不得已而用之僅去痰即止或不當用而用或當

內經曰諸風掉眩皆屬肝木夫小兒八歲已前曰純陽蓋其真水未旺心火已炎故肺金受制而无以平木故肝木常有餘而脾土不足也為父母者而有失於保養其或衣服寒暄不調以致外邪侵襲或飲食之飢飽失節以致中氣損傷是故急慢驚風之候作矣夫惟急驚屬肝木風邪有餘之証治宜清涼苦寒瀉氣之藥慢驚屬脾土中氣不足之候治宜中和甘溫補中之劑若夫急驚之候因聞不恒之聲或遇駟馬禽獸之吼以致面青口噤或聲嘶而厥發過則容色如故良久復得其身熱面赤引飲口鼻中氣熱大小便黃赤色惶惶不睡蓋驚則生痰上盛則生風偶因驚而發耳宜用李氏利驚丸瀉清丸抱龍丸宣風散五福化毒丹等藥使痰消風散多因飲食不節損傷脾胃以致吐瀉日久中氣虛弱致發搐發則無休止時其身冷面黃不渴口鼻中氣寒大小便清白昏睡露睛目上視手足瘳廢筋脈拘牽蓋脾虛則生風上盛則筋急俗名天弔風者即此候也治宜東垣黃芪湯李氏釣藤丸溫白丸丹溪參朮湯送下硃砂安神丸之類李氏謂急驚為元明之証因心經受熱而脾不能以配陽是為陽盛陰虛之候也謂慢驚為無陽之証因脾土虛甚而脾不能以勝陰是為陰盛陽虛之候也愚按小兒急慢驚風之証其虛實寒熱如天淵之隔故急驚者生一死慢驚者十死一生俗醫多不諳此理混為一途而治誤人多矣業幼科者宜推幼及人之心為心庶免斯世無天折之赤子矣幸甚幸甚

脈訣 並見前總章

用而過用焉佳口由

此而成慢驚矣此證

宜用搖鼻藥通關打

鼻涕才開關後用疎

風化痰退熱藥瀉青

丸或抱龍丸或宣風

散或五福化毒丹並

見下或導赤散發搖

條柴胡天麻等劑便

可無事琥珀散通治

諸驚證之要藥補遺

至聖丹亦可服驚風

條或珍珠丸補遺或

辰砂七寶散鎮心安

神鶴口條此治急驚

發下之心護全安天

補遺琥珀散 治小

兒急慢驚風延劇

昏冒目瞪搐搦筋

吊肚疼及和順痘

瘡小可驚哭眠臥

不安入口立效驚

癩時攻發作常服

永除病根

辰砂一分半

琥珀 牛黃

天麻 乳香

全蝎去毒 蟬蛻

方法

丹溪曰錢氏方乃小兒科之祖其立例極妙若能增損

而用之無不驗也

又曰驚風有二慢驚屬脾虛所生多死宜溫補一云當

養脾用參朮煎湯下安神丸○急驚屬痰熱宜涼瀉

一云用養血藥作湯下降火清痰九子抱龍丸之類

世以一藥通治二証甚謬

○東垣治驚論曰外物驚宜鎮心以黃連安神丸若氣動

所驚宜寒水石安神丸大忌防風丸治風辛溫之藥

必殺人何也卒散溫熱者火也因驚而泄清色先鎮肝

以硃砂之類勿用寒涼之氣大禁涼驚丸風木旺必

克脾胃當先實其土後瀉其木間考志編集錢氏方

以益黃補土誤矣其藥行一香半也收火

虛矣青楠皮瀉肺丁香熟大瀉肝大瀉脾大瀉心

子余脾胃虛反更瀉子而助火重虛其土殺人無疑

矣其風木旺証右關脈洪大掌中熱腹皮熱豈可以

助火瀉金如寒水來乘脾土其病嘔吐腹痛瀉痢清

白益黃散聖藥也今立一方元瀉火補金大補其土

是為神治之法

○黃芪湯 治慢驚風之神藥也

黃芪 人參各二分 甘草五分 加白芍一分

右細切作一服水一大碗煎半盞去粗食遠服

上三味皆甘味能助元氣甘能瀉火內經曰熱淫于

內以甘瀉之以酸收之白芍藥酸寒上能瀉火酸味

能瀉肝而大補肺金所補得金上之位大旺火虛風

木何由而來尅土然後瀉風之邪○又曰夫益黃散

僵石 炒去系背

白附子 牛膽星

代赭石 火旦醋淬

七次各一錢

片腦 一字碎五分

右為末三歲一錢

薄荷湯下慢驚加

附

補遺珍珠丸 治急

驚風

天南星 炮活石

半夏 炮各一錢半

巴豆 二十五个去

殼去油 輕粉

硃砂各五分

右為末麵糊和丸

如黍粟大每服量

湯下傷食茶下一

二或三五丸以利

為度

慢驚風

夫慢驚者多因病後
飲食不節損傷脾胃
以致吐瀉日久中氣
大虛而致發搐發則
无休止時其身冷面
黃不渴口鼻中氣寒
大小便清目昏腫露

理中丸赤神丸之類皆治脾胃寒温大盛神品之藥

若得脾胃中伏熱勞役不足之証及肥熱寒巴豆之

類致胃虛而成慢驚之証用之必傷人命夫慢驚風

者皆由人瀉脾胃虛而生也錢氏以鬼活膏療慢驚

風誤矣脾虛者由火邪乘其土位故曰從後來者為

虛邪火旺能實其木土旺故來尅土當於心經中以

甘温補土之源更於脾上中瀉火以甘寒更於脾上

中補金以酸涼使脾土中金旺火衰風木自虛矣損

食多進藥愈上藥是也

○益黃散 治胃中風熱

黃芪 二兩 陳皮 去白 人參 絡一 白芍 七分

生甘草 炙甘草 絡五 黃蓮 少許

右為細末分三服每服用水一盞煎半盞食前服

○錢氏安神丸 治邪熱驚啼心疳面黃頰赤壯熱

麥門冬 去心 馬牙硝 白茯苓 乾山藥

寒水石 炙甘草 絡五 硃砂 一兩 龍腦

右為細末煉蜜為丸如芡突大每服半丸砂糖水磨

化下慢驚用參朮煎濃汁化下

○錢氏白朮散 治積痛和胃生津止瀉頻瀉利將欲成

慢驚風者服之決效

人參 白朮 木香 白茯苓 去皮

甘草 炙 藿香 絡 乾葛 二錢

右細切分二服每水一盞煎半盞温服○丹溪用芍

藥白扁豆 肉豆蔻 絡一 用姜一片煎○若慢驚風

作加天麻 細辛 各一錢 全蝎 絡三 去 白附子 八分

同煎服不拘時候

脣上視手足痠癢筋
脈拘挛其脈沉遲散
緩此无陽也其疾由
急發用寒涼或轉
下太驟傳變成之乃
脾土虛損不足之症
治宜和中温補之劑
如吐瀉得之則理中
湯加木香以温其中
五苓散以導其水並
傷寒門如臆寒洞泄
得之則与木附湯傷
寒門下積取轉得之
則与調氣散調和脾
胃寒蒸條如外感風

寒得之則与桂枝湯
葛根湯輩並傷寒門
其他可以類推矣然
慢雖属陰亦須准較
陰陽虧盛淺深如何
不可純用温藥及燥
熱之劑惟於生胃氣
中加以截風定搖如
全蝎疆蚕天麻白附
南星輩為良方傳慢
候尚有陽証者不必
回陽但与截風調胃
均平陰陽而已太乙
保生丹或大醒脾散
或婢蝎散並補遺或

○一方治驚風用母丁香二粒細嚼入中白少許以其母
中指取血調擦牙上即甦

○急慢驚風發熱口瘡手心伏熱痰涎咳嗽喘並用湯
法重劑用瓜蒂散輕劑用苦參赤小豆末以酸漿汁
調服吐之吐後稍定更用防風通聖散為末蜜丸服
之間以桑羊乾末米飲調服以平其風氣

○又方 治急慢驚風

薄荷葉 寒水石各半 青代 白姜蚕
硃砂各一錢 全蝎二枚炒 猪牙皂角 槐角各五分
右為細末灯草湯和乳汁調時時灌之

○又方 治慢驚風子母俱服

人參 白木烙一 茯苓 陳皮各五分
甘草 薄荷烙二 半夏 天麻各七分

細辛 全蝎一枚

右細切作一服加姜三片水一盞煎至七分服

○鎮驚丸 鎮驚寧神退心熱夜啼化痰止咳
珍珠一錢 琥珀 天竺黃 雄黃各三 金箔十片
胆星五片 牛黃二片 射香五分 硃砂以三片
右為細末麥麩糊為丸如梧子大每服五六丸薄荷
姜蜜湯化下

○奪命湯 治急驚不省人事目定直視牙關不開唇白
或黑者

南星 半夏各四片 射香 輕粉各五分 金鉞
巴豆去油淨 射香 輕粉各五分 金鉞
良鉞各十片 珠砂四片
右為細末麩糊丸黍米大每歲鬼一丸灯心湯化下

醒脾散 並附錄 或溫

白丸 見下 右陽虧陰

盛病已傳過純屬慢

驚先搖盪友引驚視

之證而但昏沉者星

香全蝎散或四聖散

或為沉湯並附錄或

四君子加川烏全蝎

虛損門 身冷者方用

硫黃附子身燥者天

南星九 附錄 痰甚者

青礞石九 痰飲門 虛

甚不可下痰者靈脂

九 附錄 如腦射巴霜

寒涼通關利腸之輩

一切禁止如未發慢

驚先要睡吐舌搥頭

面青毛髮豎吐乳作

醒額上有汗此證乃

吐後胃虛生風當下

截風醒脾散 附錄 或

四君子湯加全蝎防

風 虛損門 或銀白散

附錄 或釣藤飲去麻

黃見下若四肢厥冷

吐瀉咳嗽面黯神慘

鷓鴣聲胃痛兩脇動氣

口生白瘡髮直搖頭

眼睛不轉涎鳴喘溢

頭軟大小便不禁手

○利驚丸 治急驚風神効

天竺黃 二系 輕粉

右研勻煉蜜丸如梧子大一歲兒一九二歲兒二九

五歲兒三九溫薄荷水食後服

○瀉青丸 治肝熱急驚搖搦等証

羌活 川大黃 溫麻 煨川芎

龍胆草 當歸 防風 羌活 各

右為細末煉蜜如芡突大每服半九至一九煎淡竹

葉湯同砂糖溫水化下

○抱龍丸 治傷風瘟疫身熱昏睡氣粗風熱痰實壅嗽

又治驚風潮搐及蟲毒中暑沐浴後並可服壯實小

兒宜時与服之則免痰熱驚悸之証

雄黃 三系 辰砂 另研 天竺黃 一刃 竹葉 三

天南星 另如死只將生乾者去皮略炒熟用

右為末煮甘草湯丸如皂子大溫水化下百日兒每

丸分作三服一歲兒半丸五歲兒二九童非三五丸

室女白帶伏暑用鹽少許細嚼一二九新汲水送下

臘月用雪水煮甘草和丸尤佳一法用漿水或新水

浸南星三日煮三五沸去皮取白肉切焙炒黃色為

末每八兩用甘草二兩半拍破用水二碗慢火煎至

半碗去粗旋上洒入南星末徐上研之令甘草水淨

入餘藥

○千金龍胆湯 治嬰兒出腹血脉突盛寒熱交作四肢

驚掣併諸痺驚等証

草龍胆 鈞鈞藤 柴胡 黃芩 桂枝

芍藥 各三 螻螂 六枚 茯神 甘草 各三 大黃 五錢

足一邊牽引者不治

補遺太乙保生丹

治慢驚尚有陽証

全蝎青者十四个

白附子生琥珀

僵蚕炒 蝉蜕

膽南星硃砂

防風各一条

麝香五分

末之粟米糊丸梧

子大金箔為衣薄

荷湯下二九

補遺大醒脾散

白茯苓 南星

橘紅各一錢

甘苦參 人參

白附子焙木香

全蝎焙去足

石蓮子各五分

陳倉米二百粒

每服二錢姜棗煎

服驅風醒脾通用

補遺蟬蝎散 治方

傳慢驚

全蝎七个去稍

蝉蜕二十去翅足

甘草炙二錢半

南星一个泡香

每服二錢水煎溫

服

右細切用水一升煮至五合徐上服之

○宣風散 治急驚風搖擗不定

枳榔

陳皮

甘草絡五

黑丑四兩半

右為細末二三歲兒蜜湯調下半錢已上一錢食前

○五福化毒丹 治急驚風痰熱搖擗等証

桔梗微炒

玄參炒各 青代

牙硝各二

人參二刀

茯苓去皮 甘草炙兩

銀鉤八片為

金鉤八片 射香五分另

為末入研藥拌勻煉蜜丸每兩分作十二丸一歲兒

每一九分四服用薄荷水化下瘡疹餘毒上攻口齒

涎血臭氣以生地黄自然汁化一丸以雞翎刷口內

○金鉤丸 治急慢驚風痰壅盛

半夏湯泡

天竹石 煨裂白付

雄黃

龍腦

射香各五分

金鉤二十片

右為細末姜汁調爽打糊丸梧子大每服三五丸

至一二十丸人參湯下慢驚去龍腦

○釣藤飲 治吐利脾胃氣弱虛風慢驚

釣藤各五分 蟬蛻

防風去芦

人參

白姜炒

天麻各二分 蝎尾去毒 甘草炙

麻黃去心 川芎各五分

右細切作一服水一盞煎至六分溫服量人大小加

減分數與之虛寒者加附子末半分

○溫白丸 治小兒脾氣虛弱瀉泄瘦怯冷疳泄瀉及吐

吐瀉久病轉成慢驚身冷瘳癢等証

天麻半兩

白僵蚕炒

白附子生

全蝎去毒炒

天南星各二分

天南星各二分

天南星各二分

天南星各二分

天南星各二分

天南星各二分

天南星各二分

脾風

脾風之候面青額青
舌短頭低眼合不開
轉中搖頭吐舌頻嘔
腥臭禁口咬牙手足
微搐而不休或身冷
或身溫而四肢冷其
脈沉微陰氣極盛胃
氣極虛于救一二蓋
田慢驚之後吐瀉損
脾病傳已極總歸虛
風惟脾所受故曰脾
風治法大要生胃回
陽黑附湯川烏散並

附餘或四君子湯加
生附一分可斟酌用
之極損脾胃氣若復
厚其散散溫平而
調理之若眼半開半
合手足不冷其慢驚
証候尚在當化痰鎮
心或金鎖鎖心丸與
服之見勿用回陽
亦要訣也或已入慢
脾而陽氣未甚脫者
亦不可用硫黃附子
丸服回陽湯劑手足
漸暖者仍以醒脾散
等繼其後以調之不

右為細末湯浸寒食麩為丸如菜豆大每服五七丸
至二三十丸空心姜米湯下

○涼驚丸 治驚風

草龍胆 防風 去芦 青黛 歸二錢
黃連 錢 兩二龍腦 一錢 牛黃 射香 各一字

右為細末麩糊丸如黍米大每服三五丸至一二十
丸煎金鉤湯送下

○醒脾散 治吐瀉脾困不食

全蝎 五 白附子 泡 天麻 泡 甘草 炙 石菖蒲
人參 白茯苓 木香 石蓮肉 白木 各一

每服二錢陳倉米二百粒姜末煎服有熱者去木香

○星香全蝎散 治慢驚風痰搐

南星 溫 稀 煨 木香 不見火 獨 紅 絡 人參

今蝎 人 其 草 分 在 幸 加 防 風
右劉細每服二錢入薑蘇薑棗濃煎旋以匙送下

○四聖散 治慢驚痰滯壅熱

全蝎 七 个 真僵蚕 竹 四 天南星 七 錢 真川烏 三 錢
右將南星為末水調作餅裹蚕蝎川烏外用溫紙重

包慢火灰中煨令赤色頓地上一伏時為末每服一

錢煎金銀湯點茶清調下

○烏沉湯 治慢驚驅風助胃

天麻 二 錢 人參 真川烏 生 用 木香
全蝎 煨 南星 煨 沉香 各 一 錢 甘草 五 分

右劉散每服二錢姜三片慢火煎取其半用之

○靈脂丸 治慢驚痰盛搐搦

五灵脂 醋 潤 白附子 各 煨 木香 錢 半 全蝎 煨

可輕易用極劑也緩
脾身冷粘汗直臥如
尸喘嗽頭軟皆直口
噤搖頭痰如牽鋸之
聲面無潤澤之色縮
唇氣粗者不治或灸
乳頭穴或多百會穴
十可救一並補遺

補遺灸法

一灸小兒驚風男左
乳黑肉上女右乳
黑肉上周歲者灸
三壯二三歲者灸
五七壯可量人大
小減增

灸小兒慢驚慢脚
危症藥力不到者
但看兩脚面中間
陷處有太衝脉即
灸三壯又百會穴
上灸之其穴直取
前後髮際折中橫
取兩耳大折中在
頭之中心端正旋
毛處是也如有雙
旋及旋毛不正者
非艾炷約小麥許
但灸三五壯而止
灸後仍以醒脾散
等補之附餘

南星溫南炮硃砂一錢直姜各五分全蝎半

末之米醋煮生半夏糊丸麻子大每服三九姜湯下

附○銀白散

治糞青止吐瀉壯胃氣

糯米炒

扁豆蒸各

藿香

白木各二錢

丁香二錢

甘草錢三

右為末紫蘇米飲調下加天麻砂仁白茯苓快脾正

色直指方加炮白附全蝎木香石蓮肉姜一片煎

附○釣藤散

治吐利脾胃氣虛生風慢驚

釣釣藤三錢

蟬蛻

天麻

防風

蝎尾

人參各半兩麻黃去節

僵蚕

甘草灸

川芎各二錢麝香不拘多少

右剉散白水煎寒多加附子末半錢

附○黑附湯

治慢脾風盛四肢厥冷

附子三錢

木香半

白附子

右剉散每服三錢姜五片煎取其半以匙送下

附○川烏散

驅風回陽

真川烏生

全蝎

木香各五分

右為末每服一錢姜四片煎取其半旋滴入口中嘔

吐者加丁香

附○異攻散

治吐瀉不思飲食溫中和氣

人參

茯苓

甘草

白木

橘紅

木香各等分

右細剉每服二錢姜棗煎服一方去木香

附○蝎附散

四陽氣豁風痰

全蝎七個

附子炮二

南星炮

白附子炮

右剉散每服五分姜四片慢火煎服

發搐

驚癇發搐男目左視無聲右視有聲女目右視無聲左視有聲相勝故也早晨發搐因寅卯辰時潮熱目上視手足動搖口流熱液頸項筋急此肝火大旺也治當補腎水以抑肝火補腎地黃丸諸痺條抑肝瀉青丸急慢驚風條日午發搐因巳午未時潮熱心神驚目上視

白睛赤色牙關緊急口內流涎手足動搖此心火大旺治當補肝瀉心補肝用地黃丸諸痺門瀉心導赤散見下或涼驚丸急慢驚風條日晚發搐因申酉戌時潮熱搐而痰喘目微和視睡則露睛手足冷大便下泄淡黃水是肺火旺也治當補脾而抑心肝補脾益黃散諸痺門抑心導赤散見下抑肝瀉青丸急慢

發搐方法

○導赤散 治心熱

生乾地黃 木通 甘草各等分

右細切每服三錢水一盞入淡竹葉七片同煎至半盞食後溫服一方無甘草有黃芩

○大青膏 治小兒傷風吐瀉心溫不涼熱

天麻 青代各一條 白附子一錢 蝎尾云毒

烏蛇肉酒浸 硃砂 天竺黃 射香各一

右為細末生蜜和成膏每服半皂子大或一皂子大月中兒粳米大同牛黃膏溫薄荷水化一處服之五歲已上同甘露飲服原本有天麻元大青散此知調孝忠加成方也

○牛黃膏 治熱及傷風壯熱引飲

雄黃 寒水石生 餅消 此各二

右為細末和勻蜜和成膏每服半化下後服

○甘露飲 治心胃熱咽痛口舌生瘡併瘡疹已發未發皆可服○又治熱氣上攻牙齦腫牙齒動搖含嗽併

服方見痘疹門

○白餅子又名五餅子 治小兒腹中有癖但飲乳嗽而生痰

滑石 輕粉 半夏湯泡 南星各一條

巴豆二十四粒去皮膜用水一升煮水盡為度一作水三升

右研勻巴豆後入衆藥以糯米飯為丸如菉豆大捏作餅子三歲已上兒三五餅已下一二餅煎薄荷湯

下臨卧服

○通關散 治驚風搐弱關竅不通皆由痰塞中脘留

滯百節所致痰之所以潮塞者氣實使之

驚風條 夜間發搐因

交子丑時潮熱不甚

搐而臥不穩身體溫

無壯熱目睛急仰視

喉中有痰大便燥結

色乳食不消多睡不

省不納津液治當補

脾抑心補脾益黃散

諸疳門抑心導赤散

見下或府荷丸急慢

驚風下若傷風後發

搐口中氣出熱呵欠

頓悶手足動搖治當

發散大青膏主之見

下小兒稟賦素怯者

南星條一

射香一字

赤蜈蚣一條

直僵蚕二味共

猪牙皂角二名各

燒存性

右為末以手點姜汁醮藥少許擦牙或用物引滴水

入藥兩三點迺出自開

附○嚏開散

半夏生各

皂角五分

右為末用一豆許用管子吹入鼻立醒

附○開關聖散

赤蜈蚣一條中分為兩片各

用葱汁浸一宿焙乾

全蝎亦中分為兩片各許左右以二

物詳左右

右各為末左眼翻左手搐以右藥末搐入左鼻孔右

眼翻右手搐以右藥末搐入右鼻孔雙眼翻雙手搐

兼之

多病此感傷後發

搐身熱溫多睡多唾

或吐不欲飲食而發

搐當先定搐搐退白

餅子主之見下後服

安神丸附餘又百日

丙發搐者不過三

兩次必死假者外傷

風冷口中氣出熱也

宜發散大青膏或塗

額法浴体法並見下

或至至保命丹下發

即定附餘有熱不大

便者下之即効七室

洗心散書口瘡條或

附○至聖保命丹

治小兒胎毒內風月日

安夜多啼哭鎮心安神化除一切驚風清症

全蝎十四箇去毒

防風二各

僵蚕絲去

天麻各二

射香五分

金鉞十片

南星炮

白附子

射香五分

右批証加牛黃腦子研砂

右為末粳米糊丸每兩作四十九

附○安神丸

人參

茯神

麥門冬

山藥各二

龍腦

龍齒各一

寒水石五分甘草五分

硃砂五分

金鉞二片

錢氏方有馬牙消龍腦

右為末煉蜜丸如芡實大每服一丸灯心湯化下

附○天麻防風丸

一切驚風壯熱痰盛惡仰

姜蚕炒

天麻煨

防風

人參各一牛黃一各

寬熱飲 天鈞條 却用
截風定搖 毒劑調理
天麻防風丸 附餘或
龍齒散 夜啼門 或鈞
藤散 慢驚條 有執瘡
亦或不語 防風通聖
散 中風門 或大連翹
湯 額填條 下大凡此
証要看 握拳 順逆 若
搐順 則易調理 搐逆
恐其復潮 先用通關
散 或嚏開散 或開關
散 或至聖保命丹
並附餘 或有風湯中
風門 後隨証用藥

癩

癩曰五癩 病關五臟
面赤目強 吐舌齒
心下煩燥 氣短息數
者曰心癩 面青唇青
其眼上竄 手足羸瘦
抽掣 友折者曰肝癩
面黑而晦 振目視人
口吐清沫 不動如尸
者曰腎癩 而如枯骨
日白反視 驚跳搖頭
口吐涎沫 者曰肺癩
面色痿黃 眼睛直視
腹滿自利 四肢不收

全蝎 一 辰砂 雄黃 各二 甘草 二 射香 二

塗額法

射香 蜈蚣末 牛黃末 青黛末 各一

蝎尾 去毒 薄荷葉 五分

石同為細末 研勻 熟棗肉 劑為膏 以錦上塗 勻貼額

上四方可出一指許 火上炙 手頻慰 百日裏 外兒可

用此及浴法

浴躡法 治肥胎併胎怯胎法

烏蛇肉 酒浸 白礬 青黛 各二 天麻 二

蝎尾 去毒 硃砂 各五分 射香 一字

右同研為細末 每服用三錢水 三碗 帶葉挑枝 一握

同煎至十枚 沸溫熱浴之 勿浴背

伍癩散

凡治小兒伍癩 皆當隨臟治之 每臟各有一散

如大癩 及折上竄 大叫肝也 牛癩 目直視 腹

叫脾也 雞癩 驚跳 反折手 縱雞叫肺也 豬癩

尸吐沫 猪叫腎也 羊癩 目瞪吐舌 羊叫心也 心

癩重者 死病後 甚者 亦死 治法 並用五色丸 主之

五色丸

硃砂 另研 珍珠末 各五 水銀 二 雄黃 一

黑鉛 二 銀 當作二 者為是 無礙矣

右煉蜜丸 如麻子大 每服三四丸 煎金銀薄荷湯下

細辛大黃湯 治風癩內熱

天麻 防風 各半 兩 細辛 大黃 焙

川芎 各二 甘草 一

小兒見明

者曰脾癰此五臟之

證然也調理之法惟

以驚風食三種陰閉

二証別而治之風癰

者汗出解脫風邪乘

虛其初屈指數有熱

生痰也治宜散風星

蘇散補遺或散風散

或薄荷湯獨活湯或

牛黃丸並附餘或天

麻丸勝風條驚癰者

震駭恐怖打墜積癰

其初驚叫大啼恍惚

失魂是也治宜利筋

斷癰丹補疔或錢氏

蜂黃丸或養生必用

絕黃丸或比金丸或

七寶鎮心丸或清神

湯並附餘食癰者食

時得驚悸宿結滯其

初吐乳不哺大便酸

臭或結成乳癖先寒

後熱是也治宜消積

續以定癰等劑主之

五色丸見下或妙至

丹附餘別之以陰陽

始者身體有熱抽掣

啼叫是謂陽癰陽病

右劉散每服一錢入羶角少許煎服	○散風散 治風癰失用此	羌活 獨活 防風 天麻 人參 <small>去芦</small>
荆芥 川芎 細辛 牛胆南星 <small>紅</small>	右為末煉蜜丸梧子大每服二九薄荷茶蘓湯調下	○薄荷湯 治夾驚傷寒極熱變蒸
薄荷葉 <small>半刀</small> 羌活 全蝎 甘草	麻黃 <small>去節</small> 僵蚕 <small>炒去絲</small> 天竺黃 白附子 <small>各半</small>	右為末薄荷湯下熱極生風和竹瀝少許勻服
○獨活湯 治風癰解表通裏	獨活 麻黃 <small>去節</small> 川芎 <small>各</small> 大黃 <small>焙</small> 甘草 <small>各</small>	右劉散每服一錢姜二片煎服
○牛黃丸 治風癰迷悶搐掣延朝	牛胆南星 全蝎 白附子 天麻 直姜 <small>炒</small> 蚕 <small>炒</small> 麝 <small>各</small> 射香 <small>五分</small>	藥末丸如菽豆大每服二九荆芥生姜湯下
○錢氏蛇黃丸 治驚癰	蛇黃 <small>二個火</small> 鬱金 <small>七分</small> 麝 <small>另研一字</small>	右為末粳米飯丸如桐子大每服二三九煎金銀磨
刀水化下	○養生必用蛇黃丸	蛇黃 <small>煨醋</small> 青礞石 辰砂 雄黃 <small>各</small> 鐵鏹粉 <small>四錢研極細</small>
右末化蒸餅為丸用金銀剪刀股湯五歲已上吞下	幼小化下如麻子大丸	

送原流

小兒門五

十一

始者身体无热手足

清冷不抽掣喘叫是

謂陰癩陰病脉沉面

色黯晦病在五臟骨

髓此最難痊或以印

臥属陽覆臥属陰亦

可參驗盖陽証不可

用藥陰症不可用寒

代赭石散附錄若小

兒有熱有痰不欲乳

咽睡臥不安時驚悸

此皆發癩之漸即以

紫霜九等之疳六門

或當歸大黃湯或化

風丹並附錄諸癩暗

不能言者蓋咽喉為

氣之道路風傷其氣

以掩其道路之間抑

亦如滯於心竅不

通所致耳星蘇散咳

之嗽效補遺或甘遂

猪心煎湯下蘇合香

丸諸氣門或全蝎五

癩丸附錄

補遺星蘇散 治諸

癩口禁不語

天南星 各炮剉散

每服一錢姜四片

紫蘇五葉煎取其

半却入雄猪膽以

附○比金丸 治驚癩先用此

人參

硃砂

南星

右為末煉蜜丸桐子大每服一九薄奇湯調下

附○七宝鎮心丸 治驚癩心熱

遠志肉桂雄黃

珠砂路金銀箔二十射香少許

右為末棗肉丸桐子大每服一九麥門冬煎湯下

附○清神湯 治驚癩

犀角 遠志姜製白鮮皮 人參

石菖蒲 甘草一錢

右為末每服一錢去心麥門冬煎湯調下

附○妙聖丹 治食癩通用

代赭石煅雄黃

杏仁去皮尖微已豆膜出油

輕粉 麝香各一

右為末蒸棗肉丸桐子大每服一九木通煎湯調下

附○代赭石散 治陰陽癩通用

代赭石 煨醋淬研為末水飛過日乾

右為末每服五分以金銀煎湯和金銀箔調下連進二

服良久小兒脚脛上自有赤班即邪毒發出其病隨

瘡若無赤斑則治難也

附○當歸大黃湯 治諸癩壯熱利下心中惡血

大黃溫紙包甘草炙當歸三錢赤芍藥各三

半夏制川芎各錢

半却入雄猪膽以

許溫和服

補遠斷癩丹 治癩

差後復作証候多

端連綿不除

黃芪 密水塗炙

釣藤鈎 細辛

甘草 各半兩

蟬蛻 四個洗去土

蛇蛻 三寸酒塗炙

牛黃 一字另研

右末煮棗肉和丸

麻子大人參湯下

一歲十九

天鈎

天鈎者壯熱驚悸眼

目翻騰手足抽掣或

有笑甚者爪申皆

青此由受

度毒氣入乳使兒心

肺生熱痰鬱氣滯加

之外挾風邪故也解

利風熱則愈潮熱鈎

藤飲鴛啼加蟬防天

麻附餘鴛擊涼鴛丸

諸痺門有痰抱龍丸

急驚條或滾痰丸

飲門手搖搦腹熱食

積乳癖生痰動寬熱

飲附餘

石為末每服一錢姜棗煎服

化風丹 涼風化痰退熱定搐

龜活 獨活 防風 天麻 牛胆南星

人參 去芦 川芎 荊芥 粉草 全蝎 等分

右為末煉蜜丸芡實大薄荷湯調下一方加辰砂麝

附 〇金蝎五疳丸 治小兒五疳

南星 錢半 射香 一字 全蝎 防風

硃砂 細研 遠志 姜制焙 白附子 生 蘆薈

延胡索 錢各一 金銀鈎 各三 赤蜈蚣 一條去頭足

右為末入射熟糊丸桐子大每一丸薑蒲茶煎湯

調下

天鈎方法

附 〇釣藤鈎

治小兒夜啼乃感冷也食感於夜則冷動

冷動則為陰極發躁寒盛併疾所以夜啼不眠也

釣藤鈎 茯神 茯苓 川芎

當歸 木香 白芍藥 甘草 各一

右為末每服一錢姜棗煎服其或心熱煩啼必有

臉紅舌白小便赤澀之証去木香加硃砂末一錢研

和每服一錢木通湯調下或劉散煎服亦可

附 〇寬熱飲 治小兒中天吊手足搖搦肚腹有熱

大黃 一兩 朴硝 半兩 甘草 一兩 枳殼 水瀝之

以巴豆四十九粒去 皮膜同炒去巴豆

末之每服一字或伍分薄荷湯調下

內鈎方法

〇釣藤膏 治小兒腹中極痛乾啼後軀名盤腸內鈎

乳香 沒藥 木香 姜黃 片各 木鱉 三個

油

油

內釣

內釣者腹痛多啼唇黑囊腫偃僵反張眼有紅筋斑血蓋由寒氣壅結蕪胎中驚風而得之先是內臟抽掣極痛狂叫或泄瀉頻脚忍痛啼叫過後証抽掣又來宜分兩項下藥內証服釣藤膏魏香散乳香丸木香丸並附餘外搗服釣藤飲天釣條或保命丹桑搗條

右為末蜜丸芡實大釣藤湯磨半丸入蜜服

附○魏香散 先服釣藤飲後服此

蓬木 五錢 阿魏 二錢
右先將溫酒化阿魏浸蓬木一晝夜焙乾為末紫蘇米飲調下

附○乳香丸 治驚風內釣腹痛驚啼

乳香 五分 沒藥 沉香 各一錢 蝎稍 十四个

雞心棋榔 一錢半

右為末煉蜜丸桐子大每服二九葛蒲釣藤湯調下

附○木香丸 治病如前

乳香 另研 沒藥 另研 全蝎 各五分 釣藤

舶上面香 木香 各一錢
右大蒜少許研細和丸桐子大每服二九釣藤湯下

盤腸氣

盤腸氣者痛則腰曲乾溺額上有汗是小腸為冷氣所搏然耳口閉脚冷上唇乾是也此是生下洗遲感受風冷或青糞不爽却有此証釣藤膏魏香散內釣條蘇合香丸諸氣門當歸散附餘母服烏沉湯慢驚條沉香降氣湯附餘

盤腸氣方法

附○當歸散 治小兒夜啼者臟寒而腹痛也面清手冷

不吮乳是也宜此方

當歸 去芦 白芍藥 人參 各一錢 甘草 炙

桔梗 橘皮 焙白

右為末水煎半盞時上少與服又有熱痛亦啼叫不

止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃丸人參湯下

附○沉香降氣湯 滯氣胸膈痞塞心腹脹滿喘促短氣

乾噦煩滿咳嗽痰涎

香附子 炒去毛 沉香 一錢 砂仁 三錢 甘草 七錢

右為末每服一錢入塩少許沸湯點之清晨霧露空

心服之去邪惡氣使無癰瘕

驚風方法

驚風

驚風

十四

驚風者虛惕怔忡氣
怯神散痰涎來去其
瀉必青漸生風而未
至風也驚邪人心則
面紅臉赤惕之夜啼
驚邪入肝則面目俱
青眼睛窳視驚邪入
腎則面黑惡叫喘奶
咬牙驚邪入肺則面
色淡白喘息氣乏驚
邪入脾則嘔吐不食
虛汗多睡面色淡黃
振麻視之虛則散而
濡實則數而駛治宜
鎮驚化痰安神定志

亦須究何臟受病之
處而調理之虛者溫
之實者利之熱者涼
之是謂治法之大要
也嗆喘聲浮者易治
沉者聲不響難痊又
有積積者受驚日久
積而成之其狀額上
有汗涕息煩渴潮熱
往來肚皮有執腫中
竟腹內有物跳動瀉
下如白脂豆沙是也
當重輕重而疎導之
仍丹調胃和氣取愈
大凡小兒腹中或熱

附○青龍丸 治驚積有熱

青黛

茯苓

芫膏

南星

射香

輕粉

巴霜

全蝎

右先將巴豆研如泥次入諸藥研極細丸如梧子大
硃砂為衣每服一九薄苛湯送下

附○至空丹 治諸癩急驚心熱客忤煩躁風涎搐搦

生犀屑

生玳瑁屑

琥珀

雄黃

金鉤

安息香

射香

牛黃

右生犀屑玳瑁搗為細末研入諸藥令勻將安息香
膏以重湯煮化和搜為劑如乾即入少熟蜜毫罈中

旋丸如桐子大二歲兒服二九人參湯化下

附○人參羌活散 治傷寒風驚熱或中風體硬可

黃乾葛 薏苡仁

川羌活

川獨活

前胡

柴胡

川芎

白茯苓

桔梗

枳殼

人參

也骨皮

天麻

甘草

右剉散生薑薄苛煎加蟬蛻治驚熱

附○防風導赤散 治小兒初驚

生地黃

木通

防風

甘草

有熱加 黃芩 赤芍藥 羌活

右剉散每服三錢水一盞竹葉少許同煎

附○蟬蛻釣藤飲 治肚疼驚啼

釣藤

天麻

茯苓

川芎

白芍藥

甘草

蟬蛻

川芎

右剉散灯心煎加木香麥門冬去心防風羌活

或脹次硬皆為內實

法當疎利辰砂高靈

風條或青丸附餘

見疎利之劑皆可隨

証用之熱甚心經煩

渴者至空所解之或

人參羌活散或防風

得赤散或蟬蛻鈞藤

以並附餘或天麻丸

臍風條大便秘澁者

一室洗心散加辰砂

附餘大小便不利者

神膏丸附餘或寬熱

飲內鈞條輕者化辰

丹或安神丸並發搐

條煩燥清心丸附餘

諸疳

如心疳者即驚疳也

面黃頰赤煩滿壯熱

心煩虛驚口瘡治宜

補心扶苓丸補遺或

安神丸發搐條疳疳

者即風疳也搖頭揉

目白膜遮睛合面而

睡汗流面色青黃髮

立青筋腦熱羸瘦法

當補肝地黃丸見下

生熟地黃丸天麻丸

附餘脾疳者即虫疳

五季源流

附○七室洗心散 治小兒煩熱生瘡兼治驚風

生地黃 荊芥穗 防風 甘草

黃芩 羌活 赤芍藥各等

右為末入辰砂減半加當歸尤效每服一錢灯心薄

荷湯調下空心食前服

附○神芎丸 治驚風潮搐大小便不利者

大黃生 黃芩各二 生牽牛末兩 滑石四兩

黃連 薄荷藥 川芎各半兩

右為細末滴水丸桐子大每服四五丸食後溫水

下一方加蒲黃止血証用

附○清心丸 治驚熱煩燥

人參 茯神 防風 硃砂

柴胡各二錢 金鉞三十片

右為末煉蜜丸如桐子大每服一丸竹瀝調下

諸疳方法

論

內經曰救食肥令人內熱救食耳令人中滿蓋其病因

肥其所致故命名曰疳若夫極穢中之乳子與四五歲

之孩提乳哺未息胃氣未全而穀氣尚未克也父母不

能調助惟務姑息舐犢之愛遂令恣食肥甘與大瓜菓

生冷及一切烹飪調和之味朝飧暮食漸成積滯膠固

以致身熱體瘦面色痿黃或肚大青筋疳痛瀉利而諸

疳之証作矣錢仲陽曰小兒病疳多因大病後或吐瀉

後以藥下之致脾胃虛損亡津液而成蓋此証實由愚

醫之所害耳斯言也特一端耳未可悉以為然其所謂

大病吐瀉豈非飲食之所致與夫仲陽為兒醫之祖豈

不

不

不

不

五季源流

廿六

也腹脹氣粗利下酸
臭愛喫土法當補脾
益黃散香蟾丸並見

下脾積丸靈脂丸疳
積餅神效換肌丸並
補遺肥兒丸黃土丸
五疳消食丸並附餘

肺疳者即氣疳也咳
嗽氣逆多喘揉鼻咬
甲寒熱往來亦當補
脾益黃散見下此虛

者隨其母也或清肺
湯或化愚丸並附餘
鼻下赤爛蘭香散或
白粉散並見下腎疳

者即急疳也腦熱肌
削手足如冰腹疼滑
泄通身瘡疥齒腫斷
宜其則牙齦潰一時

俱脫世俗謂之走馬
疳若不急治其齒俱
脫惡不可言法當補
腎地黃丸見下或銅

青散附餘此五疳也
五疳之外又有熱疳
者朝熱如火大便澀

滯胡黃連丸見下令
疳者時時泄利腹痛
虛汗不止至聖丸有
餘或木香丸見下脊

有誤即其所論諸疳形証治法班班可攷孝者不可不
審諸

脈法並見前總章
方法

○地黃丸補肝治疳疔疳白膜遮睛筋疳瀉血腎疳身瘦瘡
疥骨疳喜卧冷地又治胃怯不言解頤小兒年長不
能行者專服神效

熟地黃酒洗 山茱萸 乾山藥 澤瀉
牡丹皮 白茯苓各三錢

右為細末煉蜜為丸如梧子大三歲以下兒三丸至
五丸熱水空心化下年長者量增丸數
○益黃散散名補治小兒脾胃虛寒脾疳體黃腹大好食
泥土肺疳氣喘口鼻生瘡等証

陳皮 青皮 枳子皮
右作一服細切水一盞煎至六分溫服○愚每於本
方加參朮各二錢効

○木香丸 治瘦冷疳
射香研 續隨子去 木香 青皮
肉豆蔻 枳榔各二錢 蝦蟇大肚者一名蟬酥俗
右為末煉蜜丸如菉豆大每服三五丸至一二十九

薄荷湯送下
○胡黃連丸 治肥熱疳
胡黃連 宣黃連各半 硃砂二錢半

右為細末和勻填入豬膽內用沙漿焙以秋子如鉅
子上用線釣之勿著底候一條時取出研入芫荽射
香各一分飯丸如麻子大每服五七丸至一二十九

疳者食積者熱
黃瘦煩熱下痢拍背
如鼓鳴脊骨如齒齧
十指生瘡頻噉爪甲
大蘆薈丸附餘腦疳
者頭悶腦熱滿頭生
瘡身汗顯腫腮高眉
膽丸附餘乾疳者瘦
瘁少血舌乾目睛不
轉乾喘身熱手足清
冷皮燥便結搭口癡
眼黃連丸附餘疳渴
者臟中有風熱疳氣
如之乳母恣食五辛
酒麵炙煨使兒心肺

瘰癧日則消渴飲水
乳食不進夜則渴止
黃連丸附餘疳瀉者
毛焦唇白額上青紋
壯大腸鳴泄利香寇
丸附餘或如聖丸見
下疳痢者挾外邪或
停宿滯水穀不聚煩
下惡痢木香丸附餘
疳腫脹者虛中有積
毒與氣并故腹肚頭
面四肢浮腫蘆薈丸
或祖傳枳榔丸並見
下蛔疳者多喘嘔清
水腹痛青筋唇口紫

米飲下○一方是蝦蟇半兩焙乾不燒

○蘭香散 治外疳鼻下赤爛

蘭香葉名各二錢 燒存性 銅青 輕粉各五分

右為細末乾附之

○白粉散 治疳瘡

烏賊魚骨末一七 白芨末三 輕粉一七

右為件和勻先用清漿水洗瘡拭乾付之

○如聖丸 治冷熱疳瀉

史君子去殼 白無羨去麥 胡黃連 川黃連略二

射香另研 乾薑煮成

右為細末以蠶蟬膏和丸如麻子大二三歲兒五七

九已上十九至十五九人參湯下不拘時服

○香焙丸 治疳消食積虫積肉積及治腹脹大

三稜 蓬莪朮 青皮 枳殼

神曲炒 麥蘖麩 草龍胆 枳榔各半兩

木香二錢 川練子 史君子 胡黃連

川黃連略四 白木一兩 乾蟬伍

右以白木以上藥俱研為細末以乾蟬用醋煮爛成

膏和藥如乾再加醋糊丸如麻子大每服十五丸清

米湯送下

○芳薈丸 治小兒疳氣腹脹骨熱

芳薈 木香 枳榔各二錢 蠶蟬酒浸炙

黃連 蕪荑去皮 青皮 陳皮各五分

右為細末猪胆汁丸小豆大三歲兒三十九米湯下

○又方 治疳腹大

胡黃連去疳積 阿魏醋浸去肉積

黑腸頭及齒疳妙應

九附餘疳疔者骨蒸

潮熱盜汗腹急百黃

肌瘦飲食不為肌膚

黃氏湯或驚血則並

附餘丁案疳者手足

極細項小尻高肉削

體瘦臍突號哭胸陷

或生穀瘕愛喫生米

十全丹附餘哺露疳

者虛熱往來頭骨分

開翻食吐虫煩渴嘔

噦十全丹附餘無辜

疳者腦後項邊有核

如彈按之轉動軟而

不疼其間有虫如水

粉蚶皮丸補遺不速

破之則虫隨熱氣流

散搖蝕臟腑以致肢

體癱瘓便利膿血壯

熱羸瘦頭露骨高初

起可用鍼破膏藥貼

之得之於浣衣時投

兒衣露簷下為雌鳥

落羽所汚兒着此

衣虫入皮膚故也若

以用火烘着則死此

康凡此之類皆疳症

也皆依本臟而補其

母則子自安假令日

川黃連

又去積熱

神曲

食積射香 各一門子四粒

右細末猪胆汁和丸麻子大每服三十九白木湯送

下○一方有芦薈半錢

○又方 治小兒疳病

黃連

白木

山查肉 各五 胡黃連

芦薈 各二錢 蕪荑 二錢

神麩

右為細末猪胆汁為丸麻子大量兒大小加減丸數

與之

○生熟地黃丸

肝疳白膜瘕睛合面而卧肉色青黃

髮立筋青壯熱羸瘦

生熟羊酪 各半 川芎

赤茯苓

黃連

杏仁

半夏 炮制

天麻

甘草

當歸

枳壳

地骨皮 各一 黑豆 四

未之煉蜜丸菜豆大每服三十四十九空心白

○天麻丸

治肝風疳上眼

青黛

川黃連

天麻

五靈脂

川芎

芦薈 各二 龍胆草

蟬蛻 去

防風 各錢

全蝎 二枚

射香 少許 乾蟬頭 三枚

○肥兒丸

治身黃肚急痞塊泄瀉瘦弱脾疳及諸疳

胡黃連

三稜

神麩

木香

史君子 去

浸透去皮 芦薈 半兩

枳殼

香附子

義木

陳皮

麥蘗 炒

川黃連

青皮 各

末之曲蘗糊丸菜豆大每三四十九空心白湯下

○五疳消食丸

消疳殺虫退熱磨精進食

史君子肉 炒

麥蘗 炒

陳皮

羌莖

中潮熱是心經虛熱

也肝為心之母宜先補肝上實而後瀉心

心得母氣則內平而潮熱愈矣餘皆倣此

大抵小兒之臟腑柔弱不可痛擊天下必

亡津液而成痲症為兒衣常當以幼之

心為心而善調之母縱巨膽妄為施治以

絕人之嗣續幸甚

補遺茯苓丸 治心痲驚疳

扶神 薑會

神麩炒 草龍胆 黃連炒 糖棗子等分

末之陳米飯為丸如黍米大每十九米飲下

附○黃連丸 治疳渴乾疳上勞

乾高 烏梅肉 蓮肉 杏仁各一

黃連半兩猪

末之黃牛胆汁九麻子大每服十五丸烏梅湯下

附○清肺湯 小兒肺疳咳嗽氣逆多啼惡寒

黃芩 當歸 麥門冬去連翹 防風

赤茯苓 生地黃 生甘草 桔梗各一 桑白皮

紫蘊 前胡各半

每服二錢水煎溫服次用化慝丸

附○化慝丸

蕪荑 芳薈 青代 川芎

白芷稍 胡黃連 川黃連 蛇床子

琥珀 黃連 赤茯苓各三錢

遠志豆豉 釣藤皮 蝦蟆各二錢

石菖蒲一錢

麝少許

末之粟糊丸麻子

大瀉何湯下十九

補遺脾積丸

香附 山查

紫金皮 烏藥

砂仁 甘草

等分為末山查生

搗碎為末米糊丸

梧子大米飲下三

右等分為末猪胆汁浸糕糊丸麻子大每服二十九食後臨卧杏仁煎湯下其真恒用熊胆泡湯小筆蘸洗俟前藥各進數服却用青代當歸赤小豆瓜蒂地榆黃連芦薈等分雄黃少許細末入鼻欬瘡

○治小兒走馬牙疳其效如神 白礬炒 黃丹飛 京棗連核燒存性

共為末付之

○又方治牙疳用白礬置於五倍子內煨過為末付之

附○銅青散 治走馬牙疳內生瘡牙斷潰爛齒黑欲脫

或出血

白芷半兩 牙硝一錢 銅青 射香二字

末之乾敷口角及擦牙齒上甚妙

五丁丸大人小兒
皆可服

補遺靈脂丸 治脾

疳食疳

五靈脂 麥芽

青皮去穢砂仁

史君子焙橘紅

蝦蟆炙焦白寇仁

等分末之米糊丸

麻子六米湯下十

斤

補遺疳積餅 治五

疳者積腹大青筋

食少面黃肌瘦或

瀉或痢或腹痛

山查肉 青皮

神曲炒 陳皮

麥芽炒 木香

三稜煨 藜木煨

各五錢 砂仁

肉苳蔻煨 檳榔

甘草炙 柯子去

核各四錢川連水

浸取汁和藥末

白木去芦各六錢

史君子去殼二兩

川練子酒蒸去核

夜明砂炒另研

小茴炒各三錢

乾蟾蜍一大個

○至聖丸 治冷疳疳瀉

丁香 丁皮各一錢 木香

史君子 取肉陳皮 肉苳蔻煨 二錢 厚朴制

末之神麩糊丸麻子大米湯下十九

○大芳薈丸 治春疳虫蝕春脊身熱臃瘦脊骨如鋸

齒十指背瘡頻嚙指甲

芳薈 蕪荑 木香 青黛 檳榔

黃連 一兩 蟬蛻 二十射散 胡黃連 五錢

末之猪胆二個取汁浸糕糊丸麻子大每二十九米

飲下

○龍膽丸 治腦疳頭破滿頭餅瘡腦熱髮結頭腫

龍胆草 川升麻 防風 赤茯苓 芳薈

油髮 青黛 黃連淨 苦練根煨各

末之猪胆汁浸糕和丸如麻子大每服二十九米

紫蘊湯下

○黃土丸 治小兒疳積在脾面黃腹脹咬指甲掃眉

毛捺口鼻好吃泥土炭茶紙之類

黃土 一兩 陳皮 一兩 木香 二錢 黃連 五錢

巴豆 去壳二十粒

右為末麩糊丸菽豆大每歲十九黑豆汁下直候泔

五七次疳積及与益黃散助藥後与疳藥常服

○香薷丸 治疳瀉

黃連 三錢 肉苳蔻煨 木香 訶子肉煨

砂仁 茯苓 各一

末之揉飯丸麻子大每十五丸米湯下

○木香丸 治疳痢冷熱不調五色雜糞裏急後重

右焙乾為細末用

好細白面六斤微

炒黃以砂糖十兩

水蒸化和煎面藥

得所印作餅子每

重一錢每服三五

餅任意嚼吃

補遺神效換肌丸

治小兒脾疳肌瘦

潮熱盜汗飲食易

傷臟腑不調泄瀉

糟粕不化頭大腹

脹青筋氣粗愛吃

泥土

驚甲法酒炙

均注池面包煨

史君子去殼

川連炒神曲炒

麥芽炒各半兩

訶子肉一錢半

麝五分

右為末面糊和丸

芥子大米湯下量

兒大小加減

補遺神效丸 治无

辜疳及諸疳一服

虛熱退二服渴止

三服瀉痢住

唇酥一箇夏月滿

渠中取腹大以跳

黃連

砂仁各三

末之米飲丸麻子大每十五丸艾葉生姜湯下

附○妙應丸 治疳虫蛇疳

檳榔 大腹子

白豆蔻各一木香

末之皂角湯丸葶且大白湯下

附○黃芪湯 小兒疳喘嗽虛汗骨蒸渴而腹瀉少食

黃芪 當歸 川芎 芍藥 生地黃

蝦蟆去足驚甲 酥炙 陳皮 人參 白茯苓

半夏 湯泡 柴胡 史君子肉甘草各二

每服二錢姜棗煎食前服

附○驚血煎 治疳勞

北蕪蕪 柴胡 川芎 各一兩

史君子二十個胡黃連 川黃 各一兩

右用驚血一盞吳茱萸一兩拌和二黃連淹一宿欠

早炒乾揀出茱萸并血只用二連夾餘藥拌末粟粉

粉糊丸麻子大每二十九食前熟水下

附○十全丹 治丁奚哺露疳

青皮 陳皮 義木 煨 川芎

五灵脂 白豆蔻 檳榔 荳蔻各半兩

木香 史君子肉 蝦蟆各一錢

末之猪胆汁浸糕糊丸麻子大米飲下二十九

附○伍疳保童丸 治五臟疳

草在胆芽去青摘皮穢黃連去頭白鱧

蟬頭 夜明砂炒苦練根 雄黃 射香

伍倍子

射香

射香

射香

不鳴身多癩者

取糞一杓置桶中

以尿浸之桶上要

乾不与虫走起却

將蟾酥殺之放虫

任食一日一夜次

日新布袋包繫定

置急水中一宿取

出瓦上焙為末入

射香一字擦飯和

凡麻子大每二二

十九米飲下此九

試驗累多取效

吐瀉

青黛

天漿子

熊胆

芦薈

胡黃連等

末之糯米糊丸麻子大每一丸米飲吞下

○祖傳經驗秘方栴柳丸小兒疳積積氣成塊腹大有虫

等証其效如神

栴柳一兩

三稜

切醋去毛

蓬義木

醋炒

青皮

炒穰麩

陳皮

去白各半兩

蕪荑

水錢半

雷丸

去壳

乾漆

麥蘖麩

炒

山查肉

神曲

炒黃各五錢

甘草

胡黃連

鶴風

三錢

木香

不見火

良姜

砂仁一錢 右為細末醋糊丸如菜豆大每服三五丸空心淡

姜湯送下

吐瀉方法

論

內經曰諸嘔吐酸暴注下泄皆由乳食過度傳化失常蓋食鬱則

世夫小兒之吐瀉皆由乳食過度傳化失常蓋食鬱則

成熱鬱則成酸而吐成瀉此必然之理也又曰食

滯於胃口者為吐食滯於大小腸者為瀉有生下而遂

吐不休者胞胎中穢惡流於腸胃而為吐也丹溪曰錢

氏五補五瀉之法俱可選用謹遵而依法且錄如左

脈法 並見前總論

錢氏曰小兒初生下吐蓋拭掠兒口中穢惡不盡嚥入喉

中故吐木瓜丸主之 此生子子未發聲之先急取口

豆二味等分煎汁飲一二匙則光已上草病出痘疹亦

不可忍也 木瓜丸

初生吐瀉方法已詳 於下予不多贅若吐

瀉因傷風得之身温 乍涼乍熱睡多氣粗

大便黃白色吐嘔乳 食不消時或咳嗽痰

熱惡風寒先以大青 膏發散發搖條暑月

用玉露丸見下寒月 益黃散 諸瘵條吐瀉

而嘔者茯苓半身湯 附除 如身執多睡去

食乳飲水不止吐疾 大便黃水此胃虛熱 渴吐瀉多服白朮散

生胃中津液以止渴

消渴則後用大青膏

痰散痰滯條如身涼

吐沫瀉青白則亂不

渴噎氣長出氣昏露

睡此傷風益再虛怯

因成吐瀉當補脾益

黃散諸母條後用大

青膏發散發滯條吐

利腹痛理中湯傷宗

門寒瀉不止沒石子

九補遺吐瀉久脾虛

寒厥逆口逆氣冷者

死欲成慢驚金液丹

漫驚條煩渴者桂苓

甘露飲傷寒門若夏

月傷熱吐利黃色口

渴引飲者王露散見

下或五苓散或不換

金正氣散並傷宗門

或香需飲中暑門或

車前子散或二順散

並附餘瀝腑虛熱吐

利父不已者宜服二

聖丸補遺或益元散

加辰砂痢疾門吐熱

體重而瀉注熱蕪濕

也蒼木蒸活黃芩并

草湯補遺或二陳加

黃芩痰飲門右吐利

木瓜末

木香末

射香末

輕粉即輕粉也

棋樹末各一字

右再研勻麩糊為丸如黍米大每服三二丸甘草湯送下

○初生三日內吐瀉壯熱不思乳食大便乳食不消或白
色知是傷食當下之而後和胃不用日餅子和胃用
益黃湯散上二方俱見前篇

○初生三日已上至十日吐瀉身不熱或乍熱乍涼不思
乳食大便青白色乳食不消此上實下虛也更有五
臟兼見証宜詳○肺病則睡悶露睛喘氣○心則驚
悸飲水○脾則困倦饑睡○肝則呵欠頓悶○腎則
不語畏明當先見兒蕪蕪補脾益黃散主之○此二
証多病於夏秋也當先見兒蕪蕪其末詳於前

簡以俟知者正之

○五月二十五日以後夏至後十日也吐瀉身壯熱此熱乃臟腑

中十分中九分熱也或因熱傷乳食吐乳不消瀉深

黃色玉露散主之

○玉露散各名耳

石膏

寒水石

生甘草

各半 二錢

右為細末每服一字或伍分溫水調下

○六月十五日以後入暑後吐瀉身溫似熱臟腑六分熱四

分冷也嘔吐乳食不消瀉黃白色似渴或食乳或不

食食前少服益黃散食後多服玉露飲

按丹溪用去桂五苓散倍白朮加蒼木甚者二木炒

用或入益元散和勻米湯調下甚效

○七月七日以後立秋後七日也吐瀉身溫涼三分熱七分冷也不能食

若因受濕而吐利者
平胃散中濕門吐利

而渴小水不通者五

苓散傷寒門白朮散

消渴門壯熱體重荒

活黃芩蒼朮甘草湯

補遺若吐瀉四肢無

力飲食少進者此脾

胃虛弱故也治宜補

中益氣調和脾胃錢

氏白朮散急慢驚風

條或與功散脾風門

脾胃虛甚吐利不止

者君苓湯即四君子

湯對五苓散是也四

君屬損門五苓傷寒

門清氣下陷吐利不

止者東垣升陽益胃

湯即補中益氣湯加

炒神曲黃芩各一錢

孟損門釀乳法補遺

補遺沒石子丸治

寒瀉不止

南木香不見火

川芎連各五分

沒石子一個

豆蔻仁三個

訶子肉三個

右為末早米做飯

枳櫚和丸如麻子

乳多似睡悶亂哽氣長出氣睡露睛唇白多噦欲大

便不渴食前多服益黃散食後少服王露散

○八月十五日以後秋分吐瀉身冷無陽也不能食乳乾

噦瀉青褐水當補脾益黃散主之不可下也

○吐瀉黃傷熱乳也吐瀉七青傷冷乳也皆當下白餅

子主之傷熱乳者王露散傷冷乳者益黃散温中丸

並於下後服之亦有不須下但服此藥愈者

○温中丸

○一方 治瀉黃疸

三稜

莪朮

青皮

陳皮

神曲炒

麥蘖麩炒

黃連

甘草

白朮

茯苓各等分

右為細末温水調服傷乳食吐瀉加山杏時氣吐瀉

加滑石發熱加薄荷

○茯苓半夏湯 治小兒風瀉而嘔

半夏

茯苓各一錢 生姜五片

附

三五

大米飲下十五丸
量大小與之

補遺三聖丸 治小

兒臍臍或瀉或好
久不愈

川黃連 去髮

川黃柏 去皮

石等分末之入猪

膽內煮熟丸如粟

豆大每服二三十

丸米飲下

補遺芫活黃芩蒼木

甘草湯 治小兒

吐熱體重而瀉

石四味等分水煎

溫服

補遺酸乳法 治胃

虛吐瀉暫斷兒乳

令乳母食後捏去

乳汁盡服藥半盞

臥少時却與兒乳

人參 木香

藿香 沉香

陳皮 神曲

麥牙各一錢

丁香或半

右姜五片紫蘇十

片束三個煎服

腹脹

水一盞煎至六分去粗食前服

附○車前子散 治暑月伏熱霍亂吐瀉煩悶引飲不止

通利小便

車前子 白茯苓 猪苓 香薷各等入參減半

右為末每服一錢用灯心湯調下肚疼加芍藥瀉不

止加石蓮肉

附○二順散 治伏熱中暑霍亂吐瀉煩悶燥渴小便赤

色便血肚疼

木猪苓 澤瀉 茯苓 白木

甘草 杏仁 去皮 桂各一兩 乾葛半兩

右為末每服一錢新汲水調下或臍臍虛怯水煎服

有熱去桂加赤芍藥

○夏月吐瀉用益元散極效當表而出之

○附證

愚按小方脉科惟急慢驚風與夫痘疹等証最為難
疾以其吉凶反掌生死須臾故也次則五疳吐瀉為
症不一亦不可以易而治也已上四症各立篇目辨
論詳明外其餘一切小疾繁瑣多端一一不能詳盡
故各附於吐瀉之後以備檢閱參用云爾

腹脹 腹痛 夜啼 解顛

顛陷 顛填 赤痛 疥汁出 語遲

滯顛 顛頭 尾骨痛 龜胸 龜背

重舌木舌 鵝口口瘡 鶴膝 行遲

脫肛 遺尿

腹脹方法

夫腹脹由脾胃虛氣攻作也亦有實者必悶亂喘滿可下

小兒氣虛腹脹其候
目胞腫黃色黃氣喘
者揚氣丸見下或加
減揚氣丸補遺寒熱
悶亂微喘脹滿者宜
下之大承氣湯傷寒
門一法用五苓散太
紫霜丸痘疹門量兒
大小用之或白餅子
發搖條或消積丸腹
痛條執輕者大柴胡
湯傷寒門又有疳氣
積脹渴九子治之附
餘又有癥瘕痞脹三
發丸主之附餘乳傷

之宜用紫霜丸白餅子不喘滿者虛也不可下若誤下
致脾虛氣上附肺而行肺与脾子母皆虛肺主目胞腮
之類脾主四肢母氣虛甚則目胞腮腫也色黃者屬脾也
治用揚氣丸漸消之未愈漸加丸數不可以丁香木香
桂皮豆蔻入温散藥治之蓋脾虛氣未出腹脹而不喘
者可以温散藥治使上下分消其氣則愈也若虛氣已
出附肺而行則脾胃內弱每生虛氣入於四肢面目矣
小兒易為虛寒脾虛不受寒温服寒則生冷証服温則
生熱証當識此不可也胃又虛熱多生痘病或引飲不
止脾虛不能勝温隨肺之氣上行于四肢若水吐温氣
浸浮於肺則大喘也此當服揚氣丸而愈
○揚氣丸 治小兒虛脹如腹大者去蘿葭子各福九子
胡椒一兩 蝎尾祛毒半一六 不各四十九

食積心腹脹滿氣粗
吐熱或吐或瀉下積
九附餘酒食積通爾
五珍丸補遺
補遺加減揚氣丸
治小兒疳氣腹脹
喘急并面浮腫
蔓菁子炒白牽牛
生各二牙丁香
胡椒各一分
右為末麵糊和丸
如粟巨大三歲者
服三十圓米湯下
量大小減增
補遺五珍丸 治酒

右為細末奕糊丸如粟米大每服五七丸至一
九陳米飲不拘時○一方有木香一錢
○治小兒腹虛脹先服揚氣丸不愈腹中有食積結糞小
便黃微喘脉伏而實時欲飲水能食者可下之宜消
積丸紫霜丸蓋肺初虛而後結有積所治宜先補脾
而後下之後又補脾則愈也不可補肺恐生虛氣
○一方腹脹
蘿葭子 紫蘿梗 乾葛 陳皮各等甘草少許
右細切水煎服食少者加白朮
○渴丸子 治疳腫脹
蘿葭子微炒 陳皮 蓬朮煨 青皮
檳榔 五灵脂各半 木香半錢 赤茯苓
黑牽牛取頭末半生半

食積通用

青皮 蓬木

乾姜 燒存性

五灵脂 各一兩

巴豆肉 去半油一

右為末粳米飯和
九如麻子大每服
三五丸末湯下

腹痛

夫腹痛者多因邪交
攻此臟氣相擊而作
也面赤壯熱手足心

熱此挾熱腹痛也四

順清涼飲如青皮枳

殼附餘面色或白或

青手足冷甚則面黯

唇口俱黑爪甲皆青

此挾冷腹痛也七氣

湯如桂調蘇合香丸

或指迷七氣湯並附

餘若邪正交攻冷熱

不調甘桔湯加枳殼

青皮木香當歸理疫

門名內釣等証釣藤

飲急慢證條異香散

附餘腹痛小便閉

芍藥甘草湯補遺

右為末麵糊丸粟巨大每服十五丸紫蘇葉下

附○三稜丸 治小兒停積腹脇脹滿乾噦惡心全不食

三稜煨 木香 神麴炒 陳皮去白

半夏 姜汁制 丁香 桂各半兩

右為末麵糊圓如黃米大二十九丸乳食后姜湯下

附○下積丸 治乳食傷積心腹脹滿氣粗吐熱或嘔瀉

丁香粒 十 縮砂仁 十 史君子肉 伍烏梅

巴豆肉 各三個 去油

右為末爛飯丸麻子大每服三九陳皮湯下

○腹痛多是飲食所傷

白木 一錢半 陳白 去白 青皮 去穰各 山查 去核

神麴炒 麥芽炒 砂仁 各一牙 甘草炙五分

有寒加藿香吳茱萸 有熱加 黃芩

右為細末每服一錢七分清米飲或白湯下

○腹痛口中氣溫而黃色目無精彩或白睛多及多腫畏

食或大便酸臭者當磨積宜消積丸甚者用白餅子

下之後和胃用白木散

○消積丸

丁香 九粒 砂仁 十二个 巴豆 三箇去皮心

右為細末麵糊為丸如黍米大三歲已上三五丸已

下一二丸溫水下

附○四順清涼飲 治挾熱腹痛

赤芍藥 當歸 甘草 大黃 各等分

右劉散三歲已上每服二錢水一盞煎七分作兩服

欲利小便利赤芍藥虛熱加甘草下利減大黃冒風

邪加去節麻黃中風體強眼睛上視加独活量見大

痛有熱者大柴胡湯
痛甚有寒熱者大承
氣湯腹痛桂枝湯加
芍藥痛甚桂枝湯加
大黃並傷寒門

補遺芍藥甘草湯

治出疹壯疼腹痛

小便不通

芍藥一兩甘草二

分半

右白水煎服

蛇蟲

蛇虫攻心腹痛因食
物太早愛甜怕苦痛

時高帝叶只看人

中鼻頭唇口一時黑

色吐涎及清水使君

子九枚柳散並補遺

或安虫散集效丸並

見下化虫丸諸虫門

蛇厥者其人當吐蛇

此為臟寒烏梅丸諸

虫丸其虫穿心者

意以仁根煎湯治之

補遺更君子丸治

虫痛

白芍藥厚朴製

陳皮去皮川芎

甘草各二分半

小實虛加減微瀉利為度可加荊芥

○七氣湯 治七氣所傷痰涎結聚腹痛不能飲食

半夏五兩制人參 辣桂去皮各甘草半兩

右坐細每服三錢水大盞姜五片棗一枚煎食前服

○指迷七氣湯 治七情相干氣道壅滯攻衝作疼

青皮 陳皮 桔梗 蓬木

辣桂 益智仁酪一香附子半兩甘草

加半夏制各七

每服三錢水一盞姜四片棗一枚煎七分不拘時服

○異香散 治小兒諸般吊証角弓反張胸高臍凸透

明沒藥一味為末姜湯調下

○心腹痛面皎白口中沫沫及清水出發痛有時當作蛇

虫治寸白丸積痛食痛寒痛虫痛大同小異惟虫

者當口淡而沫白出小兒木性故胃火少故

心頭痛與癩畧相似但斜而手不搖耳安虫散之

○安虫散 空監用米糊為丸

黃粉炒黃 檉柳 川練子核 鶴虱酪二 白礬一錢

右為末每服一字大者五分或一錢温米飲送下臨

痛時服

○集効丸 治虫痛

木香 鶴虱炒 檉柳 柯子核 無莢

附子去皮 乾姜 大黃兩半 烏梅去核二

右為細末煉蜜丸陳皮湯下或醋湯下○一方加黃

芩黃連

○一方治虫用雞子炒白蠟陳酒糊丸服一二云殺寸白虫

○一方治蛇虫作痛用二陳湯加苦練根煎服或只以活

史君子肉湯浸去黑皮一兩俱末之

煉蜜九芡實大米

飲化下一丸

補遺極柳散 去虫

後服此

核即 木香

人參 黃連

甘草多等分

末之每服一錢小

者半錢滾水調服

夜啼客忤驚啼

夜啼者臟冷也陰盛於夜則冷動冷動則

為陰極發躁寒盛作

疾故夜啼也釣藤飲

天釣條臉紅舌白小

便赤泄此心熱煩啼

也釣藤飲去當歸木

香加殊砂木通天釣

條或碧霞散附餘客

忤者小兒神氣嫩弱

外邪客氣獸畜異物

暴觸而忤之其候驚

啼出青黃白沫面色

變易喘息腹痛及則

痰涎狀似驚癇但眼

不上眉脈來弦急而

數視其口中懸壘左

練根向東南生不出土者刮去粗皮取白皮細切濃

煎汁一盞徐徐飲之不可飲多先以糖蜜或炒肉食

之俟虫頭向上然後服之看見大小斟酌與之

○小兒腹吃粽痛用白酒藥加黃連末合研湯調服之即

○一方 治小兒腹痛

甘草 乾姜 伏龍肝 一兩 人參

茯苓 百草霜 白木 各五錢

右為細末粥九如梧子大每服三十九陳皮湯下

○小兒夜啼作心經有熱有虛治

人參 黃連 甘草 五分 竹葉 二十

右細切分作二貼每貼加生姜一片水煎服一本无

餘○花火膏 治夜啼脾臟冷而痛

燈花一顆 珠百一還服散一字

右取下塗乳上令兒吮乳

附○碧霞散 治小兒渾身壯熱夜啼

栝葉 半兩 南星 姜蚕 全蝎

鬱金 雄黃 各一錢

右為末和勻每服一錢用薄荷蜜水調下

附○六神散 治腹痛啼哭面青口中冷氣四肢亦冷曲

腰而啼或大便泄瀉及不吮乳

人參 山藥 白木 各半 甘草 二錢

茯苓 扁豆 各一

右為末每服二錢姜二片棗一枚煎服一方用當歸

白芍藥人參各二錢半甘草桔梗陳皮各一錢為散

每服二錢水煎時服

附○黃土散 治小兒卒客忤

右若小小有腫核即以竹針刺潰之或以爪甲摘破亦佳服黃土散或雄射散或六神散並附餘論帝物笑龍齒散或安神散並補遺花火膏附餘牛黃丸發痛門

補遺龍齒散 治拗

笑肚夜驚熱

龍齒 蟬蛻

釣藤 卷活

人參 茯苓

各四分姜棗煎服

補遺安神散 治小

兒夜啼不已

蟬蛻四十九个只

用後一截除去前

一截伯留足

為末作四服釣藤

湯調下

鮮顛

小兒年大頭縫開解而不合者腎主髓腦為髓海腎氣有虧腦髓不足所以頭顛開而不能合也地黃丸諸疳條仍用天南星微泡為末醋調付

爐中黃土

蚯蚓等分

研為末水調搽小兒頭上及五心上

附○射雄香散

小兒腹痛客忤危急

雄黃一錢

明乳香五分射一字

末之每服一字刺雞冠血調灌之

附○安神散

治嬰孩夜啼

蟬蛻

四十九个只用一截

右為細末作四服用釣藤湯調下不拘時候服

○小兒風痰壅盛用

南星片

半兩切以白礬湯泡晒乾

白附子二兩

右二件共為末麩糊為丸如芡實大每服一九姜蜜

薄荷湯化下

○小兒痰熱骨蒸用

二陳湯半兩加升麻二錢葛根

右細切分三貼加姜棗水煎服

○又方 治前証用

胡黃連

換榔各一錢陳皮

雷丸各一錢

神麩

半夏麩

史君子

白芙蓉各二

右為末麩糊丸如黍米大每服三五丸白湯下

○小兒鮮顛顛不 因母氣虛與熱多也錢氏曰王下面

顛不合腎氣未成也雖長必少笑更有目白睛多面

眦目色瘦者多愁少喜也丹溪用四君子湯合四物

湯有熱加黃連酒炒煎服更以帛繫束及以白欵末

付之

附○梔子仁散

治小兒顛不合

防風半兩

梔子仁一兩

干絳帛烘熱貼之亦良法也或相子仁散或三辛散塗之尤妙並附錄

顛

顛者始因臟腑有熱渴飲水漿致成世利父則血氣虛弱不能上充腦髓故也狗頭骨散或聖濟經用當歸散並附錄或地黃丸諸門

顛填

顛者將顛門腫起也脾主肌肉乳哺不當饑飽無度或寒或熱乘於脾家致使臟腑不調其氣上衝為之填脹顛突而高如物堆起毛髮短黃有汗是也或熱証用大連翹湯以消之有表熱証如頭疼身痛口乾煩渴小便赤大便秘泄夾驚腮腫柴胡散並附錄

赤遊風

右末乳汁調塗顛

○三辛散 治小兒腦角骨大顛開不合
細辛 桂心各半 乾姜一錢

右為末乳汁調塗顛上乾時再塗面赤是效

顛陷方法

○狗頭骨散 治顛陷
黃狗頭骨用火炙黃為末以雞子清調付

○當歸散 治小兒夜啼者臟寒而腹痛也面青手冷不吮乳是也宜此方用
甘草炙 桔梗 陳皮 當歸各一錢

右為末水煎半盞時少與服又有熱痛亦啼叫不止夜癸面赤唇難小便赤與三黃九人參湯下

顛填方法

○大連翹湯
連翹 瞿麥 荆芥 水通 當歸
防風 赤芍藥 柴胡 滑石 蟬蛻
甘草 一錢 山枝仁 黃芩各五

右剉細每服二錢加紫草煎溫服熱甚加大黃

○柴胡散 治小兒傷寒無汗有表証壯熱頭疼身體痛口乾煩渴小便赤大便秘泄夾驚顛腫
石膏 黃芩 甘草 赤芍藥

葛根 各二錢 麻黃 去節 柴胡 半兩

右剉散三歲兒每服二錢水小盞生姜少許葱白三寸鼓云

赤遊風方法

○小兒赤瘡 俗名赤也此蓋熱毒氣客於腠理搏於血氣發

仲陽云熱毒之氣客於腠理搏於血氣發皮膚赤如丹熱毒與血相擊而風氣乘之所以赤腫遊走遍體也蓋由乳母食酒麵煎燻過度與烘衣不候冷而即與兒穿多成此証或過內洗浴太頻濕熱之毒鬱蒸不散而得之者用小刀疏去溜頭赤暈惡血毒汁次以水黃散塗之或葛根白朮散或防風散並附餘或

於皮外赤如朱也用

荆芥 一本有芍藥杏仁

生地黃 木通 若寒帶表之藥外以芒硝泡湯洗之又以芭蕉油塗之錢氏用白玉散付之皆効

○白玉散 白堊五錢白礬五錢寒水石一兩 右為細末米醋或新汲水調

○水黃散 土消 大黃細末各二錢 右二味相合新汲水調攪勻用雞羽蘸藥塗刷毒上

○葛根白朮散 治一切赤白丹腫毒 白朮 茯苓去皮各 木香 甘草各一錢 芍藥 葛根各三 以棧去穢

右劉散每服三錢水一盞煎七分去粗煎服
○防風散 治丹毒候乃熱毒之氣與血相搏而風氣乘之故赤腫及遊走遍躰者又名赤遊風入腹入腎則殺人 漢防已半兩 朴硝 犀角 黃芩 黃芪 川升麻各二 各半

○小兒臍中汗出併痛用白礬火煨枯乾付或用黃柏末付之

語遲方法 餘○菖蒲丸 治小兒心氣不足五六歲不能言心之聲為言兒稍長合語而遲由妊娠時其母驚怖內動於兒臍和氣乘於心使心氣不足舌本無力故令語遲

大連煎湯加大黃灯心煎條付用白玉散見下或惺惺散補遺 補遺惺惺散 治赤遊腫不可服冷藥者 茯苓去皮 白朮 人參 甘草 枳壳 川芎 細辛去苗等分 每服三錢水煎

語遲

小兒四五歲不能言

蓋由在胎時其母卒
有驚怖內動於兒臟
邪氣乘於心故令心
氣不足而不能言也
宜服葛蒲丸附餘

滯頤

小兒滯頤者涎流出
而清於頤間此脾病
也脾之液為涎脾胃
虛冷不能收制其津
液故流出清於頤也
張煥溫脾丹或溫胃
散並附餘或益黃散
著疳門一法百藥煎

含嗽其涎口不出亦
殺法也疳門

癩頭

小兒生下一歲內頭
上生瘡皆因父母胎
前恣情交合所致用
人尿以鵝翎蘸洗祇
乾用青黛末付之或
猪骨髓調直輕粉付
之或樹上乾桃燒灰
清油調付或酒炒通
聖散或松皮散並見
下

石菖蒲 丹參各一 赤石脂三 人參去芦

天門冬去心焙

右為末煉蜜丸麻子大食後溫水下二十九聖濟總
錄有黃連

滯頤方法

○張煥溫脾丹 治滯頤

半夏麩 丁香 木香各一兩 乾薑

雪白朮 青皮 陳皮各半兩

右為末糊丸如黍米大一歲十九二歲二十九大小
加減米湯下

○溫胃散 治滯頤涎流出漬於頤上此由脾冷涎多
故也

半夏泡 人參去芦 甘草 乾姜

肉豆蔻 白朮各半兩 丁香

右為末每服二錢生姜三片煎食前溫服

癩頭方法

○癩頭用通聖散酒拌除大黃另用酒炒共為末再以酒
拌焙乾每服一錢水煎服外以白炭燒紅淬入水中

乘熱洗之更以胡荽子伏龍肝懸龍尾黃連白礬為
末油調付之

○又方治癩頭以松樹厚皮燒存性二兩黃丹火飛一兩

白礬火枯 大黃各五錢白膠香火飛傾石上一
兩輕粉四錢共為末熱香油調付

○丹溪治一小兒二歲滿頭生瘡一日瘡忽自平遂患痰
喘知其為胎毒也詢其母孕時多食辛熱物遂以人

參連翹黃連甘草陳皮川芎芍藥木通濃煎入竹瀝

重舌木舌弄舌

重舌者心脾之病也
候於舌而主血脾
之絡脉出於舌下二
經有熱故舌根重生
鎗舌先刺出血用蒲
黃散黃栢丹並附餘
木舌者心脾積熱熱
氣上衝故令舌腫漸
漸脹大塞滿口中急
用硝霜散或二黃散
或獨腦散並附餘弄
舌者脾臟微熱令舌
絡微紫時時舒舌能

與之數日而安

重舌木舌弄舌方法

附○蒲黃散 治重舌

附用竹瀝調蒲黃末付舌上神效

附○黃栢丹 治重舌

附黃栢不拘多少

附右將竹瀝浸水點之即愈

附○硝霜散 治木舌

附用朴硝二分紫霜一分白鹽半分同研每半錢竹瀝

井花水調傅不用朴硝及鹽亦可

附○二黃散 治木舌

附黃葵花研細黃丹半之

右二味同研點七次無有不效

附○獨腦散 治舌肌滿口

附梅花腦子點舌即消

附○瀉黃散 治弄舌

附藿香葉分枝干一小石羔五分甘草七分防風四分

右細切作一服用蜜酒炒香熟以水一盞煎至半盞

去粗時上與之

鵝口口瘡重勝方法

○治小兒鵝口瘡因白屑滿舌及兩腮故名鵝口用髮纏

指頭蘸井花水拭口令淨用濃養粟米汁以綿纏筋

頭拭之更以煖過黃丹搽之即愈

○又方治鵝口不能食乳用地雞搗水塗瘡愈地雞即園

磚石下

○治小兒口瘡瀉心湯用黃栢研細末蜜水調服

多有之

之當水與黃散服
見下慎勿用冷藥下
之飲水者脾胃虛津
液少也宜胡黃連丸
諸雜條大病未愈用
藥後弄舌者凶

鵝口瘡重勝

巢氏云小兒初生口
裏白屑滿口舌上如
鵝之口故曰鵝口此
乃胎熱而心脾最盛
黃葵於口也宜用髮
洗黃丹搽之或刀瀝

付之或地雞水塗之
並見下小兒初胞胎
有連舌舌下有膜如
石描子中隔連其舌
下後令兒言語不發
不轉也可以爪甲摘
斷微有血出无害若
血出不止可燒髮作
未付之血便止也服
保命散或吳茱萸散
並附餘如魚口不能
合或作鴉舌者難治
小兒口瘡乃血氣益
熱將養過温心脈積
熱熏蒸於上焦所致

也川淡脚調南星末
即山脚心乳母服洗
心散或辰砂七宝散
並附餘或蜜水調黃
連末抹兒口中黃柏
青黛腦子皆可或竹
瀝調牛黃末塗口內
小兒初生上脘有物
脹起如懸癰或如芦
藿盛水之狀者名曰
重膈此乃脾胃挾熱
血氣不能收斂胸中
舌下或在脰頰如吹
小脰速宜以綿纏長
針微露鋒銳刺腫處

○鹽梅散 治小兒口瘡用
白鹽梅燒存性 紅棗去核燒存性 鉛母火飛 人中白火飛

龍腦火煨 右共為細末服之神効

○治小兒口瘡用黃柏細各等分為細末付之

○治小兒頰上生瘡痛痒難忍用白楊木枝燒於刀上出
瀝付之及治鵝口瘡神効

○保命散 治小兒口裏白屑滿口上如鵝口
白礬一系 牙消細研 硃砂二分

右同研細每服一字取白鵝糞以水撿取汁調塗舌
上頰頰內未用時先以手指纏亂髮拭舌上垢然後
使藥付之

吳茱萸散 治小兒口內白屑煩燥

吳茱萸不以多少 右為末米醋調付兒脚心內退即去之

○洗心散 治風壅壯熱頭目昏痛痰涎壅滯涕唾稠
粘心神不寧眼遊睛疼舌上生瘡

白朮一分半 甘草 當歸 荊芥穗

麻黃不去節芍藥 大黃麩裏煨去麩切焙各六分

每服四錢生姜薄荷煎去滓乳母服

○辰砂七宝散 治小兒壯熱傷風壅熱舌上生瘡
麻黃去節 白朮 當歸 大黃 赤芍藥

荊芥 前胡 生地黃 甘草各半刀

右為末傷風發散用生姜薄荷煎湯調服急驚加辰
砂薄荷調下

○牛黃散 治小兒重脰重靨腫痛口中出涎

針微露鋒銳刺腫處

决出惡汁即消後服
牛黃散附錄若再生
宜再刺不尔則脹滿
口中有妨乳食呼吸
也

龜胸

仲陽云龜胸者乃肺
經受熱脹滿攻於胸
膈故胸高如龜狀耳
又乳母多食五辛煎
煨熱物過度而成此
疾或乳母有宿乳心
兒亦成此疾常捏去
宿乳則无此証也治

法用馬油百合丹
或龜胸丸並附錄或
馮白散是下

龜背

夫龜背者兒生下地
客風吹脊入於骨節
故成龜背治以龜尿
點其脊上骨節取龜
尿方附錄聖惠論寸

太陰玄精石 一升
鉛霜 半斤
龍腦
丹砂

右為末每服五分先於腫處針破出血鹽水拭口搽
藥在內

龜胸方法

○馮白散 治龜胸

桑白皮蜜水拌炒 地骨皮 甘草炙五分 加黃芩

右作一服水煎

○百合丹 治龜胸高腹滿其狀若龜此肺受熱之故

也乳母酒麪无度或夏月煩熱一乳與兒得之或乳
母多食五辛而亦成此疾

川大黃 天門冬 杏仁去破尖 桑白皮

甜葶藶炒下 石羔 百合 木通各等分

右為末煉蜜為丸如菘豆大臨臥熱湯下

○龜胸圓 治小兒龜胸背者緣肺熱氣脹滿而漸成

此疾乳母多食辛辣之物亦能成此疾矣

大黃錢一 天門冬去心 百合 杏仁去皮尖

木通去節 枳殼炒 桑白皮蜜炙 朴硝

甜葶藶炒各

右為細末煉蜜丸如芡實大食後溫湯下

龜背方法

○取龜尿方 取尿之法當放龜於荷葉上候龜尿四

顧急用鏡照之其尿自出

○灸龜背方 當灸第三椎骨下兩傍各一寸半肺俞

穴又第五椎骨下兩傍二寸半心俞穴又第七椎骨

下兩傍各一寸半膈俞穴以小兒中指方為一寸艾

背者小兒未滿半週
強令早坐遂使客風
吹脊故令背高如龜
之狀也有灸法可療
服松蓋丹並附餘

鶴膝

鶴膝者小兒稟受不
足血氣不充故肌肉
瘦薄骨節呈露如鶴
之膝抑亦腎虛而得
之加味地黃丸附餘

行遲

小兒行遲乃肝腎虛

應而血氣不充蓋肝
屬木主筋腎屬水木
無水滋故筋弱而不
能束也地黃丸加牛
膝五加皮酒炙鹿茸
諸母門或五加皮散
或虎脛骨丸並附餘

脫肛

小兒脫肛者大腸自
奮前出宜用葱湯薰
洗令軟款上送此
因瀉利氣墜而得之
者亦可服瀉利之藥
痢疾門選用然後用

炷如小麥大但三五壯而止

附○松蓋丹 治龜背

松花

枳壳

防已

川独活

麻黃

大黃

前胡

桂心少許

右為末米飲送下

鶴膝方法

附○加味地黃丸

懷地黃

酒蒸不可飽
鐵器六兩

山茱萸肉

兩
山藥錢三兩一分

牡丹皮

去棗
三兩

茯苓

去皮
三兩

川牛膝

去骨
三兩

右細末煉蜜為丸如人實大每早淡鹽湯下

行遲方法

附○虎脛骨丸

五加皮散一加皮

二木瓜同牛膝煎

米飲更侵此少酒

食前調服滯行遲

附○虎骨丸 治行遲血不克手足或肝腎經虛肝主筋

為木腎主水木無水滋故也

虎骨丸中虎骨湯

桂苓生地膝等當

棗仁煉蜜丸吞下

子女行遲用此方

脫肛方法

附○脫肛 用陳壁土泡湯先薰後洗

○又方治前証用伍倍子為細末付而頻托入之

○又方治前証用驚頭燒存性香油調付一云以此燒烟
薰之良久自收

附○遊腸散 治小兒久痢大腸頭脫出不收

赤石脂

訶子去核

龍骨各等分

右為末臘茶少許和藥摻腸頭上絹帛揉入又治痢

槐花等藥或用陳壁
土湯或五倍子散或
驚頭灰並見下或單
麻子搗爛貼頭頂心
腸即收上急洗去之
或用其蒲黃研極細
以猪脂拌勻付肛門
上即入內服滋腸散
附餘

遺尿

小兒遺尿者腎與膀胱之病也腎主水腎氣下通於陰小便者水之餘也膀胱為津液之府既冷氣衰弱不能約水故遺尿不禁或睡裏自出治宜補腎破故紙散補遺益智二茯湯或加味黃丸並附餘
補遺破故紙散治小兒夜間尿床破故紙炒為末右熟湯調下

米湯調下

○尾骨痛屬陰虛有痰

陰虛用四物湯加炒黃柏酒知母少用桂為引或以全胡木香為引如痛不止加乳香沒藥○痰用二陳湯加知母黃柏澤瀉必用前胡木香為引蓋陰虛故痰盛也如痛不止亦加乳香沒藥○二法必先以玉燭散或通經散痰少胃虛大下後用之或神祐丸下棗湯皆可與治滯同

○小兒脫囊明囊腫大墜下而不收也亦有囊皮脫爛者
木通 甘草 黃連 當歸 黃芩

右等分水煎食前溫服囊爛者以野紫蘇葉面青背紅者是為末香油調付皮脫兩丸露者外以青荷葉包之付藥後目生皮

遺尿方法

附○益智二茯湯

益智生 白茯苓去皮 茯神去皮各
右為細末空心清米飲調下亦治白濁

附○加味地黃丸
懷生地黃酒 懷山藥二 牡丹一 澤瀉一

白茯苓二 破故紙炒 山茱萸肉各二 益智仁研
人參各一 肉桂五

右為末煉蜜為丸如芡突大量大小與之早間淡搗湯送下日間食遠蕪服肥兒丸用白滾湯送下諸疳門

大醫院補遺真傳醫李源流肯督大成十五卷終

函自靈通左臉肝兮
右臉肺脾為年壽及
人中心屬印堂方廣
角腎為額骨耳尻逢
此是陰陽部位屬痘
癩怙滯及鮮紅假如
年壽初先發人中腮
頰亦相同淡紅磊落
如珠潤過期七日自
然安若越印堂方廣
出心家熱毒解方隆
額骨耳目及麻紫重
極須知命必終

痘期治法

天痘由中以達外用
藥因期而變通以其
常而言之發熱三日
而後見標出齊三日
而後起脹蒸長三日
而後貫膿漿滿三日
而後收靨發執之物
耳尻中指俱冷耳後
起紅絲呵欠噴嚏眼
目困倦兩額之間有
花紋見者預知其為
痘也發熱三日當托
裡解表使其易出亦
有氣弱而不能出者
當微補其氣氣和則

辨表裏虛實用藥其吐瀉不能食為裏虛不吐瀉能食
為裏實灰白色陷頂多汗為表虛紅活凸綻無汗為表
實又諸痛為實諸痒為虛外快內痛為內實外虛外痛
內快為內虛外實裏實而補則結癰毒表實而復用實
表之藥則潰爛不結痂也如表虛者瘡易出而難靨表
實者瘡難出而易收裏實則出快而輕裏虛則發遲而
重表實裏虛則陷伏倒靨裏實表虛則發慢收遲治之
之法三日已前未見紅點必用升麻湯參蘇飲之類以
發其表務令微斂度若未汗如表猶未解雖畧見紅點
隱約於肌肉間而升散開發之劑尚未可除凡見出遲
發慢者根窠欠紅活者便當憂慮調攝切勿袖手待斃
夫古人用藥寒熱迥別主意不同鑿者再宜憶度寒暄
推詳運氣而治如陳文中之木香散異功散用丁附姜

桂等峻熱之藥而與內經病機不合升麻湯常發揮其說
亦有用得其當者屢獲捷效若劉河間張子和輩悉用
本連大黃等寒涼之劑丹溪亦曰酒炒本連各解痘毒
依法用之而獲安者亦不少也今之鑿者往往不同依
陳氏而行者多用熱藥宗劉張而治者多用涼劑是故
不偏於熱則偏於寒此刻舟求劍之道也愚按內經有
曰寒者熱之熱者寒之微者逆之甚者從之又曰逆者
正治從者反治從少從多觀其事也陳氏用從治之法
權也劉張用正治之法常也然皆不外乎參朮芪草芩
歸茯苓芍藥等補氣血藥為主治焉亦當看時令寒熱
緩急施治固不執一見也楊氏曰痘瘡發於肌肉陽明
胃氣主之脾土一氣氣隨暢快無陷伏之患湯氏曰如
庖人籠蒸之法但欲其鬆耳滄淵翁呂復折衷衆說看

出快初不可用甚恐
湊理一密則痘難出
也四五日以清涼
解毒為主清涼則無
血熱枯燥之患解毒
則無壅滯黑陷之害
七八九日以貫膿為
主治法當溫補氣血
氣血流行而成漿自
易也十與十一二日
以收斂為主大和氣
血補脾利水則自然
結靨矣此特語其常
也蓋常者可以而變
者不可必當隨候參

詳安可執藥以應無
窮之變哉言見紅點
之時如痘輕少不可
過表在後恐成斑爛
或乾紅紫色急宜疎
利不然在後必成黑
陷四五日之內痘出
至足下為齊苟未盡
出於解毒之中宜蒸
發散若專於寒涼則
痘遲滯不出七八日
之間毒未盡解於溫
補之中又兼解毒若
偏於燥劑則毒盛不
能化漿也十一二日

方立論適中用藥寒熱攻補斟酌時宜未嘗執一治也
學者能遵守其法而行之庶無一偏之患矣

丹溪治小兒痘瘡方法

夫小兒痘瘡大抵與傷寒相似發熱煩燥臉赤唇紅身
痛頭疼乍寒乍熱噴嚏呵欠喘嗽痰涎始發之時有因
傷風傷寒而得有時氣傳染而得有時因傷食發熱嘔吐
而得有以跌撲驚恐畜血而得或為日竄驚搐如風之
證或口舌咽喉肚腹疼痛或煩燥狂悶昏睡或自汗或
下利或發熱或不發熱証候多端卒未易辨必須以耳
冷尻冷臉冷蓋瘍疹屬陽腎藏無証其耳與尻俱屬腎
故腎之所部獨冷又不若視其耳後有紅脉赤縷為之
真如此可以稽驗矣治療之法首尾俱不可妄下但溫
和之劑蒸而濟之解毒和中安表而已虛者益之實者
損之寒者溫之熱者清之是為權度昔人有喻云於危
人籠蒸之法但欲其菘耳蓋毒發於表如苟妄下則榮
衛益虛重令開泄轉增瘡爛由是風邪乘間變証者多
矣毒根於裏如苟妄下則內氣益虛毒不能出而反入
焉由是土不勝水變黑歸腎身軀振寒耳尻返熱眼合
肚脹其瘡黑陷十無一生汗下二說古人深戒以此視
瘡疹証狀雖與傷寒相似而其治法實異傷寒從表入
裏瘡疹從裏出表故也解肌之法葛根升麻紫蘇之類
可也其或氣實煩燥熱熾大便秘結則與犀角地黃湯
人參敗毒散久或紫草飲多服亦能利之故雖云大便
不通者少與大黃尤宜仔細斟酌不可妄用孟浪如小
便赤澀者分利小便則熱氣有所滲而出凡熱不可驟
過但輕解之若無熱則瘡又不能發矣

之間漿未滿足必大補氣血畧兼解餘毒不然恐有癰毒瘰癧之患此變通之妙要在隨時制宜也

三法治例

凡氣虛之症初發身熱手足厥冷乍涼乍熱精神倦怠肌肉消瘦飲食減少四肢倦而睡卧安靜便清自調虛症無疑未見點前用參芪飲加輕劑發散如紫蘇防風白

○凡痘疹春夏為順秋冬為逆

○凡痘疹分人清濁就形氣上取勇怯

○凡痘疹但覺身熱証似傷寒疑似未明便當先與惺惺散或參蘇飲熱甚者升麻葛根湯人參解毒散若見紅點便忌葛根湯恐發表虛也

○凡痘瘡初欲出時身發熱耳尻冷呵欠咳嗽面赤必是出痘之候便宜服升麻葛根湯加山查大力子其瘡出必稀少而易愈

○凡痘瘡初出時或未出時宜服後藥多者可少少者可無重者可令輕也方以絲瓜俗名天蘆近葉三寸連皮子燒存性細研砂糖拌乾吃入硃砂尤妙○又方以硃砂一味為細末看兒大小或半錢或一錢蜜水調服亦云多者可少少者可無

用參芪飲加輕劑如川芎桔梗見附錄見

○凡痘瘡發熱之時更以惡實子為末蜜調貼顯間免眼障之患

點四日之後重用參芪飲隨病加減處治

○凡痘瘡初出之際須看胸前若稠密急宜服消毒飲加山查黃芩酒洗紫草減食者加人參

七八日漿足之後保嬰百補湯調養氣血而已見附錄此症未

○凡痘瘡初出之時色白者便當大補氣血參朮芪芎升麻乾葛甘草木香丁香酒當歸白芍如大便泄加訶子肉

稍場陷里巖者多用木香異攻散收功見

○凡痘瘡初起發時自汗不防蓋濕熱薰蒸故也甚者當以參芪等實表之藥以防其難靨也

凡血熱之症初發身熱壯盛腮紅臉赤毛

○凡痘瘡初起發時煩燥謔語狂渴引飲若飲水則後來靨不齊急以涼藥解其標如益元散之類

焦色枯煩燥渴欲飲水日夜啼哭睡卧不

○凡痘瘡已出可少與化毒湯出不快者加味四聖散紫草飲子紫草木香湯快班湯絲瓜湯之類

寧好睡冷處小便赤
 澁熱症無疑未出之
 前升麻葛根湯或升
 麻流氣飲雖皆可服
 縱不若十神解毒湯
 為穩見附餘未出至
 見點三四日後熱症
 悉平勢將行漿從太
 乙保和湯加減見附
 餘八九日漿足之後
 則有保嬰百補湯調
 養之見附餘此症七
 八日間有紫黑乾枯
 及青灰乾黑陷者則
 有奪命大造談笑博

金一少金或百祥牛
 本循軍獨補等方皆
 可審用凡附餘惟經
 泄瀉之後有黑陷乾
 紅者則從本香異攻
 散治之見下此祖宗
 世業不傳之秘方試
 方中者也
 凡熱毒擁遏之症初
 發身熱甚盛腮紅臉
 赤毛焦皮燥氣粗喘
 滿腹脹煩燥狂言謔
 語睡卧不寧大便秘
 結小便赤澁面浮眼
 脹多啼多怒的係熱

○凡痘瘡出稠密甚者人參敗毒散犀角地黃湯

○凡痘瘡疎則毒少密則毒甚宜以清涼之藥解之酒炒
 芩連之類雖數服亦不妨度無害眼之患

○凡痘瘡爐灰色白淨者作寒紫黑色者齊湧者煩燥者
 作熱者黑屬血熱涼血為主白屬氣虛補氣為主中

黑陷而外白起得遲者則相兼而治

○凡痘瘡常分表裏虛實吐瀉少食為裏虛不吐瀉能食
 為裏實裏實而補則結癰毒陷伏倒靨灰白色者為

表虛紅活凸綻者為表實表實而復實其表則潰爛
 不結痂也表虛不起發者或用燒人尿驗

○凡痘瘡類分氣虛血虛用補藥氣虛者人參白朮加解
 毒藥血虛者四物湯加解毒藥酒炒芩連各解毒蓋

連為瘡家之要藥加以酒炒以制其酸寒之性獨存
 清源解毒之性是以痘瘡之症常用以救其危

○凡痘瘡須分氣血虛實大抵多屬氣血不足然當於不
 足中以別其優劣而以補氣也藥中分輕重為用以

平為期耳有夾外邪而實者少加防風等藥

○大法活血調氣安表和中輕清消毒溫涼之劑熱而治
 之此平治之法也溫如黃芪當歸木香輩涼如前胡

乾葛升麻輩佐之以川芎白芍枳殼桔梗羌活木通
 紫草之屬則可以調適矣

○黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡出者酒炒黃芪紫草
 人參等藥

○凡黑陷甚者亦用燒人屎別用無病小兒糞燒存性蜜
 水調服一方用人豬豬大囚糞於臘月燒灰名万全

散

○痒塌者於形色脉上分虛實上則脉有力氣壯虛則脉

毒擁遏未見點時先
須升麻葛根湯一服
隨服羌活散鬱湯見
附錄至見點三日之
內諸症悉平勢將行
漿則服益元透肌散
加減見附錄漿足之
後服聖童百補湯調
養而已見附錄六七
日外有紫重乾枯及
青灰乾白陷者則有
奪命大造談笑博金
一字金百祥牛李猪
尾獨神等方皆可審
用見附錄惟曾經泄

治之如下

治有伍法

表熱盛則痘必乾枯
表太涼則冰伏內熱
盛則秘結內太涼則
泄瀉氣擁盛則腹脹
喘滿執毒為所抑而
不得伸越則腹脹狂
亂毒氣即盛則表裏
受重而聖童難任是
故治痘之法在安表
和中勻氣透肌解毒
五者而已安其表使

無力氣怯痒以實表之劑加涼血藥實痒如大便不
通者以大黃等寒涼之藥少與之下如結毒氣怯輕
者用淡蜜水調滑石末以鵝翎刷瘡上潤之
○瘡乾者宜退火止用輕清之劑荊芥薄荷升麻乾葛之
類

○瘡濕者肌表間有濕氣也宜瀉濕藥白芷防風之類蓋
風藥能勝濕也

咽喉痛者如聖散鼠粘子湯

喘滿氣壅者麻黃仁芩湯

煩渴者甘草散烏梅湯

下利嘔逆者木香理中湯

顏色正者以前法平治則安將欲成就脚色淡者宜助
血藥用當歸川芎酒芍藥之類或少加紅花以潤血

色將成就之際脚色紫者屬熱用涼藥解其毒升麻
葛根湯炒黃連及連翹之類甚者必用犀角羊犀角

大解痘毒

○將醫時金白色如豆殼者蓋因初起時飲水多其醫不
齊名曰倒靨不好宜服實表之藥及消息大小便何
如大便秘宜利大便秘宜利小便如小便之澀
者大連翹湯甘露飲大便秘結內煩外熱者小柴胡
湯加枳殼最穩當或小服四順清涼飲子

○夫瘡疹用藥固有權度大小二便不可不慎其大便者
所下黃黑色其毒氣已盛不可多與熱劑但只用化
毒湯可也或不用亦可若大小二便一有秘結則傷
胃壅遏脉結氣滯毒氣無從發泄日閉舌啞肌肉鰓
黑不旋踵而變矣陷入者加味四聖散更以胡安散

胃壅遏脉結氣滯毒氣無從發泄日閉舌啞肌肉鰓
黑不旋踵而變矣陷入者加味四聖散更以胡安散

无乾枯米伏之患和
其中使无便结泄瀉
之变习其气使无雍
盛喘滿之过透其肌
使熱毒得以伸越而
透表解其毒使内外
有所分消五者不失
則血熱擁遏之症勢
雖綿密亦不足憂矣

當微汗下

治痘有云非微汗則
表不解非微下則裏
不解曰微者恐其過
也此言表熱方熾紅

點米見之先影而不
出痘癩紅起不活
動若此宜以輕湯之
劑微開腠理不致毒
氣擁於皮膚之間使
痘易出然或感其盛
勢也如醒上散与升
麻葛根湯參蘇飲之
類並見下曰既見紅
點色宜葛根其表虛
故也表寒者用亦无
妨亦有當下之症而
不下者後成紫黑擁
毒執結血枯又為失
下之患張煥曰痘未

薄付其手厚付其足順其床帳衣被併以厚綿衣蓋
之若未起獨聖散入木香煎服若其瘡已黑乃可用
宣風散加青皮錢氏云黑陷青紫者百祥丸下之不
黑者慎勿下余知其所下者瀉膀胱之邪也又云下
後身熱氣溫欲飲水者可治水穀不消或寒戰者為
逆余知其脾強者土可以制水也百祥丸恐太峻當
以宣化散代之瀉後溫脾則用人參茯苓白朮等分
厚朴木香甘草各減半為妙蓋瘡發肌肉陽明主之
脾主一濕胃氣隨腸獨不可消勝已泄之腎水乎此
錢氏不刊之秘典也

○其懷瘡者一曰內虛泄瀉二曰外傷風寒三曰變黑歸
腎

○近時治痘瘡者悉宗陳文中木香散異功散殊不知彼
立方之時必運氣在寒水司天之令及值嚴冬大寒
為因氣鬱遏痘瘡不得起發紅綻故用辛熱之劑發
之甚宜也今人不分時令寒熱一槩施治誤人多矣
或有雖值溫熱之時山野農家貧賤之人其或偶中
一二不可以為常法也

○愚按陳氏木香散異功散二方乃素問從治之法又謂
之熱火處於子母之分不傷皮毛彰君之德也或云
瘡發披博於外者屬少陽三焦火也謂之斑色小紅
而行于皮膚中出者屬少陰君火也謂之疹楊氏曰
痘瘡發於肌肉陽明胃氣主之脾土一溫胃氣隨暢
土可勝火決無陷伏之患

辨内外因
○凡瘡欲出而未出因發搐者是外感風寒之邪而內發

出時脈數洪大小便赤大便秘氣粗腹脹唇燥煩鳴此是毒氣擁盛而不得洩宜微下之使內元阻滯榮衛升降痘出順矣如百祥九宜宜散見下玄明粉散之類見附除大抵痘疹首尾元氣一耗眾元自而成後必為患矣

妄表妄下

形轉下中稱不可妄者熱其用之不當也

心熱也宜王氏惺惺散或升麻葛根湯木香參蘇飲凡瘡欲出未出而吐利者是中焦停寒或夾宿食也宜四君子湯加砂仁陳皮或和中散如夾宿食者用紫霜丸

○王氏惺惺散

白木炒 桔梗去芦 細辛 人參 茯苓 甘草 括裏根各三分

右細剉作一服入薄荷葉三片水一盞煎七分時與之

○升麻葛根湯

葛根 升麻 芍藥 甘草各一錢 右細切作一服水一盞煎七分溫服無時

○木香參蘇飲

人參三分 蘇葉 桔梗 乾葛 前胡各四分 陳皮 茯苓各五分 枳殼炒三分半 右細切作一服加生姜三片水一盞煎七分溫服

○四君子湯

人參 白朮 茯苓各一錢 甘草五分 右細切水一盞煎六服食前溫服加宿砂陳皮各六君子湯因熱用者也蓋痘瘡熱毒拂鬱于內而不得起發故用丁附木香桂心荳蔻等辛散劫鬱之劑一

二服劫而開之使鄉之鬱于內者盡因藥氣而發越乎外故痘子陷伏灰白色者皆翕然紅活凸綻而內無遺邪矣切勿過劑如一二服後劫不起者亦不可多與多則反助其毒轉增黑爛咽閉聲沉而死近世儒醫悉引內經病机諸痛痒瘡瘍皆屬心火之語以

重之宜而輒施汗下

驗形察色

夫痘有氣血之盛衰
有形色之輕重大抵
形屬於氣而色屬於
血也初出之時點若
蚊咬滯而不起雖起
塌滯皮薄而軟邪視
若無面唇先腫小者
稠密而大者平陷此
皆氣虛形重也小而
高發根欽圓淨先出
先長日見活動光潤

不燥堅突得指頭面
稀疎飲食不減此皆
氣輕形輕也見點之
初頂若火刺紅而乾
枯紫而昏暗夾斑滯
疹白而枯澁黑若塵
鋪此皆毒滯色重也
初出淡紅漸黃明亮
四五日之間頂若水
白振窠紅潤此皆血
活色輕也然則治痘
者豈不因其形色之
輕重而藥之哉亦有
痘色紅紫根窠成片
近黑上如鳥羽而有

正陳氏之失此知常而不知推之論也故使後學狐
疑不決當用而不敢用是以袖手待斃哀哉

痘瘡初發時五臟形証一

面及腮頰赤噴嚏屬肺呵欠頰悶屬肝時發驚悸屬

痘瘡五臟形色二

肝藏發水疱色微青以液為淚故

肺藏發膿疱色多白以液為涕故

脾藏發疹或加點其色如淺黃

心藏發斑其色主血故純赤

腎藏居下獨不受穢毒故無候但耳尻冷耳若痘瘡

黑陷耳及尻反熱者為逆

班痘所發之源三

夫嬰兒之胚胚暉也必資胎養以長其形焉緣母失

節慎縱欲恣冷感其穢毒之氣藏之臟府近自孩提
遠至童非值寒暄不常之候瘡疹由是而發因其所
受淺深而為稀稠焉其原實係於心一云相火之氣
所為故入於肺則成膿胞俗名碗蓋亦名麻豎以相
火乘金故破助也入于肺則成水疹俗名麤瘡入于
脾則成癭疹入于心則成斑疹

和中散

厚朴姜汁制 白木槿 乾姜炮 甘草炙各

右細切作一服加生姜一片水一盞煎六分溫服

紫霜丸

杏仁 五十枚去皮尖 赤石脂 一兩另研

巴豆 三十粒去膜油 代赭石 煨醋淬一兩研

右各另研為末和勻湯浸蒸餅為丸如黍米大三錢

沙眼摸過轉色者尤有活血之意如元雜症或有可救若黑如炭者此血死不可治也凡看痘色微此推之

痘疹驚搐

經曰諸風掉眩皆屬肝木然痘出之始雖有四臟心尖主之心火熱盛肺金受尅不能制伏肝木熱則生風上火相博神氣不安故發驚搐醫者當

驚痘疹驚搐不可遽投涼心之藥有不審而驟以驚寒治之則心寒而肌斂毒氣內陷痘何由而出也治法當平肝木利小便為切要瀉肝則風去利小便則心熱退風熱既定則痘隨出而驚搐自愈矣然痘先驚者多吉痘後驚者多凶何也痘未出之先熱蘊於內故作驚搐痘出驚止而內元凝滯故吉痘出之後

以下兒二三九八歲以上十數九食前米飲或乳汁送下

辨形氣病四

如瘡已出而毒不交者形病也瘡未出而毒交者氣病也宜補肺散加生黃芪○瘡出而毒不出者形氣俱病也形病身溫者宜解毒防風湯大便閉者宜當歸丸○形氣俱病小兒稟賦素弱者宜預服十奇散倍歸散少木香煎服

補肺散

阿膠一錢半炒成珠牛蒡子炒三分馬兜鈴五分

甘草二分半杏仁三粒去糯米炒一錢加生黃芪五分

右為末分二服水一小盞煎六分食後時時與之

解毒防風湯

防風去芦一錢地骨皮生黃芪

芍藥荆芥蕙各五分

右細切作一服水煎或為細末溫水調服亦可

當歸丸

當歸半兩黃連一錢半炒大黃二錢半甘草一兩炙

右先以當歸熬成膏以下三味研為細末以膏和為

丸如胡椒大三歲以下兒十九七八歲兒二十九食

前清米飲下漸加至以利為度

十奇散

黃芪即托裏十補散又名當歸各二錢厚朴姜製

桔梗去芦各一錢桂心三分防風去芦

川芎甘草白芷各一錢

右為細末每服一錢或二錢溫酒調下細切水煎亦

氣血虛弱復感風寒

熱毒反滯又母政輕

易發散清利故凶然

有非痘症而慢驚者

亦屬於肝而治法專

理脾土何也蓋由平

日或吐或瀉脾土虛

弱不能當肝木所剋

此非肝木之本病也

治法只須溫補脾上

為主而肝木自寧譬

如土薄而上有大木

不能乘載故无風而

自動栽培者當厚填

其上使根深本固而

自无風邪之害也痘

後有此症者亦由氣

血虛極使然也必為

難治

變黑腰疼

夫變黑腰疼之症

俱屬火盛熱極而然

經所謂亢則害承迺

之意也外火灼於

腎之問故其色黑

極腎水枯竭

宜獨不覩腰

痛者其色乾

黑是也則紫非紫則

可

○辯三陰三陽經候五

太陽病寒身熱小便赤澀出不快宜荆芥甘草防風

湯少陽病乍寒乍熱出不快宜連翹防風湯

陽明病身熱目赤大便閉實瘡遍肌肉出不快宜升

麻葛根湯加紫草

太陰病自利四肢逆冷宜附子理中湯木香散

少陰痺瘡黑陷口舌燥宜四物湯加紫草紅花

三陰病法當救裏故宜以溫劑助之

○荆芥甘草防風湯

荆芥 薄荷 牛蒡子 防風 甘草各六分

右細切作一服水一盞煎六分溫服

○連翹防風湯

連翹 荆芥穗 防風 瞿麥 木通

當歸 車前子 柴胡 赤芍 蟬蛻

黃芩 白滑石 紫草茸各三分 甘草

右細切作一服水一盞煎七分隨兒大小量數輕重

與之大小便自利者不宜用

○升麻葛根湯方見前條

每服加粳米五十粒紫草五錢煎

○又一方升麻湯 治斑在面

升麻 一兩 犀角 射香 黃芩 酒浸焙乾

人參 甘草各五分

右細切作一服水一盞煎六分食前溫服

○理中湯

人參 甘草各 白朮 乾姜炮各八分

黑是變黑腰疼之證其屬火也明矣治斯症者必大用清涼解毒於見點之初斟酌下之亦可使熱毒得解然後調理氣血如此治之庶可挽回於万一不然束手待斃悔元及矣

灰白痒塌

痘有灰白痒塌者乃氣血虧弱而變為虛寒也陽分者氣居之地也陰分者血居之地也陽氣弱則陷於

陰陰血盛則乘於陽氣虛則血進血虛則氣凌自然之理也氣虛則為麻為痒為陷血熱則為乾為燥為痛痘色白者必至於灰慘灰慘者必至於平伏痒塌此皆氣虛而不起脹血虛而不華色治法以補中益氣合四物湯補氣補血內有熱者加清利解毒之藥使血活氣行白可變為紅矣苟

右細切作一服加泡附子三分甚者五分量兒大小加減水煎食前稍熱服

○木香散

木香 大腹皮 酒洗淨 人參 赤茯苓
桂心 柯子 煨去核 青皮 半夏 姜製
前胡 丁香 甘草 各三分
右細切作一服加生姜三片棗一枚水煎量大小加減分數與之

○異功散 治痘表虛塌痒內虛泄瀉腹脹喘嗽悶亂煩

渴寒戰咬牙頭溫足冷者急宜服之
木香 當歸 酒洗去芦 桂心 白朮 炒
陳皮 肉果 麩裏煨 人參 附子 泡
半夏 湯泡七次 厚朴 姜製

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水煎服

○辯三陽証治凡痘疹春夏為順當純陽之時也古人治法與傷寒同

足脛熱 兩腮紅 大便秘 小便澀 渴不止
上氣急 脉洪數 已上七証不宜服熱藥
瘡疹一發有密如蚕種者或如糠粃者合清表宜連翹升麻湯或未出而先發搖是蕪外感風寒之邪宜茶湯下解毒丸及犀角地黄湯瘡出不快清便自調知其表當微發散升麻葛根湯若瘡青乾黑陷身不大熱大小便澀滯是熱蓄於內宜煎大黃湯下宜風散若表大熱者不可下黑陷甚者百祥丸○若瘡已發稠密微喘渴欲飲水宜微下之當歸丸及龐氏地黃膏外以黃栢膏塗面佳
值盛夏暑熱正熾適瘡火發煩渴大便實者宜玉露

單補氣而不理血則
血燥熱而痺場愈甚
矣

音啞作哈

夫人之氣出於肺之
氣喉而為聲然肺為
金又曰金空則鳴其
喉之竅虛則聲出而
清惟痘瘡之發氣拘
血載熱毒上行熱毒
生必有礙氣道其毒
不能及行於肌表故
成音啞音啞者痘出
肺竅其初小而不竟

及肌膚之痘成漿肉
亦成漿其毒壅盛則
肺竅窄狹而肺金受
火邪之剋此音之所
以不清也肺司氣之
出入而食喉者乃飲
食所進之屬茶水哈
者火甚毒壅厭門不
易進納而乃溢入氣
喉氣喉者不受物之
所故發為哈然進穀
食而不哈者蓋以食
有查滓自能入其門
而非若水溢而不犯
氣道故也七日以前

散及其露飲子或昏冒不知人時作搐搦瘡倒壓黑

陷者宜猪心龍腦膏

○連翹升麻湯 即升麻葛根湯加連翹一分是也

○犀角地黄湯

犀角 生地黄 牡丹皮 赤芍藥 各等分

右細切水煎服

○解毒丸

寒水石 研 石膏 研 各一兩 青代 五分

右以二石細研如粉入青黛和勻湯浸蒸餅為丸如

芡實大每服一九食後新汲水化下或細嚼姜水下

亦可三歲兒服半九量歲數加減服之

○宣風散

枳榔 二枚 陳皮 甘草 各半兩 黑豆 四兩 去頭末

石為末量兒大小以蜜湯調服

○百祥丸

紅牙大戟 不拘多少陰乾漿水煎極軟去骨日中曝乾復納汁中煮汁盡焙乾為細末

右一味以湯浸蒸餅為丸如粟米大每服三十九研

赤芝麻湯下量兒大小加減丸數與之

○龐氏地黃膏

生地黄 四兩 豆豉 半斤 雄黃 一錢 射香 五分

右以猪膏一斤和勻露一宿煎五六沸令三分去一

絞去下雄黃射香攪勻稍熱飲之毒從皮膚中出即

愈

○黃栢膏

黃栢 去皮一兩酒炒 葦苳 一兩去壳 甘草 四兩

右為細末以生芝麻油調從耳前至眼眶並厚塗之

痘色紅紫而兼此症者乃火氣炎土熱毒壅塞故也痘色灰白不起而兼此症者乃氣血虛弱肺胃受傷故也然此俱是逆症六日以後外痘蒸長光潤而有此症者是內痘亦長使之而然也外痘結痂而內痘自愈矣不必慮也善治者當觀其毒盛之疔於其咽喉乾燥之先而用甘桔湯瀉疫疔詳毒湯附餘或加

麥門冬杏仁牛蒡玄參荆芥之類以清氣道不使執毒有犯則自能免此患矣

寒戰咬牙

夫痘症有寒戰咬牙者或謂心火執甚元極而戰及蕪水化制之此為病熱或曰俱屬於寒如嚴冬之氣伏陽在內不勝其寒手足戰慄而齒自動也此陳氏以木香異攻而取効非寒而何

日三二次如用早前令瘡不至面縱有亦稀少

○玉露散 方見前吐瀉門

王海藏云非腎熱相火盛者不宜服此藥利北方

○甘露飲子

生地黃 熟地黃 並用酒浸 天門冬 麥門冬

山茵陳 枇杷葉 炙去毛 石斛 去子 黃芩

甘草 枳壳 麵炒黃色

○猪心龍腦膏 右細切作一服水一盞煎六分食後溫服

○梅花腦子 字研

右取新宰猪心血一箇為丸如芡實大每服一丸

或半丸量兒大小與之紫蘇湯下或井花水下亦可

○辯三陰証治 凡瘡發於秋冬為逆當純陰之時也

足脛冷 腹虛脹 糞青色 面晄白 嘔乳食

日睛青 脉沉微 已上七証不宜服寒藥

痘瘡盛出四肢逆冷或自利係在大陰脾經宜急溫之用異功散附子理中湯調中丸○痘瘡平塌灰白色不澤此是正氣不足宜十補托裏散倍黃芪加熟附子○或四肢厥逆時作搐搦係在厥陰宜溫之異功散加防風青皮或和中散去乾葛藿香加附子肉桂心

○調中丸

白朮 半兩 炒人參 五錢 甘草 炙五錢 乾姜 四錢

右為細末煉蜜為丸如菉豆大每服多不過二十九

溫水食前送下

辯形氣不足八

偏寒偏熱皆未得其
病之旨也斯症有先
後之序用藥有緩急
之宜七日以前寒戰
者乃心火亢極上燻
肺金而孔竅閉塞故
寒戰也當以表熱治
之七日以前咬牙者
乃陽明胃經主之陽
明主肌肉其經走上
下齒跟邪併陽明故
咬牙也主胃熱宜清
之七日以後寒戰乃
陰入氣道而作寒戰

也宜以氣虛治之大
用參芪加姜桂木香
以溫陽分七日以後
咬牙者陽陷於陰陰
分虛則陽入血道而
作咬牙也主血虛宜
補之大用參芪加當
歸川芎干姜以突陰
虛是七日前有此症
者屬熱而凶七日後
有此症者屬虛而亦
有可治又燕豆色而
辯其吉凶或單於寒
戰者當補氣之中兼
補血單於咬牙者於

痘疹門

肺主氣氣不足則致後三証
自汗聲不出 瘡頂陷塌 不綻肥

並宜十奇散自汗倍黃芪聲不出倍倍

心主血血不足則致後三証

灰白色 根窠不紅 不光澤

並宜芎歸湯加芍藥紫草紅花良驗

○芎歸湯

川歸 川芎各二錢半

右細切水煎服

辨表裏虛實丸

表裏俱實其瘡難出而易靨

表裏俱虛其瘡易出而難靨

諸痛為實內快外痛為外實內虛內痛外快為內實外虛

諸寒為痛

凡瘡發身痛不為外寒所折則內寒所折也宜分而治之若紅點方見為寒所折而內體有熱宜木香參蘇飲輕者消毒飲或葛根升麻加芍藥湯肉桂麝香者宜活血散併均氣

諸痒為虛

凡血氣不足多痒此証所謂諸痒為虛也宜十補托裏散及木香散加丁香官桂胃煎服或患者不能忌口因食毒物兒作痒者二物湯白芷膏或四唐子湯加解毒藥

○消毒飲

治咽喉腫痛上膈熱盛 荆芥一錢甘草五分

牛旁子三錢炒一名鼠粘子一名大力子

防風去芦五分 右細切作一服水煎加生犀角尤妙

○葛根升麻加芍藥湯

倍芍藥是也

○活血散

白芍藥

補血之中兼助氣然
此二症多發於痘後
其屬虛無疑夫雖有
少熱亦餘熱耳

乾陷倒靨

夫痘色乾紅紅後必
變紫紫必變黑黑必
枯陷此內熱漸變一
定之機也治者當於
乾紅之時急宜解散
涼血退熱清利頂雖
平陷不可以氣虛例
之而用參芪補劑補
則氣盛而血愈乾涸

右為細末每服一錢溫水調下止痛用酒調尤驗王
海藏云四肢出不快加防風一方用赤芍

○勻氣散即濟生方入味順
氣散加木香也

白木 白茯苓 青皮 白芷 陳皮 烏藥

人參 各五錢 木香 一分半 甘草 炙 一分半

右細切一服水一盞煎七分服或細末酒調亦可

蟬蛻 洗淨二十一枚 甘草 炙 一兩

右為末水煎時時服之

○百花膏

石蜜 不拘多少畧用湯和時時以鵝刷之瘡亦易
落無痕

平治諸方

石壁胡氏曰小兒難任非常之熱亦不仕可非常之
冷如熱藥太過輕則吐利腹痛重則陷伏倒靨是宜

溫涼適中可也仁齋楊氏曰諸熱不可驟去宜輕解
之蓋痘瘡無熱則不能起發史氏曰比之種痘值天
時暄暖則易生

○凡值天時不正鄉鄰痘瘡盛發宜服禁方不出方

三痘湯 油飲子 鳳龍膏

○凡初覺痘瘡欲發當先解利與傷寒相類疑似之間兼
用解表胡氏云非微汗則表不解解表當於紅班未

見之時宜用

王氏惺惺散 錢氏惺惺散 張氏防風湯

升麻葛根湯 張氏四物解肌湯 參蘇飲

○三痘湯

赤豆 大黑豆 菜豆 各一升 甘草 三兩

又以三豆淘淨用水八升煮豆熟為度逐日空心任

矣川溪曰瘡乾者宜
退火止用輕劑刑不
升麻乾葛之類溫者
宜瀉宜用風藥白芷
防風之類或利小便
所謂陷伏倒靨暑其
形畧似其症不同內
虛不能盡出者為陷
伏外被風寒所迫或
被惡氣衝觸而不得
出者為倒靨有胃虛
而不能副榮衛者雖
出而復沒故班暈白
色或黑此內虛所致
故出而無氣血以應

之其人必不能食或大便自利小便不赤或倦或嘔四肢微厥所由內虛而不能出此為陷伏也當此宜用辛溫之藥令其胃暖而榮衛無滯必自然出矣如理中湯傷寒門沾血散木香異攻之類並見下此治內虛而陷伏也痘點既出外被屋寒所感便肌竅復閉氣血凝澁而不行若此者必身痛微厥氣血盛突

與風寒相搏於肌膚必大小便秘痘點不長或黑紫或平潤此為倒靨也當此宜溫肌發散風寒如參蘇飲小柴胡湯並傷寒門或加紫草蟬退姜蚕之類溫散風寒則熱氣自然流通而痘必復長大此治外感而倒靨者也

煩燥啼叫

天癸痘之時五臟熱毒自裏達外有煩燥

意豆飲汁七日永不出

○油飲子

真麻油一升 逐日飲盡永不出

已上二方出痲鴉 倉公方

○龍鳳膏

烏雞卵一個 地龍一條活者細小者

右以雞卵開一小竅入地龍在內夾皮紙糊其竅飯

鍋上蒸熟去地龍與兒食之每歲立春日食一枚終

身不出痘瘡覺隣里有此証流行時食一二枚亦好

○錢氏惺惺散

方見前條與王氏同但方有防風川芎減半

○詳毒防風湯

方見前

○四物解肌湯

白芍藥 茯苓 升麻 葛根各七分

○活血散加防風湯

右細切作一服水一盞煎六分溫服不拘時

○麗氏紅花湯

紅花子一合 右以水半升煎百沸服之

○紫草湯

治瘡出不快及大便自利一名紫草木香湯 紫草 木香 茯苓 白木各一錢 甘草五分

右細切作一服入糯米一百粒水一盞煎至六分食

前服

○四聖散

紫草 木通各一糸 甘草 枳殼炒黃色各五分

右細切作一服水一盞煎至八分服不拘時

悶亂不眠譫語發狂
啼叫者皆由執毒蘊
蓄於中而不得發越
故也治宜涼血解毒
大小便秘者當清利
之煩燥厥冷者忌寒
黃湯諸藥亦有痘
出之時或痘後煩燥
者蓋因氣血虛弱餘
熱積於內也又宜大
補氣血為主而煩燥
自定矣

口乾發渴

天水潤下火炎上自

然之理也三焦者水
穀之道路津液者乃
氣之精化而流通三
焦以制火者也口乾
而渴者為氣虛火盛
而津液枯竭也經曰
肝熱則口酸心熱則
口苦脾熱則口甘肺
熱則口辛腎熱則口
鹹或口淡者胃熱也
是五臟之熱乃火之
使然夫火之為物非
虛不發發而不解則
津液不能上行以制
火氣炎上薰灼心脾

○樟皮飲子

樟木皮二兩 用水一升煮取半升時時細飲

○凡痘瘡出不快者有五症臨病審兒調之

天時嚴寒為寒所折不能起發宜散寒溫表冬三月
寒甚紅斑初見宜五積散正氣散參蘇飲楊氏調解
散陳氏木香散

○五積散

白芷 川芎各三分 桔梗去芦一分半 芍藥
茯苓 甘草各三分 肉桂去粗皮半夏各二分
陳皮 麻黃 去根節 蒼朮 米泔浸各一分 乾姜泡
厚朴 姜製各四分

右除肉桂枳殼二味另為粗末外一十三味細切慢
火炒令轉色攤冷次分三味末令均十一服水一盞

○正氣散

半入生姜三片煎至一盞去粗熱服
甘草各三分半 陳皮 藿香去梗 白朮各五分
厚朴 姜製 半夏 姜製各一錢半

○調解散

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水煎服
青皮 陳皮 枳殼 麩炒 桔梗去芦炒
人參 川芎 半夏泡七次 木通 乾葛各四分
甘草 紫蘇各二分

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水煎服一方
加紫草糯米

○一証炎暑隆盛煩渴昏迷瘡出不快宜辰砂五苓散煎
生地黃麥門冬臨服身熱甚者小柴胡加生地黃煩

是以津液為之下陷
準池為之乾涸故發
而為渴也 生脈散中
暑門痘前渴者宜清
金利水或紫苓湯加
乾葛煎芥痘後渴者
大補元氣保元湯即
參氏散附錄或加參
門冬五味子如瀉者
參苓白朮散之類
有陰虛火動而
渴者最為難療陰虛
者血虛也血虛不能
峻補蓋血與氣大有
不同氣無形之物血

有形之物無形者有
神卒能旺於斯須有
形者無神須當養於
平日故氣少虛可以
補之血若一虛更難
氣治此又當詳審而
不可忽也

咳嗽痰涎

咳嗽者乃和氣上衝
痰滯不行是為咳嗽
故曰咳謂無痰而有
聲肺氣傷而音不清
嗽謂無聲而有痰脾
濕動而痰氣侵惟痘

渴而便實者白虎加人參湯輕者人參竹葉湯加生
地黃煎服

○辰砂五苓散 五苓散加辰砂細研為末是也

○小柴胡湯○人參白虎湯○人參竹葉湯方俱見傷寒

証服涼藥損傷脾胃或胃虛吐利當溫中益氣宜理中

湯吐利甚者加附子或陳氏異功散木香豆蔻丸

○肉豆蔻丸

木香 砂仁 白龍骨 柯子肉 各五錢 赤石脂

枯白礬 各七錢五分 肉豆蔻 五錢 濕麵 裹煨熟

右為細末麵糊為丸如黍米大每服三十九至五十

丸煎異功散送下

○一症或成血泡一半尚是紅點此痛氣發越不透必不
能食大便如常者宜半溫裏半助養之劑用四聖散

加減及紫草木香湯絲瓜湯阮氏萬全散楊氏安法

湯

○四聖散○紫草木香湯方並見前

○絲瓜湯

絲瓜不拘幾個

連皮子燒存性為末每服一抄時時用米湯調服

此物癸痘瘡最妙或以紫草甘草煎湯調服尤佳

○阮氏萬全散 治痘瘡出不紅潤

防風 人參 蟬脫 各等分

右細切每服四錢水一盞薄荷三葉煎六分溫服熱

而實者加升麻

証外入之人皮膚厚肉腠密毒氣難以癸泄固出不快

宜消毒飲透肌散如大便秘實於消毒飲內加大黃

疹之嗽或因執毒壅
逼而不得矣散或因
氣血虛弱而外感風
寒則痰塞肺竅而不
得流通以致咳嗽故
治嗽者當以治痰為
先治痰者以順氣為
本是以南星半夏勝
其痰而咳嗽自愈枳
殼橘紅利其氣而痰
飲自際清肺全解熱
毒而和火自退亦有
痘後咳嗽脇痛者經
云左右者陰陽之道
路兩脇之謂也由餘

毒作中陰陽之氣不
能升降故作脇痛治
宜小柴胡湯加赤茯苓
五味枳殼桔梗之
類傷寒門使二氣流
行而痛自定矣有痘
疹痰涎膠固因毒氣
閉塞而有碍於津液
津液不能流通故作
痰涎正氣被塞於胸
膈或喘或嗽喉中作
聲如拽鋸乳食易液
入口即嗽吐出者此
毒氣停積於肺胃也
當升發解毒若用半

枝子仁煎服瘡出太稠宜犀角地黄湯張氏解毒防
風湯血氣不足宜十奇散咽嗑不利宜如聖湯加薄
荷枳殼口中氣熱咽痛口舌生瘡宜甘露飲子驚風
搐搦宜抱龍丸煩渴宜獨參湯黃芪六一湯

○透肌散

紫葺茸 綠升麻 粉甘草各一錢

右細切水煎服或與消毒飲同煎服尤妙

○四聖湯

桔梗二錢 甘草一錢 一方加牛旁子麥門冬各二

右細切水煎時服之

○抱龍丸 見驚風門

辨外証逆順

身熱溫燠者順 寒涼者逆 能食大便實者順

不能食大便利者逆

辨外証輕重

輕者 作三次出 大小不一 頭面稀少

重者 耳中無 根窠紅活 肥滿胃澤

辨痘瘡初末形證

微者其和在腑發為細疹狀如蚊蚤所螫點點赤色
俗名麩瘡○甚者其和在藏為痘瘡狀如碗豆根赤
頭白色出膿水俗名痘瘡二三日始見微欲出如
粟如黍或如菜豆或如水珠光澤明淨者佳四日大
小不等根窠紅光澤者輕如稠密陷頂併瀉者重六
日七日瘡形肥紅光澤者輕如身熱氣喘口乾腹脹
足指冷者重八日九日長足紅滿瘡肥色者輕如寒
戰悶亂腹脹煩渴氣急咬牙者重之至也十日十一

夏等治非其法夫滴
藥不受者死

發熱生死

發熱一日遍身只出
紅點稠密如蚕種摸
寸不碍于者死
發熱時腹中大痛腰
如被杖及至振痘乾
燥而前痛猶不止者
死先腹痛後止可用
助血氣藥以救之
發熱時身無大熱腰
腹不痛過三日絕見
點堅硬碍手者吉

日瘡當結醫如欲落之時將愈十二三日當醫而
不醫者為逆身稍利之以防其餘毒身不壯熱或腹
脹或瀉湯用十二味異攻散救之

辯不藥而愈

痘脚稀疎

根窠紅綻

不瀉不渴

乳食不減

四肢溫和

身無大熱

已上六証並不須服藥惟宜善加調護須使房室溫
盜屏諸穢氣忌見外人毋犯房色及往來婦人月水
併腋臭者皆不可近惟宜燒大黃蒼朮以辟惡氣勿
宜燒沉檀降真乳香腦射帷帳之內宜懸胡妥清酒
噴床帳併燒木為佳夫痘瘡之毒最可怕穢惡之氣觸
犯切不可信僧道看經解穢况無纖毫之力而反恐
被其穢惡之氣觸犯亦不可恃其能解而不預防戒

之戒之

辯五不治証

瘳場寒戰咬牙渴不止

痘紫黑色喘喝不寧

灰白色陷頂腹脹

頭溫足冷悶亂飲水

氣促瀉泄洩

辯疹有陰陽二証

赤疹屬陽遇清涼而消

白疹屬陰遇溫暖而消

傷寒時氣疹附

溫毒疹宜玄參升麻湯重用荆防敗毒散

胃爛班因陰明胃實矣下或下之大早所致宜化班湯虎

氏石膏湯○時氣班宜石膏湯○陽毒班胃實之人

慎服熱劑或加以風暑宜陽毒升麻湯

○玄參升麻湯

報痘生死

報痘時頭面稀少胸

發熱時用江紅紙條
蘸麻油點照心頭皮
肉裡若有一塊或週
身皆有成塊經者八
九日後死

報痘時頭面稀少胸

前背後皆无根粟紅

潤頂尖碍手如水珠

光澤者上吉也不必

根粟

根痘時煩燥不寧腰

腹痛不止口氣太臭

出紫點者死

根痘時痘色白皮薄

而光根粟全无紅色

或根帶一綿紅三五

日即長如粟且大此

痘决不能貫衆久後

成一包清水擦破即

死不可因其好看妄

與下藥

報痘全不起頂如湯

泡及每口火燒者十

日全亦爛而死

報痘時起紅班如錦

紋者六日死遍身如

蛇皮者死

報痘時里凝如瘰狀

肌肉成塊黑者只死

而已

玄參去芦洗

○荆防敗毒散

柴胡

茯苓

獨活

○化班湯

○麗氏石膏湯

香豉一合

生姜五錢

右細切作一服水

徐上服之

○陽毒升麻湯

升麻

甘草各一升

右細切作一服水

一毒氣流於陰陽脾經則癰發四肢手腕併膝腫

痛宜消毒飲重者十六味流氣飲加附子或酒浸大

黃煎服及必勝膏蠅子水等付之

○消毒飲

○十六味流氣飲

川芎

木香

枳殼各四分

升麻

甘草各一錢半

柴胡

枳殼

防風各四分

右細切作一服水

葱白五升

石膏一兩

大青

升麻

芒硝各一升半

射干

黃芩

人參

一盞半煎至一盞食前溫服

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

升麻

甘草各一錢半

柴胡

枳殼

防風各四分

右細切作一服水

葱白五升

石膏一兩

大青

升麻

芒硝各一升半

射干

黃芩

人參

一盞半煎至一盞食前溫服

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

升麻

甘草各一錢半

柴胡

枳殼

防風各四分

右細切作一服水

葱白五升

石膏一兩

大青

升麻

芒硝各一升半

射干

黃芩

人參

一盞半煎至一盞食前溫服

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

升麻

甘草各一錢半

柴胡

枳殼

防風各四分

右細切作一服水

葱白五升

石膏一兩

大青

升麻

芒硝各一升半

射干

黃芩

人參

一盞半煎至一盞食前溫服

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

方見前

升麻

甘草各一錢半

柴胡

枳殼

防風各四分

右細切作一服水

葱白五升

石膏一兩

大青

升麻

芒硝各一升半

射干

黃芩

人參

一盞半煎至一盞食前溫服

方見前

不止用退火回生散
報痘三日之後痘當
逐漸起脹若根窠紅
綻頂肥滿光澤潤者
生
起脹時痘之根脚全
然不起其頭面皮肉
紅腫如瓜之狀者死
起脹時腰腹或痛或
止遍身紫點如蚊蚤
所咬全不起發者死
起脹時痘伏陷不起
腹中膨脹不能飲食
氣促神昏者死畧能
飲食用消腫藥治之

右細切作一服水一盞煎七分服氣血虛而自利者
加附子大便實加大黃

○必勝膏

馬齒莧 梓汁 猪膏 脂

右以三味共熬為膏塗腫處

○蠅子水

蠅子不拘多少活者以水養五日施

○一毒氣流於太陰肺經則臍肉併手腕腫流為赤癰毒
宜消毒飲如聖湯五福化毒丹雄黃解毒丸解之氣

血虛者十補湯加桔梗枳殼犀角煎服咽喉不利或

腫痛宜薄荷如聖湯

○五福化毒丹 方見驚風門

每兩分作十二丸一歲兒一丸分作四服用薄荷水

起脹時遍身黑陷悶
亂不寧神昏氣潰者
死

○如聖湯 方見前

○雄黃解毒湯

化下瘡餘毒上攻口齒涎血臭氣以生地黄有妙汁
化一丸用翎刷入口內

○雄黃 雄黃 飛過各一多半 巴豆 去皮尖用四十粒

右為細末醋煮麵糊為丸如菘豆大每服二三丸熱

清茶下量兒大小與之

○一毒氣流入大腸則便膿血或下腸垢或大便秘結宜

犀角地黄湯身煩熱渴宜黃連解毒湯熱勢盛者小

承氣湯下利者黃連解毒湯黃連阿膠丸駐車丸

○黃連阿膠丸

黃連 二兩 阿膠 炒成珠一兩

右以黃連茯苓同為細末水調阿膠末搜和為丸如

起脹時根窠紫色乾
燥不潤全然不起發
者死

貫膿生死

貫膿時根窠紅潤貫

膿充滿如黃腸色二

便如常飲食不減者

吉不必服藥

貫膿時純是清水皮

白而薄與水泡相似

三四日後遍身抵破

而死

貫膿時吐利不止或

二便下血乳食不化

痘爛無膿者死除

二便不下血猶可用

止瀉及消食之藥

晉膿時二便閉目閉

聲啞腹中脹滿肌肉

黑者死

結醫生死

結醫時色轉蒼胸一

二日從口唇四邊結

醫由胸腹收至兩腿

然後脚背和額上一

梧桐子大每服二十九溫米飲送下

○駐車丸

阿膠炒成珠當歸去芦各黃連三十兩乾姜泡十兩

右為末以阿膠和成餅丸如梧桐子大每服二十九

食前清米飲下日三服小兒丸如麻子大量兒大小

加減

○一痘瘡入眼宜决明散密蒙花散撥雲散蛤粉散

○决明散

草决明 赤芍藥 天花粉 甘草

右各等分為細末每服五分食後清茶調下

○密蒙花散

密蒙花 青箱子 决明子 車前子

右各等分為細末用羊肝一片破而為三摻藥入肝

解結醫落而愈者吉

結醫時遍身臭爛如

塔餅其不可近目中

無神者死

結醫時遍身發痒抓

破無膿皮卷如豆殼

乾者死

結醫時寒戰手足顫

掉咬牙緊口者死

落醫之後痘痕雪白

全無血色者死急宜

補氣血養脾胃庶幾

附遺瘡治

內令均却仍舊合而為一以酒水濕紙七重包裹於
漉灰中煨熱勿令焦焙乾研末入射香少許每服三
錢重食後米飲調下

○撥雲散

羌活 防風 柴胡 甘草各等分

右為細末每服二錢水一盞煎至七分食後卧服薄

荷汁茶清或菊花苗煎湯調皆可忌藏鹽鹹醬溫麩

炙燂炊氣及一切發風動火之物

○蛤粉散

穀精草 海蛤粉各等

右為細末每服二錢七用豬肝許以竹刀批開摻

藥在內捲了外以青箭箬包裹麻線札結定用水一

碗煮令熟入小口瓶內薰服候溫取食之日一服不

發熱之物或吐或瀉

而精神不減者無害
此熱從內解但不宜
又見恐耗氣耳

熱時毒音遂變者重
宜清肺飲其枯湯加
鼠粘荆芥或玄參

小兒出痘凡裏有大
熱常利小便使心火
有所引導雖不用涼

藥其熱自泄去矣宜
導亦散附餘

凡裏有小熱不宜利
小便當解毒若小熱
利其小便恐損其氣

百寶丹片地黃湯消
毒飲並見下

起時頂雖起而四
圍赤白枯澀者屬血

虛有四周雖收暈而
頂陷者屬氣虛頂陷

白色氣血俱虛宜保
元湯酌餘加芳歸肉

桂木香之類用人乳
汁好酒以進之

起脹時諸痘未起而
其中有先起虛大色

如金黃者名曰賊痘
大而黑者名曰痘疔

以銀簪刺破口含清

過十服遂退

○一熱毒流於三陽之後經則腮項結核腫痛且荆防敗
毒散十補湯減桂服消毒飲倍加忍冬藤煎服

○荆防敗毒散
○十補托裏散 即十奇散 消毒飲 方並見前

○祖傳經驗秘方凡痘後不問癰毒發於何經初起紅腫
時却用黑棗赤三豆以酸醋浸研漿時以鵝翎刷
之隨手退去其効如神

○一小兒痘後二十日不大便其糞燥作痛垂死曾用大
黃芒硝枳殼巴豆等藥及用蜜導法又服香油一碗
許俱不通愚令一婢以真麻油含口內用小竹筒一
筒納穀道中吹油入腸內須臾即通真良法也

古人拯治痘瘡要法

王氏指迷云痘瘡亦時氣之一端一人受正傳染其
餘又云瘡疹有熱則易出一出遍及於肌膚○張氏

喚曰痘子氣均則出快蓋血隨氣行氣逆則血滯○
王氏疹者脾所生脾虛時旺藥之不能勝土熱動心

神而生驚○錢氏曰肝風心火二藏交爭而致搐又
曰痘症未形而先搐大忌涼心蓋瘡屬心心主血心

寒則血不能行痘欲出而不可得也切須慎之大抵
治驚推平肝利小便均氣最妙仁齋楊氏曰大熱當

利小便宜五苓散導赤散小熱當解毒宜消毒飲四
聖散

○陷伏倒靨黑陷

一証變壞歸腎黑陷宜錢氏百祥丸宣風散

一証外感風寒所致冬時宜五積散減麻黃加桂心紫

痘疹論

十五

水吸去穢血用紫草膏見下或油胭脂加血餘灰珍珠末填入瘡內則諸瘡自然起發矣

起脹時瘡上有小乳不黑不白名曰蚌痘此因護理不密而有是痘大泄元氣不治則凶用保元湯加丁香肉桂附餘其乳一密而痘自起矣
貫膿時痛不止者氣滯也用保元加木香山查以行滯氣即參

甚散附餘痒癢不止者血盛也血味醜醜嗽皮肉作痒用保元倍加黃芪芍藥以制血盛若兼足作痒不妨
貫膿時成片作爛膿水不乾內宜大補氣血外用敗草散敷之見下如頂平脚闊膿不滿足用十全大補湯加水香乾姜治之虛損門
貫膿時色白如水晶內無膿者宜內托散

草春時不換金正氣散加川芎白芷防風或風邪所襲宜消風散加紫草煎服

一証乳食所傷內氣壅遏宜楊氏調解散或四君子湯加縮木香川芎紫草大便自利宜附子理中湯

一証或因父母不謹犯房事月水及乳母腹氣穢濁諸忤所致宜阮氏辟穢丹焚而薰之仍以胡妥酒噴帟帳及懸胡妥於床帳中甚者以胡妥湯化下蘇合香丸煎塗薰亦妙聖製再甦散尤妙

一証毒氣入裏黑陷宜猪尾膏神驗

○不換金正氣散

厚朴 姜製 藿香 去梗 甘草 半夏湯泡七次去 蒼朮 米泔浸 陳皮 各五分

右細切作一服加生姜三片棗二枚水一盞煎至

分溫服

○辟穢丹

蒼朮 川芎 真香 北細辛 乳香另研 甘松

右為細末烈火焚之 今世俗例以黃茶燒烟薰之最好

○再甦散

治痘瘡觸毒氣入內 明白礬 地龍去土炒各一兩 右為細末每服五分用猪尾血一椀斗許用新汲水少許調下不拘時

○凡痘瘡膿汁不乾蓋瘡出太盛表虛難靨以致膿水粘

衣着席濕痛不能轉側宜白龍散敗草散等附之

○白龍散

加丁香乾姜附餘或

木香散加糯米乳酒

見下歌曰痘色虛明

似水晶莫將此症看

為輕十一二日防痒

場十四五日命瀕傾

痘疹貫漿已滿熱毒

已解至收膿時有數

日不焦者只看痘色

如初此亦無妨用八

珍湯加水通牛蒡

損門補脾利水而痘

自斂矣

凡當醫不醫泄瀉不

渴寒散牙屬虛寒

黃牛糞日乾火煨成灰取心中白者為末帛裹撲之

○敗草散

用蓋屋及墻背上述年腐草洗淨焙乾為細末帛裹

撲之及鋪床蓆上佳

○馮氏天花散 治痘後失音

天花粉 桔梗 白茯苓 柯子肉

石菖蒲 甘草各等分

右為末用水調半匙在碗內外以小竹七莖黃荊七

條縛作一束點火在碗內煎臨卧服

○參芪飲 專治元氣虛弱精神倦怠肌肉柔

慢面青眊白飲食少睡臥不安而不振者不分已

出未出皆治

人參一錢黃芪二錢甘草五分初熱生用出定多

右用水一鍾姜一片煎四五分不拘時服

楊仁齋謂其能補益元氣更名保元湯蓋為元氣虛

弱者立也後世治痘者多主之不分元氣虛實之異

槩用於血熱毒擁之瘡是為以實攻實豈不悞哉

○參芪飲加減禁忌法 如前虛瘡辯認不差以此方為

主前後始終皆不可易中間雜瘡兼見雖或不同要

皆氣虛所致則以本方而斟酌加減之母得過投發

散苦寒之劑初熱未出之際只可少濟以開提勻氣之

功如桔梗川芎之類漿足之後助以收斂如白木芍

藥茯苓耳

出不快加川芎

小便赤加大腹皮

大便澇加肉果

禁用 蟬退 鼠粘

禁用 車前 滑石

禁用 雀麥 山梔

也川木香散見下作

瘡者加白芷當歸蟬

退

咽喉腫痛聲啞在初

出之時為毒癰氣道

宜其枯湯加玄參年

旁 瘰癧在起服貫膿

之時因內疔長大以

致氣道窄狹而有此

證不治自斂在醫後

而喉痛腫者凶

醫後身弱坐立戰搖

宜八珍湯加黃芩知

母渴加麥門冬 虛損

門時瀉者以八珍湯

加肉豆蔻木通

痘痂當落不落者乃

火盛也用紫參湯傷

寒門辰砂六一散驚

昏門外以蜜水調滑

石末付之

孕婦出痘先後要安

胎為主條卷白木文

葉砂仁血虛者以四

物湯再加托藥虛損

門

附遺凶瘡

發熱時頭溫足冷昏

悶如痴渴飲者凶

婦人經水不調者重

隨胎血不止者凶胎

不墮入熱不退者凶

自腰下見點腰上不

出者不治

斜視之臉如橘皮不

分肉地者死

起脹時色如白飯平

塌不起者死若此者

乃毒盛血滯不可認

以虛寒之瘡

起脹時有六七粒油

而成塊於中有一大

者扁潤歪斜若此不

治

小便短澀加大腹皮

大便實秘加酒炒當歸

泄瀉加白木 肉果

嘔吐加羌活 丁香

煩渴加麥門冬 芍藥

減食加白木 人參

傷食加神曲 麥芽

喘急在三四日前者加

加紫蘇防風枳實 痰則從痰治加杏仁具母有虛証

見者決非實喘不過是毒不得外達上乘於肺巨禁

用麻黃萊菔蘇子枳殼 下氣等藥六七日後或先魯

泄瀉而後氣喘者虛之極也加人參則喘自止寢服

加大腹皮厚朴煎發散開提禁用 枳殼萊菔 寬中丁

禁用滑石

禁用大黃 生地黃

禁用龍骨 石脂

禁用半夏

禁用天花粉 葛根

禁用烏梅 半夏

禁用山查 砂仁

禁用枳實 蓬木 三私

禁用巴豆 大黃

桔梗 蟬退 杏仁

風則微散之

有虛証

痰則從痰治

加杏仁具母

有虛証

氣等藥仍視小便秘與傷食否亦有傷於生冷或寒

氣鬱遏而然從內傷外感而治內傷用丁桂神曲木

香外感用防風等藥發散治之當熱不執四五日間

手足厥冷水硬不起加丁香官桂炙黃芪川芎夏月

減丁香

四肢不起加防風減川芎

漿不足加白木 當歸

灌清漿加白木 茯苓

喘嗽加五味子 杏仁

發痒加白木 當歸

疥甚外用茵陳 燒烟燻之禁用沐浴發散之藥恐成

氣脫

氣脫

氣脫

附○十神解毒湯古方無

專治身發熱壯熱腮紅臉赤

痘後慢驚目無神而面色青者死

辯疑賦

胎毒重積發為痘瘡傳染由於外感輕重過於內傷初起太陽壬水射乎丙下後偏陽明血水化為膿漿勢若燃石變如反掌欲知表裡虛實須明寒熱溫涼症候殊形臟腑具狀肝火激成水泡肺主涕而膿漿心班紅紫脾疹赤黃

毛焦色枯已出未出三日已前痘點煩紅燥渴欲飲睡卧不寧小便赤澁者此熱盛也並皆治之

當歸尾 生地黃 紅花 牡丹皮 桔梗

赤芍藥 大腹皮 木通 連翹 川芎

此方治血熱痘疹以涼血行血為主佐以桔梗川芎有開提發散之功引以大腹皮木通有疎利執毒之效臣以連翹牡丹皮有解毒之良用此以治血熱痘疹則能內外分消熱毒雖盛度幾解散表裏自然和平矣古人用黃連解毒湯恐驟用寒涼不惟水伏熱毒及出不快抑且熱毒為其所抑則鬱於臟腑或吐痛腹脹內潰而死者有之豈若此方用之為穩當若不得已而用黃連芩柏亦須酒炒一以製其寒涼之性二以助其上行之勢借連柏以解毒耳

腎經下不火汚濁

為變黑而可防其

外癢宜何內臟呵欠

類屬肝木之因咳

嗽宜建芳肺經之象

而目滯赤者心火炎

於膏膈手足厥冷而

昏睡者脾土困於中

央耳尻屬腎溫煖如

常二處灼熱痘症非

張先分部位次察炎

祥陽明從目落鼻太

陽形於頭上心火炎

熱則鼻乾面赤肺金

鬱結則膈膈先傷手

十神解毒湯加減法

身熱壯盛加葛根前胡 毒盛綿密加荊芥鼠尾子

渴加天花粉竹葉滑石 小便尿血加犀角山梔

大便黑加犀角黃連或 吐血乾嘔加黃連犀角

發紅班加犀角黃芩黃 小便赤加山梔

小便短澁加猪苓澤瀉 小便秘加滑石瞿麥

大便秘加枳殼前胡 大便秘喘加枳殼前胡

煩燥加麥門冬 煩渴狂亂謔語加知母麥

嘔吐加猪苓澤瀉黃連 咽喉痛加甘草鼠尾刺芥

泄瀉加猪苓澤瀉防風 嘔加橘皮

已上並用燈心十四根水煎服

○保嬰百補湯 專治痘瘡八九日漿足之後別无他

瘡並以此方調理氣血資養皮胃不拘寒熱二痘皆

足是乎脾胃肝膽主
脇肋之傍頭項三陽
交會腰背統乎膀胱
外症分明用心想像
泄瀉者邪甚於下嘔
吐者邪甚於上氣逆
而腹脹隱隱毒甚而
腰痛惶七心熱甚而
驚搖胃邪突而顛狂
口燥咽乾肺受火邪
而液竭便秘溺澀腎
因火旺而津亡欲識
痘之輕重當觀執寫
形狀毒甚乎心如炎
火勢微乎內外清涼

寒熱往來神氣盛定
知痘出必微祥數番
漸出兮春回寒谷一
芥湧出兮火烈寬胸
蚕種蚤班刻期而扁
陰府蛇皮蟬退引日
而返泉鄉雖怕紫紅
更嫌灰白最宜淡紅
滋潤切忌黑陷乾紅
色要明潤方猶恐薄
嫩之易破痘著乾結
兮又愁痒塌之難當
面頰稀而磊落清安
可保胃腸密而連串
吉凶難量頂要尖員

可服之惟氣虛瘡八九日後本方加黃芪二禾官桂

少許若有別瘡在審虛實隨瘡加減而已

當歸 芍藥 地黃 白朮 人參

茯苓 山藥 甘草

右水一鍾加棗二枚煎六分溫服

太乙保和湯又名紫草透肌湯

附○專治血熱痘瘡服十神鮮毒湯後熱瘡悉去內外和

平見點三日之後不易長大粗肌者用之則能保和

元氣活血解毒助痘成漿易痂易落也

桔梗 紫草 川芎 山查 木通

人參 紅花 生地黃 甘草 糯米五十粒

右用燈心七根姜一片水一鍾煎六分溫服

便澁腹脹加大腹皮 繁紅不潤加當歸蟬退

出不快加鼠粘子 陷塌加黃芪

痛加白朮 不勻加防風

水泡加白朮芍藥 嗽加五味子麥門冬

渴加麥門冬 痒加白朮芍藥

七八日後漿足身復壯熱便秘煩渴腹脹喘急前胡
枳殼湯漿足禁用此方另立湯飲在後

附○奪命五毒丹 治痘黑陷倒靨乾枯不起者神驗

蟾酥少許 牛黃二分 硃砂一禾 雄黃三分 冰片二分

右五味用鑽猪尾血為丸如麻子大薄荷湯下一丸

移時活動

附○談笑轉金丹 治同上

取用寅亥戌未四時四靈丹加脐香下 俱用天靈蓋

附○大造保童丸 治同上兼治痘毒亦妙

不宜平陷瘰宜飽滿
切忌空瘡皮喜老而
愁癩膚愛活而怕光
結實高聳始終无慮
丹浮皮肉必主形傷
唇面預腫号八九如
何可过腰痛胃爛号
一七定受災殃瘡堆
口舌毒纏頸項咽瘡
喉腫飲食難當瀉痢
膿血毒甚無藥人力
難盡天命匪長痘瘡
焦落辨別阴阳人中
上下先屬為良若是
足腫先屬黑多凶少

一壘子人胎骨 二狼子狗胎骨 三猫子猫胎骨

加脐香下

附○一字金丹 治同上

帝丁紫花地丁 紫河車 金線重樓 山慈菘

附○牛李膏 一名必勝膏

牛李子不拘多少又名鼠李子牛訕子猪李子烏罌
子隨其地呼名

右取汁石器中熬成膏牛李野生道邊至秋結實黑
圓成穗或無生者用乾者為末水熬成膏遂服之皂

子大煎杏仁湯下

附○猪尾膏 治痘倒靨心神不寧

用小猪尾尖刺血二三點入生腦子少許辰砂末一
錢同研成膏以木香湯化下立効

古要慎防

麻疹指南

麻疹附餘

夫麻疹之與痘瘡始
似而終殊形同而證
異痘瘡發於五臟麻
疹出於六腑然麻疹
一症先動陽分而後
歸於陰經故標屬陰
而本屬陽其熱也氣
與血分相博故血多
虛耗其治也先發散
行氣而後滋陰補血

附○獨神散 治痘陷入不發黑色而氣欲絕服此漸甦

紅潤川山甲湯洗淨炙令焦黃為末每服五分入射

少許煎木香湯調下或紫草湯入酒少許調服

附○羌活散鬱湯 專治突熱擁盛鬱遏不得達表氣粗

喘滿腹脹煩燥狂言譫語睡卧不寧大小便秘毛豎
而浮眼張若怒並有神效并為風寒外搏出不快者

同治

防風 羌活 白芷 荊芥 桔梗

地骨皮 川芎 連翹 甘草 大腹皮

鼠粘子 紫草

右為粗散水一鍾灯心十四根煎至六分温服

○羌活散鬱湯加減法

初發身熱壯盛腮紅面赤毛焦皮燥咳嗽喘急者加

凡動氣燥得之藥皆不可下也

發熱之物增寒壯

熱鼻流清涕身熱疼

痛嘔吐泄瀉咳嗽氣

急腮紅眼倦多足麻

候宜服升麻葛根湯

表之見下得汗則皮

膚通暢腠理開豁而

麻疹易出也於發散

藥中加葱白生姜使

孔竅中微汗潤澤免

執閉發搖之症

一發熱咳嗽之時既

明麻疹有出不快者

升麻 腹脹喘急鼻塞面色若怒毛直及枯加麻黃

煩渴加天花粉干葛 便秘加當歸甚則加大黃

嘔吐加猪苓澤瀉橘皮 禁用 生姜丁香木香半夏

泄瀉加升麻 禁用 白木茯苓豆寇龍骨

喘嗽惡風加桑皮紫蘇 失血加犀角地黃黃連

痰班加黃連黃芩山梔 小便赤澀加滑石山梔

鼻衄加黃芩犀角 驚悸加木通山梔

瘡加青皮 不思飲食加山查

傷食加山查神曲麥芽 見點二三日間出不快利加

煩紅赤色加生地黃紅花牡丹皮去白芷防風

皮急肉紫身熱壯甚加葛根前胡

見點三日之內並依本方加減及三日之後痘瘡出

疥血包已成而前瘡悉平不得復用此方恐發散太

過難於行漿另有方藥在後其禁用藥劑並從血熱

痘瘡法而裁治之故此方不立禁忌

○益元透肌散 專治擁熱痘瘡服羌活散鬱湯後擁

瘡悉開氣血和平見點三四日後不肥大者不成漿

者用之則能勻氣解毒透肌達表領出元陽助瘡成

漿而易結膿窠也加減與保和湯同論漿足之後另

有保嬰百補湯在後

即太乙保和湯去生地紅花加蟬退鼠粘陳皮

右水一鍾加燈心十四根棗二枚煎六分溫服

○托裏散 解毒補氣血通用

陳皮 貝母 桔梗 人參 黃芪

甘草 當歸 川芎 連翹 山查

物湯換生地加柴胡

黃芩乾葛紅花牛蒡

一散鮮之 刺疾門四

乃火盛毒熾宜用六

如色紫紅乾燥暗晦

小而勻淨既出之時

凡看瘡疹之法多於

耳後項上腰眼先見

其頂大而不長其形

用麻黃湯陽明門恙

活湯消毒飲見下發

散解毒之劑外以羌

萎酒糟蒸熱擦之自

頭上至足為齊頭面

愈多者為佳

凡看瘡疹之法多於

耳後項上腰眼先見

其頂大而不長其形

小而勻淨既出之時

如色紫紅乾燥暗晦

乃火盛毒熾宜用六

一散鮮之 刺疾門四

物湯換生地加柴胡

黃芩乾葛紅花牛蒡

一散鮮之 刺疾門四

乃火盛毒熾宜用六

如色紫紅乾燥暗晦

小而勻淨既出之時

凡看瘡疹之法多於

耳後項上腰眼先見

其頂大而不長其形

小而勻淨既出之時

如色紫紅乾燥暗晦

乃火盛毒熾宜用六

一散鮮之 刺疾門四

物湯換生地加柴胡

黃芩乾葛紅花牛蒡

一散鮮之 刺疾門四

乃火盛毒熾宜用六

如色紫紅乾燥暗晦

小而勻淨既出之時

凡看瘡疹之法多於

耳後項上腰眼先見

其頂大而不長其形

小而勻淨既出之時

連翹之類虛損門茲

陰涼血而挽首除所

謂養陰退陽之義也

一麻疹出後見風沒

早未清爽者乃為風

寒所冲麻毒內攻若

不治胃爛而死宜消

毒飲加發散之藥見

下雖不復出亦尋愈

矣

有麻出三日不沒者

乃內有實熱宜四物

湯虛損門加清利之

藥如以連防風連翹

以治其中則熱自解

肉桂

白芍藥

加姜三片水煎服氣滯加木香磨入

附○四順飲 治痘壯熱或大便秘

當歸 芍藥 甘草

大黃 水煎服

附○玄明粉散 治血熱便秘

玄明粉二斤

當歸尾煎湯冷調服

附○三仁膏

治痘疹大便堅實不宜下者服此潤通

麻仁炒研細去壳 枳子打碎去皮 桃仁去皮炒

研極爛用芝麻

合微炒研細再入蜜水研極爛以

帛濾去粗殼每服同三仁蜜湯調下多少量兒取用

附○紫草化毒湯

治痘已出未出熱癢不快並服之

紫草二斤

陳皮一斤

升麻

甘草各五分

右為細末每服水一鍾葱白三寸煎至五分量兒

小調服瘡疹氣勻即出快紫草滑竅去心腹邪熱

皮快氣升麻散熱毒甘草解毒小便赤加木通

附○人牙散 治痘不起灰暗

人牙

好者燒存性

為末加射香少許調下

附○如聖散

治痰救風熱聲啞喉痛

甘草一斤

桔梗二斤

牛蒡一斤

麥門冬一斤

防風七分

玄參

射香各一斤

右葱三莖水煎服熱盛加犀角九妙或黃芩

附○如神湯 治腰痛

當歸

桂皮

玄胡索各等分

為末酒下一錢

附○三仙散

此治痘疔之要藥

紫花

地丁草

番白草

當歸尾

牛蒡荆芥玄參或四

清胃湯合其結湯加

一麻後牙疔紅腫者

端加蘇子桑皮

合二陳加瓜蒌積梗

五味湯加麥門枳殼

麻後痰嗽不止四物

痢疾門

泄瀉門香連丸之類

藥中溫門或豆蔻丸

散加木通香連白芍

一麻後瀉痢者乃積

之症加犀角汁解之

而麻自消矣如失血

物加茵陳木通生犀
角之類以利小便使
熱下行如癩瘡色白
者為胃爛不治之症

也 孕婦出癩以四物

湯加白木條今艾葉
砂仁以安胎虛損門

清熱為主則胎不動
而癩自愈矣

一癩疹正出之時不
進飲食者但得癩色
淡紅潤澤亦無害也
乃此毒未解內蘊實
熱故不食耳癩退不

右水一鍾酒二盞煎服

綱○四聖丹 治痘疔神效

珍珠 琬苴燒灰血餘燒灰二灰等分水片半分

右為細末用油胭脂調成膏先將金銀簪撥開疔口
將藥填入瘡內即變紅活矣

附○大連喬飲 治痘後腫毒蘊熱

連喬 當歸 白芍 防風 滑石

柴胡 木通 黃芩 荊芥 枝子

車前 牛蒡 各五分 蟬退 甘草 各二分

右水一鍾半姜三片煎至五分溫服

附○十三味敗毒散 治痘後腫毒

當歸 陳皮 白芷 赤芍 川山甲

乳香 沒藥 貝母 皂角 金銀花

防風 甘草 天花粉

右水酒各半鍾煎服

附○三合湯 治痘後癩白氣血虛

四君子四物二陳合成一劑姜棗水煎服凡癩白者

服此數帖滋養脾胃免生他症

附○金華散 痘後肥瘡疔瘡疥癬能收水涼肌解毒

黃丹 黃柏 黃芪 黃連 大黃

輕粉 寺分 射香 少許

右為末瘡溫乾疹燥用臘猪油熬化調搽

附○生肌散 治疔蝕不斂并痘後膿血雜流不收等瘡

地骨皮 黃連 甘草 黃柏 五倍子

為細末乾

附○瀉肝散 治痘後肝經蘊熱目痛

一癩疹前後有燒熱

之類如惹癩虫上行

梅李魚酒蜂蜜香鮮

潤澤可也又忌瓜桃

白湯以滋其渴耳必

渴飲水只宜少許葱

深患戒之慎之如極

凡出癩疹之時大忌

軍腥生食宜避風寒

水濕苟有不謹最為

食自川四物湯加神

食美虛損門如胃氣

弱者少下地黃

不退等症並屬血虛
 血熱只宜四物按證
 照常法加減湯加麥
 門冬犀角汁軟加瓜
 蔓霜有痰加貝母去
 白陳皮切忌人參白
 木半夏之類如倘誤
 用為害不小戒之戒
 之蓋瘡疹屬陽血多
 虛耗今滋陰補血其
 熱自降所謂養陰退
 陽之義

辯疑賦

麻雖胎毒多帶時行

氣候惟此傳染而成
 其發也與痘相類其
 變也此痘匪輕先起
 於陽後歸於陰毒盛
 於脾熱流於心臟肺
 之傷肺則尤甚始終
 之變腎則無瘡初則
 發熱有類傷寒眼胞
 困倦而難起鼻流清
 涕而不乾咳嗽少食
 煩渴難安邪目視之
 隱隱皮膚之下以手
 摸之磊上肌肉之間
 其形若介其色若丹
 出見三日漸沒為安

當歸 川芎 白芍 防風 白蒺藜

甘草 荊芥 黃連 木賊 蔓荊子

菊花 加灯心水煎服

○羚羊角散 治痘後餘毒不解上攻眼目生翳羞明

羚羊角 鎔黃芩 黃芪 升麻 草决明

車前子 防風 大黃 芒硝各等分

水一鍾煎半鍾稍熱服

此方以羚羊角主明目為君升麻補足太陰以實內
 逐其毒也黃芪補手太陰以實外禦其邪也為臣防
 風升清陽車前瀉濁陰草决明療赤痛淚出黃芪大
 黃芒硝用以攻其固熱為使然大黃芒硝乃大苦寒
 之藥當量兒虛實加減之

○復明散 治痘後目痛紅絲翳膜

當歸 川芎 白芍 防風 生地黄

荊芥 柴胡 白芷 蔓荊子

右水酒各半煎服

○退翳散 治痘瘡入口效

人參 牛蒡 等分

為末每服一錢糯米飲下

○搽藥方 用象牙磨水搽入目內

兔糞丸 治痘後翳膜 家菊花 二兩 白蒺藜 兩

兔糞四兩 甘草一兩

○清胃湯 治痘後牙疳腫痛 升麻 一分 當歸 二分 黃連 牡丹皮 生地 各一分

為末密丸如桐子大每服三十九細茶湯下

隨出隨沒喘息須防

根葉若腫方疹而兼

癩皮膚如赤方疹尤

次班似錦而明兮不

藥而愈如煤而黑兮

百无一痊瘡疹既出

調理甚難坐臥欲煖

飲食宜淡咳嗽涎沫

不禁酸醜忽生喘急

肺受風寒心脾火灼

口舌生瘡肺胃濕熱

津液長乾有此變症

治法不同微汗毒解

水煎服

○犀角黃連湯 治痘後牙疳

黃連一錢 烏梅一人 木香二分 犀角水一錢磨

水煎服臨藥好起時入犀角水

○走馬牙疳藥 治牙疳臭爛

黃連一兩 白朋砂一錢 胆凡三分 冰片五厘

為細末搽上一方加人參白鹽梅燒存性

○治痘瘡濕爛五方 蚕繭燒灰存性加枯凡少許

牛糞燒存性 加射少許 墻上敗草 燒存性

墻上 燒存性 松花力末

右各研細單付瘡上俱效

○辰砂益元散 治裡熱小便黃

滑石六錢水 甘草一糸淨末 辰砂二糸

方即當外散腸胃秘

結方急此疎通鼻咽

解自行者不必遽止

毒以利鬆痲後多刺

今執毒移於大腸咳

嗽喉痛兮痰氣滯於

心胃口渴心煩法在

生津養血飲食減小

治宜調胃和中餘症

无常虛期交通此即

痲之大旨列用存乎

一心

三味和勻涼水調下一二匙

○導赤散 治小便黃赤口乾煩渴

加淡竹葉灯心七莖水煎服 木通 甘草各等分

○四苓散 治痘內熱以此利小便

澤瀉 猪苓 去皮白朮 赤茯苓 去皮

加木通東流水煎服或為末白湯調下

○凡孕婦身發痘瘡宜馮氏單胎散若胎動不安宜獨至

散安胎飲身熱甚宜木香參蘇飲或瘡稠密宜十奇

散倍芍藥當歸煨桂加香附烏藥如胎已五月則半

夏桂心之屬俱不必禁

補遺蘇眉湯

初熱

○單胎散

未見占發表之藥

赤芍

白朮

川歸

白芍

赤茯苓

醫李濟源
暫用分兩量見大

小服之

紫蘇 葛根

甘草各二錢

白芍藥一錢半

陳皮 砂仁各五分

五分

葱白姜煎熱服

補遺加味升麻湯

治小兒麻疹表藥

或隣家已有疹証

預服

升麻 玄參

柴胡 黃芩各

五斤 乾葛

乾葛

人參

桔梗

條芩

北柴胡

防風

陳皮

荊芥

枳殼

柴胡

阿膠

糯米

白芷

甘草

川芎

縮砂

大熱加礬金各三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞乾柿蒂七箇野

苧根七寸甜瓜蒂一箇用銀器煎以荷葉蓋定熬至

八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服

○獨聖散 用連殼縮砂慢火炒去殼為末每服半匙熱

酒調下胎動則服服後覺胎熱則安矣

○安胎散

大腹皮 酒洗極淨焙乾再用烏瓦汁洗

人參

香附子 童便淨

陳皮

白木

白芍

川芎 川芎

砂仁

紫蘇

茯苓

赤芍藥各四錢

獨活 甘草各

每服四錢水煎服

一 小兒疹後咳嗽喘

急煩燥腹脹泄瀉

聲啞唇口青黑

黃連 黃芩

連翹 玄參

知母 桔梗

杏仁 白芍

麻黃 牛蒡子

乾葛 陳皮

厚朴 甘草

水煎服

甘草各五分

右細切作一服水一盞半燈草七莖糯米一撮煎至

一盞食前溫服

滄洲翁先生跋云凡乳嬰之與童非當岐為兩途以治之

乳嬰當無治乳母俾其氣血清和飲食有節投以調

氣通榮之劑以釀其乳使兒飲之則其瘡必肥滿光

澤無陷伏之憂重非之子必當備切其脉審其表裏

虛實以汗下之苟不實不虛則但保其冲和使脾氣

流暢則肺金藉母之助易於灌膿速於成痂無倒塌

之患或至壯盛而膚腠厚密尤須預為汗解或大便

結與溲澁者尤宜下之利之庶無患也餘証則當於

藥內倍其分兩百無一失學者宜致思焉

64
4498



萬曆丙午子夏夏月

積善堂陳奇泉梓



大醫院補遺真傳醫學源流肯綮大成十六卷終

