

脾胃部

醫學綱目

自  
卅三  
至  
卅四

十三

醫學綱目卷之二十三

脾胃部

泄瀉滯下

滯下屬熱

潔論曰藏腑瀉利其證亦多大抵從風濕熱論之是知寒少熱多寒則不能久也故曰暴泄非陰久泄非陽論曰春宜緩形形緩動則肝木乃榮反靜密則是行秋令金能制木風氣內藏夏至則火盛而金去獨火木旺而脾土損矣輕則飧泄身熱脉洪穀不能化重則下利膿血稠粘裏急後重故曰諸泄稠粘皆屬於火經云溲而便膿血知氣行而血止也宜大黃湯下之是為重劑黃芩芍藥湯是為輕劑是實則瀉其子木能自虛而脾土實矣故經曰春傷於風夏為飧泄此逆四時之氣人所自為也此一節熱泄所帶滯下也有自太陰經脾受濕而為水泄虛滑微滿身重不知穀味假令春宜益黃散補之夏宜泄之法曰宜補宜泄宜和宜

泄瀉屬濕

久瀉屬風

暴泄屬寒

治隨症施

止和則芍藥湯止則訶子湯久則防變為膿血是脾經傳受於腎謂之賊邪故難愈也若先利而後瀉謂之微邪故易安此皆脾土受濕天之所為也雖聖智不能逃口食味臯食氣從臯而入留積於脾而為水泄也此一節瀉泄所謂瀉瀉也有厥陰經動下痢不止其脉沉而遲手足厥逆涕唾膿血此症難治宜麻黃湯小續命湯汗之法云為有表邪縮於內當散之而自愈此一節風泄所謂久泄也有暴下無聲身冷自汗小便清利大便不禁氣難布息脉微嘔吐急以重藥温之漿水散是也此一節寒泄所謂暴泄也故法曰後重者宜下腹痛者宜和身重者宜除濕脉弦者去風膿血稠粘者以重藥竭之身冷自汗者以毒藥温之風邪內縮者宜汗之則愈驚澹為痢宜温之而已又曰在表者發之在裏者下之在上者湧之在下者竭之身表熱者內疎之小便澀者分利之

脉實宜下浮忌  
脉細宜温閉者宜調

又曰盛者和之去者送之過者止之兵法曰避其來銳擊其惰歸此之謂也 凡病泄而惡寒太陰傳少陰為土來剋水也用除濕白朮茯苓安脾芍藥桂枝黃連破血火邪不能勝水太陰經不能傳少陰而反助火邪上乘肺經而痢必白膿也加當歸芍藥之類是已 又裏急後重脉大而洪實為裏實症而痛甚是有物結墜也宜下之若脉浮大甚不可下 雖裏急後重脉沉細而弱者謂寒邪在內而氣散也可温養而自安 裏急後重閉者大腸氣不宣通也宜加檳榔木香宣通其氣若四肢慵倦小便少或不利大便走沉困飲食減少宜調胃去濕白朮芍藥茯苓三味水煎服白朮除脾胃之濕芍藥除胃之濕熱四肢困倦茯苓能通水道走濕 如發熱惡寒腹不痛加黃芩為主如未見膿而惡寒乃太陰欲傳少陰也加黃連為主桂枝

三部血

佐之如腹痛甚加當歸倍芍藥如見血加黃連為主桂枝  
當歸佐之 如煩躁或先便白膿後血或發熱或惡寒非  
黃連不能止上部血也如惡寒脉沉先血後便非地榆不  
除下部血也如惡寒脉沉或腰痛或臍下痛非黃芩不除  
此中部血也如便膿血相雜而脉浮大慎勿以大黄下之  
下之必死謂氣下竭也而陽無所收凡陰陽不和惟以分  
陰陽之法治之 又曰暴泄非陰久泄非陽有熱者脉疾  
身動聲亮暴注下迫此陽也寒者脉沉而細身困鼻息微  
者薑附湯主之身重不舉木附湯主之 渴引飲者是熱  
在膈上水多入則自胃膈入胃中胃本無熱因不勝其水  
胃受水攻故水穀一時下此症當灸大椎三五壯立已乃  
督脉瀉也如用藥使車前子雷丸白朮茯苓之類五苓散  
亦可 又有寒泄者大腹滿而泄又有驚澹者是寒泄也

寒熱

虛實

驚者鴨也大便如水其中有少結糞者是也如此者當用  
天麻附子乾姜之類 又法曰泄有虛實寒熱虛則無力  
不及拈衣未便已泄出謂不能禁固也實則數至圜而不  
便俗云虛坐努責是也裏急後重皆依前法進退大承氣  
分六經湯主之 太陽病為挾熱痢涼膈散主之 表症候下因而利

陽明為痼瘕進退大承氣湯主之 太陰濕勝瀉瀉

不可下而可溫四逆湯主之 少陰蟄風不動禁固可瀉

赤石脂丸乾姜湯主之 厥陰風泄以風治宜小續命湯

消風湯主之 少陽風氣自動大柴胡湯主之

分新久 保五泄傷寒乃分三部

初說暴 次說中 後說久泄

此說是難經五十七難是三節內該十五法初治以暴藥  
中以的對症藥得中治也未治久泄仲景論厥陰經治法

是也

垣胃氣和平飲食入胃精氣則輸于脾上歸于肺行於百  
脉而養榮衛也若飲食一傷起居不時損其胃氣則上升  
精華之氣反下降是為飧泄久則太陰傳少陰而為腸澼  
假令傷寒冷飲食膈滿而脹傳為飧泄者宜溫熱之劑以  
消導之傷濕熱之物而成膿血者宜苦寒之劑以內疎之  
風邪下陷者升舉之濕氣內盛者分利之裏急者下之後  
重者調之腹痛者和之洞泄腸鳴無力不及拈衣其脉細  
微而弱者溫之收之膿血稠粘數至圓而不能便其脉洪  
大而有力量者下之寒之大抵治病當求其所因察何氣之  
勝取相剋之藥平之隨其所利而利之以平為期此治之  
大法也 論瀉痢久不止或暴下者皆太陰受病不可離  
甘草芍藥若不受濕則不痢故須用白朮是以聖人立法

五泄

診

若四時下痢於芍藥白朮內春加防風夏加黃芩秋加厚  
朴冬加桂附然更詳外證寒熱處之如裏急後重須加大  
黃如身困倦須用白朮若自汗逆冷氣息微加桂附以溫  
之如或後重膿血稠粘雖在盛冬於溫藥內亦加大黃  
難有胃泄有脾泄有大腸泄有小腸泄有大瘕泄名曰後  
重 胃泄者飲食不化色黃飧泄也保命云承氣湯下之 又有脾泄  
者腹脹滿泄注食即嘔吐逆保命云建中湯主之 大腸泄者食  
已窘迫大便色白腸鳴切痛保命云乾姜附子湯主之 小腸泄者澀  
而便膿血少腹痛保命云承氣湯下之 大瘕泄者裏急後重數至  
圓而不能便莖中痛保命云胃小腸大腸三症皆清涼飲子主之其泄自止厥陰症莖中痛加  
甘草少陰症裏急後重加大黃  
此治五泄之法也  
丹泄瀉之症水穀或化或不化並無努責惟覺困倦若滯

下則不然或膿或血或膿血相雜或腸垢或無糟粕或糟粕相雜雖有痛不痛之異然皆裏急後重逼迫惱人

仲大腸有寒者多驚澹有熱者便腸垢

靈腸中寒則腸鳴飧泄腸中熱則出黃糜師傳

仲下利脉微弱數者為欲自止雖發熱不死 下利有微

熱而渴脉弱者亦自愈 下利脉數而渴者今自愈設不

瘥必清膿血以有熱故也 下利脉數有微熱汗出今自

愈設脉緊為未解 下利脉反弦發熱身汗者自愈 下

利脉沉而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒

汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

素胃脉虛則泄脉要精要論

脉滑按之虛絕者其人必下痢 肺脉小甚為泄全文

見全

以閉藏故泄

素尺寒脉細謂之後泄平人氣象論 尺膚寒其脉小者泄少

氣全文見評

仲下利脉沉弦者下重 下利寸口反浮數尺中自濇者

必清膿 溲病若腹大而泄者脉當細微而濇反緊大而

滑者死

脉泄注脉緩時小結者生浮大數者死

素泄而脉大者難治玉機真藏論 病泄脉洪大是逆也全

死生

仲下利脉大者為不止 下利日十餘行脉反實者死

靈大便赤辦飧泄脉小者手足寒難已飧泄脉小手足温

泄易已尺論疾診 腹鳴而滿四肢清泄其脉大是逆也如

是者不過十五日死矣全 腹大脹四末清脫形泄

甚是逆也如是者不及一時死矣

仲六府氣絕於外者手足寒上氣脚縮五臟氣絕於內者利不禁下甚者手足不仁下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死少陰負跌陽者為順也下利後脈絕手足厥冷時脈還手足溫者生脈不還者死病者痿黃燥而不渴胃中寒而利不止者死假令下利寸口關上尺中悉不見脈然尺中時一小見脈再舉頭者腎氣也若見損脈來為難治

丹下痢如魚腦者半死半生下痢如塵腐色者死純血者死下如屋漏者死下痢如竹筒注者不可治五虛者不治

五虛者經云脈細皮寒氣少泄痢前後飲食不入此謂五虛五虛者死其漿粥入胃泄注止則虛者活予嘗治

數人在下則泄瀉不止在上則吐痰不已者皆死蓋氣脫無所管攝故也若用參朮膏救之早者十活二三

泄瀉 產後泄瀉 下痢水穀不入裏急後重是泄瀉也

脾濕 世胃苓湯一名對金飲子治脾濕太過泄瀉不止

平胃散 五苓散各半 右劉水煎服極效

羅內經曰濕勝則濡泄甲乙經云寒氣客於下焦傳為濡泄夫脾者五臟之至陰其性惡寒濕今寒濕之氣內客於脾故不能裨助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能制故洞泄如水隨氣而下謂之濡泄法當除濕利小便也治之以對金飲子

平胃散錢五 五苓散錢二 草薢錢二 薤白錢二 右相和作四服水一盞半生姜三片棗二枚煎至一盞

去查温服食前

垣加減平胃散治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味胃滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色痿黃肌體瘦弱怠惰嗜臥體重節痛常多自痢或發霍亂及五噎八噫隔氣反胃等症

厚朴去皮姜制炒

蒼朮去粗皮米泔浸五兩

陳皮三兩

甘草二兩

右為細末每服二錢水一盞生姜三片棗二枚同煎至

七分去查温服或去姜棗帶熱服空心食前入鹽一捻

沸湯點服亦得常服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒

冷濕四時非常之氣如小便赤澀加白茯苓澤瀉

如米穀不化飲食傷多加枳實如胃中氣不快心下

痞氣加枳殼木香如脾胃困弱不思飲食加人參黃

芪如心下痞悶腹脹者加厚朴甘草減半如遇夏

加炒黃芩如遇雨水濕潤時加茯苓澤瀉如有痰

涎加半夏陳皮凡加時除蒼朮厚朴依例加之如一

服五錢有痰用半夏一兩如嗽飲食減少脉弦細加

歸身黃芪如脉洪大緩加黃芩黃連如大便硬加

大黃三錢芒硝二錢先嚼麩炒桃仁爛以藥送下

海加減平胃散例若泄瀉脾濕加茯苓丁香白朮為調胃

散一法加藿香半夏若加乾姜為厚朴湯若温疫

時氣二毒傷寒頭痛壯熱加連翹葱白五寸豆豉三十

粒煎二三服取微汗出愈若五勞七傷脚手心熱煩

躁不安百節痠疼加柴胡若痰嗽瘡痢加姜製半夏

若小腸氣痛加茴香若水氣腫滿加桑白皮若

婦人赤白帶下加黃芪若酒傷加丁香若飲冷傷

加高良姜 若滑脫泄瀉加肉苳蔻 若風痰四肢沉  
困加荊芥 若腿膝冷痛加牛膝 若渾身虛腫拘急  
加地骨皮 若腿膝温痺加鬼絲子 若白痢加吳茱  
萸 若赤痢加黃連 若頭風加藁本 若轉筋霍亂  
加樟木皮 若七邪六極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重腿  
膝痿婦人宮臟久冷月事不調者加桂枝 若胃寒嘔  
吐多加生姜一法加茯苓丁香各三兩 若氣不舒快  
中脘痞塞加砂仁香附三兩生姜煎服 若與五苓散  
相半為對金飲子 若與六一散相合為黃白散 若  
與錢氏異功散相合為調胃散 若飲食進退加神麩  
麥芽冬月加吳茱萸川椒乾姜桂為吳茱萸湯 若加  
藁本桔梗為和解散治傷寒吐利 若加藿香半夏為  
不換金正氣散 若瘧疾寒熱者加柴胡 若小腸氣

痛者加苦練茴香

丹或曰平胃散之溫和可以補養胃氣蓋子以為何如予  
曰蒼木性燥氣烈行濕解表甚為有功厚朴性温散氣非  
脹滿實急者不用承氣用之可見矣雖有陳皮甘草之甘  
緩甘辛亦是决烈耗散之劑實無補土之利經謂土氣太  
過曰敦阜亦能為病况胃為水穀之海多氣多血故因其  
病也用以瀉有餘之氣使之平耳又須察其挾寒氣得  
寒物者而後投之胃氣和平便須却藥謂之和平者初非  
補之之謂豈可以為補劑而常用之乎或曰調胃承氣亦  
治胃病謂之調者似與平胃之平意義相近何用藥之相  
遠也予曰調胃承氣治熱中下二焦藥也經云熱淫于內  
治之鹹寒佐以苦其功在乎導利而行之以緩平胃散止  
治濕上焦藥也經曰濕上甚而熱治以苦温佐以甘辛以

汗為故而止或曰治濕不利小便非其治也此非仲景法耶何子言之悖也予曰淡滲治濕因有濕在中下二焦今濕在上宜以微汗而解不欲汗多故不用麻黃葛根輩耳

五苓散治泄瀉水多者方見傷寒

瀉濕四苓散加蒼朮白朮甚者二朮必用炒

白朮三分加澤瀉一兩半

茯苓

猪苓

本治水瀉用草烏半生半燒灰存性為末醋丸空心并花

水下七丸

濕熱

河益元散治身熱泄瀉小便不利

滑石六兩

甘草炙一兩

右為末每服三錢蜜湯調下日三服如解寒發汗煎葱

白豆豉湯調下四錢併三服以效為度

丹參萸丸治濕熱滯氣者濕熱甚者用為向导亦可治石

酸下可治自利

六一散七兩即益元散

吳茱萸二兩煎過

一方去茱萸加乾

姜一兩名温六丸

本歐陽文忠公嘗得暴下國醫不能愈人云市人有此藥

三文一貼甚效夫人買進之一服而愈後召賣藥者問其

方但用車前子一味為末米飲下二錢此藥利水道

丹黃芩木通入四苓散煎服治火多泄瀉 水煎金花丸

治泄不止乾嘔方見乾嘔而利門

世木香和中丸腹痛泄瀉脉滑者神效方見治虛實法

仲下利脉遲而滑者實也利未欲止急下之宜大承氣湯

方見傷寒下利脉反滑者當有所去下乃愈宜大承氣湯

下利脉中堅者當下之 下利後三部皆平按之心下堅

風痰  
實者  
下之

飲者  
逐之

者宜大承氣急下之 病者脉伏其人欲自利利反快雖  
利心下續堅滿此為留飲欲去故也其遂半夏湯主之

其遂

大者三枚

半夏

十二枚

以水一升

煮取半升去渣

芍藥

五枚

甘草

指大一枚

右四味以水二升煮取半升去查以蜜半升和藥汁煎

取八合頓服之

積者  
下之

丹仁七姪之子肚泄有積與小胃丹二十粒作二次吞之

小胃丹方見內傷飲食

積熱作泄亦宜下之

保治寒積痢男婦小兒各不同或赤白或清痢如水不後

重者寒也經曰澄澈清冷皆屬於寒此為虛寒中有積也

宜附子巴菝輩下之見利則愈空心服

仲下痢氣者當利其小便

氣者利  
小便  
虛者和

潔治太陰脾經受濕水瀉注下體重微滿困弱無力不欲

飲食暴泄無數水穀不化先宜白朮芍藥湯

白朮

芍藥

各一兩

甘草

五錢

俱用炒黃效速

右細末每一兩水二盞煎至一半溫服

如腹疼甚者宜蒼朮芍藥湯主之

蒼朮

芍藥

各一兩

黃芩

半兩

右剉每一兩入淡桂半錢水盞半煎至一盞溫服

如脉弦頭痛者宜蒼朮防風湯主之

蒼朮

防風

各二兩

右剉同前法煎服

如下

血宜蒼朮地榆湯主之

加枳實一錢如小便不利每服加茯苓二錢如腹痛漸

已泄下漸少宜訶子散止之

丹氣虛泄瀉人參白朮炒芍藥升麻主之

垣異功散治脾胃虛冷腸鳴腹痛自利不思飲食

補脾行  
濕

人參白朮茯苓甘草陳皮各  
等分為末每五錢姜棗煎服

丹女人肚泄左手脉弱此自來欠血面帶黃多年當作虛  
濕治之

滑石錢六

白朮兩半

陳皮

當歸各三錢

厚朴

木通

芍藥各一錢

甘草各五分

分六貼姜一片煎

四八官患泄小便赤少食少倦怠脉弱此受濕為病當補  
脾涼肺

白朮

滑石各一兩

黃芩

人參

芍藥各五錢

木通

陳皮各三錢

乾姜一錢

甘草各一錢

分八貼煎服

五兒腹泄此受寒涼為病  
白朮 蒼朮各二錢 乾姜 茯苓

厚朴各一錢

甘草分三

右為末每服二錢白湯調下

一丈夫腹瀉胃痞不渴

半夏一錢

蒼朮

白朮

青皮各二錢

木通

紫蘇各一錢

良姜半錢

甘草許

分三貼姜三片水二盞煎服

輝五孺人瘰癧已好止是食少乏力肚泄自汗

牡礪半錢

白朮一錢

乾姜三錢

陳皮分五

黃芪分二

當歸分一

白朮煎服

積 賈宅女人六十八歲腹泄面黃乏力脉浮大而數此有熱

滑石

白朮炒各兩

茯苓

神麴炒

陳皮各五錢

黃連

黃芩

乾姜一錢

右為末粥為丸山查湯食前下五十粒

一丈夫病熱退未盡食太早口渴倦甚腹泄心煩脚冷

人參 滑石 柴胡 白朮

陳皮各一錢 木通半錢 甘草五分

分四貼煎七分下保和十五丸

右九方丹溪東垣治泄瀉之法大率皆用白朮滑石補

脾行濕其餘隨症加減第一二方專治泄也第三方治

泄之挾熱也第四五六方治泄之挾寒也第七八方治

泄之挾飲食積也

垣予病脾胃久衰視聽半失此陰盛乘陽加之氣短精神

不足此由弦脉令虛多言之過也皆陽氣衰弱不得舒伸

伏匿於陰中耳癸卯歲六七月間淫雨陰寒踰月不止時

人多病泄痢濕多成五泄故也一日予體重肢節疼痛大

脉弦者  
升陽除  
濕

便泄并下者三而小便閉塞思其治法按內經標本論大

小不利無問標本先利小便又云在下者引而竭之亦是

先利小便也又云諸泄利小便不利先分別之又云治濕

不利小便非其治也皆言當利小便必用淡味滲泄之劑

以利之是其法也噫聖人之法雖布在方冊其不盡者可

以意求耳今客邪寒濕之淫從外而入裏以暴加之若從

已上法度用淡滲之劑以除之病雖即已降之又降是

復益其陰而重竭其陽則陽氣愈削而精神愈短矣是陰

重強陽重衰反助其邪之謂也故必用升陽風藥即瘧以

羌活獨活柴胡升麻各一錢防風根半錢炙甘草半錢同

咬咀水二鍾煎至一盞去查稍熱服大法云濕寒之勝助

風以平之又曰下者舉之得陽氣升騰而去矣又法云客

者除之是因其曲而為之直也夫聖人之法可以類推舉一

而知百者也若不達升降浮沉之理而一槩施治其愈者幸也

升陽除濕陽治脾胃虛弱不思飲食洩瀉無度小便黃四肢困弱自下而上引而去之

升麻

柴胡

羌活

防風各半錢

蒼朮

甘草煨三分

神麴

澤瀉

猪苓

陳皮各五分

麥蘖三分

右咬咀水二盞煎去查空心服如胃寒腸鳴加益智半夏各五分姜棗同煎非腸鳴不用

人參升胃湯治一日大便三四次澹而不多有時泄瀉腹鳴小便黃

黃芪二錢

甘草煨一分

升麻六分

柴胡

陳皮

歸身

益智各一錢

紅花許少

人參六分

實積

右剉作二服水二盞煎至一盞去查稍熱食前服丹止瀉姜麴丸

神麴六兩

茴香半兩

生姜二兩

右為丸每服五七十九丸

痰積

痰積泄瀉

海石

青黛

黃芩

神麴

右為丸每服三五十九丸病少者必用吐法吐之方愈右積滯洩瀉腹必耕痛方泄者是也或肚腹滿按之堅者亦是也受病泄者宜神麴之類消導之病深而頑者必用滯下門後重多熱條進退承氣之類下之方安

虛滑熱

丹固腸丸

樗皮四兩

滑石二兩

右為末粥丸丹溪云固腸丸性燥若滯氣未盡者不可遽用

保訶子散治洩久腹痛漸已瀉下漸少宜此藥止之

訶子生一兩半熟半 木香兩半 甘草二錢 黃連三錢

右為細末每服二錢以白朮芍藥湯調下如止之不已宜因其歸而送之於訶子散內加厚朴一兩竭其邪氣也

也

虛滑久而不止者多傳變為痢太陰傳少陰是為鬼邪先以厚朴枳實湯防其傳變

厚朴 枳實各一兩 訶子生一兩半熟半 木香兩

黃連二錢 甘草炙二錢 大黃三錢

右為細末每服三錢或五錢水一盞半煎至一盞去查溫服已上治熱滑瀉

寒丹補脾丸

白朮兩半 白芍藥二錢

右為細末飯丸冬月去芍藥加肉苳菘澤瀉服之又不止者於內加飛礬一錢半

氣痢訶黎勒散主之訶黎勒十枚 右一味為散粥飲和頓服林億云疑非仲景方也

垣扶脾丸治脾胃虛寒腹中痛溏洩無度飲食不化

白朮 茯苓 甘草炙 訶子皮 烏梅肉各二錢 紅苳 乾姜 肉桂各半錢

麥蘖 神麴炒各四錢 陳皮一錢 半夏二錢

右為末荷葉裹燒飯為丸如桐子大每服五十九丸溫水食前下香一錢力加薑

治痢久臟腑虛滑去積不已用蒼朮湯下桃花丸 蒼朮兩 防風兩

右劉水一、碗煎至一大盞下桃花丸或赤石脂丸小便

利則安

桃花丸即滯下門桃花湯為丸赤石脂乾姜二味是也

衍有一人病大腸寒清小便精出諸熱藥服及一斗二升未效後教服赤石脂乾姜各一兩胡椒半錢同為末醋糊為丸如桐子大空心及食前米飲下五七十九丸終四劑遂愈

本治脾胃不和泄瀉不止諸藥不效訶子丸

訶子皮

川姜

肉荳蔻

龍骨

木香

赤石脂

附子各等分

右細末糊丸如桐子大每服四十九丸米飲下

赤石脂禹餘糧湯方治大腸泄瀉

赤石脂制

禹餘糧各四錢制

右劉碎每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

孫治氣虛傷冷暴作水瀉日夜二三十行腹痛不止夏路行備急朝真丹用硫黃一兩半研令極細枯白礬五錢同細研勻水浸蒸餅去水和丸如桐子大硃砂為衣每服十五丸溫米飲鹽湯下已上止

暴泄寒治暴水洩不止

肉荳蔻

三箇用濕麩裹之置火內煨令麩焦去麩丹溪云肉荳蔻屬金屬土溫中補脾為有力日

華子稱其下氣以脾胃得補而善運化氣自下也非若香附陳皮之缺世

右將肉荳蔻為細末只作一服陳米飲調食前服之神

驗

潔暴泄如水周身汗出一身盡冷脉沉而弱氣少而不能語甚者加吐此謂緊病宜以漿水散治之

半夏兩

良姜二錢半

乾姜

肉桂

甘草

附子炮各五錢

右細末每服三五錢水二盞煎至一盞熱服甚者三四服若太陽經傷動傳太陰下痢為驚澹大腸不能禁固卒然而下中有硬物欲起而又下欲了而又不了解小便多清此寒也宜溫之春夏桂枝湯秋冬白朮湯謙甫云驚澹者大便如水其中有少結糞是也

桂枝湯 桂枝 芍藥 白朮各半 甘草二錢

右切每服半兩水一盞煎至七分去渣溫服

白朮散 白朮 芍藥各三錢 乾姜泡半兩 甘草炙二錢

右麤末如前服之甚則除去乾姜加附子三錢謂辛能發散也

羅麪木丸治時暑暴泄吐脾胃及治飲食所傷胸膈痞悶

神麪 蒼朮泔浸一宿

右為細末麪糊為丸如桐子大每服三十丸溫米飲送

下

止洩丸 肉苳蔻五兩 滑石製 右為末搗飯丸惟滑石

夏三兩半秋二兩春冬一兩一錢半

羅中寒治驗 參政商公時年六旬有二原有胃虛症至元巳巳夏上都住時值六月霖雨大作連日不止因公務勞役過度飲食失節每日臍腹作痛腸鳴自利須去一二行少定不喜飲食懶於言語身體困倦召予視之予診其脈沉緩而弦參政以年高氣弱脾胃宿有虛寒之症加之霖雨及勞役飲食失節重虛中氣難經云飲食勞倦則傷脾胃不足而往有餘隨之歲火不及寒乃太行民病驚澹今所勝也此疾非甘辛大熱之劑則不能瀉水補土雖夏暑之時有用熱遠熱之戒又云有假者反之是從權而治其

急也內經云寒淫于內治以辛熱乾姜附子辛甘大熱以瀉寒水以為君脾不足者以其補之人參白朮甘草陳皮苦甘溫以補脾土胃寒則不欲食以生姜草荳蔻辛溫治客寒犯胃厚朴辛溫厚腸胃白茯苓甘草助姜附以導寒濕芍藥酸微寒補金瀉木以防熱傷肺氣為佐不數服即愈

附子溫中湯治中寒腹痛自利米穀不化脾胃虛弱不喜飲食懶言困倦嗜臥

附子炮去皮

乾姜炮各七錢

人參

甘草炙

白芍藥

白茯苓皮去

白朮各五錢

厚朴姜製

草荳蔻炮去皮

陳皮各三錢

右剉每服五錢或一兩水二盞半姜五片煎一盞食前溫服

簡理中湯治泄瀉加橘紅茯苓各一兩名補中湯若澹泄

不已者於補中湯內加附子一兩不喜飲水穀不化者

再加砂仁一兩共成八味理中湯方見傷寒

本治脾胃中風濕臟腑泄滑鞠藭丸

芎藭

神麴

白朮

附子各等分泡

右為細末麴糊丸如桐子大每服三五丸米飲下左

氏述楚子圍蕭蕭將潰無社告申叔展曰有麴乎有山

鞠藭乎鞠藭芎藭也意欲令逃水中以避禍是知芎藭

能除濕當加朮附以制之若脾濕而泄者萬無不中亦

治殮泄

無桂香丸治臟腑虛為風寒所搏冷滑注下不禁老人虛

人危篤累效

附子炮去皮

肉荳蔻炮

白茯苓各一兩

桂心

乾姜炮

木香炮各半兩

丁香一分

右為末糊丸如桐子大米湯下五十九空心服

孫治水瀉無度乾姜末粥飲調一錢服立效

熱

泄而身熱小便不利口渴者益元五苓若火多四苓加木

通黃芩方見濕熱條泄而困倦不便者及脉數者虛熱者宜

參木滑石苓通方見補脾行濕條泄而脉滑堅者實熱宜大承

氣湯方見實條丹玉龍丸治一切伏暑泄瀉神效方見傷寒部暑明

裏上下表

仲下痢不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利

在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復痢不止者當利小便

下痢腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜四

逆湯攻表宜桂枝湯  
截腑大腸小腸為泄全文見見診一陽發病少氣善欬善泄全文見見診病傳

運氣泄瀉有六

一曰土助脾濕盛而泄瀉經云歲土太過雨濕流行病澹

泄腸鳴又曰歲水不及濕乃下行民病身重濡泄又云歲

火不及寒乃大行土復則病驚澹腹痛腸鳴泄注又云土

鬱之發民病飲發注下又云濕勝則濡瀉治以苦溫是也

二曰風木攻脾虛而泄瀉經云厥陰司天風淫所勝民病

冷泄澹泄又云春傷於風邪氣留連乃為洞泄治以辛涼

是也

三曰熱瀉經云少陽所主為暴注又云少陰之勝腹滿澹

泄又云火鬱之發民病注下治以寒劑是也

四曰寒泄經云歲水太過寒氣流行病腸鳴澹泄又云太

陽所至為流泄禁止又云太陽之勝寒入下焦傳為濡泄

治以熱劑是也

五日熱中寒中泄經云太陽司天之政三之氣寒氣行民病寒反熱中注下者是外寒內熱泄也又云長夏善病洞

泄寒中者是外熱內寒泄也治以寒熱兼施是也  
六曰燥泄經云歲木不及燥乃大行民病腸鳴澹泄又云陽明司天燥淫所勝民病腹中鳴注泄驚澹又云陽明之勝清發於中澹泄又云陽明之復腹脹而泄治以溫劑是也

雜法

子和晉聞山東楊先生者治府主洞泄不止楊初未對病人與眾人談日月星辰纏度及風雷雲雨之變自辰至未而病者聽之忘其園楊嘗曰治洞泄不已之人先問其所愛之事好棋者與之棋好樂者與之笙笛勿輒

針灸

針灸泄瀉獨取大腸一經經云大腸病者腸中攻痛而鳴

濯濯冬日中于寒即泄當臍而痛取巨虛上廉

羅治水漬入胃為溢飲滑泄渴能飲水水下復泄泄而大渴此無藥症當灸大椎

脈諸下痢皆可灸足大都五壯商丘陰陵泉皆三壯  
甲澹泄不化食寒熱不節陰陵泉主之

玉治久泄瀉內天樞穴撮要摘英同天樞二寸半灸摘英五分  
集自痢不止 天極 中極

世又法 合谷 三里 陰陵泉不應取 中腕 關元

天樞 神闕  
東泄痢不禁小腹絞痛 丹田灸百壯 泄痢不嗜食

長谷五十壯三報之在脇臍傍相去五寸一名循元穴  
衍石硫黃今人用治下元虛冷元氣將絕久患寒泄胃脾虛弱垂命欲盡服之無不效中病當便已不可盡劑世人

宜忌

蓋知用而為福不知用而為禍此物損益兼行若俱棄而不用當倉卒之間又可闕乎

產後泄瀉

丹治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸為瀉洞泄不禁下青白黑色用荆芥大者四五穗於盞內燒灰不得犯油火入麝香研湯三呷調下此藥雖微能治大病方名酌奇散產後泄方

茯苓

川芎

黃芩

白朮

乾姜

滑石

陳皮

芍藥炒

右水煎服之

殮泄

殮泄米穀不化而完出是也

素清氣在下則生殮泄

陰陽脾家論云云熱氣在下則穀不化故殮泄更垣云清氣在

脾氣下

下者乃人之脾胃氣衰不能升發陽氣故用升散也胡助其辛之味以引元氣之升不令下陷為殮泄也羅內經曰清氣在下則生殮泄又曰久風入胃中則為腸風殮泄夫脾胃土也氣沖和以化為事今清氣下降而不升則風邪久而干胃是木賊上也故沖和之氣不能化而令物完出所以謂之殮泄或飲食太過腸胃所傷亦致米穀不化此俗呼水穀利也法當下者舉之而消剋之也以加減木香散主之

木香

良姜

升麻

檳榔

人參各二錢半

肉苳蔻煨

吳茱萸泡

乾姜泡各五分

神麴炒二錢

陳皮五分

砂仁五分

右十一味為細末每服四錢水盞半煎至一盞去查食前溫服宜加白朮

河白朮湯治殮泄風冷入中泄利不止脉虛而細日夜數

行口乾腹痛不已

厚朴製姜

當歸去苗

龍骨各五錢

白朮兩

艾葉半錢熟炒

右為末每服三錢水一盞生姜三片同煎至八分去查

空心温服

治瘵世  
宜奪食

凡泄則米穀不化謂之飡泄是清氣在下乃胃氣不升  
上古聖人皆以升浮藥扶持胃氣一服而愈知病在中焦  
脾胃也脉訣曰濕多成五泄濕者胃之别名也病本在胃  
真氣弱真氣者穀氣也不能剋化飲食乃濕盛故也以此  
論之正以脾胃之弱故也初病奪食或絕不食一二日使  
胃氣日勝泄不作也今已成大泄矣經云治濕不利小便  
非其治也又云下焦如瀆又云在下者引而竭之唯此症  
不宜此論其病得之於胃氣下流清氣不升陽道不行宜

升宜舉不宜利小便靈樞云頭有疾取之足謂陽病在陰  
也足有疾取之上謂陰病在陽也經曰陽病在陰陰病在  
陽此之謂也中有疾傍取之傍者少陽甲膽是也中者脾  
胃也脾胃有疾取之足少陽甲膽者甲風是也東方春也  
胃中穀氣者便是風化也作一體而認故曰胃中濕勝而  
成泄瀉宜助甲膽風勝以克之又是升陽助清氣上行之  
法也又一說中焦元氣不足溲便為之變腸為之苦鳴亦  
緣胃氣不升故令甲氣上行又云風勝濕也大抵此症本  
胃氣弱不能化食奪食則一日而可止夫奪食之理為胃  
弱不能剋化食則為泄如食不下何以作泄更當以藥滋  
養元氣令和候泄止漸與食胃勝則安矣若食不化者於  
升陽風藥內加炒麴同煎蕪食入頓至心頭者胃之上口  
也必口沃沫或食入反出皆胃土停寒其右手關脉中弦

肌肉消者勿治

禁大劑

按之洪緩是風熱濕相合穀氣不行清氣不升為弦脉之寒所隔故不下也麩之熱亦能去之若番胃者更加半夏生姜入於風藥內同煎奪食少食欲使胃氣強盛也若藥劑大則胃不勝藥泄亦不止當漸漸與之今病既久已至衰弱當以常法治之不可多服餌也人之肉如地之土豈可人而無肉故肉消盡則死矣消瘦人有必死者八內經有七外經有一又病肌肉去盡勿治之天命也如肌肉不至瘦盡當急療之宜先奪食而益胃氣便與升陽先助真氣次用風藥勝濕以助升騰之氣病可已矣餘皆勿論此治之上法也

治用升陽除濕湯之類是也

寒熱

羅加減木香散

方見正條

仲下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯主之

傷寒

河白朮散治殮泄脉細

上方見上條

垣治洩痢殮泄身熱脉弦腹痛而渴及頭痛微汗宜防風芍藥湯

防風

芍藥

黃芩各等分

右籠末每服半兩或一兩水二盞煎至一半溫服

梅治水穀痢久不瘥厚朴三兩黃連三兩坐細水三升煎取一升空心服

疾生於風

素春傷於風夏生殮泄

生氣通天論

久風為殮泄全文見診法

久風入中為腸風殮泄  
右久風入中為殮泄經云虛邪之中人也始於皮膚留而不去傳舍於絡脉留而不去傳舍於經留而不去傳舍於輸留而不去傳舍於伏衝之脉留而不去傳舍於腸胃在腸胃之時賁響腹脹多寒則腸鳴殮泄食不化

此久風入中為殮泄之義同也

水自內出宜灸

潔古云太渴飲水多因致水穀一時下者宜灸大椎三五

壯或用車前子雷丸白朮茯苓及五苓散等藥滲之詳見

風從外入宜下

大法條又如久風為殮泄者則不飲水而穀完出治法當

以宣風散導之後服蒼朮防風湯

宣風散

方見小兒痘發熱條服之大利服後藥

蒼朮

去皮四兩

麻黃

一兩

防風

五錢

右麩末每一兩生姜七片水一盞煎至一半去渣溫服

如此後服後藥

補本丸

蒼朮

小椒

去目炒各一兩

右為細末醋糊丸如桐子大每服五十九食前溫水下

一法惡痢久不效者彌佳小兒丸如米大

子和趙明之米穀不消腹作雷鳴自五月六月不愈諸醫

以為胃受大寒故併與聖散子豈菴丸雖止一二日藥力

盡而復作諸醫不知藥之非及責明之不思口戴人至而

嘆曰春傷於風夏必殮泄殮泄者水穀不化而直過下出

又曰米穀不化熱氣在下久風入中中者脾胃也風屬甲

乙脾胃屬戊巳甲乙能剋戊巳腸中有風故鳴經曰歲木

太過風氣流行脾土受邪民病殮泄診其兩手脉皆浮數

為病在表也可汗之直斷曰風隨汗出以火二盆暗置床

下不令病人見火恐憎其熱詒之入室更服瀉劑以麻黃

投之乃閉其戶從外鎖之汗出如洗待一時許開戶滅火

一半須更汗止泄亦止 內經曰春傷於風夏生殮瀉此

以風為根風非汗不出者有病此者腹中雷鳴泄注米穀

腸痺

不分小便滯滯皆以脾胃虛寒故耳服荳蔻烏梅粟殼乾姜附子曾無一效中脘臍下灸已數千燥熱轉甚津液涸竭瘦削無力飲食減少命予視之余以應象論曰熱氣在下水穀不分化生殮泄寒氣在上則生腹脹而氣不散何也陰靜而陽動故也診其脉兩手皆浮大而長身表微熱用桂枝麻黃湯以姜棗煎大劑連進三服汗出終日至日而愈次以胃風湯和其臟腑調養陰陽食進而愈

木香

白朮

官桂

蕪荑

訶子皮

良姜

附子

厚朴

肉荳蔻

各一兩

乾姜

六錢

甘草

五錢

右為末麩糊丸如桐子大每服二十九姜湯空心下

運氣

運氣殮泄皆屬風木攻脾經云歲木太過風氣流行脾土

受邪民病殮泄食減又云歲土不及風乃大行民病殮泄體重腹痛又云土不及曰卑監卑監之紀上角與正角同其病殮泄治以涼劑是也

針灸

刺灸殮泄有三法

其一取脾經云脾虛則腹滿腸鳴泄食不化取其經足太陰陽明又云殮泄取三陰之上補陰陵泉皆久留之熱行乃止又云殮泄取三陰者是也三陰者太陰也其二取腎經云腎藏志志有餘腹脹殮泄瀉然筋血者是也然筋謂然骨視血絡盛則泄之其三取肝經云肝足厥陰之脉所生病者胃滿嘔逆殮泄是也視盛虛寒熱陷下施法也渴飲水多水穀一時下者灸大椎三五壯立已詳見大法條甲殮泄大腸痛巨虛上廉主之又太衝主之

雜方

遺尿

大治產後遺尿取故燕巢中草燒灰研細酒調服五分男子亦治

又方 白礬枯 牡蠣煨

右等分爲末酒服方寸七日三男女同治

診

華病人臥遺尿不覺者死

滯下

久泄久痢

胎前痢

產後痢

之痢疾是也

大法

丹痢初得時一二日間以利爲法有熱先退熱後重者當利氣木香檳榔腹痛用溫散藥姜桂之屬下血當涼血和血當歸桃仁之屬下痛發熱惡寒身首俱痛此爲表證宜微汗和解用蒼木川芎陳皮芍藥甘草生姜三片表裏煎下痢身發熱者有外感用小柴胡去參下痢發熱

久不止者屬陰虛用寒涼藥必兼升散藥并執藥用下痢初發熱必用大承氣下後看症用藥發熱不惡寒脈洪者宜大承氣若惡寒者忌下下痢腹痛後重小水短下積此爲裏症宜和中疎氣用陳皮芍藥滑石枳殼厚朴之類

潔芍藥湯治下血調氣經曰洩而便膿血知氣行而血止也行血則便自安調氣則後重自除

芍藥

當歸

黃連各半

檳榔

木香各二錢

甘草炙

大黃三錢

黃芩五錢

桂半錢

利小便

右麤末每服半兩水二盞煎至一盞食後溫服如血前則漸加大黃如清後臙毒加黃栢半兩同煎服

一老人年七十面白脉弦數獨胃脉沉滑因飲白酒作

醫學綱目卷五

五

痢下血淡水膿腹痛小便不利裏急後重以參朮為君  
草滑石檳榔木香蒼朮為佐下保和丸二十五丸第二日  
前症俱減獨小便不利以益元散服之安  
河益元散治身發熱下痢赤白小便不利盪胃中積聚見

瀉

虛實

丹痢初得之必用調胃承氣及大小承氣實者用此下之  
下婁男子五十餘下痢晝有積淡紅色夜無積食自進先  
喫小胃丹兩服再與四十九丸次六十九丸去積却與斷下  
羅玄青丸治下痢勢惡頻併窘痛或久不愈諸藥不能止  
須吐下之以開除瀉熱痞悶積滯而使氣液宣行者宜此  
逐之兼宣利積熱酒食積黃瘦中滿水氣腫腹脹兼療小  
兒驚疳積熱乳癖諸症

黃連

黃栢

大黃

耳遂

芫花

醋拌炒

大戟

各五錢

輕粉

二錢

青黛

兩

牽牛

四兩取頭末二兩

右為末研勻水丸小豈大初服十九丸每服加十九丸空心  
日午臨臥三服以快利為度後常服十五丸數日後得  
食力如利尚未痊再加取利利後却常服以意消息病  
去為度後隨症止之小兒丸如黍米大退驚疳積熱不  
須下者常服十九丸

玄利積丸

黃連

四兩

天水末

八兩

當歸

二兩

乳香

兩

蘿蔔子

炒四兩

巴豆

一兩去油同黃連一處炒

右為末醋糊丸如桐子大弱者十五丸實者二十五丸  
冷下痢赤白腹滿脹痛裏急上渴引飲小水亦瀆此積  
滯也宜泄其熱中用清腸丸導氣丸推其積滯而痢自

無矣凡治積聚之症輕則溫而利之清腸丸是也重者  
天真散舟車丸下之下後切勿便補之其或力倦自覺  
氣少惡食此為挾虛症宜加白朮當歸身尾甚者加人  
參若又十分重者止用此藥加陳皮補之虛回而痢自  
止矣

予族叔年近六十夏間患滯下病腹微痛所下褐色後重  
頻併飲食大減時有微熱察其脉皆弦而濇似數稍長却  
喜不甚浮大兩手相等視其神氣大減予曰此非滯下乃  
憂慮所致心血虧脾氣弱也與參朮為君歸身陳皮為臣  
川芎炒白芍茯苓為佐使如熱加黃連為使與兩月而安  
金氏婦年近四十秋初尚熱患滯下腹但隱痛夜重於晝  
全不得睡食亦稍減口乾不飲已服治痢靈砂兩貼矣予  
視之兩手脉等濇且不勻神思倦甚飲食全減因與四物

湯倍加白朮以陳皮佐之數貼而安

義一姪患瘧間日作蕪痢脉虛甚身痛宜活血補胃待虛  
稍回却又推積

人參分五 白朮錢一 蒼朮錢一 陳皮各錢一

白芍藥炒分五 川芎分五 滑石炒錢一 甘草許少

桃仁研七分

藥後病退惟脉少弦身倦用此方調補

人參分九 蒼朮錢三 半夏分九 川芎錢一

陳皮錢一 木通錢二 甘草少

煎取三之一飲之可淡粥少少塞飢又靜坐養之

葉先生患滯下後甚逼迫正合承氣症但氣口虛形雖實  
而面黃積白此必平昔食過飽而胃受傷寧忍二三日辛  
苦遂與參朮陳皮芍藥等補藥十餘貼至三日後胃氣稍

雜方

完與承氣二貼而安苟不先補完胃氣之傷而遽行承氣恐病安之後寧免瘦憊乎

世治痢煙蠟丸黃蠟不拘多少用銀篋挑於真香油燈上燒薰落水碗內凡如此者七次為丸如蘿蔔子大每二

十丸白痢甘草湯下赤痢烏梅湯下本草云蜜蠟主下利膿血補中又云白蠟

主後重白膿

葛治重下此即赤白痢火熬鼓令少焦杵服一合日三效

無比又熬鼓令焦水一升淋取汁冷服治淋日三服有效

食治脾胃氣虛下痢日夜不已腸滑不進食用野雉一隻

如食法細斫着陳皮葱椒調和鹽醬作餛飩熟煮空心食

之

虛熱

丹噤口痢胃中熱甚大虛大熱故也用人參二錢黃連一錢姜炒濃煎汁終日細細呷之如吐再喫但一呷下咽便開又宜

封臍引熱下行用田螺肉搗碎糞臍中入麝香少許

世痢疾不納飲食者俗謂之噤口痢以脉症辨之如脾胃

不弱問而知其頭疼心煩手足濕熱未嘗多服涼藥者此

乃毒氣上衝心肺所以嘔而不食宜用敗毒散每服四錢

陳倉米一百粒姜三片棗一枚水一盞半煎八分温服若

其脉微弱或心腹膨脹手足厥冷初病則不嘔因服鴛粟

殼烏梅苦澁涼藥太過以致聞食先嘔者此乃脾胃虛弱

用山藥一味剉如小荳大一半入銀瓦銚內炒熟一半生

用同為末飯飲調下又方用石蓮槌去殼畱心并肉碾

為末每服二錢陳米飲調下此疾蓋是毒氣上衝心肺借

此以通心氣便覺思食效

暴注下迫皆屬於熱全文見診

局香連丸治下痢赤白裏急後重

黃連

去苦二十兩用吳茱萸十兩同炒今亦去茱萸不用

木香

四兩八錢不見火

右為細末醋糊丸如桐子大每服三十丸空心飯飲下

錢荳蔻香連丸治泄瀉不問寒熱赤白陰陽不調腹脹攻

痛可用如神

黃連三錢

肉荳蔻

木香各一錢

右為細末粟米飯丸米粒大每服米飲下十九至二十三

十丸日夜各四五服食前

杜治氣痢瀉裏急後重神妙方宣連二兩乾姜半兩各為

末每用連二錢姜半錢和勻空心溫酒下

羅黃連阿膠丸治脾胃氣冷熱不調下痢赤白狀如魚腦

裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利

黃連三兩

茯苓二兩

阿膠

右各為末水調阿膠和丸如桐子大每服二十

丸溫米飲湯下

仲熱利下重者白頭翁湯主之方見傷寒

仲下痢膿血裏急後重日夜無度宜導氣湯

芍藥錢二

當歸錢五

大黃

黃芩各二錢半

黃連

木香

檳榔各一錢

右為細末每服三錢水一盞煎至七分去渣溫服如未止再服下後重則止

潔大瘕泄者裏急後重數至圜而不能便莖中痛用清涼

飲子主之其泄自止莖中痛者屬厥陰加甘草裏急後重

多者屬少陰加大黃令急推去舊物則輕矣內經曰因其

重而減之又云在下者引而竭之清涼飲子方見治發熱

裏急後重數至圜而不得便皆宜進退大承氣湯主之

進承氣法治太陰症不能食是也當先補而後瀉乃進藥

進退承氣法

後重有邪壓

法也先剉厚朴半兩姜製水一盞煎至半盞服若二三服未已胃有宿食不消加枳實二錢同煎服二三服泄又未已如不加食尚有熱毒又加大黃三錢推過泄未止者為腸胃久有塵垢滑粘加芒硝半合垢去盡則安矣後重無虛症者宜之若力倦氣少脈虛不能食者不宜此法蓋厚朴枳實大瀉元氣故也退承氣法治陽明症能食是也當先瀉而後補乃退藥法也先用大承氣五錢水一盞依前法煎至七分稍熱服如瀉未止去芒硝減大黃一半煎二服如熱氣雖已其人心腹滿又減去大黃但與枳實厚朴湯又煎二三服如腹脹滿退泄亦自安後服厚瀉數服則已

方見內傷飲食門

垣感應丸治下痢赤白後重遲瀉方見內傷飲食門丹或曰治後重疎通之劑羅謙甫水煮木香膏東垣白朮安胃散等方已盡矣又有用御米殼等固澁之劑亦愈者

何也曰後重本因邪壓大腸墜下故大腸不能升上而重是以用大黃檳榔葶瀉其所壓之邪今邪已瀉其重仍在者知大腸虛滑不能自收而重是以用御米殼等瀉劑固其滑收其氣用亦愈也然大腸為邪墜下之重其重至圍後不減大腸虛滑不收之重其重至圍後隨減以此辨之百發百中也 其或下喙真常積中有紫黑血而又痛甚此為死血症法當用搗細桃仁滑石行之或口渴及大便口燥辣是名挾熱即加黃芩或口不渴身不熱喜熱手慰盪是名挾寒即加乾姜 八嬭將產患痢脉細弦而稍數後重裏急

有汚血

有虛滑

滑石	三錢	芍藥	二錢	枳殼	炒錢	木通	二錢
甘草	五分	白朮	二錢	茯苓	一錢		
桃仁	每貼九枚	研同煎					

青田人肚痢紅紫血下噤逼迫不渴不熱

白朮 芍藥 陳皮 枳殼炒

歸身 滑石半 甘草二錢 桃仁三十箇

分八貼下實腸丸三十粒

一丈夫因酒多下血肚夜後重成痢

滑石半 連翹 黃芩 木通

芍藥 枳殼 白朮二錢 甘草五

桃仁廿一 分四貼服

後重積與氣墜下服升消藥不愈者用秦艽皂角子煨大黃當歸桃仁枳殼黃連等劑若大腸風盛可作丸服  
自古治裏急後重但用檳榔木香調氣及大黃下積至丹溪始用桃仁滑石不活死血如鼓應桴實發前人之所未發也

其或下墜在血活之後此為氣滯症真前藥加檳榔一枚

後重當和氣積與氣墜下者當兼升兼消升謂升麻之類消謂木香

檳榔之類

仲泄痢下重者以水五升煮薤白三升至二升去查以四

逆散方寸七內湯中煮取一升半分溫再服東垣云薤白泄滯氣

食主赤白痢下薤白一握切煮作粥食

丹其或氣行血和積少但虛坐努責此為亡血症倍用當

歸身尾却以生地黃生芍藥生桃仁佐之復以陳皮和之

血生自安

垣虛坐而不得大便皆因血虛也血虛則裏急加當歸身

凡後重逼迫而得大便者為有物而然今虛坐努責而

不得大便知其血虛也故用當歸為君生血藥佐之

凡諸用承氣等藥挨積之後仍後重者乃陽不升也藥中

補血

升陽

當加升麻升其陽其重自去也

垣升陽除濕防風湯治裏急後重數至圉而不能便或少

有白膿或少血者慎勿利之升陽除濕防風湯方見下血

毒積

丹其或在下則纏滯在上則嘔食此為毒積未化胃氣未

平症當認其寒則溫之熱則清之虛則用參朮補之毒解

積下食自進矣

治痢方

蒼朮

白朮

當歸

白芍藥

青皮

茯苓

黃連

滑石

甘草

作一服水煎裏急後重加黃連滑石桃仁檳榔甚者大

黃嘔者加半夏姜汁

寒

世仲景建中湯治痢不分赤白久新但腹中大痛者神效其脉弦急或濇浮大按之空虛或舉按皆無力者是也方見

寒湯

丹萎長官年三十餘奉養厚夏秋間患滯下腹大痛有人

教服單煮乾姜與一貼痛定少頃痛作又與又定由是服

乾姜三斤八日後召予視之左脉弦大似數右脉弦而大

稍減亦似數重取之似繫予曰此必醉飽後吃寒涼大過

當作虛寒治之因其多服乾姜遂教與四物湯去地黃加

人參白朮陳皮酒紅花茯苓桃仁煎生姜汁飲之一月而

安丹溪云下痢腹痛用姜桂溫散之法乃乾姜并建中湯加桂是也

聖治冷痢腹中不能食肉豈菘一兩去皮以醋麪裹煨熱

搗非時粥飲下二錢七

右下痢腹痛必溫散而愈者蓋本於內經所謂寒氣客

於小腸小腸不得成聚故腹痛後泄及所謂太陽病冬

日感寒即泄當臍而痛之病也

熱

垣芍藥黃芩湯治泄痢腹痛或後重身熱久不愈脉洪疾者及下痢膿血稠粘

黃芩

芍藥各一

甘草五錢

右咬咀每服一兩水一盞半煎至一盞溫服無時如痛

加桂少許

當歸導氣湯治膿血痢無度小便不通腹中痛

當歸一錢

甘草半錢

芍藥一錢

青皮一錢

槐花炒各七分

木香

檳榔各三錢

澤瀉五分

生地黄酒浸陰乾半或二錢

右為末水煎食前溫服如小便利去澤瀉

仲下痢腹痛紫參湯主之

紫參半斤

甘草三兩

右二味以水五升先煮紫參取三升內甘草煮取一升

半分三次溫服

久病按積

潔厚朴丸治處暑秋冬間腹痛下痢大效方見反胃

世治痢疾定痛黑子丸

黃蠟錢五

杏仁

江子

砂仁各半粒

右三件香油燈上燒存性鎔蠟和勻加乳香些少丸如

米大每服十餘粒

本治積痢定痛靈砂丹

礞砂

硃砂各等分研極細

右用黃蠟五錢巴豆三七粒去殼皮膜同於銀石器內

重湯煮一伏時候巴豆紫黑為度去二七粒止用一七

粒與前藥二味同研極勻再鎔蠟和藥旋丸菴荳大每

服二丸至五丸水瀉生薑湯下白痢艾湯赤痢烏梅湯

下服時須極空心服畢一時不可吃食臨臥尤佳次食

淡粥一日瘡疾乳香湯而東不發日晚間服此藥不動  
氣服之瀉者止痢者斷疼者愈有積者內化亦不動臟  
腑大凡痢有沉積者不先去其積雖暫安後必為害常  
記陳侍郎經中庚戌秋過儀真求診初不覺有疾及診  
視肝脉沉弦附骨取則牢予曰病在左脇有血積必發  
痛陳曰誠如是前某守九江被召冒暑涉長江暨抵行  
朝血痢已數日矣急欲登對醫者以剛劑燥之雖得止  
數日臍下一塊大如盂旬日如碗大痛發則不可忍故  
急請公祠以婦耳柰何予曰積痢不可強止故積血結  
於臍脇下非抵當丸不可渠疑而不肯服次年竟以此  
終

羅陳麴丸治腹中冷痛磨積止痢

陳麴一兩

乾姜炮

官桂

白朮

當歸

厚朴

人參

甘草炙各半兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三五十九酒送下或  
淡醋湯亦得食前一日三服發時不拘增數  
右久病漸換其積方

初病宜下

脈下痢而腹滿為實當下之

丹初下痢腹痛不可用參朮然氣虛胃虛者可用初得之  
亦可用大承氣調胃承氣下之看其氣病血病然後加減  
用藥 氣用參朮 血用四物 因積作後重者保和丸  
主之五日後不可下脾胃虛故也

氣鬱發之

腹痛者肺經之氣鬱在大腸之間者以苦梗發之然後用  
治痢藥氣用氣藥血用血藥 其或痢後糟粕未實或食  
粥稍多或飢甚方食肚中作疼切不可驚恐當以白朮陳  
皮各半煎湯和之自安 粥多及食肉作痛者宜奪食奪

食多作  
疼減之

水宜分

食者減其粥食絕其肉味也

垣茯苓湯治因傷冷水瀉變作赤白痢腹痛減食熱燥四

肢困倦無力

茯苓六分

澤瀉

婦身四分

芍藥一錢

蒼朮二分

生姜二錢

肉桂五分

黃芩三分

猪苓六分

甘草五分

升麻

柴胡各一錢

一本無升麻柴胡

右收咀作二服水煎稍熟食前服

陰陽反錯

羅神效越桃散治下痢之後小便利而腹中滿痛不可忍此名陰陽反錯不和之甚也

大梔子

良姜各三錢

右為末米飲或酒調下三錢

赤黃為熱青白

內經膿血稠粘皆屬相火夫太陰主瀉少陰主痢是先洩

忘

忘津液而火就燥腎惡燥居下焦血分其受邪者故便血然赤黃為熱青白為寒治須兩審治熱以堅中丸苦薑

丸香連丸治寒白膠香散或多熱少寒承養木香膏虛滑

頻數宜止宜瀉宜養葳湯木香養葳湯並見虛滑條白膠香散未致

堅中丸治脾胃受濕滑泄注下

黃連

黃柏

赤茯苓

澤瀉

白朮各一兩

陳皮

肉荳蔻

白芍藥

人參

官桂

半夏錢各五

右為末湯浸蒸餅為丸桐子大每服五七十九丸溫米飲

送下食前服

丹下血用四物為主當涼血和血當歸桃仁之屬

潔澀而便膿血者小腸泄也脈得五至已上洪大者宜七

宣丸脈平和者立秋至春分宜香連丸春分至立秋宜芍

藥

用藥隨寒暑

藥栢皮丸四時皆宜加減平胃散如有七宣丸症者亦宜服此藥去其餘邪兼平胃氣

芍藥栢皮丸方 芍藥 黃栢皮等

右為細末醋糊丸如桐子大每服五十九丸食前温湯下

加減平胃散經云四時皆以胃氣為本久下血則脾胃虛損血水流於四肢却入於胃而為血痢宜服此滋養脾胃

白朮 厚朴 陳皮 枳榔

甘草 木香 桃仁 人參

黃連 阿膠 茯苓 各五錢

右咬咀每服五錢姜三片棗一枚水煎温服無時 血

多加桃仁 熱泄加黃連 小便澀加茯苓澤瀉 氣

不下後重加檳榔木香 腹痛加官桂芍藥甘草 膿

多加阿膠 濕多加白朮 脉洪大加大黃

食積 丹下血多主食積與熱或有用利硝者

蒼朮 白朮 黃芩 芍藥

滑石 茯苓 甘草 陳皮

神麴 炒 煎下保和丸

世治痢食積

附米 神麴 川芎 梔子

滑石 山查 紅麴 青黛

桃仁 為末丸服

丹青六九去三焦濕熱治泄瀉多與清化丸同服並不單

服兼治產後腹痛或自利者能補脾補血亦治血痢效

六一散 益元散 紅麴 活血

右飯為丸一方酒糊丸

二十九官肚痢食少下墜赤積身熱

木通二錢 芍藥炒 陳皮 白朮

滑石各五錢 甘草炒

分四貼煎下保和丸與點丸各十丸

潔蒼朮地榆湯治脾經受濕下血痢

蒼朮三兩 地榆兩

右剉每一兩水二盞煎一盞溫服

槐花丸治血痢久不止腹中不痛不裏急後重

青皮 槐花 荆芥穗各等分

右為末水煎空心溫服

內寒 仲小腸有寒者其人下重便血

集治血痢神效乾姜於火上燒黑不令成灰磁碗合放冷

為末每服一錢米飲調下

白濁氣 宜大便後有白膿或只便白膿因勞役氣虛傷大腸也以

勞熱

丹丈夫辛苦勞役肚痢白瀉

滑石兩 陳皮 白朮六錢 芍藥五錢

黃芩三錢 甘草五分 桃仁三十箇

分六貼水二盞半煎取一盞食前服

飲積 孫郎中因飲水過多腹脹瀉痢帶白

蒼朮 厚朴 白朮 茯苓

滑石 下保和丸又云加炒麴甘草

身熱脈洪為熱 治痢熱多者

大黃 黃連 黃柏 黃芩

醫學綱目卷之三

三七

枳殼 白芍藥 當歸 滑石

甘草 桃仁 白朮

右等分為末麪糊丸

世不問赤白痢用苦蕒根不拘生乾搗取汁生薑蜜水調服未效再進半碗許立愈

集愚赤白痢山荳根搗末蜜丸空心煎水下二十九三服止

干治下痢冷熱諸治不瘥方

烏頭 黃連 枳一

右二味為末蜜和丸如桐子大下二十九日三夜二神

妙

世治似痢非痢挾熱者用苦練根皮去粗皮晒乾

右為末粳米飲為丸米飲下

腹寒脈細為寒

羅至元乙亥廬臺王千戶領兵鎮漣水此地卑濕因勞役過度飲食失節至秋深瘡痢併作月餘不愈飲食全減形容羸瘦時已仲冬求治於予具陳其由診得脈弦細而微如蛛絲身體沉重手足寒逆時復麻痺皮膚疥疥如癘風之狀無力以動心腹痞悶嘔逆不止皆寒濕為病久淹真氣衰弱形氣不足病氣亦不足陰陽皆不足也針經云陰陽皆虛針所不為灸之所宜內經云損者益之勞者溫之十劑云補可去弱先以理中湯加附子溫養脾胃散寒濕澁可去脫養藏湯加附子固腸胃止泄痢仍灸諸穴以併除之經曰府會太倉即中脘也先灸五七壯以溫養脾胃之氣進美飲食次灸氣海百壯生發元氣滋榮百脈克實肌肉復灸足三里胃之合也三七壯引陽氣下交陰分亦助胃氣後又灸陽輔二七壯接續陽氣令足脛溫煖除清

濕之邪造月餘病退平復 理中湯方見傷寒部加附子名附子理中湯  
海六脉沉緊按之不鼓膀胱小腸也或瀉痢不止而腹  
脹或純便赤血或雜以血膿小便不多而不渴精神短少  
或面白色脫此失血之故也或面黃氣短此本氣損少之  
故也小腸者手太陽丙火也膀胱者足太陽壬水也是壬  
水乘兩小腸之位小腸被壬所剋而外走也諸手經短而  
足經長兼五行相剋論之又足經來剋手經此火投於水  
大寒水之症宜溫之可安其與難經一症寒熱相反亦名  
曰小腸瀉此病火投于水變為寒症又外傷足太陽膀胱  
經左脉俱浮表陽之候也忽變為內寒亦旺火投盛水而  
屈丙就壬化脉反不浮而微沉此內病與外病俱有此火  
投水例非精於脉診者孰能辨之

石脂神砂丹

生附子

乾姜

各五錢

赤石脂

兩半

硃砂

一錢

右細末酒糊丸黑荳大每服十五丸米白湯下

太平廣記貞觀中太宗苦於氣痢眾醫不效詔問群臣中  
有能治者當重賞之有術士進以乳汁煎單撥服之立瘥  
世治水泄併赤白痢用草烏大者一兩半將一半燒灰一  
半生用為細末醋糊丸如荳荳大每服七丸赤痢甘草湯  
下白痢乾姜湯下水瀉井花水下並空心服忌腥臊熱毒  
諸冷物

法夏秋治

世俗治夏中暑痢疾用黃連香薷飲加甘草芍藥生姜神  
效者蓋夏月之痢多屬于暑潔古治處暑後秋冬間下痢  
用厚朴丸大效者蓋秋冬之痢多屬于寒經所謂必先歲  
氣毋伐天和者是也厚朴丸方見脈氣反胃 初病大腸閉塞裏急  
後重治法並見前 後重治法並見前

初病宜  
宣通  
次當實  
腸固滑

丹其或纏滯退減十之七八穢積未盡糟粕未實當以炒芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸三十粒然固腸丸性燥恐尚有滯氣未盡行者但當單飲此湯固腸丸未宜遽用蓋固腸丸者雖有去濕實腸之功其或久痢體虛氣弱滑泄不止又當以訶子肉荳蔻白礬半夏等藥瀉之甚者添牡礪可擇用之然須以陳皮為佐恐太瀉亦能作疼又甚者灸天樞氣海此穴大能止泄仲下痢便膿血者桃花湯止之方見傷寒若一服愈勿再服丹溪云桃花湯主病屬下焦血虛且寒非乾姜之溫石脂之澁且重不能止血用粳米之甘以引入腸胃羅水煑木香膏治脾胃受濕臟腑滑泄腹中疼痛日夜無度腸鳴水聲不思飲食每欲痢時裏急後重或下赤黃或便膿血並宜服之

木香

丁香各一兩

枳實炒

當歸

乳香

訶子皮各一兩

肉荳蔻

砂仁各一兩半

藿香

黃連炒

白芍藥

青皮

陳皮去白

厚朴制

甘草各一兩

乾姜炮五錢

御米殼蜜水炒

右為細末煉蜜丸彈子大每服一九水一大盞劈破煎

至六七分和查稍熱食前服

海易簡斷下湯治下痢赤白無問新久長幼

白朮

茯苓各一錢

甘草五分

草果連皮一箇

右咬咀用鶯粟殼十四枚去筋膜并萼蒂剪碎用醋淹為糞末用作一服水一大碗姜七片棗子烏梅各七箇煎至一大盞分二服服之赤痢者加烏荳二粒白痢者加乾姜五錢鶯粟殼治痢服之如神但性緊瀉多令人嘔逆既以醋制加以烏梅不致為害然嘔吐人則不可

服大率痢疾古方謂之滯下多因腸胃素有積滯而成此疾始得之時不可遽止先以巴苳感應丸十餘粒白梅湯下令大便微利仍以前藥服之無不應手作效若脾胃素弱用苳蔻橘紅鶯粟殼各等分為末醋煮麩糊為丸桐子大每服五十九丸烏梅湯下兼治泄瀉暴下不止一服即愈更令藥力相倍為佳如覺惡心却以理中湯四物湯加苳蔻木香輩調其胃氣仍以二陳湯煮木香丸定其嘔逆大凡痢疾乃腹心之患尊年人尤非所宜若果首尾用平和之劑決難作效必致危篤雖欲服此則已晚矣其秦芫地榆黃栢木通之類其性苦寒却難輕服 血痢當服胃風湯并膠艾湯之類 白者宜服附子理中湯震靈丹之屬更宜審而用之 若五色雜下泄瀉無時當用熟烏頭一兩厚朴乾姜甘草各一

熱滑

分生姜煎服 今之治痢多用駐車丸黃連阿膠丸之類其中止有黃連肥腸其性本冷若所感積輕及餘痢休息不已則服之取效若病稍重則非此可療

側栢葉錢一 甘草錢三 御米殼去頂穰湯洗二次晒乾蜜拌炒黃一

錢久者倍之

右咬咀水煎熟澄清入蜜呷服之先服木香檳榔丸後服此妙

本又方

黑苳粒五十 陳皮兩半 鶯粟殼十四箇 甘草

右四味半生半炒水煎空心服盡此一劑無不效者 垣白朮安胃散治一切瀉痢無問膿血相雜裏急窘痛日夜無度又治男子小腸氣痛及婦人臍下虛冷并產後兒

枕痛虛弱寒熱不止者

御米殼

三兩去頂穰帶醋煮一宿

茯苓

白朮各一

烏梅

取肉一兩炒

車前子

五味子

右為末每服五錢水煎溫服

經治腸滑久痢神妙以石榴一箇劈破炭火簇燒令烟盡

急取出不令作白灰用碗蓋一宿出火毒為末用酸石榴

一箇煎湯調二錢

聖治痢久不止腸垢已出以烏梅二箇水一盞煎取六分

去查食前分為二服

山治痢用五倍子為丸赤痢甘草湯下白痢乾姜湯下各

十九

垣訶子皮散癸卯歲冬十月小雪天冷應時樞密院白家

一老僕面塵脫色神氣特衰長跪於前曰病脫肛日久服

脫肛

藥未驗近日復下赤白膿痢作裏急後重白多赤少不

其苦求予治療予曰此非肉食膏粱者也必多蔬食或飲

食不節天氣已寒衣蓋又薄寒侵形體不禁而腸頭脫下

者寒也滑也真氣不禁形質不收乃血脫也此乃寒滑氣

泄不固故形質下脫也當以澁去其脫而除其滑以大熱

之劑除寒補陽以補氣之藥升陽益氣以微酸之味固氣

上收名之曰訶子皮散

御米殼

五分去花萼蜜炒

乾姜

六分炮

陳皮

五分

訶子皮

七分煨去核

右咬咀水煎服或為白湯調服亦可若空心一服減半

再服全愈

羅養臟湯治大人小兒腸胃虛弱冷熱不調臟腑受寒下

痢去白或便膿血有如魚腦裏急後重臍腹疼痛日夜無

度胃膈痞悶脇肋脹滿全不思食及脫肛墜下酒毒濕毒便血諸藥不效者並宜服之

人參

當歸各六錢

木香

一兩四錢

肉桂

八錢

肉蔻

麩裏煨

白芍藥

一兩二錢

甘草

炙六錢

白朮

六錢

御米殼

蜜炙

訶子皮

去核一兩二錢

右咬咀每服二大錢水煎去查食前溫服老人孕婦小兒暴瀉急宜服之立愈忌酒麪生冷魚腥油膩物臟腑滑泄夜起久不瘥者可加附子四片煎服此藥神效不可具述

保治泄痢膿血乃至脫肛者宜地榆芍藥湯

蒼朮

八兩

地榆

卷栢

芍藥

各三兩

右咬咀每服二兩水煎溫服病退勿服

大孔開世治痢大便不禁其大孔開如空洞不閉者用葱和花椒

末搗爛塞穀道中併服酸澁固腸之劑收之如御米殼子皮之類是也神效

大孔痛

丹陳伯夫年二十歲性急好酒色奉養厚適有事多憂恐患久瘡寒熱無時忽一日大發熱大便所下皆是積滯極臭大孔極痛呻吟不絕其孔陷下喘付後事予曰此大虛也脉皆弦大而浮遂以瓦片令敲圓如銅錢狀燒紅投童子小便中急取起令乾以紙裹安痛處其時寒恐外寒乘虛而入也以人參當歸陳皮作濃湯飲之食淡味至半月而安

久下赤白大孔痛不可忍炒鹽熨之又炙枳實熨之後

痢久大孔急痛亦有寒熱者熟艾黃蠟訶子燒薰之妙

子

下痢大孔痛因熱流于下楨榔木香黃連黃芩加乾姜

運氣運氣下血有二

其一熱助心血盛而血下經云少陰司天熱淫所勝民病血泄溺色變又云少陽在泉火淫所勝民病溺赤甚則便血又云歲金不及炎火乃行民病血便注下又云厥陰司天風氣下臨火縱其暴赤沃下注治以鹹寒是也

其二寒攻心血虛而下經云太陰司天寒淫所勝血變于中民病血泄又云太陽之勝血脈凝泣或為血泄又云陽明司天之政四之氣民病血便治以諸熱是也

運氣下白皆屬火經云少陽司天客勝甚則下白溺血是也

運氣下赤白有三

其一屬火經云少陽司天火淫所勝民病泄注赤白又云少陽在泉火淫所勝民病泄注赤白少腹痛注下赤白治

以其清是也

其二屬風經云厥陰之勝腸鳴飧泄少腹注下赤白治以甘清是也

其三屬風濕經云太陽司天之政四之氣風濕交爭民病注下赤白是也

運氣裏急後重有二  
其一濕助脾盛而重經云太陰之勝少腹滿腰脰重強內不便善注泄是也

其二風攻脾虛而重經云厥陰司天風淫所勝民病溏泄瘕水閉是也瘕謂後重也

雜方 本救命延年丸治丈夫女人一切重痢

黃連 乾姜 當歸 阿膠  
右三件為末用米醋煮阿膠令消盡不可剩却將藥搜

醋丸如桐子大每服三十九飯飲吞下甚妙

又方 茱萸

黃連

阿膠

白芍等分同

右為細末麩糊為丸如桐子大每服三十九陳米飲送

下小兒十九

陳無擇無阿膠各成已丸

羅阿膠梅連丸治下痢無問新久赤白青黑疼痛諸症

阿膠炒研

烏梅肉炒

黃栢炒

黃連

當歸

赤芍藥

乾姜炮

赤茯苓各等分

右為末入阿膠末研勻水丸桐子大米飲下

黃連丸治赤白痢

吳茱萸

黃連

右用好酒同浸三日各自為末各自丸白痢茱萸丸赤

痢黃連丸甘草湯下赤白痢二九相和服

右四方寒熱蕪施收散蕪用之劑寒熱滑瀯雜合為痢

者宜之

崔治痢方以生姜切如麻粒大和好茶一二碗任意呷之  
愈若熱痢則留姜皮冷則去皮炒 又方用陳皮艾葉濃煎湯服

針灸

滯下獨取足太陰一經經云脾足太陰之脉所生病者溏

瘕泄水視盛虛熱寒陷下取之也

東泄痢不禁小腹痛後重便膿血

丹田一寸

復溜

小腸俞灸七壯

天樞

腹哀胃

泄痢及下失氣膿血

下腰五十壯穴在八魁正中央脊骨上灸名三宗骨三報

關元

窮谷各灸五壯

世裏急後重

合谷

外關

小腸俞灸

甲便膿血寒中食不化腹中痛腹哀主之 溏瘕腹中痛

臟痺地機主之

宜忌

丹予族叔形色俱實痲瘰又患痢自恃強健能食絕無忌  
憚一日召予曰却健而能食但苦汗出耳汝能止此汗否  
予曰痲瘰非汗不能愈可慮者止健與能食耳此非痢也  
胃熱善消脾病不化食與積勢已甚矣此時宜節擇飲食  
以養胃氣省出入以避風寒候汗透而安叔曰世俗謂無  
飽死痢疾我今能食何謂可慮予曰痢而能食者知胃氣  
未病也故言不死非謂恣食不擇節者不從所言恣口大  
嚼過多又啖水菓如此者月餘後強求治不可着手矣淹  
淹又月而死內經以驕恣不論於理為不治之病信哉  
又周其姓者形色俱實患痢善食而易飢大嚼不擇者五  
月矣予責之曰病中當調補自養豈可恣味戕賊遂教其  
只用熟蘿蔔吃粥且少與調治半月而安

羅如瀉痢止脾胃虛難任飲食者不可一槩用剋伐之劑  
宜補養克足自然能飲食也宜錢氏方中異功散設或喜  
嗜飲食太過有傷脾胃而心腹痞滿惡心嘔逆不拘此例  
當權用橘皮枳木丸一服得快勿再服若飲食調節不致  
有傷則胃氣自和平矣

丹下痢久甚者寒涼藥中必兼升散并熱劑初下痢不可  
用參朮唯氣虛者用之

衍有一男子暑月患血痢醫妄用寒藥逆制專用木香黃  
連阿膠治之此藥始感便用則可倘病久腸虛者不宜服  
切宜戒之 地榆性沉寒苦惟下焦熱血痢則可用若虛  
寒人及水瀉白痢未可輕使

丹古方用厚朴專為瀉積滯之氣然厚朴性太溫而散氣  
久服大能虛人滯氣稍行即去之餘滯未盡宜炒枳殼陳

皮然枳殼亦能耗氣比厚朴雖少緩比陳皮亦為重若滯氣退一半亦當去之只用陳皮以和衆藥然陳皮去白用有補瀉之兼能若為參朮之佐亦純作補藥用

久泄久痢

丹予族叔年七十稟壯形瘦夏末患泄痢至秋百方不應予視之病雖久而神不瘳小便濇少而不赤兩手脉俱澁而頗弦自言曾微悶食亦減因悟曰此必多年沉積癖在腸胃詢其平生喜食何物曰我甚喜食鯉魚三年無日不用予曰積痰在肺肺為大腸之臟宜大腸之不固也當與澄其源而流自清以萊菔陳皮青葱龍首根生姜煎濃湯和以砂糖飲一碗許自以指探喉中至半時吐痰半升如膠其夜減半次早又服又吐半升而痢止又與平胃散加白朮黃連旬日而安 朱仲符年近七十右手風攣多年

臟腑有積在上宜吐

在下宜

七月患泄瀉百藥不愈診其脉右手浮滑而洪數予曰此必太陰分有積痰肺氣壅鬱不能下降大腸虛而作泄當治上焦遂用蘿蔔子加漿水蜜探之而吐得痰一塊大如椀色如琥珀稠粘如膠痢遂止不服他藥鹿首一本作鹿目無考子和東門一男子病泄痢不止腹鳴如雷不敢冷坐坐則下注如傾諸醫例斷為寒症官桂乾姜丁香荳蔻枯礬龍骨之屬皆服之矣針灸無效遷延已二十載矣一日問于戴人戴人曰兩手寸脉皆滑予不以為寒然其所以寒者水也以茶調散湧寒水五七升又以無憂散泄積水數十行乃通因通用之法也次以五苓散淡劑滲泄利水道又以甘露散止渴不數日而冷食寒飲皆如故此法王啓玄言之矣柰無人用之何哉 太康劉倉使大便少而頻日七八十次常於兩股間懸半枚瓠蘆戴人見而笑之曰便

既頻而少欲通而不得通也何不大下之此通因通用也  
 止宜一服藥之力乃與藥大下二十餘行頓止  
 潔治泄痢久不安膿血稠粘裏急後重日夜無度宜大黃  
 湯用大黃一兩對用好酒兩大盞浸半日同煮至一盞半  
 去渣分為二次頓服之痢止停服未止再服以利為度又  
 服芍藥湯以和之所以徹其毒也為藥湯方見  
 保白朮黃芩湯服前藥痢已除宜以此和之滯下和裏條  
 白朮兩一 黃芩錢七 甘草錢三  
 右咬咀水煎去渣溫服  
 有人每早須大瀉一行或腹痛或不腹痛空心服熱藥  
 亦無效有人教以夜食前又進熱藥一服遂安後如此常  
 服愈蓋暖藥雖平日服之至夜力已盡無以敵一夜陰氣  
 之故也

本治腎泄五味子散

五味子兩二 吳茱萸兩半

右二味炒香熟研為細末每服二錢陳米飲下有一人  
 每五更將天明時必溏痢一次如是數月有人云此名  
 腎泄腎感陰氣而然服此頓愈

每日早起瀉一二行俗謂之受肚瀉是也其症有二一  
 屬寒積在內即前二條之症是也 一屬食積在脾嘗治  
 翁仲政久泄早必泄一二行泄後便輕快脉滑而少弱先  
 與厚朴和中丸五十九丸大下之後以白朮為君枳殼茯苓  
 半夏為臣厚朴炙甘草連川芎滑石為佐吳茱萸十餘粒  
 為使生姜煎服十餘貼而愈  
 仲下痢已瘥至其年月日時復發者以病不盡故也當下  
 之宜大承氣湯

熱下

寒積熱下

本治痢冷在腸胃間頻年腹痛泄瀉休作無時服諸熱藥不效宜先取去然後調治不可畏藥以養病也

厚朴

乾姜

甘草

桂心

附子

生各二錢

大黃

生細切水一盞浸半日煎汁用之

右咬咀水二升半煎八合後下大黃汁再煎六合去渣分三溫服服自夜至曉令盡否則更以乾姜丸佐之

乾姜丸

乾姜

巴菝

去心研炒黃

大黃

人參

各一兩

石除巴菝餘為末同研煉蜜丸如桐子大食前用湯吞下一丸陳米飲亦得

有人因憂愁中傷食結積在腸胃欲發吐利自冬後至暑月積傷發暴下數日不已玉函云下痢至隔年月日應期而發者此為有積且下之止用溫脾湯尤佳如難下可佐

以乾姜丸後服白朮散

白朮

木香

附子

人參

各等分

右細末每服二錢水一盞生姜三片棗子一箇煎六分溫服

汚血

丹東陽胡兄年四十歲患痢百餘日百法治不效時正九月初旬予診其六脉促急沉弦細弱乾左手為甚晝夜十行視之穢物甚少雖下清涕中有紫黑血絲食全不進予曰此非痢也當作瘀血治之其兄問瘀血何事而致予曰飽食急走極力叫罵歐打顛撲多受疼痛盛怒不泄補塞太過大酒大肉皆能致之彼云去歲枉受責杖經涉兩年恐非此等瘀血予曰服吾藥得瘀血下則生矣以桃仁乳香沒藥滑石佐以檳榔木香用神麩糊為丸以米飲下五粒至夜半又不動又依前法下二百粒至天明下穢如爛

風邪內縮

魚腸者二升半因頓終日漸與粥食而安  
久泄是風邪內縮先煎小續命湯以發其汗使邪氣不能  
侵於外然後治其痢秋冬間下痢併治番胃加減厚朴丸  
大妙

通因通用

此症係風邪縮於內其症下痢不止寸脈沉而遲手足  
厥逆下部脈不至咽喉不利或嘔吐膿血為難治宜麻  
黃升麻湯或小續命湯以發之法曰表邪縮於內當散  
邪於四肢布於絡脈外無其邪臟腑安矣有食積者加  
枳實五錢如酒入而泄瀉此熱也加黃芩五錢麻黃升麻湯見傷寒小續命湯見中風  
子和李德卿妻因產後病泄一年餘四肢瘦乏諸醫皆斷  
為死症求治戴人戴人曰兩手脈皆微小乃痢病之生脈  
况洞泄屬肝經肝木克土而成此疾亦是腸澼者腸中

有積水也先以舟車丸四五十粒又以無憂散三四錢  
四五行人皆駭之病羸如此尚可通耶眾人雖疑然未敢  
謂且更看之復以導飲丸又通之渴則調飲五苓散向晚  
使人伺之已起而緝麻前後約三四十行以胃氣湧調之  
半月而能行一月而安健 劉德源病洞泄逾年食不進  
肌瘦力乏行步欹傾面色黧黑舉世治痢之藥皆用之無  
效戴人先以舟車丸無憂散下十餘行殊不困已頗喜食  
後以檳榔丸磨化其滯待數日病已大減戴人以為去之  
未盡當再服前藥德源亦欣然請下之又下五行次後數  
日更以苦劑越之往問其家彼云已下村中收索去也  
酒肉積多 一丈夫酒多病泄久不愈又自進附椒等食不進洩愈

滑石

黃芩兩半

乾姜

黃連

樗皮

粥為丸每服一百丸

予治方憲可二三年久泄下積但食肉則甚脉右關滑左沉細先以厚朴丸三四十粒下之次奪其食用補劑加二陳及朴連查榔等消導藥煎湯下厚朴丸五粒阿魏丸二十五丸服之五六日漸得下氣多而泄不止遂間服固腸丸泄漸止即安是知固腸丸之苦寒治酒肉積之要藥也厚朴丸方見番胃

虛寒

垣聖餅子治瀉痢赤白臍腹撮痛久不愈者

黃丹

蜜陀僧各二錢

輕粉許少

定粉

礪黃各三錢

右為細末入白麩四錢和水丸如桐子大捻作餅子陰乾食前溫漿水磨服以大便黑色為效衍義云黃丹治久積

丹脾泄當大補脾氣而健運之

潔肉荳丸治腎泄久不愈脉沉細無力者效

破故紙

肉荳蔻各等分

右為末棗肉丸如桐子大米飲空心下

世固中丸治脾久泄去後與氣不快者

蒼朮

肉荳蔻各一兩

右粥丸桐子大每服五十九丸於固中丸內加破故紙一

兩名固下丸治腎久泄

丹泄瀉丸治久病大腸氣泄

熟地錢五

芍藥炒

知母各三錢

升麻

乾姜各二錢

生薑一錢

右為末白湯調服再飲百會三五壯

又方 白朮 神麩 芍藥俱炒

或散或丸子服愈

垣治老人奉養太過飲食傷脾常時脾泄

虛積

白米兩炒二 白芍藥酒炒一兩 神麩炒一兩半 山查二兩

半夏兩制一 黃芩兩炒半

右為末青荷葉燒飯丸

本治腎泄宜五味子散方見早

訶黎勒丸治休息痢晝夜無度臍腹撮痛諸藥不效

椿根白皮兩訶子半兩 母丁香三十粒

右為細末醋糊丸如桐子大每服五十九丸陳米飲湯入

醋少許一日三服效椿根乃枙根俗所謂虎眼樹是也

本木香散治隔年痢不止并治血痢尤捷

木香對用黃連半兩同炒 鶯粟殼對用生薑半兩同炒

甘草灸

右為細末入麝香少許每服一錢陳米飲下

世治久瀉不止用百草霜研細以粥糊為丸白湯下

張文仲治痢久下經時不愈者此名休息痢取大虫骨炙

焦搗末調服日三七效

干治赤白痢積年不瘥飲湯調雲母末方寸七兩服效

又治血痢用千年石灰五升熬黃以水一斗攪令澄清一

服日三升

胎前下痢

本治婦人胎前產後赤白痢

生姜年少者百錢老者二 鴨子一箇打碎入

右二味煎至八分入蒲黃三錢煎五七沸空心溫服立

效

無姪娠下痢赤白絞刺疼痛

鷄子一枚烏鷄者佳 黃丹一錢入鷄子殼內打

泥固濟火上煨傾出清黃用

倍乾研為細末

虛

卷之三

五

右每服二錢米飲調下一服愈者是男二服愈者是女

天治妊娠素弱頻併下痢腹痛羸瘦面色痿黃不進飲食

厚朴半兩 白朮 川芎 白芍藥

熟地 當歸 乾姜 人參各一

訶子三錢 甘草一錢

右咬咀每服四錢姜三片同煎

又方治妊娠下痢腹痛小便澀

當歸 黃芪各一 糯米合

右細切和勻水煎分四服

羅大寧散治妊娠下痢赤白灰色泄瀉疼痛垂死者

黑薑三十 粟殼二兩半 甘草二兩半

右為粗末都作一服生姜三片同煎食前服神效

拔熱 大治妊娠挾熱下痢亦治男子常痢

黃連 黃栢各一 山梔仁二十

右咬咀每服五錢水二盞浸二時久煮十沸頓服若嘔

加陳皮一兩半姜三兩

黃連湯治妊娠下痢赤白膿血不止

黃連八分 厚朴制 阿膠炙 當歸

乾姜各六分 艾葉 黃栢各四分

右為細末空心米飲調下方寸匕日三服

滯氣 厚朴散治妊娠下痢黃水不絕

厚朴姜炙 黃連三兩 肉苳蓫一枚連皮用

右為麤末水煮頓服

草菓飲治妊娠臍氣本虛脾胃少弱臍腑虛滑腹臍疼痛

日夜無度

厚朴姜制 肉苳蓫一箇麩裹煨

右咬咀每服三錢姜三片同煎

產後痢

雲救急散治產後赤白痢腹中絞痛

芍藥

阿膠

艾葉

熟地各一兩

甘草

當歸各三兩

右咬咀水煎分二服空心飲

大當歸芍藥散治妊娠腹中絞痛心下急痛及療產後血

暈崩中久痢方見婦人血崩門

楊療妊娠血痢用阿膠二兩以酒一升半煮取一升頓服

大產後諸痢煮薤白食之 又方羊腎脂炒薤白空心食

之甚佳

經治產後胎前痢疾敗龜甲一枚米醋炙研為末醋湯調

下丹溪云龜甲大

丹婦人患墮胎後臍滿食少痢不止脉虛左手尤甚

滑石

白芍藥炒

蒼朮各五錢

白朮五分

乾姜四錢

茯苓一錢

訶子二錢

右為細末調下保和丸四五十粒

雲產後血痢臍腹疼痛四物湯加槐花黃連御米殼等藥

黃連丸治產後赤白痢腹中攪痛不忍

黃連

阿膠

蒲黃

梔子仁各一兩

當歸二兩

黃芩

黃栢各二兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服六七十丸米飲調下日

三夜一

仲產後下痢虛極白頭翁加甘草阿膠湯主之脈經作熱極者

白頭翁

阿膠各二兩

黃連

黃栢

秦皮各三兩 甘草二兩

右以水七升煮取二升半納膠令消盡分三服温服  
婦人臨產痢疾山梔不拘多少燒灰為細末空心熟水調  
下一錢甚者不過五服

產後血痢小便不通臍腹疼痛用生馬齒莧搗汁二大合  
煎一沸下蜜一合調頓服

梅治產後血泄不禁餘血作痛蕪塊桂心乾姜等分為末  
空心酒調服方寸七

大療產後痢日五十行者取木裏蠹虫糞炒黃急以水沃  
之令稀稠得所服之即瘥

聖產後諸痢方取蒼耳葉搗汁半盞日三四温服  
大便不通 產後大便閉 大小便不通  
產後大小便不通

寒滑

雜方

虛實垣津液耗而燥者以辛潤之 腎主五液津液感則大便

如常若飢飽勞役損傷胃氣及食辛熱厚味之物而助火  
邪伏於血中耗散真陰津液虧少故大便結燥又有年老  
氣虛津液不足而結者腎惡燥急食辛以潤之是也

氣血風  
燥皆潤  
之

潤腸丸并加減法治胃中伏火大便閉澇或乾燥不通全不思  
食乃風結血秘皆令閉塞須潤燥和血疎風則自然通矣

羌活 歸稍 大黃各半兩 麻仁

桃仁泡去皮尖各一兩

右為末除麻仁桃仁另研如泥外為細末煉蜜為丸如  
桐子大每服三五丸空心白湯下 如病人不小便  
因大便不通而澇其邪盛者急加酒洗大黃以利之  
如血燥者加桃仁酒洗大黃 如風結燥者加麻仁大  
黃 如風澁者加煨皂角仁大黃秦芫以利之 如脉

瀦覺身痒氣瀦者加郁李仁大黃以除氣躁 如寒陰  
之病為寒結閉者以局方中半硫丸或加煎附子生姜  
湯冰冷與之其病雖陰寒之症當服陽藥補之若大便  
恒不甚通者亦當十服中與一服利藥微通其大便不  
令閉結乃治之大法也 若病人雖是陰症或是陰寒  
之症其病顯躁脉堅實亦宜陽藥中少加苦寒之劑以  
去熱躁躁止勿加如陰躁欲坐井中者其二腎脉按之  
必虛或沉細而遲此為易辨如有客邪之病亦從權加  
藥以去之

垣活血潤腸丸治大便風秘血秘時常結燥

當歸稍錢一 防風稍錢二 羌活兩 大黃根一兩

麻子仁二兩 桃仁二兩 研 皂角仁炮存性去皮秤一兩  
滑則燥 結自除

右除麻仁桃仁另研如泥外為極細末煉蜜為丸桐子  
大每服五十九丸白湯下三二服後須以蘇子麻子粥每  
日早晚食之大便日久再不結燥以磁器盛之紙封勿  
令見風

當歸潤腸湯

升麻二錢 當歸稍錢一 熟地錢一 生地二錢

三花五錢 大黃煨 甘草稍生 桃仁

麻仁各一錢 研如泥

右劉如麻豆大作一服水三盞入桃麻仁煎一盞空心  
稍熱服

導滯通幽湯治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不

便燥閉氣不得下治在幽門以辛潤之

當歸身

升麻稍

桃仁泥

甘草灸各一錢

紅花許少

熟地

生地各五分

右改咀作一服水二大盞煎至一盞調栝榔細末五分稍熱服之

海許學士治年老虛秘麻仁蘇子各半合研取汁分二服煮粥服之不藥而愈

羅潤腸橘杏丸降氣潤腸服之大腸自無澹滯

橘皮

杏仁去皮尖并双仁者麩炒黃各等分本草云杏仁能潤氣燥

右等分為末煉蜜丸如桐子大每服五十九丸空心溫水下亦不損胃氣

右乃潤燥法蓋桃仁麻仁治血燥杏仁郁李仁治氣燥阜角仁治風燥也

丹楊淳三哥大便秘澹小便如常咽塞不通食下便有痰出脉澹左右手同此血虛腸燥為脾約病甚者人參散主之

人參

黃芪各一錢

厚朴八分

地黃七分

桃仁

枳殼炒各一錢

甘草少許

煎入竹瀝姜汁飲之又與鎖陽菴蓉二錢桃仁一錢煮粥入竹瀝名潤腸散

婦人腸秘補血和氣以通之

肉菴蓉一兩

麻仁

白芍藥

陳皮

當歸身各一兩

右為末晒乾炒神麩糊為丸如桐子大食前白湯下五十丸二次服

世菴潤腸丸治發汗過多耗散津液大腑秘結

蘇蓉

酒浸焙沉香另研

右為末用麻仁汁打糊丸如桐子大每服七十九米飲

海益血丹治大便燥久虛亡血

當歸酒浸

熟地各等分

右為末煉蜜丸如彈子大細嚼酒下

丹大腸虛秘而熱者

白芍藥半兩陳皮

生地

當歸身各一兩

條芩

甘草

右粥為丸白湯下

右從蓉當歸地黃潤燥法蓋積血枯竭而虛甚者宜之

有積宜泄之

垣有物有積而結者當下之食傷太冷腸滿食不化腹

運響然不能大便者以苦泄之仲景麻仁湯方七宣皆

風宜散之

垣治注夏大便澹滯者血少血中伏火也黃芪人參湯加

生地黃當歸身桃仁泥麻仁泥潤之黃芪人參湯方見注夏如潤

之大便久不快利者少加煨大黃微利之如加大黃久

不快利者非血結血秘是熱則生風病必濕風症止當服

黃芪人參湯只用羌活半兩防風半兩水四盞煎至一盞

去查空心服之其大便必大走也

丹脾約丸論○成無已曰約者結約之約又束約之約胃

強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱故小便數而大便

硬故曰脾約與此丸以下脾之結燥潤腸結化津液入胃

則大便利小便少而愈矣愚竊有疑者既曰脾約脾弱不

能運也脾弱則土虧矣必脾氣之散脾血之耗原其所由

久病大下大汗之後陰血枯槁內火燔灼熱傷元氣又傷

於脾而成此症傷元氣者肺金受火克氣無所攝傷脾者

西北方人宜開  
東南方人宜潤  
燥人宜潤

醫方編覽卷之三

卷之三

肺為脾之子肺耗則津竭必竊母氣以自救金耗則木寡于畏土欲不傷不可得也脾失轉輸之令肺失傳送之官宜大便秘而難下小便數而無藏畜也理宜滋養陰血使孤陽之火不熾而金行清化木邪有制脾土清健而運行津液津液入胃則腸潤而通矣今以<sup>八</sup>大黃為君枳實厚朴為臣雖有芍藥之養血麻仁杏仁之溫潤為之佐使用之熱甚而氣實者無有不安愚恐西北二方地氣高厚人稟壯實者可用若用之東南之人內熱自甚而血氣不實者雖得暫通將見脾愈弱而燥矣後之用此方者須知在西北以開結為主在東南以潤燥為主慎勿膠柱而調瑟可也

能食伊赤為物秘

潔臟腑之秘不可一槩治療有虛秘有實秘胃實而秘者能飲食小便亦當以麻仁丸七宣丸之類主之仲景麻仁丸方見傷

寒陽明病每服二十九丸未知加至五十九丸日三服以利為度

### 局七宣丸

柴胡五兩

桃仁去皮尖炒六兩

枳實炒五兩

甘草炙四兩

訶子皮

木香各五兩

大黃麩裹煨十五兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服二十九丸米飲送下漸

加四五十丸以利為度

斗治大便不通用烏柏木皮方一寸劈破以水煎取小半盞服之立通不用多服其功神聖兼能取水或以此湯調下五苓散二錢空心更妙

潔胃虛而秘者不能飲食小便清利厚朴湯主之

陳皮兩

甘草炙二兩

厚朴制二兩

白木三兩

半夏麩炒一兩

枳實炒一兩

右麩末每用三五錢水盞半姜三片棗一枚煎至一盞

不能食便清為氣秘

去查空心温服實秘者物也虛秘者氣也

世栳榔散治腸胃受濕大便秘濇用栳榔不拘多少為末每服二錢蜜湯點服不拘時

診氣

海槐杏仁俱治大便秘當以血氣分之年老虛人大便秘秘者脉浮在氣杏仁陳皮主之脉沉在血桃仁陳皮主之所以俱用陳皮者以其干陽明病與手太陰為表裏也又云盛則難便行陽氣也敗則便難行陰血也

診陰陽寒熱

仲問曰脉有陽結陰結者何以別之曰其脉浮而數能食不大便者此為實名曰陽結也期十七日當劇其脉沉而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結也期十四日當劇垣有陽結有陰結陽結者散之陰結者熱之

熱氣留於小腸腸中痛脾熱焦渴則堅乾不得出故痛而閉不通矣全文見諸痛

膀胱移熱於小腸膈腸不便全文見診病傳變

陽結

保大黃牽牛散治相火之氣遊走臟腑大便秘結

大黃兩 牽牛頭末半兩

右為細末每服三錢有厥冷合用酒調無厥冷而手足

煩熱者蜜湯調下食後以微利為度此謂不時而熱者

濕熱也凡用大黃半兩至一兩而大便不通利者加麝少許調於藥中則大便必大走也

右熱秘皆陽結之屬仲景大小承氣及麻仁丸之類是也方見傷寒陽明病

世治後分閉塞用萱草根一捻同生姜搗碎取自然汁服之立愈

局半硫丸治年高冷秘虛秘

硫黃研細生用 半夏末

右等分和勻生姜自然汁打麪糊為丸桐子大每服五

陰結

右等分和勻生姜自然汁打麪糊為丸桐子大每服五

十九九空心温酒姜湯任下

垣麻黃白朮湯治大便不通五日一遍小便黃赤渾身腫面上及腹尤甚色黃麻木身重如山沉困無力四肢痿軟不能舉動喘促唾清水吐穢痰白沫如膠時躁熱發欲去衣須臾而過振寒頂額有時如冰額寒尤甚頭旋眼黑目中溜火冷淚鼻不聞香臭小腹急痛當臍有動氣按之堅硬而痛

麻黃不去根五分

杏仁四箇

吳茱萸四分

白芫薺五分

炒麴五分

升麻二分

柴胡

白朮

蒼朮各二分

甘草生一分

澤瀉

白茯苓各四分

橘紅二分

青皮去穢

黃連酒浸

黃柏酒浸

黃芪

人參

猪苓各三分

熟苳早一分

運氣

運氣大便閉有三

一曰熱經云熱至則淋閉又云少陰之復膈腸不便是也  
二曰寒經云太陽所至為禁止是也  
三曰濕經云太陰司天濕淫所勝病大便難是也

右改咀分作二服每服水二大盞半先煎麻黃沸去沫再入諸藥同煎至一盞去查稍熱食遠服 此症宿有

風濕熱伏於榮血之中其水火乘於陽道而上盛元氣短少上喘為陰火傷其氣四肢痿在腎水之間乃所勝之病今正遇冬寒得時乘其肝木又實其母肺金克木凌火是大勝必有大復其症善怒欠多嚏鼻中如有物不聞香臭目視慌慌多悲健忘少腹急痛遍身黃腹大脹面目腫尤甚食不下痰唾涕有血目背癆大便不通只二服皆愈

外取法

仲蜜煎導法

方見傷寒胃實丹溪云路公夏中病泄有人

又不樂大黃藥遂一夕用蜜煎三下結糞五

海霹靂煎用鹽與蜜乘熱捻如蜜煎法上頭銳用十許納

穀道中少許化開即通一法用蜜煎不通者純

海蜜煎與鹽相合如用草烏頭末相合亦可蓋鹽能軟堅

潤燥草烏能化寒消結可隨症陰陽所宜用之

急提盆散治雜病非陰候者用草烏頭不拘多少為極細

末每用葱一枝肥者削去鬚圓頭上有汁濕蘸之納穀道

中

仲猪膽汁方方見傷寒胃實

孟大便不通氣奔欲死者以烏梅十箇置湯中須臾按去

核杵為丸如棗大納下部少時即通

又方治大小便不通

江子肉

杏仁

皂角

右為末作餅置臍上灸炙自通

世通關散治卒閉不通用鹽入臍中灸即通去之

本宣積丸手心握藥便通

巴豆

乾姜

葶子

良姜

硫黃

其遂

白柝

榔各等分

右為細末研飯為丸如龍眼大早朝先用椒湯洗手麻

油塗手掌口握藥一粒移時便瀉欲止以冷水洗手

針灸大便閉有二法

其一取胃經云腸中不便取三里盛瀉之虛補之是也

其二取腎經云邪在腎病大便難取之湧泉崑崙視有血

者盡之

玉大便秘塞

照海

五分補二呼瀉六吸立通

支溝

半寸瀉三吸

撮又法

照海立通

太白瀉之灸亦可

集又法

照海十壯瀉之

章門七壯

太白半寸灸五壯已上者

摘又法

氣海八分

針時記令人挾臍揉之却刺三里

三里

穴看虛實補瀉之虛結補則通熱結瀉則通寒結先瀉後補熱結先補後瀉之

世又法

合谷

東大便閉背七椎兩傍相去各一寸灸三壯

承筋灸三壯

腸遠

挾玉泉相去二寸隨年壯針灸書無此穴或云非正穴也

又法

石門半寸

大都五分

摘治大便不通并傷寒水結

三間沿皮下向至合谷穴

出承山瀉七分

甲大便難中渚及太白主之 又大鍾主之

予觀古方通大便皆用降氣品刺蓋肺氣不略則大便

難傳送用杏仁枳殼沉香訶子等是也又老人虛人風人津液少而秘者宜以藥而滑之用胡麻麻仁阿膠等是也如妄以峻利藥逐之則津液走氣血耗雖暫通而即秘矣必更生他病昔王少府患此疾有人以駃藥利之者累矣後為肺痿咯膿血卒至不通而死

產後大便不通

本婦人產後有三種疾鬱冒則多汗汗多則大便秘故難於用藥惟麻子蘇子粥最為穩當 用紫蘇子大麻子二味各半合洗淨研極細用水再研取汁一盞分二次煮粥啜下此粥不唯產後可服大抵老人諸虛風秘皆宜服之嘗有一人年八十四忽爾腹痛惡心不食召醫數十議皆用補脾進食治風清利頭目等藥數日雖愈全不入食其家憂惶予辨說前藥皆誤矣此症正是老人風秘

虛

臟腑壅滯聚於胃中則腹脹惡心不思飲食又上至於顛則頭痛神不清也若臟腑流暢諸疾悉去矣予令作此粥兩啜而氣泄先下結真如胡椒者十餘枚後漸得通利不用藥而自愈矣

丹產後秘結不通膨滿者氣急難坐臥用麥蘖末酒下一合神效出兵部手集

大小便不通

丹一婦人脾疼後患大小便不通此是痰隔中焦氣聚上焦二陳加水通初服後吐查再服

山大小便不通燒阜角灰為末粥清調下本車狗散治大小便經久不通欲死者

用推車客七箇土狗七箇在土名土狗在水名水狗二物新瓦上焙乾為不以虎目樹皮向東南者盪煎湯服之經驗如神

痰 熱

寒

雜方

虎目即虎杖其性大能利小便又解暑毒一說男子病上狗用身女人病土狗用頭推車客用身效海廻生神膏治陰症大小便不通及諸雜病陰候大小便不通者宜用此治法數日不通危急者用之非急不用

牡礪

陳粉

乾姜炮各一兩

右為細末男病用女人唾調手內擦熱緊掩二卵上得汗出愈女病用男子唾調手內擦熱緊掩二乳上得汗出愈蓋卵與乳乃男女之根蒂坎離之分屬也

脉盛皮熱肚脹前後不通齆悶此謂五實全文見治虛實法

丹掩臍法治大小便不通用連根葱一二莖帶土生姜一

塊淡豆豉二十一粒鹽二匙同研爛作餅烘熱掩臍中以

帛紮定良久氣透自通不通再換一餅

桑大小便不通 大都分

針灸

雜方

針灸

東大小便難

環岡在小腸命下二寸

水道壯

衛在背脊四面各一寸八分腰眼至三寸挾脊相去

甲三焦約大小便不通水道主之

產後大小便不通

雲療產大小便不利下血

車前子

黃芩

蒲黃

牡礪

生地

芍藥各一兩

右為細末空心米飲服方寸七忌麪蒜

針灸

心治婦人產後忽小腹脹如蠱大小便不通氣海三里關

元三陰交陰谷主之

醫學綱目卷之二十三

醫學綱目卷之二十四

脾胃部

水脹通論

水脹皆本於房勞過度

靈黃帝問曰水穀入于口輸于腸胃其液別為五天寒衣

薄則為溺與氣天熱衣厚則為汗悲哀氣并則為泣中焦

胃緩則為唾邪氣內逆則氣為之閉塞而不行不行則為

水脹余知其然也不知其何由生願聞其道岐伯曰五穀

之津液和合而為膏者內滲入于骨空補益腦髓而下流

于陰股陰陽不和則使液溢而下流于陰髓液皆減而下

下過度則虛虛故腰背痛而脛痠陰陽氣道不通四海塞

閉三焦不瀉津液不化水穀并行腸胃之中別于迴腸留

于下焦不得滲膀胱則下焦脹水溢則為水脹

五瀝津液篇下過度也

本臍腹四肢悉腫者為水但腹脹四肢不甚腫為蠱脹也

診法

醫學綱目卷之三

靈黃帝問于岐伯曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕石水何以別之岐伯答曰水始起也目窠上微腫如新臥起之狀其頸脉動時欬陰股間寒足頸腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也黃帝曰膚脹何以候之岐伯曰膚脹者寒氣客于皮膚之間蹇蹇然不堅腹大身盡腫皮厚按其股窅而不起腹色不變此其候也鼓脹何如岐伯曰腹脹身皆大大與腹脹等也色蒼黃腹筋起此其候也腸覃何如岐伯曰寒氣客于腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫癖而內着惡氣乃起瘕肉乃生其始生也大如鷄卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候也石瘕何如岐伯曰石瘕生于胞中寒氣客于子門子門閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉以留止日以益大狀如懷子月事

不以時下皆生于女子可導而下黃帝曰膚脹鼓脹可刺邪岐伯曰先瀉其脹之血絡後調其經刺去其血絡也

論○石水臍已下腫其脉沉

水腫 先目足腫後腹大為水 胎前水 產後水

治法

素帝曰其有不從毫毛生而五臟陽以竭也津液充郭注王云不從毫毛生者生于內也津液者水也充滿也郭皮也蓋陽竭於外津液得以充滿於郭而浮腫也其魄獨居孤精於內氣耗于外形不可與衣相保此四極急而動中是氣拒于內而形施于外治之奈何岐伯曰平治於權衡去宛陳莖微動四極溫衣繆刺其處以復其形開鬼門潔淨府精以時服五陽已布踈滌五臟故精自生形自盛骨肉相保巨氣乃平湯液醪醴論開鬼開發汗也紫衡謂察其脉浮沉也脉浮為在表脉沉為在裏在裏者泄之在表者汗之故下文云開鬼門紮藏府也去宛陳莖謂去積久之水物猶如草莖之不可久留於身中也微動四極謂微動四肢令陽氣漸以宣行故曰溫衣也

靈黃帝問于岐伯

二

仲諸有水者腰已下腫當利小便腰已上腫當發汗乃愈  
風水脉浮身重汗出惡風者防已黃芪湯主之

防已兩一

黃芪一分

白木三分

甘草炙半兩

右剉每服五錢生姜四片棗一枚水盞半煎取八分去

查温服良又再服腹痛加芍藥一法潔古用此湯調五

苓散治因濕為腫者又方防已湯治風濕脉浮為在表

重從腰已上為和腰已下常種及身重難以屈伸

皮水為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動者防已茯

苓湯主之

防已

黃芪

桂枝各三兩

茯苓六兩

甘草二兩

右五味以水六升煮取二升分温三服

斲而皮水者蒲灰散主之方見淋口已上利小便法

風水急風一身悉瘡脉浮不渴續自汗出無大熱越婢湯

主之

麻黃六兩

石膏半兩

生姜三兩

大棗十五枚

甘草二兩

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升

分温三服 惡風者加附子一枚炮風水加木四兩

裏水者一身面目黃腫其脉沉小便不利故令病水假如

小便自利此亡津液故令渴也越婢加木湯主之于前越

婢湯加白朮四兩甘草麻黃湯亦主之

甘草二兩

麻黃四兩

右二味以水五升先煮麻黃去上沫內甘草煮取三升

温服一升重覆汗出不汗再服慎風寒

水之為病其脉沉小屬少陰浮者為風無水虛脹者為氣

水其汗即已脉沉者宜麻黃附子湯浮者宜杏子湯

麻黃兩 甘草兩 附子一箇

右三味以水七升先煮麻黃去上沫內藥煮取二升半

温服八合日三服已上發汗出愈

丹溪法

水腫因脾虛不能制水水積妄行當以參朮補脾使脾氣得實則能健運自然升降運動其樞機則水自行非若五苓之行水也宜補中行濕利小便切不可下當用二陳湯加白木人參蒼朮為主佐以黃芩麥門冬制肝木若腹脹少佐厚朴氣不運加木香木通氣若喘下升麻柴胡提之隨症加減必須補中用大劑白朮補脾如壅滿用半夏陳皮香附監之有熱者當清肺金門冬黃芩之屬 赤岸馮令八官素飲食不知飽但食肉必泄忽遍身發腫頭面加多致目亦不可開膈間滿如築兩足麻至膝而止渾身

不可見風陰器挺長其脉左沉而重取不應右三部雖小却有和滑氣象遂令單煮白朮湯飲早晨空心探而去之食後白朮一錢麻黃五分川芎半錢防風三分作湯下保和丸五十九如此者二日因吐中得汗通體上截為多遂得腫寬而眼開氣順而食進却于前方中麻黃防風加白朮三錢木通通草各半錢下保和丸五十九如此者五日而安此即開鬼門之法也

蘆節婦年二十餘半月之前夜間發熱面先腫次及身足腫肚亦腫口渴思冷水食畧減

大腹皮半錢 白朮一錢半 蒼朮半錢 梔子四枚

川芎錢一 麻黃分六 木通錢一 乾葛錢二

甘草稍此

朱秀才因久坐受濕能飲酒下血以苦瀉藥熱之遂成腫

疾而肚足皆腫口渴中滿無力少汗脉澹而短乃血為濕  
氣所傷法當行濕順氣清熱進食化積

滑石六錢

白木二錢

木通三錢

厚朴

乾葛各二錢

蒼木一錢

分四貼加蘇葉七片每一貼煎至三之一熱下保和丸  
與點丸温中丸各五十九

王三九孺人浮腫膈滿腹滑泄口苦而渴小便赤少脉虛  
而豁大稍遲此有汚積病為人性急

滑石一兩

陳皮四錢

蘇梗

白木

川芎

木通

厚朴各二錢

茯苓皮一錢半

甘草稍半錢

分六帖用順流水煎下保和丸廿五丸抑青丸十九丸  
吳孺人胃中有積發為腫成瘡疥身倦食少惡寒發熱脉

虛而沉

白木一兩六錢

滑石二兩

生地

木通

川芎各半兩

黃芩

茯苓皮

連翹各四錢

紫蘇三錢

甘草炙一錢半

下保和丸三十九

一女子年三十餘歲腫病有熱服藥得安但兩足下節不  
退肚內自覺尚有熱脈却平矣飲食如昨

白木錢

郁李仁一兩半

蘇梗

木通

條芩

檳榔

枳實炒半兩

青皮一兩

甘草稍一錢

分十貼細研郁李仁以順流水三盞盪起煎一盞食前  
熱服

張郎廿歲秋得腫疾午前上甚午後下甚口渴乏力脉澹

弱食亦少稟氣素怯汗不能自出鬱而為水與灸三里肺俞大椎合谷分水又與此方

白木半錢 陳皮分五 黃芩 紫蘇

海金沙 木通 大腹皮 茯苓皮

乾葛炒 厚朴 甘草各二錢

作一貼水煎服

光明人脚腫肚畧急身微熱脉畧數口乾

白木錢一 茯苓分五 乾葛炒分五 蘇梗錢五

大腹皮錢三 甘草錢一 川芎錢二 陳皮分五

許宅婦人二十已上脚踝腫近日有瘡毒

白木錢七 蒼朮 陳皮 犀角末

川芎錢五 木通 連翹 蘇葉各三錢

甘草錢一

分七貼前後入姜汁令辣熟食前服

馮官人因內有濕積兼時令濕熱右腿少陽分發爛瘡如

掌大痒甚兩手脈洪緩畧數面目手足俱虛腫膈中午前

痞悶午後腫到兩足則膈寬

犀角生五分 枳殼炒分五 陳皮 連翹

白木各一錢 木通分五 蒼朮分五 甘草稍二分

茯苓分五 加姜汁煎服

馮客癰而發腫微渴脉左手虛右手大食少

白木半錢 陳皮錢一 木通 厚朴炒

大腹皮各五分 甘草分二 牛膝分五 蘇梗分三

姜片三

馮孺人癰而浮腫大便自利

人參 半夏 陳皮各一錢 川芎

蒼朮炒

白芷各五分

木通二錢

白朮半錢

甘草各三分

王官人年四十瘧兩日一發始善啖至春作腫大小便秘食少面浮腫口渴

厚朴錢一

白朮半錢

木通七分

陳皮錢一

川芎

大腹皮各五分

牛膝

滑石各錢一

甘草各三分

右丹溪治水腫之法十五條其法大率皆以甘草佐白朮參陳等劑補中氣為君木通滑石郁李仁海金沙行水為臣厚朴大腹皮蘇梗通滯氣為佐使如氣不昇浮惡寒味沉者探吐以提之頭面先腫加麻黃微汗之挾積氣者佐以保和溫中抑青等丸磨之挾熱者佐以黃芩之類清之挾瘡癰者佐以連翹犀角散之而隨証加

減也

先補後

羅治腫以胃氣為本至元戊寅五月間積雨淋漓魯齋許仲平先生時年五十有八面目肢體浮腫大便溏多腹脹腸鳴時痛飲食減少命予治之脉得弦細而緩魯齋曰年壯時多服牽牛大黃藥面目四肢時有浮腫今因陰雨故大發予曰營運之氣出自中焦者胃也胃氣弱不能布散水穀之氣營養臟腑經絡皮毛故氣行而清為浮腫大便溏多而腹脹腸鳴皆濕氣勝也四時五臟皆以胃氣為本五臟有胃氣則和平而身安若胃氣虛弱不能運動滋養五臟則五臟脉不和平本臟之氣盛者其脉獨見輕則病過甚則必死故經曰真臟之脉弦無胃氣則死先生之疾幸而未至于甚尚可調補人知服牽牛大黃為一時之快不知其為終身之害也遂以平胃散加白朮茯苓草薏

仁數服而腹脹溇泄腸鳴時痛皆愈飲食進止有四肢浮腫以導滯通經湯主之良愈

導滯通經湯治痺濕有餘及氣不宣通面目手足浮腫

陳皮 桑白皮 白朮 木香各五錢

茯苓一兩 去皮

霖兩時加澤瀉一兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞食前溫服

白茯苓湯能變水

先攻後補

白茯苓 澤瀉各二兩 郁李仁五錢

右咬咀作一服水一碗煎至一半生姜自然汁入藥常

服無時從少至多服五七日後覺腹下再腫治以白朮

散

白朮 澤瀉各半兩

雜方

右為末煎服三錢或丸亦可煎茯苓湯下三十九以葶芎藥建中湯之類調養之平復後忌房室猪魚鹽麩等物

本大東湯治四肢腫滿用白朮三兩咬咀每服半兩水一

盞半大東三枚拍破同煎至九分去查溫服日三四服不

拘時候

梅治水腫不能服藥商陸一升羊肉六兩以水一斗煮取

六升去查和肉葱豉作臠如常法食之商陸白者好

食醫治十種水氣痛不瘥欲死者鯉魚一頭重一斤已上

者煮熟取汁和冬瓜葱白作羹食之 治十種水氣病不

瘥垂死者青頭鴨一隻治如食法細切和米并五味煮令

熟作粥空腹食之

梅治水氣脹滿小便濇白鴨一隻去毛腸洗淨饋飯半升

開鬼明

與椒姜同穰鴨腹中縫定如法蒸熟食之  
子和鄔之營兵狄家小兒病風水諸醫用銀粉粉霜之藥  
小便反瀉飲食不進頭腫肚脹四肢皆滿狀若水晶求治  
戴人戴人曰此証不與壯年同壯年病水者或因留飲及  
房室此小兒終七歲乃風水証也宜出汗乃置燠室以屏  
帳遍遮之不令見火若內火見外火必昏瞶也使大服胃  
風湯而浴之浴訖以布單重覆之凡三五重其汗如水腫  
乃減五分隔一二日又依前法治之汗出腫減七分又三  
汗而全減尚未能食以楨榔丸調之兒已嬉笑如常日矣  
本治水氣羌活散

羌活

蘿蔔子 各等分

右同炒香熟去蘿蔔子不用末之溫酒調下二錢一日  
一服二日二服三日三服取效

羅五皮散治他病愈後或瘡痂後身體面目四肢浮腫小  
便不利脉虛而大此由脾肺虛弱不能運行諸氣氣虛不  
理散漫於皮膚肌腠之間故令腫滿也此藥並宜服之

大腹皮

赤茯苓皮

生姜皮

陳皮

桑白皮

炒各等分

右件為粗末每服五錢水一大盞同煎至八分去查溫  
服不拘時候日進三服

香蘇散治水氣虛腫小便赤瀉

陳皮 去白一兩

防已

木通

紫蘇葉

各半兩

右為末每服二錢水二盞生姜三片同煎

外治水病洪腫氣脹不消食用香薷五十斤細剉納釜中  
水浸上數寸煮使氣盡去查澄清熬稠丸如桐子大日三  
服每服五丸稍加以小便利為度

紫淨疔

梅治水腫作坐臥不得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒

灰淋汁煮赤小荳空心食令飽飢即食盡不得吃飯

兵治水病初得危急冬瓜不限多少任吃神効無比丹溪云冬

瓜性急又病與陽虛者忌之丹十種水氣冬瓜去穰納赤荳在內蒸熟為丸服治痢

日久津液枯四肢腫口乾用冬瓜黃土厚包五寸煨熟去

土取汁飲之錄羅白九子治遍身腫及單腹脹滿喘悶不快小便赤瀉神

効

輕粉五分粉霜炒四分礪砂研炒三錢滑石研炒四錢

寒水石火燒研三分白丁香研羅末三錢

右件藥將輕粉滑石二味一處研勻用薄紙裹了却更

和白麵作餅再裹前藥又用桑柴火燒以熟為度取出

與前四味一處和勻水浸蒸餅搗乾為丸如菴荳大每

日姜湯下三服食前下第一日每服二丸第二日每服

三丸第三日每服四丸第四日每服五丸如覺小便多

腫漸減便勿服如小便不多更服一日二日加作六丸

做一服一日亦三服腫消為効如服藥至第三日覺牙

縫內痒痛口氣出時便用漱口藥用貫眾黃連各半兩

為散每服一錢水一盞煎至七分入龍腦少許攪勻温

服之每一日煎一錢漱口如腫消忌鹽魚肉冷硬果食

只服粥百日常瘥如臟腑秘瀆氣實先服治腫海藻散

此藥親用救人甚多神効

海藻散方見本門積氣條

仲牡礪澤瀉散治腰以下腫方見傷寒

河葶藶丸治一切水濕氣通身腫不可當者

人參

兩一

苦葶藶

四兩于鍋內焙上炒黃色為度

右二味同為細末用東肉和丸桐子大每服十五丸煎桑白皮湯下日進三服空心食前驗

羅聖靈丹治脾肺有濕喘腫盛小便赤澹

苦葶藶

四兩

木香

檳榔

茯苓

麩裏

防風

木通

人參

巴上各二錢半恐是二兩半

右為末用東肉為丸如桐子大煎桑白皮湯下

垣赤茯苓丸治脾濕太過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宣通

小便赤澹

葶藶

四兩

防已

兩二

赤茯苓

兩一

木香

五錢

右為細末東肉丸如桐子大每服三十九丸煎桑白皮湯

下食前

續隨子丸治遍身虛腫喘悶不快

人參

漢防已

赤茯苓

木香

檳榔

各五錢

苦葶藶

四兩

續隨子

兩一

海金沙

五錢

右為細末東肉丸如桐子大每服三十九丸煎桑白皮

湯食前下

海絮古方治水腫用蜈蚣去頭尾與葡萄心同搗露七日

曝乾為末淡酒調下暑月濕用尤佳

聖惠方治水腫喘促不得臥蜈蚣五枚為末食前湯調半錢至一錢小便通効

仲夫水病人目下有臥蚕或面目鮮澤脉伏其人消渴病

水腹大小便不利其脉沉細者有水可下之

世治水腫

薏苡仁根

木香

檳榔

黑牽牛

右為末酒調服

外療水病腫用鯉魚一頭極大者去頭尾及骨唯取肉以

輕劑

醫學綱目卷三

水二升赤小豆一大升和魚肉煮取二升已上生布絞取汁去查頓服盡如不盡分為三服當下利利盡即瘥

本治身軀腫滿水氣急臥不得郁李仁一大合搗為末合和麩搜作餅子與吃入口即大便利氣便瘥

丹有人患脚肢腫漸上膝足不可踐地大水頭面遍身腫脹滿用苦瓠瓠實稔如豈大以麩裹煮一沸空心服七枚

至午當出水一斗三日水自出不止大瘦乃瘥三年內須慎口味 一方治腫取苦瓠殼以鹽擦殼上燒存性為末

煎童便一盞調服瘥 苦瓠須擇無壓腐細理潔淨者不爾有毒

世三種散治浮腫用陳蘿蔔種去瓢陳蒲殼去瓢烏豈一合同煎服即時退

羅無礙丸治脾濕積流四肢腫滿  
大腹皮兩 木香兩 蓬朮 京三稜

檳榔 郁李仁 各一兩

右為細末炒麥蘖麩糊為丸如桐子大生姜湯下  
本治腫滿小便利茯苓散

郁李仁 四錢 檳榔 二錢 赤茯苓 白朮

甘遂 切片炒 陳皮 一錢  
右細末每服一錢姜東湯調下

治十種水病并根源証狀方法  
一青水先從左右肋腫起根在肝 大戟

二赤水先從舌根起根在心 葶藶子

三黃水從腰腹起根在脾 甘遂 微炒

四白水從脚腫起根在肺 桑白皮

五黑水從外腎腫起根在腎 連翹

六玄水從面腫起根在外腎 芫花 醋炒

七風水從四肢腫起根在骨

澤瀉

八石水從腎腫起根在膀胱

藁本

九高水從小腹腫起根在小腸

巴豆去皮油

十氣水或盛或衰根在腹

赤小豆

右十般種病各有根源種種不同看十種病根除一味倍多餘九味等分逐味依法修治焙為細末煉蜜丸如桐子大用赤茯苓湯吞下三丸不拘時候每日三服忌鹽一百二十日緣鹽能化水也又忌魚蝦麪食一切毒物及生冷房室甚効用此方獲瘥後更用後來補藥

補藥方

肉桂去粗皮

赤茯苓去皮

乾姜

菝葜醋煮

川芎

肉苁蓉

桔梗各等分依法製服一方無赤茯苓菝葜木青

皮白

檳榔

浚劑

右等分為末每服三錢百沸湯點服空心食前日午晚各一服前項二方治水腫病甚効予試用之百發百中獲濟者無數世間所有水病方藥無出此三方之右者幸勿忽

河三花神祐丸治中滿腹脹一切水濕腫滿

甘遂

大戟

芫花醋拌濕炒各五錢

大黃兩一

輕粉錢一

牽牛兩二

右為末滴水丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫水下每日三服至快利為度得利止後服神効

垣海金砂散治脾濕大過通身腫滿喘不得臥及腹脹如鼓

牽牛一兩半一半炒一半生

甘遂錢五

白木兩一

海金砂錢三

醫學綱目卷之三

右為細末每服二錢煎倒流水一盞食前調下得宣利止後服

**羅**海藻散治男子婦人通身虛腫喘滿不快

海藻 大戟 大黃 隨續子去壳各一

兩右四味用好酒浸一宿取出晒乾候用 滑石兩半 白牽牛頭末一

兩 甘遂麥炒一兩 白芫蕪個一 青皮能

陳皮去白各半兩

右前藥都一處杵為細末大人每服二錢如氣實者三錢平明冷茶清調下至夜時取下水三二行腫減七分隔二三日平明又一服腫消忌魚肉百餘日小兒腫服一錢五歲以下者半錢女人有胎者不可服

**保**錢氏論虛實腹脹實則不因吐瀉夕病之後亦不因下利得之脹而喘急悶亂更有痰有熱及有宿食不化者宜

大黃丸白餅子紫霜丸下之更詳別大小便如俱不通先利小便後利大便虛則久病吐瀉後其脉微細主目胞腮虛腫手足冷宜先與塌氣丸後與異攻散及和中丸益黃散和其氣因氣而腫者煎陳皮湯因濕而腫者煎防已黃芪湯調五苓散因熱而腫者八正散又一法燥熱于肺為腫者乃絕水之源當清肺除燥水自生矣于梔子豉湯中加黃芪如熱在下焦陰消使氣不得化者宜益陰則陽氣自化加黃連黃栢是也

**中**滿分消丸方見 熱水腫 梔子五錢 木香一錢 白朮二錢 急流水煎

服 又方山梔子去皮取仁炒槌碎米飲湯送下如胃院熱病在上者帶皮用 不治遊風攻頭面或四肢作腫塊知母湯

知母

麻黃

黃芪

甘草

羌活

白朮

枳殼各一兩

右粗末每服四錢水一盞半牛旁子百粒研碎煎至七分

溫日三四服覺冷不用牛旁子 有一達官母年七十

中風手拘攣平日止是附子之類扶養一日面浮腫

手背亦腫尋常有一國醫供藥診之是水病欲下大戟

牽牛以導之其家大驚憂惶召子議之子曰素問稱面

腫曰風足脛腫曰水此服附子大過正虛風生熱之証

咽必噎塞膈中不利誠如不言進升麻牛旁玄參湯繼

以知母湯三日便愈

**無復元丹**治三焦不瀉氣脉塞閉樞機不通喘息奔急水

氣盈溢滲透經絡皮膚溢滿足脛尤甚兩目下腫腿腹間

冷口苦心腹堅脹不得正偃偃則咳嗽小便不通夢中虛

驚不能安臥

獨活炮二兩

木香炒

川椒炒出

羌活

厚朴去皮姜製

陳皮

吳茱萸炒

桂心各一兩

澤瀉一兩

肉蔻煨

檳榔各半兩

右為末糊丸如桐子大每服五十九煎紫蘇湯送下不

拘時此藥世傳屢驗服者宜先屏去諸藥一日三服先

服澹利如傾次即腫消喘止宜絕慾屏鹽半年乃不再

作

**本治脾虛浮腫實脾散**

大附子一枚

草薺二兩

甘草一兩

乾姜二兩

大腹皮去皮六兩

木瓜一個去

右用水于沙器內煮乾一半擘開看乾姜不白心為度

亦不得令水乾至焦取出焙乾為末每日午時空心沸

藏府

湯點服

三陰結謂之水陰陽別論。王註云謂脾肺之脉俱寒結也。

下焦溢為水

陽明所謂上喘為水者陰氣下而復上上則邪客于臟腑間故為水也

運氣

運氣水腫有四

一曰濕經云太陰所至為附腫又云濕勝則濡泄甚則水閉附腫又云太陰之勝足脛附腫飲發于中附腫于上又云太陰司天客勝則首面附腫呼吸氣喘治以諸熱是也  
二曰火熱經云諸病附腫皆属于火又云少陽司天火氣下臨肺氣上從寒熱附腫又云少陽司天火淫所勝民病皮膚痛色變黃赤傳而為水身面附腫腹滿仰息又云少陽之復渴引水漿化而為水傳為附腫又云少陽司天客

針灸

勝甚則附腫治以諸寒是也

三曰寒經云寒勝則浮是也

四曰燥經云陽明所至為浮虛是也

黃帝問曰少陰何以主腎腎何以主水岐伯對曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脉也故其本在腎其末在肺皆積水也帝曰腎何以能聚水而生病岐伯曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也上下溢于皮膚故為附腫附腫者聚水而生病也帝曰諸水皆生于腎乎岐伯曰腎者牝臟也地氣上者属于腎而生水液也故曰至陰勇而勞甚則腎汗出腎汗出逢于風內不得入于臟腑外不得越于皮膚客于玄府行于皮裏傳為附腫本之干腎名曰風水所謂玄府者汗空也帝曰水俞五十七處者是何主也岐伯曰腎俞五十七穴積陰之

所聚也水所從出入也尻上五行行五者此腎俞故水病下為脘腫大腹上為喘呼不得臥者標本俱病故肺為喘呼腎為水腫肺為逆不得臥分為相輸俱受者水氣之所留也肺腎之標本其上下分為相輸應之病而伏菟上各俱受者緣此二臟乃水氣之所畜故也二行行五者此腎之街也三陰之所交結於脚也踝上各一行行六者此腎脉之下行也名曰太衝凡五十七穴者皆臟之陰絡水之所客也穴論

尻上五行行五  
脊中一 懸樞一 命門一 腰俞一  
長強一 大腸俞二 小腸俞二 膀胱俞二  
中胎內俞二 白環俞二 胃倉二  
盲門二 志室二 胞盲二 秩邊二  
伏菟上各二行行五

中柱二 四滿二 氣穴二 大赫二  
橫骨二 外陵二 大巨二 水道二  
歸來二 氣街二  
踝上各一行行六  
太衝二 復溜二 陰谷二 照海二  
交信二 築賓二

靈風痲膚脹為五十七疔取皮膚之血者盡取之四時氣篇

刺灸水腫有五法

其一取腎膀胱經前篇云五十七穴者是取其二經之穴也又經云腎病者腹大脛腫取其經少陰太陽血者是取其二經之血也

其二取血絡經前云取皮膚之血者盡取之是也  
其三取胃經云胃足陽明之脉所生病者大腹水腫視盛

虛熱寒陷下取之是也

其四取委陽經云三焦病者不得小便溢則水取委陽是也

其五筋針取水先以鉞針針之已刺而筋之引針而納之入而復之以盡其沫必堅來來緩則煩悅來急則安靜間

日一刺之沫盡乃止筋針針中有空竅如筋出水也

撮浮腫 分水 中脘各灸 內庭 行間 臨泣各瀉

東水氣皮痛不可近衣小腹敦敦然小便黃身潤 章門

屋翳 灸 陰交 章門 之刺

華外腰水腫先從腰腫起 肝募 水分

內中水腫面痿黃 胃脘 通谷 氣海 水分

胞中水腫根在心水赤 心俞 巨關 氣海

腹中水腫從脾起水黃 脾俞 胃脘 水分

肺喘水腫從胸起水白 肺俞 肝募

足心水腫從足起 白環俞 水分 臍中

四肢水腫變身浮 膽募

兩脇水腫四肢枯瘦從脇腫起 章門 期門

小腸水腫從臍腫起 氣海

保五脈論五水灸法

青水灸肝井灸 赤水灸心榮灸 黃水灸脾俞灸 白

水灸肺經瀉 黑水灸腎合瀉

甲身腫關門主之 水腫脹皮腫三里主之 風水膝腫

巨虛上廉主之 風水面胸腫頰黑鮮溪主之 風水面

胸腫衝陽主之 水中留飲胸脇支滿刺陷谷出血立已

面胸腫上星主之先取譙譙後取天牖風池 水腫人

中盡滿唇反者死水溝主之 水腫大臍平灸臍中無理

不治

素目窠微腫如卧蚕之狀曰水平人氣象論足脛腫曰水

仲病下利後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也答曰此

法當病水若小便自利及汗出者自當愈 跌陽脉當伏

今反數本自有熱消穀小便數今反不利此欲作水 寸

口脉浮而遲浮脉則熱遲脉則潛熱潛相搏名曰沉跌陽

脉浮而數浮脉則熱數脉則止熱止相搏名曰伏沉伏相

搏名曰水沉則絡脉虛伏則小便難虛難相搏水走皮膚

則為水矣

素頸脉動喘疾欬曰水平人氣象論

仲風水其脉自浮外証骨節疼痛惡風針經論疾診尺篇

微癱如新臥起狀其頸脉動時欬按其手足上實而不

者風膚脹也又仲景云太陽脉浮而緊法當骨節疼痛反

不疼身重反重而酸其人不可汗

出即愈為風水治法見前陽虛條

皮水其脉亦浮外証肘腫按之沒指不惡風其腹如鼓不

渴當發其汗又云渴而不惡寒者此是皮水蓋法當風水

亦當發汗也治法見陽虛條正水其脉沉遲外証自喘

石水其脉自沉外証腹滿不喘大奇論篇腎肝并沉

黃汗其脉沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致癰

膿又云身腫而冷狀如周痺胃中空不能食反

聚痛暮躁不得眠此為黃汗治法見黃疸條仲心水者其身重而少氣不得臥煩而躁其陰大腫 肝

水者其腹大不能自轉側脇下腹中痛時時津液微生小

便續通 肺水者身腫小便難時時鳴漉 脾水者其腹

大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難 腎水者其腹

大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面黃

瘦便反壅

無大抵浮腫帶數即是虛寒潛止于其間久必沉伏沉伏

則陽虛陰實為水必矣 面龐然浮腫疼痛其色始黑多  
汗惡風者屬腎風治見諸風註 諸唇黑則傷肝缺盆平則傷  
心膺出則傷脾足心平則傷腎背平則傷肺凡此五傷必  
不可治也

仲脉得諸沉當責有水身躰腫重水病脉出者死無擇云大抵浮脉帶數即是虛寒潛止于其間久必沉伏沉伏則陽虛陰實為水必矣

脉水病脉洪大者可治微細者不可治 水病腹大如鼓  
脉實者生虛者死 水病夜半死全文見診生死

仲諸病水者渴而不利小便數者皆不可發汗  
素帝曰有病腎風者面附龐然雍塞于言可刺否岐伯曰  
虛不當刺不當刺而刺後五日其氣必至帝曰其至何如  
岐伯曰至必少氣時熱時熱從曾背上至頭汗出手熱口  
乾苦渴小便黃目下腫腹中鳴身重難以行月事不來煩

而不能食不能正偃正偃則咳病名曰風水論在刺法  
帝曰願聞其說岐伯曰邪之所湊其氣必虛陰虛者陽必  
湊之故水氣時熱而汗出也小便黃者少腹中有熱也不  
能正偃者胃中不和也正偃則咳甚上迫肺也諸有水氣  
者微腫先見于目下也帝曰何以言之岐伯曰水者陰也  
目者亦陰也腹者至陰之所居故水在腹者必使目下腫  
也真氣上逆故口苦舌乾卧不得正偃正偃則咳出清水  
也諸水病者不得卧卧則驚驚則效甚也腹中鳴者病本  
於胃也薄脾則煩不能食食不能下者胃腕隔也身重難  
以行者胃脉在足也月事不來者胞脉閉也胞脉者屬心  
而絡于胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也

禁忌

仲問曰病者若水面目身躰四肢皆腫小便不利脉之不

醫學綱目卷之

二

言水反言胸中痛氣上衝咽狀如炙肉當微咳喘審如師  
 言其脉何類師曰寸口脉沉而緊沉為水緊為寒沉緊相  
 搏結在關元始時當微年盛不覺陽衰之後榮衛相干陽  
 損陰盛結寒微動緊氣上衝喉咽塞噎脇下急痛醫以為  
 留飲而大下之氣擊不去其病不除後重吐之胃家虛煩  
 咽燥欲飲水小便利水穀不化面目手足浮腫又與葶  
 藶丸下水當時如小差食飲過度腫復如前胸脇苦痛象  
 若奔豚其水揚溢則浮咳喘逆當先攻擊衝氣令止乃治  
 咳咳止其喘自差先治新病病當在後

丹盧氏醫鏡水脹辨 內經曰諸氣憤鬱皆屬於肺諸濕  
 腫滿皆屬於脾諸腹脹大皆屬於熱蓋濕者土之氣土者  
 火之子故濕每生于熱熱氣亦能自濕若子氣感母濕之  
 變也凡病腫皆宜以治濕為主所挾不同故治法亦異類

例治腫以治水立說而欲導腎以決去之豈理也哉脾土  
 衰弱內因七情外傷六氣失運化之職清濁混淆鬱而為  
 水類例以為本末皆隸于肺腎胃三者而不及脾下文繼  
 以肺金盛而生水水液妄行氣息閉樞機壅而為腫夫脾  
 土受病肺為之子焉有自盛而生水者哉若謂腫之水果  
 生于肺金之清氣則滋長腎陰奉行降令為化生之源何  
 病腫之有今滲透經絡注流溪谷皆濁腐之氣窒碍津液  
 久久灌入隧道血亦化水而欲藉脾土以制之導腎氣以  
 利之不思脾病則肝木來侮子氣亦衰木寡于畏脾欲不  
 病不可得矣治法宜清心經之火補養脾土全運化之職  
 肺氣下降滲道開通使敗濁之氣其稍清者復回而為氣  
 為血為津液其甚者在上為汗在下為溺以漸而分消矣  
 今不明言而曰制水燥水得非白圭以隣國為壑乎經言

腫病因津液充郭而致不生于肺金之盛也明矣又言氣拒于內氣耗于外責其不能滲運敗濁耳又云關鬼門繫淨府鬼門膚腠也屬肺淨府膀胱也屬腎之府未聞有導腎氣之說註文明言陰精耗損腎氣果可導乎仲景謂治濕利小便即經中繫淨府之意苟以清淨為腎而導之果於經意有合乎錢仲陽謂腎無瀉法其可輕易導之乎或曰經言疏滌五臟非導腎歟予曰此承上文五陽已布而言若鬼門開矣淨府繫矣五宮之陽氣條布彼敗濁之氣自然疏導滌除于腎氣何與焉

胎前水腫

雲防已湯治妊娠脾虛遍身浮腫心腹脹滿喘促小便不利

防已七錢半

桑白皮

赤茯苓

紫蘇葉各一兩

表裡

木香二錢半

右為粗末每服四錢姜四片水同煎食前服

葶藶散治妊娠遍身洪腫

葶藶子一兩

白木五兩

茯苓

桑白皮

郁李仁各二兩

右為粗末水六升煎取二升分三服小便利即瘥

又方 澤瀉

葶藶各二兩

茯苓

枳殼

白木各六兩

右細切以水六升煮取二升半分溫二服

子和治妊娠從脚上至腹腫小便不利微渴猪苓五兩末

以熟水服方寸七日三服

丹子腫多濕用山梔一撮米飲吞下

產後水腫

大法

汚血

丹產後腫必用大補氣血為主少佐以蒼朮茯苓使水自利

大調經散治產後腫滿喘急煩渴小便不利

大荳炒去皮 茯神兩 真琥珀錢

右為細末濃煎烏荳紫蘇湯調下

產後四肢浮腫者敗血循經流入四肢淫留日深腐爛如水故令四肢腫面黃宜服小調經散血行腫消則愈

沒藥 琥珀 桂心 芍藥

當歸各一錢 細辛 麝香各五分

右為細末每服半錢姜汁酒各少許調停服

丹婦人產後浮腫小便少口渴惡寒無力脉皆沉此躰虛而有濕熱之積必上焦滿悶宜補中道水行氣可也

白朮二兩 陳皮兩 川芎兩 木通六錢

虛實

茯苓三錢

下與點丸廿五丸

大奪魂散治產後虛腫喘促利小便則愈

生姜三兩 白麴三兩 半夏七個

右以生姜汁搜麴裏半夏為七餅子煨焦熟為末水調

一盞小便利為効

聖如產後風寒在表面日四肢浮腫宜局方中七聖丸白

湯下日加以利為度七聖丸方見痔 如浮腫至膝喘嗽加木香

換榔倍之謂氣多也 如浮腫又頭痛昏冒加羌活川芎

謂風多也 如只浮腫止七聖丸本方服之

垣中滿分消丸方身脹門熱赤用四物湯吞之

程張宣徽侍寵產後半月忽患浮腫急召產科醫治經半

月不瘥病勢轉劇召杜治之杜至曰諸醫作何病張曰皆

寒熱

云水氣浮腫杜曰非也且水氣發咳嗽小便澀是也今愛  
寵小便不澀不作咳嗽惟手足寒乃血藏虛氣塞不通流  
面生浮腫遂用益血和氣藥治之旬日病去七八經半月  
全愈所用之藥乃灵苑方牡丹散也其方云治血藏風虛  
冷今產科家多用此藥治產後諸病如神更名曰損金湯  
者是也 牡丹散 方見產後  
天加減吳茱萸湯治婦人血藏虛宿挾風冷身面虛浮等  
疾

吳茱萸	半	一兩	桔梗	半	乾姜	半	甘草	半
麥冬	門	防風	半	半夏	半	細辛	半	
當歸	半	赤茯苓	半	牡丹皮	半	桂心	各半	

右為粗末每服四錢水一盞半煎至七分去查食前熱  
服

雜方

丹產後風腫水腫澤蘭防已等分温酒調下二錢如不  
飲者醋調下亦可 成氏方

大法

先腹大後四肢腫為脹 或獨腹大四肢不腫者治法同  
無附子菴苳湯治寒客皮膚殼殼然而堅腹大身腫按之  
陷而不起色不變病名膚脹一劑未知再作

大附子 一個重七錢者 菴苳 兩

右以生姜二兩切水二碗煎至一碗去查分三服空腹  
温服次日將前附子破作四片再用菴苳二兩姜一兩  
如前煎服停三日復將附子作八片如前煎服  
治鼓脹法並見後行濕寒熱氣血諸條皆其法也  
仲脹滿按之不痛為虛痛者為實可下之 腹脹時減復  
如故此為寒當與温藥 腹滿不減減不足言須當下之

虛寒  
熱

宜大承氣湯

海脾虛滿者黃芪湯

芍藥

脾實滿不運平胃散

蒼木

東垣云腹脹滿氣不轉者加厚朴以破滯氣腹中奔悶此非腹脹滿乃散而不收可加芍藥收之是知氣結而脹宜厚朴散之散而脹宜芍藥收之

補虛行

丹鼓脹大補中氣行濕此乃脾虛之甚必須遠音樂斷厚味

朝寬暮急血虛暮寬朝急氣虛終日急氣血皆虛用

大劑人參白朮佐以陳皮蒼朮茯苓之類

有血虛者四物行血隨証加減

凡補氣必帶厚朴寬滿

腹脹必少佐厚朴者蓋厚朴味辛以氣聚于上焦故也氣不運加木

香氣若陷下用升麻柴胡以提其氣水腫當補脾為主白朮茯苓陳皮佐之

鼓脹論

心脾陽也居上腎肝陰也居下脾居中亦陰也

屬土經曰飲食入胃遊溢精氣上輸于脾脾氣散精上

于肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾具坤

靜之德而有乾健之運故能致心肺之陽降腎肝之陰升

而成天地交之泰是為無病之人今也七情內傷六淫外

侵飲食失節房勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失職胃

雖受穀不能運化故陽自升陰自降而成天地不交之否

于斯時也清濁相混隧道壅塞氣化濁血瘀鬱而為熱熱

留而又氣化成濕濕熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以

其外雖堅滿中空無物有似于鼓其病膠固難以治療故

又名曰蠱若虫侵蝕有蠱之義驗之治法理宜補脾又須

養肺金以制木使脾無賊邪之慮滋腎水以制火使肺得

清化之令却益味以防助邪斷妄想遠音樂以保母氣無

有不

安醫者不察病起于虛急於取効銜能希賞病者苦

忌利藥

於脹急喜行利藥以求一時之快不知寬得一日半日其  
腫愈甚病邪甚矣真氣傷矣去死不遠古方惟禹餘糧丸  
又名石中黃丸又名紫金丸制肝補脾殊為切當亦須隨  
証又須順時加減用之為妙予友俞仁叔儒而醫連得家  
難年近五十得此疾自制禹餘糧丸服之予診其脈弦濇  
而數曰此丸新製煅煉之火邪尚存溫熱之藥太多宜自  
加減不可執方俞笑曰今人不及古人此方不可加減服  
之一月口鼻出血色黑骨立而死 楊兄年五十嗜酒  
病瘧半年患脹病自察必死來求治診其脈弦而濇重則  
大瘡未愈手足瘦而腹狀如蜘蛛遂教以參朮為君當歸  
川芎芍藥為臣陳皮黃連厚朴茯苓為佐生甘草些少作  
濃湯飲之一日定三貼彼亦嚴守戒忌一月後瘧得汗而  
愈又十月小便長而脹愈中間雖少有加減大意只是補

補氣血  
為主

氣行濕 又陳氏年四十餘性嗜酒大便時見血于春間  
患脹色黑而腹大其形如鬼診其脈數而濇重似弱予以  
四物加黃連黃芩木通白朮陳皮厚朴生甘草作湯與之  
近一年而安一補氣一補血餘藥大率相出入皆獲安以  
保天壽或曰氣無補法子何補氣而獲安果有說以通之  
乎予曰氣無補法乃世俗之言也蓋氣之為病痞悶壅塞  
似難於補恐增病勢不思正氣虛者不能運行邪滯所着  
而不去所以為病經曰壯者氣行則愈怯者著而成病苟  
或氣怯不用補法氣何由行或曰子之藥審則審矣何効  
之遲也病者久在床枕將必厭子之迂而求速効者矣余  
曰此病之起或三五年或十餘年根深勢蕩欲求速効自  
求禍耳知王道者能治此病也或曰脹病將終不可與利  
藥乎予曰灼知其不因于虛受病亦淺脾胃尚壯積滯不

固而又有可下之証亦宜畧與疏導若援張子和濟川散  
禹功丸爲例行迅攻之策實所不敢 潘可達女年十九  
歲稟受頗厚患胃腹脹滿自用下藥利十數行時脹無增  
減來求治診其脈皆大畧按即散而無力全無數意予曰  
此有表証反攻裏當死賴稟受好時又在室尚可挽回壽  
損矣急與四物湯加人參白朮帶白陳皮炙甘草煎服至  
半月後病不退又自用蘿蔔根種煎湯澡浴兩度時腫稍  
增予曰表病攻裏已自難救今又虛其表事急矣于前藥  
去地黃芍藥加黃芪倍白朮大劑濃煎湯飲又吞人參白  
朮丸十日後如初病時又因吃難化物自利以參朮爲君  
少加陳皮爲佐又與肉苳蔻訶子爲君山查子爲使粥和  
作丸吞之至四五十貼而安 一男子年四十餘患瘧久  
而腹脹味不數而微弦重取則來不滑利輕重又皆無力

遂與索氏三和湯三倍加白朮入姜汁服之數服而瘧愈  
小便利二三日脹稍減遂又小便短少予作氣血兩虛于  
前藥內入人參牛膝當歸身尾作大劑料百服而愈  
索氏三和湯三倍加白朮方

白朮 厚朴 陳皮 各三兩 木通 一兩

枳榔 紫蘇 各二兩 甘草 海金沙

大腹皮 白茯苓 枳殼 各一兩 水煎服

**海**調胃白朮澤瀉散治瘧病化爲水氣傳變水穀不能食

白朮 半斤 澤瀉 芍藥 陳皮

茯苓 生姜 木香 枳榔 各一兩

右爲末治腹腫如神 若心下痞加枳實 若心下盛

加牽牛

**仲**心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作枳朮湯主之

枳實七 白木二

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中軟即當散也

因積成  
脹者補  
虛消積

羅真定王君用年一十九歲病積臍左連脇如覆杯腹脹如鼓多青絡脈喘不得臥時值暑雨加之自利完穀日晡潮熱夜有盜汗求予往治之脉得浮數按之有力謂病家曰凡治積非有毒之劑攻之則不可今脈虛弱如此豈敢以常法治之遂投分滲益胃之劑數服而便清自調襍以升降陰陽進食和氣而腹大減胃氣稍平間以消積之劑不月餘良愈先師嘗曰潔古老人有云養正積自除譬如滿座君子縱有一小人自無容地今令真氣實胃氣強積自消矣

一婦人年三十六歲家貧多勞性偏急自七月斷經至

八月小腹下有一塊偏左如拳有時塊起即痛作伏則勢減至半月後腹漸腫脹食減平時三分之二無力遇夜發熱天明即稍退其脉得虛微短弱瀉左尤甚初與白木一斤帶白陳皮一斤作二十貼服以三聖膏貼塊上經宿則塊軟再宿則塊小旬日後食稍進熱減半脉稍有力又與白木一斤帶白陳皮半斤酒當歸身半斤木通三兩每貼研桃仁九粒盡此劑病悉除 一婦人年五十餘歲素好怒因食燒猪肉次早面脹絕不思食倦怠六脈沉瀯獨左豁大余作躄虛有痰氣為痰所隔不得降當以補虛利痰為主每早以二陳湯加參朮大劑與一貼服後探令吐出藥辰巳時復與索氏三和湯一倍加白木二貼至睡後以神佑七丸以撓其痰去牽牛如此服至一月而安矣 金壽一安人年七十一歲好濕麪得帶下病亦惡寒淋瀝醫

與荷花鬚柴胡等藥發熱所下愈多醫與縮砂豆蔻藥以其食少也腹滿脹氣喘又與葶藶散不應又與禹餘糧丸病愈甚醫又與崇土散亦不應予脉之兩手洪濇輕則弦長而滑實至是喘甚不得臥此不是濕而釀成濕在足太陰陽明一經水穀之氣為濕所抑不得上升遂成帶下理用升舉之劑以補氣和血次之而醫反與瀉燥宜其展轉身病遂與人參生肺之陰以拒火毒白朮以補胃氣除濕熱行水道薤仁去污生新郁李仁行積水以通草佐之犀角屑解食毒消腫悶檳榔治最高之氣作濃湯吞下保和丸藥又疑素厚養有肉積加阿魏小丸同嚥之四五日後積氣漸消腫漸下又加補腎丸以生腎水之真陰又兩三日後漸安而得睡食有味矣又兩日後加與點丸以驅逐肺家之積熱而愈

一丈夫脾有熱腎有虛胃有積得腫疾或進或退口乾或氣喘醫連月不退脉軟而細以其形肥不以為忌用

白朮錢四

芍藥

地黃錢三

連翹

當歸錢二

青皮錢二

人參

木通

羌活

黃芩各一錢半

甘草

紅花此

右分五貼煎下保和丸

楊生年三十因癰初安淡食葷腐齋飯成脹在鬲上小便赤少不思食口渴脉弦而濡此胃中有瘀血用

蘇梗錢三

木通錢半

白朮錢一

川芎

枳實

白芍各五分

甘草一分

陳皮五分

厚朴分三

右研益元散下保和丸五十粒

一丈夫氣上肚或膨脹此下虛所致

陳皮錢五 人參 歸鬚 白朮  
 連翹各三錢 地黃 芍藥各二錢 木通半錢  
 甘草五分

右分五貼煎下保和丸

木香化滯湯

白芫薤仁 陳皮 大腹子 白茯苓  
 砂仁 人參各一錢 青皮 檳榔  
 木香 姜黃各二錢 白朮錢 甘草各四分

右為細末水一大盞二分煎至一盞稍熱服食前沸湯

點服亦得

右方治因積滯成脹皆以參朮枳通等煎湯補虛行濕下神佑阿魏等丸消積所謂攻補兼施者也

重劑

小温中丸治脹是脾虛不能運化不可下之

陳皮 半夏湯泡去 神麩炒 茯苓各一兩  
 白朮二兩 香附子不要 針砂各一兩半  
 苦參炒 黃連炒各半兩 甘草錢三

右為末醋水各一盞打糊為丸如桐子大每服七八十丸白朮六錢陳皮一錢生姜一片煎湯吞下虛甚加人參一錢各用本方去黃連加厚朴半兩忌口病輕者服

此丸六七兩小便長病甚者服一斤小便始長

無禹餘糧丸治十種水氣脚膝腫上氣喘滿小便不利但

是水氣悉皆主之許李士及丹溪皆云此方治彭脹之要藥  
 蛇含石大者三兩以新鉄銚盛入炭火中燒蛇黃與  
 出細研 禹餘糧三兩 真針砂五兩先以水淘  
 極細 糧一處用米醋二升就銚內者醋乾為度後用銚  
 并藥入炭中燒紅銚出傾藥爭磚地上候冷研細

醫方綱目卷三五

以三物為主其次量人虛實入下項治水多是取轉惟此方三物既非大  
戟甘遂芫花之比又有下項藥扶持故虛人老人亦可服

羌活 木香 茯苓 川芎

牛膝酒浸 桂心 白荳蔻炮 大茴香炒

蓬朮炮 附子炮 乾姜炮 青皮

京三稜炮 白蒺藜 當歸酒浸一宿各半兩

右為末拌勻以湯浸蒸餅揆去水和藥再搗極勻丸如桐子大食前溫酒白湯送下二十九至五十九最忌鹽一毫不可入口否則發疾愈甚但試服藥即於小便內旋去不動臟腑病去日日三服兼以溫和調補氣血藥助之真神方也

行濕 丹脉堅實人壯盛者或可用攻藥便收拾白朮為主 垣中滿治法開鬼門繫爭府開鬼門者發汗也繫爭府利

小便也又中滿者瀉之於內謂脾胃有病當令上下分消其氣下焦如瀆氣血自然分化不待洩滓穢如或大實大滿大小便不利從權以寒熱藥下之或傷酒濕麪及味厚之物膏粱之人又或食已便臥使濕熱之氣不得施化致令腹脹滿此亦是熱脹也治熱脹分消丸主之

仲氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作桂枝去芍加麻辛附子湯主之

桂枝 生姜三兩 甘草一兩 大棗十二個

麻黃 細辛各二兩 附子一個

右七味以水七升煮麻黃去上沫內諸藥煮取二升分溫三服當汗出如虫行皮中即愈

聖牛黃琥珀丸治水腫腹大氣息不通危急者神効 牛黃 琥珀 椒目泥水者 葶藶炒紫色各三分

昆布洗

海藻洗各一兩

牽牛炒

桂各一兩

右八味為末別研葶藶如泥一處拌勻煉蜜丸如桐子

大每服十五丸米飲下以小便利為度日再服河間方

有麝香龍胆無琥珀易名苦葶藶膏治法與此方同

**碎**腹滿口舌乾燥此腸胃間有水氣防已椒藶丸主之

防已

椒目

葶藶炙

大黃各一兩

右四味末之蜜為丸如桐子大先食飲服十九日三服

稍增口中自有津液渴者加芒硝五錢

**無**葶藶丸治腫滿腹大四肢枯瘦小便澀濁

甜葶藶隔紙炒

薺菜根分等

右為末蜜丸如彈子大每服一九陳皮湯嚼下只三九

小便清數丸當依舊已上葶藶椒目行濕

**羅**白丸子治單腹脹神効方見水腫門

**潔**治水氣蠱脹潔淨府楮實子丸

楮實子

一斗水二斗熬成膏子

白丁香

一兩 茯苓三兩

右二味為末用楮實膏為丸如桐子大不計丸數從少

至多服至小便清利及腹脹減為度次服中治丸末治

藥調養踈啓其中忌甘苦峻補其下宜五補七宣丸白

香為行濕之劑中治丸即白米散用白米淘淨等分為末以茯苓煎湯調下末治即黃芪建中之類方並見水腫門

**世**治蠱用蝦蟆一枚去內腸入蜈蚣七個新瓦上焙乾為

末丸酒服如無蜈蚣用縮砂七粒本草云蝦蟆味辛寒有毒主邪氣破癥堅

**素**黃帝問曰有病心腹滿日食則不能暮食此為何病岐

伯對曰名為鼓脹帝曰治之奈何岐伯曰治之以雞矢醴

一劑知二劑已帝曰其時有復發者何也岐伯曰此飲食

不節也

不節故時有病也雖然其病且已時故當病氣聚于腹也  
腹中論王註難矢大利小便微寒用湯漬服之禁古云以酒調服

氣壯因積成泄者但治

**五積**久必心腹脹滿肝為肥氣心為伏梁肺為息奔脾為痞氣腎氣奔豚如斯之類從五積法治之可也

**朱恕**八哥肚腫因濕氣起自五月能飲酒左脇有塊兩足時有腫

白朮 三稜醋炒 木通 陳皮

大腹皮 赤茯苓 海金沙各五分 甘草二分

炒枳五分 肉桂三分

煎湯下保和丸三十溫中丸三十抑青丸十九

**垣**廣茂清堅丸治中滿腹脹內有積堅硬如石形如盤令人坐臥不寧大小便瀉滯為喘氣促面色痿黃

厚朴五分 黃芩五分 黃連六分 草薢五分

益智五分 半夏七分 蓬朮二分 甘草生

紅花錢一 柴胡 升麻 吳茱萸

澤瀉各二分 神麴三分 歸朮五分 青皮二分

陳皮一分 葛根四分治虛渴

右剉如麻苴大水二盞煎至一盞去渣稍熱服忌酒麪二服之後中滿減半止有積不消再立方名曰半夏厚朴湯

厚朴八分 半夏錢一 吳茱萸 肉桂

紅花 黃連各一分 桃仁七分 蘇朮五分

京三稜 蒼朮 白朮 柴胡

葛根不用 甘草生各三分 歸朮 猪苓

乾姜 升麻各四分 草薢錢二 澤瀉六分

木香 青皮 陳皮 黃芩生各二分

昆布少

神麴

右劉如麻荳大作一服依前煎服之禁忌如前服此藥二服後前証又減一半却於前藥中加減之

厚朴分五

黃芩分二

甘草分五

吳茱萸分一

益智分二

砂仁分一

荳蔻分三

半夏分四

黃芪分四

紅花少

歸稍錢一

黃連分一

右劉如麻荳大作一服水二大盞煎至一盞去查稍熱

服食前忌苦寒藥泄大便又忌魚兔肉并塩物房事等

項

**丹** 心腹膨脹內多食積所致

南星半兩

半夏

瓜蒌仁研和爛

香附童便

黃連姜炒各

礞石煨

蘿蔔子錢五

麝香少

連翹錢五

右用麴糊為丸

腹腫不寬滿食肉多

黃連兩一

阿魏半兩醋

作糊丸同温中丸白朮湯送下

食肉多腹脹用三補丸料內加香附半夏麴蒸餅丸服補

方見治

積氣

**世** 四炒枳殼丸治氣血凝滯腹內蟲脹

枳殼四兩去穢切作指面大塊分四處一兩用蒼朮

黃去蔓藟子一兩用乾漆一兩同炒黃去蔓藟子一兩同炒

兩用茴香一兩同炒黃去蔓藟子一兩同炒

右用原炒蒼朮蘿蔔子乾漆茴香四味同水二碗煎至

一碗去香煮麴糊為丸如桐子大每服五十九食後米

飲下

孫殿中丞其郎中妹十歲腹痛色不變按之而大陷心腹

痞膈病已月餘按甲乙經云三焦脹者氣滿于皮膚中殼

然石堅遂與仲景方厚朴生姜二兩半夏七錢甘草半兩  
人參一錢每用藥一兩五錢水煎分三服一日服之至二  
十日愈

脉實脉  
伏積頑  
者微利  
之

**藥**一斗置鍋內入水約四指用大戟并根苗蓋遍盆合  
之煮為度去大戟不用旋旋吃東無時東盡决効如神

**丹**大戟為丸東肉九每七九泄利小水劫快實者

**垣**沉香交泰丸

治腹大便燥結脉沉  
之洪緩浮之弦者

白朮

枳實

厚朴

沉香

白茯苓

澤瀉

陳皮

當歸

大黃

青皮

木香

右為細末湯浸蒸餅為丸桐子大每服五十九加至七  
八十九溫湯下食後微利止

沉香海金沙丸治一切積聚脾濕腫脹肚大青筋羸瘦惡

証

海金沙

沉香

輕粉

牽牛末

右為末研獨科蒜如泥為丸如桐子大每服三十九加  
至五十九煎百沸灯心通草湯空腹送下更量虛實加  
減丸數取利為度

**藥**治腫木香散治水腫脹大如鼓或遍身皆腫

木香

大戟

白牽牛

右細末用猪腰子一雙批片摻末在內煨熟空心服之  
如食左腰子則搗左臂如食右腰子搗右臂如腫不能  
全去于肚上澆臍滿腹塗甘遂細末却飲甘草水少許  
其腫便去也

**藥**香東丸治蠱氣病有十種苦丁香為細末用熟東為丸  
如桐子大每服三十九煎東湯送下空心服之立効三服

大愈

之 痙病腹滿發熱十日脉浮而數飲食如故厚朴七物湯主

厚朴半斤

甘草

大黃各三兩

大棗十枚

枳實五兩

桂枝三兩

生姜五兩

右七味以水一斗煮取四升温服八合一日三服區者加半夏五合 下利去大黃 寒多者加生姜至半斤 右下脹諸方蓋本于經所謂泄之則脹已之旨也

寒熱

治脹專主濕熱治法見前補虛行濕條

諸腹脹大皆属于熱論 此乃八益之邪有餘之証自天外而入感風寒之邪自表傳裏寒變為熱作胃實腹痛日晡潮熱大渴引飲讖語是太陽陽明併大實大滿者大承氣湯下之少陽陽明微滿實者小承氣湯下之內經曰

泄之則脹已此之謂也又熱論云傷寒變為熱故下之不脹者以明寒因寒用故曰下之脹已非陰盛生內寒胃寒脹滿之病假令痙瘧為脹滿亦有寒脹熱脹是天之邪氣傷暑而得之不即時發至秋發者何也暑天當時助正氣故邪不能發至秋暮暑氣衰絕而瘧病作矣知其寒也局方用交解飲子者是也此天之邪氣雖有餘病痙瘧猶以為寒况不足病為脹滿者乎是知腹脹多為寒病也何以言之脉經云胃中寒則脹滿靈樞經云夫飲食不節起居不時未傳寒中又云腹脹滿胃脘當心而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下取胃之三里又云濁氣在上則生膈脹靈樞經云脹取三陽三陽者足太陽膀胱寒水為脹與內經通評虛實論說腹暴滿按之不下取足太陽經絡者胃之募也正同又云腹滿臈脹支兩脇脇下厥上冒過在太

陰陽明此乃胃中寒熱鬱遏也又云太陰之厥則腹滿臌脹後不利不欲食食則嘔不得卧按內經所說寒脹多如此老夫但略舉其端其病者不悟寒脹之多一切脹滿病作熱治之多用三花神佑丸大黃牽牛之類下之或藥病不相應立致夭折由是論之當從靈樞素問乎當從俗醫胃臌之論乎今立治中滿腹脹寒脹一方熱脹一方評而用之使上下分消其氣可也中滿分消湯治寒脹分消丸治熱脹二方並見後條

**靈**胃中寒則腹脹胃中寒腸中熱則脹而且泄師傳適寒涼者脹下之則脹已五常政論東垣沉香海金沙丸方見珠實篇陰并于下則足寒足寒則脹也論

**法**濁氣在上則生腹脹陰陽應象論云清氣在下則生飧泄濁氣在上則生腹脹此陰陽反作病之逆從也夫腹脹者以寒熱溫涼論之此何脹也曰此飲食失節為脹乃

治熱脹法

受病之始也濕熱亦能為脹右關脈洪緩而沉弦脈浮于上是風濕熱三脈相合而為病也是脾胃之令不行陰火亢甚乘于脾胃盛則左遷而陽道不行是六腑之氣已絕于外火盛能令母實風氣外絕風氣外絕者是穀氣入胃清氣營氣不行便是風氣也異呼同類即胃氣者是也經云虛則兼其所勝土不勝者肝之邪也是脾胃之土不足木火大勝者也經云濁陰出下竅濁陰走五臟濁陰歸六腑濁陰歸地此平康不病之常道反此則為脹也陰陽論云飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟入五臟則腹脹閉塞調經篇云下脘不通則胃氣熱熱氣薰胸中故內熱下脘者幽門也人身之中上下有七衝門皆下衝上也幽門上衝吸門吸門者會厭也衝其吸入之氣不得下歸于腎肝為陰火動相拒故咽膈不通致濁陰之氣

不得下降而大便乾燥不行胃之濕與客陰之火俱在其  
中則腹脹作矣治在幽門使幽門通利泄其陰火潤其燥  
血生益新血幽門通利則大便不閉吸門亦不受邪其膈  
咽得通腹滿腹脹俱去是濁陰得下歸地矣故經曰中滿  
者瀉之于內此法是也

沉香交泰丸治濁氣在上中擾清陽之氣鬱而不伸以為  
腹脹服之以利為度方見前

右治脈洪便結而脹

法治寒脹  
范天秩郎中之內八月中先因勞役飲食失節加之憂思  
氣結病心腹脹滿且食則不能暮食兩脇刺痛診其脉弦  
而細至夜濁陰之氣當降而不降腹脹尤甚大抵陽主運  
化飲食勞倦損傷脾胃陽氣不能運化精微聚而不散故  
為脹滿先灸中脘乃胃之募穴引胃中生發之氣上行腸

道後以順氣湯助之則濁陰之氣自此而降矣  
木香順氣湯治濁氣在上則生腹脹

木香

蒼朮

草薢

麵裹煨

厚朴

製四

青皮

錢

益智

陳皮

澤瀉

白茯苓

半夏

乾姜

吳茱萸

湯泡各二分

當歸

人參

各五分

升麻

柴胡

去各分

內經曰留者行之結者散之以柴胡升麻之苦平行少  
陽陽明二經發散清氣運行陽分為君以生姜半夏草  
荳蔻益智仁之甘辛大熱消散中寒為臣以厚朴木香  
蒼朮青皮之辛苦大溫通順滯氣以陳皮當歸人參辛  
甘溫調和榮衛滋養中氣濁氣不降宜以苦洩之吳茱  
萸之苦熱洩之者也氣之薄者為陽中之陰茯苓甘平

澤瀉臑平氣薄引濁陰之氣自上而下故以為佐氣味相合散之洩之上之下之使清濁之氣各安其位也右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去渣溫服食前忌生冷硬物

右治脉弦細脇痛而脹

肢厥脉弦細為寒

中滿分消湯治中滿寒脹寒疝大小便不通陰燥足不收四肢厥逆食入反出下虛中滿腹中寒心下痞下焦燥寒沉厥奔豚不收二服愈

黃芪五分

益智

半夏各三分

川烏一分

吳茱萸

草薢各五分

木香

青皮

當歸

黃連各三分

厚朴五分

茯苓

澤瀉

生姜

麻黃各二分

升麻三分

柴胡稍

乾姜

葶藶各二分

黃栢五分

右劉如麻苳大作一服水二盞煎至一盞去渣稍熱服

食前大忌房勞酒麪生冷硬物油膩

**治**大人小兒因食果子多而腹脹氣急者肉桂細米飯

丸菘苳大每服十九小兒五粒熱水下方

**治**靈樞經云腹滿大便不利上走胃臆喘息喝喝然取足

少陰取者瀉也宜以辛熱散之

良姜

肉桂

益智

草薢仁

厚朴

升麻

甘草

獨活使

黃栢少許引用

又方桂枝

桔梗

人參

青皮抄

陳皮

良姜

白朮

澤瀉

吳茱萸

吳茱萸湯方

乾

四肢濕腫宜繆刺先瀉其血結後調其真經謂刺去其血結是也

治心腹脹滿短氣以草葶藶一兩去皮為細末生姜湯調下五分

調下五分

太陰所至為畜滿 辨云脾為陰中之太陰又云脾為

陰中之至陰乃為坤元亘古不遷之土天為陽火也地為

陰水也在人則為脾同陰水之化脾有餘則腹脹滿食不

化故無陽則不能化五穀脾盛乃大寒為脹滿故脉經云

胃中寒則脹滿大抵此病皆水氣寒濕為之也 治宜大辛

熱之劑必愈然亦有輕重

木香場氣丸治中滿腹脹下焦虛損者

蘿蔔子炒

陳皮去白各五錢

胡椒二錢

草葶藶面裹煨

木香

青皮各五錢

蝎稍去毒二錢半

右為細末水調為丸如桐子大每服三十九溫米飲下

忌油膩服白粥百日重者一年小兒丸如麻子大桑皮

皮湯下十九日三服大人陰囊洪腫水冷須用青鹽乾

姜白麩各三錢水和膏攤紙上塗貼

諸脹腹大皆為熱全文諸病有聲鼓之如鼓皆屬于熱

中滿分消丸治中滿熱脹鼓脹氣脹水氣脹大熱脹有

寒者不治

黃芩炒

黃連各五錢炒

姜黃

白朮

人參去

甘草炙

緒苓去皮各一錢

白茯苓去皮

砂仁各二錢

枳實炒黃

半夏湯泡各五錢

乾姜二錢

厚朴去皮炒一兩

知母炒四錢

澤瀉二錢

陳皮三錢

右共為細末水浸蒸餅為丸如桐子大每服一百丸焙

乾白湯下食後寒因熱用故焙服

有第二小娘食積挾濕手足生瘡腹滿面浮口渴食少

口渴肝  
洪數為  
濕熱

膈滿小便少大便實

大腹皮

乾薑各二錢

黃芩五錢

陳皮五錢

厚朴三錢

川芎三錢

炙甘草一錢

白朮一兩

木通兩半

姜三片煎服

南二孺人面浮肚脹

蒼朮五錢

黃柏三錢

白朮兩半

陳皮一錢

木通錢

川芎五分

滑石炒錢半

甘草二錢

厚朴五分

裴孺人年五十二歲氣上膈滿食少此積熱生濕診得左三部濇小右三部微數重取稍大喜得無弦脉為可治之病

白朮兩

青皮三錢

陳皮

厚朴各五錢

大腹皮二錢

片苓炒

木通五錢

蘇梗

川芎

各三錢

桂枝

三錢

甘梢

一錢

分十貼姜二片煮飲之煎查之湯下保和二十九

經患腹脹滿奔悶掘山梔根少許煎水調一盞服 女人

血氣腹腫以山梔根末三錢熱酒空心服之

仲寸口脉遲而濇遲則為寒濇則為血不足跌陽脉微而

遲微則為氣遲則為寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷

則榮衛不利榮衛不利則腹滿腸鳴相逐氣轉膀胱榮衛

俱勞陽氣不通即身冷陰氣不通即骨寒陽前通則惡寒

陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃

散實則失氣虛則遺尿名曰氣分

氣分謂氣不通利而脹血分謂血不通利而脹非脹病

之外又別有氣分血分之病也蓋氣血不通利則水亦

不通利而尿少尿少則腹中水漸積而為脹但氣分心

氣分

下堅大而病發于上血分血結胞門而病發于下氣分  
先病水脹後經斷血分先經斷後病水脹也血分治法  
見水腫脹

藏府腹滿臌脹支鬲胛脇下厥上冒過在足太陰陽明全文見  
治虛實

條太陰所謂病脹者太陰子也十一月萬物氣皆藏于中  
故曰病脹脾解

右脾胃脹治法見前補虛行濕條諸方是也

腎氣實則脹全文見治  
虛實條二陰一陽發病善脹心滿善氣

全文見診  
病傳變

運氣運氣脹有七

一曰濕助脾盛而脹經云諸濕腫滿皆屬脾土又云歲土  
太過甚則飲食中滿又云歲土不及濕乃大行民病腹滿

又云土鬱之發民病心腹脹滿腸鳴又云太陽司天氣  
下臨濕氣變物水飲內畜中滿不發其則臌腫治以諸熱  
是也

二曰風攻脾虛而脹經云厥陰在泉風淫所勝病腹脹治  
以辛涼是也

三曰寒脹經云水太過曰流衍流衍之紀其病脹又云歲  
水太過寒氣流行甚則腹大脛腫又云水鬱之發民病痞  
堅腹滿又云太陽之勝皮膚痞腫腹滿又云太陰司天之  
政民病寒濕腹滿身臌附腫三之氣感于寒濕民病附腫  
胸腹滿治以諸熱是也

四曰燥脹經云陽明之復腹脹而洩治以溫劑是也

五曰寒鬱熱于中而脹經云陽明司天之政初之氣寒雨  
化其病中熱脹又云太陽司天之政二之氣大涼反至火

氣遂抑民病氣鬱中滿是也

六曰寒熱相薄而脹經云少陰司天之政水火寒熱接于氣交民病腹脹大又云太陰司天之政四之氣寒風曉暮蒸熱相搏民病心腹滿熱臚脹甚則附腫是也

七曰火鬱之發脹經云火鬱之發民病脇腹胸背面首四肢臚憤臚脹是也

雜方

治腹滿不能服藥導引方取獨蒜煨熟去皮納下部冷

針灸

黃帝曰脈之應于寸口如何而脹岐伯曰其脈大堅以濇者脹也黃帝曰何以知臟腑之脹也岐伯曰陰為臟陽為腑帝曰夫氣之令人脹也在于血脈之中耶臟腑之內乎岐伯曰二者皆有焉然非脹之舍也帝曰願聞脹之舍岐伯曰夫脹者皆在于臟腑之外排臟腑而郭胸脇脹皮

膚故命曰脹黃帝曰臟腑之在胸脇腹裡之內也若匣匣之藏禁器也各有次舍異名而同處一域之中其氣各異願聞其故岐伯曰夫胸腹臟腑之郭也臚中者心主之宮城也胃者太倉也咽喉小腸者傳送也胃之五竅者閭里門戶也廉泉玉英者津液之道也故五臟六腑者各有畔界其病各有形狀帝曰願聞脹形岐伯曰夫心脹者煩心短氣臥不安甲乙經云心輸主之亦取列缺肺脹者虛滿而喘欬甲乙經云肺輸主之亦取太淵肝脹者脇下滿而痛引少腹甲乙云肝俞主之亦取太衝脾脹者善噦四肢煩憊躄重不能勝衣臥不安甲乙云脾俞主之亦取腎脹者腹滿引背央央然腰髀痛甲乙云腎俞主之亦取胃脹者腹滿脘骨痛鼻聞焦臭妨于食大便難甲乙云大腸脹者脹鳴而痛濯濯冬日重感于寒則甲乙云小腸脹者少腹脹引而痛甲乙云

長沙同治...

邪主 膀胱脹者少腹滿而氣滯甲乙云曲 三焦脹者

氣滿于皮膚中輕輕然而不堅甲乙云石 膽脹者脇下

痛脹口中苦善太息甲乙云陽 凡此諸脹者其道在一

明知逆順針數不失瀉虛補實神去其室致邪失正真不

可定粗之所敗謂之天命補虛瀉實神歸其室久塞其空

謂之良工黃帝曰脹者焉生何因而有岐伯曰衛氣之在

身也常然並脈循分肉行有逆順陰陽相隨乃得天和五

臟更始四時有序五穀乃化然後厥氣在下榮衛留止寒

氣逆上真邪相攻兩氣相搏乃合為脹也榮氣循脈衛氣

逆為脈脹衛氣並脈循分為膚脹三里而瀉近者一下遠

者三下無問虛實工在疾瀉榮衛循脈至此三十九字原

愿聞之上有三里而瀉之上當有脫簡甲乙云凡 黃帝曰

善何以解惑岐伯曰合之于真三合而得帝曰善黃帝曰

脹論言無問虛實工在疾瀉近者一下遠者三下今有其

三而不下者其過焉在岐伯曰此言陷于肉盲而中氣穴

者也不中氣穴則氣內閉針不陷盲則氣不行上越中肉

則衛氣相亂陰陽相逐其于脹也當瀉不瀉氣故不下三

而不下必更其道氣下乃止不下復始可以萬全烏有殆

者乎其于脹也必審其脈當瀉則瀉當補則補如鼓應桴

惡有不下者乎脹論

刺灸脹有七法

其一取血絡經云膚脹先取脹之血絡是也

其二取胃經前篇脹論所謂三里而瀉近者一下遠者三

下無問虛實工在疾瀉是其一法也又云胃者水穀之海

其輸上在氣街下至三里水穀之海有餘則腹滿審守其

輸調其虛實又云胃病者腹膜脹取之三里也又云胃足

陽明之脈是動則病音響腹脹胃中寒則脹滿視盛虛熱寒陷下取之是脹病大法皆瀉胃穴三里也

其三取脾經云腹滿食不化腹響響不能大便取足太陰又云脾足太陰之脈是動病腹脹噎噎視盛虛熱寒陷下取之又云脾虛則腹滿腸鳴飧洩取其經太陰陽明少陰血者又云足太陰之別名曰公孫去本節之後一寸別走陽明其別者入絡腸胃虛則鼓脹取之所別也是脹之虛者多補足太陰脾穴也

其四取腎膀胱經云腎病者腹大脛腫取其經少陰太陽血者又云腎藏志志有餘則腹脹飧洩瀉然筋血者又云邪在腎則病腹脹腰痛大便難取之湧泉崑崙是有血者盡取之又云腹滿大便秘不利腹大亦上走胸膈喘息喝喝然取足少陰又云男子如蠱女子如阻身軀腰脊如解不

欲飲食先取湧泉見血是跗上盛者盡見血也又云脹

三陽是脹病多瀉腎經諸穴也

其五取三焦委陽穴經云三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則水留即為脹取委陽是也蓋不得小便則水無所泄其水溢出皮膚腫者為水其水留于腹中獨腹脹者為脹也

其六取肺經云振寒洒洒鼓頷不汗出腹脹煩惋取手太陰是也

其七取厥病成脹經云陽明之厥腹滿不得臥太陰之厥腹滿臍脹少陰之厥腹滿心痛厥陰之厥少腹腫痛腹脹盛則瀉之虛則補之不盛不虛以經取之是也

鼓脹之狀腹身皆大 臍上下左右各刺二分 中脘 通關三里手 膚脹之狀空而不堅腹身盡腫按之陷而

不起 太白 公孫 復溜 絕骨 三里 分水

腹脹 分水二寸 氣海 三里 三陰交 人中

腹脹并兩足有水 內庭五分 臨泣三分 瀉用香油抹

腹脹暴脹按之不下 中脘 氣海 三里

世 單蠱脹氣喘 水分在分水旁各一寸半針

又法 分水 三里 行間 內庭 右關 氣海各灸

東 腹脹臍突缺盆中滿尻腰腫 大敦 天牖 崑崙

寒氣腹滿蠱淫灑身熱腹中積聚疼痛衝門主之 腹

滿嚮嚮然不便心下有寒痛商丘主之 腹脹善滿積氣

關門主之 腹中氣盛腹脹逆不得卧陰陵泉主之 腹

脹腸鳴氣上衝胃不能久立腹中痛濯濯冬日重感于寒

則洩當臍而痛腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身腫俠

臍急天樞主之 腹中有大熱不安腹有大氣相和挾暴

腹脹滿瘳淫灑氣衝主之 腹滿痛不得息正卧屈一膝

伸一股並氣衝針入三寸氣至瀉之 腸中寒脹滿善噫

聞食臭胃氣不足腸鳴脹滿腹痛洩食不化心下脹三里

主之 大腸有熱腸鳴腹滿俠臍痛食不化喘不能久立

巨虛上廉主之 腹滿不嗜食衝陽主之 寒腹滿脹厲

兌主之 男子如蠱女子如阻寒熱少腹偏腫陰谷主之

胃中寒脹食多身軀羸瘦腹中滿而鳴腹臑風厥胸脇

堵滿嘔吐脊急痛筋攣食不下胃輸主之 頭痛食不下

腸鳴臙脹欲吐時泄注三焦俞主之 腹滿臙脹大便泄

意舍主之 臙脹水腫飲食不下多寒胃倉主之 腹滿

不能食刺脊中 寒中傷飽食飲不化五臟臙滿脹心腹

胸脇堵滿脉虛則生百病上脘主之 腹脹不通寒中傷

診

飽食飲不化中脘主之 水腫水氣行皮中陰交主之  
水腫腹大水脹水氣行皮中石門主之 腹滿胃中有熱  
不嗜食懸鍾主之

脈盛而紫曰脹

平人氣象論曰脹論  
脈大堅以滿為脹

唇偏舉者脾偏傾

脾偏傾則善滿善脹

全文

腹脹身熱

脈大是逆也如是者不過十五日死矣

全文見診生死下  
同或兼身熱

腹大脹四末清脫形洩甚是逆也如是

者不及一時死矣

腹脹便血其脈大時絕是逆也

嘔

咳腹脹且飧泄其脈絕是逆也

少陰終者面黑齒長而

垢腹脹閉上下不通而終矣

善噫善嘔嘔則逆

逆則面赤不逆則上下不通不通則面

黑皮毛焦而終矣

少腹脹滿

腎病石

臍下脹滿是也若先臍下滿漸延及臍上滿者亦用此法

無澤漆湯治石水四肢瘦腹腫不喘其脈沉

澤漆洗去腥

桑白皮

射干洗

黃芩

茯苓

白木各四兩

澤瀉

防已各二兩

右咬咀每服五錢水三盞烏荳一合煎二盞入藥同煎

七分去查空腹溫服日三

聖治腹堅脹滿號石水方用白石英十兩槌大荳大以甕

瓶盛用好酒三斗浸以泥重封瓶口用馬糞及糠火燒之

長令酒小沸從卯至午即住火候次日煖一中盞飲日可

三度如吃酒少隨性飲之其白石英可更一度燒之

素陰陽結邪多陰少陽曰石水少腹脹 腎肝并沉為石

水大奇論

腎脈微大為石水起臍已下至小腹腫臞然上

至胃脘死不治

醫學綱目卷五

腫

腸覃寒氣客于腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫癖而內着惡氣乃起瘕肉乃生其始生也大如鷄卵稍以益大至其成如懷子之狀又者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候也

羅睺露丸治寒傷于內氣凝不流結于腸外又為瘕瘕時作疼痛腰不得伸

京三稜

廣茂各一兩

乾漆五錢洗去

茴香三錢

硃砂四錢

輕粉一錢

川烏半兩炮

青皮去白

雄黃另研

川山甲炮二

麝香五分

巴豆

三十粒去皮同廣茂三稜炒令采黃色去巴豆不用

右除另研四味外餘為細末和勻生姜汁糊為丸桐子大每服二三十丸溫生姜湯送下溫酒亦得食前

烏喙丸治腸覃亦治乳餘

烏喙

炮去皮

石膏

藜蘆

牡蒙

茯苓酒浸

桂心

乾姜炮各

巴豆

七個

右末蜜丸如棗葶大每服三五丸食後酒飲任下亦治男子疝病

石瘕

經云石瘕生於胞中寒氣客于子門子門閉氣不得通惡血當瀉不瀉以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生于女子可導而下之

聖見睪丹治寒客于下焦血氣閉塞而成瘕空大必不消者

附子

四錢炮

澤瀉

肉桂

玄胡索

水香各二

紫石英一錢

檳榔二錢

血竭

錢半

水蛭炒一

及桃仁湯浸去皮炒

黃三十個

一

京三稜剉五錢 大黃剉碎二錢同京三稜酒浸一宿焙乾

右除血竭桃仁外同為細末和勻用原浸酒打糊為丸  
桐子大每服十九丸溫醋湯送下溫酒亦得食前

**無**石莖散治婦人血結胞門或為瘕瘕在腹脇間心腹脹  
滿腫急如石水狀俗謂之血蠱

- 紫石英兩一 歸尾
- 馬鞭草各五錢 紅花炒半兩
- 烏梅肉錢五 蓬朮炮
- 三稜炮 蘇木節
- 沒藥 琥珀研各一錢 甘草一錢

右為末濃煎蘇木酒調下二錢不飲酒姜湯調服

**脈**問曰病有血分水分何謂也師曰經水前斷後病水名  
曰血分此病為難治先病水後經水斷名曰水分此病易  
治何以故去水其經自當下水分即氣分也  
**寸口**脈沉而遲沉則為水遲則為寒寒水相搏跌陽脈

治

伏水穀不化脾氣衰則鶩溇胃氣衰則身牀腫少陽脈卑  
少陰細男子則小便不利婦人則經水不通經為血血不  
利則為水名曰血分是也 師曰寸口脈沉而數數則為  
出沉則為入出則為陽實入則為陰結跌陽脈微而弦微  
則無胃氣弦則不得息少陰脈沉而滑沉則為在裏滑則  
為實沉滑相搏血結胞門其瘕不瀉經絡不通名曰血分  
**仲**大黃甘遂湯治女人小腹滿如敦敦狀小便微難而不  
渴為水與血并結在血室也

- 大黃四兩 甘遂炮 阿膠炒各二兩
- 右剉散每服三錢水一盞煎至七分去渣溫服其血當  
下

**無**萬病丸治室女月經不通臍下堅結大如杯升發熱往  
來下痢羸瘦此為血瘕若生肉瘕不可為也

乾漆碎炒令出

牛膝酒浸一宿

生地黃四兩八錢取汁

右以地黃汁入下二味為末慢火熬候可丸即充如梧子大空心米飲或温酒下一丸日再勿妄加病去止藥女人氣血虛經不行者不可服之

針灸

**靈**小腹滿大上走胃至心浙浙身時寒熱小便不利取足厥陰雜疾

**甲**石水痛引脇下脹頭眩痛身盡熱關元主之 振寒大

腹石水四滿主之 石水刺氣衝 石水章門及然谷主之 又天泉主之

**世**腸覃之狀內着惡氣乃起瘰肉大如鷄卵日以益大其成也如孕推之則移 中極 氣衝 天樞 五福 石瘦之狀生于胞中惡血不通日以益大如孕 陰陵泉

去胞中 復溜順骨刺下待 惡血腹温方可去

胎前腹脹

滯氣

**大**紫蘇飲治妊娠心腹脹滿而脇妨悶方見婦人胎

寒熱

**紫**枳殼湯治婦人妊胎腹脹

枳殼三兩 黃芩一兩

右為粗末每服五錢水盞半煎温服

治胎前腹滿身疼沉重枳殼湯中加白朮一兩

**但**婦人懷妊六七月脉弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者小

腹如扇所以然者子藏寒故也當以附子湯温其藏附子方

見傷寒

婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰已上重如有水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實刺瀉勞宮及關元小便微利則愈

治產後血與惡露不下因而血脹用杜牛膝杵碎用水熬成膏去渣每服一椀未知再服神効 子母產後穢汚不盡腹滿用麻子三兩酒五升煮取一升分温二服當下惡

物

千治產後穢汚下不盡腹滿生姜二斤以水煮取汁服即

出

日華治產後血脹苗葉同功乃益母草子也

保紫金丹治產後腫胸中有物狀是鹽氣不降

代赭石

硃礞石

各等分按本草並無硃礞石止血下石淋除癥結伏鬼物惡氣疑即是此

右為細末醋糊丸桐子大每服三十五丸酒下胸中痛加川歸湯下久服治血癖

抵聖湯治產後腹脹滿悶嘔吐不定不可用尋常治脹

止吐藥

赤芍藥

半夏

澤蘭葉

人參

陳皮各一分

甘草一錢

右咬咀用水一碗生姜焙乾五錢煎至半碗去渣分熱三服

丹陽禮五需人瘧產後腹滿畧渴不飲脉却虛

白朮炒六錢

陳皮五錢

白芍炒極熟二錢半

厚朴

川芎各二錢

每服加海金沙一錢

分四貼煎下保和丸廿五粒

天枳木湯治虛後心腹大如盤方見脈門補虛條

保又方

代赭石兩

棗仁三十去皮尖

大黃兩半

右細末薄荷水調丸三五十九温水下無時

治產後腹大堅滿不能卧白聖散

實

28  
1769

針灸

妙藥也

樟柳根十二

大戟兩半

甘遂兩半

右細末每服二錢熱湯下取大府利為度此主水氣之

甲婦人產後餘疾飲食不下胸脇支滿目眩足寒心切痛

善噫聞酸臭脹痺腹滿小腹尤大期門主之

醫學綱目卷之二十四

