

脾胃部
肺大腸部

醫學綱目

自井五
至井六

醫學綱目卷之二十五

脾胃部

積塊癥瘕 婦人血積 胎前產後積 息積

大法

丹氣不能作塊成聚塊乃有形之物痰與食積死血成聚
宜醋煮海石醋三稜莪朮桃仁紅花五靈脂附子之類石
城白朮湯下之 瓦龍子能消血塊又能消痰 治塊當
降火消食積食積即痰也行死血血塊去後須大補之

石城痰積有塊可用洗滌垢膩又能消食積 塊在皮裏
膜外須用補氣香藥開之兼二陳湯加補氣藥先須斷厚
味凡積病不可用下藥徒損真氣病亦不退當用消積藥
融化開則自消

垣治積要法 許學士云大抵治積或以所惡者攻之所
喜者誘之則易愈如礪砂水銀治肉積神麩麥蘗治酒積
水蛭蠶虫治血積木香檳榔治氣積牽牛甘遂治水積雄

黃膩粉治痰積礫石巴豆治食積各從其類也若用羣隊之藥分其勢則難取効須要認得分明是何積聚兼見何證然後增加佐使之藥不爾反有所損要在臨時通變也治積當察其所痛以知其病有餘不足可補可瀉無逆天時詳臟腑之高下如寒者熱之結者散之客者除之留者行之堅者削之强者奪之鹹以與之苦以瀉之全真氣藥補之隨其所積而行之節飲食慎起居和其中外可使必已不然遽以大毒之劑攻之積不能除反傷正氣終難復也醫者可不慎歟

諸積皆本陰虛

諸積皆本於喜怒傷臟而陰虛陰既虛矣則風雨襲陰之虛病起於上而生積清濕襲陰之虛病起於下而成積詳

針灸

潔古之法補虛

潔壯人無積虛人則有之皆由脾胃怯弱氣血兩衰四時

為主

有感皆能成積若遽以磨堅破結之藥治之疾似去而實已衰矣乾漆硃砂三稜牽牛大黃之類得藥則暫快藥過則依然氣愈消疾愈大竟何益哉故善治者當先補虛使血氣壯積自消如滿座皆君子則小人自無容地也不問何臟先調其中使能飲食是其本也

因壽成積丹溪之法補中帶磨積為主

丹有婦人三十歲因哭子至半年後胸痞有塊如杯飲食大減面淡黃慘黑若不勝衣六脈弦細虛澁至日晡後則發寒熱予察其事勢已急補瀉兼用以補中益氣湯隨天氣寒暄加減法與東垣痞氣丸相間服方見五積門食前用湯食後用丸常令湯多於丸些少如此近一月寒熱皆退食亦稍進又以丸用湯相等服之至第二月以後忽一夜大發寒熱至天明熱退胸中之塊如失至晚手足下半節皆腫遂停藥三五日後忽一夜手足之腫如失至天明

胸中之塊復有比如前覺小一暈遂以二陳湯加桔梗白朮枳實調理半月而安次年復生一男 一婦人四十餘面白形瘦性急因大不如意三月後乳房下貼肋骨作一塊漸漸長大掩心微痛膈悶飲食減四之三每早覺口苦兩手脈微而短濇予知其月經不來矣為之甚懼辭勿與治思至夜半其婦尚能出外見醫梳粧言語如舊料其尚有胃氣遂以參朮歸芎佐以氣藥作大服一晝夜與四次外以大琥珀膏貼塊上防其長經一月餘服補藥百餘貼食及平時之半仍用前藥又過一月脈氣漸充又與前藥吞潤下丸百餘貼月經不及兩月而至瀉脈減五分之四時天氣熱意其經行時必帶紫色仍與前補藥加醋炒三稜吞潤下丸以抑青丸十五粒佐之又經一月忽報塊已消及大半月經及期尚欠平時半日飲食甘美如常但食

肉則覺不快予令止藥且待來春水旺時又與區處至次年六月忽報一夜塊大比舊反加大半指脈畧弦左畧怯於右至數日平和自言食飽後則塊微悶食行却自平予意有動心事激之間之果然仍與前補藥加黃芩炒黃連以少木通生薑佐之去三稜煎湯吞潤下丸外以琥珀膏貼之半月值經行而塊散此是肺金為內火所燥木邪勝土土不能運清濁相干舊塊輪廓尚在者因氣血之未盡復也濁氣稍留舊塊復起補其血氣使肺不受邪木氣平而土氣正濁氣行而塊散矣 方提領年五十六丁丑年冬因飲酒後受怒氣於左脇下與臍平作痛自此以後漸漸成小塊或起或不起起則痛痛止則伏面黃口乾無力食少吃此物便噁此味轉惡風寒脈之左大於右弦濇而長大率左甚重取則全弦此得熱散太多以致胃氣太傷

陰血下衰且與和胃湯以補胃氣滋養陰血并下保和丸助其化精同胃實陰血稍充卻用消塊和胃湯方

人參錢三 白木半錢 陳皮錢一 芍藥

歸身各五分 乾葛三分 紅花大豆 甘草二錢

作一貼下保和丸廿五龍薈丸十五

右三法補氣血藥為主磨積出入佐之皆補多於磨乃氣血虛甚而有積塊之法也

飲食酒肉成積

王郎心痛膈有塊與

白木錢一 青皮錢一 芍藥 木通

川芎 蒼朮各錢一 甘草五分

作一貼煎下保和丸三十粒

馮氏女年三十歲形瘦色嫩滋味素厚幼年曾踏雪嘗以

火烘鞋履以致濕熱上襲至廿五歲時口嘗吐清水吞酸醫用丁香等熱藥時止時作時仍服前藥至當年心痛胃痞有塊吃飯即吐些常出三之一遂與佐金丸廿四粒以姜湯下之與三十餘次全不進食予曰結已開矣且令止藥或口乾思飲止與半盞熟水間以青六丸與之雖困臥着床尤以絕藥為善如此近四十日診其脈前後些微弦重取似濇輕取稍和至此弦脈漸添遂令與人參酒芍藥湯引金瀉木漸漸思食而苦於大便秘病家必欲行大黃予止之遂以生芍藥陳皮桃仁人參為丸與之用蜜煎導大便行而食進調理半月而安

參萸丸即佐金丸加入人參一錢是也

盧子裕左脇下因瘡後食肉與酒而成塊

白木錢一 柴胡錢一 茯苓錢二 枳殼炒五分

人參分五

作湯下阿魏五保和甘柳青十與點十攻塊五

長垣朱郎因酒多年濕病脇上有塊腹滑泄小便黃

大滑石兩 白木錢各六 三稜錢各六 陳皮錢五

黃連錢各三 猪苓錢各三 黃芩錢各三 木通錢各二

防風錢 乾姜錢 甘草五分

分七貼煎下保和丸二十

一丈夫肚左邊帶脇上有塊先吃匾食牛乳者成氣痛又

因酒肉塊大如桃食減三分之一

滑石兩 白米錢四 陳皮錢 三稜錢三

蘿蔔子兩 連翹錢 黃連錢各一 乾葛錢二

桃仁錢 黃芩錢 甘草錢半

五分四貼水煎服

婦人脇下有塊大如掌脈滑時有熱此虛中有氣程少
補虛次與磨積藥

白芍 歸鬚錢四 陳皮 白木錢三

青皮 川芎 木通錢各一 甘草錢

白水煎熱服

磨積藥

三稜醋煮錢 枳實 青皮 桃仁錢各五

大黃錢五 桂枝錢 海藻醋煮錢

細末神麩糊丸如桐子大每服四十九

世一孺人左脇下舊有塊漸長大脈弦而大稍數詢之近

亦發熱食亦減倦怠先與補之次攻此塊

陳皮錢五 白木兩 柴胡 歸頭

青皮錢各五 甘草錢 木通錢半

體虛有熱成積

右作八貼服

次與玫瑰

青皮醋一兩半

桃仁五錢

三稜醋一兩半

桂枝三錢半

海藻醋洗三錢

醋調神麩糊為丸

一丈夫脇下有積塊內有痰熱汗不得泄兩脈大而散軟

此體有虛

三稜五錢

白朮

黃連各三錢

人參二錢

連翹

木通各三錢

川芎

桂一錢

甘草五分

水煎下保和丸

富小娘瘡後左脇下塊小便少

厚朴

柴胡各二錢

三稜五錢

甘草五分

木通五錢

白朮六錢半

青皮五錢

生姜片

右食前熱服

下邳錢郎正月發沙因此臍邊有塊二枚發起則痛伏而不痛有時又隱痛自炙臍中脈甚弦右手伏重取則畧數此蘊熱因春欲汗解而氣弱不能自發為汗復鬱又因食不節邪挾宿食所以成塊宜以保和二十溫中二十抑青十用白朮木通三稜湯下

右十一法皆補藥與磨積相半兼服之前七法治飲食酒肉成積後三法治體虛有熱成積也

按之痛者消之

丹陳里長男廿七歲舊因飽食牛肉荳腐患嘔吐又不節飲食右脇下生一塊漸長今大如掌痛發則見痛止則伏其脈弦而數知此人必性急塊上不可按按則愈痛痛則必吐黃酸苦水詢之果然或作腎氣治予曰非也此足太陰有食積與濕痰

荔枝核燒二箇

山梔炒五箇去殼

枳實炒十箇

山查九箇

菜萸炒九枚

一方有人參

右細研急流水一盞蕩起煎沸入生姜汁令辣食前熱服與六貼吐二貼服四貼與此藥且止其痛卻與消塊藥

半夏末

六錢昆角六箇水煮取汁拌半夏末晒乾

黃連炒五錢

石城二錢另研

已上三件同為細末以糖毬膏為丸如胡椒大

丹一婢色紫稍肥性沉多憂年近四十經不行三月矣小腹中有一氣塊初起如栗漸如炊餅予脈之兩手皆濇重取卻稍和試令按塊痛甚捫之高寸半遂與千金消石丸至四五次後忽自言乳頭黑且有汁恐是孕予曰非也濇脈無孕之理又與三五貼脈之稍覺虛豁予悟曰藥大峻矣令止前藥與四物湯倍白朮佐以陳皮炙甘草至三十

瀉藥成塊者滑去之

貼候脈完再與消石丸數次忽自言塊消一暈便令莫服又半月經行痛甚下黑血半升內有如椒核者數十粒而塊消一半又來索藥以消餘塊予曉之曰勿性急似開矣不可又攻若次月經行當消盡矣次月經行下少黑血塊又消一暈又來問藥予曰且守禁忌至次月又消盡已而果然大凡攻擊之藥有病則病受之病邪輕而藥力重則胃氣受傷夫胃氣者清純冲和之氣也惟與穀肉菜菓相宜蓋藥石皆偏勝之氣雖參芪輩為性亦偏况攻擊之藥乎此婦胃氣弱血亦少若待塊盡而去藥胃氣之存者幾希矣

一婦人年五十五歲形氣俱實富而神勞味厚性急常經水過多醫每用瀉藥止後病氣痛曾腹共有積塊大小十三枚遇夜痛甚着床累月飲食雖減應接家事如故其脈

隨氣上
塞咽中
者吐之

兩手皆漚而弱此因屢用漚藥致敗血積聚不行故爾時
三月間用蜀葵根煎湯再煎人參白朮陳皮青皮甘草稍
牛膝成湯入玄明粉少許研桃仁調熱飲之服至二貼腹
痛下塊一枚再并查煎服又下一枚時以病久血耗不敢
再取塊告技窮而歸後想此症患病雖重其形質尚可受
藥但當去葵根玄明粉其後塊漸消而病安
一女子年廿一歲累因食傷胃脘有塊隨氣上塞咽中問
之又因食煨鹽配粥與

白朮

半錢

陳皮

半夏

桔梗

青皮

木通

甘草

生姜

煎服一二次病遂平復再與前藥半月後加桔梗煎一

服令其吐吐出痰積遂愈

子和息城司侯聞父死于賊乃大悲哭罷便覺心痛日增

氣結者
散之

暴積急
去之

不已月餘成塊狀若覆杯大痛不堪藥皆無功議用燔針
炷艾病人惡之乃求治于戴人戴人至適巫者在其傍乃
學巫者雜以狂言以謔病者至是大笑不忍回面向壁一
二日心中結硬皆散戴人曰內經言憂則氣結喜則百脈
舒和又云喜勝悲內經自有此法

丹呂宗信年六十素好酒八月間因暑熱中得疾兩足冷
過膝上腕有塊如掌牽引脇痛不可眠臥飲食減半卻不
渴已自服生料五積散三貼予脈之六脈俱沉漚而小按
之不為弱皆數而右為甚大便如常小便赤色遂用大承
氣湯減大黃之半而熟炒加黃連芍藥川芎乾葛甘草作
湯下瓜蒌仁半夏黃連貝母九至十二貼足冷退至脛塊
減半遂止藥至半月飲食復舊諸症悉除
唐柳宗元慕救死方元和十二年二月得腳氣夜半痞絕

脇有塊大如石且死因太寒不知人三日家人號哭榮陽
鄭詢美傳杉木湯服半食頃大下三次氣通塊散其方用
杉木節一大升橘葉一六升無葉以皮代之大腹楨榔七
箇合搗碎之童便三大升共煮取一升半分二服若一服
得快利停後服

肘治卒暴癥腹中有如石刺痛牛膝一大把并葉酒煮飲
之

外治卒暴癥腹中有物堅如石痛欲死取薊藿根一小束
洗瀝去水細擘以酒二升漬三宿煖溫服五合至一升日
三若欲速得服於熱灰中溫令藥味出服之此方無毒神
効

右暴積急去條四方如塊除後必用補劑以救其受攻
之傷也

久積
除之

海萬病紫苑丸療臍腹久患痲痺如椀大及諸黃病勿
氣起時上氣衝心繞臍絞痛一切虫咬十種水病十種蟲
病及反胃吐食嘔逆惡心飲食不消天行時病女人多年
月露不通或腹如懷孕多血天陰即發又治十二種風頑
痺不知年歲晝夜不安夢與鬼交頭多白屑或哭或笑如
鬼魅所着腹中生瘡腹痛服之皆効

紫苑去苗

吳茱萸湯洗七次焙乾

菖蒲

柴胡去鬚

厚朴姜制各一兩

桔梗去芦

茯苓去皮

皂莢去皮

桂枝

乾姜炮

黃連去鬚

蜀椒去目及閉口微炒出汗

巴豆去皮膜丙油炒

川烏炮三錢

獨活

防風各一兩

右為細末入巴豆研勻煉蜜丸如桐子大每服三丸漸
加至五丸七丸生姜湯送下食後臨臥服有孕者不宜

服具引于後

痔漏腸風酒下 赤白痢訶子湯下 膿血痢米飲湯

下 墮傷血悶四肢不收酒下 蛔虫咬心檳榔湯下

氣噎憂噎荷葉湯下 打撲傷損酒下 申毒掃帚

灰甘草湯下 一切風升麻湯下 寸口虫檳榔湯下

霍亂乾姜湯下 咳嗽杏仁湯下 腰腎痛豆淋酒

下 陰毒傷寒温酒下 吐逆生姜湯下 飲食氣塊

麩湯下 時氣并花水下 脾風陳皮湯下 頭痛水

下 心痛温酒下 大小便不通燈草湯下 因物所

傷以本物湯下 吐水藜湯下 氣病乾姜湯下 小

兒天弔風搐防風湯下 小兒疳痢葱白湯下 小兒

乳食傷白湯下 月信不通紅花酒下 婦人腹痛川

芎酒下 懷孕半年後胎漏艾湯下 有子氣衝心酒

下 產暈痛温酒下 血氣痛當歸酒下 產後心痛

腹脹滿豆淋湯下 難產益智湯下 產後血痢當歸

湯下 赤白帶下酒煎艾湯下 解內外傷寒粥飲下

室女血氣不通酒下 子死腹中菜子湯下 又治

小兒驚癇大小顛狂一切風及無孕婦人身上頑麻狀

如虫行四肢俱腫呻吟等疾 楊駙馬患風氣衝心飲

食吐逆遍身枯瘦日服五九至二十日瀉出肉塊如蝦

蟬五六枚白膿二升愈 趙侍郎先食後吐日無所見

耳無所聞服五十日瀉出青蛇五七條四寸許惡膿三

升愈 王氏患大風病眉髮墮落掌内生瘡服之半月

瀉出癩虫二升如馬尾長寸許後愈 李靈惠肥氣病

日服五九經一年瀉出肉鱉二枚愈 黃門卒中風病

發時服藥泄出惡膿四升赤黃水一升一肉虫如亂髮

增補醫方卷之三

卷之三

愈 李知府妻梅氏帶下病七年血崩不止骨痠着床
日服五九至十九十五九取下膿血五升黃水一升肉
塊如鷄子狀治愈一切萬病如神惟有孕者不宜服
局溫白丸治心腹癰塊久癥積聚大如杯椀黃疸宿食朝
起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻兩
脇十種水氣八種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾九
種心痛積年食不消化或連年瘧疾不瘥及療一切諸風
身體頑麻不知痛痒或半身不遂或眉髮墮落及療七十
二種風三十六種遁尸疰忤及顛癇及婦人諸疾斷續不
生帶下淋瀝五邪失心憂愁思慮飲食減少月水不調及
腹中一切諸疾連年羸瘦困斃或歌或笑如鬼所使但服
此藥無不除愈卽前萬病紫苑方減羌活獨活防風
萬病丸療八種痞病五種癰病十種疰忤七種飛尸十二

種蠱毒五種黃病十二種瘡疾十種水病八種大風十二
種痺并風入頭眼翳膜漠漠及上氣咳嗽喉中如水雞聲
不得臥飲食不作肌膚五臟滯氣積聚不消壅閉不通心
腹脹滿及胸背鼓脹氣結四肢流入胸腹又治心膈氣滿
時定時發十年二十年不瘥五種下痢疳虫疣虫寸白諸
虫上下冷熱久積痰飲令人多眠睡消瘦無力陰入骨髓
便成漏疾身體氣腫飲食嘔逆腰腿痠疼四肢沉重不能
久行久立婦人因產冷入于臟腑中不淨或閉塞不通包
中瘀血冷滯出流不盡時時疼痛爲惡或因此斷產并小
兒赤白下痢及狐臭耳聾鼻塞等病服此藥以三九爲一
劑不過三劑其病悉除說無窮盡故稱萬病丸

牛黃細研

黃芩去芦

芫花醋炒

禹餘糧醋炒

雄黃飛研

芫蕒

人參去芦

紫苑去芦頭

蒲黃炒微

麝香研

當歸去

桔梗去

大戟炒

乾姜炮

防風去

黃連去

朱砂研

犀角鎊

前胡去

巴豆去皮心

細辛去

葶蘆炒

肉桂去粗

茯苓去

桑白皮炒

芍藥

川椒去目及閉口

芫青二十八

甘遂各一

蜈蚣去頭足

石蜥去頭尾足

芫青二十八

米同炒

石蜥去頭尾足

石蜥去頭尾足

芫青二十八

右為細末入研藥勻煉蜜為丸如荳大若一歲已下小兒有疾者令乳母服兩小荳大亦以吐利為度近病及卒病多服積病久疾即少服常服微溏利為度 卒病欲死服三九取吐利即瘥 卒中惡口噤服二九漿水下利即瘥 五疰鬼刺客忤服二九 男女邪病歌哭腹大妊娠者服二九日三夜一間食服之 蠱毒吐血

腹如刺服二九不瘥更服 瘧病未發前服一九未瘥

更服 諸有痰飲者服三九 冷癖日三服每服三九

皆間食常令微溏利 宿食不消服二九取利 癥瘕

積聚服二九日三服 拘急心腹脹滿心痛服三九

上氣嘔逆胸膈滿不得臥服二九不瘥更服 大痢服

二九日二服 疔蠱服二九或一九如杏仁大和醋二

合灌下部中 水病服三九日再服間食服之瘥止

人弱即隔日服 頭痛惡寒服二九覆取汗 傷寒天

行服二九日三服間食服之 小便不通服一九不瘥

明日更服 大便不通服三九又內一九下部中即通

耳聾停急以綿裹如棗核塞之 鼻衄服一九 瘡

腫疔腫破腫內一九如麻子大日一傅之赤根自出

犯疔腫血出以猪脂和塗有孔則內孔中瘥 癩瘡以

醋洗訖取藥和猪脂傅之。漏瘡有孔以一丸內孔中和猪脂傅上。痔瘡塗綿筋上內孔中即瘥。瘰癧以醋和塗上瘥。癬瘡以布揩令汗出以醋和塗上日一易瘥。胸背腰脇腫以醋和傅腫上日一易又服二丸。諸冷瘡積年不瘥者以醋和塗之。惡刺以一丸內瘡孔中即瘥。蝮蛇螫以少許內螫處若毒入腹心煩欲絕者服三丸。蜂螫以少許傅之瘥。婦人諸疾胞衣不下服二丸。小兒驚癇服一丸如米許以塗乳令小兒啣之看小兒大小加減。兒客忤服一丸如米大和乳塗乳頭令啣之以意量之。蝎螫以少許傅之瘥。小兒乳不消心腹脹滿服一丸如米許塗乳頭令啣之即瘥。

羅乾柿丸取虛實積下膈甚妙

朱砂研為衣

沒藥研

猪牙皂角去皮弦子為細末

乾姜炮為末

乾漆炒烟盡為末

京三稜炮為末

青礞石煨為末

水銀錢一錢鉛一錢結炒乾

巴豈三十粒去皮膜醋煮十沸

右件各研勻軟飯和為丸如葦葶大煎柿蒂湯冷下三五丸加減用婦人有胎不可服

小腸移熱於大腸為久癖為沉全文見診病傳變

千消石丸治癥瘕

硝石錢六

大黃錢八

人參

甘草各三錢

右各為末先將硝黃末以三年苦酒先煎候將乾却用參甘二末和勻為丸每二十九米湯下四日一服候下如雞肝或如米泔赤黑色等効下後忌風冷

羅醋煮三稜丸治一切積聚不拘遠年近日治之神効

熱積寒消之

京三稜

四兩醋煮透
竹筴切晒乾

川芎

二兩醋煮

大黃

半兩醋煮濕
布裹煨過

右三味同為末醋糊為丸如桐子大每三十九溫水下不拘時病甚者一月効小者半月効

羅神功助化散專治男子婦人腹中痞塊不拘氣血食積所成此方之妙不可盡述

地扁蓄

五錢

瞿麥

五錢

沉香

半錢

木香

半錢

右為細末淨依分兩和勻男以甘草淡竹葉二味等分煎湯及無灰酒同調服酒多於湯 婦人用紅花燈心

當歸等分煎湯及無灰酒同調服酒多於湯忌油膩動

氣之物及房事一月藥須用黃昏服大小便見惡物為

度神妙非常誓不輕傳匪人

聖散子治遠年積塊及婦人乾血氣

礞砂

六兩

大黃

八兩

乾漆

燒過

篇蓄

茴香

炒

如婦人乾血

氣加川山甲

二兩炮

右為細末每服三錢溫酒調下仰臥此藥只在心頭至天明大便如魚腸小便赤為驗取出並無毒有神効小兒用一錢十五已上五錢空心服之更効

寒積熱消之

寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血泣不得注於大經

血氣稽留不得行故宿昔而成積矣

海紅丸子治大人脾積氣滯胸膈滿悶面黃腹滿脹四肢

無力酒積不食乾嘔不止脾連心胸及兩乳痛婦人脾血

積氣諸般血癥氣塊及小兒食積骨瘦面黃肚脹氣急不

嗜飲食漸成脾虛不拘老少並宜服之

本草綱目卷之五

卷之五

京三稜五斤水浸軟分切作小片子 蓬木五斤 陳皮五斤揀淨

青皮五斤 胡椒三斤 乾姜二斤炮

右研六味同為細末醋糊為丸桐子大礬紅為衣每三

十九食後姜湯吞下

羅雞爪三稜丸治五臟痿痺氣塊

雞爪三稜 石三稜 京三稜 木香

青皮去白各半兩 礬砂三錢 檳榔

肉苳菘各一兩

右為細末生薑汁麪糊為丸桐子大生薑湯送下

礬砂煎丸消積磨塊一切凝滯

黑附子二枚各重五錢已上者炮裂去皮臍剉作菴子 木香三錢

草撥一兩 礬砂三錢 用水一盞 續續化在釜內火上熬乾

破故紙一兩隔紙微炒

右將飛過礬砂末封在附子釜內却用剉出附子末蓋口用和成白麪裹約半指厚慢火灰內燒勻黃色去麪用木香等為細末卻用元稞附子熟黃麪為末醋調煮糊為丸如桐子大每服十五丸至三十九生薑湯送此藥累有奇功

本治癥九治丈夫女人小兒年深日近沉積癥塊面色青黃時上搶心吐水吞酸舌生白沫婦人積年月經不調漸成血氣或血蠱塊中焦之間覆如杯椀連年累月漸成瘦瘠寒熱往來一切脾胃受寒久不瘥愈之疾並皆治之

巴菝五兩去油膜 蓬木三兩醋炙透 京三稜三兩醋炙透

丁香皮二兩 木香一兩 丁香半兩 厚朴三兩製

石菖蒲二兩 良姜一兩 蜚虫一兩半炒 川牛膝一兩

香附子四兩炒 石蓮子肉二兩 蒼苳仁一兩 史君子三兩去壳

醫方類聚卷之三

寒熱通用方

右為細末稀麪糊為丸如棗豈大積年癥瘕成塊者第一服用熟水下二十九丸自後每日三九五丸更量虛實加減與之五日去盡積塊若近脾胃有積者每服五丸米飲吞下一服取効婦人血氣成塊及血瘕每服二十丸用蘇木酒童子小便各一半煎五七沸令溫空心吞下自後每日用溫酒下三丸其血塊逐旋消從大小便去盡自知小兒疝重腹痛不能忍日夜叫喚百藥不效者陳皮湯下七丸立効諸虫皆宜下嘗服或白湯或姜湯下三五丸中酒及酒積大便鮮臭者白湯與酒各半吞十九丸立効如神一切咽塞心下硬痛皆用棗湯下五丸不拘時候

羅玄胡索丸治吐利腹脹心腹疝瘕瘕氣結虫煩不安順三焦和脾胃

玄胡索

當歸

青皮白去

雄黃飛

廣茂炮

木香

檳榔

京三稜炮各四兩

右為細末入雄黃末水糊為丸桐子大生姜湯下
荆蓬煎丸破痰癖消癥塊冷熱積聚胃膈症悶通利三焦升降陰陽順氣消食

京三稜

二兩酒浸冬三兩夏一日

枳殼炒一兩

廣茂二兩醋浸冬三

青皮白去

茴香炒微

檳榔各一兩

木香去根

右為細末水糊為丸豌豆大每服三十九丸生姜湯下

丹潤下丸治積塊方見咳嗽

世二賢散消積塊進食

橘紅一斤

甘草兩

鹽半兩

右用水二四碗從早煮至夜以爛為度水乾則添水晒

乾為末淡姜湯調下有塊者加姜黃半兩同煎藥煮
氣滯加香附二兩同煎藥煮 氣虛者加沉香半兩另
入噤口痢加蓮肉二兩去心另入

驚積

右自久積緩除條至此一十六方皆純是磨積之劑必
用補氣血藥相兼服之純用之致死乃醫殺之也謹之
驚風成塊者妙應丸加川山甲炒鱉甲燒各三錢玄胡索
蓬朮各四錢每五十九加至七十九以利為度妙應丸即
控涎丹方

茶積

丹茶癖喜吃茶及吃乾茶者

酒積

世酒積方累効
石膏 升麻 為末沙糖調服

- 烏梅肉一兩 半夏麩七錢 青木香錢四 枳實兩半
- 砂仁兩半 杏仁錢三 巴霜錢一 黃連酒浸一兩

虫積

右為末蒸餅丸菴荳大每八九白湯送下

褚澄傳云澄善醫為吳郡太守百姓李道念以公事到郡
澄見謂曰汝有重病答曰舊有冷病至今年久眾醫不瘥
澄為診曰汝病非冷非熱當是食白淪雞子過多所致令
取蒜一升煮食吐一物如升涎裹之開看是雞雛羽翅爪
距具足能行走澄曰此未盡更服餘藥又吐得如向者有
十三頭而病都瘥

衍有人病心腹懣煩彌二歲診曰腹有蠱誤食髮而然令
餌雄黃一劑少選吐一蛇如拇指無目燒之有髮氣乃愈
此殺毒虫之驗也

兩脇下積塊

右二方吐虫積之法也
丹治食積死血痰積成塊在兩脇動作腹鳴嘈雜眩運身
熱時作時止

黃連一兩半用茱萸益智同炒止用黃連 山梔半兩炒 川芎

神麴 桃仁去皮 三稜 蓬朮各半兩並醋煮

香附童便浸 山查各一兩 蘿蔔子炒一兩半

右麴糊丸又方有青皮半兩白芥子一兩半炒

治脇痛有塊龍薈丸二錢半起料方見治寒熱 加姜黃 桃仁各半兩

右蜜丸服

世小阿魏丸治脇下積塊

三稜醋炙 蓬朮醋製 青皮醋製 胡椒三錢

木香兩 麝香分 阿魏二錢

右為末醋煮陳倉米粉為丸桐子大

子和菓園劉子半妻腹中有塊如瓢十八年矣經水斷絕

諸法無措戴人令一月之內涌四次下六次取去痰約一

二桶其中不化之物有如葵葉黃爛魚腸之狀涌時以木

吐下法

如意攪之覺病積如括漸漸而平及積既盡塊痕反窪如
曰畧無少損至是而面有童色經水復行若當年少可以
有子

塊部分
痰食氣
血諸積
方

丹治塊在何部分 在中為痰飲 在右為食積 在左

為血積 潤下丸治痰積方見

阿魏丸去諸積

山查 南星皂角水浸 半夏同南星浸 麥牙

神麴 黃連各一兩 連翹 阿魏醋浸

瓜蒌 貝母各半兩 風化硝 石減

胡黃連 白芥子各二錢半 蘿蔔子蒸一兩

右為丸姜汁浸炊餅丸一方加香附蛤粉治嗽

羅破積導飲丸治內有積塊堅硬飲食不消心下痞悶

木香 檳榔 陳皮白去 青皮白去

本草綱目卷之五十一

枳殼炒

枳實炒

廣茂炒

京三稜炮

半夏湯洗七次

神麩炒

麥蘖炒

茯苓

乾姜

澤瀉

甘草炙各五錢

牽牛頭末六錢

巴豆三十枚去皮心膜

右為細末入巴豆霜令勻生薑汁打麩糊為丸如桐子大每服三十九溫姜湯送下食前

無小三稜煎治食癥酒痞血癥氣塊時發刺痛全不思食積滯不消心腹堅脹痰逆嘔噦噎酢吞酸

京三稜

蓬朮各四兩

芫花一兩去梗葉

右同入甕器中用米醋五升浸滿封器口以炭火煨令乾取出稜朮將芫花以餘醋炒令微焦焙乾為末醋糊

丸如棗豈大每十五丸生薑湯下

羅神効五食湯丸取虛實積氣食蠱脹積塊水氣年深痞

瘕並皆治之

大戟括去皮

甘遂生各半兩

猪牙皂角生去皮

胡椒生

芫花醋浸一宿取出炒各二兩

巴豆去皮膜心醋煮

二十餅
研半兩

右件除巴豆杵羅為末入巴豆再研勻水煑麵糊為丸

如棗豈大每服五七丸氣實者十九夜臥水一盞入白

米白麩黑豈生菜猪肉各少許煎至半盞去查候湯溫

下藥取下病忌油膩粘滑物婦人有胎者不可服

必効療癖取車下杏仁微湯退去皮及重仁者與乾麩相

拌搗為餅如麩乾和淡水如常溲麩法作餅大小一如病

人掌為二餅微炙黃至熟空腹食一枚當大利如不利更

食一枚或飲熱粥汁以利為度若至午後利不止即以醋

飲止之利後當虛病未盡者日里力一二日更進一服以病

醫方類聚卷之五十一

七

盡為限小兒亦以意量之不得食酪及牛馬肉等無不効

丹保和丸治食積酒積方見傷食

阿魏丸治肉積及飽食停滯胃壯者宜此脾虛者勿服

山查 蘿蔔子 神麴 麥芽

陳皮 青皮 香附各二兩 阿魏一兩醋煮

研 右炊餅丸

又方龍薈丸加白鴿糞大能消食積或入保和丸

羅流氣丸治五積六聚癥瘕癖塊留飲

木香 川茴香炒 青皮 廣茂炮

陳皮去 蘿蔔子炒 補骨脂炒 葶澄茄

砂仁 神麴炒 麥蘖炒 枳殼炒各

牽牛半兩 檳榔一兩

右為細末麩糊為丸如桐子大食後每服三十九丸細嚼

白苴薏仁一枚白湯送下

丹治血塊丸

海粉醋 三稜醋 蓬朮 桃仁

紅花 五靈脂 香附 石城

右為丸白木湯吞下

本主癥積滿腹諸藥不瘥者取白馬尿服之愈

世治腹中有塊猪腰子一雙切薄片木鑿子肉一兩與猪

腰片相間縛定外用濕紙包火內煨熟取出去紙搗盆內

搗如泥入黃連末和為丸每服廿丸烏梅甘草湯吞下第

二服廿五丸三服三十九丸漸加至以痛為度大便利其塊

自消有神効

積有常處屬藏聚無常處屬府

難病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚

故積者五臟所生聚者六腑所成也積者陰氣也其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者陽氣也其始發無根本上下無所留止其痛無常處故謂之聚故以是別知積聚也五十五難○治聚法見末條仲病有積有聚有繫氣何謂也師曰積者臟病也終不移聚者腑也發作有時展轉痛移為可治繫氣者脇下痛按之則愈復發為繫氣

肝積面青脈弦長定在左脇下

素青脈之至也長而左右彈有積氣在心下支胛名曰肝痺得之寒濕與疝同法腰痛足清頭脈緊是也五藏生成篇難肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不愈令人發欬逆噎膈連歲不已以季夏戊巳日得之何以言之肺病傳肝肝當傳脾脾季夏適王王者不受邪肝復欲還肺肺不肯受故留結為積故知肥氣以季夏戊巳日得之

五十六難

肝脈微急為肥氣在脇下若覆杯全文見治虛實法

心積面赤脈數實定在心下

素赤脈之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名曰心痺得之外疾思慮而心虛故邪從之五藏生成篇帝曰病有少腹盛上下左右皆有根此為何病可治否岐伯曰病名曰伏梁帝曰伏梁何因而得之岐伯曰暴大膿血居腸胃之外不可治治之每切按之致死帝曰然何以故岐伯曰此下則因陰必下膿血上則迫胃脘生膈俠胃脘內瘕此久病也難治居臍上為逆臍下為從勿動亟奪腹中論云生當作出林註云太素俠胃作便胃帝曰人有身體髀骨股肱皆腫環臍而痛是為何病岐伯曰病名伏梁此風根也其氣溢於大腸而着於育育之原在臍下故環臍而痛也不可動之動之為水瀦瀦之病同

脾積面黃脈大而虛定在中脘

難心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下久不愈令人病煩心以秋庚辛日得之何以言之腎病傳心心當傳肺肺秋適王王者不受邪心復欲還腎腎不肯受故留結為積故知伏梁以秋庚辛日得之五十心脈微緩為伏梁在心下上下行時唾血全文見治虛實法素黃脈之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風是也五藏生成篇疝當作痞字難脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不為肌膚以冬壬癸日得之何以言之肝病傳脾脾當傳腎腎以冬適王王者不受邪脾復欲還肝肝不肯受故留結為積故知痞氣以冬壬癸日得之十四脾脈微大為痞氣腹大臞血在腸胃之外全文見治虛實法

肺積面白脈數而浮定在右脇

素白脈之至也喘而浮上虛下實驚有積氣在胸中喘而虛名曰肺痺寒熱得之醉而使內也五藏生成篇喘謂脈躁數也難肺之積名曰息賁在右脇下覆大如杯久不已令人洒淅寒熱喘咳發肺壅以春甲乙日得之何以言之心病傳肺肺當傳肝肝以春適王王者不受邪肺復欲還心心不肯受故留結為積故知息奔以春甲乙日得之五十肺脈滑甚為息賁主氣全文見虛實法素黑脈之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎痺得之沐浴清水而臥是也難腎之積名曰贲豚發於少腹上至心下若豚狀或下或上無時久不已令人喘逆骨痠少氣以夏丙丁日得之何以言之脾病傳腎腎當傳心心以夏適王王者不受邪腎復欲還脾脾不肯受故留結為積故知贲豚以夏丙丁日

腎積面黑脈寸口大實定在心腹

得之五十六難

腎脈微急為沉厥奔豚足不收不得前後全文見治虛實法

垣肝之積肥氣丸治積在左脇下如覆杯有頭足久不愈

令人咳逆瘖瘖連年不已

治五積法

厚朴兩半

黃連錢七

柴胡兩

椒去汗目閉不用四錢

巴豆霜五分

川烏炮去皮臍錢二分

乾姜五分

皂角去皮弦子煨一錢半

白茯苓一錢

廣茂炮

昆布

人參各二錢半

甘草三錢

右除茯苓皂角巴豆外為極細末再另研巴豆霜旋旋入和勻煉蜜丸如桐子大初服二九一日加一九二日加二九漸加至大使微溏再從兩九加服周而復始積減大半勿服

右後積藥依此法服之春夏秋冬另有加減法在各條

下秋冬加厚朴一半通前重一兩減黃連一錢半若

風癰於一料中加人參茯苓菖蒲各三錢黃連只依春

用七錢雖秋冬不減淡醋湯送下空心服

加減肥氣丸 仲夏合此治同前

柴胡

厚朴各半兩

黃連兩

川椒

甘草各五分

巴霜三錢

乾姜兩半

肉桂二錢

人參兩半

川烏三錢

右除巴豆末外同為細末旋入巴霜研勻煉蜜丸如桐子大初服二九一日加一九二日加二九漸加至大使微溏再從二九加服淡醋湯下空心服利大便秘行秋冬去生姜半錢加厚朴一倍減黃連一半

心之積伏梁丸治起臍上大如臂上至心下久不愈令人

心煩

黃連半兩 人參半兩 厚朴去皮姜製半兩 黃芩去皮三錢
 肉桂錢一 乾姜 巴荳霜 川烏焙去皮各五錢
 分 紅荳 茯神去皮各一錢 丹參炮一錢
 菖蒲五分

右除巴荳霜外為末另研荳霜旋入和勻煉蜜為丸如
 桐子大初服二九一日加一九二日加二九漸加至大
 便微澹再從二九加服淡黃連湯下食遠周而復始即
 減半勿服秋冬加厚朴半兩通前共一兩減黃連半兩
 只用一兩黃芩不用

脾之積痞氣丸氣在胃脘腹大如盤久不愈令人四肢不
 收發黃疸飲食不為肌膚

厚朴製半兩 黃連去鬚八錢 吳茱萸洗二錢 黃芩二錢
 白茯苓另為末澤瀉各一錢 澤瀉各一錢 巴荳霜另研四分 乾姜炮一錢五分

白朮錢二 川烏炮去皮臍五分 人參錢一 茵陳半錢
 縮砂半錢 桂四分 川椒炒五分
 右除巴荳霜茯苓另研為末旋入外餘藥同為細末煉
 蜜為丸如桐子大初服二九一日加一九二日加二九
 漸加至大便微澹再從二九加服淡甘草湯下食遠周
 而復始積減大半勿服
 加減痞氣丸 孟秋合此

黃芩酒製三分 厚朴錢一 黃連酒製製酒 半夏各五分
 益智三分 吳茱萸三分 紅花五分 青皮二分
 歸尾三分 澤瀉五分 茯苓 神麴
 廣茂 昆布各二分 橘皮去白三分 熟地二分
 人參二分 附子分 甘草炙 巴荳霜
 葛根各二分

右為末蒸餅為丸桐子大初服二九一日加一九二日加二九漸加至大便微澹再從二九加服淡甘草湯送下

肺之積息奔丸 治左右脇下覆大如杯久不已令人洒淅寒熱喘咳嗽發肺癰

厚朴姜製八錢 黃連炒一兩 乾姜炮一錢 桂枝去皮一錢

巴苳霜四分 白茯苓一錢 川烏炮去皮一錢 川椒去汗一錢

人參二錢 桔梗一錢 紫苑去苗一錢 青皮五分

陳皮 京三稜炮 天門冬 白苳蔻各錢

右除茯苓巴苳霜旋入外餘藥為末煉蜜丸如桐子大每服二九一日加一九二日加二九加至大便微澹再從二九加服煎淡生姜湯送下食遠周而復始積減大半勿服秋冬加厚朴五錢通前一兩三錢黃連

用六錢

加減息奔丸 仲夏合此其積為病寒熱喘咳氣上奔脈瀦失精亡血氣滯則短氣血凝泣則寒熱相參氣分寒血分熱治法宜益元氣洩陰火破氣削其堅也

川烏錢一 乾姜錢一 人參二錢 陳皮錢八

黃連二兩 紫苑一錢 桂枝二錢 巴苳霜四分

厚朴半錢 青皮七分 川椒炒去汗一錢 紅花少許

茯苓半錢 桔梗一錢 白苳蔻一錢 京三稜半錢

天門冬去心半錢

右件為末湯泡蒸餅為丸如桐子大初服二九一日加一九二日加二九加至大便微澹為度再從二九加服煎生姜湯送下食前忌酒濕麪辛辣生冷之物腎之積奔豚丸發於小腹上至心下若豚狀或上下無時

久不已令人喘逆骨痠少氣及治男子內結七疝女子瘕聚帶下

苦練酒煮黃連炒五錢 白茯苓二錢 澤瀉二錢

川烏炮五錢 芎藭二錢 玄胡索一錢 全蝎一錢

附子錢 巴豆霜分 厚朴姜製 獨活錢

丁香分 肉桂分

右除巴豆霜茯苓另為末旋入外餘藥為細末煉蜜丸

如梧子大初服二九一日加一丸二日加二丸漸加至

大便微澹再從二九加服淡鹽湯送下食遠周而復始

病減大半勿服秋冬加厚朴半兩通前用一兩二錢

如積勢堅大先服前藥不減於一料中加存性牡蠣三

錢疝帶勿加 如大積大聚消其大半乃止藥過劑則

死 如積滿腹或半腹先治其所起是何積當先服本

藏積藥諸疾自愈是治其本也餘積皆然 如服藥人悶

覺熱加黃連 如服藥人氣短加厚朴 如服藥人悶

亂減桂

潔肝之積伏梁溫白丸加柴胡川芎治之 心之積肥氣

溫白丸加芎藭黃連桃仁治之 脾之積痞氣溫白丸加

吳茱萸乾姜治之 肺之積息奔溫白丸加人參紫苑治

之 腎之積奔豚溫白丸加丁香茯苓遠志治之溫白丸方見前

丹賈福六舅子十餘歲左脇有塊能飲食

青皮細切 三稜 柴胡三錢 桂枝

川芎 防風各二錢 白朮二錢 木通一錢

海藻一錢 甘草半錢

右分十貼煎取半盞下保和丸十五粒忌一切

無肥氣丸治用之積氣在脇下如覆杯其脈弦而細

青皮炒 當歸各 蒼朮各一兩半 蛇含石煨醋
 蓬木 三稜各二兩 鐵平粉各二兩
三稜蓬朮同入 醋煮一伏時

右為末醋煮米糊丸菴荳大每服四十九當歸酒下

海治伏梁在心下結聚不散用桃奴三兩為末空心温酒
 調下桃奴是桃實着樹不落者正月採樹上乾桃子是也

出聖 本治肺喘久不愈為息賁五靈丸

五靈脂二兩 木香兩 馬兜零去壳炒
 葶藶

右為細末枣肉和丸如桐子大每服二十九生薑湯下
 日二

肺之積名曰息奔在右脇下大如杯令人洒浙寒熱喘嗽

發肺癰棗膏丸

葶藶 陳皮 桔梗各等分

右下二味為末入葶藶研勻煑肥枣肉和丸如桐子大
 每服五七丸飲下予嘗患停飲久瀆肺經食已必噎喘
 覺肺系大急服此良驗

定喘急肺積葶藶丸

苦葶藶一兩 當歸 肉桂 白蒺藜
 鱉甲 川烏頭 乾姜 吳茱萸

大杏仁 茯苓 人參各五錢 栝榔兩
 右為細末煑枣肉和杵丸如桐子大每服二三十丸姜

枣湯下日四服不拘時候

師曰奔豚病從小腹起上衝咽喉發作欲死復還止皆從
 驚恐得之故越人曰驚者神上越也仲景謂奔豚從驚恐得之蓋奔豚病上衝

神上越也神上越者隨奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱奔豚湯主之

甘草

芎藭

當歸各二兩

半夏四兩

黃芩二兩

生姜三兩

芍藥二兩

乾葛一兩三錢

甘李根白皮一升焙乾

右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三夜一服

茯苓桂枝甘草大棗湯治臍下悸欲作奔豚 桂枝加桂湯治奔豚氣從小腹上至心已上二方並見傷寒

無散聚湯治有塊痛無常處展轉動移

半夏

枳榔

當歸各一兩

陳皮

杏仁去皮尖

桂心各二兩

茯苓

甘草炙

附子炮去皮臍

川芎

枳殼炒

吳茱萸湯洗

厚朴姜製各一兩

右劉散每四錢水一盞半煎七分去查食前服

運氣

運氣積塊皆從濕土經云土太過曰敦阜敦阜之化其氣滯積并穢是也

雜方

琥珀膏貼塊方見瘡疽門下 又貼塊三聖膏用石灰十兩細篩過炒紅急用好醋燉成膏入大黃末一兩官桂末半兩攪勻以瓦器封貯紙攤貼患處火烘熱貼大黃須錦紋者

世又貼塊

白鴿糞二兩

白芷三兩

硫黃

白蘇

木鱉子肉各一兩

右為末用麩水調和傅患處

丹貼積聚塊

大黃

朴硝各一兩

各為末大蒜搗膏和勻貼之

外集驗尉癥吳茱萸三升碎之以酒和煮熱布裹尉癥上

診

冷更炒更番用之癥移走逐熨之候消乃止

靈黃帝曰人之善病腸中積聚者何以候之少俞答曰皮

膚薄而不澤肉不堅而淖澤如此腸胃惡惡則邪氣留止

積聚乃傷脾胃之間寒溫不次邪氣稍至稽積留止大聚

乃起五變

胃中有癖食冷物者痛不能食食熱則能推而外之內

而不外心腹積也全文見諸脈診病雜文

難人病有沉滯久積聚可切脈而知之耶然診病在右脇

有積氣得肺脈結脈結甚則積甚結微則氣微診不得肺

脈而右脇有積氣者何也然肺脈雖不見右手脈當沉伏

其外痼疾同法耶將異也然結者脈來去時一止無常數

名曰結也伏者脈行筋下也浮者脈在肉上行也左右表

裏法皆如此假令脈結伏者內無積聚脈浮結者外無滯

疾有積聚脈不結伏有痼疾脈不浮結為脈不應病病

應脈是為死病也十八難

仲諸積大法脈來細而附骨者乃積也寸口積在胸中微

出寸口積在喉中關下積在臍傍上關上積在心下微下

關積在少腹尺中積在氣衝脈出在左積在左脈出在右

積在右脈兩出積在中央各以其部處之

素太陰瀦則病積心腹時滿厥陰瀦則病少腹積氣少陰

瀦則病積澁血陽明瀦則病積時善驚太陽瀦則病積時

善顛疾少陽瀦則病積時筋急目痛四時刺論寸口脈沉

而橫曰脇下有積腹中有橫積痛平人氣象論即動脈

也狀脈厥如豆不升降

脈左手脈橫癥在左右手脈橫癥在右脈頭大者在上頭

小者在下脈遲而滑中寒有癥結偏得洪實而滑為積

弦緊亦為積為寒痺為疝痛內有積不見脈難治見一脈相應為易治諸不相應為不治脈弦腹中急痛腰背痛相引腹中有寒疝瘕脈弦緊而微細者瘕也夫寒痺瘕瘕積聚之脈皆弦緊若在心下即寸弦緊在胃腕即關弦緊在臍下即尺弦緊脈弦小者寒痺

心肺有積痺其脈皆喘數經云赤脈之至也喘而堅診曰有積氣在中名曰心痺白脈之至也喘而浮上虛下實有積氣在胸中喘而虛名曰肺痺是也

肝有積其脈弦長而青經云青脈之至也長而左右彈有積氣在心下支肱名曰肝痺是也

脾腎有積痺其脈皆大經云黃脈之至也大而虛有積氣在腹中黑脈之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰

腎痺王註云上謂寸口是也全文見上藏府條

脈診人心腹積聚其脈堅強急者生虛弱者死脈弦而伏者腹中有癥不可轉也必死不治

三部之積皆由虛生

靈黃帝問曰夫百病之始生也皆生於風雨寒暑清濕喜怒喜怒不節則傷臟風雨則傷上清濕則傷下三部之氣所傷異類愿聞其會岐伯曰三部之氣各不同或起於陰或起於陽請言其方喜怒不節則傷臟臟傷則病起於陰也清濕襲虛則病起於下風雨襲虛則病起於上是謂三部

部至於其淫泆不可勝數百病始生篇下同是故虛邪之中人

也始於皮膚皮膚緩則腠理開開則邪從毛髮入入則抵深深則毛髮立毛髮立則淅然故皮膚痛留而不去則傳舍於絡脈在絡之時痛於肌肉其痛之時息大經乃代留而不去傳舍於經在經之時洒淅善驚留而不去傳舍於輸在輸之時六經不通四肢則肢節痛腰脊乃強留而不

風雨蒙
虛之積

去傳舍於伏衝之脈在伏衝之時躡重身痛留而不去傳
舍於腸胃在腸胃之時責嚮腹脹多寒則腸鳴飧洩食不
化多熱則溏出麤留而不去傳舍於腸胃之外募原之間
已上數端皆邪氣襲虛留而不解去以次相傳未曾留
着無有定所若留着而有定所則不能傳矣所謂留着
者當如下文法云

留着於脈積留而不去息而成積或着孫脈或着絡脈或
着經脈或着輸脈或着於伏衝之脈或着於脊筋或着於
腸胃之募原上連於緩筋邪氣滂泆不可勝論 其着孫
絡之脈而成積者其積在來上下臂手孫絡之居也浮而
緩不能拘積而止之故往來移行腸胃之間水溲滲注灌
濯濯有音有寒則膜膜滿雷引故時切痛 其着於陽明
之經則挾臍而居飽食則益大飢則益小 其着於緩筋

清濕襲
虛之積

也似陽明之積飽食則痛飢則安 其着於腸胃之募
也痛而外連於緩筋飽食則安飢則痛 其着於伏衝之
脈者揣之應手而動發手則熱氣下於兩股如湯沃之狀
其着於脊筋在腸後者飢則積見飽則積不見按之不
得 其着於輸之脈者閉塞不通津液不下孔竅乾壅此
邪氣之在外入內從上下也 此謂風雨襲陰之虛
病起於上而積生也
黃帝曰積之始生至其已成奈何岐伯曰積之始生得寒
乃生厥乃成積也黃帝曰其成積奈何岐伯曰厥氣生足
惋足惋生脛寒脛寒則血脈凝滯血脈凝滯則寒氣上入
於腸胃入於腸胃則膜脹膜脹則腸外之汁沫迫聚不得
散日以成積卒然多食飲則腸滿起居不節用力過度則
絡脈傷陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則血內
溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血溢於腸外腸外有寒

喜怒傷藏之積

汁沫與血相搏則并合凝聚不得散而積成矣卒然外中於寒若內傷於憂怒則氣上逆氣上逆則六輸不通溫氣不行凝血蘊裏而不散津液瀦滲着而不去而積皆成矣

此謂清濕鬱陰之虛病起於下而成積也

針灸

怒傷肝醉以入房汗出當風傷脾用力過度若入房汗之

浴則傷腎此謂喜怒傷臟病起於陰也風雨鬱陰之虛則病起於上而生積清濕鬱陰之虛則病起於下

皆受病其積方成矣此內外三部之所生病者也黃帝曰善治之奈何岐伯對曰察其所痛以知其應有餘不足當

補則補當瀉則瀉毋逆天時是謂至治

手少陰筋病內急心承伏梁下為肘網治在燔針劫刺以知為數以痛為輸其成伏梁唾血膿者死不治

手太陰筋病甚成息奔脇急吐血手心主筋病胸痛息奔

皆治在燔針劫刺以知為數以痛為輸經文並見經筋

癥瘕積塊先於塊上針之甚者又於塊前一針塊尾一針立應針訖灸之 又三里灸之

玉氣塊 照海 內關 通谷 又積塊 章門 中腕

灸皆三報之 氣海 天樞 上腕 通谷避用

甲傷憂煩思氣積中腕主之 腹中積上下行懸樞主之

大腸轉氣按之如覆杯熱引胃痛脾氣寒四肢煩不嗜

食脾俞主之 腹中積聚時切痛商一作曲主之 胞中

有大疝瘕積與陰陽相引而痛苦涌泄上下出補尺澤太

谿手陽明寸口皆補之

摘伏梁氣狀如覆杯 上腕 三里

甲息奔時唾血巨缺主之 息奔脇下氣上衝胸中有熱

期門主之

撮奔豚氣

水道二十壯瀉之

桑奔豚搶心不得息并疝

玉泉三十壯即中極穴

章門五十壯

又法奔豚氣攻心脇痛滿淹淹欲絕急先用湯洗手足數

數易之却取下穴

氣海

期門

關元

各五壯

玉疝氣衝心欲死

關門

在玉莖旁二十七壯針入

甲臏豚腹腫章門主之

奔豚上下期門主之

少腹積

聚勞宮主之

奔豚卵上入痛引莖歸來主之

臏豚上

腹臏堅痛引陰中不得小便兩丸齋陰交主之

臏豚氣

腹臏痛舌強不能言莖腫先引腰後引小腹腰臏少腹堅

痛下引陰中不得小便兩丸齋石門主之

臏豚寒氣入

小腹時欲嘔傷中溺血小便數背臏痛引陰腹中窘急欲

湊後泄不止關元主之

臏豚上搶心甚則不得息忽忽

少氣尸厥心煩痛飢不能食善寒中腹脹引臏而痛小腹

與脊相控暴痛時窘之後中極主之

婦人血積

丹婦人有塊多是血塊

當歸丸治婦人月經不調血積証

當歸

赤芍

川芎

熟地

廣茂

京三稜

各半錢神麩

百草霜

各二錢半

右為細末酒糊為丸桐子大溫水下

本牛膝根淨洗切焙乾搗下酒煎溫服治婦人血塊立効

右輕劑

重劑

杜尚書媳婦馬氏年三十二腹中血塊作疼經五六年形

已骨立衆皆曰不可為奈其未死何家甚貧而大小愆之

一日召杜至告杜曰但以濟物為懷則可業已請召明公

非所言也遂以少物帛贈杜杜不受曰但服某藥必獲安

無以是為疑遂示方用沒藥牛膝乾漆當歸各半兩硃砂木香水蛭炒紅娘子炒紅花牡丹皮硃砂各一分海馬一箇班猫去翅足炒十四箇為末酒醋各半升熬為膏每日天明用一皂子大酒醋化下一月病退六十日漸安果如其言

右重劑

熟劑

垣加減四物湯治婦人血積

當歸

川芎

芍藥

熟地

廣茂

桂皮

京三稜

乾漆

右為粗末每服二錢水二盞煎法如常食前

大黑神丸

神麩

茴香

木香

川椒

丁香

檳榔

乾漆

長湯煮半日令香

右除椒漆外五物皆半生半炒為細末用前生熟漆和丸如彈子大又用茴香十二兩鋪陰地陰乾候外乾并茴香收器中至乾去茴香用治腎氣膀胱痿痺及疝墜五隔血崩產後諸血漏下赤白並一丸分四服死胎一丸皆綿灰酒下 若難產炒葵子四十九粒杵碎酒煎下 諸疾不過三服痰氣十服膈氣癥癖五服血瘕三丸一婦有塊如杯每發痛不可忍諸藥莫愈投此丸盡三服杯氣盡消終身不復作矣 雲沒藥散治一切血氣臍腹撮痛及產後惡露不行兒枕痛

血竭

沒藥

桂心

當歸

蒲黃

紅花

木香

玄胡索

乾漆

赤芍

各等分

右為極細末每服二錢熱酒調下食前若血塊衝心痛甚危者以大順散三錢酒調服立止

牡丹散治婦人久虛羸瘦血塊走疰心腹疼痛

牡丹皮 桂心 當歸 玄胡索各一兩

義木 牛膝 赤芍各三兩 京三稜一兩

右為粗末每服三錢水酒各半盞

羅木香 硃砂 九治婦人瘰癧積聚血塊刺痛脾胃虛寒宿食不消久不瘥者

丁香 硃砂研 木香 官桂

附子炮 乾漆炒烟 細墨 大黃炒

乳香 廣茂 青皮 京三稜

巴豆霜減 沒藥研 猪牙皂角 乾姜炮各

右除硃砂乳香沒藥外同為細末以好醋一升化開

砂去查脚入銀器中慢火熬次下巴豆霜大黃末熬

膏將前藥末與膏為丸如麻子大每服三五丸食後

溫水送下加至大便利為度

寒劑 治血積狹熱之証於產後血塊求之

大桃仁煎治婦人血痕血積經候不通出干金方

桃仁去皮尖 大黃 蜚虫 朴硝

右四味末之以醇醋二升半銀石器中慢火煎取一升

五合下桃仁大黃蜚虫等不住手攪干下次下朴硝更

不住手攪良久出之丸如桐子大前一日不用吃晚飯

五更初用溫酒吞下五丸日午取下如黑豈汁雞肝蝦

蟆衣未下再作見鮮血即止即以調氣血藥補之

腸覃生於腸外月事時下石痕生於胞中月事不以時下

二病皆似蠱脹並見張門

針灸

脈診婦人疝癖積聚脈弦急者生虛弱者死

產實

胎前產後積

素黃帝問曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞亦無殞也帝曰愿聞其故何謂也岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死至真要論

四血塊如盤有孕難服峻劑此方主之

香附醋煮

桃仁去皮尖

海粉醋煮

白朮兩

麩糊丸服

消汚血方

南山婦人年三十八於九月廿三日月經行比前過後十日得草藥以敗血海為下胎之謀有數滴血下因此腹痛在小腹下有塊如碗大不可按湯熨則痛稍定大小便抽痛小便澁大便畧下少赤積垢食不進口畧渴發熱此胃

氣為草藥所敗加以受傷之血妄行而不得洩所以為

砂仁分三

甘草分三

滑石半錢

川芎

黃芩各三分

牛膝錢二

桃仁七箇

水酒煎服

保芍藥湯治產後諸積不可攻宜養陰去熱其病自安

芍藥斤一

黃芩

茯苓各六兩

右散每半兩水煎日三服温

丹產後消血塊

滑石錢三

沒藥錢二

血竭錢二

右為細末醋糊丸如惡露不下以五靈脂為細末麩糊丸白朮湯陳皮湯送下

又消血塊

香附童便浸

桃仁去皮尖

為末醋糊丸

息積

氣證

素帝曰病脇下滿氣逆二三歲不已是為何病岐伯曰病名曰息積此不妨於食不可刺灸積為導引服藥藥不能獨治也奇病論○王註云氣逆息難故名息積也用息奔法治之亦可

無磨積丸

胡椒一百五十粒 木香二錢 全蝎十枚

右為末粟米丸棗莖大每十五丸陳皮湯下

化氣湯治息積

砂仁 桂心 木香各二錢 甘草炙

茴香炒 丁香皮 青皮炒 陳皮

乾姜 蓬朮炮各半兩 胡椒 沉香各一錢

右為末每服二錢姜蘇鹽湯調下婦人醋湯服

道引陳無擇云導引法隨意行之皆可愚謂或按摩滿處或手足相屈伸或八段錦或六字氣之類以氣通為効

面候

面腫頰腮痛 面熱面寒 面青
面塵 面赤 面黃 面白 面黑 頰車病

黃帝曰首面與身形也屬骨連筋同血合於氣耳天寒則裂地凌水其率寒或手足懈墮然而其面不裂何也岐伯答曰十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其精陽氣上走於目而為睛其別氣走於耳而為聽其宗氣上出於鼻而為臭其濁氣出於胃走唇舌而為味其氣之津液皆上薰於面而皮又厚其肉堅故天熱甚寒不能勝之也邪氣臟腑病形篇

面腫頰腮痛

朱奶兩腮熱腫膈壅之病也

乾葛 桔梗半錢 升麻一錢 蘇葉半錢

甘草炙七分 薄荷一錢 姜片 水煎服

表熱

恒咽痛頰腫脈洪大面赤者羌活勝濕湯加黃芩桔梗甘草各半錢治之如耳鳴目黃頰頰腫頸肩臑肘臂外後廉痛面赤脈洪大者以羌活防風甘草藁本通其經血加黃連黃芩消其腫以人參黃芪益其元氣而瀉其火邪

丹兩腮腫細辛草烏等分為末入蚌粉以猪脂調傳腫處口含白梅置腮邊良久腫退出涎患消矣消時腫必先向

世治疔腮

竹葉 車前草 栝子仁 杵碎熱傳患處

腮腫用赤小豨末傳之立効

疔疔腮雞子青調赤小豨末及喉下諸般腫痛用蝸牛飛麩研勻貼腫處

風 素面腫曰風 平人氣象論

千主卒中風頭面腫杵杏仁如膏傳之

針灸面頰腫痛有三法 其一取手陽明經云頰痛刺足陽明曲周動脈見血立已

不已按人迎于經立已又云厥胸滿面腫脣潔潔然暴言難甚則不能言取足陽明又云厥頭痛面若腫起而煩心取之足陽明太陰為煩心也又云頰痛刺手陽明與頰之

盛脈出血是也 其二取手太陽經云手太陽之脈是動則頰腫不可以顧

所生病者目黃頰痛視盛虛熱寒陷下取之也 其三取手足太陽經云三焦手少陽之脈所生病者頰痛

又云膽足少陽之脈所生病者頰腫視盛虛熱寒陷下取之也又云肝氣逆則頭痛耳聾頰痛取血者蓋取足少陽

之血也

東面赤頰熱惡風寒領痛 搯竹 玉枕壯三 巨窮壯五

壯

集頰腫生瘡名枯曹風 合谷 列缺 地倉 頰庫應不

再取人中 承漿 玉液 金津 三里

甲面腫目癢腫刺陷谷出血立止 頰腫唇癢頰主之

頰腫痛天窓主之 頰腫口急頰車痛不可以嚼頰車

主之

面寒面熱

丹面熱火氣因鬱熱 面寒因胃虛

面熱為胃熱

但飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生大熱有時

而火上行獨燎其面針經云面熱者足陽明病

羅面熱○湯郎中之內五十一歲身骨肥盛已酉春患

目昏悶面赤熱多服清上藥不効詰予治之診其脈洪大

而有力內經云面熱者足陽明病脈經云陽明經氣盛有

餘則身已前皆熱况其人素膏梁積熱於胃陽明經多血

多氣木實則風熱上行諸陽皆會於頭目故面熱之病生

矣先以調胃承氣湯七錢加黃連三錢犀角一錢疎下三

兩行徹其本熱次以升麻加黃連湯去經絡中風熱上行

如此則標本之邪俱退矣

升麻加黃連湯

升麻 葛根各一錢 白芷七分 甘草炙五分

白芍五分 酒黃連四分 生犀末三分 川芎三分

荆芥穗三分 薄荷三分

右剉如麻荳大用水半盞先浸川芎荆芥薄荷外都作

一服水二盞煎至一盞入先浸三味同煎至七分去查
食後溫服數服愈忌酒濕麪五辛之物

咳逆停息不得臥面熱如醉此為胃熱上衝薰其面茯苓
桂枝五味甘草湯加大黃以利之前文方見喘不得臥

面寒為胃寒

羅面寒○真定維摩院尼長老六十一歲身體瘦弱已酉
十月間病頭面不耐寒氣弱不敢當風行諸治不效予診
之其脈皆弦細而微且其人年高素食茶菓而已陽明之
經本虛脈經云氣不足則身已前皆寒慄又加看誦損氣
由此胃氣虛經絡之氣亦虛不能上榮頭面故惡風寒先
以附子理中丸溫其中氣次以升麻湯加附子主之

升麻

葛根

白芷

黃芪各七分

甘草各五分

黑附子七分 人參

草薺各五分

益智仁三分

右判如麻苳大都作一服水三盞連鬚白葱頭二莖同
煎一盞去查溫服食前數服良愈

升麻湯辨 或曰升麻加黃連湯治面熱升麻加附子湯
治面寒有何依據答曰出自仲景雲岐子註傷寒論中辨
葛根湯云尺寸脈俱長者陽明受病也當二三日發以其
脈夾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得臥此陽明經受病
也始於鼻交頰中從頭至足行身之前為表之裏陽明經
標熱本實從標脈浮而長從本脈沉而實陽明為病蒸蒸
而熱不惡寒身熱為標病陽明本實者胃中燥鼻乾目疼
為本病陽明為肌肉之本禁不可發汗在本者不禁下發
之則變黃症太陽主表榮衛是也榮衛之下肌肉屬陽明
二陽併病葛根湯主之衛者桂枝榮者麻黃榮衛之中桂
枝麻黃各半湯主之榮衛之下肌肉之分者葛根湯主之

又名解肌湯故陽明為肌肉之本非專於發汗止汗之治
桂枝麻黃兩方互併為一方加葛根者便作葛根湯故榮
衛肌肉之次也桂枝芍藥生姜甘草大棗止汗有麻黃桂
枝甘草發汗葛根味薄獨加一味者非發汗止汗也從葛
根以解肌故名葛根湯錢仲易制升麻湯治傷寒瘟疫風
熱壯熱頭痛肢體痛瘡診已發未發用葛根為君升麻為
佐甘草芍藥安其中氣朱奉議作活人書將升麻列作陽
明經解藥予診楊氏婦陽明經標本俱實先攻其裏後瀉
經絡中風熱故用升麻湯加黃連以寒治熱也尼長老陽
明經標本俱虛先實其裏次行經絡故用升麻湯加附子
以熱治寒也仲景乃羣方之祖信哉

面青 面塵

肝木

難肝外證面青善潔善怒十六

運氣面塵有二

一曰燥金制肝經云陽明司天燥淫所勝民病嗌乾面塵
又云陽明在泉燥淫所勝病嗌乾面塵又云金鬱之發嗌
乾面塵宜治以濕劑是也

二曰火經云少陽之復厥氣上行面如浮塵目乃睵瘕治
以寒劑是也

針灸面塵皆取肝膽二經經云肝足厥陰之脈是動病甚
則嗌乾面塵脫色又云膽足少陽之脈是動病甚則面微
有塵皆視盛虛熱寒陷下取之也

面赤

心火 表

難心外證面赤口乾善笑十六
面赤為邪氣怫鬱在經宜表不宜下
仲景云下利脈沉而遲其人面赤身有微熱下利清穀者

以鬱冒汗出而解此面赤亦表而解也
運氣面赤皆屬寒經云太陽司天寒淫所勝民病面赤目
黃治以熱劑是也

針灸面赤皆取心主經云心主手厥陰之脈是動則病面
赤目黃視盛虛熱寒陷下取之也

面黃治法見黃疸明

難脾外證面黃善噫善思善味十六

索陽明經終者口目動作善驚妄言色黃診要經絡篇

面白

難肺外證面白善嚏悲愁不樂欲哭十六

血脫者色白天然不澤其脈空虛全文見治虛實法

道巴戟丸治肺病面白不悅則為脫氣脫血脫津脫液脫

精脫神方見脈緊者寒也或面白或面色亞皆寒

也以羌活防風甘草藁本四味瀉足太陽少加附子以通
其脈面色惡悲恐者更加桂附

太陽終者戴眼反折痠痲其色白絕汗出巴上全文見診生死

少陽終者耳聾百節皆縱目眩絕系其色青法

面黑若身黃面黑於黑直求之

難腎外證面黑善恐欠十六

羅陰出乘陽 一婦人年幾三十憂思不已飲食失節脾

胃有傷面色黧黑不澤環唇尤甚心懸如飢狀又不欲食

氣短而促大抵心肺在上行榮衛而光澤於外宜顯而藏

腎肝在下養筋骨而強於內當隱而不見脾胃在中主傳

化精微以灌四旁冲和而不息其氣一傷則四臟失所憂

思不已氣結而不行飲食失節氣耗而不足使陰氣上溢

於陽中故黑色見於面又經云脾氣通於口其華在唇今水反來侮土故黑色見於唇此陰陽相反病之逆也上古天真論云陽明脈衰於上面始焦故知陽明之氣不足非助陽明生發之劑無以復其色故以冲和順氣湯主之

升麻錢一

葛根半錢

甘草四分

芍藥三分

白芷錢一

黃芪八分

防風錢一

人參七分

蒼木三分

內經曰上氣不足推而揚之以升麻苦平葛根甘溫自地升天通行陽明之氣為君人之氣以天地之風名之氣留而不行者以辛散之防風辛溫白芷甘辛溫以散滯氣為臣蒼木苦辛蠲除陽明經之寒白芍藥之溫酸安太陽經之怯弱十劑云補可去弱人參羊肉之屬人參黃芪甘草甘溫補益正氣為臣至真要大論云辛甘發散為陽生薑

辛熱大棗甘溫和榮衛開腠理致津液以復其陽氣故以為使

右件咬咀都作一服水二盞姜三片棗二枚同煎至一盞去渣溫服早飯後午飯前取陽升之時使人之陽氣易達故也數服而愈

樊樓有店家劉三一日滿面皆黑色有相者斷云不過月餘死既過月且安孫入店與客飲酒遂拜孫述說其病狀孫特與診之曰非病也乃為臭氣所薰穢氣畜於面部不散故有此色問劉曰汝一月前聞甚一陣非常臭氣不能避耶劉曰一日登溷其廁臭氣不可聞隱忍良久下廁明日遂有此疾孫曰去至臭無過至香我家有南人將至售香可用沉檀二香各一兩碎擘焚於爐中安帳內以薰絹被蓋定勿令香氣散可端坐香邊瞑目靜坐候香氣散

方可出帳明日引鑑照之劉依其言面色漸變旬日如故
腎臭腐屬水脾臭香屈上今夫臭者腐臭也故聞之則入腎而面黑沉香者香臭也故薰之則脾土勝腎水而色還也

針灸

針灸面黑有二法

其一取胃經云胃足陽明之脈是動則病洒洒振寒顏黑
其二取腎經云足少陰之脈是動則病飢不欲食面如漆
柴視盛虛熱寒陷下取之也

診

少陰終者面黑齒長而垢腹脹閉全文見診生死下同
太陰終者腹脹閉不得息善噫嘔逆則面赤不逆則面黑
皮毛黑

頰車病頰車開而不合

雜方

蕭平江陳氏囚驚懼後常用手指甲掐住兩頰遂兩頰破
損心中懊懣不安脈數而實諸藥不愈用活幼口義牛黃

清心涼膈丸數服如失

無凡伸欠頰車蹉但開不能合以酒飲之令大醉睡中吹
皂角末搐其鼻嚏透即自正

狂癲

狂謂妄言妄走也癲謂僵仆不省也各自一症今以狂入
脾部癲入肝部然經有言狂癲疾者有言狂互引顛者又
言顛疾為狂者此則又皆狂顛兼病今病有妄言妄走頃
時前後僵仆之類有僵仆後妄見鬼神半日方已之類是
以顛狂兼病者也

診

難顛狂之病何以別之然狂之始發少臥而不飢自高賢
也自辨智也自貴倨也妄笑好歌樂妄行不休是也顛疾
始發意不樂直視僵仆其脈三部陰陽俱盛是也重陽者
狂重陰者顛五十九難○王註云狂病之後不欲眠臥不肯飲食自言賢智尊貴歌笑行走不休今人

以為癲疾謬矣

素二陰二陽皆交至病在腎罵詈妄行顛疾為狂陰陽類論○王

註云二陰腎水二陽胃土土刑水病在腎胃為狂

靈邪入於陽則為狂轉則為顛疾九針篇

素顛疾厥狂久逆之所生也通評虛實論太陽所謂狂顛疾

者陽盡在上而陰氣從下下虛上實故狂顛疾也脈解篇

針灸狂顛有一法

其一取胃經云足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太

陰其病實則狂顛取之所別是也

其二取膀胱經云膀胱足太陽之脈所生病者狂顛視盛

虛熱寒陷下取之也

甲狂顛疾吐舌太乙及滑肉期門主之 狂什温溜主之

狂顛疾陽谷及築賓通谷主之 狂互引顛疾數發後

雞主之 狂顛陰谷主之

狂

欲獨閉戶牖而處陰不勝其陽則脈流蕩疾并乃狂全文治

虛實法

血并於陽氣并於陰故為驚狂全文見刺虛法

素帝曰有病怒狂者此病安生岐伯曰生於陽也帝曰陽

何以使人狂岐伯曰陽氣者因暴拆而難決故善怒也病

名曰陽厥帝曰何以知之岐伯曰陽明者常動巨陽少陽

不動不動而動大疾此其候也帝曰治之奈何岐伯曰奪

其食即已夫食入於陰長氣於陽故奪其食即已使之服

以生鐵落為飲夫生鐵落者下氣疾也病能篇

無號礬丹治狂効方見藥論

鎮心丹治驚悸自汗心煩短氣喜怒悲惡恐不自知忘魂

上實者從高抑之

實

下虛上實

針灸

失魄狀若神靈所憑及男子遺泄女子帶下

辰砂研 白礬煨汁盡各等分

右為末水丸如雞頭大每服一九煎人參湯下食後服

在上者因而越之

世浙江一婦人顛狂不止醫以瓜蒂半兩為末每一錢重

井花水調滿一盞投之隨得大吐吐後熟睡勿令驚動自

此無恙

竹來甦膏治逐年近日風癩心病風狂中風涎沫潮閉牙

關不開及破傷風並皆治之

皂角一兩肥大無虫 右將皂角切碎用漿水一大碗春秋浸三四日冬七日

夏一二日揉開取淨浸透皂角汁入銀器或砂鍋內以

文武火熬用新柳條槐枝攪熬似膏藥取出攤於夾帋

上陰乾收頓如遇病人取手掌一大片用溫漿化在

內用竹管兒盛藥水將病人扶坐定頭微擡起將

入左右鼻孔內良久扶起涎出為驗欲要涎止將溫鹽

湯令病人服一二口便止忌雞魚生硬濕麪等物

子和一男子落馬發狂起則目瞪狂言不識親疎棄衣而

走罵言涌出氣力加倍三五人不能執縛燒符作醮問鬼

跳巫殊不知顧服丹砂牛黃犀珠腦麝資財散去室中滿

然不遠二百里而求戴人一往戴人以車軸埋之地中約

高二丈許上安中等車輪其輞上鑿一穴如作盆之狀縛

病人在其上使之伏臥以軟衲襯之又令一人於下坐機

一枚以棒攪之轉千百遭病人吐出青黃涎沫一二斗許

繞車輪數匝病人曰我不能堪可解我下從其言而解之

索涼水與之冰水飲數升狂乃罷矣

素帝曰陽明病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日

陽明實則脈伏宜下之

踰垣上屋所上之處皆非其素所能也病反能者何也岐伯曰四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實實則能登高也帝曰其棄衣而走者何也岐伯曰熱甚於身故棄衣欲走也帝曰其妄言罵詈不避親疎而歌者何也岐伯曰陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食不欲食故妄走也陽明脈解篇○陽明所謂病至則欲乘高而歌棄衣而走者陰陽復爭外并於陽故使之棄衣而走也

海許氏病陽厥狂怒罵詈親疎或哭或歌六脈舉按無力身表如水石發即叫呼聲高潔古云奪食則已因不與之食予用大承氣湯下之得臍腑渣穢數升狂稍寧數日復發復下如此五七次行大便數斗疾瘥身温脈生良愈此易老奪食之法也

保當歸承氣湯

當歸

大黃各一兩

甘草半兩

芒硝七錢

右判如麻苳大每二兩水一大碗姜五片棗十枚煎一半去查熱温服若陽狂奔走罵詈不知親疎此陽有餘陰不足大黃芒硝去胃中實熱當歸補血益陰甘草緩中加姜重者胃屬土此引入胃中也經所謂微者逆之甚者從之此之謂也以大利為度微緩以瓜蒂散入防風末藜蘆末吐之其病立安後用調心散洗心散涼膈散解毒湯等調之

子和一狂人陰不勝其陽則脈流薄疾陽并乃狂難經曰陽極則狂陰極則顛陽為腑陰為臟非陽熱而陰寒也熱并於陽則狂狂則生寒并於陰則顛顛則死內經曰足陽明實則狂故登高而歌棄衣而走無所不為是熱之極也以調胃承氣大作湯下數十行三五日復上漏一二升三五日又復下之凡五六十日下百餘行吐亦七八度如吐

壽者發之

虛者補之

時暖室置火以助其汗數汗方平
 一叟年六十值徭役煩擾而暴發狂口鼻覺如虫行兩手
 爬搔數年不已戴人診其兩手脈皆洪大如繩斷之曰肝
 主謀膽主決徭役迫遽財不能支則肝屢謀而膽屢不能
 決屈無所伸怒無所洩心火礮礮乘陽明金然胃本屬土
 而肝屬木膽屬相火火隨木氣而入胃故暴發狂乃命置
 煨室中涌而汗出如此三次內經曰木鬱則達之火鬱則
 發之正謂此也又以調胃承氣湯半斤用水五升煎半沸
 分作三服大下二十行血水與瘀血相雜而下數升來日
 乃康以通聖散調其後
 孫相國寺僧充忽患顛疾經半年遍服名醫藥皆不効僧
 俗兄潘氏家富召孫療之孫曰今夜睡着明後日便愈也
 潘曰且告投藥報恩不忘孫曰有鹹物但與師吃待渴却

來道至夜僧果渴孫至遂求温酒一角調藥一服與之有
 頃再索酒與之半角其僧遂睡兩晝夜乃覺人事如故潘
 謝孫問其治法曰衆人能安神矣而不能使神昏得睡此
 乃靈苑方中硃砂酸枣仁乳香散也人不能用耳
 辰砂散治風痰諸癩狂言妄走精神恍惚思慮迷亂乍歌
 乍哭飲食失常疾發什地吐沫戴日魂魄不守醫藥無驗
 辰砂一兩須光明 酸枣仁十兩 乳香半兩光
 右量所患人飲酒幾何先令恣飲沉醉但勿令吐至靜
 室中以前藥都作一服温酒調下作一盞調之令頓飲
 如飲酒素少人但以隨量取醉服藥訖便安置床枕令
 臥病淺者半日至一日病深者三兩日令家人潛伺之
 鼻息勻調但勿喚覺亦不可驚觸使覺待其自醒即神
 魂定矣萬一驚悟不可復治正肅吳公少時心病服此

一劑五日方寤遂瘥

一醉膏治心恙無灰酒二碗香油四兩和勻用楊柳枝二十條逐條攪一二百下候香油與酒相入成膏煎至八分灌之熟睡則醒或吐下即安矣

狂之為病少臥少臥則衛獨行陽不行陰故陽盛陰虛令昏其神得睡則衛得入於陰而陰得衛填不虛陽無衛助不盛故陰陽均平而愈矣

本寧志膏

人參

酸棗仁

辰砂

乳香

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九薄荷湯送下

予族弟綠兵火失心制此方與之服二十粒愈親舊多

傳去服之皆驗

海狂邪顛瀾不欲眠臥自賢自智妄行不休此方能安五

臟下心氣用白雄雞一隻煮熟五味調和作羹粥食之

經云悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精不精則不正此

悲哀傷魂而狂當用溫藥補魂之陽仲景方以地黃湯本

事驚氣丸之類即是也 經云喜樂無極則傷魄魄傷則

狂狂者意不存人此喜樂傷魄而狂當用涼藥補魄之陰

辰砂鬱金白礬之類是也

世治失心

鬱金

七兩須四

明礬

右為細末薄糊為丸如桐子大每服五六十九丸湯水任

下昔有婦人顛狂可畏數年不愈後遇至人授此方初

服覺心胸中有物脫去神氣灑然再服頓甦至人云此

病用憂驚得之痰涎包絡心竅此藥能去鬱痰

仲防已地黃湯治病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脈

浮

防已錢 桂枝 防風錢各三 甘草錢二

右四味以酒一盃漬一宿絞取汁生地黄二斤咬咀蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黄汁和分再服

本治驚瘧積氣瘧風邪發則牙關緊急涎潮昏塞醒則精神若痴驚氣丸

附子 木香 白姜蚕 白花蛇

橘紅 天麻 麻黃各半 乾葛二

紫蘇葉兩 朱砂一錢留少 天南星 洗研姜汁

浸一夕

右為末加腦麝少許同研極勻煉蜜杵丸如龍眼大每服一丸金銀薄荷湯化下温酒亦得此予家秘方也戊申年軍中一人犯法褫衣將受刑而得釋精神頓失如

瘧子與一丸服訖而寐及覺病已失矣提轄張載揚其

妻因避寇失心已數年予授此方不終劑而愈又黃彥其奇妻狂厥者踰十年諸醫不驗予授此方去附子加鐵

粉亦不終劑而愈鐵粉非但化痰鎮心至如推抑肝邪入特異若多恙怒肝邪大盛鐵粉能制伏之素問云湯厥

狂怒治以鐵落飲金制木之意也此亦前人未嘗論及無治中風或歌或哭或笑語無所不及小續命湯用麻黃

三兩人參桂枝白朮各二兩無防風附子生姜有當歸一兩

世治顛狂發作披頭大叫不避水火苦參為末蜜丸梧子大每服十丸薄荷湯化下妙

保牛黃膏治熱入血室發狂不認人牛黃半錢 硃砂 鬱金 牡丹皮各三

甘草

腦子各一

黃金

蘇丹

右為末煉蜜丸如枣子大新汲水化下

肝移寒於心狂膈中全文見診

寒

運氣狂皆屬火經云諸燥狂越皆屬於火又云火太過曰

赫曦赫曦之紀其病笑謔狂妄又云歲火太過上臨少陰

少陽病謔妄狂越治以諸寒是也風狂子主黃白當一

子和項開合之妻病飢不欲食常好叫呼怒罵欲殺左右

惡言不輟眾醫皆處藥幾半載尚爾其夫命戴人視之戴

人曰此難以藥治乃使一娼各塗丹粉作伶人狀其婦人

大笑次日又作角觝又大笑其旁常以兩箇能食之婦誇

其食美病婦亦索其食而為一嗜之不數日怒減食增不

藥而瘥後得一子夫醫貴有才無才何足應變無窮

雜方

針灸

手太陰陽明血變而止及取足太陰陽明狂始發少陰

不飢自高賢也自辨智也自尊貴也善罵詈日夜不休治

之取手陽明太陽少陰舌下視之盛者皆取之不盛釋之

也狂言驚善笑好歌樂妄行不休者得之大恐治之取

手陽明太陽太陰狂目妄見耳妄聞善呼者少氣之所

生也治之取手太陽太陰陽明足太陰頭兩頰狂者多

食善見鬼神善笑而不發於外者得之有所大喜治之取

足太陰太陽陽明後取手太陰太陽陽明狂而新發未

應如此者先取曲泉左右動脈及盛者見血有頃已不已

以法取之灸骨節二十壯顛狂大熱偏身狂而妄見妄

聞妄言視足陽明及大絡取之虛者補之血而實者瀉之

因其偃臥居其頭前以兩手四指挾按頸動脈久持之卷

而切之下至缺盆中而復止如前熱去乃止此所謂推而

散之者也刺節真邪篇○強動脈

胃足陽明之脈是動病甚則欲上高而歌棄衣而走故狂皆取陽明也

秦承祖灸法

狐魅神邪顛狂諸病并小兒驚癇兩手

大拇指用軟繩急縛之灸三壯艾炷着四處半在甲半在肉上四處盡燒一處不着其疾不愈神効難量此法累用累効

明堂灸狂發怒欲殺人見鬼身柱灸在三椎節下間後谿

通玄呆痴神門一穴沿皮向前三分先補後瀉灸之後谿補生瀉成

標幽又法 太鍾

集失志呆痴 神門 中衝 鬼服 鳩尾 百會

摘心悶不已 支溝

甲狂易魚際及合谷腕骨支正少海崑崙主之 狂言笑

見鬼取之陽谿及手足陽明太陽 狂歌妄言怒恐惡人

與火罵詈三里主之 狂妄走善欠巨虛上廉主之

易見鬼神與火解谿主之 狂言太淵主之 心懸如飢

之狀善悲而驚狂面赤目黃間使主之 狂疾液門主之

又俠谿丘墟光明主之 狂互引頭痛耳鳴目痺中渚主

之 身熱狂走談言見鬼瘦癯身柱主之 狂妄言怒恐

惡大甚罵詈巨闕主之

欲獨閉戶牖而處

胃陽明所謂欲獨閉戶牖而處者陰陽相薄也陽盡而陰

盛故欲獨閉戶牖而居 帝曰陽明惡人者何也岐伯曰

陽明厥則喘而惋惋則惡人陽明脈解篇

針灸獨閉戶牖而處有二法

其一取胃經云胃足陽明之脈是動則病惡人與火獨閉戶牖而處視盛虛熱寒陷下取之也

其二取少陰經云少陰之虛獨閉戶牖而處註云取太鍾太溪二穴
 熱病汗不出熱衄眩時仆而浮腫足脛寒不得臥振寒
 惡人與木音喉痺齒齦惡風鼻不利多臥善驚厲兌主之
 四厥手足悶者使人久持之厥熱脛痛腹脹皮痛善伸
 數欠惡人與木音振寒噤中邪外腎痛熱病汗不出下齒
 痛惡寒目急喘滿寒慄齒口禁懈惰不嗜食內庭主之
 難病若閉目不欲見人者脈當得肝脈弦急而長而反得
 肺脈短而濇者死也

診

口瘡入疥 口糜 口臭喉醒

口甘入中 唇 唇痠入口

口候

口者脾之所主胃大腸脈之所挾經云中央黃色入通於
 脾開竅於口藏精於脾又云脾主口在藏為脾在竅為口
 又云脾氣通於口脾和則口能知五味矣此脾之所主也

口也

又經云胃足陽明之脈挾口下交承漿又云大腸手陽明
 之脈挾口交人中此胃大腸之脈所挾於口也

口苦

肝氣熱則膽泄口苦全文見痿

肝熱

內經曰有病口苦名曰膽痺乃肝主謀慮膽土決斷盛汁
 七合是清淨之府取決於膽膽或不決為之恚怒則氣上
 逆膽汁上溢故口苦或熱甚而使然也以龍膽瀉肝湯主
 之

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----|
| 柴胡 <small>錢</small> | 黃芩 <small>七</small> | 生甘草 | 人參 |
| 天門冬 <small>心去</small> | 黃連 | 草龍膽 | 山梔 |
| 麥門冬 | 知母 <small>各五分</small> | 五味子 <small>七</small> | |
- 右件咬咀都作一服水二盞煎至一盞去查溫服食遠

忌辛熱物大效

真氣上逆故口苦舌乾全文見

針灸

帝曰有病口苦者病名為何何以得之岐伯曰病名曰

膽痺夫肝者中之將也取決於膽咽為之使此人者數謀

慮不決故膽虛氣上溢而口為之苦治之以胆募俞奇病論

膽募穴在腹部期門下五分膽俞穴在背部第十一椎下兩旁相去各二寸半

針灸口苦獨取於膽此篇經文是其一法也又經云膽病

者善太息口苦嘔汁當取陽陵泉又云膽足少陽之脈是

動則病口苦善太息視盛虛熱寒陷下取之也

口糜

熱

膀胱移熱於小腸腸不便上為口糜全文見診

恒移熱湯治口糜內經云膀胱移熱於小腸腸不便上

為口糜好飲酒人多有此疾易老用五苓散導赤散相合

服之神效

丹治滿口白爛葶撥一兩厚黃栢一兩六錢為末用米醋

煎數沸後調上藥涎出吐之再用湯嗽口即愈重者二次

羅胡黃連散治口糜

胡黃連分五 藿香錢一 細辛錢三 黃連錢三

右為末每用半錢乾摻口內漱吐之

必效散治口糜 白礬 大黃分等

右為細末臨臥乾貼瀝涎盡溫水漱之

運氣口糜皆屬熱經云少陰之復火氣內發上為口糜治

以苦寒是也

口臭喉腥

熱本加減甘露飲治男子婦人小兒胃客熱口臭牙宣赤眼

口瘡一切瘡疹已散未散皆可服之丹溪云甘露飲心脾胃藥也

熟地

生地

天門冬法

黃芩

枇杷葉去毛

山茵陳

枳殼

金釵石斛

甘草各一兩

犀角三錢

右為末每服二錢水一盞煎至七分去渣食後臨臥溫服小兒一服分作二服更斟酌與之

此方得自一品之家其間用犀角一味甚有道理百發百中予族中有一僕牙宣口臭牙齒漸漸頹落予與二服頓愈服之無不愈者本事方前集所未載此方緣得之不易故不敢輕泄服之自有奇效

本治口臭香薰一把以水一斗煮取三升稍稍含之丹溪云惟

香薰湯能治口臭

羅肺熱喉腥治驗 梁濟民膏梁而飲因勞心過度肺氣有傷以致氣出腥臭涕唾稠粘咽嗌不利口苦乾燥以加

減瀉白散主之

桑白皮三錢

地骨皮一錢半

甘草炙錢半

知母七分

黃芩五分

五味子二十粒

桔梗二錢

難經云心主五臭入肺為腥臭此其一也因洪飲大熱之氣所傷從心火刑於肺金以桑白皮地骨皮苦微寒降肺中伏火而補氣為君以黃芩知母苦寒治氣腥臭清利肺氣為臣肺欲收急食酸以收之以五味子酸溫以收肺氣麥門冬苦寒治涕唾稠粘口苦乾燥為君桔梗辛溫體輕浮治痰逆利咽膈為使也

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去渣溫服食後一日二服忌酒濕麪及辛熱之物

聖治口臭仍醫齒腫痛細辛煮取濃汁熱飲令吐瘥

實和尙家一男子年二十餘歲病口中氣出臭如登廁雖

親戚莫肯與對語戴人曰肺金本主腥金為火所乘火主臭應便如是也久則成腐腐者腎也此亢極則反兼水化也病在上宜涌之以茶調散涌而去其七分夜以舟車丸瀟川散下五七行比旦而臭斷

針灸 口中腫臭勞宮主之

唇唇凌入
口唇門

六腑之華在唇經云脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廩之本榮之居也其華在唇四白是也 胃脈肝脈督脈皆環唇內經云督脈上頤環唇是也 衝脈任脈皆絡唇經云衝脈任脈別而絡唇口是也

唇反者死經云唇舌肌者肉之本也唇反者肉先死是也

四肢

四肢候

陽主四肢經云四肢者諸陽之本也又云陽受氣於四肢是也陽實則肢腫經云結陽腫四肢是也 陽虛則肢滿經云冬氣病在四肢是也 脾主四肢經云四肢皆稟氣於胃而不得至經必因於脾乃得稟者是也 脾實則四肢不舉經云脾脈太過為病在外則令人四肢不舉者是也 脾虛則四肢不用經云脾藏肉形不足則四肢不用又云四肢懈惰此脾精之不行是也 治見痿及中風 五臟有邪留在支節經云肺心有邪其氣留于兩肘肝有邪其氣留于兩股脾有邪其氣留于兩髀腎有邪其氣留于兩膝是也 治法見痛痺

運氣 運氣四肢不舉皆屬濕經云土太過曰敦阜敦阜之紀其病腹滿四肢不舉是也

針灸 風逆四肢腫復溜主之

醫學綱目卷之三

五

肉

脾主肉經云脾主肉在體為肉在藏為脾又云邪在脾胃則病肌肉痛是也 脾病在谿經云北方黑色入通於腎故病在谿谿者肉之小會也

針灸

帝曰願聞谿谷之會也岐伯曰肉之大會為谷肉之小會為谿肉分之間谿谷之會以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脈熱肉敗榮衛不行必將為膿肉消骨髓外破大腸留於節湊必將為敗積寒留舍榮衛不居卷肉縮筋肋肘不得伸肉為骨痺外為不仁命曰不足大寒留於谿谷也谿谷三百六十五穴會亦應一歲其小痺淫溢循脈往來微針所及與法相同氣穴論

禁忌

形樂志樂病生於肉治之以針石全文見治法 濕傷肉甘傷肉經云濕傷肉風勝濕甘傷肉酸勝甘又云

甘走肉肉病無多食甘又云多食酸則肉胝膈而唇揭是也 坐樂傷肉經云久坐傷肉又云形樂志樂病生於肉治之以針石是也

身重

怠墮嗜臥

風

身重者濕也補中益氣湯去桂加五苓散主之

起臥不能謂之濕身重是也小柴胡湯黃芪芍藥湯

仲風濕脈浮身重汗出惡風者防已黃芪湯主之方見傷寒身重

夏月中風濕身重如山不能轉側宜除風勝濕去熱之

藥治之

腎着

腎着之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出表裏冷濕久久得之腰以下冷痛腹重如帶五千錢甘姜苓朮湯主之

甘草 白木各二兩 乾姜 茯苓各四兩

右四味以水五升煮取三升分温二服腰中自温

肝虛腎虛脾虛皆令人體重煩冤示從容論○體重屬肝腎虛脾虛則脾寡

干畏而體重腎虛則脾勝之而體重也

巨參木湯治脾胃虛弱元氣不能榮於心肺四肢沉重食

後昏悶

黃芪二錢 人參半錢 升麻三分 甘草炙四分

柴胡 酒黃柏各三分 陳皮五分 青皮五分

神麴七分 蒼朮錢一 當歸二分

右咬咀作一服水二盞煎至一盞半去渣帶熱服食前

運氣身重有五

一曰濕乃濕制腎虛而重經云太陰所至為身重又云太陰之復體重身滿又云歲土太過濕氣流行民病體重煩

冤又云土鬱之發民病身重是也

二曰濕熱經云少陽司天之政四之氣炎暑間化其病滿身重是也

三曰寒濕經云太陰司天之政三之氣感於寒濕民病身重是也

四曰風乃木制脾虛而重經云歲木太過風氣流行民病體重煩冤又云歲土不及風乃大行民病體重煩冤又云

厥陰在泉風淫所勝病身體皆重是也

五曰金乃燥制肝虛而重經云歲金太過燥氣流行民病體重煩冤是也

針灸身重有二法 其一取脾經云脾病者身重肉痿取其經太陰陽明少陰血者又云脾足太陰之脈是動則病腹脹身體皆重視盛

針灸

虛熱寒陷下取之也
其二取腎經云腎病者身重寢汗出憎風取其經少陰太陽血者是也

怠墮嗜臥

胃濕
云脈緩怠墮嗜臥四肢不收或大便泄瀉此濕勝從平胃散又云怠墮嗜臥有濕胃虛不能食或沉困或瀉泄加蒼朮自汗加白朮

虛

本補虛損治勞倦一切虛極欲垂死者肥人陰虛宜服瘦人不宜服

甘草

兩三

蒼朮

一斤米泔浸一宿切用非

川椒

四兩

草烏

半斤水浸一宿切用鹽

右共爲末用好酒糟六斤同搗三五千杵令勻爲丸如桐子大每服三十九空心溫酒鹽湯任下婦人淡醋湯

下

食入則困倦精神昏冒而欲睡者脾虛弱也

人參補氣湯治四肢懶倦

黃芪

半一錢

人參

分七

甘草

分三

生地

分五

防風

分七

白芍

分五

五味

粒二十

升麻

分七

肉桂

分二

熟地

分六

生甘草

分一

黃柏

分七

知母

分七

右爲粗末作一服水二盞煎至一盞濾去渣空心熱服

下
蠱毒

無江南閩中山間人以蛇虺蜈蚣蟻蚰蝦蟆等百虫同器畜之使其自相食啖勝者爲靈以祀之取其毒雜以菜菓飲食之類以害人妄意要福以圖富貴人或中之症狀萬端或年歲間人多死又有人家香火奉祀如家先者亦謂

之蠱能病人世謂之蠱症以姓類屬五音謂之五蠱此皆
邊鄙邪僻之地多有此事中都則蔑聞也

診

夫中蠱毒者令人心腹絞痛如有物吐出皆如爛肉若不
即治食人五臟即死驗令病人唾水沉者即是

蠱有人行蠱毒以病人若欲知其姓名者以敗鼓皮燒作
末飲服方寸七須臾自呼蠱家姓名可語之令呼喚將去
則愈治之亦有方

世驗蠱之法含一大莖其莖張皮脫者蠱也莖不張皮不
脫者非也以鵠皮至病人臥所下勿令知覺病甚者走
居則非也治療之法必須審而後行試而後可今人偶有
積聚脹滿之病類乎蠱者便以為蠱尤為非也凡蠱毒之
中有緩有急急者十數日便死緩者待以歲月氣力羸敗
食盡五臟而後死死則其毒流注於傍傍人亦成蠱注矣

無凡中毒嚼生豈不腥嚼白礬味甘者皆中毒無疑

脈人為百藥所中傷脈浮瀼而疾者生微細者死洪大而

遲者生千金遲

吐利蠱
毒法

無辰砂丸治蠱毒從酒食中着者端午日合

辰砂細研

雄黃另研水飛

赤腳蜈蚣

續隨子各一兩

麝香錢一

右為末糯米飲為丸如雞頭大若覺中毒即以酒下一
丸蛇蝎所螫醋磨傳効

必效主蠱毒神效以胡荽根絞汁半升酒和服之立下

外治蠱毒土瓜根大如拇指長三寸切以酒半升浸一宿

一服當吐下

崔蛇蠱食飲中得之咽中如有物嚙不下吐不出悶悶心
熱服馬兜苓即吐出又服麝香一錢七即吐蠱毒

聖五種蠱毒馬兜苓根三兩為末分為三貼水一盞煎五分去查服當吐虫出未快再服
本主蠱毒用大戟桃白皮以火烘乾斑猫去翅足炒三物等分搗篩為散以冷水服半方寸匕其毒即出不出更一服蠱並出此李饒州法大奇效若以酒中得則以酒服以食中得則以飲服之

右吐利蠱毒法

無凡諸蠱多是假毒藥以投之知時宜煮大荳甘草薺菀汁飲之通除諸毒藥

經山荳根不拘多少如中藥蠱毒密遣人和水研以林示聲服少許不止再服一方用酒調下二錢

本食中有蠱毒令人腹內堅痛兩目青黃淋露骨立病變無常用鐵精細研搗雞肝和為丸桐子大食前或後酒下

五九

蠱下血見血

雜方解

無解毒丸治設食毒中并百物毒救人於必死

板藍根

四兩洗

貫衆一兩剉去毛 青黛

甘草

一兩

右為末蜜丸桐子大以青黛另為衣如稍精神恍惚即是誤中諸毒急取十五丸爛嚼用新水送下即解

青黛雄黃丸凡始覺中毒及蛇虫咬癰疽纔作即服此毒氣不聚

青黛

雄黃等分

右為細末新汲水調下二錢

潔解毒丸善治男子婦人及小兒一切積熱不解停留作毒上焦壅熱咽喉不利口乾多渴伏暑困悶霍亂不寧或

山嵐瘴氣及食毒酒毒吐逆不定遊風丹毒迷惑昏困不
省人事虐煩發燥赤目口瘡善解四時傷寒之疾發散瘟
疫毒邪之氣及四方人不服水土一切諸毒並皆解之常
服此藥補真益氣化毒除風神效不可細述

滑石

黃芩

貫仲

茯苓

山梔

乾姜

草龍膽

大豈

青黛

甘草

薄荷

寒水石各一

益智仁

砂仁

大黃

山荳根

生地

桔梗

百藥煎

紫河車即蚤

菴荳粉

馬勃

板藍根

黃藥各半

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九新汲水化下
細嚼或噙化亦得小兒半丸如婦人血暈不省生姜薄
荷水磨下一丸

世解諸毒用玉簪花根搗水服

治中諸藥毒

生甘草

黑豈

淡竹葉各等

右咬咀用水一碗濃煎連服

無礬灰散治中諸物毒

明礬

建茶各等

右為末每服三錢新汲水調下得吐即效

世解砒毒鼠莽毒用旋刺下羊血及雞鴨血熱服鼠莽草

藍飲子解砒毒及巴荳毒用藍根沙糖二味相和搗水服

之更入薄荷汁尤妙

解砒毒

白蘆荳

青黛

甘草

巴荳

半粒用半邊
去壳不去白

右同為末沙糖一大塊水化開調一大盞飲之砒毒隨

解砒毒

醫方類聚卷之三

卷之三

利去却服五苓散之類

解砒毒用早禾稈燒灰新汲水淋汁濾過冷服一碗毒從利下即安又方用井花水調荳粉或菘荳插水汁皆可

解砒毒

漢椒

四十九粒

黑荳

十四粒

甘草節

二寸碎之

烏梅

二箇

右攷咀用水一盞煎至七分溫服

解鼠莽毒

解鼠莽草毒用枯過明礬同上等好末茶少許新汲水調服人有用之累效

解鼠莽草毒用大黑江荳煮汁服之

如欲試其驗先刈鼠莽苗葉以荳汁澆其根從此敗爛不復生矣

解諸食毒

治自死六畜肉中毒方用黃柏搗屑服方寸七

治爵肉漏脯中毒

爵肉密器蓋之漏宿者是也爵漏茅屋漏下沾着者是也

燒犬屎

酒服方寸七或服人乳汁或飲荳汁二三升亦良

治黍

禾中藏肝脯食之中毒方大荳濃汁飲數升即解亦治狸

肉漏脯等毒 治食生肉中毒方掘地深三尺取其下土

三升以水五升煮數沸澄清汁飲一升即愈 治六畜馬

獸肉中毒方水浸荳豉絞取汁服數升即愈

治馬肝毒中人未死方雄鼠屎二七粒末之水和服日再

服

尿尖是

又人垢取方寸服之佳

治馬肉中毒欲死方

香豉二兩杏仁三兩相和蒸一食頃熟杵服日再服又方

煮蘆根汁飲之良

治噉蛇牛肉食之欲死方

辨噉蛇牛肉毛髮向

後順者是也

飲乳汁一升立愈

以泔洗頭飲一升愈

牛

膝細切以水一斗煮取一升煖飲之大汗出即愈 治食

牛肉中毒甘草煮汁飲之即解 治食犬肉不消心下堅

或腹脹口乾大渴心急發熱妄語如狂或洞泄方杏仁一

升炒皮熟研以沸湯三升和取汁分三服利下肉片出大

驗 烏獸有中毒箭死者其肉毒用大荳煮汁及藍汁服之即解

世 悞吞蜈蚣用生雞血令病人吃須更以清油灌口中其蜈蚣滾在血中吐出繼以雄黃細研水調服愈

仲 鱠食在心胃間不化吐不出速下除之久成癥病方

陳皮兩

大黃兩

朴硝兩

右三味以水一大升煮取半升頓服消

食鱠多不消結為癥病治用馬鞭草搗汁飲之 或以姜

葉汁飲一升亦消 又可服吐藥吐之 食魚後食毒物

煩亂用陳皮濃煎汁服之即解 食鯀魚中毒用蘆根

煮汁服之即解

世 治食河豚魚中毒一時困殆倉卒無藥以清油多灌之便毒物盡吐出為愈

仲食蟹中毒治用紫蘇煮汁飲三升紫蘇子搗飲之亦愈

冬瓜汁飲二升吃冬瓜亦可 食菓中毒用猪骨燒過

末之服方寸匕亦治馬肝漏脯等毒

世 解一切菌毒掘新地窟以冷水於內攪之令澄少頃取

飲之見本草陶隱居註謂之地漿 荷葉殺藟毒

仲食諸菌中毒悶亂欲死治方 人糞汁飲一升 上漿

飲二升 大荳濃煮汁飲之 服諸吐利藥並解 取糞

汁法截淡竹去青皮浸滲其中取筒中汁是也 食楓樹

菌而笑不止亦治以前方

世 藟毒吐瀉不止者用細茶芽研細以新汲井花水服神

效 治藟毒欲死方用石首魚頭或鯢頭亦妙白水煮汁

灌之即愈 治中藟毒用篋竹不入泥者數節煎湯飲之

立效

仲誤食芋煩毒欲死亦治以前方其芋根山東人名魁芋人種芋三年不收亦成野芋並殺人蜀椒閉口者有毒誤食之戟人咽喉氣欲絕或吐下白沫身體痺冷急治之用肉桂煎汁飲之或食蒜或食地漿或濃煮豉豈汁飲之並解

仲食躁或躁方用豉煮濃汁飲之鈎吻與芹菜相似誤食殺人解之用薺芎八兩水六升煮取二升分溫二服鈎吻生池傍無他異其莖有毛以此別之菜中有水蓎若葉貞而光有毒誤食之令人狂亂狀如中風或吐血治之用甘草煮汁服之解春秋二時龍帶精入芹菜中人偶食之為病發時手青腹滿痛不可忍名蛟龍病治之用錫糖二三升日兩度服之吐出如蜥蜴三五枚瘥食苦瓠中毒治之用黍稷煮汁服之解飲食中毒煩滿治之用

苦參三兩苦酒一升半煮半沸三上三下服之吐食出卽瘥或以水煮亦得犀角湯亦解貪食食多不消心腹堅滿痛治之用鹽一升水三升煮令鹽消分三服當吐出食便瘥

奇病

雜方

項上生瘡如櫻桃大有五色瘡破則項皮斷但逐日飲牛乳自消寒熱不止經日後四肢堅如石以物擊之一似鐘磬聲日漸瘦惡用茱萸木香等分煎湯飲卽愈大腸頭出寸餘痛苦直候乾自退落又出名爲截腸病若腸盡乃不治但初截寸餘可治用脂麻油器盛之以齧坐之飲大麻子汁數升愈口鼻中腥臭水流以碗盛之有鐵色蝦魚如粳米大走躍不住以手捉之卽化爲水此肉壞矣任意饌食雞肉愈腹上麻痺不仁多煮葱白吃之自愈

婦人小便中出大糞名交腸服五苓散效如未盡愈可用舊幘頭燒灰酒服之 兩足心凸如腫上面生黑色豈瘡硬如釘子釘了履地不得脛骨破碎眼髓流出身發寒顫唯思飲酒此是肝腎氣冷熱相吞用炮川烏頭末傳之煎韭子湯服效 凡腹脹經久忽瀉數升晝夜不止服藥不驗乃為氣脫用益智子煎濃湯服立愈 四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解用酒浸黃蘆三兩經一宿取出焙乾為末每服二錢酒調下服盡安 玉莖硬不痿精流無歇時時如針刺捏之則脆乃為腎滿漏疾用韭子破故紙各一兩為末每服三錢水一盞煎至六分日三次飲之愈則住服 咽喉間生肉層層相疊漸漸腫起不痛多日乃有竅子臭氣自出遂退飲食用臭橘葉煎湯連服愈 腹中如鉄石臍中水出旋變作虫行之狀繞身匝啣痒

痛難忍撥掃不盡用濃煎蒼朮湯浴之以蒼朮末入麝香少許水調服痊 眼前常見諸般禽虫飛走以手捉之則無乃肝膽經為疾用酸枣仁羌活玄明粉青箱子花各一兩為末每服二錢水一大盞煎至七分和萍飲一日三服 大腸虫出不斷斷之復生行坐不得用鶴虱末水調五錢服之自愈 眼睛垂出至鼻如黑角色痛不可忍或時時大便血出名曰肝脹用羌活煎汁服數盞自愈 腹中有物作聲隨人語言用板藍汁一盞分五服服之又名應聲虫當服雷丸自愈 有飲油五升以來方始快意長得吃則安不爾則病此是髮入胃被氣血裹了化為虫也用雄黃半兩為末水調服虫自出如虫活者置於油中透巡間連油潑之長江 治臥於床四肢不能動只進得食好大言說喫物謂之失說物望病治法如說食猪肉時便云

你喫猪肉一頓病者聞之卽喜遂置肉令病人見臨要却
不與喫此乃失他物望也當自睡中涎出便愈 手十指
節斷壞唯有筋連無節肉虫出如燈心長數尺餘遍身綠
毛卷名曰血餘以茯苓胡黃連煎湯飲之愈 遍身忽皮
底混混如波浪聲痒不可忍抓之血出不能解謂之氣奔
以人參苦杖青鹽細辛各一兩作一服水二碗煎十數沸
去查飲盡便愈 眼白渾黑見物依舊毛髮直如鍊條雖
能飲食不語如醉名曰血潰用五靈脂爲末二錢酒調下
因着艾灸訖大痂便退落瘡內鮮肉片子飛如碟形狀
騰空去了痛不可忍是血肉俱熱用大黃朴硝各半兩爲
末水調下微利卽愈 臨臥渾身虱出約至五升隨至血
肉俱壞每宿漸多痒痛不可言狀雖喫水臥床晝夜號哭
舌尖出血不止身齒俱黑唇動鼻閉但飲鹽醋湯十數碗

卽安 眼赤鼻張大喘渾身出班毛髮如銅錢乃胃中熱
毒氣結於下焦用白礬滑石各一兩爲末作一服水三碗
煎至半令不住飲候盡乃安 有虫如蠅走於皮下作聲
如小兒啼爲筋肉之化用雷丸雄黃各一兩爲末摻在猪
肉片上炙熟喫盡自安 手足甲忽然長倒生肉刺如錐
痛不可忍喫葵菜自愈 鼻中毛出晝夜可長一二尺漸
漸粗圓如繩痛不可忍雖忍痛摘去一莖卽後更生此因
食猪羊血過多遂用乳香礪砂各一兩爲末以飯圓梧桐
子大空心臨臥各一服水下十粒自然退落 面上及遍
身生瘡似猫兒眼有光彩無膿血但痛痒不常飲食減少
久則透脛名曰寒瘡多喫魚雞韭葱自愈 脇破腸出臭
穢急以香油摸腸用手送入煎人參枸杞淋之皮自合矣
喫羊腎粥十日卽愈 口鼻中氣出盤旋不散涎如黑墨

色過十日漸漸至肩胸與肉相連堅勝金鐵無由飲食此
多因瘡後得之煎澤瀉湯日飲三盞連服五日愈 徧身
忽然肉出如錐旣痒且痛不能飲食此名血擁若不速治
潰而膿出以赤皮葱燒灰淋洗喫鼓湯數盞自安 眉毛
搖動目不能視交睫喚之不應但能飲食有經日不效者
用蒜三兩取汁酒調下卽愈 毛竅節次血出若血不出
皮脹膨如鼓須臾眼鼻口被氣脹合此名脈溢飲生姜水
汁各一二盞卽安 忽然氣上喘不能語言口中汁流吐
逆齒皆搖動氣出轉大則悶絕蘇復如是名曰傷寒併熱
霍亂用大黃人參末各半兩水三盞煎至一盞去滓熱服
可安 口内生肉毳臭惡自己惡見有根線長五寸餘如
釵股吐毳出飲食了卻吞其線以手輕捏痛徹於心困不
可言用水調生麝香一錢服三日驗 渾身生燎泡如

棠梨每箇破出水內有石一片如指甲大泡復生抽盡
肉不可治急用荆三稜蓬莪朮各五兩爲末分三服酒調
連進愈 頭面發熱有光色他人手近之如火燒用蒜汁
半兩酒調下吐如蛇狀遂安 人自覺自形作兩人並臥
不別真假不語問亦無對乃是離魂用辰砂人參茯苓濃
煎湯服之真者氣爽假者化也 男子自幼喜飲酒至成
丁後日飲一二升不醉片時無酒叫呼不絕全不進食日
就羸弱令其父用手巾縛住其手足不令動搖但扶少立
卻取生辣酒一壘就於其子口邊打開其酒氣衝入口中
病者必欲取飲堅不可與之須臾口中忽吐物一塊直下
壘中卽用帛封裹壘口用猛火燒滾約酒乾一半卽開視
之其一塊如猪肝樣約三兩重週回有小孔如針眼不可
數計棄之於江飲食復舊雖滴酒不能飲矣 夜間飲水

誤吞水蛭入腹經停月餘日必生下小蛭能食人肝血腹痛不可忍面目黃瘦全不進食若不早治能令人死用田中乾泥一小塊小死魚三四箇將猪脂溶攪勻用巴荳十粒去殼膜研爛入泥內爲丸菘荳大用田中冷水吞下十丸小兒只用三丸至五丸須臾大小水蛭一時皆瀉出卻以四物湯加黃芪煎服生血補理方見婦人門通治類 婦人產後忽兩乳伸長細小如腸垂下直過小肚痛不可忍危亡須臾名曰乳懸將川芎當歸各二斤半斤剉散於瓦石器內用水濃煎不拘時候多少溫服餘一斤半剉作大塊用香爐慢火逐旋燒烟安在病人面前卓子下要烟氣在上不絕令病人低頭伏卓子上將口鼻及病乳常吸烟氣直候用此一料藥盡看病證如何或未全安畧縮減再用一料如前法煎服及燒烟薰吸必安如用此二料已盡雖兩乳

畧縮上而不復舊用冷水磨草麻子一粒於頭頂心上塗片時後洗去則全安矣 婦人臨產服催生藥驚動太早未嘗離經而用力太過以致盲膜有傷產後水道中垂出肉線一條約三四尺長牽引心腹痛不可忍以手微動之則痛欲絕先服失笑散數服仍用老姜三斤淨洗不去皮於石鉢臼內研爛用清油二斤拌勻入鍋內炒熟以油乾焦爲度先用熟絹段約五尺長摺作結方令穩重婦人輕輕盛起肉線使之屈曲作一團納在水道口卻用絹袋兜裏候油姜稍溫傳在肉線上熏覺姜漸冷又用熨斗火熨熱使之常有姜氣如姜氣已過除去又用新者如此熏熨一日一夜其肉線已縮大半再用前法越兩日其肉縮盡入腹中其病全安卻再服失笑散芎歸湯補理切不可使肉線斷作兩截則不可醫 有人患勞瘵兩年諸藥不效

一日聞肉味其腹痛不可忍又恐傳染移在空房候其自
終經停三日病者腹痛氣息將絕思憶肉味之急忽有人
惠雞子三枚其病人俛仰取火低頭取瓦銚煎熟吹火屢
燃屢滅鼻中如有所碍將熟間忽嚏噴一聲有紅線一條
自鼻中出牽抽約二尺長趨下瓦銚中病人知是怪物急
用碗覆煎銚中盡力燒火不住其銚欲裂方住火開銚視
之乃是小虫一條頭目皆具已煨死如鉄線樣卽以示家
人後棄之於江其病卽安 居民逃避石室中賊以烟火
熏之欲死迷悶中摸索得一束蘿蔔嚼汁下咽而甦又炭
烟熏人往往致死含蘿蔔一片著口中烟氣不能毒人或
預曝乾爲末備用亦可或新水搗爛乾蘿蔔飲之亦可
自行擷穿斷舌心血出不止以米醋用雞翎刷所斷處其
血卽止仍用真蒲黃杏仁去皮尖礪砂少許研爲細末煉

蜜調藥稀稠得所喻化而安 身上及頭面肉上浮腫如

蛇狀者用雨滴皆礫上苔痕一錢水化開塗蛇頭上立消

治病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下痢宜

急治下部不曉此者但攻其上不以爲意則下部生虫食

其肛爛見五臟便死燒艾於管中熏下部令烟入更入少

雄黃良肘後 有人被蜘蛛咬腹大如孕婦其家棄之乞

食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日而平古今 療妖魅

猶鬼病人不肯言鬼方鹿角屑搗散以水服方寸匕卽實

言也外臺 蛟龍子生在芹菜上食之入腹變成龍子須

慎之用錫粳米杏仁乳餅煮粥食之三升日三服吐出蛟

龍子有兩頭 鬼擊之病得之無漸卒者如刀刺狀胸脇

腹內切痛不可抑按或卽吐血衄血下血一名鬼排斷白

犬頭取熱血一升飲之

馬希聖年五十餘性嗜酒常痛飲不醉糟粕出前竅便溺出後竅六脈皆沉澁與四物湯加海金沙木香檳榔木通桃仁服而愈此人酒多氣肆酒升而不降陽極虛酒濕積久生熱煎熬血乾陰亦太虛陰陽偏虛皆可補接此人中年後陰陽虛時暫可活者以其形實酒中穀氣尚在三月後其人必死後果然

醫學綱目卷之二十五
其病雖重五臟則天無艾艾中氣不絕令人更久
其病雖重五臟則天無艾艾中氣不絕令人更久
其病雖重五臟則天無艾艾中氣不絕令人更久
其病雖重五臟則天無艾艾中氣不絕令人更久
其病雖重五臟則天無艾艾中氣不絕令人更久
其病雖重五臟則天無艾艾中氣不絕令人更久
其病雖重五臟則天無艾艾中氣不絕令人更久
其病雖重五臟則天無艾艾中氣不絕令人更久
其病雖重五臟則天無艾艾中氣不絕令人更久
其病雖重五臟則天無艾艾中氣不絕令人更久

醫學綱目卷之二十六

咳嗽 乾咳嗽 咳喉中作聲 暴嗽
久嗽 孕嗽

大法

咳無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽無聲而有痰脾濕動而為痰也若咳嗽有痰而有聲者因傷肺氣動於脾濕故咳而無嗽也脾濕者秋傷於濕積於脾也故內經曰秋傷於濕冬必咳嗽大抵素秋之氣宜清而肅若反動之則氣必上衝而為咳嗽甚則動脾濕而為痰也是知脾無雷濕雖傷肺氣亦不為痰若有痰而寒少熱多故咳嗽非專主乎肺病以肺主皮毛而司於外故風寒先能傷之內經曰五臟六腑皆能使人咳非獨肺也各以其時主之而受病焉非其時傳而與之也所病不等寒燥濕風火皆能令人咳惟濕病痰飲入胃雷之而不行上入於肺則為

嗽假令濕在心經謂之熱痰濕在肝經謂之風痰濕在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰所治不同各宜隨症而治之若咳而無痰者以辛甘溫其肺故咳嗽者治痰為先治痰者下氣為上是以半夏南星勝其痰而咳嗽自安枳殼陳皮利其氣而痰自下痰而能食者大承氣湯微利之痰而不能食者厚朴湯治之夏月嗽而發熱者謂之熱嗽小柴胡四兩入石膏一兩知母五錢用之冬時嗽而發寒者謂之寒嗽小青龍湯加杏仁用之然此為大例更宜隨症隨時加減量其虛實此治法之大體也

咳分時
 上半日嗽多屬胃中有火用貝母石膏降胃火午後嗽多屬陰虛必用四物湯加知母炒黃柏先降其火黃昏嗽多此火氣浮於肺不宜用涼藥五味子五倍子欬而降之春嗽是春升之氣夏是火炎上最重

秋是濕熱傷肺

冬是風寒外束

用藥先後
 治嗽藥大槩多用生姜以其辛散也 咳逆非蛤粉青黛瓜蒌貝母不除 大槩有痰者加痰藥 用藥發散之後必以半夏逐其痰庶不再來 治嗽痰多用粟殼不必疑但要先去病根此乃收後藥也

吐痰多
 凡上氣多有服吐藥得瘥亦有針灸得除者宜深體悟之

表裏

仲咳而脈浮者厚朴麻黃湯主之

厚朴	五兩	麻黃	四兩	石膏	如雞子大	杏仁	半升
半夏	半升	乾姜	二兩	細辛	二兩	小麥	一升
五味子	半升						

右以水一斗三升先煮小麥熟去查納諸藥煮取三升溫服一升日三服

脉沉者澤漆湯主之

半夏升

紫參五錢一作紫苑

澤漆三斤以東瀝水五升半煮取一斗五升

生姜

白前各五兩

甘草

黃芩

人參

桂枝各三兩

右咬咀內澤漆汁中煮取五升溫服五合至夜盡

丹 感胃風寒咳嗽者行痰開腠理二陳湯加麻黃杏仁桔梗

局 三拗湯治咳嗽感胃風寒鼻塞聲重

甘草炙

麻黃不去節

杏仁不去皮尖

右咬咀每服五錢水一盞半姜五片煎服

四 巡檢舍人夜嗽多脉大而浮三拗湯加知母黃芩生姜煎

煎 一男子五十餘歲患咳嗽惡風寒口燥乾心微痛兩

手脉浮緊脅痞滿而數左手大於右手大槩表盛裏虛

問其人平日好嗜酒肉素有食積後因汗房勞又往來涉寒水且冒微雨又忍飢歸後繼以飽食酒肉而病先用人參每貼四錢麻黃根節一錢半與二三服咳嗽止惡風寒除後改用厚朴枳實陳皮青皮瓜蒌仁半夏為丸與二十餘貼用人參湯送下痞滿亦散而愈

麻黃錢一

蒼木錢二

瓜蒌

陳皮

半夏各三錢

枳殼錢三

黃芩錢一

桔梗錢一

木通錢一

甘草錢一

右分二貼加姜三片煎服

一婦人患嗽頭痛身膈痛

陳皮錢二

人參

川芎

麻黃

枳殼錢各

分二貼水煎服

婦人患身疼嗽而食少

白朮

黃芩

芍藥各三錢

川芎二錢

木通

紫蘇各一錢半

甘草五分

右四貼熱服

脾肺

夫咳之為病有一咳即出痰者脾勝濕而痰滑也有連欬十數不能出痰者肺燥勝痰濕也滑者宜南星半夏皂角灰之屬燥其脾若利氣之劑所當忌也澁者宜枳殼紫蘇杏仁之屬利其肺若燥肺之劑所當忌也

燥脾濕方

治風痰嗽其脉弦面青四肢滿悶便溺閉澁必多燥怒宜以水煮金花丸主之

南星

半夏各一兩 天麻五錢

雄黃一錢

白麩三兩

寒水石煨一兩

右為末水丸如桐子大每服五十七丸至百丸煎漿水

沸下藥煮令浮為度淡漿水浸之以姜湯下

羅化痰玉壺丸治風痰吐逆頭痛目眩嗽嘔吐

天南星

半夏各一兩

天麻半兩

白麩三兩

右為細末滴水為丸如桐子大每服三十丸水煮令藥浮漉出放溫姜湯下

天麻丸治風痰

天麻

半夏

天南星各一兩

雄黃少許

白麩三兩

右以水丸每服五七十丸至百丸先煎水沸下丸煮十

餘沸後用姜湯下食前

小黃丸治熱痰咳嗽脉洪面赤煩燥心痛唇口乾燥多喜笑

天南星

洗

半夏各一兩

黃芩半兩

右為細末姜汁浸蒸餅為丸如桐子大每服五十九至七十丸

白朮丸治濕痰咳嗽脉緩面赤肢體沉重嗜臥不收腹脹而食不消

天南星

半夏各一兩

白朮半兩

右為細末湯浸蒸餅為丸桐子大每服五七十九丸姜湯下食後局方防已丸亦可用

玉粉丸治氣痰咳嗽脉急面白氣上喘促泚洒寒熱悲愁不樂

天南星

半夏各一兩

陳皮去白

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五七十九丸人參生姜湯下食後服

姜桂丸治寒痰咳嗽脉沉面色黧黑小便急痛足寒而逆

心多恐怖

天南星

半夏各一兩

官桂去支

右為細末蒸餅為丸如桐子大每服五七十九丸生姜湯下食後

治嗽加減法 如心下痞悶加枳實五錢 如身熱甚加黃連五錢 如體重加茯苓白朮各一兩 如氣逆上者

加苦葶藶五錢 如氣促者加人參桔梗各五錢 如氣浮腫者加郁李仁杏仁各五錢 如大便秘者加大黃五錢

羅太白丹治三焦氣滯破除餘痰止嗽開胃

半夏洗

天南星炮

寒水石炮

白礬枯

白附子炮

乾姜炮各

右為細末麪糊丸如桐子大每服三十九丸溫生姜湯下

食後

世法製半夏用大半夏不拘多少湯洗七次去臍焙乾再洗七遍用米泔浸一日夜取出控乾每半夏一兩用白礬一兩半研溫水化浸上雷水兩指許頻攪冬月宜煖處頓放浸五日夜取出焙乾用鉛白霜一錢溫水化又浸二日夜通七日盡取出再用漿水於慢火內煮勿令滾候漿水極熟取出焙乾每服一二粒食後細嚼生薑湯下

石九方治濕痰滑而易出潔古所謂南星半夏勝其痰而咳嗽自安者是也

羅人參欬花散治肺胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽及遠年近日一切嗽病諸藥不效並皆治之

欬冬花

人參

五味子

紫苑

利肺氣方

桑白皮

各一兩

杏仁

八錢

木香

檳榔

紫蘇葉

半夏

湯泡各五錢

右為細末煉蜜為丸如鷄頭仁大每服一丸食後細嚼

淡姜湯送下

紫蘇半夏湯治喘嗽痰涎寒熱往來

紫蘇

半夏

紫苑茸

陳皮

五味子

各五錢

桑白皮

一兩

杏仁

去皮尖

兩錢

炒黃

右為籠末每服三錢生薑三片水煎日三服

垣紫蘇飲子治脾肺虛實寒涎痰咳嗽

紫蘇葉

桑白皮

青皮

五味子

麻黃

杏仁

陳皮

人參

半夏

甘草

各五錢

右咬咀每服五錢水二盞姜三片煎至七分溫服

本治肺感風寒作嗽紫蘇散

紫蘇

桑白皮

五味子

杏仁

麻黃

甘草

青皮各等分

右為細末每服二錢水一盞煎七分溫服

治嗽杏參飲

杏仁

款冬花

前胡

半夏制

五味子

麻黃

柴胡

桑白皮

人參

桔梗各等分

右為細末每服三錢水一盞半生姜五片同煎七分通

口服

右利肺氣藥紫蘇麻黃表多者宜之

利脇丸主胃中不利痰涎咳嗽喘促利脾胃壅滯調秘

泄藏推陳致新化食治利膈氣之妙品也

欬而脾
胃滯滯
皆加大
黃

木香

檳榔

藿香各一錢

甘草炙五錢

人參

當歸

厚朴各三錢

大黃酒炒

枳實各一錢

右為細末水丸桐子大每服三五丸

衍有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞以枇杷葉

木通款花紫苑杏仁桑白皮各等分大黃減半各如常製

治訖同為末蜜丸如櫻桃大食後夜臥各含化一丸未終

一劑而愈

右利肺氣藥加大黃脾胃壅滯者宜之

世杏仁煎治哮喘寒熱喜少噴多而色不潤食少脉強緊

杏仁一兩去皮尖用童便浸一日一換夏月一日三換浸

半月取出洗淨焙乾研令極細每服一匙大用薄荷一葉

白蜜少許水一盞煎食後服甚不過兩劑永瘥

潤燥之
劑

用童便浸杏仁七日漉出洗淨研成泥別入瓮瓶中換小便煎成膏熱水下二錢瘥

圖用童便一升浸杏仁三升春夏七日秋冬二七日并皮尖研細濾取汁煮令魚目沸候軟如麪糊即成用柳篋攪勿令着底即以簾布攤乾為丸每服三五丸茶酒任下

肺鬱痰嗽睡不安者 貝母 杏仁

右為細末砂糖入姜汁蒸餅丸含化

潤下丸治氣實有痰又治積氣并大腸經氣滯痰嗽

陳皮去白 甘草各五錢

右以水拌令鹽水乾焙燥為末蒸餅為桐子大或為末白湯點服立效

衍有人患氣嗽將期或教以橘皮生姜焙乾神麪等分末

為丸如桐子大食後夜以米飲服三五十九丸兼舊患勝膠氣緣服此皆愈

氣克形實脈澁者宜列氣

玉粉丸治氣痰脉澁方見前 桔梗湯除痰下氣胃脘脹滿痰逆惡心飲食不進

陳皮去白 半夏剉 桔梗炒各十兩 枳實去穢炒黃三兩

右末每服二錢水一盞生姜五片同煎七分去渣服

右用陳皮枳實氣克形實者宜之寒者加姜桂些少後二方有星半痰澁甚者忌服夫形肥或有汗或脉緩體重嗜臥之人咳者脾濕勝也形瘦或夏月無汗或脉澁之人咳者肺燥勝也濕者宜白木蒼木茯苓之屬燥之是也燥者宜杏仁瓜蒌之屬潤之是也

白木湯治咳嗽體重嗜臥脈緩前濕條白木丸亦治此病

形肥脈緩痰滑者宜燥

白木

茯苓

半夏各等分

右為籠末作五分或半兩甚者加水二盞姜七片煎至一半取清水調神麴末二錢服之病甚者玉壺丸大妙永除根

白木散治夏暑大熱或醉飲冷酒痰濕不止膈不利

白木

茯苓

黃芩

半夏各等分

右為籠末每服五錢水二盞姜三片同煎去查調陳皮神麴末各一錢食後服

保酒性大熱不宜大飲蓋酒味熱而引飲冷與熱凝於胃中不散而成濕故痰作矣甚者吐之後與五苓甘露勝濕去痰之劑

右三方白木燥濕半星勝痰形肥痰滑者宜之

形肥痰滑者宜

潔防風丸治痰嗽胃中氣不清利者枳實丸亦治此症

無利氣

防風

枳殼炒各半兩

白木一兩

右為末煨飯丸每服六七十丸姜湯下
丹仁十二孺人虛而有濕痰膈上有熱

白木

滑石各一兩

陳皮

木通五錢

黃芩三錢

甘草一錢

分六貼水煎服

七九嬌嗽有痰

蒼朮一兩

半夏一錢

陳皮半錢

甘草二分

茯苓五分

桔梗二分

姜三片煎服

治濕痰

蒼朮三錢

白木六錢

香附一錢

芍藥二錢

右蒸餅丸

治肥人濕痰

苦參

半夏各一錢半

白木二錢

陳皮一錢

右作一服姜三片竹瀝與水共一盞煎食遠吞三補丸

十五丸

羅卓角化痰丸治癆風心脾壅滯痰涎盛多喉中不利涕唾稠粘咽塞吐逆不思飲食或時昏瞶

枳殼炒二兩

天南星炮

白附子炮

半夏湯洗七次

白礬枯

人參去芦

赤茯苓去皮各一兩

阜角木白皮酥炙一兩

右為細末生姜汁麩糊為丸如桐子大每服三十九丸温水下食後

白龍丸治酒積有痰

半夏

滑石

茯苓

白礬枯各等分

右為末神麩糊為丸

右七方白木蒼木白附子半夏燥濕枳殼陳皮利氣形肥痰澁者宜之

寒熱痰

宋徽宗妃苦痰面浮如盤李醫用蚌粉新瓦上炒令通放地上出火毒每半兩加青黛少許同淡豉水滴入麻油數點調服而愈

寒痰

本草治喘嗽汗多者忌用

草烏錢五

麻黃錢二

右為末每服三大錢蘿蔔一箇同煮令熟只喫蘿蔔妙

形瘦脉

者宜潤

潤肺散

杏仁煎潤肺丸已上二方見燥痰條

貝母一兩

瓜蒌仁兩半

青黛錢五

右為末姜蜜調成膏噲

抑痰丸

瓜蒌仁兩一

半夏錢二

貝母錢三

右為末炊餅丸如麻子大

咳逆上氣痰飲心痛

海蛤燒為粉研極細過數日火毒散用之

瓜蒌仁帶穰同研

右為丸如麻子大白湯下

楊文治痰嗽利胸膈方瓜蒌肥大者割開去子洗淨槌破刮皮細切焙乾半夏四十九箇湯洗十遍槌破焙乾為末用洗瓜蒌實熱水并穰同熬成膏為丸如桐子大生姜湯下二十九

飽食傷脾嗽

温脾湯治食飽則咳

甘草兩

大棗二十枚

右二味咬咀水五升煮水貳升温分三服若咽中痛而聲鳴者加乾姜一兩

吃醋搶喉嗽

甘膽丸治吃醋搶喉因成咳嗽不止諸藥無效用甘草二兩去赤皮作二寸段中半擘開用猪膽汁五枚浸三日取出火上炙乾為細末煉蜜丸每服四十九茶清吞下臥服神效曾有人患此諸藥不效用此方一服愈

肺酒傷肺嗽

丹飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎入菲汁就吞瓜蒌仁杏仁黃連丸

治酒嗽

青黛

瓜蒌仁

食積嗽

用蜜姜丸含化散肺毒也

食停積嗽非青黛瓜蒌實不除有食積人面青白黃色不常面上如蟹爪路一黃一白者是也

清金丸治食積嗽方見虛實條

瓜蒌丸治食痰壅滯喘咳

瓜蒌實

半夏

山查

神麩各等分

為末瓜蒌穰水為丸竹瀝姜湯送下

又方治食積痰嗽

杏仁

蘿蔔子各二兩為末粥丸服

食積痰作嗽發熱者

肺痿

肺痿專在養肺養氣養血清金

仲生薑甘草湯治肺痿咳吐涎沫不止咽燥而渴

生薑五兩

人參二兩

甘草四兩

大棗十五枚

右四味以水七升煮取三升分溫三服

炙甘草湯治肺痿涎唾多心中溫溫液液者用甘草一味

以水三升煮半升分三溫服

桂枝去芍藥加皂莢湯治肺痿吐涎沫

桂枝

生薑各三兩

甘草一兩

大棗十枚

皂莢十枚去皮

右五味以水七升微微火煮取三升分三溫服

肺痿吐涎沫而不咳者其人不渴必遺尿小便數所以然

診

肺脹

者以上虛不能制下故也此為肺中冷必眩多涎吐甘草乾姜湯以溫之若服湯口渴者屬消渴

甘草炙四兩

乾姜二兩

右咬咀以水三升煮取一升五合去查分溫再服

右治肺痿症或咳沫或咳血今編咳沫者入此門咳血

者入咳吐血門

熱在上焦者因咳為肺痿肺痿之病從何得之師曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便數或從便難又被快藥下利重亡津液故得之

脈咳而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒非肺痿也

咳而上氣煩燥者為肺脹仲景云咳而上氣此為肺脹脈

浮大者越婢加半夏湯主之又云肺脹咳而上氣煩躁而

喘脈浮者心下水小青龍湯加石膏主之

二方並見喘門

針灸

肺咳酸
補辛瀉

丹肺脹而咳者用訶子青黛杏仁 訶子能治肺氣因火傷極遂成鬱遏脹滿不得眠一邊取其味酸苦有收斂除火之功佐以海石香附瓜蒌仁青黛半夏麩姜蜜調噙之香附用童便浸三日 脉鬱痰嗽睡不安宜清化丸貝母杏仁為末沙糖入姜汁蒸餅為丸噙化清化丸方見火熱條 肺脹而嗽或左或右不得眠此痰夾瘀血礙氣而病宜養血以流動乎氣降火疎肝以清痰四物湯加桃仁訶子青皮竹瀝之類如血礙氣作嗽者桃仁大黃姜汁丸服

一法灸但可一邊眠者可左側者灸右足三陰交可右側者灸左足三陰交立安

經治氣嗽嗽久者亦主之生訶子一枚含之嚥津瘥瘥後不知食味煎棋榔湯服之使有味

丹定喘切方 訶子 百藥箭 荆芥各等分

為末姜蜜丸含化

治嗽切方

五味子半兩 甘草二錢半 五倍子一錢

風化硝

為末蜜丸乾含化

世治痰嗽并喘白礬飛五倍子等分為末每二錢豬肝蘸藥臨臥服

本化痰涎方

明礬二兩 白殭蚕半兩炒去絲

右為細末生研薄荷令爛和丸如菘菹大每服二十九薄荷湯下日三服

治遠年近日喘嗽用皂角不蛀者三大莖剉去黑皮切開去子每子倉內入巴菝肉一粒合就麻皮縛定用生姜自然汁和蜜塗令周匝慢火炙之又塗又炙以焦黃為度劈開去巴菝以好明礬一兩枯過草麻七箇姜汁和蜜塗炙前三味為末却以杏仁二兩去皮尖研成膏與前藥和勻

肺欲收
急食酸
以收之

每服一錢用柿餅灸過候冷蘸藥細嚼臨臥服忌魚鮓鮓
養油麵酒米醋煎燂熱毒等物

右訶子五味五倍白礬例丹溪云黃昏嗽者火浮於肺
酸味斂而降之是也

羅九仙散治一切咳嗽

桑白皮

桔梗

阿膠

五味子

烏梅

欵冬花

貝母

粟殼八兩去蒂
蜜炒黃

右為細末每服三錢白湯點服嗽住止後服

欵花清肺散治咳嗽喘促胸膈不利不得安臥

人參去
芦

甘草炒

白礬枯

烏梅和核
碎

欵冬花各一
兩

甜葶藶生用
一錢

栗殼醋炒
四兩

右為細末每服二錢溫米飲湯調服食後忌油膩物多

言語損氣

人參清肺湯治男子婦人肺胃虛寒咳嗽氣急胸膈咽塞
腹脇脹滿迫塞短氣喜欲飲冷咽噎隱痛及癆肺痿勞嗽
吐血腥臭乾嘔煩熱聲音不出肌肉消瘦倦怠減食

烏梅

地骨皮

人參

甘草

阿膠炮

杏仁去皮
炒

桑白皮

知母

栗殼去頂蒂炒
各一兩

右吹咀每服三錢水一盞半入烏梅一箇同煎至一盞

去查溫服食後臨臥

人參欵花散治咳嗽久不愈者

人參

欵冬花

知母

貝母

半夏各三
錢

栗殼一兩炒
黃色

右為簾末每服五錢烏梅同煎臨臥服

安肺散治痰嗽不問新舊

麻黃二兩去節

甘草二兩炒

御米殼四兩去蒂炒黃色

右為末每三錢水一盞入烏梅一箇煎七分去查溫服

臨臥下

人參理肺散治喘嗽不止

麻黃去節炒

當歸

木香各一兩

御米殼三兩炒

人參二兩

杏仁二兩炒

右咬咀每服四錢水煎

右御米殼烏梅例收後藥也

世治嗽貝母去心畧炒知母去毛各一兩巴豆霜十四粒

為末和勻老生姜切如錢厚兩面蘸藥末臥嚼嚼時開口

勿咽

壬治咳嗽胸膈滿多喘上氣

以辛溫之

生薑一斤

砂糖五兩

右二味煎姜汁減半納糖更煎服

咳嗽上氣厥在胸中過在手陽明太陰全文見治虛實法

海肺咳喘息而有音甚則吐血麻黃湯 太陽咳而遺矢

赤石脂禹餘糧湯桃仁湯不止用猪苓分水散 心咳心

痛喉中介介鯁狀甚則咽喉痺用桔梗湯 小腸咳咳而

失氣氣與咳俱失芍藥甘草湯與夏脈不及病同蓋小腸為心之府故也 肝

咳兩脇下痛甚不可以轉轉則兩脇下滿小柴胡湯仲景云咳

引脇痛為懸飲宜上寒湯丹溪云咳引脇痛宜疎 膽咳

咳嘔膽汁黃芩加半夏生薑湯 脾咳右脇下痛陰陰痛

引肩背甚則不可以動動則咳劇升麻湯 胃咳嘔嘔甚

則長虫出烏梅丸 腎咳腰背相引而痛甚則咳涎麻黃

附子細辛湯 膀胱咳遺溺茯苓甘草湯 三焦咳腹滿

肺先受邪傳與五藏六府

不欲飲食此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆錢氏異攻散

素咳嗽煩冤者是腎氣之逆也示從容備一陽發病少氣善咳善泄夏脉不及則令人上見咳唾下為氣泄全文見法

凡咳嗽面赤胸腹脇常熱惟於足午有涼時其脉洪者熱痰在胸膈也宜小陷胸湯礞石丸之類清膈降痰甚而不已者宜吐下其痰熱也面白悲噫或脇急脹痛或脉沉弦細遲而咳者寒飲在胸腹也宜辛熱去之

寒熱面赤脉洪大者熱痰

世小陷胸湯治咳嗽膈有熱痰胸脇腹常熱者神效方見傷寒

丹黃連化痰丸
黃連一錢半 吳茱萸一錢半 陳皮五錢 半夏一兩

右為末麵糊丸如葦葶大每服百丸生姜湯下

右黃連半夏治痰嗽例
青礞石丸去痰或痞痛經絡中有痰皆能治之

青礞石硝煨五錢 半夏二兩 風化硝二錢 陳皮七錢

白朮一兩 茯苓七錢 黃芩兩

右炒神麩姜糊丸
又方礞石丸治痰
礞石半兩 半夏七錢 南星

風化硝二錢 茯苓各五錢

右為末神麩糊丸
痰嗽化痰方
黃芩一兩半 滑石兩 貝母

風化硝半錢 白芥子五錢 南星各一兩

右為末湯浸蒸餅丸丹溪云膈下痰非白芥子不能除

右風化硝佐礞石茯苓半夏治痰嗽例丹溪云礞石丸
重在風化硝

潔方見前小黃丸治咳嗽面赤煩燥脉洪濕痰條

羅人參半夏丸化痰墜涎止嗽定喘或風痰茶痰食痰一
切痰逆嘔吐厥頭痛或風氣偏正頭風疼或壅頭目昏眩

耳聾鼻塞咽乾胸膈不利

人參 茯苓 天南星各半 半夏

乾姜 白礬 寒水石各一兩 蛤粉二兩

薄荷五錢 藿香二錢

右為細末水糊丸如桐子大每服二十九粒生姜湯下食
後日三服

金珠化痰丸治痰熱安神定志除頭痛眩暈心忪恍惚
胸膈煩悶涕唾稠粘痰實咳嗽咽膈不利

生龍腦研細 阜莢仁炒黃 天竺黃一兩 金箔廿片

白礬二兩 半夏姜汁制

右阜角仁半為末與諸藥同拌勻生姜自然汁為丸如
桐子大每服三十九粒生姜湯下食後臨臥

人參清金丸治熱止嗽消痰定喘

柴胡 人參各一兩 黃芩 甘草炙

半夏各七錢 麥門冬 青黛 陳皮各二錢

五味子二十粒

右為細末水麩糊為丸如桐子大每服三十九粒溫白湯
下食後

垣脾肺受寒痰嗽用藥法 難經云肺太過則外症面白

善嚏悲愁不樂欲哭其內症喘咳上喝逆氣煩心胸滿煩

熱夜則涕出多嚏鼻塞不通肺金大實以子助母也心脾

面白脈
弦微者
寒痰

肺皆受寒邪涎出口甘水反侮土寡於畏也腹中大寒病
名曰寒中痰白作泡肺中氣虛而為大寒子助母也當於
肺中瀉腎水非辛熱之藥不退也口甘涎沫者胃中寒而
不和以辛甘熱去之飲酒者多有此反化
半夏溫肺湯治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜常多
唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛冷所致
其脈沉弦細遲

旋覆花

人參

細辛

桂心

甘草

陳皮

桔梗

芍藥

半夏制略

赤茯苓三分

右咬咀每服四錢姜三片煎食後服

丁香半夏丸治心下停飲冷痰頭目眩暈睡臥口中多涎

檳榔三分

丁香

半夏各一兩

細辛

乾姜

人參各五錢

右為細末生薑汁糊為丸如桐子大每服二十九丸姜湯

下日三服食後

羅溫胃化痰丸治膈間有寒脾胃停飲胸膈不快痰涎不

已

半夏泡三兩

陳皮去白

乾姜炮

白木焙各二兩

右為細末生薑麩糊為丸如桐子大每服二十九丸生薑

湯下不拘時

潔姜桂丸治咳嗽面黧黑足寒脈沉方見前濕痰條

局胡椒理中丸治肺胃虛寒咳嗽氣急逆氣虛痞不能食

嘔吐痰水

欵冬花去枝

蘿撥

陳皮

乾姜炮

良姜炒

甘草炙

細辛去苗

胡椒各四兩

白朮五兩

右末煉蜜丸如桐子大每服三十九丸溫湯下

仲吳萊萸湯方見傷寒

潔夏月嗽發寒熱者謂之熱嗽用小柴胡湯三兩加石膏

七錢知母三錢治之柴胡湯方見傷寒冬月嗽而發寒熱者謂

之寒嗽用小青龍湯加杏仁治之方見傷寒

丹火嗽宜清金化痰丸清化丸與清金丸同用專治熱

嗽及咽痛蓋苦能燥濕熱輕能治上取燈籠草葉為細末

蒸餅為丸每服三五十丸燈籠草即苦乾草其結房如燈籠狀故名之清金

丸一名與點丸去肺火降膈上熱痰與清化丸同用黃芩

一味炒為末水丸服痰因火動逆上作嗽者先治火次

治痰用知母止嗽清肺金滋陰降火火鬱嗽用訶子海

石瓜萎仁青黛半夏香附以開之喘嗽不拘老幼久近

上壅等疾槐花為末滴水丸如桐子大熟水或姜湯下不

拘時

羅柴胡飲治虛勞羸瘦面黃無力減食盜汗咳嗽不止

柴胡兩一五味子錢五地骨皮半兩鱉甲酥炙兩

知母兩一

右為細末每服二錢入烏梅二枚青蒿五葉水煎去查

服

本又方治勞嗽虛症及鼻流清涕耳作蟬鳴眼見黑花一切虛症丈夫婦人皆可服少年亦不妨

五味子兩二鱉甲兩三地骨皮兩三

右為末煉蜜丸如桐子大空心食前溫酒或鹽湯任意

服三五十九婦人醋湯下此方乃曲江人家秘方余服

之大有功效處方有理甚妙

傷冷嗽

海易簡杏子湯治咳嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰飲停積皆治療

人參

半夏

茯苓

細辛減半

乾姜減半

甘草

桂枝減半

芍藥

五味子各等分

右咬咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉二皮姜三片煎至六分去查溫服 若感冒得之加麻黃等分

若脾胃素實者用粟殼去筋膜剉碎以醋淹炒等分加

之每貼加烏梅一枚煎服其效尤驗嘔逆惡心者不可

用此 若久年咳嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻黃

芍藥乾姜五味子各增一半一名小青龍湯

潔古水煮金花丸治咳嗽多怒 天麻丸 羅氏化痰玉

壺丸已上三方並見濕痰條

風痰

丹搜風化痰丸

人參

僵蚕

槐角

白礬

天麻

陳皮去白

荆芥各一兩

半夏四兩汁浸

辰砂兩半

右為末姜汁研蒸餅為丸除辰砂為衣每四十九姜湯下

羅延壽丹治風壅痰嗽或寒痰咽膈不利

天麻兩半

枸杞一兩半

明礬一兩半枯乾姜一兩半

右為細末酒和成劑再用蒸餅裹定於籠內蒸熟去麩搓為丸如桐子大每服三十九溫水下食後臨臥

局防風丸治風痰上攻頭痛惡心項急目眩旋暈痰涎壅

滯昏憤

天麻酒浸一宿

甘草炙

川芎洗

防風各一兩

朱砂五錢

右為末每兩作十九朱硃為衣每服一九荊芥湯化服
茶亦得不拘時

川芎九消風壅化痰涎利咽膈清目頭痛旋暈

川芎

薄荷去土各七錢半桔梗兩半

防風去芦兩半

甘草三兩

右為末煉蜜為丸每兩半作五十九每服一九細嚼臘
茶清下食後臨臥

河間防風通聖散加半夏治風痰咳嗽方見瀕癩四干緡湯方見

喘潔古治痰嗽不能飲食者厚朴湯治之方見大便秘

虛實

山喘嗽白殭蚕為末姜汁清茶調服臨臥下方見

潔治痰嗽能飲食者大承氣湯微下之方見傷寒

四陰虛者

丹陰虛咳嗽四物湯加竹瀝姜汁主之陰分嗽者多屬

陰虛治之用知母止嗽勿用生薑以其辛散故也肺

嗽甚此好色腎虛者有之人參膏以陳皮生薑佐之

羅團參散治脉氣不利治咳喘止嗽

紫團參

款冬花

紫菀茸各等分

右為細末每服二錢水一盞烏梅一枚同煎七分去渣
溫服食後

陽虛者
參芪

人參款冬花膏治脾胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎
嘔逆惡心腹脇脹滿腰背傷痛或虛勞冷嗽及遠年近日
一切咳嗽諸藥不效者

款冬花去枝

人參去芦

五味子去枝

紫菀去芦

桑白皮去粗枝各一兩

右為細末煉蜜和丸如鷄頭大每服一九食後細嚼淡
姜湯送下或一九分作四服含化亦得

食治咳嗽不瘥者黃明膠炙令半焦為末每服一錢七人參末二錢七用豆豉湯一盞八分葱少許入銚子煎一兩沸後傾入蜜遇咳嗽時呷三五口

本治十六般哮喘

黃明膠一兩 馬兜零 甘草炙 半夏姜汁浸三日

人參兩半 杏仁去皮尖已 右為細末每服一大錢水一盞煎至七分臨臥食後服

隨病有湯使為引

心嗽面赤或汗流加乾葛煎早飯後服 肝嗽眼泪出加烏梅一枚大米十四粒煎 脾嗽不思飲食或一兩時惡心入生姜二片煎 胃嗽吐逆酸水入蛤粉煎 膽嗽令人不睡加茯神五分茶清調下 肺嗽上喘氣急入桑白皮煎 膈咳嗽出痰如真塊生姜汁調藥燕

下勞嗽入秦艽末同煎 冷嗽天曉嗽甚葱白三寸同煎 血嗽連頓不住當歸末棗子同煎 暴嗽涕唾稠粘入烏梅生姜同煎 產嗽背脚疼痛甘草三寸黃蠟少許同煎 氣嗽肚痛脹滿入青皮去白同煎 熱嗽夜甚蜜一七葱白同煎 哮喘喉如拽鋸入半夏三枚同煎 腎嗽入黃芪白飴糖同煎

上件十六件般嗽痰依法煎服無不效驗此方乃京都一家專治此疾因中官厚賂方始得傳屢試有效

右人參治嗽例

丹有一子三十餘久瘧虛甚盜汗得嗽嗽來便熱夜甚

甘草炙 白朮錢一 防風錢一 黃連分五 人參分八 乾姜分三 黃芪分五 白水煎服

里成人多嗽怠惰脉不數兩手脉大而長此勞症無熱

單白木半錢 陳皮兩 蒼朮兩 茯苓各五

神麴七分 川芎分三 黃芩炒三分 五味子粒

芍藥分五 黃芪分 甘草各三分 黃芩分

用生姜二片同煎 陳孺人九十餘歲嗽或發或止發時有清痰寒熱作食少

面虛浮淡黃色 陳皮六分 青皮一分 白朮不效 芍藥各五

麻黃錢二 木通一分 白朮乾姜 黃芩各二

防風各一分 乾姜一分 黃芩錢半

分七貼五味子七粒煎三之一 雲補肺湯治勞嗽

桑白皮兩 熟地各三 人參兩 紫菀兩

黃芪兩 五味子各一 天麻兩 葛根兩

右為末每服三錢水煎入蜜少許食後

垣欵花補肺湯治年高氣弱肌體瘦困短氣遇秋冬咳嗽

大作夜間尤甚三五百聲不絕春夏稍緩

黃芪兩 甘草錢 當歸分七 佛耳草錢一

欵冬花分二 陳皮分七 丹皮分三 黃柏酒浸三分

蒼朮錢二 麴末分七

右咬咀每三錢水煎去查稍熱食後服

清肺湯除濕熱治金火嗽

黃芪錢四 蒼朮錢 防風錢 歸身錢

茯苓各一 五味子粒三十 陳皮分二 青皮分五

澤瀉錢二 黃柏分六

右剉如麻豆每服五錢水煎去查稍熱臨臥服

瀉火補肺湯治金火嗽五六月間嗽

醫學綱目卷五

五味子錢五 黃芪錢二 人參錢一 甘草錢一

陳皮去白 錢一 麥門冬錢一 青皮分五 升麻錢一

蒼木錢一 歸身錢一

右剉如麻豆大每服五錢水煎去查稍熱服

右參芪朮治嗽例後三方黃芪為君氣虛甚者宜之膈

滿食少者忌服

丹蛤蚧丸治肺臟內傷咳嗽氣急久不除漸羸瘦

蛤蚧去頭足 兩炙 錢一 訶子煨取 肉 錢一 細辛 甘草炙 錢一

阿膠炒 蛤粉 錢一 熟地 麥門冬去心 各 錢一

為末蜜丸每兩作十五丸每一丸食後含化

右蛤蚧丸久嗽不愈者宜之

羅大利膈丸治風痰實喘咳嗽風氣上攻

牽牛四兩 生用 半夏洗 錢一 木香錢五 青皮去白 兩

痰在腸胃脈沉下實者宜

梔角各三兩 檳榔 大黃各三錢 皂角去皮 子 酥炙

右為細末生姜麩為丸每服五十九丸生姜湯下

丹墜痰丸治痰飲

枳實 枳殼一兩 牛 明礬三錢 枯 錢一 朴硝三錢 風化

猪牙皂角二錢 酒炒 黑牽牛半斤 取 頭末

右為末蘿蔔子汁為丸每服四十九丸雞鳴時服初有糞

次有痰

右下痰用大黃牽牛有熱者宜之

世治久嗽痰積半夏二兩用江子五錢敲損同煮至半夏

無白心去江子不用杏仁一兩用烏梅半兩同煮去烏梅

不用止將半夏杏仁焙乾為末煉蜜丸如菉豆大量虛實

服服後下痰積

羅透羅丹治痰實咳嗽胸膈不利

皂角酥炙去皮 黑牽牛微炒 半夏湯洗各二兩 巴豆去油另研一錢

大黃浸焙用 杏仁炒去皮

右為細末生薑自然汁丸如桐子大食後生薑湯送下
二十九咳嗽甚者三四服必效

丹治痰嗽喘

南星錢二 半夏 滑石錢三 江子五粒去油

輕粉少許

右用皂角仁浸濃汁丸梧子大每服七十九

本治諸般痰嗽

半夏姜汁浸一宿 天南星各兩 白礬各半兩 焰硝二錢

杏仁去皮尖 青黛各半兩 猪牙皂角去黑皮并子各半兩

巴豆廿一粒去殼生用

右一處為不姜糊丸如棗葶大每服七九臨臥姜湯下

小兒五九

丹青金丸治食積火鬱嗽

貝母各半兩 知母各半兩 巴豆霜五分

右為末姜汁丸青黛為衣

右下痰用巴豆有寒者宜之前一方但借巴豆之氣虛人亦可服

潔欬氣丸治久嗽痰喘肺氣浮腫

青皮 陳皮 檳榔 木香

杏仁 茯苓 郁李仁法 川歸

廣茂 馬兜零炮 葶藶錢三 人參

防已錢各四 牽牛頭末二兩半

右為細末姜汁麪糊丸如桐子大每服二十九加至七

十丸食後姜湯送下

羅紫參散治肺氣虛咳嗽喘急胸膈痞痛脚膝微腫

人參二錢 蛤蚧一對 白牽牛炒 甜葶藶炒

木香錢 苦葶藶炒 檳榔各五錢

右為末用熟棗肉丸每服四十九丸煎人參湯下食後

右下痰用檳榔木香佐牽牛葶藶郁李仁久嗽面浮足

腫者宜之

孫兆視雷道矩病吐痰頃間已及一升喘咳不已面色鬱

黯精神不快兆與服仲景葶藶大棗湯一服訖已覺胸中

快利畧無痰唾矣

本治氣喘咳嗽

大黃 葶藶一兩淨

右為末煉蜜丸如桐子大每服五七十九丸桑白皮湯下

右下痰用葶藶為效極速虛人忌用

仲咳家其脉弦為有水十棗湯主之 有支飲家欬煩

中熯不卒死至一百日或一歲宜十棗湯

丹伯温年近四十滋味厚素患咳嗽有痰與通神丸神木

丸和勻食前生姜湯下五六十九丸後以津嚥小胃丹十五

丸日服六服

右十棗湯下痰仲景法也虛人審之丹溪變十棗為小

胃丹而少服徐徐法也

脉欬而時發熱脉卒弦者非虛也此為胸中寒實所致也

當吐之咳家其脉弦欲行吐藥當相人強弱而無熱乃可

吐之其脈沉者不可發汗

子和稀涎散 三聖散 仲景瓜蒂散已上三方並見治法門

右吐熱痰法輕者但用芎藭茶梔仁蘿菖子姜汁入酸齏

汁探吐之

痰在胸膈脈浮吐弦者宜

局碧霞丹

方見治法門

本治遠年近日哮喘妙方

砒

麩

海蝶蛸各一錢

右三味為末水調作餅子慢火炙黃再研令細每服一字用井花水調一大呷空心服良久吐出為度小兒加減與之忌食毒物

右吐寒痰法丸用藜蘆瓜蒂吐不透者用附尖神效

吐下兼施

子和常仲明病寒熱往來時咳一二聲面黃無力懶思飲食夜多寢汗日漸瘦削諸醫作虛損治之用二十四味燒肝散麻茸牛膝補養二年口中痰出下部轉虛戴人斷之曰上實也先以涌劑吐痰二三升次以柴胡飲子降火益水不月餘復舊此症何名乃經中云二陽病也二陽之病發心脾不得隱曲心受之則血不流故女子不月脾受之

則味不化故男子少精此二症名異而實同仲明之病味不化也 馳口鎮一男子年二十餘歲病勞嗽數年其聲欲出不出戴人問曾服藥否其人曰家貧未嘗服藥戴人曰年壯不妄服藥可治先以苦劑涌之次服舟車瀉川丸大下之又服重劑果瘥 一田夫病勞嗽一涌一泄已減大半次服人參補肺湯臨臥更服檳榔丸以進食 右吐下兼施以攻其痰也

切痰

本治勞嗽

青黛三錢

辰砂

雄黃

白礬

信各一錢
生用

右並為末淡豆豉一百粒湯浸去殼研如膏入前五味丸如桐子大每服一九臨臥冷茶清下
治遠年近日喘嗽

蠅蛇一兩去頭足 五靈脂生 砒生 雄黃生

杏仁去皮尖輕粉 淡豆豉四十粒 馬兜零生一兩

右研除出輕粉另研餘為末用生薑葶藶自然汁合輕粉諸藥為丸如小彈大每服一九臨臥細嚼生薑湯送下

右用信劫痰例蓋為寒濕痰設也

運氣

一曰火經云少陽司天之政初之氣候乃大溫其病氣拂於上欬逆二之氣火反鬱白埃四起其病熱鬱於上欬逆三之氣炎暑至民病咳終之氣風乃至其病陽氣不嚴而咳是也

二曰燥熱經云少陰司天之政水火寒熱持於氣交民病咳喘三之氣大火行寒氣時至民病咳喘此上熱下燥為

咳喘也終之氣燥令行餘火內格咳喘此外燥包熱在內咳喘也

雜方

本治諸嗽久不瘥貝母湯

貝母一兩去心姜制 黃芩兩 乾姜生一兩 五味子

陳皮各一兩 桑白皮兩 半夏 柴胡

桂心各一兩 木香 甘草各一分

右為粗末每服五錢水一盞半加杏仁七箇去皮尖生薑七片煎去渣熱服有姓蔣者其妻積年嗽制此方授之一服瘥以治諸般嗽悉愈

右方有寒有熱有收有散諸嗽通用也

藏腑

素黃帝問曰肺之令人欬何也岐伯對曰五臟六腑皆令人欬非獨肺也帝曰願聞其狀岐伯曰皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也此邪從外受之王註云邪謂寒氣 其寒

飲食入胃從肺脉上至於肺則肺寒寒邪從外受也肺寒則外內合邪因而客之則為肺欬所謂肺先受邪也五臟各以其時受病王註云時非其時各傳以與之人與天地相參故五臟各謂王月也以治時肝治春心治夏脾治長夏肺治秋腎治冬也甚則為泄為痛乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之帝曰何以異之岐伯曰肺欬之狀欬而喘息有音甚則吐血取太淵穴也心欬之狀欬則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺取太陵穴也肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩胠下滿取太衝穴也脾欬之狀欬則右脇下痛陰引肩背甚則不可以動動則欬劇取大白穴也腎欬之狀欬則腰背相引而痛甚則欬涎取大溪穴也帝曰六腑之欬奈何安所受病岐伯曰五臟之久欬乃移於六腑脾欬不已則胃受之

胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長虫出取三里穴也肝欬不已則膽受之膽欬之狀欬嘔膽汁取陽陵泉穴也肺欬不已則大腸受之大腸欬狀咳而遺矢取巨虛上廉也心欬不已則小腸受之小腸欬狀欬而失氣氣與欬俱失取巨虛下廉也腎欬不已則膀胱受之膀胱欬狀欬而遺溺取委中穴也久欬不已則三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也取支溝穴也帝曰治之奈何岐伯曰治臟者治其俞治腑者治其合浮腫者治其經見欬論針灸治嗽灸天突肺俞二穴泄火熱瀉肺氣嗽灸兩乳下黑白際各百壯即瘥又以蒲當乳頭周匝圍身令前後正平當脊骨下解中灸十壯又以繩橫量口中折繩從脊灸繩兩頭邊各八十壯三報三日畢兩邊者是合度

治咳嗽

身柱三分瀉 至陽三分補三呼不肺膈寸一分沿皮

瀉六吸寒痰紅痰 又法 風門外一分沿皮向

咳嗽喘滿氣急不食容顏黧黑鼻流清涕 風門沿皮

補之 巨闕三分瀉之三 太淵五分瀉之 期門平 下腕

瀉之 中腕三寸 絕骨三寸半退 支

瀉之 中腕三寸 絕骨三寸半退 支

婦人咳嗽寒熱往來風寒嘔逆勞疸中滿喘急

風門沿皮一寸半 太淵五分治 中腕三寸治嘔逆

絕骨 曲池 各一寸半治寒 間使透支滿中

用 欬逆上氣舌乾脇痛心煩肩寒少氣不足以息腹脹喘

尺澤主之 咳乾嘔煩滿俠白主之 欬上氣喘不息得

暴痺內逆肝肺相搏臍口出血身脹逆息不得臥天府主

之 欬逆上氣喘不得息嘔吐胸滿不得飲食輸府主之

欬逆上氣涎出多吐呼吸喘悸不得安或中主之 胸

滿咳喘不得息嘔吐煩滿不得飲食神藏玉之 欬逆上

氣魄戶及氣舍主之 欬逆上氣譫譫主之 胸脇堵滿

不得俛仰飲食不下咳唾沫膿周榮主之 欬而泄不欲

食者商丘主之 凄凄寒咳吐血逆氣入心痛手陰郄主

之 欬而胸滿前谷主之 欬逆上氣吐沫天容及行間

主之 欬逆不止三焦有水氣不能食維道主之 欬面

赤熱支溝主之 欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不

通水突主之 欬上氣喘暴瘖不能言及舌下挾縫

青脈頸有大氣喉痺咽中乾急不得息喉中鳴翕翕寒熱

項痛肩痛胸痛腹皮熱衄氣短鯁心痛隱疹頭痛面皮赤

熱身肉盡不仁天突主之 欬逆上氣喘不能言華蓋主

診

成無已云欬者聲欬之欬俗謂之嗽者是也肺主氣形寒飲冷則傷之使氣上而不下逆而不收衝擊膈咽令喉中淫淫如痒習習如梗是冷嗽甚者續續不已連連不息坐臥不安言語不竟動引百脈咳聲聞四近矣警枯切肺痿欬唾咽燥欲飲水者自愈自張口者短氣也咳聲也咳嗽肺脹壅遏不得眠者難治

仲人嗽十年其脉弱者可治實大數者死其脉虛者必苦冒其人本有支飲在胸中故也治屬飲家 上氣面浮腫肩息其脉浮大不治又加利尤甚 脉浮短者其人肺傷諸氣微少不過一年死法當嗽也 欬嗽羸瘦脈形堅大者死

欬而脫形身熱脉小堅急以疾是逆也不過十五日死全

忌

見診

脉上氣脉數者死謂其形損故也 欬嗽脉沉緊者死浮直者生浮軟者生小沉伏匿者死

用瓜蒌恐泥膈不快

乾咳嗽

乾咳嗽者無痰有聲是也此症本於氣滯滯微者連咳十數聲方有痰出滯甚者雖咳十數聲亦無痰出是為乾咳

補開
陰鬱

類乾咳嗽極難治此係火鬱之症乃痰鬱其火邪在中用苦桔梗以開之下用補陰降火之劑不已即成勞倒倉法好此不得志者有之宜用補陰方四物湯加竹瀝炒栢之

氣滯

甘桔湯此仲景少陰咽痛藥也孫真人治肺癰吐膿血

用生甘草加減二十餘條甘桔湯方用桔梗三兩

欬逆氣者加陳皮欬嗽者加貝母知母欬發渴者

加五味吐膿血者加紫苑肺痰者加阿膠面目

腫者加茯苓嘔者加生姜半夏少氣者加人參麥

冬皮膚痛者加黃芪目赤者加梔子黃連咽痛者

加鼠粘子竹茹聲不出者加半夏桂枝疫毒頭腫

者加鼠粘子大黃芒硝胸痛膈不利者加枳殼心

胸痞者加枳實不得眠者加梔子發狂者加防風

荊芥酒毒者加葛根陳皮實熱不降

一中年婦人乾欬寸脈滑動似葶狀餘皆散大不浮左大

於右每五更心躁熱有汗俾怒氣則甚與桔梗不開諸藥

不效遂以石膏香附為君芍藥連青黛門冬瓜蒌實陳皮炒

栝歸梗為臣五味砂仁川芎紫苑佐之凡二十餘貼而安

雜方 潔古蜜煎生姜湯蜜煎陳皮湯與燒生姜胡桃方皆治無

痰而嗽者以辛甘潤其肺也如但使青皮藥皆宜去白本

草云陳皮味辛理上氣去痰氣滯塞青皮味苦治下氣二

味俱用散三焦氣也故聖惠法治云陳皮去穰穰不除即

生痰麻黃發汗節不去則止汗

本補肺法

地黃二斤生杏仁二兩生姜蜜各四兩

右搗如泥入瓦盆中置飯上蒸五七度每五更挑三匙

嚥下

治久嗽方

白蜜一斤生姜二斤

右二味先秤銅銚知斤兩訖納蜜復秤如數次納姜汁

煎之

喉如軒
聲為虛

以微火煮令姜汁盡惟有蜜斤兩在則止且服如棗大
含一丸日三服忌一切雜食

咳嗽喉中作聲

一男子五十餘歲病傷寒咳嗽喉中聲如鉤與獨參湯一
服而軒聲徐至二三貼效嗽亦漸退凡服二三十斤病始全
愈

治久患嘔呷咳嗽喉中作聲不得眠取白前搗為末温

酒調二錢七衍義云白前
保定肺氣

喉如水
實雞聲為

效而上氣喉中水鷄聲射干麻黃湯主之

射干兩

麻黃

生姜各四兩

細辛

紫菀

款冬花各三兩

大棗七枚

五味子

半夏各半升

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫納諸藥

煮取三升分温三服

白前湯效逆上氣身體浮腫短氣腫滿且夕倚壁不得

臥喉中水鷄鳴

白前

紫菀

半夏

大戟各三兩

右咬咀以水一斗浸一宿明日煮取三升分三服

肺逆

陰爭於內陽擾於外魄汗未藏四逆而起起則熏肺使

人喘鳴陰陽別論起居如故而息有音者此肺之絡脉逆也

脉絡不得隨經上下故留經而不行絡脉之病人也微故

起居如故而息有音也逆調論

針灸

督脉生病其上氣有音治其喉中央在缺盆中者天突其

病上衝喉者治其漸漸者上俠頤也天迎穴

咳喉中鳴唾血大鍾主之 胸脇支滿不得俛仰瘖瘖

欬逆上氣咽喉喝喝有聲太溪主之 咳逆上氣咽喉喝

喝喘息拔突主之

熱

治暴熱嗽方

杏仁

紫蘇子一升

陳皮一兩

柴胡四兩

右咬咀以水一斗煮三升分三服

痰

治暴嗽白蜆殼洗淨研細粥飲下

本治暴嗽

砒霜錢一

白礬一兩飛過細研

右先將砒霜安放茶盞內却將白礬末鋪蓋火煨為末

烏梅肉丸如棗荳大朱砂為衣每服二丸紫蘇湯下

雜方

治暴嗽百部藤根搗自然汁和蜜等分沸煎成膏嚥之

久嗽

風寒宜薰

肺受風寒久嗽非此不能除南星欵花鷺管石佛耳草雄黃為末拌艾以姜一厚片雷舌上次用艾上燒之須令

煙入喉中一方無佛耳草有鬱金

又方鷺管石雄黃各

一分半另為末欵花佛耳草各一分半另為末却用紙一

幅方方闊四五寸以鷄子清塗其中央四旁各懸一寸許

不塗然後以鷺管石雄黃摻於鷄子清上又以欵花佛耳

草末摻其上覆之又以一箭筋從不塗紙旁捲起為一紙

筒用糊粘牢其旁抽箭筋出焙乾用時將一紙筒含在口

一頭火燒以口吸煙令滿嚥之嚥至燒筒盡為度却喫茶

三三口壓之

霍療久嗽薰法每日取欵花好鷄子少許蜜拌花使潤納

一升鐵鑊中又用一瓦碗鑽一孔孔內安小竹筒或筆管

亦得其筒稍長置碗鑊相合及插筒處皆麪糊塗之勿令

泄氣鑊下着炭火少時欵冬煙自竹管出口含筒吸取

嚥之如胸膈稍悶須舉頭即將指頭捻竹筒頭勿令漏煙

痰

氣出及煙盡止凡如是五日一為之至六日則飽食羊肉
餽飽一頓永瘥法不用鑊枕用有嘴瓦瓶燒藥蓋住
瓶口却以口於瓶嘴吸煙咽之尤捷

枳殼湯治久痰嗽胸膈不利者多上焦發熱

枳殼炒三兩

桔梗二兩

黃芩一兩

右為細末每早取二兩半水三盞煎至一盞日作三服
午時一服中時一服臥時一服三日七兩半服盡又服
半夏湯

生半夏湯用半夏姜制切片每三錢半水盞半姜五片煎
至一盞食後服一日二三服二三日服了再服枳殼丸盡
其痰為度論曰先消胸中痰氣後去膈上痰再與枳木丸
謂首尾合治盡消其氣令痰不復作也

丹久嗽丸子

海蛤粉細研

膽星臣

杏仁臣

女青調子佐

青黛佐

皂角使

右為末姜汁丸如桐子大姜湯下

久嗽乃積痰久留肺腕粘滯如膠氣不能升降或挾濕與
酒而作

香附童便

姜蚕炒

海蛤粉

瓜蒌仁

蜂房

杏仁

姜汁

竹瀝

神麩各等分

右為末蜜調噲化

謝老人形實夏月無汗成久嗽痰

半夏制

紫蘇葉各一兩

右二味入莎末蜆殼末神麩末以瓜蒌穰桃仁半兩和
丸先服三拗湯三貼方服此丸子

男子五十歲舊年因暑月入冷水作勞患瘡後得痰嗽次

年夏未得弦脉而左手虚叩之必汗少而有痰身時時發熱痰如稠黃膠與下項方藥仍灸大椎風門肺俞五處

半夏

白木

茯苓

黃芩

陳皮

桔梗

枳殼

石膏

僵蚕

五味子

右用神麩糊丸姜湯下三十九丸先與三拗湯加黃芩白朮二貼夜與小胃丹十九丸以攪其痰

潔古欬氣丸治久嗽浮腫 羅氏紫參散用蛤蚧衍義云

蛤蚧治久嗽有功

實者下之吐之

馬兜鈴丸治多年喘嗽不止大有神功

馬兜鈴

半夏

杏仁

巴豆

皮

研

已上除巴豆杏仁另研外餘為細末用皂角膏子為丸

如桐子大雄黃為衣每十九丸臨臥煎烏梅湯下以利為

度

干治三十年咳嗽或飲或咳寒氣嗽雖不同悉治之

細辛

欬冬花

防風

紫苑

藜蘆

川椒

右六味咬咀取藜蘆先着銅器中次紫苑次細辛次欬

冬花次椒以大棗百枚間在諸藥中以水一斗二升微

火煮令汁盡出棗曝令燥鷄鳴時服半棗不知明旦服

一枚以胸中溫溫為度若強人欲嗽吐者可少增服之

便吐膿裹結痰吐後勿冷飲食咳愈止藥藥勢靜乃食

不爾令人吐不已

治久嗽不瘥方

兔屎

礪砂

胡桐淚

雜方

右三味為末蜜和丸如桐子大每服三丸以粥飲下日
三吐冷物盡即瘥

丹蛤蚧丸治久嗽方見陽虛效條又方衍義治久欬膿血胸膈

噎痛蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠羚羊角各一兩除膠外皆

為屑次入膠河水三升煮半升臨臥細呷愈詳見效血療三

十年嗽以百部根二十斤搗絞取汁煎之如飴服方寸七

日三服驗

百一治久咳嗽上氣十年諸藥治不瘥方以蝙蝠除翅足

燒令焦為末飲服之

妊娠嗽

雲馬兜鈴散治妊娠胎氣壅塞欬嗽喘急

馬兜鈴 桔梗 人參 甘草

貝母各五錢 陳皮白去 大腹皮 桑白皮

肺

紫蘇各一兩 五味子五錢

右吹咀每服四錢姜三片水煎

麻黃散治妊娠外傷風冷痰逆咳嗽不食

麻黃節去 陳皮白去 前胡略一 半夏洗

人參 白朮 枳殼 貝母

甘草各半兩

右吹咀每服四錢葱白五寸姜三片棗一枚水同煎

紫苑湯治妊娠咳嗽不止胎不安

紫苑 天門冬略一 桔梗兩半 甘草

杏仁 桑白皮各二錢半

右吹咀每服三錢竹茹一塊水煎去查入蜜半匙再煎

二沸溫服

天門冬去心兩 貝母 人參 甘草



醫學綱目卷之二十六

桑白皮 桔梗 紫蘇各半 赤茯苓兩

麻黃 錢半

右吹咀每服四錢姜三片水煎

杏仁 桑白皮 天門冬 杜仲 杜草

為散吹入喉中如不下五服下安

白芍 白朮 白朮 白朮 白朮 白朮

甘草 細切

人參 白朮 附子 貝母

麻黃 刺五加 前胡 半夏

麻黃 刺五加 前胡 半夏 刺五加 前胡 半夏

水煎服每服四錢姜三片水煎

醫學綱目卷之二十六

