

傷寒部

醫學綱目

自卅一
至卅二

十七

醫學綱目卷之三十一

傷寒部

陽明病

胃實不大便

自汗

不得臥

潮熱

譫語

狂亂

循衣摸牀

渴

嘔

乾嘔

陽明裏証

胃家實

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實是也少陽陽明者發汗利小便胃中燥煩實大便難是也陽明之為病胃家實也問曰緣何得陽明病答曰太陽病發汗若下若利小便者此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明病也傷寒脈浮而緩手足自溫者是為繫在太陽太陽者身當發黃若小便利不能發黃至七八日大便鞭者為陽明病也陽脈實因發其汗汗出多者亦為太過太過為陽絕於裏亡津液大便因鞭也

中風中
寒辨

忌攻

陽明病若能食為中風不能食為中寒 陽明病但頭眩
不惡寒故能食而欬其人必咽痛若不欬者咽不痛也
陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以
其人本虛故攻其熱必噦也 陽明病脈遲食難用飽飽
則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸下之腹滿如故所以
然者脈遲故也 陽明病欲解時從申至戌止 傷寒嘔
多雖有陽明症不可攻也 陽明病面合赤色不可攻之
攻之必發色黃小便不利也 陽明病心下鞭滿者不可
攻之攻之利遂不止者死利止者愈
傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者
知不在裏仍在表也須當發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯
陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯 陽明
病脇下鞭滿大便不利而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯

胃實有
表者先
解表

痛脈
和弦宜

口苦脈
浮脈宜
和

若上焦得通津液得下胃氣因和身濺然汗出而解
陽明中風脈弦浮大而短氣腹滿脇下及心痛久按之氣
不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱
時時噦耳前後腫刺之小瘥外不解病過十日脈續浮者
與小柴胡湯脈但浮無餘症者與麻黃湯若不小便腹滿
加噦者不治
陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下
之則腹滿小便難也許學士云宜小柴胡湯 陽明腹滿脈浮緊口
苦咽乾而喘若發熱汗出不惡寒反惡熱身重者忌發汗
忌加燒針忌下也論見白汗 陽明病脈浮而緊者必潮熱發
作有時但浮者必盜汗出
右胃家實不大便雖三尺之童亦知可下也殊不知仲
景之法雖有胃實症若表未解及有半表者亦先用桂

枝柴胡以解外然後視虛實消息之也

醫實表
解無症
若忘攻
大便硬
者導之

陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖硬不可攻之當須自欲大便時宜用蜜煎導而通之若土瓜根及入猪膽汁皆可導之

蜜煎導法

用蜜七合入銅器中微火熬稍凝似飴狀攪之勿令焦候可丸以手捏作挺子令頭銳大如指長二寸許乘熱急作之納穀道中用手急捺住欲大便時乃去之 又猪膽汁方用大猪膽一箇瀉汁和醋少許和勻灌入穀道中如飯時頃大便自去

便硬無
所苦者
俟之

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必鞭不更衣十日無所苦

也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓散 陽

明病本自汗出醫更重發汗病已瘥尚微煩不了了者此大便必鞭故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今為小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也

胃實表
解有証
者隨証
攻之

陽明病潮熱不六便六七日恐有燥糞欲知之法少與小承氣湯轉矢氣者有燥屎可攻若不轉矢氣者無燥糞不可攻

方論見
潮熱

陽明病汗出大便鞭而譫語者宜小承氣湯

方見
譫語

不大便腹滿者宜下之若但遠臍痛者則為燥

方見
腹滿

屎宜承氣湯 若心下至小腹滿痛者則為結胃宜陷胃

方見
腹滿

陽明病不吐不下心煩者宜調胃承氣湯 陽

明病發熱汗出此為越熱不能發黃也但頭汗出身無汗

汗劑頸而還小便不利渴飲水漿者此為瘀熱在裏身必發黃茵陳湯主之 小便不利大便乍難乍易有微熱喘胃不臥者宜大承氣湯論見不陽明症其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑宜抵當湯下之方見畜血無表裏症下後脈數不解消穀易飢六七日不大便者有瘀血宜抵當湯 傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯 跌陽脈浮而濇浮則謂強濇則小便數浮濇相搏大便難其脾為約麻仁丸主之

麻仁丸丹溪云氣實而表藥也

麻仁升

芍藥

厚朴去皮薑製

枳實各四兩

杏仁

大黃煨各八兩

右為末蜜和丸如桐子大米飲下二三十九末知益之每日三服

漱水不

無香

胃實脈

下

宜

脈虛者

宜

胃實反

陽明口燥但欲漱水不欲嚥者此必血滯人下許學士有一士人家病二人皆旬日矣一則身熱無汗大便不通小便如澀神昏而睡診其脈長大而實予用承氣下之而愈一則陽明白汗大便不通小便利津液少口乾燥其脈亦大而虛作蜜煎三易之下燥糞得澹利而解其家曰皆陽明不通何以治之異予曰二症雖相似然自汗小便利者不可蕩滌五臟為無津液也然則傷寒大症相似兩症稍有不同宜仔細斟酌正如格局看命雖年月日時皆同而貴賤窮通不相侔者於一時之中有淺深故知不可不謹 陽明病發多反無汗其身如虫行皮中狀者此久虛故也

虛邪

陽明病反無汗而小便利三日嘔而欬手足厥者必頭

痛若不欬嘔手足不厥者頭不痛論云小便利者寒邪內攻肢厥頭痛寒邪外攻

也陽明胃實脈浮無汗而喘宜麻黃湯論見胃實有表條陽

明病無汗小便利心中懊懣者身必發黃宜茵陳蒿湯

脈浮而數能食不大便者此為實名曰陽結也期十七日

當劇陰結脈沉而遲不能食身體重大便鞭名曰陰結也期十四日

當劇胃實欲寐者少陰少陰病但欲寐腹脹不大便者承氣湯主之論見但欲寐

針灸陰症傷寒大便不通期門照海方見

海方見已寒丸治陰症服四逆數日不大便躁渴者方見

自汗者謂不因發散而自然汗出也

問曰陽明外症云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

問曰病有得之一日不發熱而惡寒何也答曰雖得之一

日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也問曰惡寒何故自罷

答曰陽明居中土萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自

止此為陽明病也傷寒轉屬陽明者其人濺然微汗出

也

本太陽初得病時發其汗先出不徹因轉屬陽明也汗

出身熱不惡寒便鞭譫語者宜承氣湯論見

陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯

許有人患傷寒自痛鼻乾不得臥大便不通尺寸脈俱大

已數日一夕汗出予謂速以大柴胡湯下之醫駭曰陽明

自汗津液已涸法當用蜜煎何須苦用下藥予謂曰子雖

急下證

下證

陽明外

證身熱

惡寒

自汗不

惡寒

成自汗者謂不因發散而自然汗出也

問曰陽明外症云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

問曰病有得之一日不發熱而惡寒何也答曰雖得之一

日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也問曰惡寒何故自罷

和解症

知蜜煎為穩當選用大柴胡湯此仲景不傳之妙公安能知之予力爭竟投大柴胡湯二貼愈仲景論陽明之病多汗者急下之人多謂已是自汗若又下之豈不表裏俱虛又如論少陰云少陰病一二日口乾燥者急下之人多謂病發於陰得之日淺但見乾燥若更下之豈不陰氣愈甚舉此二端則其可疑者不可勝數此仲景之書世人罕能讀也予謂仲景稱急下之者亦猶急當救表急當救裏之說凡稱急者有三變謂纔覺汗未至津液乾燥便速下之則為精捷免致用蜜煎也若胃中識得了了自無可疑若未了快用之反不若蜜煎之為穩也

陽明脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則心憤憤反譎語若加燒針必怵惕躁不得眠若下則胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者

梳子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

陽明病若中寒不能食小便不利手足澀然汗出此欲作痼瘕必大便初鞭後溏所以然者以胃中冷水穀不別故也

太陽病發熱汗出不惡寒者為柔瘕

汗出不惡寒發熱關上脈細數曰小逆

汗出身熱不惡寒裏症前條陽明病是也 汗出身熱惡風寒者宜桂枝湯

似陽明二症 表裏 汗出身熱惡寒 小便利飲食 若自解 脈浮發熱口苦者邪在表脈緊自汗腹滿 不惡寒者邪在裏此表裏俱有邪宜和解

論見

論見

論見

論見

偽表不
惡寒屬
裏

兼骨節煩疼不得屈伸小便不利者甘草附子湯論見

汗出湯
不渴

若發汗後遂漏不止惡風者桂枝附子湯論見

汗出心
痞有二
症

若夏月中暑自汗身熱惡寒脈微弱口渴足冷者白虎
加人參湯主之方論見

汗後汗
不徹

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之
汗出心下痞滿有二症其痞按之濡軟不痛而惡寒者宜
附子瀉心湯其痞按之鞭引脇痛而身體不惡寒者宜十
棗湯方論見

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢急難以屈
伸者桂枝加附子湯主之

桂枝附子湯
附子製一
箇 桂枝去皮
二兩 生薑一兩
半 甘草一兩

右吹咀每服五錢水煎溫服

許有一人得太陽症因發汗汗不止惡風小便濇足攣而
不伸予診其脈浮而大浮為風大為虛予曰在仲景方中
有兩症大同而小異一則小便難一則小便數用藥少差
即有千里之失仲景第七症云太陽發汗遂漏不止其人
惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯第十
六症云傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反
以桂枝湯攻表此誤也得之便數咽中乾煩燥吐逆一則
漏風小便難一則自汗小便數或惡風或惡寒病各不同
也予用第七症桂枝加附子湯三服而汗止佐以甘草芍
藥湯足便得伸

二陽併病太陽病發汗不徹因轉屬陽明續自微汗出不
惡寒其人面赤燥煩短氣不知痛處但坐更發汗則愈論見

風濕症

發汗已身灼熱者名風濕風濕為病脈浮汗出身重多眠

胃乾

宜葳蕤湯論見風溫發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少少與

動氣

動氣在左發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤此為逆難治論見後

汗出而喘

汗下後汗出而喘者麻黃杏仁甘草石膏湯論見喘下後利不

利汗出下

止脈促喘而汗出者葛根黃芩黃連湯論見喘汗出下利熱不去厥逆惡寒者四逆湯論見利下利清穀者通脈四逆湯論見利汗出下利有微熱者其脈數自愈脈緊未愈論見利六七日後發熱而利其人汗出不止者死論見利

汗出吐利

脈緊反汗出而咽痛吐利者少陰病亡陽吐利汗出手足厥冷脈微欲絕者四逆湯吐利止汗出而厥脈微欲

意

絕者通脈四逆加豬膽汁湯方論並見吐利脈陽微而汗出者為自和也汗出多者為太過陽明汗多而渴者不可與猪苓湯脈浮自汗若小便數脚攣急者不可與桂枝湯

陰陽

自汗續法 海太陽自汗桂枝湯 陽明自汗白虎湯 少陰自汗四逆湯

陽明症身熱目痛鼻乾不得臥不惡寒而自汗或惡熱而尺寸俱浮者白虎湯主之傷寒尺寸脈俱長自汗大出身表如水石脈傳至于裏細而小及瘧疾但寒不熱其人動作如故此陽明傳入少陰戊合癸即夫傳婦也白虎加

桂枝主之然脈雖細小當以遲疾別之此症脈疾而非遲

故用此法白虎加桂枝湯方見瘧如中

活傷寒應發汗而動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗出

筋惕肉瞤此為逆難治先服防風白朮牡蠣散次服建中

湯

防風白朮牡蠣散治發汗多頭眩汗出筋惕肉瞤

防風牡蠣炒成白朮各等分

右為細末每服二錢以酒調下米飲亦得日二三服汗

止後服小建中湯

成或汗出髮潤與其出如油或大如貫珠着身出而不流

皆為不治之症

集傷寒汗多不止內庭瀉合谷瀉復溜瀉

手足汗

倒灸

診

瀉而手足澀然汗出者俱宜大承氣湯方論見陽明病

不能食小便不利手足澀然汗出者胃冷欲作痙瘕必大

便初鞭後溏論見

不得臥

身熱目疼鼻乾不得臥尺寸脈俱長者陽明受病也病人

小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥

屎也宜大承氣湯汗後大汗出煩躁不得眠欲飲水者

少少與之愈論見汗下後不得眠若反覆顛倒心中懊

懣者梔子豉湯方論見若但晝不得眠夜安靜不嘔不渴

無表症脈沉微無大熱者宜乾薑附子湯論見

少陰病欲寐二三日後煩心不得臥者黃連阿膠湯主之

煩躁論見

黃連阿膠湯

陽明裏

少陰

黃連

阿膠各一

黃芩五錢

芍藥一

雞子一箇

右咬咀水二盞煎八分去渣納膠消盡又納雞子黃攪

勻溫服日三

少陰病下利欲寐六七日後咳而嘔渴心煩不得眠者宜

猪苓湯論見下利少陰病但欲寐脈沉細不煩五六日變自

利煩躁不寐者死論見下利發熱下利厥逆煩躁不得臥

者死論見下利

不得臥續法

活傷寒吐下後心煩之氣日夜不得眠者酸棗仁湯主之

酸棗仁湯

酸棗仁一

麥門冬三

茯苓三

知母三

茯苓

川芎

芍藥各二

右咬咀每服四錢水煎服

傷寒大熱乾嘔呻吟錯語不得眠者黃連解毒湯主之

黃連

黃芩

黃柏各半

山梔二錢

一方有阿膠二錢

右咬咀每服五錢水煎服如未知再服進粥以此漸瘥

傷寒瘥後虛煩不得眠心中懊憹者烏梅湯主之

梔子

烏梅

黃芩

甘草各半兩

柴胡

右咬咀每服四錢薑三片豉五十粒煎至七分去渣溫

服一本有竹葉七片

潮熱

成潮熱者若潮水之潮其來不失時也一日一發指時而

發者謂之潮熱若日三五發者是即發熱非潮熱也潮熱

表裏

屬陽明必於日晡時發者乃為潮熱

陽明病潮熱大便微鞭可與大承氣湯不鞭者不與之若

不大便六七日恐有燥糞欲知之可少與小承氣湯入腹

中轉矢氣者此有燥糞乃可攻之若不轉矢氣者此但初

頭鞭後必漉不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者

與之則噦其後發熱者必大便復鞭而少也以小承氣湯

和之不轉矢氣者慎不可攻也

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘

有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然汗出者此大便

已鞭也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也

其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣

湯微和胃氣勿令大泄下

陽明病

胃實譫語而潮熱者承氣湯主之

大承氣湯

海藏云厚朴去痞枳實泄滿芒硝軟堅大黃酒浸一兩治大便燥實四症全者方可用之

大黃

酒浸上行引大黃至巖而下厚朴二錢姜

枳實

一枚治心下痞按之良久氣散痛

芒硝

一兩治腹中轉矢氣內有燥屎本云味辛寒潤燥

右咬咀水二大盞煎枳朴至一大盞下大黃復煎至六

分去渣入硝又煎一二沸溫服如未利再作與服以通

為度

小承氣湯

海藏云大黃泄實厚朴去痞必痞實全者可用

大黃

酒浸一兩治大便燥實四症全者可用

厚朴

二錢姜製枳實一枚

右咬咀同上法煎溫服以利為度不利再服不大便

舌燥心下滿痛而日晡小有潮熱者宜大陷胃湯

便溏腸滿脈弦

陽明病發潮熱大便溏小便自利胸脇滿不去者小柴胡

湯主之

陽明為病胃實是也今便溏而言陽明病者謂

陽明外症身熱汗出不惡寒反惡熱之病也

陽明中風脈弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾不得汗
嗜臥身黃小便難時時噦而潮熱者小柴胡加茯苓主之
傷寒十三日不解胃腸滿而嘔目瞤時發潮熱已而微
利此必柴胡症下之而不得利今反利者知醫以丸藥下
之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴
胡加芒硝湯主之

柴胡

黃芩

人參

甘草

半夏

半夏

大棗

芒硝

一盞以四錢水一盞半煎至八分去渣納芒硝更微沸溫服

診

陽明病脈浮緊者必潮熱發作有時論見胃實

潮熱續法

熱

活冬月陽明朝熱脈浮而緊者發作有時但脈澁者必

汗黃芩湯主之方見

諸語

陽明

陽明為病胃家實是也胃實則譫語故譫語宜入陽明門
陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承
氣湯一盞腹中轉矢氣者更服一盞若不轉矢氣勿更與
之明日不大便脈反微澁者裏虛也為難治不可更與承
氣湯陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎
五六枚若能食者但鞭亦宜大承氣湯下之 二陽併病
太陽病罷但發熱手足絳絳汗出大便難而譫語者下之
則愈宜大承氣湯 陽明病其人多汗以津液出胃中燥
大便必鞭鞭則譫語小承氣湯主之若一服譫語止勿更
服

實則

汗出譫語者必有燥糞在胃中此為風也須下之必過經

語虛則

乃可下下之若早語言必亂以表虛裏實故下之則愈宜

大承氣湯夫實則譫語虛則鄭聲譫語者謂亂語無次第

鄭重煩煩也只將一句舊言重疊頻言之終日殷勤不換

他聲也蓋神有餘則能機變而亂語數數更端神不足則

無機變而只守一聲也傷寒四五日脈沉而喘滿沉為在裏而反

發其汗津液越出大便為難表虛裏實久則譫語謂成無已

為鄭聲之聲非

汗後語

少陽病發汗後及小便數脚攣急誤與桂枝攻表後若胃

不和譫語者少與調胃承氣湯方論三陽合病腹滿身

重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之

則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之論見

汗發多亡陽譫語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以

通津液後自愈發汗多又重發汗者亡其陽譫語脈短者

死脈自和者不死 諸逆發汗病微者瘥劇者言亂目眩

汗多亡陽

者死

形作傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴脈濇者必譫語弱

者發熱脈浮解之當汗出愈

太陽病火劫汗後身黃小便難身體枯燥頭汗腹滿微喘

或不大便久則譫語論見太陽病二日反躁乃熨其背

而大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發譫語十餘日振

慄自下利者此為欲解也故其汗從腰已下不得汗欲小

便不得反嘔欲失溲足下惡風大便鞭小便當數而反不

數及多大便已頭卓然而痛其人足心必熱穀氣下流故

也 少陽病欬欬而下利譫語小便難者被火氣劫汗故

也吐下汗溫鍼後譫語柴胡湯症罷者此為壞病知犯何

逆以法治之論見

胃滿譫語若下後煩驚小便不利身重不可轉側者柴胡

下後煩

下後煩

胃滿譫語若下後煩驚小便不利身重不可轉側者柴胡

火後譫語

論見

加龍骨牡蠣湯主之

方論

主入血

陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗出者刺期門

隨其實瀉之

澱然汗出則愈

腹滿譫語脈浮緊者刺期門

論見

太陽少陽併病發汗則譫語脈弦五六日譫語

不止者宜刺期門

論見

婦人發熱經水適來譫語為熱

入血室若熱除脈遲者身涼胃滿如結胃狀者刺期門若

晝則明了暮則譫語者無犯胃氣及上二焦必自愈活人

以小柴胡湯主之

傷寒十三日不解過經譫語者以有熱也當以承氣湯下

之若小便利者大便當鞭而反下利脈調和者知醫以丸

藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者此為

內實調胃承氣湯主之若下利譫語者有燥屎也宜小承

氣湯

方見

右下利譫語其曰脈調和而手足和小便利者陽也

用承氣下之其脈當微厥反少陰但欲寐被火氣劫汗

譫語小便利難者陰也故當用補劑和之

但欲寐下利譫語俱見下利少

陰

許有人病傷寒下利身熱神昏多困譫語不得眠或者見

下利便以譫語為陰虛症予曰此亦小承氣症象駭曰下

利而服小承氣仲景之法乎予曰此仲景之法也仲景云

下利而譫語者有燥糞也屬小承氣湯而得解予嘗讀素

問云微者逆之甚者從之逆者正治從者反治從多從少

視其事也帝曰何謂反治岐伯曰塞因塞用通因通用王

冰註云大熱內結注瀉不止熱宜寒療結復須除以寒下

之結散利止則通因通用也正合於此又何疑焉

直視譫語喘滿者死下利者亦死 譫語妄言身微熱脈

診

浮大手足温者生逆冷脈沉細者不過一日死矣

謔語續法

素謔語者氣虛獨言也全文見註愚用參芪歸朮等劑治謔語得愈有百十數豈可不分虛

實一緊用黃連解毒大

小承氣等湯以治之乎

氣虛脈陽者錯謔失志者脈損小

海黃芪湯治傷寒或時悲哭或時嬉笑或時太息或語言錯亂失次世疑作謔語狂言者非也神不守室耳兩手脈

浮沉不一舉按全無力浮之損小沉之亦損小皆陰脈也

甚者用調中九或理中九二方並見發熱下

勞倦謔語

丹浦江鄭兄年二十歲九月間發熱頭痛妄言見鬼醫與小柴胡湯數貼熱愈甚予視之形肥面赤帶白却喜筋骨

稍露診其脈弦大而數實脈本不實保藥所致此因勞倦成病與温補藥自安遂以參朮為君苓芍為臣黃芪為佐

附子一片為使與二貼而症不減或曰脈既數大狂熱而

又大渴用附子誤矣予曰此虛症而誤投寒涼之藥人肥

而脈左大於右事急矣非加附子參朮焉能有急效再與

一貼乃去附子作大劑與服至五十貼得大汗而愈自後

又補養兩月氣體方始平復 一人五月內患謔語大發

熱肢體不能舉喜冷飲診其脈洪大而數用黃芪茯苓濃

煎如膏却用涼水調與之二四服後病者昏睡如死狀但

顏色不改氣息如常至次早方醒諸症悉退而安 盧兄

汗後再發熱妄言呂仲脩汗後熱不退亦妄言陶明節熱

退後不識人言語謬妄皆用參芪朮歸等補劑而愈信哉

謔語屬虛者十居八九

活大小便鞭手足冷脈微細者必鄭聲也當服温藥白通

湯海藏用黃芪加乾薑湯方見傷寒發熱下 候輔之脈極沉細

寒熱便利脈微

候輔之脈極沉細

謔語為

外熱內寒肩背胸脇斑出十數點語言狂亂或曰發斑謔語非熱乎予曰非也陽為陰逼上入于肺傳之皮毛故斑出神不守舍故錯語如狂非謔語也肌表雖熱以手按之須臾冷透如水與薑附等藥數日約二十餘兩得大汗而愈後因再發脈又沉遲三四日不大便與理中丸三日內約半斤其病全愈以此知侯公之狂非陽狂之狂乃失神之狂即陰虛也

便秘手足品脈洪謔語為熱

承氣湯
海治老幼及虛人傷寒五六日昏冒言妄小便或淋或澀起臥無度或煩而不得眠並宜白虎湯加山梔一錢

斗治熱病及時疫心躁狂亂奔走狀似癲癩言語不定久不得汗及時疫不知人事者以人中黃不拘多少入罐內

用泥封固武火煨半日去火候冷取出於地上以盆蓋半日許研細如麪新汲水調下三錢或未退再服愈人中黃即屎也

狂亂

鎮墜

火劫汗後亡陽心驚狂起臥不安者桂枝去芍藥加蜀漆

牡蠣龍骨救逆湯方論見驚汗家重發汗必恍惚心亂小便

巴陰痛與禹餘糧丸方見

小腹滿發狂或身黃者宜抵當湯論見發狂見黃

遺尿狂言目反直視者此為腎絕論見大法

狂亂續法

活病人煩躁狂走妄言面赤咽痛脈實潮熱狂語如見鬼

狀此陽毒也治陽毒法見陽毒門表者陽毒升麻湯黑奴丸裏者大黃散

本治傷寒發狂棄衣奔走踰牆上屋鵲石散

黃連 寒水石各等分

狂而脈實者為實熱

下症

右為細末每服三錢濃煎甘草湯候冷調下

雲傷寒心風狂妄者宜防風黃連湯

黃連

大黃

防風

遠志

茯神各半

右為細末每服一兩水煎服

海黃芪湯治傷寒或歌或笑或悲哭謔言妄語方見發熱下

狂而脈虛者為虛熱

陳志仁傷寒狂妄每欲狂走四五人扶捉不定脈虛數用

柴胡湯反劇以參芪歸朮甘草陳皮煎湯一服狂定再服

安睡

針灸

集傷寒發熱不識尊卑曲池絕骨百勞湧泉

甲熱汗不出狂互引癩疾合谷主之

循衣摸床

診治

傷寒若吐若下後不解不大便五六日至十餘日日晡

發潮熱不惡寒狂語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣

摸牀惕而不安微喘直視脈弦者生瀉者死微者但發熱

譫語者大承氣湯主之若一服利止後服太陽病以火

劫發汗陰陽枯竭虛燥或不大便久則譫語甚者至噦手

足躁擾捻衣摸牀小便利者可治論見瀉汗

許有人病傷寒大便不利日晡發潮熱手循衣縫兩手撮

空直視喘急更數醫矣見之皆走此誠惡候得之者十中

九死仲景雖有症而無法但云脈弦者生瀉者死已經吐

下難以下藥謾且救之若大便得通而脈弦者庶可治也

與小承氣湯一服而大便利諸疾漸退脈且微弦半日愈

或問曰下之而脈弦者生此何意也予曰金匱玉函云循

衣妄撮牀惕不安微喘直視脈弦者生瀉者死微者但發

熱譫語者承氣湯主之予嘗觀錢仲陽小兒直訣云手尋

衣領及檢物者肝熱也此症在玉函列於陽明部蓋陽明者胃也肝有熱邪滯于胃經故以承氣瀉之且得弦脈則肝平而胃不受克此所謂有生之理讀仲景論不能博通諸醫書以發明其隱奧吾未之見也海藏云許學士作尋末疾此論誠當然莫若以為肺熱之邪其衣襟空是肝熱風滯人必妄言亂語難經云肺邪入心為譫語

循衣摸牀續法

嘗治循衣摸牀者數人皆用大補氣血之劑惟一人兼調振脈代遂於補劑中畧加桂三分亦振止脈和而愈

病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也論見大便服柴胡湯

已渴者屬陽明也以法治之傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎人參湯

主之渴欲飲水無表証者太陽症罷轉屬陽明也下二條意同皆太陽轉屬陽明故渴也服桂枝湯

湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯主之

傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱

時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人

參湯主之王註云若純在表則惡風無時今表裏有熱故時時惡風也傷寒無大熱

口燥渴心煩脈微惡寒者宜白虎加人參湯陽明病脈

浮緊口苦腹滿而喘若下後渴欲飲水口乾舌燥者白虎

人參湯主之

白虎加人參湯

石膏碎四兩知母一兩甘草一兩粳米一合

人參二錢

右咬咀每服五錢水煎溫服

右白虎加人參五條治表渴脈洪小便利者

本有人初病嘔吐俄為醫者下之已七八日而內外發熱

溫病濕
似陽明

予診之曰當用白虎加人參湯或曰既吐復下且重虛矣
白虎可用乎予曰仲景云若吐下後七八日不解熱結在
裏表裏俱熱者白虎加人參湯正相當也蓋始吐者熱在
胃脘而脈至今虛大三投湯而愈仲景既云傷寒若吐下
後七八日不解表裏俱熱者白虎加人參湯主之又云傷
寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎又云脈浮滑此
以表有熱裏有寒白虎加人參湯主之 國朝林億校正
謂張仲景於此表裏自差矣予謂不然大抵白虎能除傷
寒中渴表裏發熱故前後二症或云表裏俱熱或云表熱
裏寒皆可服之一種脈浮無汗其表不解全是麻黃與葛
根症安可行白虎也林億見所稱表裏不同便謂之差是
亦不思之過也

論見溫病活人藏延湯
主之發熱不惡寒

而有太表解也太陽病者必頭痛身疼
表未解也此表裏兩症皆兼見

渴而下
利者少
陰

嘔不得眠小便不利者猪苓湯兼自利純青色水者大承
氣湯有熱者白頭翁湯

消渴氣上衝心心寂飢不欲食食則吐蛇若下之則利不

止若欲飲水者少少與之愈

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者

少少與之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者

五苓散主之 發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之

陽明病脈浮緊口苦腹滿發熱汗出不惡寒若下後脈浮

發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

五苓散方

猪苓 去皮 二兩

澤瀉 一兩

白朮 三兩

茯苓 去皮 二兩

小便不利而渴者太陽

消渴吐蛇者厥陰忌下

方論見下利

論見氣上衝心

桂枝去皮半兩

右咬咀為散每服三錢白湯調下海藏云五苓散當服而不服之穀消水去

形亡必就陽明燥火戊胃發黃故有調胃承氣症不當服而服之是為犯本小便強利津液重亡而成血症輕則抵當湯主之

猪苓湯方

猪苓去皮

茯苓

阿膠

澤瀉

滑石各半兩

右咬咀每服五錢水煎溫服日三

頭汗者柴胡茵陳

渴而頭汗小便不利兼脇滿往來寒熱者柴胡桂枝乾薑湯兼發黃者茵陳蒿湯論見

咳嗽者小青龍

表不解心下有水氣乾嘔發熱咳嗽而渴者小青龍湯去半夏加瓜蒌根湯論見

暑濕身熱足冷

夏月汗出惡寒身熱足冷而渴者為中暑白虎加人參湯

日虎加人參

及酒黃連主之方見中暑惡寒身熱者症似表也足冷者不可表

表未解利期門

發熱惡寒腹滿汗出小便利而渴者為肝乘脾刺期門論

表解宜腹滿

渴而脇滿及往來寒熱其症未經汗者小柴胡去半夏加人參瓜蒌湯若汗下後者柴胡桂枝乾薑湯詳見脇痛并往來寒熱

渴而心下

若但鞭不痛者為痞與瀉心湯不解反渴而小便不利者宜五苓散詳見結胃痞氣二門

欲飲不渴者文蛤散

病在陽明應汗之反以冷水噴之灌之其熱益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不瘥與五苓湯論見

文蛤散方

文蛤一兩即海蛤粉也河間丹溪多用之大能治痰

右一味為散沸湯調服方寸匕

渴欲飲水而不能飲者丹田有熱胃中有寒論見濕痺

渴不能飲下熱寒

渴欲飲水水逆者五苓渴欲飲水者少少與之

中風發熱六七日不解而煩有表裏症渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之

渴欲飲水若太陽發汗後大汗出煩躁不得眠者及厥陰病氣起衝心心疼吐衄者少少與之愈論見前條及氣上衝丸得

時氣病至五六日而渴欲飲水不能多不當與之何者以腹中熱尚少不能消之更與水作病也至七八日大渴欲

飲水者猶當依症與之與之常令不足勿極意也言能飲一斗與五升若飲而腹滿小便不利若喘若噦不可與之

忽然大汗出是為自愈也活人云凡病非大渴不可飲水若小渴咽乾者少少呷潤之令

凡得病反能飲水此欲愈也但聞病飲水自愈小渴者亦強與之飲因成其禍不可復救活人云強飲水致飲停心下滿結喘者當以五苓散

其脈不弦數而浮弱者汗出愈論見下利脈弱脈數而渴者自愈論見渴而發熱

宜禁 陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥與猪苓湯復利其小便故也

右活人云切戒太陽症無汗而渴者不可與白虎湯陽明症汗多而渴者不可與猪苓湯然太陽渴終不可與

白虎耶太陽症得汗後脈洪大而渴者方可與之也陽明渴終不可與五苓散耶陽明症小便不利汗少脈浮

而渴者方可與之也

渴續法 羅傷寒食少而渴者當以和胃之藥止之不可用涼藥止

之恐復損胃氣愈不能食也白朮茯苓是也 海秦二母病大陰病三日不解後嘔逆惡心而脈不浮與

之半硫九二三服不止復與黃芩建中湯脈中極緊無表

渴而食少者和胃已涼為脈極緊不浮宜溫

裏病胃中大熱發渴引飲皆曰陽症欲飲之水予反與薑
附等藥緊脈反沉細陽猶未生以桂附薑烏之類酒丸與
百九接之二日中十餘服病人身熱煩躁不寧欲作汗也
入以前九接之覆以厚衣陽脈方出而作大汗翌日大小
便始通下瘀血一盆如猪肝然用胃風湯加桂附三服血
止其寒甚如此亦世之未見也

少陰湯
脈沉遲
為寒沉
漢為熱
沉細為
虛

少陰症口燥舌乾而渴尺寸脈俱沉沉遲則四逆湯沉疾
則大承氣湯少陰口燥舌乾而渴身表涼脈沉細而虛
者瀉心湯主之此有形無形藥也

人參湯治傷寒七八日汗後心煩燥渴

人參 黃芩 柴胡 葛根 各一

山梔 甘草 各半兩

右為籠末每服五錢薑蔥煎溫服

陽為風
溫中者
渴治法

活陽毒倍常燥盛大渴者黑奴丸主之方見風溫加渴

甚者宜瓜蒌湯方見中暑伏熱累治不瘥其人發渴不

已酒蒸黃連丸主之方見

脈熱病在腎令人渴口乾舌焦黃赤晝夜欲飲水不止腹

大而脹尚不厭飲目無精光者死不治

嘔

傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濺濺然者是轉屬陽

明也食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇

者屬上焦也腹痛欲嘔吐者黃連湯主之方論見

嘔而發熱者小柴胡湯主之發熱微惡寒肢節煩疼微

嘔心下支結外症未去者柴胡加桂枝湯主之論見太

陽病發熱惡寒身體痛嘔逆脈緊者名曰傷寒麻黃湯症

論見發熱太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯

嘔不能
食者轉
屬陽明

未裏

論見
發熱

主之 活人云頭疼身熱痛飢熱目赤鼻乾脈浮而長是也

葛根加半夏湯

葛根 錢二

麻黃

生薑 各一錢半

甘草

芍藥

桂枝 各一錢

半夏 錢二

大棗 二枚

右咬咀以水一斗先煎葛根麻黃減二升去白沫納諸

藥煎取三升溫服一升覆取微汗

嘔而寒熱腸痛

嘔而往來寒熱胸脇苦滿者宜小柴胡若兼下利者乃太

嘔而鬱鬱微煩

陽少陽合病宜黃芩加半夏生薑湯 論見往來寒熱及下利

太陽過經十餘日反二三下之後四五日柴胡症仍在者

先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與

大柴胡湯下之愈 太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐

而心中痛大便反澹腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下

者與調胃承氣湯若不滿者不可與但欲嘔胸中痛微澹

者此非柴胡症以嘔故知極吐下也

先渴却嘔屬飲

本渴而飲水嘔者柴胡不中與也 論見

先嘔却渴欲解

先渴却嘔者為水停心下此屬飲家 活人云赤茯苓湯主之

嘔而下利

却渴者此為欲解候也 金匱云嘔思水者急與之

嘔而脈弱

嘔而下利有寒熱者為陽宜黃芩湯大柴胡湯無熱者為

嘔而心煩

陰宜猪苓湯真武湯 並見嘔

嘔而心煩

嘔而脈弱小便利身熱見厥者難治四逆湯主之

嘔而心煩

嘔而心煩若汗吐下後者梔子生薑鼓湯若未曾吐汗下

乾嘔發熱

後兼欬而渴者宜猪苓湯 詳見不

乾嘔發熱

嘔多雖有陽明胃實不可攻之 論見 嘔家有癰膿者不可治膿盡自愈 服桂枝嘔者酒客病 論見

乾嘔發熱兼自汗惡風鼻鳴者桂枝湯兼表不解有水氣

而效者小青龍湯方見發熱

乾嘔脇痛

乾嘔脇痛若表解身涼短氣汗出不惡寒者十棗湯若兼

利乾嘔下

往來寒熱脈沉緊者小柴胡湯論見往來寒熱

心下痞

乾嘔下利若兼表不解發熱而效者小青龍湯去麻黃加

逆者白通

芫花湯論見若表身涼脇痛短氣汗出者十棗湯論見

下利者

若因下後心下痞硬滿腹中雷鳴日利數行者甘草瀉心

飲水嘔

湯論見若脈微厥逆者宜白通湯若用白通湯溫後利不止厥逆

湯主之

赤茯苓湯治傷寒嘔噦心下滿胃脘間有停水頭眩心悸

赤茯苓

兩

半夏

半兩

橘紅

一兩

芎藭

各半兩

右咬咀每服四錢姜五片水煎服

傷寒瘧後嘔者有餘熱在胃脘也竹葉石膏湯加生姜主

之

乾嘔不止為虛

海葛根湯治傷寒乾嘔不止

葛根

兩

人參

各一兩

茯苓

半兩

半夏

姜製七錢半

白朮

兩

黃芪

七錢半

麥門冬

去心

甘草

各一兩

右咬咀每服三錢生姜三片棗二枚同煎服

少陽病

口苦咽乾

眩

往來寒熱

脇滿痛

胸滿

胸痛

耳聾

少陽

病續法

口苦咽乾

少陽之為病口苦咽乾目眩也

注人云宜小柴胡湯

少陽中風兩耳無所聞目赤胸

中滿而煩者不可吐下吐

下則悸而驚誤吐氣虛者悸誤下血虛者驚

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則

譫語此屬胃家胃和則愈胃不和則煩悸 傷寒三日少

陽脈小者欲已也 少陽欲解時從寅至辰上

陽明病腹滿脈浮緊口苦咽乾而喘若其人發熱惡寒誤

下之則腹滿小便難若其人發熱不惡寒反惡熱誤下之

則胃空虛為懊憹誤下之則譫語誤加燒鍼則不得眠

腹滿許學士云宜小柴胡湯

眩

眩而口苦舌乾者屬少陽

論見口苦

眩而心下鞭項強者屬

太陽少陽併病當刺大椎肺俞

忌汗下論見項強

眩而胃實若能食不惡寒者中風若飽則頭眩小便難者

穀疸皆屬陽明

論見胃實

太陽發汗後仍發熱心悸頭眩身瞤振振欲擗地者真武

湯主之

方論見戰振

動氣在左誤汗則頭眩汗不止

筋惕肉瞤方論見動氣注人云宜小建中

湯 諸逆誤汗而言亂目眩者

死論見譫語

頭眩脈沉緊發

汗則動經身為振振搖

論見戰振

往來寒熱

往來寒熱屬少陽宜小柴胡湯

本太陽病不解轉入少陽者脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脈沉緊者與小柴胡湯若已吐下發汗溫針譫語柴胡症罷此為壞病知犯何逆以法治之 傷寒

五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞硬或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者小柴胡主之。血虛氣盡滕理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食者臟腑相連其病必下邪高病下故使嘔也宜小柴胡湯

柴胡 二兩

黃芩

人參

甘草 各三錢

半夏 黃芩製 六錢

右咬咀每服五錢生薑五片棗三枚同煎溫服日三服若胸中煩而不嘔去半夏人參加瓜蒌實二枚若渴者去半夏加人參三錢括萎根一兩若腹中痛者去黃芩加芍藥三分若脇下痞硬去大棗加桂枝一兩

兩心下悸小便不利者去黃芩加茯苓一兩若不渴外有微熱者去人參加桂三分溫覆取微汗愈若欬者去人參大棗生薑加五味子半兩乾薑三分凡柴胡病下之不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解傷寒中風有柴胡症但見一症便是不必悉具

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者宜大柴胡湯論見結胃

大柴胡湯

柴胡 二兩

黃芩

芍藥 各半兩

半夏 製六錢

生薑 一兩

枳實 二兩

大黃 一兩

右咬咀每服五錢加大棗三枚水煎溫服以利為度未利再服

許有人病傷寒心煩喜嘔往來寒熱醫以小柴胡與之不

除予曰脈洪大而實熱結在裏小柴胡安能去之仲景云傷寒十餘日熱結在裏復往來與熱者與大柴胡湯三服而病除蓋大黃盪滌蘊熱傷寒中要藥王叔和云若不用大黃恐不名柴胡須酒洗生用有力

汗下後
腹滿小
便閉頭
汗心煩
往來寒
熱者柴
胡桂姜
湯傷寒五六日已發汗而復下之胸腹滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩此為未解也宜

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡兩 桂枝兩 乾薑各半兩 栝萎根兩

黃芩各一兩 牡蠣半兩 甘草各半兩

右咬咀每服五錢煎溫服微煩再服汗出愈

脈微滿者亡血病人脈微而濇者此為醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲着複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則

發熱此醫發其汗令陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲着複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故裸其身又陰脈遲濇故知血亡也

右脈微因大發汗所致故病當惡寒之時雖盛夏亦欲着複衣服濇因大下所致故病當惡寒後發熱之時雖盛冬亦欲裸其體是皆亡血陽微陰弱不能勝冷勝熱非是盛夏牽延至盛冬也

脇滿痛

少陽
方論見性
來寒熱

脇滿乾嘔往來寒熱者屬少陽傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡去半夏加人參瓜蒌根主之得病六七日脈沉浮弱惡風寒手足溫醫二三下之不能食而脇下滿痛面目

及身黃頸項強小便難者與柴胡湯必下重

陽明

本渴而飲水欲嘔者柴胡不可與也食穀者噦王註云不飲水而嘔者屬柴胡症若因水而嘔者水停心下也脇滿胃家實或嘔而舌上白胎

者或脈弦浮大身黃小便難有熱者俱屬陽明症宜小柴

胡湯方論見脇滿潮熱大便溏利者小柴胡湯方論見

表裏

若因下微利而嘔者先以柴胡湯解外後以柴胡加芒硝湯主之方論見太陽病十日已去脈浮細而嗜臥者外

已解也若胃滿脇痛者與小柴胡湯脈浮者與麻黃湯

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出發

作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡

寒者此表解裏未和也宜十棗湯

芫花炒

甘遂

大戟各等分

右為細末合和之再入臼中杵二三百下先以水一升

煮肥棗十枚取五六合去渣納藥末強人一錢虛人半

錢單飲棗湯送下平旦服若下少病不除者明日更服

加五分利後米粥白養若合下不下令人脹滿遍身浮

大腫也昔杜壬問孫兆曰十棗湯畢竟治甚病孫曰治太

陽中風表解裏未和杜曰何以知裏未和孫曰頭痛心

下痞滿脇下痛乾嘔汗出此知裏未和也杜曰公但言

口痛而所以裏未和之故要緊總未言也孫曰其嘗於

此未決願聽開論杜曰裏未和者蓋痰與燥氣壅於中

焦故頭疼乾嘔短氣汗出是痰隔也非十棗不治但此

湯不得輕用恐損人於倏忽用藥者慎之

劉宗素

婦人發熱惡寒經水適來熱除脈遲身涼脇滿如結胃狀

譫語者刺期門論見

診吐下汗後脈微心下痞脇痛氣上衝咽眩冒脈動惕者成
痲論見下後脈弦者必兩脇拘急論見傷寒大法

脇痛續法

針灸傷寒脇痛 支溝 陽陵泉

胃滿

少陽滿者柴胡合病喘者麻黃少陰病下利咽痛胃滿心煩者宜猪膚湯方論見

太陽陽明合病喘而胃滿者宜麻黃湯論見

少陰病下之脈促胃滿者桂枝去芍藥湯方論見

太陽病下之脈促胃滿者桂枝去芍藥湯方論見

促不結胃者欲解也論見下後胃滿小便不利若兼煩

驚譫語身重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯方論見

兼噦而舌胎者為濕痺論見

汗下後煩熱胃中窒者梔子豉湯主之論見

病症發熱惡寒加桂枝或自汗但頭不痛項不強胸中痞
鞭氣上衝咽喉不得息者瓜蒂散主之論見氣上衝

胸痛

少陽實胸脇痛耳聾尺寸脈俱弦者少陽受病也論見大法活人

宜吐症病胃中諸實胃中鬱鬱而痛不能飲食使人按之而反有

涎唾下利十餘行其脈反遲寸口脈微滑此可吐之利則

止

宜下症吐下後溫溫欲吐胃中痛大便溏腹滿而煩者宜調胃承

氣湯論見

耳聾

少陽病胃脇痛耳聾尺寸脈俱弦者少陽受病也論見

聾胃滿者少陽中風論見

未持脈時病人手必自冒胃師因教試令欬而不欬此必

兩耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此

少陽病續法

海辨表裏中三說假令少陽症頭痛往來寒熱脈浮此三症但有其一即為表也口失滋味腹中不和大小便或閉而不通或泄而不調但有其一即為裏也如無上下表裏症餘皆虛熱也是病在其中矣

陽氣毒盛變陽毒

陽毒之為病面赤斑斑如錦紋咽喉痛唾膿血五日可治

七日不可治宜

升麻鱉甲湯

升麻

當歸

蜀椒

甘草

鱉甲

右六味以水四升煮取一升頓服之取汗愈肘後

咽痛面赤斑斑為陽毒仲景但名發表

表裏中三法

方陽毒升麻湯有桂無鱉甲陰毒用甘草湯無雄黃

陽毒續法

活陽毒升麻湯治傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下之後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤狂言奔走或見鬼或下利脈浮大數面赤斑斑如錦紋咽喉痛下膿血五日可治七日不可治

升麻

犀角

射干

黃芩

人參

甘草

右咬咀水煎服食頃再服溫覆手足出汗則解不解重

陽毒梔子湯治陽毒傷寒發熱百節疼痛

升麻

黃芩

杏仁

梔子

赤芍

石膏

知母

大青

後賢更名陽毒傷寒主退陽

各一錢

各二錢

各二錢

各一錢

甘草

五分

柴胡

一錢

右咬咀每服半兩薑五片豉百粒同煎

大黃散治陽毒傷寒未解熱在內恍惚如狂

大黃

一兩

桂心

二分

甘草

炙

木通

大腹皮

各一兩

桃仁

二十枚

右咬咀水煎服以利為度

海葛根散治陽毒身熱如火頭痛躁渴咽喉乾痛

葛根

七錢

黃芩

大黃

甘草

山梔

朴硝

各半兩

右咬咀水煎服

活黑奴丸治時行病六七日未得汗脈洪大或數面赤日

痛身體大熱煩躁狂言欲走大渴甚又五六日已上不

熱在胃中口噤不能言為壞傷寒醫所不治或人情

竭心下尚煖撥開其口灌藥下咽即活兼治陽毒及發斑

麻黃

去節泡

大黃

二兩

釜底煤

研

黃芩

芒硝

竈突墨

研

梁上塵

小麥奴

各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大新汲水研下一丸渴者與冷

水盡飲之須臾當寒寒竟汗出便瘥若無汗再服一丸

須微利效小麥奴即小麥未熟時叢中不成麥稔之成

黑勃是也此藥須是病人大渴倍常躁盛者乃可與之

若不渴者服之反為禍耳

脈洪大內外結熱舌卷焦黑鼻中如烟煤宜以水漬布薄

之疊布數重新水漬之稍撥去水搭於背上須臾蒸熱又

漬冷如前薄之仍換新水數十易熱甚者置病人於水中

勢纔退則已亦一良法也

丹砂丸治傷寒陰陽二毒相伏危惡形症

水漬法

陰陽毒

船上硫黃 水銀 太陰石 玄精石各一兩

硝石兩半 太陽石一兩

右為末用無油銚子以文武火炒上項藥令勻如灰色研極細生姜自然汁浸炊餅丸如棗豆大每服五丸龍腦生姜蜜水下壓其躁也若陽毒東湯下陰毒白湯下不許於屋底炒

太陰病 腹滿 腹痛王叔和云元陽明篇

吐與利下三門並附入少陰病蓋此三門之病本屬太陰病因在少陰者反多故附入少陰也

腹滿

大陰病忌下 大陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛着下之必胸下結硬 太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯 本太陽病反下之因小腹滿時痛者屬太陰也桂枝加

芍藥湯主之 大便實痛者桂枝加大黃湯主之

桂枝加芍藥湯

桂枝 生薑各一兩半 甘草一兩 芍藥三兩

大棗六枚

右咬咀每服五錢水煎溫服

桂枝加大黃湯

桂枝一兩 芍藥一兩 甘草多半兩 大黃半兩大者減五錢

者加一兩虛者減五錢

石咬咀大棗三箇生薑四片水煎溫服

太陰病脈弱其人續自便利設當用大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也 太陰中風四肢煩疼陽微脈瀼而長者為欲愈 太陰病欲解時從亥至丑 腹滿時痛吐利者為太陰論見前太陰條

腹滿宜
溫二症

霍亂吐利頭痛發熱身痛不渴而腹滿者理中丸加附子
主之論見吐利下利腹脹滿身痛者四逆溫裏後用桂

枝攻表論見

腹滿宜
利二症

歲而腹滿視前後部有不利者利之則愈論見

少陰腹

滿脹不大便者宜大承氣湯論見大便

腹滿宜
和二症

腹滿小便不利身黃者茵陳蒿湯論見黃

若兼脇下痛脈

弦浮大者宜小柴胡湯論見鼻乾

腹滿不
減為實

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯

腹滿時減復

減復如
故為虛

如故此虛寒從下而上也當以溫藥和之

腹滿脈
浮四症

太陰病腹滿時痛脈浮者宜桂枝湯論見前

陽明脈弦

浮大脇痛身黃而腹滿者小柴胡湯論見鼻乾

傷寒腹滿謔

語寸口脈浮而緊此肝乘脾也名曰縱宜刺期門

陽明病腹滿脈浮緊口苦咽乾而痛若其人發熱惡寒者下之

腹滿脈
逆忌下

則腹滿小便難若其人發熱汗出不惡寒反惡熱者下之

則懊懺汗之則謔語加燒鍼則怵惕不眠論見胃家實註云當和解之

腹滿自
汗四症

陽明病腹滿脈遲若頭眩小便難者不可下若潮熱汗出

不惡寒者大承氣主之論見胃實

三陽合病腹滿身重難轉側謔語遺尿自汗者宜白虎湯

出小便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫宜刺期門

腹滿汗出不惡寒而喘若脈遲潮熱者大承氣湯若脈浮緊

口苦咽燥者忌發汗忌燒鍼忌下論見腹滿脈浮遲條

發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之

厚朴生薑人參甘草半夏湯

厚朴

生薑各二兩

半夏六錢

人參一兩

甘草五錢

吐下後
腹滿

右咬咀每服五錢水煎溫服

傷寒吐後腹脹滿者與

下利清穀若發汗必脹滿論見下利傷寒吐後腹脹滿者與

調胃承氣湯下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯

煩論見承氣湯論見

禁忌

不大便六七日少與小承氣湯不轉矢氣者不可攻之攻

之則腹滿不能食論見大便腹滿吐利者忌下論見太陰腹

滿脈浮緊口苦咽乾者忌汗下論見自汗腹滿脈遲者忌

下論見前脈遲條腹滿脈弱自利設用大黃芍藥宜減之論見太陰

中條

腹滿續法

活若飲食不節寒中陰經胸膈不快腹滿閉塞唇青手足

腹滿脈
沉細無
力者理
中

冷脈沉細少情緒或腹痛急作理中湯加青皮每服一二

劑胃即快矣枳實理中丸五積散尤妙腹脹滿者宜枳

梗半夏湯

枳梗半夏湯治傷寒心腹痞滿時發疼痛

枳梗微炒

半夏薑製

橘紅各一兩

右咬咀每服四錢生薑三片水煎服

海少陰症小便遺瀝大便遺失其人病六七日靜重如山

目不視體如水腹脹滿與物則咽不與則不求其脈沉細

而微疾按之有力宜急下之與大承氣湯

腹痛

腹滿而痛吐利者屬太陰宜四逆湯論見腹滿太陰條

若兼頭痛發熱身痛者屬霍亂霍亂腹痛不渴也理中

丸加人參論見吐利

病腹中滿痛者此為實也宜大承氣湯下之病人不大

腹滿痛
不大便

利者太陰
頭痛發
熱者霍
亂

為陽實

腹滿下利者為陰虛

腹痛厥逆為陰

腹痛嘔吐為陽

便五六日繞臍煩疼發作有時者有燥糞故使不大便也

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯 大下後六七

日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有

宿食故也宜大承氣湯 汗下後不大便而渴日晡潮熱

從心下至小腹鞭滿而痛者宜大陷胃湯 方論見

少陰病腹滿下利若小便不利四肢重痛者真武湯便膿

血者桃花湯若下利清穀手足厥逆脈微欲絕者通脈四

逆湯去蔥白加芍藥

少陰病腹痛若四肢逆而不溫者四逆散加附子 方論見

若手足厥冷脈微欲絕者通脈四逆加芍藥湯 方論見

傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者宜

黃連湯

甘草 炙

黃連

乾薑 各三分

大棗 三枚

半夏 半兩

人參

桂枝 各三分

石叟咀水煎服分二服

往來寒熱胃脇滿心煩喜嘔而腹痛者小柴胡去黃芩加

芍藥湯 方見往來寒熱條

傷寒陽脈濇陰脈弦當腹中急痛者先與小建中湯不瘥

者再與小柴胡湯

小建中湯

桂枝 一兩

甘草 炙

芍藥 三兩

生薑 一兩

大棗 六枚 膠飴 兩

右叟咀每服五錢生薑三片同煎至八分去渣下膠飴

兩匙許再煎化服 東垣云芍藥味酸於土中瀉木為君

木勢亦來侮土故脈弦而腹痛肉桂太辛熱佐芍藥以

退寒水薑辛溫發散陽氣行於經絡皮毛為使故

建中之名始于此焉

始于此焉

診

傷寒四五日腹中痛苦轉矢氣及少腹滿者此欲自利也

腹痛續法

針灸

雲傷寒邪在三陰內不得交通故為腹痛手足之經皆會於腹如脈弦而腹痛過在足厥陰肝手太陰肺刺太衝太淵太陵如脈沉而腹痛過在足太陰脾少陰腎手厥陰心包刺太谿太陵如脈沉細而痛過在足太陰脾手少陰心刺太白神門三陰交此刺腹痛之法也

腹滿欲吐不可欲瀉不瀉為乾霍亂

丹乾霍亂此係內有所傷外為邪氣所遏有用吐藥者則兼發散之義有用溫藥解散者不可用涼藥宜用二陳湯加解散藥如川芎蒼朮防風白芷之類是也

煎鹽湯治乾霍亂蠱毒宿食不消積冷心腹煩滿鬼氣用煎鹽湯三升熱飲一升刺口令吐宿食使盡不盡更復吐訖復飲三吐乃止此法大勝諸治俗人以為田舍淺近之

法鄙而不用守死而已凡有此病即先用之吐訖後詳症脈以加減理中湯治中湯欵緩調之

生薑湯治欲吐不吐欲瀉不瀉

鹽一

生薑半兩

右同炒色變以水一碗煎溫服病甚加童便一盞

世勝靈丹治乾霍亂腹痛甚者取千年石灰湯泡服

病有乾霍亂濕霍亂乾霍亂死者多濕霍亂死者少蓋吐利則所傷之物得以出洩雖甚重胃中水穀洩盡則止矣所以死者少及乾霍亂死多者以其上不得吐下不得利則所傷之物不得出洩壅閉正氣隔絕陰陽煩擾悶躁喘脹而死者多矣

乾嘔霍亂者忽然心腹脹滿絞痛蠱毒煩寃欲吐不吐欲利不利狀若神靈所附頃刻之間便致悶絕

黃王叔和原

六陰
無發黃
使不利

傷寒脈浮而緩手足自溫者是為繫在太陽當發身黃小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必

色如煙薰黃乃濕病也一身盡痛色如橘子黃乃黃病也一身不痛

濕痺者
甘附

濕家之黃也身黃似薰黃雖黃而色暗不明也熱家之黃也身黃似橘子色甚者勃勃出染着衣正黃如黃柏是其正黃色也色如薰黃一身無痛發熱者為濕痺若脈沉

緩小便不利者甘草附子湯五苓散若脈大頭痛鼻塞者

納藥鼻中則愈矣

見
在
者
鼻中一人病身體痛面黃喘滿頭痛自能飲食大小便如常予診之脈大而虛鼻塞而煩予曰非濕熱宿穀相搏此乃

陽明熱
頭汗出
者茵陳

頭中寒濕非茵陳五苓不可行也仲景云濕家病身疲痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中初無病病在頭中寒濕攻鼻故塞納藥鼻中則愈仲景無藥方此方見外臺刪繁症云治天行熱病蓋通貫臟腑寒濕沉於骨髓之間或為黃疸宜瓜蒂散即此方也瓜蒂散方見後黃續條 又有一舟稍病傷寒發黃鼻痠痛身與目如金色小便赤而數大便如常或者欲用茵陳五苓尋曰非其治也小便利大便如常則知病不在臟今眼睛鼻頰痛是病在清道中清道者華蓋肺之經也若下大黃則必腹脹為逆亦用瓜蒂散先含水次搗之鼻中黃水盡乃愈傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳湯主之陽明胃家實身無汗但頭汗出小便不利飲水漿發黃亦茵陳蒿湯主之

茵陳蒿嫩者 大黃兩

山梔二錢

右咬咀用水三大盞先煎茵陳減半納二味煎熟溫服日三服小便當利如皂莢汁狀色正赤過一宿腹滿減黃從小便中去也

身黃

身黃脇痛小便難未下者宜柴胡下後者忌柴胡二法俱見胃腸

痛

汗後身黃

傷寒發汗後而身目俱黃所以然者以寒濕在裏不解故也法不可下當於寒濕中求之與熏法同

後身黃

太陽病脈浮數為表未解醫反下之若不結胃但頭汗出餘無汗齋頸而還小便不利身必發黃論見結胃活人云茵陳湯主之

陽明病面赤攻之必發熱身黃小便不利論見胃實陽明病

黃而腹滿脈遲飽則頭眩小便難者雖下之腹滿如故論見腹滿下後不能食脇下滿痛頸項強小便難而身黃者與

柴胡湯必下重

後身黃

陽明病被火額上微汗出小便不利者身必發黃 風溫

脈浮汗出身重多眠若被火則微發黃色劇則如驚癇時瘰癧論見風溫太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣

流溢失其常度兩陽相重灼其身發黃論見頭汗

畜血身黃

身黃脈沉結少腹鞭而小便自利其人發狂大便黑者為畜血宜抵當湯論見畜血

熱身黃

傷寒身黃發熱者梔子黃柏皮湯主之

梔子十五枚

甘草兩

黃柏二兩

右咬咀每服五錢水煎溫服

傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連翹湯主之

麻黃節去

連翹根

生薑

甘草各一兩

赤小豆

梓白皮

生各半升

杏仁二十粒

大棗六枚

右咬咀每服五錢用潦水一盞半煎溫服麻黃杏仁生薑甘草大棗五味其辛發散表邪為陽也赤小豆連翹梓皮酸苦泄裏為陰也潦水味薄不助陰氣也

右身黃小便自利小腹鞭而狂大便黑者為畜血則宜抵當湯下之若小便不鞭其人不狂大便不黑者雖小

便利非畜血也其為症有二者梔子柏皮湯二者麻黃連翹赤小豆湯皆治身黃小便利而身不疼者海藏

所謂乾黃是也三者桂枝附子湯去桂加白朮湯皆治身黃小便利而一身盡痛者活人所謂中濕是也

汗下燒針後心下痞而胸煩者面色青膚黧難治色微黃手足溫者易治論見身黃禁忌見前汗後身黃下後身黃條

黃續法

身冷汗出脈沉

海傷寒病遇太陽太陰司天若下之太過往往變成陰黃一則寒水太過水來犯土一則土氣不及水來侵之多變

此疾一則茵陳茯苓湯加當歸桂枝二則茵陳橘皮湯

姜朮半夏三則茵陳附子湯四則茵陳四逆湯五則茵陳

芩附湯六則茵陳吳茱萸湯方見如左發黃小便不利煩躁而渴茵陳湯加茯苓猪苓滑石當歸官桂主之韓氏名茵

夏茯苓主之韓氏名茵發黃四肢遍身冷者茵陳湯加附子甘草主之韓氏名茵發黃肢體逆冷腰上自汗茵

陳湯加附子乾姜甘草主之韓氏名茵發黃冷汗不止者茵陳湯加附子乾姜主之韓氏名茵發黃前服姜附

諸藥未已脈尚遲者茵陳加吳茱萸附子乾姜朮通當歸主之韓氏名茵趙宗顏因下之太過生黃脈沉細遲無力次第用藥至茵陳附子湯大效

按海藏次第用藥者謂先投韓氏茵陳茯苓湯次投茵

陳陳皮湯又次投茵陳附子湯後趙秀才次第做此
趙秀才因下之早黃病脈寸微尺弱身冷次第用藥至茵
陳四逆湯大效 傷冷中寒脈弱氣虛變為陰黃仲景理
中湯如茵陳服之

便赤能食而黃

茵陳湯治傷寒發黃目赤黃小便赤

茵陳

山梔

柴胡

黃柏炙

黃芩

升麻

龍膽草各半

大黃炒

右咬咀水煎空心服以利為度

往來寒熱而黃發汗不徹而黃

海往來寒熱一身盡黃者小柴胡加梔子湯主之

衍一僧傷寒發汗不徹有留熱身面皆黃多熱期年不愈

醫作食黃治之治不對病不去問之食不減尋與此藥服

五日病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方

用茵陳梔子各三分秦艽升麻各四錢末之每用三錢

四合煎及二合去查食後溫服以和為度

小便不利而黃

活五苓加茵陳蒿湯治發黃而渴小便不利

茵陳蒿湯分十五苓湯分五

右二劑拌勻每服三錢日三服水調下

又方傷寒欲發黃者急用瓜蒂末口含水搐一字許入鼻

中出黃水甚驗即用茵陳湯調五苓散服之最效

本治頭中濕熱發黃疸瓜蒂散

瓜蒂二十枚

赤小豆

黍米各十

右為細末如大荳大一粒許納鼻中縮入當出黃水慎

不可吹入

結胃病氣發黃

雲結胃發黃太陽附本也以結胃治之

痞氣發黃太陰附本

也以痞法治之

活問白虎症亦有身熱煩渴引飲小便不利何以不發黃

答曰白虎與發黃症相近遍身汗出此為熱越白虎症也

頭面汗出頸已下無汗發黃症也

成傷寒發黃是病已極是有不治者多矣非止寸口近掌

無脈鼻氣出冷為不治之症又若形體如烟熏直視搖頭

者是為心絕環口黧黑柔汗發黃是為脾絕皆不治之症

也

少陰病發熱脈沉者發汗之

少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯主之見方

無他症者微汗之

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日

無症故微發汗也無症謂無吐利厥症

麻黃附子甘草湯

麻黃 甘草各二兩 附子一枚炮

右咬咀每服五錢水煎溫服須二三服以身汗為度

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯

主之

口燥咽乾咽痛心煩不

少陰病得之二三日已上心中煩不得臥黃連阿膠湯主

之

附子半枚 茯苓七錢 人參兩 白朮一兩

芍藥七錢 右咬咀每服五錢水煎溫服日三

少陰二三日口燥咽乾者大承氣湯急下之方論見口燥咽乾

若咽痛者甘草湯不瘥者桔梗湯方論見咽痛

之方見不

腹滿小便不利

陰病二三日至四五日腹滿小便不利若便膿血者桃花

湯主之方論見下利

身重下利

若四肢重痛下利者真武湯主之方論見下利

腹脹咳嘔而渴

少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯方見潮熱

少陰病下利至六七日變咳而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之

診瘥劇

少陰病脈微細沉但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得寤寐者死 少陰病六七日息高者死

少陰病脈緊至七八日自利脈緊變暴微厥手足反溫者欲解也論見下利 少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血也 口燥咽乾但欲寐方論見口燥 欲吐不吐

但欲寐方論見吐 吐利但欲寐方論見吐 下利但欲寐方論見吐

利 少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道

出或從口鼻或從目出是名下厥上竭為難治 少陰病

四逆惡寒而身踈脈不至不煩而躁者死 少陰病惡寒

身踈而利手足逆冷者不可治

少陰病利發悸泄

少陰病四逆其人或欬悸或小便利或腹中痛或泄利

下重者宜

四逆散

甘草炙

枳實

柴胡

芍藥各等分

右為細末日飲和查服方寸匕日三服如欬者加五味

子乾薑各五分并主下利 悸者加桂枝五分 小便

不利者加茯苓五分 腹中冷痛者加附子一枚炮令

拆 泄利下重者先以水五升煮薤白三升去查以散

三方寸匕納湯中煮取一升半分溫再服

除病脈
沉欲寐

少陰病手足逆冷其人若下利後重者此條四逆散加薤
白湯若下利脈絕及無脈者通脈四逆湯白通加猪膽汁
湯方論見若身體骨節痛脈沉者宜附子湯少陰病
脈沉者急溫之宜四逆湯方見少陰病身體痛手足寒
骨節痛脈沉者附子湯主之少陰病脈沉發熱者宜前
條麻黃附子細辛湯少陰病欲解時從子至寅上少
陰病惡寒而踈時自煩欲去衣被者可治少陰病下利
止而頭眩時時自冒者死少陰中風脈陽微陰浮者為
欲愈少陰病脈細沉數病為在裏不可發汗少陰病
脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺部弱濇者不可復下
之

陽症脈
浮嗜臥

太陽病十日已去脈浮細嗜臥者外已解也曾滿脇痛者
小柴胡湯脈但浮者麻黃湯論見脈浮汗出多眠若身

重息鼾者風溫方論見

若合目則盜汗出者二陽合病

盜汗方論見

目開欲
眠為狐

狐惑病默默欲眠目不得閉不欲飲食惡聞食臭其面目
乍赤乍黑乍白其聲啞者甘草瀉心湯咽乾者苦參湯

其肛虫蝕雄黃熏之其脈數無熱目赤皆黑者當歸赤小
豆散並見狐

口燥咽乾

少陰病得之二三日口燥乾者宜下之大承氣湯少陰

但欲寐
而躁者

病自利純青色水心下痛口燥乾者宜大承氣湯論見

傷寒無大熱口燥渴背惡寒者白虎加人參湯陽明病

發熱汗出不惡寒反惡熱若口乾舌燥者白虎加人參湯

方論見渴

太陽病下後不大便日晡潮熱心下滿痛而舌上燥渴者

心滿痛
者隨胃

宜大陷胃湯

嗽水不咽者

陽明病口燥但欲嗽水不嚥者必外海藏云嗽水不嚥胃

病惡

病人默默欲眠目不能閉起居不安聲啞或咽乾者當作

病惡

孤感治之咽喉乾燥者不可發汗

病惡

咽痛

病惡

少陰病二三日咽痛可與甘草湯不瘥桔梗湯 甘草湯

病惡

用甘草二兩咬咀每服四錢水煎去查溫服日三服 桔

病惡

梗湯用甘草二兩桔梗一兩咬咀每服五錢水煎溫服

病惡

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

病惡

右咬咀水煎服少少咽之為散白湯調服方寸匕亦效

病惡

重日三服仲景法為散調服不咬咀

病惡

成甘草湯主少陰客熱咽痛桔梗湯主少陰寒熱相搏咽

病惡

痛半夏散及湯主少陰客寒咽痛

病惡

少陰病咽中生瘡不能言語聲不出者苦酒湯主之

病惡

半夏製十枚 鷄子一箇去黃納半夏

病惡

右二味納半夏着苦酒以鷄子殼置刀鐸中安火上令

病惡

三沸去查少少含咽之不瘥更作三劑

病惡

診脈緊當無汗反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復

病惡

吐利論見

病惡

師曰伏氣之病以意候之今月之內欲有伏氣假令舊有

病惡

伏氣當須脈之若脈微弱者當喉中痛似傷寒非候痺也

病惡

病人云實咽中痛雖爾今復欲下利見後活人續法

病惡

咽痛下利兼胃滿者猪膚湯厥逆面赤者通脈四逆湯下

病惡

後復厥逆下部脈不至者麻黃升麻湯並見下利

病惡

面赤斑者陽毒

面青黑者陰毒

陽毒咽痛面赤斑斑如錦紋唾膿血五日可治七日不可治宜升麻鱉甲湯活人云陽毒升麻湯主之論見陽毒條

陰毒咽痛面目青身痛如被杖五日可治七日不可治升麻鱉甲去雄黃蜀椒湯活人云陰毒甘草湯主之論見陰毒條

診

太陽下後脈緊者必咽痛論見大法陽明病頭眩而效者必

咽痛若不效者咽不痛先厥後熱者下利必自止止而

反汗出者其喉為痺發熱無汗者下利必自止若不止者

必便膿血其喉不痺論見下利

忌

咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絕手足厥冷欲得

蹠臥不能自溫咽中閉塞不可下下之則上輕下重水

咽痛續法

寒飲氣酒半夏桂枝甘草湯治伏氣之病謂非時有暴寒中人伏

氣於少陰經始不覺病旬月乃發脈更微弱先發咽痛似傷寒非喉痺之病必下利始用半夏桂枝甘草湯主之此病只二日便瘥古方謂之腎傷寒也次用四逆主之

半夏桂枝甘草湯

半夏湯洗

甘草炙

桂心各等分

右咬咀每服四錢水煎候冷少少細呷之即仲景半夏散及湯但藥

耳

附吐

腹滿痛而吐太陰

不吐但欲嘔少陰

腹滿時痛而吐者太陰病論見腹滿活人云理中湯主之

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐自利而渴論見下利活人云四逆湯主之

少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得

之手足寒脈弦遲者此胃中實不可下也當吐之若膈有

寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜四逆湯少陰病但欲

腹痛欲吐
吐後欲
乾嘔吐
涎頭痛

臥不煩而吐五日變自利煩躁不得寐者死論見但欲寐

腹痛欲嘔吐者宜黃連湯

病解後虛羸少氣欲吐者宜竹葉石膏湯

乾嘔吐涎沫頭痛者宜

吳茱萸湯

湯泡洗
一兩半

人參三分

生姜一兩

右呖咀水煎去渣分二服

吐水煩
渴
吐下後

發熱渴欲飲水水入則吐者宜五苓散論見

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即

吐乾姜黃連黃芩人參湯主之

乾姜

黃連

黃芩

人參各等分

右呖咀水煎溫服

汗後吐

太陽病吐後汗出不惡寒發熱關脈細數飲食冷食朝食

暮吐此為小逆論見

病人脈數為熱常消穀引食而反吐者此因發汗令陽氣

微隔氣虛脈乃數也數而容熱者不能消穀以胃中虛冷

故也凡服桂枝湯而吐者必吐膿血也註云內熱者服桂枝湯則吐如

酒客之類是也吐厥逆者甘薑

活吐有冷熱二症寸口脈數手心熱煩渴而吐以有熱在

胃脘五苓散主之

寒多不飲水而吐者理中湯去朮加生姜主之

陰症喘促及吐逆者返陰丹入口便住

大橘皮湯治動氣在下不可發汗發又無汗心煩骨節疼

痛目暈惡寒食則反吐穀不得入先服大橘皮湯吐止後

脈煩數
渴為熱

不飲水
為寒

陰症吐
誤汗後

宜建中湯

陳皮半兩

生薑兩

炙甘草八分

甘草兩

人參錢

竹茹半升

右水三大盞煮取一盞分二服

病人直患嘔吐而脚弱或疼乃是脚氣當作脚氣治之治見

脚氣吐

附吐利

腹滿時痛吐利不渴者太陰病論見腹滿活人云理中湯主之病人脈

吐利無寒熱頭疼為陰

陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

少陰病吐利手足不逆冷反熱者不死脈不至者灸少

陰七壯少陰病吐利煩躁四逆者死少陰病下利欬

而嘔渴心煩變不得眠者宜猪苓湯論見少陰病腹痛

小便不利四肢重痛自下利或嘔者真武去附子加生薑

湯論見少陰病下利脈微瀼瀼而汗出者當溫其上灸

之論見欲寐溫其上謂下有寒既吐且利小便復利而

大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之王叔和入霍亂篇

太陽與少陽合病頭痛脇痛往來寒熱自利而嘔者黃芩

加半夏生姜湯論見發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐下

利者宜大柴胡湯論見發汗後水漿不得入口者為逆

若更發汗必吐下不止嘔吐而利者名曰霍亂病發

熱頭痛身疼惡寒吐利者此名霍亂自吐下又利止復更

發熱也霍亂頭疼發熱身疼痛熱多飲水者五苓散主

之寒多不飲水者宜

理中湯

人參

乾姜炮

甘草炙各一兩

白木二兩

右劉每服四錢水煎去渣溫服如寒甚者加乾姜一兩

半渴欲得水者加白木一兩半臍上築者腎氣動

也去白木加桂枝二兩吐多者去白木加生薑四兩

下利多者倍用白木悸者加茯苓二兩腹滿者

去白木加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升許自

溫勿發揭衣被活人云或四肢拘急或轉筋者亦去木加附子

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之

素土鬱之發民病嘔吐霍亂注下六元正紀篇太陰所至為

中滿霍亂吐下

右濕土霍亂即仲景五苓散理中丸之類是也

歲土不及風乃大行民病霍亂飧泄氣交變論

右土虛風勝霍亂即羅謙甫桂苓白木散之類是也

熱至則身熱霍亂吐下六元正紀篇

右熱霍亂即活人書香薷散之類是也

靈足大陰之別名曰公孫去本節後一寸別走陽明其別

者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛虛則蠱脹

吐利止後病身痛者和外國脈微者溫裏

取之所別也經脈篇氣亂於腸胃則為霍亂取之足太陰

陽明不下取之三里五亂篇東垣云足太陰期門穴也足陽明中皖穴也

吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯惡

寒脈微利止者四逆加人參湯方論見惡寒

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四

逆湯加豬膽汁下之

甘草炙二兩

乾姜三兩

附子大一枚

豬膽汁半合

右三味咬咀水三盞煎至二盞去渣納豬膽汁分作二

次溫服其脈即來

乾嘔下利分陰

吐利發汗脈平不煩者以新虛不勝穀氣故也 乾嘔而利兼脇痛而表解者宜十棗湯心下痞鞭而煩者宜甘草瀉心湯兼厥逆脈微者通脈四逆湯白虎加猪膽汁湯詳

乾嘔

脈陰陽俱緊至於吐利其脈獨不解緊去人安此為欲解若脈遲至六七日不欲食此為晚發水停故也為未解食自可者為欲解

吐利續法 內經霍亂法附

夏月霍亂為暑

活夏月中暑霍亂上吐下利心腹撮痛大渴煩躁四肢逆冷汗自出兩脚轉筋宜服香薷飲須并底沉極冷頓服之乃效他藥不能救

香薷散治陰陽不順清濁相干氣鬱中焦名為霍亂此皆飽食鱸炙頓啖乳酪酒膠百品無所不食多飲水漿眠睡

冷席風冷之氣傷於脾胃諸食結而不散陰陽二氣壅而不反陽氣欲降陰氣欲升陰陽交錯變成吐利不已百脈混亂榮衛俱虛冷搏筋轉皆宜服此

厚朴 去皮二兩 黃連 薑汁炒二兩 香薷 同 甘草 半兩

右為末每服四錢水煎不犯鐵器慢火煎之兼治不時吐利霍亂腹撮痛大渴煩躁四肢逆冷汗自出兩脚轉筋疼痛不可忍者須并中沉令極冷頓服之乃效

羅桂苓白朮散治胃暑飲食所傷傳受濕熱內盛霍亂吐瀉轉筋急痛腹滿痛悶小兒吐瀉驚風皆宜服此

桂枝 各半 人參 各半 白朮 各半 茯苓 各半

澤瀉 各半 石膏 各半 寒水石 各一兩

滑石 二兩 一方有木香藿香葛根各半兩

右為細末每服三錢白湯調下或新汲水生薑湯下亦

得有一蒙古百戶昔良海因食酒肉飲潼乳得吐瀉霍亂
症從朝至午精神昏憤以困急來告予診視之脈得沉
數按之無力所傷之物已出矣即以新汲水半碗調桂
苓白朮散徐徐服之稍得安靜又於墻陰掘地一穴約
二尺許貯以新汲水在內攪之待一時澄定名曰地漿
用清者一杯再調服之漸漸氣和吐瀉遂止至夜得安
翌日微煩渴遂愈却以錢氏白朮散時服之良愈或
問用地漿者何也予曰坤為地地屬陰土平曰靜順感
至陰之氣又於墻陰貯以新汲水以取重陰之氣也陰
中之陰能泄陽中之陽霍亂症由暑熱內傷而得之故
痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡又加暑熱七神迷
亂非至陰之氣則不能息予用之者此也內經福萬世
之書豈不信哉 又提學侍其公年七十九歲六月中

暑毒霍亂吐瀉昏冒終日不知人事夜半請予視之診
其脈七八至洪大有力頭熱如火足寒如冰半身不遂
牙關緊急予思內經五亂篇中云清氣在陰濁氣在陽
榮氣順脈衛氣逆行亂於胃中是謂大惋云云亂於腸
胃則為霍亂於是霍亂之名自此而生蓋年高氣弱不
任暑氣陽不維陰則瀉陰不維陽則吐陰陽不相維則
既吐且瀉矣前人見寒多以理中湯熱多以五苓散作
定法治之今暑氣極盛陽明得時之際况因動而得之
中暑明矣非甘辛大寒之劑不能泄其暑熱墜浮煽之
火而安神明也遂以甘露散甘辛大寒瀉熱補氣加茯
苓以分陰陽水水調灌之漸省人事諸症悉去後慎言
語節飲食三日以參朮調中湯以意增減服之理其正
氣逾十日後方平復

無訶子散治老幼霍亂一服即效

訶子炮去核

甘草炙

厚朴薑製

乾薑炮

神麴炒

草果去殼

良薑炒

茯苓

麥芽炒

陳皮各等分

右為細末每服二錢候發不可忍時用水煎入鹽少許服之

聖治霍亂用厚朴薑製火上炙令香為末以新汲水調下二錢七佳

大人參散治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參

厚朴薑製

橘紅各一

當歸炒

甘草炙各半兩

右為末每服四錢薑三枚水煎服

丹霍亂內有所傷外有所感

集吐瀉還用此以提其氣起吐用二陳湯加減或用樟木煎湯吐亦可

海霍亂症本自胃家或因寒飲或因飲水或傷水毒或感濕氣冷熱不調水火相干陰陽相搏轉筋攣痛經絡亂行暴作吐瀉中焦胃氣所主也察其色脈隨經標本此治霍亂吐瀉之法也

外治霍亂吐下不止者艾一把水三升煮至一升頓服

經霍亂陳皮湯下山荳根末二錢

山霍亂吐瀉用屋下倒掛塵泡湯澄清服之大忌飲食入腹則死喫水水不妨不可飲熱湯

集吐瀉不止或吐轉多四肢發厥虛風不省人事服此四

散漸煖神識便省

回陽散用天南星為末每服三錢用大棗三枚同煎至八

霍亂後方

分溫服未省再服
霍亂轉筋治法見轉筋

羅增損縮脾飲解伏熱除煩渴消暑毒止吐利霍亂之後服熱藥太多煩躁者尤宜服之

草果 烏梅 甘草 砂仁 各四兩

乾葛 二兩

右咬咀每服五錢生薑五片同煎以水沉冷以解煩或溫或熱隨意服

無茯苓澤瀉湯治霍亂吐瀉後煩渴欲飲水

茯苓 澤瀉 甘草 桂心 各二兩

右咬咀每服四錢生薑二片同煎食前服一方有小麥

五兩

別錄

世以小竹杖兩手反抱住於脊骨就杖見上下各點一穴如先吐先灸上穴先瀉先灸下穴各三百壯百發百中

又霍亂諸法不效者灸大椎 又以鹽納臍中灸二十七壯

立甦

霍亂吐瀉中脘 天樞 三里 委中

摘又法上脘 三里

甲霍亂泄出不自知先取太谿後取太倉之原 又法巨

闕 關衝 支溝 解谿

千又主陰陵泉

東吐利上下俱出藏痺膿血頭重臂痛太白 地機 風

府 各五 長強 尺澤 各一

甲霍亂泄利期門主之 厥逆霍亂府舍主之

世霍亂手足厥冷灸三陰交七壯

甲霍亂逆氣魚際太白主之 霍亂遺尿失氣三里主之
世病人合面正臥兩手着身以繩橫亘兩肘尖頭依繩下
俠脊兩邊相去各一寸灸三七壯無不驗 霍亂已死但
有煖氣者灸承筋七壯立甦 取法以繩從足拇指圍至後
跟一匝捻斷等折一半為度
以此度從足跟貼地量
上至膻度極頭處是穴
甲霍亂頸痺不仁承筋主之 千金云主
糜痲脚痲 暴霍亂僕參主
之

診

世霍亂遍身轉筋肚痛四肢厥冷欲絕者其脈洪大易治
脈微囊縮舌卷不治

禁忌

千諸霍亂忌與米飲胃中得米即吐不止
羅潔古老人云霍亂轉筋吐瀉不止其病在中焦陰陽交
而不和發為疼痛此病最急不可與分毫粥飲穀氣入胃
則必死矣

保凡霍亂慎勿與粟米粥湯入胃即死本草云粟米味酸
微寒無毒主養腎氣去脾胃中熱益氣霍亂脾胃極損不
能傳化加粟米豈有能生也邪如吐瀉已多欲住之後宜
以稀粥漸漸補養以遲為妙

自利不
渴屬太
陰

自利不渴者屬太陰以其臟有寒故也當溫之宜
四逆湯

甘草 兩

乾姜 三錢

附子 半兩

右咬咀水煎溫服強人加附子半兩乾姜一兩半

自利而
渴屬少
陰

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少
陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便
白以下焦虛有寒不能制水故令色白也 活人云四
逆主之 少
陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不能眠者猪苓湯主之

少陰病自利清水色純青者心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯
孫實大郎患傷寒經十餘日口燥舌乾而渴心中疼自利清水衆醫皆相守但調理耳汗下皆所不敢實氏親故相謂曰傷寒邪氣害人性命甚速安可以不決之疾投不明之醫乎召孫至曰即日不可下明日正當下投小承氣湯遂大便通得睡明日平復衆皆曰此症緣何下之而愈孫曰不深於書徒知有書耳不知書之奧也口燥舌乾而渴豈非少陰症乎少陰症固不可下豈不知少陰一症自利清水心下痛者下之而愈仲景之書明有是說也衆皆欽服
白頭翁湯與粟米湯
下利欲飲水者以有熱故也宜
白頭翁湯與粟米湯
下利欲飲水者以有熱故也宜

白頭翁 黃栢 秦皮 黃連各三

右吹咀水煎去渣溫服不瘥再服
少陰病下利白通湯主之 少陰病三三日不已至四五日腹滿痛小便利或下利或嘔者宜

真武湯 茯苓 芍藥各三 附子一 白朮半兩加減法從

右吹咀每服五錢生姜五片煎至八分溫服日三 款者加五味子細辛乾姜各一分 小便利者去茯苓
下利者去芍藥加乾姜 嘔者去附子加生姜七片
少陰下利咽痛胃滿心煩者猪膚湯主之用猪膚四兩以水一盞半煎取一盞去渣加白蜜二合半白粉一合二勺半熬煮和相得溫服 海藏云猪

厥利症治

大汗利而厥冷者宜四逆湯 少陰病但欲寐下利若兼手足厥逆者白通加猪膽汁湯通脈四逆湯方論見後厥利兼便膿血者宜桃花湯方論見後便膿血條少陰病效而下利譫語者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗故也 少陰病下利脈微瀉嘔而汗出必數更衣反少者當溫其上灸之溫其上義見前條少陰病下利若利自止惡寒而躄手足溫者可治 大汗出熱不去內拘急四肢疼必下利厥逆而惡寒者四逆湯主之 傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利吐膿血泄下不止者為難治宜

麻黃升麻湯

麻黃去節二升麻二

當歸

知母

黃芩

姜廷路謝

石膏碎

白朮

乾薑

芍藥

天門冬

桂枝

茯苓

甘草各六銖

右咬咀每服五錢水煎溫服相次一炊時又進一服汗出愈

診

下利脈沉而遲其人面少赤身有微汗下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也 凡厥利當不能食今反能食者恐為除中試食以索餅不發熱者知胃氣尚在必愈也論見傷寒先厥後發熱下利者必自止而反汗出咽中痛者其喉為痺發熱無汗而利必自止必便膿血便膿血者其喉不痺 下利後脈絕手足厥冷時脈還手足溫者生脈不還者死 下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死 傷寒發熱下利厥逆躁不得臥者死 傷寒發熱下利至甚

厥不止者死

厥利但欲眠者少陰

少陰病下利脈微與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者

白通加豬膽汁湯主之服湯後脈暴出者死微續者生

白通湯

乾薑一兩

附子一枚

右呔咀每服五錢入蔥白二寸同煎溫服

白通加豬膽汁湯

乾薑一分

蔥白一莖

附子一枚

童便一分

豬膽一筒

右水一盞煎至五分去渣入童便膽汁相和得所溫服

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒真病面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯主之

甘草

乾薑二兩

附子一枚

面赤色者加

蔥九莖

腹中痛者去蔥加芍藥二兩

嘔者加生

薑二兩

咽痛者去芍藥加桔梗二兩

利止脈不

出者去桔梗加人參一兩

右呔咀每服五錢水煎溫服未瘥急更作一劑其脈續

續出者愈

少陰病但欲寐四肢逆而利若下重者四逆散加薤白也

論見厥方

若惡寒身蹇者不治

論見

下利有表証為陽

下利腹脹滿身體疼痛先溫其裏乃攻其表溫裏四逆湯

攻表桂枝湯

傷寒表不解乾嘔發熱欬而下利者此為

水氣宜小青龍去麻黃加芫花湯

方論見欬

太陽與陽明合

病者必自下利葛根湯主之

方見太陽病治人云下利而

脈浮大而長

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若

者是其証也

嘔者黃芩加半夏生薑湯主之

下利而頭疼胃弱或口苦

大而強
是也

黃芩湯

黃芩三分

甘草炙

芍藥各二

大棗枚

右咬咀水煎溫服若嘔加半夏六錢生姜五片

太陽病桂枝症醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者宜

葛根芍連湯

葛根三兩

黃連

黃芩各二兩

甘草炙半兩

右咬咀每服五錢水煎溫服日進二三服

下利清穀脈沉微手足厥逆者為陰宜通脈四逆湯論見前條

脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之傷寒

醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏宜四逆湯救表宜桂枝

利清脈沉脈浮不厥屬陽

湯 少陰病下利膿血者桃花湯主之 少陰病二三日

日至四五日腹滿小便不利下利不止膿血者宜

桃花湯

赤石脂四兩一半全

大米半合

乾薑二錢

右水二大盞煮三味米熟去渣納赤石脂細末一方寸

七溫服日三愈勿服

少陰病下利膿血者可刺 下利膿血若厥而發熱厥

少熱多者病當愈也論見厥 先厥後發熱無汗者利不止

也論見前條 下利脈數而渴者令自愈設不瘥者必清膿血

以有熱故也 下利寸脈反浮數尺中自濇者必清膿血

下利脈數不解而下利不止者必挾熱而便膿血也論見

血者

下利謔語若脈微手足厥但欲寐小便難者為陰宜補劑

下利謔語分陰

陽

和之

若脈和手足温及不欲寐小便利者為陽宜調胃承氣湯

論見語語及前少陰下利欲寐條

陽明少陽合病必下利其脈不負者順也負者失也互相

尅賊名為負也脈滑而數者有宿食也當下之宜大承氣

湯 下利脈遲而滑者內實也利未欲止當下之宜大承

氣湯 下利脈反滑當有所去下之乃愈宜大承氣湯

下利脈微者白虎湯也若微瀉嘔而汗出數更衣者當温

而灸之方論見少陰下利條

下利脈大者虛也以其強下之故也設脈浮革故爾腸鳴

者屬當歸四逆湯主之

熱利下重者白頭翁湯主之 四肢逆而泄利下重四逆

散加薤白主之論見前厥利條

下利身痛

下利身體疼痛若但四肢沉重疼痛小便不利者前條真

武湯症也 若四肢疼厥逆惡寒者四逆湯若通身疼痛

者先以四逆湯温裏後用桂枝攻表也方論見前

下利三部脈皆平按之心下鞭者急下之宜大承氣湯

下利後心下痞鞭者此非結熱但胃虛客氣上逆故使鞭

甘草瀉心湯主之論見前

下利咽喉痛若兼胃滿者猪膚湯兼厥逆者通脈四逆湯

若下利不止厥逆下部無力咳唾膿血者麻黃升麻湯方論

並見前條

下利十餘行胸中痛寸口脈滑者宜吐之則利止論見前

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心湯後以他藥下

之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在

下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者宜利其小便

下後利遂不止利為協熱

下利嘔痛下利胸痛

下利心下鞭

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂

禹餘糧各四兩

右剉碎每服五錢水煎溫服不瘥再服

下後心下痞鞭腹中雷鳴乾嘔而利者甘草瀉心湯方論見痞

下後心下痞鞭表裏不解而利者桂枝人參湯方論見痞

下利脈促表不解喘汗而利者葛根黃芩黃連湯方論見前

表凡藥下後潮熱脇滿嘔而利者先用小柴胡湯解外

後以柴胡加芒硝湯論見潮熱凡藥下後譫語脈調和小便

利而下利不厥者調胃承氣湯論見瀉語下後脈大浮革腸

鳴而利者當歸四逆湯論見前下利脈冷條下後脈數不解者必

便膿血論見前便血條下後成陰症厥逆咽不利唾膿而利者

麻黃升麻湯論見厥利條

少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈

去者為欲解也雖煩下利必自愈 傷寒脈浮緩手足溫

至七八日忽暴煩下利日十餘行者必自止論見黃門發熱

而厥七日下利者為難治 傷寒六七日不利便發熱而

利其人汗出不止者死有陰無陽故也 少陰病但欲臥

不煩至五六日忽自利煩躁不得寐者死論見但欲寐下利

脈沉弦者下重也脈大者為未止脈微數者為欲自止雖

發熱不死 下利有微熱而渴脈弱今自愈 下利脈數

而渴者自愈設不瘥者必清膿血論見前下利脈數有微

熱汗出今自愈設復緊為未解 傷寒下利日十餘行脈

反沉者死 假令下利寸口關上尺中悉不見脈然尺中

時一小見脈再舉頭者腎氣也若損脈來至為難治 下

利清穀不可攻表汗出必脹滿

下利續法

腎寒
大便青
白為寒
臍下熱
大便黃
赤為熱

活寒毒入胃者臍下必寒腹脹滿大便黃白或青黑或下
利清穀宜四逆湯理中湯白通加附子湯四逆加薤白散
挾熱利者臍下必熱大便赤黃色及腸間津汁垢膩宜黃
芩湯白頭翁湯三黃熟艾湯薤白湯赤石脂湯
三黃熟艾湯治傷寒四日而大下熱利時作白通湯諸藥
多不得止宜服此湯除熱止利

黃芩

黃連

黃柏

熟艾半雞子大

右咬咀水煎溫服

薤白湯治傷寒下利如爛肉汁赤帶下伏氣腹痛諸熱悉
主之

豆豉半合綿裹

薤白搗

山梔七枚

右咬咀用水二升半先將梔子十沸下薤白煎至二升

下豉煎取一升二合溫服

赤石脂丸治傷寒熱利

赤石脂兩一

黃連

當歸各二兩

乾姜炮五兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九米飲下日三服
濕毒氣盛者下利腹痛大便如膿血或如爛肉汁宜桃花

湯地榆散黃連阿膠散

地榆散治傷寒熱毒不解日晚即壯熱腹痛便利膿血

地榆

犀角屑

黃連炒

葛根各一兩

梔子仁半兩

黃芩兩一

右咬咀每服四錢水一盞入薤白五寸同煎溫服

海阿膠湯治傷寒熱毒入胃下利膿血

黃連炒

山梔半兩

阿膠炒

黃柏各一兩

右咬咀每服四錢水煎服

雲傷寒汗下後大小便利者腹中痛者宜燥腸丸

傷寒汗下後大

小便利
腹痛宜
温

附子炮一 龍骨兩半 乾姜兩一 吳茱萸
粟殼兩 訶黎皮各半

裏急後
重宜下

傷寒汗下後裏急後重下利者宜
七宣丸

大黃兩一 桃仁去皮尖 木香 檳榔
柴胡 訶子皮 甘草各半

氣逆者
宜和

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五十九温水下
傷寒汗下後氣逆利不止者寒也宜
枳實芍藥甘草湯
芍藥 甘草 枳實炒 乾姜炮各半兩
右咬咀每服五錢水煎服

厥陰病 氣上衝心 飢不欲食 吐
虫 厥 少腹滿囊縮

厥陰病

厥陰之為病消渴氣上衝心中疼熱飢不欲食食則吐
蚘 厥陰病渴欲飲水者少與之愈 厥陰中風脈微
浮為欲愈不浮為未愈 厥陰病欲解時從丑至卯上
病如桂枝症頭不痛項不強寸脈微浮胃中痞鞅氣上衝
咽喉不得息者此為曾有寒也當吐之宜

脈浮氣
上冲咽
喉不得
息者為
陽

瓜蒂散

瓜蒂炒 赤小豆各一分

右研為細末取一錢用豉一合湯七合先漬之須臾煎
稀糜去渣取汁相和温頓服不吐少少加得快吐乃止
諸亡血虛家不可與服
活瓜蒂散每服一錢七藥下便臥欲吐且恐之良久不吐

取三錢七湯二合和服以手指探之便吐不吐復稍增之
以吐為度若吐少病不除明日如前法再吐之不可令人
虛也如藥力過時不吐飲熱湯一升以助藥力吐訖便可
食無更服若服藥過多者飲水解之

奔豚 奔豚氣上衝胃腹痛往來寒熱奔豚湯主之方見積塊
陰陽易 陰陽易少腹裏急引陰中拘攣熱上衝胃頭重不欲舉眼
剛痊 中生花者宜燒裊散論見陰

汗後氣 氣上衝胃口噤不得語欲作剛痊者宜葛根湯論見
燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹
上衝心者灸其核各一壯與
桂枝加桂湯

桂枝二兩 芍藥 生薑各一兩半 甘草一兩
大棗六枚

右咬咀每服五錢水煎溫服桂枝加桂以能
動氣發汗則氣上衝正在心端論見 太陽下後其氣上

衝者可與桂枝湯方用前法若不上衝者不可與之
傷寒吐下後心下逆滿氣上衝胃頭眩脈沉緊若發汗則

動經身為振搖者茯苓白朮甘草湯論見戰振 傷寒吐
下後發汗虛煩脈甚微八九日心下痞鞭脇下痛氣上衝
咽喉眩冒經脈動惕者久而成瘵

氣上衝心續法

雜方 活李根湯治氣上衝正在心端

半夏 當歸 芍藥 生薑

茯苓 桂枝 黃芩 甘草

甘李根白皮各等分

右咬咀每服五錢水煎溫服

飢不欲食

飢不欲食食則吐蛇者厥陰病論見氣上冲心手足厥冷脈乍

緊心煩飢不能食者邪在胸中宜瓜蒂散吐之論見厥

太陽病吐發汗出發熱不惡寒關脈細數腹中飢口不能

食朝暮吐者此為小逆論見發熱陽明病下後心中懊懣飢

不欲食但頭汗出者宜梔子豉湯論見煩

吐蛇虫

氣上衝心疼飢不欲食吐蛇者厥陰病論見氣上冲靜而復

煩須臾復止得食而嘔又煩吐蛇虫者為蛇厥宜烏梅丸

方論見厥

病人有寒復發汗胃中冷必吐蛇活人云先服理中丸次服烏梅丸

厥

兩感於寒者三日少陰與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥論見

先厥後太陰註云耳聾者少陽傷寒一二日至四五日而厥者

必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥

應下之而反發汗者必口傷爛赤成無已云若始得之

手足便厥而不溫者是陰經受邪陽氣不足可用四逆湯

溫之若手足自熱而至溫從四逆而至厥者傳經之邪也

四逆散主之必須識此勿令誤也四逆湯方見下利又當

外症別之予嘗治一中年婦人惡熱身熱而渴脈數細弱

先厥後熱用溫藥反劇後以四逆散兼參朮各半服之厥

愈脈出洪大而痊

手足厥寒脈細欲絕者宜

當歸四逆湯

甘草 通草各六錢 當歸 桂枝

細辛 芍藥各一兩

各一兩

脈細弱而厥為寒

先厥後

厥陰吐

汗下後

飢不欲食者陽

熱為寒

右咬咀每服五錢入枣子一枚同煎温服

若其人内有久寒者宜當歸四逆加茱萸生薑湯主之於原方内加吳茱萸二兩生薑二兩半 嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之

傷寒脈滑而厥者裏有熱也白虎湯主之

傷寒脈促手足厥逆者可灸之脈經云可灸少陰厥陰主逆

傷寒六

七日脈微手足厥冷煩躁灸厥陰灸而不止者死

病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胃中心中滿而煩飢不能食者病在胃中當吐之宜瓜蒂散脈緊一作脈結者有理脈來

數時一止復來曰促脈來緩時一止復來曰結結促二脈

者脈為邪礙而歇止也灸之吐之所以逐去其邪也

少陰病身痛手足寒脈沉者宜附子湯論見欲寐傷寒五六

日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便更硬日

者此為陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也汗出

陽微假令純陰結不得復有外症悉入在裏此為半在裏

半在表也脈雖沉驟不為少陰病所以然者陰不得有汗

今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得

屎而解

本有人患傷寒五六日頭汗自出自頸以下無汗手足冷

心下痞悶大便秘結或者見四肢冷又汗出滿悶以為陰

症予診其脈沉而緊予曰此症誠可疑然大便秘結非虛結

也安得為陰脈雖沉而緊為少陰症多是自利未有秘結

者此症半在裏半在表投以小柴胡湯得愈仲景稱傷寒

五六日頭汗出云云至得屎而解正此之謂也有人難曰

脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰不得有汗何也

今頭汗出者故知非少陰何以頭汗出便知非少陰症予

悸而厥

曰此一
段正是仲景議論處謂四肢冷脈沉緊腹滿全似
少陰然大便鞭頭汗出不得為少陰蓋頭者三陽同聚若
三陰止胃而還有頭汗出自是陽虛故曰汗出為陽微是
陰不得有汗也若少陰頭有汗則死矣故仲景平脈法云
心者火也明少陰則無頭汗者可治有汗者死心為手少
陰腎為足少陰相與為上下惟以意逆志者斯可得之
傷寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却治其
厥不爾水漬入胃必作利也

茯苓甘草湯

茯苓

桂枝各二錢

生薑三錢

甘草炙一錢

右咬咀水煎溫服

悸而四逆吐而

少陰病四逆或悸者四逆散加桂枝主之方論見傷寒
脈浮自汗出小便數心煩微惡寒腳攣急反與桂枝湯欲

攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾
姜湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與
之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重
發汗復加燒針者四逆湯主之

甘草乾姜湯

甘草四兩

乾姜二兩

右咬咀每服五錢水煎溫服

芍藥甘草湯

白芍藥

甘草各二兩

右咬咀每服五錢水煎溫服

調胃承氣湯

方見

四逆湯

方見

問曰症象陽且按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脛拘急
而譫語師曰言夜半手足當溫兩脚當伸後如師言何以
知此答曰尺寸浮而大浮則為風大則為虛風則生微熱
虛則兩脛攣急症象桂枝因加附子參其間增桂令汗出

附子溫經回陽故也厥逆咽中乾煩躁陽明內結譫語煩亂更飲甘草乾姜湯夜半陽氣還兩足當熱脛尚微拘急重與芍藥甘草湯乃脛伸以承氣湯微瀉則止其譫語故知病可愈 少陰病食入則吐復不能吐手足寒脈弦遲者宜吐之論見吐

下利而厥

下利而厥下重者四逆加薤白脈微者通脈四逆湯白通湯溫後無脈者白通加豬膽汁湯汗後拘急者四逆湯下

吐利厥為寒

後咽不利者麻黃升麻湯方論見下利吐利發熱惡寒汗出而厥者屬霍亂宜四逆湯 吐利煩躁欲死而厥者屬少陰宜吳茱萸湯 吐利止脈微欲絕而厥者通脈四逆加豬膽汁湯方論見吐利

渴而厥為暑

中暑口乾而渴治法見中暑門

時止者

傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此為

下昏昏嗜臥口舌乾燥乃曰前醫留白虎加人參湯可服否予曰白虎雖云治口燥舌乾若只此一句亦未然今此症不可服白虎者有三傷寒症云立夏以前立秋以下不可妄用一也太陽症無汗而渴者不可用二也况病人陰症悉具其時春氣尚寒三也仲景云下利清穀急當救裏宜四逆湯五兩人參一兩生薑十餘片連翹蔥白九莖水五大盞同煎至三盞去渣分三服一日服之至夜則止手足溫翌日大汗而解繼之以理中湯數服而愈孫真人習業論云凡欲為大醫必須精讀甲乙素問黃帝鍼經明堂流注十二經絡三候九部本草藥性仲景叔和並須精熟如此方為大醫不爾猶無目夜遊動致顛殞執此用藥者再思可矣

天熱症熱宜寒

陽症治驗 真定府趙吉夫年三十三至元五月間因勞

之
役飲食失節傷損脾胃時發煩躁而渴又食冷物過度遂
病身體困倦頭痛四肢逆冷嘔吐而心下痞醫人不察見
其四肢逆冷嘔吐而心下痞乃用桂枝末三錢七熱酒調
下仍以綿衣覆之作陰毒傷寒治之須臾汗大出汗後即
加口乾舌澀眼白時紅項強硬肢體不柔和小便淋赤大
便秘澀循衣摸床如發狂狀問之則言語錯亂視其舌則
赤而欲裂朝輕暮劇凡七八日家人輩悉謂危殆不望生
全鄰人吉仲完舉予治之診其脈七八至知其熱证明矣
遂用大承氣湯苦辛大寒之劑一兩作一服服之利下三
行折其勝勢翌日以黃連解毒湯大苦寒之劑二兩徐徐
服之以去其熱三日後病十分中減五六更與白虎加入
參湯約半斤服之瀉熱補氣前症皆退戒以慎起居節飲
食月餘漸得平復內經曰凡用藥者無失天時無逆氣

無翼其勝無贊其復是謂至治又云必先歲氣無伐天和
當暑氣方盛之時聖人以寒涼急救腎水之源補肺金之
不足雖有客寒傷人仲景云用麻黃湯內加黃芩知母石
膏之類恐發黃發斑又用桂枝湯之戒况醫以桂末熱酒
調服所謂差之毫釐謬以千里逆仲景之治法經云不伐
天和不禁其復不翼其勝不失氣宜不然則故疾未已新
病復起矣

天熱症
寒宜中
治
用熱遠熱從乎中治 友人劉巨源年六十五歲至正夏
月因勞役飲食失節又傷冷飲得疾醫者往往以為四時
症治之不愈逮十日請予治之曰右手三部脈沉細而微
太陰症也左手三部脈微浮而弦虛陽在表也大抵陰多
而陽少今所苦身體沉重四肢逆冷自利清穀引衣自覆
氣難布息懶言語此脾受寒濕中氣不足故也仲景言下

利清穀急當救裏宜四逆湯溫之內經有用熱遠熱之戒
口乾但嗽水不嚥早晨身涼而肌生粟午後煩躁不欲去
衣昏昏睡而面赤隱隱紅斑見於皮膚此表實裏虛故也
內虛則外症隨時而變詳內外之症乃飲食勞倦寒傷於
脾胃非四時之症明矣治病必察其下今適當大暑之時
而得內寒之病以標本論之時為標也病為本也用寒藥
則順時而違本用熱藥則從本而逆時此乃寒熱俱傷必
當從乎中治中治者溫之是也遂以錢氏白朮散加升麻
就本方加葛根甘草以解其斑少加白朮茯苓以除濕而
利小便人參藿香木香和脾胃進飲食咬咀一兩煎服再
服癘退而利止身溫而神出次服異功散治中湯辛溫之
劑一二服五日得平止藥或曰病雖少愈勿藥可乎予曰
藥攻邪也內經曰治病以平為期邪氣既去強之以藥變

身熱而
脈忽無
脈者必
有汗

証隨起不若以飲食調養待其真氣來復此不藥而藥不
治而治之理旬日良愈必察其下者謙甫謂時下之宜也
活若病人寒熱而厥面色不澤冒昧而兩手忽無脈或一
手無脈者必是有正汗也多用綿衣裹手足令溫煖急服
五味子湯或兼與麻黃細辛甘草湯之類服之時時必有
大汗而解矣

五味子湯治傷寒喘促脈伏而厥
人參一分 五味子兩半 麥門冬去心 杏仁去皮
生薑 陳皮各一分 惠子二枚
右咬咀水煎服

針灸
摘治傷寒手足逆冷 大都一分
傷寒六脈俱無復溜 補大 合谷 中極 支溝寸
半此穴和 復溜 順骨 巨關三分 氣衝灸七
脈絕穴

宜忌

諸手足逆冷皆屬厥陰不可汗下然有須汗須下者謂手足雖逆冷時有溫時手足掌心必煖非正厥逆也當消息之

診

脈病若四肢厥逆脈反浮大而短者死

少腹滿囊縮

尺寸脈微緩者厥陰受病也當六七日發其症少腹煩滿

而囊縮論見大法活人元脈沉短囊縮者承氣湯下之病者手足厥冷言我不

結胃小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元也

少腹硬滿小便利者為畜血若兼身黃發狂者抵當湯主

之詳見畜血門不身黃發狂者抵當丸但少腹急結者宜桃花承氣湯

傷寒表不解乾嘔發熱而欬或小便不利少腹

滿者小青龍去麻黃加茯苓湯主之論見

不大便日晡潮熱從心下至少腹硬滿而痛者宜大陷胃湯

心腹滿為結胃

少腹滿囊縮續法

活傷寒六七日煩滿囊縮其脈尺寸俱微緩者足厥陰肝

經受病也厥陰病其脈微浮為欲愈不浮為未愈宜小建

中湯脈浮緩者必囊不縮外症必發熱惡寒似瘡為欲愈

宜桂枝麻黃各半湯若尺寸俱沉短者必是囊縮毒氣入

腹宜承氣湯下之大抵傷寒病臟腑傳變陽經先受病故

次傳入陰經以陽主生故太陽水傳足陽明土土傳足少

陽木為微邪也陰主殺故木傳足太陰土土傳足少陰水

水傳足厥陰木至六七日當傳厥陰肝木必移氣克於脾

土脾再受邪則五臟六腑皆因而危殆榮衛不通耳聾囊

縮不知人而死矣速用承氣湯下之可保五生一死古人

云脾熱病則五臟危又土為木賊則死若第六七日傳厥

陰脈得微緩微浮為脾胃脈也故知脾氣全不受克邪無

厥陰肝脈滑者宜汗脈和緩者宜和脈短者宜下

脈沉結裏縮者厥陰腹滿肢厥者勝於冷結

少腹滿小便利者畜血不利者畜飲

大小便
引飲宜
下飲宜
便利不
熱不痛
宜溫

所容否極泰來榮衛將復水升火降則寒熱作而大汗解矣

海厥陰症者煩滿囊縮大小便不通發熱引飲腹滿尺寸脈微緩煩者火也滿者木也雖不吐衄囊縮但急者亦木也火與木相合四肢厥逆而爪甲青大小便不通地道塞也發熱引飲邪氣在裏宜溫之下之

已上諸症大小便俱通地道不塞不發渴不引飲邪不在裏則宜溫之灸之則裏外相接以復陽氣宜服

正陽散

麝香

一錢細研性辛溫

乾薑

甘草各二錢

附子

一兩炮去皮臍味辛鹹溫

皂角

二兩酥炙去皮

右為細末每服二錢白湯下溫服

回陽丹

硫黃

半兩味酸溫大熱治心腹腫聚邪氣冷癖左脇氣咳上氣脚冷無力

附子

炮半兩

乾姜

炮二錢

木香

半兩味辛溫療肌中偏寒主氣不足之精

全蠍

半兩味辛治

蕞澄茄

半兩味辛溫治皮風心腹氣脹

吳茱萸

半兩洗炒

右為末酒糊丸如桐子大生薑湯下三五十九併二三服以熱投之衣被取汗

陰氣毒盛變陰毒

陰毒之為病面青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻鱉甲湯去雄黃蜀椒主之

陰毒續法

活陰毒甘草湯治傷寒時氣初得病一二日便結成陰毒或服藥後六七日已上至十日變成陰毒身重背強腹中

活人更
名陰毒
傷寒主
退寒

仲景但
名陰毒
主發寒

絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脈沉細而疾身如被杖咽喉痛五六日可治七日不可治

甘草

升麻

當歸各五錢

雄黃二錢

桂枝去皮

蜀椒炒去汗併開口者及子二分

鱉甲酥炙一兩半

右咬咀水煎服如人行五里許更進一服覆取汗毒從汗出汗出即愈若未汗再服

本陰毒本因腎氣虛冷因慾事或食冷物後傷風內既伏陰外又感寒或先感外寒而後伏陰內外皆陰則陽氣不守遂發頭痛腰重腹痛眼睛疼身體倦怠而不甚熱四肢逆冷額上及手背冷汗不止或多煩渴精神恍惚如有所失或可起行不甚覺重診之則六脈俱沉細而疾尺部短小寸口或無六脈俱浮大或沉取之大而不甚疾者非陰

陰毒脈沉細疾

症也若服涼藥過多則渴轉甚躁轉急有此症者急服還陽退陰之藥即安惟補虛和氣而已宜服正元散退陰散五勝散陰症不宜發汗如氣正脈大身熱未瘥用藥發汗無妨

始得陰毒

正陽散治傷寒如覺風寒吹着四肢頭目骨節疼痛急服此藥如人行五里許再服連進三服出汗立瘥若患陰毒傷寒入退陰散五分同煎或傷冷傷食頭昏氣滿及心腹諸疾服之無有不效

麻黃去

陳皮

大黃生

甘草

乾薑

肉桂

芍藥

附子

吳茱萸

半夏製各等分

右咬咀麻黃加一半茱萸減一半同為末每服一錢水一盞姜三片葱一枚煎七分熱服以衣被蓋覆取汗切

須候汗乾去之如是陰毒不可用麻黃免更出汗

退陰散治陰毒傷寒手足逆冷脈沉細頭痛腰重連服三

次小小傷冷每服一字入正元散同煎入鹽一捻陰毒傷

寒咳逆煎一服細細熱呷病止

川烏 乾薑等分

右為麤末炒令轉色放冷再搗為細末每服一錢水一

盞鹽一捻煎至半盞去渣溫服

五勝散治傷寒頭痛壯熱骨節疼痛昏沉困倦咳嗽鼻塞

不思飲食兼治傷寒寒氣并慢陰毒神效

白朮 甘草 五味子 石膏各一

乾薑 三兩

右取白朮五錢水一盞入鹽少許同煎服如寒氣

來者加乾薑一兩煎服入艾葉少許煎服

海白朮散治陰毒傷寒心悶煩躁四肢厥冷

川烏 炮去皮臍 桔梗 附子 炮 白朮

細辛 各一兩 乾姜 炮半兩

右咬咀或末之白湯調下一錢匕

羅正陽丹治陰毒傷寒手足厥冷指甲青色體冷脈沉細

而微神效 用蔥蔥四五枝陳蜂房四五箇燒存性為細

末用蔥蔥搗和丸如彈子大手心內握定用手帕繫繫

定須更汗出以綿被覆蓋如手心熱甚休教解開如服

藥先服升麻湯五錢連鬚蔥三莖生姜五片水二大盞

煎至一盞去渣溫服被覆取汗則愈

本陰毒漸深候 積陰感於下則微陽消於上故其候四

肢沉重逆冷腹痛轉甚或咽喉不利或心下脹滿結硬躁

渴虛汗不止或時狂言爪甲面色青黑六脈沉細而一息

陰毒漸深爪青面黑

七至以來有此症者速宜於氣海關元二穴灸二三百壯以手足溫暖為效仍服金液丹來甦丹五勝散還陽散退陰散

川烏去皮臍冷水浸七日薄切晒乾紙袋盛之有患分服壓下陰毒所注如猪血相似未已再進一服效

還陽散治陰毒面青四肢逆冷心躁腹痛

用硫黃末新汲水調下二錢良久或寒一起或熱一起更看緊慢再服汗出瘥

活返陰丹治陰毒傷寒心神煩躁頭疼四肢逆冷

硫黃兩五 附子炮去皮臍 乾姜炮 桂心各半兩

右用生鐵鈔先鋪玄精末一半次鋪硝石末一半中間下硫黃末又着硝石一半蓋硫黃却以玄精石末蓋上

用小盞合着用三斤炭火燒令得所勿令烟出細研似麩後三味搗羅為末與前藥同研令勻軟飯和丸如桐子大每服十五丸至二十九煎艾湯下頓服汗出為度病重則三十丸此方甚驗喘促與吐逆者入口便住又服此藥三五服不退者更於臍下一寸灸之須是晝夜大段不住手灸不限多少壯數灸之艾炷勿令小小則不得力若其入手足冷少腹硬即於臍下兩邊各開一寸各安一道三處齊下火灸之仍與當歸四逆湯併返陰丹亦須頓脹內外通透方得解若遲誤即死矣又若陰症加以少腹不通及陰囊縮入少腹絞痛欲死者更於臍下二寸石門穴急灸之仍須與返陰丹當歸四逆湯加吳茱萸生薑積勿與尋常利小便冷滑藥穴散散治傷寒惡候

船上硫黃 黑附子去皮生用新臘茶為細末各一兩

右為細末先用好酒一升調藥攤入新碗中於火上蕩乾合在瓦上每一碗下燒熟艾一拳大以瓦搗起無令着火直至烟盡候冷即括取研入磁盒內盛每服二錢酒一盞共煎七分有火燄起勿訝傷寒陰毒者四肢冷脈沉細或吐瀉五心煩躁胃中結硬或轉早伏陰在內湯水不得下或無脈先喫一服如吐却更進一服服後心中熱其病已瘥下至臟腑中表未解者渾身壯熱脈氣洪大便宜用發表藥或表解者更不發熱便得眠睡渾身有汗若少有痞結脈實方可用下膈行臟腑藥漸用調和元氣補治脾胃湯散服此藥二服不應者不可治也

除毒沉

本陰毒沉困之候與前後漸染之候皆同而更加沉重六

兩眉一

脈附骨取之方有按之即無一息八至已上或不可數至

此則藥餌難為功矣但於臍下灼火艾如束大三百壯以來手足不和煖者不可治也倘復和煖以前硫黃及熱藥助之若陰氣散陽氣來則漸減熱藥而和治之以取瘥也活治陰虛陽脫體冷無脈氣息欲絕不省人事及傷寒陰厥百方不效者用蔥以索纏如臂大切去根及葉惟存白長二寸許如大餅樣先以火煏一面令通熱勿令着火乃以熱面熨病人臍上連臍下又以熨斗滿貯火熨之令蔥餅中熱氣鬱入肌肉中須更作三四餅餅壞不可熨又易一餅良久病人當甦手足温有汗即瘥更服四逆湯以温其內

海治陰症諸藥不效併湯水不下身冷脈絕氣息短不知人用蔥白熨法莫若用醞醋拌麩皮炒熟注布袋中蒸熨

比上法尤速

代灸塗臍膏

附子

馬藟子

蛇床子

吳茱萸

肉桂各等

右為細末可用白麪一匙藥末一匙生薑自然汁煨成膏攤帛上圓三寸許貼臍下關元氣海自晚至曉其火力可代灸百壯腰痛亦可貼之 一法用丁香萸撥乾薑牡礪燒灰放手心中以唾津調如泥以手掩其陰至暖汗出為度

陰毒傷寒四肢逆冷者用吳茱萸不拘多少為細末溫酒和勻生絹袋盛之熱熨脚心令通暢愈若以湯煎溫藥洗以接四肢亦可 本治陰中伏陽破陰丹

硫黃

水銀

陳皮

青皮

右將硫黃先入銚子內鎔開次下水銀用鐵杖子打勻令無星傾入黑茶盞內細研入二味用麪糊丸如桐子大每服三十九如煩躁冷盥湯下陰症艾湯下良效

有人初得病四肢逆冷臍下築痛身疼如被杖蓋陰症也急服金液破陰來復等丹其脈遂沉而滑沉者陰也滑者陽也病雖陰症而見陽脈有可生之理仲景所謂陰病見陽脈者生仍灸氣海丹田百壯手足溫溫陽回得汗而解或問滑沉之狀如何便有生理予曰仲景云翁奄沉名曰滑何謂也沉為純陰翁為正陽陰陽和合故名曰滑古人論脈滑雖曰往來前却流利旋轉替然與數相似仲景三語而足也此三字極難曉翁合也言張而復合也故曰翁為正陽沉言忽降而下也故曰沉為正陰方翁而合

降而沉奄為忽忽間仲景論滑脈可謂諦當矣其言皆有法故讀者難曉宜細思之

則也... 盜汗... 面赤... 壞病... 驚悸... 藏結... 痞氣... 同異... 結胃... 小便不利... 無汗... 瘧狀... 頭汗... 舌白胎... 噫... 噦... 畜血... 吐血... 下血... 唾血... 畜血... 吐血... 短氣... 心痛... 除中... 下重... 身熱惡... 寒身寒惡熱... 瘧... 瘧... 狐惑... 百合... 合病併病汗不吐後等病... 太陽與陽明合病必自下利葛根湯主之不下利但嘔者

醫學綱目卷之三十二

傷寒部

合病併病汗下吐後等病

喘 身重

難轉側

遺尿

盜汗

面赤

壞病

戰慄振搖

筋惕肉瞤

叉手冒心

驚悸

藏結結胃痞氣同異

結胃

痞煩

煩躁

欬

小便不利

小便難

尸厥鬱冒

噫

噦

無汗

瘧狀

頭汗

舌白胎

噦

無汗

鼻衄

下血

唾血

畜血

吐血

短氣

心痛

除中

下重

身熱惡

寒身寒惡熱

瘧

瘧

狐惑

百合

合病併病汗不吐後等病

太陽與陽明合病必自下利葛根湯主之不下利但嘔者

汗宜

醫學綱目卷之三十二

一

葛根加半夏湯主之

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半

夏湯生薑湯主之

陽明與少陽合病必下利脈滑而數者有宿食也當下之

宜大承氣湯

二陽併病太陽出汗不徹因轉屬陽明自汗不惡寒太陽

症不罷面赤燥煩短氣者更發汗則愈

二陽併病太陽症罷潮熱譫語者下之則愈

太陽與少陽併病項強眩冒心下硬如結胃者刺胃脘肝

脘

論見

太陽與陽明合病喘而胃滿者不可下麻黃湯主之

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊強鼻

宜和

宜下

併病宜

宜下

表裏

喘發熱

脈浮為

表

乾不得臥予曰太陽陽明合病仲景云中有三證下利

根湯不下利嘔逆者加半夏喘而胃滿者麻黃湯也治以

麻黃湯得解

太陽病頭疼發熱身疼惡風無汗而喘者麻黃湯

陽明病脈浮無汗而喘者麻黃湯

枝湯加厚朴杏仁佳

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝

杏仁

右咬咀每服五錢水一盞半生薑五片肥棗三枚劈破

同煎至八分溫服覆取微汗

表不解乾嘔發熱欬喘者小青龍去麻黃加杏仁湯

陽明病潮熱汗出不惡寒短氣腹滿而喘者大承氣湯

喘潮熱
腹滿大
小便秘
脈沉為

裏

不大便註云在裏而喘者腹滿在表而喘者腹不滿小便不利大便乍難乍易微熱喘胃不能臥者大承氣湯脈沉喘滿反發汗大便難者

裏實論見

汗後而喘

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃兩

杏仁五十

甘草二

石膏半

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取二升去查溫服一升

發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘汗後脈沉喘滿大

便難譫語者裏實論見

下後而喘

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯下後利不止脈促而喘汗者葛根黃芩黃連湯論見太陽病下之微喘者表未解故也桂枝

加厚朴杏仁湯主之

許有武臣為寇執置舟中艙板下數日得脫乘飢恣食良久解衣捫虱次日遂傷寒自汗而脈不利一醫作傷食而下之一醫作解衣中邪而汗之雜治數日漸覺昏困上喘息高予診之曰太陽下之表未解微喘者桂枝加厚朴杏仁湯此仲景之法也指令醫者急治藥一啜喘定再啜藥熱汗出至晚身涼脈已和矣醫曰某平生不曾用仲景方不知其神捷如此

診

傷寒吐下後不大便潮熱若劇則不識人循衣摸床微喘直視脈弦者生澁者死論見循衣摸床濕家下後額汗微喘大

小便利者死論見

體痛

少陰病息高者死詳見厥利

厥冷

脈浮洪汗出如油髮潤喘不休者為命絕論見

論見

脈浮洪汗出如油髮潤喘不休者為命絕論見

喘續法

陰毒 活陰證喘促者返陰丹主之四肢逆冷喘促入口便佳

飲水喘

病人小渴與水劇飲之致停飲心下滿結者喘死甚衆當以五苓散或陷胃丸主之方見渴及結解

身重

身重面垢遺尿

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上出汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之

身重眠浮多眠

身重脈浮

身重腹滿

風濕為病脈浮汗出身重多眠鼻息鼾論見風濕宜治人夢熱湯陽明病脈浮緊口苦咽燥腹滿而喘發熱汗出不惡寒身重忌汗忌燒鍼忌下論見自汗註云此証宜和解之陽明病汗出不惡寒身重短氣腹滿而喘有潮熱者宜

承氣湯論見不大便

風濕身重

風濕脈浮身重汗出惡風者宜

防已黃芪湯

防已兩一

甘草兩半

白朮七錢半

黃芪去蘆一兩一錢

右咬咀每服五錢生薑四片大棗一枚水盞半煎八分溫服良久再服服後當如虫行皮中從腰下如冰後坐被上又以一被繞腰已下溫令微汗瘥喘者加麻黃半兩胃中不和者加芍藥三分氣上衝者加桂三分下有沉寒者加細辛三分

中暑身重

中暑病發熱惡寒身重痛汗出足冷脈虛而渴者忌汗下

汗身重無傷

傷寒脈浮緩身不疼但重無少陰但欲寐吐利證者宜大青龍湯

身重心悸

下後身重心悸者不可發汗當自汗者乃解論見

身重陰中拘攣

陰陽易為病身重少氣少腹急引陰中拘攣上衝胃眼花者燒視湯論見陰

四肢重為陰

難轉側

少陰病腹痛小便不利四肢沉重痠痛下利者真武湯論

三陽合病腹滿身重難轉側汗出者白虎湯論見下後胃滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側者柴胡牡礪湯論見風濕相搏身體煩疼不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而澁者桂枝附子湯論見

遺尿

腹滿譫語者合病

三陽合病腹滿身重難轉側譫語遺尿汗出者白虎湯論見

身痒脈浮虛者

不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脈澁故知也因發不透徹而面赤燥煩短氣者不足言陽氣拂鬱若脈微惡寒面反有熱色而身痒者桂枝麻黃各半湯小

口噤背脊張者瘧赤斑者陽毒

身熱足寒面赤卒口噤背反張者瘧病陽毒面赤斑斑如錦紋咽喉痛唾膿血者宜升麻鱉甲湯方論見

面赤下利脈微為陰

少陽病下利清穀手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒面赤色者通脈四逆湯加蔥白論見下利清穀脈沉遲面少赤手足微厥者必鬱肩汗出解論見

下面赤息

陽明病面合赤色者不可攻之論見便難

壞病

太陽病三日已發其汗若吐若下若溫鍼仍不解者此為壞病桂枝不中與也觀其脈症知犯何逆隨証治之

壞病續法

虛

山治傷寒壞症獨參湯好人參一兩煎服

溼陽症大汗大下後亡陽於外亡血於內上而津脫下而液脫津液兩亡宜以羊肉湯補之矧陰症者豈可不溫補哉此與傷寒太陽症振搖與真武湯一例外之陽病至此尚溫兜內之陰候豈得不補耶

難產脫血虛者宜用羊肉湯傷寒汗下太過亡陽失血若只用救逆效必遲矣與羊肉湯為效神速病人面色雖見陽是客熱上焦中下二焦陰氣虛感若調得下焦有陽

上焦陽氣下降丹田知所歸宿矣夫氣有高下病有遠近証有中外治有輕重各適其至所為故病八九日汗下太過二脈沉細無力多踈足臥惡聽人聲皮有粟時戰如瘧宜羊肉湯主之

當歸

白芍藥各一兩

黑附子炮去皮臍四錢

龍骨燒通赤半兩

生薑二兩

牡礪燒赤一兩

桂枝七錢半

右為籠末每服一兩羊肉四兩蔥白五寸去黃心同剉爛以水五升一升今之大盞也熬至一半以來濾絞去渣分三服服之

戰慄振搖

虛成戰者身為之戰搖也慄者心戰是也戰之與慄戰外而慄內也又云戰為正與邪爭則鼓慄而戰振但虛而不至爭故心聳動而振也戰之與振振輕而戰重也

汗後振
為虛

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胃起則頭眩脈沉緊發汗則動經身為振振擻者宜

茯苓桂枝白朮甘草湯

茯苓

兩

桂枝

一兩

白朮

甘草各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去渣溫服

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身暈動

振振欲躄地者真武湯主之

方見少陰
滑下利

孫太乙官道士周德真患傷寒發汗出多驚悸目眩身戰掉欲倒地衆醫有欲發汗者有作風治者有用冷藥解者病皆不除召孫至曰太陽經病得汗早欲解不解者因太陽經欲解復作汗腎氣不足汗不來所以心悸目眩身轉遂作真武湯服之三服微汗自出遂解蓋真武湯附子白朮和其腎氣腎氣得行故汗得來也若但責太陽者惟能

乾涸血液爾仲景云尺脈不足榮氣不足不可以汗以此知腎氣怯則難得汗也明矣許學士云鄉里有一姓高者子年三十初得病身微汗脈弱惡風醫以麻黃藥與之汗遂不止發熱心多驚悸夜不得眠譫語不識人筋惕肉瞤振振動搖醫又進鎮心藥予曰強汗之過也仲景云脈微汗出惡風不可服青龍湯服之則筋惕肉瞤此為逆也惟真武湯可救進此三服佐以清心竹葉湯數日遂愈

清心
竹葉
湯未
考

下後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外俱虛故也

亡血家不可發汗發汗則寒慄而振 太陽病火熨其

背大汗出火熱入胃發譫語十餘日振慄自下利者此為

解也

論見
諸語

脈浮緊按之芤當戰而汗出解脈芤為虛是以發戰脈浮

未汗戰
振為欲

解

為在表故當汗出解也論見大法 太陽病脈陰陽俱停等必

戰慄汗出而解論見發熱 凡柴胡症下之若柴胡症不罷者

復與柴胡湯必蒸蒸而振發熱汗出而解論見往來寒熱 脈浮

而遲面熱赤而戰慄者當汗出解也反發熱者脈遲不能

作汗其身必痒也論見面赤

諸乘寒者則為厥鬱冒不仁口急不能言戰而慄也陰中

於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故邪中於陰也

筋惕肉瞤

汗出筋惕肉瞤若眩悸振振欲躄地者及服大青龍湯後

厥逆者俱宜真武湯方見戰掉及發熱 若動氣在左頭汗不止

者活人用防風白朮牡蠣次服建中湯論見重寒

汗下吐溫鍼後若膚瞤動胃煩面色青黃者難治論見痞

若經脈動惕脈微心下痞氣衝咽喉者久而成痿治見痞

平居忽戰慄者初中邪

虛

診

叉手冒心

發汗過多叉手冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯論見悸

悸見

驚悸

虛

少陽耳聾目赤胃滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚論見

傷寒八九日下之胃滿煩驚小便不利譫語一身盡重不

可轉側者宜

柴胡加龍骨牡蠣湯

半夏二合

人參

茯苓各一兩半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去渣溫服

大棗六枚

龍骨

大黃二兩半

柴胡四兩

鉛丹

牡蠣二兩半

生薑

桂枝

下後驚

火逆驚

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起臥不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之活人云醫以火劫而成人云醫以火劫而成火邪者是也

桂枝蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝去皮三兩

甘草炙二兩

生薑切三兩

牡蠣炒五兩

龍骨四兩

大棗十二枚

蜀漆洗去腥三兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

太陽傷寒者加溫鍼必驚也 風溫脈浮自汗身重多眠

若被火者微則發黃劇則如驚癇時瘕瘕論見風溫陽明病

脈浮緊口苦咽乾腹滿若加燒針必怵惕煩躁不眠論見自汗

驚悸續法

傷寒後

海茯苓丸治傷寒後或用心勞倦四肢羸弱心忪驚悸吸

吸短氣

茯苓

麥門冬去心

熟地各一兩

牡丹皮

人參

黃芪各七錢

桂枝

甘草炙

牛膝

澤瀉各半兩

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大食前溫酒

下二十九

犀角湯治傷寒後伏熱在心怔忡驚悸不得眠睡

犀角屑兩半

茵陳蒿七錢半

茯苓兩二

芍藥

生地焙二兩

麥門冬去心兩半

山柰兩半

右咬咀每服五錢水一盞半薑二片竹葉三七片同煎

食後服

麥門冬茯苓飲子治傷寒後心神恍惚不得臥

麥門冬去心

赤茯苓去皮

知母焙

芎藭

甘草炙

酸枣仁微炒

陳皮去白炒

檳榔各一兩

醫方類聚卷三十一

宜道宜
禁溫

右咬咀每服五錢水一盞半生薑五片煎溫服日三服
少陰心悸者四逆不可與也心悸者火懼水也惟腎欺心
故為心悸者是足經上手經也若與四逆湯變無形中惡
候生矣故先以甘草茯苓湯導其濕次以四逆湯溫之者
為心悸全無手經火令入足水也心悸在濕未去終至於
斃故不敢溫之溫之則壞矣

悸

汗後心

汗後心下悸若頭眩身動振振欲僻地者真武湯也論見
戰若叉手自冒心者後條桂枝甘草湯也若譫語胃不
和煩悸者活人用調胃承氣湯也論見若臍下悸者後
條茯苓桂枝甘草大棗湯也發汗過多其人叉手自冒
心下悸欲得按者宜
桂枝甘草湯

桂枝四錢

甘草二錢

右二味以水一盞半煎八分去渣溫服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚宜

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓八錢

甘草炙二錢

桂枝四錢

大棗二枚

右作二服以甘爛水二鍾先煮茯苓減二分納諸藥煮
取一盞去渣溫服日三作甘爛水法取水斗許置大盆
中以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

下後心

脈浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗
當自汗出乃解所以然者尺中脈微此裏虛須表裏實津
液自和便自汗出愈少陽病耳聾胃滿不可吐下吐下
則悸而驚者註云氣血虛往來寒熱胃脇滿心下悸而小
便不利者小柴胡去黃芩加茯苓湯方論見往
來寒熱

停飲心

太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裏急也

氣虛心

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之 傷寒脈結

代心動悸宜

炙甘草湯

甘草兩

生薑三片

人參兩

生地兩

桂枝兩

麥門冬去心各

麻仁合

阿膠兩

右以咀每服五錢水一盞半入酒半鍾煎至八分去渣

納阿膠溶盡溫服日三

霍亂吐利心悸者理中丸加茯苓

悸厥逆心

手足厥冷而悸者茯苓甘草湯手足逆而不溫悸者四逆散加桂枝

臟結與結胃痞氣大同小異

寸浮關

問曰病有結胃有臟結其狀何如答曰按之痛寸脈浮關

沉下

脈沉名曰結胃也何謂臟結答曰如結胃狀飲食如故時

寸浮關

時下利寸脈浮關脈細小沉緊名曰臟結舌上白胎滑者

飲食如

難治王胡奉云可 臟結無陽症不往來寒熱其人反靜

結故為臟

舌上滑胎者不可攻也王胡奉云可刺開 病胃中素有

痞連在臍旁引入小腹入陰筋者此名臟結死

病發於

病發於陽而反下之熱入因作結胃病發於陰而反下之

陽下之

因作痞所以成結胃者以下之太早故也 傷寒五六日

病發於

嘔而發熱者柴胡湯症具而以他藥下之柴胡症仍在者

成痞氣

復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗

出而解若心滿而硬痛者此為結胃也大陷胃湯主之但

滿而不痛者此為痞柴胡不中與之與半夏瀉心湯

結胃

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所發潮熱從心下至少腹而痛不可近者大陷胃湯主之

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所發潮熱從心下至少腹而痛不可近者大陷胃湯主之。太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞅則為結胃大陷胃湯主之若不結胃但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃也。丹溪云此症曰胃中空曰短氣躁煩曰脈浮大陷胃湯不可輕用傷寒六七日結胃熱實脈沉而緊心下痛按之實鞅者大陷胃湯主之。雲岐云三症脈沉而實皆曰陷胃熱大陷胃湯

大黃

一兩半去皮為末錦紋者佳

芒硝

一兩八錢 甘遂 一字赤連珠者

為細末

右水二盞煮大黃至八分去渣下硝一沸下甘遂末溫

服得快利止後服

小結胃病正在心下按之則痛脈浮滑者宜

小陷胃湯

小結胃按之則痛

半夏

湯洗二兩

黃連

一兩

瓜蒌

一枚用四分之一

右咬咀水二盞先煎瓜蒌至一盞半後用半夏黃連煎取八分去渣溫服未和再服微解下黃連便安也

孫工部郎中鄭忠厚因患傷寒胃腹滿面黃如金色諸翰林醫官商議畧不定推讓曰胃滿可下恐脈浮虛召孫至曰諸公雖疑不用下藥鄭之福也下之必死某有一二服藥服之必瘥遂下小陷胃湯尋利其病遂良愈明日面色改白京城人稱服

熱實結胃潮熱水結胃頭汗無大熱

寒實結胸無熱

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯

但結胃無大熱者此為水結在胸脇也但頭微汗出者大

陷胃湯主之活人云水結胃小半夏加茯苓湯小柴胡去牡蠣湯亦主之

病在陽應以汗解之反以冷水噴之若灌之其熱被却不

得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散

若不瘥者與五苓散寒實結胃無熱證者與三物小陷胃

湯此三物白散亦可

桔梗三分 巴豆一分去皮尖 貝母三分

右三味為末納巴豆更於臼中杵之以白飲和服強人

半錢羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱

粥一碗利過不止進冷粥一碗汗出已腹中痛與芍藥

一兩

右熱實結胃及寒實結胃活人不拘寒熱但用陷胃湯

不瘥用枳實理中丸應手而愈

結胃項亦強如柔痙狀下之則和宜

大陷胃丸

大黃二兩 葶藶 芒硝 杏仁去皮炒各三分

右搗羅二味納杏仁芒硝合研如脂相和為丸如彈大

後用甘遂末一字白蜜少許水二盞半煎至一盞頓服

一宿乃下如不下再服 王海藏云大陷胃湯太陽入

本藥也大陷胃丸陽明藥也小陷胃湯少陽藥也大陷

胃治熱實大陷胃丸無喘小陷胃治痞

心下滿痛如結胃狀若頭下強痛眩暈者刺大椎肝膈若

汗下後頭項強痛發熱小便不利者桂枝去桂加茯苓白

朮湯方論並見項強

若婦人經水來熱除譫語者刺期門論見譫語

熱入血室

結胃項強

診

太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脈微弱者此本有寒也反下之若利止必作結胃未止者四日復下之此作協熱利也四日復下之五字衍文也太陽病下之脈浮者必結胃也論見太陽少陽併病而反下之成結胃心下硬下利不止水漿不下其人心煩 結胃症悉具煩躁者亦死

結胃續法

候下未成結胃者急用理中解之若誤下了初未成結胃者急煩與理中湯自然解了更不作結胃蓋理中湯治中焦故也此古人亦說不到後因人消息得之若大段轉損有厥症者兼與四逆湯便安胃中雖和傷寒未退者宜候日數足可下却以承氣再下之蓋前來下之未是故也

服陷胃不效者以枳實理中治西晉崔行功云傷寒結胃欲絕心膈高起手不得近用大陷胃湯皆不瘥者此是下後虛逆氣已不理而毒復上攻

大小結

氣毒相搏結於胃者當用枳實理中丸先理其氣次療諸疾古今用之如神應手而愈

枳實理中丸治傷寒結胃欲絕心膈高起手不得近

枳實十六片 茯苓 人參 白朮

乾薑炮 甘草炮已上各二兩

右為末煉蜜丸如雞子黃大每服一九熱湯化下連進二三服胸中豁然渴者加瓜蒌根一兩自汗者加牡蠣二兩煨過下利亦加

增損理中丸王朝奉云大小陷胃湯丸不愈者宜與之

人參 白朮 瓜蒌 牡蠣

甘草炙各二兩 乾薑炒白半兩 枳實炒二十箇 黃芩去枯

右為細末煉蜜為丸如彈子大湯一盞煎服不效復與之不過五六丸胃中豁然矣用藥神速未嘗見也渴者

以半夏
結苓治水

加瓜蒌根有汗加牡蠣

活水結在胃脇間亦名結胃其證頭微汗出但結胃無熱者小半夏加茯苓湯小柴胡去棗加牡蠣主之

按俞伯道忽患微熱心下滿頭有汗不能解眾醫以為溫病用表藥有謂食在膈者治之皆不愈召孫至曰用半夏茯苓湯遂瘥眾問其故曰頭有汗心下滿非濕症乃水結胃脇也水既去其病乃愈且如濕氣心下滿自當遍身汗若有食心滿頭豈得有汗若言是表身又不疼不惡寒表証何在故凡水結胃脇頭必有汗耳

小半夏加茯苓湯勸見

氣塞不通宜穿結

穿結散大實大滿心胸高起氣塞不通者為結也

蟾酥

麝香

輕粉

巴豆另研少許

右再研過至細以乳汁為丸如黍米大每服二丸用薑

湯下不時服

血結胃宜海蛤

本婦人傷寒血結胃膈揉而痛不可撫近宜

海蛤散

海蛤

滑石

甘草

各一兩

芒硝兩半

右末每服二錢雞子清調下

針灸

治結胃灸法

巴豆十四箇

黃連

七寸去皮用

右搗細津唾和成膏填入臍中以艾灸其上腹中有聲其病去矣不拘壯數病去為度纒灸了便以溫湯浸手帕拭之恐生瘡也

傷寒結胃 先使人心敞骨下正痛處左畔揉之以毫
針刺左畔支溝穴正坐側臂取之二分次刺左間使名曰雙關刺次
左行間臥取之針入六分此支溝行間穴下針至分數內
吸訖長呼一口氣出針即左畔一壁結胃立效右畔
依上刺之慢慢呼吸停針用針獲時而愈無有不效

傷寒結胃痞氣 胸中結痞湧泉 太溪 中衝 太陵

心中結痞隱白 太白 少衝 神門

胃中結痞少商 太淵 大敦 太衝并上下中腕瀉之

通玄 結胃身黃 湧泉

抽 血結胃面赤大燥口乾消渴胃中疼痛不可忍

期門 太陵 關元妊娠不得刺關元胎死不出子母俱亡慎之

集 傷寒胸膈痛 期門 太陵

活 近世治結胃多用金針并用硫黃陽起石者若寒實結

胃或有瘥者若熱實結胸必死也

痞

心下痞 濡關脈 浮者大云結胃與痞關脈須沉若關脈浮者大黃黃連瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

大黃 黃連各二兩 黃芩一兩

右咬咀以麻沸湯二升漬之一時良久絞去渣分溫再

服

心下痞而復惡寒汗出者宜

附子瀉心湯

大黃 黃連 黃芩各一兩 附子一枚炮

破別煮取汁

右咬咀百沸湯一大盞熱漬之一時久絞去渣納附子

惡寒汗出加附子

汁分溫再服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞

當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃

連瀉心湯活人云表症未解心下妨悶者非痞也謂之支結柴胡桂枝湯主之曾陽滿微結小柴胡加乾

薑牡蠣湯主之

傷寒嘔而發熱者柴胡湯症具而以他藥下之若心下滿

而不痛者此為痞宜半夏瀉心湯論見結胃痞同異

半夏瀉心湯

半夏湯洗七次一兩黃芩六分人參二兩甘草各一兩半

黃連半兩大棗六枚乾薑一兩

右咬咀每服五錢每一盞半煎至八分去渣溫服半夏

瀉心湯若加甘草即後條甘草瀉心湯治痞嘔噦吐利

也若加生薑即後條生薑瀉心湯治痞嘔噦氣下利也

利下後者加甘草

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也宜

甘草瀉心湯

甘草炙二兩黃芩二兩乾薑各一兩半半夏一兩

大棗六枚黃連半兩人參一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去渣溫服活人云伊尹湯液論甘草瀉心七味舊本無人參

傷寒發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而下利者大柴胡湯

主之

心下痞硬嘔逆下利若表解身涼脇痛十棗湯主之方論並見

痞硬未下

利痞硬下

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有

水氣腹中雷鳴下利者宜

生薑瀉心湯

生薑二兩

黃芩

甘草 炙

乾薑 兩

半夏 兩

黃連 兩

大棗 六箇

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去渣溫服

太湯病外症未除而數下之遂協熱而利利下不止心下

痞鞭表裏不解者宜

桂枝人參湯

桂枝 另

甘草 炙 各一兩

白朮

乾薑 各一兩

半夏 各一兩

白朮

人參

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞納桂更煮取七分

去渣溫服日再服夜一服

汗下解後心下痞硬者旋覆

傷寒發汗若吐若下解後心下痞噎噫氣不除者旋覆代

赭石湯主之

活人云有旋覆代赭石湯証其人或欬逆氣虛者先服四逆湯胃虛者先服理中丸次服

旋覆代赭石湯

旋覆花 兩

人參 半兩

生薑 一兩

代赭石 三錢

甘草 炙

半夏 八錢

大棗 六箇

右咬咀每服五錢水一盞煎至八分去渣溫服 病解

後心下痞鞭噫氣若不下利者此條旋覆代赭石湯也

若下利者前條生薑瀉心湯也

胃中痞硬氣上衝咽不得息者瓜蒂散若心下痞鞭脇痛

氣上衝咽眩暈者成痙

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口煩燥

小便不利者五苓散主之

論並見

五

心下支結似痞表未解心下滿似痞手足冷

發熱惡寒身痛表症未解若心下支結妨悶者柴胡桂枝湯也方見發熱若心下痞而腹滿者即前條先以桂枝湯解後用大黃黃連瀉心也

心下滿似痞而手足厥冷若脈乍結乍解心煩飢不欲食者瓜蒂散若脈沉細頭汗惡寒大便鞭者小柴胡湯論見厥

大陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽並竭無陽則陰獨復加燒針因胃煩面色青黃膚腫者難治令色微黃手足溫易愈

脈浮而緊而反下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

脈浮而大心下反鞭有執屬藏者攻之不令發汗屬腑者不令溲數溲數則大便鞭汗多則熱愈甚汗少則便難若

脈遲尚未可攻 陽明痞胃實心下硬滿者不可攻之論見胃

痞續法

虛滯

活傷寒本無痞應發汗醫反下之遂成痞枳實理中丸最良審知是痞先用桔梗枳殼湯尤妙綠桔梗枳殼行氣先用之無不驗也

桔梗枳殼湯治傷寒痞氣胸滿欲絕

桔梗

枳殼麩炒去穰各二兩

右咬咀以水二盞煎至一盞去渣分二服

煩

汗吐下後懊憹虛煩

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹者梔子豉湯主之 若少氣者梔子甘草豉湯主之 若嘔者梔子生薑豉湯主之 陽明病下之其外有執手足溫不結胃心下懊憹飢不能食但頭汗出者梔子豉湯主之 陽明病脈浮緊若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊

懷舌上白胎者宜梔子豉湯論見下利後煩按之心下濡者為虛煩也宜梔

梔子豉湯

肥梔子四箇香豉兩半

右水二盞先煎梔子一盞納豉同煎取七分去渣溫服得快吐止後服

梔子甘草豉湯於梔子豉湯中加甘草半兩餘依前法得

吐止服梔子生薑豉湯於梔子豉湯中加生薑一兩二

錢餘依前法得吐止後服

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主之

梔子四兩乾薑兩半

右二味以水一盞半煎取八分去渣溫服得吐者止後

服

發汗吐下後心中懊懣而煩若無燥屎大便爽者此條梔

子豉等湯也若有燥屎不大便者後條小承氣湯也

太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭者與小

承氣湯和之愈

胃實而煩

陽明病下之心下懊懣而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿

初頭鞭後必澹不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯方見

熱胃實不大便心煩若吐下後者此條大小承氣湯也

若不吐不下者調胃承氣也

許有人病傷寒八九日身熱無汗時時譫語時因下後大

便不通三日矣非躁非煩非寒非痛終夜不得臥但心中

無曉會處或時發一聲如歎息之狀醫者未知是何症予

診之曰此懊懣怫鬱二症俱作也胃中有燥屎者服承氣

湯下燥屎二十枚得利而解仲景云陽明病下之心中懊
懷微煩胃中有燥屎者可攻又云小便不利大便乍難乍
易時有微熱怫鬱不臥者有燥屎也承氣湯主之素問云
胃不和則臥不安此夜所以不得眠也仲景云胃中燥大
便堅者必譫語此所以有時發譫語也非煩非躁非寒非
痛所以心中懊懷也聲如歎息而發一聲所謂外氣怫鬱
也燥屎得除大便通利胃中安和故其病悉去也

不得眠而煩論見不得眠

胃滿而煩

胃滿而煩若不經汗兼往來寒熱者小柴胡湯方論見往來寒熱

兼下利咽痛者猪膚湯方論見下利若汗下後往來寒熱者

柴胡桂枝薑湯方論見往來寒熱兼身重不可轉側者柴胡龍

胃中空而煩

骨牡礪湯方論見驚發汗若下之而煩熱胃中空者梔子豉湯主之

心下滿而煩

心下鞭滿而煩若滿而不痛腹中雷鳴下利者甘草瀉心

湯 脇痛氣衝咽胃眩者成痿方論見痿若滿痛下利不止

水漿不下者併病方論見痞傷寒下後心煩腹滿臥起不安者宜

心煩腹滿臥起不安

梔子厚朴湯 梔子去殼 厚朴薑製 枳實切一

已上三味用水一盞半煎取八分去渣溫服得吐者止

後服

腹滿而煩

腹滿而煩若有燥屎者前條大承氣湯也若大便澹胃痛

欲吐先此時極吐下者調胃承氣湯也論見

吐後火後煩

太陽病吐之但太陽當惡寒今反不惡寒不欲近衣此為

吐之內煩也脈之微數不可灸灸則煩逆論見大法嘔時鬱鬱微煩若與小柴胡湯嘔不止者大柴胡湯也若

脈浮數而煩

極吐下後胃滿便溏腹痛者調胃承氣湯也
病欲解者必當先煩乃有汗而解論見大法 太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈 傷寒發熱汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗宜桂枝湯主之

脈平後煩者損

病人脈已解而日暮微煩以病新瘥人強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微熱煩損穀則愈 吐利汗後脈平小煩者以胃虛不勝穀氣也論見吐利

先煩後悸為熱

心悸而煩若少陽汗後譫語胃不和煩悸者活人用調胃承氣湯論見口苦
若二三日心中悸而煩者宜小建中湯論見悸 心煩而渴

下利厥逆而煩

湯論見欲寐 若與白通湯後下利不止厥逆無脈乾嘔者白通湯加猪膽汁論見
若惡寒身倦時煩欲去衣者可治也論見但欲寐
手足厥冷而煩若脈乍結乍解及心中滿飢不能食者宜瓜蒂散吐之

診

若脈緊至七八日自利脈緊變暴微手足反溫者欲解也論見方論並見下利 若下利無脈乾嘔者白通湯加猪膽汁也論見下利

煩躁有汗表症宜

煩躁有表証發熱惡寒體痛脈浮緊者大青龍湯也方論見條
若發汗不徹太陽証不罷其人面赤躁煩短氣者更發汗則愈論見短氣

煩躁無
表証宜
下宜溫

得病二三日脈弱無太陽柴胡症煩躁心下鞭至四五日
雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承
氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭
鞭後必溏未定成鞭攻之必溏須小便利屎定鞭乃可攻
之宜大承氣湯王註云無太陽証為無表証也煩躁不
大便續臍痛發作有時者有燥屎也下之後復發汗日
夜煩躁不得安眠時安靜不嘔則渴無表証脈沉微身無
大熱者宜

乾薑附子湯

乾薑兩 附子一枚
生用

右二味以水三升煮取一升去查頓服

海服薑附湯有二法一法當熱服手少陰心也水包火熱
服以接心火身表寒盛外火少也寒從外生熱從內消

如凍死寒在外也一法當寒服足少陰腎也寒邪入水冷
服以類腎水身表微熱內水多也熱從外生寒從內消譬
如飲冷寒在內也

發汗若下之病仍不解煩躁者宜

茯苓四逆湯

茯苓兩 人參六錢 附子一枚生用去皮臍
作八片只用二片

甘草二錢 乾薑各二錢

右剉如麻豆大作一服水一盞半煎至八分去查溫服

煩躁心
下鞭

煩躁心下鞭若未曾下者即前條無太陽柴胡症以小承
氣少少微和之也若已曾下心下鞭痛短氣躁煩者大隔
胃也若結胃証悉具煩躁者死也方論見

火逆煩
躁

火逆下之因燒鍼煩躁者宜

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝去皮

甘草炙

牡蠣煑

龍骨各一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

太陽病以火熏之不得汗其人必躁如不解必清血名為火邪

太陽病火熨其背大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發譫語十餘日振慄下利者欲解也論見

煩躁厥逆若吐利者吳茱萸湯也論見

若不煩而躁四逆脈不至死也論見不得臥者死也論見

利下

成所謂煩躁者謂先煩漸至躁也所謂躁煩者謂先發躁而迤遲復煩者也從煩至躁為熱未有不漸煩而躁者也先躁後煩謂怫怫然更作燥悶此為陰盛隔陽也雖大躁

欲於泥水中臥但飲水不得入口是也此氣欲脫而爭

如燈將滅而暴明也蓋內熱曰煩謂心中鬱煩也外熱曰躁謂氣外熱躁也內熱為有根之火故但煩不躁及先煩

後躁者皆可治外熱為無根之火故但躁不煩及先躁後

煩者皆不可治也 臟厥既厥煩躁方論躁無暫定而

厥者為臟厥靜而復煩吐重而厥者為蛇厥烏梅丸主之

方論熱少厥微不欲食煩躁數日小便白者熱除也若

欲食者愈若厥而嘔胃腸煩滿者便血論見少陰病但

欲寐不煩至五六日變自利煩躁不得臥者死論見

煩躁續法

煩躁不飲水為陰盛隔陽

活病人身冷脈沉細疾煩躁而不飲水者陰盛隔陽也宜服霹靂散須臾躁止得睡汗出即瘥火熾散丹砂丸並主之丹砂丸方見活人書

霹靂散治陰盛陽煩燥不飲水

附子

一枚炮熟取出用冷灰搗細研入真蠟茶二錢和勻

右為細末分作二服水二盞煎至六分臨熟入蜜半匙放溫或冷服之須臾躁止得睡汗出即瘥

海已寒丸此丸不階上陽生於下治陰症服四逆輩胃中發躁而渴者或數日大便秘小便澁亦服此丸上不躁大小便自利

肉桂

茯苓各五錢

良薑

烏頭炮各七錢

附子炮

乾薑炮

芍藥

茴香炒各一兩

右等分為細末糊為丸如桐子大溫酒下空心服五七十九八九十九亦得酒醋為糊俱可

李破陰丹治陰中伏陽煩躁六脈沉伏

方論見陰毒

頃年鄉人李信道得疾六脈沉伏不見深按至骨則若有

煩躁六脈沉伏

陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小便利者可治 關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死 濕家關節疼痛下之額上汗出微喘小便利者死 下利不止者亦死 濕家頭汗出欲被覆向火者若下之早則噦胃滿小便不利舌上白胎也

論見身痛

頭汗續法

孫凡水結胃脇間頭必有汗治以半夏茯苓湯

活病人表實裏虛玄府不開則陽氣上出汗見於頭凡頭汗出者五臟乾枯胞中空虛津液少也慎不可下下之謂之重虛

成頭者諸陽之會邪搏諸陽津液上湊則汗見於頭也 海頭汗出劑頸而還血証也額上偏多者屬心部為血証

也獨益中州脾土以血藥治之其法無以加矣

舌白胎

半表半裏

舌上白胎若陽明胃實脇下滿不大便而嘔者小柴胡湯

論見胃實

若下後心中懊懣者梔子豉湯

方論 若下後噦

而胃滿小便不利者丹田有熱胸中有寒也

論見牙疼

診忌

脈陰陽俱緊者口中氣出唇口乾燥倦臥足冷鼻中涕出

舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人微發熱手足溫者

此為欲解或到八日已上反大熱者此為難治設使惡寒

者必欲嘔也腹內痛者必欲利也

海藏云惡寒必欲嘔者必欲利也 臟結如結胃狀飲食如故時時下利寸脈浮關脈小

細沉緊舌上白胎滑者難治也若無陽症不往來寒熱其人反靜者不可攻也

論見臟結

舌胎續法

火氣劫也 若四逆者用四逆散加五味子乾薑也

欲寐

傷寒欬逆上氣其脈散者死謂其形損故也 欬而矢小便者不可發汗汗出則四肢厥冷

論見遺尿

欬續法

丹崇慶和尚因飽醉後發熱嗽而右脇痛渴不安眠

柴胡

黃芩

白朮

陳皮

桔梗

木通各二錢

人參

麻黃各一錢半

甘草

右分三貼水煎服

雲傷寒汗後喘咳不止恐傳肺痿補肺散

人參兩

五味子錢

桑白皮兩

款冬花

蛤蚧對

右為細末每服五錢沸湯一盞調服

肺虛氣之宜補

內傷外感補而散之

診

傷寒汗下後咳嗽肺虛聲音嘶敗者宜

阿膠散

薯蕷

阿膠炒

五味子

麥門冬

白朮

各一兩

乾薑

炮

桂枝

各二錢

杏仁

去皮尖

右剉細末每服七錢水二盞入烏梅肉一錢同煎服

傷寒汗下後喘咳煩躁氣滯澁邪氣逆者用

桔梗湯

桔梗

桑白皮

各一兩

甘草

貝母

訶黎勒

各五錢

右為細末每服五錢入五味子烏梅肉各一錢水二盞

同煎服

小便不利

小便不利表不利

小便不利表不解若乾嘔發熱而欬少腹滿者小

解

去麻黃加茯苓也

方論見欬

若汗下後仍項強發熱心下滿

痛者桂枝去桂加茯苓白朮

方論見項強

小便不利脅滿若往來寒熱未汗下者小柴胡去黃芩

加茯苓汗下後者加柴胡桂薑

方論見往來寒熱

若煩驚譫語

身重不可轉側者柴胡湯加龍骨牡蠣也

論見不得臥

小便不利大便乍難乍易喘急不能臥者大承氣湯

論見不得

小便不利大便難

小便不利而渴若脈浮數發熱者五苓散加猪苓湯

方論見渴

若頭汗者柴胡桂薑湯加茵陳蒿湯

方論見發黃

小便不利關節疼痛若痛不得屈伸汗出惡風身腫者屬

風濕宜甘草附子湯若脈沉緩大便反快者屬濕痺活人

用五苓散也

方論見身痛

小便不利頭汗若脇滿者柴胡薑桂也

方論見往來寒熱

小便不利頭汗脇滿

醫方類聚卷之三

宋

小便不利身黃下後無他症勿治但欲寐者陰症

若發黃者茵陳蒿湯也 小便不利身發黃方論俱見發黃 大下後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈活人云若大渴引飲瀉利之

小便不利但欲寐者屬少陰若腹滿下利膿血者用桃花湯 腹痛下利四肢重痛者用真武湯也方論見下利 若四逆者用四逆散加茯苓但欲寐方論見

陽明病小便不利濇然汗出者若欲食者愈不能食者欲作痼瘕痼瘕者寒氣積結也

小便不利續法

活陰症小便不利手足厥冷脈微細者不宜服利小便冷

滑藥但服返陰丹并取臍下石門穴灸之方論見陰毒返陰丹

集傷寒小便不通取陰谷 陰陵泉

傷寒後小便不利見小便不通門

小便難

汗後小便難

汗後小便難若太陽發汗遂漏不止者則惡風小便難四

肢難屈伸宜桂枝附子湯也方論自汗 若太陽症中風以火

劫發汗則邪風被火熱血氣流溢身黃陽盛陰虛欲衄小

便難也方論見頭汗 若少陰以火劫汗者則欬而不利譫語

小便難也論見脇痛

下後小便難

下後小便難有二若脈遲浮弱惡風寒下之者則脇滿身

黃項強小便難也見脇痛 若陽明胃實發熱惡寒脈浮緊

下之者則腹滿小便難也論見胃實

脇痛身黃小便難若陽明胃實未下者宜小柴胡湯若下

後不食項強者忌柴胡論見脇痛

尸厥鬱冒

少陰脈不至尸

少陰脈不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胃膈榮氣反

脇痛身黃小便難

厥

聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此為尸厥當刺期門

太陽汗下後鬱

太陽病下之不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因至胃家汗出自愈所以然者汗出表和故也得裏和然後復

下之

得裏和三字中間必有衍文脫簡得字當字若字之誤裏和當是裏未和蓋脫一未字也

下利清穀脈沉遲其人面赤身有微熱者必鬱胃汗出解

下利清穀鬱胃

論見

喘秘鬱

小便不利大便乍難乍易喘胃不能臥者大承氣湯論見下利

胃乘寒鬱

諸乘寒者則為厥鬱胃不仁口急不能言戰慄也論見大法

心下硬眩胃

眩胃心下鞭若不汗下吐而項強者為併病宜刺大椎肺

論見

若汗下吐後脈微氣上衝咽者成痿論見氣少陰病但

欲寐下利止而眩胃者死論見欲寐

尸厥鬱胃續法

熱

海傷寒傳至五六日間漸變神昏不語或睡中獨語一二

旬目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則咽不與則不思六

脈細數而不洪大心下無痞腹中不滿大小便如常或傳

至十日已來形貌如醉醫見神昏不已多用大承氣湯下

之則誤矣蓋不知此熱傳手少陰心經也然又未知自何

經而來答曰本太陽經傷風風為陽邪傷衛陰血自燥熱

畜膀胱壬病逆傳於丙丙丁兄妹由是傳心心火自上迫

熏肺所以神昏也蓋肺為清肅之臟內有火邪故令神昏

宜梔子黃芩黃連湯若脈在丙者導赤散脈在丁者瀉心

湯若誤用涼膈散此乃氣中之血藥也如右手寸脈沉滑

有力者則可用之或用犀角地黃湯近於是已本方所說

若無犀角以升麻代之是陽明經藥也此解陽明經血中

熱藥若脈浮沉俱有力者是丙丁俱有熱可以導赤散瀉心湯各半服之則宜矣此症膀胱傳丙足傳手經者下傳上也丙傳丁者表傳裏也壬傳丁者良之離也越經傳者又為腑傳臟也活人云傷寒只傳足經不傳手經者此言不盡意也有從足經而傳手經者何以知之經云傷寒或止傳一經或間傳三經不可一途取之但視其脈與外證治之此活法也與食則咽者邪不在胃也不與則不思者以其神昏故也邪熱既不在裏誤用承氣下之其死也必矣脈在丙者脈浮也脈在丁者脈沉也脈丙丁俱有熱者浮沉俱有力也

噫

噫而心下痞硬不利者旋覆代赭湯若下利者生薑瀉心湯也方論見痞

噫續法

濕痰

水火相傳噫氣

雲傷寒噫氣者何氣使然答曰胃中氣不交故也少陰經至胃中交於厥陰水火相傳而有聲故噫氣也宜

如聖加枳實湯

甘草

桔梗各五錢

枳實炒三錢

右剉細每服五錢入五味子半錢水煎服

傷寒汗下後喘而噫氣者宜如聖加人參藿香杏仁湯各分

右剉細每服五錢水煎服

噦

傷寒大吐大下後極虛復極汗出者以其人外氣怫鬱復

與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

胃中虛冷不能食者飲水則噦與小承氣湯入腹中不轉

矢氣者不可攻之攻之必脹滿不食與水則噦論見

本渴而飲水嘔者噦食穀者噦論見陽明病胃實不能

飲水而噦

汗下吐後噦

汗下後喘而噦氣

食者攻其熱必噦論實見 濕家頭汗出背強惡寒欲覆被
向火者下之早則噦論見 太陽病以火劫發汗血氣流溢身黃欲衄頭汗腹滿譫語
甚者至噦捻衣摸床小便利者可治論見 傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈

利 噦滿下 陽明胃實脈弱浮大短氣腹滿脇痛嗜臥身黃小便難有
潮熱時時噦脈浮者小柴胡若不尿腹滿加噦者不治論
實 噦續法

治寒熱 活噦胃寒所生橘皮乾薑湯羌活附子散半夏生薑湯退
陰散主之若服藥不瘥者灸乳直下一指許三壯若婦人
則屈乳頭下盡處是穴亦有陽症者小柴胡湯橘皮竹茹
湯方見雜

橘皮乾薑湯

橘皮

通草

乾薑

桂心

甘草各三兩

人參二兩

右改阻每服四錢水一盞煎至六分去渣溫服日三

羌活附子散方見雜

半夏生薑湯治噦欲死

半夏一兩

生薑二兩切

右水二盞煎至八分去渣溫服

下 胃熱失

海傷寒欬逆脈散死 仲景之言不虛偽 大抵原因失

下生 欬逆喉中陰不內 便軟惟宜用瀉心 便硬尤

宜大承氣 二藥神工作者誰 東垣潔古為良劑

潔欬逆者火熱奔急上行而肺陰不內何其當哉故便秘

者宜大承氣下之便軟者瀉心湯主之

海少陰欬逆者此失下也陰消將盡陽逆上行使陰不內

也然陰既盡陽亦將盡也吸入腎與肝陽逆上行陰入不
 內故為陽極脈微將盡者不宜下宜服瀉心湯養陰退陽
 而已如不用瀉心湯涼膈散去硝黃清肺散亦可若脈左
 浮右沉實非表也裏極則反出於表也何以然欬逆舌強
 右脈實者知少陰裏也飲水過多心下痞而渴逆者五苓
 散主之別無惡候是也惡候生或兼以舌攣語言不正而
 反昏冒與咽痛者少陰也速下之宜大承氣湯也何以脈
 浮為表浮之實大沉之損小是為表也浮之實大沉之亦
 然即非表也邪入已深矣內熱當沉反浮陽極復之表也
 陰症者內已伏陰陰氣太甚腎水擅權肝氣不生胃火已
 病丁火又消所以遊行相火寒邪迫而萃集於胃中亦欲
 盡也故令人發熱大渴引飲欲去蓋覆病人獨覺熱他人
 按執之身體肌肉骨髓血脈俱寒此火即無根之火也故

身寒大渴不欲陰近衣為

裏寒
 用丁香乾薑之類執藥溫胃其火自下
 勾氣散

川烏頭大者三箇炮裂去皮臍

右為細末每服三錢用黑豆二十一粒砂糖同泡湯調
 乘熱細細飲之

本治陰毒吃逆方

川烏頭 乾薑 附子巴上炮 肉桂

芍藥 半夏 炙甘草 吳茱萸

陳皮 大黃各等分

右為細末每服一錢水一盞生薑三五片煎至七分去
 查溫服

肉苳菴湯治傷寒汗後吃逆噫氣

肉苳菴筒 一石蓮肉炒 茴香各一兩 人參

肉苳菴筒

石蓮肉炒

茴香各一兩

人參

丁香各半 枇杷葉五片拭去毛炙
右剉細用水四盞生薑十片煎二盞去渣空心溫服分二服

表寒 良薑湯

橘皮

良薑

桂枝

當歸各一兩

麻黃兩半

杏仁二十箇

甘草兩半

檳榔三箇別為末

右咬咀用水四盞薑十片棗三枚同煎至二盞去渣下檳榔末再煎三沸通口服一盞未已再服雁老云傷寒吃逆不止是陰陽氣升降欲作汗升之不下故胃氣上逆為吃逆無休止宜服此方

無汗

無汗發熱惡寒身重身痛六湯

太陽發熱惡風寒體痛脈浮緊無汗其人若喘者麻黃湯也若煩躁者大青龍湯也 若項背強者葛根湯也 方論見

熱

若小便少氣衝冒口禁者為剛症亦葛根湯也 論見

若自汗者必自愈 論見

無汗不大便屬陽明

陽明病胃家實法當多汗若反無汗者有四證脈浮而喘者邪尚在表宜麻黃汗之身如虫行痒者久虛宜建中之類小便利而厥者寒邪宜溫之小便不利發黃者瘀熱宜茵陳利之也 論見

無汗身痒為虛

無汗身痒其人若脈微惡寒面反有熱色者桂枝麻黃各半湯也 方論見 若脈浮遲面赤戰惕發熱者遲為無陽

不能作汗也 論見 若陽明胃實身如虫行者久虛也 論見

胃實

無汗小便不利心下滿

無汗小便不利其人若身黃頭汗渴飲水漿或悞懷者宜茵陳湯 方論見 若身黃脇痛鼻乾嗜臥有潮熱脈浮者柴胡湯 方論見 若項強發熱心下滿痛桂枝去桂加茯苓

苓白朮也方論見

無汗禁忌若浮身痛者忌桂枝論見脈浮發熱表不

解者忌白虎論見若少陰欲寐但厥者忌強發汗必動

其血也論見凡發汗如服一劑病症尤在當再作本湯

與之至有不肯汗出者服三劑乃解若汗不出者死病也

論見

無汗續法

摘傷寒在表發熱惡寒頭項痛腰脊強無汗尺寸脈俱浮

合谷五分候遍身汗出即復溜瀉

雲又法 手陽明商丘 合谷 手太陽腕骨 陽谷

足少陽俠谿 足陽明厲兌 手厥陰勞宮 皆隨經辨

脈刺之 又十二經榮皆可刺

摘傷寒發汗不出 風池 俠溪 魚際散脈中二

渠二分 內庭應特

瘧狀

太陽病如瘧狀一日二三度發其人若脈微緩不嘔清便

者欲愈也若脈微惡寒面有熱色身痒者桂枝麻黃各半

也方論見服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前

法若形如瘧日再發者汗出必解宜

桂枝二麻黃一湯

桂枝八錢 芍藥五錢 麻黃三錢 大棗二

生薑五錢 杏仁八枚 甘草半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

病人煩熱汗出解又如瘧狀日晡所發者屬陽明也脈實

者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂

枝湯 婦人寒熱經水適斷者為熱入血室其血必結故

日晡發者宜下和宜汗宜

日二三發者宜桂麻各半湯

使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之論見婦人傷寒

頭汗

小便不利頭汗

頭汗小便不利其人若胸脇滿往來寒熱者柴胡桂薑也方論見往來寒熱

胃實頭汗

陽明胃實頭汗其人若下血譫語者為熱入血室宜刺期門論見譫語

宜梔子豉湯方論見煩若被火額上汗出小便不利者必發

黃也方見胃實

下滿

頭汗心下滿其人若脈沉細微惡寒手足冷口不欲食大便鞭者小柴胡湯論見厥往來寒熱

若水結胃無大熱者大陷胃湯孫兆改用半夏茯苓湯

診

太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛則小便難

舌白胎邪淺黃深黑者邪

成舌者心之官法應南方火本紅而澤傷寒三四日已後舌上有膜白滑如胎甚者或燥澁黃黑是數者熱氣淺深

之故也邪氣在表者舌上即無胎及邪氣傳裏津液結搏則舌上生胎矣寒邪初傳未全成熟或在半表或在半裏

或邪氣密於胃中者皆舌上白胎而滑也經曰舌上如胎

者以丹田有熱胃上有寒邪初傳入裏也陽明病脇下硬

滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯是邪在半表

半裏也太陽病若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊懣

舌上胎者梔子豉湯主之是邪客於胃中也若病在臟宜

若可下如舌上滑胎者則不可攻是邪未全成熟猶帶表

寒故也

澁者白

及其邪傳為熱則其舌上之胎不滑而澁也經曰傷寒七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥

而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之是熱耗津液而滑者已乾也

若熱聚於胃則為之舌黃是熱已深矣金匱要畧曰舌黃未下者下之黃自去

若舌上黑色者又為熱之極也鍼經曰熱病口乾舌黑者死以心為君主之官開竅於舌黑為腎色見於心部心部

者火也腎者水也水之邪熱已極鬼賊相刑故知必死也垣下後病嗽加五味子麥門冬如舌上有滑胎者是胃中

有寒勿用之胃有微寒加辛熱之劑立效舌燥澁如楊梅刺者用生薑切厚片蘸蜜於舌上搯之其刺立消神效

無薄苛蜜治舌上白胎乾澁語話不真先以生薑厚片蘸蜜水搯洗有用薄苛自然汁與白蜜等分調勻傳之良

動氣

禁忌

成動氣者為築築然動跳於腹者是也動氣在右不可

發汗發汗則衄而渴心苦煩飲即吐水活人云先服五苓散三服次服竹葉動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤

活人云先服防風白朮湯動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端活人云宜服李根湯方見氣上衝動氣在下不可

發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼目暈惡寒食則反吐穀不能進活人云先服大橘皮湯動氣在右不可下

下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸也動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖身有熱臥則

欲蹠動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自泄欲得水自灌動氣在下不可下下之則腹脹滿

卒起頭眩食則下清穀心下痞也

動氣續法

醫學綱目卷三十一

三十一

傷寒汗下後臍左有動氣者宜

防葵散

防葵兩一

木香不見

柴胡

黃芩各半

右剉為細末每服五錢水煎服

傷寒汗下後臍上有動氣者宜

枳殼散

枳殼錢五

赤茯苓

當歸

三稜炮各

木香

訶黎勒各五

右為末每服五錢沸湯點服

傷寒汗下後臍右有動氣者宜

前胡散

前胡

赤茯苓

大腹皮

人參各五

木香

檳榔

大黃各三

右為細末每服五錢沸湯點服

傷寒汗下後臍下有動氣者宜

茯苓散

赤茯苓兩一

檳榔錢三

桂心

大腹皮

川茴香炮

良薑各五

右為細末每服五錢沸湯點服

如久不治傳為積熱治之難痊不可汗下也

鼻衄

傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之活人云衄後脈浮者宜麻

黃湯衄後脈已微者不可行麻黃湯宜黃芩芍藥湯太陽病脈浮緊無汗發熱身

疼痛八九日不解表症仍在此當發其汗服藥已微除其

人發煩目瞑劇者必衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃

湯主之不大便頭痛有熱若小便赤者承氣湯也若小

表

便清而衄者桂枝湯也論見發汗 太陽病脈浮緊發熱無汗而衄者愈也論見發熱

太陽病以火劫發汗血氣流溢失其常度陽盛則欲衄陰虛則小便難論見頭汗 少陰病但厥無汗而強發之必動其

血或從口鼻出或從目中出者難治論見欲寐 動氣發汗則衄而渴飲水就吐論見動氣

脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄 陽明胃實口燥但欲漱水不咽者必衄也 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊直視不能瞬不得眠衄家不可發汗者為無脈若浮緊身疼發熱惡寒之症宜發之

鼻衄續法 海仲景言衄不可發汗者蓋為脈微也若浮緊者麻黃湯

脈浮者麻黃桂枝脈微者犀角黃芩

浮緩者桂枝湯脈已微二藥不可用犀角地黃湯主之仲景云衄家不可發汗汗出必額上陷脈緊直視不能瞬不得眠又云亡血不可發其表汗出即寒栗而振此二說皆為脈微不可汗也若脈浮緊及得緩者皆當發之是也

活傷寒衄血脈已微者黃芩芍藥湯犀角地黃湯主之犀角地黃湯治傷寒應發汗而不發汗內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑此方主消化瘀血

芍藥一兩 生地一兩 牡丹皮二錢 犀角二錢

右咬咀每服五錢水一盞半煎取一盞有熱如狂者加黃芩一兩其人脈大來遲腹不滿自言滿者為無熱不用黃芩

茅花湯治鼻衄不止用茅花尖一把以水三盞濃煎汁一盞分二服即瘥無花以根代之

若衄而渴者心煩飲則吐水先服五苓散次服竹葉湯

本治傷寒衄血滑石丸 滑石末不以多少飯丸如桐子大每服十九微嚼破新

水咽下立止用藥末一錢飯少許同嚼下亦得老幼皆可服湯晦叔云鼻衄者當汗不汗所致其血青黑時不以多少乃止宜服溫和藥以調其衛纔見鮮血急以此藥治之

下血

少腹結急下血

傷寒下血若太陽病外已解但少腹急結者桃仁承氣湯也方論見畜血

胃實譫語下血

若陽明胃實譫語者宜刺期門穴論見譫語

汗下後下血

太陽病以火熏汗不得汗其人必躁而滑血論見躁淋家

不可發汗發汗則便血 太陽病下之其脈浮滑者必下血論見大法

少陰病但欲寐一身手足盡熱者必便血也 傷寒熱少厥微不欲食煩躁數日小便利色白若欲食者愈若嘔而

胃脇煩滿者必便血也

唾血

咽痛吐血

咽痛吐血若面赤斑斑如錦紋者為陽毒宜升麻鱗甲湯方論見陽毒

下後厥逆吐血

若下後利不止手足厥逆下部脈不至者麻黃升麻湯論見下

灸後汗後吐血

脈浮熱甚反灸之必咽燥唾血論見大法 服桂枝湯吐者必

吐膿血論見吐

太陽畜血

身黃如狂屎黑喜忘者為畜血 太陽病表証在而發熱

惡寒脈反沉結而身黃發狂少腹硬滿者若小便不利為無血也小便自利血證諦也宜以抵當湯主之論見發熱

抵當湯

水蛭十箇熬去子炸 蜜虫十枚去翅足 大黃一兩湯浸去皮 桃仁七枚去皮
右咬咀作一服水一盞煎七分去查溫服
傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下
之不用餘藥宜

抵當丸

水蛭五枚

蜜虫五枚

桃仁六枚

大黃三錢

右為末煉蜜和作一九以水一盞煎至七分頓服時
當下血不下再服

太陽病不解熱結膀胱其人似狂若血自下者病愈其外
未解者尚未可攻當先解外外解但小腹急結者宜攻之
桃仁承氣湯王海藏方有薑七片桂確各三錢

桃仁十二枚

去皮尖

大黃兩

甘草炙

桂枝

芒硝各半

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去查入硝化開食

後服

陽明畜

當湯論見胃實

海初便褐色者重再便深褐色者愈重三便黑色者為尤
重色變者以其火燥也如羊血在日色中須更變褐色久
則漸變而為黑色即此意也當詳察之

詐血在上則喜忘在下則發狂

下後畜

病人無表裏症發熱七八日雖脈浮救者可下之假令已
下脈不解胃熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血
宜抵當湯若脈數不解血下不止必協熱而便膿血也
成當不大便六七日之際無喜忘如狂之症又無少腹鞭
滿之候何以知其有畜血蓋以其脈浮數故也浮則熱客

於氣數則熱客於血下後浮數俱去則病已若下後數去而浮仍在則榮血中熱去而衛氣中熱在為邪氣獨留心下善飢邪熱不殺穀潮熱反渴也若下後浮去而數不解則衛氣中熱去而榮血中熱在血熱合併迫血下行胃虛協熱消穀善飢血至下焦若下不止則血得以泄必膿血也若不大便六七日則血不得出泄必畜在下焦為瘀血故須以抵當湯下之

口渴漱水不欲咽者瘀血在胸

病者胃滿痞痿舌青口燥但漱水不欲下咽無寒熱脈微大來遲腹不滿其人言我滿為有瘀血海云漱水不欲胸滿心下手不可近者桃仁承氣湯主之病者如熱狀煩滿口乾燥而渴其脈反無熱此為陰伏是瘀血也當下之

衄血唾血畜血續法

血分上中下三部

海血症古人用藥雖有輕重之殊而無上下之別今分作上中下三等以衄血嘔血唾血吐血為上部血結胃中為中部畜血下焦為下部夫既有三部之分故藥亦當隨其輕重也

上部血

汗多為衄血脈浮灸之咽燥為唾血當汗不汗熱入於裏者為嘔血吐血此在上也犀角地黃湯主之涼膈散加生地黃亦可然衄唾嘔吐俱在上亦當以輕重分之大凡血證皆不飲水惟氣證則飲之宜詳之此證乃足太陰所主脾所不暴越而上行所以有吐血嘔血之候也實者犀角地黃湯虛者黃芩芍藥湯凡病嘔吐者以脾所主故咸用芍藥主之是知太陰藥也

中部血

血結胃中 頭痛身痛漱水不咽者衄無熱胃滿漱水不欲咽者喜忘昏迷其人如狂心下手不可近者血在中也

桃仁承氣湯主之

下部血

畜血下焦 其人發狂小腹滿硬小便自利大便反黑及

血分輕重異治

臍下疼者抵當湯丸主之如狂者在中發狂者在下

抵當湯丸藥味同劑如何是二法蓋喜忘發狂身黃屎黑

者疾之甚也但小腹滿硬小便利者輕也故有湯丸之別

桃仁大黃等分水蛭蚘重多者作湯三之二者作丸丸之

名取其數少而緩也故湯用煎服一升丸止服七合也

活病人無表症不發寒熱唇燥但欲漱水不欲入咽其脈

微而沉小腹硬滿小便反利大便必黑身黃發狂此血證

諦也大抵傷寒當汗不汗裏熱畜化為血其人喜忘而如

狂血上逆則喜忘血下畜則如狂輕者犀角地黃湯桃仁

承氣湯甚者抵當湯丸須取盡黑物為效按太陽病畜血

今云無表証者但說得陽明畜血為未備

海喜忘發狂身黃屎黑者疾之甚也但小腹滿小便利者

輕也

生地黄丸病人七八日後兩手脈沉細微膚冷臍下滿或

狂或躁大便實而色黑小便自利者此畜血証也若老幼

氣虛弱者宜此方主之

生地黄 自然汁一升如無生地黃只用生乾地黃二兩 乾漆 半兩炒烟盡

生藕 自然汁半升如無藕用刺薊汁一升半 藍葉 一握切細乾者用末半升

蚘虫 二十箇去翅足熱內炒黃 水蛭 十箇炒 大黃 一兩剉如葶大

桃仁 研碎半兩

右一處入水三升同慢火熬及二升放冷分二服先投

一服至半日許血未下再投之此地黃湯比抵當湯丸

其勢甚輕如無地黃與藕汁升數添水同煎抵當丸恐

用之太過不止損血故以此湯主之

吐血續法

表虛脈浮脈者麻黃去

垣治一貧士病脾胃虛與補劑藥愈後繼而居曠室臥熱炕咳而吐血數次予謂此久虛弱外有寒形而有火熱在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉裏之虛熱蓋冬居曠室衣服單薄是重虛其陽表有大寒雍遏裏熱火邪不得舒伸故血出於口因思仲景治傷寒脈浮數當以麻黃湯發汗而不與之遂成衄血却與麻黃湯立愈與此甚同因與

麻黃人參芍藥湯

麻黃一錢去外寒 桂枝半錢補表虛 白芍藥一錢 黃芪一錢實表益衛
甘草炙一錢補脾 五味五粒安肺氣 門冬三分保肺氣 人參三分益氣 當歸五分和血養血

右咬咀作一服水三盞煎麻黃一味令沸去沫至二盞

熱毒入裏者極當挑仁

入餘藥同煎至一盞去查熱服臨臥一服愈觀此一方足以為萬世模範也蓋取仲景麻黃湯與補劑各半服之但凡虛人合用仲景方者皆當以此為則也
傷寒吐血諸陽受邪初熱在表應發汗熱毒入經結於五臟內有瘀積故吐血也瘀血甚者抵當湯也輕者桃仁承氣湯兼服犀角地黃湯三黃丸

短氣

短氣表症

短氣骨節痛不得屈伸汗出小便不利惡風身腫者為風濕宜甘草附子湯方論見體痛 短氣腹滿脇痛其人若脈弦

浮大外不解無汗嗜臥身黃小便難有潮熱者小柴胡湯也論見胃方

和症

若表未解手足濇然汗出或有潮熱者宜大承氣湯方論見熱 若表解心下痞鞭乾嘔短氣者宜十棗湯方論見熱

短氣汗不徹

短氣煩躁若發汗不徹續微汗出不惡寒表證不罷面赤

短氣心硬痛

者為併病更發汗則愈論見面赤

若下後心中懊憹心下硬痛者用大陷胃湯

跌陽脈微而緊則為寒微則為虛微緊相搏則為短氣

坐而伏者短氣也

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未全解也

傷寒及心痛

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未全解也

傷寒及心痛

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未全解也

針灸

傷寒飲水過多腹脹氣喘心下痛不可忍宜灸中脘氣

海二氏如小腹有氣上衝者宜灸天樞氣衝三里三陰

交如無此症只用前穴

除中

傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯微其熱脈遲為寒今與

黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除

中必死 眼睛不慧語言不出而穀食反多者此為除中

口雖欲言舌不能語 凡手足厥冷而利不當食而食者

恐為除中試與索餅食之發熱者除中不發熱者非也論見

厥門

下重

泄利下重若少陰症欲寐四逆者四逆湯加薤白散若熱

者白頭翁湯方論見下利

脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰已

醫學綱目卷五

三

下必重而痺名火逆也

脈遲浮弱惡風寒者表症醫反下之遂不食腸痛身黃項

強小便難復與柴胡湯必下重論見

下利脈沉弦者下重也論見

身熱惡寒身寒惡熱

病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也活人

以桂枝湯治寒次以小柴胡加桂以溫其表身大寒反不欲近衣者寒在皮

膚熱在骨髓也活人云先與白虎湯加人參除熱

續增症

射干湯治初秋暴雨冷及天行暴寒其熱喜伏於內咳嗽

曲折不可得氣息喉啞失聲乾嗽無唾喉中如梗

射干兩 半夏二兩 杏仁兩半去皮尖炒生薑炮二

甘草 紫苑各一 橘皮 肉桂

枳實各二兩 當歸 獨活 麻黃已上各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去渣溫服

續增斑

海陽症發斑有四有溫毒發斑有熱病發斑有時氣發斑

有傷寒發斑已上四斑活人有治法見後

斑斑如錦紋或發之四末或發之面部或發之背背色紅

赤者胃熱也紫黑者胃爛也一則下早一則下晚乃外感

熱病而發也宜用玄參升麻湯白虎等藥王明奉云赤斑

斑出十死一生皆用白虎人參湯阿膠大青龍湯兼與紫雪散大妙可下者調胃承氣湯

活溫毒發斑者初春病人肌肉發斑癢疹如錦紋或咳心

悶但嘔者是也冬時觸冒寒毒至春始發初病在表或已

汗吐下而表証未罷毒氣未散以此發斑宜用黑膏主之

又有冬月溫暖人感乖戾之氣冬末即病至春或被積寒

陽斑如錦紋

溫毒斑 咳嘔至 春發

所折毒氣不得洩至天氣暄暖溫毒始發則肌肉斑疹如錦紋而咳心悶但嘔有清汁宜用葛根橘皮湯主之
黑膏方療溫毒發斑

生地半斤切碎 好鼓一升

右二味猪膚二斤合一處煎令三分減一絞去查用雄黃麝香如荳大為末同藥再煎服之其毒便從皮中出者則愈忌蕪荑

葛根橘皮湯療冬溫未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其寒解冬溫始發肌中斑爛癢疹如錦紋而咳心悶但嘔吐有清汁宜服此湯即止

葛根 橘皮 杏仁去皮 知母

黃芩 麻黃去節 甘草炙

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去查溫服

熱病時氣斑無時發

熱病發癍與時氣發癍並同夫病人或未發汗或已經發汗而熱毒不散表虛裏實熱毒乘虛出於皮膚所以發癍瘡癰疹如錦紋俗名謂之熨瘡素問謂之疹大抵發癍不可用表藥蓋表虛裏實若發其汗重令開洩更增癍爛也宜用玄參升麻湯大青四物湯猪膽雞子湯選用之玄參升麻湯治傷寒發汗吐下後毒氣不能散表虛裏實發熱於外故身發癍如錦紋甚則煩躁譫語兼治喉閉腫痛

玄參 升麻 甘草炙

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去查熱服

大青四物湯治傷寒熱病十日已上發汗及吐利後熱不除身上斑出

大青 阿膠 甘草炙 豆豉合

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞旋入膠再煎令

猪膽雞子湯治五六日斑出

猪膽合三 鷄子一 苦酒三

右三味合煎三沸強人盡服瘦人煎六七沸服之

陽毒癰

陽毒升麻湯治癰出面方見

海消毒飲子治癰 黍粘子六 荆芥 防風各二 甘草一

右咬咀水煎服

陰症如蚊咬狀

陰症發癰出曾背又出手足亦稀少而微紅者若作熱症投之涼藥大誤矣此無根失守之火聚於胃中上獨熏肺傳於皮膚而為斑點但如蚊蚋蚤虱咬形狀而非錦紋也宜調中溫胃加茴香芍藥以大建中陰毒升麻鱉甲湯之

類其斑自退可謂治本而不治標也海藏云陽明發斑亦有紅點如斑出於皮膚

湯治陰癰方見 大建中湯方見治 陰毒升麻鱉甲

侯國華病傷寒四五日身微斑渴欲飲診之沉弦欲絕厥

陰脈也服溫藥數日不已又以薑附等藥覺陽微回脈生

因渴私飲水一杯脈復退又見頭不舉目不開問之則犯

陽易若只與燒視散則寒而不濟矣遂更用吳茱萸湯一

大服調燒視散連進二服出大汗兩晝夜而愈

丹發癰似傷寒者痰熱之病發於外汗以散之下之非理

宜忌 欲眠目不閉聲啞為狐惑為蠱

狐惑之為病狀如傷寒或因傷寒而變成斯病其狀默默

欲眠目牽不得閉臥起不安重蝕於喉咽為惑蝕於陰肛

為狐不欲食惡聞食臭其面目乍赤乍黑乍白蝕於上部

虫蝕上 為狐 虫蝕下 為惑

則聲啞甘草瀉心湯主之方見 蝕於下部則咽乾苦參湯洗之 蝕於肛者雄黃散熏之用雄黃一味為末取二

瓦合之燒向肛熏之 脈經云病人或從呼吸上蝕其咽喉或從下焦蝕其肛陰

蝕上為惑蝕下為狐狐惑病者猪苓散主之方未考究 病者脈數無熱微煩默默但欲臥汗出初得之三四日目

赤如鳩眼七八日目四眦一本皆黑若能食者膿已成也 赤荳當歸散主之方見

狐惑續法 一婦人狐惑聲啞多眠目不聞惡聞食臭不省人事半月後又手足拘強脈數而微細先與竹瀝薑汁一盞服之忽

胃中有汗腹鳴即目閉省人事遂用參朮歸陳入竹瀝薑汁飲之五六貼而愈

濕痰

上唇有瘡蝕下唇有瘡蝕肛

活狐惑傷寒與濕蠱皆虫証初得狀如傷寒或因傷寒變成此疾大抵傷寒腹內熱食少腸胃空虛三虫行作求食蝕人五臟及下部為蠱虫病其候齒無色舌上盡白甚者唇黑有瘡四肢沉重忽忽喜眠虫蝕其肛爛見五臟則死當數看其上下唇上唇有瘡虫蝕其臟下唇有瘡虫蝕其肛殺人甚急多因下痢而得治蠱桃仁湯黃連犀角湯雄黃銳散主之

治蠱桃仁湯

生艾

大棗十五箇去核

右水二盞煎至一盞半分三服

黃連犀角湯治傷寒及諸病之後內有蠱出下部者

黃連兩半

犀角兩

烏梅七

沒藥分

桃仁去皮尖炒

槐花子碎各

右水二大盞半煎至一盞半分三服

雄黃銳散治下部蠹瘡

雄黃

苦參

青箱子

黃連各二分

桃仁去皮尖一分

右為散以生艾搗汁為丸如枣核大綿裹納下部匾竹葉汁更嘉冬月無艾只用散裹納亦得

百合病

百服一宗悉致其病

百合病論曰百合病者謂無經絡百服一宗悉致病也人常默默然意欲食不能食意欲臥不能臥意欲行不能行或有時聞食臭或時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥即劇吐利如有神靈者身形雖似和其人脈微數每溺時輒頭痛者六十日乃愈若溺時頭不痛漸淅然者四十日愈若溺時快然但頭眩者二十日愈

診

或末病而預見或病四五日而出或病二十日或一月微

見者各隨其症治之

活人云此名百合傷寒多因傷寒虛勞大病之後不平後變成奇疾也

百合病發汗後宜服

百合知母湯

百合七枚

知母三兩切

右先將百合水洗浸一宿當白沫出去其水更以井水二盞煎至一盞去查又將井水二盞另煎知母取一盞去查和百合一盞同煎取一盞半分溫再服

百合病下後者宜用

滑石代赭湯

百合七箇

滑石三兩碎綿裹

代赭石

如彈大一枚綿裹

右先將百合水洗淨浸一宿當白沫出水更以井水二升煎取一盞去查另用水二升煎滑石代赭石取一升

去查後合和同煎取一升半分溫服

百合病吐後宜用

百合雞子湯

百合七枚

雞子黃一枚

右先將百合水浸一宿當白沫出去其水更以井水二

升煎取一盞去查納雞子黃攪勻煎五分溫服

百合病不經吐下發汗病形如初者宜

百合地黃湯

百合七箇

生地黃汁一升

右水洗百合浸一宿當白沫出去水更以井水二升煎

取一升去查納地黃汁煎取一升五分溫再服中病

勿更服大便當如漆黑

百合病一月不解變成渴者百合洗方主之用百合一升

28
3778

