

婦人部  
小兒部

醫學綱目

自卅五  
至卅六

十九



醫學綱目卷之三十五

婦人部

胎前症

求子

受胎

惡阻

妊娠經來

胎漏下黃汁或如葶汁

胎動不安

胎上逼心

跌撲傷胎毒藥傷胎

妊病可下胎斷胎

胎自墮

十月未足欲產過期不產

難產縮胎法

坐草法

催生法

下死胎法

求子法

大法調經為先

胎前之道始於求子求子之法莫先調經每見婦人之無子者其經必或前或後或多或少或將行作痛或行後作痛或紫或黑或淡或凝而不調不調則血氣乖爭不能成孕矣詳夫不調之由具或前或後及行後作痛者虛也其少而淡者血虛也多者氣虛也其將行作痛及凝塊不散

者滯也紫黑色者滯而挾熱也治法血虛者四物氣虛者四物加參芪滯者香附縮砂木香檳榔苑仁玄胡滯久而沉痼者吐之下之脈証熱者四物加苓連脈証寒者四物加桂附及紫石英之類是也直至積去滯行虛回然後血氣和平能孕子也予每治經不調者只一味香附末醋為丸服之亦百發百中也

肥人多痰宜燥

婦人肥盛者多不能孕育以身中有脂膜閉塞子宮以致經事不行瘦弱婦人不能孕育以子宮無血精氣不聚故也肥人無子宜先服調理藥

當歸酒洗一兩 川芎七錢 白芍 白朮  
半夏湯洗 香附 陳皮各一兩 茯苓二兩  
甘草一兩  
作十貼每貼姜三片水煎吞後九子

白朮二兩

半夏麩一兩

茯苓半兩

橘紅四錢

川芎

香附各一兩

神麩炒半兩

甘草二錢

粥丸每服八十九丸如熱多者加黃連枳實各一兩煎前藥訖却服後益斯丸

厚朴

杜仲

桂心

秦艽各二錢

附子

公苓各六錢

白微

半夏

乾姜

牛膝

沙參各二錢

人參四錢

細辛半兩

右為末煉蜜丸小豈大每服五丸空心酒下加至十九不妨覺有娠三月後不可更服忌食肉則難產當

出月

按此方即秦桂丸也丹溪忌服之者蓋忌於瘦人無血者若肥人濕多者又兼前調理藥而所服丸數十減其

九只服五分無妨也上三方得之於母溪之子朱懋誠者累試有効

大五補丸同上三方丸

瘦人無血攝精宜潤

天門冬

麥門冬

菖蒲

茯苓

人參

益智

枸杞

地骨皮

遠志

熟地各等分

右為細末煉蜜丸如桐子大空心酒下三十九服本方數服後以七宣丸泄之

增損三才丸

天門冬

酒浸去心

熟地

酒蒸

人參

去

遠志

去

五味子

酒浸去心

茯苓

酒浸去心

鹿角

炙

一法加白馬

莖

炙

一法加

冬令人有力

一法加續斷以續筋骨

一法加沉香煖下焦虛冷

右為細末煉蜜杵子下丸如桐子大每服五十九空心

好酒下年老欲補加混元衣全個入藥混元衣者是胎衣頭生兒者佳

用酒浸晒乾細剉為末

紫石英丸治婦人無子

紫石英

研水飛三兩

天門冬

酒浸去心焙乾三兩

當歸

川芎

紫葳

卷柏

熟地

禹餘糧

醋炒七次

牡蒙

石斛

去根

辛夷

參

肉桂

牡丹皮

桑寄生

細辛根

續斷

川烏

炮

食茱萸

厚朴

姜製

乾姜

炮

牛膝

酒浸各一兩

栝子仁

輕炒另研

山蕒

烏賊魚骨

燒灰各一兩半

甘草

炙

右二十六味為極細末煉蜜丸桐子大每服二十九酒  
米飲任下空心食前日二

寸脈沉者痰積

戴人過譙郁營，飲會有一卒說出妻事戴人問其  
故荅曰吾婦為室女時心下有冷積如覆盆按之如水聲  
以熱手熨之如冰之來已十五年矣恐斷吾孕是以去之  
戴人曰公勿黜也如用吾藥病可除孕可得卒從之戴人  
診其寸脈沉而遲尺脈洪大有力非無子之候也可不逾  
年而孕其良人嘆曰試之先以三聖散吐涎一斗心下平  
軟次服白朮調中湯五苓散後以四物湯和之不再月氣  
血合度數月而娠一子戴人常曰用吾此法無不子之婦  
此言不誣一婦人年三十四歲夢與鬼神交驚怕異常  
及見神堂陰司舟楫橋梁如此一十五年竟無妊娠巫祈  
覲禱無所不至鑽肌炙肉孔穴萬千黃瘦發熱引飲中滿

汚血冷積

足腫委命于天一日苦請戴人戴人曰陽火盛于上陰水  
盛于下見鬼神者陰之靈神堂者陰之所舟楫橋梁水之  
用兩手寸脈皆沉而伏知胸中有痰實也凡三涌三泄三  
汗不旬日而無夢一月而一娠

三十年者

朴硝

丹皮

當歸

大黃蒸一飯久

桃仁各三兩

細辛

厚朴

苦梗

赤芍藥

人參

茯苓

桂心

甘草

川牛膝

陳皮各二兩

附子炮一兩半

蜚虫炒焦去翅足

水蛭炒各十枚

右咬咀每服四大錢水酒各半盞煎至六分去渣溫服  
空心日三夜一溫覆得少汗必下積血及冷赤膿如小

荳汁斟酌下盡若力弱大困不堪者只一二服止然恐惡物不盡不得藥力能盡服儘好不爾用坐導藥

坐導藥治全不產及斷緒服前盪胞湯惡物不盡用此方

皂角去皮

吳茱萸

當歸各二兩

細辛去苗

五味子

乾姜炮各二兩

黃葵花

白礬枯

戎塩

蜀椒各半兩

右為細末以絹袋大如指長三寸餘盛藥令滿縛定納婦人陰中坐臥任意勿行走小便時去之更安一日一度易新者必下清黃冷汁汁盡止若未見病出可十日安之本為子宮有冷惡物故令無子值天陰冷則發疼痛須候病出盡方已不可中輟每日早晚用蕒菜煎湯

薰之

忌服熱藥

秦桂丸論

無子之因多起於婦人醫者不求其因起

於何處遍閱古方惟秦桂丸其辭確其意專用溫熱藥近乎人情欣然授之銳然服之甘受燔灼之禍猶憤然不悔何者陽精之施陰血能攝之精成其子血成其胞胎孕乃成今婦人之無子者率由血少不足以攝精也血之少也固非一端然欲得子者必須調補陰血使無虧欠乃可推其有餘以成胎孕何乃輕用熱劑煎熬臟腑血氣沸騰禍不旋踵矣或曰春氣溫和則萬物發生冬氣寒凜則萬物消隕非秦桂丸之溫熱何以得子臟溫煖而成胎耶予曰詩曰婦人和平則樂有子和則血氣均平則陰陽不爭今得此藥經血必轉紫黑漸成衰少或先或後始則飲食驟進久則口苦而乾陰陽不平血氣不和疾病蜂起焉能成胎縱然成胎生子亦多病而不壽以秦桂丸耗損天真之陰也戒之慎之

按秦桂丸施于肥人而少其丸數兼服調理補藥亦無妨但忌施于瘦人火多者也

督脈主不孕  
灸

素督脈生病女子不孕

世治男子無子者用執艾一團用鹽填臍滿却於鹽上隨  
鹽大小做艾丸灸之如痛即換鹽直灸至艾盡為度如一  
日灸不盡二日三日灸之曾効

東婦人無子胞門在關內左邊二寸灸五十壯又法氣門在關元傍各關三寸

集又法子宮在中極傍各關三寸針入二寸灸三七壯中極

垣又法關元二十壯三報穴甲絕子灸臍中令人有子女女子手脚拘攣腹滿疝月水不  
下乳餘疾絕子陰痒陰交主之 腹滿疝積聚餘疾絕子

陰痒刺石門千金云奔豚上少腹堅痛下引陰中不得小便女子絕子衄血在  
內不下關元主之千金云轉胞不得滿小腹痛各石木痛婦人子門不閉

少腹苦寒陰痒及痛經閉不通中極主之 婦人無子

診

泉主之 大疝絕子築賓主之 絕子 江主之穴在內

宛 婦人絕產若未曾產陰廉主之分半 婦人子門不閉

男子脈浮弱而濇為無子精氣清 婦人少腹冷惡寒久年少者得之 無子年大考得

之絕產 脈微弱而澁年少得此為無子中年得此為絕 產 肥人脈細胞有寒故令少子其色黃者胃上有寒

少陰脈浮而緊則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮則亡血 絕產惡寒 受胎

丹成胎以精血之後先分男女者褚澄之論也思切惑焉 後閱東垣方有曰經水斷後一二日血海始淨精勝其血 感者成男四五日後血脈已旺精不勝血感者成女此論 亦為未瑩何以言之易曰乾道成男坤道成女夫乾坤陰

男女分  
左右

陽之性情也左右陰陽之道路也男女陰陽之儀象也父精母血因感而會精之泄陽之施也血能攝之陰之化也精成其骨此萬物之始於乾元也血成其胞此萬物資生於坤元也陰陽交媾胎孕乃凝胎之所居名曰子宮一系在下上有兩岐一達於左一達於右精勝其血及剛日陽時感者則陽爲之主受氣於左子宮而男形成精不勝血及柔日陰時感者則陰爲之主受氣於右子宮而女形成或曰分男分女吾知之矣其有雙胎者將何如曰精氣有餘岐而分之血因分而攝之故也若夫男女同孕者剛日陽時柔日陰時感則陰陽混雜不屬左不屬右受氣于兩岐之間者也亦有三胎四胎五胎六胎者猶是而已或曰其有男不可爲父女不可爲母與男女之兼形者又若何而分之耶予曰男不可爲父得陽氣之虧者也女不可爲

母得陰氣之塞者也兼形者由陰爲駁氣所乘而爲狀不一以女兼男形者有二一則遇男爲妻遇女爲天一則可妻而不可夫又有下爲女體上具男之全形此又駁之甚者也或曰駁氣所乘獨長於陰月成之形又若是之不同耶予曰陰躰虛駁氣易于乘也駁氣所乘陰陽相混無所爲主不可屬左不可屬右受氣于兩岐之間隨所得駁氣之輕重而成形故所兼之形有不可得而同也

右丹溪此論極造精微發前人之未發是知男女之分已定於萬物資始乾元之際陰陽交媾之時昧者不寤是理妄有轉女爲男之法感矣夫萬物皆資始於乾元獨男女之分不資始於乾元乎

胎前當清熱養血 產前安胎白朮黃芩妙藥也 胎前將臨月以三補丸加炒香附炒白芍藥蒸餅丸服 又抑

雜法

熱以三補用生地膏丸本連栢為末地黃膏丸之有孕八九個月必順氣枳殼蘇莖前至八九月因火動逆作鳴急可用條

驗胎法

神方驗胎散婦人三兩個月月經不行疑是兩身却疑血滯心煩寒熱恍惚此藥可驗取之內也外已有身病無邪脈以素問脈法推之十得八九矣

真雀腦芎兩當歸全用重一兩者只用七錢

右二味為細末分作三服濃煎好艾湯一羹調下或好酒調服亦得可待三兩個時辰間覺腹臍動仍頻即有胎也動罷即愈安穩無虞如不是胎即不動所滯惡物自行母亦安也如服藥不覺効再煎紅花湯調下必有神効

靈苑治婦人經脈住三個月驗胎法真川芎為細末濃煎

診

艾湯下一匕投腹內漸動是有胎也

試孕有無

甘草一分

皂角一分

黃連許

右為末酒調服有則吐無則不吐每服一錢半

婦人懷胎七月而不可知時時衄血而轉筋者此為軀也衄時噎而動者非軀也

婦人足少陰脈動甚者任子也平人氣象論謂太溪脈也全元起本作足少

別謂之有子陰陽別論王註云陰謂尺中也持謂搏絀於手也尺脈搏擊與寸脈殊別則為有孕之兆

脈妊娠初時寸微小呼吸五至三月而尺數也脈滑疾重以手按之散者胎已三月也脈重手按之不散但仄不滑者五月也此即陰搏陽別之義言尺脈滑數寸脈微小而尺與寸脈別者孕脈也尺脈左偏大為男右偏大為女左右俱大產二子大者如實狀陰

搏陽別之義謂尺脉實大與寸脈殊別但分男左女右也 婦人妊娠四月欲知男女法左疾為男右疾為女俱疾為生二子王子亨云妊娠三為男在右為女 遣妊娠人面南行還復呼之左迴首者是男右為首者是女 看上圍時夫從後急呼之左迴首者是男右為首者是女也

右按丹溪云男受胎在左子宮女受胎在右子宮斯言大契是說也蓋男胎在左則左重故迴首時慎護重處而就左也女胎在右則右重故迴首時慎護重處而就右也推之於脈其義亦然胎在左則血氣護胎而盛於左故脈亦從之而左疾為男左大為男也胎在右則血氣護胎而盛於右故脈亦從之而右疾為女右大為女也亦猶經云陰搏陽別謂之有子言受胎處在臍腹之下則血氣護胎而盛於下故陰之尺脉鼓搏有力而與

陽之寸脈殊別也又如癰癤發上則血氣從上而寸脈盛發下則血氣從下而尺脈盛發左則血氣從左而左脈盛發右則血氣從右而右脈盛也丹溪以左大順男右大順女為醫人之左右手蓋智者之一失也

**丹**婦人懷孕愛物乃一藏之虛假如肝藏虛其血氣止能養胎不能榮肝肝虛故愛酸物吃

**大**胎動不安或因僵仆或因毒藥重者便致傷胎當以母形心察之母面赤舌青者子死母活唇口俱青兩邊沫出者子母俱死面青舌赤口中沫出者母死子活也

**脈**婦人妊娠八月脈實大牢強弦緊者生沉細者死

**丹**脈細勺易產大浮緩氣散難產

**脈**婦人懷胎一月之時足厥陰脈養二月足少陽脈養三月手心主脈養四月手少陽脈養五月足太陰脈養六月

足陽明脈養七月手太陰脈養八月手陽明脈養九月足少陰脈養十月足太陽脈養諸陰陽各養三十日活兒手太陽少陰不養者下主月水上為乳汁活兒養母懷娠者不可灸刺其經必墮胎陳氏大全論云足厥陰肝脈也足少陰脾脈也足陽明胃脈也足太陽膀胱脈也手足少陰心脾也手足太陽肺大腸也

惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也帝曰何以知懷子之且生也岐伯曰身軀有病而無邪脈也論中

大妊娠稟受怯弱便有阻病其狀顏色如故脈息和順但覺肢軀沉重頭目昏眩擇食惡聞食氣好食酸酸甚者或

桂下口心

作寒熱心中憤悶嘔吐痰水恍惚不能支持巢氏謂之惡阻但症有輕重耳

仲婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒熱名妊娠桂枝湯主之於法六十日當有比証設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之

右絕之者謂絕止醫治候其自安也予常治一二婦阻病吐愈治愈逆因思此仲景絕之之旨遂停藥月餘自安真大哉聖賢之言也

丹惡阻即從痰治多用二陳湯

羅半夏茯苓湯治妊娠惡阻嘔吐心煩頭目眩暈惡聞食氣好食酸鹹多臥少起百節煩疼羸瘦有痰胎孕不牢

- 半夏洗一兩 赤茯苓
- 熟地各七錢半 橘紅
- 旋覆花千金方無旋覆花有細辛紫蘇 人參 芍藥

痰症

川芎

桔梗

甘草各半

右咳阻每服五錢姜七片水煎空心兼服茯苓丸 若有客熱煩渴口瘡去橘紅細辛加前胡知母七錢半

若腹冷下利去地黃加炒桂心半兩 若胃中虛熱大便秘小便赤澁加大黃七錢半去地黃加黃芩二錢五分

寒痰

茯苓丸治妊娠阻病心中煩悶吐痰眩暈先服半夏茯苓湯兩劑後服此藥

赤

人參

杜

乾姜

半夏

湯泡七次炒黃 橘皮各一兩

白

葛根

甘草

枳殼各一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服一丸米飲下日三服一方加麥門冬肘後加五味子

妊娠嘔吐不止者乾姜人參半夏丸主之

乾姜

人參

半夏

右三味末之以生姜汁糊丸如桐子大飲服十九日三服大全方論半夏動胎而不用今仲景豈獨不知此而用於此方乎予治妊娠阻病累用半夏末管動胎也經云有故無殞是也

大治惡阻吐清水甚害十餘日粥漿不入者

白朮

人參

丁香

甘草

右為細末每服二錢水一鍾姜五片煎至七分溫服歸原散治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥無効

人參

甘草

川芎

當歸

芍藥

丁香

白茯苓

白朮

陳皮

桔梗

枳殼

半夏

熱痰

右咬咀每服三錢生姜五片棗一枚水同煎  
人參橘皮湯治阻病嘔吐痰水

人參

橘皮

白朮

麥門冬去心各

甘草三錢

厚朴製

白茯苓各五錢

右為粗末每四錢加淡竹茹彈子大生姜三片水同煎  
治妊娠惡阻嘔吐不下食

青竹茹

橘皮各二兩

生姜

茯苓各四兩

半夏五兩

右細切以水六升煮取二升半去查分三服

治妊娠嘔吐不食兼吐痰水

生蘆根七分

橘紅四分

生姜六分

檳榔二分

右切以水二盞煎七分空心熱服

治妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

青竹茹

麥門冬各三兩

橘皮二兩

蘆根握一

右切細以水一大升煮半升去查分兩服食前

安胎飲治妊娠惡阻心中憤悶頭重目眩嘔逆不食或胎

動不安腰腹疼痛

甘草

茯苓

當歸

熟地

川芎

地榆

白朮

黃芪

白芍藥

半夏泡七次炒

阿膠炒各等分

右咬咀每服三錢生姜四片水同煎

一婦人孕三月吐痰水并飲食每日寅卯作時覺小腹

有氣衝上然後膈滿而吐面赤微躁頭眩臥不起抹四肢

疼微渴此肝火挾衝脈之火衝上也一日甚一日輕脈和

右寸洪大百藥不効者將二月予男病偶用沉香磨水化

煎

抱龍丸一服膈寬氣不上衝二三服吐止眩減食進而安  
又應氏婦得胎七月嘈雜吐食脈維心下滿塞氣攻背兩  
肘皆痛要人不住手以熱物摩慰得吐稍疎脈洪大

黃芩二錢

黃連一錢

白朮

半夏各二錢

甘草炙

縮砂各五分

陳皮

當歸

山梔

枳殼炒

香附

人參

蒼朮絡

茯苓一錢

生姜七片

服二貼後嘈雜吐止心滿塞退但於夜間背肘痛用摩  
慰遂與抱龍丸化服其疾如失

一婦人年近三十懷孕兩月病嘔吐頭眩自覺不可禁  
持以人參白朮川芎陳皮茯苓等藥服五七日愈覺沉重  
召子脈之兩手弦左為甚而且弱子曰此是惡阻病必怒  
氣所激問之果然肝氣既逆又挾胎氣參朮之補大非所

宜教以時用茯苓湯下抑青丸二十四粒五貼目覺稍安  
診其脈略有數狀自言口乾苦稍食粥則口酸子意其為  
膈間滯氣未盡行教全以川芎陳皮山梔茯苓生姜煎湯  
下抑青丸十五粒十餘貼餘証皆平但食及常時之半食  
後覺口酸不食覺易飢子謂肝熱未平則以白湯下抑青  
丸二十粒二十日而安予又脈之見其兩手脈雖和平而  
左手弱甚此胎必墮此時肝氣既平參朮可用矣遂用始  
初參朮等藥補之預防墮胎以後之虛服之一月胎自墮  
却得平穩無事抑青丸一味黃連為丸是也

### 妊娠經來

陽微陰滑故令  
下  
婦人經月下但為微少師脈之反言有軀其後審然其  
脈何類何以別之師曰寸口脈陰陽俱平榮衛調和按之  
滑浮之則輕陽明少陰各如經法身反灑浙不欲食飲頭

痛心亂嘔噦欲吐呼則微數吸則不驚陽多氣溢陰滑氣盛滑則多實六經養成所以月見陰見陽精汁凝胞散散者損墮設復陽盛雙胎二胎今陽不足故令激經也滑脈主血有餘今經又少故知孕也

胎漏下血

大法

虛

因血虛 因血熱

師曰婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕者有

妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞阻芎歸膠艾湯主之

方見血崩

治胎動下血心腹疼死生不知服此湯活即安死即下

此即催生碑手散方見跌撲傷胎即當歸川芎為散也 妊娠無

故卒下血不止取阿膠三兩炙搗末酒一升半煎令消一

服愈

羅立聖散治妊娠下血不止鷄肝三個用酒一升煮熟共食之大効

保治胎漏二黃散生地熟地等分剉水三盞煎半乾去查服

保治胎下血阿膠二兩搗末生地半斤搗取汁以清酒三升絞汁分三服

保治胎漏下血不止胞乾即死宜急治之

升絞汁分三服

大治胎漏下血不止胞乾即死宜急治之

生地汁升 陳酒合

右同煎三五沸溫三服以止為度

保治婦人胎漏下血及因事下血枳殼湯

枳殼 黃芩各半兩 白朮一兩

右粗末每七錢水一盞煎七分食前服

婦人年二十餘三個月孕發瘧疾後淡血水下腹滿口

血熱

虛熱

渴

白芍 茯苓 黃芩

歸尾 川芎 陳皮

東陽婦人三十五歲孕八九個月漏胎不止胎比前時稍覺收小血色微紫有塊食減平時三之一腹微疼無情緒

人參 白朮 白芍 陳皮

川芎 茯苓 縮砂 大腹皮

木連藤

同煎食前下三聖丸五十粒

瘕病破血

婦人宿有瘕病經斷來及三月而得漏下不止胎動在臍上者為瘕痼害妊娠六月動者則三月經水利時胎下血者後斷三月絕也所以血不止者其瘕不去故也當下其瘕桂枝茯苓丸主之凡胎動多在當臍今動在臍上故知是瘕也

桂枝 茯苓 牡丹 桃仁

芍藥

右五味末之煉蜜丸如兔屎大每日食前服一丸不知加至三丸

本治胎下血不止取桃樹上乾不落莢子燒灰和水服瘕

本草云莢奴破血又治伏梁積氣

胎漏黃汁下或如荳汁

治妊娠忽然下黃汁如膠或如荳汁胎動腹痛

粳米 黃芪

右以水七升煎取二升分為四服

銀苧酒治妊娠下黃汁或如赤荳汁

苧根 銀斤

右水九升煎取四升每服入酒半升或一升煎分二次

氣虛

血虛

診 虛

服

服 婦人懷軀六月七月暴下斗餘水其胎必倚而墮此非時孤漿預下故也胎漏徐徐下水今暴下而多故知墮胎也

胎動不安

大 娠胎動不安者由衝任經虛受胎不實也亦有飲酒房室過度損動不安者有悞擊觸而胎動者有喜怒氣宇不舒傷於心肝觸動血脈者有信醫宜服煖補反為藥所害者有因母病而胎動者但治母病其胎自安有胎不堅固動及毋疾但當安胎其毋自愈

服 固胎常

永固孕丸

地黃

川芎

黃芩各五分

歸身尾

人參

白芍

陳皮各一分

白朮一錢半

甘草三錢

黃栢些

桑上羊食藤七葉圓者

糯米十四粒

右咬咀煎服

仲 娠宜常服當歸散主之

當歸

黃芩

芍藥

芩藎各一分

白朮半斤

右五味杵為散酒飲服方寸七日再服妊娠常服即易產胎無苦疾產後百病悉主之

娠 養胎白朮散主之

白朮

芩藎各四分

蜀椒三錢

牡蠣煨二分

右四味杵為散酒服一錢七日三服夜一服但苦痛加芍藥心下毒痛倍加芩藎心煩痛吐不能飲食加細辛一兩半夏大者二十枚服後若嘔以醋醬味服之後不解者小麥汁飲之已後渴者大麥粥服之病雖愈服之

勿置

胎動不安宜補陰行滯

**附**胎動不安取苧根如足大指者一尺咬咀以水五升煮取三升去查服一方有生薑五片。丹溪云

**大**銀苧酒方見前胎漏條

治胎動不安好銀煮水着葱白作羹食之佳

或動或痛者安之

治妊娠二三月上至八九個月胎動不安腹痛已有所下方

艾葉

阿膠炒

當歸

川芎

各三兩

甘草

兩一

右細切以水八升煮取三升去查肉膠令烊分三服日

三

**雲**立効散治婦人胎動不安如重物所墜冷如冰即佛手散方見

門眩

**大**縮砂散治胎動不安墮在須臾者神効方見毒物傷胎

胎上逼心

瀉心滿胸者下氣通陽

**本**紫蘇飲治妊娠胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛謂之子懸兼治臨產驚恐氣結連日不下

紫蘇莖葉兩一大腹皮

人參

陳皮

白芍

各半兩

當歸

甘草

分一

右細剉分作三服每服用水一盞半生薑四片葱白七寸煎至七分去查空心服

曾有累日婦人產不下服遍催生藥不驗予曰此必坐草太早心懷下一點懼氣結而不行然非不順也素問云恐則氣下蓋恐則精神怯怯則上焦閉閉則氣還還則下焦脹氣乃不行矣得此藥一服便產及婦人六七月子懸者予用此數數有驗不十服胎便近下 陳良甫云治一婦

有孕七個月遠歸忽然胎上衝心而痛坐臥不安兩醫治之無效遂說胎已死矣用葶麻子研爛加麝香調貼臍中以下之命在垂亡召陳診視兩尺脈絕他脈平和陳問二醫作何証治之荅曰死胎也陳曰何以知之兩尺脈沉絕以此知之陳曰此說出在何經二醫無荅陳曰此子懸也若是胎死却有辨處面赤舌青死母活面青舌赤吐沫母死子活唇口俱青母子俱死今面不赤口不青其子未死是胎上逼心宜以紫蘇飲丁治之至十服而胎遂下矣

**大治胎上逼心煩悶方**并治胎動困篤用葱白二七莖濃煮汁飲之若胎未死即安已死即出未効再服此方神妙宜之本草云慈白通陽氣安胎

**秘錄胎動上迫心痛**取艾葉如鷄子大以頭醋四升煎取二升分溫服 治胎上逼心熱痛下血神麴半斤搗碎和

通身痛 衝心者 有水

熟水絞取汁三鍾無時溫服止

**大治妊娠遍身痛或衝心欲死不能飲食**

白朮五兩 黃芩二兩 芍藥四兩

右水六升煮取二升半分作三服緣胎有水致痛兼易

產

跌撲傷胎毒藥傷胎

跌撲傷 者逐汚 養新

**佛手散**治婦人妊娠六七月因事築磕着胎或子死腹中惡露下疼痛不已口噤不絕用此藥探之若不損則痛

止子母俱安若胎損立便逐下又治血上衝心腹滿悶者

如湯沃雪此藥催生神効方見眩即當歸川芎等分爲散口噤灌之

**大治胎忽因倒地舉動擊重促損腹中不安子死以川芎末酒服方寸匕須臾二三服出**

治妊娠從高墜下腹中下血煩悶

生地 益母草各一兩 當歸 黃芪各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜四片煎至六分去查無時服

**丹** 婦人因閃挫傷胎肚疼血崩

歸尾 陳皮 白朮 人參

茯苓 白芍 川芎各三錢 甘草五分  
右分四貼水三盞煎取一盞下縮砂末一錢五分五靈脂一錢

**大** 治婦人服草藥胎墮腹痛用白扁豆少許去皮為末米飲調服方寸匕或濃煎亦可

阿膠散治妊娠或因傾仆或因毒藥胎動不安腰痛腹滿或有所下或胎上搶心短氣

熟地二兩 白芍 艾葉 當歸

甘草 阿膠 黃芪各一兩 一方有川芎

右咬咀每服半兩姜三片棗一枚同煎溫服無時

治妊娠偶有所傷胎動不安疼痛不可忍縮砂不以多少和皮炒黑色一方用仁置熨斗內略炒為細末熱酒調下

二錢不飲酒者米飲調下覺腹中熱則胎已安矣此方極効

奪命丸治婦人小產下血子死腹中其人憎寒手指唇口爪甲青白面色黃黑胎上搶心則悶絕欲死冷汗自出或

食惡物或悞服草藥傷動胎氣下血不止胎尚未損服之可安已死服之可下若胎腐爛腹中危甚者立可取出此

方的係異人傳授至妙此即仲景茯苓枝丸但用淡醋湯嚼下不同耳方即壯丹茯苓枝丸亦丹溪亦妙

姪病可下胎斷胎

痛不可忍命將絕者縮砂酒桂苓丸

下胎方

**大**治妊娠母因疾病胎不能安可下之取七月七日法麩四兩水二大盞煎取一盞三分綿濾去渣分溫三服立下又方大麩五升清酒一斗煮二沸去渣分五貼隔宿勿食但再服其子如糜母無疾苦千金不傳妙又方麥蘖一升為末和水煮二升服之即下神効又方附子二枚為末以淳苦酒和塗右足去之大良又方取鷄子一枚以三指撮鹽放鷄子中服之立出

斷產方

**大**斷子法

用白麩麩一升無灰酒五升打作糊煮二升半用絹帛濾去渣作三服候前月經將來日晚下吃一服次日五更吃一服天明吃一服月經即行終身絕子

**大**斷產驗方故黍昏方圓一尺燒為末酒飲調服終身不復懷孕又方油煎水銀空心服如棗核大一丸永斷不

損人

胎自墮

虛熱

**大**陽施陰化胎孕乃成血氣虛損不足營養其胎自墮或勞怒傷情內火便動亦能墮胎推原其本皆因於熱火能消物造化自然病原乃謂風冷傷於子藏而墮此未得病情者也予見賈氏婦但有孕至三月左右必墮診其脈左手大而無力重取則瀟知其血少也以其妙年只補中氣使血自榮時正夏初教以濃煎白朮湯下黃芩末一錢服三四十貼遂得保全其生因而思之墮因內熱而虛者於理為多曰熱曰虛當分輕重蓋孕至三月正屬相火所以易墮不然何以黃芩熟艾阿膠等為安胎妙藥耶好生之工幸無輕視

虛寒

**大**治妊娠懷胎數落而不結實

甘草 黃芪 人參 白朮

川芎 熟地 吳茱萸各等分

右為末空心溫酒調二錢忌菘菜荖李雀肉醋物按丹

昔是虛熱而無寒者今姑存此一方以俟施之於千百而一者也

醋附丸治數墮胎方見

姪子不成時時墮胎後漏下五色疼痛灸胞門關門左邊

門右邊二寸名子丸

十月未足欲產過期不產

婦人懷胎有七月八月而產者有至九月十月而產者

有經一年二年乃至四年而後產者各依後法治

知母丸治十月未足而痛如欲產難治產難及子煩用知

母一味為細末煉蜜丸如鷄豈大溫酒嚼下日三服丸如

桐子大飲下二十九

滯氣 針灸

先期欲產者涼血安胎

治姪娠月數未足而似欲產腹痛者

槐子 蒲黃等分

右為末蜜丸如桐子大溫酒下二十九以痛止為度

又方蒲黃如麥核大篩過以井花水調服

子日月未足而欲產者搗葛蒲根汁一二升灌喉中本草云葛

蒲治胎動不安下血

羅治婦過月不產方

四物湯 香附 芫仁 枳殼

縮砂 紫蘇 水煎服即生

難產縮胎法

世之難產者往往見於鬱悶安佚之人富貴養之家

若貧賤辛苦者無有也古方書止有瘦胎飲一論而其方

為湖陽公主作也實非極至之言何者見其有用此方者

過期不產者補血行滯

虛實

其難自若予表妹苦於難產後遇胎孕則觸而去之予甚  
憫焉視其形惟勤於指搆思旬日忽自悟曰此正與湖  
陽公主相反彼奉養之人其氣必實耗其氣使平和故易  
產今形肥知其氣虛又坐知其不運必氣愈弱兒在胞胎  
因母氣不能自運耳當補其母之氣則兒健易產矣令其  
有孕至五六個月來告遂于大全方紫蘇飲加補氣藥與  
數十貼因得男而甚快後遂以此方隨母形色性稟參時  
令加減與之無不應者因名其方曰達生散

氣虛者  
補氣行  
滯

縮胎飲

即達  
生散

大腹皮

三錢

人參

陳皮

紫蘇葉

各五

分

歸身尾

白芍

白朮

各一錢

甘草

二錢

黃楊樹腦

七個

或加枳殼縮砂青葱五葉

右作一貼吞下益母丸臨月得二十服易生產後無病

按丹溪云難產死胎此血氣滯病也蓋此方補中行滯

春加川芎

氣虛倍參朮

氣實倍香附陳皮

血

虛加當歸地黃

形實倍紫蘇

性急加黃連

熱急

加黃芩

濕痰加滑石半夏

食積加山查

食後易

饑加黃楊腦

腹痛加木香官桂黃芩

冬不用芩

黑神丸

一名催生丸  
一名益母丸

用益母草研末粥丸治婦人臨月

一日三次服之用縮砂飲送下能催生易產產後服能生

新血去舊血只以白湯送下虛者煎白朮人參陳皮湯送

縮胎丸八九個月用之

黃芩

夏一兩秋七錢冬半兩炒

白朮

二兩

茯苓

七錢半

陳皮

兩

右末粥丸桐子大

氣實者  
耗氣者

又方候九個月用之

黃芩一兩宜熱藥不宜涼藥性人減半

枳殼炒七錢半

滑石七錢五分臨月十日煎小便秘多時加此一味

白朮一兩

右為末粥丸如桐子大每服三十九空心熱湯下

**保**束胎丸

白朮

枳殼各等分

右燒餅為丸桐子大入月一日食前五十九水下服之至產已

**本**滑胎枳殼散

枳殼

甘草各二兩

右為細末每服二錢百沸湯點服空心食前日三服凡懷孕六七月以上即服令兒易生初生胎少黑一百日肉漸變白此孫真人滑胎易產方抑陽降氣為眾方之冠也

妊娠治衝任脈虛補血安胎內補丸

熟地二兩

當歸一兩微炒

右細末煉蜜丸桐子大每服三四十丸溫酒下上三方諸集皆載在人用之如何耳大率婦人妊娠唯在抑陽助陰素問云陰搏陽別謂之有子蓋關前為陽關後為陰尺中之脈按之搏手不絕者任身也婦人平居陽氣微盛無害及其妊子則方閉經隧以養胎若陽氣盛搏之則經脈妄行胎乃不固素問所謂陰虛陽搏謂之崩也抑陽助陰之方甚多然胎前藥唯惡羣陰若陰陽交雜別生他病唯是枳殼散所以抑陽四物湯所以助陰故爾枳殼散差寒若早服之恐有胎寒腹痛之疾以內補丸佐之則陽不至強陰不至弱陰陽調勻有益胎孕此前人未常論及

**本**榆白皮焙乾為末婦人妊娠臨月日三服方寸七令產

雜方

極易產下兒身皆塗之信有效

臨產坐草法

欲產之婦脈離經沉細而滑也同名夜半覺時應分

難經云一呼三至曰離經一呼一

至曰離經一呼一來辰日午定知生

難經云一呼一身重躰熱寒又頻舌下之脈黑復青及舌

中則生也上冷子當死腹中須遣母歸冥面赤舌青細尋看母活子

死定難應唇舌俱青沫又出子母俱死總高拚面青舌赤

沫出頻毋死子活定知真不信若能看應驗尋之賢哲不

正候

十產論○一曰正產者婦人懷胎十月滿足忽腰腹作

陣疼痛相次胎氣頓陷至於臍腹痛極乃至腰間重痛穀

道挺逆繼之漿破血出兒子遂生此名正產

未正產

二曰傷產者婦人懷胎未產一月已前忽然臍腹痛疼有

如欲產仍却無事是名試月非正產也但一切產母未有

正產之候即不可令人抱腰亦不可令產母妄亂用力若

兒身未順繞方轉動便教產母虛亂用力使兒子錯落忽

橫忽倒不能正生皆緣產母用力於未當用力之所致也

直待兒子身順臨逼門戶方始用力一送令兒下生此名

傷產

右傷產一法最為切要慎勿輕忽也凡十月未足臨產

腹痛或作或止或痛不甚皆名曰弄痛非正產之候或

腹雖痛甚而腰不甚者非正產之候胎高未陷下者非

正產之候穀道未挺逆者非正產之候水漿未破血未

出者非正產之候漿血雖出而腹不痛者非正產之候

凡未有正產候且令扶行熟忍如行不得或凭物坐之

或安臥之或服安胎藥一二服得安即止慎勿妄服催

生藥餌愴惶致令產母憂恐而挫其志務要產母寬心存養調停亦令坐婆先說解諭之如覺心中煩悶可取白蜜一匙新汲水調下切勿妄亂用力先困其母直待子逼門戶腰重痛極眼中如火穀道挺逆時是正產候方可用力并服催生藥也予男婦於未產一月已前腰腹俱痛全似將產其痛至甚但遇已牌稍止如此者將十餘日計無所出因閱此條遂與安胎藥加參朮數服間與肉味養之由是平復不痛又二十餘日始產一男是時若妄動亂用力并服催生等藥立見危亡矣

見正產候宜催

三曰催生者若婦欲產漿破血下已見是正產候但却未生即可服催生藥以催之忽有經及數日產母困苦亦可服藥助產母之正氣令兒速生此名催生

冬產宜常溫煖

四曰凍產者冬月天冷產母經血得冷則凝以至兒子不

夏產宜適溫涼

能生下此害最深若冬月產者下部不可脫去綿衣并不可坐臥寒處當滿房着火常有煖氣令產母背身向火令臍下腿膝間常煖血得熱則流散使兒易生此名凍產

五曰熱產者盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼傷損胎氣亦不可人多熱氣逼襲產母使產母血沸而有發熱頭痛面赤昏昏如醉乃至不知人事此名熱產

正橫產宜

六曰橫產者兒先露手或先露臂此由產母未當用力而用之過也兒身未順用力一逼遂至身橫不能生下當令產母安然仰臥後令看生之人先推其手令入直上漸漸逼身以中指摩其肩推上而正之或以指攀其耳而正之須是產母仰臥然後推兒徐徐正之候其身正煎催生藥一盞吃了方可用力令兒下生此名橫產

順倒產宜

七曰倒產者產母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒

子不能廻轉便直下先露其足當令產母仰臥令看生之人推其足入去不可令產母用分毫力亦不得驚恐使兒自順云

正偏產宜

八曰偏產者兒身未正產母用力一逼致令兒頭偏柱左腿或偏柱右腿故頭雖露偏柱一畔不能生下當令產母仰臥次令看生之人輕輕推兒近上以手正其頭令兒頭頂端正然後令產母用力一送即便生下若是小兒頭後骨偏柱穀道只露其額當令看生之人以綿衣炙溫裹手於穀道外方輕輕推兒頭令正便令產母用力送兒生也此名偏產

礙礙產宜

九曰礙產者兒身已順而露正頂不能生下蓋因兒身回轉肚帶攀其肩以此露正頂而不能生當令產母仰臥令看生之人輕輕推兒近上徐徐引手以中指按兒肩下撥其肚帶仍須候兒身正順方令產母用力一送使兒生下此名礙產

右橫產倒產偏產礙產四法若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命也按倒產者今世往往隨其倒足生下並無後患子母雙全不必依推足上之法亦可又礙產者往往肚帶有纏在兒頂上而兒頭自出在產門外看生之人以手撥其肚帶從兒頭頂過而下之者又有肚帶纏在頂上一匝而兒與胞衣自然同下者皆無妨不必以此礙產法入產門裏撥下之也

坐產法

十曰坐產者言欲臨產時高處繫一手巾令產母以手攀之輕輕屈足坐身令兒生下非坐在物上也此名坐產

盤腸產

十一曰盤腸產者趙都運恭人每產則大腸先出然後產

禁忌

子產後其腸不收甚以為苦名曰盤腸產醫不能療偶在建昌得一坐婆施一法而收之其法以醋半盞新汲冷水七分調停喫產母面每喫一縮三喫收盡此良法也

產後腸不收香油五斤煎熱盛盆俟溫坐油盆中約一頓食時以皂角末吹入鼻中嚏作立上妙門

催生法

大凡生產自有時候未見時候切不可強服催生滑胎等藥或勢不得已則服之又云切不可坐草及令坐婆亂

下手凡催生藥必候腰痛甚胎前下葉血破方可服

四催生只用佛手散最穩當又快捷方見婦人通論即歸湯

滑以流通滯

催生如聖散黃蜀葵子小半合一方二錢重研爛以酒瀝去查溫服神妙或漏血胎乾難產痛極者并進三服良久腹中氣寬胎滑即產須見正產候方可服之歌曰黃葵子炒七十粒 細研酒調濟君急 若遇臨危產難時 免得全家俱哭泣

又方以香油白蜜小便可勻各半盞調益母草末服一方止用油蜜小便能下難產

秘錄治橫產不得出車前子末酒服二錢匕

六催生柞木飲子治產難或橫或倒死胎爛脹腹中此方屢用神効

苦以驅逐閉塞

大柞木枝洗淨一尺甘草大者五寸

右用新汲水三升半同入新磁瓶內以紙三重緊封之文武火煎至一升半令香候產婦腰重痛欲坐草時溫

飲一小盞腰未重痛勿服便覺心下開豁如覺再渴又飲一盞至三四盞覺下重便生此方至驗

**梅**治難產礙胎在腹中如已見兒胎衣不出胎死者痰藜子貝母各四兩為末米飲下一匙如相去四五里許不下再服

香以開  
血逐汚

又方通明乳香一塊如皂角子大為末腰痛時用新汲水一小盞入醋少許同冷令產母兩手提兩石燕坐婆調藥飲水須臾坐草便生痛楚神良又方開骨膏乳香研

細五月五日午時滴水丸如鷄頭大每服一粒無灰酒吞下又方催生神助乳珠丹乳香研細以猪心血為丸如桐子大硃砂為衣晒乾每服一粒冷酒化下良久未下再服一粒如大段難產以蓮葉燒煎水二盞煎至一盞放溫化下一粒良久未下亦可再服此藥靈驗如神合藥

時五月五日午時七月七日三月三日効又方乳香硃

砂等分為細末麝香酒調下又方腰疼可服乳香人參各一錢辰砂半錢同研細用鷄子清一個調之生姜自然

汁放開冷服如橫生倒生即時端順子母平善

**大**勝金散問曰產難若何答曰胎側有成形塊為兒枕子欲生時枕破與敗血裹其子故難產但服此藥逐其敗血即自生逆生橫生並治之

麝香錢一 鹽豉一兩以青布裹了燒紅急研細

右為末取秤鍾燒紅以酒焯之調下一錢

催生丹治產婦生理不順產育艱難或橫或逆並皆治之

十二月兔腦髓去皮膜研如泥 乳香另研極細二錢半

母丁香末錢一麝香另研

右三味拌勻以兔腦髓和丸如鷄頭大陰乾油帛裹每

服一丸溫水下即產兒握藥出

勝金丹治難產神妙敗兔毫筆頭一枚燒為灰研細搗生藕汁一盞下之立產若產母虛弱及素有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器內重湯煖過後服

氣滯者行氣

主難產搗益母草取汁七大合煎半頓服立下無新者以乾者一大握水七合煎服

易產天麻丸

天麻即益母草六月間帶根採晒乾

右為末不拘多少煉蜜丸如龍眼大臨產時熟水嚼化一丸能除產後百病

難產

縮砂

香附醋炒

枳殼

甘草

滑石

右為末白湯調服

催生蒲黃地龍陳皮等分地龍洗去土於新瓦上焙令微

黃各為末臍足心三處貼如經日不產各抄一錢七新水調服立產此常親用甚妙

大催生神効七聖散臨產腰痛方用之

玄胡索

沒藥

白礬

白芷

姜黃

當歸

桂心

右為細末臨產陣痛時燒掣頭鉄通赤粹酒調三錢服一二盃立產

難產吞槐子十四枚逆產燒銅錢通紅放酒中飲之

胞漿先破疲困者固血

大治胞漿先破惡水來多胎乾不得下時須先與四物湯補養血氣次更煎濃葱湯放冷令坐婆洗產戶須是欵曲

洗令氣上下通暢更用酥調滑石末塗產戶裡次服神妙

乳珠丹或葵子如聖散

二方見前

催生如聖散治逆產橫生瘦胎

百草霜

香白芷

不見火為末

右二味等分研勻每服二大錢於臨產時以童子小便并少米醋打為膏沸湯調下集驗方用酒童便各半蓋同煎纔沸即熱服不過再服丹法用芎歸湯調血得生得乾

清胎方

又方治橫倒生者

明阿膠炒

滑石末

各一兩 葵子二兩

右水一盞半煎至一盞去渣分二服

治難產五六日不得分娩者疲困虛乏光明水膠二兩用好酒一升半微火焙膠入新鷄子一個鹽一錢七攪溫令產母坐椅上伸腰大口作二次服覺小便重便生緣坐草早驚動故也

破汚血方

半夏湯治胎乾而不能產

半夏一兩

大黃五錢

肉桂七錢

菝仁三十個

右為粗末先服四物湯一二服次服半夏湯生姜三片

水煎服 又方當歸為末調方寸匕酒服之

去取方

如聖膏治難產併治胞衣不下兼治死胎

葶麻子七粒去殼細研成膏塗脚心胞即下速洗去

不洗腸出却用此膏塗頂上腸自縮入一方葶麻子百粒雄黃一錢細研用如上法塗之

催生萬金不傳遇仙丹

葶麻子十四粒

去殼

硃砂

雄黃各一錢半

蛇蛻一尺

燒

石為末漿水飯和丸如彈子大臨產時先用椒湯淋滌臍下次安藥一丸於臍中用蠟紙數重覆上以潤帛繫二須生下急取去藥一丸可用三次一方葶麻子三粒

雜方

**世**三麻四荳脫衣裳研碎將來入麝香若有婦人遭產難貼在臍中兩分張用草麻子三粒巴荳四粒去壳入射研細貼在臍中

治產危急者立聖丹寒水石四兩內二兩生二兩煨赤取出同生者研細入硃砂同研如深堯花色每用三分井花水調如薄糊用紙花剪如杏葉大攤用貼臍心候乾再易不過三上便產橫逆惡候死胎不下並治神驗寒水石非方解石也即今人謂軟石膏也此方國初異人傳之妙

**圖**經催生令產婦兩手各握石燕一枚須臾子下

救產難經日不生雲母粉半兩温酒調服入口即產萬不失一陸氏云已救三五百人効 治橫逆產理不順用伏龍肝細研每服一錢酒調服之以土着兒頭上戴出妙

**世**如神散治催生累効靈妙於理固難通於事實殊効臨產時令人路上尋草鞋一隻取耳燒灰温酒調下三錢七

針灸

得左足者生男右足者生女覆者兒死側者有驚此藥委是神奇用此送下催生丸尤妙

**東**婦人將產預先胎破惡水長流坐草早無血可養枯竭

**獨陰**五分在足小指第三節間 承陰一寸五分

**下**催生難產及死胎 太衝八分補 合谷補 三陰交

五分瀉立 足小指節三壯心術 產子上衝逼心 巨

時分解 關令正坐用抱頭抱腰微偃針入六分留七呼得氣即瀉

是向後枕骨有痕 合谷三分留三 三陰交五分瀉

**張仲文** 橫產難產 右腳小指尖頭灸三壯

**集**又法 獨陰同上法取灸 合谷補 三陰交瀉

**桑**難產 三陰交

下死胎法

大下死胎法方用桂枝二錢麝香當門子一個同研煖酒

以塞者熱行之

熱者寒以行之

服須更如手推下比之用水銀等此藥不損血氣趙和叔傳一方無麝香單用桂末一錢痛時童便調下名救苦散

鄧知縣傳療死胎不出朴硝研細半兩以童便溫服下屢効治死胎不下指甲青舌青脹悶口中作屎吳先以平胃散一貼作兩服每服酒水各一盞煎至一盞却投朴硝半兩研細再煎三五沸溫服其胎化血水下治子死腹中不出其母氣欲絕水銀二兩吞之立効

燥者滑以潤之

本治子死腹中不用辰砂一兩以水煮數沸末之然後取酒服之立出

外療子死腹中真珠二兩為末酒調服盡立出

粉草

黃芩各半兩

右為粗末每服四錢水煎

雲治妊娠三五個月胎死在腹中不出

大腹子 赤芍藥 榆白皮各三兩 當歸一兩 滑石末七錢 瞿麥 葵子 茯苓

猪脂升

白蜜

淳酒升

右三味合煎取二升分溫二服不能飲隨所能服之

世治生產不順胎死腹中胞衣不下臨產危急妙

蛇退

一條全者香油燈上燒研

麝香少許

右為末童便酒各半盞調一服即生効

楊氏療有孕月數未足子死腹中母欲悶絕取大豈三升

雜方

醋煮濃汁三升頓服立瘥

本治妊娠熱病胎死腹中鹿角屑一兩水一盞葱五莖豈豉半合同煎至六分去查温分二服

大取死胎烏鷄一隻去尾細剉以水三升煮取二升去鷄通手用衣帛蘸摩臍下胎自出

產後症

胞衣不下

血暈

血不下

血不止

虛弱

無乳

乳汁自出

陰脫

血塊痛見腹門

產後必用方

大凡生產畢令飲童便一盞不得便卧且宜閉目而坐須更上床仰卧不宜側卧宜堅膝末可伸足高倚床頭厚鋪茵褥遮圍四壁使無孔隙免致賊風兼時時令人以物從心捍至臍使惡露不滯更三日內令產婦常聞醋炭氣或燒乾漆烟芒 漆以舊漆器燒之以防血暈不問腹痛

不痛有病無病以童便和酒半盞温服五七服妙陳藏器云清淨

汁與產婦服之將苧麻與產婦枕之止血暈產婦腹痛以苧安腹上則止

產後當大補血氣為先雖有雜症以末治之

熱多者宜清之

地黃丸治產後腹痛眼見黑花或發狂如見鬼狀或胎衣不下失音不語心胃脹滿水穀不化口乾煩渴寒熱往來口内生瘡咽喉腫毒心中忪悸夜不得睡產後中風角弓反張面赤牙關緊急或崩中如豚肝臍腹疔痛煩躁恍惚四肢腫滿及受胎不穩唇口指甲青黑

生地

研取汁

生薑

各二斤研取汁

蒲黃

當歸

各四兩

右於銀石器內取生地黃汁炒生薑滓以生薑汁炒地黃查各令乾四味同焙研為細末醋煮麩糊為丸如彈子大每服一丸食前當歸酒化下神妙一方只用生薑

生地無蒲黃當歸依交加法制之為末每服三錢溫酒調下

**黑神丸**產後服之能生新血去舊血用白湯送下虛者

參朮陳皮湯送下方見催生門益母膏治產婦一切傷損一

切血病方見調經門

**大**凡婦人因暑月產乳取涼太多得風冷腹中積聚百病

兢起迄至於死百方不差桃仁煎主之出蓐後服之

桃仁一千二百枚去皮尖及双仁熬令黃色

右一味搗令極細熟以上等酒一斗五升研三四遍如

作麥粥法以極細為佳納小長項窰窰中密塞以糊封

之納湯中煮一伏時不停火亦不令火猛使瓶口常出

在湯上勿令沒之熟訖溫酒服一合日再服

寒多者宜溫之黑神散治婦人產後惡露不盡胞衣不下攻衝心腹痞滿

熟地 蒲黃炒 當歸 乾姜泡

桂心 芍藥 甘草各四兩 黑荳炒去皮半升

右為細末每服二錢酒半盞童便半盞同煎調服

右黑神散寒多及秋冬者宜之若性急形瘦及夏月宜

審之

**胎前母滯** 產後母虛 產後一切皆不可發表 產

後不可用芍藥以酸寒伐生發之氣故也

**大**不可吃物過多恐成積滯若未滿月不宜多語喜笑驚

恐憂惶哭泣思慮急怒強起離床坐久行動或作針工恣

食生冷粘硬油膩魚肉之物及不避風寒當時未覺滿月

之後即成蓐勞凡產後滿百日乃可交合不爾至死虛羸

百病滋長慎之凡婦人患風氣臍下虛冷莫不由早行房

也  
或曰初產之婦好血已虧汚血或留彼黑神散非要藥乎荅曰至哉乾元萬物資生理之常也初產之婦好血未必虧汚血未必積藏府未必寒何以藥為飲食起居勤加調護何病之有誠有汚血體怯而寒與之數貼亦自簡便或有他病當求病起何因病在何經氣病治氣血病治血何用海制此方例令服餌設有性急者形瘦者本有怒火者夏月坐蓐者時有火令姜桂皆為禁藥至于將護之法尤為悖理肉汁發陰經之火易成內之病也先哲具有訓戒胡為以羊鷄濃汁作糜而又常服當歸丸當歸建中湯四順理中丸雖是補劑並是偏熱臟腑無寒何處消受若夫兒之初生母腹頓寬便啖鷄子且吃夥益不思鷄子難化夥益發熱展轉生証不知所困率爾用藥寧不悞人

診

予每見產婦之 不者必教之以却去黑神散與夫鷄子夥益諸品肉食且與白粥將理間以此少養魚煮令淡食之半月後方與少肉若鷄子亦須豁開淡煮大能養胃却疾彼富貴之家驕恣之婦卒有白帶頭風氣痛膈滿痰逆口乾經事不調髮禿躄皆非是陽盛陰虛之病天生血氣本自和平曰勝曰虛又烏知非此等繆迷有以兆之耶  
脈診婦人生產之後寸口脈洪疾不調者死沉微附骨不絕者生 診婦人新生乳子脈沉小滑者生實大堅弦急者死

數血

胞衣不下

大奪命丹治血入胎衣衣為血脹不得下  
附子 炮半 牡丹 兩一 乾漆 一分碎之  
右為末以醞醋一升大黃末一兩熬成膏和藥丸如桐

子大温酒吞五七丸不拘時此藥逐去胞中之血血散  
脹消胞衣自下矣

花蓋石散治產後氣欲絕緣敗血不盡血迷血暈惡血奔  
心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭煖急以童便調一  
錢取下惡血如猪肝終身無血風血氣疾膈上有血化為  
黃水即吐出或從小便出也方見跌撲傷損黑龍丸治胞衣不  
下神效方見產後黑神散治惡露不快胞衣不下方見產通

牛膝湯治胞衣不出臍腹堅脹急痛即殺人服此藥胞即  
爛下死胎亦下

牛膝

瞿麥各四兩

當歸三兩

通草六兩

滑石八兩

葵子五兩

右咬咀以水九升煮三升分三服若衣不下腹滿即殺

人推其源皆胞衣有血奔心是以不出服此藥衣即爛  
出

治胞衣不出牛膝一兩葵子一合以水一升煮半升去查  
分二服

**備急丹**治產後惡血衝心胎衣不下腹中血塊以錦紋  
大黃一兩為細末用醎醋半升同煎如膏丸如桐子大患  
者用醋七分蓋化五丸至七丸服之須臾血下即愈

**保胎衣**不下或子死腹中或血衝上昏悶或血暴下及  
胎乾不能生產半夏湯主之見前催生條

下胎丸

白欬各半兩

右細末丸如桐子大食後半夏湯下三十九漸加至五  
十九如未効者須廣大其藥榆白皮散主之又効大  
聖散主之有宿熱者宜服人參荊芥散

雜方

**大治胞衣不下**惟有花蓋石散一件最為要緊若鄉居藥局遠者倉卒無之今採得胡氏方一妙法若產訖胞衣不下稍久則血流胞中為血所脹上衝心胃喘急疼痛必致危篤若有此証宜急斷臍帶以少物繫帶必用力牢固繫之然後截斷使其子血脈不潮入胞中則胞衣自當痿縮而下縱淹延數日亦不害人只要產母心懷安泰終自下矣累試有驗 治胞衣不下以蛇退炒為細末酒下二錢

如聖膏

方見胎前催生即麻子法

若胞衣不下腹脹則殺人黑

荳一合炒熟入醋一盞煎去荳分三服 胞衣不下取竈內黃土一寸研碎同醋調勻內於臍中續煎甘草湯三四合服之出

針灸

**山胞衣不下**用取初洗兒湯服下一盞勿令產母知  
**集胞衣不下** 三陰交 中極各瀉之

**標幽**又法 照海 內關

**甲**女子字難若胞不出崑崙主之

產後血暈

表

**仲**問曰新產婦人有三病一者病瘧二者病鬱胃三者大便難何謂也師曰新產血虛多汗出喜中風故令病瘧亡血復汗寒多故令鬱胃亡津液胃燥故大便難產婦鬱胃謂血暈也

**大**產後血暈者氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷亂心神故眼前生花極甚者令人悶絕不知人口噤神昏氣冷但服清魂散即醒

澤蘭葉

人參各二錢半

荆芥兩

川芎兩半

甘草一兩先方無

右為末用溫酒熱湯各半盞調一錢急灌之下咽即開

眼氣定省人事

保治產後風虛血暈精神昏昧荆芥散

荆芥一兩 苑仁五錢

右細末溫水下三錢微喘加杏仁炒甘草各三錢

治產後血暈用荆芥穗為末童便調下二三錢極妙驗  
產後血暈身痠直戴眼口角與目外眦向上牽急不知  
人取鷄子一枚去殼取清以荆芥末二錢調服遂仍依次  
調治若無他疾則不須治甚敏捷

右荆芥例氣虛人不宜服

血

下血多而暈者但昏悶煩亂而已當補血下血少而暈  
者乃惡露不下上搶於心心下滿急神昏口噤絕不知人

當破血行血

下血少而暈者

婦人產後血暈此乃虛火載血漸漸暈將上來用鹿角

宜破血

燒灰出火毒研極細用好酒童便調灌下一呷即醒此物  
行血極効

獨行散治產後血暈昏迷不省衝心悶絕五靈脂半生  
半炒各二錢為細末溫酒調下二錢口噤者幹開口灌之  
入喉即愈 一方加荆芥等分為末童便調下

治下胎或產後血上衝心已死用鬱金燒存性為末二  
錢醞醋一合調灌之立活

產後血暈心悶氣絕紅花一兩搗為末分作二服酒二  
鍾煎取一鍾併服如口噤幹開灌之速効 一方用紅花

三兩新者無灰酒童便各半升煮取一盞服之  
治血暈蘇木三兩細剉水五升煮取二升分再服瘥無

蘇木方取緋衣煮汁服之亦得  
產後血暈不知人及在語麒麟竭一二兩細研為末非時

溫酒調下二錢七

**保**紅花散治產後血昏血暈血崩及月事不勻遠年乾血氣

乾荷葉 牡丹皮 川歸 紅花

蒲黃炒等分

右細末每半兩酒煎和查溫服如胎衣不下榆白皮湯調半兩立効

右破血輕劑

**無**牡丹散治產後血暈悶絕口噤則斡開口灌之

牡丹皮 大黃煨 芒硝各一兩 冬瓜子半合

右剉每服五錢水三鍾煎至一鍾半去查入硝又煎分二服

產書治產後心煩手脚煩熱氣力欲盡血暈連心頭硬及寒熱不禁接骨木破之如算子一握以水一升煎取半升分溫二服或小便數惡血不止服之即瘥此木煎三遍其  
卷廿四卷尾產後多怪一頂金湯  
乃灵死方，牡丹散也

丹心至死者但以童便  
無神散治產後血暈用

細酒調服佳方見產通用

右二方寒多者用之

芎歸加芍藥湯治產後去血過多而暈方見產後血不止

**保**又方治產後血暈危困

生地汁一大盞 當歸半錢 赤芍藥半錢

右水煎三五沸溫服如覺煩熱去當歸入童便半盞服

溫酒調下二錢七

紅花散治產後血昏血暈血崩及月事不勻遠年乾血氣

乾荷葉 牡丹皮 川歸 紅花

蒲黃炒等分

右細末每半兩酒煎和查溫服如胎衣不下榆白皮湯調半兩立効

右破血輕劑

無牡丹散治產後血暈悶絕口噤則斡開口灌之

牡丹皮 大黃煨 芒硝各一兩 冬瓜子半

菟仁三十粒去皮尖

右剉每服五錢水三鍾煎至一鍾半去渣入硝又煎分二服

產書治產後心煩手脚煩熱氣力欲盡血暈連心頭硬及寒熱不禁接骨木破之如算子一握以水一升煎取半升分溫二服或小便數惡血不止服之即瘥此木煎三遍其力一般此是起死之方

右重劑血點滴不出者宜用

下血多血暈者宜補血

大花葶石散治產後氣欲絕惡血奔心至死者但以童便

調一錢取下惡物極妙方見跌撲傷損 黑神散治產後血暈用

細酒調服佳方見產通用

右二方寒多者用之

芎歸加芍藥湯治產後去血過多而暈方見產後血不止

保又方治產後血暈危困

生地汁一大盞 當歸二錢半炒 赤芍藥二錢半到

右水煎三五沸溫服如覺煩熱去當歸入童便半盞服

之

治產後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷氣欲絕  
新羊血一盞飲之日三服妙

大產後忽冒汗出不識人者暴虛故也破鷄子三枚吞  
之便醒若未醒可與童便一升甚驗 若產後去血多者  
又增此疾與鷄子不醒者可急作竹瀝汁一服五合須臾  
不定再與五合類與三五服痊

婦人年三十餘面白形長心中長有不平事忽半夜誕  
子絕分娩後侵晨暈厥不知人遂急於氣海灼艾十五壯  
而蘇後以參朮等藥兩月方安

一產婦鬱胃其脈微弱不能食大便反堅但頭汗出所  
以然者血虛而厥厥而必冒胃家欲解必大汗出以血虛  
下厥孤陽上出故但頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血

氣虛

陽盛陰

虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食小柴

胡湯主之

醫胃即  
暈也

雜方

治產後血暈全不省人事極危殆者用韭菜切入有嘴  
瓶內煎熱醋沃之便密封瓶口以瓶嘴向產婦鼻孔令醋  
氣透入須先扶病人起坐即醒 又方如覺暈即以醋噴  
面醒來即與醋細細呷之又以醋塗口鼻并置醋於傍使  
常聞其氣 又法治血暈去者急取乾漆燒取烟以向鼻  
即醒如無乾漆舊漆器亦可 又方治產後血暈用生半  
夏末少許吹入鼻中

本治胎後血上衝心生姜五片切以水八升煮取三升分  
三服

醋墨防產時血暈好墨半錠火燒赤投醋中如此三遍  
出火毒研細每服五分淡醋湯調下

針灸

摘產後血暈不省人事 三里 支溝 三陰交此穴無

標又法 陰交 陽別

世又法 神門 內關不應取 關元灸

產後血不下

汚血

保治婦人惡血不下

當歸炒 芫花炒等

右為細末每服三錢酒下又用好墨醋碎末小便酒下

妙

大產後惡露方行而忽然斷絕驟作寒熱臍腹百脈皆痛如以錐刺

當歸分 桂心 芍藥各半 桃仁去皮炒

沒藥研各 蜜虫去翅 水蛭炒各三

右為末醋糊丸如豌豆大醋湯下

右峻劑

治產惡露不下

乾荷葉二 鬼箭羽 菝仁 劉寄奴

蒲黃各

右為粗末每服三大錢以童便一大盞姜二片生地一分搥碎同煎至六分去渣無時熱服

治產後血不下蒲黃三兩水三升煎取一升頓服

治產後血不下益母草搗絞汁每服一小鍾入酒一合

溫攪勻服

千生產後血不去麻子五升酒一升浸一宿明日去渣溫

服一升不瘥再服一升不吐不下不得與男子通一月將

養如初瘥

寒滯

大黑龍丸治產後一切血疾產難胎衣不下危急惡疾垂

死者但灌藥得下無不全活神驗不可言

當歸 五靈脂 川芎 良姜

熟地各三兩

右細剉入沙礮中赤石脂泔縫紙筋鹽泥固濟炭火十斤煨令通赤去火候令取開看成黑糟色取出細研却入後藥

百草霜錢五 硫黃 乳香各一兩 花蕊石

琥珀各三錢

右五味並細研如桐子大頓服立効  
產後血不止

芎歸加芍藥湯治產後血崩眩暈不知人事

川芎 當歸 芍藥各等分

右咬咀每服四錢以水一鍾半煎至七分去查無時熱

虛

服

產後血崩如荳汁紫黑過多者四物湯加蒲黃生地汁

阿膠薊根艾白芷煎服

寒 虛中有

四七二孺人產後冒寒哭多血再下身潤脈沉

當歸 白朮 陳皮 川芎

乾姜 黃芩各二錢 芍藥錢一 甘草些

右分二貼煎服

滯 虛中有

王孺人因憂慮墮胎後兩月餘血不止腹痛此躰虛氣滯

惡物行不盡

陳皮錢一 白朮錢二 芍藥錢一 木通

川芎分五 甘草分二

作湯下五芝丸六十粒食前

治產後惡血不盡或經月半歲升麻三兩清酒五升煮

陷下者 舉之

脫者盛之

取二升半分温再服

雲牡礪散治產後惡露淋瀝不絕心悶短氣四肢乏弱頭目昏重煩熱

牡礪

川芎

熟地

茯苓

龍骨

續斷

當歸

艾葉

五味

人參

甘草

地榆

右為末每服三錢生姜三片枣一枚水同煎食前

汚血

產書產後猶有餘血水氣者宜服頭淋酒黑豈五升熬令烟盡於甕器內以酒一斗焯之

右頭淋酒治汚血又能發表也

治產後惡血不絕腹中絞痛氣息急

亂髮

阿膠

代赭石

乾姜

馬蹄

乾地黄

牛角腮

右為細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下三四十九日

二服

寒

治產後崩中下血不止莖蒲一兩半剉酒二鍾煎一鍾去渣分三服食前温

雜方

丹產後血崩取木月及斤者或半斤者燒灰為末用麝香一錢枳殼去穰內用濕紙包煨令香熟研細入藥每用一

錢烏奔湯下

右木月蓋木耳之類木屑疊也按木耳治崩中滯下效

本產後下血不止炙桑白皮煮水飲之

秘錄治胎落下血不止以桑木中蝎虫燒末酒服方寸七

日二服

產後虛弱

丹產後補虛

虛熱

人參

白朮各一錢

黃芩

歸身尾各五分

川芎兩半

陳皮三分

右煎服如有寒加乾姜三分茯苓一錢

**保三元湯**治產日久虛勞而脈浮大者方見婦人門大法降乃小柴胡合四

也物

治產後日久虛勞鍼灸不效者三合散此四君子四物小柴胡三方合和是也

白朮

川歸

芍藥

黃芪

茯苓

熟地兩一

柴胡半兩

黃芩六錢

人參半兩

半夏

甘草各六錢

川芎兩一

右為粗末每一兩水一鍾半服日三

**大當歸羊肉湯**治產後雖無疾者但覺虛弱兼心腹痛

肥羊肉一斤去脂水一斗

煮取八升去肉

當歸五兩

黃芪四兩

虛寒

生姜六兩

右以肉汁煮三味取二升五合分為四服若覺惡露不

盡加桂三兩惡露下多加芎三兩有寒加茱萸一兩有

氣加細辛二兩有熱加生地汁二合

**保**治產婦虛勞不能食十全散方見治虛實法氣血糸

**羅**當歸建中湯治婦人一切血氣俱損及產後勞傷虛羸

不足腹中疼痛吸吸少氣小腹拘急痛引腰背時自汗出

方用當歸四兩肉桂二兩甘草二兩白芍六兩姜棗煎服

**雲**治產後虛損飲食不下四物加建中人參白朮茯苓主

之

產後無乳

**大**累經產而無乳者亡津液故也須服滋益之藥以動之

若雖有乳却又不甚多者須服通經之藥以動之仍以羹

虛實

臍引之蓋婦人之乳資於衝脈與胃經通故也大抵婦人素有疾在衝任經者乳汁少而其色帶黃所生之子怯弱多病

**無**乳汁不行有氣血盛而壅閉不行者有血氣弱澁而不行者虛當補之實當踈之踈用通草漏蘆土瓜葷補用鍾乳粉猪蹄鯽魚之屬

實者疎之

**六**治乳無汁

土瓜

漏蘆各三兩

甘草二兩

通草四兩

右水八升煎取二升分溫三服

**集**下乳汁括菱子淘洗控乾炒令香熟瓦上搗令白色為末酒調下一七合卧少時產書下乳汁土瓜為末酒服一錢日三服

**本**下乳汁以京三稜三個水二碗煎取一碗洗取汁下為

度極妙

虛者補之

**婦**人乳不行高苣子糯米各一合細研水一碗攪勻入甘草末一字煎之溫呷頻與妙

**立**効方下乳汁

糯米

高苣子

各半合並淘洗

甘草半兩

右煎汁一升研藥令細去查分作三服立下

又方 猪蹄一隻

通草四兩

右以水一斗煮作羹食之

**羅**湧泉散治婦人乳汁因氣絕少

瞿麥穗

麥門冬

去心

龍骨

川山甲炮黃

王不留行

右為細末每服錢熱酒調下後吃猪蹄羹少許又用水梳於左右乳上各梳三二十梳日三服依前法

又方治癩汁少

瓜蒌根

薄荷幹身等分

右為粗末先吃羊蹄汁一碗次服藥後再吃葱絲羊羹湯少許出効

大有人乳脈不行已十七日諸藥無効遇有人送赤荳一斗遂時常煮粥食之當夜乳脈通行

乳汁自出

虛實

大產前乳汁自出者謂之乳注生子多不育產後乳汁自出蓋是身虛宜服補藥以止之若乳多急痛而出者温帛之漏蘆散亦可

漏蘆二錢半

蛇蛻一條

瓜蒌十個

右為末酒調二錢無時

產後陰脫

虛

一婦人三十餘歲生女二日後產戶一物如手帕下有帕尖約重一斤予思之此因胎前勞乏傷氣成肝痿所致却喜血不甚虛其時歲暮天寒恐冷乾壞了急與炙黃芪半錢人參一錢白朮五分當歸一錢半升麻五分三貼連服之即收上得汗通身乃安但下齋沾席處乾者落一片約五六兩重蓋脂膜也食進得眠診其脈皆潛左略弦視其形却實與白朮芍藥各錢半陳皮一錢生姜一片煎二三貼以養之 一婦人產子後陰戶中下一物如合鉢狀有二岐其夫來求治予思之此子宮也必氣血弱而下墜遂用升麻當歸黃芪大料二貼與之半日後其夫復來曰服二次後覺響一聲視之已收陰戶訖但因經宿乾着席上破一片如掌心大在席某妻在家哭泣恐腸破不可復生子予思之此非腸胃乃糟粕也肌肉破尚可復完若氣血

雜方

充盛必可生滿遂用四物湯加入參與一百貼三年後復有子 治子宮下用黃芪一錢半人參一錢當歸七分升麻三分甘草二分作一貼水一鍾煎至三分去查食前服却用五倍子末泡湯洗又用末傅之如此數次宜多服藥永不下 治陰脫蓋產努力太過致陰脫若脫肛狀及陰挺出逼近腫痛舉重房勞皆能發作清水續續小便淋露用硫黃烏賊骨各半兩五味子一分為末傅患處兼服參芪歸草升麻等補藥 治產後陰下脫人尿燒酒下方寸七日千金無罌蠍皮散加鱉頭炙亦治方見脫肛

治產後陰腫下脫內出玉門不閉石灰一升炒極熱湯二升投灰中適溫冷澄清坐水中以浸玉門斯須平復如故 又方以鉄精粉上推內之又灸臍下橫紋二七壯 一法用鉄精羊脂二味攪令稠布裹灸熱熨推內之鉄精

戶痛 子母療產後陰下脫燒兔頭末傅之

針灸

女人胞胎門落頰不收常濕 神關 玉泉五十壯 身

交臍下指縫中灸五十壯三報 又法 玉泉傍開三寸多隨年壯三報 女

人陰門冷腫 飯來三十壯 甲 婦人陰挺出四肢淫瀼身悶少海主之一作照海



肺病久則虛冷肝強實而反勝肺也宜視病之新久虛實

五藏病證

虛則補母實則瀉子  
肝病哭叫目直視呵欠煩悶項急 心病多叫哭驚悸手

五藏雜診

足動搖發熱飲水 脾病困睡洩瀉不思飲食 肺病悶

亂哽氣長出氣短氣喘急○腎病目無精光畏明體骨重

肺藏怯○唇白色當補肺阿膠散主之若悶亂氣喘促

哽氣者難治肺虛損故也○脾肺病久則虛而唇白脾者

肺之母也母子皆虛不能相營故名曰怯肺主唇唇白而

光澤者吉白如枯骨者死此以唇診肺之法也唇白色者

衣領及亂髮物者肝熱也宜瀉青丸手插

喜仰臥使氣得上下通也瀉心湯主之心氣熱則合面

腎虛○兒本虛怯由胎氣不成則神氣不足目中白睛多

顛解顛開面色既白者皆為難養雖長不過八八之數若

恣色慾不及四旬而亡或有因病而致腎虛者非也又腎

不足則下竄蓋骨重惟欲墜下而身縮也腎者陰也腎氣

虛則畏明皆宜補腎地黃丸主之心氣熱則上竄宜導赤

是也肝病勝肺○肝病秋見一作補肝勝肺也肺怯不能勝肝當

補脾治肝益有母令子實故也補脾益黃散治肝瀉青

丸主之  
肺病勝肝○肺病春見一作肺勝肝也肝怯故受病當補

肝腎治肺補肝腎地黃丸治肺瀉白散主之  
五臟相勝輕重○肝病見秋本旺肝勝肺也宜補肺瀉肝

五藏相勝參見時令

輕者肝病退重者唇白而死

肺病見春金旺肺勝也當瀉

輕者肺病退重者目淡

輕者肺病退重者目淡

輕者肺病退重者目淡

輕者肺病退重者目淡

輕者肺病退重者目淡

輕者肺病退重者目淡

青必發驚更有赤者當搐海藏云為肝怯故曰淡青也

心病見冬火旺心勝腎也當補腎治心輕者心病退重者下竄不語腎怯虛也

腎病見夏水勝火腎勝心也當瀉腎輕者腎病退重者悸動當搐

脾病見四旁皆放此治之順者易治逆者難治脾怯當面赤目黃五臟相反隨證治之

右五臟相勝病隨時令乃錢氏擴充內經藏氣法時論之旨實發前人所未發者也假如肝病見於春及早晨

乃肝自病於本位也今反見於秋及日晡肺之位知肺虛極肝往勝之故當補脾肺瀉肝也餘倣此

肝病宜或已經下有合下者必先實其母後瀉其子也假令肺虛而痰實此可下之症先當益脾後方瀉肺也

五藏補法

瀉青丸又名瀉肝丸導赤散海藏云瀉丙小腸瀉心湯海藏云瀉丁心

安神丸錢氏治心虛痛益黃散又名補脾散海藏云此劑能脾以燥濕東垣云

阿膠散又名補肺散海藏云杏仁本瀉肺瀉白散又名瀉肺散

散海藏云治肺熱骨蒸自汗用此直瀉之梔子黃芩亦瀉肺當以氣血分之

地黃丸海藏云治腎虛解顛即癩病也治脈毛而虛方見勞瘵

微論互臟病

熱則從心寒則從腎嗽而氣上從肺風從肝瀉從脾假令瀉兼嗽又氣上乃脾肺病也宜瀉白益黃散合而服之

脾苦濕肺苦燥氣上逆也其症見瀉又兼面色黃腸鳴嘔吐者宜服理中湯瀉而嘔者宜服茯苓半夏湯如瀉而渴

熱多者宜服黃芩厚朴湯不渴而熱少者宜服白朮厚朴湯其他五臟若有兼症皆如此類推之更詳後論四時推移用藥

醫學綱目卷之三

三

心自病

心主熱自病或大熱瀉心湯主之 實則煩熱黃連瀉心湯主之 虛則驚悸生犀散主之

五邪乘心法

肺乘心微邪喘而壯熱瀉白散主之 肝乘心虛邪風熱煎大羌活湯下大青丸主之 脾乘心實邪泄瀉身熱瀉黃散主之 腎乘心賊邪恐怖惡寒安神丸主之

肺自病

肺主燥自病則喘嗽燥則潤之 實則喘而氣盛瀉白散主之 虛則喘而少氣先益黃散後阿膠散主之

五邪乘肺法

心乘肺賊邪熱而喘嗽先地黃丸中導赤散後阿膠散主之 肝乘肺微邪惡風眩冒昏憤嗽羌活膏主之 腎乘肺實邪增寒嗽清利百部丸主之 脾乘肺虛邪體重吐痰洩瀉嗽人參白朮散主之

肝自病

肝主風自病則風搖拘急肝苦急急食甘以緩之佐以酸苦以辛散之 實則風搖力大瀉青丸主之 虛則風搖

力小地黃丸主之

五邪乘肝法

心乘肝實邪壯熱而搖利驚丸涼驚丸主之 肺乘肝賊邪氣盛則前伸呵欠微搖法當瀉肺先補本臟補肝地黃丸主之瀉肺瀉白散主之 脾乘肝微邪多睡體重而搖先當定搖瀉青丸主之搖止再見後症則別立法治之

脾自病

腎乘肝虛邪增寒呵欠而搖羌活膏主之 脾主濕自病則洩瀉多睡體重昏倦脾苦濕急食苦以燥之 實則泄瀉亦黃睡不露睛瀉黃散主之 虛則泄瀉色白睡露睛白朮散主之

五邪乘脾法

肝乘脾賊邪風瀉而嘔茯苓半夏湯主之 心乘脾虛邪壯熱體重而瀉羌活黃芩蒼朮甘草湯主之 肺乘脾實邪能食不大便而嘔吐嗽煎檳榔大黃湯下葶藶丸 腎乘脾微邪惡寒泄瀉理中丸之類主之

腎

腎自病

腎主寒自病則足脛寒而逆人之五臟惟腎無實小兒瘡疹變黑陷則是腎實水尅退心火

五和乘腎法

心乘腎微邪內熱不惡寒桂枝湯主之 肺乘腎虛邪喘嗽皮溢寒百部丸主之 肝乘腎實邪拘急氣搖身寒理中丸主之 脾乘腎賊邪體重泄瀉身寒理中丸主之

五臟旺四時補瀉

凡五臟虛弱是自已正令不行乃鬼賊之所尅害當補本臟之正氣假令肺病喘嗽時於初春見之法當補腎見於夏救肺見於秋瀉肺見於冬補心瀉本臟又名寒嗽大抵五臟各至本位即氣盛不可更補到所克位不可更瀉云五藏子母虛實鬼賊微正若不達旨意不易得而入焉在前者為實邪在後者為虛邪妻來乘夫為微邪夫來乘妻為賊邪本藏自病為正邪

參照

肝病面白 肺病面赤 脾病面青 腎病面黃 心病面黑 若肝病驚搖而又加面白痰涎喘急之類此

皆難治餘倣此推之假令春分前風寒也宜用地黃羌活防風或地黃丸及瀉青丸相間服之春分後風熱也宜用羌活防風黃芩或瀉青丸導赤散下之立夏後熱也宜用三黃丸導赤散夏至後濕熱也宜用導赤散瀉黃散合而服之或黃芩人參木香之類秋分後用瀉白散立冬後用地黃丸主之謂腎不受瀉也

潔古海藏精錢氏法

補肝丸四物湯內加防風羌活等分為細末煉蜜丸是也

鎮肝丸瀉青丸去梔子大黃治肝虛 瀉腎丸治脈洪而實前熟地改生地山茱萸是也此治左手本部脈若右尺洪實以鳳髓丹瀉之此地黃丸即仲景八味丸去桂附若加五味子腎氣丸也此益肺之源以生腎水焉

禁忌

○慈幼論○人生十六歲已前血氣俱盛如日方昇如月

將圓惟陰長不足腸胃尚脆而窄養之道不可不謹童子不衣裘帛前哲格言具在人耳裳下體之服帛溫煖甚於布者也裘皮服溫軟甚於帛者也蓋下體主陰得寒涼則陰易長得溫煖則陰暗消是以下體不與綿絳交厚溫煖之服恐妨陰氣實為確論血氣俱盛食物異消故食無時然腸胃尚脆而窄若稠粘乾硬酸醃甜辣一切魚肉水菓濕麪燒炙煨炒俱是發熱難化之物皆宜禁絕只與熟菜白粥非惟無病且不縱口可以養德此外生粟味鹹乾柿性涼可為長陰之助然粟太補柿太溢俱為難化亦宜少與婦人無知惟務姑息畏其啼哭無所不與積成痼疾雖悔何及所以富貴驕養有子多病迨至成人筋骨柔弱有食則不能忌口以自養居喪則不能食素以盡禮小節不謹大義亦虧可不慎歟至於乳母尤宜謹戒

乳汁便通情欲中動乳脈便應病氣到乳汁必凝滯兒得此乳疾病立至不吐則瀉不瘡則熱或為口糜或為驚搐或為夜啼或為腹痛病之初來其瀉必少便須詢問隨證治母母安亦安可消患於未形也夫飲食之擇猶是小可乳母稟受之厚薄性情之緩急骨相之堅脆德行之善惡兒能速肖尤為關係古之胎教具在方冊愚奚多贅若夫胎孕致疾事起茫昧人多玩忽醫所不知兒之在胎與母同體得熱俱熱得寒俱寒病則俱病安則俱安母之飲食起居尤當慎密不可不知也

**田**大凡小兒過煖生熱熱極生風提抱生瘧餵飼生癖最宜慎之

**案**大喜後食乳食多成驚癇大哭後食乳食多成吐瀉  
**案**乳下小兒常多濕熱食積痰熱乃是傷乳為病小兒易

怒肝病與脾病最多

雜論

脈亂不治弦急和氣不沉緩傷食促急虛驚浮風沉細冷

候兒脈當以大指按三部一息六七至為平和八九至為發熱五至為內寒脈弦為風癩沉緩為傷食促急為虛驚弦急為氣不和沉細為冷浮為風大小不勻為惡候為鬼祟浮大數為風為熱伏結為物聚單細為疳勞凡腹痛多喘嘔而脈洪者為有虫沉而遲潮熱者胃寒也温之則愈訣曰小兒脈緊風癩候沉緩食傷多嘔吐弦急因知氣不和急促急驚神不守冷則沉細風則浮牢實大便應秘久腹痛之候緊而弦脈亂不治安可救變蒸之時脈必亂不治自然無過繆單細疳勞洪有虫大小不勻為惡候脈沉而遲有潮熱此必胃寒來內寇瀉利脈大不可醫仔細酌量宜審究雲岐子云未及五歲不可視聽者未可別脈五歲已上方可以脈別浮沉遲數按錢氏論

又不拘五歲上下也

嬰兒未可方脈者俗醫多看虎口中紋顏色與四肢冷熱取之亦有可驗予作二歌紀之曰紫風紅傷寒青驚白色疳黑時因中惡黃即困脾端又冷熱症歌曰鼻冷定知是瘡疹耳冷因知風熱證通身皆熱是傷寒上熱下冷傷食病若能以色脈參伍驗之所得亦過半矣

不治症

世百日內不治症 發斑 臍風撮口 馬脾風 龜背

錢不治症目赤脈貫瞳人 胸腫及陷 鼻乾黑 魚口

氣急 吐虫不定 瀉不定精神不好 大渴不定止之

又渴 吹鼻不噴 病重口乾不睡 時氣唇上青黑點

頰深赤如塗臙脂 鼻孔開張 喘急不定

嬰兒病其頭毛皆逆上者必死論疾診尺篇

脈小兒病困汗出如珠着身不流者死 小兒病而胸陷

口唇枯乾目直視口中氣冷足與頭相低臥不舉身手足四肢垂其臥正直如縛掌中冷皆死至十日不可復治之

生下胎疾

雜方

無小兒初生氣絕不能啼者必是難產或胃寒所致急以綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶且將胞衣置爐炭中燒之仍燃大紙條蘸油點火於臍帶下薰之蓋臍帶連兒火熏時有火氣由臍入腹更以熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可洗浴了即斷臍帶

百壽散小兒初生未滿月已裹用之者老無瘡疥

黃連

硃砂

右水煎令老母拭去口涎淨灌下餘藥傾盆中浴兒遍身搽妙 又方淨黃連一錢水一盞預先煎下待兒生

虛實

未出聲時便用灌下以去腹中惡物臍屎兼解胎中蘊積熱毒終身不生瘡又去臍風等病

胎實面紅目黑睛多者善笑胎怯面黃目黑睛少白睛多者多哭更別父母肥瘦肥不可生瘦瘦不可生肥也

胎肥者生下肌肉厚遍身血色紅滿月以後漸漸羸瘦目白睛粉紅色五心煩熱大便難時時生涎浴體法主之

天麻

蝎尾

硃砂

烏蛇肉

油浸焙乾

木

白礬

麝香

青黛

右研勻每用三錢水三碗桃枝一握并藥五七枝同煎至十沸溫熱浴之勿浴背

胎怯者生下面無精光肌肉薄大便白水身無血色時時哽氣多噦目無精采亦宜以浴法主之

母氣不足則羸瘦而肉薄父精不足則解顱眼白多

寒熱

胎熱生下有血氣時時叫哭身壯熱如淡茶色目赤大便赤黃糞稠急釀乳浴法主之

小兒在胎時因母有熱或恣食酒麪熱毒之物傳於胎中令兒生下面赤眼閉身體壯熱哭聲不止口熱如湯乃胎熱之候也宜生地黃湯

生地

赤芍藥

川芎

當歸

瓜蒌根

右件等分咬咀每服半兩水一盞煎六分產婦亦可服以此抹入兒口中

凡胎熱服藥不可求速效治法當釀乳漸解之若處以涼藥攻之必損脾胃加以嘔吐乃成大患宜服生地黃湯用釀乳小兒胎中有寒生下不能將護再傷於風其候面色青白四肢逆冷手足顫動口噤不開乃胎寒之故或寒

胎黃

氣乘虛入臟作腹疼盤腸內疝胎寒治法見寒腹痛條

田月裏生驚急取猪乳細研辰砂牛黃各少許調抹口中神效乳母服防風通聖散三劑其驚自消

治小兒未滿月驚搖似中風欲死者用辰砂以新汲水濃磨汁塗五心上最效

治胎癩驚風皆可服全蝎頭尾全者用生薄荷葉包外以麻線纏火上灸燥為末別研生硃麝香各少許煎麥門冬湯調下

胎黃

小兒生下遍體面目皆黃狀如金色身上壯熱大便不通小便如栢汁乳食不思啼叫不止此胎黃之候凡有此症乳母宜服生地黃湯仍忌酒麪五辛之物

生下吐

木瓜丸治小兒生下吐者因兒初生下拭口中穢惡不盡咽入喉中故吐木瓜丸主之凡初生急須拭口中令

淨若啼聲一發則咽下多生諸病矣

木瓜

麝香

臙粉

木香

檳榔各等分

右同研細末麪糊丸如小黃米大每服一二九甘草水下無時

四月裏生嘔先用硃砂丸下之如利後用硃沉煎墜其邪氣使穢物自下而不嘔也

月裏生赤肌膚如赤丹塗者先用牛黃散托裏續用藍葉散塗外乳母服泗涼飲子三大劑

右小兒初生下月裏諸疾蓋胎毒之淺者若一二歲後所生之疾乃胎毒之深者宜權法治之

垣李叔和一日問東垣曰中年來得一子至一歲後身生紅絲瘤不救後三四子至一二歲皆病瘤而死敢問何也

生下赤

胎瘤

曰予試思之翌日見叔和曰吾得之矣汝腎中伏火精多有紅絲以氣相傳生子故有此疾遇觸而動發於肌肉之間俗名胎瘤是也汝試視之果如其言遂與滋腎丸數服以瀉腎中火邪補天真之不足忌酒肉辛熱之物其妻以六味地黃丸養其陰血受胎五月後以白朮黃芩二味作散與服後生兒至三歲前症不復作矣叔和曰先生乃神醫也遂從受學其子今已年壯矣

胎癘

丹溪補遺謂小兒心氣鬱而多瘡疽由胎食過而受毒此至論也小兒識見未萌欲想未動心氣何鬱先哲謂乳下小兒常多濕熱與胎食過而受毒又有成胎之時父母氣血有寒熱之偏多能致子之病况形體未堅完盲膜尚脆嫩何為畧而未論向見一人連年疔病新愈而成一男生來三月病熱右腋下陽明少陽之間生一瘡兩平左腋下

相對又生一瘡膿血淋漓無復生意醫者王壽甫以四物湯敗毒散加參以香附為佐犀角為使大料飲乳母兩月而安踰三月忽腹脹生赤疹如霞片取剪刀草汁調晚蚕沙傳之隨消半月胎移入胞囊為腫黃瑩可畏越兩日囊裂開兩丸顯露出清水以紫蘇葉承麩炭細末托之旬餘而合夫以父之久病其母寧無憂鬱之火與疔之餘熱毒致此亦不可不知

胎瘡

張進士次子二歲滿頭有瘡一日瘡忽自平遂患痰喘予視之曰此胎毒也慎勿與解利藥眾皆愕然予又曰乃母孕時所喜何物張曰辛辣熱物是其所喜因口授一方人參連翹川芎黃連甘草陳皮芍藥木通濃煎湯入竹瀝與之數日而安何以知之見其精神昏倦受病特深決無外感非胎毒而何予之次女形瘦性急體本有熱懷

三月適當夏暑口渴思水時發小熱遂教以四物加黃芩陳皮生甘草木通因懶於煎煮數貼而止其後生子二歲瘡疾遍身忽一日其瘡頓愈遂成痰瘡予曰此胎毒也瘡若再作病必自安已而果然若於孕時確守前方何病之有

胎毒

鄭廉使之子年十六初生七箇月患淋病五七日必一發其發則大痛水道狀如黍如粟者約一杯許然後定診其脈輕則澁重則弦視其形瘦而長其色青而蒼意其父必因多服下部藥遺毒在胎留於子之命門而然遂以紫雪和黃柏末九桐子大晒極乾熱湯下百丸以食物壓之又半日痛大作腰連腹水道乃行下如黍如粟者一大碗許其病減十分之八後又與陳皮一兩桔梗木通各半兩作一貼與之又下如黍粟者一合許而安父得燥熱且能

胎癩

病子况母得之者乎予書此以證東垣紅瘤之事此亦熱在血分也

陳氏女八歲時癩病遇陰雨則作遇驚亦作口出涎沫聲似羊鳴予視之曰此胎受驚也其病深癩調治半年亦可安仍須淡味以佐藥功與燒丹丸繼以四物湯入黃連隨時令加減半年而安  
燒丹丸方原本未考按類萃用玄精石輕粉各一錢粉霜硼砂各五分研勻入寒食麩一錢滴水和成餅再用麩裹煨黃取出去麩再研細滴水和丸如米大一歲五九二歲十九溫水送下取下惡物為度未知是否

肝主風

角弓反張

搖頭

偏風

驚搐

驚癇

天弔

眼目

眼白多

雀目疳瘡

赤眼

通睛

偏墜

陰腫囊腫脫囊

疝氣

小便不通

淋病

遺尿

喉痺

風熱

肝有風目連劄不搐有熱則直視亦不搐得心熱則搐治肝瀉青丸治心導赤散 凡病或新或久皆引肝風風動而上於頭目曰屬肝風入於目上下左右如風吹不定兒不任故目連劄也若熱入於目牽其筋脈兩皆皆緊不能轉視故目直視也若得心熱則搐其子母俱有實熱風火相搏故也治肝瀉青丸治心導赤散

角弓反張

風虛

針灸

肝有風甚則身反張強直不搐心不受熱當補腎治肝補腎地黃丸治肝瀉青丸 丹溪云瘥比癩為虛宜帶補多是氣虛有火蕪痰用人參竹瀝治之不用兼風藥此論實發前人所未發湯氏雖云瘥候十無一生蓋未嘗有此法施於人也 國角弓反張鼻上入髮際三分灸三壯 大椎下節間灸

診

三壯  
身軟時醒者為癩身強直反張如弓不時醒者為瘖瘖候十無一生

搖頭

肝風搖頭諸方不載鄭都丞子患七年搖頭三年下血已服百餘方前後所服治搖頭者無非風藥止血者或作痢或作腸風百藥無效予既視其病又知其詳亦不明其標本退而思之乃肝血液盛外有風熱乘之肝屬木盛而脾土為木所克脾與肺是子母俱為肝所勝而血遂漬於大便故便血不止遂處一方但損肝袪風而益脾初亦一時之見只數服而愈十餘日後血止而下白膿遂得以安

犀角屑

甘草各一

瓜蒌根

蛇退皮

防風

釣藤

麻黃

黃芪

羌活

白芍藥

右為末束肉丸食後薄苜湯下只二服作效頭搖即止

便血隨愈次間服胃風湯數日頓除沈舍人子服之亦

驗

食療云蛇脫皮主去風邪明目治小兒一百二十種驚

癩寒熱痔蠱毒安胎絜用 治癩弄舌搖頭者宜用全脫

偏風

全蝎散治小兒驚風中風口眼喎斜言語不正手足偏

廢不舉

全蝎

僵蚕

川芎

黃芩

甘草

桂枝

赤芍藥

麻黃

大麻

大南星

湯泡七次去皮

右為末每服三錢水一鍾半薑七片煎七分温服無

時量大小與之一日三四服忌羊肉

驚搖

按驚搖一也而有晨夕之分表裏之異身熱力大者為急驚身冷力小者為慢驚仆地作聲醒時吐沫者為癩頭目仰視者為天弔角弓反張者為痙而治各不同也

法時補瀉

潮熱變發搖在早晨寅卯時者此肝用事之時也身體壯熱目上視手足動搖口内生熱涎項頸強急此肝旺也

當補腎治肝補腎地黃丸治肝瀉青丸潔古云木之位肝旺也

因潮熱發搖在巳午未時者此心用事之時也心惕目上視白睛赤色牙關緊急口內涎生手足動搖此心旺也當

補肝治心治心導赤散涼驚丸補肝地黃丸潔古云火之位心熱也

廣親宅七太尉方七歲潮熱數日欲愈錢謂父二大王曰七使潮熱將安八使預防驚搖王怒曰但使七使愈勿

才異

言八使病錢曰八使過來日午間即無苦也次日午前果

作搖急召錢治之三日而愈蓋預見其目直視而顯赤必

肝心俱熱更坐石枕子乃欲就冷此熱甚也又肌膚素肥

盛而本實其脈急促故發搖尅言午時者自寅至午皆心

肝用事之時治之乃瀉心肝補腎自安矣

因潮熱發搖在申酉戌時者此肺用事之時也不甚搖而

喘目微斜視身熱如火睡露睛手足冷大便淡黃水是肝

旺當補脾益黃散治肝瀉青丸治心導赤散潔古云脾病以掛其強而後補脾為宜

脾恐木賊害宜先瀉心肝

徐氏子三歲病潮熱每日酉則發搖身微熱而目微斜露

睛四肢冷而喘大便微黃請錢與李同治錢問李曰病何

搖也李曰有風何身熱微溫曰四肢所作何目斜睛露曰

搖則目斜何肢冷曰冷厥心內熱曰何喘曰搖之甚也曰

何以治之曰涼驚丸鼻中灌之必搐止錢又問曰既謂風病温壯搐引目斜露睛內熱支冷及搐甚而喘併以何藥治之李曰皆此藥也錢曰不然搐者心肝實也身微熱者日西肺用事之時也肺主身温今且熱者肺虛也目微斜露睛者肝肺相乘勝也四肢冷者脾虛也肺若虛甚則脾母亦弱木氣乘脾四肢即冷治之當先補脾肺用益黃散阿膠散得脾虛症退然後治其心肝以瀉青丸導赤散涼驚丸治之九日愈

因潮熱發搐在亥子丑時者此腎用事之時也不甚搐而臥不穩身體温壯目睛斜視喉中有痰大便銀褐色乳食不消多睡不省當補脾治心補脾益黃散治心導赤散涼驚丸潔古云皆因大病後脾胃虛損多有此疾傷風發搐因傷風後得之口中氣出熱呵欠煩悶手足動

表裏

搖當發散大青膏主之小兒生來怯弱者多此病也大青膏方

見傷寒

傷風發搐因傷風而得之症同大人傷風寒痰之類當辨有汗無汗陰陽二症用大青膏小續命之類開發則愈

大青膏陰症小續命陽症也

傷寒發搐因傷食後得之身體温多睡多吐不思乳食而發搐當先定搐搐退白餅子下之後服安神丸

傷食發搐謂不因他症忽然而搐此因飲食過度致傷脾胃故兒多睡多吐不思飲食脾胃既虛引動肝風則發搐當先定其搐加羌活防風煎下瀉青丸後用白餅子下其食漸漸用調中九異功散養其氣

百日內發搐真者不過兩三次必死假者頓發不為重真者內生驚癇假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝任乃

日搐

發搐也欲知假者口中氣出熱治之可發散大青膏主之  
及用塗顛浴體法 李司戶孫百日病來搐三五次請衆  
醫治或作天弔或作胎驚或作驚癇皆無應者後錢氏用  
大青膏如荳許一服發之復與塗顛法及浴體法三日而  
愈何以然嬰兒初生肌骨嫩怯一被風傷遂不能任故發  
搐也然頻發者輕以客風在內每遇不任即搐輕則易歇  
故發頻也搐稀者是內臟發病不可救也頻搐者宜散風  
冷故用大青膏亦不可多服蓋兒至小易虛易實多即生  
熱止宜用下塗顛法

麝香

蝎尾去毒為薄苛半

蜈蚣

牛黃

青黛各一

右同研末用熟束肉劑為膏新綿帛上塗勻貼顛上四  
旁可出一指許火上炙手頻慰百日裏外兒可用此塗

顛法

外物驚  
宜苦寒

外物驚宜鎮平之以黃連安神丸若氣動所驚宜寒水

內動驚  
宜甘寒

石丸黃連安神丸黃連安神丸見燥條  
寒水石丸見治法

按外物驚者元氣本不病故治以黃連安神之苦寒氣  
動驚者不因外物驚元氣自有病故治以寒水石安神  
之甘寒也

鎮心丸涼心經治驚熱痰盛

甜硝白者一兩

人參一兩

甘草炙

寒水石燒各一兩半

山藥白者二兩

白茯苓二兩

硃砂一兩

龍腦

麝香各一錢三分

急驚屬  
陽慢驚  
屬陰

凡急慢驚陰陽異證切宜辨而治之急驚會涼瀉慢驚合  
溫補

右急驚症屬水火土實也木實則搐而力大目上目劓

所謂木太過曰發生其動掉眩癩癩是也火實則身熱面赤土實則不吐瀉睡合睛故其治法合涼瀉而用涼驚丸利驚丸之類慢驚症屬木火土虛也木虛則搐而力小似搐而不甚搐經所謂木不及曰委和其病搖動注恐是也謂手足搐動腹注泄心恐悸也火虛則身冷口氣冷土虛則吐瀉睡露睛故其治法合溫補而用羌活膏益黃散有熱者用東垣黃芪益黃散其東垣非錢氏羌活膏治慢驚者謂土虛泄瀉火木乘之謂手掌與腹俱熱之症若火木土俱虛而搖動恐悸注瀉手腹冷者非羌活膏不能治之

急驚屬痰熱慢驚屬脾虛

**急驚**主痰熱當涼瀉之只用降火下痰養血之藥慢驚主脾虛所以多死先實脾土後散風邪只用硃砂安神丸更於血藥中求之如四物四君子東垣黃芪益黃散詳用

驚力不吐瀉

**急驚**因聞大聲或大驚而發搐過則如故此無陰也當下利驚丸主之 小兒急驚者本因熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱大小便黃赤劇則發搐蓋熱甚則風生風屬肝此陽盛陰虛也故利驚丸主之以除其痰熱不可用巴菝及溫藥大下之恐搖虛熱不消也小兒熱痰客於心胃因聞大聲非常則動而驚搐矣若熱極雖不聞聲及驚亦自發搐

**急驚**者陽症也俱腑受病熱痰客於心肺是少陽相火旺經云熱則生風因聞大聲而作蓋謂東方震卦得火氣而發搐火本不動煽得風而動當用利驚丸導赤散瀉青丸地黃丸搐止宜服安神丸

**急驚**內有熱即生風又或因驚而發則目上連劄潮延搐搦身體與口中氣皆熱及其發定或睡起即了了如故

此急驚症也當其搐勢漸減時與鎮心治熱之藥一二服如麝香丸鎮心丸抱龍丸辰砂丸紫雪之類候驚勢已定須更以藥下其痰熱如利驚丸軟金丹桃枝丸之類利下痰熱心神安寧即愈

大黑龍丸治小兒急驚神效方見後急慢驚治條

小黑龍丸治小兒急驚輕者

青礞石兩一 青黛錢一 蘆薈半錢 膽星兩一

右為極細末甘草湯為丸如鷄頭大每一丸薑蜜薄苛

湯下

右二方礞石膽星瀉濕痰之劑為君痰多者宜之

錢涼驚丸

草龍膽兩一 防風兩一 青黛兩各 龍腦研一

黃連末分五 牛黃分一 麝香各一

右為細末麪糊為丸如粟米大每服一二十九金銀泡湯下之

無治陽癇即急驚風

硃砂研一 膩粉 麝香各五 蘆薈

白附子錢各二 甘草錢一 胡黃連錢一 蝎稍七

僵蚕蜜炙十條 金箔七片 赤脚蜈蚣條一

右為末二歲已上服半錢七金錢薄荷湯調下三歲一

錢七如口不開灌入鼻中

勝有方者利之

錢利驚丸 輕粉 天竺黃 青黛各一 黑牽牛頭末半兩

右同研蜜丸豌豆大一歲一丸溫薄荷湯下食後服海

藏云涼驚溫驚利驚自有分別南星胭脂輕粉青黛色

味各有輕重

羅鎮肝丸治小兒急驚風目直上視抽搐昏亂不省人事是肝經風熱也

天竺黃 研

生地

當歸

竹葉

草龍膽

川芎

大黃 煨

羌活

防風 已上各二錢半

右為細末煉蜜丸如雞頭大每服二丸沙糖水化下先服此後服天麻散

右五方瀉肝木之劑為君前二方輕劑通用後三方峻劑必脈有力血氣實者宜之又關氏所謂候搖勢定下其痰熱之類是已

海五福丸治急驚風生蚯蚓一條研爛入五福化毒丹一丸再研如泥煎薄荷湯少許調化旋灌量兒大小加減服之無不效者

五福化毒丹治驚熱涼心驅

生地

熟地 焙各五兩

天門冬

麥門冬 焙各

三

甜硝

玄參

甘草 各二兩

青黛 一兩

右上六味為細末後研入硝黛煉蜜丸如雞頭大每服半丸或一丸食後熟水化下

安神丸 方見治法

鎮心丸 方見前表裏條

右三方甘寒瀉火之劑為君小兒血氣虛而急驚者宜之又潔古關氏所謂候搖止勢減宜安神鎮心之類是已

慢驚方  
小身冷  
曾吐瀉

慢驚因大病後或吐瀉或只吐不瀉變成脾胃虛損遍身冷口鼻氣出亦冷手足時痲癢昏睡露睛此無陽也括萎湯主之

慢驚者陰證俱厥受病蓋小兒吐瀉病久脾胃虛損若不早治則成慢驚名曰瘕瘕似搐而不甚搐也因脾胃虛損故大便不聚當去脾間風先用宣風散導之後用益黃散史君子九平之則其利自止既已失治則脾胃俱虛致被肝木所乘是為慢驚當用溫補羌活膏主之

東都王氏子吐瀉諸醫用藥下之至虛變慢驚其候昏睡露睛手足瘕瘕而身冷錢曰此慢驚也與瓜蒌湯其子胃氣實即開目而身溫王疑其子不大小便令諸醫以藥利之醫留八正散等數服不利而身復冷令錢氏利小便錢曰不當利小便利之必身冷一二日果身冷矣因抱出錢曰不能食而胃中虛若利大小便則脾胃俱虛當身冷而閉目即死今幸胎氣實而難衰也錢氏用益黃散史君子丸四服令微能飲食至日午果能飲食所以然者謂利

大小便脾胃虛寒當補脾不可別攻也後又不語諸醫作矢音治之錢曰既失音何開目而能飲食又牙不緊而口不噤也諸醫不能曉以地黃補腎錢曰此因用涼藥利小便致脾腎俱虛今脾已實腎尚虛故補腎必安治之半月而能言一月而痊

瓜蒌湯

瓜蒌

白甘遂末

右同於慢火上炒焦黃研勻每服一字麝香薄荷湯調服

右瓜蒌湯錢氏治慢驚法脈有力者宜用蓋濕痰積於膈中使風火不得開發而身冷故用瓜蒌湯劫去濕痰使風火得伸而身溫搐止若脈無力者不宜用之便當補脾及溫白丸羌活膏之類

勝無力者溫之

青州白九子治小兒驚風大人諸風

半夏生七兩

南星生三兩

白附子生二兩

川烏生半兩

右為末以生絹袋盛并花水攪出如未出者更以手揉出如有滓更研再入絹袋攪盡為度於磁盆中日晒夜露至曉撇去舊水別用井花水攪又晒至來日早再換新水攪如此法春五日夏三日秋七日冬十日去水晒乾後如玉片研細以糯米粉煎粥清丸菜豈大每服三五丸薄荷湯下癱風酒下並無時

錢氏異功散溫中和氣治吐瀉不思食方見吐瀉

驚啼手足痠癢睡臥不穩四君子加全蝎去尾尖毒炒

釣藤白附子炒等分同煎方見治虛實去脾胃虛弱生風多困

四君子加炒半夏麩沒石子等分為細末入冬瓜子少許

同煎服

溫白丸治小兒脾氣虛困泄瀉瘦弱冷疳洞利及因吐瀉或久病成慢驚瘈瘲

天麻生半兩

白僵蚕炒

白附子生

天南星劉湯洗

乾蝎去毒

乾蝎去毒

乾蝎去毒

乾蝎去毒

右為末湯浸寒食麩為丸如菜豈大仍於寒食麩中養

七日取出用每服五七丸至三十九空心生薑米飲

下暈病勢漸加丸數服之寒食麩謂寒食日煮糜麩取之以始乾時用也

釣藤飲子治吐利脾胃氣弱虛風慢驚

釣藤三分

蟬殼

防風去蘆

人參去蘆

麻黃去節

白僵蚕炒

天麻

蝎尾炒去毒

甘草炙

川芎各一分

麝香一錢

一方有蜆殼

三箇去頭足炙黃

右為末每服二錢水一盞薑三片煎六分溫服量多少

與之寒多者加附子半錢服無時

羌活膏治脾胃虛或吐瀉後為慢驚者亦治傷寒無不效

防風去蘆 川芎 人參去蘆 白附子炮

赤茯苓去皮各半兩 天麻兩 白僵蚕湯浸炒黃

乾蝎炒去毒 白花蛇酒浸焙各一分 川附炮去臍

麻黃去節各二錢 沉香 母丁香

藿香葉 木香各二錢 輕粉 真珠末

牛黃各一錢半 龍腦半兩 麝香 辰砂

雄黃各一錢半 羌活兩

右為細末煉蜜作劑旋丸如芫大每服一二丸食前服或薄荷湯或麥門冬湯化下實熱急驚勿服性溫故也

返魂丹治小兒諸癇潮發瘰癧口眼相引項背強直牙關緊急目直上視及諸病久虛變生虛風多睡者因症

再不解速宜服之在蒸藥

烏犀剉屑 水銀兩半 天麻酒洗焙乾 檳榔各半兩

僵蚕大絲嘴 硫黃兩兩研末入水銀置磁石蓋

白附子炮 川烏炒通赤密烟少許入碗內以

獨活去蘆 乾蝎各 草解炒各 肉桂去麩

當歸酒浸焙 細辛根 防風去蘆 天南星薑汁

黃炒 阿膠梓併 藿香洗去 烏蛇酒浸一

骨去皮 沉香 槐膠 羌活

白花蛇酒浸去皮骨 麻黃去根 半夏薑汁浸

羚羊角鎊 陳皮去白 天竺黃研

木香 人參去蘆 乾薑炮 茯苓去皮

蔓荆子皮白 晚蚕沙微 敗龜板醋酒 藜蘆本

桑螵蛸炒 白芷 何首烏米泔浸

虎骨酒醋塗砂仁白木油浸一枳殼炒去

丁香厚朴去皮薑汁塗蟬殼炒

川芎附子水浸泡石斛去根肉蓯蓉去殼

龍腦雄黃研水硃砂研水飛已

膩粉麝香研各烏雞一隻去狐肝三具已

蠟月內入瓦瓶固濟火金箔三十片

右藥五十八味炮製如法煉密合和搗三五千下丸如

桐子大金箔為衣每一歲兒溫薄苛自然汁化下無時

右關氏宗鑑氏治慢驚法脈無力者宜之其法以青州

白丸子兼異功散羌活膏溫白丸釣藤飲子之類服之

至有往往死中得生者今如其法又增入海藏四君子

法次於異功散之後返魂丹次於羌活丸膏之後相參

用之也

湯氏法

凡吐瀉成虛風慢脾先用奪命散青州白丸子末煎如

稀糊入蜜調控下涎後服祛風醒脾等藥

奪命散方見後通治

治虛風八仙散風盛者服之

白天麻 白附子 花蛇肉 防風

南星 半夏 冬瓜子 全蝎各等

加川烏

右咬咀每服一錢水半盞薑二片棗半枚煎二分熱服

加薄荷尤佳

醒脾散昏困者服之

白木 人參 甘草 橘紅

茯苓 全蝎各半 半夏 木香各一

白附子炮四 南星炮兩 陳倉米二百粒一方無白

卷之三

錢亦

右為末每服一錢水半盞薑二片葱半箇煎二分漸漸服之不可頓服頓服必吐

釀乳方

人參

木香

藿香

沉香

橘皮

神麴

麥芽各等

丁香半

右收咀每服四錢水一椀薑十片紫蘇十葉葱三枚煎至半椀乳母食後須去乳汁盡方取服之即仰臥霎時令藥入乳之絡次令兒吮數口不可過飽此良法也如嘔定一日急宜截風服八仙散兩日後宜醒脾散如前件藥俱用不效危困可憂須診太衝脈未絕者當灸百會一穴前後髮際兩耳尖折中乃是穴也方書所載但云頂上旋毛中殊不審有雙頂者又有旋毛不正者庸

醫之輩習循舊本誤人多矣灸後即當控涎用青州白丸子末再煎如稀糊入煉蜜調奪命散良久涎下細研靈砂米飲調旋抹口中漸看退證如風盛服八仙散昏困服醒脾散常令減乳乳母服釀乳藥如此調理無不愈者間有稟受不堅五行數短者雖神聖功巧不能奪其造化矣 若涎已離隔但在喉中如鋸藥不能入又不可控當用別法療之兼搐鼻噴嚏得出次服奪命散庶免再作

療痰方

川烏尖

白附尖各七箇去皮生用

蝎梢七枚

石綠許

右為末一處和勻用軟雞翎蘸入喉中逐漸抽出頻用帕子拭之

右湯氏治慢驚法先用奪命散白丸子控涎候涎下一  
回用八仙醒脾等一回令乳母用釀乳法如危極者却  
灸百會及擦痰法但奪命用礞石氣虛者難用必與東  
垣益黃散相兼服之可也

陳氏法

陳氏治慢驚風先服芩蝎散用手法幹出寒痰冷涎自不  
痴呆次服油珠膏 後服益真湯溫壯元氣 時服前朴  
散寬上實下

芩蝎散治小兒腦髓受風顛顛開解皮肉筋脈急脹腦骨  
縫青筋起面少血色或腹中氣響時便青白色沫或嘔吐  
痰涎欲成慢驚搖足脛冷者

川芎

兩

細辛

錢二

草撥

兩

半夏

酒浸一  
宿湯洗

焙二

錢

蝎稍

去毒

右細末一週兒抄一銅錢用數沸湯調稍熱飢服

如

痰滿胸喉中眼珠斜視速與服若自上直視不轉睛者  
難救或痰氣壅塞不能嚥藥用一指於兒喉嚨中探  
入就幹去痰涎氣稍得通次用補脾益真湯或以油珠  
膏選用此方累世活人多矣

油珠膏治氣逆嘔吐風痰作搐

石亭脂

硫黃中揀取  
如臘者五錢

滑石

兩

黑附子

炮去  
皮臍

半夏

酒浸一宿湯  
洗七次焙乾

南星

醋浸一宿湯洗七  
次焙乾各一錢

右細末每服一錢用冷清薑汁半盞滴麻油一點如錢  
抄藥在油珠上須臾墜下却去薑汁與兒服之更用清  
薑汁三五口嚥下肚飢服服訖後一時方與乳食

補脾益真湯治胎弱吐乳便清而成陰癩氣逆涎潮眼珠  
直視四肢抽掣或因變蒸客忤及受驚誤服涼藥所作

木香

當歸

人參

黃芪

丁香

訶子

陳皮

厚朴薑製

甘草炙

肉蔻麩果

草菓

茯苓

白木

桂枝

半夏湯泡

附子炮各半兩

全蝎炒每服加一枚

右咬咀每服三錢水一盞半薑一片棗一枚煎六分稍

熱飢服服訖令揉心腹以助藥力候一時方與乳食

渴者加茯苓人參甘草去附子丁香肉蔻 瀉者加丁

香訶子肉 嘔吐加丁香半夏陳皮 腹痛者加厚朴

良薑 咳嗽加前胡五味子去附子官桂草菓肉蔻

足冷加附子丁香厚朴 惡風自汗加黃芪官桂 痰

喘加前胡枳實赤茯苓去附子丁香肉蔻草菓 氣逆

不下加前胡枳殼檳榔去當歸附子肉蔻 腹脹加厚

朴丁香前胡枳殼

前朴散治心腹結氣或嘔噦吐瀉腹脹痛驚悸

前胡

白木

人參

陳皮

良薑

藿香

甘草

厚朴各等分

右剉每服三錢水一盞煎七分稍熱空心服

小兒誤服涼藥或用帛蘸水繳口因此傷動脾胃或泄瀉

或腹脹或腹中響 小兒面少血色常無喜笑不看上而

視下 小兒顛顛高急頭縫青筋時便青糞 小兒肥壯

糞如清涕或如凍汁 小兒時時扎眼糞便青白沫有時

乾硬 已上五症忽然嘔吐者必成陰癩俗謂慢驚是也

小兒頭雖熱眼珠青白而足冷或腹脹而足冷或瀉而足

冷或嘔而足冷或渴而足冷頭熱目赤痰壅鼻喉咽皆無根之火逆也 已上

五症忽然吐而作搐者名曰慢脾風速與補脾益真湯一

服三錢重加蝎一枚如因驚而搐者前朴散一服三錢重

加附子前胡各半錢同煎

右陳文忠治慢驚法其治之次第自成一家故另錄之

以備採用其醫案所言芎蝎散油珠膏累累取效

雜法

治慢驚神效 用一粒丁香一箇蝎一字辰砂一點血已

上俱為末男用男左手中指血女用女右手中指血蘸末

擦瘡土愈

醒脾丸治小兒慢脾風因吐痢後虛困昏睡欲生風癩

厚朴 白木 硫黃入五腐中 灸三五井

天麻

全蝎

防風

官桂

人參各一錢

右為細末酒浸蒸餅和丸如鷄頭大每一丸搥碎温米

飲下

蝎稍丸治小兒胎虛氣弱吐痢生風昏困嗜臥或潮搐

全蝎微炒

白附煨裂各半兩 硫黃

半夏薑汁制各

兩一

右為末薑汁糊丸如麻子大每服三十九荆芥湯下量

兒大小加減服之

天麻

防風

川烏

全蝎去翅足薄切葉

南星

等分水煎服

湯氏治慢驚

真川烏一枚夫皮生用

全蝎等分

右二件咬咀分二服水二盞薑十片煎半盞旋旋滴入

口中

無陰癩即慢驚風

黑附子生去皮臍 南星生

半夏各二錢 白附子半錢

右研細井水浸七日每日換水浸訖控乾入硃砂二錢麝香一錢研勻每服一字薄芎湯調下量兒加減一方用黑附子生去皮臍為末每服二錢以水一盞半生薑二片煎至半盞分二服量兒加減吐者入丁香五箇同煎空心服或水浸炊餅為丸如粟米大每服二十九生薑湯下亦可

**錢**回生散治小兒吐瀉或誤服冷藥脾虛生風成慢驚大南星重入九錢已上者用地坑子一箇深三寸許用炭火五斤燒紅入好酒半盞在內然後入南星却用炭火三兩條蓋在地坑上候南星微裂取出剉碎再炒勻熟不可稍生放冷為末每服半錢濃煎生薑防風湯調下又方梓朴散

厚朴

半夏

湯洗七次薑汁浸半日晒乾一錢

右米泔三升同浸一百刻水盡為度如百刻水未盡少加火熬乾去厚朴只將半夏為末每服五分或一字薄芎湯調下無時

豈卷散治小兒慢驚多因藥性太溫及熱藥治之有驚未退而別生熱症者有因病愈而致熱症者有反為急驚者甚多當問病幾日因何得之曾以何藥療之可用解毒藥無不效宜此方

大豆黃卷

水浸黑豆生芽是也晒乾

管仲

板藍根

甘草

炙各兩

右為末每服半錢水煎服甚者三錢藥水內入油數點煎又治吐重服不拘時

右諸家雜治慢驚其首一方用人血蘸藥末擦唇者甚效後一方解藥太過之毒尤見錢氏憂人之切也

通治急慢驚風  
痰盛氣實者鎮之

**垣**驚兒瀉青色先鎮平以硃砂之類勿用寒涼之藥大禁涼驚丸蓋風木旺必克脾土當先實其土後瀉其木其風木旺症右關脈洪大掌中熱腹皮熱者是也今立一方黃芪益黃散主之人參甘草黃芪各等分此三味皆溫能補脾土益元氣甘能瀉火內經云熱淫於內以甘瀉之以酸收之白芍藥酸寒能瀉火酸能瀉肝木而大補肺金所補得金土之位大旺則火虛矣風木何由而來尅土然後瀉風木之旺脾虛者以火邪乘其土位故也故曰從後來者為虛邪火旺能實其木木旺故來尅土當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中瀉火以甘寒補金以酸涼故致脾土中金旺火衰則風木自虛矣

黃芪益黃散治胃中風熱  
黃芪二錢 人參一錢 甘草五分 白芍藥七分

陳皮不去白 黃連少許 白茯苓四分

右為麤末每服水二盞煎五沸去渣溫服

**丹**治小兒驚而有熱者

人參 茯苓 白芍藥酒炒 白朮

右入生薑煎服暑月加黃連生甘草竹葉煎服

陳明遠治小兒驚因脾虛肝乘之手足搐動四肢惡寒而食少

白朮二錢 茯苓一錢

右煎湯入竹瀝熱下龍薈丸二十九保和丸二十九

**湯**奪命散大能控風涎不問急慢驚風痰潮壅盛塞於咽

喉其響如潮名曰潮涎百藥不能過咽命在須臾但先用

此藥入喉痰即墜下功有萬全奪天地之造化也

青礞石一兩八錢 通紅須硝盡為度候冷如金色取用

右為細末急驚風痰壅上身熱如火用生薄荷自然汁入蜜調微溫服之良久其藥自裹痰墜下從大便出如稠涕膠粘乃藥之功也次服退熱祛風截驚等藥慢驚風亦以痰涎潮上塞住咽喉藥食俱不能入醫者技窮勢迫以待其盡但用此藥以青州白丸再研為末煎如稀糊熟蜜調下其涎即墜入腹次服花蛇川烏全蝎蜈蚣等藥

**大黑龍丸**治小兒急慢驚風神效

膽星 礞石稍服各一兩 天竺黃 青黛各半

蘆薈二錢 辰砂 蜈蚣燒灰一錢 僵蚕五分

右為末甘草汁為丸如鷄頭大每服一九或二九薑蜜薄苛湯下如慢驚用桔梗白朮湯下

鎮驚丸

琥珀二錢 青黛兩半 辰砂二錢 天竺黃二兩

天麻兩 真珠母二錢 蘆薈 柴胡各半

青皮 甘草各二錢 膽星二兩 雄黃一錢

乳香兩 青礞石兩半

右為末甘草膏丸如鷄頭大慢驚參朮湯下急驚薄荷薑蜜湯下

小兒急慢驚風

全蝎四十九箇 辰砂半兩 研極

右取蚯蚓十條洗淨入小瓶內以溫火煨蚯蚓化為水和丸如胡椒大每三丸用順流水化服下

小兒急慢驚風

僵蚕三條 辰砂一錢 全蝎一箇 真珠末撮

右末取蓬蒿中小虫兒每一箇研作一九如麻子大每

一粒用乳汁下

**本保命丹治小兒急慢驚風四肢逆冷眼直口噤涎不止**

虎睛

一對安在土上以瓦蓋之慢火逼乾

硃砂

全蝎

天麻

分一蜈蚣二條去頭尾赤脚者

麝香

右為細末煉蜜丸如大莖大瓦罐貯之又入腦麝管定

急驚薄荷蜜湯化下慢驚薄荷湯化下各三九

**溫驚丸**

一名粉紅丸

南星

為末入膽月牛膽中陰乾百日為末四兩

硃砂

天竺黃

坯子胭脂

錢半龍腦五分

右用牛膽汁和丸如雞頭大每服一九小者半九沙糖

水下

泡龍丸治傷風瘟疫身熱昏睡氣喘風熱痰實壅嗽驚風潮搐及蠱毒中暑沐浴後並可服壯實小兒宜時與服之

丹溪云抱龍丸心肝藥也

南星

如無牛膽者只將生者剉炒熟用四兩

天竺黃

雄黃

辰砂

另砂各半兩麝香一錢

右為細末煮甘草膏和丸皂莢子大溫水化下百日小

兒每丸分作三四服五歲兒一二九大人三五九亦治

室女白帶伏暑用鹽少許嚼一二九新汲水送下臘月

雪水煮甘草和藥尤佳一法用漿水或新水浸南星三

日候透煮軟三五沸取出乘軟切去皮只取白軟者薄

切焙乾炒黃色取末八兩以甘草二兩半拍破用水二

碗浸一宿慢火煮至半碗去渣漸漸傾入南星末內慢

研令甘草水盡方入餘藥

**奪命散治急慢驚風諸藥不效此藥隨手奏功**

白附子

黑附子

炮去皮臍半兩急驚不用

南星

錢三

兩

天麻錢三 辰砂另研二錢半 防風 半夏各半兩

全蝎去毒七箇 蜈蚣條 麝香錢半 殭蚕炒慢驚不用

右為末三歲兒半錢薄苛生薑自然汁加好酒沸湯各少許調服急驚加輕粉腦子各少許

**湯** 治慢驚甚驗

赤脚蜈蚣酒塗炙一條 白殭蚕炒七條 辰砂另研一字

全蝎用薄苛葉包炙七枚 青州白丸子三十粒

右為末入麝香少許慢驚人參麥門冬湯調下急驚加腦子牛黃各少許金銀薄苛湯調下

**羅** 天麻散治小兒急慢驚風及大人中風涎盛半身不遂言語艱澁不省人事

半夏錢七 天麻二錢半 甘草炙 茯苓

白朮各三錢

右用水一盞入磁罐內煮令水乾將老薑三錢同煮候乾為細末每服一錢五分薑棗湯調下

**經** 治驚風墜涎天南星一箇重一兩者換酒浸七伏時取出新瓦上炭火炙乾烈地上去火毒搗末入硃砂一分研為細末每服五分荆芥湯空心及午時各調下一服

**三** 天麻防風丸治小兒驚風身熱喘急多睡驚悸搐掣神昏涎痰不利等症

天麻 防風 人參各兩 蝎尾去毒半兩

甘草 硃砂 雄黃 牛黃

麝香各一錢 殭蚕炒半兩

右為末煉蜜丸如櫻桃大硃砂為衣每服薄苛湯下一二丸

**重** 七味羌活膏治急慢驚風壯熱

羌活 獨活 天麻 全蝎去毒

人參 殭蚕炒各兩 烏蛇肉酒浸一宿焙乾一兩

右為末煉蜜丸如皂子大每兩作五十九丸每服一九荆芥湯下

**經**治小兒驚風全蝎一錢不去頭尾用薄荷葉裹炙乾同研為末作四服湯下

**治**小兒驚風殭蚕蝎稍等分天雄尖附子尖共一錢炮過為末每服一字薑湯調下

**羅**小兒驚風釀乳方用白羊頭一箇丁香同熬至熟乳母空心盡食之

**孫**女因胎中受濕熱日午發搐唇黑面青每日作一次未半週難與藥且釀乳飲之

白朮 陳皮 半夏 芍藥

青皮各五分 人參 川芎 木通各二錢

黃連二錢 甘草炙一錢 右分八服薑五片與乳母煎服

痰積者攻積

小兒急慢驚風發熱口瘡手足伏熱痰熱痰喘痰嗽並用涌法重劑用瓜蒂散輕劑苦參赤小豆末酒酸薑汁調服之後用通神散蜜丸服之間以桑牛陰乾研末調服以平其氣

**本**漏銀丸治小兒急慢驚風積滯

青黛三錢 水銀一皂角子大同 寒食麩

黃明膠炒焦為末各二錢 輕粉炒豆 雄黃

粉霜 硃砂各一 巴豆共一粒 腦麝許少

右研細滴水為丸如麻子大埋漏曝乾瓷盒盛之一歲一丸隨意加減煎菓子湯送下不得化破

治急慢驚風乳香其遂各半兩同研細每服半錢用乳  
杏湯調下或用童便調下尤妙

右二十方通治急慢驚風蓋謂虛實兩見急慢互出故  
有通治之法合而言之急慢雖異皆本之於痰故礞石  
星半之屬通能治之者也分而言之礞石之屬瀉痰青  
黛之屬瀉木硃砂之屬瀉火皆治氣實之劑參草之屬  
補土天麻全蝎之屬補木烏附之屬補火又皆治氣虛  
之劑故補瀉兼施虛實通治之法也

小兒驚風糊孫糞燒存性碗覆出火毒生蜜調灌少許  
心神不安四君子加辰砂半分寒湯調下 又有一症  
欲發瘡疹先身熱驚跳或發搐搦此非驚風當用發散藥  
驚風或泄瀉等症煩渴者皆津液內耗也不問陰陽宜  
煎錢氏白朮散使滿意取足飲之彌多彌好

雜方

針灸

明堂急慢驚

印堂灸急驚瀉

急驚 支正 下廉 小兒慢驚風灸尺澤二穴各七壯

文內正中炷 睡中驚掣 厲兌壯 睡中驚目不合灸

如小灸大 屈肘橫紋上三壯

咬呀甚者發驚

呵欠面青者驚風

目赤兼青者發搐

驚癇發搐男發搐目左視無聲右視有聲女發搐目右

視無聲左視有聲相勝故也更有發時症濕毒曰男為木

聲右視金位相擊則有聲女為金故右

視金位無聲左視木位亦相擊有聲

李寺丞子三歲發搐自卯至巳目右視大叫哭錢見曰此

逆也男為陽本發左視無聲則順右視有聲則逆所以然

者左肝木也右肺金也逆則二臟相戰金木相擊而有聲

診

也治宜瀉強補弱假令女發搐目左視是肺來乘肝肝不能任故叫哭也當瀉其肺後治其心續治其肝若病在秋時同肺兼旺位當瀉其肺若病在春時同此肝旺之時尚不能勝肺是肺強而肝火弱也當補其肝腎大瀉其肺若男發搐目右視是肝來勝肺而叫哭當瀉其肝心若病在春夏時同肝心旺時當大瀉其肝若病在秋冬時同此肺旺之時尚不能勝肝是肝強而肺極虛也當補其肺大瀉其肝所以言目反視者乃肝主目也凡搐則是風熱相搏於內風屬肝故外見於目也今此病男反女症故稍易治於女也先瀉其肺以瀉肺湯主之二日不悶亂知病退也後用地黃丸補腎三服後用瀉青丸各二服以瀉心肝五日而愈 又肺虛不瀉者何也曰假令男目右視木克金肝旺勝肺而但瀉肝若更病在春夏金氣極虛故當

補其肺慎勿瀉也

**湯**凡搐男左女右為順易治男右女左為逆難治

心脈急甚為瘵癢全文見診治法○脾脈急甚為瘵癢

不治症 **驚風**不治證 搐而不休休而再搐 **驚叫發搐** 汗

出足冷 痰滿胸喉 口開目直

禁忌

**治**小兒急驚方搐不用驚擾此不足畏慢驚雖靜乃危病也急驚方搐時但扶持之不可擒捉蓋風氣方盛恐流入筋脈或至手足成拘攣也

驚癇

驚癇即急慢之症但驚癇發時仆地作聲醒時吐沫急慢驚則不作聲不吐沫也

陰陽

陽癇初作時病先身熱瘵癢驚啼叫噉而後發脈浮者為陽癇乃急驚也內在六腑外在皮膚為易治若病先身冷

不驚瘈不啼呼而作脈沉者為陰癇乃慢驚也此病內在

五臟所主

五臟外在骨髓劇者難治

錢凡治五癇皆隨臟治之每臟各屬一獸宜以五色丸主

之犬癇反折上竄犬叫肝也 羊癇目瞪吐舌羊叫心

也 牛癇目直視腹滿牛叫脾也 雞癇驚跳反折手縱

鷄叫肺也 猪癇如尸吐沫猪叫腎也

五色丸 硃砂研半兩 水銀一分 雄黃一分 鉛三兩同

真珠末兩

右煉蜜丸如麻子大每服三四丸金銀薄荷湯下

如有客痰發熱而有聲煎大黃荊芥湯下五色丸 潮

熱有時積熱也桃枝丸主之壯熱不退當用地骨皮散下

五色丸 風熱當用防風黃芩湯下大青膏 身溫不

當用白虎湯加蒼朮下五色丸

木雌黃丸治小兒癲癩欲發眼暗瘰癧聲惡嚼舌

雌黃 黃丹各一分 麝香研一分

右為末拌令極勻用牛乳汁半升熬成膏入前藥末杵

三五百下丸如菉荳大每服三丸溫熱水下一日三服

此方得自名醫之家極有神效

湯蛇黃丸治驚癇

真蛇黃醋煨碎 鬱金三分一分 麝香另研一分

右為末粳米飯丸如桐子大每服三二丸煎金銀磨刀

水化服

海古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡疾煮取汁和諸

藥煮服之彌古者尤佳

治癇方治太陽陽明二經為病

荆芥穗四兩 白礬為細末

右束肉為丸如桐子大每服二十九丸荆芥湯下次三十丸四十九丸又次五十九丸俱食前

身冷不驚喘脈沉為陰

沉香天麻湯○魏敬甫之子四歲從長老摩頂授記衆

僧念呪因而大恐遂發驚搐痰涎壅塞目多白睛項背強急喉中有聲一時許方醒後每見皂衣人輒發多服硃犀龍麝鎮墜之藥四十餘日而前症猶在又添行步動作神思如痴予診其脈沉弦而急黃帝針經云心脈滿大癩瘖筋學又云肝脈小急癩瘖筋學蓋小兒血氣未定神氣尚弱因而驚恐神無所依又動於肝肝主筋故癩瘖筋學病久氣弱小兒易為虛實多服鎮墜寒涼之劑復損其氣故添動作如痴內經云暴癩眩足不任身取天柱穴是也天柱穴乃足太陽之脈所發陽蹻附而行也又云癩瘖瘖

不知所苦兩蹻主之男陽女陰潔古云晝發治陽蹻申脈夜發治陰蹻照海先各灸兩蹻各二十七壯次處

沉香二錢 天麻三錢 羌活五錢 防風三錢

益智二錢 川烏炮去皮 桂枝各二錢 當歸各一錢半

半夏湯泡 獨活四錢 附子炮去皮 薑屑一錢

右咬咀每服五錢生薑三片水煎溫服舉痛論云恐則氣下精怯而上焦閉又云從下上者引而去之以羌活獨活苦溫味之薄者陰中之陽引氣上行又入太陽之經為引用故以為君天麻防風辛溫以散之當歸甘草辛甘溫以補氣血之不足又養胃氣故以為臣黑附子川烏頭益智仁大辛溫行陽退陰又治寒客傷胃腎主五液入脾為涎以生薑半夏燥濕化痰十劑云重可去怯沉香辛溫體重氣清去怯安神故以為使氣味相合

升陽補胃恐怯之氣自得平矣

**湯** 牛黃丸治因驚中風五癩天吊客忤潮涎灌壅

白花蛇酒浸取肉 白附子 全蝎 真川烏一枚半兩

生者 天麻 薄荷葉各半兩

已上六味先為細末次入

雄黃五兩 辰砂錢三 腦子另研半兩 牛黃錢三

麝香錢一

右為一處和勻麻黃去根二兩酒一升煎麻黃至一盞去麻黃用酒熬藥得所勿至焦赤衆手疾丸如芡實大密器盛之一丸作五服煎金銀薄苛湯磨化大能發散驚邪

治五癩得效方

露蜂房焙一兩 石綠一兩 桂心 遠志去心

人參各半兩 硃砂錢一

右為末粥丸如桐子大每服二三十九白湯下

濕痰 治小兒驚癩

膽星二兩 全蝎去翅尾半兩 白附子一兩 薄荷半兩

疆蚕炒一兩 川芎一兩

右為末粥丸青黛為衣每服一二九薑湯下

治小兒癩用甘遂末一錢猪心一箇取三管頭血三條和甘遂末將猪心批作兩片入藥在內以線縛定外濕昏包裹入文武火煨熟不可過度取藥細研入辰砂末一錢和勻分作四丸每服一丸猪心湯化下再服另取猪心煎湯此方神效

虛 **湯** 斷癩丹治癩瘡後復作連綿不除服之有驗

黃芪蜜水塗灸 釣藤 細辛 甘草炙

蛇蛻皮各半 蟬蛻去土 牛黃另研

治遠年驚癇心血不足神驗方蝎虎一枚褐色者用剪子取下四足爪連血細研入生珠末麝香腦子各少許同研細薄苛湯調下作一服須先用奪命散控下涎次服之能奪造化雖數年癲癇亦能治之此藥所以神效者蓋癲皆心血不足此物名守宮其血與心血類也取下如室女之紅鉛服之於心故能補也此乃怪重去其足而復能行又再生而活也蝎虎即蝦蟇奪命散方見驚搐門

雜方

**用**小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成癲當歸末小荳大乳汁灌之日夜三四服  
**本**治小兒卒得癲用釣藤甘草炙各二分水五合煮取二合服如小惠大日夜三大服  
廣濟及崔氏方治小兒驚癲諸湯飲皆用釣藤皮又野豬

黃味辛甘平療癲癇水研如棗核日三服效衍義云野豬黃膽世不常有間得之能治小兒痰癲

**子**李氏一小兒病手足搐搦戴人曰心火勝也勿持捉其手當從搐搦此由乳母保抱太極所致乃令掃淨地以水洒之乾令復洒令極濕俛臥兒于地上良久渾身轉側泥漿皆滿仍以井水洗之少頃而瘥

**治**小兒胃寒重上諸危惡與癲相似者乾漆搗炒烟盡入白蕪荑等分為細末米飲調下一字至一錢瘥

**針灸**  
**用**小兒癲癇瘈瘲脊強互相引項灸長強穴三十壯在脊骹端跌地取之乃得 小兒驚癲瘈瘲脊急強目轉運上插筋縮主之

**用**小兒癲癇驚風目眩灸神庭穴七壯在鼻直上入髮際五分 小兒風癲灸鼻柱上髮際宛宛中三壯炷如小麥

大

小兒驚癇先驚怖啼叫後乃發也灸頂上旋毛中三壯及耳後青絲脈炷如小麥大旋毛中即百會穴也青絲脈手足少陽瘻脈穴也

驚癇灸巨關三壯

甲小兒驚癇本神及前項顛會天柱主之 小兒驚癇反

視臨泣主之 小兒癇瘵嘔吐泄注驚恐失精瞻視不明

眇眇瘻脈主之 羊癇會宗下空主之錢氏云羊癇目

癇發目上插攢竹主之 馬癇金門及僕參主之 風從

頭至足癇瘻口閉不能開每大便腹暴滿按之不下噎悲

喘崑崙主之 小兒癇瘻遺精溺虛則病癇頽實則閉瘵

小腹中熱善寐大敦穴主之 癇驚如有見者列缺穴主

之并取陽明絡

錢五癇重者死病後甚者亦死

診

風熱

天弔亦驚風之證但天弔發時頭目仰視驚風則無也

湯小兒瘻瘵不定翻眼擡睛狀若神祟頭目仰視名為天

弔凡有此疾宜服蘇合香丸灸兩手大拇指兩甲肉相半

男先灸左女先灸右及兩足大拇指中間各三五壯又灸

前後手心各五壯此皆得效之法

九龍控涎散治天弔

赤脚蜈蚣酒塗灸一條

鵬茶各一錢

荊芥穗炒

白礬枯各一錢

右為末每服半錢人參薄苜湯調下

釣藤飲治天弔潮熱

釣藤

人參

犀角屑各半兩

全蝎

滴乳

雄黃另研

菘豆半生半炒

甘草各二錢

天竺黃二味另研

天麻各分 甘草半

右為末每服一錢水煎服

癩迷嚼舌仰視牛黃大豆許和蜜水調廣利方

眼目

針灸

明目澁羞明狀如青盲 中渚壯壯小兒艾 兒三五

歲忽生白翳遮睛掩瞳人疼痛不可忍 九椎上灸一壯

妳癰目不明者 肩中膺灸一壯

診

錢目赤兼青者發搐 目直而射身反折強直者生驚

虛

世治眼白多多屬虛 合杏仁各一分 炙甘草一分 山茱萸二

鹿茸兩半 澤瀉兩 茯苓各一 山茱萸兩

天中地黃兩 牡丹皮兩 牛膝各一

右為末蜜丸如桐子大鹽湯食後下二十九

雀目疳眼

濕痰

煮肝丸治小兒疳眼翳膜羞明不見物服十日必退如

大人雀目者一服效

夜明沙

青蛤粉

穀精草各一

右件為細末每服一錢五七歲已上二錢猪肝一大

片批開糝藥在內攤勻麻線纏定以米泔半碗煮肝熟

取出肝湯傾碗內熏眼分肝作三服嚼訖却用肝湯下

一日三服不拘時候大人雀目空心服至夜便見物如

患多時日二服

熱

龍膽飲子治疳眼流膿生疳翳濕熱為病神效不治寒濕

為病者

青蛤粉兩半

羌活

草龍膽各三

黃芩炒二

蛇蛻皮兩半

麻黃二錢

穀精草兩

升麻二錢

鬱金

甘草各半錢

右為細末每服二錢食後茶清調下

針灸

灸雀目疔眼法○小兒雀目夜不見物灸手大指甲後一寸內廉橫紋頭白肉際各一壯炷如小麥大 小兒疔眼灸合谷二穴各一壯炷如小麥大在手大指次指兩骨間陷中

赤眼

熱

湯導赤散治心熱小便赤眼目赤腫

赤芍藥

羌活

防風各半兩

大黃

甘草各一錢

右為末燈心黑豈煎食後服

余平生無赤眼之患用之如神小兒小兒可通用凡眼赤澁之初只用自已小便張目翳出用一指接抹眼中便畢

閉目少頃即效此以真氣逼去邪熱也

本治小兒赤熱腫眼

大黃

白礬

右二味等分為末同冷水調作罨子貼眼立效

針灸

明眼忽大小皆赤合谷灸三壯 熱毒風盛眼疼灸中指

本節頭三壯

通睛

肝病

湯牛黃丸小兒通睛皆因失慎築打觸着頭面額角兼倒撲令兒肝受驚風遂使兩目閉睛名曰通睛宜服此

牛黃

白附子炮

肉桂

全蝎

芫蕪

石膏煨各一錢

白芷二錢

藿香兩半

硃砂二錢

麝香一分

右為末煉蜜為丸如芡實大三歲已下每服一九薄苛

湯下乳食後忌油麪猪肉

偏墜

雜方

小兒狐疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛十四枚熬焦

桂枝半兩二物為散每服八分日再酒調下蜜丸亦通

偏墜亦宜防葵丸令兒坐於土中午時灸印下偏墜之處

七壯防葵丸未詳

小兒偏墜若非胎中所有在後生者於莖下腎囊前中間

弦子上灸七壯立愈

胎產疝卵偏墜 囊縫後十字紋上灸三壯春灸夏

陰腫囊腫脫囊

滯氣

小兒陰腫由啼叫怒氣閉縱於下成此疾宜海蛤散

海蛤三錢

檳榔各半兩

茴香炒三分

薏苡仁

白朮

右末食前溫酒調下大小加減

汚血

陰腫又方

桃仁去皮尖及雙仁者炒三分

牡丹皮

桂枝

白蒺藜炒去刺各半兩

郁李仁湯浸去皮一分

右水煎服

脫囊即外腎腫大

木通

甘草

當歸

黃連

黃芩

右水煎服

雜方

蚯蚓散治腎子腫硬成疝用乾蚯蚓為末唾調傳常避

風冷濕地先用花椒蔥湯避風處洗却用此傳之累驗

治小兒囊腫如升用甘草煎汁調地龍末塗之立退累

效

針灸

用紫蘇葉為末水調傳上又用青荷葉包之治脫囊效  
即陰腫 崑崙壯

疝痛

滯氣

湯治小腸疝氣家傳妙方

芫花醋浸

木香

檳榔

三稜各半

茯苓

青皮

全蝎

桂枝

附子

礪砂各一分

右為末將礪砂浸澄去土頓在湯瓶上候成膏子和糖醋打麪糊為丸如荳大每三十九丸空心温酒下未效再服

小便不通

錢捻頭散治小便不通

玄胡

川苦練各等分

汚血

熱

右同為細末每服半錢或一錢捻頭湯調下量多少與之捻頭湯即湯中滴油數點食前服

湯木通散治心經伏熱小便不通啼叫

木通兩

牽牛子炒半兩

滑石兩

右為末燈心蔥白煎服

冬葵子散治小兒腹急悶

冬葵子兩

木通兩

右為末每服一錢煎服

尿深黃色久則尿血 小便不通久脹滿當利小便

淋病

血

湯治血淋神效方

紫草

連翹

車前子各等分

水煎服

又方

海螵蛸

生地

白茯苓

右等分為末栢葉車前草煎湯調下

氣

治氣淋

赤芍藥

檳榔麩裹煨

右為末燈心同煮子煎湯調下

遺尿

虛

湯治小便不禁或睡中遺出不覺

雞腸草

牡礪粉

龍骨

麥門冬去心

白茯苓

桑螵蛸各半

右件咬咀每服一錢枣子一枚擘破煎食前服

又方破故帛一味炒為末黃柏煎湯調下

療小兒睡中遺尿不自覺桂末雄雞肝等分搗丸如小

豆大溫水下日三服

雜考

小兒夢中遺尿薏苡仁一合許去心不去殼敲碎入塩

小撮同炒黃色用水二鍾煎至半鍾空心服之累效

喉痺

上實

凡治小兒喉痺宜於大人喉痺法參用之

湯喉痺別無治法非吐不可生此證萬一危極前法無效

急用官局碧霞丹研細用薄荷自然汁入醋調以雞翎蘸

藥送入喉內徐徐導引得吐出痰涎為佳本方論碧霞

丹能害人此不然蓋當時遇有合死之人耳

碧霞丹

石綠

附子尖

烏頭尖

蝎梢

右為末為丸薄荷汁化取涎出

針灸

喉中鳴咽乳不利 璇璣 急喉痺 天突一壯不宜



