

小兒部

醫學綱目

自州七
至州八

二十

醫學綱目卷之三十七

小兒部

心主熱

潮熱

積熱

溫病

變蒸

熱

心痛

弄舌

重舌

木舌

舌白胎

鼻衄

遲言

盜汗

自汗

癰癤

腮腫

惡核瘰癧

赤丹

疥癬

眉煉

耳瘡

面瘡

口

瘡

癩頭瘡

脚凍瘡

痘疹治法通論

痘出太密

痘出不快

痘痒塌

痘灰白色

痘黑陷倒靨

痘寒戰

痘

發熱

痘寒熱

痘渴

痘渴瀉

痘

瀉不渴

痘吐逆

痘腹脹

痘腹痛

痘喘

痘大便秘

痘餘毒

痘入目

痘咽痛

痘風

痘癩搖

痘瘡痛

醫學綱目卷之三十七

痘膿而不痂 痘後瘡癩 痘癰 中惡

客忤

五臟執證

肝熱手尋衣領及亂捻物瀉青丸主之 壯熱飲水喘

悶瀉白散主之 壯熱者一向熱而不已也

肺熱手搯眉目日西熱甚咳嗽寒熱壯熱飲水甘桔湯主

之若肺虛熱唇深紅色輕者瀉白散重者涼膈散主之

心熱視其睡口中氣溫或合面臥及上竅搖頭咬牙皆心

熱也導赤散主之 心氣熱則心胸亦然欲言不能而有就冷之意故合面睡

脾熱則目黃肚大怠惰嗜臥身熱飲水四肢不收瀉黃散

主之

腎虛則下竅畏明地黃丸主之 頰赤由心臟邪熱上攻

也宜服導赤散

五臟面

面上證左腮為肝右腮為肺額上為心鼻為脾頰為腎

赤者熱也隨證治之 目內皆赤者心熱導赤散主之

紅者心虛熱生犀散主之青者肝熱瀉青丸主之淺淡者

補之黃者脾熱瀉黃散主之無精光者腎虛地黃丸主之

潔古云目中五色甚者瀉本臟色淺者宜補之又云白是寒小便清四逆湯黃赤是熱承氣湯瀉本藏青是腹痛捻

頭散主之桂枝芍藥湯亦主之

去暑

小兒脈沉而數者骨間有熱欲以腹按冷清也

錢身熱不飲水者熱在外身熱飲水者熱在內

海四順飲子治熱在內而不厥 連翹散治熱在外而不

厥

小兒發熱手足伏熱痰熱必用吐法輕劑苦參赤小豆

末重劑瓜蒂散淡蘼汁調服之如不吐用鵝翎探之

虛熱

朱監簿子五歲忽發熱醫曰此心熱也頰赤而唇紅煩

燥引飲遂用牛黃丸三服以一物瀉心湯下之來日不愈

反加無方而不能食又下之便利黃沫錢曰心經虛而有留熱在內必被涼藥下之致此虛勞之病也錢先用白朮散生胃中津液次以生犀散治之朱曰大便黃沫如何曰胃氣正即瀉自止虛熱也朱曰醫用瀉心湯如何錢曰瀉心湯者黃連一物耳黃連性寒多服則利能寒脾胃也坐久衆醫至皆曰實熱錢曰虛熱若實熱何以瀉心湯下之不安又加面黃頰赤五心煩躁不食而引飲醫曰既虛熱何大便黃沫錢笑曰便黃沫者服瀉心湯多故也錢與胡黃連丸治愈 鄭人齊郎中者家好收藥散施其子忽臟熱齊自取青金膏三服并一服餌之服畢至三更瀉五行其子困睡齊言子睡多驚又與青金膏一服又瀉三行加口乾身熱齊言尚有微熱未盡又與青金膏其妻曰用藥十餘行未安莫生他病否召錢氏至曰已成虛羸先用前

白朮散時時服之後服香薷九十三日愈香瓜丸即香散方見自汗條

海風熱邪熱四君子湯加生薑荊芥煎

雪小兒客熱在內不思乳食先用導赤散次用益黃散

實熱在內者四順飲之類在上者吐之方見表裏條

用小兒熱病六乙散妙藥也

食傷胃熱薑蒸

白朮兩 半夏 黃連各半兩

加平胃散粥食後白湯下

本治小兒驚熱

全蝎 天南星取心為末一錢 人參三錢

蛇蛻三錢

右為末薄荷蜜湯調下

錢風溫熱壯熱相似 潮熱時間發熱過時即止來日依

潮熱

驚熱

實熱

時又熱此欲發驚候也

壯熱者一向熱而不已甚則發驚癇也

風溫者身不熱而口中氣熱又有風溫症者但溫而不熱

傷寒熱口熱呵欠頓悶項急治見傷寒部

痘疹熱噴嚏悸動耳尖冷治見痘瘡部

變蒸熱唇上白泡珠起耳冷治不必

疳熱面黃喫炭土羸瘦鼻下赤爛治見疳部

驚風熱發搐悸癇脈數煩躁顛叫恍惚治見驚部

素帝曰乳子而病熱脈懸小者何如岐伯曰手足溫則生

寒則死通評虛實論甲乙經謂婦人乳子者

熱證疎利或解化後無虛證勿溫補熱必隨生

潮熱

熱有作止每日應時而發也

虛熱

錢地骨皮散治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱

知母 甘草 半夏洗七次 銀柴胡去蘆

人參 地骨皮 赤茯苓已上各等分 如有驚熱

加蠟蛻天麻黃芩若加藜蘆名藜蘆飲子

右為細末每服二錢生薑三片水煎食後溫服量大小

加減海藏云地骨皮散即小柴胡湯加減法自汗者地骨皮散無汗者非胡湯三黃湯仲景所用錢氏散

諸丸散加減並出古法

生犀散治症同前

生犀角性末二錢 地骨皮 赤芍藥 柴胡

葛根各一兩 甘草各半兩

右為麤末每服一二錢水煎食後溫服海藏云生犀湯即犀角地黃湯

加減法此少陽陽明相合也

犀角散治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾晚潮熱夜有盜汗

五心煩躁四肢困倦飲食雖多不生肌肉

犀角末 地骨皮 麥門冬 枳殼炒

大黃蒸 柴胡 茯苓 赤芍藥

黃芪 桑白皮 人參 鱉甲醋塗炙 各等分

右為麤末每二錢入青蒿少許水煎量兒大小加減一鍾煎八分食後溫服

小兒潮熱盜汗胡黃連柴胡等為細末煉蜜丸芡實大每二丸酒化開入少水煎小沸服

朱監簿子五歲夜發熱曉即如故衆醫有作傷寒治者有作熱治者以涼藥解之不愈其候多涎而喜睡他醫以鐵粉丸下涎其病益甚至五日大引飲錢曰不可下之乃取白朮散一兩煎藥汁三升使任意取足服朱生日飲多不作瀉否錢曰無生水不作瀉縱多不足怪也但不可下

耳朱生日先治何病錢曰止瀉治痰退熱清神皆此藥也至晚服盡錢視白更可服二升又煎白朮散三升服盡得稍愈第三日又服白朮散三升其子不渴無涎又投阿膠散二服而安

秦芫散治潮熱減食蒸瘦

秦芫去頭切焙 甘草炙各一兩 薄荷葉切焙半兩

右為麤末每服二錢水一鍾煎八分食後溫服

潮熱有時胸滿短氣者桃枝丸方見小兒積熱

風痰熱晚熱早涼嗅水無時此候乃痰作潮而生風熱

即宜金星丸下之或氣弱者不可下宜奪命散以控下涎

次服惺惺散加南星白附子奪命散方見驚風門惺惺散方見痘疹門

金星丸治風熱結聚喉內痰鳴喘麗咳嗽面紅顯腫咽膈

壅塞發熱狂躁多渴

實熱 風痰熱

宿食熱

右為末米醋糊丸麻子大薄荷臈茶下
脈經云小腸有宿食常暮發熱明日復止此宿食夜熱也
海藏云夜熱屬陰四順飲之類此血熱在夜也

積熱

久熱也疳熱亦久但兼面黃喫炭土鼻下爛也

表裡虛

小兒積熱者表裏俱熱遍身皆熱頰赤口乾小便赤大便焦黃先以四順清涼飲子利動臟腑則熱去既去復熱者內熱已解而表熱未解也當用惺惺散紅綿散加麻黃微發汗表熱乃去表熱去後又發熱者何也世醫到此盡不能曉或再用涼藥或再解表或以謂不可醫誤致天傷者甚多此表裏俱虛氣不歸元而陽浮於外所以再發熱非熱證也只用六神散入粳米煎和其胃氣則收陽歸內

身體便涼熱重者用銀白散

清涼飲子每服二錢薄荷三錢同煎方見治寒熱法惺惺散方見

痘疹

紅綿散

下後表熱未解者汗之

白殭蚕炒二兩

天麻生用一兩

天南星切薄片油浸黃二兩

蘇木節另研二兩半

右為末每服一錢水一小盞入紅綿少許同煎至六分

溫服凡小兒風熱頭目不清並宜服之若傷寒有表證

發熱者每服入去節麻黃末五分有裏熱心燥渴者入

滑石末半錢同煎服之

六神散

汗後氣不歸元者和之

人參

白茯苓

乾山藥

白朮

白扁豆

甘草各等分

右為末每服一大錢水一小盞煎至五分服此藥用處甚多治胃冷加附子治風症加天麻治痢加鴛粟殼

銀白散

乾山藥

白朮

白茯苓

各半人參

白扁豆

知母

甘草

灸升麻

右為末每服一大錢水一小盞煎一枚生薑二片同煎

溫服不拘時候

桃枝丸取積熱及結胸又名桃符丸

巴豆霜

大黃

黃栢

各錢輕粉

礪石

右細末麪糊丸粟米大煎桃枝湯下一晬兒五七九五七歲二三十九未晬兒二三九臨臥服

世之
梔豉飲子治小兒畜熱在中身熱狂躁昏迷不食

梔子仁

七枚豆豉

右用水三盞煎至二盞看多少服之無時或吐不吐立

效

變蒸熱

變蒸者陰陽水火蒸於血氣而使形體成就是五臟之變氣而七情之所由生也蓋兒生之日至三十二日一變每變蒸畢即覺性情有異於前何者長生臟腑意智故也何謂三十二日長骨添精神人有三百六十五骨以象天數以應期歲以分十二經絡故初生至三十二日一變生癸屬足少陰腎藏精與志六十四日二變一蒸生壬屬足太陽膀胱其發耳與聾冷至九十六日三變生丁屬手少陰心經心藏神其性為喜一百二十八日四變二蒸生丙屬

診名

手太陽少腸其發汗出而微驚一百六十日五變生乙屬
足厥陰肝肝藏魂喜哭一百九十二日六變三蒸生甲屬
足少陽膽其發目不閉而赤二百二十四日七變生辛屬
手太陽肺肺藏魄生聲二百五十六日八變四蒸生庚屬
手陽明大腸其發膚熱而汗或不汗二百八十八日九變
生巳屬足太陰脾脾藏意智至三百二十日十變五蒸生
戊屬足陽明胃其發不食腸痛而吐乳又手厥陰心包經
手少陽三焦此二經俱無形狀故不變而不蒸也前十變
五蒸乃天地之數以生成之然後始生齒能言知喜怒故
云始全也太倉云氣入四肢長碎骨於十變後六十四日
為一大蒸計三百八十四日長其經脈手足受血故能
持握足受血故能行立經云變且蒸謂蒸畢而足一歲之
日有餘也師曰不汗而熱者發其汗大吐者微止不可別

治又六十四日為一大蒸計四百四十八日又六十四日
三大蒸計五百一十二日共五百七十六日變蒸既畢兒
乃成人也變者變生五臟也蒸者蒸養六腑也所以成人
變者上氣蒸者體熱每經一變一蒸情能既異輕則發熱
微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或吐或汗或煩啼躁
渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相似亦有變
蒸之餘續感寒邪者但變蒸則耳冷飢冷上唇發泡狀如
泡珠若寒邪搏之則寒熱交爭腹中作痛而啼叫之聲日
夜不絕變者易也蒸於肝則目眩微赤蒸於肺則噎嗽毛
聳凡五臟六腑筋脈骨節循環各有證應其治法和平之
劑微表之熱實者微利之或不治亦自愈

湯千金變蒸論云凡兒生三十二日一變六十四日再變
變且蒸九十六日三變一百二十八日四變變且蒸一百

六十日五變一百九十二日六變變且蒸二百二十四日
十變二百五十六日八變變且蒸二百八十八日九變三
百二十日十變變且蒸積三百二十日小蒸畢後六十四
日大蒸蒸後六十四日復大蒸蒸後一百二十八日復大
蒸凡小兒自生三十二日一變再變為一蒸凡十變而五
小蒸又三大蒸積五百七十六日大小蒸都畢乃成人小
兒所以變蒸者是榮其血脈改其五臟故一變竟輒覺情
態有異其變蒸之候變者上氣蒸者體熱變蒸有輕重其
輕者體熱而微驚耳冷尻冷上唇頭白泡起如魚目珠子
微汗出重者體壯熱而脈亂或汗或不汗不欲食食輒吐
喎目白睛微赤黑精微白又云目白者重赤黑者微變蒸
畢自精明矣此其證也單變小微兼蒸小劇凡蒸平者五
日而衰遠者十日而衰先期五日後期五日為十日之中

禁服藥
灸刺

熱乃除耳或違日數不歇切不可妄治及灸刺海藏云言變蒸通一

十八次蓋前三百二十日為十小蒸後二百五十六日為十大蒸也 喎平與切不嘔而吐也

若身熱耳熱尻亦熱此乃他病可作別治

熱久不解者下

紫霜丸治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒溫壯熱汗後熱不渴及腹中有痰癖哺乳不進乳則吐喎食癩先寒後熱者

代赭石醋碎赤石脂兩一巴豆三十粒杏仁五十箇

右先將杏仁巴霜細研為膏却入二石相和更搗一二

千杵當自相得若硬入少蜜同杵之密器中收三十日

兒服如麻子大一粒與少乳汁令下食頃後與少乳勿

令多至日中當小下除熱若未全除明日更與一粒百

日兒服如小豈大一粒以此准定增減紫霜丸無所不

治雖下亦不虛人

心痛

心痛當於大人心痛門參用之

心痛吐水者重痛 心痛不吐水者冷心痛

靈礬散治小兒虫咬心痛欲絕

五靈脂二錢 白礬火飛半錢

右同研每服一二錢水一鍾煎至五分溫服無時當吐

出虫

弄舌

脾熱

弄舌脾藏微熱令舌絡微緊時時舒舌治勿用冷藥及

下之當少與瀉黃散漸服之田氏云若肥實者用牛黃散治之或欲飲

水醫疑為熱用冷藥下之者非也飲水者脾胃津液少故

也又加面黃肌瘦五心煩熱即為疳宜加胡黃連輩 若

重舌

診治

湯重舌附舌下近舌根生形如舌而小謂之重舌其着舌

下如此者名重舌其着頰裏及上腭如此者名重腭其着

齒斷上如此者名重斷皆刺之去血可也

熱痰

重舌治法用苦竹瀝漬黃栢末點舌上如不愈後用真

蒲黃傅之不過三次愈用真蒲黃微炒掃鋪地上出火氣

熱口閉裏粘輕輕

治小兒重舌馬牙硝塗舌下日三度

治小兒重舌木舌先用新水揉口并舌上下後用皂角

針燒灰入腦子少許每用半字糝舌上下出涎立效

治小兒重舌燒烏賊魚骨細研和鷄子黃傅喉及舌

上

治小兒重舌欲死亂髮灰細研以半錢傅舌下日不住

雜方

用之

重舌素白皮煮汁塗乳飲之 祕錄又以蜣螂燒末唾

傳之

木舌者舌腫漸漸大滿口不急治即塞殺人

熱

木舌治法用局方中紫雪一分竹瀝半合和之時時抹

口中自消 小兒木舌百草霜滑石芒硝為末酒調傳

舌白胎

雜方

舌上生如粥粒桑白皮汁傳之三兩次妙

血熱

地黃湯治榮中熱及肺癰鼻血生瘡一切丹毒

生地

赤芍藥

當歸

川芎

雜方

右咬咀水煎去渣量大小加減服如鼻衄臨熟入生蒲

黃少許生瘡加黃芪等分丹毒加防風等分同煎累驗

春冬衄者用生地黄研取汁加生蒲黃少許砂糖并花水

浸服之愈 秋夏衄者用車前草一握洗淨同生薑一處

研取汁入生蜜一匙先拌查塞鼻次用新汲水和蜜并車

前草生薑汁飲之即愈 又方生蘿蔔取根搗自然汁仰

頭滴入鼻管中即止次以新汲水和蜜蘿蔔汁飲之良

遲言

虛

首蒲丸治小兒心氣不足五六歲不能言

石菖蒲

人參

丹參

天麥門冬

赤石脂

直指有當歸川芎

硃砂

砂

右為細末煉蜜丸如菉豆大溫水下十九至二十九日
二三服久服效又有病後腎虛不語宜兼服六味地黃

九海藏云地黄丸足少陰也與葛蒲丸上下通經

雞頭丸治小兒諸病後不能語

雄雞頭炙一箇 鳴蟬炙三箇

大黃煨一兩 甘草一兩

當歸三錢

不通

黃芪各半兩

川芎

遠志去心

麥門冬去心各三分

右同為細末煉蜜丸如小菘豆大平日米飲下五丸空

心日三四服兒大者加之久服取效雞蟬二物宜求死

者用之不可旋殺孫真人所謂殺生求生去生更遠矣

海 白舌鳥今之鶯也名反舌主小兒不語炙食之又治重

咬

錢 腎怯失音相似病吐瀉及大病後雖有聲而不能語此

非失音為腎怯不能上接於陽故也當補腎地黃丸主之

失音乃瘁病耳 口噤不止則失音聲遲亦同

錢灸

明五六歲不語者 心膈三錢

盜汗

錢黃芪散治虛熱盜汗

牡蠣煨

黃芪

生地各等分

右為末煎服不拘時

盜汗睡而自汗出肌肉虛也止汗散主之遍身汗香瓜丸

主之

止汗散用故蒲扇灰研細每服三錢溫酒調下無時如無

以故蒲代之

虎杖散治實熱盜汗虎杖水煎服量多少與之無時

海晉郎中丁自嬰至童盜汗凡七年矣諸藥不效予與涼

膈散三黃丸三日病已蓋腎為五液化為五濕相火逼腎

腎水上行乘心之虛而入手少陰心火炎上而入肺欺其

實熱

不勝已也皮毛以是而開腠理玄府不閉而為汗出也出於睡中者為盜汗以其覺則無之故經曰寢汗憎風是也先以涼膈散瀉胸中相火相火退次以三黃丸瀉心火以助陰則腎水還本臟玄府閉而汗為之自已

雜方 自汗

錢治病有等 張氏三子病大者汗遍身次者上至頂下至胸小者但額有汗衆醫以麥煎散治之不效錢曰大者與香瓜丸次者與益脾散小者與石膏湯各五日而愈

香瓜丸
胡黃連 黃色者 大黃 濕昏
柴胡 去蘆 鱉甲 醋炙 黃栢
蘆薈 青皮 各等分 黃連

右除黃瓜外同為細末將黃瓜割其頭填入諸藥至滿却蓋口用杖子插定火內煨熟將黃瓜及藥同用麩糊丸如棗豆大每服二三丸食後冷漿或新水下大者五七丸不過十丸

中部汗 胃怯汗上至頂下至臍此胃虛當補胃益黃散主之
頭汗 錢六陽虛汗上至頂不過胸也不須治之 喜汗厚衣臥而額汗出也止汗散主之

表散 癰癤 湯凡癰癤未見之初微見有紅頭瘰子起隱疹者急用不語唾夜半頻頻塗之飲酒了不可用
治發背癰癤方

羌活 兩 川山甲 炒焦 生人骨 煨存性
麝香 少許

右末煎麻黃薄苛酒調如陰瘡頭平向內者服之即突
出其功效不可盡述若小兒痘瘡黑陷者只一服而起
萬不失一

腮腫

本治小兒毒氣攻腮赤腫可畏者

皂角去核兩 天南星生用錢

糯米合

右為細末薑汁調塗立效

惡核瘰癧

除本於裡

湯小兒惡核生於項頸上遇風寒所折不消結成瘰癧久
而潰膿生瘡也宜服四味大黃飲即四順清涼飲子是也

瘰癧又方

升麻

射干

連翹

犀角屑

大黃微

朴硝各半兩

治標於表

貼惡核方

右咬咀水煎大小加減忌酒麪炙燥物

赤小豆

猪牙皂角

硝石

黃藥

木鱉子各半兩

右末雞子清調塗患處

貼散瘰癧神效方

白膠香

降真香用心無土氣者

海螵蛸

右等分為末糝患處外以水帛掩之一夜而退

赤丹

田赤遊治法宜服犀角散一法先鑷去惡血服上藥犀角散方

風熱

見潮

湯小兒丹毒乃熱毒之氣極與血相搏而風乘之故赤腫
及游走遍身者又名赤遊風入腎入腹則殺人大抵丹

毒雖有多種病源一也有赤丹毒遍身痒者或女子十五
六而脈未通者多發丹疹皆由血有風毒乘之宜服防已
散

漢防已

兩半

朴硝

犀角

黃芩

黃芪

升麻

各乙

右咬咀竹葉煎大小加減

四小兒黑斑紅斑瘡痒癩疹並用防風通聖散治之

荆芥散

防風

天花粉

羌活

生地黃

當歸

蟬蛻

各等分

水煎服

解毒散

寒水石

滑石

石膏

辰砂

右三石等分為末入辰砂少許量兒大小燈心湯下

又方

赤小豆

木鱉子

橡料子

南星

大黃

朴硝

右為末用慈姑薄苜蓿青和蜜水調塗患處外用雄黃

圍之却服荆芥解毒二散

聖小兒發斑散毒氣用生葵菜葉絞取汁少少與服之

千治小兒丹發慎火草生一握搗取汁傳之效

秘治小兒赤遊丹行於上下至心即死搗芭蕉根汁煎

塗之

兵部治孩子赤丹不止以胡荽汁傳瘰

秘錄小兒赤遊行於體上下至心即死以芒硝納湯中取

濃汁以拭丹上

錢丹瘤熱毒氣客於腠理搏於血氣發於外皮上赤如丹

敷貼正
治法

當以白玉散塗之

白玉粉即滑石

寒水石兩

右末之用米醋或新水調塗

四火丹磨銅鐵水調廁上泥傳之 小兒赤遊風用朝南

燕巢泥雞子清調傳將腫處用針割破鮮魚血塗之尤妙

四小兒天火丹臍腰起者赤溜不妨用蚯蚓泥炒研細香

油傳之

四又法用牛膝一兩去苗甘草半兩生剉碎水煎一大盞

去查調伏龍肝塗之

四小兒赤丹伏龍肝為末芭蕉油調傳 又方用雉雞毛

及鷲毛燒灰香油調傳

湯又傳丹毒方只一夜消盡用花蓋石生薑薄苛自然汁

調鷲毛刷上患處為妙

虛

張三太尉女十五歲病此諸醫百藥俱試而不能中召予

視之以生料四物湯加防風黃芩一日而愈

生料四物湯治血熱生瘡遍身腫痒及脾胃常弱不禁犬

黃等冷藥尤宜服之 赤芍藥 川芎 當歸

生地

防風各半

黃芩一錢

右咬咀水煎量大小加減忌酒麪猪羊肉豆腐

四小兒赤溜主傷血熱宜生地黃木通荆芥苦藥帶發表

之類外以芭蕉油塗患處

四丹痒者用韭菜按此盞與香油以手摩熱於丹上搯之

立愈 四小兒丹瘤單麻子五箇去皮研入麪一匙水調塗之甚

效

雜方

十種丹法

小兒十種丹癩腫毒所起形候并方治法

一飛竈丹從頂頭起先腫用蔥白研取自然汁塗

二古竈丹從頭上紅腫痛用赤小荳末雞子清調塗譚氏方同不拘何處皆治

三鬼火丹從面赤赤腫用灶心土雞子清調塗按不拘何處皆治妙

四天火丹從背起赤點用桑白皮末羊脂調塗

五天灶丹從兩腎赤腫黃色用柳葉燒灰水調塗腎一作瘡

六水丹從兩脇虛腫用生鐵屑為末猪糞調塗

七胡火丹從臍上起黃腫用檳榔為末米醋調塗

八野火丹從兩脚赤腫用乳香末羊脂調塗

九烟火丹從兩脚有赤白點用猪槽下土麻油調塗

十胡漏丹從陰上起黃腫用屋漏處土羊脂調塗

右此十種丹毒變易非輕治之或緩則終不救故予不

惜是方能逐一仔細辨認依此方法治之萬不失一如

經三日不治攻入臟腑則終不救不可緩也

赤遊風於身上下至心即死子母秘錄煎汁洗之荊薺即白

百日内發必死不治

疥癬

小兒經絡蘊熱頭面及身體生瘡四君子加瓜蒌根桔

梗各半錢煎服

小兒惡瘡天氣溫和頻與澡洗更衣名曰外宣亦不宣

服藥小兒不得已而服藥此乃下法若將養合宜何疾可

侵更令乳哺有節勿令過飽其身乃如藥樹此養生之理

也

惡瘡方頻浴身安外宣無病

也

也

也

也

也

也

也

也

春用柳條荆芥 夏用東葉槐枝 秋冬用苦參
煎湯洗

敷藥

傳瘡藥方

剪刀草

黃連

苦參

右等分爲末先洗淨次用麻油輕粉調傳

回瘡癬治法浸淫瘡宜用苦瓠散塗之乾癬宜用羊蹄根

絞自然汁調膩粉塗之濕癬宜用青金散貼之

苦瓠散治小兒浸淫瘡漸展不止

苦瓠

二兩

蛇蛻皮

燒灰

半兩

蜂房

微炒

半兩

梁上塵

一合

右爲細末生油調塗攤帛上貼

青金散治小兒濕癬浸淫瘡

白膠香

兩

輕粉

兩

青黛

二錢

半

右研爲細末乾糝瘡上

秘錄治小兒風癩不止白礬十二分煖熱酒投化用馬尾

蘸酒塗之

小兒頭面爛瘡木耳春細蜜調傳又冷水調平胃散傳

俱乾則易之

眉煉

眉煉治法用青金散傳之如不愈燒小麥存性研細好

油調塗

耳瘡耳凍瘡

雜方

小兒耳後月蝕瘡蚯蚓糞燒以猪油和傳之 耳上生

瘡竹葉燒末猪脂傳之妙 楊氏以雞子白和傳立瘡 耳月蝕方胡粉和上傳之

耳後月蝕黃連末傳之安

白礬散治小兒凍耳成瘡或痒或痛

黃栢

白礬

各半兩

右為末先以湯洗瘡後用生油調塗

面瘡

世治小兒面瘡通面爛無全膚膿水流漓百藥不效者陳年鵝猪油不入塩者傳之神效

口瘡

法 塗頤門

如聖散治小兒口瘡不能喫乳者江子一粒或二粒研爛不去油入硃砂黃丹傳紙絹上少許刺開小兒頤門貼在頤上如四邊起粟米泡便用溫水洗去藥恐成瘡更用苜蒲水洗便安其效如神

法 塗脚心

世南星膏治口瘡小兒難用藥以大天南星去皮取中心龍眼大為末却用酸醋調塗脚心甚妙

治小兒口瘡飲乳不得以白礬如鷄子大置醋中塗見足底二七次即愈

正治法

無牡礪散治小兒口瘡

牡礪煨通紅取出候冷研細以昏 甘草炙為末

右和勻時時挑少許糝口中或吐皆無害

口瘡右法乳母同兒宜服洗心散瀉心湯然後用黃栢

末研細糝之瀉心湯方黃連一味為末密水調不可煎

湯治口瘡驗方

黃栢蜜炙赤 青黛一分 右二件為末頻糝口內愈

斗口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火泛上宜附子

理中湯

癩頭瘡

世治久癩頭用黃連細末傳之 治年久癩頭內用苦參

丸食後服之外用苦參末油傳之二月愈

又方用防風通聖散酒製除大黃另研為末再用酒拌

正 治

從法

晒乾為末每一錢水煎服日四五服至三十點見效
又方

川芎 片苓 芍藥 陳皮 各半

白朮 酒 當歸 酒 各 天麻 酒 蒼耳 半 錢

黃栢 酒 粉草 酒 防風 各 三 錢

右咬咀煎服四五次服之服過睡片時

小兒癩頭用燒紅炭焯長流水令熱洗之仍用芫荽子煎

猪脂去子用脂傳患處 又法用胡荽子伏龍肝懸龍尾

黃連白礬為末油調傳

頭瘡方

猪油 一 錢 半 雄黃 水銀 各 二 錢 半

右研和勻傳瘡上

又方治小兒癩頭并身癩等證用松皮燒灰白膠香枯礬

大黃黃栢油調傳患處 又方用臘月馬脂油搽患處極

妙

簡頭瘡大筭殼燒為灰量瘡大小用灰調生油傳又加臍

粉佳

松錄小兒頭身諸瘡燒雞卵殼和猪脂傳之

世治癩頭

松香 一 兩 乾 鈔 溶 開 安 在 石 上 候 冷 取 起 輕 研 細 黑龍尾 三 錢 即 屋

鹿垂 白芷 兩 松樹皮 燒 灰 二 錢 水銀 二 錢

黃丹 三 錢 雄黃 白礬 各 二 錢

右為末以血餘入香油煎爛調傳患處

脚凍瘡

湯生附散治爛脚瘡用生附子為末麩水調傳之愈

痘瘡治法通論

大法

瘡疹惟用溫平藥治之不可妄下及妄攻發受風冷海
云溫平者非熱劑如荆芥薄荷防風牛蒡子甘草之類活
人鼠粘子湯與潔古解毒防風湯相兼選用是也丹溪云
鼠粘子連翹山查甘草此
四味瘡疹始終必用之藥

診睦親宮中十大王瘡疹云瘡疹始終出未有他證不
可下但當用平和藥類與乳食不受風冷可也如瘡疹三
日不出或出不快即微發之鼠粘子湯之類如瘡發後不多出即
加藥如一日一貼加藥不出即大發之升麻葛根防風羌
活獨活麻黃桂枝
類如發後不多及脈平無証即瘡本稀不可更發也有大
熱者當利小便小熱者當解毒利小便四
聖散之類若不快勿發勿
下攻止用抱龍丸治之瘡疹若起能食者大黃丸下一二
行即止有大熱者當利小便有小熱者宜解毒若黑紫乾
陷者百祥丸下之不黑者慎勿下身熱煩躁腹滿而喘大
小便澀面赤悶亂大吐此當利小便不瘡者宜風散下之

蔡古海
藏宗錢
氏法

也若五七日痲不焦是內發熱氣蒸於皮中故瘡不得焦
痲也宜宣風散導之用生犀角磨汁解之使熱不生必着
痲矣

論曰癍疹之病其為證各異瘡發焮腫於外屬少陽三
焦相火也謂之癍小紅靨行皮膚中不出者屬少陽君火
也謂之疹凡顯癍疹若自吐瀉者不可妄治而多言謂邪
氣上下皆出也大凡癍疹首尾皆不可下恐動則生變此
謂少陽通表宜和之也當先安裏解毒次微發之解毒須
安五臟防風湯是也如大便不秘者須微發之藥宜錢氏
方中選而用之如大便過秘宜微利之當歸丸惠變百祥
丸是也初知癍疹若使之併出小兒難禁是以別生他症
也首尾不可下者首曰上焦尾曰下焦若既吐利安可下
便宜安裏若不吐瀉者先與安裏藥三五服如能食而大

便秘結內實者宜疎利之若內虛而利者宜用安裏藥一
二服末後一服調以微發之藥要之安裏之藥多發表之
藥少秘則微疎之令邪氣勿壅併而能作番次出使兒易
禁也身溫者順身涼者逆二者宜多服防風湯和之
安裏解毒防風湯

防風

地骨皮

黃芪

芍藥

荆芥

枳殼

鼠粘子各等分

右為末水煎四五錢服若能食而大便實宜當歸丸微
利之

當歸丸

東變百祥丸

二方並見痘瘡大便秘門

夫癩之為病皆由子在母腹中時浸漬食母血穢溫而
成毒皆太陰濕土壅滯君相二火之所作也因小兒真氣
既盛正氣又旺邪無所容或遇天寒感傷表或因傷裏癩

由是而出焉治當何如外者外治內者內治中外皆和其
癩自出至於惡寒者發之表大熱者奪之渴者清之大便
秘結者下之小便不通者利之驚者安之泄者分之可以
執一為哉大抵傷寒同治隨經用藥最為高論假令五日
已裏諸病與癩疹不能別辨者不可疑作癩疹必須發之
但各從其所傷應見治之皆不妨癩出若強發之其變不
可勝數矣前人言首尾俱不可下者為癩未顯于表下則
邪氣不得伸越此脈證有表而無裏故禁首不可下也尾
不可下者為癩毒已顯於外內無根蒂大便不實無一切
裏證下之則癩氣逆陷故禁尾不可下也又言溫煖蓋覆
不令通風以癩毒或身表涼而惡寒或天冷寒而惡冷溫
煖蓋覆不令通風也癩若已出身熱天暄何必用蓋覆而
不使之通風乎後人執此二句首尾俱不敢下溫煖不令

通風不知天令之所加人身之所盛致使悞人多矣大抵前人之言隨時應變後之人不知其變故常執而不移也噫首尾俱不可下者以其始終臟腑元無凝滯也若有一切裏證及大便結者安得不下溫暖不使之通風以其發在冬時故如此也若發在夏時癰雖未出亦不用此也癰之用藥大率以脈為主浮中沉之診平舉按之候察其虛實定其中外則可以萬全矣

如外傷升麻湯主之方見本門內傷枳實丸主之大方俱見大便更

者枳朮丸主之若傷冷者溫之神應丸三方俱見惡

寒者發之宜防風蒼朮湯方見本門表大熱者奪之此表

者通言三陽也夫陽盛者氣必上行言奪者治之不令上

行也是知無三陽表證有三陽裏證染於有形也此言表

總三陽之名也 渴者清之大渴者白虎湯暑月用之小兒

者涼膈散涼膈散去硝黃加甘桔者穩大便秘結者下之桃仁承氣

湯四順飲子柴胡飲子選用察其在氣在血必內實能食

而秘者可用但當微微潤之 小便不通者利之導赤散

八正散之類當求上下二焦何經而用之 驚者安之涼

驚丸重者瀉之瀉青丸 泄者分之寒則異功散四君子

湯熱則澤瀉茯苓湯

小兒癰疹初發未能辨認間但求所出之由因內因外及

不因外內隨其所傷如法服餌防其變故抑其盛氣比之

他證尤不可緩或發或瀉或解其肌或化其毒求其所起

之由涼血清肺調其臟腑平其飲食謹其禁忌嚴其養攝

適其寒溫將理有法俾盡其道使出無不快之經成無不

痂之潰既愈之後不致遊毒流汗虛腠目疾膜翳瘡癤癰

瘤喉閉隘腫潮熱汗泄此治癰之大畧也 凡未出而發

搖者是外感風寒之邪內發心熱之所作也當用茶粉下
解毒丸犀角地黃湯主之 一發出便密如針頭形勢重
者合輕其表而涼其內連翹升麻湯 若癰已發密重微
喘飲水者有熱證用去風藥微下之 若出不快清便自
調知其表不存裏當微發升麻葛根湯 若青乾黑陷
身不大熱大小便澀則是熱在內煎大黃湯下宜風散
若身表大熱者表證未罷不可下 若癰已出見小熱小
便不利當以八正散利之 若已發後有餘毒未散復有
身熱瘡腫之類當茶粉下解毒丸 凡瘡疹已出後有聲
音者乃形病而氣不病也 瘡疹未出先聲音不出者乃
形不病而氣病也 若瘡疹出而聲音不出者是形氣俱
病也當清其肺氣宜用八風湯并涼膈散去硝黃亦可
丹溪分
氣血虛
小兒痘疹分氣血虛實以四君子四物酒炒芩連等服

寶貝

之

氣虛參朮加解毒藥 血虛四物加解毒藥

右加解毒者酒炒黃芩炒黃連是也海藏云解毒者三

黃湯金花丸之類

痘瘡分人之清濁就形氣上取勇怯 痘瘡黑屬血熱

涼血為主白屬氣虛補氣為主中黑陷而外白色起遲者

則補氣中畧帶涼血藥

陳氏惟
主溫補

痘瘡未出已出之間或瀉渴或腹脹或氣促謂之裏虛

速與十一味木香散治之 如已出之間其瘡不光澤不

起發根窠不紅謂之表虛速與十二味異功散治之 如

已出之間其瘡不光澤不起發根窠不紅或瀉渴或腹脹

或氣促是表裏俱虛也連與十二味異功散送下七味肉

苳菴丸治之 丹溪云木香異功散二藥治寒 如瘡始出

醫學綱目卷三

痘

一日至十日渾身壯熱大便黃是表裏俱實也其瘡必光澤必起發必飽滿必易屬而不致損傷若無他疾不宜服藥表裏俱實者易出易屬表裏俱虛者易出難屬表虛難出裏虛難屬隨症治之

張氏之治痘要法吐瀉少食為裏虛陷伏倒屬灰白為表虛二者俱見為表裏俱虛全用異功散救之甚至薑附靈砂亦可用若止裏虛減官桂若止表虛減肉豈菟不減官桂丁香若能食便秘而陷伏倒屬者為裏實當用錢氏及丹溪下法若不吐瀉能食為裏實裏實而補則結癍毒紅活綻凸為表實表實而用表藥則潰爛不結痂凡痘但見癍點便忌葛根湯恐發得表裏俱虛也

辨陳氏之偏
讀前人之書當知其立言之意苟讀其書而不知其意求適於用不可得也痘瘡之論錢氏為詳歷舉源流經絡

分明表裏虛實開陳施治之法而又證以論辨之言深得著書垂教之體學者讀而用之如求方員於規矩較平直於準繩引而伸之觸類而長之可為無窮之應用也今人不知致病之因不求立方之意倉卒之際據證驗方謾爾一試設有不應并其書而廢之不思之甚也近因局方之教久行素問之學不講抱疾談醫者類皆喜溫而惡寒喜補而惡解利忽得陳氏方論皆用燥熱補劑其辭確其文簡歡然用之翕然信之遂以為錢氏不及陳氏遠矣或曰子以陳氏方為不足歟曰陳氏方誠一偏之論雖然亦可謂善求病情者其意大率歸重於太陰一經蓋以手太陰屬肺主皮毛足太陰屬脾主肌肉肺金惡寒而易於感脾土惡濕而無物不受觀其用丁香官桂所以治肺之寒也用附木半夏所以治脾之濕也使脾與肺果有寒與濕而

兼有虛也量而與之中病則已何傷之有今也不然但見
出遲者身熱者泄瀉者驚悸者氣急者渴思飲者不問寒
熱虛實率投木香散異功散間有偶中隨手獲效設或誤
投禍不旋踵何者古人用藥製方有向導有監制有反佐
有因用若錢氏方固未嘗廢細辛丁香白木參芪率有監
制輔佐之藥不專務於溫補耳然其用寒涼者多而於補
助一法畧示端緒未曾深及癡人之前不可說夢錢氏之
慮至矣亦將以候達者擴充推廣用之耳雖然渴者用溫
藥痒塌者用補藥自陳氏發之迥出前輩然其多用桂附
丁香辛芳燥熱恐未為適中也何者桂附丁香輩當有寒
而虛者固是的當虛而未必寒者其為患當何如耶陳氏
立方之時必有挾寒而用一偏之方寧不過於熱乎予嘗
會諸家之粹求其意而用之實未敢據其成方至正甲申

辨瘡疹候

陽氣早動正月間邑間痘瘡不越一家率投陳氏方童幼
死者百餘人雖由天數吾恐人事亦或未之盡也

傷寒男體重面黃女面赤喘息急各憎寒口中氣熱呵
欠頓悶項急瘡疹則顯赤躁多噴嚏悸動昏倦四肢冷傷
寒當發散之瘡疹當溫平之有大熱者宜解毒 昏睡喜
嚏悸者將發瘡疹

辨癍證 呵欠 噴嚏 睡中急驚 耳尖冷 眼澁

辨傷寒 口熱 口中醋氣 妳辦不消 腹中疼痛

瘡疹候面燥顯赤目胞亦赤呵欠頓悶乍涼乍熱咳嗽
嚏噴足稍冷夜臥驚悸多睡此瘡疹症天行之病也

錢氏論屬五臟

睦親宮十太尉瘡疹衆醫治之王曰疹未出屬何臟腑一
醫言胃氣熱一醫言傷寒不退一醫言在母腹中有毒錢
氏曰若言胃氣熱何以乍涼乍熱若言母腹中有毒屬何

臟也醫曰在脾胃錢氏曰在脾胃何以驚悸皆無以對錢氏曰夫胎在腹中月至六七則已成形食母腹中穢液入兒五臟食至十月即穢液滿胃至生時兒口中猶有不潔產母以手拭淨則無疾病俗以黃連米粉下其臍糞之穢此亦母之不潔餘氣入兒臟中本先因微寒又遇風寒邪氣相搏而成痘疹也未出欲作之時熱動五臟則五臟之症先見初欲病時先呵欠頓悶驚悸乍涼乍熱手足冷面頰赤燥咳嗽噴嚏此五臟症俱見也呵欠頓悶者肝也時發驚悸者心也乍涼乍熱手足冷者脾也面赤頰頰赤咳嗽噴嚏者肺也惟腎無候以在腑下不能食穢故也凡瘡疹乃五臟毒若出歸一症肝水疱肺膿痲心為癩脾為疹腎雖無症其候惡者瘡變倒靨而黑陷則歸腎也此由不慎風冷而不能食內虛所致也今太尉疹子無他證當

用平和藥為治因用抱龍丸數服愈海藏云本先因微寒

冷而不能食內虛一句勿認作寒証用抱龍丸即知瘡疹多熱也

瘡疹始出之時五臟症見惟腎無候但見平症耳尻涼耳涼是也尻耳俱屬於腎其居北方主冷也

痘疹始出之症必先見面燥腮赤目胞亦赤呵欠頓悶乍熱乍涼咳嗽噴嚏足稍冷多睡睡驚並瘡疹之症或生膿泡大瘡或生小紅瘡或生癩疹此三等不同何故俱顯上症而後乃出蓋已上諸症太陽寒水起於右腎之下煎熬左腎足太陽膀胱寒水夾脊逆流上頭下額逆手太陽丙火不得傳道逆於面上故顯是症蓋壬癸寒水尅丙丁熱火故也諸瘡症皆從寒水逆流而出也醫者當知此理乃敢用藥大胞者一名赤宮一名丹田一名命門男子藏精施化婦人繫胞有孕俱為生化之源非五行也非水亦

非火此天地之異名也象坤土之生萬物也夫人之始生也血海始淨一日二日精勝其血則為男子三日四日五日血脈已旺精不勝血則為女子乃二物相搏長先身生謂之神又謂之精道與釋二門謂之本來面目是也其子在腹中十月之間隨母呼吸呼吸者陽氣也而生動作滋益精氣神飢渴皆隨母血兒隨目長筋骨皮肉血脈形氣俱足十月降生口中尚有惡血啼聲一發隨吸而下此惡血復歸命門胞中僻于一隅隱伏而不發直至兒因內傷乳食濕熱之氣下陷合于腎中二火交攻榮氣不從逆於肉理惡血乃發諸癩疹皆出於腎水其湯後聚肉理歸於陽明故三番癩始顯之症皆足太陽壬膀胱尅丙小腸其始出皆見於面終歸於陽明肉理熱化為膿者也二火熾盛反勝寒水遍身俱出此皆從足太陽傳變中來也

驗時

始發潮熱三日已上熱暈入皮膚即發瘡疹而不甚多

者熱留皮膚之間潮熱隨臟出如早食潮熱不已為水泡之類也已午潮熱為癩申酉潮熱為膿辰戌丑未潮熱為疹也

用藥驗

驗癩法若三日未覺形迹當以生酒塗身上時時看之

狀如蚤痕者是也或曰傷寒傷食潮熱與癩疹不能辨者宜以辛涼之劑調之五日已裏發出即汗五日已外無者非癩也各隨應見而治之

治瘡施

治小兒壯熱昏睡傷風風熱瘡疹傷食皆相似未能辨

認問服升麻葛根湯惺散小柴胡湯甚驗蓋此數藥通治之不致誤也惟傷食則大便酸臭不消化畏食或吐宜

以藥下之海藏云宜以藥下之者當察其所傷何物生硬升麻葛根湯寒熱不等不可處以巴豆之類大毒之藥下之少陽渴小便不利也小柴胡湯治往來寒熱胸脇微痛少陽也然欲知其經當以脈別之

癩症未
顯服藥

小兒耳冷尻冷手足乍煖乍凉面赤時嗽時噎驚悸此瘡
疹欲發候也未能辨認間服升麻湯消毒散已發未發皆
宜服仍用胡荽酒黃栢膏暑月煩燥食後與白虎湯玉露
散熱盛與紫雪咽喉或生瘡與甘桔湯甘露散餘依前說
大人小兒同治法惟大小不同耳海藏云消毒散太陽藥
也白虎湯治身熱目疼
鼻乾不得臥陽明藥也甘露散肺腎藥也甘桔湯少陽藥
也紫雪天冬麥冬黃芩生地為血劑玉露散肺腎藥也石
膏寒水石為氣劑已上
五方皆瀉時暑之藥

升麻葛根湯治傷寒瘟疫風熱壯熱頭痛瘡疹已未發並
宜服之

升麻 葛根 芍藥 甘草各等分

右同為細末每服四錢水一盞半煎至一盞無時溫服

海藏云升麻葛根湯太陽陽明之藥陳文中云身熱腹
痛者身熱泄瀉者身熱驚悸者身熱汗出者身熱足冷
者俱不宜服升麻葛根湯張巽之云凡
痘見癩點忌葛根湯恐發得表虛也

惺惺散治小兒風熱瘡疹傷寒時氣頭痛壯熱目澁多睡
咳唾氣壅鼻塞涕

白朮 桔梗 細辛 瓜蒌根

人參 茯苓 甘草各等分

右咬咀每服二錢水一盞生薑三片入薄荷三葉煎至

半盞時時與服活人云加防風川芎亦各隨經也海藏
云惺

惺散治風熱咽不利脾不
和少陽渴小便不利也

右二方發表平劑

王朝奉四物解肌湯

芍藥 升麻 葛根

每服四錢水一盞煎至七分去渣服或云小兒傷寒疫

癘潮熱瘡疹五日已衰疑似不能辨別者並皆辛凉之

劑調之即以四物湯解肌之類海藏云此論即有表也
若內傷腹中有物未得

大便而發熱者當以食藥去其物則可若得便後仍發熱在表者亦宜此解肌湯比錢氏升麻葛根湯減甘草加黃芩以有表熱之意也

田防風蒼朮湯治小兒邪熱在表惡風惡寒瘡疹未出可解表發癩疹

防風兩 蒼朮 石膏各一 甘草炙半

川芎 黃芩各二

右為錢末每服二錢生薑三片薄荷七葉水煎日二服

此方惡寒者宜用之

右二方辛涼之劑表有熱者宜之

大便酸臭不消化畏食或吐乃內傷飲食宜枳朮丸傷冷食飲神應丸

傷食宜消導之

田一男子年十六歲發熱而昏目無視耳無聞兩手脈皆豁大而畧數知其為勞傷矣時里中多發痘者雖不知人

與藥則飲與粥則食遂教以參芪當歸蒼朮陳皮大料濃

與之飲至二十餘貼痘始出又二十貼則成膿疱身無全

膚或曰病勞可畏何不用陳氏全方治之予曰此但虛耳

無寒也只前方守之又數十貼而安後詢其病因為先四

五日恐有出痘之患遂極力採樵連日出汗甚多

錢五臟各有一證 肝臟水疱 肺臟膿疱 心臟癩

脾臟疹 婦腎變黑

海肝臟水疱色或青肺臟膿疱色或白脾臟疹或如麩糠

色心臟癩其色赤變婦腎則色黑矣此五色凡痘疹一色

者善或二色三色相合而作者凶 第一大小不等

小兒在胎十月食五臟穢血生下則其毒當出故瘡疹之

狀皆五臟之液肝主淚肺主涕心主血脾為裹血其瘡出

有五名肝為水疱以淚出如水其色青而小肺為膿疱以

五臟見症

涕稠濁如膿其色白而大心為癩主血其色赤而小次於水疱脾為疹其色赤黃而小涕淚出多故膿疱水疱皆大血榮於內所出不多故癩疹皆小又病水疱膿疱者涕淚俱少以液從瘡出故也譬如泡中容水水去則泡瘦矣

右水疱者俗謂之水痘也膿疱者俗謂之痘子也癩者俗謂之瘡子也疹者俗謂之麻子也痘之形狀最大水痘次之癩瘡又次之麻子最小隱隱如麻子也

更看時月重輕大抵瘡疹屬陽出則為順故春夏病為順秋冬病為逆冬月腎旺又盛寒病多歸腎變黑又當辨春膿疱夏黑陷秋癩子冬疹子亦不順也

凡瘡疹只出一般者善 先發膿胞後發疹子者順 先發水疱後發疹子者逆 先發膿胞後水疱多者順少者逆 先發水疱後發癩子多者逆少者順 先發疹子後

辨逆順輕重

發癩子者順 先發膿胞後發癩子者逆

海藏云此一句諸臟相合而不齊也用藥亦難矣前斷云五色各隨五臟亦有二色相合或有三色即無定也此與前後膿水癩疹大小不同先後逆順大意相若

凡瘡疹若出辨視輕重若一發便出盡者必重也痘夾疹

者半輕半重也出稀者輕裏外肥紅者輕外黑裏白者微

重也外白裏黑者大重也瘡端裏黑如針孔者熱劇也青

乾黑陷昏睡汗出不止煩燥熱渴腹脹喘喘大小便不通

者困也凡瘡疹當乳母慎口不可令飢及受風寒必歸腎

變黑難治

海藏云或熱極反兼水化者亦能變黑當以涼藥主之不可不察以脈別之可也或有出色正者內素有熱頭反陷色或灰青似黑中有針眼陷當急以清涼藥疎之便結者大黃牽牛之類便軟者金花丸之類主之

陳輕者作三次出 大小不一等 頭面稀少 眼中無

根窠紅 肥滿光澤

重者一齊並出 密如蚕種 身熱腹脹 瘡灰白色

周密無縫 瀉渴不止 頭溫足冷

輕變重 犯房室 不忌口 先曾瀉 飲冷水 餌涼

藥 重變輕 避風寒 常和暖 大便稠 不燥渴 忌生

冷 忌外人

右飲冷水耳涼藥若內有實熱者不須忌之

二日三日痘瘡始見微微纔出如粟米大或如黍米大或

如菜豆大似水珠光澤明淨者佳不須服藥

四日五日痘瘡大小不等根窠紅活光澤明淨者輕如稠

密陷頂灰白色瀉渴者重

六日七日痘瘡肥紅光澤者輕如身溫氣促口乾腹脹足

指冷者重

指冷者重

八日九日痘瘡長足肥滿蒼蠟色者輕如寒戰悶亂腹脹

煩渴氣急咬牙者至重也

十日十一日痘瘡當腐瘡加欲落而愈如身熱悶亂腹脹

泄瀉寒戰咬牙者重

金黃栢膏如瘡疹已出此藥塗面次用胡荽酒外治法

黃栢兩 菜荳粉二兩 甘草四兩 紅花二兩

右同為細末生油調從耳前至眼眶並厚塗之日三兩

次如早塗瘡不至面縱有亦少錢氏云瘡疹護眼人多用脂據元醫云不如

錢氏黃栢膏最好諸家護眼法無出此方也

補痘瘡初出用鼠粘子為末水調傳頰明並無患眼亦妙

胡荽酒 胡荽一味細切四兩以好酒蓋煎一二沸入

胡荽再煎少時用物合定放溫每吸一大口微噴從頂至

足勾遍勿噴頭面病人左右常令有胡荽氣即能辟去污

塗面護眼法

噴體令快法

氣瘡疹出快

變重為輕法

痘疹初出時或未出時見時人有患者宜預服此藥多者令少重者令輕以丝瓜近蒂三寸連皮子燒灰存性為末沙糖拌勻乾喫入硃砂末更妙

消消毒救苦湯治痲症悉具消化便令不出若已出稀者再不生痲十一月立此方隨四時加減惟通造化明藥性者能之

麻黃根

羌活

防風各五分

柴胡

川芎各二分

細辛

藁本二分

升麻五分

葛根

黃芩酒炒各二分

黃連三分

黃柏酒炒五分

紅花少許

蘇木一分

歸身三分

吳茱萸半份

白朮一分

蒼朮二分

甘草生

橘皮各一分

連翹半錢初出者或出大者加

生地五分

右咬咀每服五錢水二大盞煎至一盞去查稍熱服痲

疹者因內傷必出班乃榮氣逆故也大禁牽牛巴豆峻

藥宜半夏枳實大黃益智仁之類去瀉止吐若耳尖冷

呵欠睡驚嚏噴眼澁知必出痲也宜

升麻

葛根

白芍藥

甘草

歸身

連翹各等分

右咬咀水煎服此定法也後隨症加減

如肺出膿痲先顯喘嗽或氣高而喘促少加人參黃芩

以瀉伏火而補元氣如心出小紅痲必先見噎乾驚

悸身熱肌肉腫脈弦洪少加黃連如命門出癩疹必

先骨痛身熱其疼痛不敢動搖少加生地黄栢諸痲

疹皆為陰症瘡皆因內傷乳食脾胃不足榮氣逆行雖

火勢內熾陰覆其外故錢氏製四物升麻湯發之如有

分五藏施治

傳變症依加減法服之

世如疹痘則發於脾宜陳氏人參清膈散疹者皮膚隱隱如麻名曰麻子

水疱者多因傷寒熱毒而發宜升麻散及羌活散方見

分乾温治

淵瘡乾者宜退火濕者用瀉濕退火止用輕劑荆芥升麻

葛根連翹之類瀉濕乃肌表間濕宜用風藥防風白芷之

類痘初起時自汗不妨蓋濕熱薰蒸而起故也

診生死

世痘瘡不治症有七 一憂齒痘黑陷喉中涎喘因先受

風冷血氣虛弱即變此症 二憎寒困倦痘子縮伏 三

瘡作坑內無膿血或黑色泡或瘡跡作黑色 四痘癰壅

腫痘毒變疔口臭銀爛牙落 五聲啞氣噎或咽藥腹中

鳴 六痘初出而半在皮膚帶紫黑色不出者 七誤於

踈轉氣啞者 凡出前後心密及兩手心兩足心密者皆

不可治

論痘不治有五 痒塌寒戰咬牙煩躁不止 紫黑色

喘渴不寧 頭温足冷悶亂欲飲水 目睛上視齒齙氣

促泄瀉不止 灰白色陷頂腹脹喘渴不止

治小兒瘡疹與傷寒相類頭痛身熱足冷脈數疑似之間

只與升麻湯解肌兼治瘡子已發未發皆可服但不可踈

轉此為大戒傷寒身熱固不可下瘡疹發熱在表猶不可

轉世人不學乃云初覺以藥利之宜其毒也誤矣海藏云

當在經則可若熱甚過極足冷或內傷腹熱足冷宜以寒

藥如洗心調胃及化食藥通膈之類主之然當求責臟府

秘與不秘脈道何如耳許氏云上熱下冷傷食也痘疹初

傷手足亦冷惟傷寒一身盡熱不與足冷相類此傷食非

王德孚用感應丸治之痘瘡已出不可踈轉出得已定

膿血太盛却用踈利亦非也海藏云此言若在經而出不

時後重如刺疾及脈大抵瘡疹首尾皆不可下海藏云

滑在裏者亦當微下小兒身耳尻冷咳嗽輒用利藥即害人海藏

疑滯者不可拘此

可拘此

禁忌

言裏和而少陽之氣在經熱者故用化毒犀角湯為氣出裏若氣未出裏未盡求責疎利亦可 凡治疹痘纔瀉則令內陷決不可輕易轉下惟大小便多日不利宜微微利之及痘已靨尚有餘熱停留或作熱或作瘡瘕或成癰宜四順飲下之不特消餘毒亦免生他症累試累驗 每見疹痘者服發表麻黃藥出汗陽氣盡出膚表遂至癰爛臟虛則腹痛自利或作寒戰或作陰癰死者多矣

陳痘瘡自初出至已愈之際父母切忌房事

四凡痘瘡勿令親近狐臭漏腋者房中淫慾者及婦人經候醉酒葷穢硫黃蚊藥一切腥臊疫汚蒸濕誤燒油髮五辛發糞淋尿熬油煎卵俱當忌之

三瘡疹忌外人及穢觸之物雖不受風冷亦不可擁逼常令衣服得中並溫涼處坐臥

陳痘瘡發熱口乾煩渴不止者切不可與水喫亦不宜與蜜红柿西瓜橘子等冷物食之 若脹實中有實熱者不必忌生冷 痘瘡

欲靨已靨之間忽不能靨腹脹煩渴不可與水蜜等冷物食之或頭溫足指冷或瀉渴氣促亦不可與之 十二日

十三日瘡痂已落其麻猶黯或凹或凸肌肉尚嫩不可濕浴亦不宜食炙煨物酸辣五辛有毒之物恐熱毒熏膈眼目多生翳障

海世人徒知憐惜過愛信其俗而不藥病已成而方憂摩撫從容無所不從豈知愛之適足以害之惜之適足以棄

之始不早治治不全終卒之殞斃勞而無功至是咎醫嗚呼其計亦繆矣

痘出太密

丹疎則無毒密則有毒用涼藥解之雖數十貼亦不妨無

執

害眼之患

一發便密如針頭形勢重者合輕其表而涼其內連翹升麻湯主之

鼠粘子湯治癩疹已出稠密身表熱急與此藥防後青乾黑陷

鼠粘子炒二錢當歸身酒浸甘草炙柴胡
連翹 黃芩各一錢地骨皮二錢

右咬咀每服二錢水煎去渣溫服空心服藥畢且勿與乳食

調肝散治瘡疹太盛宜服令瘡不入眼

生犀二錢草龍膽一錢黃芪半兩大黃二錢
桑白皮炒黃麻黃去節釣藤子各一錢石膏半兩
瓜蒌仁去皮甘草炒各二錢

右為麤末每服二錢水煎食後溫服微利效

出太多者犀角地黃湯地骨皮鼠粘子湯犀角地黃湯方見血地皮散加鼠粘子是也

又解瘡毒藥

絲瓜 升麻 芍藥酒炒 甘草生
山查 黑豆 赤小豆 犀角

右咬咀水煎服

癩已發密重微喘飲水者有熱證用去風藥微下之治男子勞傷出痘昏不知人身無全膚者方見痘未愈

痘出不快

錢氏消毒散 化毒湯活人鼠粘子湯已上三方並見本條中有鼠粘子荆芥防風皆發痘之要劑也

右三方發瘡痘皆溫平溫涼藥錢氏所謂三日不出或

大法

出不快即微發之者是也如微發不出者即就與前項藥該每服二錢者即加至三四錢該每日二服者即加至三四服如加藥又不出者即用升麻葛根麻黃桂枝大發之如大發後不多及脈平無事者即瘡稀不可更發如脈洪有熱有大熱者當用四聖導赤八正輩利小便便有大熱者當用芩連及金花丸輩解毒若利小便解毒後又不快則勿發勿下止用抱龍丸治之此皆錢氏心法也

虛

丹勉奴痘已出第三日色淡不肯發此血氣俱虛與此方

人參錢一 白朮炒 黃芪酒 歸身酒洗各
陳皮分二 甘草炙少 訶子煨 荳蔻煨一

右煎入好酒些飲之
右治氣血俱虛

彭疹痘發未透宜四君子湯加黃芪紫草糯米煎凡醫百病不可損胃氣故用四君子及糯米等助其胃氣山園孝志續錢

氏方

世六一湯專發痘瘡之膿

黃芪錢六 甘草錢一

右咬咀每服二錢水六分煎入酒二分同煎至半盞溫服更加橄欖同煎尤好加山藥亦得

右治氣虛

活活血散治瘡子或出不快用白芍藥末酒調如欲止痛

只用溫熱水調嚥下海藏云張和之治四肢出了不快加防風大效此症乃大陰藥也

世四物湯治痘瘡出不快不甚紅活不起根窠綠血虛故也此藥能活血調順痘疾無如此方自古及今用之如賢只加甘草服之

虛寒

右治血虛

女子瘧後出痘血氣俱虛又值冬寒熱易退不出

丁香五粒

附子五分

桂枝半錢

甘草二分

人參兩半

黃芪一錢

陳皮

當歸酒洗各五分

陳異功散治痘瘡已出之間不光澤不起發根窠不紅謂之表虛

木香

當歸各三錢

桂枝

白朮

茯苓各二錢

陳皮去白

厚朴薑製

人參去蘆

肉蔻各二錢半

丁香一錢半

半夏薑製一錢半

附子炮去皮一錢半

右咬咀每服二錢水一盞薑五片棗三枚煎服

右治虛寒虛而不寒者宜用前方血氣俱虛之劑不宜用此必脈虛細四肢身冷者方可用之

虛熱

藍根散治瘡疹出不快及倒靨一名二聖散救小兒垂死

板藍根一兩

甘草炙七分

右末每服半錢反雄雞冠血三兩點同溫酒少許食後

調下無時甚則三五服立效丹溪云藍能散敗血

若出不快清便自調知其不在表不在裏當微發之宜升

麻葛根湯

消毒散治瘡未出或已出未能勻遍又治一切瘡涼膈

去痰治咽喉痛

牛蒡子炒三兩

甘草炙半兩

荆芥穗二錢

右同為麤末每服三錢水一盞半去查溫服海藏云此之劑一法加防風薄荷

治鼠粘子湯治小兒痘瘡欲出未能得透皮膚熱氣攻咽

喉眼赤心煩

鼠粘子炒四兩

荆芥穗

甘草各一兩

防風兩半

表裏清便自調宜表

右為細末沸湯點服臨臥大利咽喉化痰涎止嗽老幼皆宜海藏云太陽少陽之劑首論溫平者此也

海又法用牛蒡子炒熟為末同荆芥煎服

右三方消毒飲加減法也

活化毒湯治小兒瘡痘已出未出並宜服之

紫草茸 升麻 甘草各等分

右咬咀水二鍾粳米五十粒同煎此陽明之藥也海藏云出不快者化毒湯本方用糯米去梗米

丹亞玉痘出兩日不甚透食稍進汗微出熱畧減但食物口中覺有惡味此出得遲發未透須微微表之

升麻 甘草 紫草 白朮

作一貼加少酒同煎白芍須炒見其大便雖出不多却

白帶溏滑

陳皮 芍藥炒半

世透肌湯治痘不透

紫草 白芍藥 升麻 秫米粉炒各半兩

右三方皆化毒湯加減法也

海太陽出不快身之後也 荆芥甘草防已湯

陽明出不快身之前也 升麻加紫草湯聖惠方升麻葛根加紫草

少陽出不快身之側也 連翹防風湯即連翹散

四肢出不快 防風芍藥甘草湯

痘疹煩不得眠者 甘桔加梔子湯

桔梗 甘草 梔子 各等分煎服

活治痘出不快煩躁不得眠者 水解散麻黃黃芩湯升麻

黃芩湯主之海藏云莫若定其氣血用石膏梔子之類尤佳麻黃黃芩湯升麻黃芩湯亦當求責的是

太陽陽明方可用之

煩不得眠者宜汗利之

太

方

水解散治天行頭疼壯熱 二日兼治疔瘡未出煩躁或
出尚身體發熱者

麻黃去節 四兩 大黃 黃芩 桂心

甘草各二兩 芍藥各二兩

右為麤末患者以生熟湯浴訖以暖水調下二錢相次
二服得汗利便瘥強人服二方方七風實之人三伏中
亦宜用之若去大黃春夏通用

升麻黃芩湯治痘瘡出不快煩躁不得眠 麻黃黃芩湯
治痘瘡出不快益煩躁昏憤或出而身熱者已上二方見小兒傷

便難宜
流行

四聖散治瘡疹出不快及倒靨一方有黃芪

紫草茸 木通 甘草各 枳殼炒

右等分為麤末每服一錢水一鍾煎至八分溫服無時

劉提點云疹痘最要大小分曉錢氏四聖散
用木通枳殼極好若大小流利不必苦泥

田紫草迴癩散小兒痘疹出不快或倒靨毒氣入腹

紫草茸 黃芪 桑白皮 木通

枳殼 白木各等分

右為麤末每服三錢水酒各半盞麝香少許同煎服

海紫草木通散治小兒瘡疹

紫草 木通 人參 茯苓

粳米各等分 甘草減半

右為末每服四錢水煎此小便不利之劑也

世 人參蟬蛻散治小便不利瘡痘不散燥躁多渴憂牙咬

齒氣麓喘滿

人參 蟬蛻 白芍藥 木通

赤茯苓 甘草 紫草茸各等分 水煎服

紫草散發痲疹

釣藤鈎子

紫草茸各等分

右為細末每服一字或五分一錢溫酒調下無時

海小兒瘡疹出未快可濃煎紫草汁服

右紫草例為通利腠理要藥也

瘡不綻黃狗蠅四五枚用常酒研細服之未綻再服冬月在耳內取之

汚血

雜方

直絲瓜湯發瘡疹最妙絲瓜連皮燒灰存性百沸湯調下
痘痒塌

虛實

田痒塌者於形色脈上分虛實實則脈有力氣壯虛則脈無力氣餒實痒則勢熾虛痒則氣怯虛痒以實表之劑加涼血藥實痒以大黃寒涼之藥少許與之下其結糞痘瘡痒塌不掩

白朮一錢半

黃芪錢半

當歸

陳皮各五分

甘草些

水煎溫服

雜方

予治一子七歲痘將出未出之際腹泄數行其泄色黑不發根窠三日後痒塌抓即黑色口渴其根窠如水疥狀不紅澤不起發食少脈浮數有力按之虛遂用參芪歸朮陳皮肉豈惹為君炙甘草訶子桂為佐使水煎熟好酒些少咽下痒立止食立進根窠紅澤而起發二服全愈

丹輕者用淡蜜水調滑石末以雞羽潤瘡上

陳痘痒難任搔之成瘡或膿或血出者敗草散治之切不可用牛糞灰貼則臭穢痲瘵多矣

屋爛草

屋上爛草也如無牆頭上爛草亦可用此草經霜雪雨露而感天地之氣善解瘡毒

右一味為末每研碎篩末若渾身瘡破爛膿水不絕粘貼衣裳難以坐睡可用二三升攤於床褥上令兒坐臥

其效如神

小兒痘瘡痒難任候搔成瘡及瘡痂欲落不落用上好白蜜一味塗於瘡上其痂易落可無紫黑癩痕

世傳痘瘡落後痘毒不盡變成癩癧其痒難任用陳年鴈脂油傳神妙

又方用羊髓骨髓煉一二沸入輕粉少許研成白膏毫合盛之塗瘡效

痘灰白色

寒熱

丹爐灰白色靜者怯者作寒看躁者勇者焮發者作熱看

大小利為表虛為裏實

凡痘疹白色將靨如豆殼者蓋因初起時飲水多其靨不齊俗呼倒靨不妨但服實表之劑如毒氣鬱裏消息他大小便如大便閉通大便小便閉通小便無妨

虛寒

吳店小兒周歲痘瘡色白甚痒藥中每加參芪半兩

白朮五分

丁香兩

當歸一錢

官桂三分

黃芪兩

水煎服

虛熱

予族姪女笄年出痘灰白色身熱喘嗽渴脈洪有力與八物湯加連翹桔梗犀角屑半夏木通紫草乾葛石膏杏枳連芩前胡瓜蒌仁服之十貼後色紅活喘嗽緩減漸微但熱未除遂於前方減芪杏胡枳連芩蒌七味服三十餘貼而安安後髮皆落月餘方起床虛之盛也○又一男子二十餘歲出痘已破未破者灰白色又雜間以黑陷倒靨者發熱寒戰身痛脈洪或時弦亦與八物加木通紅花紫草陳皮連翹服十餘貼而安

痘黑陷倒靨

虛服 紫草散治瘡痘黑陷曾服此方愈 元錢皆云有枳殼難

紫草

甘草

糯米

九云此味極好助胃氣

黃芪 各等分 水煎服

丹痘瘡黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡出者用黃芪人參酒炒紫草治之顏色正者如上治法

色淡補血

如將出成就之際却色淡不正者屬血虛宜用補血藥當歸川芎白芍酒洗之類或加紅花

色紫解毒

如將成就之際却色紫不正者屬熱宜用涼藥解毒升麻芩連枯梗連翹之類甚者用犀角屑

如用後一項諸藥色仍不正者宜兼用二法

大小症利脈淨者宜通表

回生散治瘡疹倒靨黑陷用人牙燒灰存性入麝香少許研細每服半錢用黃芪白芍藥煎湯調下立效錢氏方中用溫酒調下雲岐方中用升麻紫草煎湯調下

湯治痘瘡黑陷藥不能發者有驗用川山甲一味燒存性為細末入麝香當門子少許一歲五分三歲一錢溫酒調

下一服取效雖半身黑陷欲絕者亦能暫甦而發紅色但有目閉無覓者不復生矣

此方雖驗回生散又佳今詳麝香恐不宜服

麻黃湯用麻黃剪去根節五錢用蜜一匙同炒良久以水半升煎候沸去上沫再煎去三分之一氣用查病瘡疱

倒靨黑者乘熱盡服之避風俟其瘡復出一法用無灰酒煎更速但小兒不能飲酒者難服以此藥入表也

世傳此法累用效有

大小症脈實者調和畏

活瘡黑倒靨猪尾湯無比散龍腦膏子無不驗

海藏云若用草藥下已而後用之可也

猪尾膏治瘡倒靨用小猪尾尖刺血兩點入生腦子少許同研新汲水調下食後立效

龍腦膏子治時疫發痘瘡及出瘡子未透心煩狂躁氣喘
妄語或見鬼神或已發而陷伏皆宜速治不治其毒入臟
決死用生龍腦一錢研細滴猪心血和丸如豆子大每服
一丸心煩狂躁者用紫草湯化下若瘡子陷伏者用温酒
化下少時心神便定得睡瘡疹發透依常將息取安海藏云此
一法証極而用故
活人云不得已也

海四糞散治癰瘡倒靨黑陷出御院藥方 歌曰人猫猪犬臘

辰燒每服三錢蜜水調選甚倒靨并黑陷萬兩黃金也合

消臘月辰日合此藥甚驗

子和人中黃臘月者最佳通風處以火煨成煤水調下三
五錢陷者自出丹溪云子和黑陷甚者用燒人尿卽此方
也

世治疹痘不透乾黑危困用山查肉一味為末每服二錢

紫草酒送下量兒大小加減徐徐進三四服卽紅活

海劉守真涼膈散治小兒癰疹黑陷亦妙然止能治大便
結硬小便赤澁為當若大便小便已通不宜用此惟以易
老去大黃硝者最為穩當

寒戰咬
牙者下
之

錢凡痘疹重者猶十活四五黑者無問何如十難救一其
候或寒戰咬牙或身黃腫紫宜急以百祥丸下之復惡寒
不已身冷出汗耳尻反熱者死何以然腎氣大旺脾虛不
能治故也下後身熱氣温欲飲水者可治以脾氣生勝腎
寒去而温熱也治之宜解毒不可妄下妄下則內虛多喘
於腎若能食而痲頭焦起或未焦而喘實者可下之宜四
順飲 瘡赤陷而耳尻反熱者為逆用百祥丸牛李膏各
三服不愈者死

百祥丸一名南陽丸治瘡疹黑陷寒戰咬牙戛齒身黃紫

腫

紅牙大戟

不以多少陰乾漿水煮軟去骨日中曝乾復納汁煮汁盡焙乾為末

右水丸如黍米大每服一二十九研芝麻湯下吐利同

無時此方治屢齒甚妙

牛李膏用牛李子不以多少取汁石器內熬成膏牛李子生野道邊至秋結實黑子成穗如無生者以乾者為末水熬代用每服皂子大煎杏膠湯化下此藥須於九月中取之

睦親宅一大王病瘡疹始用一李醫又召錢氏錢留與抱龍丸三服李以藥下之其疹稠密錢氏見大驚曰若非轉下則為逆病王曰李已用藥下之錢曰瘡疹始出未有他症不可下也但當用平和藥頗與乳食不受風冷可也瘡痂若起能食者大黃丸瀉一二行即止今先下之瘡疹未

能出盡而稠密甚則難治此誤也縱得安其病有三一者疥二者癩三者目赤李氏不能治經三日黑陷後復召錢曰幸不發寒病未困也遂用百祥丸為主牛李膏為助各二大服至五日間瘡復紅活七日而愈蓋黑者歸腎水也腎旺勝脾土不尅水故脾虛寒戰則難治所用百祥丸者以瀉膀胱之腑腑若不實臟自不盛也何以不瀉腎由腎主虛不受瀉如二服不效即加寒而死矣

子治瘡疹黑陷鐵脚歲靈仙為末炒一錢腦子一分用

溫水調服取下瘡痂為效

治無比散治小兒瘡疹惡候

硃砂

先研一兩

牛黃

麝香

樟腦

膩粉

細研各一錢

右同研細如有患者小兒一字大人五分入水銀少許

用小猪尾上血三兩點新水同調服寧穩得睡者然後
取轉下如爛魚腸蒲萄穗之類涎臭惡物便安小兒用
乳汁調妙海藏云此瀉內熱之極不能開發於外則宜
此內雖過泄外亦開發即透肌膚之藥與至
寶丹

小兒癩疹黑陷方

乾胭脂錢 胡桃一箇燒
存性

右為細末煎胡荽酒調下藥一錢立效

右治死血黑陷凡前方用川山甲及麝香等藥治黑陷
皆為氣滯者設也

雜方

治癩疹黑陷用臘月禿梟腦子一箇或二箇以好酒調
服若乾者以好酒浸少時化開依上條服立效禿梟百
勞鳥也

箬葉散治倒靨用箬葉一味燒灰為末麝香酒下

瘡黑而忽瀉便膿血并痂皮者順水穀不消者逆何以

診

然且瘡黑屬腎脾氣本強或舊服補脾藥脾氣得實腎雖
用事脾可制之令瘡入腹為膿血及連痂皮得出是脾強
腎退即病出而安也瀉米穀及瀉乳不化者是脾虛不能
致腎故自泄也此必難治海藏云瀉出痂皮根在內也表
裏俱病是為火鬱水穀化者順
水穀不
化者逆
未縱一齊黑者為陷已縱而不齊黑者為將靨

痘寒戰

虛寒

憎寒困倦或發寒戰能令痘子縮伏宜用陳文中異功

散方見痘出
不快條

虛熱

寒戰咬牙黑陷者百祥丸下之方見黑
醫條嘗治痘瘡寒戰

用白朮芪歸加苓治之愈

痘發熱

熱

胡宅痘瘡發熱此血少有餘毒也

陳皮

白朮

歸身

白芍藥各三錢

牛蒡子

研破炒

木通

犀角

生甘節

川芎各一錢半

分六貼水盪半煎食前稍熱服

小熱者解

連翹散治一切熱兼治瘡疹如神

連翹

防風

梔子

甘草各等分

右為末水煎服

海藏云治熱在外而不厥此少陽藥也

易老云涼膈去大黃芒硝者能解六經中熱此不惟解熱治小兒癍疹熱候亦使發之則本藥與防風荆芥二物各

半白水煎服

河梔子金花丸

黃芩

黃連

黃柏

山梔炒各等分

右末滴水丸如葶子大每服五九白湯下

錢三黃丸治諸熱

黃芩兩半

大黃煨

黃連各二錢半

右為細末月丸葶苈大每服五七九至十五二十九食

後米飲送下

右錢氏云有小熱者解毒海藏謂解毒者三黃丸金花

丸之類是也

四聖散方見出

海藏紫草木通湯方見同上

導赤散方見治虛

煩渴腹滿喘急

八正散方見林部

丹有初起煩躁譫語狂渴引飲若飲水則後來醫不齊急以涼藥解其標如益元散之類可用

右五方利小便退熱之劑錢氏云有大熱者利小便又

云身熱煩渴腹滿而喘大小便澀面赤悶亂大吐此當

利小便蓋此用導赤散之類是也

利小便
後熱不
退者下
之

錢宣風散

檳榔兩

陳皮

甘草各半

牽牛四兩生

右為細末三二歲蜜湯調下五分已上一錢食前易老

加防風

雲通膈九利上下氣血藥也

大黃

牽牛

木通各等分

右為細末滴水丸如粟粒大每服三五丸量兒大小

虛實加減

右錢氏云有大熱利小便不瘥者宜宣風下之

瘡痘得
水而活

子和蔡河有舟師偶見敗蒲一束沿流而下漸泊舟次似
聞啼聲而微開視之驚見一兒四五歲許瘡疱周匝密不
容隙兩目皎然飢而索食因以粥食之其妻怒曰自家兒
女多惹瘡疱傳染奈何私料蔡河流緩必不遠持兒一鞋

逆流而上徧問皆曰無此兒行二十里又至一村落舟師
呼於市曰有兒年狀如許瘡疱死棄河中今復活忽酒邸
中有人出曰我某村某人也兒四五歲死於瘡疱舟師出
其鞋其人泣曰是吾兒也奔往視驚見兒活流涕拜謝舟
師抱兒歸今二十餘矣此兒本死得水而生第未驗其瘡
疱之疾寒耶熱耶

痘寒熱

大和散治瘡痘後寒熱往來嗜臥煩悶躁亂

生地

當歸

地骨皮

人參

甘草各等分

白芍藥各等分

右咬咀每服一錢水半盞煎至三分去渣溫服

痘渴

陳十妹年廿歲出痘而有孕十箇半月大渴不甚出透

寒熱交作血虛氣虛

人參

白朮

黃芪

陳皮

甘草炙

歸身各一錢

薑三片酒水各半盞煎服

海瘡疹大腸閉澀或發渴四君子加瓜蒌根桔梗主之

若身熱小渴者六味人參麥門冬散治之如不愈或身熱

大渴者七味人參白朮散治之又不可愈十一味木香散

六味人參麥門冬散

麥門冬去心

人參去蘆

甘草炙

陳皮

白朮

厚朴薑製各半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至六分去渣溫服虛人減

厚朴

七味人參白朮散

方見消渴門○已上四方四君子加減法也

面赤煩躁大小

初起煩躁渴引飲者急以涼藥解其標

虛為熱

身熱煩渴腹滿而喘大小便澀而赤悶亂大吐此當利

小便不澀者宜風散下之

面白腹脹為寒

陳十一味木香散集驗方本治瘡痘身熱作渴方見後渴瀉條

文中云腹脹渴者瀉渴者足指冷渴者驚悸渴者身溫渴

者身熱面皯白色渴者寒戰渴不止者氣急咬牙渴者飲

水轉木瀉不已者已上九證即非熱也乃津液少脾胃肌

肉虛故也宜木香散治之如不愈更加丁香官桂此說必加審用

之脹渴瀉瀉渴驚悸渴寒戰渴咬牙渴亦多屬熱者不可不察

痘渴瀉

陳牙兒十九歲出痘有紅癍吐瀉而渴

蒼朮一錢

白朮三錢

黃芪一錢半

陳皮二錢

茯苓

甘草炙

硝砂

當歸各一錢半

薑三片同煎服

身熱脈
洪數為
熱

從子六七歲時患瘡痘發熱微渴自利一小方脈視之用
木香散每貼又增丁香十粒予切疑焉觀其出遲因問自
利而氣弱察其所下皆臭滯陳積因腸胃熱蒸而下也恐
非有寒而虛遂急止之已投一貼矣繼以黃連解毒湯加
白朮與十貼以解丁香之熱利止瘡亦出其後肌常有微
熱而手足生癢癩與涼劑調補踰月而安 一男子十餘
歲出痘熱時出根脚密嘔吐不食腰背骨節痛大渴喉痛
腹亦痛全不食者半月餘脈浮弦洪而數與參芪歸朮灸
甘草陳皮半茯苓薑煎服之至五日日色淡又加桂些少婦
芪再用酒製至七日痒甚加丁香三粒附子些少痒止至
八日九日渴大作而腹泄瀉痒甚至十日寒戰遂用白朮
為君芪陳苓炙甘草歸朮臣至十一日不瀉或痒或譫語
但守前藥半月後自吐虫痰多而安

身冷脈
虛遲為
寒

陳十一味木香散治疹痘腹脹渴其效如神必須密察的
是寒症六脈
虛細身不甚熱或發寒或嘔吐肚腹痛
或身熱四肢俱冷者可用此方出集驗

木香

大腹皮

人參

官桂

赤茯苓

青皮去白

前胡

訶子皮

半夏

丁香

甘草

炙各
三兩

右咬咀每服二錢水一盞薑三片煎空心溫服

異功散集驗方瘡痘頭溫足冷腹脹瀉渴方見痘
出不快

表裏俱
虛

張巽之云吐瀉渴少食為裏虛異功散減官桂主之此症

瀉渴不可喫蜜水痘出之間不光澤不起發根窠不紅或

瀉渴或腹脹或氣促是為表裏俱虛與異功散送下七味

肉苳蔻丸治之

異功散方見
痘出不快

痘瀉不渴

虛寒

瘡疹不渴臟寒下利四君子加乾薑減半主之

痘疹大便不固痘漸黑陷小兒乳母同服

人參 白茯苓 肉苳蔻 黃芪各半兩

甘草灸二錢

右咬咀每服一錢水半盞薑五片棗一枚煎三分乳母倍服若大瀉手足厥冷加附子用驗

肉苳蔻丸治痘疹泄瀉

木香 砂仁 白龍骨 訶子肉

肉蔻麩裹煨各半兩 赤石脂 白礬枯各七錢半

右為末糊丸如黍米大一歲三十九三歲百丸溫米飲下瀉止勿服

痘吐逆

痘瘡吐逆無痰益黃散有痰二陳湯或橘皮半夏湯不止者加丁香若吐而瀉者亦宜益黃散及陳氏木香散異

功散 吐而身熱煩渴腹滿喘大小便澀面赤者當利小便不澀者宣風散下之全文見大法

痘腹脹

勉奴痘後渴肚急小便少發熱

芍藥五分 川芎三分 白朮五分 陳皮五分

乾葛三分 甘草錢半 木通二分 水煎服

寄子五歲痘後肚急

白朮錢一 陳皮 木通各五分 犀角

川芎 白芷各七分 甘草錢三分 水煎服

陳文中木香散治痘瘡腹脹渴瀉方見痘

腹滿而喘大小便澀身熱面赤悶亂大吐者當利小便不

澀者宣風散下之全文見大法

痘腹痛

熱

虛寒

實熱

痘腹痛多是痘毒當臨證消息

丹吳店子出痘瘡腹痛

丁香二枚

官桂

芍藥各一錢

白朮

當歸各五分

右作一貼服 常治痘始出腹痛或身痛脈洪數者解

表涼藥加芍藥甘草漸安

痘喘

世瘡痘出後喘急痰盛宜杏甘湯人參清膈散

杏甘湯治瘡痘煩喘渴躁

麻黃

桑白皮

杏仁

甘草

右等分爲麤末每服三錢水一盞煎食後服

海瘡疹肺不利紫草甘草枳殼湯

虛熱 陳人參清膈散

人參

桑白皮

柴胡

當歸

芍藥

知母

茯苓各半兩

白朮

黃芪

紫苑

地骨皮

滑石各一兩半

甘草

桔梗各一兩

黃芩半兩

石膏一兩

右咬咀每服三錢水煎溫服

實熱 痰實壯熱胸中壅悶臥則喘急前胡枳殼湯主之

前胡

枳殼

赤茯苓

甘草各五錢

大黃量兒加減

右咬咀每服三錢水一盞煎六分旋服

喘而腹滿大小便澀者利小便不澀者宜風散下之法錢氏

痘出之間或氣促者木香散主之

痘大便秘

治瘡疹已出未出大便秘澀或時發渴四君子加瓜蒌

實 根桔梗治之 當歸丸

當歸兩半 甘草一分 黃連 大黃各二錢半

先將當歸熬膏子入藥末三味為丸加服之以利為度

海 惠變百祥丸治癩疹大便秘結 紅牙大戟去骨 青州葱去核

右用水二盞同煎至水盡為度去大戟將葱焙乾可和作劑旋丸從少至多以利為度

治 洗心散治痘瘡壯熱大小便不利狂言多渴

大黃 甘草 當歸 麻黃去節 白朮 芍藥 荆芥各等分

雜方

陳 四五日不大便者可用肥嫩猪脂一塊白水煮熟切如

豆大與兒食之令臟腑滋潤瘡痂易落百無碍滯

診治

痘餘毒

海 癩瘡餘毒或肝虛入眼目或肺虛為癬疥或為癰癤發在骨節腎之虛也發在肌肉脾之虛也或在筋或在頭或在面或牙齒疳蝕或咽喉腫痛各隨經而見皆毒不散蘊積而成或病人始不早治或醫者失治遺於經絡其所由來蓋有自矣宜服解毒等劑

世 痘毒攻脾則泄瀉身浮攻肝則眼生翳膜攻心則煩躁啼哭攻腎則耳疼膿聚攻肺則咳嗽痰涎

治 小兒痘瘡餘毒未散食穀太早補住毒氣

鼠粘子六錢 甘草五分 犀角三錢 荆芥 防風各一錢 白朮二錢 枳殼一錢 水煎溫服

痘入目

丹法

如痘傷眼必用山梔赤芍决明歸鬚連翹防風桔梗升麻小劑末之調服如眼無光過百日後血氣完復則自明矣

治瘡疹後毒氣攻眼或生翳膜赤黑之類宜用四物湯加荆芥防風煎服兼用黑豆皮穀精草海蛤甘草等分爲末用熟猪肝切片蘸服神妙方治痘毒目翳用江西蛤粉黑豆皮甘草蜜蒙花

痘後生翳數服效用葳靈仙仙靈脾等分洗淨不見火與日爲細末每服隨時宜第三次米泔下

錢氏法

錢氏黃柏膏痘初出塗面護眼方見痘大調肝散治瘡疹

大盛服之不入眼方見痘密羊肝散即下蜜蒙散方見活人條蟬蛻散治癩瘡入眼半年已裏者一月取效

右二味研入羚羊角細末二分拌勻每服一字百日外兒一二分三歲三四分漿水或新水調下日三四夜一二食後一年已上者不治

治瘡疹入眼

馬屁勃兩半 皂莢子十四粒 蛇皮兩半

右入小罐子內鹽泥封固燒存性研細溫酒調下三錢

食後

治瘡疹入眼或翳

括萎根兩半 蛇皮二錢

右爲細末用羊肝一箇批開入藥末二錢麻線纏定米泔煮熟頓與食之兒未能食肝乳母多食之

又方用蟬蛻末以水煮羊肝湯調服二三錢

地黃散治小兒心肝壅熱目赤腫痛生赤翳或白膜遮

海藏法

醫學綱目卷五

五

睛四邊散漫者尤易治若暴遮黑睛者多致失明宜速用此方亦治瘡疹入眼

熟地

當歸各一

黃連

大黃煨各一錢

生地去心

木通各一錢半

防風

羌活

生犀末

蟬蛻去土

木賊

穀精草

白蒺藜

沙苑蒺藜已上各一錢

甘草半錢

玄參五分

右為細末每服一字或五分量兒大小加減煎羊肝湯食後調下日三夜一忌口將息大人亦治

東垣注

治痘瘡風熱毒翳膜暈遮睛以瀉青丸治之大效初覺

易治

用竹葉湯和沙糖水化下瀉青丸二丸漸至微利神效

活人法

瘰入眼用决明撥雲密蒙花通聖蛤粉散之類然無出

此書海藏云莫若病時隨經而取不使毒氣轉入眼中為尤妙然眼有五輪亦當求貴此言為失治者說也

决明子

瓜蒌仁各半兩

赤芍藥

甘草各一分

右為細末入麝香少許令勻每服二錢生米泔調下臨

臥服

撥雲散治瘡痘入眼及生翳用桑螵蛸真者一兩炙令焦

細研搗為末入麝香少許每服二錢米泔調下

密蒙花散治小兒痘瘡入眼及無辜疔氣入眼

密蒙花三兩

青箱子

决明子

車前子各一兩

右末拌勻用羊肝一大片薄批糝上濕帛裹煨熟量多

少空心服之錢氏海藏云即羊肝散

通聖散治疹痘瘡入眼及生翳

白菊花

如無甘菊代之然不如白菊好

菘豆

穀精草去根一兩

右為細末每服一大錢柿乾一箇米泔水一盞同煎候
米泔盡只將柿乾去核食之不拘時日三枚日近者五
七日遠者半月取效

蛤粉散治小兒瘡子入眼

穀精草 蛤粉各等分

右為細末每一錢七猪肝一兩許批開摻藥捲了用竹
箸裹麻線縛定水一碗煮令熟入收口斃瓶薰眼候温
取食之日作不過十日退

明 癩瘡入眼 大杼壯

痘咽四

如聖餅子治小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛海藏云隨經此

牛蒡子炒 甘草各一兩 麥門冬去心 桔梗一兩

右為末加竹葉同煎細細服之海藏云減門冬竹葉甘

鼠粘子湯 消毒飲二方並見前

小兒癩出欲透皮膚身熱咽喉不利甘草桔梗升麻湯

甘草兩半 桔梗一兩 升麻兩半

右 每服一大錢水煎服

錢 甘露飲子治心熱咽喉痛口舌生瘡并瘡疹已發未發

並可服之治熱上攻牙根腫痛動搖

生地 熟地 天門冬去心 麥門冬去心

枇杷葉去毛 枳殼炒 黃芩去心 石斛去苗

甘草炒 山茵陳

右各等分為麤末每服二錢水一盞煎食後温服牙齒

腫痛則含嗽并服海藏云甘露

田 地黃丸治小兒痘疹口瘡喉腫痛牙疳臭爛

天門冬 麥門冬 玄參各三兩 甘草

薄苛各一

右為細末生熟地黃汁和九櫻桃大每服一丸溫蜜水化服

痘風

虛實

痘風分氣血虛實以日子守之多帶氣血不足 虛則黃芪生血之劑助之畧佐以風藥 實則白芍黃芩為君連翹白芷續斷之類為佐若屬寒陳氏方可用

楊氏女年十餘歲痘發不透屬落後骨節痛食少夜間或熱此餘毒在內虛甚難於疎導須在補中有通此方主之

當歸

白朮

犀角

陳皮

通草

甘草

牛膝

蘇梗

右咬咀生薑三片水煎溫服

男子七歲痘瘡初出不透毒氣攻內骨節作痛兩足不可

直癩痕欠紅活脈浮而和小便赤少

婦身

白朮

陳皮

木通

犀角屑

人參

茯苓

甘草

右分二貼煎服

痘癩瘡

風火

疹後因
搗成糊

瘡疹搗由風火相勝也惟瘡疹能作瘡疹為脾所生脾虛而肝旺乘之木來勝土熱氣相擊動於心神心喜為熱神氣不安因搗成癩癩子為心所生心生熱熱則生風風屬於肝二臟相搏風火相爭故發瘡也治之當瀉心肝補

其母括萎湯主之

海葢云諸痛瘡皆屬於心火無論虛實皆從心火上調則肝乘之肝與

心火相合故用括萎湯若脾土實火旺逆乘而成癩者此實邪也便結者瀉青丸便軟者瀉青湯亦當以脈別之

括萎湯方見驚風

凡未出而發瘡者是外感風寒之邪內發心熱之所作

也當用茶粉下解毒丸犀角地黃湯主之

世治瘡痘欲出身熱煩躁忽發驚搐宜驅風膏小如聖飲小便不通八正散涎盛利驚丸抱龍丸量症施之

丹欲發瘡疹先身熱驚跳搐搦此非驚風宜發散藥

世麻痘風搐方
人參 羌活 防風 殭蚕醋
南星薑製 白附薑製 甘草炙

右等分生薑三片水煎服其搐立止

錢癩疹病後欲發癩餘瘡難發癩以木勝脾木歸心故也若涼驚用涼驚丸溫驚用粉紅丸即溫驚丸

治痘瘡痛用溫驚丸水化下方見前驚搐條
海治瘡出煩痛五物木香散

青木香兩二 丁香 零凌香各一兩 麝香一分

每服四錢水一小盞半煎服之熱盛者加犀角一兩如無犀角以升麻代之輕者一服大效

雜方 又方以芒硝和猪膽塗瘡上令動茄落無癩仍用黃土抹之良此病小便澀有血者中壞瘡背黑腐不出膿者死不

世痘將結腐乾硬而痛宜塗酥潤之腐可揭去則去之如無酥用猪油煎汁代之此痛非服藥可免也

海癩疹膿而不焦此本治失清涼之氣有如五穀得陽氣而成熟非涼風至則不能實也天地嚴肅之氣一加則萬物秀而實矣與癩疹何異須察何經而清涼之或下而成

痘膿而不痂痂牙切瘡腐曰痂

癩疹膿而不焦此本治失清涼之氣有如五穀得陽氣而成熟非涼風至則不能實也天地嚴肅之氣一加則萬物秀而實矣與癩疹何異須察何經而清涼之或下而成

雜考

嚴肅之氣則瘡氣必不至於膿而不痂矣要當知之餘毒不盡而疾作蓋出於此當是清涼飲非陽和則苗不秀非嚴肅則秀不實劉涓子訣云痘發如膿窠不肯腐者但調沙糖水與喫劉提點云亦曾試用但後來結癩痕白

錢五七日痂不焦是內發熱蒸於外故不得焦痂也宜宣風散導之用生犀磨汁解之必著痂矣

陳痘已腐未愈之間忽被風邪搏之成疔瘡宜雄黃散綿

蠶散治之又不愈多漬骨傷筋殺人

雄黃散治小兒牙齦生疳蝕瘡

雄黃錢一 銅綠錢二

右二味同研極細每用量瘡大小乾貼

綿蠶散治小兒因痘瘡身體及肢節上生疳蝕瘡膿水不絕用出蛾綿蠶以生白礬搥碎入蠶內令滿炭火燒令白

礬汁盡取出研極細每用乾貼瘡口上

錢凡痘瘡方纔著痂即用菜油不住潤之可揭則揭若不

潤及遲揭瘡痂硬即隱成癩痕矣

陳痘痂雖落其癩猶黯或凹凸肉起當用滅癩藥塗之

韶粉兩一

輕粉字一

右研細入煉過豬脂油拌和如膏塗癩上

痘後瘡癩

熱毒

四連翹散治小兒瘡疹癩痘疹餘毒作楚或生於頭面耳

疹頰赤生瘡

黃芩

瞿麥

木通

連翹

柴胡

荊芥

牛蒡子

滑石

羌活

赤芍藥

甘草各等

每服三錢水一盞煎半盞又入生薄荷尤好

痘瘡

實熱毒

痘瘡多是實毒血熱成瘡分上下用藥一日不可緩成

膿必用清熱涼血為主赤芍藥甘草節連翹桔梗之類

上引用升麻葛根下引用檳榔牛膝更助以貝母忍冬草

白芷瓜蒌大便燥用大黃寒熱用芩栝此法累效

保木香散治小兒癰後生瘡如神

地骨皮兩 木瓜兩 川山甲各黃三錢半

麝香一字

右為末米飲下二錢

痘瘡傳藥用貝母南星僵蚕天花粉寒水石白芷草烏

大黃猪牙皂角醋調傳患處效

中惡

楊小兒神守則強邪不干正若真氣衰弱則鬼毒惡氣中

之其狀卒然心腹刺痛悶亂欬死是也凡中惡腹大而滿
診其脈緊細而微者生脈大而浮者死即服蘇合香丸未
醒以皂角末搐鼻次服沉香降氣湯加人參茯苓又能辟
邪容忤亦宜服

降真香 白膠香 沉香 虎脛骨 酥

人參 鬼箭草 草龍膽各五錢

右為末次入雄黃五錢麝香一錢煉蜜丸乳香湯化又

令兒帶及燒臥內尤妙

廣治中惡容忤唾化麝香一錢重研和醋二合服之即瘥

海龍腦膏治小兒發熱在心胃卒不知人方見痘黑陷

湯凡中暑悶倒急扶在陰涼處切忌與冷若得冷即死當

用補藥及熱湯熨臍腹間煖即瘥如無湯即搗熱土暈於

臍上仍撥小窩子尿於中可代湯熨之良久嚼大薑一塊

以水嚥下續用解暑藥

針案 小兒口中腥臭膈氣滿勞宮主之

客忤

湯 客忤者小兒神氣軟弱忽有非常之物或未經識見之人觸之或經歷神廟佛寺與鬼神氣相忤也故謂之客忤亦名中客其狀吐下青黃白色水穀將下時腹痛反倒面變五色其狀若癩但目不上插耳其脈數者是也亦宜服蘇合香丸并真珠散

真珠散治客忤驚風鬼疰驚邪痰熱心舍不寧精神不定心常怔忡睡中驚跳時或咬牙五心煩熱有汗兼喘面赤舌白呵欠煩渴小便赤瀉或吐利黃沫常服辟邪安神

真珠

海螵蛸

滑石

白茯苓

人參

白附子

甘草

全蝎

麝香

腦子

生珠

金銀箔

銀二片

金三片

右末和勻半錢煎燈心麥門冬湯入蜜少許調服日午臨臥各一服

固 客忤因而驚忤者治法用竈中黃土研二兩鷄子一枚

去殼二件相和入少許水調先以桃柳枝湯浴兒後將此

藥塗五心及頂門上

陳無擇法用灶中黃土蚯蚓屎等分如此法塗之

治 卒客忤噤口不能言細辛桂心等分納口中效

醫學綱目卷之三十八

小兒部

脾主濕

吐瀉

吐

吐水吐虫

泄

瀉

乳食不化

赤白痢

腹脹附丁

水腫

疳

虛羸

鶴節

宿食

痞

哺露

癖

脾弱多困

渴

大小便秘

黃疸

腹痛

驚口

口

瘡

見心主熱門

口噤

滯頤

撮口

濕痰 白附丸通治小兒咳嗽有痰感冒發熱吐瀉心神不安

神效

南星二兩

半夏

白附子

白礬各一兩

右為細末薑汁糊丸如桐子大一歲兒服八九丸用薄荷

湯化下

南星半夏用冬藏雪水於六月六日浸起晒乾又浸凡九次方用

吐瀉

夏秋治
裏

錢小兒初生三日內吐瀉壯熱不思乳食大便乳食不消
或白色是傷寒當下之併和胃下用白餅子和胃用益黃
散主之

兒生三日已上至十日吐瀉身溫涼不思乳食大便青白
色乳食不消此上實下虛也更有五臟兼見證 肺睡露
睛喘氣 心驚悸飲水 脾困倦饒睡 肝呵欠煩悶
腎不語畏明 當先視兒兼臟症先瀉其所實者而補其
虛如脾虛益黃散主之此二症多病於秋夏也

五月身
熱瀉黃
九分下
一分補

五月夏至後吐瀉身壯熱者此熱也蓋小兒臟腑十分中
九分熱也或因傷熱乳食不消瀉深黃色玉露散主之

玉露散一名甘露散

寒水石

半兩軟而微青
黑中有細紋者

生甘草

一錢
石膏半兩堅
白而有

右同為細末每服一字或五分一錢食後溫湯調下

云非腎熱相火大
盛者不宜服此

六月身
溫瀉黃
白色六
分補四
分下

六月大暑後吐瀉身大溫而似熱臟腑中六分熱四分冷
也吐嘔乳食不消瀉黃白色似渴或食乳或不食乳食前
少服益黃散食後多服玉露散 廣親宮五太尉病吐瀉
不止米穀不化衆醫用溫藥一日而加喘吐不定錢氏曰
當以涼藥治之所以然者謂傷熱在內也用石膏湯三服
并服之衆醫皆言吐瀉多而米穀又不化當補脾何以用
涼藥王信衆醫皆用補脾丁香散三服錢醫後至曰不可
服此三日後必腹滿身熱飲水吐逆三日外果如所言所
以然者謂六月熱甚伏入腹中而令引飲熱傷脾胃即大
吐瀉也醫又行溫藥使上焦亦熱故喘而引飲三日當甚
衆師不能治復召錢至見其熱證以白虎湯三服更以白

七月瀉
身溫涼
三分下
七分補

餅子下之一日減藥二分二日三日又與白虎湯各二服
四日用石膏湯一服及旋合麥門冬黃芩腦子牛黃天竺
黃茯苓以硃砂為衣服五丸竹葉湯化下熱退而安
七月立秋後吐瀉身溫臟腑中三分熱七分冷也不能食
乳多似睡悶亂哽氣長出氣睡露睛唇白多噦欲大便不
渴食前多服益黃散食後少服玉露散 廣親宮七太尉
七歲病吐瀉是時七月其症全不食而昏睡睡覺而悶亂
哽氣乾嘔大便或有或無不渴衆醫作驚治之疑睡故也
錢曰先補脾後退熱與史君子丸補脾石膏湯退熱次日
又以水銀硫黃末研和以生薑水調下一字錢曰凡吐瀉
五月內九分下而一分補八月內九分補而一分下此者
是脾虛瀉醫妄治之至於虛損下之即死即當補脾若以
史君子丸恐緩已又留溫胃益脾藥治之醫者李生曰何

食而噦錢曰脾虛津少即嘔逆曰何瀉青褐水曰腸胃至
虛冷極故也錢治而愈

八月身
冷瀉青
一分下
九分補

八月秋分後吐瀉身冷無陽也不能食乳乾嘔噦瀉青褐
水當補脾益黃散主之不可下也

下後不
愈隨証
用藥

凡小兒盛暑吐瀉邪熱在下焦則瀉在上焦則吐亡津
必渴用玉露散雖吐時時與啜之過三日必愈 如身熱

脈大小便黃用五苓益元各半熱湯調溫服之 如身涼
脈細小便青早晨益黃散午後玉露散 如過四五日困

弱宜異功散和中丸開胃丸
如有風而瀉用防風羌活 謂吐瀉兼肝病 有熱而瀉
風搐拘急也

用黃連黃芩大黃 謂吐瀉兼心 有寒而瀉用附子 謂吐
瀉兼脾病身冷或足 病身熱也

有濕而瀉用白朮茯苓 謂吐瀉兼本藏
腎病而逆也 脾病多睡體重
昏倦 有肺病而瀉用芍藥桂心定喘麥冬人參甚者多
也

檳榔大便不通加大黃謂吐瀉兼肺病喘嗽也更詳看病新舊新則止之久則有腸風之患宜推陳致新法當宣風散導過後用入臟君臣藥調之宜益黃散

冬春治表身濕瀉黃白咳嗽先表後瀉

傷寒吐瀉身溫乍涼乍熱睡多氣短大便黃白色嘔吐乳食不消時咳嗽更有五臟兼見症當煎入臟君臣藥先服大青膏後服益黃散如先曾下或無下證慎不可下此乃脾肺受寒不能入脾也潔古云身溫吐瀉咳嗽是風木槌榔荳蔻湯下大青膏後服益黃散

身熱瀉黃而瀉先止瀉後表

傷風吐瀉身熱多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃水此為胃虛熱渴吐瀉也當生胃中津液以止其渴止後用發散藥止渴多服白朮散發散大青膏主之潔古云吐瀉身者五苓散主之身熱而嘔者當服白朮散後煎槌榔木香湯下大青膏傷風吐瀉身涼吐沫瀉青白色悶亂不渴噎氣長出氣睡

身涼瀉青不瀉

先補後表

露睛此傷風荏苒輕怯因成吐瀉當補脾後發散補脾益黃散發散大青膏主之此二證多病於春冬也潔古云身瀉者則知為寒煎附子桂枝湯下大青膏

先表不解者利之後補

小兒傷於風冷病吐瀉醫謂脾虛以溫補之不已復以涼藥治之又不能散謂之本傷風醫者亂攻之因脾氣積虛內不能散外不能解至十餘日其証多睡露睛身溫風在脾胃故大便不聚而為瀉當去脾間風風退則痢止宣風散主之後用史君子丸補其胃亦有諸吐痢久不瘥者則脾虛生風而成慢驚矣

吐瀉過多脾胃虛乏欲生風候者四君子加白附子減半生薑煎服

身熱瀉黃多瀉為熱

玉露散方見上和中散和胃止吐瀉定煩渴治腹痛

人參

茯苓

白朮

甘草

乾葛

黃芪

白蘆豆

藿香

右為細末每服三錢水一盞半東二枚去核生薑五片

煎八分食前溫服海藏云和中散四君子湯加減法

嬰小兒周歲吐乳腹瀉

滑石

白朮

乾葛

陳皮

右為麤末煎飲之

吐瀉身熱瀉黃多渴錢氏作熱病治在夏秋用玉露散兼

益黃散相間服在春冬用白朮散大青膏亦相間服

聖萬安膏

吐利四肢脹逆腦門低陷四君子加藿香丁香芍藥等

分煎服○錢氏益黃散方見小兒大法條

世和胃丸治吐瀉不止欲生慢驚

肢冷瀉青不渴為寒

丁香

白朮

半夏

藿香

蝎尾

右為末薑汁打糊為丸如小豆大三歲兒三十九薑湯

下

關理中丸治吐利不飲米穀不化手足厥冷方見傷寒

金液丹治吐利日久脾胃虛損手足厥冷精神昏塞多睡

露睛口鼻氣涼欲成慢驚風又治大人陽虛陰盛身冷脈

微自汗吐利小便不禁

船上硫黃十兩先飛陳去砂石秤研為末用砂盒子盛今八分滿水和赤石脂盛泥固封晒乾

露地先埋一水罐盛水滿坐盆子在上又以泥固濟

訖常以三斤火養三日三夜足加頂火一斤煨成冷

右以榔木槌乳鉢研為末每服二錢生薑米飲調下多

服取效大人藥末一兩蒸餅一兩水浸去水餅和丸桐

子大晒乾每服五十九至百九米飲空心下

關氏云吐瀉虛極當速生胃氣宜與理中丸併研金液丹末煎生薑米飲調灌之惟多服乃效俟胃氣已生手足漸熱然猶瘳即減金液丹一二分增青州白丸子一二分同研如上服兼用異功散羌活膏温白丸釣藤飲子之類仍類與粥雖至危者往往死中得生十救八九沈存中論金液丹見小兒吐利劇氣已絕服之得活者數人須多服方驗

芫薹散治吐瀉煩渴腹脹小便少

船上碗黃一分滑石五分丁香各半芫薹各半

右為細末每服一字至半錢米飲調下無時

芫薹散治虛寒而渴方見本條白朮散治虛熱而渴方見下吐條吐瀉身温瀉黃白似渴錢氏作寒熱雜合病治在夏秋用

玉露散益黃散相間服在冬春用益黃散大青膏相間服之

虛

異功散温中和氣治吐瀉不思乳食凡小兒虛冷病先與數服以正其氣一方加木香

人參 茯苓 白朮 甘草

陳皮各等

右為細末每服二錢水一盞生薑五片葱二枚同煎海藏

云此方內君子湯補脾湯加減法也

温中丸治小兒瀉白胃寒故也腹痛腸鳴吐酸水不思飲食霍亂吐瀉

人參 白朮 甘草各等

右為末薑汁麪糊丸如棗葶大米飲下二三十九無時吐瀉昏睡露睛者胃虛熱吐瀉昏睡不露睛者胃實熱

虛熱實熱

寒痰

胃虛熱治法錢氏白朮散和中散是也胃實熱治法錢氏玉露散河間益元散是也

半粟散治小兒脾胃虛寒吐瀉等疾及治寒痰

半夏湯浸切陳粟米陳梗米亦得用三分

右咬咀每服三錢水一大盞半生薑十片同煎至八分食前溫服

世白附丸方見上脾主濕條錢氏吐瀉乳不化傷食也宜下之

乳不化為傷食微則消之甚則下之

馮承務子五歲吐瀉壯熱不思食飲錢氏見兒月中黑睛少而白睛多面色眇白曰此子必多病面色眇白者神怯也黑睛少者腎虛也黑睛屬水本怯而虛故多病也縱長成必肌膚不壯不奈寒暑易虛易實脾胃亦怯更不可縱恣酒慾若不保養不過壯年也面上常無精神光澤者如婦人之失血也今吐利不食壯熱者傷食也又虛怯不可

下下之虛入肺則嗽入心則驚入脾則瀉入腎則益虛俱宜以消積丸磨化之為微有食也如傷甚則可下不下則成癖也若實食在內亦可下也下畢補脾必愈隨其虛實無不效者

嬰小兒吐瀉黃疸

三稜 蓬朮 陳皮 青皮

神麴 麥芽 黃連 甘草

白朮 茯苓

右為細末生薑燈心湯調服傷乳食吐瀉加山查時氣吐瀉加滑石發熱加薄荷

吐

虛 **嬰**萬安膏調脾順氣定驚脾胃不足吐乳黃疸治小兒一切等疾

木香三錢 沉香二錢 檀香三錢 香附一兩

檳榔兩半 白朮二兩 肉蔻兩半 薄荷二兩

人參兩半 甘草兩 辰砂三錢 琥珀一兩

真珠一分 青黛一分 犀角各二錢半 黃芪一兩

麝香五分 史君子一兩 天竺黃兩半

右為末煉蜜丸臨臥服薄苛汁或蜜水米飲化下

世萬安膏治小兒脾胃虛弱腹生疳虫癥瘕食積泄瀉常服消疳去積助胃氣和中疎氣滯

人參兩 木香一兩 沉香一兩 藿香各半兩

厚朴薑製一兩 甘草半兩 陳皮一兩 青皮一兩

乾薑實食肉桂各一兩夏不用 史君子炮十箇 澤瀉冬不用春秋減

右為末煉蜜丸如芡實大食前米飲化下如熱薄苛湯

下一方無木香沉香藿香青皮四君子有白朮蒼朮

苓猪苓 錢吐沫及痰或白綠水皆胃虛冷吐稠涎及血皆肺熱久則虛吐痰涎冷者温之

田朱沉丹治小兒嘔吐不止

硃砂二錢 沉香二錢 藿香三錢 滑石半兩

丁香十四粒 白朮 木香

右為細末每服半錢用新汲水一盞芝麻油滴成花子抄藥在上須臾墜濾去水却用別水空心送下

定吐紫金核治小兒一切嘔吐不止

半夏湯洗七次薑製 人參 白朮 木香

丁香 藿香各二錢半

右為細末稀麪糊為丸如李核大後用沉香一錢為末

寒吐

硃砂一錢水飛二味同研勻為衣陰乾每服一九用小
棗一枚去核納藥在內濕帛裏燒熟嚼與小兒服後以
米飲壓之

錢香銀丸治吐

丁香

乾葛各一錢

半夏湯浸切焙

水銀各半兩

右上一三味同為細末將水銀與藥研勻生薑汁丸如麻
子大每服一二九至五七九煎金銀花湯下無時

本白朮散治小兒吐嘔脈遲細有寒

白朮

人參

半夏各二錢

茯苓

乾薑

甘草各一錢

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去查

溫服日二三一方無半夏麩有木香藿香

湯小兒寒吐者由乳母當風取涼解脫致令風冷入乳變

敗兒若飲之故嘔吐也乳母當食後捏去舊宿敗乳急服
理中湯次用釀乳法其候是寒清痰夾乳吐出是也凡有
此候服藥不效胃氣將絕藥不能下當服靈砂丸如大便
通宜來復丹二藥常用驗

吐乳尋田中蚯蚓屎研如泥食前米飲下五分不過三

四次妙聖惠方

霍香散治脾胃虛有熱面赤嘔吐涎嗽及轉過度者宜

服

麥門冬去心

半夏麩炒

甘草炙各半兩

藿香一兩用葉

石膏兩半

右為末每服五分至一錢水一盞半煎七分食前溫服

治小兒嘔吐脈數有熱麥門冬散

麥門冬

半夏

人參

茯苓各二錢

熱吐

甘草錢一
右為末每服二錢水一盞薑三片煎至五分去渣溫服
日二三服

錢氏玉露散方見吐瀉

湯治小兒伏暑嘔吐清膈飲子

香薷
淡竹葉各一兩
白茯苓
人參
半夏
檀香
甘草各半兩
白粳米合

右咬咀薑煎溫服大小加減

小兒秋夏伏暑多有熱吐其吐黃涎頭額溫五心熱小便
或赤而少乃熱吐也或乾嘔而無物宜香薷飲方見中暑

疳積吐

治小兒疳積黃瘦吐食

川烏錢一
定粉錢三
艾灰錢二
龍骨錢二
右為末滴水丸如龍眼核大捏作餅子每服一餅米飲

風痰吐

磨下

鐵粉丸治涎盛潮搐吐逆

水銀砂子二錢
硃砂一分
鐵粉
天南星各一分
去皮臍
輕粉二分

右同研水銀星散盡為度薑汁糊丸如粟米大煎生薑
湯下十五丸至二三十丸無時

雜方

田氏朱沉煎 紫金核方見寒條

經治小兒吐不定用五倍子二箇一生一熟甘草一握濕

帛裹炮過同搗為末每服米泔調下半錢七擦

二氣散治虛實冷熱霍亂吐逆

硫黃不夾石者細研半兩
水銀一分與硫同研

右同研如墨煤色不見星為度每服一字至五分乾薑
水調下不拘時量見大小加減此散浮泛難調先洒少

水以指緩緩研之稍稍增湯調之治大人小兒一切吐逆諸藥不效者服此頃刻如神

禁忌凡小兒乳哺不宜飽滿飽滿而必溢故嘔吐 生下吐

見胎

針灸吐乳 灸中庭一壯

吐水吐虫

胃冷

主之

冬月吐酸多是胃虛寒而虫作吐用錢氏白朮散加丁香二粒

吐水不止者屬心痛胃冷

吐水心痛者虫痛 口中

吐沫水者後必重痛

泄瀉

虛

萬安膏治吐瀉腹痛吐乳

方見吐門

一法加陳皮薑棗

滑瀉

吐瀉四君子加陳皮厚朴等分同煎

傷食瀉

臟腑滑泄四君子加訶子五分米飲調下

黃承務子二歲病傷食而瀉衆醫與止之十餘日便青

白乳食不消身凉加哽氣昏睡咸謂困篤召錢錢先與益

黃散補肺散各三服三日身温而不哽氣後以白餅子微

下之又與益脾散三服利止何以然利本脾虛傷食初不

與下之留連十日上實下虛脾氣弱則引肺亦虛脾肺子

母故也今先補脾則肺病自退即身温不哽氣也然後下

其所傷或曰何不先下後補曰便青為下臟冷若先下必

大虛今先實脾而後下則不虛矣後更與補之乃安

見小兒

寒瀉

温中丸治胃寒瀉白腹痛腸鳴

方見吐瀉

四瀉青亦是寒宜用蘇合香丸平胃散各等分蜜湯調服
便青者因驚風內臟脾氣不和治宜白朮湯
凡大瀉引飲者其病不以新久皆宜服白朮散痢病亦
同治

執瀉 小兒夏月泄瀉用益黃散 瀉黃赤黑皆熱用益元散

黃栢丸之類

疳瀉 史君子丸治疳瘦泄痢腹脇脹滿方見疳門

診 小兒大便青澀飧泄脈小手足寒難已脈小手足溫易

已

乳食不化

胃冷

食不消脾胃冷故不能消化當補脾益黃散主之

乳食不消初病忽然氣出冷四肢亦冷面白無光澤精

神不定此乃胃氣不和可以大溫藥治之史君子丸益黃

散主之 若病泄瀉日久不瘥乳食不化是脾胃有風冷

先服益黃散二服後用宣風散導之胃宜再補

赤白痢

熱痢初

治小兒痢疾

黃連

黃芩

大黃

甘草

右煎服赤痢加紅花桃仁白痢加滑石末

湯治痢之法若欲取積只用官局進食丸甚穩雖取積又

能治痢萬無一失積已下急以四君子湯加薑薤訶子補

之次服厚腸香連丸得效

治小兒赤白痢多體弱不堪下大困重者麻子一合炒

令香熟為末每服一錢七蜜漿水和服效

疳瀉痢日久不瘥見疳門獨瀉不眠條

瀉黃紅赤黑者皆熱毒 瀉青白穀不化者胃冷

寒熱雜

體弱不堪下者甘寒潤

有積宜

白附香連丸治腸胃氣暴傷乳哺冷熱相雜渴痢赤白裏急後重腹痛扭撮晝夜頻併乳食減少

黃連

木香各錢

白附尖二箇

右末飯丸如粟米大每服十九至三十九米飲下食前日夜各四五服

荳蔻香連丸治泄瀉不拘寒熱赤白陰陽不調腹痛腸鳴切痛立效如神

黃連炒三分

肉荳蔻

木香各錢

右為細末粟米飯丸如米粒大每服十九至三十九日夜各四服食前米飲下

田木香丸治小兒泄瀉青白膿血相雜

黃連吳茱萸同炒去茱萸一兩

肉蔻煨二箇

木香一錢

右為細末麩糊丸如黍米大赤痢粟米飲下白痢厚朴

湯下空心

小香連丸治冷熱腹痛水穀利腸滑

木香

訶子肉各一兩

黃連兩

右為細末米飲和丸如菴荳大每服十九至三十九食前頻服之

赤痢四君子加赤芍藥當歸入粟米少許同煎

治熱痢備急方用井花水調騰茶蜜磨生薑湯則飲之

黃柏丸治小兒熱痢下血

黃柏半兩

赤芍藥四錢

右為末飯和丸如麻子大每服一二十丸食前米飲下

重兒加減

治小兒赤痢搗青藍汁二升分四服聖惠方治小兒中下血

治小兒尿血甘草五分以水六合煎取二合去渣一歲

兒一日服令盡

白痢四君子等分加乾薑減半入粟米少許同煮

治小兒久痢淋瀝水穀不消枳實六分搗末以米飲調

二錢七二歲兒服一錢

小兒噤口痢醱乳法

厚朴

枳殼各五

白朮

芍藥各半

滑石

木通

陳皮

甘草各五

右分四貼細研桃仁七枚水二盞半煎取一盞與母服

服時去宿乳令盡為妙

黃連例錢氏

加黃柏為二聖丸

加橘皮為橘連丸

加榆仁為榆連丸

加黃芩大黃為三黃丸

加阿膠茯苓為阿膠丸

加訶子木香為小香連丸

加荳蔻木香為荳蔻香連丸

加木香白附子

針灸

白附子香連丸治痢

加阿膠當歸乾薑為駐車丸治痢

小兒脇下滿瀉痢體重四肢不收痲痺積聚腹痛不嗜

食痰瘧寒熱

脾膈二穴在背十一椎下兩旁相去各一寸五分

秋深冷痢不止臍下二三寸間動脈中二

白脫肛十二椎下節間三壯又法翠尾骨上三寸骨陷

間三壯壯如

又法龜尾一壯脊端

腹脹附丁

虛寒

潔腹脹虛實凡久病吐瀉之後虛則其脈微細肺主目

胞及腮脾主四肢若色淡黃目胞腮虛腫手足冷先服塌

氣丸後服異功散和中丸四君子湯益黃散之類用諸温

藥養直氣異功散和中丸方見吐瀉

塌氣丸

胡椒兩

蝎尾兩半

醫學綱目卷三十一

五

右為末糊丸如粟米大每服五七丸至一二十九陳米
飲下無時一方有木香一錢

本調中丸治小兒久傷脾胃腹脹

乾薑 橘紅 白朮 茯苓

木香 砂仁 官桂 良薑各等分

右細末糊丸如麻子大每服二三十九食後熟水下

潔實則脈洪實不因吐瀉久病後亦不因痢下腹脹而喘

急悶亂更有痰有熱及有宿食不化而腹脹者宜服白餅

子大黃丸解毒丸下之兼須詳認大小便如都不通先利

小便後利大便白餅子方見癖○解毒丸方見喉痺○大黃丸方見傷寒

青丸小兒熱結於內腹脹壯熱大便赤黃躁悶煩亂者宜瀉

腹脹由脾胃虛氣攻作也實者悶亂喘滿可下之用紫

實者可下虛者不可下

不可下

霜丸白餅子此言未下而喘者為實故可下若誤下而喘者為虛氣附肺不可下也紫霜丸白餅子二

方見不喘者虛也不可下若誤下之則脾虛氣上附肺而

行肺與脾子母皆虛肺主目胞腮之類脾主四肢母氣虛

甚即目胞腮腫四肢黃色治之用塌氣丸漸消之未愈漸

加丸數不可以丁香木香橘皮荳蔻大溫散藥治之何以

然脾虛氣未出故雖腹脹而不喘可以溫散藥治之使上

下分消其氣則愈矣若氣虛已出附肺而行即脾胃內弱

每生虛氣入於四肢面目矣小兒易為虛實脾虛則不受

寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此勿誤也胃久虛熱

多生疽疔或引飲不止脾虛不能勝腎隨肺氣上行於四

肢而目腫若水狀腎氣漫浮於肺即大喘也此當用塌氣

丸病愈後面未紅者虛衰未復故也此下後喘故宜塌氣丸若未下而喘宜下

之○治腹脹者譬如行兵戰寇於林寇未出林以兵攻之

脹未下而喘為實已下而喘為虛

虛脹用
塌氣丸
不愈宜
下

痰積脹

必可獲寇若出林不可急攻攻則必有失當以意漸收之
即順也寇未出林謂虛氣未出而不喘不目胞腫腫故可
用丁香木香大溫散藥上下分清其氣而愈也寇
已出林謂虛氣已出為喘為
目胞腫須用塌氣丸漸消之
治小兒虛腹脹先服塌氣丸不愈腹中有食積結糞小便
黃時微喘脈伏而實時飲水能食者可下之蓋胆初虛而
後有積所治宜先補脾然後下之後又補脾即愈也不可
補肺恐生虛喘

阿魏丸治小兒食積腹如蜘蛛狀肚痛小便白濁

阿魏醋浸一宿研
如泥半兩

黃連炒半兩
研如粉

山查肉兩 連翹半兩

半夏皂角水浸
一宿一兩

右為末炒神麩糊丸如荀子大每服二十九空心米飲
下喫果子多者加胡黃連米食多者加神麩山查肉食
多者加阿魏

又阿魏丸

阿魏兩 黃連酒煮
六兩

右為末醋浸阿魏一宿研如泥湯浸蒸餅丸如元氣不
足加人參

小阿魏丸

山查肉三兩 石碱三錢 半夏一兩

右為末阿魏半兩醋浸糊丸白湯下

小兒疳病或腹大

胡黃連二錢去
果積 阿魏一兩半神麩
去肉積食積

黃連二錢去
熱積 麝香四粒
通竅

右為末每服十二粒白木湯下

肥兒丸治小兒病多因缺乳喫食太早所致或因久患
臟腑胃虛虫動日漸羸瘦腹大不能行髮豎發熱無精神

疝脹異名治法

黃連
神麩各一兩
麥芽炒半兩
木香錢一
檳榔三箇不見火
史君子
肉苳蔻麩裹各半兩
右為末糊為丸如桐子大每服三二十九丸量兒加減熟水吞下

六神丸治如前證

丁香
木香
肉苳蔻用麩裹煨各五錢

訶子煨去核半兩
史君子
蘆薈研各一兩

右為末以束肉和丸如麻子大每服五丸至七丸溫米飲下食前

丁奚者腹大頸小黃瘦是也無辜哺露三候大體相似輕重立名宜服十全丹
十全丹治丁奚哺露神效方

檳榔
枳殼炒
青皮
陳皮

三稜炒
蓬朮炒
砂仁各半兩
丁香

木香各一分
香附一兩

右為末神麩糊丸如黍米大空心食前米飲下百丸一方去香附砂仁丁香三稜枳殼加五靈脂白蔻史君子蘆薈蝦蟇川芎

治小兒腹如蜘蛛四肢瘦者用黑骨雞子破頂入蜘蛛一枚於內以濕紙糊竅用文武火煨熟去蜘蛛食其雞子累效必數枚方愈

實者分氣消積

中滿分消丸

黃連
枳實
厚朴各五錢
乾薑

薑黃
猪苓
砂仁
澤瀉

茯苓各三分
陳皮
白朮各一分
半夏四分

黃芩二錢
甘草一分

右為細末蒸餅為丸如黍米大每服三十九溫酒送下
消痞丸快利之劑

黃連半 枳實 黃芩 甘草

人參各三錢 厚朴七 乾薑四 橘皮錢一

薑黃五

右為細末蒸餅為丸如黍米大每服三十九隨乳下

丹腹脹

蘿蔔子 蘇梗 乾葛 陳皮各等分

甘草減半

如食減加白朮煎服

虛者升陽滋血

恒升陽滋血湯二月間一小兒未滿百日病腹脹不大便
二日便瘦弱遍身黃色宜升陽氣滋血和血補血利大便

蝎稍二 神麴三 厚朴 芫花各錢

桃仁十 升麻三

右作一服水一盞煎至半盞去查食前服

麻黃升麻湯治小兒面色痿黃腹脹食不下正月四月小

兒服之神效

麻黃二 桂枝一 杏仁 吳茱萸

草薢五 厚朴 麩末 羌活各一

柴胡根五 白茯苓一 白朮 青皮各五

升麻根 蒼朮 澤瀉 猪苓

陳皮各一 黃連五 黃栢一

右咬咀作一服水一大盞煎七分去查食前熱服

寄子年五歲痘後肚急

白朮錢一 陳皮 木通各五 犀角屑

川芎 白芷 蘇梗 甘草各三分

痘後脹解毒

針灸

右咬咀水煎服

治腹脹引背食飲多漸漸羸瘦黃可灸脾膈二穴七壯在十一頓下兩傍相去各一寸五分黃疸灸三壯

小兒腹滿不能食飲懸鍾主之

丁奚即脹治見張門丹溪條

水腫

湯藥

白文舉兒五歲身面皆腫尿多

山梔炒

桑皮炒各一錢

黃芩二錢半

白朮

蘇梗各一錢半

右咬咀作三貼水一盞半煎至半盞食前溫服

退腫散氣方

赤小豆

陳皮

蘿蔔子

甘草各半兩

木香炮七分

右為麤末薑煎服大小加減

又方

白朮炒

木香炮

甘草炙

茴香炒

青皮各半兩巴豆三十粒去膜同青皮炒去巴豆不用

右為末米飲調下

又方用錢氏益黃散加木香去丁香加蘿蔔子去訶子為末大小加減米飲調下

水腫加喘難治

腫病腎熱傳於膀胱熱盛逆於脾胃脾虛而不能制腎

水反尅脾土脾隨水行脾主四肢故流走而身面皆腫也

若加喘者重也何以然腎水勝而尅退脾土反勝心火心

又勝肺肺為心尅故喘或問曰心刑肺肺本見虛今何喘

實曰此有二一者肺大喘此五臟逆二者腎水氣上行傍

侵於肺故令大喘此皆難治

針灸

明水氣浮腫 分水三壯

疳

大法

疳者小兒病癖或久吐瀉醫者妄投轉過之藥小兒易為虛實致令胃虛而三津液內發虛熱外消肌肉一臟虛則諸臟皆弱其病目胞腫腹脹痢色無常漸加瘦瘠久不痊可是腸胃有風積法當宣風散導之後各依本臟補其母

疳在內
脹瀉

錢諸疳皆依本臟補其母及與治疳藥冷則木香丸熱則胡黃連丸主之疳在內目腫腹脹利色無常或沫青白漸瘦弱此冷證也宜史君子丸
史君子丸治臟腑滑及疳瘦下痢腹脇脹滿不思乳食常服安虫補胃消疳肥肌

厚朴 去麩皮薑汁
塗炙半兩

史君子 去殼一兩
麩裹煨

陳皮 去白
一分

甘草 炙到
半兩

訶子 半兩半生
半煨去核

青黛

半兩是兼驚及帶熱渴者宜此
方如只藏府不調不用青黛

右為細末煉蜜和丸如小雞頭大每服一九米飲化下
兒生百日已上三歲已下服半丸乳汁化下元方無青黛

厚腸丸治小兒失乳以食飼之不能化或生腹脹四肢瘦弱或利色無常

陳皮 三分

麥蘖 五分

半夏 三分

枳殼 五分

蒼朮 三分

青皮 二分

人參 三分

厚朴 二分

麩末 五分

右為細末麩糊丸如麻子大每服二十九溫湯送下忌飽食

本芎朴丸治小兒疳瘦瀉白水腹脹

芎藭 厚朴各一兩 白朮半兩
右為細末煉蜜丸如小彈子大每服一九米飲化下三歲已下半丸

治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢冷熱不調以漏蘆一兩杵為散每服以猪肝一兩散子一錢七塩少許水煮熟空心頓服

泄小兒腹大泄瀉水穀不化喫食不知飢飽累效

神麩炒 麥芽炒 三稜 青皮

香附 山查 厚朴 甘草

藿香 枳實 地黃 砂仁

黃連 枣子各等分

右為末白湯調下量兒加減

一富家子年十四歲面黃善喫易飢非肉不飽泄瀉二

瀉而多食為重

月來求治脈之兩手皆大怪不甚瘦倦以為濕熱當脾胃困而食少今反形健而多食且不渴予意其疾必疳虫作痢也取大便視之果蛭虫所為適往他處有一小兒醫在側教其用治虫藥治之禁其勿用去積藥約回途當為一看診而止痢也偶勿果至次年春夏之交其瀉復作腹不痛而口乾予曰此去年治虫而不治疳故也遂以去疳熱之藥濃煎白朮湯下三日而瀉止半月後偶過其家見其子甚瘦予教以白朮為君芍藥為臣川芎陳皮黃連胡黃連入少蘆薈為丸白朮湯服之半月而止禁其勿食肉與甜物三年當自愈

錢大蘆薈丸治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連 黃連 白燕蕒用仁 蘆薈
木香 青皮 雷丸破開白者佳赤者勿用

鶴虱微炒各五錢麝香另研一錢

右為細末粟米飲和丸如菘荳大米飲下一二十九不拘時

胡黃連麝香丸治疳氣羸瘦出白虫

胡黃連 白蕪荑仁各一兩半 黃連

木香各半兩 辰砂另研一分 麝香另研一錢

右為細末麪糊丸如菘荳大米飲下五七丸至十九三五歲已上者十五丸至二十九服無時

榆仁丸治疳熱瘦悴有虫久服克肥

榆仁去皮 黃連去鬚各一兩

右為細末用猪膽七箇破開取汁與二藥同和入碗內甑上蒸九分每日一次候日數足研麝香五分蒸餅湯浸一宿同和成劑丸如菘荳大每服五七丸至一二十

丸米飲下無時

右四方治瀉而多食為虫疳也

錢木香丸治時時下利唇口青白 如聖丸治冷熱疳瀉

瀉而少食為冷疳

二方並見本條

沒石子丸治洩瀉白濁及疳利滑腸門痛

木香 黃連各一分 沒石子一枚 荳蔻仁三箇

訶子肉三箇

右為細末飯和丸如麻子大米飲下十五丸量兒加減

食前

湯休息痢及疳瀉痢遷延日月百藥俱試飲食不妨便秘不止用雞子一枚打破鎔黃蠟一塊如指大以雞子和炒空心喫盡百醫百效無不獲安

本小兒疳痢垂死者取益母草炙食之取足瘥止甚佳

右治瀉而少食為冷疳也

獨脹不瀉治法見脹門

疳在外

疳疔在外鼻下臭爛自揉鼻頭上有瘡不着痂漸透耳生

疔 走馬牙疔神效乾薑白礬枣子燒焦存性為末傅患處

疔 鼻疔治法先用甘草白礬湯洗淨後糝蘆薈黃連黃栢

末日三傳 一方用米泔洗黃連末傳日三四次亦佳

疔 紅鉛散治走馬疔綠礬不以多少色鮮明者入乾鍋用

炭火燒鍋赤傾出以好酒酒拌勻再入鍋如此數遍色紅

研作細末入麝香少許先以溫漿水洗嗽淨用指蘸藥有

疔處貼之

羅乳香丸治走馬牙疔如神

乳香

輕粉

砒研各五分

麝香少許

右先將乳香研細入輕粉麝砒共再研勻用薄紙一菲葉潤去藥內按過揉紙少許丸如黃米大臨臥將藥填在患處至明則愈忌食醬醋鹽等物

錢 蘭香散治鼻瘡爛

蘭香葉

燒灰二錢 銅青

五分 輕粉

右末令勻看瘡大小乾貼之

龍骨散治口疔走馬疔

砒霜

半錢 粉霜

半錢 龍骨

半錢 定粉

龍腦

半錢 蟾酥

右先研砒粉極細次入龍骨等研次入定粉等同研每

用少許傅之

經 治小兒走馬疔蝕透損骨及小小攻蝕必效方天南星

一箇當心作坑子安雄黃一塊在內用麩裹燒候雄黃作

醫學綱目卷之六

疔

汁以盞子合定出火毒去麩研為末入麝香少許拂瘡驗
錢白粉散治諸瘡

烏賊魚骨末七

白芨末七 輕粉七

右末先用清漿水洗拭過貼之

山小兒牙疳用茴香桔梗燒灰存性傅之如乾油調傅

湯五福化毒丹治蠱鼻清膈涼血

玄參

桔梗去蘆各

赤茯苓

人參

牙硝

青黛

甘草各一分

麝香五分

一方有龍腦五分

右除麝香牙硝另研一處為末次和青黛等煉蜜丸如

芡實大金銀箔為衣薄苛湯化下瘡疹餘毒磨生犀角

水下上焦熱壅口齒鮮血宜露臭氣用生地黄汁化下

食後

寒熱

錢大抵疔病當辨冷熱肥瘦其初病者為肥熱疔久病者
為瘦冷疔是也冷者木香丸熱者黃連丸主之冷熱之疔
尤宜服如聖丸

胡黃連丸

胡黃連

黃連各半

硃砂一分

右上一二物為細末研入硃砂末都填入猪膽內用淡漿
於砂鈹子內懸胎煮一飯時久取出研入蘆薈麝香各
一分飯丸如麻子大每服五七丸至一二十九丸米飲下
食後 一方加蝦蟇半兩不燒

木香丸

木香

青黛另研

檳榔

肉蔻去皮各

麝香另研一分

續隨子一兩

蝦蟆三箇先用繩繫

曬乾燒存性

右末蜜丸如棗豈大每服三五丸至一二十九丸薄苛湯

下食前

如聖丸治冷熱疳瀉

胡黃連

川黃連

白蕪荑

去皮炒各三兩一本作一兩

史君子

去殼另研一兩麝香五分

乾蝦蟆

五箇酒浸煮成膏

右前藥為末與膏丸如麻子大每服入參湯下二三歲五七九已上十九至十五九無時

湯小兒冷疳多渴好臥冷地煩躁啼叫飲食不進漸成羸

瘦其候難明有若熱證但大便滑泄百藥不效是也因女

子百藥俱試而無偶中者竟與錢氏木香丸不數服而愈

自後凡有此證無不獲驗

肝疳

錢氏肝疳白膜遮睛

湯氏肝疳眼白青兩眼睛痒

筋疳

錢氏筋疳瀉血而瘦並當補肝地黃丸主之

方見勞瘵即六味地黃丸

驚疳麝香丸治小兒一切驚疳等病

草龍膽

胡黃連

木香

蟬蛻

錢一

瓜蒂

龍腦

麝香

牛黃

各一錢並各自研

右猪膽為丸如桐子及菴荳大驚疳或秘或瀉清米飲

送下小兒五七粒至一二十粒眼疳猪肝湯下疳渴燥

猪湯下猪肉湯下亦得驚風發搐眼上竄薄苛湯下一

九更水研一丸滴鼻中牙疳瘡口瘡研貼虫痛苦練根

湯或白蕪荑湯送下百日内小兒大小便不通水研封

臍中有虫候乾漆麝香各少許并入生油一兩點溫水

化下一大丸慢驚勿服

本睡驚丸治小兒一切驚疳食積風癩之證

史君子

五十塊香墨

金銀箔

膩粉

東大

各七

錢

右先將史君子存性同墨研細次入金銀箔乳鉢內研
次入膩粉并麝香少許研令極細稀糊丸如桐子大陰
乾每服一九薄苛湯磨下一歲已下半丸一名青金丹
極效

田氏涼驚丸治小兒驚熱疳瘦乳癖方見驚搖

錢氏心疳面黃頰赤身壯熱當補心安神丸主之方見治虛實法

湯氏心疳口内生瘡

田氏安神丸治心虛疳熱面黃頰赤壯熱驚啼神志恍惚

不寧方見治虛實法

湯驚甲散治疳勞骨蒸

驚甲九助者湯浸用童便塗灸

生熟地

地骨皮

當歸

人參去蘆各半兩

黃芪蜜灸

白芍藥各一分

右咬咀每服二錢水半盞煎服

猪肚丸治骨蒸疳勞肌體黃瘦

木香兩半

黃連

生地

青皮

銀柴胡去蘆

驚甲九助者湯浸用童便塗灸各一兩

右為末猪肚一枚入藥於內以線纏之於沙礮內懸胎

煮熟取出細研猪肚為丸如麻子大米飲送下大小加

減不拘時服

無龍膽丸治疳病發熱

龍膽

黃連

史君子肉

青皮各等分

右為末猪膽汁和丸如桐子大每服三十粒量兒加減

臨臥熱水下

右四方治疳熱安神丸其寒補心驚甲散甘溫補脾後

二方苦寒瀉脾瀉濕熱也

世烏犀丸治小兒疳熱腹内生虫肚大手足疲弱丁奚疳

羸此方治疳
熱如神

黑牽牛二兩

史君子七錢

青皮二兩

雷丸二錢

苦練皮半兩

皮用蘆二錢半

鶴虱五錢

右同入鍋內炒焦為末麪糊丸如黍米大三歲見二十
丸米飲下食前烏犀丸食後黃龍丸

二丁丸治乳癖食癖疳熱如神方見

疳熱當服進食丸磨積仍間服化虫丸後服驚甲散退

熱次服肥兒丸進食丸方見癖

治疳熱化虫丸

白蕪荑

黃連

神麪

麥芽各炒

右木糊丸如黍米大空心米飲下猪膽汁尤佳

肥兒丸方見前

右疳熱當以積熱門參用如熱有作止者與潮熱門參

用可也

脾疳

脾疳面黃腹大食泥土當補脾益黃散主之方見治

腸脾疳食不消胃疳多吐

大胡黃連丸治一切驚疳腹脹虫動好喫泥土生米不

思飲食多睡吼哇臟腑或瀉或秘肌膚黃瘦毛焦髮黃飲

水五心煩熱能殺虫進飲食兼治瘡癬常服不瀉痢唯泥

聲欲嘔

胡黃連

黃連

苦練子各一

白蕪荑去扇

秋初

乾蟾頭燒存性另

麝香另研

青黛另研一

蘆薈另研

右先將前四味為細末猪膽汁和為劑每一丸如胡桃
大入巴荳仁一枚置其中用油單紙一重裹之同米一
升許蒸米熟為度入後四味為丸少入麪糊丸如麻子

大與十九或十五九清米飲下食後臨臥日三服

垣大蕪荑湯又名梔子茯苓湯治黃疸土色為熱當小便

不利今反利者知黃色髮黃脫落知膀胱腎俱受土鼻下

斷作瘡者土逆行營中大便能乳者胃中有熱故也喜食土者胃氣不足面色

黑者為寒大便青屬寒褐色血黑色熱畜血中間黃色腸胃治法

當滋營潤燥內除寒熱外致津液

山梔三分

黃栢

甘草炙各二分

大蕪荑五分

黃連

麻黃

羌活

柴胡各三分

防風一分

白朮五分

茯苓三分

當歸四分

右件劉如麻苳大作一服水一盞半煎至一盞去查稍熱服食前

右三方治疳黃食土前方寒多者宜服後二方熱多者宜之

丹疳黃食積

白朮

黃連

苦參

山查各等分

右用糊丸如麻子大食後白朮湯下十五九

山小兒疳黃雞彈劍一小竅入巴苳淨一粒紙糊孔煨熟

去巴苳食之隔一日再喫一二箇

四小兒喫泥石膏黃芩陳皮茯苓甘草白朮散煎服

經治小兒喫泥及臍肚膩粉一分用沙糖搜丸如麻子大

空心米飲下一丸瀉出土瘡腹如掌切脹也

錢初病疳津液少者當生胃之津液白朮散主之唯多則

妙

龍粉丸治疳渴

草龍膽

定粉微炒

烏梅肉焙

黃連各二分

右為細末煉蜜丸如麻子大米飲下一二十九無時

湯三稜散治小兒尿白濁久則成疳宜踈脾土消食化滯

三稜 炒 蓬朮 炒 益智仁 甘草 各一兩

神麩 炒 麥芽 炒 橘紅 各半兩

右為末白湯調下

世黃龍丸治停食化積磨積

三稜 蓬朮 各三兩 青皮 陳皮 各一兩半

山查 乾薑 各七錢半 檳榔 半兩

右晒乾為末糊丸黍米大三歲兒每二十九食後薑湯

下食前烏犀兪相間服此治小兒疳積等證無不效者

烏犀九方見疳熱條

錢膽礬丸治疳消癖進食止瀉和胃追虫

綠礬 真者為鹿末一錢 膽礬 真者為鹿末一錢 大棗 四十箇去核

好醋升

已上四物同熬令寒爛候和後藥

史君子 去殼炒三兩 枳實 炒三兩 黃連 訶子 去核各

各一兩 巴荳 二十七箇去皮破之

已上五味同炒黑約三分乾入後藥

夜明砂 蝦蟆 燒存性各一兩 苦練根皮 五錢

已上三味再入炒候乾同前四物杵羅為末同前膏和

入臼中杵千下如未成旋入熟肉亦不可多恐服之

難化太乾即入溫水亦可丸如棗荳大每服二三十丸

米飲溫水下不拘時

世肥兒丸治小兒疳積

蘆薈 另研 胡黃連 各二錢 神麩 四錢 黃連

白朮 山查 炒各半兩 蕪荑 炒二錢半

右為末將蘆薈末拌勻猪膽汁丸如粟米大每服六十

九食前白湯下

本 蘆薈丸治小兒疳積秘方

蘆薈

荊芥

黑丑

青皮各等分

右治炮為末麩糊丸如粟米大一歲兒已下一丸或二丸亦不妨量大小加減

肺疳

錢 肺疳氣喘口鼻生瘡當補脾肺益黃散主之方見治虛實法

腎疳

腎疳極瘦身有瘡疥當補腎地黃丸主之方見勞瘵即六味地黃丸

湯 腎疳齒爪黑

右腎疳羸瘦瘡疥治法當與虛羸門相參用之

骨疳

錢 骨疳喜臥冷地

湯 木香丸治渴好臥冷地

雜方

世 五疳保童丸治小兒乳食不擇冷熱好食肥膩恣食甘鹹臟腑不和生疳

青黛

苦練根皮

夜明砂

五倍子

蘆薈

黃連

龍膽草

白蕪荑

乾蟾各一分

麝香少

蟬腿去嘴瓜一分

猪膽大者五箇拌諸乾藥焙

右件粟米煮糊為丸如麻子大一歲兒三九不拘時米飲下日三服忌猪肉

腦疳

聖 治小兒腦疳鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦益腦用鯽魚膽滴於鼻中連滴三五日效

湯 小兒腦疳者是胎熱所為但頭皮光急頭髮作穗或有

頭瘡腫至顙顙腫則多損眼此疾因兒在胎中母臨月房

事不已而成項軟倒肥而不瘦天柱骨剉也

附子生去皮

南星

右末生薑自然汁調攤貼患處次服防風丸并瀉青丸

疳疔散

小兒久患疳疾體虛久不進飲食患久諸候退只是天柱骨無力醫者不識謂之五軟用白殭蚕真者去絲炒為末每服五分或一錢薄苛酒調下日三更須貼藥貼藥生筋散

木鱉子三箇 革麻子三十粒

右各取肉同研用一錢津調先烘上令熱貼之

右疳五軟蓋痿屬也不若用地黃丸及黃栢龜板之類為愈

無辜疳

小兒無辜疳者其候面黃髮直時時壯熱飲食不生肌膚積經日月遂致死者謂之無辜疳也言天有鳥名曰無辜晝伏夜游洗浣衣褥露之經宿或遇此鳥飛從上過將衣褥與小兒穿臥便令兒有此疾如禽獸生下有噤垂若不速去當損其命又腦後有核初生軟而不覺痛其中有

虫如米粉得熱氣漸長大則筋結定虫隨氣血流散所以停留子母相生侵蝕臟腑肌肉作瘡或大便泄膿血致使小兒漸漸黃瘦頭大髮豎手足細弱生十二件無辜疾症天吊 胡孫噤 鶯口 木舌 懸癰 重齶 着噤 臍風 撮口 重舌 乳淵 龜胸 鱉甲散

鱉甲醋炙三分 檳榔三箇 沉香分 漏蘆

甘草炙 牛蒡子炒 史君子 赤芍藥

訶子炮去核各半兩

右為麤末每服一錢水半盞煎六分去渣溫服

針灸

多疳者 願會壯 瘡蝕斷鼻穢衝人 勞官壯 疳皆脾胃病亡津液之所作也因大病或吐瀉後醫又以藥吐下致脾胃虛弱亡失津液且小兒病疳皆愚醫之

所壞病假如潮熱是一臟虛一臟實而內發虛熱也法當
補母而瀉本臟則愈假今日中發潮熱是心虛熱也肝為
心母法宜先補肝母肝實而後瀉心得母氣則內平而
潮熱自愈醫見潮熱妄謂其實乃以大黃牙硝葷諸冷藥
利之利既多而不能禁則津液內亡漸成疳也又如癖病
發作寒熱飲水脇下有形硬痛法當用藥漸消磨之醫反
以巴豆礪砂葷藥下之小兒易虛易實下之既過胃中
津液耗損漸成疳瘦又有病傷寒五六日間有下證以冷
藥下之太過致脾胃虛而津液少即便引飲不止而生熱
也熱氣內耗肌肉外消他邪相干証變諸端亦成疳病又
有吐瀉久病或醫妄下之其虛益甚津液煩燥亦能成疳
也

小兒病癖由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水不止或
喘而嗽與潮熱相類若不早治必成勞癖以其有癖癥則
令兒不食致脾胃虛而發熱故引飲也飲多即蕩滌脾胃
亡失津液不能傳化水穀其脈沉細益不能飲食致脾胃
虛衰四肢不舉諸邪遂生羸瘦而成疳矣

肥疳即脾疳也身瘦虛黃乾而有瘡疥其候不一種種異
端今畧舉言之目濇或生白膜唇赤身乾黃或黑喜臥冷
地或食泥土身有瘡疥瀉青白黃沫水痢色變易腹滿身
耳鼻皆有瘡髮鬚作穗頰大項細極瘦飲水皆其證也

不治症

心疳者苦要驚啼常只喫水少食辛味耳邊有青脈舌
上有焦點者不治○肝疳者目帶青左脇下硬多吐沫眼
頭黑者不治 脾疳者肚大青筋唇口無血色人中平下
痢不止者不治 肺疳者咳逆氣急瀉白水身上黑斑者
不治 腎疳者要喫鹹醋喫水不住小便如粉汁齒黑有

瘡骨出耳乾腦焦不治

虛羸

寒熱

虛羸脾胃不和不能食乳致肌瘦亦因大病或吐瀉後脾胃尚弱不能傳化穀氣有冷者時時下痢唇口青白有熱者身壯熱肌肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香丸主之夏月不可服如有證則少服之熱者胡黃連丸冬月不可服如有證則少服之虛羸與疳同治也○木香丸九胡黃連丸方並見疳條

盧薈丸

龍膽草

黃連

燕蕒去皮先炒黃色次入前二味一處炒赤色

各一兩

右為末另入盧薈一分和勻爛飯丸如黍米大二歲兒

服三十九空心米飲送下

露星膏

黃芪

蜜水

胡黃連

地骨皮

柴胡各等分

右為末煉蜜丸如芡實大隔宿酒浸露一宿次日澄去酒薄苛湯浸服之

錢橘連丸治疳瘦久服消食和氣長肌肉

橘皮

黃連

米泔浸一宿一兩半

右為細末另研入麝香五分屬猪膽七箇分藥入膽內漿水煮候臨熟以針微刺破以熟為度煮粟米粥和丸如棗豆大每服十九至三十九米飲下量兒加減無時海藏云黃連苦燥可瀉脾火長肌肉

二聖丸治小兒臟腑或好或瀉久不愈羸瘦宜常服

黃連

黃極

去粗皮各一兩

右為細末入猪膽內重湯煮熟丸如葶藶大每服二三
十九米飲下量兒加減類服無妨

虛 小兒疳病肌羸血氣不足同大人勞瘵之疾治之

右以潔古此言論之不拘冷熱虛羸皆用四君子地黃
丸與前藥相兼服為得也

雜方

聖 又方治小兒尸疰勞瘦或時寒熱方用鰲頭一枚燒灰
杵末新汲水下五分七立可

灸

明 羸瘦不生肌膚 胃脘壯 灸一
田 小兒疳瘦於胸下骨尖上灸三壯次於脊下端尾翠骨
尖上灸三壯

小兒疳瘦脫肛體瘦渴飲形容瘦悴諸方不瘥者取尾翠
骨上三寸骨陷中灸三壯

小兒身羸瘦黃豚腹腫四肢懈惰肩背不舉章門二穴各

診 灸七壯

世 母氣不足則羸瘦肉極

鶴節即虛羸之
異名也

虛

湯 小兒鶴節由稟賦不足血氣不榮肌肉瘦瘠則骨節皆
露如鶴之足皆腎虛不生骨髓之故治法宜錢氏地黃丸

加鹿茸牛膝

宿食

脾

湯 消食丸治宿食不消又名消乳丸

砂仁

陳皮炒

三稜炒

神麩炒

麥芽炒各
半兩

香附炒
兩

右末麩糊丸如麻子大食後白湯送下大小加減

七聖丸

三稜

蓬朮

川練

青皮

陳皮 芫花 杏仁

右件等分先用醋浸芫花一宿炒漸乾次入蓬稜同炒赤色又入陳練等再同炒一處令微焦取出為末前藥如各半兩杏仁亦用半兩湯浸去皮尖雙仁不用細研入巴芫二十粒去油和勻醋糊丸如黍米大一歲兒常服二丸臨臥溫熱湯送下使日間所殮之物一夜而化永無疳疾能使黃瘦子頓作化生兒今之小兒可去巴芫只入杏仁名七聖丸是也

痞

虛 枳朮丸 方見內傷飲食 ○飲食不進四君子加薑棗煎 ○枳實

理中丸 方見傷寒

實 湯痞者塞也其病腹內氣結脹滿壯熱是也當辣利大便破結散氣常服進食丸

聖 甘遂散治小兒痞結雖服湯藥暫利而滯實不去心下堅脹按之輒啼內有伏熱破結

甘遂 煨赤 青皮 黃芩 大黃 炒各半兩

右咬咀煎去渣服量大小加減以利則止用之無不效
湯 戶部張侍郎小娘子患此蘊積結聚已經年矣其候腹滿壯熱大小便閉不食諸醫皆作虛熱潮熱或作胃寒不食治然既不食大小便自然少又欲解疳熱治百藥俱試而無一中勢已窘迫招予視之問曰合服何藥答曰當服甘遂大黃張驚駭曰前諸醫者皆用補劑此女不進食久矣不宜利動腸胃予答曰信我者生逆我者死張曰更有無甘遂而次於此藥方者可否予令即服大承氣湯二服而愈次日診之尚有餘滯積實其症必過數日而腹閉須服前藥始可除根數日後果再閉腹滿痞結再投此藥一

服而痊

小兒急欲乳不能食由客風熱入兒臍流入心脾經即
舌厚唇燥口不能乳當涼心脾

哺露

虛

哺露者因乳哺不消脾胃寒者用能食血氣減損肌
肉不榮柴骨羸露吸吸苦熱謂之哺露也宜麝香進食丸
方見本條

癖

診

小兒積症面黃腫

壯脹

面合臥地

小便

如油

多嘔

眼睛黃

腹內虛鳴

多睡

眼白黃

赤白痢下

髮黃

眼赤

多瀉

虛實

凡有積滯須辨虛實况孩兒虛瘦長短黑白南北古今不
同不可一槩論也予今之法實者可服進食丸虛而微白

及疳瘦者宜服肥兒丸

肥兒丸方見疳門心疳條為丸如黍米大兒一歲十九飯飲下

小兒腹中有癖不食但飲乳是也當漸用白餅子送下

白餅子

滑石

輕粉

半夏湯洗

南星各一錢為末

巴菝

二十四箇去皮膜水一升煮水盡為度

右研勻巴菝後入衆藥以糯米飯為丸如小菜豈大捏

作餅子兒三歲已上三五餅四歲已下一二餅蔥白湯

下臨臥服

進食丸治乳食不化心胸脹滿疳積肚疼

木香

枳殼炒去白

當歸

代赭石

硃砂

另研三錢

巴菝

去油膜一錢

麝香另研五分

右為細末麪糊為丸如黍米大一歲二丸量兒大小加

減米飲送下

活雙聖丸治小兒身熱頭痛飲食不消心腹脹疼痛大小
便不利或下重數起未瘥可再服

巴荳六十箇去皮 甘草炙 麥門冬去心

錢五錢 甘草炙 硃砂一錢 牡礪兩

錢五錢 牡礪兩

右麥門冬甘草甘遂牡礪四味為細末入巴豆硃砂麩
仁合和搗二千杵更入少蜜搗和極熟旋丸兒半歲服
如蘇子大兒一歲服如麻子大分為二九兒二歲服如
麻子大一九兒三四歲服如麻子大二九五六歲服如
麻子大三九兒七八歲服小荳大二九兒十歲微大如
小荳大三九以雞鳴時分服之如至日出不下者熱粥
飲數合投之即下丸藥皆雙出也若利甚濃煎冷粥數
合與之即止

食癖

錢珠丸治小兒一切積聚驚涎宿食乳癖大小便澀滯
療腹脹行滯氣

巴豆仁十四箇水浸 木香

丁香各五分 滑石二錢 輕粉五分留少

右為末研勻濕紙裹燒粟米飯為丸如麻子大一歲兒

一九八九歲至十五歲服八九丸枣子煎湯放冷下如挾

風熱難動者先服涼藥一貼乳癖者臨臥服數丸

本消積丸治小兒食積氣濕氣面黃白多腫大便黃赤酸
臭

砂仁十二箇 丁香九粒 烏梅肉三箇 巴豆去油

右細末糊丸如粟米大三歲已上五六九已下二三九

用溫水下無時服大凡小兒身溫壯熱非變蒸之候大

便白而酸臭為胃有畜冷宜此藥消下後服溫胃藥若

身温壯熱大便赤而酸臭為胃有畜熱宜此藥下後服
涼胃藥無不愈一方有史
君子七枚

乳癖丹丁香化癖散治乳癖

白丁香 蜜陀僧 硫黃已上各
二錢 礪砂五
分

輕粉少
許

右研細末每一歲兒服五分男病女乳調女病男乳調
出下黑糞為度後用通膈丸泄之

世二丁丸治小兒乳癖

白丁香兩半 丁香 蜜陀僧各一
兩 韶粉一
錢

硫黃三
錢

右細末糊丸如小葶大二三歲兒十九日哺時米飲下飲
乳者乳汁下次日當取下惡物熱即隨退加黃鶯屎一
錢尤妙

驚癖錢紫霜丸

代赭石細研水
飛二錢 巴豆二十一粒去
油心皮膜

杏仁二十一箇
去皮尖

右為細末飯丸如粟米大每服三五丸至十九皂莢子
湯下無時海藏云五色加減並見治法

湯驚癖須用礪石藥方可治之

右七方治癖皆峻劑若稍涉虛者必用四君子及益黃
散之類兼服之

氣癖

秘錄治小兒氣癖取三稜針作羹粥以米麪為之與乳母
食每日取一匙大與兒喫亦得作粥與羹熟食之治小兒
十歲已下及新生百日無問癩熱無辜瘡癖等皆理之妙
不可言者

針灸

田小兒癖氣久不瘥者灸中脘一穴章門二穴各七壯章

門在大橫外直臍季肋肋端側臥曲上足伸下足舉臂取
之中腕在上腕下一寸臍上四寸居心蔽骨與臍之中
從髕胛下取病人四指定穴併灸臍後脊骨中二七壯無
不驗

脾弱多困

脾胃不和四君子加白朮一倍薑棗煎 脾困四君子
加木香砂仁人參各半錢煎 脾胃虛弱生氣多困四君
子加炒半夏麩沒石子等分四末入冬瓜子少許同煎

本治脾風多困用人參散入四驚參用

人參 冬瓜仁各半兩 南星切片用漿水薑汁黃存性一兩
右為細末每一錢水半盞煎二三分溫服

渴

渴有三種 一者乘熱積於心脾煩燥大渴引飲宜白

虛熱

湯謂不因吐瀉大病忽然而作

二者因久病或取轉過度致脾虛引飲宜白朮散方見消瘴
海藏云治發渴四君子加乾葛枇杷葉先以東湯煮過炙乾用各等

濕熱

三者因患濕熱病熱結膀胱小便不利大渴引飲有表裏
症者宜五苓散主之

大小便不通

難方

無小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人以溫水
先嗽口了吸嘔兒前後心并臍下手足心共七處每一處
凡三五次嗽口吸嘔取赤紅為度須臾自通不爾無生意
有此證者遇此方可得再生矣

生下不大便治法先以硬蔥針維入肛門如大便不下
後用牛黃散送硃砂丸一時自見

握宜丸治小兒便難燥結或服瀉藥腹脹悶亂命在須臾
可用此丸不移時大小便自利

巴荳一錢 硫黃 良薑 附子

檳榔 各等分 甘遂

右為細末粟米飯和丸如棗豆大用椒湯洗小兒男左
女右手握之用綿裹定看行數多少置藥洗去不用即
止

錢 郁李仁凡治檳榔小兒大小便不通并驚熱痰實欲得
澹動者

大黃一兩酒浸半日 郁李仁去皮研

滑石細研

右先將郁李仁研成膏和大黃滑石丸如黍米大二歲
兒服三二丸量大小與之或乳汁或薄荷湯下食前

黃疸

陽黃則大小便赤澀身熱是脾土與心火相搏為陽病
法當先利小便後下大便

凡治黃病腹脹當用茵陳蒿湯調下五苓散若欲利小便
去大黃欲利大便則加大黃之類有陽證可服謂面赤飲
水者是也茵陳蒿湯五苓散

身疼轉背強大小便澀皮膚面目齒爪皆黃小便如屋
塵色利者易治澀者難治宜服五苓散加茵陳煎湯調又
宜服導赤散加茵陳煎或身熱宜服小柴胡湯甚者服承
氣湯

小兒身體蒸熱胸膈煩滿皮膚如青橘之黃白睛亦然
濕熱所致也宜加減瀉黃散主之此藥能退脾土復腎水
降心火

黃連

梔子

右咬咀都作一服水一大盞煎至六分去渣稍熱服食

茵陳各五

黃柏

黃芩各四

黃

陰黃則清便自調面目及身黃四肢冷是脾虛不能制

腎水當用益黃散下史君子丸益黃散方見治法

淡黃白者胃不和也平胃散調中丸渴者人參白朮散平

散方見泄瀉○調中丸方見腹

針灸

痛○人參白朮散方見清渴

○月裏生黃見胎驚條

黃相似 身皮目皆黃者黃病也身痛轉背強大小便

澁一身盡黃面目指爪皆黃小便如屋塵色着物皆黃渴

者難治此黃疸也此一證多發於大病後又有一證不因

病後身微黃者胃熱也大人亦同又有面黃腹大食土渴

者脾疰也又有自生而身黃者胎疸也又書云諸疸皆

色深黃者是也若淡黃兼白者胃怯不和也

梔子栝皮湯 治傷寒身黃發熱

梔子八 黃柏一 甘草炙半

右水煎去渣溫服

犀角散 治小兒黃疸一身盡黃

犀角一 茵陳 乾葛 升麻

龍膽草 生地各半 寒水石七錢

右咬咀白水煎服一方治小兒忽發黃面目皮肉盡乾

黃以乾葛汁和蜜調服神珍方無乾葛用瓜萎

連翹赤小荳湯 治小兒傷寒發熱身黃

麻黃 連翹 甘草 生薑

赤小荳 生梓白皮各二 杏仁四十

大棗十二箇

右咬咀水煎服一方生小麥苗搗汁服之立效

消食丸 治小兒脾胃不和常服寬中快氣消乳食正顏

色砂仁 陳皮 三稜 蓬木

神麴炒 麥芽炒 香附米泔浸炒 枳殼

檳榔 烏梅各半兩 丁香二錢半

右為末麴糊丸如菹豈大食後紫蘇湯下二三十九

茯苓滲濕湯 治小兒黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲水身體

面目俱黃小便不利不得安臥不思食飲

茯苓五分 澤瀉三分 茵陳六分 猪苓

黃芩 黃連 山梔 防已

白朮 蒼朮 陳皮 青皮

枳殼各二錢

右咬咀水煎徐徐溫服

治小兒吐瀉黃疸

三稜 蓬朮 青皮 陳皮

神麴 麥芽 黃連 甘草

白朮 茯苓各等分

右為末溫水調服若傷乳食吐瀉加山查時氣吐瀉加

滑石發熱加薄荷

瓜蒂散 治小兒忽發心滿堅硬脚手心熱變為黃疸不

急治則殺人

瓜蒂七箇 赤小豆七粒 秫米七粒

右為末用一字吹兩鼻內令黃水出餘末盡水調服之

得吐出黃水即愈一方瓜蒂一兩赤小豆四兩為末每

服一錢溫水調服藥下即臥當吐清黃汁為效虛者不

搗鼻法

宜服

腹痛

世腰乾
啼者為
內吊

湯小兒腹痛曲腰乾哭無淚面青白唇黑肢冷為盤腸內
弔凡有此證急煎蔥湯淋洗其腹揉之蔥慰臍腹間良久
尿自痛中出其疼立止續次服藥

乳香

沒藥各少許透
明者細研

右件末香一塊於乳鉢內磨水一分滾數沸調乳沒末

此藥只一服效

錢

釣藤膏治小兒腹中極痛乾啼後偃名盤腸內弔

乳香研

沒藥研

木香

薑黃各四
錢

木鱉子仁二十箇

右先將後三味同為細末次研入上二味煉蜜和成劑
收貯每一歲兒可服半皂子大餘以意加減煎釣藤

化下無時次用魏香散

魏香散

蓬朮半兩

阿魏一錢

右先用溫水化阿魏浸蓬朮一晝夜焙乾為細末每服
一字或半錢煎紫蘇米飲空心調下

無

蒜乳丸治冷證腹痛夜啼

大蒜

一種慢火煨
香熟研爛

乳香另研
五分

右研為丸如芥菜子大每服七粒乳汁送下

右四方治寒腹痛屬盤腸內弔其候曲腰乾哭是也

錢

胃虛冷面皸白色腹痛不思食當補脾益黃散主之若

不下利者調中丸主之

益黃散治下利而痛也
調中丸治不利而痛也

調中丸

白朮

人參

甘草炒各
半兩

乾薑炮四
錢

右為細末蜜丸如菉豆大每服五七丸至十五丸食前

不思飲
食者為
胃冷

溫水下

海藏云仲景理中例也

當歸散凡小兒夜啼者臟寒而腹痛面青手冷不吐乳是也宜此方服之效

當歸去蘆頭

白芍藥

人參各一錢

甘草炙五分

桔梗

陳皮各一錢

右咬咀煎五分時時少服愈

右三方治寒腹痛屬胃虛其候不思食是也

熱痛亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便赤黃與三黃丸人

參湯下二黃丸方見治發熱法

腹痛夜啼服牛黃如豆大乳化喫之於臍下書田字立

安聖惠方

積痛口中氣溫面黃白目無精光或白睛多及多睡畏

食或大便酸臭者當磨積宜消積丸甚者白餅子下之後

面赤唇焦便黃為熱痛

面黃白大便酸臭為積痛

和胃用白朮散消積丸白餅子方見

食積腹痛硬必用紫蘇蘿蔔子之類

世小兒好喫粽成肚痛用黃連白酒藥等分為丸服

湯三稜散治積氣肚痛

砂仁

甘草

益智炒去殼

三稜

蓬朮

青皮炒各等分

為末白湯點下

虫痛面皯白心腹痛口中沫及清水出發痛有時安虫散

主之小兒本怯者多此病田氏云虫痛啼哭俛仰坐臥不安自按心腹時時大吐而無正

色或青或黃唇白又目無精色口吐涎沫此為虫痛

安虫散治小兒虫痛

胡粉炒

鶴虱炒

川練子去殼

白礬枯二分

右為細末每服一字大者五分米飲調下痛時服

湯治虫動痛極不可忍用乾漆半兩檳榔一枚生風窰老

一塊再煨細研三件一處為末空心熱酒調良久取下虫
立愈靈老恐靈中
煨過泥物也○又方用乾漆一两搗碎炒令烟盡

出用新汲水入生麻油空心調下

安虫丸治上中二焦虛或胃寒虫動及痛

乾漆炒烟盡雄黃分一巴豆霜錢

右為細末糊丸如黍米大量兒大小服之取東引石榴
根煎湯下或苦練根或蕪荑湯下五七丸至二三十丸
發時服

蕪荑散主治同前凡小兒痛時便高聲啼叫人中上鼻頭
唇口一時黑色脈法當沉弱而弦今反脈大是虫症也

白蕪荑乾漆炒各

右為細末每服一字或五分或一錢米飲調下發時服

烟虫用練樹根為君佐以二陳湯煎下

診

積痛食痛虛痛大同小異惟虫痛者當口淡而沫自出
治之隨其症用藥虫與癩相似小兒本怯故胃虛冷則虫
動而心痛與癩畧相似但目不斜手不搖也安虫散主之
辛氏女子五歲病虫痛諸醫以巴豆乾漆礪砂之屬治之
不效至五日外多哭而俛仰睡臥不安自按心腹時大叫
面無正色或青或黃或白或黑目無光而慢唇白吐沫至
六日胸高而臥轉不安召錢至錢詳視之用蕪荑散三服
見目不除青色大驚曰此病大困若更加瀉則為逆矣至
次日辛見錢曰夜來三更果瀉錢於瀉盆中看如藥汁以
杖攪之見有元藥錢曰此子肌厚當氣實今證反虛不可
治也辛曰何以然錢曰脾虛胃冷則虫動而今反目青此
肝乘脾又更加瀉知其氣極虛也而元藥隨糞下即脾胃
已脫兼形病不相應故知死病後五日昏篤七日而死

驚口

胎熱
巢氏病源驚口候者小兒初生口裏白屑滿舌上如驚口故曰驚口此乃胎熱而心脾最盛薰發於口也治用髮纏指頭蘸井花水揩拭之睡時黃丹煨出火氣摻於舌上葛氏如用前法其舌上白屑不脫可煮栗莢汁令濃以綿纏指頭拭之若春夏無栗莢可煮栗木皮如用井花水法小兒初出腹有連舌下有膜如石榴子者中隔連其舌下後令兒言語不發舌不轉也可以爪甲摘斷之微有血出無害若血出不止燒髮灰傳之即止

口噤

風痰
大人小兒口噤不開牙關緊者諸藥勿效天南星末一錢腦子少許相和研勻用指蘸生薑自然汁蘸藥於左右大牙根上擦之立開

寒 熱

口噤初生口噤不開不收乳用赤脚蜈蚣去足炙末猪乳汁調下五分三四服愈

聖小兒生下七日口噤牛黃些少竹瀝調下一字以猪乳滴口中 口噤搐鼻法用鬱釜藜蘆瓜蒂為末水調搐之

滯頤口角垂涎是也

肅清心導痰丸治舌縱涎下方見大人

湯小兒滯頤者多涎流出積於頤上此由脾胃冷涎多故也脾之液為涎綠脾胃虛冷不能制其津液故流出於頤法當溫脾按內經云舌縱涎下皆屬熱此恐湯氏之偏見今兩存之以備參攷

張渙溫脾丹 治滯頤效

白朮

青皮各半兩

半夏麩

丁香各一兩

乾薑炮半兩

右為細末糊丸如黍米大一歲兒十九二歲二十九米

飲下

臍風撮口

小兒洗浴拭臍不乾風入作瘡令兒撮口甚者是胃虛氣不和口頻撮調氣益黃散主之

赤脚金頭蜈蚣

蝎稍尾

僵蚕

瞿麥

右為末先以鷺毛管吹豆大入鼻內嚏噴啼叫可醫更

用薄荷湯下

雜方

栢墨散治斷臍後為水濕所傷或襁抱濕氣傷於臍中或解脫風冷所乘致令小兒四肢不和臍腫多啼不能乳啼宜速療之

黃栢

釜下墨

亂髮

右為細末每用少許傳之

丹臍風濕鹽二兩豉二合杵成餅子如錢炙熱熨臍上安

又以黃栢末傳之

姚小兒臍腫桂心炙熱熨之日四五

秘臍風瘡用年久東壁泥研傳之

聖臍風久者成瘡不乾伏龍肝傳之 又馬齒莧燒葉末

傳之

子母治小兒臍赤腫杏仁杵如脂傳臍腫上

聖治小兒臍中汁出不止并赤腫用枯白礬研細傳之

世治嬰兒因剪臍傷外風致瘡不乾用白礬煨白龍骨各

等分同為末每用少許傳之 又方綿燒灰研細每少許

乾摻之

四撮口夜合花枝煮汁拭口并洗愈

田撮口治法用白殭蚕為末蜜調塗兒穀逆又半黃一錢

竹瀝一合時時抹口中即瘥

無小兒初生一七日內忽患臍風撮口百無一效坐視其死良可憫也有一法世罕知者凡患此證看兒齒齦上有小泡子如粟米狀以溫水蘸熟帛裹指輕輕擦破即開口便安不藥神效

針灸

小兒初生臍風撮口諸藥不效者灸然谷穴在內踝前起大骨下陷中可灸三壯鍼入三分不宜見血立效

甲臍風目上插刺絲竹空

明臍腫腰對臍骨節間三壯

世臍風撮口在百日內不治

醫學綱目卷之三十八

399

