

醫學綱目

八番世三

陰陽臟腑部

治惡寒

上寒下熱

產後瘡

往來寒熱

產後往來寒熱

外熱內寒外寒內熱

瘡寒熱

上熱下寒

久瘡

瘡脹

醫學綱目卷之六

陰陽臟腑部

治惡寒

陽虛惡寒正治

丹陽虛惡寒用參芪之類甚者加附子少許以行參芪之氣永康呂親家形瘦色黑平生喜酒多飲不困年近半百且有別館忽一日大惡寒戰且自汗渴却不能飲予診其脉大而弱惟右關稍實響類弦重取則澁遂作酒熱內鬱不得泄由表熱而下虛也黃芪一物與乾葛同煎與之盡黃芪二兩乾葛一兩脉得小次日安矣


垣脾胃之虛怠惰嗜臥四肢不收時值秋燥令行濕熱少退體重節痛口舌乾食無味大便不調小便頻數不嗜食食不消兼見肺病洒淅惡寒氣慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益胃名曰升陽益胃湯

羌活兩半

柴胡三錢

獨活兩半

白朮三錢



人參去蘆一兩

防風故以辛溫瀉之半兩

半夏一兩湯洗

茯苓二錢小兩

渴者勿用澤瀉三錢不淋

黃連二錢

橘皮四錢

白芍藥五錢何故秋旺用

類反補旺為脾胃虛則肺受病故因時而補母虛也

右咬咀每服三錢生薑五片棗二枚去核水三盞同煎至一盞去香溫服早飯後午飯前服之禁忌如前其藥漸加至五錢止服藥如小便罷而病加增劇者是不宜利小便當少去茯苓澤瀉若喜食初二日不可飽食恐胃再傷以藥力尚少胃氣不得轉運升發也須薄滋味或美食助其藥力益升浮之氣而滋其胃氣慎不可淡食以損藥力而助邪氣之降沉可以小役形體使胃與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

靜尤佳若胃氣稍強少食果以助穀藥之力五穀為養五菓為助者也禁忌如前者服藥忌語一二時辰及酒濕麵大料物及冷蒸寒涼淡滲之物

黃芪補胃湯治表虛惡賊風

黃芪三錢

甘草一錢

麻黃一錢

草薺一錢

橘皮半錢

青皮七分

當歸一錢

香白芷半錢

升麻三分

藁本三分

柴胡六分

黃柏八分

右判如麻豆大水二盞煎至一盞去香稍熱食前服

丹晉雲胡君錫年三十一歲形肥而大色稍蒼厚家富而足更專嗜口味兩年前得消渴病醫與寒涼藥而得安有一人教以病後須用滋補令其專用黃雌雞因此食至千餘隻漸有膈滿嘔吐之病醫者意為胃寒遂以附子沉香之藥百餘貼嘔病除月餘天氣大熱忽惡風足亦怕地氣

遂堆糠尺許厚上鋪以簾糊以重紙方可坐臥而兩手不能執筆口鼻皆無氣以呼吸欲言無力行十餘步便困倦脉皆浮大而虛僅得四至予作內有濕痰因多服燥熱藥遂成氣耗血散當此夏令自合便死因其色之蒼厚元氣尚全可以安穀遂以人參黃芪白朮熬膏煎淡五味子湯以竹瀝調飲之三日諸病皆愈令其頓絕肉味一月後康健如舊又以雞湯下飯一月後胸腹膨滿甚自煎二陳湯加附子白苳苳飲之其病頓除遣人問調理藥予教以絕去諸藥與肉飲自然平安

右陽虛惡寒五法皆以參芪為君首一法佐以附子中三法佐以升陽之劑末一法佐以消痰之劑也

垣夫脾胃之症始則熱中終傳寒中經云陰盛生內寒厥氣上逆寒積於胃中是腎水反來侮土此謂所勝者妄行

也作中滿脹作延作清涕或溺足下痛不能任身履地骨乏無力喜睡兩丸多冷時作陰陰而痛或妄見鬼狀夜夢亡人腰背胛眼腰脊俱痛而不渴不瀉此溫氣去寒獨留寒獨留則血凝泣血凝泣則脉不通故其脉盛大以瀉名曰寒中

白朮附子湯

白朮

附子炮

陳皮

蒼朮制

厚朴制

半夏湯泡

茯苓去

澤瀉各一

猪苓半兩去皮

肉桂四

右剉如麻苳大每服五錢水二盞生薑二片煎至一盞食前溫服量虛實加減

夫病熱中症者衝脉之火附二陰之裏傳之督脉督脉者第二十一顛下長強穴是也與足太陽膀胱寒氣為附經

痲病惡

督脉其盛也如巨川之水疾如奔馬其勢不可遏太陽寒氣細細如線督脉逆太陽寒氣上行衝頂入額下鼻尖入手太陽傳於臂中手太陽者丙熱氣也足太陽膀胱者壬寒氣也壬能尅丙寒熱逆於臂中故脉盛大其手太陽小腸熱氣不能交入膀胱經故十一經之盛氣積於臂中故其脉盛大其膀胱逆行盛之極子能令母實手陽明大腸金即其母也故燥旺其燥氣挾子之勢故脉濇而大便不通以此言之脉盛大以濇者手陽明大腸脉也

若見此病中一症皆為寒禁用諸甘酸藥

素帝曰人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者何岐伯曰是人多痺氣也陽氣少陰氣多故身寒如從水中出帝曰人有身寒湯火不能熱厚衣不能温然不凍慄是為何病岐伯曰是人者素腎氣勝以水為事太陽氣衰腎

寒分氣

脂枯不長一水不能勝兩火腎者水也而生於骨腎不生則髓不能滿故寒甚至骨也所以不能凍慄者肝一陽也心二陽也腎孤藏也一水不能勝二火故不能凍慄名曰骨痺是人當掌節也論逆調

東垣云晝則惡寒是陰氣上溢於陽分也夜則惡寒是陰血自旺於陰分也

海氣分寒桂枝加附子湯方見傷寒自汗桂枝加芍藥人參

新加湯方見傷寒體痛

血分寒巴戟丸神珠丸方見治虛實法

巴戟丸

良薑兩六

紫金藤兩六

巴戟兩二

青鹽兩二

肉桂

吳茱萸兩各四

右為末酒糊丸每服二十九丸暖盞酒送下鹽湯亦得

三焦寒用藥大例

上焦寒陳皮厚朴藿香 中焦寒大小便不通白朮乾薑
丁香 下焦寒肉桂附子沉香

桂附丸

二氣丹

還少丹

上焦 鐵刷湯

中焦

下焦

八味丸

胡椒理中丸

大建中湯

天真丹

胡椒理中丸

欵冬花去梗

胡椒

甘草炙

萆撥

良薑各四兩

白朮五兩

乾薑

陳皮焙

細辛去苗各四兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九溫湯酒米飲任

鐵刷湯

良薑炮六兩

茴香各二兩

甘草炙一兩

蒼朮米泔浸一宿八兩

右為細末每服二錢薑三片鹽一捻水一盞煎至七分
溫服或熱酒調下

二氣丹

肉桂去粗皮

硫黃細研各一錢

乾薑炮

硃砂研為衣各二錢

附子製為末半兩

右為細末研勻麵糊為丸梧子大每服三十九鹽湯下

附子理中丸

人參去蘆

附子炮去皮臍

乾薑炮

甘草炙

白朮各三兩

右為末煉蜜種丸每一兩作十九每服一丸以水一盞
化破煎至七分服

大建中湯治內虛裏急少氣手足厥逆少腹纏急或腹滿
弦急不能起臥微汗出陰縮或腹中寒痛不堪勞苦唇口
乾精自出或手足乍寒乍熱而煩苦酸痛不能久立補中
益氣

桂心錢

芍藥

黃芪各二

甘草一錢

生薑錢

當歸

人參錢三

附子錢

半夏錢

棗三枚

右咬咀水五盞煎至三盞去渣分三服

垣 天真丹治下焦陽虛

沉香

巴戟

茴香

破故紙炒

萆薢酒浸

胡蘆巴炒

杜仲炒

琥珀各

官桂錢

牽牛頭末去鹽取

右為末用浸藥酒糊為丸梧子大每服五十九至八十

九空心溫酒下

海下焦寒四逆例乾薑味苦能止而不行附子味辛能行
而不守泄小便不通二藥皆陽氣化能作小便若薑附木
三味內加茯苓以分利之為佳附生用而不炮則無火力
熱則行而不止兼以水多煎少則熱直入下焦
代灸膏治老人衰弱元氣虛冷臟腑虛滑腰脚冷痛沉重
飲食減少手足逆冷不能忍者用此代灸其効不能盡述

大附子炮一箇

吳茱萸

桂皮

木香

蛇牀子兩各半

馬蘭草一兩

右為細末每用藥半匙白麵半匙生薑汁半盞同煎成
膏攤於紙上臨臥貼臍以油紙覆其上綿衣繫之自夜
至明乃去每夜如此貼之其腰腹如炙百壯除寒積腰
疼貼腰眼

背惡寒是痰飲仲景云心下有留飲其人背惡寒冷如冰
治法茯苓丸之類是也方見驚悸 身前寒屬胃經云胃足陽
明之脉氣虛則身以前皆寒慄治法宜鍼法補三里穴是
也 手足寒者厥也治見厥 掌中寒者腹中寒魚上白肉
有青血脉者胃中有寒也腹胃寒理中之類全見診法

五臟寒方

肝寒雙和湯方見治虛實法

脾寒知黃散方見小兒

腎寒八味丸方見治虛實法

海通治大寒大已寒丸逆湯

垣沉香桂附丸

沉香

良薑

附子炮

吳茱萸

肉桂

茴香炒

乾薑炮

川烏各一兩

心寒定志丸葛蒲丸方見
肺寒小青龍湯傷寒方見

右為末醋煮麵糊為丸桐子大每服五七十九米飲下
食前一服忌生冷

海大已寒丸

草撥

右為細末水煮麵糊為丸如梧子大每服二十粒米飲

湯下食前服

肉桂各四兩

乾薑炮

良薑各六兩

湯下食前服

諸脉按之無力所生病症 六脉中之下得弦細而滑
按之無力腹中時痛心胃相控畢隱隱而痛或大便溏泄
鼻不聞香臭清濁涕止目中淚出喘喝痰嗽唾出白沫腰
沉沉苦痛項背骨節時作痛目中流淚口鼻惡寒時時頭
痛目眩苦振寒不止或嗽或吐或嘔或噦則發燥蒸蒸而
熱如坐甑中必得去衣居寒處或飲寒水則便如故其振
寒復至或氣短促胃中滿悶而痛如有膈咽不通欲絕之

狀甚則口開目瞪聲聞於外而淚涕痰涎大作其發燥方過而振寒復至或面白而不澤者脫血也悲愁不樂情慘意悲健忘或善嘔此風熱大損寒水燥金復也如六脈細弦而瀉按之空虛此大寒症也亦傷精氣以辛甘溫熱潤之劑大瀉西北二方則愈

薑附湯治中寒口噤四肢強直失音不語忽然暈倒口吐涎沫狀如暗風手足厥冷或復煩燥兼治陰証傷寒大便秘而發熱者

乾薑

熟附子分

右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去渣溫服或慮此藥性太燥即以附子理中湯相繼服餌薑附本治傷寒經下後又復發汗內外俱虛身無大熱薑則煩燥夜則安靜不渴六脈沉伏並宜服此不知脈者更宜審之

六月病
寒者宜
從中治

兼治中脫虛寒久積痰水心腹冷痛霍亂轉筋四肢厥逆一方附子湯以生用者名曰白通湯一方白通湯內加白朮倍之甘草減半名生附子白朮湯治中風濕昏悶恍惚腹脹滿身重手足瘳瘳繫繫自汗失音不語便利不禁一方用薑附湯加麻黃白朮人參甘草等分名附子麻黃湯治中寒濕昏暈緩弱腰脊強急口眼喎啞語聲渾濁胸腹脹氣上喘急不能轉動更宜審而用之

海六月太熱之氣反得太寒之病氣難布息身涼脈遲何以治之答曰病有標本病熱為本太寒為標用涼則順時而失本用熱則順本而失時故不從乎標本而從乎中治中治者何用溫是已然既曰溫則不能治太寒之病治太寒者非薑附不可若用薑附又似非溫治之例然衰其太

半乃止脉得四至餘病便無冷治之足矣雖用薑附是亦中治也非温而何經曰中熱遠熱雖用之不當然勝至可犯亦其理也

右虛寒正治蓋謂脉虛而惡寒者設也脉虛惡寒真寒也故正治

丹色目婦人年近六十月內常覺惡寒戰慄喜炎火御綿多汗如雨其形肥肌厚已服附子十餘貼渾身痒甚兩手脉沉瀋重取稍大知其熱甚而血虛也以四物去川芎倍地黄加白朮黃芪炒黃柏生甘草人參每服一兩重方與一貼腹大泄目無視口無言予知其病勢深而藥無反佐之過也仍用前藥煎炒與之蓋借火力為引導一帖利止四帖精神回十帖病痊安 蔣氏年三十餘形瘦面黑六月喜熱惡寒兩手脉沉而瀋重取似數以三黃丸下之

以薑湯每服三十粒二十帖微汗而安三黃恐是三補丸苓連栢也

海婦人先病惡寒手足冷全不發熱脉入至兩脇微痛治者便作少陽治之陽在內伏于骨髓陰在外致使發寒治當不從內外從乎中治也宜以小柴胡調之倍加薑棗

子和一婦人身冷脉微食沸熱粥飯六月重衣以衣帽蒙其首猶覺寒泄注不正常服薑附硫黃燥熱之劑僅得平和稍用寒涼其病轉加三年不愈戴人診其兩手脉皆如積繩有力一息六七至脉訣曰六數七極熱生多以涼布熨心以新汲水淋其病處婦乃呌殺人不止令人時時復以冷水淋之至三四十桶大戰汗出昏困一二日而向之所惡者皆除此法本於華陀所用世無知者

素陽明所謂酒酒振寒者陽明者午也五月盛陽之陰也陽盛而陰氣加之故酒酒振寒也脉解篇

濕痰惡寒宜吐

右寒實反治蓋謂脉實而惡寒者設也脉實惡寒假寒也故反治

丹久病惡寒當用解鬱濕痰積中抑遏陽氣不得外泄身必惡寒進士周本道年近四十得惡寒症服附子數百帖而病甚予診其脉弦而緩遂以江茶入生薑汁香油些少吐痰一升許減大半又與通聖散去麻黃大黃芒硝加當歸地黃百帖而安

一女子惡寒用苦參赤小荳各一錢為末薑水吐後用後

川芎 南星 蒼朮 黃芩 酒麴丸服

上焦不通則陽氣抑遏而皮膚分肉無以溫之故寒慄東垣升陽益胃湯用升發之劑開發上焦以伸陽明出外溫之也丹溪吐出濕痰亦開發上焦使陽氣隨吐升發出外溫之也故寒慄皆愈二者治陽虛表寒之要

運氣運氣惡寒有三

一曰火熱經曰諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火又云少陽所至為惡寒戰又云少陽在泉客勝則腰腹痛而反惡寒治以寒劑是也

二曰風經云厥陰在泉風淫所勝病洒洒振寒治以辛涼是也

三曰寒濕包熱經云陽明司天之政清熱之氣持於氣交民病振寒四之氣寒雨降病振慄治視寒熱輕重多少其制是也

治寒厥必先熨

陰陽者寒暑也熱則滋雨而在上根少汁人氣在外皮膚緩腠理開血氣減汗大泄皮淖澤寒則地凍水冰人氣在中皮膚緻腠理閉汗不出血氣強肉堅濇當是之時善行水者不能往冰善穿地者不能鑿凍善用針者亦不

能取四厥血脈凝結堅搏不往來者亦未可即柔故行水者必待天溫冰釋凍解而水可行地可穿也人脈猶是也治厥者必先熨調和其經掌與腋肘與腳項與脊以調之火氣已通血脈乃行然後視其病脈淖澤者刺而平之堅緊者破而散之氣下乃止此所謂以解結者也刺節真邪用針之類在於調氣氣積於胃以通榮衛各行其道宗氣留於海其下者注於氣衝其上者走於息道故厥在於足宗氣不下脈中之血凝而留止弗之火調弗能取之用針者必先察其經絡之實虛切而循之按而彈之視其應動者乃後取之而下之六經調者謂之不病雖病謂之自已也

大寒在外留而補之入於中者從合瀉之針所不為灸之所宜官能篇○從合治之

黃帝曰人之振寒者何氣使然岐伯曰寒氣客於皮膚陰氣盛陽氣虛故為振寒寒慄補諸陽鍼灸臟腑惡寒有三

其一取肺經云振寒鼓頷不得汗出腹脹煩冤取手太陰是也其二取胃經云胃足陽明之脈是動則病洒洒振寒善伸數欠視盛虛熱寒陷下取之也其三取膽經云膽足少陽之脈所生病者汗出振寒視盛虛熱寒陷下取之也

針灸

撮下部寒冷 關元 腎俞

桑君又法 氣海 中極

甲振寒瘰癧手不伸咳嗽唾濁氣膈善嘔鼓頷不得汗煩滿身痛因為瘰癧尺澤主之 頭項惡風汗不出悽厥惡寒嘔吐目系急痛引額頭重項痛玉枕主之 悽悽振寒

數欠伸言俞主之

密語通身惡寒筋脉拘急十指不得近風

絕骨二十半推而上之令氣中和為解

治往來寒熱

靈榮之生病也寒熱少氣血上下行壽天剛

仲云婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此

為熱入血室其血必結故使如癰狀發作有時小柴胡湯

主之傷寒

海小柴胡加減法 如寒熱往來經水不調去半夏加秦

芎芍藥當歸知母地骨皮牡丹皮川芎白朮茯苓 如小

柴胡湯與四物湯各半名調經湯 無孕嘔者加半夏

無汗者加柴胡 惡寒者加桂 有汗者加地骨皮 嗽

者加紫菀 通經者加京三稜廣茂 勞者加鱉甲

感寒飲
冷脉沉
寒者屬

羅完顏小將軍病寒熱間作腕後有班三五點鼻中微血
出兩手脉沉瀆胸膈四肢按之殊無大熱此內傷寒也問
之向者臥殿角傷風又渴飲冰酪水此外感者輕內傷者
重外從內病俱為陰也故先班後血顯內陰症寒熱間作
脾亦有之非徒少陽之寒熱也與調中湯數服而愈
調中湯

白茯苓

乾薑

白朮

甘草各等分

右剉如麻苴大每服五錢水一盞半煎

經云風氣盛於皮膚之間內不得通外不得洩風者善行
而數變滕理開則洒然寒閉則熱而悶其寒也則衰飲食
其熱也則消肌肉故使入快慄而不能食名曰寒熱皮膚
為寒熱全文見風 因於露風乃生寒熱全文見 風
門快慄作失味 盛為寒熱全文見診

河解風湯治中風寒熱頭目昏眩肢體疼痛手足麻痺上膈壅滯

人參

川芎

獨活

甘草

麻黃

去節湯洗 焙各一兩

細辛

半兩

右為末每服三錢水一盞生薑五片薄荷葉少許同煎至八分不計時候

防風湯治中風寒熱

防風

甘草

黃芩

桂枝

當歸

白朮

秦艽

乾葛

杏仁

五十枚

右為散水酒薑棗煎服

眩大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧輕則消導重則下之

見晚九之類並宿食門求之

右積聚而寒熱以積聚法治之

雲地骨皮散治血中風氣體虛發渴寒熱

柴胡

地骨皮

桑白皮

枳殼

前胡

黃芪

白茯苓

五加皮

人參

甘草

桂心

芍藥

右咬咀每服三錢生薑三片水煎

柴胡散治寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩

柴胡

黃芪

赤茯苓

白朮

人參

地骨皮

枳殼

桔梗

桑白皮

赤芍藥

生地黄

麥門冬

甘草

右咬咀每服四錢薑五片水煎

本事有一師尼患惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩或時自

汗是時疫氣大行醫見其寒熱作傷寒治之大小柴胡雜
進數日病劇予診視之三部無寒邪脈但厥陰弦長而上
魚際宜服抑陰等藥予製此地黃丸

生地黃兩

柴胡

秦艽

黃芩各半

赤芍藥兩

右細末煉蜜丸桐子大每服三十九烏梅湯吞下不拘
時候日三服昔宋褚澄療師尼寡婦別製方蓋有為也
此二種寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交
爭乍寒乍熱全類溫瘧久則為勞嘗讀史記倉公傳載
濟北王侍人韓女病腰痛背痛寒熱衆醫皆以為寒熱也
倉公曰病得之欲男子不可得也何以知其然診其脈
肝脈弦出寸口是以知之蓋男子以精為主婦人以血
為主男子精盛則思室婦人血盛則懷胎夫肝攝血故

也厥陰弦出寸口又上魚際則陰血盛可知褚澄之言
信有為矣

右地黃丸雖曰抑陰實補陰瀉陽之劑也

丹趙孺人夜間發寒後便熱丑寅時退起來口渴食少無
味穀不化腹痛而泄倦怠或遇事則熱燥赤眼氣壅又不
耐風寒亦惡熱

白朮錢二

芍藥錢一

陳皮錢一

黃芩錢半

炒栢錢三

炙甘草分

炒芩分三

牡丹分三

木通分三

人參錢半

歸身錢二

確砂分三

煎下保和丸實腸丸各三十九

呂十四孺人怒氣後寒熱咳嗽食少淋泄

縮砂分三

甘草分三

人參錢半

白朮一錢

連翹錢一

陳皮錢一

茯苓分一

薑二片同煎

潤肺散治嗽方見 大柴胡湯治結熱在裏往來寒熱傷寒

有宿食者以宿食法治之

臟腑寒熱

臟腑寒熱有四

一曰肺經云脉之至也喘而虛名曰肺痺寒熱得之醉而使內也又曰肺脉微急為肺寒熱是也

二曰脾經云脾脉小甚為寒熱是也

三曰大陽經云三陽為病發寒熱是也

四曰陽維難經云陽維為病苦寒熱是也

運氣

運氣寒熱有二

一曰火熱攻肺經云少陰司夫熱氣下臨肺氣上從喘嘔

寒熱又云少陽司夫火氣下臨肺氣上從寒熱肺腫又云

少陰司夫熱淫所勝寒熱皮膚痛又云歲木不及燥乃大

行復則病寒熱瘡瘍治以寒劑是也

二曰寒熱相錯經云陽明司天之政天氣急地氣明民病寒熱發暴三之氣燥熱交合民病寒熱又云陽明司夫燥

氣下臨肝氣上從民病寒熱如瘡又云少陰司夫之政四之氣寒熱互至民病寒熱治視寒熱多少其制是也

子和武陽仇天祥之子病發寒熱諸醫作骨蒸勞治之半

年病甚戴人往視之診其手脉尺寸皆朝於關關脉獨大戴人曰肺癰也問其乳媪曾有痛處乳媪曰無戴人令兒

去衣舉其兩手觀其兩脇下右脇稍高戴人以手側按之兒移身避之按其左脇則不避戴人曰此肺部有癰已吐膿矣

針灸上

素多寒熱之法先灸項大椎以年為壯數王註云如患人之年數次灸掖骨以年為壯數尾骨謂之掖骨視背膂陷者灸之膂者為節

少澤前谷腕骨陽谷少海然谷至陰崑崙主之 身寒熱
 陰都主之 寒熱刺腦戶 風寒熱腋門主之 心如懸
 陰厥脚腫後廉急不可前却癰瘕便膿血足跗上痛舌卷
 不能言善笑心下痞四肢倦溺青赤白黃黑青取并赤取
 榮黃取輸白取經黑取合 血痔泄後重腹痛如癰狀臥
 仆必有所扶持及失氣涎出鼻孔中痛腹中常鳴骨寒熱
 無所安汗出不休復溜主之 骨寒熱澁難腎膺主之
 肺寒熱呼吸不得臥上氣嘔沫喘氣相追逐胸滿脇膈急
 息難振慄脉鼓氣昂胸中有熱支滿不嗜食汗不出腰脊
 痛肺俞主之 咳而嘔噦寒食不下寒熱皮肉膚痛少氣
 不得臥胸滿支兩脇臑上兢兢脇痛腹脹胃腕暴痛上氣
 肩背寒痛汗不出喉痺腹中痛積聚默然嗜臥怠惰不
 欲動身常濕濕_温心痛無可搖者臑俞主之 欬而脇

喘咳寒熱取背輸太陽

滿急不得息不得反側脇脇下與臍相引筋急而痛反折
 目上視眩耳中脛然肩項痛驚狂衄少腹滿目眈眈生白
 翳欬引胸痛筋寒熱唾血短氣鼻酸肝俞主之 寒熱食
 多身羸瘦兩脇引痛心下貫痛心如懸下引臍少腹急痛
 熱面急_黑目眈眈久喘咳少氣溺濁赤腎俞主之 寒
 熱咳嘔沫掌中熱虛則肩背寒慄少氣不足以息寒厥交
 兩手而聾口沫出實則肩背熱痛汗出暴四肢腫身濕搖
 肘寒熱饑則煩飽則善面色變_難口噤不開惡風泣出
 列缺主之 寒熱胸背急喉痺欬上氣喘掌中熱數欠伸
 汗出善忘四肢厥逆善笑弱白列缺主之 胸中膨膨然
 甚則交兩手而聾暴瘧喘逆刺經渠及天府此謂之大膲
 肺系急胸中痛惡寒胸滿悒悒然善嘔膽汁腦中熱喘
 逆氣氣相追逐多濁唾不得息肩背風汗出面腹腫臑中

嘔寒熱
取太陰
厥陰

頭痛寒
熱取少
陽厥陰

食饑不下喉痺肩息肺脹皮膚骨痛寒熱煩滿中府主之
寒熱目眩眈善欬喘逆通谷主之 煩心欬寒熱善噦
勞宮主之 寒熱唇口乾身熱喘息目急痛善驚三間主
之一本云寒熱心背引痛胸中不得息咳唾血涎煩中善
饑食不下欬逆汗不出如癰狀目淚出悲傷心膈主之
寒熱善嘔商丘主之 嘔厥寒時有微熱脇下支滿喉痛
噎乾膝外廉痛滯灤脛瘦腋下腫馬刀瘻肩腫吻傷痛大
衝主之

寒熱頭痛喘喝目不能視神庭主之其目泣出頭不痛者
聽會取之 寒熱頭痛如破目痛如脫喘逆煩滿嘔吐流
汗頭維主之 寒熱胸滿頭痛四肢不舉腋下腫上氣胸
中有聲喉中鳴天池主之 寒熱頭痛水溝主之 寒熱
善怖頭重足寒不欲食臑寧京骨主之 下部寒熱病汗
不出體重逆氣頭眩痛飛陽主之 肩背痛寒熱瘰癧達

頸頰腫
寒熱取
太陽陽

振寒寒
熱取太
陽

頸有大氣暴聾氣蒙聾耳目不開頭頰痛淚出目鼻衄不
得息不知香臭風眩喉痺天牖主之 寒熱瘰癧四肢不
舉腋腫馬刀瘻臑膝脛骨滯灤瘰痺不仁陽輔主之
寒熱頸瘰癧欬呼吸炙手三里左取右取右取左 寒熱
頸瘰癧人迎主之 寒熱瘰癧胸中滿有大氣缺盆中滿
痛者死外潰不死有引項不舉缺盆中痛汗不出喉痺欬
嗽血缺盆主之 寒熱頸瘰癧肩痛不可舉臂臑膺主之
寒熱頸瘰癧耳鳴無聞痛引缺盆肩中熱痛手臂不舉
有真主之 寒熱瘰癧目不明欬上氣唾血有中膈主之
寒熱頸腋腫申脉主之 寒熱頸頰腫後谿主之 胸
中滿耳前痛齒熱痛目赤痛頸腫寒熱渴飲輒汗出不飲
則皮乾熱煩曲池主之
振寒小指不用寒熱汗不出頭痛喉痺舌急卷小指之間

熱口中熱煩心心痛臂內廉痛聾欬痰口乾頭痛不可
 顧少澤主之。振寒寒熱肩膈肘臂頭痛不可顧煩滿身
 熱惡寒目赤痛皆爛生翳膜暴痛眦耳聾臂重痛肘攣
 痂疥腦滿引臙泣出而驚頸項強身寒頭不可顧後谿主
 之。振寒寒熱頸項腫實則肘攣頭眩痛狂易虛則生疣
 小者痂疥支正主之。寒熱悽厥鼓頷承漿主之。
 有痛寒熱取太陽少陰
 肩痛引項寒熱缺盆主之。身熱汗不出胃中熱滿天窞
 主之。寒熱肩腫引胛中肩臂酸痛臑膺主之。臂厥肩
 膺胸滿痛目中白翳眼青轉筋掌中熱乍寒乍熱缺盆中
 相引痛數欬喘不得息臂內廉痛上鬲飲已煩滿太淵主
 之。
 腹脹痛寒熱取太陽
 寒熱腹臙央央然不得息京門主之。善齒頰齒唇熱汗
 不出口中熱痛衝陽主之。胃管痛時寒熱皆主之。

寒反出寒熱取太陽
 寒熱篡反出承山主之。寒熱篡後出瘰癧脚膈酸重戰
 慄不能久立脚急腫痛跖筋足攣少腹痛引喉嗌大便難
 承筋主之。
 脛腫寒熱取太陽
 寒熱脛腫丘墟主之。寒熱痺脛不收陽交主之。眼厥
 膝急腰痛引腹篡陰股熱陰暴痛寒熱膝痠重合陽主
 之。寒熱解爛爛作淫灑脛痠四肢重痛少氣難言至陽
 主之。
 腰骨痛寒熱取太陽
 寒熱腰痛如折束骨主之。寒熱骨痛玉枕主之。
 靈黃帝曰人之善病寒熱何以候之少俞答曰小骨弱肉
 者善病寒熱黃帝曰何以候骨之大小肉之堅脆色之不
 也少俞答曰顧骨者骨之本也顧大則骨大顧小則骨
 小皮膚薄而其肉無胭其臂濡濡然其地色焔然不與天
 同色活然獨異此其候也然後臂薄者其髓不滿故善病

寸微惡
寒尺弱
發熱

寒熱也五變

仲云病有洒淅惡寒而復發熱者何也曰陰脈不足陽往
從之陽脈不足陰往乘之何謂陽不足假令寸口脈微名
曰陽不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒也何謂陰不足假
令尺脈弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也全文

素寸口脈沉而喘曰寒熱平人氣

也脈要精微論○沉脈澁洪大寒熱在中尺膚烘然

先熱後寒寒熱也言初捫尺膚則寒也尺膚先寒久之而熱

者亦寒熱也言初捫尺膚則寒也寒熱奪形脈堅搏是逆也

寒熱安
臥脫肉
者死
寒熱赤
腫
子死

三歲死見赤脈不下貫瞳子寒熱病者平旦死全文見

虛熱

產後往來寒熱四物內加小柴胡湯
保治日久虛勞微有寒熱脈沉而數宜柴胡四物湯

川芎 當歸 芍藥 熟地黄各半

柴胡八錢 人參 黃芩 甘草

半夏各三

右為末水煎服

產後往來寒熱而脈弦者少陽也小柴胡加生地黄湯

柴胡兩二 黃芩五錢 人參三錢 半夏錢一兩五

大棗枚三 生地黄 梔子 枳殼錢五

右如煎服

增損柴胡湯治產後虛發寒熱飲食少腹脹

柴胡

人參

甘草

半夏

陳皮

川芎

白芍藥各等分

右吹咀每服三錢薑五片棗二枚水同煎食後日二服

大全治產後乍寒乍熱增損四物湯

人參

當歸

芍藥

川芎

乾薑各一

甘草

右吹咀每服四錢水一盞薑三片煎七分去渣熱服無時

雲熟地黄散治產後虛勞皆由體虛氣力未壯勞復所起四肢煩疼時發寒熱

熟地黄

人參

白芍藥

白茯苓

白木

續斷各一

黃芪

桂心

五味子

當歸

川芎各半

右吹咀每服四錢薑三片棗一枚水同煎

黃芪丸治產後虛勞寒熱進退頭目眩痛骨節酸疲氣力乏

黃芪

鱉甲

當歸炒各一兩

桂心

白芍藥

續斷

川芎

牛膝

茯苓

沉香

栢子仁

枳殼各六錢半

五味子

熟地黄各半兩

右為細末煉蜜為丸桐子大每服四五丸粥飲下食後

外熱內寒外寒內熱

仲云病人身太熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也活人云先與桂枝湯治寒次與小柴胡湯治熱也

長熱裏

醫方類聚卷六

三

羅病有遠近治有緩急 征南帥不隣吉友年七旬丙辰冬
南征至楚丘諸路迎送多獻酒醴因而過飲太多遂腹痛
腸鳴自利日夜約有五十餘行咽嗑腫疼耳前後赤腫舌
本強涎唾稠粘欲吐不吐以手洩之方出言語艱難反側
悶亂夜不得臥予診得脈浮數極按之沉細而弦即謂中
丞粘公曰仲景言下利清穀身體疼痛急當救裏清使自
調急當救表救裏四逆湯救表桂枝湯今胃氣不守下利
清穀腹中疼痛雖宜急治之比之咽嗑痛猶可少待公曰
何謂也答曰內經云瘡發咽嗑名曰猛疽此疾治遲則咽
塞咽塞則氣不通氣不通則半日死故宜急治於是遂破
刺腫上紫黑血出頃時腫勢大消遂用桔梗甘草連翹黍
粘酒製黃芩升麻防風等分咬咀每服約五錢水煮清令
熱嗽冷吐去之咽之恐傷脾胃自利轉甚再服涎清腫散

表裏
熱寒

聲出後以神應丸辛熱之劑以散中寒解化宿食而燥脾
濕丸者取其不即化則不犯上焦至病所而後化乃治主
以緩也不數服利止痛定後胸中閉塞作陣而痛思靈樞
云上焦如霧宣五穀味蒸膚充身澤毛若霧露之溉是為
氣也今相公年高氣弱自利日久致脾胃中生發之氣不
能滋養於心肺故使閉塞而痛經云上氣不足推之揚之
脾不足者以甘補之再與發散甘辛之味溫養脾胃加以
升麻人參上升以順正氣不數服而胸中快利痛止內經
云調氣之方必別陰陽內者內治外者外治微者調之其
次平之盛者奪之隨其攸利萬舉萬全又曰病有遠近治
有緩急無越其製又曰急則治其標緩則治其本此之謂
也

仲云病人身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也

活人云先與白虎加人參湯治熱次與桂枝麻黃各半湯以解其外

上熱下寒上寒下熱

羅上熱下寒治驗 中書左丞姚公茂六旬有七宿有暗風至元戊申末因酒病發頭面赤腫而痛耳前後腫尤甚胸中煩悶嗑咽不利身半已下皆寒足脛尤甚由是以牀相接作坑身半已上常臥於牀飲食減少精神困倦而體痛命予治之診得脉浮數按之弦細上熱下寒明矣內經云熱勝則腫又曰春氣者病在頭難經云畜則腫熱砭射之也蓋取其易散故遂於腫上約五十餘刺出血紫黑約一盃數頃時疼痛消散又於氣海中太文灸百壯乃助下焦陽虛退其陰寒次於三里二穴各灸三七壯治足胫下寒引導陽氣下行故也遂製一方名曰既濟解毒湯以熱者寒之然病有高下治有遠近無越於此以黃芩黃連苦

寒酒製為引用瀉其上 燕 桔梗 甘草 辛甘溫升佐諸苦藥治其熱 柴胡 升麻 苦平味薄者也 陽中之陽散發上熱 連翹 苦辛平散結消腫 當歸 辛溫和血止痛 酒煨 大黃 苦寒引苦性上行止煩熱 投劑之後腫散痛滅 大便秘利再服減大黃 慎言語節飲食不旬自良愈

既濟解毒湯治上焦頭目赤腫而痛胸膈煩悶不得臥身半已下皆寒足胫尤甚大便秘

- 大黃 酒煨 大便 利不用
- 連翹 酒製 炒
- 黃芩 酒 炒
- 甘草 炙
- 升麻 各一 錢
- 桔梗 各二 錢
- 柴胡
- 黃連 酒 炒

診

脉熱病所謂陽附陰者腰以下至足熱腰以上寒陰氣下爭還心腹滿者死所謂陰附陽者腰以上至頭熱腰以下寒陰氣上爭還得汗者生

鍼灸

【靈】上寒下熱先刺其項太陽久留之已刺則熨項與肩胛
令熱下合乃止此所謂推而上之者也刺節真邪論下同上熱
下寒視其虛脈而陷之於經絡者取之氣下乃止此所謂
引而下之者也

補文施
瀉

【垣】另有上熱下寒經曰陰病在陽當從陽引陰必須先由
絡脈經隧之血若陰中火旺上騰於天致六陽反不衰而
上充者先去五臟之血絡引而下行天氣降下則下寒之
病自去矣慎勿獨瀉其六陽此病陽亢乃陰火之邪滋之
只去陰火只損血絡經隧之邪勿悞也 聖人以上熱下
寒是有春夏無秋冬也當從天外引陽下降入地中此症
乃上天羣陰火熾而反助六陽不能衰退先於六陽中決
血絡出血使氣下降三陰雖力微能逐六陽下行以陰血
自降故也亦可謂老陽變陰之象也故經云上熱下寒視

其虛脈下陷於經絡者取之此所謂引而下之也但言絡
脈皆是也病大者三稜鍼決血去陽中之熱熱者手太陽
小腸中留火熱之邪致此老陽不肯退化為陰而下故先
決去手太陽之熱血使三陰得時之用而下降以行秋令
奉收道下入地中而舉藏也乃瀉老陽在天不肯退化行
陰道者也至元戊辰春中書參政楊公正卿年踰七十病
面顏鬱赤若飲酒狀痰稠粘時眩暈如在風霧中一日會
都堂此症忽來復加目瞳不明遂歸命予診候兩寸脈洪
大尺脈弦細無力此上熱下寒明矣欲藥之為高年氣弱
不在記先師所論凡上熱譬猶鳥巢高巔射而取之即以
三稜針於顛前髮際疾刺二十餘出紫黑血約二合許即
時頭自清利諸苦皆去自後不復作刺上熱下寒與經首
責其虛治之能引上熱下降垣於
熱處得血候熱自裏退而降也

密語上寒下熱上熱下寒
補或分開上寒補懸鍾五分
分下熱瀉曲池一寸五分

瘡寒熱

懸鍾後瀉上熱下寒先瀉後補

內經論
瘡生於風暑

魄汗未盡形弱而氣燦穴俞已閉發為風瘡見生論
秋善病風瘡全文見夏暑汗不出者秋成風瘡通天論

邪入分
陰則陰
實則虛
故寒陳
邪出分
陽則陽
實則虛
故熱燥

素黃帝問曰夫痲瘡皆生於風其蓄作有時者何也岐伯
曰瘡之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱
痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲飲冷帝曰何氣使然
願聞其道岐伯對曰陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移
也陽弁於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓頷也巨陽
虛則腰脊項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而
痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱內外
皆熱則喘而渴故飲冷也此皆得之夏傷於暑熱氣盛藏

日作者
邪客淺
問曰作
深者邪
客

於皮膚之內腸胃之外此榮氣之所舍也此令人汗空踈
腠理開因得秋氣汗出遇風及得之以浴水氣舍於皮膚
之內與衛氣并居衛氣者晝日行於陽夜行於陰此氣得
陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作帝曰其間白
而作者何也岐伯曰其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰
邪內着陰與陽爭不得出是以間日而作也帝曰善其作
日晏與其日早者何氣使然也岐伯曰邪氣客於風府循
脊而下衛氣一日一夜大會於風府其明白日下一節故
其作也晏此先客於脊背也每至於風府則腠理開腠理
開則邪氣入邪氣入則病作以此作日稍益晏也其出於
風府日下一節二十五日作五下至臑骨二十六日作六
入於脊內注於伏膂伏中之脈其氣上行九白出於缺盆
之中其氣日高故作日益早也其間日發者由邪氣內薄

伏膂上
缺盆與

醫學綱目卷六

陽會則

於五臟橫連募原也其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間白乃作也靈樞經云瘧者內薄於五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能日作故次日乃畜積而作焉謹當積二字則非一日之義明矣始明邪氣未盛未與衛氣相當故未作必候畜積與衛氣相當故作焉

風無常府邪客處是府

帝曰夫子言衛氣每至於風府腠理乃發發則邪氣入入則病作今衛氣日下一節其氣之始發也不當風汗其日作者奈何岐伯曰此邪氣客於頭項循督而下者也故虛實不同邪中異所則不得當其風府也故邪中於頭項者氣至頭項而病中於背者氣至背而病中於腰脊者氣至腰脊而病中於手足者氣至手足而病衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣之所發必開其腠理邪氣之所舍則其府也 帝曰瘧先寒而後熱者何也岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水

寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也病以時作名曰寒瘧 帝曰先熱而後寒者何也此先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒也亦以時作名曰溫瘧 帝曰夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍舍於何藏岐伯曰溫瘧得之冬中於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓爍肌肉消腠理發泄或有所用邪氣與汗皆出此病藏於腎其氣先從內出之於外者也如是者陰虛而陽盛陽盛則熱矣衰則氣復反入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧 其但熱不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧帝曰瘧瘧何如岐伯曰瘧瘧者肺素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開

醫學綱目卷六

風寒舍於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於陰故但熱而不寒氣內藏於心而外舍於分肉之間令人消燂肌肉故名曰瘧瘧帝曰瘧未發其應何如岐伯曰瘧氣者必更盛更虛當氣之所在也病在陽則熱而脉躁在陰則寒而脉靜極則陰陽俱衰衛氣相離故病得休衛氣集則復病也

衛與邪相并則病作與邪相離則病休其并於陰則寒并於陽則熱離於陰則寒已離於陽則熱已至次日又集而并合則復病也

帝曰時有間二日或至數日發或渴或不渴其故何也岐伯曰其間日者邪氣與衛氣客於六府而有時相失不能相得故休數日乃作也瘧者陰陽更勝也或甚或不甚故或渴或不渴已上俱瘧論篇

瘧應四

帝曰火熱復惡寒發熱有如瘧狀或一日發或間數日發其故何也岐伯曰勝復之氣會遇之時有多少也陰氣多而陽氣少則其發日遠陽氣多而陰氣少則其發日近此勝復相薄盛衰之節也瘧亦同法至真要大論

帝曰論言夏傷於暑秋必病瘧今瘧不必應者何也岐伯曰此應四時者也其病異形者反四時也其以秋病者寒甚以冬病者寒不甚以春病者惡風以夏病者多汗帝曰夫風之與瘧相似同類而風獨常在瘧則有時而休者何也岐伯曰風氣留其處故常在瘧氣隨經絡沉以內薄故衛氣應乃作瘧論篇

保夏傷於暑秋必病瘧蓋傷之淺也近而暴傷之重也遠而深瘵瘧者久瘧也是知夏傷於暑濕熱閉藏而不能發洩于外邪氣內行至秋而發為瘧也初不知何經受病隨

其受而取之有中三陽者有中三陰者大抵經中邪氣其
症各殊同傷寒治之也故內經曰五臟皆有瘧其治各別
在太陽經者謂之風瘧治多汗之在陽明經者謂之熱瘧
治多下之在少陽經者謂之風熱瘧治多和之此三陽受
病皆謂暴瘧也發在夏至後處暑前者此乃傷之淺者近
而暴也在陰經者則不分三經皆謂之溫瘧宜以太陰經
論之其發處暑後冬至前者此乃傷之重者遠而深也瘵
瘧者老瘧也故謂之久瘧

桂枝羌活湯治瘧病處暑前後頭痛項強脉浮惡風有汗

桂枝

羌活

防風

甘草各半兩

右為籠末每服半兩水一盞半煎至一盞溫服迎發且
服吐者加半夏麩

瘵疾頭痛項強脉浮惡風無汗者宜麻黃羌活湯

麻黃

羌活

防風

甘草各半兩

右同前服法如吐加半夏麩等分

治瘧病身熱目痛熱多寒少脉長睡臥不安先以大柴胡
湯下之微利為度如下過外微邪未盡者宜白芷湯以盡
其邪

白芷湯

白芷各一兩 知母各一兩 石膏各二兩

右為籠末同前服法

治瘧無他症隔日發先寒後熱寒少熱多宜桂枝石膏湯

桂枝五錢

石膏

知母各一兩

黃芩各一兩

右為籠末分作三服水半盞同煎服間白者邪氣所舍
深也如外邪已罷內邪未已再下之從卯至午發者
宜大柴胡湯下之從午至酉者知邪在內也宜大承

氣湯下之。從酉至子發者或至寅時發者知邪在血也宜桃仁承氣湯下之。前項下藥微利為度以小柴胡湯徹其微邪之氣。

治瘧寒熱大作不論先後此太陽陽明合病也謂之大爭寒熱作則必戰動經曰熱勝則動也發熱則必汗泄經云汗出不愈知為熱也陽盛陰虛之証治當內實外虛不治恐久而傳入陰經也宜桂枝芍藥湯主之。

石膏兩各半

桂枝二錢

黃芩

知母

芍藥

右為麤末五七錢用水煎如前藥服之寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也宜桂枝黃芩湯以和之。

甘草四錢

石膏五錢

知母五錢

桂枝二錢

柴胡一兩

黃芩四錢

人參半兩

半夏四錢

右為麤末同前服後如外邪已罷內邪未已用大柴胡大承氣等湯下之。

治虛暑後冬至前後瘧其法並於久瘧法求之。局方雙解飲子治瘧疾辟瘴氣神効。

肉苳蔻

草苳蔻

各二箇一箇用水和

厚朴

二寸一半用生薑

甘草

大者二兩一半

生薑

二塊如事大一塊濕

右各咬咀每服分二半用水一碗煎至一大盞去渣空心溫服。東垣云秋暑暑氣衰病熱瘧知其寒也局方用雙解飲子是已知此方治寒瘧也。

保治發瘧如前症是夜發者麻黃黃芩湯主之。

麻黃去節

甘草三錢

桃仁三十枚

黃芩五錢

桂枝二錢

右為細末依前服法桃仁味苦甘辛肝者血之海血受

晝發屬血夜發屬氣

邪則肝氣燥經所謂肝苦急食甘以緩之故桃仁散
血緩肝謂邪氣深透而入血故夜發乃陰經有邪此湯
發散血中風寒之劑

世桃仁承氣湯治夜瘧有實熱者傷寒方見

治先熱後寒者小柴胡湯先寒後熱者小柴胡加桂枝湯
多熱但熱者白虎加桂枝湯多寒但寒者柴胡桂薑湯
瀉之寒熱多少以定治法也若多寒而但有寒者其脈或洪
實或滑當作實熱治之若用桂枝慢也如或多熱而但
有熱者其脈或空虛或微弱當作虛寒治之若用白虎
湯亦慢也所以欲學者必先問其寒熱或熱多或少或寒
多或少又診脈以
參之百無一失矣

小柴胡加桂湯治瘧先寒後熱傷寒方見 小柴胡湯治瘧先
熱後寒

仲溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節疼煩時便難白虎
加桂枝湯主之脈經云朝發暮解

知母兩

甘草二兩

石膏斤

粳米合

桂三兩

右剉每服五分水一盞煎八分去渣溫服出汗愈

柴胡桂薑湯治瘧寒多微有熱或寒不熱傷寒方見
瘧多寒者名曰牡瘧蜀漆散主之

蜀漆燒去

雲母燒三日

龍骨等分

右三味搗為散末發前以漿水服半錢匕如溫瘧加蜀

漆一錢臨發時服一錢匕

牡蠣湯治牡瘧

牡蠣四兩

麻黃去節

甘草二兩

蜀漆三兩

右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升內諸
藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服

柴胡去半夏加枳實湯治瘧病後渴者亦治勞瘧

柴胡 兩 人參 各三 黃芩 兩 括蕪根 兩

生薑 兩 大棗 兩 甘草 兩

右七味以水一斗二升煮取六升去渣再煎取三升溫服一升一日兩三服

瘧 有風 有暑 有食 有痰

三日一發者受病一年 間日一發者受病半年 一日一發者受病一月 二日連發住一日者氣血俱受病 一日間日者補藥帶表藥後用截瘧丹截之在陰分者用藥徹起陽分方可用截方

常山 草果 檳榔 知母

烏梅 川山甲炒 甘草炙

用水酒各一大碗煎至半碗露一宿臨發前二時溫服之如吐則勿服之

大法補中帶散

大法暑風必當發汗夏月多在風涼處歇遂閉汗而不泄因食者必從飲食將息 瘧而虛者須先用參朮一二帖托住其氣不使下陷後用他藥治內傷挾外邪者同法內必生痰必以汗解二陳湯加柴胡常山黃芩 瘧而甚者發寒熱頭痛如破渴而飲水自汗可與

人參 黃芪 白朮 黃連

黃芩 梔子 川芎 蒼朮

半夏 天花粉 水煎服

一丈夫瘧脉弦細每自近午發此風寒也

白朮 柴胡 青皮 半夏

蒼朮 麻黃 木通 桂

甘草

何氏子年二十歲瘧間日作頭痛惡寒為甚

醫學綱目卷六

麻黃錢一 白木錢五 青皮錢三 木通錢七

蒼術錢二 桂皮半錢 半夏錢五 炙甘草錢三

小娘患瘧汗但未到下體 知母錢一 半夏半錢

白木錢二 麻黃 人參 桂枝錢半

分二貼薑三片水二盞半煎至半盞露星月下一夜次

日早空心熱服

陳一之于二歲間白瘧

麻黃五分 白木錢二 蒼術半錢 陳皮錢一

內心半夏錢一 木通錢一 甘草些

何主首二十歲瘧間兩日作寒自足起發時口渴身痛頭

痛服已有汗 黃芪 白木炒 青皮錢二

大黃半 麻黃半

芍藥 蒼術錢二 木通錢一 炙甘草錢三

柴胡錢一 王舅瘧左弦甚右畧瀼將退時有汗

人參兩 半夏兩 白木 柴胡各六

蒼術 青皮各五 木通兩 甘草些

分五帖煎服三之一去渣入薑汁半杯露一夜次早溫

服之 王孺人舊患瘧疾因勞心力又發今骨節疼痛惡心食少

與此方

人參錢五 白木半兩 蒼術兩 陳皮兩

川芎 當歸 木通各一 甘草錢一

分六帖薑三片 馮官人發瘧脉弦有汗

醫學綱目卷六

醫學綱目卷六

五

人參錢五

黃芪

黃連

白朮各三錢

芍藥錢三

茯苓錢三

黃芩錢三

作五帖水煎服

盧兄瘡後辛苦再發脉大洪而浮此血傷也宜補之

人參錢半

白朮錢一

黃芩錢四

甘草錢四

白芍錢一

黃連錢三

生地黄

茯苓

歸尾各五分

作一帖熱飲仍灸大椎穴五壯

一婦人五十餘歲形實喜作勞性急味厚喜火食夏却患惡寒發熱更作無休時衣被雖厚常凜然兩脉皆濇予作雜合邪治之遂以四物湯加陳皮以人參白朮為君生甘草黃柏為佐多入薑汁吞通神丸三十九回金柳青各二十九阿魏十九煎三帖而得睡第五帖而身和第七帖通

身微汗諸症皆去

蜀方人參養胃湯

草菓

茯苓

人參去蘆各半兩

甘草炙七錢

橘紅七錢半

厚朴去皮姜製

蒼朮湯洗

半夏湯洗各一兩

藿香葉洗去土

右吹咀每服四錢水一盞半薑七片烏梅一箇煎至七分

去香熱服脉弱無力或寒多者加乾薑附子如脉洪有力熱多者加黃芩黃連柴胡

右朴蒼藿香發散也半菓茯苓切痰也人參用之惟虛

人最宜

丹絕瘡青蒿丸

青蒿

冬瓜皮

官桂

馬鞭草略二

右藥焙乾為末糊為丸如胡椒大每一兩分四服於戊

時前一時服盡治瘡方百草霜黃丹等分細研每服

二錢七於發日虛心水調服不止連兩服愈 治瘡用蒜不拘多少研極爛以黃丹少許聚為度丸如雞頭大候乾每服一丸新汲水下東服至妙

垣 治瘡疾

大蒜開片一分

右一片內入巴豈肉一粒輕紙裹煨熟去巴豈研入黃丹為丸如雞頭大每服一丸先發寒用桃枝七寸東向者煎湯發日五更面北服如發熱用冷水送下味全好次發又可進一服除根
右黃丹劫痰例輕劑也

易簡七寶湯

常山 陳皮 青皮 枳榔
甘草 厚朴分

右咬咀每服半兩水酒各一盞煎六分當發日侵晨服之此服有常山必須吐而愈或當日大作俗謂鬪藥是也虛怯人及脾胃寒者不宜服
右此劫痰例重劑也虛人慎之或補後用之

局方尅効飲子

龍腦 麝香 定粉各研 荷葉焙
菖茸末 甘草各 硃砂各 信各

金箔二十五片為衣

右為末煉蜜搜和每兩作二十九丸無名異為末每服一二丸溫水磨連日發者未發前服之間白者不發夜服之隔數日發者前一日夜服之
河辟邪丹治嵐瘴鬼瘡併白頰白

菖茸 雄黑豈各九 信半錢

黃丹錢

硃砂錢

右為末同入乳鉢內滴水為丸分作三十粒每服一粒用東南桃枝取七枚研汁并花水早晨日欲出不出時向日吞之

右信砒劫痰為至峻之劑虛人切忌之

運氣瘧疾有二

一曰火熱經云歲火太過炎暑流行金肺受邪民病瘧少氣又云火太過曰赫羲其病笑瘧狂妄又云火鬱之發民病溫瘧又云少陽司天火淫所勝民病發熱惡寒而瘧又云少陽之復發而為瘧又云少陽司天之政民病寒熱瘧治以寒劑是也

二曰寒濕經云陽明司天為四之氣病瘧寒之候是也

河斷瘧如聖散

砒信錢

蜘蛛大者三箇

雄黑豈九粒

右為末滴水為丸如雞頭大如來日發於今晚夜北斗下先獻過次早以紙裹於耳內札一丸立愈如神一粒可救二人

素帝曰夫經言有餘者瀉之不足者補之今熱為有餘寒為不足夫瘧者之寒陽火不能溫也及其熱冰水不能寒也此皆有餘不足之類當此之時良工不能正必須其自衰乃刺之其故何也願聞其說岐伯曰經言無刺熇熇之熱無刺渾渾之脉王註曰渾渾謂脉無端緒無刺漉漉之汗故為其病逆未可治也夫瘧之始發也陽氣并於陰當是之時陽虛而陰盛外無氣故先寒慄也陰氣逆極則復出之陽陽與陰復并於外則陰虛而陽實故先熱而渴夫瘧氣者并於陽則陽勝并於陰則陰勝陰勝則寒陽勝則熱瘧者風寒

癰未發
宜堅束

針灸

之不常也病極則復至病之發也如火之熱如風雨不可
 當也故經言曰方其盛時必毀因其衰也事必大昌此之
 謂也夫癰之未發也陰未并陽陽未并陰因而調之真氣
 得安邪氣乃亡故工不能治其已發為其氣逆也帝曰善
 攻之奈何早晏何如岐伯曰癰之且發也陰陽之且移也
 必從四末始也陽已傷陰從之故先其時堅束其處令邪
 氣不得入陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血者皆
 取之此其往而未得并者也論 凡治癰先發如食頃乃
 可治過之則失時也 癰發身方熱刺附動脈開其空
 出其血立寒 癰方欲寒刺手陽明太陰足陽明太陰
 刺血當隨井 癰脈滿大急刺背俞用中針傍五腧俞各
 一適肥瘦出其血也 王註云背俞謂大杼五腧 癰脈小實
 急灸脛少陰刺指井 指井至陰穴也 癰脈緩大虛便宜

用藥不宜用鍼 諸癰而脈不見刺十指間出血血去必
 已先視身之赤如小菖者盡取之 刺癰者必先問其病
 之所先發者先刺之 先頭痛及重者先刺頭上及兩額
 兩眉間出血 王註云頭上星百會兩額 先項背痛
 者先刺之 先腰脊痛者先刺脊中出血 先手臂痛者
 先刺手少陰陽明十指間 先足脛痠痛者先刺足陽明
 十指間出血 風癰癰發則汗出惡風刺三陽經背俞之
 血者 肝癰痛甚按之不可名曰肝癰病以鏡針針絕骨
 出血立已 身體小痛刺至陰諸陰之井無出血間日一
 刺 癰不渴間日而作刺足太陽渴而間日作刺足少陽
 刺 經云癰不渴間日而作 溫癰汗不出為五十九刺
 足太陽之癰令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱焮焮
 焮焮然熱止汗出難已刺郄中出血 金門穴黃帝中腧
 經云委中主之海藏

羌活加生地黃 足少陽之瘧令入身體解休寒不甚熱
 小柴胡加桂湯 不甚惡見入見火心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽使發
 胡柴湯 足陽明之瘧令入先寒洒淅洒淅寒甚久乃熱熱
 去汗出喜見日月光火氣乃快然刺足陽明跗上衝陽
 足太陰之瘧令入不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至
 則善嘔嘔已乃衰即取之待病衰即取之井俞及公足
 少陰之瘧令入嘔吐甚多寒熱熱多寒少欲閉戶牖而處
 其病難已海小柴胡加半夏湯陽明病 足厥陰之瘧令
 入腰痛少腹滿小便不利如瘧狀非瘧也數便噫恐懼氣
 不足腹中悒悒刺足厥陰太衝穴海四物加 肺瘧令入
 心寒寒甚熱熱間善驚如有所見者刺手太陰陽明列缺
 心瘧者令人煩心甚欲得清水反寒多不甚熱刺手少
 陰神 肝瘧者令人色蒼蒼然太息其狀若死者刺足厥

陰見血中 脾瘧者令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗
 出刺足太陰補 腎瘧者令人灑灑然腰脊痛宛轉大便
 難目眴眴然手足寒刺太陽少陰太鍾 胃瘧者令人且
 病善饑而不能食食而肢滿腹大刺足陽明太陰橫脈出
 血三 疔充解 瘧寒熱甚寒熱厥取手陽明 瘧寒少熱
 多取足少陽 瘧而赤目眩眩心痛取手陽明少陽 瘧
 腰背痛不渴取足太陽俱刺
 甲瘧瘧神庭及百會主之 瘧振寒熱盛狂言天樞主之
 瘧盛熱列缺主之 瘧寒厥及熱厥煩心善噦心滿而
 汗出刺少商出血立已 熱瘧口乾商陽主之 瘧寒甚
 欲嘔沫陽谿主之 風瘧汗不出偏歷主之 瘧多寒少
 熱大鍾主之 瘧欬逆心悶不得臥嘔其熱多寒少欲閉
 戶而處寒厥足熱太谿主之 瘧瘵瘵驚股膝重所轉筋

瘧疾綱目卷六

瘧疾

頭眩痛解谿主之。瘧日西發臨泣主之。瘧多汗腰痛不能後仰目如脫項如拔崑崙主之。瘧不渴間日作崑崙主之。

久瘧

久瘧者瘵瘧也以其隔二三日一發纏綿不去

丹老瘧係風暑之邪入在陰分在臟宜用血藥引出陽分而散川芎撫芎紅花當歸蒼白朮白芷黃柏甘草露一宿早服古方多用峻劑恐非稟受怯弱與居養所移者所宜始悟常山砒丹烏梅劫劑或誤投之輕病變重重必危矣三日一作者邪入於三陰經也作於子午卯酉日者少陰經瘧也作於寅申巳亥日者厥陰經瘧也作於辰戌丑未日者太陰經瘧也瘧得於暑當以汗解或因取涼太過汗鬱成痰其初感也弱者即病胃氣強者伏而未發至於再

感復因內傷其病乃作宜其難瘵夫感冒與風皆外邪也故非汗多不解今之遺此疾者已經再三劫試胃氣重傷何由得愈欲治此症必先與參朮等補劑為君加柴葛等發散藥漸而收汗得汗而虛又行補葷下體屬陰最難得汗補藥力到汗出至足方是佳兆

丹治一婦病瘧三日一發食少經不行已三月脈無時冬寒議作虛寒治疑誤再診見其梳洗言動如常知果誤也經不行非無血為痰所碍脈無非血氣虛乃積痰生熱結伏其脈而不見耳當作實熱治與三花丸旬日後食進脈出帶微弦謂胃氣既全雖不瘧當自愈而經行也令淡滋

味果應三花神佑丸見水脹

一婦身材小味厚瘵瘧月餘間日發於申酉頭與身痛寒多喜極熱辣湯脈伏面慘晦作實熱治之以斗車湯為末

粥九黍米大服十粒津噦日三次令淡飯半月大污愈
久瘡欲吐不吐宜吐之用藜蘆散或雄黃散

瘡病能食而痰伏者小胃丹方見內傷飲食

一人性急好酒色味厚適多憂怒患久瘡忽大熱下臭積
大孔痛陷下此太虛脈弦大而浮以瓦磨如錢圓燒紅童
便燥急取以紙裹於痛處恐外寒乘虛而入也以參歸陳
皮煎服淡味半月而安

一婦人久痢因哭子變瘡一日五六作汗如雨不止脈微
數疲甚無邪可治陰虛陽散死在旦夕且服四獸等熱劑
遂用參朮各二兩白芍藥一兩黃芪半兩炙甘草二錢作
大劑四五服而愈

一人因勞役發嗽得瘡又服發散藥變為發熱舌短語
言不正痰吼有聲脈洪實似滑先用獨參湯加竹瀝二盞

設一服後吐膠痰舌本正後用黃芪人參湯服半月而愈

藜蘆散 大藜蘆末炒 溫壺水調下以吐為度

雄黃散 雄黃 瓜蒂 赤小豆各一錢

右為細末每服半錢溫水調下以吐為度

驚甲煎丸 治瘡母

驚甲十二分 烏扇三分 黃芩 鼠婦熬

小兒大黃 桂枝 石韋去毛 厚朴

紫葳 阿膠各三分 乾姜 人參

桃仁各二 柴胡 蟬螂各六分 芍藥

牡丹皮 廣虫炒各五分 蜂窠炙四分 瞿麥二分

葶藶炒 半夏各一分 赤硝十二分

右二十三味為末取銀甕下灰一斗清酒一斛五斗浸
灰候酒盡一半看驚甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁

內諸藥前為瓦如桐子大空心服十九日三服
瘡母丸

青皮

桃仁

紅花

神麩

麥芽

鱉甲

三稜

蓬朮

海粉

香附

右為末神麩糊為丸如桐子大每服五七十九白湯下

小兒瘡疾痞塊用生地芍藥各一錢半陳皮川芎黃芩半

夏各一錢甘草二分姜水煎調鱉甲末服

十棗湯

芫花

大戟

甘遂

右為末每服半錢水一盞東十枚同煎半盞服

瘡脹

秋深久瘡胸中無物又無痰癢腹高而食少俗謂瘡氣入

腹宜倉木湯主之

蒼木

草烏頭

杏仁

右為粗末起作一服水三升煎至一半均作二服下日服盡

產後瘡

產後瘡

產後瘡疾多由汚血挾寒熱而作太法宜葉胡四物湯調

之熱多者宜服草菓飲子

半夏

赤茯苓

草菓

甘草

陳皮

川芎

白芷

紫蘇

良姜

青皮

乾姜

右咬咀分二貼水二盞姜五片棗二枚煎至八分當發

日早連進二服無不効者

寒多者宜服生熟飲子

肉苳蔻

草菓仁

厚朴

半夏

