

肝膽部

眩癩

癩癩

顫振

子癩

產後癩瘰

瘰

勞風


厲風

胎前瘰

產後瘰

小字子癩

八





醫學綱目卷之十一

肝膽部

眩

癩癩

子癩

大法

成無已云眩者非眩而見其眩謂眼黑眩也運者運為運轉之運世謂之頭旋是也

內經論眩皆屬肝木屬土虛丹溪論眩主於補虛治痰降火仲景治眩亦以痰飲為先也

肝木作眩

諸風掉眩皆屬於肝全文見診法

河掉搖也眩昏亂旋運也風主動故也所謂風氣動而頭目眩運者由風木旺必是金衰不能制木而木復生火風火皆屬陽多為蕪化陽主乎動兩動相搏則頭目為之眩運而旋轉故火木動也煩得風則自旋轉人或乘舟車及作環舞而眩運者其動不止而左右紆曲故經曰曲直動搖風之用也眩運而嘔吐者風熱甚故也



狗蒙招尤目與耳聾下實上虛過在足少陽厥陰其則入

肝全文見治
肝虛實法

本治肝厥頭暈清頭自釣藤散

釣藤

陳皮

半夏

麥門冬

茯苓各半

石膏

人參

甘菊

防風各半

甘草分

右為庵末每服四錢水一鍾半生薑七片煎至八分溫服

服

治肝厥狀如癩疾不醒嘔吐醒後頭虛運發熱方

麻黃

釣藤皮

石膏

乾葛

半夏麩

柴胡

甘草

枳殼

甘菊

右為庵末每服四錢水一鍾半生薑三片棗一枚同煎

至八分去查溫服

婦人患頭風者十居其半每發必掉眩如在車上蓋因血虛肝有風邪熱故耳素問云狗蒙招搖目眩耳聾上虛下實過在足少陽厥陰甚則歸肝蓋謂此也余常取此方以授人比他藥捷而效速奇勞散

川芎配

當歸分

羌活

旋覆花

蔓荆子

細辛

石膏

藁本

荆芥穗

半夏麩

防風

熟地

甘草各半

右為末每服二錢水一木鍾生薑三片同煎至七分去查溫服不拘時服

右甘寒瀉風木

羅風痰治驗

叅政楊公七旬有二有風痰於至元戊辰

春忽病頭旋眼黑目不見物心神煩亂兀兀欲吐復不吐
 心中如懊懣之狀頭偏痛微腫面赤色腮頰亦赤色足胛
 冷命予治之余料之此少壯之時喜飲酒久積濕熱於內
 風痰內作上熱下寒是陰陽不得交通否之象也經云治
 熱以寒雖良士不敢廢其繩墨而更其道也然而病有遠
 近治有輕重參政今年高氣弱上熱雖盛豈敢用寒涼之
 劑損其脾胃經云熱則砭之又云高巔之上射而取之余
 以三稜針約二十處刺之其血紫黑如露珠之狀少頃頭
 目便覺清利諸症悉減遂處方云眼黑頭旋虛風內作非
 天麻不能除天麻苗謂之定風草此草獨不為風所搖故
 以為君偏頭痛者乃少陽也非柴胡黃芩酒製不能治黃
 連苦寒酒炒以治上熱又為因用故以為臣橘皮苦辛溫
 炙甘草甘溫補中益氣為佐生薑半夏辛溫能治風痰袪

芩甘草利小便導濕熱引而下行故以為使服之數劑邪
 氣平生氣復而安矣

天麻半夏湯治風痰內作胸膈不利頭旋眼黑兀兀欲吐
 上熱下寒不得安臥

天麻 半夏各乙
 黃芩酒浸 甘草炙
 橘皮白去 柴胡分七
 黃連分三 白茯苓皮去 前胡各五

右吹咀作一服水二鍾薑三片煎至一鍾溫服食後忌
 酒麪生冷物

垣羌活湯治風熱壅盛上攻頭目昏眩

羌活 防風 黃芩各乙兩
 黃連酒煮一兩 黃柏酒炒半兩 瓜蒌酒洗半兩 柴胡分七
 白茯苓錢五 澤瀉錢六

右為麤末每服五錢水煎取清食後或先臥通口熱服之即服

右苦寒瀉風木

外感風邪

靈筋骨血氣之精而與脉并為目系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虛其入深則隨眼系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣大感

本治一切頭旋本因體虛風邪乘於陽明經上注頭面遂入於腦亦因痰水在於胸膈上犯大寒使陽氣不行痰水結聚上衝於頭自令頭轉旋羚羊角散

- 羚羊角 茯神各一
- 白芷 半夏湯洗七次枳殼
- 甘草 附子各一分

防風

右為麤末每服四錢水一鍾半生薑五分慢火煎至七分去渣不拘時候溫服

百一都梁丸治風吹項背頭自昏黑眩痛

香白芷大塊者用沸湯泡洗四五次焙乾

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼用荊芥湯點茶下

無大豆紫湯治中風頭眩惡風自吐冷水有汗方見症門

聖治風頭旋用蟬殼二兩微炒為末非時下溫酒一鍾七

上虛眩

針經胃風篇云上虛則眩又五臟生成篇云狗蒙招九目暝耳聾下實上虛蓋蒙昏也招搖掉也暝黑眩也皆謂昏冒搖掉眼黑眩屬下實上虛也

丹陳客婦人近五十頭痛麻木眩運脉甚虛宜補氣益血去風行濕

天麻酒乙 人參錢半 白朮錢二 黃芩錢半
 歸身尾酒半 川芎錢半 陳皮錢半 甘草錢三
 黃芪錢三 半夏錢五 生薑片三

右作三劑水煎服
 賈勇因勞役眼眩倦怠頭不爽肚帶溏滑

黃芪錢半 人參錢半 當歸錢一 黃柏炒三
 白朮酒一錢 陳皮錢半 蔓荊子粒五 甘草些
 煎稍熟飲之丑卯時各一次去枕眠少時巳申時又各一次瘥

男子因作勞成病發熱脚酸口苦頭暈
 白朮 茯苓 黃連 川芎兩半
 白芍藥 人參 生地 陳皮
 當歸各一兩 甘草錢一 杜仲炒六兩

分十八貼食前熱下柳青丸二十二粒
 丈夫患熱頭眩脈大而散此是辛苦中來

陳皮錢三 柴胡錢三 人參錢二 白朮錢二
 黃芪錢三 木通錢一 甘草些 分三貼服

本治風眩頭暈川芎散

山茱萸兩一 山藥 甘菊花 人參
 川芎各半兩 茯苓兩半

血虛眩 因芎歸湯治產後去血過多眩暈不食及遺胎去血多
 崩中去血多金瘡去血多拔牙齒去血多不止懸虛心煩
 眩暈頭重目暗舉頭欲倒方見婦人
 頭眩屬氣虛拔痰無痰作眩不得治痰為主拔補氣藥
 補虛降 大治痰

并降火藥濕痰多者用二陳湯痰多因火動者二陳湯
加酒苓取運火動其痰二陳湯加黃芩蒼朮羌活散風行
濕水煮金花丸治頭眩方規
取運不可當者大黃三次酒炒乾為末茶調下每服一
錢至二錢一男子年七十九歲頭自昏眩而重手足無
力吐痰口口相續左手脉散大而緩右手緩而脉大不及
於左重按皆無力飲食畧減而微滑大便三四日一行衆
人皆與風藥至春深必死予曰此皆大虛證當以補藥作
大劑服之衆怒而去余教用人參黃芪當歸身芍藥白朮
陳皮濃煎作湯使下連栢丸三十粒如此者服二年半而
精力如少旺時連栢丸冬加乾薑少許餘三時皆依本法
連栢皆薑汁炒為細末又以薑汁煮糊為丸
本治虛風眩吐痰涎不飽養正丹

虛者宜
補中

黑鉛 水銀 硫黃 硃砂各一
右用鐵盞一隻火上滾鉛成汁次下水銀用柳枝子打
勻取下放少時下三味末令冷研為粉用米飲丸或用
棗肉丸如梧子大每服三十九丸鹽湯下
此藥升降陰陽補接真氣非止頭旋而已
范天駭之內素有脾胃之病時顯煩躁胃中不利大便
不通初冬出外而晚歸為寒氣怫鬱悶亂大作火不得伸
故也醫疑有熱治以疎風丸大便秘行而病不減又疑藥力
少復加七八十九下兩行前症仍不減復添吐逆食不能
停痰唾稠粘湧出不止眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘
無力不欲言心神顛倒兀兀不止目不敢開如在風雲中
頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安臥予謂前症乃
胃氣已損復下兩次則重損其胃而痰厥頭痛作矣製半

夏白木天麻湯治之而愈

天麻分五 半夏湯洗一錢 人參分五 白木錢一
蒼朮分五 橘皮 黃芪 澤瀉
白茯苓各分五 神麴一錢 炒 大麥蘖一錢 乾薑分三
黃柏分二

右件咬咀每服半兩水二盞煎至三盞去渣帶熱服食
前此頭痛甚謂之足太陰痰厥頭疼非半夏不能療
眼黑頭眩虛內作非天麻不能除其苗為定風草亦
治內風之神藥也內風者虛風是也黃芪甘溫瀉火補
元氣大參甘溫瀉火補中益氣二木俱甘苦溫除濕補
中益氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫益氣調中升
陽神麴消食瀉胃中滯氣大麥蘖實中助胃氣乾薑辛
熱以滌中寒黃柏苦大寒酒洗以主冬天少火在泉發

躁也

右氣虛拔痰眩暈余嘗治一人既則稍輕但舉足則頭
旋眼黑以天麻半夏茯苓陳皮白附僵蚕莖草歸生
薑黃芩煎湯服之五六日愈蓋做此方加減之也
濟芎朮湯治胃中濕痰眩暈嘔逆頭重不食

川芎 半夏酒洗 白木各一兩 甘草炙半兩
右咬咀每服四錢水一盞生薑七片煎服不拘時有附
子桂心無半夏

巖旋覆花湯治中脘伏痰嘔逆眩暈

旋覆花 半夏 橘紅 乾薑各一兩
枳榔 人參 甘草 白木各半兩

悸者蒸
行水

仲卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之

方見 假令瘦人臍下有悸吐涎沫而頭眩此水也五苓散主之傷寒
痰閉不出者吐 子和青黛散搗取涎治眩神效方見
 頭風眩運可用獨聖散吐之吐訖可用清上辛涼之藥防風通聖散加半夏等味伸景云此痰結胸中而致也通聖

獨聖散

瓜蒂多少 鬱金各等分

右為細末每服一錢或二錢薑汁調下服之用鷄翎探吐

河間搜風丸治邪氣上逆風熱上攻頭自眩運大小便結滯大小便滯者微利之

人參 茯苓各半兩 滑石二兩 藿香二錢半

乾姜 白礬生各一兩 蛤粉二兩 南星

大黃 黃芩各二兩 牽牛四兩 薄荷兩半

半夏一兩 寒水石一兩 右為末滴水丸小豆大每十九生薑湯下加至二十九日三服

益精氣 仲白米附子湯治風虛頭重眩苦極不知食味暖肌補中之

白米二兩 附子一兩半炮去皮 甘草一兩炙

右三味剉每五錢薑五片棗一枚水鍾半煎至七分去渣溫服

本治體虛有風外受虛濕身如在空中生散

生附子去皮 生南星各等分 右二味咬咀每服四大錢水一鍾生薑十片慢火煎至

八分去查服戊午年予在新安有此疾名醫傳授此方
三服愈

仲心下有支飲其人苦冒眩澤瀉白朮主之短氣倚息形腫者利

用澤瀉五兩白朮二兩以水二升煮一升分溫再服

運氣運氣眩有二
一曰風助肝盛眩經云厥陰司天之政風行太虛雲物搖動目轉耳鳴三之氣風乃時舉民病掉眩又云厥陰司天客勝則耳鳴掉眩又云厥陰之勝耳鳴頭眩又云厥陰之復筋骨掉眩治以諸涼是也

二曰濕邪傷腎眩經云太陰司八濕淫所勝頭項腰背痛而眩治以苦熱是也

雜方
洞神妙散搗鼻治頭目昏眩偏正頭痛左見頭
針灸腦為髓海其輸上在於其蓋下在風府髓海不足則腦

轉耳鳴脛痠眩冒目無所見全文見針灸蓋者百會穴也上氣不足頭為之苦傾目為之眩補足外蹠下雷全文見針灸邪在腎肩背頭項痛時眩取湧泉崑崙視有血者盡取之全文見針灸

怪穴 頭目眩運 至陰

標 金門 申脉

桑 風池 神庭內風池通玄明 金門瀉 三聖補

心 頭暈怕寒些少風寒則目暗矇作不分冬夏常用綿帽包日夜不離一去帽即發 百會 惺惺分恐 風池

二寸半主 頭大熱 豐隆二十

桑 頭熱 上顙 風門 攢竹 百會

甲 風眩善嘔煩滿神庭主之如顏色青者上星主之取上星者先取諱謹後取天牖風池如頭痛顏青者顙會主之

診

風眩引額痛上星主之先取諱諱後取天牖風池
眩目眩惡風寒面赤腫前項主之風眩目眩顛上痛後
項主之風眩驚手腕痛泄風汗出至腰陽谷主之
風目眩頭痛風眩目痛腦空主之風逆暴四肢腫濕則
唏然寒飢則煩心飽則眩大都主之頭眩目痛至陰主
之
丹左手脉數熱多脉澁有死血右手脉實痰積脉
大必有久病

癩癩

癩癩即頭眩也痰在膈間則眩微不吐痰溢膈上則眩甚
仆倒於地而不知久名之曰癩癩徐嗣伯云大人曰癩小
兒曰癩其實一疾也然與中風中寒中暑尸厥等仆倒不
同凡癩癩仆時口中作聲將仆時吐涎沫省後又復發時

大法

作時止而不休息中風中寒中暑尸厥之類則仆時無聲
省時無涎沫者後不復再發間有發者亦如癩癩之常法
也

瓜蒌 半夏 南星 大率行痰為主 黃芩 黃連

分痰與熱有熱以涼藥清其心有痰必用吐藥吐後

用東垣安神丸此證必用吐吐後用五疔之藥青黛柴

胡川芎之類

海治張洪伏三脉風癩驚癩發狂惡火與火者灸第三椎

第九椎眼局方妙香丸以針穿三眼于透冷水內浸少時

服之如本方若治眩細緩三脉諸癩似狂者李河南五生

丸妙香丸方

氣亂于頭則為厥逆頭重眩仆全文見邪搏陽則為癩

上實

丸見虛煩條

邪搏陽則為癩

疾見診法下同針經九針厥成爲癩疾厥氣上

疾云邪入於陽轉爲癩疾

帝曰人生而有病癩疾者病名曰何安所得之岐伯曰

病名爲胎病此得之在母腹中時其母有所大驚氣上而

不下精氣并居故令子發爲癩疾論奇病

凡癩癩及中風中寒中暑中濕氣厥口厥而昏眩倒仆不

省入事者皆由邪氣逆上陽分而亂於頭中也癩癩者痰

邪逆上也中風寒暑濕及氣厥口厥者亦風寒暑濕等邪

氣逆上也邪氣逆上則頭中氣亂頭中氣亂則脈道閉塞

孔竅不通故耳不聞聲目不識人而昏眩無知仆倒於地

也以其病在頭顛故曰癩疾治之者或吐痰而就高越之

或鎮墜痰而從高抑之或內消痰邪使氣不逆或隨風寒

暑濕之法用輕劑發散上焦或針灸頭中脈絡而導其氣

皆可使頭顛脈道流通孔竅開發而不致昏眩也是知癩

癩之癩與厥成癩疾眩冒癩疾之顛一疾也王太僕誤分
顛爲二疾獨孫真人始能言之今特冠此氣亂頭顛等經
文於癩癩篇首使人知疾有所歸而治有所據也

局碧霞丹治五癩疾方見前

世治暗風天麻南星半夏僵蚕白附子防風各半兩白礬

二兩用木瓜一箇切去頂取穰納前藥末用原頂覆住麩

包煨熟能搗如泥爲丸又用皂角二寸敲細酒半盞浸一

宿如發時取前藥一十九粒納口中用酒灌下取出痰即

愈自省後且服三十粒薑湯下

治風癩及心風病用皂角二挺搥破濾汁熬如稀糊攤紙

上曬乾取兩葉如小錢大用溫漿水浸洗去紙注於兩鼻

孔各一蜆殼許須臾涎下咬筋瀝盡涎後服祛痰丸

代赭石一兩

白礬二兩

大黃三兩

芒硝二兩

上者抑
之行之

高者因
而越之

心血少者甚之

右為細末稀糊為丸如梧子大每服二十九冷水送下不拘時

仲風引湯治癩疾瘰癧後方見

無礬丹丸治五癩百癩無問陰陽冷熱

號丹晉書略

右用磚鑿一窠可容二兩許先安丹在下次安礬在上以炭五斤熾令炭盡取出細研以不經水猪心血為丸如菴葢大每服十九至二十九橘皮湯下

四治暗風遠年日久不愈皆可服用地黃廣南道地者不計多少火煨醋燂七次為細末每服二錢溫酒調下年深者亦治

羅參硃丸治風癩大有神效

人參
哈粉
硃砂各等分

右為細末縱猪心血為丸如梧子大每服二十九金銀花湯下食遠服

神應丹治諸癩疔好辰砂不拘多少為細末用猪心血和之得所以蒸餅暴蒸取出就熟丸如梧子大每服十九食遠臥時煎入參湯下大有神效

琥珀壽星丸

大南星一斤煨乾
琥珀四兩
硃砂二兩
猪心三箇取血另打生薑麩糊攪令稠粘將猪心血和入藥末丸如梧子大每服五十九煎入參湯空心送下

日進三服

世蜜陀僧散治暗風取蜜陀僧成塊者以鐵線纏又用鐵線懸掛火煨紅用酒醋六升燂盡出火毒研極細每服一

痰迷心竅者開之

麻黃不去節 五錢 桔梗 黃芩 石膏各一
 白朮 山梔 荆芥穗各二 滑石各一

甘草兩

右為羅末每服一兩生薑煎溫服日再服

若勞汗當風寒薄為酸鬱乃痲此勞汗出於女府脂液所凝去苦硝倍加芍藥當歸散玄府之風當調其榮衛俗云風刺或生癢疹或赤或白倍加麻黃鹽豉芎白出其汗麻黃去節亦去苦硝以鹹走血而內凝故不用之發汗罷依前方中加四物湯黃連解毒三藥合而飲之日二服故內經曰以苦發之為熱在肌表連內也小便淋閉去麻黃加滑石連翹煎藥中調木香末一錢七麻黃主於表而不主於裏故去之腰脇走注疼痛者加硝石當歸甘草一服各一錢調車前子末海金沙

末各一錢故經曰腰者腎之府破傷風者如在表則辛以散之在裏則苦以下之蕪散之汗下後通利榮血祛逐風邪每一兩加荆芥穗大黃各一錢調全蝎末一錢羌活末一錢諸風癩瘡小兒急慢驚風大便秘結邪熱暴甚腸胃乾燥寢汗咬牙上竄喘語筋轉驚悸肌肉蠕動每一兩加大黃二錢梔子二錢茯苓末二錢七如肌肉蠕動者調羌活末一錢經曰肌肉蠕動命曰微風風傷於肺咳嗽喘急者每一兩加半夏桔梗紫苑各二錢如打撲傷損肢節疼痛腹中惡血不下每一兩加當歸大黃各二錢半調沒藥乳香末各二錢解利四時傷寒內外所傷每一兩加益元散一兩芫白十莖鹽豉一合生薑半兩水一碗同煎至五七沸或煎三小碗溫冷服一半以散投之即吐吐罷後服一半稍熱

眼汗出立解如飲酒中風身熱頭痛如破者加黃連
鬚二錢麥白十莖衣法立愈慎勿用桂枝麻黃湯解之
頭旋腦熱鼻塞濁涕時下每十兩加黃連薄荷各二錢
牛內經曰膽移熱於腦則辛頰鼻淵者濁涕下不
色王註曰膽液不澄則為濁涕不色如水泉者故曰鼻
淵也此為足太陽脉與陽明脉俱盛也如氣逆者調木
香末一錢

素心脉滿大癩瘕筋攣

仲風引湯除熱癩癩又治大人風引少小驚癩瘕瘰日數
十發醫所不瘥又治脚風

- 大黃
- 龍骨
- 乾薑各四
- 桂枝三
- 甘草
- 牡礪各二
- 寒水石
- 滑石
- 赤石脂
- 白石脂
- 紫石英
- 石膏各六

右十二味桂麩末篩以青囊盛之取三指撮并花水三
升煮三沸溫服一升治風熱瘕瘕食後量多
河犀角丸治風癩癩發作有時揚手擲足口吐痰涎不省
人事暗倒屈伸

- 犀角末兩
- 赤石脂三
- 朴硝一
- 白僵蚕一
- 薄荷葉兩

右為末麩糊丸如梧子大每服二十九至三十九溫水
下日三服不拘時候如覺痰多即減數忌油膩炙燥
龍腦安神丸治男婦五種癩癩無問遠年近日發作無時

- 茯苓去皮取人參去
- 地骨皮
- 甘草
- 麥門冬去心各
- 龍腦三錢
- 牛黃半兩
- 硃砂二錢
- 桑白皮兩
- 馬牙硝三錢
- 麝香三錢
- 烏犀角末兩
- 金薄三十片

脈小急
為寒

右十三味煉蜜為丸如彈子大，金薄為衣，冬月溫水化下，夏月涼水。又治虛勞發熱咳嗽，語喑舌強，日進三服。

靈肝脈小急，癩瘕筋攣。王註云：肝養筋，藏血，肝氣受寒，故癩瘕筋攣。一陰急

為癩厥，同。肺脈急甚為癩疾，腎脈急甚為骨癩疾。湖

虛實

羅沉香天麻湯治癩瘕筋攣，防風小

珠子辰砂丹治風癩久不愈者

薯蕷

人參

遠志

防風

紫石英

茯神

虎骨

虎睛

龍腦

五味子

石菖蒲

丹參

細辛各二錢半

珠子末錢四

右件為細末，麴糊為丸如梧子大，用硃砂二錢研細為衣，每服三二十丸，煎金銀花湯送下，日進三服，忌魚肉。

濕麴動風之物

烏頭丸治五風癩病

川烏

草烏

天仙子

五靈

果豈升

右為細末，滴水和丸如梧子大，每服五七丸，溫水下如

中風加附子半兩

實

子和昔項開完顏氏病，搐先右臂并右足，約搐六七十數，良久左臂并左足亦搐六七十數，不瘥兩目直視昏瞶，不識人，幾月餘求治，於余先漏其寒痰三四升，次用導水禹

功散泄二十餘行，次服通聖散辛涼之劑，不數日而瘥。

羅法煮草麻子治諸癩病，不開年深日遠

草麻子去皮取仁二兩 黃連去鬚剉如

右件用銀器承一大碗，慢火熬水盡，即添水熬三日兩

法

夜為度，取出去黃連，只用苧麻子仁風乾，不得見日，用竹刀將苧麻子每粒切作四塊，每次服五粒，計二十塊。作一服，用荆芥湯食後溫服。服苧麻子者，終身忌食

治一婦人四十五歲生子多，觸胎時有腹痛，每夜喜飲酒三盞，即睡。其天性暴而諧謔，所以借酒解怒。忽九月望後，癩病大作，目上視揚，手擲足甚，強健舉體，大筋皆動，喉嚨如錐涎沫流，口兩角如此。一時辰許，諸症皆靜，狀如熟寢，全不知人。半時，小腹漸痛，上至心痛，大作汗如雨，自頭至乳而止。如此半時，痛漸減，汗亦收，痛作時却自言其痛，其餘言語皆謬誤，問亦不答，亦不知人。痛定，又熟寢如前。癩與痛間作，晝夜不息。經兩宿，方召其脈之痛作時，脈四至半，似弦非弦，左弱於右。予未敢與藥，候癩作時，再看形脈。後作時，六脈皆隱，但有太筋轉於指下，眼白青而面不

青，手之動三倍於足。予聞之，痛作時必欲重按，比癩作時汗必不出，其夫言果然。予曰：此非死證，若尚能嚔藥，則易治。試以調香附子末灌之，適癩勢稍定，却嚔得半盞，急燒竹瀝末，就時痛大作，余以肝有怒邪，因血少而氣獨行，所以脾受病，脾胃之間舊有酒痰為肝氣所抑鬱，而為痛然。酒喜動可以出入升降，入內則痛出外，則癩當乘其入內之時，急為點灸，敦行間中腕三處穴，冷分頭同時下火灸之。足上艾火少灸，先了腹上痛，漸下至腰而止。熟寢半時，癩作如前證，減半，又以竹瀝入少薑汁灌下，大半鍾灌時，適值癩定，但熟寐如前，自是不省人事。晝二夜皆已棄之。余曉之曰：身不發熱，因痛則汗出，大便不通者五六日，自予來亦未見其小水，非死症，當是血少無神而昏耳。爾為痛，指入中候而呻吟急，以入參湯同竹瀝灌之，又昏

購如前余教以作入參白朮膏又竹瀝調下如此二晝夜
凡用入參一斤白朮二斤眼忽能開手能舉自言曾腦滿
而舉身皆痛耳目仍未有聞見忽自齋床甚多余聞之甚
喜且得癩與痛皆不作但教令用陳皮芍藥甘草川芎湯
調參朮膏又加竹瀝飲之余欲往他處耳與脈之間其作
聲余自知謬拙不教以粥與藥間服急令作稀粥與之止
燕得三四匙牙禁不受余遂以木楔幹開以稀粥入藥湯
又與竹瀝同灌一大鍾蓋是粥多而藥居三之二予遂出
門教令粥藥相間與之予在二十里外未申間天大風作
予料此婦癩必作特往視之癩不作而痛作脈去來急無
次急為灸然谷太衝巨闕灸罷痛定問其要粥否答曰我
正飢其夫飲之以粥燕兩鍾予乃往他處仍教以藥湯調
參朮膏竹瀝與粥間與之如前第二夜半時召予甚急往

視之癩病大作奪手不能診脈令人扶定兩時予捉其中
指強而脈之四至半釐大有方左右同而右少緩口妄言
而無次又怒罵人眼上視不瞬而嘔又欲起走其狀若有
所憑然予捉定兩手為灸兩大指背半甲半肉際各三壯
怒狀稍殺求免索燭視之耳目仍未有聞見昏寐至夜半
狂怒大作且言鬼怪之事而師巫至大罵巫者予靜思之
氣因血虛亦從而虛邪因以理或有之且與補藥血氣若
克邪當自退仍與前藥又恐痰頑佐以荆瀝又以秦承祖
灸鬼法灸之哀告我自去昏睡一晝夜忽自起坐索粥其
夫與之方問夫你面垢如許惟床上有香氣繼又無所知
識惟開眼不睡手足雖能運動却作尋摸態如此又二晝
夜粥食稍加又溺床多如前予益喜仍守前藥予又往他
處次日晚忽來召予急往視之病人自言渾身皆痛脈之

皆五至左右均而和曰參朮膏俱盡遂教令就與前藥中
加參朮煎去荆瀝加香附末與一服覺甚快余且令守此
藥至次夜半又來告急曰前痛大作往視之坐榻上呼聲
甚高予思之此虛病亦多汗腸燥而糞難耳痛當在小腹
與腰急烘琥珀膏大者貼小腹仍教以熱手摩腰腎間連
得下氣而痛減就睡少時又起如是者五六次一醫者勸
令用通利藥予曰痛與死孰為輕重且堅忍至夜半後當
自通又往他處至四更來告急往視之痛大作予令坐以
溫湯中當自下換湯痛定覺甚快第二桶湯下結糞二塊
就睡天明予又往他處至晚又告急予視痛大作連及兩
脇予不可近予思之此痛無因若結糞未盡痛當在下今
痛在上必因食多問之果然醫者欲用感應丸予教勿與
粥藥病者乃索藥遂以香附末令舐之至夜半痛漸減天

久癩
痰積

陰陽

明覺暮飢索粥予曰非飢也乃嘈耳勿與而自安其家人
自與粥至辰已間予往他處至晚痛又作而病者索香附
末不已遂以湯調半碗與之探令吐猶有宿食痛遂止予
又往他處至夜半又告痛復作詢之以醋拌蘿蔔苗吃粥
又以香附末探吐之痛定教令三晝夜勿與食至次日少
與淡粥覺飢時以陳皮湯下白朮丸如此調理自安
痰癩癩治法並見土虛條

潔治風癩病久不能愈者從厚朴丸春秋加添外又於每
一料中加入參菖蒲茯苓各一兩五錢和劑服之厚朴丸
方見菴

垣升陽湯治陽躄癱足太陽下行宜升陽氣
麻黃八錢不羌活一兩防風根八錢炙甘草五錢
右咬咀每服三錢水五大盞煎至三盞去查稍熱服宿

食消盡腹中空服之後避風寒一二時辰乃效

潔書發治陽蹻申脉二穴在足外踝下陷中容爪申白肉際是也夜發治陰蹻照海二穴在足內踝下陷中是也先灸兩蹻各二七壯然後服前藥

干治百病風癩用麻仁四升水六升猛火煮令芽生去香煎取七合且空心服或發或不發或多狂語勿怪之但令久摩手足須臾即定凡進三劑無不愈

羅神應丹治諸風心癩病

狐肝具

烏鴉一隻

鴟梟一箇

白礬兩

野狸

一箇去肚腸不用皮毛用新瓦礮盛內以炭火煑爛

生犀角末兩

右為末用酒打麩糊為丸如菓子大硃砂為衣每服一丸酒送下不拘時候

楊氏蝎虎治癩法見小兒驚癩門妙

氣暴變癩眩足不任身取天柱

氣亂於頭則為厥逆頭重眩仆取之天柱大杼不知取太陽榮輸於此義同

癩疾始生先不樂頭重痛視舉目赤甚作極已而煩心候

之于顏取手太陽陽明太陰血變而止癩疾始作而引口啼呼喘悴者候之手陽明太陽左強者攻其右右強者

攻其左血變而止癩疾始作先反僵因而脊痛乃候之太陽陽明太陰手太陰血變而止

俱出癩

玉癩凡灸癩必先下之乃可灸不鳩尾必高者乃可下

通後谿

集鳩尾湧泉心膻

桑陽交三里後谿太衝間使

摘風癩熱病心風驚癩_六 上腕 三里

桑天吊_六 巨關_三 百會 顛門

東癩 平旦發者足少陽 晨朝發者足厥陰 日中發

者足太陽 黃昏發者足太陰 人定發者足陽明 半

夜發者足少陰 心癩面赤心下熱短氣喘息_六 巨缺_三 脾

此 肝癩面青及視手足搖動_六 丘墟_三 中封_三 脾

癩面黃腹大善利_六 胃腕并腕傍一寸各三壯 衝陽

隱白 肺癩面白口吐沫_六 肺膺 少商 少陽_{各三}

腎癩面黑正直視身不搖如尸厥_六 金戶 少海 至陰

湧泉_{各三壯} 膈癩四肢不舉_六 風府_{刺一分} 百會

人中 承漿_{各隨年壯} 腸癩都無動靜如尸厥狀

湧泉 勞宮 驚風_{各隨年壯} 風府_{七壯刺} 神闕

癩張搖頭馬鳴歡反折_六 風府_{七壯刺} 神闕

牛癩目直視腹脹_六 尾尖_{三壯} 大推_{三壯}

羊癩揚目吐舌_六 大推_{三壯} 刺

猪癩吐濁沫口動搖_六 浮白_{三壯} 刺

犬癩手屈拳_六 勞宮_{一壯} 刺 絲竹空 助戶_{各一}

雞癩搖頭反折善驚目搖_六 至陰 竅陰 厲兌_{各三壯} 刺

用癩疾多言耳鳴目憊頰腫實則聾齒墮不能言齒喉痛

鼻軌衄血則痺膈偏歷主之 癩疾吐舌鼓頰狂言見鬼

溫溜主之_{此後} 癩疾吐舌曲池主之 癩疾互引僵仆

申脈主之先取陰蹻後取京骨 癩疾在妄行振寒京骨

主之 癩疾身痛在善行束骨主之 癩疾僵仆轉筋僕

參主之 癩疾目眈眈衄衄崑崙主之 狂癩疾暴痛飛

揚主之 癩疾反折委中主之 癩疾憊風而振寒不得

言得寒益其熱狂走欲自殺目反妄見痰涎泣出死不可
 省入肺膈主之 癲狂膈膈及肝膈主之 癲疾僵仆目
 妄見恍惚不樂狂走癲痰絡都主之 癲疾互引反折
 眼及眩狂走不得臥心中煩攢竹主之 癲疾發寒熱大
 煩滿悲泣出解絡主之 癲疾互引口喎喘悸者犬迎主
 之取手陽明太陰變血而止 癲疾狂多食喜笑不發於
 外煩心渴商丘主之 癲疾嘔沫神庭及兌端承漿主之
 其不嘔沫本神及百會後頂玉枕天衝太杼曲骨尺澤陽
 谿外丘當上臑傍五分通谷合門承筋合陽主之 委中下
二寸為
 陽 癲疾互引水溝及斷交主之 癲疾上星主之先取
 噫嘻後取大牖風池 癲疾嘔沫暫起僵仆惡見風寒面
 赤腫心會主之 癲疾癡狂狂走頸項痛後頂主之
 癲疾狂走癡狂搖頭口喎戾頸強口間主之

癲疾骨瘦眩狂痰涎口噤羊鳴刺腦戶 狂易多言不休
 及狂走欲自殺目反妄見刺風府 癲疾怒欲殺人身柱
 主之 狂走癲疾吞急強目轉上插筋輸主之 癲疾發
 如狂走者面皮厚敦敦不治虛則頭重洞泄淋瀝大小便
 難腰尻重難起居長強主之 寒厥癲疾嚙向痰涎驚狂
 陽交主之 癲疾大瘦腦空主之 癲疾僵仆存益腕骨
 及風池主之 癲疾狂痰眩仆暗不能言羊鳴沫出聽
 官主之 癲狂煩滿刺絲竹空 癲疾吐舌沫出羊鳴戾
 頸天井主之 天井在肘後 癲疾氣短嘔血胸背痛行間主之
 癡厥癲疾洞泄然谷主之 癲狂互引天柱主之
 右針灸癲法內經但取手足太陽陽明太陰六經而已
 今甲乙經等書又多取督經手足太陽足少陰厥陰蓋
 隨症取之然學者當以內經為主也

診

骨顛疾者顛齒諸胎分肉皆滿而骨居汗出煩悒嘔多
 沃沫氣下泄不治顛若感切骨居汗出筋癱疾者身
 倦攣急大刺項大經之大極嘔多沃沫氣下泄不治 脈
 顛疾者暴仆肉段之脈皆脹而縱脈滿盡刺之出血不滿
 灸之揀項太陽灸帶脈于腰相去三寸諸分肉本輪嘔多
 沃沫氣下泄不治 顛疾者疾發如狂者死不治 治顛
 疾者常與之居察其所當取之處病至視之有過者瀉之
 置其血於頰頰之中至其發時血獨動矣不數灸窮骨二
 十此窮骨者顛骨也俱出顛疾篇
 來疾去徐上實下虛為厥顛疾全文見治虛實法
 顛疾脈搏大滑久自已脈小緊急死不治通論虛 顛
 疾脈虛則可治實則死同
 脈顛疾脈實堅者生脈細小者死此說與內經相友更詳之當以內經為準

風症

子癰

葛根湯治妊娠臨月因發風症忽悶瞶不識人吐逆眩
 倒名曰子癰

葛根

貝母去

牡丹皮

防風

當歸

川芎

白茯苓

桂心

澤瀉

甘草各二兩

獨活

石膏

人參略三

右咬咀以水九升煮取三升分溫二服貝母令人易產
 未臨月并麻代之

丹治一婦人懷妊六月發癰手足揚直面紫黑色合眼涎
 出昏瞶不省人事半時而醒醫與震靈丹五十餘貼其疾
 時作時止無減症直至臨產方自愈產一女葶中子母皆
 安次年其夫疑丹毒必作求治之診其脈浮取弦重取滑

按至昏則沉實帶數時正二月因未見其癩發正狀未敢與藥意其舊年癩發時乃五月欲在剪時度此疾必作當審議施治至五月半其疾果作皆是午巳兩時遂教以自製防風通聖散用生甘草加桃仁多紅花少或服或吐至四五劑疾漸疎而輕發為疥而愈

大治子癩用確砂末酒調下三錢婦人胎前產後

癩病者口禁角弓反張者是也

大去補

癩病者口禁角弓反張者是也
癩病者口禁角弓反張者是也
癩病者口禁角弓反張者是也

此症多由二血筋無所營故邪得以襲之所以傷寒汗下過多與夫病瘡人及產後致斯病者藥可見矣
沖一男子二十餘歲患痘瘡醫治後忽患口禁不開四肢

強直不能屈時或連腰腹痛一陣則冷汗如雨痛定則汗止時作時止其脈極弦緊而急如真弦狀向短此子極勤苦意其因勞倦傷血山君多風寒乘虛而感又因痘瘡其血愈虛當用辛溫養血辛涼散風遂以當歸身芍藥為君川芎青皮釣藤為臣白木陳皮甘草為佐桂枝木香黃連為使更加紅花少許煎十二貼而安

神木加羌活麻黃湯治剛癩解利無汗神木方見傷寒太陽
白木加桂心黃芪白木湯治柔癩解利有汗白木方見傷寒太陽
太陽陽明加川芎 荆芥穗 正陽陽明加羌活 酒大黃 少陽陽明加防風 柴胡根

熱而在表者加黃芩 寒而在表者加桂枝黃芪附子 熱而在裏者加大黃 寒而在裏者加乾薑良薑附子 已上數經寒熱當以脈別之

表產屬
太陽

防風當歸散

防風

當歸

川芎

地黃略一

右剉每服一兩水三盞煎至二盞溫服

仲活人治瘧法並見後表裏陰陽條二太陽病發熱無汗而反惡寒者名曰剛瘧。太陽病發熱汗出而不惡寒者名曰柔瘧。

仲葛根湯治太陽無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘧葛根湯主之。傷寒見

若發熱無汗反惡寒者名曰剛瘧宜麻黃加獨活防風湯

麻黃略一

桂枝略一

芍藥三

甘草附

獨活

防風略一

右剉細每服一兩水二鍾煎至一鍾半溫服

丹瓜蒌桂枝湯太陽病其症慳身軀強凡凡然脈反弦急

此為柔瘧海藏治有汗而為柔瘧

瓜蒌根二

桂枝三

甘草二

生薑三

大棗十二

芍藥二

右六味以水九升煮取三升分溫三服取微汗汗不出食頃啜粥發之

食頃啜粥發之

漏若發熱自汗而不惡寒者名曰柔瘧宜桂枝加川芎防風湯

桂枝

芍藥

生薑各一

甘草

防風

川芎各一

大棗六

右剉細每服一兩水三盞煎至二盞半去渣溫服

凡剛柔二瘧並可與小續命湯方見中風門恒去香入生薑汁小續命

湯加減法 若柔瘧自汗者去麻黃夏間及病有熱者減

桂枝一半冬及初春去黃芩

續命湯治卒中半身不遂手足拘急不得屈伸身體冷
或昏或癡或身強直不語或生或死狂言不可名狀角弓
反張或欲得食或不用食大小便不利皆療之

人參 桂心 當歸 獨活
黃芩 乾薑炮 甘草各七錢半 石膏一兩

杏仁四十枚

右九味咬咀以水九升煮取三升分溫三服日三服取
汗無汗者加麻黃

裏証屬陽明

仲剛痿為病曾滿口噤臥不着席脚攣急必齧齒可與夫
承氣方見傷寒

子和呂君玉之妻年三十餘病風搐目眩角弓反張數日
不食諸醫皆作驚風暗風癩治之以天南星雄黃天麻
烏附用之殊無少效戴人曰諸風掉眩皆屬肝木曲直搖

動風之用也陽主動陰主靜出火盛則金虛不能平木
肝木茂而自病因風涎二三升次以寒劑下十餘行又
以排針刺百會穴出血一盃立愈
半表半裏屬少陽
海若汗後不解汗靜汗燥目直視口噤往來寒熱脈弦者
少陽風症宜柴胡加防風湯

柴胡一兩 人參五錢 半夏六錢 黃芩五錢
生薑 甘草各六錢 防風一兩 棗三箇

右剉每服一兩水三盞煮至二盞半去渣溫服

若發汗過多發熱頭面搖卒口噤背反張者太陽蕪陽明
也宜去風養血防風當歸散主之方見本門大法條

瘧分陰陽

陽瘧並見表裏條仲景雖曰瘧皆身熱足寒然瘧陽不厥
逆

陰瘧无汗

百一治中風身直不得屈伸反覆者取槐皮黃白者切之

以酒或水六升煮取三升去渣服

千倉公當歸湯治冷厥風口噤角弓反張瘧疾方

當歸 防風各七錢半 獨活一兩 附子一枚

細辛兩半 麻黃錢半

右改咀以酒五升水三升煮取三升服一升日不開者

格日納湯一服當蘇二服少汗三服大汗

八物白朮散治陰瘧一二日面腫手足厥冷筋脉拘急汗不出恐陰氣內傷

白朮 茯苓 五味子各半 桂心三

蘇黃兩半 良薑分 羌活兩半 附子分三

右為末每服四錢水一大盞生薑五片同煎至五分去

香溫服無時

海若發熱脉沉而細者附太陰切必腹痛宜桂枝加芍藥

防風防已湯 又宜小續命湯

桂枝一兩 防風 防已各一兩 芍藥二兩

生薑一兩 大棗六枚

右剉每服一兩水三盞煎至一盞去渣溫服

陰瘧有汗 活附子散陰瘧手足厥逆筋脉拘急汗出不止頭項強直

頭搖口噤良驗

桂心錢二 附子一兩 白朮一兩 川芎錢三

獨活兩半

右為末每服三錢水一鍾棗一枚煎至五分溫服

桂心白朮湯治陰瘧手足厥冷筋脉拘急汗出不止

白朮 防風 甘草 桂心

川芎 附子

右為末每服五錢水二鍾生薑五片棗二枚同煎至七

分去查温服

附子防風散治陰痿閉身合面手足厥逆筋脉拘急汗出不正

白芷一兩 防風 甘草各三 桂心半

附子分 乾薑三 柴胡半兩 茯苓分

五味子兩

藏府 右為末每服三錢水二盞生薑四片同煎去查温服

海發汗太多因致瘧身熱足寒頭強惡寒頭熱面腫目赤頭搖口噤背反張者太陽瘧也 若頭低視下手足牽引肘膝相搆陽明瘧也 若目或左右邪視并一手一足搐搦者少陽瘧也汗之止之知之各隨其經可使必已

右太陽瘧屬裏無汗宜汗之有汗宜止之陽明瘧屬裏

宜下之少陽瘧屬半表半裏宜和之所謂各隨其經也丹廬婦人因怒手足強直十指如束左脉弦虛右脉弦大而強稍堅此風木攻脾土宜速瀉肝氣助肺金補脾土之陰

黃連二錢 天南星 白朮 人參

黃芩 天麻 川芎 木通

陳皮 青皮各半 甘草分

作三貼煎取二盞入薑汁各辣再沸熱服

肺移熱於腎傳為柔瘧全文見診

運氣

運氣瘧有三 一曰風經云厥陰在臍客勝則大關節不利內為瘧強拘急外為不便又云諸暴強直皆屬於風是也 二曰濕經云諸瘧項強皆屬於濕王註謂陽內鬱而陽行於外是也 三曰寒包熱經云火太過曰赫義赫義

雜方

之紀上羽與正徵同其病瘥蓋司天之寒東火於中亦陰陽內鬱陰行於外之意也

世治角弓反張胞衣瓶內水鷲毛挑入患人口唇即愈

肘治中風身體強直不得屈伸反覆括柘樹皮細切一升以酒二升浸一宿每日溫酒服半升酒盡再作柘實即拘

干治口噤手足不隨而身體強直伏龍肝五升以水七升

和攪取汁飲之

診

仲病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤且赤獨頭

動搖卒口噤背反張者瘥病也活人書云外症發熱惡寒與傷寒相似但其脈沉遲

反張而項背反張者瘥病也夫瘥病下之

則瘥復發汗必拘急夫瘥脈按之緊如弦直上下行

脈達家其脈伏堅直上下行

無凡瘥脈皆伏沉弦緊

仲太陽病發熱脈沉而細者名曰瘥為難治瘥病有灸

瘥難治即破傷風之類瘥病若發其汗者寒濕相搏其表益虛

即惡寒瘥病發其汗已其脈冷冷如蛇暴腹脹大者為

欲解脈如故反伏弦者瘥

針灸

靈風瘥身反折先取足太陽及膈中及血絡出血中有寒

取三里熱病

索太陽所謂強上引背者陽氣太止而爭故強上也脈解

督脈為病脊強反折骨空論

足少陰之筋循脊內挾脊上至項其病主癱瘓及瘥在外

者不能伸在內者不能仰故陽病者腰反折不能伸陰病

者不能仰治在燔針

甲風瘥身反折先取太陽及膈中及血絡出血瘥中有

寒取三黑，瘧取之陰，陰及三毛上及血絡出血，瘧取
顙會及百會，又膈輸上關光明主之，瘧目不眴刺腦戶
瘧春強反折瘳癩疾頭重五樞主之，瘧互引善驚
天衝主之，瘧反折心痛形氣短尻腫瀉小便黃閉長強
主之，瘧筋痛急互引肝輸主之，熱瘧脾輸及腎輸主
之，大瘧口噤互相引口乾小便赤黃或時不禁承漿主之
瘧驚互引脚如結肺如裂束骨主之，瘧反折互引腹
脹掖攣背中怏怏引脇痛內引心中脊內肺輸主之，又
刺陽明從項而數背椎俠脊脊而痛按之應手者刺之，尺
澤三痛立已

勞風之屬

虛邪 丹云瘧比癩為虛蓋因勞汗遇風內挾太陽寒濕之邪治
亦與瘧同法但高視其所勞則知虛在何截如房勞則腎

表

虛汗出腠理開風入皮膚得寒則閉風不能出與水俱行
其人當目下腫如臥蚕之狀戴人云腎主水其經至于目
下故也不禁房室則死明其虛在腎也所以關於太陽何
也太陽主寒其經最在外腠理得寒則閉故太陽先受邪
也治宜八物白朮散倉公當歸湯見前
河間芎枳丸方未 皂角化痰丸方見咳

胎前瘧

此病多由風寒濕乘虛而感皆從太陽經治之
活獨活防風湯 治瘧太陽有汗

桂枝兩

芍藥兩

甘草兩

獨活

防風兩

右劉細每服一兩水二鍾煎至二鍾溫服
防風獨活湯 治瘧太陽無汗

葛根兩 麻黃兩 芍藥 防風兩

桂枝兩

右剉細每用一兩先煮麻黃去上沫入後藥同煎數沸
溫服

產後症

千竹瀝湯 治產中風口噤面青手足急強用竹瀝一升
分為五服微溫頻服大效

虛痰

產問曰產後汗出多而變症者何答曰產後血虛腠理不
密因遇風邪搏之故變症也宜速斡口灌小續命湯稍緩

解表

即汗出如雨手拭不及不可救也小續命方見前產條
舉鄉古拜散 治新產血虛產者荆芥穗不以多少瓦上
微炒為末大昔黃卷熱酒沃之去黃卷取汁調四五錢和

香飲之其效如神

大昔紫湯 治產後中風形如角弓反張口噤涎潮黑
荳半升炒令焦黑烟起以無灰酒二升沃之又磁器中每
用一盞入獨活五錢同煎至六七分去滓溫服

按續命已下三方太陽厥陰藥也邪實脈浮弦有力者
固宜但產後血氣大虛之人不宜輕發其表但用防風
當歸散治之為妙

血虛

海防風當歸散方見前產條

破傷風 痲痺 顫振 產後痲痺

破傷風者因瘡熱甚鬱結而榮衛不得宣通佛熱因之遍
體故多白痲是時瘡口閉塞氣難宣通故熱甚而生風也
大法 先辨瘡口平無汁者中風也邊自出黃水者中水也並欲
作瘡急治之又痛不在瘡處者傷經絡亦死症也初覺瘡

腫起白痴身寒熱急用玉真散貼之傷在頭面急嚼杏仁和雄黃白麩傅瘡上腫漸消為度若腰脊及張四肢強直牙關口噤通身冷不知人急用蜈蚣研細末擦牙吐出涎沫立甦亦宜按摩導引

河破傷風風熱躁甚佛鬱在表而裏氣尚平者善伸數欠筋脉拘急或時惡寒或筋惕而搐脉浮數而弦也宜以辛熱治風之藥開衝結滯而愈猶傷寒表熱佛鬱而以麻黃湯辛熱發散也凡用辛熱開衝風熱結滯宜以寒藥佐之則良免致藥中病而風熱轉甚也如治傷寒發熱用麻黃桂枝加黃芩石膏知母之類是也若止以甘草滑石葱豉寒藥發散甚妙若表不巳漸傳入裏裏又未太甚而脉弦小者宜以退風熱開結滯之寒藥調之或微加治風辛熱亦得猶傷寒在半表半裡而以小柴胡和解之也若裏熱

已甚而舌強口噤項背反張驚惕搐搦涎吐稠粘胸腹痞塞便秘結或時汗出脉沉洪數而弦也然汗出者由風熱鬱甚于裏而表熱稍罷則腠理踈泄而心火熱甚故汗出也法宜除風散結寒藥下之然後以退風熱開結滯之寒藥調之則熱退結散而風自愈矣

背後搐者羌活獨活防風甘草向前搐者升麻白芷獨活防風甘草兩傍搐者柴胡防風甘草右搐加滑石

解表 河玉真散

南星 防風各等

右為末生姜汁酒調服傷處以此貼之

羌活防風湯 治破傷風初邪傳在表

- 羌活
- 防風
- 川芎
- 藁本
- 當歸
- 芍藥
- 甘草
- 地榆

細辛各一

右咬咀每服五錢水二盞煎六分熱服熱則加黃芩一兩大便秘加大黃一兩

防風湯見前

蜈蚣散

蜈蚣一對

魚鱧五錢

左蟠龍半兩炒

右為細末用防風湯調服

實表

白木防風湯若服前藥已過蔽府和有自汗者宜服此藥

白木

防風

黃芪各一

右咬咀每服七錢水二盞煎至一盞去滓溫服

攻裏

大芎黃湯臟腑秘小便赤自汗不止者宜速下之

川芎兩

黃芩二錢

甘草兩

大黃兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服以利

為度

江鰮丸 治破傷風驚而發搐蔽府秘澁知病在裏

江鰮半兩

野鴿糞半兩炒

雄黃錢

蜈蚣對

天麻兩

白殭蚕兩

右為細末分作三分先用二分燒飯為丸如桐子大硃

砂為衣又用一分入巴苣霜一錢同和亦以燒飯為丸

不用硃砂為衣每服硃砂為衣丸藥二十九丸入巴苣霜

丸藥一丸次服二丸漸加至利為度再服硃砂為衣丸

藥病愈止

和餅羌活湯 利後宜服搐瘥不已亦宜服

羌活

獨活

地榆各一

每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服如有熱加黃

芩有痰加半夏

地榆防風散 治半表半裏頭微汗身無汗

地榆 防風 地丁香 馬齒莧各一

右為細末每服三錢溫米飲調下

虛 養血當歸地黃散日久氣血漸虛邪氣入胃宜養血四物湯加防風藁本白芷細辛各等分為細末每用五錢水一盞半煎至一盞溫服

瘕瘕

病筋脉相引而急名曰瘕瘕俗謂之搐是也

風火

河諸熱瘖瘕皆属于火熱勝風搏併于經絡風主動而不寧風火相乘是以熱瘖瘕生矣治法祛風滌熱之劑折其火熱瘖瘕可立愈若妄加灼艾或飲以發表之劑則死不旋腫矣

診治

素問云心脉急甚者為瘕瘕此心火虛寒也治宜補心午

黃散主之靈樞云心脉滿大癰瘕筋攣此心火實熱也治宜瀉心火涼驚丸主之肝脉小急亦癰瘕筋攣此肝虛也續斷丸主之若肝脉盛者先救脾宜加減建中湯素問云脾脉急甚者亦為瘕瘕此脾虛肝乘之而瘕也故宜實土瀉肝木之劑

虛實 汗多不止為虛無汗能食為實

脾胃 固人參益氣湯 治熱傷元氣四肢困倦手指麻木時時

瘕瘕

黃芪錢 甘草炙 升麻各五 五味子三十

柴胡分六 生甘草伍 人參二錢 炙甘草分五

白芍藥分七

右改咀作三服水二盞煎至一盞去香熱服

獨活湯 治風虛昏瞶不自覺知手足瘕瘕或為寒熱血

虛不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之

獨活

羌活

人參

防風

當歸

細辛

茯神

遠志

半夏

桂心

白薇

菖蒲

川芎各五錢

甘草二錢半

全服一兩水二盞生姜五片煎八分食後溫服

胃風湯 治虛風症能食麻木牙關緊急手足痠痲目肉

蠕爛胃中有風面腫

白芷二錢

升麻二錢

葛根一錢

蒼朮一錢

甘草五分

柴胡

藁本

羌活

黃柏

草薺各五分

麻黃半錢不

蔓荊子一錢

當歸身一錢

右吹咀水二鍾姜三片棗二枚煎至一鍾溫服

千薯賴丸

治虛勞不足風氣百疾頭目眩冒驚悸

薯蕷八分

當歸十分

桂心七分

神麴炒

熟地各十分

甘草二十分

人參十分

芎藭五分

芍藥

白朮

麥門冬

杏仁各六分

柴胡

桔梗

茯苓各五分

鹿角膠七分

乾姜三分

白朮三分

防風六分

大棗一百枚為膏

黃芩六分

大黃黃卷七分

右二十二味末之和棗膏煉蜜丸如彈子大空腹酒服

一丸日三服

肝

續斷丸

治肝勞虛寒脇痛脹滿眼昏不食羸縮瘕瘕

續斷酒浸

川芎

當歸酒浸

半夏湯泡

橘紅

乾姜炮各一兩

桂心

甘草各半兩

右為細末蜜丸如桐子大每服百丸白滾湯下

心

牛黃散 治心虛風筋脉攣搐神昏語澁

牛黃

龍腦

硃砂

麝香各一錢

蟬蛻

烏蛇肉

酒浸一兩全蝎炒

殭蚕炒

桑螵蛸

羚羊角

阿膠炒

天麻

防風

甘菊花

蔓荊子

桂心

細辛

側子炮去皮

獨活去芦各半兩

犀角解

麻黃七錢半

右為細末和勻再研每服一錢薑淋酒下

續命煮散 治風氣留滯心中昏憤四肢無力口眼攣動

或時搐搦或渴或自汗

防風

獨活

當歸

人參

細辛

葛根

芍藥

川芎

甘草

熟地

遠志

荆芥

半夏各五

官桂七

每服一兩水二盞生姜二片煎至八分去渣通口服汗

多者加牡蠣粉一錢半

風熱獨活散 消風化痰

細辛

石膏研

甘草各半兩

防風

藁本

旋覆花

川芎

蔓荊子

獨活各一

右為細末每服三錢姜二片水一大盞煎七分食後服

運氣運氣瘕瘕有二

其一曰火經曰火鬱之發民病嘔逆瘕瘕又曰少陽所至

為暴注暍瘕又曰少陽司天客勝則為瘕瘕是也

其二曰水經曰陽明司天燥氣下臨木氣上從民病脇痛

目赤掉振鼓慄又曰歲土太過雨濕流行民病足痿不收

針灸

行善瘕又曰太陰之復頭頂痛重而掉瘕尤甚是也

甲卒心中痛瘕瘕互相引肘內廉痛心熱上然間使主之

熱病先手臂身熱瘕瘕唇白聚鼻張目下汗出如轉珠

兩乳下二寸堅脇滿悸列缺主之 振寒瘕瘕手不伸欬

嗽嘔濁氣膈善嘔尺澤主之 大風嘿也不知所痛嗜臥

善驚瘕瘕天井主之 頭重鼻衄及瘕瘕至陰主之 身

熱狂走譫語見鬼瘕瘕身柱主之 干腹滿瘕瘕心痛氣滿不得息巨闕主之 嘔血時瘕善

顛振

搖頭顏青汗出不過肩傷寒溫病曲澤主之

顛搖也振動也風火相乘動搖之象比之瘕瘕其勢為緩

內經云諸風掉眩皆屬於肝掉即顛振之謂也又曰諸禁

鼓慄如喪神守皆屬於熱鼓慄亦動搖之意也此病多真

風熱相合亦有風寒所中者亦有風挾濕痰者治各不同

也常見此症多於傷寒熱病痢疾中兼見者多是熱甚而

曳牽動重遲者微有不同

星附散 治中風雖能言口不啗斜手足躄曳者

天南星 半夏肥上俱人參 黑附子去皮

白附子 茯苓 川烏去皮 僵蚕

沒藥各等 右咬咀每服五錢水酒各一盞煎六分熱服并進得汗

獨活散見前瘕 為度

五金牙酒 療積年八風五疰舉身躄曳行步跛躄不能

收持

金牙 碎如米粒用 地膚子 無子用莖葉一

小絹袋盛 方用蛇床子

熟地 葫蘆根 附子 防風
 細辛 莽草各四 川椒四 羌活斤
 一方用獨活
 右十味咬咀盛以絹袋用酒四斗於磁器中漬封固勿
 令泄氣春夏三四宿秋冬六七宿酒成去滓日服三合
 常令酒氣相接不盡一劑病無不愈

表

門風

產後因虛傷風痰同傷表症未傳入裏宜服防風湯前
 愈風湯 治產後中風口噤痰亦治血暈四肢強直用
 荆芥略炒為末每服三錢豆淋酒下
 增損柴胡湯 治產後感異症手足牽搐涎潮昏悶
 柴胡 黃芩二分 人參一分 甘草一分

大法

經曰脉風成爲癘俗呼癘風是也

云大風病是受得天地間殺物之風古人謂之癘風以
 其酷烈暴悍可畏爾人得之者須分在上在下夫在上者
 以醉仙散取臭惡血於齒縫中出在下者以通天再造散
 取惡物蚘虫於穀道中出所出雖有上下道路之異然皆

癘風

石膏二錢 知母一錢 黃芪半二錢 半夏一錢
 右咬咀分三服水二盞姜三片棗二枚煎八分不拘時
 服
 秦芫湯前症已去次服此藥去其風邪
 秦芫 芍藥 柴胡各一錢 甘草二分
 黃芩 防風各一分 人參 半夏各一分

不外於陽明一經而已。看其疼痛上先見在土體多者病在上也。下先見在下體多者病在下也。上下同得者病在上復在下也。陽明主胃與大腸無物不受此風之入人也。氣受之在上多血受之在下多血氣俱受者上下皆多自非醫者有神病者有鐵心罕有免者。余曾治四五人中間惟一婦人得免以其貧甚無物可吃也。孫真人曰吾嘗治四五百人終無一人免者非真人之不能治也。第無一人能守禁忌耳。

取劑 大法重者取積取汗

醉仙散 治大風疾遍身癢疹癢痒麻木

胡麻子 牛旁子 枸杞子 蔓荊子各一

白蒺藜 苦參 瓜蒌根 防風各半

右為細末每十五錢棗一輕粉一錢拌勻每服一錢半

調下晨午夕各一服後五七日先於牙縫內吐黃涎
渾身疼痛昏悶如醉次後利下膿血惡臭氣病根乃去矣

四聖保命丹

附片 大黃兩 黃柏兩 苦參 荊芥各四

右為末煉蜜和勻分作二百二十九丸每服一丸溫酒送下

食遠日三服忌肉醬一方用蝦蟆一箇燒灰

祛風散

大蚕沙五升先篩淨水 東行蝎虎麵一條培乾用白

為絡素 晒乾

右每服一二合熬稻葉湯調服食前日三服

通天再造散 治大風惡疾

鬱金錢 大黃一兩 白牽牛六錢半 生半炒

皂角刺黑大者一兩

右為末每服五錢日未出時面東以無灰酒調下

汗劑 愈風丹 治癩

皂角一斤

去皮弦到作四指許以無灰酒浸一宿瀝出同新汲水一大碗揉作濃汁濾去渣以

砂鍋慢火熬膏

苦參四兩

土蟻蛇頭尾全用未

右二味末以皂角膏丸如桐子大每服七十九空心用

防風通聖散煎成送下日二服服三二日後入浴出汗

病重者不過二料病微者止用烏稍蛇不用土蟻

換肌散 治大風年深不愈至眉毛墮落鼻梁塌壞額顛

腫破服此速效

白花蛇三兩

烏蛇三兩酒一宿地龍去土

當歸酒

細辛各一兩

白芷各一兩 天麻

蔓荊子

葳靈仙

荊芥穗 五甘菊花

苦參

紫參

沙參

木賊

不灰木

川芎

沙苑蒺藜

甘草炙

天門冬

赤芍藥

苜蓿九節

何首烏

胡麻炒

草烏頭各三

蒼朮三升米

木鱉子去殼 定風草三

右同為細末每服五錢七食後酒調服酒多為妙

緩劑 輕者疎風和血以二聖散治之二聖散方

大黃三錢

皂角刺燒灰

右將皂角刺一二箇燒灰研細用大黃半兩煎湯調下

二錢早服樺皮散中以升麻湯下瀉青丸晚服二聖散

此為緩治

栢葉湯用東南枝上栢葉一秤水一桶水三沸去渣盛起旋熬黍沙調服初服苦澁三五日後甜十日四肢沉重便赤白痢一月後發出瘡疙塔破用烏龍散搽之

烏龍尾即倒懸 烏鷄子皮煨

二味為末用桐油調搽於破瘡上

種皮散治肺癰風毒遍身癰疹瘙癢

荆芥穗二 枳殼 樺皮各四 甘草炙半

二杏仁去皮 取皮用水一碗煎

右為末每服二錢食後溫酒調下

凌霄散治癰風神效

蟬殼 地龍炒 甘草 全蝎各七箇炒

凌霄花半

右為末每服二錢熱酒調下無時於浴室中常蹲湯中

一時許服藥神效

祛風丸治疥癩經曰脈風成爲癩也

黃芪 枳殼 防風 芍藥

甘草 熟地 地骨皮 枸杞子

生地

右九味木杵杵為細末煉蜜丸如桐子大白湯下五寸

丸一

洗藥如聖散

蔓荊子 苦參 玄參 厚朴

荆芥 紫參 陳皮 沙參

麻黃去節 防風 白芷 歲靈仙酪二

右為細末每服五錢桃柳枝各一杷水五升煎臨臥熱

洗忌五辛

東垣

恒段庫使病癰風滿面連鬚極痒眉毛已脫落須用熱水沃之稍緩每晝夜須數次或破刺亦緩先師曰風論中云夫癰者榮衛熱附其氣不清故使其鼻柱壞而色敗皮膚

癆潰風寒安平脉而不去各曰癆風治之者當刺其腫上以銳針刺其處按出其惡氣腫盡乃止常食如常食勿食他食如用藥當破血去熱升陽去癥瀉榮以辛冷散之甘温升之行陽明經瀉心火補肺氣乃治之正也

補氣瀉榮湯

升麻

連翹各六分

蘇木

當歸

全蝎

黃連

地龍

黃芪各三分

黃芩生四分

甘草半錢

人參二分

生地四分

桃仁三分

桔梗五分

麝香許少

胡桐淚一分

水蛭炒令烟二箇去翅足微

右剉如麻豆大除連翹另剉胡桐淚研白苳蔻二分為細末二味另放麝香虫出水蛭三味為末另放外都作一服水二大盞酒下匙入連翹煎至一盞六分再入白

針灸

苳蔻二味并麝香等三味再上灰煎一二沸稍熱服之早飯後午飲前服忌酒濕麪生冷硬物經大風刺其肌肉故汗出百日刺骨髓汗出百日凡二百日髮眉生而止針承漿一穴在頤前唇下宛上中足陽明任脉之會療偏風口喎面腫口齒痺蝕虫瘡灸亦佳日灸七壯至七七壯灸則血脉通宜其風應時立愈

也... 溫升之行... 補氣...

眼血利... 其風...

日脚... 亦...

奉樂... 穴...

日... 生...

野... 其...

早... 於...

豈... 和...



