

肝膽部

驚悸怔忡 產驚悸 心動 怒 善太息 目疾
 赤腫 外障 內障 不能近視 不能遠視 雀目
 目淚 風沿爛眼 倒睫拳毛 努肉攀睛 絲垢入目
 視岐亂見 睛目直視 目上視

八卷

醫學綱目

三



醫學綱目卷之十三

肝膽部

驚悸怔忡

產驚悸

心憺憺動

大脈虛有痰

驚者心卒動而不寧也悸者心跳動而怕驚也怔忡亦心動而不寧也

丹怔忡大脈屬血虛與痰 有慮便動者屬虛 時作時止者痰因火動 瘦人多是血虛 肥人多是類飲

真覺心跳者是血少宜四物安神之類


治勞役心跳大虛症

母 硃砂一錢 歸身 白芍 側柏 川芎各五

林 陳皮 甘草 黃連各三

右用猪心血為丸

壅六脈俱大按之空虛必面赤善驚上熱乃手少陰心之脈也此氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑瀉火與氣以墜



氣浮以甘辛溫微苦峻補其血熟地黃生地黃柴胡升麻
白芍藥牡丹皮川芎黃芪之類以補之以防血溢上竭
鎮壓之劑謂
丹砂之類

杜林學士本南人歷內地為官有一子甚端嚴而聰敏父
母愛之居常喜食海蛤飲食之項未嘗不設至十八年忽
面色頓青形體瘦削夜多驚悸皆謂勞瘵之疾百療不瘳
遂召杜脈之杜曰非病何以知之蓋雖病削面青精神不
減問學院子秀才好食甚物曰多食南海中味杜曰但多
服生津液藥病當自愈如是經兩月面色漸有紅潤意夜
亦無驚悸林學士延杜而問曰醫師之驗又聞世名願聞
此病所以杜曰王冰素問曰鹽發渴乃勝血之証海味皆
鹹物既多食海味使心血漸衰則夜驚悸今既去鹹用生
津液之藥又且少吐血液易坐面色漸有紅潤此疾去乃

安矣眾醫以為勞瘵非其治也

仲食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣飲水多必
心下悸

無五飲停畜閉於中脘最使入驚悸屬飲家

時作時
止者痰
因火動

溫膽湯治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致心驚膽
懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸症或短氣悸之或復自汗
膽虛不能致脾則
脾之水飲作矣

半夏湯洗 竹茹 枳實炒各
二兩 橘皮二兩
去白

甘草炙一
兩 茯苓五錢

右為散每服四大錢水一盞半薑五片棗一枚煎七
分去渣食前服

仲心下悸者半夏麻黃丸主之

半夏 麻黃等分

右二味為末煉蜜和丸如小豆大飲服三九日三服

茯苓甘草湯方見傷寒傳

驚屬肝心脾

素東方青色入通於肝其病發驚駭金匱真言論

脾移熱於肝則為驚血病傳變

一陽一陰發病主驚駭背痛善噫善欠者名曰風厥全文

三陽一陰太陽脈勝一陰不得止內亂五臟外為驚駭陽

論

臥而驚者肝

本珍珠丸獨活丸並治臥驚悸多魘經云臥則血歸於肝

今血不靜臥不歸肝故驚悸於臥也

東羌活勝濕湯治臥而多驚悸多魘瘦者邪在少陽厥陰

也加柴胡五分如淋加澤瀉五分此下焦風寒二經合病

也經曰腎肝之病同上治為俱在下焦非風藥行經不可

也羌活勝濕湯方見腰痛

諸病疼酸驚駭皆屬於火全文

因驚成悸者病在心膽

丹病自驚而得者則神出其舍舍空得夜則成痰也血氣

入舍則痰拒其神不得歸焉控涎丹加辰砂遠志

無驚悸因事有所大驚而成者名曰心驚膽寒病在心膽

經其脈大動搖無頭尾者也東垣珠砂安神丸方見頭

垣云外物驚宜鎮平以黃連安神丸是也

無鎮心丹治驚悸

辰砂用黃松酒浸 龍齒用磁石

右只取辰砂龍齒各等分為末猪心血為丸如芡實大

每服一丸以麥門冬葉葦葦燈心白蜜水煎葦熟為度

臨臥咽下小兒磨化半丸量歲數與之

世蜜陀僧散治驚氣入心絡不能語者昔有為狼及太蛇

所驚皆以此而安用蜜陀僧研極細末茶調一錢七下服

即愈

無寒水石散治因驚心氣不行鬱而生涎結為飲遂為大疾
疾怵悸墮懷不自勝持少遇驚則發尤宜服之

寒水石煨 滑石水飛各一錢 生甘草一錢
右為末每服二錢熱則新汲水下怯寒則薑棗湯下加
龍膽少許尤佳

于和衛德新之妻旅宿樓上夜值盜劫人燒舍驚墜床下
自後每聞有響則驚倒不知人家入輩躡足而行莫敢冒
觸有聲諸醫作心病治之入參珍珠及定志丸皆無効戴
人見而斷之曰驚者為陽從外入也恐者為陰從內出也
驚者為自不知也恐者為自知也足少陽膽經屬肝木膽
者敢也驚怕則膽傷矣乃命待女執其兩手按於高椅上
坐當面前下置一小几戴人曰娘子當視此一木猛擊之
其婦人大驚戴曰我以木擊几何必驚乎伺少停擊之驚

少緩又斯須連擊三五次又以杖擊兩腋又暗遣人擊背後
之背徐徐驚定而歎曰是何治法戴人曰內經云驚者平
之平者常也常見必無驚是夜使入擊其門窗自昏暮達
曙熟臥不聞夫驚者神上越也從下擊几使之下視所以
收神也一上白雖聞雷亦不驚德新素不喜戴人至是終
身敬服

仲灸甘草湯治脈結代而悸方見

丹驚悸定志丸加琥珀鬱金

無定志丸治心氣不足驚悸恐怯

菖蒲炒 遠志心去 茯苓各二 人參兩一
辰砂為衣 扶神
右為末蜜丸如桐子大每服五十丸米湯下一方去扶神名開心散服二錢七不時

本安神鎮心治驚悸消風痰辰砂遠志丸

石菖蒲

遠志

人參

茯神

川芎

山藥

鐵粉

麥門冬

天麻

半夏

南星

白茯苓

細辛

辰砂各半兩

右為細末生薑五兩取汁入水煮糊丸如菴荳大另以硃砂為衣每服二十五丸夜臥服生薑湯下小兒減服

茯苓丸

石菖蒲

辰砂

人參

遠志

茯苓

真鐵粉

茯神

南星牛膽

半夏麩分等

右為細末生薑四兩取汁和水煮糊丸如桐子大別用朱末為衣乾之每服十粒加至二十粒夜臥生薑湯下

上方療驚良驗

聞木音則驚屬胃

胃是陽明脈是動則病聞木音則惕然而驚欲動素陽明所謂甚則惡火與火聞木音則惕然而驚者陽氣與陰氣相搏水火相惡故惕然而驚也○黃帝問曰足陽明之脈病惡火與火聞木音則惕然而驚鐘鼓不為動聞木音而動何也岐伯曰陽明者胃脈也胃者土也故聞木音而驚者土惡木也解篇

痰飲驚悸屬脾

運氣驚悸有三

一曰肝木不及金來乘之經曰木不及曰委和委和之紀其發驚駭又云陽明之復則入肝驚駭筋攣是也二曰火邪助心經云少陽所至為驚惑又云少陽所至為驚躁又云少陽之勝善驚是也

三曰寒邪傷心經云歲水太過寒氣流行病煩心躁悸是也

按經云陽氣者開闔不得寒氣從之乃生大僕陷脈為獲留連肉腠俞氣化薄傳為善畏及為驚駭者是瘰瘡所為之驚駭也蓋俞則瘰瘡之俞竅其痛氣留連肉腠之間恐人觸着而痛故化惕惕然之心內薄而傳為善畏驚駭之疾也

針灸

撮心燦燦跳動少衝瀉之灸立效

甲驚善悲不樂如墮汗不出面塵黑病飢不欲食照海主之○膽寒怯寒厥手臂痛善驚妄言面赤泣出液門主之○善驚悲不樂厥脛足下熱面盡熱眩乾渴行間主之○素肝脈驚暴有所驚駭大奇論王註云驚謂驚言迅急也○二陽急為驚上○白脈之至也喘而浮上虛下實驚有積氣在胸中名

因驚生病有四

曰肺痺寒熱全文見續陽明清則病積而善驚

仲寸口脈動而弱動即為驚弱即為悸

脈驚主病者其脈止而復來其人目睛不轉不能呼氣

仲病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪此四病皆從驚發得之

產驚悸

大七寶散產後服之安神壓驚悸

辰砂研

桂心

當歸

川芎

人參

白茯苓

羚羊角燒存性各二錢

乾薑一錢炮

右為末每服一錢用羌活豆淋酒調下如不飲酒漬米水飲調下如心煩熱悶以麥門冬去心煎湯調下減薑桂如心下煩悶而痛用薑便酒調下如腹痛加

當歸如心悶加羚羊角如心虛氣怯加桂心不
 下食或惡心加入參虛顛加茯苓
 海大効牡丹皮散治血藏虛風及頭自不利不思飲食手
 足煩熱肢節拘急疼痛胸膈不利太腸不調陰陽相干心
 驚怯悸或時旋運各

牡丹皮 川芎 枳殼麩炒各陳皮

玄胡索 甘草 羌活 半夏湯洗各

木香分 訶子肉分 芍藥分 三稜炒半

乾薑五錢 當歸一兩 白朮炒三 桂心五錢

右為細末每服二錢水一盞半煎五七沸食前溫服益
 血海退血風勞攻注消寒痰實脾胃理血氣攻刺及氣
 虛惡寒潮熱証至妙

大治產後中風心忪悸志氣不定恍惚語言錯亂

- 人參分 羚羊角屑 麥門冬 茯神各
 - 茯苓 白鮮皮 甘草略 石膏分
 - 淡竹瀝兩大
- 右咬咀用水二升煎至七合下竹瀝分三服

心澹澹動

澹澹因痰動也心澹澹動者謂不怕驚而心自動也驚恐
 亦曰心中澹澹恐謂怕驚而心亦動也

其澹澹自動之病屬一經一屬心主手厥陰病經云心主
 手厥陰之脈是動則病心中澹澹大動面赤自黃喜笑不
 休視盛虛寒熱陷下取之是刺灸之法也又曰太陽司夫
 寒淫所勝病心澹澹大動胸脇胃腕不安治以甘熱是運
 氣之寒傷心主也○其二屬少陽病經云一陽發病少氣
 善欬善噫其傳為心掣是也掣尺制反曳也

少陽病
心掣

厥陰病
心澹澹
大動

怒

怒在陰陽為陰閉遏其陽而陽不得伸也經云陰出之陽則怒又云血并於上氣并於下心煩寤善怒東垣云多怒者風熱陷下於地是也○怒在臟腑所屬經在臟為肝在志為怒又云肝藏血血有餘則怒又云膽為怒是也

丹治怒方

香附末兩 甘草末兩

右和勻白湯調服五錢

怒皆屬木太過

運氣怒皆屬木太過經云木太過曰發生發生之紀其病怒又云歲木太過風氣流行其則善怒又云歲土不及風反大行民病善怒是也○怒在禁忌多生厥逆經云陽氣者大怒則形氣絕而血苑於上使人薄厥又云暴怒傷陽又云怒則氣逆甚則嘔血及食泄是也

善太息

太息者屬燥邪傷膽

運氣善太息皆屬燥邪傷膽經云陽明在泉燥淫所勝疾善太息又云陽明之勝太息嘔苦又云少陰司天地乃燥凄愴數至脇痛善太息是也

針灸

內經灸刺善太息皆取心膽一經經云黃帝曰人之太息者何氣使然岐伯曰思憂則心忡急心忡急則氣道約約則不利故太息以出之補手少陰心主足少陽留之也又曰膽病者善太息口苦嘔宿汁視足少陽脈之陷下者灸之又云膽足少陽之脈是動則病口苦善太息視盛虛實寒熱陷下取之是也

甲色蒼蒼然太息如將死狀振寒瘦白便難中封主之脾虛令人病寒不樂好太息商丘主之凡好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰即取公孫及井腧

實則腸中切痛厥頭面腫起煩心狂飲多不嗜臥虛則腹脹腸中氣大滿熱痛不嗜食霍亂公孫主之

目疾門

目赤腫痛

外障

內障

不能遠視

不能近視

雀目日落不見物

目淚不止

風沿爛眼

倒睫拳毛

努肉

攀睛

飛絲塵垢入目

視岐亂見

目開不閉

眇目直視

目上視

目具明

經云瞳子黑眼法於陰白眼赤脈法於陽故陰陽合轉而精明此則眼具陰陽也姪文見視又曰五臟六腑之精氣皆上注於目而為之精精之窠為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡其窠氣之精為白眼肌肉之精為約束裹擷筋骨氣血之精而與脈并為系上屬於腦後出於項中此則眼具五臟六腑也全文見視後世以內外皆

屬心上下兩臉屬脾白眼屬肺黑眼屬肝瞳子屬腎謂之五輪蓋本諸此也又有六廓之說無義無據今不得刪入焉

臟腑主目有二

肝主目

一曰肝經云東方青色入通於肝開竅於目藏精於肝又云人臥血歸於肝肝受血而能視又云肝氣通於目肝和則目能辨五色也

心合脈

二曰心經云心合脈諸脈者皆屬於目是也至東垣又推之而及於脾如下文所云

目疾始

東垣五臟生成篇云諸脈者皆屬於目目得血而能視針經九卷太惑論云心事煩冗飲食失節勞役過度故脾胃虛弱心火太盛則百脈沸騰血脈逆行邪害孔竅大明則日月不明也夫五臟六腑之精氣皆稟受於脾土而上貫

於目脾者諸陰之首也目者血氣之宗也故脾虛則五臟之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也主人之神宜靜而安相火代行其令相火者胞絡也主百脈皆榮於目既勞役運動勢乃妄行及因邪氣所并而損其血脈故諸病生焉凡醫者不理脾胃及養血安神治標不治本不明正理也

陽主散陽虛則眼櫻急而為倒睫拳毛陰主斂陰虛不斂則瞳子散大而為目昏眼花

論目眦外決于面眦為銳眦在內近鼻者為內眦上為外眦下為內眦診脈痛赤脈從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少陽病太陽病宜溫之散之陽明病宜下之寒之少陽病宜和之也
論云眼之為病在腑則為表當除風散熱在臟則為裏

當養血安神暴發者為表而易療久病者為裏而難治除風散熱者瀉青丸主之養血安神者定志丸主之婦人熟地黃丸主之或有肥體氣盛風熱上行目昏遊視子散主之此由胸中濁氣上行也重則為痰厥亦能損目常使胃中氣清自無此病也又有因目疾服涼藥多則損氣者久之眼漸昏弱乍明乍暗不能視物此則失血之驗也熟乾地黃丸消氣定志丸相須而養之或有視物不明見黑花者此之謂腎氣弱也宜補腎水駐景丸是也或有暴失明者謂眼居諸陽交之會也而陰反閉之此風邪內滿當有不測之病也

目赤腫痛

目疼有二一謂目眦白眼痛一謂目珠黑眼疼蓋目眦白眼疼屬陽故晝則疼甚晝苦寒藥則效經所謂白眼赤脈

陰陽

法於陽故也目珠黑眼疼屬陰故夜則疼甚點苦寒則反劇經所謂瞳子黑眼法於陰故也

陰症治法

簡補肝散治肝虛目睛疼冷淚不止筋脈痛及羞明怕日夏枯草五錢香附子一兩共為末每服一錢臘茶調下無時候服

右夏枯草治目珠疼至夜則疼甚者神效或用苦寒眼藥點上反疼甚者亦神效蓋目珠者連日本日本又名目系屬厥陰之經也夜甚及用苦寒點之反甚者夜與寒亦陰故也丹溪云夏枯草有補養厥陰血脈之功其草三四月開花遇夏至陰生則枯蓋稟純陽之氣也故治厥陰目疼如神者以陽治陰也予周師目珠疼及連眉稜骨痛并頭半邊腫痛遇夜則作用黃連膏子點上則反大疼諸藥不効灸厥陰少陽則疼隨止半日又作

又灸又止者月餘遂以夏枯草二兩香附二兩甘草四錢同為細末每服一錢五分用茶清調服下咽則疼減大半至四五日良愈又一男子年六十歲亦目珠連眉稜骨疼夜甚用苦寒劑點亦甚與前証皆同但有白翳二點一黑目及外眥為翳稟皆不効亦以此藥間東垣選奇湯又加四物黃連煎服并灸厥陰少陽而安

本治睛疼難忍者

川芎 防風 細辛 薄荷各等

右為末每服一錢麥門冬熟水調下食後日午夜臥各一服

保止痛散治兩額角痛目睛痛時見黑花及目赤腫痛脈弦作內障也得之於飢飽勞役

柴胡半兩 甘草錢半 瓜蒌根二 當歸

黃芩酒四刃一半 生地黃兩一

右為齋末每三錢水一盞半薑三片棗一枚臨臥熱服
小便不利加茯苓澤瀉各五錢

治太陽經衛虛血實目腫赤臉重頭中濕盜膚腎睛痛肝
風盛眼黑腎虛

桔梗丸

桔梗一 牽牛頭末

右細末每服四五十九至一百丸食前溫水下日二次

行暴赤眼無瘡者以古銅錢刮角薑上取牙於錢唇點目
熱淚出隨點隨愈但小兒甚懼不須疑已試良驗有瘡者

又以此
治疔瘡

張仲文治眼暴赤腫痛不得開又淚出前附子赤皮末如
蠟燭尿著目中以瘻為度

陰病似
陽点法

本治丈夫女人室女小兒諸般赤眼針頭丸

川烏尖七枚 懷乾七枚 白僵蠶七枚 去鵬砂文十

右為末用猪胆取汁調藥不令稀用成軟塊攤在碗內

荆芥艾各一兩皂角小者一莖燒將藥碗覆薰之當將
藥骨攪勻轉又攤又熏以皂角荆芥艾尺為度再搜成

塊用油紙裹入地中出火毒冬天兩日夜夏天一夜春
秋一日夜取出丸如針頭大每一丸點眼中妙

治目中百病乳汁煎黃連點之

能視蓋水入於經其血乃成又曰上則為乳汁下則為月

水故知乳汁即血也用以點目豈不相宜者哉 治眼痛

小黃柏皮一名小栢子以籠布揩去麤皮刮取柔細黃屑
以手急捏成團如鷄子大以苧絲縛之次以蘿蔔葉包之

陽藥治
法

又用苧絲縛之置灰火內煨去外二三層有灰者急用紗絞出黃汁收之點眼甚妙一友用乳汁拌小黃柏皮同煨點之又勝可

世傳信方眼風泪痒或生翳或赤皆一切皆主之宣州黃連搗為細末雜核仁去皮碾為膏緣此性稍濕未得故耳與黃連等分相合取不蛀乾東三枚割頭少許留去核以二物填於中却取割下東頭依前合定以少綿裹之惟薄綿為佳以水半碗於銀器中文武火煎取一鷄子殼以綿纏待冷點眼萬七不失前後試驗數十人皆應

保點眼藥除昏退翳截赤定痛

當歸二錢

黃連二錢

防風一錢五分

細辛五分

甘草一錢

右剉如麻豆大水一大碗文武火煎滴水中不散為度

入藥少許點閉目

丹暴赤眼痛枸杞汁點妙

目卒痛荆芥燒汁點之

保救苦丸治眼暴赤發噴痛甚者

黃連一兩

川歸二錢

甘草一錢

右剉細水半碗浸一宿以火熬約至一半綿絞去香令淨再熬作稠膏攤在碗上倒合以物蓋之用熟艾一大塊如彈子大底下煨之薰膏子令艾盡為度下下項藥
硃砂一錢
腦子五分
乳香
沒藥各研各分
右研入膏和丸如米大每用二丸點眼兩角仰面臥藥化方起

世點藥方黃連五錢去鬚地磁用水三碗浸夏月三日冬五日以古文錢百六箇同煎取汁半碗又將查再煎凡三次取綿纏過以磁器煨成膏如沙糖樣却將盧甘石黃

惡寒服
淨者為
有表

連牙茶小便煨過者入麝香少許同研細入前膏子再煨
可丸為度如桐子大化點一方不用蘆甘石只將膏子
入麝少許點尤妙一方陰陽寒熱通用以生薑自然汁
重綿纏過澄薑泥晒乾却用黃連膏入蜜少許以薑泥為
丸餅如錢厚或水化或乾點神效

薑汁點法見前黑睛痛條治目痛惡寒服浮者効治目
皆白眼痛諸法並見後表裏寒熱虛實等條

東垣選奇湯防風飲子治眉骨痛不可忍方見眉

芎辛湯治兩目晝夜隱濇難開羞明畏日目赤視物昏暗

芎藭 蔓荊子各五分 細辛二分 防風一分

甘草 白芷各一分

右作二服水一大盞八分煎至一盞去渣稍熱服
極佳

明目細辛湯治兩目發赤微痛羞明畏日怯風寒怕火眼
睫成細膜多隱濇難開眉攢痛悶鼻涕唾極多如稠膿
大便微硬喜食冷物

麻黃 羌活各三分 藁本一分 川芎五分

細辛少許 白茯苓一分 蔓荊子六分 荆芥蕙一分

當歸稍少 生地黄六分 川椒八粒 桃仁二十枝

紅花少許 防風二分

右並劉如麻草大分作四服每服水二大盞煎至一盞
去渣稍熱服食後忌酒濕麵及風寒處行走

本治肝腎風毒氣上衝眼痛菊花散

甘菊花 牛蒡子各兩 防風三兩 白蒺藜去刺

甘草一兩 五錢

右為細末每服二錢熱水調下食後臨臥

脈實有力者為有裏

凡目赤痛或太腑秘或脈實有力者為裏證宜微利之

實熱條瀉青丸洗肝散之類是也
海目赤暴作雲翳疼痛不可忍宜四物龍膽湯
四物各五錢 羌活 防風各三錢 草龍膽

右水煎服

丹丈夫患眼赤腫痛

連翹

黃芩

歸鬚

陳皮

蒼朮各二錢

木通半錢

甘草炙一錢

分三貼薄苛葉五片水二盞煎一半入些好酒熱飲之

保槐子散治體肥氣盛風熱上行目昏濇

槐子

黃芩

木賊

蒼朮各等分

右細末食後茶送下

川芎散治風熱目眩熱腫及胸中不利

川芎

槐子各一兩

右為末氣滯不利薑湯調目疾茶清調熱上咬吹下

兩煎服

潔治眼赤暴發腫散熱飲子

防風

羌活

黃芩

黃連各二兩

右切每半兩水二盞煎食後溫服如太腑秘加大黃一

兩如痛甚加川歸地黃煩躁不得臥加梔子一兩

治目暴發赤腫除風散熱瀉青丸方見治

局洗肝散風毒上攻暴作赤目腫痛難開隱濇淚

薄荷梗

當歸

羌活

防風各去

梔子仁

甘草炙

大黃

川芎各二兩

右為末每服二錢食後熱水調下

本事治目暴赤澇腫疼痛

木賊牛兩 細辛半兩 草烏一分 龍膽草半兩
去節 爭洗 去尖 去根
 右為到散每服三大錢水一大盞黑菅半人豆煎至一二沸入沙糖一塊如大彈子大煎至八分去香食後溫服一應諸眼患血用忌煎燻油麪酢醬熱物及不得嗔怒房色等事則便易獲痊矣
 治腎經虛冷水候不升不能上滋肝木致令眼目昏暗或痛或痒須用此藥方調治之

虛熱宜
升降水
火

- 川芎 荆芥 天麻 菖藪
- 川烏炮 烏藥 羌活 黑牽炮
- 川歸 金釵石斛各等
- 右為末煉蜜丸如苦大硃砂各等每服一丸薄荷湯送下

目赤腫足寒者必用時時溫洗其足并赤脈處屬何經灸三里臨泣崑崙等穴立愈○海藏四物龍膽湯方見
 保地黃湯治眼小昏澇因發而久不能癒

- 防風 當歸 黃芩 黃連
- 人參 茯苓 羌活 地黃各等
- 右麓末每服五七錢水一大盞半煎至一盞溫服
- 丹赤眼痒痛煎枸杞汁服救急
- 垣助陽和血補氣湯治眼發上熱壅白睛紅眵多淚無疼痛而隱澇難開此服藥藥太過而真氣不能通九竅也故眼昏花不明宜助陽和血補氣
- 防風分七 黃芪錢一 甘草分五 蔓荆子
- 歸身分五 白芷分二 升麻分七 柴胡
- 右咬咀作二服水一大盞半煎至一盞去香熱服臨臥送

風及惡食珍物

碧天丸治目疾累服寒涼不愈兩目蒸熱有如火薰赤而不痛紅系血脈滿自貫睛翳昏暗羞明畏日或上下臉赤爛或不伏風土而內外眦皆皆洗破之

瓦粉炒一兩 銅綠七分 枯白礬二分是一錢

右研銅綠白礬令細旋旋入瓦粉銅綠勻熱水種之共為丸每用一丸熱湯半盞浸一二箇時辰洗至覺微滑為度少合眼半時辰許臨臥更洗了與自就睡尤神妙一丸可洗十日如再用重湯內頓令熱此藥治其標為裏熱治已去矣裏實者不宜用此當為其實熱諸方見前大腑秘堅條

實熱宜

子和清州王正之子年十五歲目赤多淚象工無效戴人見之曰此兒病在目最當得之毋腹中被驚其父曰姪娘

血壅者決之

時在臨清被圍戴人令服瓜蒂散加鬱金上湧下泄各去涎沫數升人皆笑之其母曰兒腹中無病何以吐瀉如此至明日其目輝然爽明一小兒名得孫眼發赤其母買銅綠欲洗兒目前成家人誤與兒飲之須臾大吐吐訖立開安慶趙君玉目暴赤腫點洗不退偶思戴人法曰凡病在上者皆宜吐乃以茶調散涌之一涌赤腫消散君王歎曰法之妙其迅如此乃知法不遠人人自遠耳

孫仁廟朝中衛才人忽患眼疼衆醫皆不能療或投寒藥或投補藥加之腑臟不安上乃問孫孫曰臣非眼科乞不全責於臣降旨有功無過孫乃診之肝脈弦滑非熱壅也乃才人年壯血盛肝血併不通遂問及宮人月經已二月不通衆醫曰有孕孫曰此正為疾耳遂下通血藥其經既通不日眼疾亦愈上賜錢三十萬才人贈金一囊宮人謠

點藥方

曰神醫不來雙目難開
丹治風赤眼乾蚯蚓十箇炙為末冷清茶下二錢夜臨臥
與服聖惠

點藥諸方分陰陽並見前眼痛分黑白條

世治眼暴赤腫大由螺以清水漾去泥壁去掩入黃連末
一錢麝些少在內將一盞子安少濕泥仰安田螺在泥上
粘定露一宿次日早盡化為水以鷄翎刷眼痛處則瘥

外治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水一升於白碗中浸春
夏一食時以上看碧色出即以筋頭纏綿仰臥點所患眼
乃先從太眇中滿眼點微痛不畏良久三五飯頃即側臥
瀝却熱汁每日十度已上不過二日瘥 治赤目痒痛地
骨皮三升水三斗煮取三升去渣納鹽二兩煎取二升傳
石或加乾薑二兩

博濟治風毒上攻眼腫痒澁痛不可忍者或上下臉皆赤
爛浮翳瘀肉侵睛神效驅風散

五倍子兩 蔓荆子五錢

右同杵為末每用二錢水二盞銅瓦器內煎及一盞澄
香熱淋洗留滓二服又依前煎淋洗大能明眼目去滯
痒

潔眼稍赤爛

黃連三錢 白礬三錢 銅綠 蜜陀僧一錢

輕粉少

右為極細末少少貼之

東碧雲散搗藥

青黛一錢 蔓荆子半錢 川芎二錢 薄荷二錢
鬱金一錢 石膏一錢 細辛一錢 紅荳粒一錢

芒硝錢一
右為細末，口噙水鼻孔內吹之。
治赤眼頭風等症，此方名為神聖散。

乳香

沒藥

川芎

石膏

雄黃各二錢

盆硝兩半

右為細末，專治赤眼冷淚頭風耳聾耳痒鼻塞聲重，搯牙根便佳。

保眼發赤腫毒氣侵睛脹痛宜拔毒散

盆硝

乳香

雄黃

沒藥各等分

右為細末，研以少許搯鼻中。

治眼風毒發腫鼻中欲嚏嚏多鼻損而生瘡宜風散

川芎

甘菊各二錢

乳香

沒藥各一錢

右為末，少許搯鼻中。

治赤腫眼以白蔓末水調貼脚掌心，又以土硃蜜調

膏貼眼上

赤眼用九節黃連秦皮麝末加滑石一塊煎湯洗，又

方用熱湯澀洗或濃煎冬青葉湯入鹽熱洗。

治火眼艾燒細烟以碗蓋之候烟上成煤取下以温水

調洗之入黃連尤妙。

恒廣大重明湯治兩目臉赤爛熱腫疼痛并稍赤及眼臉

痒及痒極抓至破爛赤腫眼楞生瘡翳目多眵痛隱濇難

開

草龍膽稍

防風

甘草根

細辛各等分

右剉如麻荳大，內甘草，剉只作二挺，先以水一大碗

半煎草龍膽一味乾一半再入餘三味煎至一小半碗

去渣用清汁帶熱洗以重湯坐令極熱，日用五七次洗。

畢少合眼須臾即去努肉縱長及痒亦減矣

運氣目赤有二

一曰風助火鬱於上經云少陰司天之政二之氣陽氣布風乃行寒氣時至民病目暗目赤氣鬱於上而熱又云少陽司天之政初之氣風勝乃淫候乃太溫其病氣拂於上目赤是也

火德盛熱在中

二曰火盛經曰火太過曰赫義赫義之紀其病目赤又云火鬱之發民病目赤心熱又曰少陽司天之政三之氣炎暑至目赤又云少陽之勝目赤是也

肝實宜清之

三曰燥邪傷肝經云歲金太過燥氣流行民病目赤又云陽明司天燥氣下臨肝氣上從脇痛目赤是也

每灸

內經灸刺白睛痛有四法其一取足太陽經云目痛赤脈從上下者太陽病故知取

之也

其二取足陽明經云目痛赤脈從下上者陽明病故知取

之也

其三取足少陽經云目痛赤脈從外走內者少陽病又手

足少陽之脈所生病者皆目銳皆病故知取之也

其四取蹻脈經云邪客足陽蹻之脈令人目痛從內眥始

刺外踝之下半寸所左刺右右刺左又云目中赤痛從內

眥始取之陰蹻也

灸刺黑珠痛有三法

其一取足太陽經云足太陽有過項入于腦者正屬目本

名曰眼系頭目若痛取之右項中兩筋間是也

其二取足厥陰經云肝足厥陰之脈上入頰頰連目系故

取之也

其三取少陰經云手少陰之別名曰通里屬目系取之掌後一寸也又足少陽之正陽明之正皆繫目系經無取法也

子和余嘗病目赤或腫或翳作止無時偶至新息帥府百餘日羞明隱滯腫痛不巳忽眼科姜仲安云宜刺上星至百會速以銚針刺四五十刺攢竹穴絲竹空穴上兼眉際二十刺及鼻兩孔內以草莖彈子出血如前約一升許來日愈大半三白平復如初

潔眼痛睛欲出者須公關大刺斗指間出血須十指縫
心眼暴赤腫百會各出血立愈 神庭 上庭 顙門 前頂

世眼腫 二間 行間
摘眼疼不可忍 風池 食谷立愈

玉眼紅腫羞明怕日并昏針飛向鼻不可直刺忌灸 睛明 童子窈

翳眼痒痛 光明 第五各瀉 行間 合谷灸如二間

集羞明怕日 攢竹 小骨空灸如二間

張風眼卒生翳膜疼痛 中指本節尖上灸三壯小灸大左灸右右灸左

集諸障 睛明 四白在珠下 太陽百會商陽厲兌光明各出血合谷三里命門肝膈光明各灸之

撮眼赤腫疼痛 陽谷一分瀉至陰

甲內眥赤腫目眇眇無所見皆痒痛溢膚白翳睛明主之
○目眇眇赤痛大柱主之
○目痛泣出甚者如脫前谷主之
○眼痛下廉主之
○白膜覆珠子無所見解溪主之
○青盲無所見遠視眇眇目中溢膚白膜覆瞳子目窻主之
○目痛口僻疾目不明四白主之
○目痛引此鼻少腹偏痛

皆一嘔痰視昏嗜臥照海主之瀉左陰躡取足左少陰
 前作春先刺陰躡後刺少陰氣在橫骨上○目中白翳然谷取
 之○目視不明振寒目翳瞳子不見腰兩脇痛脚痠轉筋
 丘墟主之○目赤目黃翳窮主之○目眩無所見偏頭痛
 引目外眦張急領厭主之○目中痛不能視上星主之先
 取噫嘻後取天牖風池○目痛不明斷交主之
 藥眼痛久不愈○魚際灸七

外障在睛外
 遮睛

表裏上
 經云診目痛赤脈從上下者太陽病從下上者陽明病從
 外走內者少陽病按此論表裏之翳明矣用以治症如鼓
 應桴也

翳從上
 下者大

凡赤脈翳初從上而下者屬太陽以太陽主表其病必連
 眉稜骨痛或腦項痛或半邊頭腫痛是也治法宜溫之散

宜散

之溫則臘茶鹽川附等分煎服立愈戴立齋嘗以此論用
 川附一錢作一服隨愈散則簡要夏枯散東垣選奇湯之
 類是也○一方附子半兩芽茶一大撮白芷一錢細辛川
 芎防風羌活荆芥各半錢煎服神效

夏枯草治眉稜痛目翳從上下者累效必與退雲丸相
 兼服夏枯草方見目珠痛條

選奇湯治眉稜骨痛目翳從上下者妙方見眉
 羌活除翳湯治太陽寒水翳膜遮睛不能視物

- | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 麻黃根 <small>分</small> | 羌活 <small>半兩</small> | 防風 <small>兩</small> | 藁本 <small>七</small> |
| 薄荷葉 <small>二</small> | 細辛 <small>少</small> | 荆芥 <small>七</small> | 煎成 |
| 川芎 <small>三</small> | 當歸根 <small>三</small> | 生地 <small>酒一</small> | 小椒 <small>五</small> |
| 黃栢 <small>四</small> | 知母 <small>酒五</small> | | |

右咬咀每服三錢水三大盞煎至一盞半入荆芥蕙再

煎至一盞去香稍熱服後忌酒濕麪

本又方

防風兩

白蒺藜兩

羌活半兩

甘菊兩

右為細末每服二錢入鹽少許百沸湯點服食後

赤脈翳初從下而上者或從內眥出外者皆屬陽明以陽

明主裏其症多熱或便實是也治法宜下之寒之下則局

方流氣飲錢氏瀉青丸局方溫白丸加黃連黃柏之類

用累驗寒則一味黃連羊肝丸之類也

局流氣飲治目生翳障

大黃炮

牛蒡子炒

川芎

菊花去枝

白蒺藜炒去

細辛苗

防風去

玄參去

山梔皮

黃芩去

甘草炙

蔓荊子

荆芥梗

木賊去

草決明半

蒼木兩

醫從下
上者陽
明宜下
宜寒

右為末每服二錢臨臥用冷酒調下

羅撥雲散治因眼發濕熱不退而作翳膜遮睛昏暗羞明

隱濇難開

川芎

草龍胆

楮實

薄荷

羌活

荆芥蕙

石決明

草決明

蒼朮

大黃

甘草

木賊

密蒙花

連翹

川椒

甘菊

桔梗

石膏

地骨皮

白芷

白蒺藜

檳榔略

石燕對

右件搗羅為細末每服三錢溫茶清一盞調下食後

日三服忌雜魚鳥諸肉

海藏東垣先生治痲後風熱毒翳膜氣暈遮睛以瀉青丸

子瀉之大効初竟易治保命集云痲後翳膜亦能治

之瀉清丸減太黃一半用之

妻姪女形肥筭年時得目疾每一月或二月一發之時
 紅腫瀆痛難開如此者三年服除風散熱等劑及尋常
 眼藥則左目反有頑翳從銳眥來遮瞳人右目亦有翳
 從下而上經云從內外走者少陽病從下上者陽明病
 予謂此少陽上明二經有積滯也脈短滑而實晨則似
 短潔古云短為有積滯過抑臟腑宜下之遂用溫白丸
 減川芎附子三之二多加龍胆黃連如東垣五積法從
 二九每白加一九加至太利然後減九又從二九加起
 忽一日於利中下黑塊血若干如墨大而硬堅從此漸
 蒼痊而翳盡去矣

世黃連羊肝丸治目翳從下上者從內眥出外者神效見

翳從外
內眥

赤脈翳初從外眥入內者為少陽以少陽王平表半裏治

少和宜
和解

法宜和解之神仙退雲丸之類是也
垣神仙退雲丸治一切翳暈內外障昏無睛者累効妙方也

- 川芎 當歸各半 犀角酒洗 枳實
- 川棟 上各半兩 瓜蒌仁生者六錢 蛇退 薄荷葉不見火已
- 荆芥蕙 同焙乾去甘草不用 密蒙花
- 白蒺藜 微炒羌活 生地酒洗焙乾
- 川木賊 便一宿焙于

右為細末煉蜜為丸每一兩分作十九丸泔湯調服日
 進二三丸食後婦人當歸湯下有氣者木香湯下使之
 在久消息

本治諸眼患因熱病後毒氣攻眼生翳膜遮障服此藥逐

旋消退不犯刀針

青箱子

防風

枳殼各一

羌蔚子

細辛各半

枸杞子

澤瀉

生地黃

石决明各一

車前子

川當歸

麥門冬去心各

右各如法修事焙乾為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸飯飲吞下忌一切熱毒物

垣羌活退翳湯

羌活二

防風半一

黃芩半

柴胡三

五味子二

黃柏酒炒

芍藥五

黃連二

甘草二

草龍胆酒洗

黃芪三

升麻一

歸身一

石膏半

右件劉如麻蓮大冰二盞分作二服前至一盞入酒少

消翳散一名龍膽飲子

青蛤粉兩半

羌活

龍膽草

黃芩炒各

蠟退五分

麻黃一錢

穀精草兩

升麻二錢

川鬱金兩半

甘草根分

又方 右為細末每服二錢食後溫茶調下上四方熱多者宜之

川芎

羌活

旋覆花

防風兩

甘草

蒼朮淋浸一夕去皮日乾不見火

楮實

楮葉並八月採陰乾

甘菊

枳實

蟬退

木賊各一

右木白中治為末茶清調下二錢食後臨臥各下服治暴赤眼忌濕麪及酒楮實須真無實者取葉不爾諸

藥無効合時不得焙及犯鐵器予觀此方取楮葉必無實者蓋陰陽二合相匹配取有實者陽也無實取葉者陰也所以不得真楮實者悉無効

羅五秀重明丸治眼翳膜遮睛隱晦昏花常服清利頭目

甘菊花開頭五百 荆芥穗五百 木賊去節五百 楮實五百

右川椒開口者五百粒

又右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼時時咽

下食後隨化無時臨臥大忌酒麪熱物已上二方無

表裏下

翳膜者風熱重則有之或癍入眼此肝氣盛而發在表也翳膜已生在表明矣宜發散而去之若反疎利則邪氣內搐為翳益深邪氣未定謂之熱翳而浮邪氣已定謂之水翳而沉邪氣定而深者謂之陷翳當以煖發之物使其邪氣再動翳膜乃浮佐之以退翳之藥而能自去也病人者

不能速効宜以歲月除之

翳分新

新翳所生表散方東垣羌活除翳湯有熱血虛者退雲丸之類是也

保治水腎久不生者羚羊角散

羚羊角

升麻

細辛各等分

甘草半

右為末一斗煉蜜為丸每服五七丸用一斗半為散以

泔水煎吞九子食後

煖發陷翳亦羚羊角散之類用之在久消息若陰虛有熱

者兼服神仙退雲丸

補陽湯治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通令青

陰盛陽虛當先補其陽後治其陰

白翳見於大眇乃足太陽少陰經中鬱遏足厥陰肝經氣不得上通於目故青白翳內阻也當於太陽少陰經中九原之下以益肝中陽氣衝天上行此當先補其陽後於足

太陽少陰標中瀉足厥陰肝經陰火乃次治也內經曰陰盛陽虛則當先補其陽後瀉其陰此治法是也每日清晨以腹中無宿食服補陽湯臨臥服瀉陰丸若天色變大寒大風并大寒後預日飲食不調精神不足或氣弱俱不得服候體氣和平天氣如常服之先補其陽使陽氣上升通於肝經之末利監竅於眼目矣

羌活 獨活 當歸身去若頭用稍
 甘草稍 熟地黃 人參去 黃芪
 白朮已上各 澤瀉 陳皮去 白各 生地黃炒二
 白茯苓皮去 知母炒黃絕 柴胡去苗 防風半
 白芍藥兩 肉桂去皮 一錢
 右同為麤末每服半兩水一大盞煎至三盞去渣溫服空心使藥力行盡方許食

連栢益陰丸

羌活 獨活 甘草根炒 當歸稍依前
 防風 五味子略半 黃連酒洗或制
 石决明燒存性 草决明 黃芩
 黃栢 知母略一
 右為細末煉蜜丸如葶藶大每服五十丸漸加百丸此臨臥清茶送下常以助陽湯多服少服此藥以此藥則妨飲食二則力大如并陽湯不可多服

升陽泄陰丸

羌活 獨活 甘草根 歸身
 熟地兩各一 人參 黃芪 白朮各半
 澤瀉錢三 白芍藥兩二 陳皮錢三 白茯苓
 防風錢三 肉桂半 生地酒洗炒 知母酒炒
 五錢 五錢 如大三

暑加

楮實酒拌

柴胡去苗一錢半

右吹咀每服五錢水煎熱服另合一料煉蜜丸如桐子大食遠茶清送下五十九每白與前藥各一服不可飽服如天氣熱其加五味子三錢或半兩天門冬去心半兩枳實亦加半兩

右上一三方合治一病空心補陽湯臨臥連栢丸食遠升陽泄陰丸

瞳子散

滋陰地黃丸治內障兼右目小眦青白翳瞳子散大內障

白朮 歸身尾 生地 木通

黃連 黃芩炒 黃柏炒各 甘草錢一

分三貼煎服大熱加白芍藥

翳從下而上諸方瀉青之類並見表裏上條○翳除盡至期年月

翳除至期復發者有積雜方

日期復發者或間一月或二月一發皆為積治如脈滑者宜溫白丸加黃連草龍脂如東垣五積法服之

百點膏張濟民眼翳以至遮瞳人視物不明如覺雲氣遮障以此方治之

黃連二錢以水一碗煎至半碗再入後藥 當歸分六 甘草根分六

防風根分八 麩仁三分 去皮尖

右剉如麻荳大麩仁另研如泥同麩滴入水中不散去查沫入好蜜少許再煎少時為度極要病人心淨點之

點至目微痛為度一白點五七次臨臥點尤妙名曰百點膏但欲多點使藥力相續

羌活退翳膏治足太陽寒水膜遮左睛白翳上視物不明

椒樹東南根西北 麻黃三分節根 羌活七分

黃連三分 歸身分六 防風分三 柴胡分三

生甘草四分

升麻三分

生地黄三分

漢防已二分

蕤仁六箇

藁本二分

右淨水一碗先煎漢防已黃連生甘草當歸身生地黄煎至三盞入餘藥再煎至一盞去渣入銀磁器內熬稀膏點之有力為度

退翳膏子治黑白翳

荆芥穗錢一

黃連錢三

生地黄半錢 甘草五分

歸身分六

連翹分四

柴胡稍分五

升麻分三

防風分四

蕤仁分三

青皮分四

細辛分六

右先用水半盞浸荆芥一處次將黃連生地黄甘草三味用水一大碗煎至半碗再下餘七味同煎至一盞去渣更上火熬至半盞入荆芥水二匙入蜜少許再煎令勻點之神效

圓明膏治內障生翳及瞳子散大皆勞心過度飲食失節

柴胡去苗五分

麻黃去蘆五分

歸身錢三

生地黄兩半

黃連去須五分

甘草錢二

訶子皮濕昏裏煨二錢

右七味先以水二碗熬麻黃至一碗去沫外六味各咬咀如葶大篩去沫子秤入內同煎滴水中不散去渣沫入蜜少許再熬點之

右點方四皆東垣先生所製乃隨證立法非如泛常通用之方如瞳子散大用訶子收之之類也

保金絲膏點眼

生薑取汁四兩

白蜜煉去沫一斤

假猪膽汁錢三 黃連四兩 碎用水

右先煎黃連水後入薑汁次入蜜同煎去沫淨入下項

腦子

硃砂

熊膽各四錢

射香

羅金露膏

青鹽各三 輕粉鈔 鵬砂二
右研細攪勻同煎令稀膏用之

糞仁推碎

黃丹各一

黃連兩半

蜜六兩

右件先將黃丹入鍋中炒黃至紫入蜜攪勻下長流水四升以嫩柳枝頭七莖把定攪之次下糞仁候滾十數沸又下黃連用柳枝不住手攪熬至二升置離內傾藥在紙上慢慢滴之無令塵汚如有瘀血加礪砂一錢上火煨開入前膏子內用

夜光丸治赤眼翳目昏花

宜黃連

訶子去核各二兩 當歸一兩

銅綠一錢

右收咀用河水三升同浸兩晝夜入銀磁器熬取汁再入文武火熬槐柳枝攪滴水成珠為度

猴猪胰子

二箇先去脂以水洗換水無度令淨入竇連膏內煮黑色取出用之

蘆甘石

一兩童便下碗燒紅燂不為度 黃連四兩河水浸去

青監六兩

蜜一斤澄去查蠟 梨十枚去皮核絞取汁

右將梨汁并石入膏子內熬五七沸次入青監用槐柳枝攪褐色傾入磁瓮冷水中拔去火毒臘月合為妙正月十一月次之餘月皆不可

蟾光膏治遠年目病不通道路去翳膜須用臘月成開且合

白沙蜜

四兩色白者炒隔年蔥一枝去鬚皮短切煨放定用紙同熬去白膜觀蔥軟熟為度以綿纏淨收取蠟面 黃丹三錢水飛生用 蜜三錢水飛生用

蘆甘石

煨過五錢淨水飛入前蜜中用桃柳各一枝攪勻放下

當歸

赤芍藥

杏仁湯炮去皮尖已上三味各三錢

黃連

去芦頭川芎兩

秦皮

訶子皮

訶子皮

防風

石膏

女精石

井泉石

無名具

女參

代赭石

石決明

味各三錢或咀或雪水或長流河水五升銀磁器內
熬至三升總去查淨再熬至一升將半五味藥水傾
入前放下藥蜜一同慢火熬藥紫
金色時用添入後藥勿令火急

沒藥

琥珀

硃砂

麝仁

已上五味各三錢前四味先研爛後入麝仁水飛一同

研細澄有查再水飛研清再水飛方傾入前紫金藥內

十同復熬一二沸以藥滴於水中不散為度大抵勿令

過與不及取下土中埋七日取出置銀器中如法收貯

再添入後細藥傾入藥時亦用桃柳枝攪勻

南鵬砂

珍珠

龍腦

珊瑚枝

錢

麝香

右伴五味研極細亦以桃柳枝攪勻傾入前藥中復攪

勻然後以紙封器口旋取用如有取不及藥用淨水

斟酌洗碗却將碗藥水熬三五沸另行收拾或洗眼或

膏子藥稠了時傾入此少調解

右用藥柴燒共計二十九味

肘療目熱生膚赤白膜取雀屎細直者入乳和付目上消

爛盡烏賊骨主目中一切浮翳細研和蜜点之又骨末

治目中熱有翳

丹治眼翳白皮索為繩日乾燒為灰研細点之自漸退

妙又方猪膽皮去汁搥為繩燒灰点之亦妙

東碧雲散治外障搗藥

麻黃根

煨身

乳香

麝香

右將當歸麻黃為粗末炒黑色入乳射研極細噲化搗

入鼻中

摘鼻

薄荷紅 石膏紅 芒硝 川芎各等
細辛紅 蔓荊子紅 青黛紅

右為末鼻內搗之

丹楊生娘患赤眼生膜似白星

秦皮 滑石 黃連 荆芥

歸頭 赤芍藥絡

右分四貼煎洗仍教其莫洗浴止可洗脚

干治法以鵝翎截之近黑睛及當白睛翳之膜自聚上以

針鈎挽之割去即見物以綿當眼着血斷三日瘡

東垣醫魏邦彦夫人目翳暴生從下而起其色綠腫痛不

可忍先師曰翳從下而上病從陽明是也綠非五方之正

色殆肺腎合為病邪乃就畫家以墨臙粉合為色諦視之

與翳同色肺腎為病無疑矣乃瀉肺腎之邪而入陽明之
藥為之使既効而他日病復作者三其所從來之經與翳
色各異乃以意消息之曰諸脈皆屬於目脈病則從之此
必經絡不調則目病未已也問之果然因視所不調者治
之病遂不作

針灸外障並見目赤門

內障

在睛裏昏暗與不患之眼相似唯瞳人裏有隱上青白者
無隱上青白者亦有之

丹一老人病目暴不見物宅無所苦起坐飲食如故予曰

太虛急煎入參膏一斤服二日目方見一醫與青礞石藥

予曰今夜死矣不悟此病得之氣大虛今不救其虛而反

用礞石不出此夜必死果至夜半死○一男子四十餘歲

氣虛則
目暴元

形實平生好飲熱酒忽目盲脈瀼此因熱酒所傷胃氣汚濁之血死在其中而然也遂以蘇木作湯調入參膏飲之服二日鼻內兩手掌皆紫黑予曰此病退矣滯血行矣以四物加蘇木桃仁紅花陳皮煎調入參末服數日而愈○一男子五十五歲九月間早起忽開眼無光視物不見急就睡片時却能見人物竟不能辨其何人何物飲食減平時之半神思極倦服之緩大四五至之上重按則散而無力予作受濕治詢之果因臥濕地半個月得此証遂以白朮為君黃芪茯苓陳皮為臣附子為佐十餘貼而安○右三方治目不明皆為氣脫而用參末追回者也經云上焦開矣宜五穀味薰膚充身澤毛若霧露之漑是謂氣脫者目不明即其証也

人參補胃湯治勞役飲食不節內障眼病此方神効

黃芪根雨一 人參雨一 甘草錢六八 蔓荊子錢

白芍藥錢三 黃柏錢三 酒炒四

右咬咀每服三四錢水一大盞煎至三盞去渣稍熱服臨臥三五服兩目廣大視物如常惟覺兩脚踏地不知高下蓋火伏升發故也病減住服七日再服此藥宜春間服之

益氣聰明湯治飲食不節勞傷形體脾胃不足內障耳鳴或多年視物昏暗令目廣大久服無內障耳鳴耳聾之患又令精神倍常飲食增倍身輕體健耳目聰明

黃芪半 甘草根錢六 人參半 升麻根錢三
 葛根錢三 蔓荊子錢一 白芍藥錢一 黃柏錢一 洗酒
炒黃

右咬咀秤二錢水二鍾煎至一鍾去渣熱服臨臥服五

更再煎服之得睡更妙如煩亂或有熱春月漸加黃柏夏月倍之如脾胃弱去之熱減亦少用但有熱或麻木或上壅頭目三四服後其熱皆除又治老人腰以下沉重痠痛此藥久服治以上重反有精神兩足輕淨不知高下空心服之或少加黃柏輕浮自減小兒減服多則壅滯若治倒捷去黃柏芍藥忌煙火酸物

圓明內障升麻湯治內障得之脾胃元氣衰弱心火與三焦俱盛為此疾劉舜卿因南征飲食失節形體勞役心不得休息眼疾復作今擬此方服之効

- 柴胡根七錢 羌活根半兩 防風根半兩 白朮
- 甘草炙 歸根酒洗 升麻根各一錢 白芍錢六
- 乾薑錢一 五味子錢二 人參
- 黃芪兩一 白茯苓錢三 葛根

右咬咀每服五六錢水三大盞煎至二盞入黃芩黃連湯一錢同煎數沸去渣前至三盞食後熱服

- 黃芩黃連湯一方有升麻五錢柴胡一兩
- 黃芩酒洗炒 黃連去鬚酒洗 草龍膽一兩酒洗
- 生地一兩酒洗 草龍膽炒七錢 草龍膽炒四次

右咬咀每服二錢入水二盞煎數沸去渣再煎至一盞熱服午後晚間俱不可服唯午飯時服之方效

- 復明散治內障
- 黃芪半錢 川芎分五 柴胡 連翹
- 甘草炙各一錢 歸身錢二 蒼朮分五 生地錢一
- 陳皮分五 黃柏分三 右劉如麻荳大每作一服水二大盞煎至三盞去渣食稍熱服食後忌酒濕麪辛熱大料之物

右四方治目不明皆氣虛而未脫故可與參芪中微加
連栢若氣既脫則黃栢等涼劑不可施經云陽氣者煩
勞則張精絕且目不可以視耳閉不可以聽之類是其
證也

血虛則
暗散大
視物花

內障瞳子散大論并方腎主骨之精為瞳子散大者因腎
水虛骨枯而心包絡之火得以乘
也凡心包絡之脈出於心中代心君行事也與少陽為
表裏瞳子散大者少陰心之脈挾目系厥陰肝之脈連目
系心主火肝主木此木火之勢盛也其味則宜苦宜酸宜
涼大忌辛辣熱物是瀉木火之邪也飲食中常知此理可
也以諸辛主散熱則助火故不可食諸酸主收心氣瀉木
火也諸苦瀉火熱則益水也尤忌食冷水木寒之物此物
能損胃氣胃氣不行則元氣不生元氣不生緣胃氣下陷
胷中三焦之火及心火乘於肺上入胷灼髓火主散益瞳

子之散大者以此太熱之物直助火邪尤為不可食也藥
中去羌蔚子以味辛及主益肝是助火也故去之加黃芩
半兩黃連三錢黃連瀉中焦之火黃芩瀉上焦肺火以酒
洗之乃寒因熱用也亦不可用青箱子為助陽火也更加
五味子三錢以收瞳人之散大也且火之與氣勢不兩立
故經曰壯火食氣氣食少火少火生氣壯火散氣諸酸物
能助元氣探真人云五月常服五味子助五臟氣以補西
方肺金又經云以酸補之以辛瀉之則辛瀉氣明矣或曰
藥中有當歸其味亦辛甘而不丟何也此一味辛甘者以
其和血之聖藥也况有甘味又欲以為鄉道為諸藥之使
故不去也
熟地黃丸治血弱氣虛不能養心致火旺於陰分瞳子散
大小陰為火君主無為不行其令相火代之與心包絡之

脈出心系分為二道少陽相火之體無形其用在其中矣
火盛則能令母實乙木肝旺是也其心之脈挾目系肝之
脈連目系况乎足少陽之脈同出耳中至耳上角斜起終
於目外小眥風熱之盛亦從此道來上攻頭目致偏頭腫
悶瞳子散大視物昏花血虛陰弱故也法當養血涼血益
血收火散火而除風熱則愈矣

熟地兩 歸身酒洗五錢 柴胡去苗八錢 天門冬焙三錢
人參去蘆三錢 甘草炙二錢 地骨皮三錢
黃芩炒二錢 枳殼炒二錢 五味子三錢 生地黃七錢
右為細末煉蜜丸如棗葶大每服一百丸茶湯送下食
後日二服制之緩也大忌辛辣物而助火邪及食寒冷
物損其胃氣藥不上行也又一論云瞳子黑眼法干陰

由食辛熱之物助火乘於目中其睛故散睛散則視物
亦大也

益陰腎氣丸 此壯水之主以鎮陽光也

山茱萸取皮一兩 茯苓去皮二錢半 五味五錢 熟地二兩
乾山藥五錢 澤瀉半錢 牡丹皮五錢 生地酒洗焙乾一兩
歸稍酒洗五錢
右為細末煉蜜丸如桐子大硃砂為衣每服五七十九
淡監湯送下

滋陰地黃丸治內障右眼小眥青白翳太眥亦微顯白翳
腦痛瞳子散大上熱惡熱大便澀後痞難小便如常遇熱
煖頭疼暗脹能食日沒後天陰暗則昏此症可服熟地
黃丸翳在天眥加葛根升麻翳在小眥加柴胡羌活
熟地錢八 生地半兩 歸身酒洗半兩 知母酒洗炒三錢

丹參^{兩半} 黃柏^{酒浸焙} 芍藥^{一兩} 防已^{酒洗焙}
 羌蔚子^{兩半} 牡丹皮^{錢三} 寒水石^{生用} 柴胡^{兩半}
 黑附^{錢一} 川芎^{錢二}

右為細末煉蜜丸如小豆大空心五十九白湯下始宿
 食未消候飢時服之每後忌言語隨後食壓之

保當歸湯治翳補益瞳子散大

歸身 黃芩^{各二錢} 黃連 地黃^{各三錢}
 柴胡^{錢一} 芍藥^{錢一} 甘草^{錢三}
 右水煎臨臥服

羅甘菊花丸治男子腎臟虛弱眼目昏暗或見黑花常服
 明目煖水臟活血豔顏壯筋骨

甘菊花^{去土} 枸杞^{兩四} 熱地^{兩三} 乾山藥^兩
 右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九空心食後

各一服溫水下

瑞竹四神丸治腎經虛損眼目昏花補虛益損及兩眼雲
 翳遮睛

甘州枸杞^{一斤揀去白膜青底者一兩分作四分}
 香茴^{香各一兩妙} 川椒^{一兩妙} 一兩四錢用乳
 合炒^七 特先用好酒一盞將枸杞淘過
 右件炒過將川椒等四味篩去不用止用枸杞子加熟
 地白朮茯苓各一兩同為細末煉蜜為丸如桐子大每
 服五七十九空心溫酒送下加甘菊一兩尤妙

右地黃枸杞補腎例按瞳子散大不當用羌蔚川芎附
 子今東垣滋陰地黃丸兼用者蓋有外障大小皆之醫
 故也

保柴胡散明目益腎水

柴胡 羌活 防風 生地

芍藥 甘草各等分

右為麗末水煎服

脾受邪者血病

東垣云肝木旺則火之勝無所畏懼而妄行也故脾胃先受之或病自而生內障者脾裹血胃主血心主脈也者血之腑也或曰心主血又云脈主血肝之竅開於目也亦前

熱地黃丸之類是也

參血鬱者目昧

河目昧不明熱也然玄腑者無物不有人之臟腑皮毛肌肉筋膜骨髓牙爪至於世之萬物盡皆有之乃氣出入升降之道路門戶也人之眼耳鼻舌身意神識能為用者皆升降出入之通利也有所閉塞者不能為用也若目無所見耳無所聞鼻不聞臭舌不知味筋痿骨痺爪退齒腐毛髮墮落皮膚不仁腸胃不能滲泄者悉由熱氣抑鬱玄腑閉密而致氣液血脈榮衛精神不能升降出入故也各隨

鬱結微甚而為病之輕重故知熱鬱於目則無所見也故目微昏者至近則轉難辨物由目之玄腑閉小如隔簾視物之象也或視如翳翼者玄腑有所閉合者也或目昏而見黑花者由熱氣甚而發之於且亢則害承乃制而反出其泣氣液昧之以其至近故雖微而亦見如黑花也

誠哉河間斯言也目盲耳聾鼻不聞臭舌不知味手足不能運用者皆由其玄腑閉塞而神氣出入升降之道路不通利故先賢治目昏花如羊肝丸用羊肝引黃連等藥入肝解肝中諸鬱蓋肝主目肝中鬱解則目之玄腑通利而明矣故黃連之類解鬱熱也椒目之類解濕熱也蒼蔚之類解氣鬱也苜蓿之類解血鬱也木賊之類解積鬱也羌活之類解經鬱也磁石之類解頭鬱墜邪氣使下降也蔓菁下氣通中理亦同也凡此諸劑皆

治氣血鬱結目昏之法而河間之言信不誣矣至於東垣丹溪治目昏用參芪補血氣亦能明者又必有說通之蓋目主氣血盛則玄腑得利出入升降而明虛則玄腑無以出入升降而昏此則必用參芪四物等劑助氣血運行而明也

羊肝丸三方又散一方並見肝條治肝中諸鬱目昏如神本治次年眼生黑花不明者

椒目炒一兩 蒼朮炒二兩

右件為末醋糊丸如桐子大每服二十九醋茶送下不過十日取效丹溪云椒目行慘道不行也

外補肝散治三十年失明蒺藜子七月七日收陰乾搗散飲食後水服方寸七

崔但瞳子不壞者療十得九愈蔓菁子六升蒸之看氣通

內障取
足厥陰
太陽手
少陰

用甌下釜中熱湯淋暴乾還林如是三遍即取杵篩為末食上清酒調二錢送下日再服本草云蔓菁子下氣利五臟又利大便通氣益氣

經治虛勞目暗昧三月蔓菁花陰乾為末以井花水空心調下二錢七久服長生

世五福還瞳丹治目白翳赤石脂川椒二味同炒辰砂茯神乳香末肉為丸如桐子大空心溫酒下百丸十服見効按內障先患一目次第相引兩目俱損者皆有翳在黑睛內遮瞳子而然今詳通黑睛之脈者目系也目系屬足厥陰足太陽手少陰三經蓋此三經臟腑中虛則邪乘虛入經中鬱結從目系入黑睛內為翳龍木論所謂腦脂流下作翳者即足太陽之邪也所謂肝氣衝上成翳者即足厥陰之邪也故治法以針言之則當取三經之腧穴如天柱風府太衝通里等穴是也其有手巧心

審論者能用針於黑眼裏撥其翳為効尤捷也以藥言之則當補中疎通此三經之鬱結使邪不入目系而愈今集龍本論免方于後

龍木論羚羊角飲子治圓翳內障不痛不痒

羚羊角三兩 細辛二兩 知母二兩 車前子一兩

人參二兩 黃芩各二兩 防風二兩

右為末每一錢以水一盞煎至五分食後去香溫服之

補肝散治肝風內障不痛不痒眼見花發黃白黑赤或一

物一形

羚羊角各三兩 防風各三兩 羌活各三兩 車前子一兩

人參各二兩 茯苓各二兩 細辛各二兩 玄參各二兩

黃芩炒各一兩

右為末食後調服一錢米飲湯下

羚羊角散治綠風內障頭旋目痛眼內痛澁者

羚羊角各一兩 防風各一兩 知母各一兩 人參各一兩

茯苓各一兩 玄參各一兩 黃芩各一兩 桔梗各一兩

細辛各一兩 車前子一兩

右為末以水一盞散一錢煎五分食後去香溫服之

羚羊角湯治青風內障勞倦加昏重頭旋腦痛眼內痛澁者

羚羊角各一兩 人參各一兩 地骨皮各一兩

羌活各一兩 車前子一兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去香溫服之

右四方皆羚羊角玄參細辛羌活防風車前子為君蓋

羚羊角行厥陰經藥也丹溪云羚羊角入厥陰經其捷

是也玄參細辛行少陰經藥也海藏云玄參治空中氣

肝中熱

氤之氣無根之火為聖藥也羌活防風車前子行太陽經藥也如筋脈枯澁者諸方中更加夏枯草能散結氣有補養厥陰血脈之功嘗試之有驗然此諸方又當悟邪之所在若氣脫者必與參膏相半服之氣虛者必與東垣補胃人參湯益氣聰明湯之類相半服之血虛者必與熟地黃丸之類相兼服之更能內觀靜守不于塵累使陰氣平伏方許作効

蘆薈丸黑水疑醫內障不痛不痒微有頭旋脈瀆者

蘆薈 甘草各一分 人參 牛膽各半

栝子仁 細辛各一分 羚羊角二兩

右為末煉蜜為丸如桐子大空心茶下十九

墜翳丸治偃月翳垂花翳等病微有頭旋額痛者

青羊膽 青魚膽 鯉魚膽各七熊膽一分

牛膽兩 麝香少 石決明

右為末麪糊丸如桐子大空心茶下十九

除風湯治五風痲成內障頭旋偏腫痛瞳人結白者

羚羊角 車前子 芍藥 人參

茯苓 大黃 黃芩 芒硝各一分

右為末水一盞散一匙煎至五分食後去渣溫服

磁石丸治雷風內障頭旋惡心嘔吐

磁石 煑赤醋 五味子 牡丹皮 乾薑

玄參各一分 附子炮半

右為末煉蜜丸如桐子大食前茶下十九

本治目方用黃連多矣而羊肝丸尤奇真用黃連末一兩白羊肝一具去膜同於砂盆內研令極細殺手撚為丸如桐子大每服以溫水下三十九連作五劑但是諸眼目疾

及障翳青盲皆治忌猪肉冷水唐崔承元為官治一死囚
 出活之後數年以病自致死一旦崔為內障所苦喪明逾
 年後半夜獨坐自歎忽聞塔除窸窣之聲崔問是誰徐曰
 昔年蒙恩活囚也今來報恩遂將此方告訖而沒依此合
 服不數月眼復得明
 入方治內障

白羯羊肝只用于肝一片熟地半兩 兔絲子
 蕤仁 車前子 麥門冬 地膚子去殼
 澤瀉 防風 黃芩 白茯苓
 五味子 桂心 杏仁炒 細辛
 枸杞子 茺蔚子 苦苧藤 青箱子各一兩
 右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四丸溫水下日
 三服不拘時候張臺卿嘗苦自肝京師香者令灸肝俞

遂轉不見物因得此方眼目遂明一男子內障醫治無
 効因以餘劑遺之一夕燈下語其家曰適偶有所見如
 隔門縫見火者及目視之眼中翳膜俱裂如線張云此
 藥靈勿妄與入忽之則無驗予益信之且欲廣其傳也
 經云肝虛則目眈眈無所見耳汨汨無所聞善惡如入將
 捕之狀海藏云目瞑肝氣不治也
 又鎮肝明目羊肝丸

羯羊肝一具新瓦盆中灯了更 甘菊
 羌活 栝子仁 細辛 官桂
 白木 五味子各半兩 黃連三分
 右為細末煉蜜丸如桐子大空心食前溫水下三四十
 丸

千補肝散治目失明方

青羊肝一具去三薄切之以新瓦瓶子未用者又肝於中炭火炙之為極細末

蓼子令香

右為末食後服方寸七日二加至三七不過一二劑能

治目眵眵無所見方用青羊肝一具細切以水一斗銅器中煮以麩餅覆上上鐵兩孔如入眼大以目向就薰不過再薰即瘥

肝血不足

濟養肝丸治肝血不足眼目昏花或生眵淚

當歸酒洗 車前子酒蒸 防風去 白芍藥

薤仁研 熟地酒蒸 川芎 枳實各等

右為末煉蜜丸如桐子大每服七十九熟水送下不拘時

本素問云久視傷血血主肝故勤書則傷肝主目昏肝傷

則自生風熱氣上騰致目昏亦不可專服補藥但服益血鎮肝明目藥自愈

熟地黃丸

熟地半斤 黃連 決明子各一 沒藥研

甘菊花二 防風 羌活各一 桂心研

硃砂研

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九熟水下食後

日三服

胆熱 明目髮不白落方用牛胆浸槐子陰乾百日食後每日

吞一枚十日身輕三十日白髮再黑百日通神

膽移熱於腦則辛頰鼻淵傳為翳障眼目全文見診

經云腎足少陰之脈是動則病坐而欲起目眵如无所

見○又云少陰所謂起則目眵无所見者陰內奪故目

腎虛

胆熱

眩上無所見也此蓋房勞目昏也

左腎陰

治瞳子散大諸方並見前陰虛睛散大視物花條

東益本滋腎丸必与前陰虛睛散大條相兼服

黃栢去皮挫碎

知母去毛挫碎酒洗炒各等分

右為極細末滴水丸如桐子大每服一百五十九熱湯

送下空心服後以乾物壓之

右腎陽

濟補腎丸治腎氣不足眼目昏暗瞳人不明漸生肉障

磁石煨醋焙十次水飛過

兔絲子酒蒸二次各二兩

五味子

熟地酒蒸

枸杞子

覆盆子酒浸

肉蓯蓉酒浸

車前子酒蒸

沉香

青鹽二味另研半兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服七十九空心鹽湯下

子神麴左主明目百歲可讀細書

神麴四

磁石煨醋焙七次一兩

光明砂

右為末煉蜜丸如桐子大每服五丸米飲下食前日三

服常服益眼力此方神驗不可具述

外治積年目失明不識人决明子二升杵散食後以粥飲

服方寸七本草云决明子微寒助肝氣益精水

千白瓜子七升絹袋盛撿沸湯中三偏暴乾以酢五升浸

一宿暴乾為末酒調方寸七服日三服之至百且可夜讀

書本草云白瓜子平安外台各補肝散主五勞七傷酸入肝

運氣

運氣目昏有四

一曰風熱經云少陰司夫之政風熱蒸布雲物沸騰太陰

橫流寒乃時至往復之作民病壅瞶此風熱蒸布目昏也

二曰熱經云少陰在泉熱淫所勝病目瞑治以鹹寒此熱

勝目昏也

三曰風又云歲水不及濕乃大行復則大風暴發目視眊眊此風勝目昏也

四曰燥經云陽明司天燥淫所勝目昧皆瘍治以苦熱是也

本讀書之苦傷肝損目誠然晉范甯嘗苦目痛就張湛求方湛戲曰古方宋陽子少得其術以授魯冀門伯次授左丘明遂世上相傳以及漢杜子夏晉左太冲凡此諸賢並有眼目疾此方用損讀書一減思慮二專內視三簡外觀四宜起晚五宜早眠六凡六物燉神火下以氣簇蘊於胸中七日然後納諸方寸修之一年近能數其目睫遠視尺筆之餘長服不已洞見瑤壁之外非袒明目乃亦延年審如是而行非可謂嘲戲亦奇方也

羅省郎中張子敬年六十七歲病眼自昏暗微黑色皮膚

不澤六脈弦細而無力一曰出示治目二方問子可服不子曰此藥以黃連太苦之藥為君諸風藥為使且人年五十膽汁減而目不明內經云土位之主其瀉以苦瀉風藥亦能瀉壬午年六十脾胃虛而皮肉枯重瀉其土使脾胃虛而不能營運榮衛之氣滋養元氣胃氣不能上存膈氣吐食諸病生矣又况年高衰弱此藥不可服只宜慎言語節飲食微愈空愈此不治之治也子敬以為然明年春除關西路按察司三年致仕還精神清勝脈遂平和此不服寒涼之劑也內經云誅伐無過是謂大感解之可也

靈黃帝曰人之哀而涕泣者何氣使然岐伯曰心者五臟六腑之主也目者宗脈之所聚也上液之道也口鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五臟六腑皆搖搖則宗脈感宗脈感則液道開液道開故涕泣出焉液者所

以灌精濡空竅者也故上液之道開則泣泣不止則液竭
液竭則精不灌精不灌則目無所見矣故命曰奪精補天
柱經俠頸俠頸謂頭

針灸

針灸內道有四法此篇是其一也

其二取肝經曰肝虛則目眈眈無所見善怒取其經厥陰
與少陰取血者是也

其三取腎經云腎足少陰之脈是動則病目眈眈無所見
視寒熱虛實取之也

其四取陽蹻經云邪之所在皆為不足上氣不足目為之
瞑補足外踝下留之是也

三眼久病昏花 肝膈一分沿皮向後 三里一寸沿

童子邪

子和其人女僮至西華自急暴直不見物戴人曰此相火

也太陽陽明氣血俱盛乃刺其鼻中攢竹穴與項前五穴
大出血目立明

甲青盲遠視不明承光主之 瞳子癢遠視昏眈眈夜無
見目潤動與項口相參引喎喎口不能言刺承泣 目眼
身汗出承漿主之

撮要眼無光 商陽一分沿皮向後

甲青盲商陽主之 瞳目眈眈偏歷主之 瞳目眈
眈少氣灸手五里左取右 取左 目眩遠視眈 目窻
主之 青盲瞳目惡風寒上關主之

金針開
內障法

龍木論內障根源歌

不疼不痛漸昏濛 薄霧輕烟漸濃
或見蛇飛花亂出 或如絲絮在虛空
此般狀樣因何得 肝臟停留熱與風

大叫大啼驚與恐
初時一眼先昏暗
苦口何須陳逆耳
此時服藥宜銷定
日久既應全黑暗
名字隨形分十六
靈藥這回誰得効
強修將息依前說

針內障眼法歌

內障由來十六般
分明一一知形狀
若將針法同圓翳
冷熱光明虛與實

腦脂流入黑睛中
次第相牽與一人
只緣肝氣不相通
將息多垂即沒功
時名內障雙瞳
龍師聖者會推窮
金針一撥日當空
莫遣依前病復踪

學醫人子審須看
下針方可得安然
誤損神光取瘥難
調和四体待今安

不然氣悶違將息
咳嗽震頭皆未得
若求涼藥銀膏等
老翳細針初復嫩
病虛新產懷娘月
不雨不風兼暗月
安心定意行醫道
患者向明盤膝坐
針者但行醫路
有血莫驚須在手
忽然驚振醫重
七日解封難見目
還睛丸散堅心服

囉逆勞神翳却翻
多驚先服鎮心丸
用意臨時體候看
針形不可一般般
下手總知將息難
清齋三日在針前
念佛親姻莫雜喧
提撕腰帶得心安
惻隱之情實善緣
裹封如舊毋開看
服藥三旬見朗然
花生水動莫忘言
百日分明復舊根

目次第相牽但拘翳一厚厚
 痛先患一短向後俱厚處發之
 拈去莫留短肉兼于所過之經
 針宜宜黑水疑翳初患時頭眩
 翳頭腦被打築惡血流入眼內
 雖不痛不痒其翳黃色紅色者
 宜針撥中心濃重者不宜針撥
 獨白翳黃心宜先服藥後針之
 針
 白翳黃心翳四邊白中心黃者
 烏風不宜針但瞳人小三五
 左翳眼前多見虛花或白或黑
 見一物二形二眼同患急宜補
 嘔吐雙自俱暗瞳子白如霜
 鼻頰骨痛眼內痛溢先患一
 後俱損無翳目見花或紅或黑

明虛不能近視

頰骨痛眼內痛溢先患一
 向後俱損無翳目見花
 勞倦加昏重○雷頭風變
 結白
 能遠視不能近視 能近視不能遠視
 東能遠視不能近視者陽氣有餘陰氣不足也乃血虛氣
 盛血虛氣盛者皆火有餘元氣不足火者元氣穀氣真氣
 之賊也元氣之來也徐而和細也如線邪氣之來也驟而
 強如巨川之水不可遏也
 海目能遠視責其有火不能近視責其無水法當補腎
 東地芝丸治阻不能近視能遠視及犬腐風成癩悉皆治
 之
 生地 焙四 天門冬 去心 枳殼 炒二 甘菊花 去皮
 右同為細末煉蜜丸如桐子大每服一百丸茶清送下

陽虛不能遠視

溫酒亦下食後六味地黃丸亦治此症
能近視不能遠視者陽氣不足陰氣有餘乃氣虛而血盛也血盛者陰火有餘也氣虛者元氣衰弱也此老人桑榆之象也

海目能近視責其有水不能遠視責其無水法宜補心
東定志丸出局治眼不能遠視能近視者

遠志法兩 人參兩 白茯苓去皮兩 菖蒲兩

右為末煉蜜丸硃砂為衣每服十九加至三十九

雀目日落即不見物

無蛤蚧丸治雀目日落不見物

蛤蚧研細 黃蠟分

右溶蠟搜粉為丸如棗大每用猪肝一片二兩許批開裹藥一丸麻線纏入瓦內水一碗煮熟取出乘熱熏目

至溫吃肝以愈為度神效

千雀目方

地膚子錢 決明子升

右二味為末以米飲汁和丸食後服二十九至三十九日服至瘥止

世治雀目用蒼朮四兩米泔水浸一宿切作片焙乾為末每服三錢猪肝二兩批開藥在內用麻線繫定粟米一合水一碗砂鍋內煮熟熏眼候溫臨臥服之大效

聖治雀目眼不計時月用蒼朮一兩搗羅為末每服一錢不計候

針灸

心雀目不能夜視 神庭 上星 前頂 百會 絡 瞳 睛 又法 照海 肝俞 目淚不止

心氣熾
目淚出

素厥則目無所見夫人厥則陽氣并於上陰氣并於下陽并於上則火獨光也陰并於下則足寒足寒則脹也夫一水不勝五火故目皆盲是以氣衝風泣下而不止夫風之中目也陽氣內守於精是火氣燼目故見風則泣下也有以此之夫火疾風生乃能用此之類也脈解精微論

子知凡風衝淚出俗言作冷淚者非也風衝于內火發于外風熱相搏由是淚出內外皆治可愈治外以貝母一枚白膩者加胡椒七粒不犯銅鐵研細臨臥點之治內以當歸飲子服之

當歸

大黃

柴胡

人參

黃芩

甘草

芍藥

滑石

右切碎每服三錢至五錢水一盞生薑三片同煎七分去渣溫服

寒濕積
滯淚出

肝為淚全文見五臟

恒水附木勢上為眼溢為淚為冷淚此皆由肺金之虛而肝木寡於畏也

孫英宗朝國婆婆患眼冷淚眼科醫官治二三年不能瘳上召孫係至曰臣非眼科但有藥耳容進方用石決明一兩赤小荳一兩半半夏五錢生班猫二十一粒炒去頭足木賊五錢為末薑汁丸如桐子大每服二十丸薑湯下方進聖旨下眼科詳定眼科醫官奏曰此方於眼科甚不相涉班猫有毒恐傷臟腑不敢用合再取聖旨國婆婆聞之曰眼科醫官不惟不能亦不愿使我治也但合此藥縱傷無怨上聞之孫自進藥服經十餘日愈六分二十日全愈時眼科並奉兩官孫賞錢三十萬銀海止淚方

蒼朮米泔浸一兩半木賊去節二兩香附子炒去
右為末煉糊丸如桐子大食後鹽湯下三九
經云風氣與陽明入胃循脈而上至目內眦則寒中而泣
出此中風寒淚出也

河當歸湯治風邪所傷寒中目淚自出肌瘦汗不止

當歸 人參各三兩 官桂 乾薑炮

白朮 白茯苓 甘草 川芎

細辛 白芍藥各半兩 陳皮一兩

右為末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚同煎至八
分去渣熱服不計時併三服

雜方 本治頭風冷淚龐安常二方

甘菊 決明子各二錢 白朮 羌活
川芎 細辛 白芷 荆芥穗各半兩

又方 右為細末每服一錢溫湯調下食後日三服

川芎 甘菊 細辛 白朮

右為末蠟丸如黍米大夜臥服一丸口中一時辰換一
丸

本治風盛隔壅鼻塞清涕熱氣攻眼下淚多眩齒間緊急
作頭痛川芎丸

川芎 柴胡略一 半夏麩 甘草炙
甘菊 人參 前胡 防風各半兩

右每服四錢水一盞生薑四片薄荷五葉同煎七分去
渣溫服

憂五臟六腑心為之主耳為之聽目為之視肺為之相肝

為之榮脾為之衛腎為之主外故五臟六腑之津液盡上
滲于目心悲氣并則心系急心系急則肺舉肺舉則液上
溢夫心系與肺不能常舉乍上乍下故欬而泣出矣
丹婦人患眼眩不思食四物湯加白朮陳皮黃芩連翹分
六貼煎食前熱服又灸合谷

用治眼淚出不止用黃連濃漬綿乾拭目

山風淚眼九節黃連和槐樹皮灰鹿末煨湯澄清頻洗

垣神効明目湯連翹飲子治淚不止二方並見

運氣淚出皆從風熱經曰厥陰司天之政三之氣天政布

風乃時舉民病泣出是也

針灸

集迎風冷淚眩暈黑花大骨空小骨空如上火灸二
間刺五分灸之合谷針

風沿爛眼

因風沿眼系上膈有積熱自飲食中挾熱氣而成頑痰

塞濁氣不降清氣不上升由是火益熾而水益降積而久

也眼沿因膿漬而腫於中生細小虫絲遂年久不愈而多

痒者是也用紫金膏以銀釵脚指去油膩點之試問若果

痒者又當去虫以絕根本蓋紫金膏止是去濕與去風涼

血而已若前所謂飲食挾怒成痰又須更與防風通聖散

去稍黃為細末以酒拌勻晒乾依法服之禁諸厚味及大

料物方盡諸法之要紫金方未詳即蘭室秘藏

防風通聖散方見

世蘆葇石散治爛風眼以蘆葇石不拘多少先用童便煨

七次次用黃連濃煎汁煨七次次用谷雨前茶清濃煎煨

七次又併三汁餘者一處再煨三次然後安放地上丁宿

出火氣細細研入冰片射香點上神妙蘆葇石煨時須用

好紫銷炭極大者鑿三穴以安蘆甘石
丹治風沿爛眼二蚕沙用香油浸所餘重綿纏過點之愈
久愈妙

世紫金膏用水飛過號丹蜜多水少文武火熬以器貯點
之

保治眼赤睛以青泥蛆淘淨晒乾末之仰臥合自用藥一
錢放眼上須臾藥行待少時去藥赤睛自無

針灸
中垣目睛赤爛歲久俗呼赤睛是也常以三稜針刺目外
以洩濕熱立愈

撮要風弦爛眼 大骨空 在手大指第二節小大 小骨空 在手小指二節尖
灸七壯亦吹火滅

湯虛
眼睫毛倒入眼中央是也 自煇食中疔

神效明目湯治眼楞緊急致倒睫拳毛損目及上脰比目
赤爛睛亦疼痛昏暗目則冷淚長流夜則眼眵滿眼

葛根一錢 甘草根錢 防風根一 蔓荊子五分
細辛根分

又一方加黃芪根錢
右咬咀作一服水一盞八分煎至一盞香稠熟臨臥
服効

防風飲子治倒睫拳毛

黃連炒 甘草炙 人參各一 葛根
防風各五 歸身半錢 細辛葉 蔓荊子各三

右劉如麻草大都作一服水二大盞煎至一盞香濕
服食後避風寒濕熱處眠之

神効黃芪湯治渾身麻木不仁及兩目緊急縮小羞明畏

白或隱澁難開或視物無力睛痛昏花手不得近或目少
睛光或目中熱如火服五六次神效

黃芪兩 大人參去蘆兩 甘草炙兩 蔓荊子對二

白芍藥兩 陳皮去白兩

右吹阻每服四五錢水一盞八分前至一盞去查臨臥
稍熱服如小便淋澁加澤瀉五分如有大熱證加黃柏
三錢酒浸四次炒如麻木不仁雖有熱不用黃柏再加
黃芪一兩如眼縮小去芍藥忌酒醋濕麪木料物蔥韭
蒜及淡參生冷硬物如麻木重甚者加芍藥一兩木通
一兩

檢書湯戊申六月徐總官患眼疾於上眼皮下出黑白翳
二箇隱澁難開兩目緊急而無疼痛兩手寸脈細緊按之
共大無力知足太陽膀胱為命門相火煎激逆行作寒水

霧及寒膜遮睛與下項一服神效外證呵欠善悲健忘
噴時自淚下面赤而白能食不大便小便數而欠氣上而
喘

黃芪分七 細辛葉分五 柴胡分七 生薑

荆芥錢一 防風半錢 羌活半錢 藁本錢一

甘草稍錢一 升麻錢一 葛根分五 川芎分五

知母錢一 黃柏半錢 歸身錢一

右判如麻荳大作一服水二大盞煎至一盞稍熱服
連翹飲子治目中溜火惡日與火隱澁小角偏繁久視昏
花迎風有淚

蔓荊子 甘草 連翹各分三 柴胡分二

酒黃芩分五 生地分三 防風分五 人參分三

黃芪分五 紅葵花分三 升麻錢一 歸身分二

羌活

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去渣稍熱食後服
前方治倒睫拳毛後三方治眼楞緊急縮小眼楞緊
縮小者倒睫拳毛之漸也故以其方附於後蓋陽虛則
眼楞緊急陰虛則瞳子散大故東垣治眼楞緊急用參
芪補氣為君佐以辛味疎散之而忌芍藥五味子之類
酸收是也治瞳子散大用地黃補血為君佐以酸味收
斂之而忌羌蔚子青箱子之類是也

治倒睫眼方以無名異末摻捲在帗中作捻子點着至藥
末處吹殺以烟薰之自起

本治倒睫爛弦

蠶沙

號丹

右二味慢火熬成膏入輕粉五分熬黑色逐時湯泡洗

瑞青黛散治眼倒睫極効

蝟刺

東棘針

白芷

青黛

右各等分為細末左眼倒睫口噴水左鼻內搗之右眼
倒睫右鼻內搗之

山眼毛倒睫摘去拳毛用虱子血點入眼內數次即愈

垣眼生倒睫拳毛由目緊急皮縮之致也蓋內大熱攻陰
氣外行當去其內熱并火邪使眼皮緩則眼毛立出翳膜
亦退用手法攀出內臉向外刺以三稜針針出熱血以左
瓜甲迎住針縫立愈

努肉攀睛

羅還睛散治眼翳膜昏澁淚出瘀血努肉攀睛

川芎

草龍膽

草決明

石決明

荆芥

枳實

野菊花

野麻子

熱

白茯苓皮去

甘草炙

木賊

白蒺藜

川椒炒去子

仙靈脾

茵陳已上各半兩

右為細末每服二錢食後茶清調下一日三服忌雜魚肉及熱麪蕎麥等物一方有猪實子無仙靈脾茵陳枳殼三味

圖治卒患赤白努肉生肉痛者最好梨一箇搗絞汁黃連三枚碎之以綿裹漬令色變仰臥注目中

外主目翳及努肉用礬石最白者納一黍米於翳上及努肉上即冷淚出綿拭之令惡汁盡其疾日減翳自消薄便瘡礬石須真白者方効

千治目中生肉翳滿目閉瞳子及生珠管方

貝齒七枚燒為末 真珠等分

右為細末如粉以注翳肉上不過五度即瘡

針灸

集努肉翳睛 睛明 風池 太陽出血 期門

雜方

治飛絲入目者用頭垢點入眼中即出神効○飛絲入眼用柘樹漿點上綿裹筋頭離水於眼上繳拭延毒○治飛絲入目以大麻子一合碎碎并花水一碗浸攪却將舌浸水中涎沫自出神効一方用麻子葉碎許如麻子法尤妙

飛絲落眼眼腫如眯痛澁不開鼻流清涕用京墨濃磨以新筆塗入目中閉目少時以手張開其絲自成一塊看

在眼白上却用綿輕輕卷下則愈如未盡再塗此方累効○治眯目鹽與鼓置水中浸之視水其查立出孫真千治稻麥芒入眼取蟬蟻以新布覆目上待蟬蟻從布上摩之其世出着布上

物落眼中用新筆蘸繳出○又方濃研好墨點眼立出

視岐亂見

精不相
比則視
岐

靈帝曰余嘗上清冷之臺中墮而顛亂前則感余私
異之竊內怪之獨瞑獨視安心定氣而不解獨搏獨眩被
髮長跪俛而視之後久之不巳也卒然自止何氣使然岐
伯曰五臟六腑之精氣皆注於目而為之精精之窠為眼
骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡其窠氣之精
為白眼肌肉之精為約束裹攝筋骨血氣之精而與脈荒
為系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虛
其入深則隨眼系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則目系
急目系急則目眩以轉矣邪中其精其精所中不相比也
則精散精散則視岐故見兩物

荀牧仲頃年嘗謂予曰有人視一物為兩醫作肝氣盛
故見一為二服瀉肝藥皆不驗此何疾也予曰孫真人曰

神勞則
精氣亂
視岐

靈樞有云目之系上屬於腦後出於項中云云則視岐故
見兩物也令服驅風入腦藥得愈

靈目者五臟六腑之精也榮衛竟鬼之所常營也神氣之
所生也故神勞則竟鬼散志意亂是故瞳子黑眼法於陰
白眼赤脈法於陽也故陰陽合轉而睛明也目者心之使
也心者神之舍也故神精亂而不轉卒然見非常處精神
竟鬼散不相得故曰惑也帝曰余疑其然余每之東死未
嘗不惑去之則復余唯獨為東死勞神乎何其異也岐伯
曰不然也心有所善神有所惡卒然相感則精氣亂視誤
惑感神移乃復是故間者為迷甚者為惑

素夫精明者所以視萬物別白黑審長短以長為短以白
為黑如是則精衰矣

右目亂見治法東垣益氣聰明之類是也

目閉不開

足太陽之筋為目上綱足陽明之筋為目下綱熱則筋縱目不開全文見

睛者目睛斜倒不

針灸

甲 睛目者水滯上之

集直視者視物而目睛不轉動者是也若目睛動者非直視也傷寒直視者邪氣壅盛冒其正氣使神氣不慧臟腑之氣不上榮於目則目為之直視傷寒至於直視為邪氣已極證候已逆多難治經曰衄家不可發汗發汗則額上陷脈緊急直視不能瞬不能眠以肝受血而能視亡血家肝氣已虛目氣已弱又發汗亡陽則陰陽俱虛所致也此雖錯逆其未甚也遠狂言反目直視又為腎絕直視搖頭又為心絕皆臟腑氣脫絕也直視譫語喘滿者死下利者

亦死又劇者發狂則不識人循衣摸床傷而不安微喘而且

視脈弦澀者死皆邪氣盛而正氣脫也

少陽終者其百節縱目裏絕系全文見診生死條目系絕

衆謂直視如鷺

目上視

瞳子高者太陽不足戴眼者太陽已絕全文見診生死條

轉動也

太陽之脈其終也戴眼反折瘵癢

針灸目上視見中風上

