

心場部

痛 卒心痛 妊產心痛 諸氣痛 胃痛胃滿 胃痺短氣
 煩躁 虛煩 胎產煩躁 懊懷 致悶 譫妄 產譫妄
 循衣撮空 飛屍鬼症 喜笑 健妄 諸痛 諸逆 衝上
 噫 下氣

心字綱目

十五





醫學綱目卷之十六

心小腸部

心痛 卒心痛

胎前心痛

產後心痛

諸般氣痛

寒熱

丹心痛即胃脘痛凡心痛必用溫藥此是鬱結不行阻氣不運故痛在下者多屬食宜溫利之大凡心膈痛須分新久若明知身受寒氣口喫寒物而得者於初得之日當與溫散或溫利之

身受寒氣宜溫散

溫散謂治身受寒氣於外者如陳無擇麻黃桂枝湯治

外因心痛之類是也方親表

口食寒物宜溫利

溫利謂治口食寒物於裏者如仲景九痛丸潔古煮黃

丸治大實心痛之類是也方見實條

久病為鬱熱宜寒之

若曰病得之稍久則成鬱又鬱則蒸熱熱久必生火原病式中備言之矣若欲行溫散溫利寧無助火添病耶由是



方中多以山梔為熱藥之向導則邪易伏病易退正氣復而病安矣然病安之後若恣縱口味不改前非病復作時乃委咎於醫誤也 大槩胃之有熱而作痛非山梔不可須薑汁佐之多用台芎開之 用山梔炒去皮每十五枚煎濃湯下呷入薑汁冷辣再煎少沸吞九枚加川芎一錢尤妙 又方用山梔去殼炒黃為末以薑汁調粥丸有寒者加草薺末丸服之

又方治氣實心痛

山梔去殼炒香附乙 茱萸錢一

右為末炒餅丸如花椒大以生地黃用酒洗淨同生薑煎湯下廿丸外用胡椒草撥各半兩為末以醋調稔成

九子吞之

心痛方

黃連炒

山梔炒

茱萸各五錢

荔枝核燒存性為末三錢

滑石

右為末薑汁化炒餅為丸

又方治心痛

白朮

白芍藥

砂仁

半夏

當歸各三錢

桃仁

甘草

黃連

神麴炒

陳皮

吳茱萸各一錢半 薑五

人參錢一

又方二陳湯加川芎蒼朮倍加炒梔痛甚者加炒乾薑此從治反治之法

暴病為寒宜溫之

保寒厥心痛者手足逆而通身冷汗出便利瀉清或大便利而不渴氣微力弱急宜以朮附湯溫之寒厥暴痛非及病也朝發暮死宜急救之是知久病非寒暴病非熱也朮附湯治寒厥暴心痛脈微氣弱附湯也

附子炮去皮白朮兩四 甘草一
右爲末附子令勻每三錢水一盞半薑五片葱一枚煎
至二盞去渣溫服食前

羅胃脘當心而痛治驗 漕運使崔君長男雲卿年二十
五體本豐肥奉養膏粱時時有熱證友人勸食寒涼物因
服寒藥至元庚辰秋瘧發醫以砒霜等藥治之新汲水下
禁食熱物瘧病未除反添吐瀉脾胃復傷中氣愈虛腹痛
腸鳴時復胃脘當心而痛不任其苦屢醫未效至冬不瘧
延至四月間勞役煩惱過度前證大作請予治之診視脈
得弦細而微手足稍冷面色清黃不澤情思不樂惡入煩
冗飲食減少微飽則心下痞悶嘔吐酸水每發作冷汗時
出氣促悶亂不安須臾額相抵而坐少時易乏予思內經
云中氣不足溲便爲之變腸爲之苦鳴下氣不足則爲痿

厥心寬又曰寒氣客於腸胃之間則卒然而痛得熱則已
非其辛大熱之劑則不能愈遂製一方名曰扶陽助胃湯

- 附子炮去皮一錢 乾薑炮一錢半 草薺薺 益智仁
- 棟參 甘草炙 官桂 白芍藥各一錢
- 吳茱萸 陳皮 白朮各五錢

內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦溫附子乾薑大辛熱
溫中散寒故以爲君草薺薺益智仁辛甘大熱治客寒犯
胃爲佐脾不足者以甘補之炙甘草甘溫白朮陳皮苦溫
補脾養氣水挾水氣亦來侮土故作急痛桂辛熱以退寒
水芍藥味酸以瀉木來剋土吳茱萸苦熱泄厥氣上逆於
胸中爲使右剋如麻苳大都作一服水二盞薑三片棗二
枚同煎至二盞去渣溫服食前三服大勢去痛減半至秋
先灸中脘三七壯以助胃氣次灸氣海百餘壯生發元氣

滋榮百脈以還少丹服之喜飲食添肌肉皮膚潤澤明年
春灸三里二七壯乃胃之合穴亦助胃氣引氣下行又以
芳香助脾服育氣湯加白檀香平治之戒以懲忿窒怒慎
言語節飲食一年而平復

身熱足冷煩躁

保熱厥心痛者身熱足冷痛甚則煩躁而吐額上自汗知
為熱也其脈洪大宜灸太谿崑崙表裏俱瀉之是為熱病
引熱下行汗通身出者安也灸後與金鈴子散痛止服枳
實白朮丸去其餘邪也

金鈴子散治熱厥心痛或作或止久不愈者

右為末每服三錢酒調下痛止與枳朮丸

外療峭心痛能膽如大葶許和水服大效本草熊胆味苦寒

仲心中寒者其人病心如噉蒜狀劇者心痛徹背背痛徹

寒飲

心譬如蠱注其脈浮者自吐乃愈

經云寒氣客於背俞之脈則血脈澁血脈澁則血虛血虛
則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣至熱氣至則
痛止矣此亦寒氣客心背而痛也

心痛徹背背痛徹心烏豈赤石脂丸主之

蜀椒兩 烏頭炮一分 附子炮半兩 乾薑炮一兩

赤石脂兩

石五味為末蜜丸如桐子大先食服二九日服三不效
稍加服

胸痺不得臥心痛徹背者括萎薤白半夏湯主之

括萎實一枚 薤白兩 白酒一升 半夏半斤

右四味同煮至四升服一升日三服
心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭

足上下痛而不可觸近大建中湯主之

蜀椒二合

乾薑兩

人參兩

右三味以水四升煮取二升去查內膠飴一升微火煎

取一升半分溫再服如二炊頃可飲粥二升後更服當

下且食糜溫覆之

心中痞厥逆心懸痛桂枝生薑枳實湯主之

桂枝

生薑各一兩

枳實五箇

右三味以水六升煮取三升分溫三服

聖治寒疝心痛四肢逆冷全不飲食用桂心二兩去皮搗

羅為散不計時候熱酒調下二錢匕

世果附湯治寒氣心痛

附子

草果

良薑等

以酒煎服立效

羅二薑丸參脾溫胃去冷消痰大治心脾疼寬胸下氣進飲食及一切冷物所傷並皆治之

乾薑炮

良薑

右等分為細末麪糊丸如桐子大每服十五丸至二十

丸食後陳皮湯姪婦人不宜服

右方辛甘熱以散寒結

世治心痛累效白梅一箇去核生硫黃為末相和搗勻以

可丸為度作二丸白湯下立愈病不再作

右方酸熱以收散寒凡服辛劑反甚者改服酸劑立愈

也

丹客寒犯胃草薺丸主之熱亦宜用止可三二服

草薺薺

一錢四分麪果煨熟去皮脂

吳茱萸湯泡洗

焙乾

益智仁

僵蚕炒

歸身

青皮各六分

神麴 薑黃各四分 生甘草 三分 桃仁 七枚 去皮
 半夏 湯泡七次 一錢 澤瀉 利水 一錢 小便 麥蘗 炒黃 一錢 半
 炙甘草 六分 柴胡 四分 詳脇下 人參
 黃芪 陳皮

右一十八味除桃仁另研如泥外為極細末同研勻湯
 浸炊餅為丸如桐子大每服三十九丸熱白湯送下食遠
 旋斟酌多少用之

監縣之問年五十餘春末心脾疼自言腹脹滿手足寒過
 肘膝須綿裹火烘胸襟畏熱却喜掀露得風涼則快脈皆
 沉細而澁稍重則絕輕取似弦而短口渴乾而喜熱飲穀
 肉全不食遂以草苜蓿丸三倍加黃連滑石炒神麴為丸
 白朮為君茯苓為佐陳皮為使作湯送下一百丸服至二
 斤諸証皆愈

虛以物桂按而痛者按虛以二陳湯加炒乾薑和之

按之痛止者為虛治法並見寒心痛條丹溪五草苜蓿丸
 治氣餒弱人心痛方見寒熱通用條

仲九痛丸治九種心痛

附子 三兩 生狼牙 一兩 巴荳 一兩 去皮心

人參 乾薑 吳茱萸 各一兩

右六味為末煉蜜丸如桐子大酒下強人初服三九日
 三服弱者二九兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連
 年積冷流注心胸痛併冷腫上氣落馬隊車血疾等證
 皆主之忌口如常法

寒實 膠黃丸治大實心痛 方見飲
 蒙本湯治大實心痛大便已利宜以此徹其痛也

蒙本 兩 蒼朮 兩

右劉每服一兩水二盞煎取半盞溫服

右寒實

熱實

御按之心下滿痛者此為實也當下之宜夫柴胡湯傷方見
子和一將軍病心痛不可忍戴人曰此非心痛乃胃脘當
心痛也內經曰歲木太過民病胃脘當心而痛乃與神祐
丸一百餘粒病不減或曰此胃脘有寒宜溫補不宜與涼
劑將軍素知戴人明了復求藥於戴人戴人復與神祐丸
二百粒作一服大下六七行立愈神祐丸方見水腫門

右熱實

食積痛

蔣氏子年十六久瘧方愈十日而心脾大痛兩手脈皆
伏痛稍殺時氣口噤盛餘脈皆發實而細予曰此宿食也
詢之因食冷油煎堆子遂以小胃丹津嚥半餘粒仍斷飲
食經三日凡與小胃丹十二次痛不作至晚心忽大痛連

及兩脇予曰此必與穀太早問之果然遂斷其飲食初與
藥蓋宿積已因小胃而稍解其痛又因新穀與餘積相併
而復作若又攻擊必大傷胃氣所以不與藥又斷食三日
其家大恐以為不救時有怨言予曰六日不能思食強禁
不與方成惡候待其索食與之又須較量方可至夜更餘
心嘈索食予先用白朮黃連陳皮作丸并遂以熱湯下七
八十九以除其嘈雜若以為飢而與藥其痛必如前矣其
家苦欲與予詢病者隔間莫尚問否答曰我纔飢作必繼
之薄悶今雖未甚快然亦未嘗思食過兩時許又索食予
以前丸與之如是者又一晝夜飢不再作人亦昏困思睡
予教以用稀粥減平日之半兩日禁其雜食調理半月而
安小胃丹方見飲食內傷

保心痛用小胃丹津下十五丸

右漸除熱宿食積法

世木香丸治食積心痛

木香

丁香

三稜

蓬朮

青皮

陳皮二錢半

檳榔二錢

白芷一錢

巴豆肉十五粒用醋煮令無白心

右末醋糊丸麻子大

本治一切積聚有飲心痛礪砂丸

礪砂

三稜另末

乾薑

香白芷

巴豆去油各半兩

大黃另末

乾漆各半兩

木香

青皮

胡椒各一分

檳榔

肉苁蓉各一分

右為細末醋醋二十升煎五七沸後下三稜大黃末同煎

五七沸入礪砂同煎成膏稀稠得所入諸藥和勻杵丸

如葶苈大年深成塊生薑湯下四五丸食積熱水下白

刺乾薑湯下赤刺甘草湯白刺當歸湯蔥酒亦得

厚朴丸紫苑丸治積聚心痛厚朴丸方見翻胃紫苑丸方見積塊

心傷者其人勞後即頭面赤而下重心中痛而自煩發

熱臍跳其脈弦此為心臟所傷也

外因痛丹心痛輕者散之麻黃桂枝重者加石碱用川芎蒼朮炒

山梔作丸服

桂枝

麻黃

石碱

右為末薑汁浸軟餅為丸桐子大熱薑湯下十五丸如

服丸數多又治痰飲

無麻黃桂枝湯治外因心痛惡寒發熱內攻五臟拘急不

得轉側

麻黃去節湯浸焙

桂心

芍藥

細辛去苗

乾薑

甘草炙各七錢半

半夏

香附各五錢

右劉每五錢水薑半生薑五片煎七分去查食前服大便秘入大黃量虛實加減

世治心疼甚效

檳榔 桂心 葛根 甘草

細辛 半夏 桔梗 枳殼

川芎 防風

右等分惟甘草半之水煎服有人心疼諸藥不效服此愈

丹青巖劉山長子年三十六歲得心疼十八年矣因酒飲牛乳病發時飲食無得得病八年後盛暑及沐浴飲食時皆無汗中間更醫不一悉以丁附諸丹等熱藥治之至是黃瘦食減若不勝衣痛作時須以三物桂之診其脈皆三至弦弱而清未風先寒大便或閉或泄最苦是胸膈吞酸

七月內遂以二陳湯加白朮黃連黃芩桃仁郁李仁澤瀉每日用此藥飲而出之所吐皆苦黑水雜以如浸木耳片者此日却再與兩貼飲而不出如此兩月近二百餘貼澀脈漸退至數漸添忽一日診其脈純弦漸有充滿之狀時正立冬後頗暄暖意其必欲作汗又意其血氣未充汗難以發以人參黃芪芍藥當歸陳皮半夏甘草調理二日此時痛雖緩每晝夜一二作至第三日與麻黃蒼朮當歸川芎甘草等藥纔下咽目上視口噤面無神色予呼之不應見其四肢不收急以左手抱其頭就坐於床以右手拊指捻其人中須臾而愈通體汗如雨自此痛不復作但人倦食未增耳續又大為噤酸所苦每一晝夜六七作其作時有一酸塊自胸膈間直衝上咽喉情狀極惡遂悉罷諸藥以黃連濃煎取冷俟酸塊欲上時以冷黃連汁數滴與之

即同如此六七次半日許其塊亦除於是罷藥淡粥調養
又近三箇月時以立春節節餘中腕處微有脹急面帶青
色氣息喘促時天氣尚寒意謂脾土因久病衰弱木氣行
令此肝凌脾急以索短三和湯與之至四日而安

一婦人年四十餘歲因二十年憂慮後心痛或可按或不
可按食甚減口渴而不能飲水形瘦骨立心痛止則頭痛
作其痛無常處頭痛止則心痛作夜間全不寐大便七八
日一行堅小而黑而出亦難累與四物加陳皮生甘草前
後約百餘貼病雖不增却無退減予曰此肺久為火所鬱
氣不得行由是血亦畜塞遂成汚濁氣壅則頭痛血濁不
行則心痛通一病也治肺當自愈遂做東垣方清空膏例
細切黃芩酒令赤色為細末以熱白木湯調下頭上稍汗
如此十餘貼漸漸汗至通身及膝而止諸病皆愈因其膝

下無汗形瘦病久小便數大便澁兩手皆見澁服當歸補
血以防後患問其又思水而不飲遂與四物加陳皮生甘
草桃仁酒入以補之遂安
裏實心痛並見按之滿痛為實條丹溪云心痛脈堅實不
大便秘者下之

虫痛

羅化虫丸

鶴虱

檳榔

胡粉炒

苦練根去厚

五十

白礬飛十

右為末麩糊為丸桐雨大小兒疾病多有諸虫或因臟
腑虛弱而動或因食甘肥而動動即腹中疼痛往來上
下攻心痛則哭不休合眼仰身撲手心神悶亂嘔噦涎
沫或吐清水四肢羸困面青色黃飲食雖進不生肌肉
或寒或熱沉沉默默不的知病處一歲兒服五丸溫漿

下入香油一兩點打勻下之米飲亦得其虫自下

保妙香丸治男子婦人心痛強中搐熱如癩狀方見

風癩者羌活湯引下妙香丸羌活湯方見諸風條血癩者當歸湯

引下妙香丸當歸湯方見諸血條

虫痛者面上白斑唇紅能食治用練根錫灰之類脈堅實不大便者下之

羅補金散治諸般虫

鶴虱生 雷丸 定粉 錫灰已上各等分

右為末每服三錢空心少油調下又用猪肉一兩燒熟摻藥在上細嚼亦得用翎毛掃甘遂末一錢與前藥一處服之其虫自下

本治寸白虫方黑鉛灰炒四錢下服先喫猪肉脯少許一時來却用砂糖濃水半盞調灰五更服虫盡下白粥將

寸白

又療寸白虫用錫灰蕪荑檳榔者極佳宜和中每覺心中多嘈雜意欲作飲又疑虫漫依此方所說翌日下長虫二條一長二尺五寸頭扁闊尾尖銳每寸作三節斑如錦紋一條皆寸斷矣千金謂勞則生熱熱則生虫心虫曰蛔脾虫曰寸白腎虫如方截絲縷肝虫如爛杏肺虫如蚕皆能殺人惟肺虫為急肺虫居肺葉內蝕入肺系故成瘵疾咯血聲嘶藥所不到治之為難道藏中載諸虫頭皆向下行唯自初一至初五以前頭上行故服藥多取月朞以前蓋為此也

取寸白虫方 畫粉 密陀僧各等分

右為末每服二錢用麻油調服空心下頃刻成涎取下

取寸白虫 錫灰兩 木鱉 蘆薈各二十文

黃丹文十

輕粉文十

右為末猪膏油丸如桐子大先齋一日晚黃飯次早
五更溫水調下分作二服

制虫制勞悅肌膚去勞熱

檳榔半一兩

龍膽草一兩

乾漆半兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服十九至十五丸熟水
吞下

張仲文治寸白虫熬胡粉冷燥平且作肉腫以藥方寸七
入腫中服之效

丹治諸虫練皮細末米飲調下二錢七斗門

千生脾胃有虫食即痛面黃無色疼痛無時以石州蕪蕒
仁二兩和麩炒令黃色為末非時米飲調二錢七瘥

經治蛔虫吐水心痛鶴虱二兩為末蜜丸平且漿水服二

十九愈千金方為末空心溫醋湯下虫當出

經胃宿食冷多寸白虫每朝空心熱酒調山荳根末三錢
服之其虫自出

簡治諸虫在臟腑久不瘥檳榔半兩炮搗為末每服一錢
至二錢蔥蜜煎湯調下空心

外療蛔虫心痛惡心吐水乾漆熬搗蜜丸服十五丸日再
服

范疳治寸白虫方狼牙五兩搗末蜜丸麻子大隔宿不夜
食明且以漿水下合服盡愈

大治寸白虫以酸石榴東引根一握淨洗細剉用水三升
煎取半碗已下去查五更初溫服盡至明且取下虫一大
團永絕根本白喫粥補之

本金櫻東行根治寸白虫剉二兩入大米三十粒水二升

煎五合空心服須臾瀉下

治寸白虫葉黃根洗去土四兩切以水酒各一升漬一宿平旦分再服凡葉黃皆用細根東北陰者良若稍大如指已上者皆不任用

食治蛔虫心痛面青口中沫出取臨水扁蓄葉一斤細切以水三斗煮如飴去渣空心服一升虫即下至重者再服仍通宿不食來日平明服之效

本取寸白虫苦絲瓜不以多少研為末每服二錢好酒二盞空心調服

竹木香三稜散治腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑牽牛半生 大腹子多 檳榔 雷丸
錫灰醋炒 三稜煨 蓬朮煨 木香
大黃上各

右為細末每服三錢空心用蜜水調下或砂糖水亦可須先將燒肉一片口中半嚼之休嚥下吐出口中肉汁後服藥

右方有攻性而下虫者

本崔元亮海上方治一切心痛無問新久以生地黃一味隨入所食多少搗取汁搜麩作餅餽或冷淘食良久當利出虫長一尺許頭似筆管後不復患至元十年通事舍人崔抗女患心痛垂氣絕遂作地黃冷淘食之便吐一物可方一寸如蝦蟇狀無目足等微似有口蓋為此物所苦自此頓愈麩中忌用鹽

丹治蚘虫吐清水氣口刺痛取生艾汁隔宿勿食以肥香脯方寸片先喫令虫聞香次即飲一升必下蚘虫胸喉中覺有虫上下偏喜聞葱豉油食之香者兩三日不食開口

而臥將油煎蔥豉令香放口邊重當自出引而去之但隨所喜物用之亦可

世治心痛稀荻草搗汁醋和服之效有人服此吐虫二條終身不發

子和酒官楊仲仁病心氣痛此人常好飲酒初飲二三杯必奔走三五十次其酒稍散方能復席飲至前量醉後至明日嘔清黃水數口夜變魚腥臭六七日始安戴人曰宜吐乃吐虫一條青黃色長六七寸口目鼻俱全二百膜瞞狀如蛇類楊醃乾示人

仲虺虫為病令人吐涎心痛發作有時毒藥不止甘草粉蜜湯主之

甘草二兩 粉一兩 蜜四兩
右三味以水三升先煮甘草取二升去查內粉蜜攪令

和煎如薄粥温服一升瘥即止

孫白大王宮中有一宮人七太尉所寵也忽患一疾凡惡心則吐虫數條後乃頻作七太尉甚怒之累治不瘥每用殺虫藥則吐虫愈多召孫診之孫曰六脈皆細非虫脈也今雖吐虫乃臟寒而虫不安失居上膈因而吐出復用殺虫藥虫為藥所苦不能自安所以吐虫愈多也孫遂用藥不三五服皆一色在子虫遂不吐明白再召孫至六脈漸大進前藥其病不作後求方乃硫黃附子各二兩並末粳米糊為丸每二十九丸米飲下

仲烏梅丸治方見傷寒厥陰病

河止氣天香散治心痛但忍氣則發者方見虛實法

丹心痛脈澁者有死血又云作時飲湯水下作吃者有死

血桃仁承氣湯下之方見傷寒 凡治證必要先問起居何如

氣痛 血痛

假如心痛有因平日喜食熱物以致死血留於胃口作痛用桃仁承氣湯下之切記輕者用韭汁桔梗能開提其氣血藥中兼用之

經失笑散治婦人心痛氣刺不可忍五灵脂淨好者蒲黃等分為末每二錢用黃醋一杓熬成膏再入水一盞煎至七分熱服效

世手拈散治心脾疼極驗詩云草果玄胡索灵脂并沒藥酒調三二錢一似手拈却又治心痛劉寄奴末六錢玄胡索末四錢薑汁熱酒調服妙

簡治九種心痛腹脇積聚滯氣筒子乾漆二兩搗碎炒出烟細研醋煮麪糊和丸如桐子大每服五丸至七丸熱酒下醋湯亦得服無時

外治心痛當歸為末酒調服方寸七

痰痛

世治心痛亦能治哮喘半夏研碎香油炒薑汁炊餅為丸薑湯下二十九

五味鹹更堅條海蛤丸寒條括萎半夏菲白湯表條桂麻石碱丸皆治痰飲心痛之妙劑也

世治心痛累效陳年白蠅殼洗淨為末熱酒調下三錢半即愈

世一味牡蠣粉酒調下三錢氣實者可用治痰飲心痛海蛤丸

海蛤燒為灰研極細過數日火毒散用之 瓜萎仁帶穰

右以海蛤入瓜萎內乾濕得所為丸每服五十九

又方治脾疼海蛤粉佐香附末用川芎山梔生薑汁煎辣湯調服為佳

雜方 治血氣攻心痛不可忍以藜根剉酒浸服之瘥

世心痛枯槁辰砂少許每半錢人參湯調下一方用白礬辰砂糊丸好醋吞下神效又方辰砂一味研好醋調服效又方用白礬為細末每服一錢茶調下

外黃連湯肘後龍膽湯並見本心痛熱條

仲粉蜜丸脾受肝制而急故重不安用粉蜜之甘緩以安

之方見重條

素少陽所謂心脇痛者言少陽盛也盛者心之所表也九月陽氣盡而陰氣盛故心脇痛也所謂不可反側者陰氣藏物也物藏則不動故不可反側也脈解篇

瑞蚕沙散治男子婦人心氣痛不可忍者晚蚕沙不拘多

少為細末用滾湯泡過濾淨取清水服之立止又方黃

荊子炒焦為末米飲調下亦治白帶治心痛用洗淨玉

簪花根搗濃汁雜和好酒一半熱服

運氣

治心腹俱痛以布裹椒薄注腹上火熨令椒汗出良運氣心痛凡熱風濕寒燥五氣之初皆能于心而痛蓋心為五臟之主故也

白熱邪于心經云少陰司天熱淫所勝病心痛肺脹又云少陰之復暴疇心痛又少陽之勝熱客於胃煩心心痛又云陽明司天燥氣下臨暴熱至其則心痛此在泉之熱為痛治皆以寒劑是也

二曰寒邪于心經云太陽司天寒氣下臨其則心痛又云陽明司天之政四之氣寒雨降病心痛又云歲水太過民病上下中寒煩心躁悸心痛又云歲金不及炎火乃行復則寒雨暴至心痛又云水鬱之發民病寒客心痛又云太陽司天寒淫所勝病厥心痛又云太陽之復心胃生寒心痛痞滿又云少陽在泉主勝則熱反上行而客于心心痛

蓋終之氣寒勝其客也又云歲火不及寒乃大行病鬱胃
蒙昧心痛又云太陽之勝寒厥入胃則内生心痛皆治以
熱劑是也

三曰風邪于心傷胃經云少陽司天政終之氣風乃至
心痛又云少陽司天風行于地心痛胃脘痛脘不通又云
歲水不及濕乃大行復則暴風大發高痛於心腹又云
木鬱之發民病胃脘當心而痛脘咽不通又云厥陰在泉
風淫所勝心痛支滿又云厥陰司天風淫所勝胃脘當心
而痛又云厥陰之復厥心痛又厥陰之勝胃脘當心而痛
治皆以涼劑是也

四曰濕邪于心經云土鬱之發心痛脇脹又云太陰在泉
濕淫所勝病飲積心痛又云太陰之勝火氣內鬱心痛熱
格治皆以熱劑是也

五曰燥邪于心經云陽明之復善太息心痛痞滿治以溫
劑是也

六曰寒熱中于心經云少陰司天之政寒熱凌犯而爭於
中寒厥入胃心痛二之氣大火行寒氣時至民病氣厥心
痛治分寒熱多少調之是也

針灸
厥心痛者他臟病于之而痛皆有治也真心痛者心臟自
病而痛故夕發且死且發夕死無治也然心臟之經絡有
病在標者其心亦痛而有治經云心手少陰之脈是動則
病隘乾心痛渴而欲飲又心主手少陰之脈所生病者心
痛掌中熱皆視盛虛熱寒隔下取之又經云手心主之別
名曰內關去腕二寸出於兩筋之間實則心痛取之兩筋
間也又云邪在心則病心痛喜悲時眩仆視有餘不及調
其俞是也

靈厥心痛通背相控善與如從後觸其心僂僂者腎心痛也先取京骨崑崙發針不已取然谷厥病篇下同

心痛引背灸刺法有四

其一取足太陽經刺節云取京骨崑崙者是其穴也蓋足太陽之正循脊當心入散絡故心痛引背取之也
其二取足少陰經刺節云取京骨崑崙不已取然谷者是其穴也又經云腎足少陰經之脈所生病者煩心心痛視盛虛熱寒陷下取之也又經云心痛引腰脊欲嘔取足少陰者是也蓋足少陰脈貫脊絡心故亦治心痛引背也
其三取足少陽經云心痛引背不得息刺足少陰不已取少陽者是也蓋手少陽之脈散絡心脈又三焦下俞曰委陽是足太陽絡足太陽循脊當心入散絡故亦治心痛引背也

其四取督任脈經云背與心相控而痛所治天突與十椎及上紀上紀者胃脘也下紀者關元也又云心痛當九節刺之按已次按之立已不已上下求之得之立已者是也蓋十椎與九節者督脈也胃脘與天突者任脈也

厥心痛腹脹胸滿心尤痛甚者胃心痛也取之太都太白心痛兼脹灸刺法有二

其一取足太陰經云取太都太白者是其穴也又經云脾足太陰之脈是動則病胃脘痛腹脹所生病者煩心心中急痛者視盛虛熱寒陷下取之又云心痛腹脹齋齋然太便不利取足太陰者是也蓋足太陰脈從胃上膈注心中故心痛腹脹者取之也

其二取足陽明經云胃病者腹脹胃脘當心而痛飲食不下取之三焦者是也蓋胃脘當心痛者似心痛實非心痛

也厥心痛如以錐針刺其心心痛甚者脾心痛也取之然谷太谿

脾心痛而取然谷太谿者故孫真人張潔古謂之妄經也

厥心痛色蒼蒼如死狀終日不得太息肝心痛也取之行間太衝

心病色蒼如死狀者取肝其兼小腸滿便溲難者亦取肝經云心痛引少腹滿上下無常處便溲難刺足厥陰

是也

厥心痛臥若徒居心痛間動作痛益甚色不變肺心痛也取之魚際太淵

徒居謂間居間謂痛緩心痛臥與閑居則痛緩動作則

益甚者取肺其兼短氣者亦取肺經云心痛但短氣不足足以息刺手太陰者是也

心痛不可刺者中有盛聚不可取于胸膈中有虫瘕及蛟蛸皆不可取以針心腸痛懷作痛腫聚往來上下行痛有休止腹熱喜瀉涎出者是蛟蛸也以手聚按而堅持之無令得移以大針刺之又持之至不動乃出針也

集九種心痛 間使 靈道 公孫 太衝 三里 陰

陵泉

心氣痛 巨缺 雄尾各揆 興隆 瀉之

撮脾脊後心疼痛 中渚 瀉之 灸心痛背上穴 心俞

高俞

心痛脈弦肝原穴 脈沉腎原穴 脈瀉肺原穴 脈

浮心原穴 脈緩脾原穴

醫學綱目卷六

六

臍冷心痛 巨缺臍刺之如五臟氣相干而脇痛

玉 心脾疼 上腕二寸 中腕二寸半 補多瀉少

甲 心痛不可按煩心巨缺主之 心痛有虫多涎不得反

側上管主之 心痛上搶心不欲食支痛引高建里主之

撮 心胸痛并氣攻 勞官 大陵各三分 內關

甲 心痛善悲厥逆懸心如飢之狀心恒而驚太陵及間使

主之 心寒痛難以俛仰心疝衝胃死不知人中腕主之

心痛嘔噦嘔血驚恐畏久神氣不足郄門主之

難 陰維為病苦心痛內關穴

甲 脾逆氣寒厥急煩心善唾噦噫胸滿噉呼胃氣上逆心

痛太淵主之臍云肺 心脹痛尺澤主之千金云心煩悶

息 心痛卒欬逆尺澤主之出血立已 胸痺心痛肩內

麻木天井主之 胸脇背相引而痛嘔吐不食鬲門主之

診

胸痺心痛不得息痛無常處臨泣主之千金云不

甲 心痛雖日數多不喫飯不死若痛止便喫物還痛必須

三五服藥方可喫物 心痛左手脈數熱多脈濇有死血

右手脈實是痰積 脈大必是久病 兩手脈堅實不

太便者下之 痛甚者脈必伏多用溫藥附子之類不可

用參朮

心脈微急為心痛引背食不下全文見治

沉問曰病腹痛有虫其脈何以別之師曰腹中痛其脈當

沉若弦反洪大故有虫 脾脈微滑為蠱毒蝮蝎腹熱

虛實法

脈關上脈繁而滑者蛇毒 脈沉而滑者寸白 肘後虛

以下三寸寸執者腸中有虫全文見診 真心痛手足青至腕

心痛甚且發死夕發且死

熱刺生
虫故脈
洪大者
主頭

寒

醫學綱目卷六

六

寒

卒心痛

竹治急心疼方

斑猫七箇胡椒四粒

右將二味同炒令斑猫焦碎吹去斑猫不用却將淨胡

椒研為細末只作一服熱酒調下不拘時候

治暴心痛不可忍者

荔枝核丹溪云荔枝核

右為末每服一錢水醋各半盞煎七分稍熱服

治卒心痛黃連八兩一味吹咀水七升煮五升絞去渣

温飲五合日進三服

治卒心痛龍膽草四兩酒三升煮一升半頓服

走馬湯治中惡心痛腹脹太便不通

巴豆二枚去杏仁二枚

實

熱

有虫

右二味以綿纏槌令碎熱湯二合捻取白汁飲之當下

葱白三五根去皮鬚葉搗為膏將病人口幹開用是將膏

送入咽喉用香油四兩灌送下油不以多少但得葱下喉

其人必甦少時將腹中所停虫病等物化為黃水微得利

為佳除根永不再發累效一方用真香油頓服三盞亦妙

治卒心痛白艾成熟者一升水二升煮取一升去查頓

服若為客氣中者當吐虫丹溪云艾屬火而有

治卒心痛東引桃枝一握切碎以酒一升煎去半升頓服

大效

經云邪客于足少陰之絡令人卒心痛暴脹胸脇支滿無

積者刺然骨之前出血如食頃而已不色左取右右取左

針灸

雜方

病新發者五日已

痛卒心痛不可忍

上腕八分先補後瀉覺針下氣行如

氣海

湧泉無積者刺之如食頃而已有積者飲藥利之刺之立已如不已再刺後

間使支溝 三里

丹鍼灸經治卒心痛不可忍吐冷酸水及原臟氣少不足

大指次指內約文中各一壯如小麥大下火立瘥

甲卒心痛瘳癢互相引肘內廉痛心散然間使主之

卒心痛汗出大敦主之出血立已 心腹中卒痛而汗出

石門主之

胎前心痛

大治妊娠卒心痛氣欲絕

川芎

當歸

茯苓

厚朴各等

右水六升煎二升分二服

白水散治妊娠卒心痛欲死不可忍者

白水

赤芍藥略二黃芩半一兩

右水六升煮取二升半分三服半日令盡微下水令易

產忌桃李雀肉

產後心痛

羅火龍散治產後心痛

艾葉

鹽炒

茴香炒

川練子炒各

右為末水煎服

大治婦人血崩心痛甚者名曰殺血心痛小產下血過多

而心痛者亦然用烏賊魚墨炒為末醋湯調下

此魚腹多

救治產後血不盡心腹痛荷葉燻令香為末水煎下方寸

失笑散治心腹痛百藥不效服之即愈

方見心痛

汚血條

人過必吐其

墨以散身

墨以散身

墨以散身

寒

大 全崖蜜湯治產後血寒心痛

熟地

當歸

獨活

吳茱萸

芍藥

乾薑

甘草

桂心

小草

各一兩 細辛半兩

右為散每服半兩水三盞煎至三盞去查稍熱服

聖治產後惡血衝心痛氣悶欲絕用桂心三兩搗羅為散

狗膽汁和丸如櫻桃大不拘時候熱酒磨下二九

諸般氣痛

大法

丹氣痛一身腔子裏氣痛少用木香於藥內行得開

河正氣天香散治婦人一切諸氣或上癢心胸或攻築脇

肋腹中結塊發渴刺痛月水不調或眩暈嘔吐往來寒熱

減食方見治虛實氣血條

調氣方

香附四兩

人參兩

烏藥三兩

砂仁兩

甘草多

右為細末熟湯調服

本治脾積氣婦人諸般氣痛

香附五兩

蓬木醋

甘草各二兩

右各淨研為細末每服二錢入鹽少許百沸湯空心熱

服

治一切氣疾丈夫婦人撞心冷氣並皆治之

香附

一斤炒

陳皮

四兩

甘草一兩

右為細末每服二錢空心鹽湯點服

丹寬中丸

枳殼為末酒糊丸

婦人患氣痛喜食熱物二陳湯加木通薑五片煎下保

和丸
濕痰

女子患氣痛要揉者曾服烏沉湯有效又再發

陳皮六錢 半夏 青皮兩半 芍藥二錢
木通 川芎 柴黃一錢 甘草五分

右分五貼薑三片煎服
明五院君出外怒婦膈痞痛不思食脈沉弦稍數此氣柳不通也

半夏三錢 青皮 枳殼各二錢 黃芩
芍藥各錢 木通 甘草各錢

右薑三片煎取半盞下保和丸三十粒
三七嫂怒後氣痛脈沉不思食

青皮一錢 柴胡半錢 甘草一錢 半夏一錢
黃芩五分 木通三錢 陳皮五分

熱

右薑三片煎服
感柿婦人五十七歲氣痛不可按漸漸痛至足

青皮 芍藥各三錢 川芎 陳皮各三錢
黃柏炒 木通各一錢 甘草些

寒

本治婦人室女血氣刺痛不可忍日夜叫喚可憐者一服效

芸薹子 肉桂板桂 良薑 沒藥各等分

右焙乾為末每服三錢乳香湯調下熱服不拘時候
心腹中結伏氣杏仁陳皮桂心訶黎勒皮為丸空心

實類

本和氣散治男婦一切氣疾他藥不瘳者

甘草炙半兩 白芨兩一 地骨皮 山蜈蚣

藿香兩半 白芷兩 木香 紅內消

山慈菘各半

右焙乾為末每服二大錢空心鹽湯點服余鄉村有
老醫數世習醫凡婦人氣疾惟憑此藥百發百中

胃病胃滿

心病經云南風生於夏病在心俞在胃脇又云仲夏善病胃脇

此則胃脇痛屬心故入心部

肝病

肝虛則胃痛引背脇肝實則胃痛不轉側喜太息肝著則

常欲蹈壓其胃經云春脈如弦其氣不實而微此謂不及

令人胸痛引背下則兩脇脹滿此肝虛而其脈症見於春

如此也

仲肝中寒者兩臂不舉舌本燥喜太息胃中痛不得轉側

食則吐而出汗也

肝著其人常欲踏其胃上先未著時

但欲飲熱旋覆花湯主之

方未考金匱婦人門有旋覆花湯方或云上合此

素陽明所謂胸痛短氣者水氣在臟腑也水者陰氣也陰

氣在中故胸痛少氣也

仲胸痺之病喘息咳唾胸背痛短氣寸口脈沉而遲關上

小緊數者宜以栝蒌薤白白酒湯主之

栝蒌實一枚 薤白半升 白酒七升

右三味同煮取二升分溫再服

栝蒌薤白半夏湯治胃痺不得臥心痛徹背方見心

胃痺心中痞留氣結在胸胸滿脇下逆搶心栝蒌薤白桂

枝湯主之人參湯亦主之

枳實薤白桂枝湯

枳實四枚 厚朴四兩 薤白半斤 桂枝一兩

栝蒌實一枚

脈沉遲者寒痰虛痰

右五味以水五升先煮厚朴枳實取二升去渣納諸藥
煮數沸分溫作三服
人參湯

白朮 人參 甘草 乾薑各二兩

右四味以水八升煮取三升溫服一升日三服
孫主簿垂述之母患胸中痞急不得喘息按之則痛脈數
且瀆曰習痺也因與仲景三物小陷胸湯一劑和二劑愈

方見傷寒

仲支飲胸滿者枳朴大黃湯主之

厚朴兩 大黃兩 枳實四枚

右三味水五升煮取二升分溫再服

痰癰方

脈寸口脈沉胸中引脇痛胸中有水氣宜瀉漆湯及刺巨
關瀉之澤漆湯仲景方也此後門

杜壬治胃脇痛徹背心腹痞滿氣不得通及治痰咳大抵
葵去穢取子熟炒連皮研和麩糊為丸如桐子大米飲下
五十九

治胸腹壅滯去痰開胃用半夏洗淨焙乾搗羅為末生
薑自然汁和為餅子用濕紙裹於慢火中煨令香熟水一
盞用餅子一塊如彈丸大入鹽半錢煎取三盞溫服能去
胸膈壅逆大壓痰毒及治酒食所傷其功效大矣

汚血

鄭仲游年二十有三高有三點相引痛吸氣皮覺急

滑石兩 桃仁兩 枳殼一兩 黃連半兩

甘草錢

右為細末每錢半以蘿蔔根自然汁研煎熟飲之
五六次

仲本年二十七因乾熱補菜又妄自學吐納以致氣亂血

熱嗽血消瘦遂與行倒倉法今嗽血消瘦已除因與炒荳
米隔間有一點氣梗痛似有三條絲垂映在腰與小腹亦
痛大率偏在左邊此肝部有惡血行未盡也

滑石兩

黃丹三錢

枳殼炒一兩

黃連五錢

生甘草二錢

紅花錢一

柴胡錢五

桃仁兩一

右為細末每服一錢半以蘿蔔自然汁煎沸服之

垣上清散清利頭目寬快胸中不利者悉利於表

黃芪三錢

甘草二錢

人參錢三

葛根半錢

防風根錢一

蔓荊子錢半

右咬咀分作二服每服水一盞半煎至一盞去渣臨臥

溫服以夾衣蓋覆面首不語須臾汗出為效未服藥頭

一日不語如服藥畢亦一日不語

運氣胸痛有二

表

針灸

其一火邪助心經云歲火太過其刺胸中痛脇支滿脇痛
膺背肩胛兩臂內痛是也

其二金邪傷肝經云歲金太過民病胸痛引背兩脇滿且
痛引少腹又云歲土不及風乃大行民病體重腹痛金復
則胃脇暴痛引少腹者是也

內經灸刺胸痛有四

其一取心經云心痛者胸中痛脇支滿脇下痛膺臂肩胛
間痛兩所臂內痛實則胸腹大脇下腰子相引而痛取其
經少陰太陽舌下血者其變病刺却中血者是也

其二取腎經云腎虛則胃中痛太腹小腹痛取其經少陰
太陽血者按刺法不分補瀉但言取血王註謂先去血脈
後調虛實也

其三取膽經云膽足少陽脈所生病者胸脇肋髀膝外皆

痛詳盛虛熱寒陷下取之也

其四取筋經云手心主之筋其病當取過者又轉筋前及

胸痛息賁治在燔針劫刺以知為數以痛為輸又足太陽

之筋足少陽之筋痛皆引胸痛治在燔針劫刺以知為數

以痛為輸也

灸刺胃滿有三法

其一取氣海經云膈中者氣之海其輸上在手柱骨之上

下前在於人迎氣海有餘者氣滿胸中悅息面赤審守其

輸而調其虛實無犯其害是也手柱骨滑伯仁謂肩胛上際今處是穴也

其二取肝經云肝足厥陰脈所生病者胸滿嘔逆殮泄孤

疝遺溺閉癢詳盛虛熱寒陷下取之也

其三取胃經云厥逆腹滿面腫唇燥然暴言難其前不

能言取足陽明是也

集胸脇痛不堪

期門四分

章門六分

至七七壯

行間

丘墟湧泉

東又法

期門沿皮二寸

支溝

膽俞沿皮一寸五分

甲胸滿痛璇璣主之 胸脇摺滿痛引胸中華蓋主之

胸脇摺滿痺痛骨疼飲食不下嘔逆上氣煩心紫宮主之

胸中滿不得息脇痛骨疼喘逆上氣嘔吐煩心王堂主

之 胸脇背相引痛心下胸中嘔吐多睡飲食不下幽門

主之 胸脇摺滿痛引膈不得息悶亂煩滿不得飲食靈

墟主之 胸脇摺滿却引背痛臥不得轉側胸鄉主之

大氣不得息息即胸脇中痛實則其身盡寒虛則百節盡

縱大包主之 胸滿善太息胸中膨脹然丘墟主之千金云胸

背 胸中痛天容主之 胸脇摺滿勞宮主之 胸痺引

背時寒間使主之 胸滿不得息頸腫陽谷主之千金云陽

胸膈痞滿，膈塞飲食不下，嘔吐食後，還出中庭，主之。

胸膈痞滿，痰涎引膈，腹痛短氣，煩滿巨關，主之。

胸膈痞滿，不得息，咳逆乳癰，洒淅惡寒，神封，主之。

胸膈痞滿，逆不通，呼吸少氣，喘息不得舉，臂步，即主之。

胸膈痞滿，惡聞入聲，木音，巨虛，土廉，主之。

胸膈痞滿，喘逆上氣，呼吸喘息，不知食味，氣乳根，主之。

胸膈痞滿，喘逆上氣，呼吸喘息，不知食味，氣戶，主之。

胸膈痞滿，喘逆上氣，呼吸喘息，不知食味，氣期門，主之。

胸膈痞滿，喘逆上氣，呼吸喘息，不知食味，氣甲，主之。

胸膈痞滿，喘逆上氣，呼吸喘息，不知食味，氣腹，主之。

胸膈痞滿，喘逆上氣，呼吸喘息，不知食味，氣胸，主之。

胸膈痞滿，喘逆上氣，呼吸喘息，不知食味，氣溪，主之。

胸膈痞滿，喘逆上氣，呼吸喘息，不知食味，氣胸滿，主之。

胸膈痞滿，喘逆上氣，呼吸喘息，不知食味，氣胸鳴，主之。

胸膈痞滿，喘逆上氣，呼吸喘息，不知食味，氣三間，主之。

胸膈痞滿，喘逆上氣，呼吸喘息，不知食味，氣三間，主之。

胸膈痞滿，喘逆上氣，呼吸喘息，不知食味，氣三間，主之。

胸膈痞滿，喘逆上氣，呼吸喘息，不知食味，氣三間，主之。

胸膈痞滿，喘逆上氣，呼吸喘息，不知食味，氣三間，主之。

胸膈痞滿，喘逆上氣，呼吸喘息，不知食味，氣三間，主之。

胸膈痞滿，喘逆上氣，呼吸喘息，不知食味，氣三間，主之。

胸膈痞滿，喘逆上氣，呼吸喘息，不知食味，氣三間，主之。

胸膈痞滿，喘逆上氣，呼吸喘息，不知食味，氣三間，主之。

氣

仲脈當取太過不及，陽微陰弦，即胸痺而痛，所以然者，極虛也。今陽虛，知在上焦，所以胸痺心痛者，以其陰弦故也。

白色，養理者，肺大肺大，則多飲善病胸痺。診文見脇偏蹠者，肺偏傾，肺偏傾，則胸偏痛。

胸痺短氣，緩急。

仲胸痺，胸中氣塞，短氣，茯苓杏仁甘草湯主之。橘枳薑湯主之。

茯苓杏仁甘草湯：茯苓二兩，杏仁五十箇，甘草一兩。

橘枳薑湯：右三味以水一斗，煮取五升，溫服一升，日三服。

陳皮一斤，枳實三兩，生薑一斤。

右三味以水五升，煮取二升，分溫再服。

寒

干治胸痺氣滿壅心膈不利枳實二兩麩炒微黃為末非時以清粥飲調下二錢聖惠方同

仲胸痺緩急者薏苡仁附子散主之

薏苡仁十五兩大附子十箇

右二味杵為散服方寸七日三服

煩燥 虛煩 胎前虛煩 產後虛煩 躁 懊懣

瞀悶

大法

恒煩躁發熱論 黃帝針經五亂篇云氣亂於心則煩心蜜默俛首靜伏云云氣在於心者取少陰心主之俞又云咳喘煩寃者是腎氣之逆也又云煩寃者取足少陰又云煩寃者取足太陰仲景分之為二煩也躁也蓋火入於肺則煩入於腎則燥俱在於腎者以道路通於肺母也大抵煩躁者皆心火為病心者君火也火旺則金燥水虧惟火

診

運氣

獨存故脾胃合而為煩躁又脾經絡於心中心經起于脾中二經相搏濕熱生煩夫煩者擾擾心亂元元欲吐怔忡不安躁者無時而熱冷汗自出少時則止經云陰躁者是心伸景以梔子色赤而味苦入心而治煩鹽豉色黑而味鹹入腎而治躁名梔子豉湯乃神藥也若有宿食而煩者梔子大黃湯主之

運氣煩躁有二

一曰熱助心火煩躁經云少陰之復燠熱內作煩躁孰嚏

又云少陽之復心熱煩躁便數憎風是也

二曰寒攻心虛煩躁經云歲水太過寒氣流行邪害心火

病身熱煩心躁悸陰厥是也

成煩為擾而煩躁為憤躁之躁合而言之煩躁為熱也枳而言之煩陽也躁陰也煩為熱之輕者躁為熱之甚者

無內熱曰煩外熱曰躁

謹按先賢治煩躁俱作有屬熱者有屬寒者治獨煩不躁者多屬熱惟悸而煩者為虛寒治獨躁不煩者多屬寒惟火邪者為熱蓋煩者心中煩胸中煩為內熱也躁者身體手足躁擾或裸體不欲近衣或欲在井中為外熱也內熱者有本之熱故多屬熱外熱者多是無根之火故屬寒也

內外俱虛身躄冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆躄不得安靜者死熱病七八日其脈微細小便不利加暴口躁脈代舌焦乾黑者死

虛煩

活人云虛煩似傷寒非傷寒也成無已云傷寒有虛煩有心中煩有胸中煩二說不同攻之於書成無已之言實出

仲景活人無據然往往有非因傷寒而虛煩者故兩存之立虛煩一門於此心部立傷寒煩一門於傷寒部

診治

無虛煩身不覺熱頭目昏疼口乾咽燥不渴清清不寐皆虛煩也

傷寒起臥不安睡不穩謂之煩宜梔鼓湯竹葉石膏湯二方並見

傷寒

但煩熱者清肺去痰

活云但獨熱者虛煩也諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脈不緊數故知非裏實也不可下病此者內外皆不可攻攻之必遂煩渴當與竹葉湯若嘔者與陳皮湯一劑不愈再與之孫真人云此法數用有效

陳皮湯

陳皮一兩

甘草炙五錢

人參一分

竹茹五錢

右劉如麻荳大每服五錢水一盞半薑三片棗二枚煎至七分去查食前服

無淡竹茹湯治心虛悶頭疼短氣內熱不解心中悶亂及婦人產後心虛驚悸煩悶欲絕

麥門冬心去 小麥各一兩半 甘草炙一兩 人參

白茯苓各一兩半 半夏湯洗二兩

右劉散每服四錢水二盞薑七片棗三枚淡竹茹一塊如指大煎至七分去查食前服

煩熱冲心乱者安神

恒朱砂安神丸治心亂煩熱怔忡心神顛倒元元欲吐胸中氣亂而熱有似懊懷之狀皆膈上血中伏熱蒸蒸不安宜用權法以鎖陰火之浮行以養吐焦之元氣用甘草之甘溫補之當歸生地又為長生陰血之聖藥黃連去心煩除濕熱朱砂納浮游之火而安神明

朱砂一錢研 黃連淨酒炒一錢半 甘草炙五分 生地

當歸頭各一錢

右為極細末蒸餅為丸如黃米大每服十九津下

下痢後煩者吐之方見傷寒部煩門

帝曰有病身熱汗出煩滿煩滿不為汗解此為何病岐

煩滿汗出不解者刺之飲湯

伯曰汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名

曰風厥帝曰愿卒聞之岐伯曰巨陽主氣故先受邪少陰

與其為表裏得熱則上從之從之則厥也帝曰治之奈何

岐伯曰表裏刺之飲之服湯也詳熱論刺謂針足太陽小陰也飲之服湯謂仲景止逆下

一女子年二十餘歲在室素強健六月間發煩悶困憊不食發時欲入井六脈皆沉細而弱數兩日後微渴眾以

煩熱入井脈伏心熱者

下之

為病暑治不效四五日加嘔而大瘦手心極熱喜在陰處
漸成伏脈時妄語予急制局方妙香丸如桐子大以井水
下一丸半日許大便藥已出病無退減遂以麝香水洗藥
以針穿三竅次日以凉水送下半日許大便下稠痰數升
是夜得睡困頓伏枕旬日而愈因記金匱云昔肥而今瘦
者痰也遂作此藥治之
妙香丸丹溪云疏決腸胃制伏木火藥也

辰砂飛研

牛黃

龍腦

膩粉

麝香研各

金箔九十

巴菝

三百十五粒去尖膜炒熟研

右令研勻煉黃蠟六兩入好蜜三分同煉令勻為丸每
兩作三十九丸如要此藥速行針刺一眼子冷水浸少時
服效更速小兒百病丸如菝菝大

無溫膽湯治大病後虛煩不得眠方見不

仲

酸東湯治虛勞虛煩不得眠方見不

右九法治熱煩前五法煩熱怔忡知熱在心肺也故用
竹葉石膏辰砂鎮墜其熱使下行也第六法煩而下利

知熱在上也故用梔豉湯吐之第七法煩而汗出不解
知表裏有邪也故用表裏飲湯第八法脈沉口渴手心
熱知熱不在表也故用妙香丸下之第九法溫膽酸東
治不得眠也

煩皆生
於虛

凡心虛則煩心肝腎脾虛亦煩心經云夏脈者心也其不
及者令人煩心又云肝虛腎虛脾虛皆令人身重煩冤者
是知煩多生於虛也

連氣

運氣煩有五

一曰熱助心實而煩經云少陰司天熱淫所勝病胃中煩
熱隘乾又云少陽司天火淫所勝病煩心胃中熱又云少

陽之勝煩，心心痛，治以酸寒是也。

二曰心從制而煩，經云太陽司天寒氣下臨，心氣上從寒清時舉火氣高明，心熱煩是也。

三曰金攻肝，虛而煩，經云歲金太過燥氣流行，肝木受邪，民病體重煩冤是也。

四曰土攻腎，虛而煩，經云歲土太過雨濕流行，腎水受邪，民病體重煩冤，又云歲水不及濕乃大行，民病煩冤足痿是也。

五曰木攻脾，虛而煩，經云歲木太過風氣流行，脾土受邪，民病體重煩冤，蓋肝虛腎虛皆令入體重煩冤，故金太過則肝虛土太過則腎虛木太過則脾虛，凡此三太過之歲，則肝腎脾受邪而虛，皆病體重煩冤也。

針灸

灸刺煩心有四

其一取心俞經云心主手厥陰心包絡之脈所生病者煩，心心痛，掌中熱，詳盛虛熱寒陷下取之，又云氣亂于心則煩，心密默俛首靜伏取之，手少陰心主之腧是也。

其二取腎膀胱俞經云腎足少陰之脈所生病者煩，心心痛痿厥，足下熱痛，視盛虛熱寒陷下取之，又云舌縱涎下煩悅取足少陰，又云足少陰之別名曰大鍾，當踝後繞跟別走太陽，其病氣逆則煩悶取之所別也，又汗出煩滿不解，表裏取之，巨陽少陰也。

其三取肺俞經云手太陰之脈所生病者煩，心胃滿，視盛虛熱寒陷下取之，又云振寒洒洒，鼓頷不得汗出，腹脹煩冤取手少陰是也。

其四取脾俞經云脾足太陰之脈所生病者煩，心下急痛，漉瀉，泗水閉，視盛虛熱寒，下取之是也。

熱

胎前虛煩

大竹葉湯治妊娠苦煩悶名曰子煩

防風

黃芩

麥冬去心各二兩

白茯苓四兩

右剉散每服四錢水一盞竹葉十數片煎七分去渣溫服之

益母丸治子煩似虛不得臥者即知母丸但用粳肉為丸數未足欲產門

治子煩口乾不得臥用黃連去鬚為細末每服一錢粥飲調下

產後虛煩

血攻心

大治產後餘血不盡奔心煩悶生藕汁飲二升甚效竹瀝亦得

治產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絕羊血一盞頓服如不定更服立效

煩短氣欲絕者補之

產後血虛氣煩生地黄汁清酒各一盞相和煎一沸分三服服之

治產後虛煩用蒲黃以東流水和服方寸匕極良

治產後短氣欲絕心中煩悶竹葉湯

竹葉細切

麥門冬一升

甘草兩

生薑兩

大棗十四箇

右切以水一斗煮竹葉小麥至八升去渣納餘藥煮取三升去渣溫服虛悸加入參二兩少氣力加糯米五合

產後虛煩不得眠芍藥枳湯

芍藥

當歸

枳子各五錢

香豉半

右如枳子豉湯修服產後傷寒便同下後變証此方雖不若神景酸

大竹葉湯方見虛條

熱

煩不得眠者

大竹葉湯方見虛條

大竹葉湯方見虛條

重可去

經治產後煩躁，禹餘糧一枚狀如酸餛者入地埋一半，四面緊築，用炭一秤發頂火一斤煨去火三分，耗二為度，用濕沙土覆一宿，取出打去外面一重，只使裏肉細研水淘澄，五七度將帛襯乾，再研數千遍，用甘草煎湯調二錢，七只一服，立效。

四肢煩

痛者與小柴胡湯，頭不痛但煩者，此湯主之。小柴胡湯方見傷寒

黃芩兩

苦參兩

乾地黄兩

右三味以水八升，煮取二升，溫服一升，多吐下，虫。

雜方

婦人產中虛煩亂嘔逆，安中益氣竹皮大丸主之。

生竹茹分二

石膏分二

桂枝分

甘草七

白薇分一

右五味末之，棗肉和丸，彈子大，以飲服一丸，日三夜三。

服有熱者倍白薇，煩喘者加栝實一分。

躁

口渴手

諸躁狂越皆屬於火。全文見診○丹溪治一女子煩欲入井，愈此乃火之躁也。

不渴

陰盛發躁，名曰陰躁，欲坐井中，宜以熱藥治之。成无已云：雖躁欲坐井中，但欲水不得入，口是也。

陰躁之極，欲坐井中，陽已先亡，醫猶不悟，復指為熱，重

以寒藥投之，其死也何疑焉！况寒涼之劑入腹，周身之火

得水則升走矣。

活

活靈散方見燥○診躁法見煩

懊懣

診

懊懣虛煩之劇者，治法並見虛煩門，成無已云：懊者懊惱，之懊懣者鬱悶之貌，即心中懊懣惱煩，懣懣鬱鬱然。

不舒暢憤然無奈比之煩悶而甚者懊懣也

醫學綱目卷十六

診

醫懣亦虛煩之甚者治法並與傷寒虛煩同蓋醫者昏也
悶者煩也凡醫而不問者名曰昏迷悶而不醫者名曰虛
煩今日醫懣者謂昏迷虛煩併病許學士所謂懊懣終久
不得臥心中無曉會處者是也

運氣

運氣醫懣者屬內熱經云火鬱之發民病醫懣懊懣又云
太陽司天之政三之氣蕤氏行民病心熱醫懣不治者死
是也

譫妄 附中惡口
在等症

產後譫妄

產後循衣撮

空

虛者
痰

丹虛病痰病有似鬼祟論 血氣者身之神也神既衰之
邪因而入理或有之若夫血氣兩虧痰客中焦妨礙升降

不得運用以致十二官各失其職視聽言動皆有虛妄以
邪治之其人必死吁哉冤乎誰執其咎憲幙之子傳兄年
十七八時暑月因大勞而渴欲飲梅漿又連得大驚三四
次妄言妄見病似鬼邪診其脈兩手皆虛弦而帶沉數予
曰數為有熱虛弦是大驚又梅漿之酸鬱於中脘補虛清
熱導去痰滯病乃可安遂與人參白朮陳皮茯苓連等
藥濃煎湯入竹瀝薑汁與旬日未效眾皆尤藥之不對予
脈之知其虛之未完與痰之未導也仍與前方入荆瀝又
旬日而安 外弟戚一日醉飽後亂言妄見詢之係伊兄
兄附體言出前事甚的乃叔在邊叱之曰非邪乃食魚生
與酒太過痰所為耳灌鹽湯一大碗吐痰一二升汗因大
作歷一宵而安 金氏婦壯年暑月赴筵婦及姑詢其坐
次失序遂赧然自愧因此成疾言語失倫其中多聞一句

曰奴奴不是脈大率皆數而弦予曰此非邪乃病也但與補脾清熱導痰數自當自安其家不信邀數巫者噴水而呪之旬餘而死或曰病非邪而以邪治之何遽至於死予曰暑月赴宴外境蒸熱辛辣適口內境鬱熱而况舊有積痰加之愧悶其痰與熱何可勝言今乃驚以法尺是驚其神而血不寧也噴以法水是瀦其體密其膚使汗不得泄汗不出則蒸熱內燔血不寧則陰消而陽不能獨立也不死何為或曰外臺秘要有禁呪下科庸可廢乎予曰移精變氣乃小術耳可治小病若內有虛邪當用正大之法自有成式昭然可攷然符水惟膈上熱痰下咽冷涼胃熱得之豈不暫快亦可取安若內傷而虛與冬令嚴寒符水下咽必冰胃而致害彼鬱熱在上熱邪在表須以汗解卒得清冷膚腠固密熱何由解必致內攻陰陽離散血氣垂爭

去死為近又何誅焉

仲邪哭使鬼不安者血氣少也血氣少者屬於心心氣虛者其人多畏合自欲眠夢遠行而精神離散鬼鬼妄行陰氣衰者為顛陽氣衰者為狂

本治因驚言語顛錯不能服溫藥宜遠志丸

硃砂半兩八麝少許同研

金箔五片

遠志

南星

人參對病精白附子

白茯苓

酸枣仁各半兩

右為細末煉蜜丸如桐子大朱砂為衣每服三十九薄苛湯下食後臨臥服

茯神散

茯神

乾地黄

白芍藥

川芎

當歸未母桔梗

白茯苓

遠志等分

右為細末每服二錢水二盞燈心末肉同煎至七分不
狗時候貫明遠教授母七十四歲因戎為驚疾如上証
服此二方得效

運氣

運氣譫妄即傷寒家譫妄也其病有二

驚

一曰火邪助心經云歲火太過上臨少陰少陽病反譫妄
狂越又云火太過曰赫曦其動炎灼妄擾又云少陰所至
為譫妄又云少陰之復振慄譫妄又云少陽之勝心痛煩
心善驚譫妄治以鹹寒是也

中風譫

二曰寒邪傷心經云歲水太過寒氣流行邪害心火病身
熱煩心躁悸陰厥上下中寒譫妄上臨太陽渴而妄胃又
云陽明司天之政四之氣寒雨降振慄譫妄治以甘熱是
也

無加減續命湯治中風或歌哭或笑語無所不至

麻黃三兩

人參

桂枝

白木各二兩

當歸

防己

黃芩

甘草

白芍藥

芎藭

杏仁各一兩

右剉散每服四大錢水一盞半棗二枚煎七分去渣不
以時服

中惡譫

病者卒心腹脹滿吐利不行如乾霍亂狀世所謂中惡是
也由入精神不全心志多恐遂為邪鬼所擊或附着沉沉
默默妄言譫語誹謗罵詈訐露人事不避譏嫌口中好言
未然禍福及至其時毫髮未失人有起心已知其故登高
陟險如履平地或悲泣呻吟不欲見人如醉如狂其狀萬
端但隨方俗攷驗治之

羅八毒赤散治男子婦人染着神鬼謂之鬼疰病

雄黃

礬石

朱砂

牡丹皮

附子炮 藜蘆 巴荳各一兩 蜈蚣一條
右八味為細末煉蜜為丸如小芫大每服十九丸冷水送下無時

尸症 本飛尸者發無由漸昏然而至其狀心腹刺痛氣息喘急脹滿遁尸者停道在入肌肉血脈之間觸即發動亦令人心腹脹滿刺痛喘急攻脇衝心瘥後復發沉尸者發時亦心腹絞痛脹滿喘急雖歇之後猶沉痼在入府藏令人無處不惡風尸者在入四肢循環經絡其狀冷躍去來沉沉默默不知痛處衝風則發伏尸者其病隱伏五藏積年不除未發身體都如無患發則心腹刺痛脹滿喘急又有諸尸注候者則是五尸內之尸注而挾外鬼邪之氣流注身體令人寒熱淋漓或腹痛脹滿喘急或破塊踊起或攣引腰脊或舉身沉重精神雜錯恒覺昏謬每節氣改變輒到

大惡積年累月漸至頓滯以至於死死後復易傍人乃至滅門故為尸症皆用忍冬藤葉剉數斛煮令濃取汁煎服日三瘥

太乙神精丹蘇合香丸治此疾第一
因喪驚憂悲哀煩惱感尸氣成諸證變動不已似冷似熱風氣觸則發用雄朱散

- | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 雄黃 | 朱砂 | 桔梗 | 羌活 |
| 芍藥 | 當歸 <small>炒</small> | 升麻 | 川烏 |
| 龍腦 | 川芎 | 南星 <small>炮</small> | 山梔 |
| 陳皮 | 木香 | 菴草 | 白朮 |
| 枳殼 | 檳榔 | 黃芩 <small>各等分</small> | 麻黃 <small>五分</small> |
| 白僵蚕 <small>炒</small> | 虎頸骨 <small>醋</small> | 紫蘇子 <small>炒</small> | 鬼箭羽 <small>炒等分</small> |
| 蜈蚣 <small>酒炙</small> | | | |

石馬田長母恨二錢酒調下日三服

頃在徽城日常修谷神精丹一料庚由予家一婦人夢中見二蒼頭一前一後手中持一物前者云到也未後應云到也擊下爆然有聲遂魔覺後心下點痛不可忍昏悶一時許予忽憶神精丹有此一証取三粒令服之少頃已無病矣云服藥覺痛止神醒今如常矣日後相識稍有邪氣與一二服無不應驗方在千金中治中風之要藥但近世少得曾青磁石為難合爾

無還魂湯治卒中惡奄忽氣絕口噤不開方見卒中暴厥門與仲景方同

千五邪湯治邪氣啼哭或歌或笑桂加

禹餘糧

防風

桂心

芍藥

獨活

甘草

白朮

人參

石膏

牡蠣

秦艽各一兩

防己

葛蒲

茯神

雄黃

蛇蛻皮各一兩

右吹咀每服五錢水三盞煎七分服之

仲大棗湯治婦人悲傷欲哭象如神靈方見胎部悲門

產後諸疾

敗血

奪命散治產後血暈入心經語言顛倒健忘失志

沒藥

血竭等分

右研細為末產後用童便與細酒各半盞煎一二沸調

下三錢良久再服其惡血自下行婦人產後諸疾如神

而愈

挾熱

又方治產後敗血衝心發熱狂言奔走脈虛大者

乾荷葉

生地黄

牡丹皮等分

右三味濃煎湯調蒲黃二錢七分服即定

林

扶寒

郭氏論產後乍見鬼神者何答曰心主身之血脈因產耗傷血脈心氣虛則敗血得積上干於心心不受觸遂致心中煩躁臥起不安乍見鬼神言語顛倒醫人不識呼為風邪如此但服調經散每服加龍膽一捻得睡即安

沒藥

琥珀此細研

桂心各一錢

芍藥

當歸各

麝香

細辛各三分

右為末每服半錢生薑汁溫酒各少許調服

大治方產下日見鬼言語顛倒用蘇合香丸一錢以童便調服即醒

治產後發熱狂言奔走服虛大者四物湯加柴胡如不愈加甘草柴胡生地黃等分煎服亦可

廣治產後血暈心悶不識神言鬼語氣急欲絕

芍藥

甘草

丹參各一兩 生地汁

熱 渴血

鐘壘

虛

生薑汁各一升

白蜜各一合

右水二升先煮三味取八合下地黃生薑汁蜜調分為二次服

大治產後敗血及邪氣入心如見祟物顛狂用大辰砂一

二錢研極細用乳汁三四茶匙許調仍握茶項活地龍一

條入藥候地龍滾三滾取出地龍不用不令帶藥出但欲

得地龍身上延耳入無灰酒與前乳汁和合七八分盞重

湯溫遇疾作分三二服

栝子仁散治產後狂言亂語皆由內虛敗血挾邪攻心

栝子仁

遠志去心

人參

桑寄生

防風

琥珀研

當歸少

生地焙

甘草等分

右為麤末先用白羊心一箇切片以水一大盞半先煮

熱

至九分去羊心入藥末五錢煎至六分去渣無時服
循衣撮空

海治婦人血風症因大脫血崩漏或前後失血因而枯燥其熱不除循衣撮空摸床閉目不省擲手揚視搖動不寧錯語失神脈弦浮而虛內躁熱之極也氣厲鼻乾不潤上下通躁此為難治宜生地黄黃連湯主之

川芎

生地黄

當歸各七

赤芍藥

梔子

黃芩

黃連各三

防風兩

右為麩末每服三錢水二盞煎至七分去渣取清飲無時徐徐與之若脈實者加大黃下之
大承氣湯氣藥也身外而之內者用之生地黄黃連湯血藥也身內而之外者用之氣血合病循衣撮空証同身氣而之血血而復之氣大承氣湯下之身血而之氣氣而復

診

之血地黃黃連湯主之二者俱不大便

病入循衣撮空謔語者不可治病人陰陽俱絕掣衣撮空妄言者死

喜笑不休

心火熱

喜笑皆屬心火經云心藏神神有餘則笑不休又云在藏為心在聲為笑在志為喜又云精氣併於心則喜又云火太過為赫曦赫曦之紀其病笑狂妄又云少陰所至為喜笑者是也

河笑著茂鮮淑舒榮彰顯火之化也故喜為心火之志也喜極而笑者猶燿燦太甚而鳴笑之象也故病笑者心火之盛也

子和路經古宅逢一婦病喜笑不止已半年矣眾人皆無術求治於戴人戴人曰此易治也以滄益成塊者二兩餘

及千里外事令人長生去三百病毒不能為害

雨治又心孔懼寒多忘喜誤了酉日密自至市買遠志著巾角中為末服之勿令人知

腎傷

腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言全文見血并於下氣并於上亂而喜忘刺虛實

運氣

運氣喜忘皆屬心火虛經云火不及曰伏明伏明之絕其病昏惑悲忘又云太陽司天寒氣下臨心氣上從善忘又云太陽之復其則入心善忘善悲是也

雜方

本草商陸花主入心昏塞多忘喜誤取花陰乾百白搗末日暮水服方寸匕臥思念所欲事即於眼中自覺

針灸

集健忘列缺 心俞 神門 中脘 三里 少海 灸無開虧者心高心高則滿於肺中晚而善忘難開必言全

診

見

諸痛門

諸部分痛各入本門如痛風入痺門目痛入目門此特痛之大法耳

寒熱

素黃帝問曰予聞善言天者必有驗於人善言古者必有驗於今善言人者必有厭於己如此則道不惑而要數極所謂明明也今予問於夫子令言而可知視而可見捫而可得令驗於己如發蒙解惑可得而聞乎岐伯再拜稽首對曰何道之問也帝曰愿聞人之五臟卒痛何氣使然岐伯對曰經脈流行不止環周不休寒氣入經而稽遲泣而不行客於脈外則血少客於脈中則氣不通故卒然而痛帝曰其痛卒然而止者或痛甚不休者或痛甚不可按者或按之而痛者或按之無益者或喘動應手者或心與背相引而痛者或脇肋與小腹相引而痛者或腹痛引陰股

者或痛宿昔而成積者或卒然痛死不知久少間復生者
或痛而嘔者或腹痛而後泄者或痛而閉不通者凡此諸
痛各不同形別之奈何岐伯曰寒氣客於脈外則脈寒脈
寒則縮絀縮絀則脈急絀急則外引小絡故卒然而痛
得炆則痛立止因重中於寒則痛久矣吳古迥切熱也寒氣客
於經脈之中與炆氣相薄則脈滿滿則痛而不可按也
寒氣稽留炆氣從上則脈充大而血氣亂故痛甚不可按
也寒氣客於腸胃之間膜原之下血不得散小絡急引
故痛按之則血氣散故按之痛止寒氣客於伏春之脈
則深按之不能及故按之無益也寒氣客於衝脈衝脈
起於關元隨腹直上寒氣客則脈不通脈不通則氣因之
故喘動應手矣寒氣客於背俞之脈則血脈泣脈泣則
血虛血虛則痛其俞注于心故相引而痛按之則熱氣至

熱氣至則痛止矣治見心痛寒氣客於厥陰之脈厥陰之脈
者絡陰器繫於肝寒氣客於脈中則血澀脈急故脇肋與
小腹相引痛矣治見脇肋痛厥陰客於陰股寒氣上及小腹
血泣在下相引故腹痛引陰股治見腹痛寒氣客於小腸膜
原之間絡血之中血泣不得注於大經血氣稽留不得行
故宿昔而成積矣治見積寒氣客於五臟厥逆上泄陰氣
竭陽氣未交故卒然痛死不知人氣復反則生矣寒氣
客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也治見吐法寒氣客於小腸
小腸不得成聚故後泄腹痛矣治見滯下熱氣留於小腸小
腸中痛癰熱焦渴則堅乾不得出故痛而閉不通矣治見秘結
帝曰所謂言而可知者也視而可見奈何岐伯曰五臟
六腑固盡有部視其五色黃赤為熱白為寒青黑為痛此
所謂視而可見者也帝曰捫而可得奈何岐伯曰視其

醫學綱目卷之...

俱舉痛論篇

形氣陰陽

靈

痛隨利減

主病之脈堅而血及陷下者皆可捫而得也
氣傷痛形傷腫故先痛而後腫者氣傷形也先腫而後痛者形傷氣也
有形而不痛者陽之類也無形而痛者陰之類也無形而痛者其陽完而陰傷之也急治其陰無攻其陽有形而痛者其陰完而陽傷之也急治其陽無攻其陰陰陽俱動者有形而無形加以煩心命曰陰勝其陽此謂不表不裏其形不支
通則不痛痛則不通又云痛隨利減亦有當隨其經絡而通之則疼痛去矣如輕可去實麻黃葛根之屬是也謂如頭痛當用川芎細辛之類通之則無疑滯痛隨利減也海諸痛為實痛隨利減世多以下之為利也假令痛在表者實也痛在裏者實也痛在血氣者亦實也故在表者汗

之則愈在裏者下之則愈在血氣者散之行之則愈豈可
以利為下乎作通字訓則可得矣故經曰通則不痛痛則
不通此之謂也

運氣

運氣諸痛皆屬火經云諸疼痛皆屬於火是也

一屬火實經云火鬱之發民病骨痛節乃有動是也

一屬火虛經云火不及曰伏明伏明之紀其發痛是也

諸痛皆屬火寒涼藥不可峻用必用溫散之藥諸痛

不可用入參蓋補氣氣旺則不通而痛愈甚矣

諸逆衝上

逆氣象陽全文見五藏

凡氣逆必見象陽症面赤脈洪當以

法降其逆乃愈若以氣象陽盛而用寒藥攻之則不救矣
氣上衝心咽不得息治法見傷寒厥陰病條

如秋冬之月胃脈四道為衝脈所逆并脇下少陽脈二

秋冬為寒春夏

為熱

道而反上行病名曰厥逆經曰逆氣上行滿脈去形七神昏絕離去其形而死矣其証氣上衝咽不得息喘息有聲不得臥於調中益氣加吳茱萸半錢或一錢觀厥氣多少用之如夏月有此症為大熱也蓋此症隨四時為寒熱溫涼宜以酒黃連酒黃柏酒知母各等分為細末熟湯為丸如桐子大每服二百丸白湯空心下仍多飲熱湯服畢少時便以美飲食壓之使不得胃中停留直至下焦以瀉衝脈之邪也

寒氣厥逆赤丸主之

茯苓

桂心各四兩

細辛兩

烏頭

附子各二兩

射罔如大棗

右六味為末內真珠為色蜜丸如麻子大先食酒飲下三九日三夜一服不知稍增之以知為度四兩不用桂

逆氣五臟皆有

腹引擊
左逆在
心小腸

一曰心小腸經云諸逆衝上皆屬於火又云少腹控裏引腰脊上衝心邪在小腸取之盲原以散之刺太陰以予之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之是也

嘔逆
在胃

二曰胃經云胃為氣逆是也胃逆有嘔有吐有噦故刺嘔吐取中脘三里也刺噦取乳下黑根盡處及臍下三寸皆大驗也治各有本門

喘咳逆
在肺大
腸

三曰肺大腸經云肺苦氣上逆急食苦以泄之又云腹中常鳴氣上衝胃喘不能久立邪在大腸刺盲之原巨虛下廉是也其肺逆曰咳喘取天突人迎泄之也治亦各有門

耳聾耳鳴
腫逆在
肺

四曰肝經云肝氣逆則耳聾不聰煩腫取血者是也

奔豚胸

五曰腎即奔豚氣逆脚氣衝心之類是也治亦各有門

氣不得
前後逆
六曰腎經云督脈別絡生病從少腹上衝心而痛不得前
後為衝疝是也治見疝門

針灸
腎氣衝心 關元二寸半補 帶脈一分沿皮向

小腹有逆氣上衝心腹脹滿不得息 氣衝右膈下七寸

二十動脈應手 三里立愈

運氣厥逆有三

一曰風火經云少陽司天火氣下臨風行于地厥逆隔不通是也

二曰寒經云水鬱之發善厥逆是也

三曰濕經云太陰司天濕氣下臨厥逆是也

噫飽氣也俗 下氣

上焦竭善噫何謂也師曰上焦受中焦氣未和不能消是故能噫耳經云衛出于上焦 上焦不歸者噫而酢酸經云不歸不至也上

府上裁

集之氣不至其部則物噫屬心脾及二陽一陰經云心不能噫故噫而酢酸 噫又云太陰所謂上走心為噫者 陰盛而上走於陽明陽明絡屬心為噫故曰上走心為噫也又云二陽一陰發病主驚駭背痛善噫久也

寒熱 仲旋覆代赭湯治痞而噫方見傷寒疝門

本心下蓄積痞悶或作痛多噫敗卵氣枳殼散主之

枳殼 白木各半兩 香附兩 檳榔二錢

右為細末每服二錢米飲調下日三服不拘時候所老

宜州人與前方証皆除氣上蒸心膈噫氣稍寬脈之右關弱短左關左尺長洪大而數此所有熱宜瀉所補脾

青皮錢一 白木半錢 木通 甘草分

煎下保和丸十五粒抑青丸二十粒 噫氣胃中有火有痰

南星製

半夏

軟石膏

香附

各等分水煎服

運氣噫有三

一曰熱助心實而噫經云少陰之復噫噦是也

二曰寒攻心虛而噫經云太陽司天寒淫所勝善噫又云太陽之復唾出清水及為噦噫是也

三曰風攻脾虛而噫又云厥陰在泉風淫所勝腹脹善噫是也

針灸

針灸噫獨取脾經云脾足太陰之脈是動則病腹脹善噫視盛虛熱寒陷下取之也

診

仲寸脈弱而緩弱者陽氣不足緩者胃氣有餘噫而吞酸食卒不下氣填於膈上

脈寸脈緊寒之實也寒在上焦胸中必滿而噫跌腸脈

微而澁微無胃氣瀇即傷脾寒在膈而反下之寒積不消胃微脾傷穀氣不行食已自噫寒在胸膈上虛下實穀氣不通為閉塞之病跌腸脈微瀇及寸脈緊而噫者皆屬寒診全見 太陰中者腹脹閉噫氣嘔逆

下氣

心虛

下氣屬心虛經云夏脈者心也心脈不及下為氣泄者是也

結腸胃

河腸胃鬱結穀氣內發而不能宣通於腸胃之外故善噫而或下氣也

診

診癰癩勞瘵若氣下泄不止者必死此真氣竭絕腸胃腠理閉塞穀氣不能宣通於腸胃之外故從腸胃中泄出也

醫學綱目卷十六 尾

醫學綱目卷十六

