

醫學綱目

十九

八卷

心小腸部

瘰癧部
 瘰癧部分形狀不同
 瘰癧 偷針 天蛇頭代指 石瘰 諸腫
 陰瘰囊瘰 便毒 貼骨瘰 甲疽嵌甲 乳瘰乳岩 瘰癧 結核
 胃腕瘰 內瘰有三 肺瘰腸瘰



醫學綱目卷之十九

癰疽所發部分名狀不同

疔瘡

石癰

諸腫

瘰癧附馬結核

癭瘤

偷鍼

天蛇頭伐指

甲疽散甲

乳癰乳巖

囊癰陰頭癰

便毒

貼骨癰

內癰有

三 肺癰腸癰胃脘癰

靈五臟身有五部伏兔一腓二腓者膈也背三五臟膺四

項五此五部有癰疽者死寒熱病篇王海藏云腦髮髮

消不可患癰疽者七處 眼後虛處 頤接骨處 陰根

根上毛間腠與尻骨接處 耳門前後車骨接處 諸因

小腹風水所成癰疽 頷骨下近耳後虛處 鼻骨中並

能害人但以諸法療之或有得瘥唯眼後虛處最險 正

腦上一處起為腦癰及腦疽腦錄並在夫椎骨上入髮際

腦癰疽宜急破

通診癰疽要言部分



腦錄難愈

生腦癰皮起，易得破穴，急破急出膿，不害腦疽皮厚，難得破穴，須急發內毒，使破穴方可。

髮脫防漏

左右鬢兩處癰疽，癩初起如魚咬，癢疹痛腫，不赤紅，難見膿汁，是為鬢發，此亦危篤之患，既損破多，為漏瘡。

左右髮際起，如粟米，頭白肉赤，熱痛如錐刺，此疾婦人患多，丈夫患少，始因風濕上攻，髮際亦宜出膿，無傷。

額及太陽發疽慎風水

左額右額發赤疽，不拘大小，狀如桃李，急宜藥貼破見膿，無害右額角一處發毒疽及惡癩，為近太陽穴，如腫滿太陽，即成虛損，為近穴而難消，不可破，如破後傷外風水，即能害人，亦宜用藥潰膿，後速斂合瘡口，如經冬月，即成冷。

發眉處

瘡繆此處近太陽穴，上至額角，都為險處。左右太陽穴或發疽癩及癰，五七日不潰，毒氣流入眼眶，攻眼眼合，不開用藥貼破，破後慎外風水，所入即損其睛，疰損眼臉而成大疾。

攻眼與太陽

左右眉稜兩處發為發眉，不拘在頭尾，宜慮未疾已前攻擊，在眉頭即攻入眼，損睛在眉後即攻入太陽，並宜戒慎鼻下，一處人中兩處為發髭，此多因摘髭外入風而結，攻作不常，寒熱相併，此亦害人。

發頤 牙又發 忌風水

下頤一處發為發頤，肥人多有此疾，恐手搔傷而發腫，左右牙又骨接處發癰疽，處腫脹攻骨及牙關，張口不得，因諸風熱上攻，或多食燒炙之物，所為或因患牙癰，即從牙縫中破出膿血，切忌外風水觸犯。

臂發處

垂臂兩處發，接骨下臂，上起如鷄鴨卵，大皆由榮衛不

調所為也喜患實處而不透內亦宜急消或發穴早瘡
兩臂肘起在接骨下引手至小骨之上發癰癩此處雖實
奈連大小筋骨舉動不便垂手多墜或如膿深沉徹骨即
傷筋脈拳縮不舒搯撮宜急以緩慢筋脈藥餌治之

發手背

兩手背發癰疽初生如水刺無頭腦頑然滿手背腫滿後
聚毒成瘡深入至骨而為發手背此屬五種皆發毒之類
也

發筋處
內攻

兩肋起疽名為發肋粉腫盛至十數日不穴攻即腫大如
杯碗高如鐵背痛徹內腸絞刺左邊患應右邊痛右邊患
應左邊痛唯有此處多是內毒却入攻而死者多。有斯
患急以針刺出膿血則免內攻傷內矣

三里發

三里兩處起癰疽初發如牛眼睛青黑便五七日破穴出
黑血汁膿腫攻勝肚連腿裏拘急冷疼此因傷筋氣勞力

所成宜用湯藥注射去其外毒自平息矣
兩脚接骨近上勝肚下一處起丹疽如胡桃大硬如物打
搗之狀不苦疼但腫急脹慮其損筋亦須早出膿毒可保
平安也

脚發
毒深不可
治深不
可治

兩脚心發徹骨者不治如脚心微皮破不至深發膿不多
者可治 癰發雖重不至損入但世人不曉醫治自至危
殆耳

上焦宜
用解利
藥虛傷
風水

上焦發癰為陽是壅塞實候宜解利溫涼湯藥去其積熱
上攻外即貼消毒逼腫藥如已結定即用發穴藥候穴破
出其膿毒腫平方貼生肉等藥然後飲合瘡口亦慮外傷
風水勿食發風熱醬麪毒物等忌房事

中焦宜
用暖內
藥防內
攻

中焦發癰至腰上一節前後心不定所在皆是滯滯候亦
乘虛而作不拘大小前起心雄尾者最要緊近兩腋是虛

處兩脇肋下至臍上及臍下兩傍一二寸發癰填氣伏硬
難潰膿為此等處偏難發穴穴後難全瘡口並須先用暖
內藥服後用熱藥貼令軟和慢慢破穴不得急破急破即
朝夕出膿不住緩慢破穴即一頓出膿易為將息後心者
唯有十一椎脾俞下十四椎上為腎俞腎俞下為腰俞兩
處起癰者防毒氣內攻為此處皆是至虛處凡有癰起先
須補內氣令實方可放破因氣實則不內攻且易得潰唯
腰俞兩處多成漏疾預防節然則免矣

下焦宜
用和平

下焦發為流注虛損候前陰股兩處起如鷄卵大長橫擢
內初起腫核結塊後四畔浮腫相併伏硬色青黑先用和
平內藥服三五日後用發穴散及罨藥令軟即穴穴後其
瘡口即隨擗子肉作長瘡瘡口破宜急用抽毒膏出膿上
盡便貼發瘡口藥為此處無肉可壞更不須長肉也

便毒防
漏

腿脛兩處起為便毒跨下兩脇大下大道前穀道小道後
成懸癰皆是虛極人患此癰近穀道左右亦多痔癰宜急
補脾臟及發處貼藥即用發穴散破後用抽膿膏膿盡用
合瘡口散令之慎勿過冬即成冷漏難治

兩垂珠
兩曲脈
兩外踝
兩漏

垂珠左右兩處起癰為騙馬墜初起大小不定此處微突
皮肉薄紋緊口亦難合瘡初起宜以消散藥貼令內消此
處亦易成漏瘡唯宜消散之硬即恐緩慢難為功矣又云
交膈一處近稜線上赤為騙馬墜防漏騙馬墜是也
兩曲脈膀肚下內外兩踝前有廉乃兩邊為裏外廉上結
癰腫此處近骨難瘥宜用收毒散外貼四畔中心即用活
血肉藥貼無害
下至兩脚心發癰癰沉深不治如微似皮薄易破者猶可
也凡有癰腫皆屬六腑有疾

瘡發於喉中名曰猛疽猛疽不治化為膿膿不瀉塞咽
 半日死其化為膿者瀉則合家骨冷食三日而已發於
 頸者名曰天疽其癰大而赤黑不急治則熱氣下入淵腋
 前傷任脈內薰肝肺薰肝肺十餘日而死矣俱出瘡疽篇下同
 消百脈疽腫起環頸項疼痛身體大熱不敢動止慎慎不
 能食此有大畏恐駭上氣咳嗽其發引耳不可以腫十五
 日可刺導引不刺導引見血八十日必死土龍疽發背
 起胃俞及腎俞大發寒熱十數日大汗展頸引身盡熱如
 沸不穴二十日死九日可刺不刺其上下亦黑若膿青黑
 者死血膿者不死
 靈陽氣大發消腦溜項名曰腦爛其色不樂腦項痛如刺
 以針煩心者死不可治
 消赤色疽發頭額以腦前并手掌中十日不穴者死七日

可刺出赤血七日未有膿不可治不穴者不作穴而東坡西擊也 杼疽
 發鬚鬚及兩耳不穴十五日死可刺其膿色黑如豆鼓或
 見血者死 愚疽發大椎骨上連兩夾脊上七日可刺導
 引為癰疽出膿不可止吐碎骨身痒後痛者此故傷寒氣
 入臟腑發為食疽也九日可刺導引之不刺不導引十一
 日死
 瘡發於肩及膈名曰疔瘡其狀赤黑急治之此人汗出
 至足不害五臟瘡發四五日逆熾之瘡疽篇此當入瘡
 消丁疽發兩肩惡血留結內外榮衛不通發成疔疽五日
 腫大令人口噤寒戰十三日可刺不治二十日死 陳乾
 疽腫發起兩肩及兩大臂連胛骨二七日痛不息亦不可
 動五十日身熱不赤六十日可刺刺之無血者死
 靈發於腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石欲細而長疎

砭之塗以不膏六日已勿畏之其癰堅而不潰者為馬刀
挾癰急治之

消內痰疽發兩腋下及臂并兩手掌中振寒熱血隘乾飲
多即嘔煩心憤憤脈盛六七八日診如此可汗不汗死

靈發於胸名曰井疽其狀如大莖三四日起不早治下入
腹不治七日死矣發於膺名曰甘疽色青其狀如穀實

瓜瓠常苦寒熱急治之去其寒熱不急治十歲死死後出
膿發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之其狀大

癰膿其中乃有生肉大如赤小豆治之劉蒨菴草根各一
升以水一斗六升煮之竭為取三升即強飲厚衣坐於釜

上令汗至足已疵疾蚤切。甲乙經於赤小豆下。作治之劉蒨菴草赤松根各一升。
消使炎疽腫起發肋及兩肩肘頭二十日不穴死九日可
刺發赤白相間膿多可治全無赤白者不治 蜂疽發背

上起心愈及心包絡愈若肩髃二十日不穴死十日可刺
其色赤黑膿清者不治 特疽發肺俞及肝俞不穴二十

日死八日可刺其色紅赤內隱起如椒子者死陰陽二
氣疽廣潤滿背或大或小不常腫熱脹大十日可刺道引

出膿不拘深淺多少發渴體倦十日外不見膿不治 筋
疽發夾脊兩邊大筋上其色蒼八日可刺有瘡在肥腸中

九十日死 衝疽發小腹疼痛而振寒熱四日憤憤五日
變色可刺不刺即導引出膿毒不治五十餘日死

靈發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治三十日死
矣治見經

消湧泉疽腫起發太陰如伏鼠二十日不穴死十日可刺
發清膿赤黑者死白者可治太陰尻尾

靈發於股脛名曰股脛疽其狀不甚變色癰腫內薄於骨

發於股脛名曰股脛疽其狀不甚變色癰腫內薄於骨

不急治三十日死矣股解如消發於股陰名曰赤施不

急治六十日死在兩股之內不治十日死

消陰疽發腿髀及陰股始發腰強數飲不能多十日發堅

腫脹惡寒心煩躁死不治

靈發於膝名曰疔疽其狀大癰色不變寒熱而堅勿石石

之者死須其柔乃石之者生堅如石者因生樟諸癰疽

之發於節而相應者不可治也發於陽者百日死發於陰

者三十日死問劉涓子云應者內發透外也發於脛

名曰兔齧其狀如赤莖至骨急治之不急治害人也發

於內踝名曰走緩其狀癰色不變數石其輪而止其寒熱

不死發於足上下名曰四淫其狀大癰不急治受之百日

死發於足傍名曰厲癰其狀不失初從小指發急治去

之其狀黑者不可消輒益不治百日死發於足指名曰

脫癰其狀赤黑者死不治不赤黑者不死治之不急治斬

之否則死矣

冷種敦疽發兩足指五日不穴死四日可刺其色發黑癰

者不堪未過節者可治陽疽起足跌及足下二十日不

穴死十日可刺發赤白膿血不多其瘡上痒及赤黑者死

丹琥珀膏

歸鬚

細辛

獨活

川芎

皂角

川椒

黃芪稍

升麻

藁本

蜂房

甘草稍

防風稍

木鱉子

芍藥

白斂

枸杞子	苜蓿	降真香	官桂
瓜蒌	蘇木	白芷	杏仁
黃連	槐枝 <small>已上各一兩</small>	琥珀	沉香
木香	丁香	藿香	零零香
雲母石	乳香	雄黃	硃砂
安息香	甘松 <small>已上各半兩</small>	麝香 <small>各一錢</small>	羊腎脂 <small>兩</small>
髮灰 <small>錢五</small>	白礬 <small>粘一兩已上十味為極細末</small>	黃丹	
蟾酥 <small>兩二</small>	香油 <small>斤四</small>		

右先以前十六味剉槌碎用冰五升文武火熬至二升半去查再用冰五升又熬至二升半去查與前汁一處慢火煎用槐枝不住手攪成膏用磁器盛頓起將後琥珀等十六味研為極細末用帛包起於前膏內下淨羊脂四兩真酥二兩同膏入香油內攪令勻以文武火熬

膏內水盡用帛燃點油燒不爆為度漸入黃丹以二兩五錢重為一次仍用槐枝不住手攪滴水虫不散軟硬得所如軟添黃丹如硬添油再上火熬却入前藥細末五兩微煎數沸用磁器盛貯如用於紙上攤之量瘡口大小專治五發惡瘡疔腫癰癤遠年冷痺痔漏一切無名惡瘡蛇傷蝎咬犬吠並皆治之

疔瘡

疔瘡皆生四肢發黃疱中或紫黑必先痒後痛先寒後熱也

表裏

羅丙午歲予居藁城人多患疔瘡縣尹董公謂予曰今歲患疔瘡者極多貧民無力醫治近於吏侯處得數方用之者無不效官給藥錢君當捨手治之遂諾其語董公榜示通衢命予施藥如此一年全活甚眾其用保生錠子千金

托裏散神聖膏藥破棺丹凡四方

保生錠子治疔瘡背疽癰瘰一切惡瘡

金脚信二錢

雄黃三錢

輕粉二錢

礞砂三錢

麝香半錢

巴豆四十九粒另研文火炮生用尤妙

加蟾酥一錢

右為細末用黃蠟五錢溶開將藥和成錠子冷水浸少時取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開每用一餅次用神聖膏後用托裏散若瘡氣入腹危者服破棺丹世傳疔瘡必有一條紅線可針紅線所至之處出血然後傳藥

神聖膏藥治一切惡瘡

當歸

藁本各半

沒藥

乳香各二錢

白朮

琥珀各半

黃丹二兩

白膠香二兩

黃蠟二兩

粉霜一錢

木鱉子五十個去皮

巴豆十五粒去油

槐柳枝各一百二十支

膽礬一錢

右件一處先將槐柳枝下在油內熬焦取出復下其餘熬勿至焦濾出却將油澄清下黃丹再熬成膏子緋帛攤之立有神效

托裏散治一切發背疔瘡

黃芪半兩

厚朴二兩

川芎

防風

桔梗略二

白芷

連翹二錢

芍藥

官桂

甘草節

人參各一兩

木香

沒藥

乳香

當歸各半

右為細末每服三錢酒一大盞煎二三沸和薑溫服

破棺丹治瘡腫一切風熱

大黃二兩半生半熟甘草

芒硝各一兩

右為細末煉蜜丸如彈子每服半丸食後溫酒化下或

敷貼雜方

童弱半盞研化之忌冷水

濟金砂散取疥瘡

道人頭微炒存性一兩即蒼耳子

蟾酥以多為妙

礶砂三錢

雄黃三錢

右將瘡四圍刺破以沙油調藥末置於瘡內緋帛封之數日疔自出如瘡入腹嘔逆者將蒼耳搗汁飲之但用礶砂雄黃等分研細用蜜調先破瘡頭去血入藥莖大在瘡口內紙花貼之亦効

無蒼耳散治一切疔腫神効用蒼耳草根莖苗子但取三色便可用燒灰存性研細用好米醋米泔澄淀和如泥隨瘡大小塗上厚二分乾即易之不過千度即拔根出須針破塗之更加雄黃尤効

世蒼耳與白梅研爛貼疔上拔去根

濟蟾酥丹治疔瘡取蟾酥以白麵黃丹搜作劑丸如麥粒

狀針破患處以一粒納之取蟾酥法用癩吧破眉稜上以竹篾刮下然後搗在背陰處自乾用之

苦苣擣汁傳疔瘡殊驗青苗陰乾以備冬月為末水調

傳本草云取苦苣莖中白汁傳疔腫出根又取汁滴瘡上立潰

丹治疔用磁石為末苦酒和傳封之根出立瘥秘

疔瘡用白蘞為末水調傳之聖惠

世治疔瘡用麻內蛙虫一條研傳瘡上却用膏藥貼上飯時去膏藥其疔自出

治疔瘡最有助効用蟬蛻僵蚕為末酸醋調塗四圍留瘡口俟根出稍長然後拔去再用藥塗瘡海藏方單用僵蚕為末津調塗亦佳

保治疔瘡奪命散

烏頭尖

附子底

鷓鴣稍

雌黃

雄黃錢各一 蜈蚣兩一 礞砂 粉霜

輕粉各五分 砒二錢半 腦子許少 麝香許少

右為細末先破瘡出惡血以草杖頭用帛帶藥末插於口內以深為度

丹日本三藏傳疔瘡方江子肉十粒半夏一大顆研末附子半枚羌螂一枚各為末四味臭射香相和看瘡大小以帛繩子圍瘡口以藥泥上又用絹帛貼傳時換新藥以可為度此方活人甚多

聖治疔瘡甚者用附子末醋和塗之乾即再塗千金方同

丹琥珀膏方見瘰癧疔下雜方條

又方用鐵刀斲破疔頭以蟾酥傳之後用

莎草根 甜菜葉 插細以無灰酒盡量調服之酒醒疔化水即痛定如熱除不必去疔亦自愈也

表裏雜方 世治疔瘡

獨脚茅 防風 細辛 甘草節

白僵蚕 青皮 黃連 羌活

獨活 蟬腿 赤芍藥各等

右咬咀每服五錢先將一服加澤蘭葉少許薑一兩同搗爛熱酒和服然後酒水各半薑薑三片煎服此方神効

無治十三種疔皆以此法治之

以緋帛一片裹藥取匝為限先用亂髮鷄子大攤布帛上平黃如桐子大又以棘刺針二十一枚赤小荳七粒為末並布髮上捲緋綿作團外以髮作繩十字縛之置熨斗中急火燒灰研細以枸杞或子或根皮枝葉隨得為末用枸杞末二七緋帛夾一七共成三七研勻分二

服空心温酒調下

取并

世奪命丹治疔瘡發惡心及諸惡瘡

蟾酥錢半 硃砂水飛三分 輕粉 枯礬

寒水石水飛各一錢 銅綠字一 麝香字二

海羊二十箇研即蠟牛也

右件為細末將海羊另研為泥和藥一處丸如菘荳大如丸不就加好酒成之病輕者一丸二丸重者三丸未效再服服時嚼葱白一大口極爛置手心放藥丸於葱內裹合以熱酒送下暖處臥取汗出為效忌冰水

返魂丹治十三種疔

硃砂 膽礬各一兩半 血竭 銅綠

蝸牛生用各一兩 雄黃 枯白礬各一兩 輕粉

沒藥 蟾酥各半兩 麝香少許

瘡毒

右將蝸牛蟾酥研爛餘藥為細末同研和丸如鷄頭大每服一丸令病人先嚼葱白三寸吐在手心將藥丸裹在葱白內用熱酒一盞吞下如重車行五里許有汗出即瘡如不能嚼葱研爛裹下極效

治疔瘡毒氣入腹多嘔吐欲死者即服內托香粉散滴乳半兩另研真菘荳粉一兩為細末煎生甘草湯調三錢時時飲之常令灌潤胸膈方用雄黃菘荳粉乳香等分為末水調服

世疔瘡入腹嘔者煎道人頭濃汁飲之

治疔瘡毒氣入腹昏悶不食

紫花地丁 蟬腿 貫仲各一兩 丁香

乳香各二錢

右為細末每服一錢空心温酒下紫花地丁麥熟時有蒲公英狀但蒲公英開黃花地丁開紫花

瑞治疔危篤者二服即愈輕者一服立效

土蜂房蜂房有毒利大小便 蛇蛻一條

右作三處罌血中盛用黃泥封固火煨存性研為細末
每服一錢空心好酒調服少頃腹中大痛痛止其瘡已

化黃水矣仍服五聖散

大黃兩 生薑兩 瓜蒌箇 皂角針兩

破棺丹下方有雷婦赤芍連翹牡蠣

右吹咀用好酒二升同煎至八分去渣不拘時服

山梔 牽牛末 大黃兩 甘草

京三稜炮各七錢

右煉蜜丸如彈子大酒化服之

世治疔瘡最驗用蒼耳臭牡丹各一大握搗爛新汲水或

真者 順流水調服三碗瀉下黑水即愈
熱下之 丹追毒丸

海浮石燒赤醋碎七次半兩 乳香 沒藥各一

巴豆九粒 川烏兩

右為末醋糊丸如桐子大若患二三日服十九五六日

服十四九隨病上下服之先喫冷酒半盞或一盞又用

冷酒吞下如嘔吞之不妨出藥依上服之病人大便不

動再用三九如疔看得端的小破用頭垢留患處後服

藥

疔後犯疔腫垂死菊花葉一握搗絞汁一升入口即活

此神驗亦用其根丹溪云根莖葉花皆可紫梗者佳

疔腫困重生搗蒼耳根葉和冰見尿絞汁冷服一升日

三服甚驗

危困通 治方

世疔瘡於所屬經絡各馮之 疔瘡者必發於手足之間
生黃痂其中或紫黑色有一條如紅線貫上倉卒之際急
宜以針於紅線所至處刺出毒血然後以麝酥乳香膏等
藥於正瘡上塗之針時以病者知痛出益為好否則紅線
入腹攻心必致危困矣

百治疔腫以針刺四畔用石榴皮末着瘡上調麝團四

畔灸痛為度調未傳上急裏經宿連根自出

診

禹錫患疔腫中風疼痛者爛驢馬糞敷瘡滿五十遍極效
二曰麻子疔其狀肉上起頭大如黍米色稍黑四邊微
赤多癢忌食麻子及衣布并入麻田中行 二曰石疔其
狀皮肉相連色如黑甚硬刺之不入肉內陰微痛忌
瓦礫磚石之屬 三曰雄疔其狀炮頭黑靨四畔仰炮漿
起有米出色黃大如錢孔形忌房事 四曰雌疔其狀瘡

頭稍黃向裏靨亦似灸瘡四面炮漿起心凹色赤大如錢
孔忌房事 五曰火疔其狀如湯火燒灼瘡頭黑靨四邊
有胞漿起如赤粟米忌灸燻 六曰爛疔其狀色稍黑
有白癩瘡中潰潰有濃水流瘡形大小如匙面忌沸熱
食爛帛物 七曰三十六疔其狀頭黑浮起形如黑豈四
畔起大赤色今日生明日二後日三乃至十若滿三十
六藥所不能治俗名黑癩忌噴怒畜積愁恨 八曰蛇眼
疔其狀瘡頭黑皮上浮生形如小豈狀似蛇眼太體硬忌
惡眼看并嫉妬人見之及毒藥 九曰鹽疔其狀大如
匙面四畔皆赤有黑粟粒起大忌食鹹物 十曰水洗疔
其狀大如錢形或如錢孔瘡頭白裏黑靨汗出中硬忌飲
藥水水洗渡河 十一曰刀鎌疔其狀潤狹如雞鶩犬長
一寸左側肉黑如燒燥忌刺及刀鎌切割鐵刃所傷可以

藥治不可亂攻。十二日浮漚疔其狀瘡體圓曲少許不
谷長而狹如雞葉大內黃外黑黑處刺不痛黃處刺則痛
十三日牛拘疔其狀肉起插不破
此十三種初發必先痒後痛先寒後熱熱定則寒多四肢
沉重頭痛心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆者難治其麻
子疔一種始末准痒所最忌者不得觸犯犯即難治其浮
漚疔牛拘疔兩種無忌終不治亦不殺人欲知犯觸但看
春強瘡痛極甚不可忍者是犯禁也炮步

石癰

堅種雜方

治石癰如石不作腫者生商陸根搗擦之燥則易之取
軟為度張文仲癰未潰以苦苣白汁滴之立潰本草云亦出
疔根

木香散治瘡難消不能作膿腫不止酒調下三錢方見痘癰

諸腫

凡卒腫起大痛元菁根大者杵之和苦酒如泥煮三沸昂

土包之氏風毒腫三年苦酒濃煎蔥白以布包慰腫上

外臺秘要治一切熱毒腫商陸根和鹽少許傳之日再易孫

人食忌治一切毒腫疼痛不可忍者搗草麻仁傳之立差

搗後治腫菝葜子一升炒黃杵細以香油和如泥再炒

令焦以舊布如腫之大小攤之貼腫上勿開頭搽上外臺

治惡刺及狐狸刺毒腫取蒲公英草根白汁傳之多塗

立瘥余七月十五日夜左手中指背指着庭木痛不可忍

十日後瘡且深漸高犬痛欲死用此而安孫

患熱腫水研山荳根濃汁塗乾再塗

疔月中以新瓦罐滿注熱水用朴硝二升投湯中攪散

掛北簷下俟硝滲出罐外却收之以人乳汁調半盞掃疔

切風熱毒氣攻注目臉及發頭面四肢腫痛應手神效
山腫毒或疼痛處以赤小豆為末水調傳頰或用水香白
芷水調傳尤妙 又方白芙蓉葉晒乾同皂角為末水調
傳

治諸處皮裏面痛何首烏末薑汁調膏以帛裹於痛處
用火炙皮鞋底履之妙經驗

瘰癧馬刀 結核連續者為瘰癧形長如蛤者為馬刀

曲陽縣劉禪師善治瘡瘍瘰癧其效更捷授予四方太
乙膏玉燭散剋効散翠玉膏用之每每見効

太乙膏治瘰癧子瘡神効
沒藥四錢 清油一斤 黃丹五兩 腦子研一
麝香三錢 輕粉 乳香各二錢

右以清油黃丹熬成膏用柳枝一又用葱蔥七枝旋
加下葱盡為度下火不住手攪至滴水不散却入沒乳
腦麝輕粉等味攪勻磁器內盛用

剋効散

斑猫四十九个不 官桂半錢 粳米四升
赤小豆九升 硃砂半

右五味研為細末初服三字次服半錢次服三字又次
服四字煎樟柳根湯送下空心服以小使林瀝併作瀉
為効照心嘔吐黃水無妨其瘰癧日自消矣

玉燭散治瘰癧自消和血通經

當歸 芍藥 大黃 甘草
熟地 芒硝 黃芩 川芎各等
右為齋末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去渣

溫服日進一服七八日効

翠玉膏 方見
楊氏家藏治癰癧方

荆芥 翅足用 白僵蚕 黑牽牛 各二錢 斑猫 二十人

右為末臨臥時先將滑石末一錢用米飲調服半夜時
又服五更初却用溫酒調藥一錢或二三錢量強弱
用服訖如小便無惡物行次日早再進一服又不行第
三日五更初先進白糯米稀粥湯再進前藥一服更以
燈心湯下調琥珀末一錢重服以小便內利去惡毒為
愈如小便痛用青黛一錢以甘草湯調送下即止

嚴三聖丸治癩癧
丁香 五粒 斑猫 十 麝香 另研

右為末用鹽豉五十粒湯浸研爛如泥和前藥令勻丸
如菘菹大每服五七丸食前溫酒送下日進三服五七
日外覺小便淋瀝是蒸之効或便下如青筋膜之狀是
病之根也忌濕麪毒食

保連翹湯

連翹 一斤 瞿麥 一斤 大黃 三兩 甘草 兩

右剉每服一雨水二碗煎至一盞半早食後已時服在
項兩邊屬足少陽經服藥十餘日後可於臨泣穴灸七
七壯服藥不可住至五六十日方効一方加大黃木
通貝母 各五兩 雄黃 七分 檳榔 半兩 減甘草不用
同前藥為細末熱水調下三五錢

無必勝丸治癩癧不以年深月近及腦後兩邊有小結塊
連服數箇兼勞擦腹內有塊治之

鯽魚一箇去子雄黃一粒錒砂一錢已上二味並入
干炭火燒蜈蚣一條蓬朮兩梔子箇
烟尽取出皂角二挺已上四草麻子五箇去皮
味並燒存性

黃明膠三

右為末另用皂角二挺去皮搥碎以水三碗揉去滓煮
 精羊肉四兩爛軟入輕粉五匣男子乳汁半兩同研成
 膏和藥末丸如棗甚大硃砂為衣温酒浸晨下十九
 服至晚看肉疙瘩子若項有五箇則以五服藥取之視
 其所至多少以為服數既可更進數服

痛上
 白花蛇酒浸軟去皮
骨焙乾二兩
 犀角兩半
 黑牽牛兩半生

青皮兩半
 犀角兩半
 黑牽牛兩半生

世小犀角丸常服除去根本截其源流應効如神諸癰並
 宜服之

犀角
 青皮
 陳皮各一
 黑牽牛一兩半生

右為細末用皂角二條去皮弦子炮搥以布絞取汁一
 碗許又用新薄荷二斤研取汁同熬成膏以前藥末為
 丸如桐子大每服二十九連翹煎湯食後服間以薄荷
 茶湯服

子和一婦人病癰癰延及胸臆皆成大瘡相連無好皮肉
 求戴人瘡之戴人曰公為所勝治以酸寒命以滄鹽吐之

外敷藥方

即吐而着如次用京膈散解毒湯等剉皮肉乃復如初
世治瘰癧未破者如神百藥不應者累效

杏樹葉陰乾為末五分

蝙蝠火焙乾為末二分半

蜜蜂七箇焙為末

萬年霜火煨為末二分半即人中白

白花蛇蛻燒為灰存性為末二分半

右將杏樹葉末用清水調却入前四件藥末調勻傳患處却將皮帛一片用針刺孔貼藥上如乾用清水就帛上刷之每一晝夜換藥一次如面上發熱服清涼飲子數貼其熱自退

敗散瘰癧方神效

白膠香

海螵蛸

降真香

用心無上氣者

右等分為末摻患處外以水帛掩之一夕而退已破者

蜜蜂二十箇

蛇蛻七分

蜈蚣二條端午前收者

右用香油四兩將前三藥入油內用文武火熬成入光粉二兩用葉枝七條如筋大者急攪候冷出火氣七晝夜方可用帛攤作膏貼患處上三五日方得之必義門剪便消

丹貼瘰癧方用大烏頭五箇入炮五箇生用並去皮臍大

皂莢二條半以好米醋一鍾別炙醋乾為度一半焙乾並去黑皮又用砂糯米一百六十粒同研末以好米醋於入上罇頓微煖傳貼患處入蜜少許尤佳不問有頭無頭大罇五枚日乾細研酥調如麪日兩度貼之出聖惠方

或破或不破項以下至胸前者皆治之用九真藤如雞卵大洗生嚼常服之取葉搗覆瘡上數服即止出斗門方何首烏也

無蝸牛散治瘰癧潰肉未潰皆可治

蝸牛不拘多少以行於茶芽上曬乾燒存性

右為末入輕粉少許猪骨髓調用紙花量瘡大小貼之
入丁法以帶殼蝸牛七箇生用取去肉入丁香七枚於七
殼內燒存性與肉同研成膏用紙花貼之

海項後側少陽經中疔瘡不辨肉色不問大小及月日深
遠或有赤硬腫痛用

生山藥一塊 草麻子箇一

右研勻攤貼之如神丹溪云山藥補陽氣生者能消腫
不丟其病為貴非腫硬之謂乎
故其氣則留滯自不容不行

世粉金散

黃柏

草烏等分

為末蜜調傳之

清涼散餅

山慈姑生 良薑等分

右俱搗為餅去汁魯之能散去寒熱或以山慈姑磨調
酒服大妙此藥大能散癰如神

東龍泉散塗癰

瓦粉

龍泉粉炒即磨刀石上粉也

昆布去上

廣茂

京三稜各半兩酒浸炒乾

右件同為極細末煎熱水調塗之用此去疾尤速

心治癰用鯽魚莖花燒灰存性水調傳 治鼠癰小嫩鼠

未出毛者焙乾蝙蝠糞小麥炒鬼箭根焙乾各為末和勻

油調傳乾再傳之

本治鼠癰癰刺蝟皮弄上炒右一味研為末加水銀粉

乾傳

廣治瘰癧經年不瘥者生玄參搗碎傳上日二易之

外治癩癧燒狼屎灰傳上
本治諸癩疾

硃砂

砒霜

硃砂

馬牙硝各等

右乳鉢內研細麵糊搜如香附子狀相瘡口大小作之
盡送入瘡口中恐腫時用薄蒜研細塗之待收口却將
大栢皮白丁香並為末盡入乳鉢如邊不乾却用江子
去殼不拘多少用麻油煎令赤去火氣後去江子入蠟
合如膏看瘡口大小塗之及將白芨末水調塗上立效
治漏癧用蛇菰子不拘多少瓦上晒乾為末用紙揆蘸藥
入瘡口立效蛇菰子未詳
丹又方用大田螺肉燒存性為末射香少許濕則乾修乾
則油調傳
脈人年五六十其脈浮大者痺俠背行苦腸鳴馬刀俠

者皆益勞得之

又治癩癧

人參

白朮

當歸

陳皮

芍藥

川芎

香附

茯苓

半夏

甘草

右作一服薑二片以金銀藤煎湯一鐘半煎前藥食後
就吞絳宮丸五十粒

又方絳宮丸

大黃

山查

連翹

川芎

當歸

麥芽

杏仁

蘆薈

甘草

芸薹子

黃連

南星

海藻

升麻

羌活

桔梗

防風

白朮

黃芩

右用神麩糊為丸已破加入參一兩作膏用甘草節僵

蚕同煎
治頸上塊動者

夏枯草末錢六 甘草末錢一

右和勻每服一錢至二錢茶清調下食後

本言夏枯草大治瘰癧散結氣有補養厥陰血脈之功而經不言觀其能退寒熱者儘可倚仗若實者以行散之藥佐之外施艾灸亦漸取效此草三四月開花夏至邊便枯蓋稟純陽之氣得陰則枯耳世人不知故表而出之內瀉病本之法並見前表裏條

虛東連翹散堅湯治耳下至缺盆或至肩上半瘡堅硬如石動乏無根者名馬刀瘡從手足少陽經中來也或生兩脇或已流膿作瘡或未破並皆治之

當歸酒洗 黃芩生半

柴胡根二錢 連翹兩半

黃芩酒炒 甘草炙六

京三稜洗細到半兩同廣茂酒

土瓜根酒炒 芍藥錢一

蒼朮錢三

黃連酒炒 廣茂酒炒

草龍膽酒洗

右以一半為細末煉蜜為丸如棗葶大每服一百丸或一百五十丸一半吹咀每服半兩水一盞八分先浸半日煎去渣熟服臨臥頭低脚高去枕而臥每日作十次嚥留一口送下九子服畢如常安臥

升陽調經湯治遊項下或至頰車生瘰癧此症出足陽明胃經中來也若其瘡深遠隱曲肉低是足少陰腎中來也是戊傳癸水夫傳真俱作塊子堅硬大小不等並皆治之或作丸服亦得

升麻八錢

連翹兩半

葛根五錢

草龍膽酒炒

桔梗兩半 細黃芩酒炒六錢 黃柏酒炒去皮七錢
 知母酒洗炒一兩 廣茂酒洗炒一兩 甘草炙半兩 京三稜酒洗
廣茂炒五錢 黃連去鬚酒洗五錢

右秤二半作丸煉蜜為丸如菉菘大每服一百丸或一百五十九丸 咬咀每服半兩若不能食大便硬可施加至七八錢止水二盞先浸半日前至一盞去香熱服 身脚在高處去枕頭膺一口作十次嚙之留一口在後送下九子服藥畢臥如常此治法也

散腫潰堅湯治馬力瘡結硬如石在耳下至缺盆或至肩上或至脇下皆手足少陽經中及癰癧遍下頰或至頰車堅而不潰在足陽明經中所出或一瘡已破及流膿水並皆治之服藥多少臨病斟酌量病人飲食多少大便硬軟以意消息之

通治少陽明

救苦勝靈丹湯治馬力挾癭者從耳下或耳後下頰至肩上或入缺盆中者乃手足少陽經之分野其癭癧在於頰

柴胡稍錢四 升麻錢六 桔梗兩半 草龍膽酒炒半兩
 黃芩稍錢一 半生 連翹錢三 甘草根錢三
 當歸錢三 白芍藥錢二 瓜蒌根酒洗半兩 黃柏去皮半兩
 知母兩半 葛根錢二 黃連錢二 京三稜酒炒三錢
 廣茂酒洗炒三錢 昆布去土半兩

右咬咀每服六錢或七錢水二盞先浸半日前煎至一盞去香稍熱服於臥處伸脚在高處頭微低每嚙一口作十次嚙至服畢依常安臥取藥在胸中停留故也另攪半料作細末煉蜜為丸如菉菘大每服一百丸此湯留一口送下更加海藻半兩炒食後量虛實加減多少服皆做此例

下或至頰車者乃足陽明經之分野受心脾之邪而作也
今將二證合治之

黃芪一錢護皮毛實腰理及活血氣又人參三分補

氣短及不調真漏蘆半錢勿以白升麻一錢

葛根半錢此三味俱甘草半錢能調中和

連翹一錢此一味乃十二經中之瘡家之神藥也

牡丹皮三分去腸胃當歸身三分生地黄三分

熟地黄三分此三味諸經中肉桂二分大

月倍之其味酸其氣寒能補中益氣治腹痛如冬月寒症勿用

散結聚如陰症瘡瘍少用之此寒因熱用之意又

為陰寒覆蓋其瘡用大辛熱去之煩燥者勿用

柴胡功同連翹如瘡不黍粘子腫不用

昆布二分味鹹若瘡堅硬甚京三稜炮二

廣茂者用之不便者勿用羌活

獨活

防風

似拔防風辛溫如瘡在膈上雖手足太陽

經症亦當用之為能散結去上節風邪故也

益智仁二分如睡多者胃不和也或吐沫

麥芽一錢健脾神效消化者用之黃連炒三分

厚朴一錢製一錢二分黃柏炒三分如煩燥

右共為細末湯浸蒸餅捏作餅子晒乾搗如米粒大每

服三錢白湯下如氣不順加橘紅甚者加米香少許

量病人虛實消息之母令藥多妨其飲食此治之大法

也如止在陽明分者去柴胡黍粘子二味餘皆用之

如在少陽分為馬刀挾瘦獨活漏蘆升麻葛根加瞿

麥三分如本人氣素弱其病勢來時氣盛而不短促

者不可考其平素宜作氣盛而從病變治之權也加黃

濕痰

治風癱瘓

芩黃連黃柏知母防已視邪氣在土中下而用之假令
 在上焦加黃芩半酒洗在中焦加黃連半生酒在下焦加
 酒製黃柏知母防已之類選而用之如大便不通而
 滋其邪盛者加酒製大黃以利之如血燥而大便乾
 燥者加桃仁泥大黃如風結燥不行者加麻仁大黃
 以潤之如風澁而大便不行加煨皂角仁大黃秦苑
 以利之如膿血覺身亦氣澁而大便不通者加郁李
 仁大黃以除風燥如陰寒症為寒結秘而大便不通
 者以局方半硫丸或加炮附子乾薑煎候冰冷服之
 大抵用藥之法不惟瘡瘍一家凡諸疾病氣素怯弱者
 當去苦寒之劑多加入參黃芪甘草之類以瀉火而補
 元氣餘皆倣此

雜方

土附子升 食鹽升 小便升
 右三味同浸半月日取出將附子去黑皮陰乾為末用
 黑豈爛煮研為膏丸附子末如桐子大每服十九酒吞
 下早晚二服

鹹炙

丹初發頭項硬未破者其効如神牡礪四兩甘草二兩為
 末每服一大錢食後臍茶同點日二服半升除根
初虞世
瘡治世義大官 一切丈夫婦人瘰癧經効牡礪用炭一
瘡瘡用此方 稱煨通赤取出於濕地上用紙襯出火毒一宿取四兩玄
 參三兩并搗羅為末以麵糊丸如桐子大早晚食後臨臥
 各三十丸酒下藥將尽瘰亦除根出經
驗方

辛散

取麥子微炒研為細末薄荷酒調二三錢服治瘰癧及
 數日稍稍飲之

酸收

甘緩

針灸

則効

世治瘰癧用夜合草遇夜則其葉閉合本草名谷明俗名連錢毋出木由中貼水面生取其葉搗自然汁服之查盒患處効

保文武膏治瘰癧用桑椹黑熟者一斗以布袋絞取汁石器中熬成膏子白湯化下一匙日三服紅薯晒乾為末湯調服

聖治瘰癧腫硬疼痛年深時久不瘥用狸頭蹄骨酥炙黃搗羅為散每日空心粥飲調下二錢七

黃帝曰寒熱瘰癧在於頸腋者皆何氣使然岐伯曰此皆風痿寒熱之毒氣也留於脈而不去者也鼠痿之本皆在於藏其末上出於頸腋之間其浮於脈中而未內著於肌肉而外為膿血者易去也黃帝曰去之奈何岐伯曰請

從其本引其末可使衰去而絕其寒熱審按其道以予之徐徃徐來以去之其小如黍者一刺知三刺而已寒熱

右經一章皆從經脈取臟腑之本以治瘰癧之末也其未出於耳下或耳後下頰至肩或入缺盆中者當於手足少陽經取之或針或灸如後穴

偏瘰癧天井 肩井

撮瘰癧天井 半寸灸十壯

東腋腫馬力挾瘰善自嚙舌頰天牖中腫寒熱 陰泣

丘墟 灸各十分 太衝 一分灸 腋下頰項腫 天池 順

三分灸 如頰腫加後谿 二分灸 腋下腫馬力挾瘰喉

痺 六 陽輔 五分灸 申脈 一分灸 三

甲胸中滿腋腫馬力瘰善自嚙舌頰天牖中腫淫溼胫瘦頭眩枕骨頰顛痛目溢身痺洒淅振寒季脇支滿寒熱

脇腰腹膝外腫痛，臨泣主之。馬力腫痿，淵液章門支溝主之。出於頰下，或至頰車者，當於手足陽明經取之。或針或灸如後穴。三里足陽明，合谷手陽明。丹搗生商陸根，作餅子置於瘰癧上，艾炷灸餅子上，乾即易之，灸三四餅出外臺。

世當瘰癧，上貼肉灸十四壯，神效。

東瘰癧，馬力將先出，瘡用四楞鐵環定住，不令出移，破作口子，以油紙然，維之，勿令合了，以絕其瘡之源，其効至

速如瘡不破，或病人不肯破，更以藥塗之，三日，易之以

龍泉散，主之。方見表裏條

世瘰癧多生肩項，或赤或白，或沉或浮，初生如莖，久似核

年月浸久，其大如梅，或如雞卵，排行成列，或生二三，或生

六七，俗云蟠蛇瘰癧是也，用性努力思慮過久，則疾痛赤腫

診治

繼之早治，為上

流注瘰癧，婦人多有之，其性急躁，其氣怫鬱，其心執着，初生在項破後，膿注四肢，遍體結毒，如梅李狀，不瘳自破，孔竅相穿，寒熱疼痛，或流膿，洗是名流注瘰癧也，又名千歲瘡，宜服托裏救苦神應丸。

川烏附去皮臍生用一兩

烏頭五兩

當歸酒浸一宿

沒藥

白芷

陳皮

甘草節各一兩

蟬蛻水洗半兩

大皂角七錠去皮弦子

薑黃半兩

右用皂角敲碎，水四大碗煎至二大碗，濾去渣，用汁下同煮烏頭、川烏，候烏頭爛為度，搗如泥，其餘諸藥却另為末，和烏頭泥為丸，如桐子大，每服六十九丸，飽皆用薄苜湯下。若瘡既破，穿鑿孔穴，其處必生腫肉，如指大，或黑或白，乃風與氣搏，宜驅風行經散氣之劑，以化氣。

調經湯主之

化氣調經湯與神應丸間服治流注癰

香附末酒浸一宿晒乾一兩

橘皮二兩

羌活一兩

白芷一兩

甘草半兩

牡蠣煨半兩

天花粉

皂角刺各半兩

右為細末每服二錢用清湯不拘時候調下日三次

如脈有力者先用追毒神異湯下之却服救苦神應丸

辰砂

血竭各一錢

麝香一字共為細末 大黃半兩

大甘草節半兩

右為咬咀作一貼河水一鍾煎半鍾調前末子臨臥服

之

單窠癰者生三箇也發於頸項最難治但宜如前藥服之

日久自消或發於顛骨亦難治用毒藥療之勿令浸漬

久多蓮子癰一胞裹十數枚生於項之左右以手觸則能

轉動尚可用藥治療如堅硬按不動者乃不可去增寒發

熱燥渴凡遇此症至難治雖神聖亦無如之何也已

重臺癰生於項頸或左或右初則單窠結在上或在下重

疊見之是名重臺癰此症藥不可療不可針灸若是毒行

其腫痛發渴生痰萬死一生害入極速初覺有之急用小

犀角丸粉金散治之 燕窠癰形似燕窠不可治

肺脈微瀯為鼠瘦在頸支腋之間下不勝其上其應善疫

全文見治虛實法色白脈主泄

靈黃帝曰決其生死奈何岐伯曰反其目視之其中有赤

脈上下貫瞳子見一脈一歲死見二脈半二歲死見三

脈二歲死見三脈半二歲半死見三脈三歲而死見赤脈

不下貫瞳子可治也寒熱篇

禁忌

夫瘰癧初發必起於少陽經不守禁戒必延及陽明經大抵食味之厚鬱氣之積曰毒曰風曰熱皆此二端招引變換須分虛實彼實者固易治自非痛斷厚味與發氣之物雖易亦難殊為可慮以其屬膽經主決斷有相火而且氣多血少婦人見此若月經行不作寒熱可生稍久轉為潮熱其症危矣自非斷欲絕慮食淡雖神聖不可治也

結核

獨形而小核者為結核

結核火氣熱甚則鬱結堅硬如果中核也不須潰發但熱氣散則自消

痰積

結核或在項在頸在臂在身如腫毒者多在皮裏膜外多是痰注作核不散問其平日好食何物吐下後用藥散核

結核在頭項方

僵蚕炒

大黃酒

青黛

膽星各等

右為末蜜丸噙

結核在下頰二陳湯加酒炒大黃連翹桔梗柴胡

結核在臂二陳湯加連翹防風川芎酒蒸蒼朮皂角刺僵

蚕麝香行大陰厥陰之積痰使結核自消其捷

濟治頰下結核不消經効用大肚蜘蛛不拘幾箇以好酒

浸之研爛同浸酌酒去香溫熱臨臥服之

瘰癧

瘰癧

虛邪之入於身也深寒與熱相搏久留而肉着寒勝其熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌為膿內傷骨內傷骨為骨蝕有所疾前筋也筋當作結筋屈不得伸邪氣居其間而不及發為筋痛有所結氣喘之衝氣留之不得

反津液久留合為腸瘤文者數歲乃成以手按之柔已有
所結氣歸之津液留之邪氣中之凝結日以易其運以聚
居為昔痛以手按之堅有所結深中骨氣因於骨節與氣
并日以益大則為骨疽有所結中於肉宗氣居之邪留而
不去有熱則化而為膿無熱則為肉疽凡此數氣者其發
無常處而有常名也刺節真邪結也此皆虛邪中入為病
弗去而又留者積歲累月而成疽

子和新纂一婦人年四十餘有瘤三辨戴人令以醋吐之
三涌三汗三下癭已消半次服此癭之藥遂大消去夫病
在上者皆宜吐亦自有消息之法耳

疔瘰氣赤瘰丹標熱勝氣也火之色也

丹瘰氣先須斷厚味
海藻洗 黃連二

火 雜方

右為末以少許置掌中時時砥之津咽下如消三分之
二須止後服一方用黃栢二兩海藻一兩不用黃連亦
佳

治癭氣結核癭瘤腫硬以昆布一兩洗去鹹搗為末每用
一錢綿裹於好醋中浸過合之咽津藥味盡再嚼之

用治頸下卒結囊欲成癭海藻一斤洗去鹹酒浸飲之
無破結散

- 海藻洗 草龍膽 海蛤 通草
- 昆布 礬石枯 松蘿名三 麥麩分四
- 半夏 貝母各二

為采酒服方寸七日忌鯽魚猪肉五辛生菜諸雜毒
物十日知二十日愈

瘡玉壺散治三種癭

海藻洗 海帶洗 昆布 雷丸各一
 青鹽 廣茂各半
 右等分爲細末陳米飲丸如榛子大噉化以煉蜜丸亦好

子種 人參化瘦丹

海帶洗 海藻洗 海蛤 昆布已上四
 澤瀉炒 連翹已上各 猪鬃 羊鬃各十枚
即猪羊外腎乃囊中之卵也

羅 寶金散偏醫癭氣無不瘥

右爲末蜜丸如鷄頭大臨臥噉化一二丸忌油膩物
 猪羊鬃十對煖水洗去脂膜後晒乾杵爲細末 海藻洗
 海帶各二 丁香 木香 琥珀研
 麝香研各一分 真硃研半兩

右件先將丁香木香海藻海帶杵爲細末入下項藥味合和再研細重羅過每服一錢熱酒一盞調服夜臥服垂頭而睡若在室男女十服必効如男子婦人患者一月見効有胎不可服

海 帶丸治癭氣久不消

海藻洗 貝母 青皮 陳皮
 右件各等分爲細末煉蜜爲丸如彈子大食後噉化下丸大効

羅 拉瘤方名三井散

硃砂 粉霜 雄黃已上各 輕粉
 沒藥 乳香已上各 土黃三錢 雄黃法硃黃
兩去殼巴豎半兩去油硃砂另爲末二錢右以硃黃丁處爲末用木盤子同石腦油成塊油極裹定埋於地坑內四十九日取出於磁器盛
壁作小塊研細少許硃黃即雌黃

右為細末以津調塗瘡頂外邊敷一菲葉先以花紙貼
乏上用小黃膏貼之

小黃膏

黃栢

黃芩

大黃各等

右為細末以水調為糊比前藥大一遭三日見至八
九日不取直候可取一方單用黃栢末亦佳

丹小兒丹癰草麻子五箇去皮研入麩一匙水調塗之甚

妙由小

羅生肌青龍散

訶子皮

高茶

龍骨

右件各等分為細末乾煨上

又枯瘡方

砒

硃砂

黃丹

雄黃

輕粉已上各

斑猫生用三

硃砂

乳香

沒藥絡一

右研為末糯米粥為丸捏作棋子樣爆乾先系破瘡頂
三炷以藥餅蓋上用黃栢末以水調貼之數日自然枯

乾落下

一方以銅綠為末草刺瘡破瘡上以膏藥塗之

世點瘡方神驗

桑柴灰

棗樹灰

黃荆灰

桐殼灰格二

蕎麥灰少

右以沸湯淋汁五碗許澄清入斑猫四十箇川山甲五
片乳香腦子不拘多少約五碗煎作三碗用磁器盛之
乳香腦子候冷入之後臨用時入新石灰調成膏神妙
傳瘡上乾以清水潤之其效如神

羅枯瘡方

桑柴灰三碗

石灰三碗

朽木三兩

乾桑耳三兩

草烏半斤

川烏兩

右朽木等四味一處燒灰令有性同煎之灰研勻用米一桶淋汁如法熬成膏用之

針灸

東諸瘦惡氣

肩顛男左灸十八壯右十七壯女右灸十八壯左十七壯

又法

天府壯七

衝陽隨年壯

甲瘦天窻

作天窻于金作天府

及膈會主之

瘦瘰氣舍主之

子和在西華眾人皆訕以為世瀉而已一日魏壽之與戴人入食肆中見一夫病一瘰正當目上細內皆色如灰李下垂覆目睛不能視物戴人謂壽之曰吾不待食熟立取此瘰魏未之信也戴人曰吾與爾取此瘰何如其人曰人皆不敢割戴人曰吾非用刀割別有術其人從之乃引入一小室中令臥一床以繩束其所刺委中大出血先

令以手揉其目瘰上亦刺出雀巢立平出戶壽之大驚戴人曰人之有瘰可盡窺乎郟城戴人之鄉也一女子未婚年十八兩手背皆有瘰一類雞距二類羊角腕不能鉤向明望之如耕膠然夫家欲棄之戴人見之曰在手背者為膠瘰在面者為粉瘰此膠瘰也以錐針十字刺破按出黃膠膿三二匙立平瘰核更不再作婚事復成非索明者不敢用此法耳

本治果報面生瘰癧方用艾丸灸十壯即醋磨硫黃塗

帛上剪如螺螄掩子大貼所灸處更用膏藥重貼二日

換候痒擠出膿如葦荳粉即愈硫黃羅謙甫作雄黃

無瘰多着於肩項瘰則隨氣凝結此等皆年數深遠浸大

浸長堅硬不可移者名曰石瘰皮色不變者名曰肉瘰筋脈露結者名曰筋瘰赤脈交結者名曰血瘰隨憂愁消長

診察

者名曰氣瘰五癭皆不可妄決破決破則膿血崩潰致
天柱癰則有六骨瘤脂瘤肉瘤膿瘤血瘤亦不可決潰肉
瘤尤不可治治則殺人唯脂瘤破而去其脂粉則愈
丹服瘰癧藥先須斷厚味

目眇瘍即俗謂之
目眇

運氣

運氣目眇方有二

一曰熱經云少陰司天之政三之氣大火行寒氣時至民
病目赤眇瘍治以寒劑也

二曰燥經云歲金太過民病目赤腫眇瘍又云陽明司天
燥淫所勝民病目眇眇治以溫劑也

雜方

世治偷針眼方

南星生為末
三錢 生地黃不拘
多少
右一處研成膏貼太陽兩邊腫自消

又方治偷針眼生薑搗細益之淚出即愈

天蛇頭 代指

雜方

丹蒲公英草清明時節如薺菜狀中開一朶花如菊花者
取乾與蒼耳草一味等為末以好醋濃煎浸洗即愈

蒲公英及冬酒治天蛇頭極效累驗方見乳
瘡門

世治天蛇頭蒲公英搗細水和調去查服之又搗查食患
處屢效

治天蛇頭用

野落蘇即兼
絲子 金銀花藤 天蒼麥

右切細用好米醋濃煎先薰後洗

又方用入糞雜黃泥搗之畏在患處即愈

丹治手指忽腫痛名為代指以烏梅入醋研浸患處立瘥
治手指腫酸漿水入少鹽熱浸之冷即易孫真
方

雜方

甲疽散甲 散五銜反

精治甲疽因剔甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫痛復綠
窠窄靴研損四邊腫嫩黃水出浸淫相染五指俱爛漸漸
引上脚踏跑漿四邊起如火燒瘡日夜倍增醫方所不能
療者用綠礬五兩形色似朴硝而綠色置於鐵板上聚炭
封之吹令火熾其礬即沸流出色赤如溶金汁者是真也
候沸定汁盡去火待冷取出研為細末色似黃丹收之先
以鹽湯洗瘡晶裏乾用此末傳之愈

靈石 治甲疽努肉裹甲膿血疼痛不瘥凡此疾須剔去肉
中甲不治亦愈或已成瘡不瘥用乳香末膽礬燒研等分
傳之內消愈

世勝金方治甲疽努肉膿血疼痛不瘥用牡礪頭厚處生
研為末每服二錢研錠花酒調下如瘡盛已潰者以此末

傳之更服前藥二日三服

丹嵌甲陷甲割甲成瘡久年不瘥者用烏頭尖黃柏等分
末之洗淨貼之

精華陀治嵌甲累效方

硃砂 乳香並研各錢半 膩粉錢半 橄欖核燒存性用

三箇 黃丹字

右為末以生麻油調先以鹽湯洗淨搥乾傳之二次效
乳癰乳巖

乳癰陽
明歐陰
所屬

丹乳梗論○乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不
知調養怒忿所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不
行故塞不通而汁不得出陽明之血沸騰故熱甚而化膿
亦有所乳之子膈有滯痰口氣焮熱食乳而睡熱氣所吹
遂生結核於初起時便須忍痛搽令稍軟吮令汁透自可

消散矣此不治必成癰癤治法疎厥陰之滯以青皮清陽
明之熱細研石膏行汚濁之血以生甘草節消腫導毒以
瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸頭或湯或
散加減隨意消息然須以少酒佐之若加以艾火兩三壯
於腫處其效尤捷彼村工喜於自衛便妄用針刀引惹拙
病良可哀憫若夫不得於夫不得於舅姑憂愁鬱遏時白
積累脾氣消沮肝氣橫逆遂成隱核如鷲棋子不痛不痒
十數年後方為瘡陷名曰妳巖以其瘡形軟四似巖穴也
不可治矣若於始生之際便能消釋病根使心清神安然
後施之治法亦有可安之理予族姪婦年十八歲時嘗得
此察其形脈稍實但性急躁伉儷自諧所難者後姑耳遂
以單方青皮湯間以加減四物湯行經絡之劑兩月而安
此病多因厚味濕熱之痰停蓄膈間與滯乳相搏而成

血滯氣

又有滯乳因兒口氣吹噓而成又有拗怒氣激滯而生者
煨石膏燒樺皮瓜蒌子甘草節青皮皆神效藥也婦人此
病若早治之便可立消有月經時悉是輕病五六十後無
月經時不可作輕易看也

乳癰

青皮

瓜蒌

橘葉

連翹

桃仁留尖

皂角刺

甘草節

破多加參芪

精神効瓜蒌散治乳癰妳巖神効丹溪亦云妙捷恐貧賤
之家未能辦集者用後蒲公英尤妙

瓜蒌

一箇去皮焙為末子多者有力

甘草生

當歸酒浸焙各半兩

乳香研各

沒藥二錢半

右為末用無灰酒三升於銀石器內慢火熬取二升清
汁分作三服食後良久服如有妳巖便服此藥可杜絕

病根如毒氣已成能化膿為黃水毒未成即於大小便中通利如疾甚再合服以退為度 立効散與前方間服神妙但於瓜蒌散去減去當歸加紫色皂角刺一兩六錢是也

本蒲公英草味甘平無毒主婦人乳癰腫水煎汁飲之及封之立消

丹蒲公英在處田間路側有之三四月開黃花似菊味甘解毒散滯意其可入陽明太陰經洗淨細研以忍冬藤濃煎湯入少酒佐之隨手便欲睡睡覺已失之矣

滯乳食痰
張氏橘皮湯治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍者神効因小兒吹乳變成斯疾者並皆治之用陳皮一味湯浸去白晒乾麩炒微黃為細末麝香研酒調二錢初發覺亦腫疼痛一服見効

丹乳癰初發腫硬一服瘥真樺皮末酒服方寸七睡省已失

羅勝金丹治婦人吹乳極有神効用百齒霜即木梳上髮垢右一味不拘多少用無根水為丸如桐子大每服三丸倒流水送下食後令病左乳者左臥右乳者右臥於溫處汗出愈用新水傾於房上接之乃倒流水也

圖治婦人奶疼痛不可忍用川山甲炙黃木通各一兩自然銅半兩生用三味搗為細末每服二錢溫酒調下不拘時候

簡婦人吹乳獨勝散白丁香半兩搗羅為末每服一錢七溫酒調服無時

雲治婦人吹乳皂角散誦曰婦人吹乳意如何皂角燒灰蛤粉和熱酒一杯調一字頃間搽散笑呵呵

又方

有痰者清之

丹楊瑞人乳腫痛

乳香研一 瓜蒌根末兩 右研令勻溫酒調服二錢

青皮 石膏煨 連翹 皂角刺炒

黃藥子 當歸頭 木通各一 甘草生三分

作一貼入好酒些少同煎飲之又有別藥洗腫處

義二孺人平時乳內有結核不為痛忽乳邊又有一腫核頗却有些痛

黃芩 川芎 木通 陳皮各四

人參仁 芍藥仁 大腹皮仁 炙甘草

生甘草絡一 當歸頭水

分二貼煎服

丹二孺人但經將行而乳腫先兩日發口乾而不渴食少

減脈左弦帶數右却平治用四物湯加陳皮白朮茯苓

熱下典點九三十粒

產後乳膨調麥牙飲自消

雪連翹湯治產後妬乳并瘰

連翹 升麻 芒硝各一 玄參

芍藥 白薇 防已 射干絡八

大黃仁 甘草六 杏仁四十個去皮尖

右咬咀以水六升煮二升下大黃次芒硝分三服

丹一婦人年六十厚味鬱氣而形實多妬夏無汗而性急

忽左乳結一小核大如棋子不痛自覺神思不佳不知食

味絕半月以入參湯調青皮甘草末入生薑汁細細呷下

日夜五六次至五七日消矣此乃妳岩之始不早治隱至

五年十年已後發不痛不痒必於乳下潰竅如巖穴出

產後輕者內消之

乳岩在早治

膿又或五七年十年雖飲食如故洞見五內乃死惟不得於夫者有之婦人以夫為天失於所天乃能生此謂之巖者以其如穴之欹呀空洞而外無所見故名曰巖患此者必經久淹延惟此婦治之早正消患於未形餘者皆死片十餘人又治一初嫁之婦以青皮甘草與之安

雜方敷

丹用蒲公英草搗爛蠶患處神妙

雲用天南星末以温酒調塗之

聖治婦人乳痛成瘻以益母草為末水調塗乳上宿自瘻生搗爛用之亦得

山婦人吹乳用葉樹蚌屑飯搗成膏貼之

丹乳頭裂破丁香末傅之梅師

怪穴乳癰乳中穴在乳下中針入一分沿皮向後一寸半灸瀉

用乳癰寒熱短氣臥不安膺慙主之乳癰妻素寒熱痛

針灸

不可按乳根主之大驚乳痛梁丘主之乳癰有熱三

里主之乳癰諸藥不能止痛者女子乳癰驚巨虛下廉

主之千金云臂腫重乳癰太衝及復溜主之妬乳太

淵主之婦人乳餘疾盲門主之

囊癰陰頭癰

囊癰屬

丹外科精要云癰疽入囊者死囊屬厥陰今以死言之將以為屬少陰腎經邪予親見入囊者七八人悉以濕熱入肝經施治而用補陰藥佐之雖膿潰皮脫辜丸懸掛可畏者皆不死但未知下虛年老者如何耳

千治丈夫陰頭癰師所不能醫用鱉甲一枚燒末以鷄子

白和傅之良

便毒

精治穀道前後生癰謂之懸癰用橫紋甘草一兩四寸截

虛

斷以長流水一碗文武火慢慢離水炙自早至午炙令水盡甘草中心見水潤為透細剉却用無灰好酒二小杯入甘草煎至一杯溫服之二三服便可保無虞此病初發如松子大漸如蓮子數十日後始覺赤腫如棗子即破若破難治此藥雖不能消過二十日後必盡消矣投雨服亦無害林判院嘗患此癰已被服此藥兩服瘡即合甚妙

丹騎馬癰用大粉草帶節四兩長流水一碗以燂浸水盡為末入皂角灰少許作四服湯調頓服立效

疔青皮湯治便毒

青皮 防風 當歸身 甘草稍生各等分

右咬咀分作四服水一小碗煎至八分去粗大溫服空心日進三服

丹毒腫或着陰卵或偏着一邊痛牽引小腹痛不可忍見

內疎

癰疽雜病痛

子和王燭散即四物湯諸胃承氣湯各半服之也

世又方

劉寄奴 王不留行 大黃 金銀花

木鱉子

右等分酒水煎露一宿五更服

丹便毒初起

射干 生薑如指大搗細

右取順流水煎微沸服之以瀉為度又用牛皮膠醋煮

塗患處

已結成膿者

大黃兩半 枳實三 厚朴三錢 甘草節一錢
 連翹半錢 桃仁泥一枚 生薑三片

又便毒 右作子貼煎服之

青皮

白芷

柴胡

赤芍藥

檳榔

朴硝

烏藥

木瓜

大黃

連翹

瓜蒌

生地黄

甘草節

三稜

蓬朮

黃芩

犀角

皂角刺

右咬咀水三碗煎至一碗大飢服以瀉為度

山便毒取大蜘蛛一箇研細熱酒下

丹又方用甘草節白芷黃連各等分如破者龍骨白枯礬

赤石脂并用鐵圍散癰疽腫毒亦治用之效

乳香

沒藥各半

大黃

黃連

黃栢

南星

半夏

防風

雜方

羌活

皂角刺

木鱉子

瓜蒌

甘草節

草烏尖

阿膠研

右為細末醋調成膏以石器內火熬黑色為翎傳之

貼骨癰

保諸瘡大痛不辨肉色漫腫光色名附骨癰如神三生散

露蜂房

蛇退

頭髮洗淨

右燒灰存性研細酒下三錢

丹附骨癰熱在血分之極初發時以青皮甘草治之破後

當養血

內癰有三

素肝滿腎滿肺滿皆實即為腫王註云滿謂脹氣肺之癰

喘而兩胛滿仲景云肺癰吐膿如米粥烟燥振栗肝癰兩胛滿臥則驚不得

小便腎癰脚下至小腹滿大奇論林億云脚下當作小

診

腹腫強按則痛便數似淋仲景云腸癰小腹痞堅蓋小腹
痛而痞堅者腎癰也小便數而似淋者腸癰也即肺癰肝
屬之
胃脘癰人迎脈逆而盛全文見後
胃脘癰條

肺癰腸癰胃脘癰

肺癰法

丹癰疽發於內者肺癰肝癰腎癰腸癰囊內癰附骨癰惟
肺癰須先解表今表而出之

千欬唾膿血其脈數實者為肺癰若口中欬即留中隱痛
脈反滑數此肺癰也

問曰病者欬逆何以知其肺癰當有膿血吐之則死其脈
何如曰寸脈微而數微為風數為熱微則汗出數則惡寒
風中於衛呼氣不入熱逼於榮吸氣不出風傷皮毛熱傷
血脈風舍於衛其人則欬目乾喘滿咽燥不渴多吐濁沫
時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌

可救膿成則死問曰振寒發熱寸脈滑數其人飲食起
居如故此為癰腫醫反不知以傷寒治之不應何以知有
膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在胃中者為肺
癰其脈數欬吐有膿血設膿未成其脈自數察法但數為
膿已成也

先解表
次取膿
終補裏

要小奇龍湯方見傷寒條

要葶藶大棗瀉肺湯治肺癰喘不得臥

葶藶炒黃研細
如彈大

大棗十二枚

水三升入棗先煮取二升去棗入葶藶又煮一升頓服
之又曰治肺癰胸滿脹一身并面目浮腫鼻寒涕涕出
不知香臭酸辛咳逆上氣喘鳴迫塞用前方三日一劑
可至三四劑須先與小奇龍湯一劑乃與之
要桔梗湯治欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥

臭久久吐膿如粥者肺癰也

桔梗 甘草各一兩

水三升煮取一升去渣分溫再服則吐膿血也亦治喉痺三因其草倍之每四錢名四聖散千金亦名桔梗湯用桔梗三兩甘草二兩服後必吐膿血

要菁莖湯治肺癰又云一本治欬有微熱煩滿心胸甲錯

葶藶切升 薤白仁半 冬瓜仁半 桃仁五十枚

水一斗先煮菁莖得五升去粗入諸藥取二升分溫五服當吐如粥千金云肺癰當吐膿血葶藶即汀洲間蘆荻之類種也

治吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者宜消風散天男子髮灰研細入和之清米飲下可除根只兩服亦治吐血散方荆芥川芎羌活人參茯苓僵蚕防風藿香蟬蛻各二錢厚朴陳皮各半兩為末是也

禁固獨行方治心曾甲錯為肺癰黃昏湯王廷用夜合皮

掌大一枚水三升煮取二升分再服夜合樹按本草章即烏農樹

右肺癰證治要畧以小青龍湯先與三劑乃行氣取膿之藥將以解表之風寒邪氣此治腫瘍之例也後以常宙方終之者將以補裏之陰氣此治潰瘍之例也此上方皆丹溪所集

取膿雜方

梅如聖丸治風熱毒氣上攻咽喉痛痺腫塞妨悶及肺癰喘嗽唾膿血骨滿振寒咽乾不渴時出濁沫氣臭腥久久咯膿狀如米粥

律腦研 牛黃研 桔梗 甘草生用各一錢

右為細末煉蜜丸每兩作二十九每用一丸嚥化

丹濟生桔梗湯治肺癰心曾氣塞咳嗽膿血心神煩悶咽乾多渴兩足腫滿小便赤黃大便多澀桔梗貝母川歸瓜蒌仁根殼薏苡仁桑白皮防風已上各一兩生甘草杏仁

蒸百合各半兩黃芪一兩半右修事吹咀每服四錢水一
碗半生薑五片煎至八分去渣服若大便秘加大黃小便
秘加木通

仲桔梗白散治欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾
腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰

桔梗

貝母各三

巴豆

一分去皮
炒研如脂

右三味為散強人飲服半錢七羸者減之病在膈上者
吐膿血膈下者瀉出若下多不止飲冷水一碗則定亦

要畧方丹溪不刪採用
之者必有微意存焉

丹肺癰醫元戎搜風湯吐之搜風湯
未考

木治肺癰吐膿血作臭氣胃乳皆痛并麻湯

川升麻

桔梗

薏苡仁

地榆

牡丹皮

芍藥各半

甘草二
分

補裏雜
方

診

右刺龜末每一兩水一升半薑五片煎去渣日三服

丹濟生排膿湯治肺癰得吐膿後以此排膿補肺生綿芪
二兩細末每二錢水一碗煎一半服肺癰收斂瘡口止
有谷櫛樹皮白欬煎湯飲之

肺癰已破入風者不治腸癰千金謂妄治必殺人腸癰

為病小腹重而強按之則痛便數似淋時時汗出復惡寒

身皮甲錯腹皮急如腫狀其脈數者少有膿也巢云洪數

者已有膿脈若遲緊者未有膿甚者腹脹大轉側有水聲

或透臍生瘡或膿自臍出或大便秘

脈問曰羽林婦病何以知腸有膿師曰脈滑而數滑則為

實數則為熱滑則為榮數則為衛衛數下降榮滑上升榮

衛相干血為敗瀉小腹痞堅小便或澀或自汗出或復惡

寒膿為已成設脈遲緊則為瘀血血下即安

例 腫瘍瀉

要薏苡附子敗醬散治身中錯腹皮急如腹脹本無積聚身熱脈數者

附子炮二

敗醬五

薏苡仁錢一

右為末每服方寸匕以水二合煎頓服小使當下三因

薏苡仁附子同煎敗醬用二兩一分每四錢水一盞半

煎七分去渣空心服

千 大黃牡丹湯治腸癰小腹痞堅或偏在膀胱左右其色

白堅大如棠熱小使自調時自汗出脈遲堅者未成膿可

下之當有血脈數膿成不復可下

大黃四

牡丹皮三

芒硝二

冬瓜仁升一

桃仁五十

右以咀水五升煮一升頓服當下膿血稠繁用芒硝半

合瓜子五合劉涓子用硝石三合肘後同名瓜子湯三

因用大黃桃仁各二分瓜子三分牡丹皮一錢硝石一錢劉散作一貼水三盞煎至八分去渣入硝再煎沸頓服無時

無薏苡湯治腸癰腹中痛煩躁不安或脹滿不食小便澀

婦人產後虛熱多有此病縱非癰但疑是者便可與或有

差亦無妨薏苡仁五兩牡丹皮桃仁各三兩瓜子仁四兩

劉散每四大錢水盞半煎七分服姚氏去桃仁用杏仁崔

氏加芒硝二兩千金方同

例 潰瘍補

醫案曰女子腹痛百方不治脈滑數時作熱腹微急孫診

曰腹痛脈當沉細今脈滑數此腸癰也以雲母膏一兩作

丸如桐子大以牛皮膠烱温酒調膠水下丸子藥餉時服

盡膏下膿血一盞而安

千灸法屈兩肘正肘頭銳骨是穴灸百壯下膿血而安

診

王氏餘話有婦人腸中痛不可忍大便自小便出李生診之曰此脈見於陽部此腸癰也乃出雲母膏作百十九煎黃芪湯吞下利膿血數升而安李曰寸芤積血在胃關芤為腸生癰也李乃楊吉老之婿葉舉業習醫官取醫博士內疽者皆因飲食之火挾七情之火相鬱而發飲食者陰受之七情者臟腑受之宜其發在腔子而向裏非干腸胃盲膜也謂之內者以其視之不見故名焉

右腸癰五方丹溪先生所集也前三方內其要畧一方元本雖云內有癰膿然先生不言之而又連千金三因二方置於篇首者蓋亦腫瘍瀉利例也後二方用膠烱黃芪煎湯吞藥者蓋亦潰瘍補例也

素帝曰人病胃脘癰者診當何如岐伯曰診此者當候胃脈其脈當沉細沉細者氣逆甲乙經凡細作沉瀝逆者人迎甚盛甚

雜方

盛則熱人迎者胃脈也逆而盛則熱聚於胃中而不行故胃脘為癰也病能

河射干湯治胃脘癰人迎脈逆而盛嗽膿血榮衛不流熱聚胃只成癰

射干去毛

梔仁

赤茯苓去皮

升麻各一兩

赤芍藥一兩 白朮半兩

右為末每服五錢水二盞煎至三盞去渣入地黃汁一合蜜半合再煎溫服不計時候

要復元通氣散治諸氣溢耳聾腹癰便癰瘡疽無頭止痛消腫

青皮

陳皮各四兩

甘草三寸生熟各半 川山甲炮

瓜蒌根各二兩

金銀花一兩

連翹一兩

右為細末熱酒調下

診

丹陽癱大腸有執積死血流注桃仁承氣湯加連翹秦艽
 近肛門破入風者難治用防風之類大凡破傷風在
 頭面則以白芷為君防風頭佐之蓋去頭面皮膚之風故
 也在身體及四肢則以防風為君隨身稍用下部則以獨
 活佐之肺癱吐膿後其脈短而澹者自痊浮大者難治
 其面色白而反赤者此火之尅金皆不可治
 金匱方論曰執在上焦者因欬為肺痿肺痿之病何從得
 之或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又
 被快藥下利重亡津液故寸口脈數其人欬口中反有濁
 唾涎沫者為肺痿之病若口中辟辟燥欬即胃中隱隱痛
 脈反滑數此為肺癰欬唾膿血脈數虛者為肺痿數實者
 為肺癰
 按此言肺痿屬熱如欬久肺傷聲啞聲嘶咯血此屬陰

虛火熱甚也本論治肺痿吐涎沫而不欬者其人必
 渴必遺尿小便數以上虛不能制下故也此為肺中冷
 必眩多涎唾用炙甘草乾薑此屬寒也肺痿吐涎多心
 中溫液者用炙甘草湯此補虛勞也亦與補陰虛火熱
 不同是皆宜分治之故肺痿又有寒熱之異也
 精勞傷血氣膝理虛而風邪乘之內盛於肺也則汗出惡
 風咳嗽短氣鼻塞項強胃脇脹滿久久不瘥已成肺痿也
 保肺癱者由陰咳辛熱炙燂或酣飲熱酒燥熱傷肺所致
 治之宜早

醫學綱目卷之十九尾

頭面刺以百...
 也存身...
 意之宜早...
 刺刺...
 風如...
 國...
 不同...
 中...
 必...
 溫...



