

脾胃部

内傷飲食 胎前傷食 痰症 痞 不能食 饑不能食
 思食 妊娠思食 消瘴 上消 中消 下消 胎前產後渴
 口躁咽乾 黃疸 產後發黃 食勞瘠黃 黃汗 日黃
 黑疸

八考

育學子綱目

二七一



醫學綱目卷之二十一

脾胃門

內傷飲食

胎前傷食

百病皆生於痰

大法

垣飲食傷論 陰陽應象論云水穀之寒熱感則害人六腑 痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷此乃混言之也分之為一飲也食也飲者水也無形之氣也因而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺肺病則為喘咳為腫為水瀉輕則當發汗利小便使上下分消其濕解醒湯五苓散生薑半夏枳實白朮之類是也如重而積積為滿者芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之此其治法也食者物也有形之血也如生氣通天論云因而飽食筋脈橫解腸澀為痔又云食傷太陰厥陰寸口大於人迎兩倍三倍者或嘔吐或痞滿或下痢腸澀當分寒熱輕重治之輕則內消重則除下如傷寒物者半夏神麴乾薑二枚廣茂巴



芫之類主之如傷熱物者枳實白朮青皮陳皮麥蘗黃連
大黃之類主之亦有宜吐者陰陽應象論云在上者因而
越之瓜蒂散之屬主之然而不可過劑過則反傷腸胃蓋
先因飲食自傷又加之藥過故腸胃復傷而氣不能化
食愈難消矣漸至羸困故五常正大論云大毒治病十去
其六小毒治病十去其七常毒治病十去其八無毒治病
十去其九不可過之此聖人之深戒也

輕者內消

丹傷食惡食者胃中有物導痰補脾二陳湯加白朮山查
川芎蒼朮

傷飲

五苓散治煩渴飲水過多或水入即吐心中澹澹停濕
在內小便不利

肉桂兩

茯苓

白朮各一兩

澤瀉二兩
五錢

右為細末每服二錢熱湯調下不拘時候服訖多飲熱
湯取汗出愈治傷冷飲者煎五苓散送半夏枳朮丸
治傷飲不惡寒胸中微覺夯悶身重飲食不化者或小便
不利者五苓散去桂枝依前斟酌服之如痧熱在裏
身發黃疸食前濃煎茵陳湯調服愈

除濕散治傷馬牛乳酪及水水一切冷物

半夏湯泡七錢

車前子錢五

甘草錢二

紅花錢二

茯苓錢七

乾薑錢三

澤瀉兩半

右為細末每服三錢食前白湯調下

丹導飲丸治水飲

吳茱萸錢三

白茯苓兩

黃連錢五

蒼朮兩

獨活錢七

右為細末神麴糊丸服

傷酒

丹 茱萸丸治飲用六一散一料加果茱萸一兩水丸服
酒 者大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之止當發散汗出則愈矣其次莫如利小便乃上下分消其濕今之病酒者往往服酒癥丸太熱之藥下之又有用牽牛大黃下之者其無形元氣受病反下有形陰血乖誤甚矣酒性大熱已傷元氣而復重瀉之亦損腎水真陰及有形血氣俱為不足如此則陰血愈虛真水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是以元氣消燦折入長命不然則虛損之病成矣酒疸下之久而則為黑疸慎不可犯宜以葛花解醒湯上之

海 治酒病宜發汗若利小便炎酸不肯下行故曰火鬱則發之以辛溫散之是從其體性也是知利小便則濕去熱不去若動大便尤為踈陋蓋大便者有形質之物酒者無

形之水從汗而發之是為近理濕熱俱去故治以苦溫發其火也佐以苦寒除其濕也

葛 花解醒湯治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

- 青皮三分 木香五分 橘紅五分 人參
- 猪苓 白茯苓各一錢 神麴炒 澤瀉
- 白朮各二錢 白芷各二錢 葛花
- 砂仁各五錢

右為細末每服三錢白湯調下但得微汗則酒病去矣此蓋不得已而用之豈可恃此酌飲成病自損元氣惟病酒者宜之

聖 治酒醉不醒用菘菜子二合研細井水調服
丹 烏梅丸治酒毒化痰消食

烏梅斤一 半夏 白礬略八 生薑二兩

右搗為細末以新瓦兩片夾定火焙三晝夜為度次入神麩麥芽陳皮青皮蓬朮枳殼丁皮大腹子各四兩糊丸每服四五十九薑湯下

四烏梅丸治酒積神效方見積塊門

五白朮丸治酒停胸中膈氣痞滿面色黃黑將成癰疾飲食不進日漸羸瘦如欲飲者先服不醉

生薑一斤去皮切片以鹽橘紅三兩 廣茂炮三
乾薑兩三 益智仁粒二十丁香五十 甘草錢二
砂仁粒三十 三稜炮二 木香 茴香炮各

白芷冠三十 右為末煉蜜丸每一兩作五九硃砂為衣生薑湯下細嚼無時服

傷食

冊解酒毒併熱毒栢若木名枳拘北人名白爛瓜杭州貨賣名蜜屈立春生秋熟多間經霜後取食

枳朮丸治疴積消食強胃海藏云本仲景枳朮湯也今枳朮丸治老幼虛弱飲食不化或臟腑軟弱者

枳實去穢炒 白朮二兩

右為末荷葉裏燒飯為丸如桐子大每服五十九白朮湯下服白朮者本意不取其食速化但久服令人胃氣強實不復傷也

麩積朮丸治為入強食所致心胸滿悶不快

神麩炒 麥蘗炒 枳實炒各 白朮二兩

右為末荷葉燒飯為丸每服五十九

木香枳朮丸破滯氣消飲食開胃進食

木香 枳實各一兩 白朮二兩

照前法為丸服

又方開胃進食

木香錢二 人參 乾薑各一 枳實兩一

白朮兩二

照前荷葉燒飯為丸食前白湯服三五十九丸忌飽食

檳榔丸消食破滯氣

檳榔錢一 木香錢一 陳皮錢五 甘草錢一

人參錢二

右為末蒸餅丸每服二三十丸食前白湯下

羅木香檳榔丸疎三焦寬胸膈破痰飲快氣潤腸

神麩 皂角酥炙 郁李仁去皮各一兩

杏仁去皮 木香 檳榔 青皮去

枳殼各一兩

右為末再用皂角四兩水一碗浸下日揉膏入熟蜜少

許為丸桐子大每服五十九丸淡薑湯下

丹保和丸治食積酒積

山查肉兩一 半夏薑製 蘿蔔子炒各五錢 神麩錢三

麥芽炒二錢 黃連炒半兩 陳皮兩半

右為末酒糊丸服或用神麩糊為丸尤妙

大安丸脾經消導之劑虛者宜斟酌用之

山查兩二 神麩炒 半夏製 茯苓各一兩

陳皮錢五 白朮兩二 連翹錢五 蘿蔔子炒半兩

右為末神麩糊丸服一方無白朮

三黃枳木丸治傷肉食濕麩辛辣厚味之物填塞悶亂胸

膈不快

黃芩兩二 黃連酒炒 大黃煨 神麩炒

白朮 陳皮 略一

右為末湯浸蒸餅為丸如菘菹大每服五十九白湯下

垣除濕益氣丸治傷濕麩心腹滿悶肢體沉重

枳實 炒 白朮 黃芩 生 神麩 炒 略

紅花 分三 蘿蔔子 炒 熟 半兩

右為末荷葉飯丸每服五十九白湯下

上二黃丸治傷熱食痞悶元尤欲吐煩亂不安

黃芩 二兩 黃連 酒洗 一兩 升麻 柴胡 各三

甘草 二錢 枳實 炒 半兩

右為末湯浸蒸餅丸每服六七十丸白湯下

枳朮導滯丸治傷濕熱之物不得旋化而作痞滿悶亂不

安 黃芩 枳朮 白朮 黃連 各三

澤瀉 二錢 枳實 炒 神麩 炒 各五錢 大黃 煨 二

右為末湯浸蒸餅為丸白湯下五七十九

白朮丸治傷暑粉濕麩油膩之物

白朮 兩 半夏 兩 橘紅 七錢 神麩 炒

枳實 炒 各一兩 黃芩 兩 枯白礬 分三

右為末湯浸蒸餅為丸量所傷多少加減服之如素食

多用乾薑故以黃芩瀉之

梅食狗肉不消心下堅或腹脹口乾發熱妄語者薑根汁

飲之

食魚膾及生肉在胸膈不化必成癥瘕鴉馬鞭草汁飲

之飲生薑水亦易消

垣半夏枳朮丸治因冷食內傷左有澤瀉一兩有小便

淋故也

半夏薑製二兩 枳實炒一兩 白朮一兩
右為末荷葉飯為丸如傷食寒熱不調每服加上二黃
丸十九白湯下

木香乾薑枳朮丸破滯氣消寒飲食

木香三錢 乾薑炮五錢 枳實炒一兩 白朮一兩半

右為末荷葉飯為丸食前白湯服四五十丸

丁香爛飯丸治食傷太陰又治卒心胃痛

丁香一錢 丁皮三錢 甘草炙一錢 甘松淨

砂仁各三錢 益智仁各三錢 三稜炮一錢 廣茂炮一錢

香附五錢 木香一錢

右為末湯浸蒸餅為丸白湯服或細嚼亦可

重者除小胃丹

芫花好醋拌勻過一宿於瓦器內
不住手攪炒令黑不令焦 甘遂濕麩裏
水浸三

日洗晒乾三二云水浸八七日
春秋五日或用水煮亦可

大戟水浸一
時洗

黃柏炒三兩

右為末以白朮膏丸如蘿蔔子大臨臥津液吞下或白

湯送下取其膈上濕痰熱積以意消息之欲利空心服

一方加水香檳榔各半兩
蒸餅丸每服七八十九

本治中酒不醒及傷食

巴菝去油二粒 烏梅二粒 丁香三粒 胡椒五粒

右為末入飯同拌二三下為丸如桐子大細嚼丁香

湯下五七丸小兒下丸

仲衛急丸治尺寸俱盛填塞悶亂方見卒
中門

垣蠲飲枳實丸逐飲消痰道氣清膈

枳實炒一兩 半夏製一兩 橘紅各二兩 黑豆取頭末
三錢

傷食

傷熱食

右為未入者麩糊為丸每服五十九食後生薑湯下
如所傷飲食在胸腹間兀兀欲吐返覆悶亂以物探吐
之甚者用瓜蒂散

傷食

人病有宿食何以別之曰脈浮而大按之反濇尺中亦
微而濇故知有宿食用大承氣湯下之傷寒方見脈數而滑
者實也此有宿食下之愈宜大小氣湯下痢不飲食者
宿食也亦宜大承氣湯下之脈緊如轉索無常者有宿
食也脈經云寸口脈緊胸中有宿食不化

藏金露丸治內傷心痞氣不升降水穀不消

大黃兩

枳實炒五錢

桔梗兩

牽牛二錢五分

右為未荷葉飯為丸白湯下三五十九食後常服減半

一方薑糊丸

傷食

木香見睨丸治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛

巴菝霜五分

京三稜煨

神麩炒

石三稜去皮根各

兩

木香二錢

香附兩

升麻三錢

草薺煨熟取汁五錢

柴胡三錢

右為未湯浸炊餅為丸如菖菝大每服一二十九白湯送下

送下

三稜消積丸治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

京三稜炮七錢

廣茂炮七錢

青皮

陳皮各五錢

丁皮

益智各五錢

神麩炒三錢

茴香兩半

巴菝和米皮炒焦去米

右為未醋麩糊為丸如桐子大每服十九至二十九溫薑湯下食前服量虛實加減得更衣止後服

感應丸治中虛積冷氣弱有傷停積胃脘不能傳化或因

氣傷冷或因飢飽傷食飲酒過多心下堅滿兩脇脹痛心

腹大痛霍亂吐瀉大便頻數後重遲澁久痢赤白膿血相
雜米穀不化愈而復發又治中酒嘔吐痰逆惡心喜睡頭
旋胸膈痞滿四肢倦怠不思飲食不拘新舊冷積並皆治
之

木香

肉苁蓉

丁香

乾薑

巴荳七十箇去皮
心膜研出油

杏仁一百四十粒
湯泡去皮尖研

百草霜兩

右前四味為末外入百草霜研與巴荳杏仁七味同和
勻用好蠟六兩溶化成汁以重絹濾去香更以好酒一
升於銀石器內煮蠟數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上
取蠟秤用丸春夏修合用清油一兩銚內熬令香熟次
下酒煮蠟同化成汁就銚內乘熱拌和前項藥末秋冬
修合用清油一兩半同煎煮熟成汁和價藥末成劑分

作小錠子油紙裹放旋丸服之每三十丸空心薑湯下
神應丸治一切冷物冷水及乳酪傷小腹痛腸鳴米穀不
化

巴荳

杏仁

乾薑

百草霜

丁香

木香

黃蠟

右先將黃蠟用好醋煮去查穢將巴荳杏仁同炒黑烟
盡研如泥春夏入香油半兩秋冬入錢溶開下杏仁巴
荳攪勻次下木香丁香等末研勻搓作錠子油紙裹旋
丸桐子大每米飲下三五丸食前日三服大有效
雄黃聖餅子

巴荳一百枚
去油膜雄黃兩

白麩十兩
又羅過

右三味內除白麩餘同為細末共麩和勻用新水攪和
做餅如手大以水再煮浮於湯上看硬軟捏作餅子每

氣口脈
緊盛宜
下

服五七餅加至十餅十五餅饑良一餅利一行二十餅利一行食前茶酒任下

察人之生也由五穀之精化五味之備故能生形經曰味歸形若傷於味亦能損形今飲食過節以致腸胃不能勝氣不及化故傷焉經云壯火食氣氣食少火壯火散氣少火生氣又云飲食自倍腸胃乃傷以失四時之調節故能成病脈在氣口經曰氣口脈盛傷於食心胃滿而口無味口與氣口同口曰坤者土乃脾之候故胃傷而氣口緊盛夫傷有多少有輕重如氣口一盛得脈六至則傷於厥陰乃傷之輕也枳木丸之類主之氣口二盛脈得七至則傷於少陰乃傷之重也雄黃聖餅子木香檳榔丸枳殼丸之類主之氣口三盛脈得八至九至則傷太陰填塞悶亂則心胃大痛備急丸神保丸消積丸之類主之元元欲吐不

已俗呼食迷風是也經曰上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死瓜蒂散主之如不能吐是無治也經曰其高者因而越之此之謂也備急下之亦可
檳榔丸治飲食過多心腹脹悶

檳榔二錢

陳皮

牽牛略

木香二錢

枳實兩

右為末醋糊丸生薑湯下三四十九

煮黃丸治飲食過多心腹脹滿脇肋走氣疼癢刺痛如神

雄黃兩

巴莖五錢
研如泥

右入白麩二兩同研勻滴水丸如桐子大滾漿水煮十

二丸慮入冷漿水內令沉冷每用時用浸藥冷漿下二

丸下自十二時盡十二丸以微利為度不必盡劑

仲宿食在上脘當吐之宜瓜蒂散又云凡血虛者不可吐

尺脈絕者當吐

垣瓜蒂散治大滿大實氣上衝逆上部有脈下部無脈填塞悶亂者用之如尺寸俱盛者宜用備急丸

瓜蒂炒

赤小豆者等

右為細末每服二錢溫漿水調下取吐為度仲景以香鼓七合煮取汁和散下七服之若不至兩尺脈絕者不宜便服此藥恐損元氣令人胃氣不復若止胃中塞塞悶亂不通以物探之得吐則已如探不去去以此劑吐之或曰盛食填塞胸中痞亂兩寸脈當用事今反兩尺脈不見其理安在曰胃中有食是木鬱宜達故探吐之食者物也物者坤土也是足太陰之號也胃中者肺也為物所塞肺者手太陰金也金主殺伐與坤土俱在手而上而旺於天金能克木故肝木發生之氣伏於地下非木鬱而何吐去上焦陰土之物未得舒暢則鬱結去矣

食塞於上脈絕於下若不明天地之道無由達此至理水火者陰陽之徵兆天地之別名也故獨陽不生獨陰不長天之用在於地下則萬物生長地之用在於天上則萬物收藏此乃天地交而萬物通也此天地相根之道也故陽火之根本於地下陰水之原本於天上故曰水出高原故人五臟主有形之物物者陰也陰者水也右三部脈主之偏見於寸只食塞於上是絕五臟之源源絕則水不下流兩尺脈之絕此其理也何疑之有然必視所傷之物冷熱隨症加減如傷冷物一分熱物二分則用寒藥二停熱藥一停隨時消息經云必先歲氣無伐天和此之謂也

陰症服散擊者宜溫

秦生好服三生茶及冷物成積而痼寒脈非浮非沉上下內外按舉極有力堅而不柔觸指突出膚表往來不可

以至數名縱橫不可以巨細狀此陰症鼓擊脈也一身流
行之火萃於胸中寒氣逼之故搏大有力與真武四逆理
中等湯丸佐以芍藥茴香使不僭上每日服百九夜八寸
至夜出汗而愈

既有三陰可下之法亦必有三陰可補之法予故云內
傷三陰可用溫劑若飲冷內傷雖云損胃未知色脈各在
何經若面色青黑脈浮沉不一弦而弱者傷在厥陰若面
色紅赤脈浮沉不一細而微者傷在少陰若面色黃濛脈
浮沉不一緩而遲者傷在太陰也如傷在厥陰肝之經
當歸四逆湯加吳茱萸生薑湯之類主之傷寒傷在少
陰腎之經宜服通脈四逆湯傷寒傷在大陰脾之經理
中丸湯主之大便軟者宜湯結者宜丸傷寒傷在太陰
海唐臣嗜食遂成陰症脈遲七八至下止後僅二至予

亟與溫劑數服四五日不解遂續進三服下日脈生大汗
而解

禁忌

羅陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷謂食
物無貪於多貴在有節所以保冲和而遂頤養也若貪多
務飽飢寒難消徒積暗傷以召疾患蓋食物飽甚耗氣非
或食不下而上湧嘔吐以洩真元或飲不消而作痰咯
唾以耗神水大便頻數而洩耗穀氣之化生溲便滑利而
濁耗源泉之浸潤至於精清冷而下漏汗淋漓而外洩莫
不由食物過傷滋味太厚如能節滿意之食自有爽口之味
當不至於飽甚即頓頓必無傷物物皆為益津液內畜精
華和凝邪毒不能犯疾疹無由作矣

胎前傷食

傷食

本治婦人有孕傷食宜服木香丸

木香二錢 三稜 白茯苓 人參各三錢

右為末麩糊丸每服三十九丸熟湯下

治妊娠氣不和調飲食少味宜服白朮散

白朮 紫蘇各一兩 白芷 人參

訶子皮 川芎 青皮各半兩 甘草一錢

右為末每服二錢水一盞薑三片煎至七分不拘時溫服

妊娠傷食又當於前條傷飲食之輕劑參酌用之

經云飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生本在五味陰之

五官傷在五味若妊婦飲食不節生冷毒物恣意食啖致

脾胃之疾故妊娠傷食難得藥效惟此二方穩便

百病皆生於痰

傷飲

仲有痰飲有懸飲有溢飲有支飲 其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之痰飲病痰飲者當以溫藥和之又云

有痰飲者苓桂其本湯主之

飲後水流在脇下咳唾引痛謂之懸飲

病懸飲者十棗湯主之方見傷寒 留飲者脇下痛引缺盆咳

嗽則轉甚 胸中有留飲其人短氣而渴四肢歷節疼脈

沉者有留飲 飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身

體疼重謂之溢飲病溢飲者當發其汗大青龍湯小青龍

湯主之二方並見傷寒 咳逆倚息短氣不得臥其形如腫謂之

支飲 人咳數年其脈弱者可治實大數者死其脈數者

必苦冒眩其人本有支飲在胸中故也治屬飲家 支飲

亦喘而不能臥加短氣其脈平也 水在心心下堅築短

氣惡水不欲飲 水在肺吐涎沫欲飲水 水在脾少氣

身重 水在肝脇下支滿噎而痛 水在腎心下悸

嘔吐是水飲在心脇仲景云嘔吐心下痞者胸中有水宜

半夏茯苓湯主之又云嘔家本渴今反不渴心下有支飲

故也小半夏湯主之又云先渴却嘔者水停心下小半夏
 加茯苓湯主之羅謙甫云痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩
 心悸或半身不快或為寒熱並二陳湯主之方見冊眩
 悸是飲仲景云卒嘔吐心下痞眩悸者膈間有水半夏加
 茯苓湯主之方見吐又云瘦人膈下有悸吐涎沫而癩眩
 者此水也五苓散主之方見吐又云胸滿目眩者苓桂甘
 朮湯主之方見短氣又云心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯
 主之方見眩門

仲膈上病痰滿喘咳吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出其
 人振振身瞤劇必有伏飲治見脈大心下有留飲其人
 背寒冷病人臂不時疼痛其脈沉細非風也必有飲在
 上焦其脈虛者為微勞營衛氣不和故也久久自瘥脈虛
丸不虛控涎丹 胸滿是飲仲景云支飲胸滿者厚朴大黃湯主

之方見又云心下有痰飲胸膈支滿目眩苓桂朮甘湯
 主之方見短氣

渴燥是水飲在腸胃所生仲景云渴而小便不利宜五苓
 散主之 又云先渴却嘔者為水停心下小半夏加茯苓
 湯主之 又云腹滿口舌乾燥此腸間有水氣防椒蘆黃
 丸主之但因水所在之處不同而所兼之症不一也

自利有飲故丹溪治久痢皆吐之去膠痰自愈又仲景云
 病者脈伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此為留
 飲欲去故也甘遂半夏湯主之方見又云小便不利四
 肢沉重疼痛自利者此為水氣宜用真武湯去芍藥加乾
 薑主之久病傷寒表不解嘔欬自利者此為水氣宜服小
 青龍湯去蘇黃加芫花主之 尺膚麤如枯魚之鱗者水
 飲候也全見色鮮明者有留飲

診

肝脈奕而散色澤者當病溢飲溢飲者暴渴多飲而溢入肌皮腸胃之外也脈要精微論肝脈澹其為溢飲全虛實法

痰症

脈雙弦者飲也皆大下後善虛脈偏弦者飲也肺飲不弦但苦喘短氣脈弦數有寒飲冬夏難治脈沉而弦者懸飲內痛脈浮而細滑者傷飲

絲帛鋪劉負外患傷寒六七日晝夜不得眠方眠即起方起即倒未嘗少息看待厭倦召孫孫曰若言是氣必喘作今無此症非氣也時復身上冷汗出尺寸脈皆沉關中亦沉重診之鼓擊於指下此痰積寒聚於胸中也遂用陳皮半夏乾薑三物各一兩為飲薑半兩搥碎以水兩碗煎七分去渣分二服服藥經時遂睡經一晝夜不甦既覺下痰一塊如鷄子大其疾遂愈凡痰症皆有冷汗其証明矣

丹風痰多見奇症凡風痰病必用風痰藥白附子天麻雄黃牛黃僵蚕皂角之類濕痰多見倦怠軟弱濕痰宜用蒼白二朮又用油炒半夏痰清者屬寒用二陳湯之類

半夏

陳皮

茯苓

甘草

每服四錢加生薑七片烏梅一箇煎不拘熱服嘔吐甚者加丁香

導痰湯

半夏四兩

南星

橘紅

枳殼

赤茯苓各半兩

甘草

薑水煎服

燥濕痰方

南星製

半夏製各半兩

蛤粉二兩

青黛為衣

痰症治法

熱痰多挾風外症為多用青黛黃連天花粉大快膈上熱

痰因火盛逆上者治火為先白朮黃芩石膏之類中
氣不足加參朮黃芩假之以降其熱也 食積痰神麴麥
蘗山查 欲吐食積痰用蘿蔔子油炒為末漿水調下探
而吐之 食積痰必用攻若氣虛者用補氣藥送 老痰
海石半夏瓜蒌香附五倍子佐他藥大治頑痰 鬱痰僵
蚕杏仁瓜蒌訶子貝母五倍子 痰而脾虛者清中氣一
陳湯加白朮之類兼用升提藥 內傷挾痰必用參朮莖
之類多用薑汁傳送或加半夏之類虛甚加竹瀝 眩暈
嘈雜乃火動其痰用二陳湯加梔子芩連之類 噫氣吞
酸此係食鬱有熱火氣上動以黃芩為君南星半夏橘紅
為臣熱多加青黛 喉中如有物咯不出咽不下此老痰
也重者吐之用瓜蒂散氣實用荆瀝仲景用半朴茯苓 痰
結核在咽喉中燥不能出入化痰藥內加醃藥軟堅之味

瓜蒌仁杏仁海石桔梗連翹少佐以朴硝薑蜜丸噙化
凡人身上中下有塊是痰問其平日好食何物吐下後左
用藥 痰之為物隨氣升降無處不到 痰在腸胃間可
下而愈 痰在經絡中非吐不可出吐中就其發散意
痰在膈上必用吐之瀉亦不出 痰膠固者及脈浮者俱
用吐法吐法見治法 痰在膈下非白芥子不能達 痰
在皮裏膜外以薑汁竹瀝導之 痰在四肢非竹瀝不能
開 二陳湯善治人一身有痰如在上下加下引藥在上加
上引藥 潤下丸降痰最妙 青礞石丸重在風化硝
小胃丹能損胃食積痰用之然不宜多服 蒼朮治痰飲
成窠囊者極效 海粉能治熱痰降濕痰軟結痰消頑痰
最效可入丸子不可入煎藥 枳實瀉痰能衝墻壁 竹
瀝能治膈間有痰或癲狂或健忘或風痰最效又能養血

荆瀝治痰稍重用此二味效速且穩當一瀝治痰結在皮裏膜外及經絡者必佐以薑汁葦汁治血滯不行中焦有飲取自然汁冷飲三四盞必覺胸中煩躁不寧後自愈氣實熱痰吐難得出或成塊或吐咯不出及兼氣鬱者難治中焦有痰胃氣亦賴所養卒不便虛若攻之盡則虛矣凡治痰用利藥過多致脾氣下虛則痰反易生而多矣

痰之為病方論少有細述之者近惟三因畧言亦無加減法夫痰之源不一有因痰而生者有因熱而生痰者有因氣而生者有因風而生者有因驚而生者有積飲而生者有多食而成者有因暑而生者有傷冷物而成者有脾虛而成者有飲酒而成者其為病也驚痰則成心包痛顛疾熱痰則成煩燥頭風爛眼燥結怔忡懊懣驚眩風痰

成癱瘓大風眩暈暗風悶亂飲痰成脇痛四肢不舉每目嘔吐食痰成瘰癧刺口出臭氣暑痰中暈眩冒黃疽頭疼冷痰骨痺四肢不舉氣刺痛酒痰飲酒不消但得酒次日又吐脾虛生痰食不美反胃嘔吐氣痰攻注走刺不定婦人於驚痰最多蓋因產可交接月事方行其驚因虛而入結成塊者為驚痰必有一塊在腹發則如身孕轉動跳躍痛不可忍凡人手臂或動不得或骨節遍身痛坐臥不寧此痰入骨也 有人脚氣久不治骨節痛與脚氣藥不愈此痰病也 凡傷寒病後嘔吐藥不得入亦因初病膈中有涎痰也或因下之太早而遂議其非痰未為確論 傷寒發黃亦是痰病蓋因熱搏而成凡大便秘者亦是痰結右前件諸症發生不一甚不易辨指下難求得此妙訣慎勿輕傳

妙應丸
加減法

凡有痰者眼皮及眼下必有烟灰黑色舉目便知不待切脈。眼黑而頰赤者熱痰也。面大黃色亦熱痰也。外症必煩滿，膈熱口乾，思冷，大便秘結，小便赤熱，久必生風，或眩暈耳鳴，眼花多虛症，治之而用熱藥，服久必脈大實發，夫熱而中風可急下之。眼黑而行步呻吟舉動艱難者，入骨痰也。其症遍體骨節疼痛，眼黑而面帶土色，四肢痿痺，屈伸不便者，風濕痰也。眼黑而氣短促者，驚風痰也。左右關脈大者，膈中有痰，也可吐之，怕吐者，消息下之。凡人每日背上一條如線，而寒起者，宜吐下之。凡病百藥不效，其關上脈伏而大者，痰也用妙應丸加減法。痛即控涎丹。脚氣加明松脂一錢，檳榔木瓜各一兩，卷柏半兩，先以鹽水煎，半日，次日白水煮，半日，同煎。每服二十九，加至四五十，再服下，惡物立效。驚風痰。

滾痰丸
治症

加硃砂二錢，又加全蝎每用八九丸，常與之三五服去。酒痰加雄黃全蝎各二錢，每服十丸。走注腰痛加核桃三箇，燒灰每服三十九，加至五十九，溫酒下。脚氣走注於前方內加吳茱萸，驚氣成塊者加川山甲炒鱉甲，燒各三錢，玄胡索蓬朮各四錢，每服五十九，加至七十九，以利為度。腎痺痛加木鱉子去殼研一兩，桂半兩，熟痰加益硝等分，每服三兩丸。寒痰加胡椒丁香蝎桂各等分，每服二十五丸。

洞虛痰之為病，成偏頭風，成雷頭風，成太陽頭痛，眩暈如坐舟車，精神恍惚，或口眼開動，或眉稜耳輪俱痒，或頰腮四肢遊風腫硬似疥，非疥，或渾身燥痒搔之則隱疹隨生，皮毛烘熱，色如錦斑，或齒頰似痒似痛，而疼無定所，滿口牙浮痛痒不一，或噁氣吞酸，鼻聞焦臭，喉間豈腥，氣心煩。

鼻塞咽隘不利路之不出咽之不下或因噴嚏而出或因
舉動而唾其痰如墨又如破絮或如挑膠或如蜆肉或心
下如停水鐵閉帶妨悶噎連聲狀如隔氣或寢夢刑戮
刀兵劍戟或夢入人家四壁圍遶暫得一實百計得出則
不知何所或夢在燒人地上四面烟火枯骨焦氣撲鼻無
路可出或不因觸發忿怒悲啼雨淚而寤或時郊行忽見
天邊兩月交輝或見金光數道回頭無有或足膝酸軟或
骨節腰腎疼痛呼吸難任或四肢肌骨間痛如擊戳乍起
乍止並無常所或不時手臂麻痺狀如風濕或臥如芒刺
不安或如毛虫所螫或四肢不舉或手足重滯或眼如薑
蜃膠粘痒溢開闔甚難或陰晴交變之時胸膈氣結閉而
不發則齒痒咽痛口糜舌爛及其奮然而發則噴嚏連聲
初則涕唾稠枯次則清水如注或眼前黑脂腦後風聲耳

內蟬鳴眼睜肉湯治之者或曰腠理不密風府受邪或曰
上感下虛或曰虛或曰寒或曰發邪惟洞虛子備此疾苦
乃能治療病勢之來則胸腹間如有二氣交紐壅塞煩鬱
有如烟火上衝頭面烘熱眼花耳鳴痰涎涕淚並從肺骨
間湧起凜然毛豎噴嚏千百然後遍身煩燥則去衣凍體
稍止片時或春秋乍涼之時多加衣衾亦得暫緩或頓飲
冰水而定或痛飲一醉而寧終不能逐去病根乃得神秘
沉香丸方屢獲大效愈人數方但不欲輕傳匪人故以隱
語括之詩曰甕裏翻身甲帶金於今頭戴草堂深相逢二
八求斤正硝煨青礞倍若沉十七兩中沉半兩水九梧子
意須斟除驅怪病安心志水瀉雙身却不任

大黃藤八
沉香半

黃芩八

青礞石一月硝煨
如金色

右為末水如梧子大白湯食後空心服一切新舊
 失心喪志或癲或狂等症每服一百丸氣盛能食狂甚
 者加二十九臨時加減消息之一切中風癱瘓痰涎
 壅塞大便或通或結者每服八九十九或加至百丸永
 無秘結之患一切陽症風毒脚氣遍身遊走疼痛每
 服八九十九未效加至百丸一切無病之人遍身筋
 骨疼痛不能名者或頭疼牙痛或搖或痒風蛀等症風
 寒鼻塞身體或疼或不疼非傷寒症者服八九十九痰
 盛氣實者加之一切吞酸噎逆膈氣及胸中疼悶腹
 中氣塊衝上嘔沫吐涎狀如翻胃心下恍惚如長入捕
 怵惕不安陰陽閉格變生垂症食飢傷飽憂思過慮心
 下嘈雜或痛或噦或晝夜虛飽或飢不喜食急慢喉閉
 赤眼每用加減服一切新舊痰氣喘嗽或嘔吐頭暈

目眩加減服之一切頭顙腫硬若癩癧者及口糜舌
 爛咽喉生瘡者每服六七十丸加蜜少許一處嚼碎噙
 化睡時徐徐嚥之曾有口瘡者服二三十丸依前法噙
 之二三夜瘡一切男婦大小虛實心疼連腹身體羸
 瘦發時必嘔綠水黑汁冷涎乃至氣絕心下溫煖者量
 虛實加減服之若事屬不虞之際至於百丸即便回生
 未至顛危者虛弱疑似之間只服三十九或五十九立
 見生意然後續續進之以瘡為度兼服生津化痰溫中
 理氣之藥一切荏苒疾病凡男婦患非傷寒內外等
 症或酒色過度或吐血或月事愆期心煩志亂或腹脹
 胸膈勞倦痰眩或暴行日中因暑伏痰口眼喎斜目痛
 耳憤鼻塞骨節酸疼乾嘔惡心諸般內外疼痛百藥元
 效衆醫不識者依前法加減服之效大抵服藥須臨臥

在床用熱水一口許，漱下便臥。藥在喉膈間徐徐而下，如日間病出不測，疼痛不可忍，必欲急除者，須是一依前臥法服，大半日不可食湯水，及不可起身行坐，言語直候藥丸除遂，上焦痰滯惡物過膈入腹，然後動作，方能中病。每夜須連進二次，次日痰物既下，三五次者，仍服前數下，五七次或只下二三次，而病勢頓已者，次夜減二十九，頭夜所服並不下惡物者，次夜加十九，入壯病實者，多加至百丸，惟候虛實消息之，或服過仰臥咽喉稠粘壅塞不利者，痰氣泛上，乃藥病相攻之故也。少頃藥力既勝，自然寧帖，往往病久結實於肺胃之間，或只暴病全無泛溢者，服藥下咽，即仰臥，頓然百骸安靜，五臟清寧，次早先去大便一次，其餘遍數皆是痰涕惡物，看甚么糞，用水攪之，及係痰片粘涎，或稍上腹痛。

腰腎拘急者，蓋有一種頑痰惡物，閉氣滑腸，憂急後重者，狀如痢疾片餉，即已若有痰涎，易下者，快利不可勝言，頓然滿口生津，百骸爽快，間有片時倦怠者，蓋因連日病苦不安，一時為藥力所勝，氣體暫和，如醉得醒，如浴方出，如睡方起，此藥並不洞泄刮腸，大瀉，但取痰積惡物，自腸胃次第而下，腹中糟粕並不相傷，其推下腸腹之糞，則藥力所到之處，是故先去其糞，其餘詳悉不能備述，服者當自知之。

熱痰雜方

黃連導痰湯一陳湯加黃連枳實是也
垣黃芩利膈丸利胸中熱治膈上痰

- 黃芩 生炒各 兩
- 南星 三錢
- 半夏 五錢
- 黃連 三錢
- 枳殼 三錢
- 白木 五錢
- 陳皮 三錢
- 澤瀉 五錢
- 白礬 五分

右為末水浸蒸餅丸每服三四十九丸白湯下食遠服

丹中和丸

蒼朮

黃芩

半夏

香附

各等分為末蒸餅糊丸

垣小黃丸化痰止涎除濕和胃氣治胸膈不利

黃芩

乾薑

白朮

半夏

澤瀉

黃芪

右為末蒸餅糊丸白湯下

風痰雜方

羅祛風丸有人喜食酸醎酒色過節滲注成痰飲聚於胸

膈滿則嘔逆惡心涎流一臂麻木升則頭目昏眩降則腰

脚疼痛深則左癱右瘓淺則厥然倒地此藥寬中祛痰搜

風理氣和血駐顏延年益壽

半夏麩

荆芥

槐角子

白礬

橘紅

硃砂

右為末薑汁糊丸每服五六十九丸生薑皂角子仁湯送

下日三服

玄道痰丸

半夏

六兩分作三處一分礬水浸一分肥皂

右餘藥在下半夏在上浸至斗日半月時時動水令二

藥相透次相合下處揀去巴豆皂角慢火煮乾取半夏

切碎晒乾入

甘遂

百藥煎

僵蚕

全蝎

右為末同前半夏末一處合和用揀出皂角鍊膏為丸

如硬再入糊令得所每服十五丸實者二十五丸

本膈上有痰川芎丸

川芎

二兩細剉

川大黃

二兩蒸

慢火熬熟

右件焙乾為末用不蛀皂角五七挺溫水搽淨綿濾出
查瓦罐中熬成膏和前二味為丸如桐子大每服十五
丸小兒三九生薑湯下

經治風痰用鬱金一分藜蘆十分各為末和勻每服一字
用溫漿水調下以餘漿水嗽口仰服以食壓之

寒痰雜方

海五飲湯治五飲最效

- 旋覆花 人參 陳皮白去 枳實
- 白朮 茯苓 厚朴製 半夏製
- 澤瀉 猪苓 前胡 桂心
- 白芍 甘草炙

右等分每兩分四服薑十片水二盞煎去查溫服無時
忌肉食生冷等物因酒成飲如葛根葛花砂仁
昌倍木九治五飲一曰留飲停水在心下二曰癖飲水在

兩脇三曰痰飲水在胃中四曰溢飲水溢在脇五曰流飲
水在脇間瀝也有聲皆由飲水過多或飲冷酒所致

白朮 桂心去 乾姜炮各
右為末蜜丸每服二十九溫米飲下加至三十九食前
本治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜腸鳴多唾口中
清水自出脇助急脹痛不欲食此胃氣虛冷所致其脈沉
弦細遲旋覆花湯

- 細辛 陳皮 桂心 人參
- 甘草 桔梗 芍藥 半夏
- 旋覆花已上各 赤茯苓

右為末每服四錢姜七片煎去查溫服
羅木香半夏丸治痰涎上壅心胸不利常服消痰寬膈
木香炒 半夏炒 陳皮 茯苓

姜屑

人參

草薺

白附子各五

右為末麩糊丸食後生姜湯下三五十九

氣痰
雜方

降痰丸治三焦氣滯下痰飲消食利膈痞滿咳唾稠粘面
熱目赤肢體倦怠不思飲食常服升降滯氣消化痰涎

木香

檳榔

青皮

陳皮

京三稜

枳殼炒

半夏洗

大黃

黑牽牛各一

右為末麩糊丸食後姜湯下

運氣

運氣痰飲皆屬濕土經云太陰在泉濕淫所勝民病飲積
又云歲土太過雨濕流行甚則飲癉中滿又云土鬱之癉
飲癉中滿又云太陰之勝腹背病滿飲癉於中治以諸熱
劑是也

針灸

標諸痰為病頭風喘嗽一切痰飲 豐隆 中脘

婦人年高風痰作楚脈沉實滑數痰在下則無力在軍

則胸膈閉悶在上則頭風喘嗽昏運癉則抽牽手足皆動

風門沿皮二

巨闕三寸

豐隆半寸

肩井五分

用溢飲脇下堅痛中脘主之

痞

不能食

飢不能食

惡食

姪

身惡食

痞者心下痞滿而不能食是也仲景云滿而不痛為痞滿
而痛為結

濕主痞
傷寒下
早

夫痞者心下滿而不痛是也太陰者濕也主壅塞乃土
來心下為痞滿也傷寒下太早亦為痞乃因寒傷其榮也
者血也心主血邪入於本故為心下痞悶仲景立瀉心湯
數方皆用黃連以瀉心下之土邪其效如響應桴故活人
書云審短是痞先用桔梗枳殼湯非以此專治痞也蓋因

雜病下之大過

先錯下必成痞症是邪氣將陷而欲過胸中故先用截散其邪氣使不致於痞先之一字早用之義也若已成痞而用之則失之晚矣不惟不能消痞而反損胸中之正氣則當以仲景痞藥治之經云察其邪氣所在而調治之正謂此也非止傷寒如此至於酒積雜病下之太過亦作痞傷蓋下多亡陰亡陰者謂脾胃水穀之陰亡也故胸中之氣因虛下陷於心之分野故致心下痞宜升胃氣以血藥兼之若全用氣藥導之則其痞益甚甚而復下之氣愈下降必變為中滿膨脹皆非其治也又有虛實之殊如實痞太便閉者厚朴枳實湯主之虛痞太便利者白芍陳皮湯主之如飲食所傷痞悶者當消導之去其胸中室塞上逆元兀欲吐者則吐之所謂在上者因而越之是也

虛實

攻補兼施

寒痞者從血中來雜病痞者亦從血中來雖俱為血症大抵傷寒之症從外至內從有形至無形故無形氣症以苦泄之有形血症以辛甘散之中滿者勿食耳不滿者復當食也中滿者腹脹也如自齋滿而外無腹脹之形即非中滿乃不滿也不滿者病也當以甘治之可也苦泄之者枳實黃連之類是也有形血症以辛甘散之者仲景人參湯是也

垣黃芪補中湯

- 黃芪 分五
- 人參 分八
- 甘草
- 白朮
- 蒼朮 分五
- 陳皮 分五
- 澤瀉
- 猪苓
- 茯苓 分三

用水煎至七分溫服送下大消痞丸

冊治一婦人因有大不如意事遂致膈滿不食因循累月積成癥痞不能起坐至午已間必發熱面赤酉戌后熱退

面赤亦退至夜小便雖數每出數滴而已六脈沉澁而短
 小左右一般重取皆有經水雖按月亦數滴而已予曰此
 志不遂而氣鬱胃有瘀血而血亦虛鬱氣成痰在中官却
 不食兼用補瀉之治法以白朮二錢人參茯苓各一錢紅
 花一莖大陳皮一錢煎取濃湯下呷食前熱服之少頃藥
 行後與半匙稀粥又少頃用減輕粉牽牛三花丸如芝蔴
 大以津唾下十五丸一白一夜煎藥九藥各服四遍至次
 日方食知味又次日食稍進第三日則熱退面亦不赤如
 此七日飲食起坐平復如初
 二罐口渴食少氣痞脈弦

白朮 青皮 半夏各一 乾葛半錢
 木通 甘草 少
 分二貼姜二片煎下與點丸二十九保和丸二十九

葶藶丸治心下痞胸中不利

苦葶藶 酒浸 人參 各三
 柴胡 獨活 各二
 砂仁 茵陳 酒炒 各一
 厚朴 半夏 各五
 右為末蒸餅丸篩內水發如米大臨臥白湯服三錢
 木香消痞湯治因憂氣鬱結中脘腹皮急微痛心下痞滿
 不思飲食食亦不散常查痞悶

柴胡 陳皮 各八
 生薑 歸稍 各二
 木香 草薢 各一
 甘草 根 炙 羌活
 黃芩 浸 三 水 一 半 酒
 白芷 薤 各 一
 當歸 身 各 七
 青皮
 甘草 炙 五
 紅花 許 少
 枳實 各 一
 半夏 各 一

無影氣 症以苦
 作一服水煎去查食前熱服忌酒麪等物
 大消痞丸治一切心下痞滿及積年久不愈者

泄之

黃芩各一 黃連各六 葛黃 白朮各一

人參各二 甘草各多 砂仁各一 枳實各五

半夏製四 乾薑各一 陳皮各二 神麴各一

澤瀉各三 厚朴各二 猪苓各一

右為末水浸蒸餅為丸每服六七十丸至百丸食遠白湯下

湯下

黃連消痞丸治心下痞滿壅塞不散煩熱喘促不寧

黃連各一 枳實各七 乾薑各二 半夏各七

黃芩各一 茯苓 白朮 甘草各三

薑黃各一 澤瀉各一 猪苓

右為末湯浸蒸餅為丸每服五七十丸白湯食前下

失笑丸治右關脈浮弦心下濕痞惡食懶倦開胃進食

枳實 黃連各五 乾薑各二 半夏各三

厚朴各四 人參各五 甘草各二 白朮各三

麥蘖各二

右為末水浸蒸餅為丸每服三十九白湯送下不拘時

量虛實加減服

丹小娘心頭痞悶口乾面微黃脈洪

黃連 半夏 白朮 青皮

木通各三

分三貼薑煎去渣熱服下保和丸十五丸

回金丸瀉肝火行濕與熱能開痞結治肝邪補脾土

黃連各六 吳茱萸各一

右為末水浸蒸餅為丸一方用黃連六兩吳茱萸半兩

一名佐金丸

海少陰面赤下痢心下痞瀉心湯加減例易老單用黃連

瀉心湯用錢氏法後隨症加減煩者加山梔 燥加香
鼓嘔加半夏 滿加枳實厚朴 腹痛加芍藥 脈遲
加附子下焦寒加乾薑 大便硬加大黃 如用薑附
先煎令熟使熱不僭後加黃連同用

有形血
攻之

羅枳實理中丸治中脘痞滿滯氣不消積寒停冷飲食不
化傷寒

仲人參湯治胸痺心痞胸痺 半夏瀉心湯治痞滿關脈
沉傷寒

脾氣鬱
結

丹一女子在家因事不如意鬱結在脾半年不食每日食
棗數枚適喜饅頭亦能少食惟深惡粥飯予診其脾氣非
枳實不能散遂以溫膽湯去竹茹與服經三月服二百貼
而愈 又一女子二十餘許婚後夫遠出二年不歸女子
病重不食困臥如痴他無所苦諸醫不效予往治之見女

向裏床而睡形體羸瘦予思之此氣結病也藥不能治得
怒可解予往激其怒掌其面三且責以不得有外患女果
大怒而哭待其哭一二時許令其父母解之進藥二貼即
欲食矣予謂其父母曰雖愈必得喜方可解若再思則結
氣必復至矣其父因偽作其夫有書回約日成婚一月餘
其夫果歸病得全愈

脾飲傷

飲食傷脾痞悶輕者大消痞丸枳朮丸回金丸之類甚者
微下之吐之下之者檳榔丸黃丸吐之者二陳湯及瓜
蒂散探吐之是也

經治膈下冷氣及酒食飽滿常服用青皮四兩分作四分
一分用湯浸一宿去穢餘三分用鹽二兩拌勻良久銚內
微炒焦為末每服一錢半茶末五分水一盞煎七分放溫
常服用沸湯點服尤妙

寒

寒熱

寒痞辛甘散之枳實理中丸之類是也熱痞苦寒瀉之大

運氣

消痞丸之類是也

丹治痞軟石膏研末醋糊丸服能瀉胃火食積痰火

一曰濕痞經云土平氣曰備化備化之紀其病痞又云太陰所至為畜滿為積飲痞膈又云太陰司天之政民病寒濕痞逆又云土鬱之發痞墜腹滿又云土不及曰卑監卑監之紀其病留滿痞塞是也

二曰寒痞經云水鬱之發民病痞墜腹滿又云太陽之復心痛痞滿是也

三曰燥痞經云陽明之復甚則痞滿是也

針灸

海問井主心下滿十二經皆有井當治何井 假令善潔面青善怒是少陽經受病當治金井竅陰是也 假令滿

禁言

閉淋洩便難轉筋足厥陰肝經受病當治木井大敦是也假令頭項痛腰脊強發熱惡寒是太陽膀胱受病當治陽井至陰是也 假令手足自溫自利不渴足太陰脾受病當治陰井隱白是也

羅藥戒○客有病痞者積於其中伏而不得下自外至者捍而不得納從醫而問之曰悲下之不可歸而飲其藥既飲而暴下不終日而向之伏者散而無餘向之捍者柔而不支焦膈通達呼吸開利快然若未始有疾者不數日痞復作投以故藥其快然也亦如初自是不踰月而痞五作五下每下輒愈然客之氣下語而三引體不勞而泝股不步而慄肌革無所耗於前而其中蕭然莫知其所來嗟夫心痞悲下不可已予從而下之術未爽也蕭然獨何如聞楚之南有良醫焉往而問之醫笑曰子無怪是蕭然者也

凡子之來固為是爾然也坐吾語汝天下之理有甚快於吾心者其末也必有傷求無傷於其中則無望快於吾心夫陰伏而陽蓄氣與血不運而為痞橫乎子之胸者其累大矣擊而去之不須臾而除其大之累和平之物不能為也必將搏擊震撓而後可夫人之和氣冲然而其微泊乎其易危擊擗震撓之功成而子之和亦已病矣由是觀之則子之痞凡一快者則子之和亦一傷矣不踰月而快者五子之和平之氣不既索乎故爾然如不終日也且將去子之痞而無寧於和也子歸燕居三月而後與之藥可為也客歸三月齋戒而復請之醫曰子之氣少復矣取藥而授之曰服之三月而疾少平又三月而少康終年而可復常且飲藥不得壓進客歸而行其說然其初使人滿然而遲之蓋三投藥而三反之也然日不見其所攻之效及軟

則月異而時不同終歲而疾平矣客謂醫再拜而謝之坐而問其故醫曰此醫國之說豈特施之於病哉子獨不見秦之治民乎悍而不聽令愷而不動事放而不畏法令之不聽治之不變則秦之民常痞矣商君見其痞也厲以刑法威以斬伐悍厲猛鷲不毫髮少貸痛剗而力鋸之於是乎秦之政如建瓴流通四達無敢或指而秦之痞常一快矣自孝公以至二世凡幾痞而幾快矣頃者已也強者已柔而秦之民無懼心矣故猛政一快者歡心一亡積快而不已而秦之四肢枵然徒具其物而已民心日離而君孤立於上故匹夫大呼不終日而百姓皆起秦欲運其手足肩脊而漠然不我應故秦之亡也是好為快者之過也昔者先王之民其初亦嘗痞矣先王豈不知善然擊去之以為速也惟懼其有傷於中也故不敢求快於吾心優柔而

撫育之教以仁義道以禮樂陰解其亂而除去其痞旁視而憐然有之矣然月計之歲察之前歲之俗非今歲之俗也不擊不搏無所忤逆是以日去其戾氣而不與其歡心於是政教達安樂久而後患除矣是故三代之治皆更數聖人歷數百年而後俗成則予之藥終年而疾愈蓋無足怪也故曰天下之理有甚快於吾心者其末也必有傷求無傷於其終則無益於予心雖欲豈特治天下為然哉客再拜而紀其說

不能食

心下不痞滿自不能食也

經治大人小兒不進乳食積氣去痰用入參四兩半夏一

兩薑汁浸一宿曝乾為末麩糊丸食後生薑湯下

和中丸開胃進食

虛實
任飲食

乾薑一錢

木瓜一枚

甘草三錢

陳皮三錢

人參一錢

白朮三錢

右為末蒸餅糊丸食前白湯下三五十九丸

本七珍散開胃進食補脾養氣

人參

白朮

黃芪一錢

山藥

白茯苓

粟米微

甘草等分

右為末每服二錢薑棗煎服如故不思飲食加匾豆一

兩名八珍散此方温平不熱常服飲食自倍

六神湯治傷寒虛羸不思飲食

人參

白朮

黃芪一錢

枳殼一方用

白茯苓兩半甘草二錢

右為末每服五錢薑棗同粳米合許煎食前服

羅錢氏異功散治脾胃虛弱難在飲食

異功散用人參白

茯苓白朮甘草

紅木香各等分薑棗煎服

羅謙甫云脾胃弱而飲食難在者不可一藥用克伐之劑宜錢氏異功散補之自然能食設或嗜食太過傷脾而痞滿嘔逆權用枳實丸一服慎勿多服予嘗治翁氏之瘧食少汗多先用補劑加黃連枳實月餘食反不進汗亦不止因悟謙甫此言遂減去枳連純用補劑又令粥多於藥而食進又於原方內加附子三分半一服而愈

垣寬中進食丸滋形氣喜飲食

- 草薢仁 五錢
- 砂仁 五分
- 半夏 七錢
- 麥芽 一兩
- 枳實 四錢
- 神麴 兩半
- 甘草 錢半
- 乾薑 一錢
- 陳皮 三錢
- 木香 五分
- 白朮 各二錢
- 白茯苓 各二錢
- 澤瀉 人參 各一錢
- 青皮 各一錢

右為藥湯浸蒸餅為丸每服三五十九白湯下

脾胃積滯

和中丸治病久虛弱厭厭不能食而臍臍或秘或瀉常服和中理氣消痰進食去濕厚腸胃

- 厚朴 薑製 一兩
- 白朮 一兩
- 半夏 一兩
- 橘紅 八錢
- 檳榔 四錢
- 枳實 三錢
- 木香 二錢
- 甘草 三錢
- 右為宋生薑汁浸蒸餅丸每服五六十丸食後白湯下
- 木香 乾薑 枳朮丸能開胃進食 二方並見內傷

交泰丸升陽氣瀉陰火調榮氣進飲食助精神寬腹脹除怠惰嗜臥四肢不收沉困懶倦

- 知母 四錢
- 生薑 一分
- 柴胡 一錢
- 厚朴 三錢
- 冬加七分
- 人參 一錢
- 黃連 一錢
- 肉桂 去皮 一錢
- 白茯苓 三錢
- 紫苑 去苗 六錢
- 小椒 目者 一錢
- 白朮 二錢
- 皂角 去皮 大錢

因醫家雜錄卷五

川烏頭半錢 乾薑錢三 巴豆霜兩半 吳茱萸湯洗半兩

砂仁錢三 右除巴豆霜另研入餘俱為細末蜜丸每服三四十九

溫水下量虛實加減

寒熱 虛熱

河人參半夏丸下痰進食妨觀咳

丹治一男子因服熱藥多又性急形瘦多倦食少此時四

月後與此方分作十四貼食後煎熱下天補丸十五粒

白木半兩 炒麴兩 陳皮七錢 黃芩六錢

人參 炙甘草各一 麥門冬 木通各半

生甘草 又治勞苦不思飲食 滑石 白茯苓各一

治脚氣瘦倦不思飲食

白木兩 蒼朮 陳皮 黃連

黃柏 半夏各半 匾栢七斤 香附

白芍藥 右為末薑汁糊丸

憂抑傷脾不食飲食 黃連 芍藥酒 香附 青六散末

右薑汁浸炒為丸 加紅曲二兩 散

濕痰氣滯不思穀食三補丸加蒼朮倍香附

本治脾氣久虛不進飲食停飲脇痛麴木丸

神麴炒十 白木五 乾薑 官桂各二

吳茱萸 川椒各三

醫家雜錄卷五

卷五

右為采薄糊丸每服三五十九食前薑湯下有飲加白
朮二兩此方自試有效

脾胃虛

二神丸治脾胃虛弱全不進食

破故紙炒四兩 肉苁蓉生二兩

右為末用肥棗四十九箇生薑四兩切片同煮棗爛去
薑取棗剝去皮核用肉研為膏入藥末和杵丸如桐子
大每服之四十九盞湯下有久全不進食服補脾藥皆
不效予授此方服之頓能進食此病不可全作脾氣治
蓋腎氣怯弱真元衰削是以不能消化飲食譬之鼎釜
之中置諸米穀下無火力終日米不熟其何能化黃魯
直嘗記服兔絲子淘淨酒浸曬乾日挑數匙以酒下之
十日外飲啜如湯沃雪亦知此理也

針灸

摘胃弱不思飲食腸鳴腹痛食亦不化 三里 三陰交

東三焦停水氣攻不食身黃微熱胃中有寒故也 維道

又中卦 胃俞 腎俞

撮三焦邪熱不嗜飲食 關元一分沿皮向後三分灸

東全不思食 然谷立血

脈浮滑而疾者食不消脾不磨 陽脈滑而緊滑則胃氣

實緊則脾氣傷得食不消者此脾不和也 類治之

仲才口脈微而澹微者衛氣不行澹者榮氣不達榮衛不

能相將三焦無所仰身體痺不仁榮氣不足則頭疼口維

言衛氣虛則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而

吞酸中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則為遺洩

類治之

脾胃虛 飢不能食

靈黃帝曰人之善飢而不嗜食者何氣使然岐伯曰精氣

飽不能

運氣

針灸

診

并於脾胃熱氣留於胃胃熱則消穀穀消故善飢胃氣逆上則胃脫寒故不嗜食也論大惑

運氣飢不欲食皆屬濕邪傷腎經云太陰司天濕淫所勝民病心如懸飢不欲食治以苦熱是也

鍼灸飢不欲食有二法其一清胃經云胃者水穀之海其膈上在氣衝下至三里水穀之海不足則飢不受穀審中其膈調其虛實是也

其二取腎經云腎是少陰之脈是動則病飢不欲食心如懸苦飢狀視盛虛熱寒陷下取之也

東飢不能食飲食不下嘔而雷鳴大迎 中極 食實

又法 期門 章門 冬脈不及為病在中令人心懸如飢全文見治 仲寸口脈弱遲弱者胃氣微遲者榮中寒榮為血血虛則

發熱胃為氣氣虛則發厥

惡食

屬胃

素太陰所謂惡聞食臭者胃無氣故惡食臭也

丹惡食者胸中有物道痰補脾二陳加白蒼香等湯

垣失笑丸治虛痞惡食方規 妊娠惡食

大治妊娠惡食

人參兩 厚朴 生薑 枳殼

甘草各二 水煎服 凡妊娠惡食者以所思食任意食之必愈

消痺門 胎前產後渴 口燥咽乾

渴而多飲為上消，消穀善飢為中消，渴而便數有膏為下消。

垣上消者，舌上赤，裂大渴，引飲，逆調論云：心移熱於肺，傳

為膈消是也。以白虎加入參湯主之。潔古曰：上消者，上焦

飲水而少食，大便如常，小便清利，知其燥在上焦，宜流濕以潤其燥。

中消者，善食而瘦，自汗，大便硬，小便頻數，叔和云：口乾飲

水多，食亦飢，虛癉成，為消中者是也。以調胃承氣湯及三

黃丸主之。潔古云：中消者，胃也，渴而飲食多，小便赤，黃丸主之，黃熱能消穀，知其熱在中焦也，宜下之。

下消者，煩燥，引飲，耳輪焦，乾小便如膏，叔和云：焦煩，水易

虧此，腎消也。以大味地黃丸主之。潔古云：腎消者，病在下

如膏油之狀，至病成，面色黧黑，形瘦而耳焦，小便濁而有脂液，治宜養血以分其清，濁而自愈矣。

右上消者，經謂之膈消，膈消者，渴而多飲是也。中消者

經謂之消中，消中者，渴而飲食俱多，或不渴而獨飲是

也。下消者，經謂之腎消，腎消者，飲一溲二，其溲如膏油

即膈消消中之傳變。王註謂肺臟消，燥氣無所持是也。

蓋肺藏氣，肺無病則氣能管攝津液，而津液之精微者

收養筋骨血脈，餘者為溲。肺病則津液無氣管攝，而精

微者亦隨溲下，故飲一溲二，而溲如膏油也。筋骨血脈

無津液以養之，故其病成漸形瘦焦乾也。然肺病本於

腎虛，腎虛則心寡於畏，妄行凌肺，而移寒與之。然後肺

病消，故仲景治渴而小便反多，用腎氣丸補腎救肺，後

人因名之腎消及下消也。或曰：經既云肺消，死不治，仲

景復用腎氣丸治之，何也？曰：飲一溲二者，死不治，若飲

一未至溲二者，病尚淺，猶或可治，故仲景腎氣丸治飲

水一斗，小便亦一斗之症，若小便過於所飲者，亦無及

矣。

病式服藥

熬猪肚湯

小承氣湯

葵之源瀉腎煎

羊肉冬瓜湯

腎氣丸

消渴手大陰大渴不止

消足陽明瘦弱而數便

腎消足少陰少凌多

來冬飲子

易老順氣散

內化丸

化水丹

裝注制陽煎

三消分水火圖

消渴未傳瘰癧中滿不治

因論消渴未傳能食者必發腦疽背瘡不能食者必傳中
滿鼓脹聖濟總錄皆為必死不治之症潔古分而治之能
食而渴者白虎加入參湯主之不能食而渴者錢氏白朮
散倍加葛根主之上中既平不復傳下消矣前人用藥厥
有肯哉或曰未傳瘰癧者何也此火邪勝也其瘡痛甚而
不潰或赤水者是也經曰有形而不痛者陽之類也急攻
其陽無致其陰治在下焦元氣得强者生失强者死未傳

禁忌

中滿者何也以寒治熱雖方士不能廢繩墨而更其道也
然臟腑有遠近心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制大
其服皆適其所至所為故知過與不及皆誅罰無過之地
也如膈消中消制之太急速過病所及而成中滿之疾正
謂上熱未除中寒復生者非藥之罪失其緩急之宜也處
方之際宜加審焉

本總錄論消渴有三種一者渴而飲水多小便數有脂似
麩井而甜者消渴病也二者吃食多不甚渴小便少有似
油而數者消中病也三者雖渴飲水不能多腿脚瘦小痿
弱小便數此腎消病也特忌房勞千金云消渴病宜慎者
有三一飲酒二房勞三鹹食及麪能慎此三者雖不服藥
亦自可愈消渴之人愈與未愈皆須慮其失癰必於骨節
間忽發癰疽而卒

診

素帝曰夫子數言熱中消中不可服膏粱芳草石藥石藥發瘖芳草發狂夫熱中消中皆富貴人也今禁膏粱是不合其心禁芳草石藥是病不愈願聞其詳岐伯曰芳草之氣美石藥之氣悍二者其氣急疾堅勁故非緩心和人不可以服此二者帝曰不可以服此二者何以然岐伯曰熱氣慄悍藥氣亦然二者相遇恐內傷脾胃者土也而惡木服此藥者至甲乙日更論熱中論王註云多飲數波謂之即鍾乳之類即鍾乳之類

垣滑石治渴本為竅不利而用之以燥能亡津液也天令濕氣太過者當用之若無濕用之是犯禁也

本黃帝曰人之善病消瘵者何以候之少俞答曰五臟皆柔弱者善病消瘵黃帝曰何以知五臟之柔弱也少俞曰夫柔弱者必有剛強剛強多怒柔者易傷也黃帝曰何以

候柔弱之與剛強曰此人薄皮膚而肉堅固以深者長衝直揚其心剛則多怒怒則氣上逆胸中蓄積氣血逆留臆皮充肌血脈不行轉而為熱熱則消肌膚故為消瘵此言其人暴剛而肌肉弱者也五變篇弱弱小以薄者心脆心脆則善病消瘵熱中肩背薄者肺脆肺脆則善病消瘵易傷脇骨弱者肝脆肝脆則善病消瘵易傷唇大而不可堅者脈脆脈脆則善病消瘵易傷耳薄不堅者腎脆腎脆則善病消瘵易傷全文見診法心脈微小為消瘵滑甚為善渴肺脈微小為消瘵肝脈微小為消瘵小甚為多飲脾脈微小為消瘵腎脈微小為消瘵諸脈小者陰陽俱不足也勿取以針而調以甘藥全文見治虛實法凡治消瘵肥貴人則膏粱之疾

素心脈奕而散者當消渴自巳脈要精微論帝曰消瘵何如

脉

岐伯曰脈實大病久可治脈懸小堅病久不可治虛實
難病若開自而渴心下牢者脈當得緊實而數反得沉澹
而微者死也難

脈消渴脈數大者生細小浮短者死

渴而多飲為上消

大法

丹治消渴養氣 降火 生血為主 茯苓根治消渴之

神藥

心移熱於肺傳為膈消全文見診病傳變王註云心脇兩

橫膈膜故心熱入肺久傳

能食而實熱

渴者錢氏白朮散加葛根大作湯劑廣服之

保人參石膏湯治膈消土焦煩渴不欲多食

人參 錢五

石膏 兩一

知母 錢

甘草 錢四

每服五錢水煎食後溫服

錢 加減地骨皮散治上消

知母

柴胡

甘草 炙

半夏

地骨皮

赤茯苓

白芍藥

黃芪

石膏

黃芩

桔梗

右為細末每服三錢薑五片水煎食遠溫服

垣 白朮散治虛熱而渴

人參

白朮

白茯苓

甘草 略一

乾葛 兩二

藿香 兩一

木香 兩一

右為末每服三錢煎溫服如飲水多多與服之海藏云

加減法治濕勝

海 治脾胃虛弱太渴不止而食少小便不利大便不調精

神短少腹窄如繩束之

不能食為虛熱

白茯苓去皮 橘紅各一 生薑研
右為末煉蜜丸如彈子大每服二丸白湯化空心服忌
生冷硬物怒發思慮過度如脈弦或腹中急甚者加甘
草三錢

易老門冬飲子治老弱虛人大渴

人參 枸杞子 白茯苓 甘草各三

五味子研 麥門冬去心 薑水煎服

羅門冬飲子治膈消胸滿心煩精神短少多為消病

知母 甘草炙 瓜蒌仁 五味子

人參 葛根 茯神 生地

麥門冬略一

右為末每服五錢加竹葉十四片同煎

恒小便不利而渴知內有濕也小便自利而渴知內有燥

渴分燥

也濕宜泄之燥宜潤之

仲脈浮小便不利微熱消渴者宜利小便發汗五苓散主

之方見傷寒 脈浮發熱渴飲飲水小便不利者猪苓湯主之

傷寒 本火府丹治消渴方見 壬戌年一卒病渴日飲水三斗

不食者三月心中煩悶時已十月予謂心中有伏熱與此

藥數服每服五十九溫水下越二日來謝云當日三服渴

止又次日三服飲食如故此方本治淋用以治渴效信乎

藥要變通用之

藏器石燕主消渴同水牛鼻和煮飲之

渴而小便自利諸方並見下消燥熱條

恒神效生津甘露飲子方見下消

丹消渴泄瀉先用白芍白朮各炒為末調服後隨症用藥

渴分濕

垣止渴潤燥湯治消渴大便乾燥喜溫飲陰頭短縮舌上白燥唇裂口乾眼澁難開及於黑處如見浮雲

升麻一分 柴胡七分 甘草稍五分 杏仁六箇
桃仁研一分 麻仁研一分 歸身一分 紅花許少
防風根一分 荊芥穗一分 熟地二分 小椒一分
細辛一分 黃柏一分 知母 石膏絡一分

病後餘熱 渴分有汗無汗 雜症有汗而渴者以辛潤之無汗而渴者以苦堅之
陽無汗而渴不宜服白虎湯若得汗後脈洪大而渴者宜服之
陽明汗多而渴不宜服五苓散若小便不利汗少脈浮而渴者宜服之
丹消渴病退後而燥渴不解此有餘熱在肺經可用麥冬耳草少許生薑汁冷服 虛者可用人參湯

寒 三化水丹治手足少陰渴飲不止或心痛者本席治飲冷水多

川烏脂大者四箇炮去皮 甘草炙一分 牡蠣生三兩
右為細末醋浸蒸餅為丸每服十五丸新水下心痛者醋湯下立愈飲水一石者一服愈海藏云此藥能化停水

大經渴 垣太陽經渴其脈浮無汗者五苓散滑石之類主之 陽明經渴其脈長有汗者白虎湯涼膈散之類主之 少陽經渴其脈弦而嘔者小柴胡湯加瓜蒌之類主之 太陰經渴其脈細不欲飲縱飲思湯不思水者四君子理中湯之類主之 少陰經渴其脈沉細自利者猪苓湯三黃丸之類主之 厥陰經渴其脈微引飲者宜少與之 聖治時氣煩渴用生藕汁一盞入生蜜一合令分分為三

其緩

服

蜜酒方

好蜜

水磁

細麴

好乾酵

右先熬蜜水去沫冷下麴每日攪三次五服

仲渴欲飲水不止者文蛤散主之

文蛤五兩按本草云如治味油用治

右七件捍為散以沸湯和服方寸七

經治一切渴用大杜礪不拘多少於臘日或端午日黃泥

裏煨通赤放冷取出為末用鯽魚煎湯下一錢七小兒五

分只兩服痊

本治渴疾飲水不止神效散

白浮石

蛤粉

蟬殼等

右為末豚鯽魚膽七箇調三錢不拘時服

又消渴方

白浮石

舶上青苔等麝香少

右為末每服二錢溫湯下

苦堅黃連丸即瓜蒌根丸是也

辛潤保上焦燥而渴蜜煎生薑湯用大器傾注時時呷之法曰

心肺之病莫厭煩而少飲內經曰補上治上宜以緩又曰

辛以潤之問腠理致津液通則肺氣下流故火氣降而燥

衰矣其渴即止有人消渴引飲無度或令食葦苗日用

三五兩不得入鹽但吃得十斤即效

酸收 千里漿一名水葫蘆

木瓜

紫蘇葉

桂酪

烏梅肉

赤茯苓

一本有神麴豈粉

右為末煉蜜丸如彈子大喻化下丸嚥下齒扇腎水故也

又方 百藥煎 烏梅肉 紫蘇葉

人參 甘草 麥門冬

右等分為細末煉蜜丸如彈子大噲化

芷梅湯 烏梅肉 甘草各三 百藥煎兩

白芷 白檀 右為細末湯點服

運氣 運氣渴有二

一曰熱助心盛而渴經云少陽司天之政三之氣炎暑至

民病渴又云少陰之復渴而欲飲又云少陽之復噎絡焦

槁渴引冰漿治以諸寒劑是也

二曰寒攻心虛而渴經云太陽司天寒氣下臨心火上從

隘乾善渴又云太陽司天寒淫所勝民病隘乾渴而欲飲

又云寒水太過上臨太陽民病渴而妄冒治以諸熱是也

雜考 丹治消渴用燥絲湯飲之能引腎氣上行朝於口

仲吐酸欲得水而貪飲者文蛤飲志之兼治微風脈緊頭

痛 文蛤兩 麻黃 甘草 生薑各三

石膏兩 杏仁五十 大棗十二

右咬咀以水七升煮取二升溫服一升汗愈

垣甘草石膏湯治渴病全愈再劇舌白滑微腫咽喉嚥唾

覺痛臉腫時渴飲冷白沫如膠飲冷乃止 升麻五分 柴胡七分 甘草根五 黃柏一

石膏六 杏仁六 枳仁 防風根

荆芥穗 生地各一 熟地三 黃連三

知母一 細辛一 紅花少 小椒三

婦身一 右水煎去渣食後熱服

針灸口渴咽乾有四法

其一取心經云心手少陰之脈是動則病噎乾心痛渴而欲飲隨盛虛寒熱陷下取之也

其二取肺大腸經云大腸手陽明之脈所生病者目黃口乾隨盛虛寒熱陷下以施補瀉疾留之法也又云肺虛則少氣耳聾噎乾取其經太陰太陽之外厥陰內血者是也其三取腎經云腎足少陰之脈所生病者口熱舌乾咽腫噎乾隨盛虛寒熱陷下取之又云噎乾口中熱如膠取足少陰是也

其四取肝經云肝足厥陰之脈是動病甚則噎乾面塵脫色隨盛虛寒熱陷下取之

蜜 消渴經百日已上者不可刺

王液 訖取一分瀉見血 三里 瀉訖如前補王液 關元

瀉訖用取廉泉

集 又法 金津 玉液 承漿 海泉 人中 廉

泉 腎俞 氣海

東 小腸俞 陽池 各灸 廉泉 出惡血 又法 胃脘

心膈 臍中 各灸 又法 承漿 然谷 勞宮 曲

地 意舍 關元 各灸

世 口熱咽乾唾如粘膠口苦噎中介介然 各灸 大溪 頤 陽

陵泉 二十

甲 渴飲身體燥多噎隱白主之 消渴嗜飲承漿主之

消渴脛骨主之 噎乾腹痠痛坐臥目慌 善怒多言伏

溜主之

消穀善飢為消

瘰成為中消 至文見脈經云五臟皆柔弱而脆者為消瘰王註云瘰為消熱病也 已食而

虛熱

飢者胃疽平人氣象論云穀入多而氣少得之有所

脫血濕居下也全生文見

胃熱則消穀

靈胃中熱則消穀令人心懸善飢眇已上皮膚熱師傳篇胃

中熱腸中寒則咳飢小腹脹中熱則胃中消穀津液

素三陽結謂之消陰陽別論王註云胃及大腸俱熱結也熱則消水穀

大腸熱則消水

垣消渴中消自古只治燥止渴誤矣殊不知三陽結謂之

消二陽者陽明也手陽明大腸主津液所生病熱則目黃

口乾是津液不足也足陽明主血所生病熱則消穀善飢

血中伏火是血不足也結者津液不足結而不潤皆燥熱

為病也此因數食甘美而多肥故其氣上溢轉為消渴治

之以蘭除陳氣也不可服膏梁芳草石藥其氣悍烈能助

熱燥也越人云邪在六腑則陽脈不和陽脈不和則氣留

之氣留之則陽脈盛矣陽脈太盛則陰氣不得榮也故肌

肉皮膚消削是也

食甘美所致

素帝曰有病口甘者病名為何何以得之岐伯曰此五氣

之溢也名曰脾瘴夫五味入口藏於胃脾為之行其精氣

津液在脾故令人口甘也此肥美之所發也此人必數食

甘美而多肥也肥者令人多熱甘者令人中滿故其氣上

溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也奇病論

胃熱則善消冰穀可飲甘辛降火之劑用黃連末生地

白藕各自然汁牛乳各一升熬成膏和黃連末一斤丸如

桐子大每服三五丸少呷白湯下日進十服

河猪肚丸治消渴

猪肚筒一黃連兩瓜蒌根兩麥門冬去心

知母兩

虛者潤之

為細末納猪肚中線縫置甑中蒸極爛乘熱於石臼中杵可丸為度如硬加少蜜為丸每服三十九丸漸加至四十九丸渴則服之三因方多梁米其仲本草云猪肚能補中益氣止渴

垣調胃承氣湯治消中渴而飲食多起時宜服之

黃丸方見治發熱條 順利散治中熱在胃而能食小便赤黃微利至不欲食為效不可多利

厚朴 枳實各一 大黃 四

每服五錢水煎食遠服

食飲即消中

大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食飲全見診病傳變而過不生肌膚亦易飢也東垣云善食而瘦者謂食移易胃伏火邪於氣分則能食脾虛則肌肉削也 胃移熱於膽亦曰食飲同

河參蒲丸治食飲胃中結熱消穀善食不生肌肉

人參 赤茯苓 菖蒲 遠志

地骨皮 牛膝酒浸各

右為末煉蜜丸每服二十九米飲下

運氣 運氣消中皆屬熱經云少陰之勝心下熱善飢又云少陽之勝熱客于胃善飢治以寒劑是也

針灸

針灸消中皆取於胃經云邪在脾胃陽氣有餘陰氣不足則熱中善飢取三里灸之又云胃足陽明之脈氣盛則身已前皆熱於胃則消穀善飢熱則清之盛則瀉之

用 陰氣不足熱中消穀善飢腹熱身煩狂言三里主之

腹中氣脹引脊痛飲食多而身羸瘦名曰食飲每作先取脾俞後取季脇

渴而便數有膏為下消

燥熱 張安撫芸夫年四十五歲病消渴舌上赤裂飲水無度

小便數多先師以此藥治之良愈消渴多傳瘡瘍為不救之疾既效亦不成瘡瘍享年七十五而終名之曰生津甘露飲子治消渴上下齒麻舌硬赤爛腫痛食不下腹時脹滿疼痛渾身色黃目白睛黃甚則四肢萎弱無力面塵脫色脇下急痛善噎善怒健忘醫肉腰背疼痛兩丸冷甚上方石膏用三兩二錢

石膏 二錢
 人參
 甘草 生
 山梔
 連翹
 甘草 炙
 蔓澄茄
 黃連
 薑黃
 藿香 各一
 歸身
 白葵 分五
 麥門冬
 杏仁 錢一
 歸身
 蘭香 分五
 黃柏 酒炒 一
 升麻 根 二
 木香 錢
 桔梗 錢三
 柴胡 根 分五
 知母 錢二
 全蝎 二個
 右為末湯浸蒸餅和勻成劑捏作餅子晒乾作碎如黃

米大每服三錢挑於掌內以舌舐之津液送下或白湯食後服之神效凡消渴為病燥熱之氣勝也內經云熱淫所勝佐以甘苦以甘瀉之熱則傷氣七傷則無潤折熱補氣非甘寒之劑不能故以石膏之甘寒為君啓玄子曰滋水之源以鎮陽光故以栝連梔子知母之苦寒瀉熱補水為臣以當歸杏仁麥門冬全蝎連翹白葵蘭香甘草甘寒和血潤燥為佐升麻柴胡苦平行陽明少陽二經蔓澄茄白苣藿木香藿香反佐以取之又用桔梗為舟楫使浮而不下也

和血養氣湯治口渴舌乾小便數舌上赤裂此藥生津除燥生肌肉一名地黃飲子

黃連 酒七
 桃仁 八
 生地 分七
 紅花 少
 黃柏 酒一
 當歸 酒四
 甘草 分三
 升麻 分一

知母酒五分 防已酒三分 羌活五分 麻黃根三分
 口乾舌渴加杏仁六分 甘草生三分 小便數加石

膏分六

右吹咀作三服水煎去渣稍熱服忌酒麪房事

清涼飲子治消中能食而瘦口舌乾自汗大便結小便數

羌活稍分 柴胡稍分 升麻稍分 防風稍分
 當歸分六 甘草稍分 石膏半分 知母酒製一分

紅花許少 防已五分 龍膽草一分 黃柏一分
 桃仁五 杏仁伍 生地酒五分 黃芪根一分

黃芩酒一分 甘草條一分 右水二盞酒一小盞煎服

甘露膏治消渴飲水極多善食而瘦自汗大便結燥小便頻數又名蘭香飲子

石膏二分 知母一分 甘草生一分 人參五分

防風根一分 半夏製五分 蘭香五分 白芷莖
 連翹 桔梗 升麻各五分

右為末水浸蒸餅丸或捏劑作薄餅子晒乾碎如米大

每用淡薑湯下二錢

丹 徐兄年四十歲口乾小便數春未得之夏來求治診其

兩手左瀋右畧數而不弦重取似大而稍有力左稍沉畧

弱而不弦然瀋却多於右直滿尺皆不甚起此由飲食味

厚生熱謂之痰執禁其厚味宜降火以清金抑肝以補脾

用三消丸十粒左金阿魏丸各五粒以薑湯吞下二日六

次又以四物湯加參朮陳皮生甘草五味子麥門冬煎服

一日三次與丸藥間服一二日自覺清快小便減二之二

口亦不乾止渴未除頭暈眼花久坐則腰疼遂以摩腰膏

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

治腰疼仍以四物湯用參芪減川芎加牛膝五味子炒栢
麥門冬煎飲調六一散服及覺便多遂去六一散仍服丸
藥而安 黃連末治消渴要藥加天花粉末人乳生地黄
汁生藕汁二物為膏入山藥末搜和以薑汁和煉蜜為膏
徐徐挑於舌上以白湯少許送下亦得能食加軟石膏
治消渴以天花粉為末入乳汁生薑汁煎膏先如薑薑
大每服百丸食後服

世治消渴小便多者煮瓜蒌根汁飲之良

世治消渴無方可治者用天花粉大烏頭炒等分為細末
蒸餅丸每服百丸開水送下

已上四方蒺藜根為君本草云蒺藜根主消渴止小便
通月水乳汁夫既能止小便又能通月水知其流濕潤
燥治消渴之要藥也

本千金地黃丸治腎渴

黃連四兩 生地半斤 研取汁連查拌

右再為細末煉蜜為丸食後麥門冬湯下五六十丸

羅黃連丸治消渴飲水無度小便頻數

黃連淨半斤 用無灰好酒浸一宿
重湯蒸一伏時取出晒乾用

右為細末滴水丸白湯下五七十丸

又方治卒消渴小便多搗黃連細末蜜丸服三四十九

麥門冬湯治消渴日夜飲水無度飲下即洩

麥門冬法 黃連 冬瓜各二兩

右為麤末每服五錢水煎八分去查溫服若冬瓜無乾
者用新冬瓜肉三斤去穰分作十二片為十二服每服
用瓜一片劈破水煎日三服

冬瓜飲子治消渴能食而飲水多小便如脂麩片日夜無

度

冬瓜一枚

黃連十兩為細末

右先以冬瓜破開去穢，摻黃連末在內，却用頂蓋定於熱灰中煨熟，去皮切細爛研絞汁，每服一盞至二盞，日三夜一服。

本三消丸用好黃連，治淨為細末，不拘多少，切冬瓜肉，研取自然汁和成餅，陰乾再為細末，用汁浸和，加至七次，即用冬瓜末為丸，每服三四十九丸，以冬瓜汁煎大麥仁湯送下，尋常渴止一服效。

已上五方黃連冬瓜為君，丹溪云冬瓜性走而急，久病與陰虛者忌之，又有黃連為佐用者，蓋之。

食治消渴飲水不止，小便數用田螺五升水一斗，浸一宿，湯即飲之，每日一度，易水換螺為妙，又方以水煮取汁飲。

之亦任吃

和治飲水百杯尚猶未足，小便如砂或如杏色，飲服此方三五日，小便大出，毒注下十日除根，此方子和自云此重劑試有驗。

水銀四錢

錫二錢同水銀炒成砂子

牡礮

密陀草

知母

紫苑

古參

貝母各一兩

黃丹兩

蒺藜根兩

右為細末，男子用不生兒猪肚，婦人用獾猪肚，一箇納藥於內，以麻線縫之，用新尾二斤繩繫，一遭別用米一升，蒺藜根末半升，於新水內煮熟，取出放冷，不用米及蒺藜，只斫猪肚併肚中藥末爛和為丸，如硬加蜜食前米湯下三四十九丸。三因方無貝母

河胡粉散治大渴百方不痊者亦治腎消。

黃丹 胡粉各半
 茯苓二兩 甘草一兩
 澤瀉 石膏 赤石脂 白石脂各半
 右吹咀水煎服日三服如腹痛減之為丸服尤效每服十九多則腹痛

及從

葛根丸治消渴消腎日飲碩水者
 葛根三兩 瓜蒌根二兩 黃丹二兩 附子炮去皮 脂一兩

右為末煉蜜丸每服十九日進三服春夏去附子

腎虛

垣六味地黃丸治腎消方見治 虛實法
 經治消渴不止下元虛者用牛膝五兩細剉為末生地黃汁五升晝曝夜浸以汁盡為度蜜丸空心溫酒下三十九久服壯筋骨駐顏色黑髮髮生津液

仲治男子消渴小便反多如飲水一斗小便亦一斗腎氣丸主之方見治 虛實法

子和治腎消以腎氣丸本方內加山藥一味外桂附從四時加減冬一兩春秋三錢夏一錢 又法腎氣丸去附子加五味子一兩半

本唐祠部李郎中論消渴者腎虛所致每發則小便甜醫者多不知其故亦缺而不言洪範曰稼穡作甘以物理推之淋錫醋酒作脯法須更即甜是明人之食後滋味皆甜流在膀胱若腰腎氣盛則上蒸穀氣化成精氣下入骨髓其次為脂膏又其次為血肉其餘則為小便故小便色黃血之餘氣也五臟之氣鹹潤者則下味也若腰腎既虛冷則不能蒸化穀氣盡下為小便故味甘不變其色清冷則肌膚枯槁也猶如乳母穀氣上洩皆為乳汁消渴病者下泄為小便皆精氣不實於內則小便數澀弱也又肺為五臟華蓋若下有煖氣蒸則肺潤若下極冷則陽不能升故

肺乾而渴易於否卦言之矣乾上坤下陽無陰不降陰無陽不升上下不交故成否也譬如釜中有水以火煖之又以板覆之則煖氣上騰故板能潤若無火力則水氣不能上升此板終不得潤火力者腰腎強盛也常須煖補腎氣飲食得火力則潤上而易消亦免乾渴之患故仲景云宜服腎氣八味丸此疾與脚氣雖同皆為腎虛所致其脚氣始發於二三月盛於五六月衰於七八月凡消渴始發於七八月盛於十一二月衰於二三月其故何也夫脚氣痿疾也消渴宜疾也春夏陽氣上故痿疾發則宜疾愈秋冬陽氣下故宜疾發則痿疾愈審此二者疾可理也猶如善為政者寬以濟猛上以濟寬隨時變通耳

利治諸虛不足胸中煩降時常消渴唇口乾燥或先渴而飲發瘡或病瘡疽而後渴者宜用黃芪湯多服之方見瘡疽門

保行氣丸治消渴
消渴而小便反多者皆腎氣不營脂液也宜多服黃芪黃芪乃補氣之要藥

五靈脂行義云五靈脂入肝最速能行經血不能生血
右等分為末每服三冬冬瓜湯下無瓜時苗葉亦可日三服渴止勿服再服八味丸去附子加五味子
外治消腎小便數鹿角一具炙焦搗篩為末酒服方寸匕漸之加之

保茴香散治消病下焦渴症小便如膏
茴香炒 苦棟炒 各等分炒為末食後酒調下一錢

食治消渴舌焦口乾小便數野雉一雙以五味者極熟去肉取汁渴飲之肉亦可食
肝癰者臥則驚多飲小便數全文見瘡

診

心移寒于肺消者飲一溲二不治全文見胎病傳云王註云腎水消燥氣死所持

故飲一溲二也

仰寸口脉浮而遲浮即為虛遲即為勞虛則衛氣不足勞則榮氣竭跌陽脉浮而數浮則為氣數則消穀大便氣盛則溲數溲數則堅七數相搏即為消渴 跌陽脉數胃中有熱即消穀引飲大便必堅小便即數

胎前渴

葛根散治婦人妊娠胸膈煩燥唇口乾裂四肢壯熱食少

- 葛根
- 黃芩
- 人參
- 薤仁
- 黃芪
- 甘草
- 麥門冬

右各等分每服四錢加竹茹彈子大水煎服

人參黃芪散治妊娠身熱煩燥口乾少食四肢壯熱

人參 黃芪 葛根 麥門冬 知母 甘草

右改咀每服四錢薑三片淡竹葉十四片同水煎

治妊娠壅熱心神煩燥口乾渴逆

- 升麻
- 山梔
- 柴胡
- 扶神
- 瓜蒌根
- 黃芩
- 人參
- 麥門冬

右改咀每服四錢水煎服

知母散治妊娠煩悶口乾胞胎臃熱

- 知母
- 麥門冬
- 甘草
- 黃芪
- 赤茯苓
- 右改咀加竹茹同煎

產後渴

虛熱

雲竹葉湯治產後虛弱口渴

竹葉形三

甘草

人參

茯苓各一兩

生薑

半夏各三兩

麥門冬五兩

大棗十五個

右咬咀以水九升，先用生薑竹葉大棗煎取七升，去渣入棗煎取二升，每服五合，日三夜一。

玄胡索散治產後失血渴不止

欒金

乾葛

桂心

青皮

枳殼

玄胡索

右等分以好醋浸一宿，焙乾為末，每服二錢，陳皮湯調。

下日三夜

本治產後出血太多，虛煩發渴，用真正蒲黃末二錢，白湯調下，如渴燥甚，并花水下。

大治產後中風煩渴，用紅花子五合，微炒研碎，以水一升。

煎取七合，每匙頭呷下。

陳士良療血渴及產後渴疾，用蓮子心，生取為細末，米飲調下，二錢效。

保桃花散治產後不煩而渴

新石灰兩

黃丹五

右為細末，渴時用井水調下一錢。

口燥咽乾

垣飲食不節，勞倦所傷，以致脾胃虛弱，乃血所生病，主口中津液不行，故口乾咽乾，病人自以為渴，鑿以五苓散治之，反加渴燥，乃重竭津液，以致危凶，經云：虛則補其母，當於心與小腸中補之，乃脾胃之根蒂也，以甘溫之藥為之，主以苦寒為之，使以酸為之，臣佐以辛心苦緩急，食酸以收之，心火旺則肺金受邪，金虛則以酸補之，次以甘溫及

收之，心火旺則肺金受邪，金虛則以酸補之，次以甘溫及

甘寒之劑於脾胃中瀉心火之亢盛是治其本也

本黃芪湯治心中煩燥不生津液不思飲食

黃芪 熟地 白芍 五味

麥門 甘草 人參 天門

白茯苓

右咬咀每服三錢薑棗烏梅同煎去渣食後服

精五味子湯桑枝煎治口乾方見燥熱咽乾忌南星半

夏

連氣口燥舌乾皆為熱燥二氣然分言之有四

一曰熱經云歲火太過民病嗑乾又云少陰司天熱溽所

勝病胸中煩熱嗑乾治以寒劑是也

二曰燥經云金鬱之發嗑乾面塵冬云陽明在泉燥溽所

勝甚則嗑乾面塵治以溫劑是也

三曰上熱下燥經云少陰司天之政水火寒熱之氣時於

氣交民病嗑乾四之氣民病寒熱嗑乾是也

四曰上燥下熱經曰陽明司天之政四之氣民病嗑乾引

飲皆治以寒溫多少其制是也

素督脉生病嗑乾論空 黃疸 產後黃 金勞疳黃 黃汗

自黃 黑疸

丹五疸不要分同是濕熱如蠶麩相似 輕者小溫中丸

重者大溫中丸 熱多者加苓連 濕多者茵陳五苓

散加食積藥 濕熱因制胃氣服下藥大便下利者參芪

加茵陳山梔甘草

仲諸病黃家但利其小便假令脉浮當以汗解之宜桂枝

加黃芪湯穀疸之為病寒熱不食即頭眩心胸不安久

久發黃為穀疸茵陳蒿湯主之

黃疸病茵陳五苓散

主之二方並見傷寒

羅疾苓除濕湯治黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲冷身體面目俱黃小便不利不得安臥亦不思食

白茯苓五分

澤瀉三分

茵陳蒿六分

猪苓三分

黃芩生

黃連

山梔

防已

白朮

蒼朮

陳皮

青皮各二分

右咬咀水煎空心服

完顏正卿因官事勞役飲食不節心火乘脾氣虛弱更以悲怒氣逆傷肝心下痞滿四肢困倦身體麻木次傳身目俱黃微見青色顏黑心神悶亂怔忡不安兀兀欲吐口生惡味飲食不化時下完穀小便壅閉而赤黑辰巳之間發熱日暮則止至四月尤甚予診其脈浮而緩金匱云寸

口脈浮為風緩為痺非中風四肢苦煩脾色必黃熱熱已行跌陽脈益食穀即眩為傷脾風寒相搏穀氣不消胃中苦濁氣不流小便不通陰彼其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸茵陳梔子湯

茵陳錢

茯苓五分

山梔仁

蒼朮炒

白朮各三分

黃芩生六分

黃連

枳實炒

猪苓皮去

澤瀉

陳皮

防已各二分

青皮分

右咬咀作二服長流水煎食前溫服二服可愈山梔茵陳能瀉濕熱而退黃故以為君枳實苦寒泄心下痞滿肺主氣今熱傷其氣故身體麻木以黃芩苦寒瀉火補氣為臣二朮苦甘溫青皮苦辛溫能除胃中濕熱洩其壅滯養其正氣防已苦寒能去十二經滯濕澤瀉醜卑

茯苓猪苓甘平導膀胱中濕熱利小便而去癰閉

丹治疽脉虛便赤此後五方
腫者宜之

白木兩一

人參

猪苓

茵陳各五

澤瀉錢七

山梔炒

木通錢三

桂枝錢

一婦人年二十八歲發黃脉澁經水自來不行身體倦怠

未曾生子

陳皮

白木

木通各一
兩

黃芩

歸頭

丹皮各半
兩

甘草錢

分作十二貼水煎食前熱服

千治疽取小麥拌汁絞飲六七合晝夜飲三四次愈

仲諸疽用猪膏半斤亂髮如鷄子大三枚以髮入膏中煎

至髮盡分再服病自從小便中出

通腎疽湯治腎疽目黃渾身金色小便赤澁

升麻根兩

羌活錢

防風錢

獨活

白木

柴胡

蒼朮錢一

猪苓分

澤瀉分三

白茯苓

葛根錢半

甘草分三

黃柏分二

人參

神麴各六
分

分作二貼水煎食前稍熱服

仲桂枝加黃芪湯治黃疽脉浮而腹中和者宜汗之若腹

滿欲暈也懊憹而不和者宜吐之不宜汗

桂枝

白芍藥各三
兩

生薑兩三

大棗枚十二

黃芪兩二

右水煎熱服須臾飲熱粥以助藥力取微汗為度

更服

丹治一人年二十歲因勞又冒雨得疽脚痠心悸口苦力

弱尿黃脉浮而數病在表宜解外

黃芪三

白朮

蒼朮名一

陳皮

蘇葉

木通五

山梔炒

甘草稍

白水煎服下保和十五丸與煎抑青丸十九丸温中二十丸

法

仲麻黃醇酒湯治黃疸用麻黃三兩以好清酒五升煮取二升五合頓服盡冬月用酒煮春月用水煮酒疸頭無熱清言了腹滿欲吐鼻燥其脉浮者先吐之沉弦者先下之酒疸心中熱欲嘔者吐之愈如陰症欲吐者韓氏用陳皮湯理中湯類瓜蒂湯治諸黃用蒂二十七枚以水一升煮取五合去渣頓服

頓治疸取藜蘆置灰内炮之以變色搗為末水服半錢七小便不利數服

子和蔡氏一女病黃遍身浮腫面目如金色困乏無力不

法

思飲食惟喜食生物灰哉之屬先以苦劑蒸餅為丸吐痰一碗又以舟車丸通經散下五七行如黑汗更以道飲丸磨食散氣不數日安好如初李七老病漏水症面黃而喘二足皆腫按之陷而復起行則濯有聲常欲飲水不能睡臥戴人令上涌去痰而汗之次以舟車丸瀉川散下以益腎散復下之又以分陰陽利水道之劑復下之所苦皆痊

右脉浮而腹不和者吐之

仲治酒疸心中懊懣或熱痛梔子大黃湯主之

山梔十四枚

大黃二兩

枳實五枚

豆豉一升

右四味以水三升煎取二升温作三服

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之宜大黃硝石湯主之

大黃

黃柏

硝石各四

梔子十五枚

水煎將熟納硝石頓服

師曰病黃疸發熱煩喘胸滿口燥者以病發時以火劫其汗兩熱所得然黃皆從濕得之身盡發熱面黃肚熱在裡當上之

羅黃連散治黃疸大小便秘澀壅熱累效

黃連二兩

大黃醋拌炒二兩

甘草炙各二兩

右為極細末食後溫水調下二錢日三服先用芫蒂散

搗鼻取下黃水却服此藥芫蒂散見後雜方條

治黃疸皮黃眼睛赤金色小便赤取秦茺五兩牛乳三升煮取一升去查入芒硝一兩服之蕭烟云秦茺治酒疸

安嘉趙君玉病疸遍身發黃往問醫眾醫皆云乃陽

明症公等與麻知幾皆受訓於張戴人甚簡議吃大黃者

難與論病君玉不悅婦自揣無別病乃取二花神祐丸八十粒服之不動君玉乃自悟曰予之濕熱甚矣此藥尚不動以舟車丸瀉川散服之大下結糞一斗一夕而黃退君玉因此益信戴人之言

右脉沉而腹不和者下之

梨

仲諸黃腹痛而嘔者宜小柴胡湯方見傷寒

孫洽黃疸用柴胡一兩去苗甘草一分細剉作一劑以水

一碗白茅根一握同煎至七分去查不拘服

庚

諸疸小便不利為裏實宜利小便或汗之無汗為表實宜

發汗或吐之治法並見表裡疸條

仲男子黃太便自利當與虛勞小建中湯方見傷寒

寒熱

海內感傷寒勞役形骸飲食失節中州變寒病生黃非外感而得只用建中理中大建中足矣不必用茵陳也

仲治一婦人年六十歲病振寒戰慄足太陽寒水也呵欠噴嚏足少陽膽也口吐津液足陽明不足也心下急痛而痞手少陰受寒足少陰血滯也身熱又欲近火熱在皮膚寒在骨髓也腦下惡寒丹田有寒渾身黃及睛黃皆寒濕也餘症驗之知其為寒濕黃赤而黑又頻數者寒濕勝也病來身重如山便著床枕者陰濕盛也其脈右手關尺命門弦細按之洪而弦上急為寒加之細者北方寒水雜以緩其者濕盛出黃色脈洪大者心火受制也左手又按之至腎舉手來實者壬癸腎旺也六脈按之俱空虛者下焦無陽也用藥法先宜以輕劑去其寒濕兼退其洪大之脈以理中加茯苓湯投之按此症雖小便黃赤亦作寒治者蓋以餘症及脈別之也

人參

白朮

甘草

乾姜

茯苓各等

右煎熟以水冷與之此熱因寒用以假寒對足太陽之假熱以乾姜辛熱瀉勝脫之真氣故曰真對真假對假若不愈當以米附湯與之

屢矣

羅陰黃治驗至元丙寅六月時雨霖人多病濕疫直齋定韓君祥因勞役過度渴飲涼茶又食冷物遂病頭痛肢節亦疼身體沉重胸滿不食自以為外感用通聖散二服後添身體困其方命醫治之醫以白解散發其汗越四日以小柴胡湯二服後加煩燥又六日以三乙承氣湯下之燥渴尤甚又投白虎加人參湯柴胡飲之類病愈增又易醫用黃連解毒湯硃砂膏至寶丹十七日後病勢轉增傳變身目俱黃肢體沉重背惡寒皮膚冷心下痞硬按之則痛眼澁不欲開目睛不了了懶言語自汗小便利大便閉而不了命予治之診其脈緊細按之虛空兩寸脈短不及本

位此症得之因時熱而多飲冷加以寒涼藥過度助水乘心及木侮土先因其母後傳其子經云傳所不勝乘所勝也時值霖雨乃寒濕相合此謂陰症發黃予以茵陳附子乾姜湯主之經云寒濕於內治以甘熱佐以苦辛濕淫所勝平以苦熱以淡滲之以苦燥之附子乾姜辛甘大熱散其中寒故以為君半夏苳蔻辛熱白朮陳皮苦甘溫健脾燥濕故以為臣生姜辛溫以散之澤瀉甘平以滲之枳實苦微寒瀉其痞滿茵陳微苦寒其氣輕淨佐以姜附能去層膜間寒濕而退其黃故為佐使也煎服一劑前黃症減半兩服悉去又服理中湯數服氣得平復或難曰發黃皆以為熱今暑熱隆盛又以熱藥治之何也予曰理當然也成無已云陰症有二一者始外傷寒邪陰經受之或因食冷物傷太陰經也二者始得陽症以寒治之寒涼過度也

陽為陰也今君祥因天令暑熱冷物傷脾過服寒涼陰氣勝陽氣欲絕加以陰雨寒濕相合發而為黃也仲景所謂當於寒濕中求之李思順云解之而寒涼過劑瀉之而遂冠傷君正謂此也聖賢之制豈敢越哉

- 附子 炮去皮 三錢 乾姜 炮 二錢 茵陳 一錢 白朮 分 四
- 草薢 根 一錢 白茯苓 分 三 枳實 炒 一錢 半夏 製 一錢
- 澤瀉 各 半錢 橘紅 分 三

右生姜五片水煎去渣涼服

無養榮湯治五疸脚弱心松口淡耳響微寒發熱氣急小便白濁當作虛勞治之

- 黃芪 當歸 桂心 甘草 炙
- 陳皮 白朮 人參 各 一兩 白芍 三兩
- 熟地 五味 茯苓 各 三錢 遠志 去心 半兩

右每服四錢姜蜜煎空心服

右五法治虛寒黃疸

四治婦人久勞苦得面黃心悸口苦小便不黃自利食少右脉大於左此虛中受濕也

- 白米
- 芍藥
- 當歸各五錢
- 黃芪
- 黃芩
- 茯苓
- 人參各三錢
- 陳皮半錢
- 黃連一錢
- 甘草五分

分六貼下保和温中各二十九

垣補中湯治面黃多汗目昏赤四肢沉重減食腹中時痛咳嗽兩手左脉短右脉弦細兼虛右手關脉虛

- 升麻
- 柴胡各二錢
- 歸身二分
- 蒼朮五分
- 澤瀉四分
- 甘草八分
- 五味一分
- 黃芪二錢
- 神麴三分
- 紅花少許
- 大麥麵五分

右作二服水煎食前服

右二方治虛熱黃疸

仲黃疸小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱上除必也歲小半夏湯主之方見嘔吐小便色不變不可除熱者蓋中无熱故清白而不黃自无熱可除也諸疸小便色白不可除熱者無熱也若有虛寒症者當作虛勞治之 諸疸小便黃赤色者為濕熱治法並見表裡虛疸

嚴穀疸丸專治穀疸

- 苦參三兩
- 龍膽草兩
- 牛膽一个

右為末入牛膽汁加少蜜為丸空心姜湯或甘草湯下

葛根湯治酒疸

- 葛根兩
- 枳實炒
- 山梔
- 豆豉各一兩
- 甘草炙半兩

白水煎不拘時溫服

外治黃疸以柳枝入水濃煎汁服之

經患五般急黃以水調山豆根末二錢空心服之

運氣黃疸皆屬濕熱經云少陰司天之政四之氣溽暑至

民病黃疸又云厥陰司天之政四之氣溽暑濕熱相搏民

病黃疸而為肝腫是也

雜芳

羅疳鼻瓜蒂散治黃疸渾身如金色累效

瓜蒂散

母丁香錢

黍米九粒

赤小豆五分

右為細末每服臨臥時先含水一口却於兩鼻孔內

半字便睡至明且取下黃水便服黃連散病輕者五日

效重者半月效黃連散方見前大小閉條

聖治遍身如金色用瓜蒂四十九個須是六月六日收者

丁香四十九粒入甘鍋內燒烟盡為度研細小兒用半字

吹鼻內指牙大人用一字吹鼻內差

類要治黃疸用苦葫蘆瓢如大束許四枚以童便浸二兩

食頃取兩束許分納兩鼻中黃水自出效令病人吸之

又方治黃疸身眼皆如金色修合不可令婦人雞犬見之

取東引桃枝一握細切用水二鍾煎至半空心服服後三

五日其黃離如薄雲漸散唯眼最後痊百日方平復身

黃漸散後可時飲清酒一盞使眼中黃易散忌食熱麵猪

魚等物

針灸

針灸黃疸有二法

其一取脾經云脾足太陰之脈所生病者黃疸視盛虛寒

熱取之

其二取腎經云腎足少陰之脈所生病者黃疸視盛虛寒

熱取之

王黃疸 腕骨三分灸 中腕補

集黃疸發虛傷寒飲食過多六

腕骨分 湧泉三分灸 百勞 三里 中腕 膏肓

用黃疸善欠脇下滿欲吐脾俞主之千金云身重不可動 消渴身

熱面赤黃舍主之 消渴黃疸足一寒一熱意古縱煩滿

然谷主之 消瘴善喘氣走咽喉不能言手足清溺黃大

便難隘中腫痛唾血口中熱睡如膠太谿主之 黃疸熱

中善渴太衝主之 身黃時有微熱不嗜食膝內肉與前

痛少氣身重中封主之 黃疸身黃勞宮主之 嗜卧四

肢不欲動搖身黃灸手五里左取右右取左 黃疸刺脊

中千金云腹中滿不能食

素目黃者曰瘰 溺黃赤安卧者亦名黃疸

靈身痛而色微黃齒垢黃爪甲上黃疸也論疾疹尺篇

診

仲脈沉渴欲飲水小便不利者皆發黃 腹脹滿舌痿黃

躁不得睡屬黃家 跌陽脈緊而數則為熱也則消穀

緊則為寒食即為滿尺脈浮為傷腎 跌陽脈緊為傷脾

寒熱相搏食穀即眩穀氣不消胃中苦濁七氣下流小便

不通陰被其寒熱流膀胱身軀俱黃名曰穀疸 陽明病

脈遲者食難用飽七則發煩眩小便又難此欲作頭穀疸

雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也 心中懊懣而熱

不能食時欲吐名曰酒疸 病酒黃疸必小便不利其候

心中熱足下熱是其症也

脈酒疸黃色心下結熱而煩

仲額上黑微汗出手足中熱薄暮則發膀胱急小便自利

名曰女勞疸腹如冰狀不治治見 黃疸之病當以十八

日為期治之十日已上宜痊反劇為難治 疸而渴者難

治疸而不渴者可治發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而發熱脈凡黃家候其寸口脈近堂無脈口鼻冷並不可治

產後發黃

血虛 丹治一婦人四月內產發黃四肢倦怠食少經事不來時

發熱脈弦

白木兩

人參

秦艽

丹皮

生地

木通

柴胡

芍藥

川芎

黃芩

乾葛錢一

甘草

分十二貼水煎食前熱服

食勞疔黃

解補 一名黃胖夫黃疸者暴病也故仲景以十八日為期食勞黃者宿病也至有久不愈者故宜另立篇門

大溫中丸治黃胖 朱先生

香附 一斤童便浸春夏

三次

苦參 春夏二兩

一斤

芍藥 五兩

陳皮 三兩

山查 五兩

蒼朮 五兩

白朮

茯苓 各三兩

青皮 六兩

俱為細末醋糊丸如桐子面異筋骨露氣實者米飲下五六十九面肥白與氣虛羸弱者白朮湯下三四十九忌一切生冷油膩鷄鵝羊鴨生硬併糍粽難化之物服過七日後便覺手掌心涼口唇內有紅暈起調理半月愈

丈夫黃胖胃有宿積口淡脚痠氣急

針砂 淘炒淨醋煨

蒼朮

香附

三稜 各一分

陳皮

黃連

萊菔

人參各半 茯苓各半

右為末神麴醋糊丸每服五十九丸若飽入保和十九白湯下

又小温中丸治黃胖宜草野貧賤人服蓋其飲食无積但神陰燥湿而已

針砂一斤以醋炒為末入糯米砂極黃為末亦用一斤醋糊丸如桐子大每服米飲下四五十九丸忌口同下輕者服五兩重者不過七兩愈六十瘦面黃口苦而渴此食積生湿熱

白木半斤 連翹各一斤 羌活 通草

煎熟吞下穀疸丸保和丸各四十粒阿魏丸五粒

暖中丸治黃胖殺肝邪舒脾氣虛者不宜用

陳皮 蒼朮 厚朴製 三稜 大白木 青皮各五 香附斤 甘草二

針砂十斤 醋

右為末醋糊丸空心鹽姜湯下五十九丸晚食前酒下亦可忌狗肉

右五方附朴查青稜蓬以磨積針砂酸醋以浮肝白朮蒼朮以補脾重可去怯之劑唯温中丸無補性虛者勿用

世治黃胖綠礬六兩用米醋於鐵鍋內煮七次以乾為度置地上出火氣為末南星末一兩炒麩一兩大皂角二斤水煮熟揉出膿膠去皮查濾過再熬入菓子六兩蒸熟去皮核煎成濃膏搗勻和前藥末為丸如桐子大每服五丸早晚用姜湯各一服忌油膩煎煨如身上發紅斑時急煎薑湯服之斑自愈

本治男婦患食勞氣勞遍身黃腫欲變成水及久患瘰癧

小腸膀胱面自忽黃宜服紫金丹

膽礬三

黃蠟二

大棗五十

右以砂鍋或銀石器內用好醋三升先下礬三煨三火熬三半日取出三去皮核次下蠟二再煨三火熬三一二時如膏好入蠟茶二兩同和三丸如桐子大每服二三三十九丸茶酒任下如久患腸風痔漏陳米飲下日三服三一自見效三宗室趙彥材下血面如蠟不進食蓋酒病也授此方服之終劑血止面鮮潤食亦倍常新安一士人亦如是與三三百粒作三服立愈

羅惠礬丸治食勞黃目黃身黃

皂礬

不拘多少置砂鍋內燒三通三赤用米醋三煎三用木炭三

右為末三枣肉三丸每服二三三十九丸食後姜湯下三一方用白礬不用皂

世惠礬丸治黃胖

皂礬五兩

枣肉二兩

蒸粉三兩

右為末三生姜汁三丸每服二三三十九丸三下日三次米飲下三食前

右三方礬醋之酸以馮肝三患肉之甘以補脾三若虛黃於前三疳疔小便自利自汗虛勞瘧條下諸方三選用之

婦人年三十面黃脚瘦弱口苦喜茶月經不勻且多倦怠

黃芪三

白朮一

炒栢

秦艽二

甘草三

木通五

陳皮五

芍藥

人參各一

當歸一

蒼朮

川芎各二

一婦人六十面黃倦甚足痠口苦脉散而大此濕傷氣也

黃柏炒一 甘草炙五

分六貼水煎食前服

王官人瘡後面黃脚瘦弱倦怠食飽氣急頭旋

黃芪分二 蒼朮錢

白木半錢 木通分三

甘草炙二分 黃柏炒三分

厚朴製一分 陳皮一分

水煎服

成康五官面黃脚瘦無力食不化脉虛而少弦口苦肚脹

宜補之

蒼朮分半

木通分三

白朮

當歸分五

芍藥

陳皮分各五

甘草分二

川芎分五

白人參分三

水煎下保和丸四十粒

經治食氣遍身黃胖氣喘食不進心胸渴悶用不蛙皂角
去皮及子塗好醋炙令焦為末一錢巴豆七粒去油膜二

件以淡醋研好墨為丸如麻子大每服三丸食後陳皮湯
下日三服隔一日增一丸以利為度常服消酒食

子和一男子作贅偶病疽善食而瘦四肢不舉面黃無方
其婦翁欲棄之其女不肯婦翁乃農夫招婿意欲作勞見
其病甚每日詬辱之人教之餌蠟礬丸三稜丸俱不効戴
人見之不脛而廢使服漏劑去積痰宿水一斗又以泄水
丸通經散下四五十行不止戴人命飲水水下盞立止次
服平胃散間服檳榔丸五十粒七日黃退力生蓋黃疸之
症濕熱與宿穀故也俗謂之食勞黃

世喜喫乾茶

石膏

白芍藥

黃芩

水煎服更於積塊門茶瘰條相參用之

山酒楚黃用絲瓜連皮子燒灰因楚得病楚湯調下因酒

得病酒調下

黃汁

黃汗汗出，淡衣黃如稻汁是也。

仲問曰：黃汁之為病，身軀腫發熱，汗出而渴，狀如風水。汁治衣色正黃，如稻汁。脉沉，何從得之？師曰：以汗出時入水中浴，水從汗孔入，得之。宜芪桂酒湯主之。

黃芪

白芍藥 各五兩

桂枝 三兩

右三味以苦酒一升水七升相和者，取三升溫服一升。初發當心煩，服至六七日乃解。若心煩不止者，以苦酒其阻故也。酒代苦酒

黃汗之病，兩脛自冷，假令發熱，此屬歷節。食已汗出，又身常暮盜汗出者，此勞氣也。若汗出已反熱者，久其身必甲錯。若發熱不止者，必生惡瘡。若身重汗出已輒輕者，久

診

久身必憊，即胸前痛，腰上汗，腰下無汗，腰腹弛痛。如有物在皮中狀劇者，不能食，身疼重，煩躁，小便不利者，此為黃汗。桂枝加黃芪湯主之。表見本門

脉浮而洪浮，則為風洪，則為氣。風氣相搏，風強則為隱疹，身軀為痒，為泄。風久為痲，氣強則為水，難以俛仰。風氣相擊，身體洪腫，汗出乃愈。惡風則虛，此為風水。不惡風者，小便通利，上焦有寒，其口多涎，此為黃汗。

目黃

經云：目黃者曰黃疸，然亦有目黃而身不黃者，故宜別立篇門。

風

風氣自陽明入胃循脉而上，至目眚，其人肥，風氣不得外洩，則為熱中。而目黃。全文見河青龍散治風氣傳化，腹內疼結，而目黃，風氣不得泄為

熱中煩渴引飲

地黃 威灵仙 防風 荊芥穗

何首烏 去黑皮米泔浸一宿竹刀切各二兩

右為末每日三服食後沸湯調下二錢

類治黃疸目黃不除用瓜丁為細末如葶大納鼻中令病人深吸取鼻中黃水出愈

針灸目黃有五法

其一取心經曰心少陰之脈所生病者目黃腸痛

其二取心主經云心主手厥陰之脈是動則病面赤目黃

其三取小腸經云小腸手太陽之脈所生病者耳聾而目黃

其四取大腸經云大腸手陽明之脈所生病者目黃口乾

其五取膀胱經云膀胱足太陽之脈所生病者目黃淚出

其五取膀胱經云膀胱足太陽之脈所生病者目黃淚出
云 已上五法並視盛虛寒熱陷下取之

黑疸

黃疸久久變為黑疸身黃額黑或身面俱黃是也若身不

黃面黑於章門主之 針灸經云神門亦治疸

仲酒疸下之久久變為黑疸目青面黑心中如噉蒜齏狀

大便正黑皮膚爪之不仁其脈微弱雖黑微黃故知之

黃家日晡時發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急少腹

滿一身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如冰狀大

便黑或時澹此女勞之病非水也腹滿者難治硝石散主

硝石 礬石 燒各等分

右為細末，勻和以夫麥麩粥調服，方寸匕，日三服。病隨大小便下，小便去黃，大便去黑，是其候也。

聖治黑疽多死，宜急治。用土瓜根一斤，搗碎絞汁，六合頓服。當有黃水隨小便出，更服之。

面瘡然浮腫，脊痛不能正立，其色焔黑，多汗惡風者，屬風。治見諸風明

醫學綱目卷之二十一終

黑疽

其正邪相搏，發於背脊，大如之，相視主赤，其色焔黑，多汗惡風者，屬風。



