

八卷  
西曆  
廿二年

醫學綱目

卷一



醫學綱目卷之三十一

傷寒部



陽明病

胃實不大便

自汗

不得臥

潮熱

譫語

狂亂

循衣摸牀

渴

嘔

乾嘔

陽明長症胃家實

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實是也少陽陽明者發汗利小便胃中燥煩實大便難是也陽明之為病胃家實也問曰緣何得陽明病答曰太陽病發汗若下若利小便者此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明病也傷寒脈浮而緩手足自溫者是為繫在太陽太陽者身當發黃若小便利不能發黃至七八日大便艱者為陽明病也陽脈實因發其汗汗出多者亦為太過太過為陽絕於裏津液大便因艱也

中風中  
寒辨

陽明病若能食為中風不能食為中寒 陽明病但頭眩

忌攻

不思寒故能食而欬其人必咽痛若不欬者咽不痛也  
陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以  
其人本虛故攻其熱必噦也 陽明病脈遲食難用飽飽  
則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸下之腹滿如故所以  
然者脈遲故也 陽明病欲解時從申至戌止 傷寒嘔

多雖有陽明症不可攻也 陽明病面合赤色不可攻之

攻之必發色黃小便不利也 陽明病心下鞭滿者不可

攻之攻之利遂不止者死利止者愈

胃實有  
表者先  
解表

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者  
知不在裏仍在表也須當發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯  
陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯 陽明  
病脇下鞭滿大便不利而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯

脇痛脈  
和浮弦宜

若上焦得通津液得下胃氣因和身濈然汗出而解  
陽明中風脈弦浮大而短氣腹滿脇下及心痛久按之氣  
不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱  
時以熾耳前後腫刺之少瘥外不解病過十日脈續浮者  
與小柴胡湯脈但浮無餘症者與麻黃湯若不小便腹滿  
加噦者不治

口苦脈  
和浮弦宜

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下  
之則腹滿小便難也 許孝上云宜小柴胡湯 陽明腹滿脈浮紫口  
苦咽乾而喘者發熱汗出不惡寒反惡熱身重者忌發汗  
忌加燒針忌下也 論見自汗 陽明病脈浮而緊者必潮熱發  
作有時但浮者必盜汗出

右胃家實不大便雖三代之童亦知可下也殊不知仲  
景之法雖有胃實症若表未解及有半表者亦先用桂

胃實表  
解無症  
者忌攻  
大便硬  
者導之

枝柴胡以解外然後視虛實消息之也

陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖硬不可攻之當須自飲大便時宜用蜜煎導而通之若土瓜根及入猪膽汁皆可導之

蜜煎導法

用蜜七合入銅器中微火熬稍凝似飴狀攪之勿令焦候可丸以手捩作挺子令頭銳大如指長二寸許垂熟急作之納穀道中用手急捺住欲大便時乃去之又猪膽汁方用大猪膽一箇瀉汁和醋少許和勻灌入穀道中如飯時頃大便自去

便硬無  
所苦者  
俟之

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必鞭不更衣十日無所苦

胃實表  
解有証  
者隨証  
攻之

也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓散陽明病本自汗出醫更重發汗病已瘥尚微煩不了了者此大便必鞭故也以上津液胃中乾燥故令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今為小便數少以津液竭還入胃中故知不久必大便也

陽明病潮熱不大便六七日恐有燥糞欲知之法少與小承氣湯轉矢氣者無燥屎可攻若不轉矢氣者無燥糞不可攻

潮熱論見 陽明病汗出大便鞭而譫語者宜小承氣湯方見 不未便腹滿者宜下之若但逆膈痛者則為燥

尿宜承氣湯若從心下至不腹滿痛者則為結胸宜陷胸湯方見 陽明病不吐不下心煩者宜調胃承氣湯 陽明病發熱汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗

汗劑頸而還小便不利渴飲水漿者此為痲熱在裏身必發黃因陳湯主之 小便不利大便作難在內有數物喘胃不臥者宜大承氣湯論見不 陽明症其人喜忘者必有畜血所以然者本有之瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑宜抵當湯下之畜血見 無妄裏症下後脈數不解消穀易飢六七日不大便者有瘀血宜抵當湯 傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯 跌陽脈浮而濇浮則氣強濇則小便數浮濇相搏大便難其脘為約麻仁丸主之

麻仁丸丹溪云氣實而表藥也

杏仁升

芍藥

厚朴去皮

枳實碎四

杏仁

大黃煨各八兩

右為末蜜和丸如桐子大米飲下二三十九未和益之每日三服

陽明口燥但欲漱水不欲嚥者此必血暍活人云輕則犀角湯重則抵當湯 許學士有士人家病二人皆旬日矣一則身熱無汗大便不通小便如澁神昏而睡診其脈長大而實予用承氣下之而愈一則陽明自汗大便不通小便利津液少口乾燥其脈亦大而虛作蜜煎三易之下燥糞得溏利而解其家曰昔陽明不通何以治之異予曰二症雖相似然自汗小便利者不可瀉滌五臟為無津液也然則傷寒太症相似兩症稍有不同宜仔細斟酌正如格局看命雖年月日時皆同而貴賤窮通不相侔者於一時之中有淺深故知不可不謹

陽明病發多反無汗其身如虫行皮中狀者此久虛故也

漱水不  
燕者  
胃實脈  
下  
實者宜

脈虛者  
宜導

胃實反  
死汗者

虛邪

陽明病反無汗而小便利三日嘔而欬手足厥者必頭

痛若不欬嘔手足不厥者頭不痛註云小便利者寒邪內攻厥厥頭痛安邪外攻

也陽明胃失脈浮無汗而喘宜麻黃湯論見胃實有表條陽

明病無汗小便利心中懊懣者身必發黃宜茵陳蒿湯

脈浮而數能食不大便者此為實名曰陽結也期十七日

當劇陽結脈沉而遲不能食身體重大便鞭名曰陰結也期十四日

當劇陰結少陰病但欲寐腹脹不大便者承氣湯主之論見但欲寐

胃實續法

針灸 傷寒大便不通 期門章門 照海

陰症 海已寒丸治陰症服四逆數日不大便躁渴者方見躁條

自汗

成自汗者謂不因發散而自汗出也

問曰陽明外症云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

問曰病有得之一日不發熱而惡寒何也答曰雖得之一日

惡寒將自能即汗出而惡熱也問曰惡寒何故自罷

答曰陽明居中土萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日即

止此為陽明病也 傷寒轉屬陽明者其人濺然微汗出

也

下證 太陽初得病時發其汗先出不微因轉屬陽明也 汗

出身熱不惡寒便鞭證者宜承氣湯論見諸證

陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯

急下證 已有入患傷寒目痛鼻乾不得臥大便不通尺寸脈俱大

已數日一汗出謂速以大柴胡湯下之醫駭曰陽明

自汗津液已涸法當用蜜煎何須苦用下藥予謂曰子雖

陽明外 證自汗 不自汗不 惡寒

下證

急下證

知蜜煎為穩當選用大柴胡湯此仲景不傳之妙公安能知之乎加爭竟投大柴胡湯二貼愈仲景論陽明之病多汗者急下之人多謂已是自汗若又下之豈不表裏俱虛又如論少陰云少陰病下利口乾燥者急下之人多謂病發於陰得之曰淺但見乾燥若更下之豈不陰氣愈甚舉此二端則其可疑者不可勝數此仲景之聖世人罕能讀也予謂仲景稱急下之者亦猶急當救表急當救裏之說凡稱急者有三變謂總蒼下未至津液乾燥便速下之則為精捷免致用蜜煎也若胃中藏得下之自無可疑若未能了慢用之又不若蜜煎之為穩也

和解症 陽明脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重者發汗則心憤憤反譫語若加燒針必體惕燥不得眠若下則胃中空虛客氣動膈心中懊懷舌上胎者

梔子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

脈浮發熱口苦者邪在表脈緊自汗腹滿不惡寒者邪在裏此表裏俱有邪宜和解

陽明欲食小使反不利大便自調其人骨節疼翕翕如有坑狀奄然發在濇然汗出而解此水不勝穀氣與汗共并脈緊則愈

不飲食者瀉腹 陽明病若中寒不能食小使不利手足濇然汗出此欲作瘰癧必大便初鞭後溏所以然者以胃中冷水穀不別故也

似陽明二症 太陽病發熱汗出不惡寒者為柔症

論見 太陽病吐後汗出不惡寒發熱閉上脈細數曰小逆

論見 汗出身熱不惡寒裏症前條陽明病是也

汗出身熱惡寒者宜桂枝湯論見 兼項強痛者桂枝加葛根湯見

傷表不更  
惡寒屬  
裏

兼骨節煩疼不得屈伸小便不利者甘草附子湯論

熱係身 若發汗後遂漏不止惡風者桂枝附子湯論見

汗出渴  
不渴  
汗出心  
痞有二  
症

加人參湯主之方論見  
傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之  
汗出心下痞滿有二症其痞按之濡軟不痛而惡寒者宜  
附子瀉心湯其痞按之鞭引脇痛而身體不惡寒者宜十  
惠湯方論見

汗後汗  
不徹

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢急難以屈  
伸者桂枝加附子湯主之

桂枝附子湯

附子一

桂枝去破

生姜一兩

甘草一

大棗六

右咬咀每服五錢水煎溫服

許有一人得太陽症因發汗汗不止惡風小便濇足攣而  
不伸予診其脈浮而大浮為風大為虛予曰在仲景方中  
有兩症大同而小異一則小便難一則小便數用藥少差  
即有千里之失仲景第七症云太陽發汗遂漏不止其人  
惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯第十  
六症云傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反  
以桂枝湯攻表此誤也得之便數咽中乾煩燥吐逆一則  
漏風小便難一則自汗小便數或惡風或惡寒病各不同  
也予用第七症桂枝加附子湯三啜而汗止佐以甘草芍  
藥湯足便得伸

二陽併病太陽病發汗不徹因轉屬陽明續自微汗出不  
惡寒其以面赤燥煩短氣不知痛處但坐更發汗則愈論

風溫症 赤而 發汗已身灼熱者名風溫風溫為病脈浮汗出身重多眠

宜葳蕤湯論見風溫

胃乾 發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少少與

之論見不 動氣在左發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤此為逆難治法

見後 續條 汗下後汗出而喘者麻黃杏仁甘草石膏湯 下後利不

喘汗出而 正脈促喘而汗出者葛根黃芩黃連湯論見喘

利汗出下 汗出下利熱不去厥逆惡寒者四逆湯

下利清穀者通脈四逆湯論俱見 汗出下利有微熱者

其脈數自愈脈緊未愈論見下利 六七日後發熱而利其人

汗出不止者死論見下利

脈緊反汗出而咽痛吐利者少陰病亡陽吐利汗出手

足厥冷脈微欲絕者四逆湯吐利止汗出而厥脈微欲

絕者通脈四逆加猪膽汁湯方論並見吐利

脈陽微而汗出者為自和也汗出多者為太過陽明汗

多而渴者不可與猪苓湯脈浮自汗若小便數脚攣急

者不可與桂枝湯

目汗續法

陰陽 太陽自汗桂枝湯 陽明自汗白虎湯 少陰自汗四

逆湯

陽明症身熱目痛鼻乾不得臥不惡寒而自汗或惡熱而

尺寸俱浮者白虎湯主之傷寒尺寸脈俱長自汗大出

身表如冰石脈傳至于裏細而小及瘧疾但寒不熱其人

動作如故此陽明傳入少陰戊合癸即夫傳婦也白虎加

桂枝主之然脈雖細小當以遲疾別之此症脈疾而非遲故月此法自虎加桂枝湯方見癰如中汗暑自汗微惡寒者亦宜服之  
汗傷寒應發汗而動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗出筋惕肉瞤此為逆難治先服防風白朮牡蠣散次服建中湯

防風白朮牡蠣散治發汗多頭眩汗出筋惕肉瞤

防風

牡蠣炒成

白朮各等分

右為細末每服二錢以酒調下米飲亦得日二三服汗止後服小建中湯

或汗出髮潤與其出如油或大如貫珠着身出而不流皆為不治之症

針灸手足汗分寒熱傷寒汗多不止內庭瀉 合谷瀉 復溜瀉 陽明病短氣腹

滿而手足濇然汗出者俱宜大承氣湯方論見朝熱 陽明病不能食小使不利手足濇然汗出者胃冷欲作痼瘕必大便初鞭後溏論見自汗

陽明裏

身熱目疼鼻乾不得臥尺寸脈俱長者陽明受病也病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘胃不能臥者有燥屎也宜大承氣湯 汗後大汗出煩躁不得眠欲飲水者少少與之愈論見渴 汗下後不得眠若反覆顛倒心中懊憹者梔子豉湯方論見煩 若但晝不得眠夜安靜不嘔不渴無表症脈沉微無大熱者宜乾薑附子湯論見煩燥 少陰病欲寐二三日後煩心不得臥者黃連阿膠湯主之

黃連阿膠湯

醫學綱目卷三

黃連 阿膠各一 黃芩五錢 芍藥兩

雞子筒

右咬咀水二斗煎取五分去渣納膠消盡又納雞子黃攪勻溫服日三

少陰病下利欲寐六七日後咳而嘔渴心煩不得眠者宜猪苓湯論見下利少陰病但欲寐脈沉細不煩五六日變自利煩躁不寐者死論見下利發熱下利厥逆煩躁不得臥者死論見下利

不得臥續法

傷寒吐下後心煩之氣日夜不得眠者酸棗仁湯主之

酸棗仁湯

酸棗仁升 麥門冬去心 甘草炙 知母半 茯苓 川芎 乾薑各一兩

右咬咀每服四錢水煎服

傷寒大熱乾嘔呻吟錯語不得眠者黃連解毒湯主之

黃連 黃芩 黃柏各半 山梔二錢

一方有阿膠二錢

右咬咀每服五錢水煎服如未愈再服進粥以此漸瘥

傷寒瘥後虛煩不得眠心中懊憹者烏梅湯主之

梔子炒半兩 烏梅去核四箇 黃芩 甘草多各半兩

柴胡一兩

右咬咀每服四錢薑三片豉五十粒煎至七分去渣溫服一本有竹葉七片

潮熱

表裏 潮熱者若潮水之潮其來不失時也一日一發指時而發者謂之潮熱若日三五發者是即發熱非潮熱也潮熱



陽明中風脈弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾不得汗  
嗜臥身黃小便難時時噦而潮熱者小柴胡加枳芍主之  
傷寒十三日不解胃腸滿而嘔日晡時發潮熱已而微  
利此必柴胡症下之而不得利今反利者知醫以丸藥下  
之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴  
胡加芒硝湯主之

柴胡一兩

黃芩

人參

甘草炙

生姜

已上各五錢

半夏湯浸三箇

大棗三枚

芒硝兩一

每服五錢水一盞半煎至八分去渣納芒硝更微沸温服

陽明病脈浮緊者心潮熱發作有時論見胃實有表條

潮熱續法

活冬月陽明朝熱脈浮而緊者發作有時但脈溢者必盜

熱

診

陽明宜下症

汗黃芩湯主之方見下利

譫語

陽明為病胃家實是也胃實則譫語故譫語宜入陽明門  
陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承  
氣湯一盞腹中轉矢氣者更服一盞若不轉矢氣勿更與  
之明白不大便脈反微澁者裏虛也為難治不可更與承  
氣湯陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎  
五六枚若能食者但軛亦宜大承氣湯下之一陽併病  
太陽病罷但發熱手足熱漿汗出大便難而譫語者下之  
則愈宜大承氣湯陽明病其人多汗以津液出胃中燥  
大便必軛軛則譫語小承氣湯主之若下服譫語止勿更  
服

實則譫

汗出譫語者必有燥糞在胃中此為風也須下之必過經

語虛則

乃可下下之若早語言必亂以表虛裏實故下之則愈宜

大承氣湯夫實則譫語虛則鄭聲鄭聲者謂亂語無次第

鄭重頓煩也只將一句舊言重疊頓言之終日殷勤不換

他聲也蓋神有餘則能機變而亂語數數更端神不足則

無機變而只傷寒四五日脈沉而喘滿沉為在裏而反

發其汗津液越出大便為難表虛裏實反則譫語謂鄭聲

為鄭聲之非非

少陽病發汗後及小便數脚攣急誤與桂枝攻表後若胃

不和譫語者少與調胃承氣湯方論三陽合病腹滿身

重難以轉側身不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之

則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之論見

汗發多亡陽譫語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以

通津液後自愈發汗多又重發汗者亡其陽譫語脈短者

死脈自和者不死 諸逆發汗病微者瘥劇者言亂目眩

汗後語

陽忌下

者死命將難全

形似傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴被火者必譫語發

熱脈浮解之當汗出愈

太陽病大劫汗後身黃小便難身體枯燥頭汗腹滿微喘

或不大便支則譫語論見頭汗

太陽病一日反嘔凡灸其背而大汗出太熱入胃中渴

燥煩必發譫語十餘日振慄即下利者此為欲解也故莫

汗從腰已下不得汗欲小便不得反嘔欲失溲足下惡風

大便硬小便當數而反不數反多大便已頭卓然而痛其

人足心必熱穀氣不流故也

少陰病嗽而下利譫語小便難者被火氣劫汗故也論見

吐下汗溫汗後譫語柴胡証罷此為壞病知犯何逆以法

治之論見

壞病

胸滿譫語若下後煩驚小便不利身重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯

若婦人發熱經水來身涼者刺期門

陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗出刺期門隨其實而溲之倏然汗出則愈。腹滿譫語脈浮緊者刺期門。太陽少陽併病發汗則譫語脈弦五六日譫語不止者刺期門。

婦人發熱經水適來譫語為熱入血室若熱除脈逆者身涼脇滿如結胸狀者刺期門也。若書則明。暮則譫語者無犯胃氣及上焦必自愈活人以小柴胡湯主之也。傷寒傷寒十三日不解過經譫語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當硬而反下利脈調和者醫以丸藥下之非其治也。若首下利者脈者微厥今反和者此為內實也。

調胃承氣湯主之。下利譫語者若有燥屎也宜小承氣湯

右下利譫語景曰脈調和而手足反和小便利者陽也

故用承氣下之其脈當微厥反少陰但欲寐被火氣却

汗譫語小便難者陰也當用補劑和之。但欲寐下利譫語

許學士云有人病傷寒下利身熱神昏多悶譫語不得眠

或者見下利便以譫語為陰虛証予曰比小承氣証中發

曰下利不眠小承氣仲景之法乎予曰此仲景之法也仲

景云下利而譫語者有燥屎也屬小承氣湯而得解嘗讀

素問云微者發之甚者逆之逆者正治發者反治從少從

多觀其事也帝曰何謂反治岐伯曰塞因塞用通因通用

王水註曰太熱內結注溲不止熱宜寒療結腹消除以寒

下之結散利止則通因通用也正合於此

直視讖語喘滿死下利者亦死 讖語妄言身微熱脈浮

大手足温者生逆冷脉沉細者不過三日死矣

識語續法

虛

**察註** 識語者氣虛獨言也全文註。愚用參芪木扁等藥治識語得愈者將百千數豈可不少。虛寒一例用黃連解毒湯大小承氣治識語。若脉傷者見鬼仲景所謂下陽識語亦此義。

**海** 黃芪湯治傷寒或時喜笑或時悲哭或時太息或語言錯亂失志無疑作識語狂言者非也神不守舍其兩手脉浮沉不一舉按全無力浮之損小沉之亦損小皆陰脉也甚者用調中九二方並見發熱下

**丹** 浦江鄭兄年廿餘九月發熱頭痛妄言見鬼醫與小柴胡十餘貼熱愈甚予視其形肥面赤帶白却露筋骨診其脉弦大而數實脉不本寒涼藥所致此因勞倦成病與温補藥自安遂以人參白朮為君茯苓芍藥為臣黃芪為佐

附子一片為使與二貼而症不減或曰脉既數大狂熱而又大渴用附子誤矣予曰此虛症而誤投寒涼之藥入肥而脈左大於右事急矣非加附子參朮焉能有急效再與一貼乃去附子作大劑與服至五十貼得大汗而愈自後又補養兩月氣體方始平復 一人五月內患識語大發熱肢體不能舉喜寒飲診其脈洪大而數用黃芪茯苓濃煎如膏却用涼水調與之二四服後病者昏睡如死狀但顏色不改氣息如常至次早方醒諸症悉退而安 虛元汗後再發熱妄言昏倦汗後熱不退亦妄言陶明節熱退後不識人言語謾妄皆用參芪木扁等補劑而愈信哉 識語屬虛者十居八九

**活** 大小便鞭手足冷脈微細者必鄭聲也當服温藥白通湯海藏用黃芪加乾薑湯方見傷寒發熱下 候輔之脈極沉細

便利肢脈微

寒熱

候輔之脈極沉細

謔語

外熱內寒肩背胸脇出十數點謔言狂亂或曰發斑謔語非熱乎予曰非也陽為陰逼上入于肺傳之皮毛故斑出神不守舍故錯語如狂非謔語也肌表雖熱以手按之須臾冷透如水與薑附等藥數日約二十餘兩得大汗而愈後因再發脈又沉遲三四日不大便與理中丸三四日內約半斤其病全愈以此知侯公之狂非陽狂之狂乃失神之狂即陰虛也

便秘手足溫脈為熱

治便秘小便赤手足溫脈洪數者必謔語也宜用調胃承氣湯

治老幼及虛人傷寒五六日昏冒言妄小便或淋或澀起臥無度或煩而不得眠並宜白虎湯加山梔一錢  
治熱病及時疫心躁狂亂奔走狀似癩癩言謔不定久不得汗及時疫不知人事者以人中黃不拘多少入襠內

用泥封固武火煨半日去火候冷取出於地上以盆蓋半日許研細如麪新汲水調下三錢或未退再服愈人中黃即尿也

狂亂

火劫汗後亡陽心驚狂起臥不安丹桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯方論見驚汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰痛與禹餘糧丸方見

下症 小腹痛發狂或身黃者宜抵當湯論見發熱方見畜血遺尿狂言目反直視者此為腎絕論見大法

狂亂續法

病人煩躁狂走妄言面赤咽痛脈實潮熱狂語如見鬼狀此陽毒也治陽毒法見陽毒門表者陽毒升麻湯黑奴丸裏者大黃散本治傷寒發狂棄衣奔走踰牆上屋鵲石散

黃連

寒水石各等分

狂而脈實者為實熱

右為細末每服二錢濃煎甘草湯候冷調下  
雲傷寒心風狂妄者宜防風黃連湯

黃連

大黃

防風

遠志

茯神各半

右為細末每服一兩水煎服

海黃芪湯治傷寒或歌或笑或悲哭謔言妄語方見發熱下

狂而脈虛者為

陳志仁傷寒狂妄每欲狂走四五人扶捉不定脈虛數用柴胡湯反劇以參芪歸木甘草陳皮煎湯一服狂定再服

安睡

針灸

傷寒發熱不識尊卑 曲池 絕骨 百勞 湧泉

甲熱汗不出狂互引癲疾合谷主之

傷寒若狂若下後不解不大便五六日至十餘日且日晡所

發潮熱不惡寒狂語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脈弦者生瀉者死微者但發熱謔語者大承氣湯主之若一服利止後服 太陽病以水劫發汗除陽枯竭虛燥或不大便久則謔語甚者去歲手足躁擾捻衣摸牀小便利者可治

証有入病傷寒大便不利日晡發潮熱循衣縫兩手撮空直視喘急更數驚矣見之皆走此誠惡候得之者十中九死仲景雖有症而無法但云脈弦者生瀉者死已經吐下難以下藥謾且救之若大便秘通而脈弦者庶可治也與小承氣湯一服而大便秘諸疾漸退脈且微弦半月愈或問曰下之而脈弦者生此何意也予曰金匱玉函云循衣妄撮牀惕不安微喘直視脈弦者生瀉者死微者但發熱謔語者承氣湯主之予嘗觀錢仲陽小兒直訣云手尋

衣領及捻物者肝熱也此症在玉函列於陽明部蓋陽明者胃也既有熱邪滯于胃經故以承氣瀉之且得弦脈則肝平而胃不受克此所謂有生之理讀神景論不能得通諸醫書以發明其隱奧吾未之見也海截云許季士作尋未疾此論誠當然莫若以爲肺熱之邪其人也矣矣言問語唯經云肺邪入心爲譫語

循衣摸牀續法

虛嘗治循衣摸牀者數人皆用大補氣血之劑惟一人兼瞶振脈代遂於補劑中累加桂二分亦振止脈和而愈

渴

病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也論見不服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎人參湯主之渴欲飲水無表証者大陽症罷轉屬陽明故渴也服桂枝

渴不惡寒者

湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯主之

傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱

時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人

參湯主之王註云若純在表則惡風無時今表裏有熱故時時惡風也傷寒無大熱

口燥渴心煩脈微惡寒者宜白虎加人參湯陽明病脈

浮緊口苦腹滿而喘若下後渴欲飲水口乾舌燥者白虎

人參湯主之

白虎加人參湯

石膏碎四知母半甘草一粳米合

右咬咀每服五錢水煎溫服

右白虎加人參五條治表渴脈洪小便利者

本有入初病嘔吐俄爲醫者下之已七八日而內外發熱

予診之曰當用白虎加人參湯或曰既吐復下且重虛矣  
 白虎可用乎予曰仲景云若吐下後七八日不解熱結在  
 裏表裏俱熱者白虎加人參湯正相當也蓋始吐者熱在  
 胃腕而脈至今虛大三投湯而愈仲景既云傷寒若吐下  
 後七八日不解表裏俱熱者白虎加人參湯主之又云傷  
 寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎又云脈浮滑此  
 以表有熱裏有寒白虎加人參湯主之 國朝林億校正  
 謂張仲景於此表裏自差矣予謂不然大抵白虎能除傷  
 寒中渴表裏發熱故前後二症或云表裏俱熱或云表熱  
 裏寒皆可服之 一種脈浮無汗其表不解全是麻黃與葛  
 根症安可行白虎也林億見所稱表裏不向便謂之差是  
 亦不思之過也  
 太陽發熱不惡寒而渴者為溫病論見溫病治人歲幾湯  
 主之發按不惡寒者以

而有六表解也太陽病者必頭痛身疼  
 表未解也此表裏兩症皆兼見  
 渴而下利屬少陰其病但兼欲寐小便白者四逆湯兼咳  
 嘔不得眠小便不利者猪苓湯兼自利純青色水者大承  
 氣湯有熱者白頭翁湯方論見

消渴吐  
 既者厥  
 陰忌下

小便不  
 利而渴  
 者太陽

消渴氣上衝心 心痰飢不欲食 食則吐 吐若下之則利不  
 止若欲飲水者少少與之愈論見氣  
 土衝心  
 太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者  
 少少與之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者  
 五苓散主之 發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之  
 陽明病脈浮緊口苦腹滿發熱汗出不惡寒若下後脈浮  
 發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之  
 五苓散方

猪苓 二兩 去皮

澤瀉 兩一

白朮 兩三

茯苓 二兩 去皮

桂枝去皮半兩

右吡咀為散每服三錢白湯調下海藏云五苓散當服而不調胃承氣症不當

形亡必就陽明燥火成胃發黃故有調胃承氣症不當服而服之是為犯本小便強利津液重亡而成血症輕則挑仁承氣湯重則抵當湯主之

猪苓湯方

猪苓去皮

茯苓

可膠

澤瀉

滑石各兩

右吡咀每服五錢水煎溫服日三

頭汗者

渴而頭汗小便不利兼胸滿往來寒熱者柴胡桂枝乾薑湯兼發黃者茵陳蒿湯論見

咳喘者

表不解心下有水氣乾嘔發熱咳嗽而渴者小青龍湯去半夏加瓜蒌根湯論見

身熱者

夏月汗出惡寒身熱足冷而渴者為中暑白虎加入參湯

反酒黃連主之

方見中暑惡寒身熱者症似表也足冷者不可裏

發熱惡寒腹滿汗出小便利而渴者為肝乘脾刺期門論

渴而胸滿及往來寒熱其症未經汗者小柴胡去半夏加

渴而心

人參瓜蒌湯若汗下後者柴胡桂枝乾薑湯

渴而心下顛痛日晡潮熱不大便者為結胃宜大陷胃湯

若但鞭不痛者為痞與瀉心湯不解反渴而小便不利者

宜五苓散詳見結胃痞氣二門

病在陽明應汗之反以冷水巽之灌之其熱益煩肉上粟

起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不瘥與五苓湯

文蛤散方

文蛤一兩即海蛤粉也河間

右一味為散沸湯調服方寸匕

渴欲飲水而不能飲者丹田有熱胃中有寒論見

渴飲  
水逆  
者五苓  
渴欲飲  
水者小  
少與之

中風發熱六七日不解而煩有表裏症渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之

渴欲飲水若太陽發汗後大汗出煩躁不得眠者及厥陰病氣起衝心心疼吐酸者少與之愈論見前條及氣上衝凡得

時氣病至五六日而渴欲飲水不能多不當與之何者以腹中熱尚少不能消之更與水作病也至七八日大渴欲

飲水者猶當依症與之與之常令不足勿極意也言能飲一斗與五升若飲而腹滿小便不利若喘若噦不可與之

忽然大汗出是為自愈也活人云凡病非木渴不可飲水若小渴咽乾者少少咽潤之令

凡得病反能飲水此欲愈也但聞病飲水自愈小渴者亦強與之飲因成其禍不可復救活人云強飲水致飲停心下滿結喘者當以五苓散或開胃湯生之下痢脈弱脈數而渴者自愈論見下利渴而發熱

宜禁

其脈不弦緊而浮弱者汗出愈

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥與猪苓湯復利其小便故也

右活人云切成太陽症無汗而渴者不可與白虎湯陽明症汗多而渴者不可與猪苓湯然太陽渴終不可與

白虎耶太陽症得汗後脈洪大而渴者左可與之也陽明渴終不可與五苓散耶陽明症小便不利汗少脈浮

而渴者方可與之也

渴續法

羅傷寒食少而渴者當以和胃之藥止之不可用涼藥止之恐復損胃氣愈不能食也白朮茯苓是也

海秦二母病太陰病三日不解後嘔逆惡心而脈不浮與之半硫丸二三服不止復與黃芪建中湯脈中極緊無表

虛而食  
少者和  
胃忌家  
渴脈極  
緊未浮  
宜溫

裏病胃中大熱發渴引飲皆曰陽症欲飲之水予反與薑  
附等藥緊脈反沉細陽猶未定以桂附薑烏之類酒丸與  
百九接之二日中十餘服病人身熱煩躁不寧欲作汗也  
又以前丸接之覆以厚衣陽脈方出而作大汗翌日大小  
便始通下瘀血一盆如猪肝然用胃風湯加桂附三服血  
止其寒甚如此亦世之未見也

少陰症口渴舌乾而渴尺寸脈俱沉沉遲則四逆湯沉疾  
則大承氣湯少陰口渴舌乾而渴身表涼脈沉細而虛  
者瀉心湯主之此有形無形藥也  
人參湯治傷寒七八日汗後心煩燥渴

山梔 黃芩 柴胡 葛根各一  
甘草各半兩  
右為釐末每服五錢薑蔥煎溫服

陽毒風 治陽毒倍常燥盛大渴者黑奴丸主之方見 風溫加渴  
溫中胃 甚者宜瓜蒌湯方見 中暑伏熱累治不瘥其人發渴不  
渴治法 已酒蒸黃連丸主之方見 中暑

脈熱病在腎令人渴口乾舌焦黃赤晝夜欲飲水不止腹  
大而脹尚不厭飲目無精光者死不治

嘔不能食者轉屬陽明 傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濇濇然者是轉屬陽  
明也 食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇

者屬上焦也 腹痛欲嘔吐者黃連湯主之方論見 嘔而發熱者小柴胡湯主之 發熱微惡寒肢節煩疼微  
嘔心下支結外症未去者柴胡加桂枝湯主之論見 太陽

陽病發熱惡寒身體痛嘔逆脈緊者名曰傷寒麻黃湯症  
太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯

發熱見 太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯

主之活人云頭身熱痛飢熱目疼鼻乾脈浮而長是也  
葛根加半夏湯

葛根二錢

麻黃

生薑各半

甘草

芍藥

桂枝各一錢

半夏二錢

大棗二枚

右咬咀以水一斗先煎葛根麻黃減二升去白沫納諸藥煎取三升溫服一升覆取微汗

嘔而寒熱脇痛

嘔而往來寒熱胸脇苦滿者宜小柴胡若兼下利者乃太陽少陽合病宜黃芩加半夏生薑湯論見往未寒熱及下利

嘔而微煩

太陽過經十餘日反二三下之後四五日柴胡症仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與

大柴胡湯下之愈太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而心中痛大便反溇腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣湯若不滿者不可與但欲嘔胸中痛微溇

者此非柴胡症以嘔故知極吐下也

本渴而飲水嘔者柴胡不中與也論見脇痛

先渴却嘔者為水停心下此屬飲家活人云赤茯苓湯主之

却渴者此為欲解候也金匱云嘔思與之

嘔而下利有寒熱者為陽宜黃芩湯大柴胡湯無熱者為

陰宜猪苓湯直武湯並見嘔利門

嘔而脈弱小便利身熱見厥者難治四逆湯主之

嘔而心煩若汗吐下後者梔子生薑豉湯若未曾吐汗下

後兼欬而渴者宜猪苓湯詳見不

嘔多雖有陽明胃實不可攻之論見胃實

可治膿盡自愈服桂枝嘔者酒客病論見大法

乾嘔

乾嘔發熱兼自汗惡風鼻鳴者桂枝湯兼表不解有冰氣

乾嘔發熱

乾嘔發熱兼自汗惡風鼻鳴者桂枝湯兼表不解有冰氣

先渴却嘔渴欲解

嘔而下利

嘔而厥

嘔而心煩

而欬者小青龍湯方見發熱

乾嘔脇痛若表解身涼短氣汗出不惡寒者十棗湯若兼

往來寒熱脈沉陰者小柴胡湯論見往來寒熱

乾嘔下利若兼表不解發熱而欬者小青龍湯去麻黃加

羌花湯論見若表身涼脇痛短氣汗出者十棗湯論見

若因下後心下痞硬滿腹中雷鳴自利數行者甘草瀉心

湯論見

若脈微厥逆者宜白通湯若用白通湯溫後利不止厥逆

無脈者白通加豬膽汁湯論見

乾嘔厥逆若脈微下利者通脈四逆湯白虎加豬膽汁湯

若脈弦遲不利者四逆湯論見

中渴而飲水嘔者柴胡不中與也宜治膈間有水赤茯苓

乾嘔續法

湯主之

赤茯苓湯治傷寒嘔噦心下滿胃膈間有停水頭眩心悸

赤茯苓兩一 半夏姜製兩一 橘紅 芎藭各半兩

人參兩一 白朮兩半

右以咀每服四錢姜五片水煎服

傷寒瘧後嘔者有餘熱在胃腕也竹葉石膏湯加生姜主

乾嘔不止為虛海葛根湯治傷寒乾嘔不止

葛根 人參兩一 茯苓兩半 半夏姜製錢七

白朮兩半 黃芪七錢半 麥門冬去心 甘草炙各兩一

右以咀每服三錢生姜三片棗三枚同煎服

少陽病 口苦咽乾 眩 往來寒熱

脇滿痛 胸滿 胸痛 耳聾 少陽

病續法

口苦咽乾

少陽病

少陽之為病口苦咽乾目眩也

活人云宜小柴胡湯

耳聾胸滿忌吐

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐

下則悸而驚誤吐氣虛者悸誤下血虛者驚

脈弦發熱忌汗

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則

譫語此屬胃家胃和則愈胃不和則煩悸傷寒二百少

陽脈小者欲已也少陽欲解時從寅至辰止

陽明病腹滿脈浮緊口苦咽乾而喘若其人發熱惡寒誤

針者陽明忌汗下

下之則腹滿小便難若其人發熱不惡寒反惡熱誤下之

腹滿許學士云宜下柴胡湯

則胃空虛為懊憹誤下之則譫語誤加燒鍼則不得眠

腹滿許學士云宜下柴胡湯

眩

少陽眩

眩而口苦舌乾者屬少陽吧覲

眩而心下鞭項強者屬

和項強

太陽少陽併病當刺大椎肺俞忌汗下項強

胃實

眩而胃實若能食不惡寒者中風若飽則頭眩小便難者

汗後眩為虛

穀道皆屬陽明胃實

太陽發汗後仍發熱心悸頭眩身暈振七欲擗地者真武

湯主之方論見

誤汗

動氣在左誤汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤方論見動氣活人云宜小建中

諸逆誤汗而言亂目眩者死論見

頭眩脈沉緊發

汗則動經身為振振搖論見

往來寒熱

往來寒熱

本太陽病不解轉入少陽者胸下鞭滿乾嘔不能食往來

寒熱尚未吐下脈沉弦者與小柴胡湯若已吐下發汗溫

針譫語柴胡症罷此為壞病知犯何逆以法治之傷寒

五六月中風往來寒熱胸脇苦滿默上不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞硬或心下悸小使不利或不渴身有微熱或欬者小柴胡主之血虛氣盡膠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默上不欲飲食者臟腑相連其病必下邪高病下故使嘔也宜

小柴胡湯

柴胡二

黃芩

人參

甘草各三

半夏薑製六錢

右咬咀每服五錢生薑五片棗二枚同煎溫服日三服若胸中煩而不嘔去半夏人參加瓜蒌實一枚若渴者去半夏加人參三錢括葉根一兩若腹中痛者去黃芩加芍藥三分若脇下痞硬去大棗加牡蠣一

熱結寒熱者大柴胡湯

兩心下悸小使不利者去黃芩加茯苓一兩若不渴外有微熱者去人參加桂三分溫覆取微汗愈若欬者去人參大棗生薑加五味子半兩乾薑三分凡柴胡病下之不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解傷寒中風有柴胡症但見一症便是不必悉具

大柴胡湯

柴胡配

黃芩

芍藥各半

半夏製六

生薑兩一

枳實兩半

大黃兩一

右咬咀每服五錢加大棗三枚水煎溫服以利為度未利再服

許有入病傷寒心煩喜嘔往來寒熱醫以小柴胡與之不

除予曰脈洪大而實熱結在裏小柴胡安能去之仲景云傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯三服而病除蓋大黃瀉滌蘊熱傷寒中要藥王叔和云若不用大黃恐不名柴胡須酒洗生用有方

汗下後胸滿小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩此為未解也宜柴胡桂枝乾薑湯

柴胡二兩 桂枝 乾薑各半 栝萎根

黃芩各一兩 牡蠣 甘草各半兩

右咬咀每服五錢煎溫服微煩再服汗出愈

病人脈微而瀉者此為醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲着複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽欲則惡寒陰弱則

汗下後胸滿小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩此為未解也宜柴胡桂枝乾薑湯

脈微瀉者亡血

發熱此醫發其汗令陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲着複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故裸其身又陰脈遲澀故知血亡也

右脈微因大發汗所致故病當惡寒之時雖盛夏亦欲着複衣服牆因大下所致故病當惡寒後發熱之時雖盛夏亦欲裸其體是皆亡血陽微陰弱不能勝冷勝熱非是盛夏牽延至盛夏也

脇滿痛

少陽

脇滿乾嘔往來寒熱者屬少陽方論見往

太陽

傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者小

柴胡去半夏加人參瓜蒌根主之得病六七日脈沉浮弱惡風寒手足溫醫二三下之不能食而脇下滿痛而自

陽明

及身黃頸項強小便難者與柴胡湯必下重

**本渴而飲水欲嘔者柴胡不可與也**食穀者噦王註云不

嘔者屬柴胡症若因水而嘔者水停心下也脇滿胃家實或嘔而舌上白胎

者或脈弦浮大身黃小便難有熱者俱屬陽明症宜小柴

胡湯方論見脇滿潮熱大便溏利者小柴胡湯方論見

表裏若因下微利而嘔者先以柴胡湯解外後以柴胡加芒硝

湯方論見太陽病十日已去脈浮細而嗜臥者外

已解也若胃滿脇痛者與小柴胡湯脈浮者與麻黃湯

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出發

作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡

寒者此表解裏未和也宜

手裏湯

芫花少

甘遂

大戟各等

右為細末合和之再入白中栲二三下先以水一升

煮肥棗十枚取五六合去渣納藥末強人一錢虛人半

錢單飲寒湯送下平旦服若下少病不除者明日更服

加五分利後米粥白養若下不下令入脹滿通身浮

腫也昔杜士問孫兆曰十東湯畢竟治甚病孫曰治太

陽中風表解裏未和杜曰何以知裏未和孫曰頭痛心

下痞滿脇下痛乾嘔汗出此知裏未和也杜曰公但言

病症而所以裏未和之故要緊總未言也孫曰某嘗於

此未決願聽開諭杜曰裏未和者蓋痰與燥氣壅於中

焦故頭疼乾嘔短氣汗出是痰膈也非乎寒不治但此

湯不得輕用恐損人於條忽用藥者慎之

針灸 婦人發熱惡寒經水適來熱除脈遲身涼脇滿如結魯狀

謹語者刺期門論見

論見

診吐下汗後脈微心下痞脇痛氣上衝咽眩胃脈動揚者成痿論見下後脈弦者必兩脇拘急論見傷寒大法

脇痛續法

傷寒脇痛 支滿 陽陵泉

胃滿

少陽滿 口苦咽乾又耳聾胃滿者屬少陽忌吐下宜柴胡湯論見

太陽陽明合病喘而胃滿者宜麻黃湯論見

少陰病下利咽痛胃滿心煩者宜猪膚湯方論見

太陽病下之脈促胃滿者桂枝去芍藥湯方論見若脈促不結胃者欲解也論規下後胃滿小使不利若兼煩

驚譫身重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯方論見若兼噦而舌胎者為濕痺論見

汗下後煩熱胃中空者梔子豉湯主之論見

病症發熱惡寒加桂枝或自汗但頭不痛項不強胸中痞鞞氣上衝咽嗑不得息者瓜蒂散主之論見氣衝

胸痛

少陽病 胸脇痛耳聾尺寸脈俱弦者少陽受病也論見活人云柴胡湯主之

宜下症 病胃中諸實胃中鬱上而痛不能食欲使人按之而反有涎唾下利十餘行其脈反遲寸口脈微滑此可吐之利則止

止

宜下症 吐下後溫上欲吐胃中痛大便溏腹滿而煩者宜調胃承氣湯論見

氣湯論見

耳聾

少陽病 胃脇痛耳聾尺寸脈俱弦者少陽受病也論見口苦耳

聾胃滿者少陽中風論見未持脈時病人手必自冒胃師因教試令欬而不欬此必

兩耳聾無聞也所以然者以重於汗虛故如此

少陽病續法

表裏中三法  
**海辨**表裏中三說假令少陽症頭痛往來寒熱脈浮此三  
症但有其一即為表也口失滋味腹中不和大小便或閉  
而不通或泄而不調但有其一即為裏也如無上下表裏  
症餘皆虛熱也是病在其中矣

陽氣毒盛變陽毒

咽痛面赤斑為  
陽毒仲  
景但名  
湯毒主  
發表  
七日不可治宜

升麻鱉甲湯

升麻二兩

當歸

蜀椒炒去

甘草各一兩

鱉甲手指大雄黃研半

右六味以水四升煮取一升頓服之取汗愈肘後千金

方陽毒升麻湯有桂无鱉甲陰毒用甘草湯无雄黃

陽毒續法

**活**陽毒升麻湯治傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下之  
後變成陽毒腰痛煩悶不安面赤狂言奔走或見鬼或  
下利脈浮大數面赤斑如錦紋咽喉痛下膿血五日可  
治七日不可治

升麻

犀角鎊

射干

黃芩

人參

甘草各等分

右咬咀水煎服食頃再服溫覆手足出汗則解不解重  
作

後更  
名陽毒  
傷寒主  
退陽  
陽毒梔子湯治陽毒傷寒發熱百節疼痛

升麻

黃芩

杏仁各二錢

梔子

赤芍各一錢

石膏二錢

知母

大青各一錢

甘草五分 柴胡一錢

右咬咀每服半兩薑五片豉百粒同煎

大黃散治陽毒傷寒未解熱在內恍惚如狂

大黃半兩 桂心二分 甘草炙 芒硝

木通 大腹皮各一兩 桃仁二十枚

右咬咀水煎服以利為度

海葛根散治陽毒身熱如火頭痛燥渴咽喉乾痛

葛根七錢 黃芩 大黃炒醋 甘草

山梔 朴硝各半兩

右咬咀水煎服

活黑奴丸治時行病六七日未得汗脈洪大或數面赤目

痛身躄大熱煩躁狂言欲走大渴甚又五六日已上不解

熱在胃中口禁不能言為壞傷寒醫所不治或人精鼻已

竭心下尚煖按開其口灌藥下咽即活兼治陽毒及發斑

麻黃去節泡 大黃二兩 釜底煤研 黃芩

芒硝 竈突墨研 梁上塵 小麥奴略

右為末煉蜜丸如彈子大新汲水研下二九渴者與冷

水盡飲之須臾當寒寒竟汗出便瘥若無汗再服二九

須微利效小麥奴即小麥未熟時叢中不成麥捻之成

黑勃是也此藥須是病人大渴倍常躁盛者乃可與之

若不渴者服之反為禍耳

水漬法

脈洪大內外結熱舌卷焦黑鼻中如烟煤宜以水漬布薄

之疊布數重新水漬之稍按去水搭於胃上須臾蒸熱又

漬冷如前薄之仍換新水數十易熱甚者置病人於水中

熱繩銀則已亦一良法也

陰陽毒

丹砂丸治傷寒陰陽二毒相伏危惡形症

船上硫黃

水銀

太陰石

玄精石各一

硝石半

太陽石一

右為采，用無油，銚子，以文武火炒，上項藥，令勻，如灰色，研極細，生姜，自然汁，浸，煨餅，丸，如棗豆大，每服五丸，龍腦，生姜蜜水，下，壓其躁也。若陽毒，東湯，下陰毒，白湯，下，不許於屋底炒。

太陰病

腹滿

腹痛

王叔和云元陽明篇

吐與利下三門並附入少陰病，蓋此三門之病，本屬太陰，病因在少陰者，反多，故附入少陰也。

腹滿

太陰病太陰之為病，腹滿而吐，食不下，自利益甚，時腹自痛，若下之，必胸下結硬。太陰病，脈浮者，可於汗，宜桂枝湯。本太陽病，醫反下之，因小腹滿時痛者，屬太陰也。桂枝加

芍藥湯主之。太便實，痛者，桂枝加大黃湯主之。

桂枝加芍藥湯

桂枝

生薑各半

甘草兩

芍藥三

大棗六枚

右咬咀，每服五文，水煎，溫服。

桂枝加大黃湯

桂枝一

芍藥一

甘草多半

大黃半兩

者加一兩法虛者減五錢

右咬咀，大棗三箇，生薑四片，水煎，溫服。

太陰病，脈弱，其人續自便利，設當歸、大黃芍藥者，宜減之，以其人胃氣弱，易動故也。太陰中風，四肢煩疼，陽微脈瀼而長者，為欲愈。太陰病，欲解時，從亥至丑。腹滿時痛吐利者，為太陰。命九前太陰條

腹滿宜  
溫二症

霍亂吐利頭痛發熱身痛不渴而腹滿者理中丸加附子  
主之論見吐利 下利腹脹滿身痛者四逆溫裏後用桂  
枝攻表論見下利

腹滿宜  
利二症

噦而腹滿視前後部有不利者利之則愈論見 小陰腹  
滿脹不大便者宜大承氣湯論見大便

腹滿宜  
和二症

腹滿小便不利身黃者值陳蒿湯論見黃 若兼脇下痛脈  
弦浮大者宜小柴胡湯論見鼻乾

腹滿不  
減復加  
故為虛  
脈

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯 腹滿時減復  
如故此虛寒從下而上也當以溫藥和之

腹滿脈  
乳下症

太陰病腹滿時痛脈浮者宜桂枝湯論見前 陽明脈弦  
浮大胸痛身黃而腹滿者小柴胡湯論見鼻乾 傷寒腹滿澹  
語寸口脈浮而緊此肝乘脾也名曰縱宜刺期門 陽明

病腹滿脈浮緊口苦咽乾而痛若其人發熱惡寒者下之

腹滿脈  
遲忌下

則腹滿小便難若其人發熱汗出不惡寒反惡熱者下之  
則懊憹汗之則譫語加燒鍼則怵惕不眠論見胃家實 陽明病腹滿脈遲若頭眩小便難者不可下若潮熱汗出  
不惡寒者失承氣主之論見胃實

腹滿自  
汗四症

三陽合病腹滿身重難轉側譫語遺尿自汗者宜白虎湯  
論見合病 傷寒發熱脈瀼惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗  
出小便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫宜刺期門 腹

汗後腹  
滿

滿汗出不惡寒而喘若脈遲潮熱者大承氣湯若脈浮緊  
口苦咽燥者忌發汗忌燒鍼論見腹滿 發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之  
厚朴生薑人參甘草半夏湯

厚朴

生薑各二

半夏六

人參兩

甘草五

吐下後  
腹滿

右吐咀每服五錢水煎溫服  
下利清穀若發汗必脹滿論見傷寒吐後腹脹滿者與  
調胃承氣湯下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯  
論見極吐下後溫溫欲吐胸痛便溏腹滿而煩者調胃  
承氣湯論見

禁忌

不大便六七日少與小承氣湯不轉矢氣者不可攻之攻  
之則腹滿不能食論見大便腹滿吐利者忌下論見腹  
滿脈浮緊口苦咽乾者忌汗下論見腹滿脈遲者忌  
下論見前腹滿脈弱自利設用大黃芍藥宜減之論見

腹滿續法

腹滿脈  
沉細無  
力者理  
中

若飲食不節寒中陰經胸膈不快腹滿閉塞唇青手足  
冷脈沉細少情緒或腹痛急作理中湯加青皮每服二三

劑胃即快矣枳實理中丸五積散尤妙  
腹脹滿者宜枳  
梗半夏湯

枳梗半夏湯治傷寒心腹痞滿時發疼痛  
枳梗微 半夏薑 橘紅各一

右吐咀每服四錢生薑三片水煎服

少陰症小便遺瀝大便遺失其人病六七日靜重如山  
目不視體如冰腹脹滿與物則咽不與則不求其脈沉細  
而微疾按之有力宜急下之與大承氣湯

腹痛

腹滿痛  
利者太陰  
頭痛發  
熱者霍  
亂

腹滿而痛吐利者屬太陰宜四逆湯論見腹滿  
太陰條  
若兼頭痛發熱身痛者屬霍亂 霍亂腹痛不渴者理中  
丸加木參論見  
病腹中滿痛者此為實也宜大承氣湯下之病人不大

為陽實

腹痛下利者為陰虛

腹痛厥逆為陰

腹痛嘔吐為陽

便五六日繞臍煩疼發作有時者有燥糞故使不大便也  
發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯 木下後六七  
日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有  
宿食故也宜大承氣湯 汗下後不大便而渴日晡潮熱  
從心下至小腹鞭滿而痛者宜大陷胃湯方論見結胃  
少陰病腹滿下利若小便利四肢重痛者真武湯便膿  
血者桃花湯若下利清穀手足厥逆脈微欲絕者通脈四  
逆湯去蔥白加芍藥

少陰病腹痛若四肢逆而不溫者四逆散加附子方論見欲寐  
若手足厥冷脈微欲絕者通脈四逆加芍藥湯方論見下利  
傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者宜  
黃連湯

甘草炙

黃連

乾薑各三分

大棗三枚

半夏兩

人參

桂枝各三分

石岐咀水煎服分二服

往來寒熱脅脇滿心煩喜嘔而腹痛者小柴胡去黃芩加  
芍藥湯方見往來寒熱條

腹痛弦滑者建中

傷寒陽脈濇陰脈弦當腹中急痛者先與小建中湯不瘥  
者再與小柴胡湯

小建中湯

桂枝一兩

甘草炙一兩

芍藥三兩

生薑一兩

大棗六枚

膠飴八兩

右以咀每服五錢生薑三片同煎至八分去渣下膠飴

兩匙許再煎化服東垣云芍藥味酸於土中瀉木為君  
餘糖甘草其溫補脾養胃為臣木挾  
木撻亦來侮土故脈弦而腹痛肉柱太辛熱佐芍藥以  
退寒小薑辛甘辛溫發散陽氣行於經絡皮毛為使故  
建中之名始于此焉

診傷寒四五日腹中痛者轉朱氣及少腹滿者此欲自利也

腹痛續法

針灸

傷寒邪在三陰內不得交通故為腹痛手足之經皆會於腹如脈弦而腹痛過在足厥陰肝手太陰肺刺太衝太淵太陵如脈沉而腹痛過在足太陰脾少陰腎手厥陰心包刺太谿太陵如脈沉細而痛過在足太陰脾手少陰心刺太白神門三陰交此刺腹痛之法也

腹痛欲吐不吐欲瀉不瀉瀉為乾霍亂

乾霍亂此係內有所傷外為邪氣所逼有用吐藥者則兼發散之義有用溫藥解散者不可用涼藥宜用二陳湯加解散藥如川芎蒼朮防風白芷之類是也

無鹽湯治乾霍亂蠱毒宿食不消積冷心腹煩滿鬼氣用煎鹽湯三升熱飲一升刺口令吐宿食使盡不盡更復吐訖復飲三吐乃止此法大勝諸治俗人以為田舍滾近之

法鄙而不用守死而已凡有此病即先用之吐訖後詳症脈以加減理中湯治中湯欬緩調之

宜薑鹽湯治欲吐不吐欲瀉不瀉

鹽一兩

生薑半兩

右同炒色變以水一碗煎溫服病甚加童便下盞

世勝靈丹治乾霍亂腹痛甚者取千年石灰湯泡服

成病有乾霍亂濕霍亂乾霍亂死者多濕霍亂死者少蓋吐利則所傷之物得以出洩雖甚重胃中水穀洩盡則止矣所以死者少及乾霍亂死者多者以其上不得吐下不得利則所傷之物不得出洩壅閉正氣隔絕陰陽煩擾悶躁喘脹而死者多矣

無乾嘔霍亂者忽然心腹脹滿絞痛蠱毒煩冤欲吐不吐欲利不利狀若神靈所附頃刻之間便致悶絕

黃王叔和原  
入陽明篇

太陰  
濕熱黃  
便不利

傷寒脈浮而緩手足自溫者是為繫在太陰當發身黃小便  
便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必  
自止以脾家實腑穢當去故也

面色如煙薰黃乃濕病也一身盡痛色如橘子黃乃黃病  
也一身不痛

濕痺者  
其附

成濕家之黃也身黃似薰黃雖黃而色暗不明也熱家之  
黃也身黃似橘子色甚者勃勃出染着衣正黃如黃柏是  
其正黃色也色如薰黃一身盡痛發熱者為濕痺若脈沉  
緩小便不利者甘草附子湯五苓散若脈大頭痛鼻塞者  
納藥鼻中則愈矣命見  
體痛

成一人病身體痛面黃喘滿頭痛自能飲食大小便如常  
予診之脈大而虛鼻塞而煩予曰非濕熱宿穀相搏此乃

陽明熱  
頭汗出  
若茵陳

頭中寒濕非茵陳五苓不可行也仲景云濕家病身疼痛  
發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中初  
無病病在頭中寒濕攻鼻故塞納藥鼻中則愈仲景無藥  
方此方見外臺刪繁症云治天行熱病蓋通貫臟腑寒濕  
沉於骨髓之間或為黃疸宜瓜蒂散即此方也瓜蒂散方  
見後黃續  
條 又有二舟相病傷寒發黃鼻疼身與自如金色小  
便赤而數大便如常或者欲用茵陳五苓予曰非其治也  
小便利大便如常則知病不在臟今眼睛鼻頰痛是病在  
清道中清道者華蓋肺之經也若下大黃則必腹脹為逆  
亦用瓜蒂散完含水次搯之鼻中黃水盡乃愈  
傷寒十八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳湯  
主之陽明胃家實身無汗但頭汗出小便不利飲水漿發  
黃亦茵陳蒿湯主之

茵陳蒿一兩者大黃兩

山施二錢

右咬咀用水三升先煎茵陳減半納二味煎熟溫服日三服小便當利如皂莢汁狀色正赤過二宿腹滿減黃從小便中去也

身黃腸痛

身黃腸痛小便難下者宜柴胡下後者忌柴胡二法俱見

汗後身黃

傷寒發汗後而身自俱黃所以然者以寒濕在裏不解故也法不可下當於寒濕中求之與熏法同

下後身黃

太陽病脈浮數為表未解醫反下之若不結胸但頭汗出無身汗劑頸而還小便不利身必發黃論見結胸活人云茵陳湯主之

陽明病面赤攻之必發熱身黃小便不利論見胃實陽明病黃而腹滿脈遲飽則頭眩小便難者雖下之腹滿如故論見

下後不能食脇下滿痛頸項強小便難而身黃者與

柴胡湯必下重

火后身黃

陽明病被火額上微汗出小便不利者身必發黃風溫脈浮汗出身重多眠若被火則微發黃色劇則如驚癇時

瘰癧論見風溫太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃論見頭汗

身黃脈沉結少腹鞭而小便自利其人發狂大便黑者為

女節血身黃

畜血宜抵當湯論見畜血

虛熱身黃

傷寒身黃發熱者梔子黃柏皮湯主之

梔子十五枚甘草兩黃柏兩

右咬咀每服五錢水煎溫服

傷寒瘧熱在裏身必發黃麻黃連翹湯主之

麻黃節連翹根生薑

赤小豆

梓白皮生各半升杏仁二十粒甘草各一兩

大棗六枚

右咬咀每服五錢用潦水一盞半煎溫服麻黃杏仁生五味其辛發散表邪為陽也赤小豆連翹梓皮酸苦泄裏為陰也潦水味薄不助陰也

右身黃小便自利小腹鞭而狂大便黑者為蓄血則宜抵當湯下之若小便不鞭其人不在大便不黑者雖小便利非蓄血也其為症有三一者梔子柏皮湯二者麻黃連翹赤小豆湯皆治身黃小便利而身不疼者海藏

所謂乾黃是也三者桂枝附子湯去桂加白朮湯皆治身黃小便利而一身盡痛者活人所謂中濕是也

汗下燒針後心下痞而胸煩者面色青膚腫難治色微黃手足溫者易治論見身黃禁忌見前汗後身黃下後身黃條

黃續法

海傷寒病遇太陽太陰司夫若下之太過往往變成陰黃

身分汗陰出脈沉而黃為

一則寒水太過水來犯土一則土氣不及水來侵之多變

陰

此疾一則茵陳茯苓湯加當歸桂枝二則茵陳梔皮湯加姜朮半夏三則茵陳附子湯四則茵陳四逆湯五則茵陳

姜附湯六則茵陳吳茱萸湯方見如左發黃小便不利煩躁而渴茵陳湯加茯苓滑石當歸官桂主之韓氏名茵

發黃四肢遍身冷者茵陳湯加夏茯苓主之韓氏名茵發黃四肢遍身冷者茵陳湯加附子甘草主之韓氏名茵發黃肢體逆冷腰上自汗茵

陳湯加附子乾姜甘草主之韓氏名茵發黃冷汗不止者茵陳湯加附子乾姜主之韓氏名茵發黃前服姜附

諸藥未已脈尚遲者茵陳加吳茱萸附子乾姜不通當歸主之韓氏名茵趙宗顏因下之太過生黃脈沉細遲無

力次第用藥至茵陳附子湯大效按海藏次第用藥者謂先投韓氏茵陳茯苓湯次投茵

陳七皮湯又次投茵陳附子湯後趙秀才次第做此  
趙秀才因下之早黃病脈寸微尺弱身冷次第用燕云茵  
陳四逆湯大效傷令中寒脈弱氣虛變為陰黃仲景理  
中湯加茵陳服之

便赤能  
食而黃

茵陳湯治傷寒發黃目赤小便赤

茵陳

山梔

柴胡

黃柏

黃芩

升麻

龍膽草 酪半 大黃 兩

右咬咀水煎空心服以利為度

往來寒  
熱而黃  
發汗不  
徹而黃

海 往來寒熱一身盡黃者小柴胡加梔子湯主之  
一僧傷寒發汗不徹有留執身面皆黃多熱期年不愈  
醫作食黃治之治不對病不去問之食不減尋與此藥服  
五日病減三分之一十日減三分之二二十日病悉減方  
用茵陳梔子各二分秦升麻各四錢末之每用三錢水

小便不  
利而黃

四合煎及一合去渣食後溫服以和為度  
活五苓加茵陳蒿湯治發黃而渴小便不利

茵陳蒿湯分五苓湯五

石二劑拌勻每服三錢日三服水調下

鼻塞而  
黃

人方傷寒欲發黃者急用瓜蒂末口含水搗一字許入鼻  
中出黃水甚驗即用茵陳湯調五苓散服之最效

本治頭中濕熱發黃疽瓜蒂散

瓜蒂二十

赤小豆

黍水各十

右為細末如大芫大一粒許納鼻中縮入當出黃水慎  
不可吹入

結胃痞  
氣發黃

雲結胃發黃太陽附本也 法結胃 痞氣發黃大陰附本  
也治之法  
活間白虎症亦有身熱煩渴引飲小便不利何以不發黃

答曰白虎與發黃症相近遍身汗出此為熱越白虎症也  
頭面汗出頸已下無汗發黃症也

成傷寒發黃是病已極是有不治者多矣非止寸口近掌  
無脈鼻氣出冷為不治之症又若形體如烟垂直視搖頭  
者是為心絕環口壅壘柔汗發黃是為脾絕皆不治之症  
也

少陰病 但欲寐嗜臥 口燥咽乾 咽  
痛 吐 吐利 下利

但欲寐嗜臥  
少陰之為病脈微細但欲寐則氣微則行陽寐則行陰而

少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯主之方

少陰病 脈微細 欲寐 法之

無汗 者微汗 之

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日

無症故微發汗也無症謂無 吐利厥症

麻黃附子甘草湯

麻黃 甘草各二兩 附子一枚炮

右咬咀每服五錢水煎溫服須二三服以身汗為度

少陰病得之二三日口中和其背惡寒者當灸之附子湯

主之

附子一枚 茯苓七錢 人參半兩 白朮兩

芍藥七錢 右咬咀每服五錢水煎溫服日三

少陰二三日口燥咽乾者大承氣湯急下之方論見口

若咽痛者甘草湯不瘥者桔梗湯方論見

少陰病得之二三日已上心中煩不得臥黃連阿膠湯主

口燥咽 乾 咽痛 心煩不 臥

之得臥方見不

腹滿小  
便不利

陰病二三日至四五日腹滿小使不利若便膿血者桃花湯主之方論見

身重下  
利腹脹咳  
嘔而渴

若四肢重痛下利者真武湯主之方論見

少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯方見

診差劇

少陰病下利至六七日變咳而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之

少陰病脈微細沉但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得寤寐者死少陰病六七日息高者死

少陰病脈緊至七八日自利脈變暴微厥手足反溫者欲解也論見

少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血也方論見

但欲寐方論見 吐利但欲寐方論見 下利但欲寐方論見

少陰病  
欲得泄  
利

利 少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭為難治 少陰病四逆惡寒而身踈脈不至不煩而躁者死 少陰病惡寒身踈而利手足逆冷者不可治

少陰病四逆其人或欬悸或小使不利或腹中痛或泄利下重者宜

四逆散

甘草多

枳實

柴胡

芍藥各等分

右為細末日飲和香服方寸匕日三服如欬者加五味子乾薑各五分并主下利 悸者加桂枝五分 小使不利者加茯苓五分 腹中冷痛者加附子一枚炮令拆 泄利下重者先以水五升煮薤白三升去渣以散三方寸七納湯中煮取一升半分溫再服

除病脈  
沉欲寐

少陰病手足逆冷其人若下利後重者此條四逆散加薤  
白湯若下利脈絕及無脈者通脈四逆湯白通加猪膽汁  
湯方論見若身體骨節痛脈沉者宜附子湯 少陰病  
脈沉者急温之宜四逆湯方見 少陰病身體痛手足寒  
骨節痛脈沉者附子湯主之 少陰病脈沉發熱者宜前  
條麻黃附子細辛湯 少陰病欲解時從子至寅止 少  
陰病惡寒而踈時自煩欲去衣被者可治 少陰病下利  
止而頭眩時時自胃者死 少陰中風脈陽微陰浮者為  
欲愈 少陰病脈細沉數病為在裏不可發汗 少陰病  
脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺部弱瀉者不可復下  
之  
太陽病十日已去脈浮細嗜臥者外已解也胃滿脇痛者  
小柴胡湯脈但浮者麻黃湯論見 脈浮汗出多眠若身

醫學綱目卷五

五

目開欲  
眠為孤  
感

但欲寐  
而躁者  
少陰身  
熱而躁  
者陽明

心滿痛  
者陷胃

重息鼾者風溫方論見

風溫

若合目則盜汗出者三陽合病

盜汗見

狐惑病默默欲眠目不得開不欲飲食惡聞食臭其面目  
乍赤乍黑乍白其聲啞者甘草瀉心湯咽乾者苦參湯  
其肛重蝕雄黃煎之其脈數無熱目赤背黑者當歸赤小  
豆散並見狐  
惑條

口燥咽乾

少陰病得之二三日口燥乾者宜下之大承氣湯 少陰

病自利純青色水心下痛口燥乾者宜大承氣湯論見

傷寒無大熱口燥渴背惡寒者白虎加人參湯 陽明病

發熱汗出不惡寒反惡熱若口乾舌燥者白虎加人參湯

方論見渴  
表解餘

太陽病下後不大便日晡潮熱心下滿痛而舌上燥渴者

醫學綱目卷五

五

宜大陷胃湯

嗽水不咽者血

陽明病口燥但欲嗽水不嚥者必血滿心下和不可近者

狐惑症

病人默默欲眠目不能閉起居不安聲啞或咽乾者當作狐惑治之 咽啞乾燥者不可發汗

咽痛

咽痛欲飲者少陰

少陰病二三日咽痛可與甘草湯不瘥桔梗湯 甘草湯用甘草二兩咬咀每服四錢水煎去香溫服日三服 桔梗湯用甘草二兩桔梗一兩咬咀每服五錢水煎溫服 少陰病咽中痛半夏散及湯主之

半夏製

桂枝

甘草各等分

右咬咀水煎服少少咽之為散白湯調服方寸匕亦效 日三服 仲景法為散調服不咬咀

成甘草湯主少陰客熱咽痛桔梗湯主少陰寒熱相搏咽

痛半夏散及湯主少陰客寒咽痛

少陰病咽中生瘡不能言語聲不出者苦酒湯主之

半夏四枚

鷄子

一箇去黃納半夏苦酒於鷄子殼中

右二味納半夏著苦酒以鷄子殼置刀鐮中安火上冷

三沸去香少少含咽之不瘥更作三劑

診脈緊當無汗反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復

吐利論見吐利

師曰伏氣之病以意候之今月之內欲有伏氣假令舊有

伏氣當須脈之若脈微弱者當喉中痛似傷寒非喉痺也

病人云實咽中痛雖爾今復欲下利 見後活人續法

咽痛下利兼胃滿者猪膚湯厥逆面赤者通脈四逆湯下

後復厥逆下部脈不至者麻黃升麻湯 並見下利

咽痛下利少陰厥陰

面赤斑陽毒咽痛面赤斑斑如錦紋唾膿血五日可治七日不可

治宜升麻鱉甲湯活人論見陽毒升麻湯

陰毒咽痛面自青身痛如被杖五日可治七日不可治升

麻鱉甲去雄黃蜀椒湯活人論見陰毒升麻湯

診太陽下後脈緊者必咽痛論見陽毒升麻湯陽明病頭眩而效者必

咽痛若不效者咽不痛先厥後熱者下利必自止若不止者

反汗出者其喉為痺發熱無汗者下利必自止若不止者

必便膿血其喉不痺論見

忌咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絕手足厥冷欲得

蹠臥不能自溫咽中閉塞不可下下之則上輕下重水

漿不下臥則欲蹠身急頭眩下利日數止行

咽痛續法

伏氣活半夏桂枝甘草湯治伏氣之病謂非時有暴寒中久伏

氣於少陰經始不覺病旬月乃發脈更微弱先發咽痛似傷寒非喉痺之病必下利始用半夏桂枝甘草湯主之此病只二日便瘥古方謂之腎傷寒也次用四逆湯

半夏桂枝甘草湯

半夏湯洗甘草炙桂心各等分

右咬咀每服四錢水煎候冷少少細呷之散及湯但藥

耳吹咀

附吐

腹滿時痛而吐者太陰病論見腹滿活人

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐自利而渴論見下利活人

少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得

之手足寒脈弦遲者此胃中實不可下也當吐之若膈有

寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜四逆湯少陰病但欲

腹滿痛而吐太陰

不吐但欲

痰少陰

臥不煩而吐五日變自利煩躁不得寐者死論見但

腹痛欲嘔吐者宜黃連湯

病解後虛羸少氣欲吐者宜竹葉石膏湯

乾嘔吐涎沫頭痛者宜

吳茱萸湯

吳茱萸湯泡洗

人參三

生姜一兩

大棗三枚

右咬咀水煎去渣分二服

吐水煩渴發熱渴欲飲水水入則吐者宜五苓散論見

吐下後傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即

吐乾姜黃連黃芩人參湯主之

乾姜

黃連

黃芩

人參各等分

右咬咀水煎溫服

汗後吐

太陽病吐後汗出不惡寒發熱關脈細數欲食冷食則食暮吐此為小逆論見

病人脈數為熱當消穀引食而反吐者此因發汗陰陽氣微膈氣虛脈乃數也數而客熱者不能消穀以胃中虛冷故也 凡服桂枝湯而吐者必吐膿血也註云內熱者即桂枝湯則吐如

酒客之類是也 吐厥逆者甘薑

吐續法

脈煩數渴為熱

吐有冷熱主症寸口脈數手心熱煩渴而吐以有熱在

胃脘五苓散主之

寒多不飲水而吐者理中湯去朮加生姜主之

陰症喘促及吐逆者返陰丹入口便住

大橘皮湯治動氣在下不可發汗發又無汗心煩骨節疼

痛目暈惡寒食則反吐穀不得入先服大橘皮湯吐止後

下飲水為寒陰症吐

吐後

吳茱萸湯

宜建中湯

陳皮半兩 生薑兩 棗子八枚 甘草兩半  
人參錢一 竹茹升半

右水三大盞煮取一盞分二服

脚氣吐病人直患嘔吐而脚弱或疼乃是脚氣當發脚氣治之見

附吐利

吐利無寒熱頭疼為陰腹滿時痛吐利不瀉者太陰病論見腹滿活人病人脈

陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之少陰病吐利手足不逆冷反熱者不死脈不至者灸少陰七壯少陰病吐利煩躁四逆者死少陰病下利欬而嘔渴心煩變不得眠者宜猪苓湯論見少陰病腹痛

小便不利四肢重痛自下利或嘔者真武去附子加生姜

湯論見少陰病下利脈微瀉嘔而汗出者常溫其上灸

之論見欲寒溫其上以助陽氣也既吐且利小便復利而

大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之和入霍亂篇

太陽與少陽合病頭痛脇痛往來寒熱自利而嘔者黃芩

加半夏生姜湯論見發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐下

利者宜大柴胡湯論見發汗後水漿不得入口者為逆

若更發汗必吐下不止嘔吐而利者名曰霍亂病發

熱頭痛身疼惡寒吐利者此名霍亂自吐下又利止復更

發熱也霍亂頭疼發熱身疼痛熱多飲水者五苓散主

之寒多不飲水者宜

理中湯

吐利有寒熱頭疼為陽

霍亂吐利

白木

人參

乾姜 炮

甘草 各一兩

白朮 一兩

右剉每服四錢水煎去渣溫服如寒甚者加乾姜一兩

半渴欲得水者加白朮一兩半臍上築者腎氣動

也去白朮加桂枝二兩吐多者去白朮加生薑四兩

下利多者倍用白朮悸者加茯苓二兩腹滿者

去白朮加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升許自

溫勿發揭衣被活人云或四肢拘急或轉筋者亦去朮加附子

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之

連氣土鬱之發民病嘔吐霍亂注下六元正紀篇太陰所至為

中滿霍亂吐下

右濕土霍亂即仲景五苓散理中丸之類是也

歲上不及風乃大行民病霍亂飧泄氣交變論

右上虛風勝霍亂即羅謙甫桂苓白朮散之類是也

熱至則身熱霍亂吐下六元正紀篇

右熱霍亂即活人書香薷散之類是也

金名足太陰之別名曰八孫夫本節後二寸別走陽明其別

者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛虛則蠱脹

取之所別也經脈氣亂於腸胃則為霍亂取之足太陰

陽明不下取之三里五亂篇東垣云足太陰期一

吐利止而身痛不休者當消息和詳其外宜桂枝湯惡

寒脈微利止者四逆加人參湯方論見惡寒

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四

逆湯加豬膽汁下之

甘草炙二兩 乾姜兩三 附子大一枚 豬膽汁半合

右三味咬咀水三盞煎至一盞去渣納豬膽汁分作二

次溫服其脈即來

吐利止後病身痛者和外脈微者溫裏

乾嘔下利分陰陽

吐利發汗脈平不煩者以新虛不勝穀氣故也 乾嘔而利兼脇痛而表解者宜于寒湯心下痞硬而煩者宜甘草瀉心湯兼厥逆脈微者通脈四逆湯白虎加猪膽汁湯

診

脈陰陽俱緊至於吐利其脈獨不解緊去人安此為欲解若脈遲至六七日不欲食此為晚發水停故也為未解食自下者為欲解

吐利續法內經霍亂法附

治夏月中暑霍亂上吐下利心腹撮痛大渴煩躁四肢逆冷汗自出兩脚轉筋宜服香薷飲須井底沉極冷頓服之乃效他藥不能救

香薷散治陰陽不順清濁相干氣鬱中焦名為霍亂此皆飽食膾炙頓啖乳酪酒膠白品無所不食多飲水漿睡

夏月霍亂為暑

冷席風冷之氣傷於脾胃諸食結而不散陰陽二氣雍而不反陽氣欲降陰氣欲升陰陽交錯變成吐利不已百服混亂榮衛俱虛冷搏筋轉皆宜服此

厚朴去破 黃連薑汁炒 香薷兩 甘草半兩

右為末每服四錢水煎不犯鐵器慢火煎之兼治不時吐利霍亂腹撮痛大渴煩躁四肢逆冷汗自出兩脚轉筋疼痛不可忍者須井中沉令極冷頓服之乃效

桂苓白朮散治暑飲食所傷傳受濕熱內盛霍亂吐瀉轉筋急腹痛滿悶小兒吐瀉驚風皆宜服此

桂枝 人參 白朮 白茯苓各半兩

澤瀉 甘草 石膏 寒水石兩

滑石兩 一方有木香藿香葛根各半兩

右為細末每服三錢白湯調下或新汲水生薑湯下亦

得有蒙古百戶昔良海因食酒肉飲潼乳得吐瀉霍亂症從朝至午精神昏憤以困急來告予診視之脈得沉數按之無力所傷之物已出矣即以新汲水半碗調桂苓白朮散徐徐服之稍得安靜又於牆陰掘地一穴約二尺許貯以新汲水在內攪之待一時澄定名曰地漿用清者一杯再調服之漸漸氣和吐瀉遂止至夜得安翌日微煩渴遂愈却以錢氏白朮散時時服之良愈或問用地漿者何也予曰坤為地地屬陰土平曰靜順感至陰之氣又於牆陰貯以新汲水以取重陰之氣也陰中之陰能泄陽中之陽霍亂症由暑熱內傷而得之故痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡又加暑熱七神迷亂非至陰之氣則不能息予用之者此也內經福方世之書豈不信哉 又提學侍其公年七十九歲六月

里霍亂吐瀉昏冒終日不知人事夜半請予視之診其脈七八至洪大有方頭熱如火足寒如冰半身不遂牙關緊急予思內經五亂篇中云清氣在陰濁氣在陽榮氣順脈衛氣逆行亂於胃中是謂大飽云云亂於腸胃則為霍亂於霍亂之名自此而生蓋年高氣弱不任暑氣陽不維陰則瀉陰不維陽則吐陰陽不相維則既吐且瀉矣前人見寒多以理中湯熱多以五苓散作定法治之今暑氣極盛陽明得時之際况因動而得之中暑明矣非甘辛木寒之劑不能泄其暑熱浮爛之火而安神明也遂以甘露散甘辛木寒瀉熱補氣加茯苓以分陰陽水水調灌之漸省不事諸症悉去後慎言語節飲食二日以參朮調中湯以意增減服之理其正氣逾十日後方平復

渴霍亂

無訶子散治老幼霍亂二服即效

訶子炮去 甘草炙 厚朴薑 乾薑炮  
神麴炒 草果去 良薑炒 茯苓

麥芽炒

陳皮各

右為細末每服二錢候發不可忍時用水煎入鹽少許服之

聖治霍亂用厚朴薑製上次香為末以新汲水調下二錢七佳

大人參散治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參 厚朴薑 橘紅各一 當歸炒  
甘草炙各 為末每服四錢表三枚水煎服

霍亂內有所感外有所感

雜方

集吐瀉還用吐以提其氣起吐用二陳湯加減或用樟水煎湯吐亦可

海霍亂症本自胃家或因寒飲或因飲水或傷水毒或感濕氣冷熱不調水火相干陰陽相搏轉筋變痛經絡亂行暴作吐瀉中焦胃氣所主也察其色脈隨經標本此治霍亂吐瀉之法也

外治霍亂吐下不止者艾一把水三升煮至一升頓服

經霍亂陳皮湯下山荳根末二錢

山霍亂吐瀉用屋下倒掛塵泡湯澄清服之大忌飲食入腹則死喫冰水不妨不可飲熱湯

集吐瀉不止或吐轉多四肢發厥虛風不省人事服此四肢漸煖神識便省

回陽散用天南星為末每服三錢用大棗三枚同煎至八

霍亂吐瀉

三



甲霍亂逆氣，魚際大白主之。霍亂遺尿，朱氣三里主之。世病人合面，正臥，兩手着身，以繩橫亘兩肘，木頭依繩，下俠脊兩邊，相去各一寸，灸三七壯，無不驗。霍亂已死，但有煖氣者，灸承筋七壯，立甦。取法以繩從足，指指圓，至膝上，此度從足跟，貼此量。上至臑，度極，頭處是穴。

甲霍亂頭痺不仁，承筋主之。千金云主。暴霍亂，以參主之。

世霍亂遍身轉筋，肚痛四肢厥冷，欲絕者，其脈洪大，日愈。脈微囊縮，舌卷，不治。

羅潔古老人云：霍亂轉筋吐瀉不止，其病在少陰。陰陽交而不和，發為疼痛。此病最急，不可與分毫粥，穀氣入胃，則必死矣。

保凡霍亂，慎勿與粟米粥湯入胃，即死。本草云：粟米味酸，微寒，無毒，主養腎氣，去脾胃中熱，益氣。霍亂脾胃極弱，不能傳化，加粟米，豈有能生也。即如吐瀉已多，欲任之後，宜以稀粥漸漸補養，以遲為妙。


自利不渴者，屬太陰，以其臟有寒故也。當溫之，宜四逆湯。

甘草兩，乾姜三錢，附子半。

右咬咀，水煎，溫服。強人加附子半箇，乾姜二兩半。少陰病欲吐不吐，心煩但欲寐，五六日自利而渴者，屬少陰也。虛故引水自救，若小便色白者，少陰病形悉具。小便白以下焦虛，有寒不能制水，故令色白也。活人云：四少陰病下利六七日，欲嘔，心煩不能眠者，猪苓湯主之。

自利而渴屬少陰

自利不渴屬太陰



少陰病自利清水色純青者心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯

孫寶大郎患傷寒經十餘日口燥舌乾而渴心中疼自利清水衆醫皆相守但調理耳汗下皆所不敢寶氏親故相謂曰傷寒邪氣入性命甚速安可以不失之疾投不明之醫乎孫至曰即曰不可下明白正當下投承氣湯遂大便通得睡明白平復衆皆曰此症緣何下之而愈孫曰不深於書徒知有書耳不知書之奧也口燥舌乾而渴豈非少陰症乎少陰症固不可下豈不知少陰工症自利清水心下痛者下之而愈仲景之書明有是說也衆皆欽服

下利欲飲水者以有熱故也宜白頭翁湯

白頭翁

黃柏

秦皮

黃蓮各三錢

右咬咀水煎去渣濕服不瘥再服

少陰病下利白通湯主之少陰病二三日不愈至四五日腹滿痛小便利或下利或嘔者宜真武湯

茯苓

芍藥各三錢

附子一箇

白朮半兩加減法從

右咬咀每服五錢生姜五片煎至五分溫服且二方本效者加五味子細辛乾姜各一分小便利者去茯苓下利者去芍藥加乾姜嘔者去附子加生姜七片少陰下利咽病會滿心煩者猪膚湯主之用猪膚四兩以水一盞半煎取一盞去渣加白蜜二合半白粉一合二芍半熬煮和相得溫服海藏云猪

厥利症

大汗利而厥冷者宜四逆湯 少陰病但欲寐下利若兼  
手足厥逆者宜白通加猪膽汁湯通脈四逆湯後方論見兼  
便膿血者宜桃花湯方論見後 少陰病欲而下利譫語  
者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗故也 少陰  
病下利脈微滑喘而汗出必數更衣反少者當溫其上灸  
之溫其上義 少陰病下利若利自止惡寒而手足溫  
者可治 大汗出熱不去內拘急四肢疼必下利厥逆而  
惡寒者四逆湯主之 傷寒六七日大下後寸脈沉而遲  
手足厥逆下部脈不至咽喉不利吐膿血泄下不止者為  
難治宜

麻黃升麻湯

麻黃去節二升 麻二兩

當歸

知母

黃芩

萎蕤各八銖

石膏碎

白朮

乾薑

芍藥

天門冬

桂枝

茯苓

甘草各六銖

右咬咀每服五錢水煎溫服相次下炊時又進下服汗  
出愈

下利脈沉而遲其人面少赤身有微汗下利清穀者必鬱  
胃汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛  
凡厥利當不能食食反能食者恐為除中試食以索餅  
不發熱者知胃氣尚在必愈也論見 傷寒先厥後發熱  
下利者必自止而反汗出咽中痛者其喉為痺發熱无汗  
而利必自止必便膿血便膿血者其喉不痺 下利後脈  
絕手足厥冷時時脈还手足溫者生脈不还者死 下利  
手足厥冷无脈者灸之不溫若脈不还反微喘者死 傷  
寒發熱下利厥逆躁不得臥者死 傷寒發熱下利至甚

厥利但欲眠者少陰

厥不止者死

少陰病下利脈微與白通湯利不止厥逆先服乾嘔煩者

白通加猪膽汁湯主之服湯後脈暴出者死微續者生

白通湯

乾薑兩

附子一枚

右咬咀每服五錢入葱白二寸同煎溫服

白通加猪膽汁湯

乾薑一分

葱白一

附子一枚

童便一合二

猪膽筒

右水一盞煎至五分去渣入童便膽汁相和得所溫服

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其病面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯主之

甘草炙

乾薑各二

附子一枚

面赤色者加

蔥九莖

腹中痛者去蔥加芍藥二兩嘔者加生

薑二兩

咽痛者去芍藥加桔梗一兩利止脈本

出者去桔梗加入參一兩

右咬咀每服五錢水煎溫服未瘥急更作一劑其脈續

續出者愈

少陰病但欲寐四肢逆而利若下重者四逆散加薤白也

論見厥方

若惡寒身踈者不治

下利腹脹滿身熱者先溫其裏乃攻其表溫裏四逆湯

攻表桂枝湯

傷寒表不解乾嘔發熱而不利者此為

水氣宜小青龍去麻黃加芫花湯

太陽與陽明合

病者必自下利葛根湯主之

太陽與陽明合病自下利者與黃芩湯若

脈浮大而長

者是其症也

嘔者黃芩加半夏生薑湯主之

下利而頭眩者與黃芩湯若

脈浮

大而成是也

黃芩湯

黃芩三

甘草炙

芍藥各二

大棗二

右以咀水煎溫服若嘔加半夏六錢生薑五片

太陽病桂枝症醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘

而汗出者宜

葛根芩連湯

葛根三

黃連

黃芩各二

甘草炙半

右以咀每服五錢水煎溫服日進二三服

下利清穀脈沉微手足厥逆者為陰宜通脈四逆湯論見前條

脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之傷寒

醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏下後身

疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝

下利清穀  
脈沉微  
脈浮而遲  
脈浮不  
厥屬陽

湯少陰病下利便膿血者桃花湯主之少陰病二三日

桃花湯

赤石脂四兩一半合

大米半合

乾薑半斤

右水二大盞煮三味米熟去渣納赤石脂細末一方寸

七溫服日三愈勿服

少陰病下利膿血者可刺下利便膿血若厥而發熱厥

少熱多者病當愈也論見前條先厥後發熱無汗者利不止

以有熱故也下利寸脈反浮數尺中自濡者必清膿血

下利脈數不解而下利不止者必挾熱而便膿血也論

下利語語若脈微手足厥但欲寐小便難者為陰宜補劑

下利語語若脈微手足厥但欲寐小便難者為陰宜補劑

下利語語若脈微手足厥但欲寐小便難者為陰宜補劑

下利語語

補劑

陽

和之

若脈和手足温及不欲寐小便利者為陽宜調胃承氣湯

脈滑宜

陽明少陽合病必下利其脈不負者順也負者失也互相

尅賊名為負也脈滑而數者有宿食也當下之宜大承氣

湯下利脈遲而滑者內實也利未欲止當下之宜大承

氣湯下利脈反滑當有所丟下之乃愈宜大承氣湯

脈微宜

下利脈微者白虎湯也若微瀉嘔而汗出數更衣者當温

而灸之方論見少陰下利條

下利脈大者虛也以其強下之故也設脈浮革故爾腸鳴

者屬當歸四逆湯主之

下利寒

熱利下重者白頭翁湯主之四肢逆而泄利下重四逆

散加薤白主之論見前厥利條

下利肢

疼身痛下利身體疼痛若但四肢沉重疼痛小便不利者前條真

武湯症也若四肢疼厥逆惡寒者四逆湯若通身疼痛

者先以四逆湯温裏後用桂枝攻表也方論見前

下利心

下利三部脈皆平按之心下鞕者急下之宜大承氣湯

下利後心下痞鞕者此非結熱但胃虛客氣上逆故使鞕

甘草瀉心湯主之論見痞

下利咽

痛下利咽痛若兼胃滿者猪膚湯兼厥逆者通脈四逆湯

痛下利胸

若下利不止厥逆下部無力咳唾膿血者麻黃升麻湯方論

下後利

下利十餘行胸中痛寸口脈滑者宜吐之則利止論見胃滿

利為傷熱

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞕服瀉心湯後以他藥下

之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在

下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者宜利其小便

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂

禹餘糧各四

右剉碎每服五錢水煎溫服不瘥再服

下後心下痞鞭腹中雷鳴乾嘔而利者甘草瀉心湯方論見痞

下後心下痞鞭表裏不解而利者桂枝人參湯方論見痞

下利脈促表不解喘汗而利者葛根黃芩黃連湯論見前

表凡藥下後潮熱脇滿嘔而利者先用小柴胡湯解外

後以柴胡加芒硝湯論見潮熱凡藥下後譫語脈調和小便

利而下利不厥者調胃承氣湯論見譫語下後脈大浮革腸

鳴而利者當歸四逆湯論見前下下後脈數不解者必

便膿血論見前下後成陰症厥逆咽不利唾膿而利者

麻黃升麻湯論見厥少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反

去者為欲解也雖煩下利必自愈 傷寒脈浮緩手足溫

至七八日忽暴煩下利日十餘行者必自止論見黃門發熱

而厥七日下利者為難治 傷寒六七日不利便發熱而

利其人汗出不止者死有陰無陽故也 少陰病但欲臥

不煩至五六日忽自利煩躁不得寐者死論見但下利

脈沉弦者下重也脈大者為未止脈微數者為欲自止雖

發熱不死 下利有微熱而渴脈弱今自愈 下利脈數

而渴者自愈設不瘥者必清膿血論見前下利脈數有微

熱汗出今自愈設復瘥為未解 傷寒下利日十餘行脈

反沉者死 假令下利寸口開上尺中悉不見脈然尺中

時一小見脈再舉頭者腎氣也若損脈來至為難治 下

利清穀不可攻表汗出必脹滿

下利續法

醫學綱目卷五

卷五

脐下寒  
大便青  
白為寒  
脐下熱  
大便黃  
赤為熱

活寒毒入胃者脐下必寒腹脹滿大便黃白或青黑或下利清穀宜四逆湯理中湯白通加附子湯四逆加薤白散挾利者脐下必熱大便赤黃色及腸間津汁垢膩宜黃芩湯白頭翁湯三黃熟艾湯薤白湯赤石脂湯

黃芩

黃連

黃柏

熟艾半雞子大

右吹咀水煎溫服

薤白湯治傷寒下利如爛肉汁赤帶下伏氣腹痛諸挾悉主之

豆豉半合綿裹

薤白握

山梔七枚

右吹咀用水二升半先將梔子十沸下薤白煎至二升下豉煎取一升二合溫服

赤石脂丸治傷寒熱利

赤石脂一斤

黃連

當歸各二斤

乾姜炮

便膿血  
為濕

右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九丸米飲下日三服濕毒氣盛者下利腹痛大便如膿血或如爛肉汁宜桃花湯地榆散黃連阿膠散

地榆散治傷寒熱毒不解日晚即壯熱腹痛便利膿血

地榆

犀角屑

黃連炒

葛根各

梔子仁半斤

黃芩一斤

右吹咀每服四升水一盞入薤白五寸同煎溫服

海阿膠湯治傷寒熱毒入胃下利膿血

黃連炒二斤

山梔半斤

阿膠炒

黃柏各一斤

右吹咀每服四升水煎服

雲傷寒汗下後大小便利者腹中痛者宜燥腸丸

傷寒汗  
下後大

小便利  
腹痛宜  
温

附子炮一  
龍骨半  
乾姜一  
吳茱萸  
粟殼  
訶黎皮各半  
右為細末酒糊丸如桐子大每服三十九温水下利止  
勿服

裏急後  
重宜下

傷寒汗下後裏急後重下利者宜  
七宣丸

大黃一

桃仁三十枚  
木香

檳榔

柴胡

訶子皮

甘草各半

氣逆者  
宜和

傷寒汗下後氣逆利不止者寒也宜  
枳實芍藥甘草湯

芍藥

甘草

枳實

乾姜炮各半

右改咀每服五升水煎服

厥陰病

氣上衝心

飢不欲食

吐衄

虫

厥

少腹滿囊縮

吐衄

厥陰病

厥陰之為病消渴氣上衝心中疼熱飢不欲食食則吐

衄厥陰病渴欲飲水者少少與之愈厥陰中風脈微

浮為欲愈不浮為未愈厥陰病欲解時從立至卯上

病如桂枝症頭不痛項不強寸脈微浮胃中痞鞅氣上衝

咽喉不得息者此為胃有寒也當吐之宜

瓜蒂散

瓜蒂

赤小豆各一分

右研為細末取二錢用豉一合湯七合先漬之須臾煎  
稀糜去渣取汁相和温頓服不吐少少加得快吐乃止  
諸亡血虛家不可與服

活瓜蒂散每服一錢七藥下便臥欲吐且忍之良久不吐

厥陰氣  
上冲咽  
喉下得  
息者宜  
陽

取三錢七湯二合和服以手指探之便吐不吐復稍增之  
 以吐為度若吐少病不除明日如前法再吐之不可令人  
 虛也如藥力過時不吐飲熱湯一升以助藥力吐訖便可  
 食無更服若服藥過多者飲水解之土合米飲之  
 奔豚氣上衝胃腹痛往來寒熱奔豚湯主之方見積塊  
腎積氣條  
 陰陽易少腹裏急引陰中拘攣熱上衝胃頭重不欲舉眼  
 中生花者宜燒視散論見陰  
 剛瘧氣上衝胃口噤不得語欲作剛瘧者宜高根湯論見瘧  
 汗後氣上衝鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹  
 上衝心者灸其核各一壯與  
 桂枝加桂湯  
 桂枝二兩 芍藥 生薑各一 甘草兩  
 六棗六枚

些後  
 右吹咀每服五錢水煎溫服桂枝加桂以能  
動氣發汗則氣上衝正在心端論見  
動氣 太陽下後其氣上  
 衝者可與桂枝湯方用前法若不上衝者不可與之  
 傷寒吐下後心下逆滿氣上衝胃頭眩脈沉緊若發汗則  
 動經身為振搖者茯苓白朮甘草湯論見戰振  
方見振搖 傷寒吐  
 下後發汗虛煩脈甚微八九日心下痞鞭脇下痛氣上衝  
 咽喉眩身經脈動惕者久而成痿  
 氣上衝心續法  
 雜方 活李根湯治氣上衝正在心端  
 半夏 當歸 芍藥 生薑  
 茯苓 桂枝 黃芩 甘草  
 甘李根白皮各等分  
 右吹咀每服五錢水煎溫服

厥陰者

汗下後  
飢不欲  
食者陽  
症

厥陰吐

飢不欲食

飢不欲食則吐蚘者厥陰病論見氣上中手足厥冷脈作

厥心煩飢不能食者邪在胸中宜瓜蒂散吐之論見厥

太陽病吐發汗出發熱不惡寒關脈細數腹中飢口不能

吐蚘虫

食朝暮吐者此為小逆論見發熱陽明病下後心中懊憹飢

不欲食但頭汗出者宜梔子豉湯論見煩

氣上衝心疼飢不欲食吐蚘者厥陰病論見氣上中靜而復

厥

煩須臾復止得食而嘔又煩土蚘虫者為蚘厥宜烏梅丸

先提後

太陰註云耳聾者少陽

傷寒二日至四五日而厥者

病發縮而厥者厥陰病必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥

應下之而反發汗者必口傷爛赤成無已云若始得之

手足便厥而不溫者是陰經受邪陽氣不足可用四逆湯

溫之若手足自熱而至溫從四逆而至厥者傳經之邪也

四逆散主之必須識此勿令誤也四逆湯方見下利又當

外症別予嘗治一中年婦人惡熱身熱而渴脈數細弱

先厥後熱用溫藥反劇後以四逆散兼參朮各半服之厥

愈服出洪大而痊

手足厥寒脈細欲絕者宜

當歸四逆湯

甘草

通草各六錢

當歸

桂枝

細辛

芍藥各一兩

右投咀每服五錢入棗子一枚同煎溫服

若其人內有久寒者宜當歸四逆加茱萸生薑湯主之於原方內加茱萸黃二兩生薑二兩半嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之

脈滑厥者宜灸

傷寒脈滑而厥者裏有熱也白虎湯主之

脈逆厥者宜灸

傷寒脈促手足厥逆者可灸之脈逆云可灸少陰厥陰主逆傷寒六

脈緊促者宜吐

七日脈微手足厥冷煩躁灸厥陰灸而不止者死病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胃中心中滿而煩飢不能食者病在胃中當吐之宜瓜蒂散脈緊一作脈結者有理脈未

脈沉而厥

數時一止復來曰從脈來緩時一止復來曰結結促二脈者脈為邪礙而歇止也灸之吐之所以逐去其邪也

脈沉而厥

少陰病身痛手足寒脈沉者宜附子湯論見傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞭脈細

脈沉而厥

者此為陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外症悉入在裏此為半在裏半在表也脈雖沉緊不為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解

者此為陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外症悉入在裏此為半在裏半在表也脈雖沉緊不為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解

本有久患傷寒五六日頭汗自出自頸以下無汗手足冷心下痞悶大便秘結或者見四肢冷又汗出滿悶以為陰症予診其脈沉而緊予曰此症誠可疑然大便秘結非虛結也安得為陰脈雖沉而緊為少陰症多是自利未有秘結者此症半在裏半在表投以小柴胡湯得愈仲景稱傷寒五六日頭汗出云云至得屎而解正此之謂也有久難曰脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰不得有汗何也今頭汗出者故知非少陰何以頭汗出便知非少陰症予

曰此一段正是仲景議論處謂四肢冷脈沉緊腹滿全似少陰然大便鞭頭汗出不得為少陰蓋頭者三陽同聚在三陰止而還有頭汗出自是陽虛故曰汗出為陽微是陰不得有汗也若少陰頭有汗則死矣故仲景平脈法云心者火也明少陰則無頭汗者可治有汗者死心為手少陰腎為足少陰相與為上下惟以望息逆志者斯可得之傷寒厥而心中悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬心胃必作利也

茯苓 桂枝各二錢 生薑三錢 甘草一錢  
右咬咀水煎溫服  
少陰病四逆或悸者四逆散加桂枝主之方論見傷寒  
脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲

致其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草姜湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒針者四逆湯主之  
甘草乾姜湯 甘草四兩 乾姜二兩  
右咬咀每服五錢水煎溫服  
芍藥甘草湯 芍藥四兩 甘草二兩  
右咬咀每服五錢水煎溫服  
調胃承氣湯方見發熱四逆湯下利  
問曰症象陽且按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脰拘急而譫語師曰言夜半手足當溫兩脚當伸後如師言何以知此答曰尺寸浮而大浮則為風大則為虛風則生微熱虛則兩脰攣急症象桂枝因加附子參其間增桂令汗出

附子温經回陽故也厥逆咽中乾煩躁陽明內結譫語煩  
亂更飲甘草乾姜湯夜半陽氣還兩足當熱脛尚微拘急  
重與芍藥甘草湯乃脛伸以承氣湯微瀉則止其譫語故  
知病可愈少陰病食久則吐復不能吐手足寒脈弦遲  
者宜吐之論見

下利而厥

下利而厥下重者四逆加雞白脈微者通脈四逆湯白通  
湯温後無脈者白通加猪膽汁湯汗後拘急者四逆湯下  
後咽不利者麻黃升麻湯方論見

吐利厥

吐利發熱惡寒汗出而厥者屬霍亂宜四逆湯吐利煩  
躁欲死而厥者屬少陰宜吳茱萸湯吐利止脈微欲絕  
而厥者通脈四逆加猪膽汁湯方論見

濕而厥

中暑口乾而渴治法見中暑門傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此為

瀉元氣

藏厥非為蛇厥也蛇厥者其人當吐蛇今病者靜而復時  
煩此為藏寒蛇止入脈故煩須更復止得食而嘔又煩者  
蛇聞食臭出其人當自吐蛇蛇厥者宜  
烏梅丸主之

烏梅七十箇

細辛

附子炮去

人參

黃柏

桂枝各一

乾薑二

黃連四

蜀椒炒去汗當歸

右九味共為細末以苦酒漬烏梅一宿去核蒸熟杵成  
泥和藥令相得油白中加煉蜜杵三千下丸如桐子大  
食前服十九日三服稍加至二十九日忌生冷滑物等  
凡厥者陰陽氣不相順接便為厥厥者手足逆冷是也  
傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病為進寒多熱少陽  
氣退故為進也傷寒發熱四日厥反三日厥少熱多其

診

病當自愈四日至七日熱不除者其後必便膿也 傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能食今反能食恐為除中食以索餅不發熱者知胃氣尚在必愈恐胃熱未而復去也後三日脈之其熱續在者期之且日夜半愈所以然者本發熱六日厥反九日復發熱三日侷前木日亦為九日與厥相應故期之且日夜半愈後三日脈之而脈數其熱不罷者此為熱氣有餘必發瘧也 傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥終不過五日以熱五日故知自愈 傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便利色白者此熱除也欲得食其病為愈若厥而嘔胃膈煩滿者其後必便血 少腹滿痛而厥為冷結 關元論見少 少陰四逆惡寒身踈無脈不煩而躁論見欲寐

忌 少陰病但厥無汗而強發之必動其血論見欲寐 諸四逆厥者不可汗之諸虛家亦然 傷寒五六日不結胸腹濡脈虛復厥者不可下此為亡血下之者死

右厥逆皆忌下惟前條先熱者必厥厥應下之而反致汗者下法宜下忌汗之

厥續法

冷厥 活冷厥者初得病日便四肢逆冷脈沉微而不數足多攣臥時惡寒或自引衣蓋覆不飲水或下利清穀或滿便自調或小便數外症多惺惺而靜脈雖沉實按之遲而弱者知其為冷厥也四逆湯理中湯通脈四逆湯當歸四逆湯當歸四逆加茱萸生薑湯白通加猪膽汁湯隨症用之 熱厥 熱厥者初中病必身熱頭痛外別有陽症二三日至四五日方發厥兼熱厥者厥至半日却身熱蓋熱氣深方能發

厥須在三三白後也若微厥却發熱者熱深故也其脈雖伏按之而滑者為裏熱其人或畏熱或飲水或揚手擲足煩躁不得眠大便秘小便赤外症多昏憤者知其熱厥也白虎承氣湯隨症用之

失下變

又有下症悉具而見四逆者是失下後血氣不通四肢便厥醫人不識却疑陰厥復進熱藥禍如反掌大抵熱厥須脈沉伏而滑頭止有汗其手雖冷時復指爪溫須便承氣湯下之不可拘忌也

脈沉疾有力宜下沉遲無力宜溫

海厥陰症四肢厥冷爪甲青脈沉疾按之有力者為陽則當下宜大承氣湯如脈沉遲按之無力者為陰則當溫宜四逆湯更須速灸之

天寒宜熱之

羅省椽曹德裕男婦二月初病傷寒八九日請予治之脈得沉細而微四肢逆冷自利腹痛目不欲開兩手常抱掖

下昏昏嗜臥口舌乾燥乃曰前醫白虎加入參湯可服否予曰白虎雖云治口燥舌乾若只此一句亦未必然此症不可服白虎者有二傷寒症云立夏以前立秋以下不可妄用一也太陽症無汗而渴者不可用二也况病人陰症悉具其時春氣尚寒三也仲景云下利清穀急常救裏宜四逆湯五兩人參一兩生薑十餘片連鬚蔥白九莖水五大盞同煎至三盞去渣分三服一且服之至夜則止手足溫翠白大汗而解繼之以理中湯數服而愈孫真人習業論云凡欲為大醫必須精讀甲乙素問黃帝鍼經明堂流注十二經絡三候九部本草藥性仲景叔和並須精熟如此方為大醫不爾猶無目夜遊動致顛殞執此用藥者再思可笑

天執症

陽症治驗

真定府趙吉夫年三十三至元五月間因勞

醫家類書卷五  
李  
役飲食失節傷損脾胃時發煩躁而渴又食冷物過度遂  
病身體困倦頭痛四肢逆冷嘔吐而心下痞醫人不察見  
其四肢逆冷嘔吐而心下痞乃用桂枝末二錢七熱酒調  
下仍以綿衣覆之作陰毒傷寒治之須臾汗大出汗後即  
加口乾舌澀眼白時紅項強硬肢體不柔和小便淋赤太  
便秘澀循衣摸床如發狂狀問之則言語錯亂視其舌則  
赤而欲裂朝輕暮劇凡七八日家人輩悉謂危殆不望生  
全鄰人吉仲完舉予治之診其脈七八至知其熱症明矣  
遂用大承氣湯苦辛太寒之劑一兩作一服服之利下三  
行折其勝熱翌日以黃連解毒湯太苦寒之劑二兩徐徐  
服之以去其熱三日後病十分中減五六更與白虎加人  
參湯約半斤服之瀉熱補氣前症皆退戒以慎起居節飲  
食月餘漸得平復內經曰凡用藥者無失天時無逆氣宜

無異其勝無替其復是謂至治又云必先歲氣無伐天和  
當暑氣方盛之時聖人以寒涼急救腎水之原補肺金之  
不足雖有客寒傷入仲景云用麻黃湯內加黃芩知母石  
膏之類悉發黃發斑又用桂枝湯之戒况醫以桂末熱酒  
調服所謂差之毫釐謬以千里逆仲景之治法經云不伐  
天和替其復不翼其勝不失氣宜不然則故疾未已新  
病復起矣

天執症  
中宜治

用熱遠執從乎中治友人刘巨源年六十五歲至正夏  
月因勞役飲食失節又傷冷飲得疾醫者往往以為四時  
症治之不愈逮十日請予治之曰右手三部脈沉細而微  
太陰症也左手三部脈微浮而弦虛陽在表也太抵陰多  
而陽少今所苦身體沉重四肢逆冷自利清穀引衣自覆  
氣難布息懶言語此脾受寒濕中氣不足故也仲景言下

利清穀急當救裏宜四逆湯溫之內經有用熱遠挾之戒  
口乾但嗽水不嚥早晨身涼而肌生粟午後煩躁不欲去  
衣昏昏睡而面赤隱隱紅斑見於皮膚此表實裏虛故也  
內虛則外症隨時而變詳內外之症乃飲食勞倦寒傷於  
脾胃非四時之症明矣治病必察其下今適當未暑之時  
而得內寒之病以標本論之時為標也病為本也用寒藥  
則順時而違本用熱藥則從本而逆時此乃寒熱俱傷必  
當從平中治中治者溫之是也遂以錢氏白朮散加升麻  
就本方加葛根甘草以解其斑少加白朮茯苓以除濕而  
利小便人參藿香木香和脾胃進飲食改咀一兩煎服再  
服癡退而利止身溫而神出次服異功散治中湯辛溫之  
劑一二服五日得平止藥或曰病雖少愈勿藥可乎予曰  
藥攻邪也內經曰治病以平為期邪氣既去強之以藥

身熱而脈忽死有汗

証隨起不若以飲食調養待其真氣未復此不藥而藥不  
治而治之理旬日良愈必察其下者謙甫謂時下之宜也  
治若病人寒熱而厥面色不澤冒昧而兩手忽無脈或一  
手無脈者必是有正汗也多用綿衣裹手足令溫煖急服  
五味子湯或兼與麻黃細辛甘草湯之類服之醉時必有  
大汗而解矣

五味子湯治復寒喘促脈伏而厥

人參一分 五味子兩 麥門冬味 杏仁去皮  
生薑 陳皮各一分 棗子枚

右咬咀水煎服

針灸 摘治傷寒手足逆冷大都分 合谷 中極 支溝  
集傷寒木脈俱無復溜補大脈 復溜順骨 巨關三寸 氣衝灸七  
脈絕穴和

宜忌

活諸手足逆冷皆屬厥陰不可汗下然有須汗須下者謂手足雖逆冷時有溫時手足掌心必暖非正厥逆也當消息之

診脈病若四肢厥逆脈反浮大而短者死

少腹滿袋縮

尺寸脈微緩者厥陰受病也當六七日發其症少腹煩滿而袋縮論見木法活人云脈沉病者手足厥冷言我不結胃小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元也

少腹硬滿小便利者為畜血若兼身黃發狂者抵當湯主之身黃發狂者抵當丸但少腹急結者宜桃花承氣湯血門畜傷寒表不解乾嘔發熱而欬或小便利少腹滿者小青龍去麻黃加茯苓湯主之論見效  
心腹滿胃結胃  
少腹滿  
小便利者畜血不利者  
女畜飲  
脈沉者  
裏痛者  
厥陰脈  
滿腹脈  
者勝脈  
冷結

少腹滿袋縮續法

傷寒六七日煩滿袋縮其脈尺寸俱微緩者足厥陰肝經受病也厥陰病其脈微浮為欲愈不浮為未愈宜小建中湯脈浮緩者必衰不縮外症必發熱惡寒似瘧為欲愈宜桂枝麻黃各半湯若尺寸俱沉短者必是袋縮毒氣入腹宜承氣湯下之太抵傷寒病臟腑傳變陽經先受病故次傳入陰經以陽主生故太陽水傳足陽明土土傳足少陽木為微邪也陰主殺故水傳足太陰土土傳足少陰水水傳足厥陰木至六七日當傳厥陰肝木必移氣克於脾土脾再受邪則五臟木腑皆因而危殆榮衛不通耳左囊縮不知入而死矣速用承氣湯下之可保五生一死古人云脾熱病則五臟危又土為木賊則死若第六七日傳厥陰脈得微緩微浮為脾胃脈也故知脾氣全不受克邪無

大小便  
秘結  
引飲宜  
下大小  
便利不  
宜溫

所容否極泰未榮衛復水升火降則寒熱作而大汗解矣

海厥陰症者煩滿囊縮大小便不通發熱引飲腹滿尺寸脈微緩煩者火也滿者木也雖不吐衄囊縮但急者亦木也火與木相合四肢厥逆而爪甲青大小便不通地道塞也發熱引飲邪氣在裏宜溫之下之

已上諸症大小便俱通地道不塞不發渴不引飲邪不在裏則宜溫之灸之則裏外相接以復陽氣宜服

正陽散

麝香一錢細研性辛溫 乾薑炮 甘草炙各二錢半 附子一兩炮去皮脂味辛鹹溫 皂角二兩酥炙去皮 右為細末每服二錢白湯下溫服

回陽丹

硫黃半兩味酸溫大熱治心腹腫聚和 附子炮半兩 乾姜炮二錢半 木香半兩味辛溫療中 全蠍半兩味咸寒 藜蘆半兩味辛溫治 吳茱萸洗炒 右為末酒糊丸如桐子大生薑湯下三五十九餅二三服以熱投之衣被取汗

陰氣毒盛及陰毒

陰毒之為病面青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻鱉甲湯去雞黃蜀椒主之升麻鱉甲湯方見陽毒

陰毒續法

活陰毒甘草湯治傷寒時氣初得病一二日便結成陰毒或服藥後六七日止至十日變成陰毒身重背強腹中

活人史  
名陰毒  
傷寒主  
其要

仲景但  
各陰毒  
上發法

絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脈沉細而疾身如被杖咽喉痛五六日可治七日不可治

甘草

升麻

當歸各七錢

雄黃二錢

桂枝去皮

蜀椒炒去汗從閉五

鱉甲酥炙

右咬咀水煎服如人行五里許更進一服覆取汗毒從汗出汗出即愈若未汗再服

**本陰毒**本因腎氣虛冷因慾事或食冷物後傷風內既伏陰外又感寒或先感外寒而後伏陰內外皆陰則陽氣不守遂發腫痛腹重腹痛眼睛疼身倦怠而不甚熱四肢逆冷額上及手背冷汗不止或多煩渴精神恍惚如有所失或可起行不甚重診之則六脈俱沉細而疾尺部短小寸口或無六脈俱浮大或沉取之大而不甚疾者非陰

陰毒脈沉細疾

症也若服藥過多則濕轉甚躁轉急有此症者急服還陽退陰之藥即安惟補虛和氣而已宜服正元散退陰散五勝散陰症不宜發汗如氣正脈大身熱未瘥用藥發汗無妨

如得陰毒

正陽散治傷寒如瘧風寒吹着四肢頭自骨節疼痛急服此藥如人行五里許再服連進三服出汗立瘥若患陰毒傷寒入退陰散五分同煎或傷於傷食頭昏氣滿及心腹諸疾服之無有不效

麻黃去

陳皮

大黃生

甘草

乾薑

肉桂

芍藥

附子

吳茱萸

半夏饅絡

右咬咀麻黃加一半茱萸減一半同為末每服下錢水一盞姜三片煮一校煎七分熱服以衣被蓋覆取汗切

須候汗乾去之。如是陰毒不可用麻黃，免更出汗。  
退陰散治陰毒傷寒手足逆冷脈沉細頭痛腰重連服三  
次小小傷冷每服一字入正元散同煎入鹽一捻陰毒傷  
寒咳逆煎一服細細熱咽病止。

川烏

乾薑等分

右為麤末炒令轉色放冷再搗為細末每服一錢水一  
盞鹽一捻煎至半盞去渣溫服。

五勝散治傷寒頭痛壯熱骨節疼痛昏沈因倦咳嗽鼻塞  
不思飲食兼治傷寒夾冷氣并慢陰毒神效。

白朮半兩

甘草

五味子

石膏略

乾薑半兩

右吟咀每服五錢水一盞入鹽少許同煎服如冷氣相  
夾入薑棗煎或治陰毒病入艾葉少許煎服。

海白朮散治陰毒傷寒心悶煩躁四肢厥冷

川烏炮去

桔梗

附子炮

白朮

細辛各一兩

乾姜炮半兩

右吟咀或末之白湯調下一錢匕。

羅正陽丹治陰毒傷寒手足厥冷指甲青色體冷脈沉細  
而微神效。用蔥蔥四五枝陳蜂房四五箇燒存性為細

末用蔥蔥搗和丸如彈子大手心內握定用手帕緊繫  
定須臾汗出以綿被覆蓋如手心熱甚休教解開如服

兼先服升麻湯五錢連煎葱三莖生姜五片水一大盞  
煎至一盞去渣溫服被覆取汗則愈。

陰毒漸深而黑

本陰毒漸深候積陰感於下則微陽消於上故其候四  
肢沉重逆冷腹痛轉甚或咽喉不利或心下脹滿結硬躁  
渴虛汗不止或時時言爪甲面色青黑六脈沉細而一息

七至以來有此症者速宜於氣海關元二穴灸之三百壯以手足溫煖為效仍服金液丹末麩丹五勝散還陽散退陰散

川烏 去皮臍 於水浸七日薄切 晒乾 紙袋盛之 有患分服 壓下陰毒 所注如瘡 血相似未已 再進一服 效

還陽散治陰毒面青四肢逆冷心躁腹痛

用硫黃末新汲水調下二錢良久或寒一起或熱一起更看緊慢再服汗出瘥

返陰丹治陰毒傷寒心神煩躁頭疼四肢逆冷

硫黃兩五 附子炮去皮臍 乾姜炮 桂心各半  
硝石研 太陰女精石另研各

右用生鐵鈔先鋪玄精末一半次鋪硝石末一半中間下硫黃末又着硝石一半蓋硫黃却以玄精石末蓋上

用小盞合着用三斤炭火燒令得所勿令烟出細研似麩後三味搗羅為末與前藥同研令勻軟飯和丸如桐子大每服十五丸至二十丸煎艾湯下頻服汗出為度病重則三十九丸此方甚驗喘促與吐逆者入口便住又服此藥三五服不退者更於臍下一寸灸之須是晝夜大段不住手灸不限多少壯數灸之艾炷勿令小小則不得力若其人手足冷少腹硬即於臍下兩邊各開一寸各灸一道三處齊下火灸之仍與當歸四逆湯併返陰丹亦須頻服內外通透方得解若遲誤即死矣又若陰症加以少腹不通及陰囊縮入少腹絞痛欲死者更於臍下二寸石門穴灸之仍須與返陰丹當歸四逆湯加吳茱萸更生薑慎勿與尋常利小便滑藥火散散治傷寒惡候

舶上硫黃 黑附子去皮新臘茶各一兩  
 右為細末先用好酒一升調藥攤入新碗中於火上湯  
 乾合在在上每一碗下燒熟文一奉天以在搗起無令  
 着火直至烟盡候冷即括取研入磁盆內盛每服二錢  
 酒一盞共煎七分有火酸起勿訝傷寒陰毒者四肢冷  
 脈沉細或吐瀉五心煩躁胃中結硬或轉早伏陰在內  
 湯水不得下或無脈先喫一服如吐却更進一服服後  
 心中熱其病已瘥下至臍臍中寒解者渾身壯熱脈  
 氣淋大便宜用發表藥或表解者更不發熱便得眠睡  
 渾身有汗若少有痞結脈實方可用下膈行臟腑藥漸  
 用調和元氣補治脾胃湯散服此藥三服不應者不可  
 治也

陰毒沉困

陰毒沉困之候與前後漸染之候皆同而更加沉重不

脈宜  
忌全

脈附骨取之左有按之即無一息不至已上或不可數至  
 此則蒸餽難為功矣但於臍下灼火艾如束大三百壯以  
 末手足不和煖者不可治也倘復和煖以前硫黃及熱藥  
 助之若陰氣散陽氣味則漸減熱藥而和治之以取瘥也  
 活治陰虛陽脫体冷無脈氣息欲絕不省人事及傷寒陰  
 厥百方不效者用意以索纏如臂大切去根及葉惟存白  
 長二寸許如大餅樣先以火煖下面令通熱勿令着火乃  
 以熱面熨病人臍上連臍下又以熨斗滿貯火熨之令意  
 餅中熱氣鬱入肌肉中須更作三四餅一餅壞不可熨又  
 易一餅良久病人當甦手足溫有汗即瘥更服四逆湯以  
 溫其內

海治陰症諸藥不效併湯水不下身冷脈絕氣息短不知  
 久用蔥白熨法宜若用醞醋拌麩皮炒熟注布袋中蒸熨

此上法尤速

伏灸塗臍膏

附子

肉桂各等

馬蘭子

蛇床子

吳茱萸

右為細末可用白麩一匙菴末一匙生薑自然汁煨成膏攤布上圓三寸許貼臍下關元氣海自晚至曉其火力可代灸百壯腰痛亦可貼之。一法用丁香真擦乾薑狂礪燒灰放手心中以無津調如泥以手掩其陰至暖汗出為度。

陰毒傷寒四肢逆冷者用吳茱萸不拘多少為細末溫酒和勻生給袋盛之熱熨脚心令通暢愈若以湯煎溫藥滌洗以接四肢亦可。

除伏本治陰中伏陽破陰丹

硫黃

水銀各一兩

陳皮

青皮各半兩

右將硫黃先入銚子內鎔開次下水銀用鐵杵子打勻令無壟傾入黑茶盞內細研入一味用麩糊丸如桐子大每服三十九如煩躁冷益湯下陰症又湯下良效。

有人初得病四肢逆冷臍下築痛身疼如被杖蓋陰症也急服益液破陰來復等丹其脈遂沉而滑沉者陰也滑者陽也病雖陰症而見陽脈有可生之理仲景所謂陰病見陽脈者生仍灸氣海丹田百壯手足溫上陽回得汗而解或問滑沉之狀如何便有生理予曰仲景云翁奄沉名曰滑何謂也沉為純陰翁為正陽陰陽和合故名曰滑古人論脈滑雖曰往來前却流利旋轉替上然與數相似仲景三語而足也此三字極難辨翁合也言張而復合也故曰翁為正陽沉言忽降而下也故曰沉為正陰方翁而合俄



