

詩經綱目

卷一

八卷
四拾母



醫學綱目卷之三十二

傷寒部

合病併病汗下吐後等病

喘 身重

難轉側

遺尿

盜汗

面赤

壞病

戰慄振搖

筋惕肉瞤

又手冒心

驚悸

藏結結胸痞氣同異

結胸

痞煩

煩躁

欬

小便不利

小便難

尸厥鬱冒

噫

噦

無汗

瘧狀

頭汗

舌白胎

動氣

鼻衄

下血

唾血

畜血

吐血

短氣

心痛

除中

下重

身熱惡

寒身寒熱

瘧

瘵

狐惑

百合

合病併病汗不吐後等病

大陽與陽明合病必自下利葛根湯主之不下利但嘔者

汗金病宜



葛根加半夏湯主之

宜和 太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半

夏湯生薑湯主之

宜下 陽明與少陽合病必下利脈滑而數者有宿食也當下之

宜大承氣湯

併病宜汗

二陽併病太陽出汗不徹因轉屬陽明自汗不惡寒太陽

宜下

二陽併病太陽症罷潮熱譫語者下之則愈論見

太陽與少陽併病項強眩目心下硬如結胸者刺脅腋肝

喘

表裏

喘發熱脈浮為

太陽與陽明合病喘而胃滿者不可下麻黃湯主之

許有久病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊強身

表

乾不得臥予曰太陽陽明合病仲景云中有三證下利葛

根湯不下利嘔逆者加半夏喘而胃滿者麻黃湯也治以

麻黃湯得解

太陽病頭疼發熱身疼惡風無汗而喘者麻黃湯論見

陽明病脈浮無汗而喘者麻黃湯論見大便喘家有汗桂

枝湯加厚朴杏仁佳

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝去皮

芍藥各一

甘草炙

厚朴各六

杏仁去皮

右咬咀每服五錢水一盞半生薑五片肥棗三枚劈破

同煎至八分溫服覆取微汗

表不解乾嘔發熱欬喘者小青龍去麻黃加杏仁湯論見

陽明病潮熱汗出不惡寒短氣腹滿而喘者大承氣湯論見

微熱大腹滿小便不利

裏

不大便註云在裏而喘者小便不利大便乍難乍易微
腹滿在表而喘者腹不滿
熱喘身不能臥者大承氣湯脈沉喘滿及發汗大便難者

汗後而喘

裏實論見發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃
杏仁甘草石膏湯

麻黃兩 杏仁五十 甘草二 石膏半

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮
取二升去渣溫服一升

發汗後飲水多必喘以水灌之亦發汗汗後脈沉喘滿太
便難論見譫語者裏實論見

下後而喘

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻黃
杏仁甘草石膏湯下後利不止脈促而喘汗者葛根黃
芩黃連湯論見太陽病下之微喘者表未解故也桂枝

加厚朴杏仁湯主之

許有武臣為寇執置舟中艙板下數日得脫乘飢次食良
久解衣捫風次自遂傷寒自汗而脈不利一醫作傷食而
下之一醫作解衣中邪而汗之雜治數日漸覺昏困上喘
息高予診之曰太陽下之表未解微喘者桂枝加厚朴杏
仁湯此仲景之法也指令醫者急治藥一啜喘定再啜漿
汗出至晚身涼脈已和矣醫曰某平生不曾用仲景方
不知其神捷如此

診

傷寒吐下後不大便潮熱甚劇則不識人循衣摸床微喘
直視脈弦者生澁者死論見濕家下後額汗微喘木
小便利者死論見少陰病息高者死詳見厥利厥冷
無脈灸之不還反微喘者死詳見直視譫語喘滿者死
論見脈浮洪汗出如油髮潤喘不休者為命絕論見

喘續法

陰喘 陰證喘促者返陰丹主之四肢逆冷喘促入口便佳訪

飲水喘 病人小渴與水劇飲之致停飲心下滿結者喘死甚衆當

以五苓散或陷胃丸主之方見渴及結胃

身重 三陽合病腹滿身重難以轉側口不紅而面垢譫語遺尿

發汗則譫語下之則額上出汗手足逆冷若自汗出者白

虎湯主之

身重脈浮多眠 風溫為病脈浮汗出身重多眠鼻息鼾論見風溫宜

身重脈浮紫 陽明病脈浮緊口苦咽燥腹滿而喘發熱汗出不惡寒身

重忌汗忌燒鍼忌下論見自汗註云

身重腹滿 陽明病汗出不惡寒身重短氣腹滿而喘有潮熱者宜大

承氣湯論見不

風濕脈浮身重汗出惡風者宜

防已黃芪湯

防已刀

甘草半

白木七錢

黃芪去芦一錢

右咬咀每服五錢生薑四片大棗一枚水五升前分

溫服良久再服服後當如虫行皮中從腰下如冰後坐

被上又以一被統腰已下溫令微汗喘者加麻黃

半兩胃中不和者加芍藥三分氣上衝者加桂三

分下有沉寒者加細辛三分

中暑身重 中暑病發熱惡寒身重痛汗出足冷脈虛而渴者忌汗下

鍼宜瓜蒂散白虎

傷寒脈浮緩身不疼但重無少陰但欲寐吐利證者宜大

青龍湯

身重 下後身重心悸者不可發汗當自汗者乃解論見

身重 陰陽易為病身重少氣少腹急引陰中拘攣上衝胃眼花者燒棍湯論見陰

四肢重 少陰病腹痛小便不利四肢沉重疼痛下利者直武湯論

熱濕風 難轉側 三陽合病腹滿身重難轉側汗出者白虎湯論見

病 胃滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側者柴胡牡礪湯論見

病 風濕相搏身體煩疼不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而澁者桂枝附子湯論見

病 遺尿 三陽合病腹滿身重難轉側譫語遺尿汗出者白虎湯論

多服息 風濕病脈浮汗出者身重多眠若下之則小便不利直視

診 朱洩論見 寸口脈微而澁微者衛氣不行澁者榮氣不逮榮衛不能

相將三焦無所仰身體痺不仁榮氣不足則煩疼口難言

衛氣虛則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而吞

酢中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則迂洩

迂急 欬而小便利若失小便者不可發汗汗出則四肢厥冷

盜汗 太陽病火熨其背大汗出譫語十餘日振慄下利欲小便不得反嘔而朱洩者此為欲解也論見

盜汗 直視者此為腎絕論見 盜汗 三陽合病脈浮大見關上但欲眠睡目合則汗

盜汗 陽明病 脈但浮者必盜汗出論見 胃實成先已云陽明病常作裏

盜汗 盜汗 盜汗 盜汗 盜汗 盜汗 盜汗 盜汗 盜汗 盜汗

故也。大陽病脈浮而動數，頭痛發熱，微盜汗出而反惡寒者，表未解也。論見

成傷寒盜汗者，非若雜病之虛，是由邪氣在半表半裏使然也。何者？若邪氣一切在表，于於衛則自然汗出也。此則邪氣浸行於裏，外連表邪及睡則衛氣行於裏，乘表中陽氣不緻，津液得泄，故但睡而汗出，覺則氣散於表而汗止矣。其證悉當和表而已。

面赤

面赤燥煩，氣脈滿者，汗不徹。

二陽併病，太陽初得病時，發其汗，汗先出不徹，因轉屬陽明，續自微汗出不惡寒者，太陽症不罷者，不可下之。下之為逆，如此可小發汗，設面色緣緣正赤者，陽氣怫鬱在表，當解之，薰之。若發汗不出，不足言陽氣怫鬱，不得越，當汗不汗，其人躁煩，不知痛處，乍在腹中，乍在四肢，按之

身浮脈陰虛者

口乾不省脈者，陰毒

面赤下利，脈者為陰

不可得其人短氣，但坐以汗出不徹故也。更發汗則愈，何以知汗出不徹？以脈溢故知也。因發不透徹而面赤躁煩，此是當汗不汗也。故更發汗則愈。


脈浮而遲，面熱赤而戰慄者，六七日當汗出而解，反發熱者，瘥遲為無陽，不能作汗，其身必痒也。大陽病如瘥狀者，脈微惡寒，面反有熱色而身痒者，桂枝麻黃各半湯小汗之。論見

身熱足寒，面赤卒口噤，背反張者，瘥病也。論見

陽毒面赤斑斑如錦紋，咽喉痛，唾膿血者，宜升麻鱉甲湯。論見

少陽病下利，清穀，手足厥逆，脈微欲絕，身反不惡寒，面赤色者，通脈四逆湯加蔥白。論見

下利清穀，脈沉遲，面赤，手足微厥者，必鬱冒，汗出解。論見



陽明病面合赤色者不可攻之論見

壞病

大陽病三日已發其汗若吐若下若溫鍼仍不解者此為壞病桂枝不當與也觀其脈症知犯何逆隨証治之

壞病續法

虛 治傷寒壞症獨參湯好參一兩煎服

海陽症大汗大下後亡陽於外亡血於內上而津脫下而液脫津液兩亡宜以羊肉湯補之矧陰症者豈可不溫補哉此與傷寒太陽症振搖與真武湯一例外之陽病至此尚溫况內之陰候豈得不補耶

韓產脫血虛者宜用羊肉湯傷寒汗下太過亡陽失血若只用救逆效必遲矣與羊肉湯為效神速病人面色雖見陽是客熱上焦中下二焦陰氣已盛若調得下焦有陽則

上焦陽氣下降丹田知所歸須矣夫氣有高下病有遠近証有中外治有輕重各適其至所為故病八九日汗下太過二脈沉細無力多踈足臥惡聽人聲皮有粟時戰如瘧宜羊肉湯主之

當歸

白芍藥各一略去皮 黑附子略四錢

龍骨燒通赤

生薑二

牡礪燒赤

桂枝七錢

右為葷末每服一兩羊肉四兩蔥白五寸去黃心同剉爛以水五升升今之大盞也熬至一半以來瀘絞去渣分三服服之

戰慄振搖

虛 成戰者身為之戰搖也慄者心戰是也戰之與慄戰外而慄內也又云戰為正與邪爭則鼓慄而戰振但虛而不至爭故心聳動而振也戰之與振振輕而戰重也

汗後振

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胃起則頭眩脈沉緊發汗則重絕身爲振振搖者宜

茯苓桂枝白朮甘草湯

茯苓

桂枝

白朮

甘草

右以水五升煮五錢水一盞半煎八分去渣溫服

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動

振振欲墜地者真武湯主之

孫本乙官道士周德真患傷寒發汗出多驚悸目眩身戰

卓欲倒地衆醫有欲發汗者有作風治者有早於藥解者

皆不除自孫至曰太陽經病得汗早欲解不解者因太

陽經欲解作汗腎氣不足汗不來所以心悸目眩身轉

遂作真武湯服之三服微汗自出遂解蓋真武湯附子白

朮和其腎氣腎氣得行故汗得來也若但責太陽者惟能

乾涸血液爾仲景云尺脈不足榮氣不足不可以汗以此

知腎氣怯則難得汗也明矣許學士云鄉里有二姓高者

子年二十初得病身微汗脈弱惡風醫以麻黃藥與之汗

遂不止發熱心多驚悸夜不得眠謔語不識人筋惕肉瞤

振振動搖醫又進鎮心藥予曰強沛之過也仲景云脈微

汗出惡風不可服青龍湯服之則筋惕肉瞤此爲逆也惟

真武湯可救進此三服佐以清心竹葉湯數日遂愈

湯未考

下後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外俱虛故也

亡血家不可發汗發汗則寒慄而振太陽病火熨其

背大汗出火熱入胃發譫語中餘日振慄自下利者此爲

解也

未詳

脈字緊按之芤當戰而汗出解脈芤爲虛是以發戰脈浮

解

為在表故當汗出解也論見大法 太陽病脈陰陽俱停等必
戰慄汗出而解論見 凡柴胡症下之若柴胡症不罷者
復與柴胡湯必蒸蒸而振發熱汗出而解論見 脈浮
而遲面熱赤而戰慄者當汗出解也反發熱者脈遲不能
作汗其身必痒也論見
平居忽戰慄者初中邪 諸乘寒者則為厥論見 胃不仁口急不能言戰而慄也陰中
於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故邪中於陰也

筋惕肉瞤

汗出筋惕肉瞤若眩悸振振欲蹶地者及服大青龍湯後
厥逆者俱宜直武湯方見戰掉 若動氣在左頭汗不止
者活人用防風白朮牡朮次服建中湯論見
汗下吐溫鍼後若膚瞤動胃煩面色青黃者難治論見
若經脈動惕脈微心下痞氣衝咽喉者久而成痿論見

叉手冒心

虛發汗過多叉手冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯論
見 驚悸

虛少陽耳聾目赤脅滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚論

下后驚傷寒八九日下之胃滿煩驚小便不利譫語一身尽重不
可轉側者宜柴胡加龍骨牡朮湯

- 半夏二枚 大棗十枚 柴胡四兩 生薑五兩
 - 人參二兩 龍骨二斤 鉛丹一分 桂枝二兩
 - 茯苓各半 大黃二兩 牡朮二兩
- 右咬咀每服五錢水一斗半煎至八分去渣溫服

火逆醫

傷寒脈浮醫以火逆劫之亡陽必驚狂起臥不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡礪龍骨救逆湯主之活人云醫以火劫而或劫汗出或劫身用

桂枝蜀漆牡礪龍骨救逆湯

桂枝去皮

甘草炙

生薑切

牡礪炒

龍骨炙

大棗十二枚

蜀漆洗去腥

右吹咀每服五錢水一盞半煎至八分去香溫服

太陽傷寒者加溫鍼必驚也 風溫脈浮自汗身重多眠

若被火者微則發黃劇則如驚癇持瘰癧論風溫陽明病脈浮緊口苦咽乾腹滿若加燒針必怵惕煩躁不眠論

驚悸續法

傷寒序

虛拉

瀉茯苓丸治傷寒後或用心勞倦四肢羸弱心忪驚悸吸短氣

茯苓

麥門冬去心

熟地各一

牡丹皮

人參

黃芪各七

桂枝

甘草炙

牛膝

澤瀉各半

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大食前溫酒

下二十九

犀角湯治傷寒後伏熱在心怔忡驚悸不得眠睡

犀角屑

茵陳蒿半錢

芍藥

生地熟

麥門冬共心

山梔半

右吹咀每服五錢水一盞半薑二片竹葉三七片同煎

食後服

麥門冬茯苓飲子治傷寒後心神恍惚不得臥

麥門冬心

赤茯苓皮

知母焙

芎藭

甘草炙

酸棗仁炒

陳皮去白

檳榔各

宜道温
禁温

右咬咀每服五錢水一盞半生薑五片煎温服日三服
少陰心悸者四逆不可與也心悸者火懼水也惟腎欺心
故為心悸者是足經上手經也若與四逆湯亦無形中惡
候生矣故先以甘草茯苓湯導其濕次以四逆湯温之者
為心悸全無手經火令入足水也心悸在濕未去終至於
斃故不敢温之温之則壞矣

悸

汗后心

汗後心忪若頭眩身觸動振振欲僻地者真武湯也論
若又手自冒心者後條桂枝甘草湯也若譫語胃不
和煩悸者活人用調胃承氣湯也論見若臍下悸者後
條茯苓桂枝甘草大棗湯也發汗過多其人又手自冒
心心忪欲得按者宜
枳朮甘草湯

桂枝四錢

甘草二錢

右二味以水一盞半煎八分去香温服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚宜

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓八錢

甘草二錢

桂枝四錢

大棗二枚

右作二服以甘爛水二鍾先煮茯苓減二分納諸藥煮
取一盞去香温服日三作甘爛水法取水斗許置大盆
中以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

下後心

脈浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗
常自汗出乃解所以然者尺中脈微此裏虛須表裏實津
液自和便自汗出愈少陽病耳聾脅滿不可吐下吐下
則悸而驚者註云氣血虛往來寒熱胃腸滿脹下悸而小
便不利者小柴胡去黃芩加茯苓湯方論見在

存飲心 太陽病小便利者以飲水多必心忤小便少者必若裏
急也
傷寒二三自心中悸而煩者小建中湯主之
傷寒脈結
代心動悸宜
炙甘草湯

甘草 炙
生薑 三
人參 半
生地 一
桂枝 去
麥門冬 去心各
麻仁 合

霍亂吐利心忤者理中丸加茯苓
手足厥冷而悸者茯苓甘草湯手足逆而不溫者四逆
散加桂枝
右吐咀每服五錢水一盞半入酒半鍾煎至八分去渣
納阿膠溶盡溫服日三

臟結與結胃痞氣大同小異

小浮問曰病有結胃有臟結其狀何如答曰按之痛寸脈浮開
沉下利
利為結
胃
寸浮開
沉下利
飲食如
故為結
結
病發於
門下之
成結胃
病發於
陰下之
成痞氣
痞連在臍旁引入小腹入陰筋者此名臟結死
病發於陽而反下之熱入因作結胃病發於陰而反下之
因作痞所以成結胃者以下之太早故也 傷寒五太日
嘔而發熱者柴胡湯症具而以他藥下之柴胡症仍在者
復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗
出而解若心滿而硬痛者此為結胃也大陷胃湯主之但
滿而不痛者此為痞柴胡不中與之與半夏瀉心湯

結胃

大結胃不接而痛

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡時有潮熱從心下至小腹而痛不可近者大陷胃湯主之。太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞅則為結胃大陷胃湯主之。若不結胃但頭汗出餘處無汗卻頸而還小便不利身必發黃也。丹溪云此症曰胃中空曰短氣燥煩曰脈浮大陷胃湯不可輕用。傷寒六七日結胃熱實脈沉而緊心下痛按之實鞅者大陷胃湯主之。雲岐云三症併見皆曰西潮也。

大陷胃湯

大黃一兩半去皮為末 芒硝八錢 枳實連珠者

為細末

右水二盞煮大黃至八分去渣下硝下沸下枳實末溫服得快利止後服。

小結胃病正在心下按之則痛脈浮滑者宜小陷胃湯。

半夏湯洗

黃連一分

瓜蒌一枚用四分

右咬咀水二盞先煎瓜蒌至一盞半後用半夏黃連煎取八分去渣溫服未和再服微解下黃涎便安也。

臨工部郎中鄭君厚因患傷寒胃脹滿面黃如金色諸翰林醫官商議舉不定推讓曰胃滿可下恐脈浮虛名孫至曰諸公雖疑不用下藥鄭之福也下之必死其有工下服藥服之必瘥遂下小陷胃湯尋利其病遂良愈明日面色改白京城人稱服。

熱實結
水結胃
頭汗无
大塊

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯
但結胃無大熱者此為水結在胸脇也但頭微汗出者大
陷胃湯主之活人云水結胃小半夏加茯苓
病在陽應以活解之反以冷水噴之若灌之其熱被却不
得去強更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散
若不差者與五苓散寒實結胃無熱證者與三物小陷胃
湯此三物白散亦可

桔梗分三

巴豆一分去皮尖
焚黑研如貼

貝母分三

右三味為末納巴豆更於白中杵之以白飲和服強人
半錢贏者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱
粥一碗利過不止進冷粥一碗汗出已腹中痛與心藥
一兩

右熱實結胃及寒實結胃活人不拘寒熱但用陷胃湯

結胃項
強

不瘥用枳實理中丸應手而愈
結胃項亦強如柔痙狀下之則和宜

大陷胃丸

大黃仁

葶藶

芒硝

杏仁去皮炒
各二分

右搗羅二味納杏仁芒硝合研如脂相和為丸如彈大
後用其遂末一字白蜜少許水二盞半煎至一盞頓服
一宿乃下如不下再服 王海藏云大陷胃湯太陽之

本藥也大陷胃丸陽明藥也小陷胃湯少陽藥也太陷
胃治熱實大陷胃丸兼喘小陷胃治痞

心下滿痛如結胃狀若頭下強痛眩暈者刺大椎肝膈若
汗心後頭項強痛發熱小便不利者桂枝去桂加茯苓白
朮湯方論並
見項強

若婦人經水來熱除諸證者刺期門論見
諸語

熱入血

診

太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脈微弱者此本有寒也反下之若利止必作結胃未止者四日復下之此作協熱利也四日復下之五字衍文也太陽病下之脈浮者必結胃也論見大法太陽少陽併病而反下之成結胃心下硬下利不止水漿不下其人心煩 結胃症悉具煩躁者亦死

結胃續法

候下未成結胃者急用理中解之若誤下了初未成結胃者急煩與理中湯自然解了更不作結胃蓋理中湯治中焦故也此古人亦說不到後因人消息得之若太段轉損有厥症者兼與四逆湯便安胃中雖和復寒未退者宜候日數足可下却以承氣再下之蓋前來下之未是故也 西晉崔行功云傷寒結胃欲絕心膈高起手不得近用大陷胃湯皆不瘥者此是下後虛逆氣已不理而毒復上攻

大小

氣毒相搏結於胃者當用枳實理中丸先理其氣次療諸疾古今用之如神應手而愈

枳實理中丸治傷寒結胃欲絕心膈高起手不得近

小半枳實十六片 茯苓 人參 白朮 乾薑炮 甘草炮已上各二兩

右為末煉蜜丸如雞子黃大每服一丸熱湯化下連進二三服胸中豁然渴者加瓜蒌根一兩自汗者加牡礪二兩煨過下利亦加

海增損理中丸王朝奉云木小陷胃湯丸不愈者宜與之

人參 白朮 瓜蒌 牡礪 甘草炙各三兩 乾薑炒半兩 枳實炒二十個 黃芩去枯 右為細末煉蜜為丸如彈子大湯下盡煎服不效復與之不過五六丸胃中豁然矣用藥神速未嘗見也渴者

以半夏
其治水
結

加瓜蒌根有汗加牡礬

水結在胃脇間亦名結胃其證頭微汗出但結胃無熱者小半夏加茯苓湯小柴胡去葱加牡礬主之

按俞伯道忽患微熱心下滿頭有汗不能解衆醫以為溫病用表藥有謂食在膈者治之皆不愈及孫至曰用半夏茯苓湯遂瘥衆問其故曰頭有汗心下滿非溫症乃水結胃脇也水既去其病乃愈且如濕氣心下滿自當遍身汗若高食心滿頭豈得有汗若言是表身又不疼不惡寒表証何在故凡水結胃脇頭必有汗耳

氣寒不
通宜穿
結

小半夏加茯苓湯方見喉門穿結散太實太滿心胸高起氣塞不通者爲結也

蟾酥 麝香 輕粉 巴豆另研少許 右再研過至細以乳汗爲丸如黍米大每服二丸用薑

血結胃
宜海蛤

湯下不時服

木婦人傷寒血結胃脇脹而痛不可攤近宜海蛤散

海蛤 滑石 甘草炙 芒硝研 右末每服二錢雞子清調下

小腸通利則胃膈血散膈中血聚則小腸壅小腸壅膈中血不流行宜此方若小使血散數行更宜桂枝紅花湯發其汗則愈活人書云此方宜非仲景然其言有理姑有之 針灸治結胃灸法

巴豆十四箇 黃連十寸去皮用 右搗細津唾和成膏填入臍中以艾灸其上腹中有聲其病去矣不拘壯數病去爲度纔灸了便以溫湯浸手帕拭之恐生瘡也

摘傷寒結胃 先使人心散骨下正痛處左畔揉之以毫
針刺左畔支溝穴正坐側臂取之次刺左間使名曰雙關刺次
左行間取之針以五分此支溝行間穴下針至分數內
吸訖長呼下口氣出針即左畔一壁結胃立效右畔
依上刺之慢呼吸停針用針獲時而愈亦有不效

雲傷寒結胃痞氣 胸中結痞湧泉 太溪 中衝 太陵

心中結痞隱白 太白 少衝 神門

胃中結痞少商 太淵 大敦 太衝并上中腕瀉之

通玄結胃身黃 湧泉

摘血結胃 面赤大燥口乾消渴胃中疼痛不可忍

期門 太陵 關元雄娠不得刺關元胎死

集傷寒胸膈痛 期門 太陵

活近世治結胃 多用金針并用硫黃陽起右者若寒實結

胃或有瘕者若熱實結胸必死也

痞

心下痞 心下痞按之濡其脈閉上浮者大黃黃連瀉心湯主之活人

瀉心湯 大黃黃連瀉心湯

大黃 黃連各二 黃芩一

右咬咀以麻沸湯一升漬之一時良久絞去渣分溫再服

思寒汗出加附子 心下痞而復惡寒汗出者宜

附子瀉心湯 大黃 黃連 黃芩各一 附子一枚炮

破別煮取汁 右咬咀百沸湯一大盞熱漬之一時以絞去渣納附子

汁分溫再服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞
黃元解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃
連瀉心湯活人云表症未解心下妨悶者非痞也謂之支
薑牡礪湯主之

心下痞
悶胸
沉者半
夏瀉心

傷寒嘔而發熱者柴胡湯症具而以他藥下之若心下滿
而不痛者此為痞宜半夏瀉心湯論見結胸
痞問異

半夏瀉心湯
半夏湯洗七次 黃芩 人參 甘草各半

黃連半 大棗六枚 乾薑一

右咬咀每服五錢每一盞半煎至八分去渣溫服半夏
瀉心湯若加甘草即後條甘草瀉心湯治痞嘔噦吐利
也若加生薑即後條生薑瀉心湯治痞嘔噦氣下利也

瀉利下
後者如

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷
鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安寢見心下痞謂病不
盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故
使鞭也宜

甘草瀉心湯

甘草二 黃芩 乾薑各一 半夏一

大棗六 黃連半 人參一

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去渣溫服活人
尹陽論甘草瀉心
七味日全元入參

傷寒發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而下利者大柴胡湯
主之

痞觀表
解身涼
脇痛
下
喜極未

心下痞硬嘔逆下利者表解身涼脇痛寸裏湯主之並方論
見

利痞硬下

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有

水氣腹中雷鳴下利者宜

生薑瀉心湯

生薑二

黃芩

甘草各一

乾薑半

半夏一

黃連半

大棗六

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去香溫服

下後表

大陽病外症未除而數下之遂協熱而利利下不止心下

痞鞭表裏不解者宜

桂枝人參湯

甘草各一

白朮

桂枝半

乾薑各一

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞納桂更煮取七分

去香溫服日再服夜一服

汗下解

傷寒發汗若吐若下解後心下痞噎噫氣不除者旋覆代

赭石湯主之

旋覆代赭

人參半

生薑半

代赭石三

旋覆花一

半夏湯泡

大棗六

右咬咀每服五錢水一盞煎至八分去香溫服病解

後心下痞噎噫氣若不下利者此條旋覆代赭石湯也

若下利者前條生薑瀉心湯也

胃中痞硬氣上衝咽不得息者瓜蒂散若心下痞鞭脇痛

氣上衝咽眩暈者成瘕氣上中心

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口煩燥

小便不利者五苓散主之

痞硬氣

服浮

心下支結似痞
表未解
心下滿
似痞手
足冷

發熱惡寒身痛表症未解若心下支結妨悶者柴胡桂枝湯也左見發熱若心下痞而腹滿者即前條先以桂枝湯解後用大黃連瀉心也
心下滿似痞而手足厥冷若脈乍結乍緊心煩飢不欲食者瓜蒂散若脈沉細頭汗惡寒大便鞕者小柴胡湯論見
太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽並竭無陽則陰獨復加燒針因胃煩面色青黃膚甲者難治今色微黃手足溫易愈
脈浮而緊而反下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳
脈浮而大心下反鞕有熱屬藏者攻之不令發汗屬腑者不令溲數溲數則大便鞕汗多則熱愈甚汗少則便難若脈遲尚未可攻陽明痞胃實心下硬滿者不可攻之見論

痞續法

虛滯
痞傷寒本無痞應發汗醫反下之遂成痞枳實理中丸最良審知是痞先用桔梗枳殼湯尤妙綠桔梗枳殼行氣先用之無不驗也

桔梗枳殼湯治傷寒病氣胸滿欲絕

桔梗

枳殼楚炒去穢各二刀

右咬咀以水二盞煎至一盞去渣分二服

煩

汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反戾顛倒心中懊憹者梔子豉湯主之若少氣者梔子其草豉湯主之若嘔者梔子生薑豉湯主之陽明病下之其外有熱手足溫不結胃心下懊憹飢不能食但頭汗出者梔子豉湯主之陽明病脈浮緊若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊

膿舌上白胎者宜梔子豉湯論現 下利後煩按之心下濡者為虛煩也宜

梔子豉湯

肥梔子四箇 香豉半

右水二盞先煎梔子一盞納豉同煎取七分去香溫服得快吐止後服

梔子甘草豉湯於梔子豉湯中加甘草半兩餘依前法得吐止服 梔子生薑豉湯於梔子豉湯中加生薑一兩二

錢餘依前法得吐止後服 傷寒醫以丸藥大下之身熱不丟微煩者梔子乾薑湯主

梔子四箇 乾薑半

右二味以水一盞半煎取八分去香溫服得吐者止後

煩胃實而

服

發汗吐下後心中惶懼而煩若無燥屎大便與者此條梔子豉等湯也若有燥屎不大便者後條小承氣湯也

太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯和之愈

陽明病下之心下懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞭後必澹不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯防明

朝熱胃實不大便心煩若吐下後者此條大小承氣湯也若不吐不下者謂胃承氣也

許有人病傷寒八九日身熱無汗時時譫語時因下後大便不通三日矣非躁非煩非寒非痛終夜不得臥但心中

無曉會處或時發一聲如歎息之狀醫者未知是何症予診之曰此懊憹怫鬱二症俱作也胃中有燥屎者服承氣

湯下燥屎二十枚得利而解仲景云陽明病下之心中懊
懷微煩胃中有燥屎者可攻又云小便不利大便作難乍
易時有微熱怫鬱不臥者有燥屎也承氣湯主之素問云
胃不和則臥不安此夜所以不得眠也仲景云胃中燥大
便堅者必譫語此所以有時發譫語也非煩非躁非寒非
痛所以心中懊懷也聲如歎息而發一聲所謂外氣怫鬱
也燥屎得除大便通利胃中安和故其病悉去也

不得眠而煩論見不

胃滿而煩

胃滿而煩若不經汗兼往來寒熱者小柴胡湯方論見往

兼下利咽痛者諸膚湯方論見若汗下後往來寒熱者

柴胡桂枝薑湯方論見往兼身重不可轉側者柴胡龍

骨牡礪湯方論見驚

胃中窒而煩

發汗若下之而煩熱胃中窒者梔子豉湯主之

心下煩

心下鞅滿而煩若滿而不痛腹中雷鳴下利者甘草瀉心

湯脇痛氣衝咽胃眩者成痰方論見痞若滿痛下利不止

水漿不下者併病方論見痞

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者宜

梔子厚朴湯

梔子四枚厚朴薑製枳實切一

已上三味用水一盞半煎取八分去渣溫服得吐者止

後服

腹滿而煩

腹滿而煩若有燥屎者前條大承氣湯也若大便澹胃痛

欲吐先此時極吐下者調胃承氣湯也論見

吐後火

太陽病吐之但太陽當惡寒今反不惡寒不欲近衣此為

吐之內煩也脈之微數不可灸灸則煩逆論見

嘔時煩

嘔時鬱上微煩若與小柴胡湯嘔不止者大柴胡湯也若

極吐下後胃滿便溏腹痛者調胃承氣湯也
脈浮數而煩病欲解者必當先煩乃有汗而解論見大法 太陽病初服桂

枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈 傷寒發熱汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗宜桂枝湯

脈平後病人脈已解而日暮微煩以病新瘥人強與穀脾胃氣尚

弱不能消穀故令微熱煩損穀則愈 吐利汗後脈平小煩者以胃虛不勝穀氣也論見吐利

先煩後悸而煩若少陽汗後譫語胃不和煩悸散活人用調胃承氣湯論見口苦

先煩後煩為虛若二三白心中悸而煩者宜小建中湯論見心煩而渴

但欲寐而煩少陰病但欲寐而煩若自利而渴小便白者活人用四逆

湯論見欲寐 若與白通湯後下利不止厥逆無脈乾嘔者白通湯加猪

膽汁論見 若惡寒身倦時煩欲去衣者可治也論見但欲寐

手足厥而煩若脈乍結乍緊及心中滿飢不能食者宜瓜蒂散吐之

診若脈緊至七八日自利脈緊變暴微手足反溫者欲解也論見

方論並見下利 若下利無脈乾嘔者白通湯加猪膽汁也論見下利

煩躁有表証發熱惡寒体病脈浮緊者大青龍湯也方論見發汗

若發汗不徹太陽証不罷其人面赤燥煩短氣者更發汗則愈論見短氣

極吐下後胃滿便溏腹痛者調胃承氣湯也
脈浮數而煩病欲解者必當先煩乃有汗而解論見大法 太陽病初服桂

枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈 傷寒發熱汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗宜桂枝湯

脈平後病人脈已解而日暮微煩以病新瘥人強與穀脾胃氣尚

弱不能消穀故令微熱煩損穀則愈 吐利汗後脈平小煩者以胃虛不勝穀氣也論見吐利

先煩後悸而煩若少陽汗後譫語胃不和煩悸散活人用調胃承氣湯論見口苦

先煩後煩為虛若二三白心中悸而煩者宜小建中湯論見心煩而渴

但欲寐而煩少陰病但欲寐而煩若自利而渴小便白者活人用四逆

湯論見欲寐 若與白通湯後下利不止厥逆無脈乾嘔者白通湯加猪

膽汁論見 若惡寒身倦時煩欲去衣者可治也論見但欲寐

手足厥而煩若脈乍結乍緊及心中滿飢不能食者宜瓜蒂散吐之

診若脈緊至七八日自利脈緊變暴微手足反溫者欲解也論見

方論並見下利 若下利無脈乾嘔者白通湯加猪膽汁也論見下利

煩躁有表証發熱惡寒体病脈浮緊者大青龍湯也方論見發汗

若發汗不徹太陽証不罷其人面赤燥煩短氣者更發汗則愈論見短氣

煩燥元
表証宜
下溫

得病二三日脈弱無大陽柴胡症煩躁心下鞭至四五日
雖能食以小承氣湯少與微和之令小安至六日與承
氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭
鞭後必溏未定成鞭攻之必溏瀆小便利尿定鞭乃可攻
之宜大承氣湯王註云五太陽証為元表証也煩躁不
大便續膈痛發作有時者有燥屎也下之後復發汗日
夜煩躁不得安眠時安靜不嘔則渴無表証脈沉微身無
大熱者宜

乾薑附子湯

乾薑一
附子生用一枚

右二味以水三升煮取一升去渣頓服

海服薑附湯有二法一法當熱服手少陰心也水包火熱
服以接心火身表寒盛外火少也寒從外生熱從內消譬

如凍死寒在外也下法當寒服足少陰腎也寒邪入水冷
服以類腎水身表微熱內水多也熱從外生寒從內消譬
如飲冷寒在內也
發汗若下之病仍不解煩躁者宜
扶苓四逆湯

扶苓一

人參六

附子一枚生用去皮臍
作入片只用二片

甘草二

乾薑各二

右剉如麻豆大作一服水一盞半煎至八分去渣溫服
煩躁心下鞭若未留者即前條無太陽柴胡症以小承
氣少少微和之也若已留下心下鞭痛短氣躁煩者大陷
胃也若結胃証悉具煩躁者死也方論見
火逆下之因燒鍼煩躁者宜
桂枝甘草龍骨牡蛎湯

火逆煩
躁

煩躁心
下鞭

桂枝去皮 甘草炙 牡礪熬 龍骨略一

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去渣溫服

本陽病以火熏之不得汗其人必躁如不解必清血名爲火邪

太陽病火熨其背大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發譫語十餘日振慄下利者欲解也論見

煩躁厥逆若吐利者吳茱萸湯也論見 若下利而躁四逆脈不至死也論見 不得臥者死也論見

成所謂煩躁者謂先煩漸至躁也所謂躁煩者謂先發躁而追連復煩者也從煩至躁爲熱未有不漸煩而躁者也

先躁後煩謂怫怫然更作燥悶此爲陰盛隔陽也雖大躁

欲於泥水中臥但飲水不得入口是也此氣欲脫而爭譬如紅將滅而暴明也蓋內熱曰煩謂心中鬱煩也外熱曰躁謂氣外熱躁也內熱爲有根之火故但煩不躁及先煩後躁者皆可治外熱爲無根之火故但躁不煩及先躁後煩者皆不可治也

臟厥或煩躁方論 躁無輕定而厥者爲臟厥靜而復煩吐舌而厥者爲蛇厥烏梅丸主之方論

熱少厥微不欲食煩躁數自小便白者熱除也若欲食者愈若厥而嘔胃腸煩滿者便血論見 少陰病但欲寐不煩至五六日變自利煩躁不得臥者死論見

煩躁續法

活病人身冷脈沉細疾煩躁而不飲水者陰盛隔陽也宜服霹靂散須臾躁止得睡汗出即瘥火散散丹砂丸並主之丹砂丸方

煩燥不飲水爲陽

之見活人云

霹靂散治陰盛隔陽煩燥不飲水

附子一枚炮熟取出用冷灰拖

右為細末分作二服水二盞煎至六分臨熟入蜜半匙

放溫或冷服之須臾躁止得睡汗出即瘥

煩燥渴為上批

已寒丸此丸不僭上陽生於下治陰症服四逆薑胃中

發燥而渴者或數日大便秘小便澀亦服此丸上不燥太

小便自利

肉桂

茯苓各五錢

良薑

烏頭炮各七錢

附子炮 乾薑炮 芍藥 茴香炒各一兩

右等分為細末糊為丸如桐子大溫酒下空心服五七

十九八九十九亦得酒醋為糊俱可

煩燥大脈沉伏為中伏阻

本破陰丹治陰中伏陽煩躁六脈沉伏方論見

頃年鄉人李信道得疾六脈沉伏不見深按至骨則若有

力頭疼身溫煩躁指末皆冷胃中滿惡心更兩醫矣皆不

識止用調氣藥予診之曰此陰中伏陽也仲景法中無此

証世人患此者多若用熱藥以助之則為陰所隔絕不能

導引真陽反生寒熱用冷藥則所伏真火愈見消燼非其

治也須用破散陰氣導達真火之藥使火升水降然後得

汗而解矣予授此藥二日粒作一服冷塩湯下不時煩躁

狂熱手足躁擾其家大驚予曰俗所謂操陽也須臾稍定

畧睡身已中汗自昏達且方止身涼而病除矣

效

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎

或小便利少腹滿或喘者宜

小青龍湯

麻黃

芍藥各三錢

五味子半兩

乾薑

表不解而欲屬太陽

甘草

細辛

桂枝去皮

半夏各三錢

右咬咀每服五錢水盞半煎八分去查溫服若微利者去麻黃加芫花如彈子大熬赤色若渴者去半夏加瓜蒌根三分若噎者去麻黃加附子一錢五分炮若小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓一兩若喘者去麻黃加杏仁三分去皮尖

性來寒熱而效屬少陽

效而往來寒熱胃滿心煩喜嘔者小柴胡去人參薑棗加五味乾薑也方論見往來寒熱

表解胃實而效屬陽明

效而表解胃實屬陽明病若反無汗小便利而嘔手足厥者必頸痛若頭眩不惡寒能食者必咽痛論見胃實

但欲寐而效下利屬少陰

效而但欲寐屬少陰病若下利腹痛小便不利四肢重痛者用真武湯加五味子細辛乾薑也若下利六七日變效嘔渴不得眠者猪苓湯也若下利譫語小便難者被

火氣劫也

若四逆者用四逆散加五味子乾薑也方論並見

診

傷寒效逆上氣其脈散者死謂其形損故也效而大小便者不可發汗汗出則四肢厥冷論見廷尿

效續法

內傷外感補而散之

崇慶和尚因飽醉後發熱嗽而右脇痛渴不安眠

柴胡

黃芩

白朮

陳皮

桔梗

木通各二錢

人參

麻黃各半錢

甘草錢

右分三貼水煎服

雲傷寒汗後喘咳不止恐傳肺痿補肺散

人參錢

五味子五錢

桑白皮二錢

欬冬花

蛤蚧對

右為細末每服五錢沸湯一盞調服

肺虛氣乏宜補

傷寒汗下後咳嗽肺虛声音嘶敗者宜阿膠散

薯蕷 阿膠炒 五味子 麥門冬去心

白朮各一 乾薑炮 桂枝各二 杏仁去皮尖

右剉細末每服七錢水二盞入烏梅肉一錢同煎服

傷寒汗下後喘咳煩躁氣滯泄邪氣逆者用

桔梗湯

桔梗 桑白皮各一 甘草 貝母

訶黎勒各五錢

右為細末每服五錢入五味子烏梅肉各一錢水二盞

同煎服

小便不利

小便不利表不解若乾嘔發熱而欬少腹滿者小青龍湯

肺實氣滯宜散

小便不利

去麻黃加茯苓也方論 若汗下後仍項強發熱心下滿

痛者桂枝去桂加茯苓白朮方論 見

小便不利胃脇滿若往來寒熱未汗下者小柴胡去黃芩

加茯苓汗下後者加柴胡桂薑方論 見

身重不可轉側者柴胡湯加龍骨牡蛎也論 見

小便不利大便難乍易喘急不能臥者大承氣湯論 見

小便不利而渴若脈浮數發熱者五苓散加猪苓湯方論 見

若頭汗者柴胡桂薑湯加茵陳蒿湯方論 見

小便不利關節疼痛若痛不得屈伸汗出惡風身腫者屬

風溫宜甘草附子湯若脈沉緩大便反快者屬濕痺活人

用五苓散也方論 見

小便不利頭汗若脇滿者柴胡薑桂也方論 見

解

小便不利

小便不利

小便不利

小便不利

小便不利

小便不利身發黃方論俱見發黃
若發黃者茵陳蒿湯也
太下後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便
利必自愈活人云若大渴引飲復利之

但欲寐者陰症
小便不利但欲寐者屬少陰若腹滿下利膿血者用桃花
湯方論見腹痛下利四肢重痛者用真武湯也方論見若四
逆者用四逆散加茯苓方論見
陽明病小便不利濺然汗出者若欲食者愈不能食者欲
作痼瘕痼瘕者寒氣積結也

小便不利續法
陰症小便不利手足厥冷脈微細者不宜服利小便冷
滑藥但服返陰丹取臍下石門穴灸之方論見
傷寒小便不通取陰谷陰陵泉
傷寒後小便不利見小便不通門

小便難

汗後小便難若太陽發汗遂漏不止者則惡風小便難四
肢難屈伸宜桂枝附子湯也方論若太陽症中風以水
劫發汗則邪風被火熱血氣流溢身黃陽盛陰虛欲衄小
便難也方論見若少陰以火劫汗者則欬而下利謹語

下後小便難有二若脈遲浮弱惡風寒下之者則脇滿身
黃項強小便難也見脇痛若陽明胃實發熱惡寒脈浮緊
下之者則腹滿小便難也論見

脇痛身黃小便難若陽明胃實未下者宜小柴胡湯若下
後不食項強者忌柴胡論見
尸厥鬱冒
少陰脈不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胃膈榮氣反

聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此為尸厥當刺期門

太陽汗下後

太陽病下之不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因至胃

胃家汗出自愈所以然者汗出表和故也得裏和然後復

下利清谷

下利清穀脈沉遲其人面赤身有微熱者必鬱汗出解

喘秘

小便不利大便乍難乍易喘胃不能臥者大承氣湯

乘虛

諸乘寒者則為厥鬱胃不仁口急不能言戰慄也

心下硬

眩胃心下鞭若不汗下吐而項強者為併病宜刺大椎肺

昏

肺肝肺強

若汗下吐後脈微氣上衝咽者成痿

欲寐下利止而眩胃者死

少陰病但欲寐

尸厥鬱胃續法

熱

海傷與傳至五六日間漸變神昏不語或睡中獨語一二

句目赤唇焦舌乾不欲水稀粥與之則咽不與則不咽不

脈細數而不洪大心下無痞腹中不滿大小便如常或傳

至十日已來形貌如醉醫見神昏不已多用大承氣湯下

之則誤矣蓋不知此據傳手少陰心經也然又未知自何

經而來答曰本太陽經傷風風為陽邪傷衛陰血自燥熱

畜膀胱王病逆傳於丙丙丁兄妹由是傳心心火自上逆

熏肺所以神昏也蓋肺為清肅之臟內有次邪故令神昏

宜梔子黃芩黃連湯若脈在內者導赤散脈在外者瀉心

湯若誤用涼膈散此乃氣中之血藥也如右手寸脈沉滑

有力者則可用之或用犀角地黃湯近於是已本方所說

若無犀角以升麻代之是陽明經藥也此解陽明經血中

熱藥若脈浮沉俱有方者是丙子俱有熱可以道赤散瀉
 心湯各半服之則宜矣此症膀胱傳丙足傳手經者下傳
 正也丙傳下者表傳裏也壬傳正者良之離也越經傳者
 又為胸傳臟也活人云傷寒只傳足經不傳手經者此言
 不盡意也有從足經而傳手經者何以知之經云傷寒或
 止傳一經或間傳二經不可一途取之但視其脈與外證
 治之此活法也與食則咽者邪不在胃也不與則不思者
 以其神昏故也邪熱既不在裏誤用承氣下之其死也必
 矣脈在丙者脈浮也脈在丁者脈沉也
 脈在丙丁俱有無者浮沉俱有方也

濕咳噫而心下痞硬不利者旋覆代赭湯若下利者生薑瀉心
 湯也見方合

續法

水火相

傷寒噫氣者何氣使然答曰胃中氣不交故也少陰經
 至胃中交於厥陰水火相傳而有聲故噫氣也宜
 如聖加枳實湯

甘草

桔梗各五錢

枳實各三錢

右剉細每服五錢入五味子半錢水煎服

汗下後

傷寒汗下後喘而噫氣者宜如聖加人參藿香杏仁湯各
 分右剉細每服五錢水煎服

噦

汗下吐

傷寒大吐大下後極虛復極汗出者以其人外氣拂鬱復
 與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

飲水而

胃中虛冷不能食者飲水則噦與小承氣湯入腹中不轉
 矢氣者不可攻之攻之必脹滿不食與水則噦論見
 本渴而飲水嘔者噦食穀者噦論見陽明病胃實不能

食者攻其熱必噦論見 濕家頭汗出背強惡寒欲栗被
向火者下之早則噦論見 太陽病以火劫發汗血氣流溢身黃欲嘔頭汗腹滿譫語
甚者至噦捨衣摸床小便利者可治論見

傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈
陽明胃實脈弱浮大短氣腹滿脇痛嗜臥身黃小便難有
潮熱時時噦脈浮者小柴胡若不尿腹滿如噦者不治論見

噦續法

治寒熱 噦噦胃寒所生橘皮乾薑湯羌活附子散半夏生薑湯退
陰散主之若服藥不瘥者灸乳直下二指許三壯若婦人
則屈乳頭下盡處是穴亦有陽症者小柴胡湯橘皮竹茹
湯方見雜

橘皮乾薑湯

橘皮 通草 乾薑 桂心

甘草各三 人參二

右咬咀每服四錢水一盞煎至六分去渣溫服日三

羌活附子散方見雜

半夏生薑湯治噦飲死 半夏一 生薑二切

右水二盞煎至八分去渣溫服

傷寒欬逆脈散死 仲景之言不虛偽 大抵原因失

下生 欬逆喉中陰不內 便軟惟宜甯瀉心 便硬尤

宜大承氣 二藥神工作者誰 東垣潔古為良劑

欬逆者火熱奔急上行而肺陰不內何其當哉故便秘

者宜大承氣下之便軟者瀉心湯主之

海少陰欬逆者此失下也陰消將盡陽逆上行使陰不內

也然陰既盡陽亦將盡也吸入腎與肝陽逆上待陰入不
 內故為陽極脈微將盡者不宜下宜服瀉心湯養陰退陽
 而巳如不用瀉心湯涼膈散去硝黃清肺散亦可若脈左
 浮右沉實非表也裏極則反出於表也何以然欬逆舌強
 右脈實者知少陰裏也飲水過多心下痞而渴逆者五苓
 散主之別無惡候是也惡候生或兼以舌蠱語言不止而
 反昏冒與咽痛者少陰也速下之宜大承氣湯也何以脈
 浮為表浮之實大沉之損小是為裏也濁之實大沉之亦
 然即非表也邪入已深矣肉熱當涼反浮陽極復之表也
 陰症者內已伏陰陰氣太甚腎水極權肝氣不生胃火已
 病丁火又消所以遊行相火寒邪迫而萃集於胃中亦欲
 盡也故令人發熱大渴引飲欲去盡覆病人獨覺熱他人
 按執之身體肌肉骨髓血脈俱寒此火即無根之火也故

身寒大渴不欲近衣為

裏寒
 用丁香乾薑之類藥溫胃其火自下
 勻氣散

川烏頭大者三個炮裂去皮脂

右為細末每服三錢用黑豆二十粒砂糖同泡湯調
 乘熱細細飲之

本治陰毒吃逆方

川烏頭 乾薑 附子俱炮 肉桂

芍藥 半夏 灸甘草 吳茱萸

陳皮 各等分 大黃

右為細末每服一錢水一盞生薑三五片煎至七分去
 渣溫服

肉苳薹湯治傷寒汗後吃逆噎氣
 肉苳薹一個 石蓮肉炒 茴香各一 人參

表寒
良薑湯

丁香各半 枇杷葉五片批去毛炙
右剉細用水四盞生薑十片煎二盞去渣空心溫服分二服

橘皮

良薑

桂枝

當歸各一

麻黃半

杏仁十

甘草半

檳榔三個另

右咬咀用水四盞薑十片棗三枚同煎至二盞去渣下檳榔末再煎三沸通口服一盞未已再服老云傷寒吃逆不止是陰陽氣升降欲作汗升之不下故胃氣上逆為吃逆無体止宜服此方

無汗

無汗發熱惡寒
太陽發熱惡風寒体痛脈浮緊無汗其人若喘者麻黃湯也若煩躁者大青龍湯也 若煩者葛根湯也方論見

无汗大便不

熱 若小便少氣衝胃口禁者為剛症亦葛根湯也論見

若自衄者必自愈論見
陽明病胃家實法當多汗若反無汗者有四證脈浮而喘者邪尚在表宜麻黃汗之身如虫行痒者久虛宜建中之類小便利而厥者寒邪宜溫之小便不利發黃者必熱宜茵陳利之也論見

无汗身痒為虛

無汗身痒其人若脈微惡寒面反有熱色者桂枝麻黃各半湯也方論見 若脈浮遲面赤戰惕發熱者遲為無陽不能作汗也論見 若陽明胃實身如虫行者久虛也論見

无汗小便不利

無汗小便不利其人若身重頭汗渴飲水漿或懊憹者宜茵陳湯方論見 若身黃脇痛鼻乾嗜臥有潮熱脈浮者柴胡湯方論見 若項強發熱心下滿痛桂枝去桂加茯苓

下滿心

苓白朮也方論見

禁忌

無汗禁忌若浮緊身痛者忌桂枝論見脈浮發熱表不解者忌白虎湯論見若少陰欲寐但厥者忌強發汗必動

其血也論見凡發汗如服一劑病症尤在當再作本湯

與之至有不汗出者服三劑乃解若汗不出者死病也論見

大法

無汗續法

金多

損傷寒在表發熱惡寒頭項痛腰脊強無汗尺少脈俱浮

合谷五分候通身汗出即復溜瀉

又法 手陽明商丘 合谷 手太陽腕骨 陽谷

足少陽俠谿 足陽明厲兌 手厥陰勞宮 皆隨經辨

脈刺之 又十二經榮皆可刺

損傷寒發汗不出 風池 俠溪 魚際散脈中二 經

渠五分 肉庭應時 出汗

瘧狀

日二三
發者
桂麻各
半湯

太陽病如瘧狀一日二三度發其以若脈微緩不嘔清便者欲愈也若脈微惡寒面有熱色身痒者桂枝麻黃各半也方論見服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出必解宜

桂枝二麻黃一湯

桂枝八錢 芍藥五錢 麻黃二錢 大枣一

生薑五錢 杏仁八枚 甘草兩

右咬咀每服五錢水一斗半煎至六分去渣溫服

自晡發
者宜下
和宜汗宜

病人煩熱汗出解又如瘧狀日晡所發者屬陽明也脈實者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯 婦人寒熱經水適斷者為熱入血室其血必結故

使如瘡狀發作有時小柴胡湯主之論見婦人傷寒

頭汗

小便不利頭汗

頭汗小便不利其人若胸脇滿往來寒熱者柴胡桂薑也

方論見往來寒熱

若發黃渴飲水漿者宜茵陳湯方論見發黃

胃實頭汗

陽明胃實頭汗其人若下血譫語者為熱入血室宜刺期

門論語

若下後手足溫不結胃心中懊憹飢不欲食者

宜施子豉湯

若被火額上汗出小便不利者必發

黃也

方見胃實

心下滿頭汗

頭汗心下滿其人若脈沉細微惡寒手足冷口不欲食大

便鞭者

小柴胡湯論見厥往來寒熱

若水結胃無大熱者

大陷胃湯孫兆改用半夏茯苓湯

太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常

度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛則小便難除

陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出到頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小便利者可治關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死濕家關節疼痛下之額上汗出微喘小便利者死下利不止者亦死濕家頭汗出欲被覆向火者若下之早則噦曾滿小便不利舌上白胎也論見身痛

頭汗續法

診

凡冰結胃腸間頭必有汗治以半夏茯苓湯

治病入表實裏虛玄府不開則陽氣上出汗見於頭凡頭

汗出者五臟乾枯胞中空虛津液少也慎不可下下之謂

之重虛

成頭者諸陽之會邪搏諸陽津液上涸則汗見於頭也

海頭汗出刺頸而還血証也額上偏多者屬心部為血証

也獨益中州脾土以血藥治之其法無以加矣

舌白胎

半表半裏

舌上白胎若陽明胃實腸下滿不大便而嘔者小柴胡湯

而胃滿小便不利者丹田有熱胸中有寒也論見

診

脈陰陽俱敗者口中氣出唇口乾燥倦臥足冷鼻中涕出

舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人微發熱手足溫者

此為欲解或到八日已上反太熱者此為難治設使惡寒

者必欲嘔也腹內痛者必欲利也海藏云惡寒必欲嘔者

細沉緊舌上白胎滑者難治也若無陽症不往來寒熱其

人反靜者不可攻也論見

舌胎續法

成舌者心之官法應南方火赤紅而澤傷寒三四日已後

舌上有膜白滑如胎甚者或燥澁黃黑是數者熱氣淺深

之亂也邪氣在表者舌上即無胎及邪氣傳裏津液結搏

則舌上生胎矣寒邪初傳未全成熟或在半表或在半裡

或邪氣客於胸中者皆舌上白胎而滑也經曰舌上如胎

者以丹田有熱胸上有寒邪初傳入裡也陽明病胸下硬

滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯是邪在半表

半裡也太陽病若上之則胃中空虛客氣動膈心中懊懣

舌上胎者梔子豉湯主之是邪客於胸中也若病在藏宜

若可下如舌上滑胎者則不可攻是邪未全成熟猶帶表

寒故也

白胎

及其邪傳為熱則其舌上之胎不滑而澁也經曰傷寒七

八日不解熱結在裡表裡俱熱時時惡風大渴舌上乾燥

而煩欲飲水數升者白虎加入參湯主之是熱耗津液而滑者已乾也

黃者宜下若熱聚於胃則為之舌黃是熱已深矣金匱要畧曰舌黃未下者下之黃自去

黑者不治若舌上黑色者又為熱之極也鍼經曰熱病口乾舌黑者死以心為君主之官開竅於舌黑為腎色見於心部心部者火也腎者水也水之邪熱已極鬼賊相刑故知必死也

難垣下後病嗽加五味子麥門冬如舌上有滑胎者是胸中

有寒勿用之胸有微寒加辛熱之劑立效舌燥微如楊梅刺者用生薑切厚片蘸蜜於舌上擦之其刺立消神效無薄苛蜜治舌上白胎乾淡語話不真先以生薑厚片蘸蜜水揩洗有用薄苛自然汁與白蜜等分調勻傳之良

動氣

驚

成動氣者為藥然動跳於腹者是也動氣在右不可

發汗發汗則血而渴心苦煩飲即吐水活人云先服五苓散三服次服枳實湯動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤

活人云先服防風白朮牡蠣湯動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端活人云宜服李根湯動氣在下不可

發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼自暈惡寒食則反吐穀不能進活人云先服天橘皮湯動氣在右不可下

下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸也動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖身有熱則則欲隨動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自泄欲得水自灌動氣在下不可下下之則腹脹滿卒起頭眩食則下清穀心下痞也

動氣續法

卷之二

漢

傷寒汗下後臍左有動氣者宜

防葵散

防葵

木香不見

柴胡

黃芩各半

右剉為細末每服五錢水煎服

傷寒汗下後臍上有動氣者宜

枳殼散

枳殼炒五

赤茯苓

當歸

三稜炮各

木香

訶黎勒各五

右為末每服五錢沸湯點服

傷寒汗下後臍右有動氣者宜

前胡散

前胡

赤苓

大腹皮

人參各五

木香

檳榔

大黃

表

右為細末每服五錢沸湯點服

傷寒汗下後臍下有動氣者宜

茯苓散

赤茯苓

檳榔

桂心

大腹皮

川茴香炮

良薑各五

右為細末每服五錢沸湯點服

如久不治傳為積熱治之難痊不可汗下也

鼻衄

傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之

活人云衄後脈浮者宜麻黃湯衄後脈已微者不可行麻黃湯宜黃芩芍藥湯

太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表症仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之

不大便頭痛有熱若小便赤者承氣湯也若小

便清而衄者桂枝湯也論見 太陽病脈浮緊發熱無汗

而衄者愈也論見

虛

太陽病以火劫發汗血氣流溢失其常度陽盛則欲衄陰

虛則小便難論見 少陰病但厥無汗而強發之必動其

忌

血或從口鼻出或從目中出者難治論見 動氣發汗則

衄而渴飲水就吐論見

脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄 陽明胃實口燥但欲

漱水不咽者必衄也 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊直視不能瞬不得眠衄家不可發汗者為微脈若浮緊身寒發熱惡寒之症宜發之

鼻衄續法

海仲景言衄不可發汗者蓋為脈微也若浮緊者麻黃湯

浮緩者桂枝湯脈已微二藥不可用犀角地黄湯主之仲景云衄家不可發汗汗出必額上陷脈緊直視不能瞬不得服又云汗血不可發其表汗出即寒慄而振此二說皆為

脈微不可汗也若脈浮緊及得發者皆當發之是也

治傷寒衄血脈已微者黃芩芍藥湯犀角地黄湯主之

犀角地黄湯治傷寒應發汗而不發汗內有瘀血鼻衄吐

血面黃大便黑此方主消化瘀血

芍藥

生地

牡丹皮

犀角

右咬阻每服五錢水一盞半煎取一盞有熱如狂者加

黃芩一兩其人脈大來遲腹不滿自言滿者為無熱不

用黃芩

芩花湯治鼻衄不止用芩花尖一把以水三盞濃煎汁一

盞分三服兩度無花以根代之

若衄而渴者心煩飲則吐水先服五苓散次服芩葉湯

本治傷寒衄血滑石丸

滑石才不以多少飯丸桐子大每服十九微嚼破新水

咽下立止用菜末一錢飲少許同嚼下亦得老幼皆可
服用晦叔云鼻衄者當汗不汗所致其血青黑時不以
多少乃止宜服溫和菜以調其衛終見鮮血急以此菜
治之

下血

傷寒下血若太陽病外已解但少腹急結者桃仁承氣湯
也論見
若陽明胃實譫語者宜刺期門穴論見
太陽病以熨熏汗不得汗其人必躁而滑血論見 淋家
不可發汗發汗則便血 太陽病上之其脈浮滑者必下
血論見
少陰病但欲寐下身手足盡熱者必便血也 傷寒熱少
厥微不欲食煩躁數日小便利色白若欲食者愈若嘔而

診

胃腸煩滿者必便血也

唾血

陽明畜
咽痛吐血若面赤斑斑如錦紋者為陽毒宜升麻鱉甲湯
方論見
下後厥
逆吐血
若下後利不止手足厥逆下部脈不至者麻黃升麻湯論方

後後汗
後吐血
脈浮熱甚反灸之必咽燥唾而喘論見 服桂枝湯吐者必
吐膿血論見

畜血

太陽畜
身黃如狂屎黑喜忘者為畜血 太陽病表証在而發熱
惡寒脈反沉結而身黃發狂少腹硬滿者若小便不利為
無血也小便自利血證諦也宜以抵當湯主之論見
抵當湯

水蛭十筒熬 蜜十枚 去大黃 浸一兩湯 桃仁七枚 去皮 研
右咬咀作下服水 一盞煎七分 去渣 溫服
傷寒有熱少腹滿應示便不利 今反利者為有血也 當下
之不用餘藥宜
抵當丸

水蛭五枚 蜜五枚 去桃仁 六枚 大黃三

右為末煉蜜和作一丸 以水一盞 煎至七分 頓服時
當下血不下 再服

太陽病不解熱結膀胱其人似狂若血自下者病愈其外
未解者尚未可攻 當先解外外解但小腹急結者宜攻之
桃仁承氣湯王海藏方有薑七

桃仁十二枚 去皮尖 芒硝各半 大黃兩 甘草炙

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣入硝化開食
後服

陽明症胃家實喜忘大便黑色雖硬反易者有畜血宜抵
當湯論見

初便褐色者重再便深褐色者愈重三便黑色者為尤
重色變者以其火燥也如羊血在日色中須更變褐色矣
則漸變而為黑色即此意也當詳察之

血下後畜 病入無表裏症發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已
下脈不解胃熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血

宜抵當湯若脈數不解血下不止必協熱而便膿血也
成當 不大便六七日之際無喜忘如狂之症又無少腹鞭
滿之候何以知其有畜血蓋以其脈浮數故也浮則熱客

口燥
水不飲
咽者
血在胸

於氣數則熱客於血下後浮救俱去則病已若下後救去而浮仍在則榮血中熱去而衛氣中熱在為邪氣獨留心下善飢邪熱不殺穀潮熱反渴也若下後浮去而數不解則衛氣中熱去而榮血中熱在血熱合併迫血下行胃虛惕熱消穀善飢血至下焦若下不止則血得以泄必膿血也若不木便六七日則血不得出泄必畜在下焦為瘀血故須以抵當湯下之

病者曾滿瘡痂古言口燥但漱水不欲下咽無寒熱脈微大來遲腹不滿其人言我滿為有瘀血海云漱水不咽胸者桃仁承氣湯主之病者如熱狀煩滿口乾燥而渴其脈反無熱此為陰伏是瘀血也當下之

衄血唾血畜血續法

血分上
中下三
部

血症古人用藥雖有輕重之殊而無上下之別今分作上中下三等以衄血唾血吐血為上部血結胃中為中部畜血下焦為下部夫既有三部之分故藥亦當隨其輕重也

上部

汗多為衄血脈浮灸之咽燥為唾血當下不汗熱入於裏者為嘔血吐血此在上也犀角地黄湯主之涼膈散加生地黄亦可然衄唾嘔吐俱在上亦當以輕重分之大凡血證皆不飲水惟氣證則飲之宜詳之此證及足太陰所主脾所不裹越而上行所以有吐血嘔血之候也實者犀角地黄湯虛者黃芩芍藥湯凡病嘔吐者以脾所主故咸用芍藥主之是知太陰藥也

中部血

血結胃中 頭痛身痛漱水不咽者衄無熱胃滿漱水不飲咽者喜忘昏迷其人如狂心下不可近者血在中也

下部血

血分輕重異治

數俱去則病已若下

畜血下焦 其人發在小腹滿硬小便自利大便反黑及

臍下疼者抵當湯丸主之如狂者在中發狂者在下

抵當湯丸藥味同劑如何是二法蓋喜忘發狂身黃屎黑

者疾之甚也但小腹滿硬小便利者輕也故有湯丸之別

桃仁大黃等分水蛭蠅虫多者作湯三之二者作丸丸之

名取其數少而緩也故湯用煎服下丸止服七合也

活病人無表症不發寒熱唇燥但欲漱水不欲入咽其脈

微而沉小腹硬滿小便反利大便必黑身黃發狂此血證

諦也太抵傷寒遺汗不汗裏熱畜化為血其人喜忘而如

狂血上逆則喜忘血下畜則如狂輕者犀角地黃湯桃仁

承氣湯甚者抵當湯丸須取盡黑物為效者表症仍在也

今云无表証者但說得明明畜血為未備

輕也

海喜忘發狂身黃屎黑者疾之甚也但小腹滿小便利者

生地黃丸病人七八日後兩手脈沉細微膚冷臍下滿或

狂或躁太便實而色黑小便自利者此畜血証也若老幼

氣虛弱者宜此方主之

生地黃 自然汁一升如無生地 乾漆半斤炒

生藕 自然汁半升如無藕 藍葉一握切細乾

蛭虫二十个去翹 水蛭十个 大黃一升

桃仁半斤 右一處入水三升同慢火熬及二升放冷分二服先投

一服至半日許血未下再投之此地黃湯比抵當湯丸

其勢甚輕如無地黃與藕汁升數添水同煎抵當丸恐

用之太過不止損血故以此湯主之

吐血續法

表虛服
浮者有
麻黃參

治一貧生病脾胃虛與補劑藥愈後繼而居病室臥熱
炕咳而吐血數次予謂此久虛弱外有寒形而有火熱在
內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉裏之虛熱蓋冬
居曠室衣服單薄是重虛其陽表有大寒壅遏裏熱火邪
不得舒伸故血出於口因思仲景以傷寒脈浮緊當以麻
黃湯發汗而不與之遂成衄血却與麻黃湯立愈與此甚
同因與

麻黃人參芍藥湯

麻黃一錢去 桂枝半錢補 白芍藥一錢 黃芪一錢實
甘草一錢 五味五粒安 門冬三分保 人參三分益
氣不足而 當歸五分和
右咬咀作一服水三盞煎麻黃一味令沸去沫至二盞

執善入
衰者抵
骨桃仁

入餘藥同煎至一盞去渣服臨臥一服愈觀此一方
足以為萬世模範也蓋取仲景麻黃湯與補劑各半服
之但凡虛人合用仲景方者皆當以此為則也
傷寒吐血諸陽受邪初熱在表應發汗熱毒入經結於
五臟內有瘀積故吐血也瘀血甚者抵當湯也輕者桃仁
承氣湯熱服犀角地黃湯二黃丸

短氣

短氣表
虛

短氣骨節痛不得屈伸汗出小便不利惡風身腫者為風
濕宜甘草附子湯方論見 短氣腹滿脇痛其人若脈弦
浮大外不解無汗嗜臥身黃小便難有潮熱者小柴胡湯
也論見胃實方
見往來寒熱

短氣裏

若表未解手足濇然汗出或有潮熱者宜大承氣湯方論
若表解心下痞鞅乾嘔短氣者宜十棗湯方論

短氣牙不徹續微出不出裏表證不能面赤

者為併病更發汗則愈論見面赤

短氣心硬痛若下後心中懊憹心下硬痛者用大陷胃湯論見

跌陽脈微而咳則為寒微則為虛微緊相搏則為短氣坐而伏者短氣也論見大法

心痛

傷寒五六日下之後身熱不去心中結痛者未全解也

梔子豉湯主之

陽明病胃實脈弦浮大短氣腹滿腸下及心痛鼻乾無汗

嗜臥身黃小便難有潮熱時時噦者小柴胡湯論見胃實方見在來

寒下

心痛續在

綱傷寒飲水過多腹脹氣喘心下痛不可忍宜炙中脘氣

海正六如小腹有氣上衝者宜炙天樞氣衝三里三陰

交無此症只用前穴

除中

傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脈遲為寒今與

黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除

中必死眼睛不慧語言不出而穀食反多者此為除中

口雖欲言舌不能語凡手足厥冷而利不當食而食者

恐為除中試與索餅食之發熱者除中不發熱者非也論

門厥

下重

泄利下重若少陰症欲舉四逆者四逆湯加薤白散若熱

者曰頭翁湯方論見

脈浮宜以芩解用灸之邪無從出因火而盛病從腰已

脈浮誤灸下重

泄利下重

下必重而痺名火逆也

脈遲弱惡風寒者表在皮膚反下之遂不食腸痛身黃項

強小便難復與柴胡湯必下重論見

下利脈沉弦者下重也論見

身熱惡寒身寒惡熱

診治

病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也活人
以桂枝湯治之次以升身大寒反不欲近衣者寒在皮
膚熱在骨髓也活人云先與白虎湯加人參除熱

續增症

射干湯治初秋暴雨冷及天行暴寒其熱喜伏於內咳嗽

曲折不可得氣息喉啞失聲乾嗽無唾喉中如梗

射干兩

甘草

半夏兩

紫苑兩

杏仁兩

橘皮

肉桂

枳實各

當歸

獨活

麻黃各

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去渣溫服

續增斑

海陽症癸斑有凶有溫毒癸斑有熱病癸斑有時氣癸斑

有傷寒癸斑已上四斑活人

斑斑如錦紋或癸之四末或癸之面部或癸之背脊色紅

赤者胃熱也紫黑者胃爛也一則下早一則下晚及外感

熱病而癸也宜用玄參升麻湯白虎等藥王翰表云赤斑

斑出子死下生皆用白虎人參湯阿膠大青

龍湯兼與紫雪散大妙可下者調胃承氣湯

溫毒癸斑者初春病人肌肉癸斑癰疹如錦紋或咳心

悶但嘔者是也冬時觸冒寒毒至春始癸初病在表或已

汗吐下而表証未罷毒氣未散以此癸斑宜用黑膏注之

又有冬月溫暖人感垂灰之氣冬末即病至春或被積寒

陽斑如錦紋

溫毒癸斑咳嘔至春癸

所折毒氣不得洩至天氣暄煖溫毒始發則肌肉斑疹如
錦紋而咳心悶但嘔有清汁宜用葛根橘皮湯主之
黑膏方療溫毒發斑

生地切碎 好豉升

右二味猪膚二斤合一處煎令三分減一絞去香用雄
黃麝香如葶大為末同藥再煎服之其毒便從皮中出
者則愈忌蕪黃

葛根橘皮湯療冬溫未即病至春被積寒所折不得發至
夏得熱其寒解冬溫始發肌中斑爛癰疹如錦紋而咳心
悶但嘔吐有清汁宜服此湯即止

葛根

橘皮

杏仁去皮

知母

黃芩

麻黃湯泡

甘草炙

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去渣溫服

熱毒
發時

熱病發斑時氣發斑並同夫病人或未發汗或已經發
汗而熱毒不散表虛裏實熱毒乘虛出於皮膚所以發斑
瘡癰疹如錦紋俗名謂之痧瘡素問謂之疹大抵發斑者
不可用表藥蓋表虛裏實若發其汗重令開洩更增癰爛
也宜用玄參升麻湯大青四物湯皆賸雞子湯選用之
玄參升麻湯治傷寒發汗吐下後毒氣不能散表虛裏實
發熱於外故身發斑如錦紋其則煩躁譫語兼治喉閉腫
痛

玄參

升麻

甘草炙

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去渣熱服

大青四物湯治傷寒熱病十日已止發汗及吐利後熱不
除身上斑出

大青

阿膠

升草各一

豆豉合

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞旋入膠再煎令

猪膽雞子湯治五六月斑出

猪膽三枚

雞子一枚

苦酒三合

右三味合煎三沸強人盡服瘦人煎六七沸服之

陽毒在面

陽毒升麻湯治斑出面陽毒

消毒飲子治斑

黍粘子六分

荆芥

防風各二

甘草一分

右咬咀水煎服

陰毒如蚊咬狀

陰症發斑出曾茸又出手足亦稀少而微紅者若作熱症投之涼藥大誤矣此無根朱守之火聚於胃中上燭熏肺傳於皮膚而為斑點但如蚊蚋蚤風咬形狀而非錦紋也宜調中溫胃加茴香芍藥以大建中陰毒升麻鱉甲湯之

類其斑自退可謂治本而不治標也

湯治陰毒

大建中湯

陰毒升麻鱉甲

侯國華病傷寒四五日身微斑渴欲飲診之沉弦欲絕厥

陰脈也服溫藥數日不已又以薑附等藥覺陽微回脈生

因渴私飲水一杯脈復退又見頭不舉目不開問之則犯

陽易若只與燒裨散則寒而不濟矣遂用吳茱萸湯下

大服調燒裨散連進二服出大汗兩晝夜而愈

丹癸癘似傷寒者痰熱之病發於外汗以散之下之非理

欲眠目不閉聲啞為狐惑為蠱

狐惑之為病狀如傷寒或因傷寒而變成斯病其狀默默

欲眠目牽不得閉臥起不安更無於喉咽為惑蝕於陰肛

為狐不欲食惡聞食具其面目赤作黑乍白蝕於上部

更上更下

宣忌

則聲啞耳草瀉心湯主之方見 蝕於下部則咽乾苦參湯洗之 蝕於肛者雄黃散熏之 用雄黃一味為末取二下瓦合之燒向肛熏之

脈經云病人或從呼吸上蝕其咽喉或從下焦蝕其肛陰蝕上為惑蝕下為狐狐惑病者猪苓散主之方未考究

病者脈數無熱微煩默默但欲臥汗出初得之三四日日赤如鳩眼七八日日四皆一本皆有黃字 黑若能食者膿已成也

赤茸當歸散主之方見下血

狐惑續法

濕痰 一婦人狐惑聲啞多眠目不閉惡聞食臭不省人事半月後又手足拘強脈數而微細先與竹瀝薑汁一盞服之忽胃中有汗腹鳴即目閉首不人事速用參朮歸陳八竹瀝薑汁飲之五六貼而愈

治狐惑傷寒與濕毒皆虫証初得狀如傷寒或因傷寒變成此疾大抵傷寒腹內熱食少腸胃空虛一虫行作求食蝕人五臟及下部為蠱虫病其候齒無色舌上盡白甚者唇黑有瘡四肢沉重忽忽喜眠虫蝕其肛爛見五臟則死當數看其上下唇上唇有瘡虫蝕其臟下唇有瘡虫蝕其肛殺入甚多因下痢而得治蠱桃仁湯黃連散主之

治蠱桃仁湯

生艾

杏仁去皮尖炒

槐花子碎各

大棗十五个

右水二盞煎至一盞半分三服

黃連犀角湯治傷寒及諸病之後內有蠱出下部者

黃連半

犀角一

烏梅一

沒藥分

上唇有瘡蝕其下唇有瘡蝕其

右水二太盞半煎至二盞半分三服
雄黃銳散治下部蠱瘡

雄黃

苦參

青箱子

黃連冬三

桃仁去皮尖一分

右為散以生艾搗汁為丸如東核大約綿裹納下部蠱瘡
葉汁更嘉冬月無艾只用散綿裹納下部亦得

百合病

百脈一宗悉致其病

百合病論曰百合病者謂無經絡百脈一宗悉致病也人
常默默然意欲食不能食意欲臥不能臥意欲行不能行
或有時聞食臭或時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸
藥不能治得藥即劇吐利如有神靈者身形雖似和其人
脈微數每渴時振頭痛者六七日乃愈若渴時頭不痛漸
漸然者四十日愈若渴時快然但頭眩者二十日愈其病

診

或未病而預見或病四五日而出或病二十日或一月微
見者各隨其症治之活人云此名百合病者多因傷寒虛

百合病發汗後宜服

百合知母湯

百合七枚

知母三兩切

右先將百合水洗浸一宿當白沫出去其水更以井水
二盞煎至一盞去渣又將井水二盞另煎知母取一盞
去渣和百合一盞同煎取一盞半分溫再服

百合病下後者宜用

滑石代赭湯

百合七箇

滑石三兩碎

代赭石如彈大一枚綿裹

右先將百合水洗濯浸一宿當白沫出水更以井水二
升煎取一盞去渣另用水二升煎滑石代赭石取一升

去查後合和同前取一升半分溫服

百合病吐後宜用

百合雞子湯

散百合七枚

雞子黃一枚

右先將百合水浸一宿當白沫出去其水更以井水二

升煎取一盞去其納雞子黃攪勻煎五分溫服

百合病不經吐下發汗病形如初者宜

百合地黃湯

百合七箇

生地黃汁一升

右水洗百合浸一宿當白沫出去更以井水二升煎

取一升去查納地黃汁煎取一升五合分溫再服中病

勿更服大便當如漆黑

百合病一月不解變成滑者宜洗方主之用百合一升

以水一斗漬之宿洗身已食者餅勿以鹽鼓食之

括萎牡研散

括萎根

牡研等分

右為末飲服方寸七日三服

百合病變發熱者一作發寒熱宜用

百合滑石散

百合一升

滑石三升

右為散飲服方寸七日三服當微利止脹熱則除

宜息 百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見

陽攻陰復發其汗此以逆見陰攻陽乃復下之此亦為逆

也

醫學綱目卷之三十二

