


醫學綱目

三十一

八卷
四拾冊





醫學綱目卷之三十三

傷寒部

勞復門

陰陽易

仲景主於攻邪

大病瘥後勞復者枳實梔子豉湯主之

有食者大積

右三味以清漿水二盞煮取一盞分服枳實梔子豉取

有熱者柴胡

食肉太黃量用實加減皆傷寒瘥後更發熱者小柴胡湯主之脈浮者以汗解之沉

有水氣者滲之

實者以下解之

大病瘥後從腰以下有水氣者牡蠣澤瀉散主之

牡蠣熬

澤瀉

蜀漆洗去

商陸熬

海藻洗

括麥根

葶藶各等

右為散水服方寸匕小便利止後服日二次



胃有寒者溫之

太病瘥後喜暈久不_レ平_レ者胃上有寒當以丸藥溫之宜理中丸

氣逆欲吐者抑之

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

淡竹葉

石膏

半夏

人參

麥門冬

甘草

嘔者加生姜

右咬咀每服五錢水一盞半入粳米百餘粒煮取八分

米熟湯成去渣溫服

風家表解而不_レ了_レ工_レ且愈

勞復續法

海大哉勞者動也動非一種有內外血氣之異焉若勞乎氣則無力與精神者法宜微舉之若勞乎血與筋骨者以四物之類補之若勞在脾內為中_レ調中可已此為有形病也但見外證則謂之復病非為勞也交_レ再感風寒是也

其母

本記有人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脈弦數心不得

寧真勞復也予診之曰勞心之所致神之所舍未復其初

而又勞傷其神榮衛失度當補其子益其脾解其勞庶幾

得愈授以補脾湯佐以小柴胡湯解之或者難曰虛則補

其母今補其子何也予曰子不知虛勞之異乎難經曰虛

則補其母實則瀉其子_レ虛當補母人所共知也千金曰

心勞甚者補脾氣以益之_レ生則感之於心矣此勞則當

補子人所采聞也若母生我者也子繼我而助我者也方

治其虛則補其生我者與錦囊所謂本骸得氣遺體受陰

同義方治其勞則補其助我者與荀子言未有子富而父

貧同義此治虛與勞所以異也

補脾湯治傷寒得汗瘥後脾胃傷冷物胸膈不快尋常血

氣不和

其子

人參

白朮

甘草

橘皮去白

青皮去白

乾姜各等分

右為末每服三錢水一盞煎數沸熱服入鹽點亦得
治勞復麥門冬湯氣欲絕者用之有效能起死回生

麥門冬丹

甘草二兩

粳米

右麥門冬去心為細末水一盞煎粳米令熟去米納湯
一小盞半入藥五錢七座三枚去核新竹葉一十五片
同煎至一盞去渣溫服不能服者綿滴口中文治小兒
不能灌漿者宜用此綿滴法此方不用石膏以其三
焦無水熱也兼能欲死之人陽氣將絕者故不用石膏
若加艾參天妙

外木病後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛
乳一升水四升煎至一升如人饑稍稍飲不得多期十日

服不佳

附治驚病新起早勞食飲多致勞復欲死燒酸雷服方寸
七

活雄鼠屎湯治勞復

施子十四

雄鼠屎二七枚兩頭尖者是

枳殼三枚炒

右為細末每服四錢水一盞半入葱白二升香豉三十
粒同煎一盞分二服勿令病人知鼠屎

七味葱白湯治傷寒或因起動勞復或因吃食稍多皆成
此候若復甚者一如傷寒初有此證宜服此方

葱白連

乾葛

新豉合

生姜切一

麥門冬心

熟地三

流水四升以杓揚之

右七味用清水煎三分減二去渣分二服漸漸服之取
汗

右傷寒發熱莫若仍用丹溪以參芪歸朮加發散之劑
添之為對當也

陰陽易

虛邪

傷寒陰陽易之為病其人身體重少氣少腹裏急或引陰
中拘挛熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者燒
視散主之

燒視散取婦人中視近隱處剪燒灰以水和服方寸七日
三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子視襠燒灰
用

膏治傷寒病未平復犯房室死者命在須臾用獨參湯調
燒視散九服參二一斤餘得愈者三四人信哉用藥不可
執一也

陰陽易續法

寒熱

治熱者

治傷寒病新瘥陰陽未和因合房室則令人陰腫入腹絞
痛婦人則裏急腰膝連腹內痛名為陰陽易也其男子病
新瘥未平復而婦人與之交接得病名曰陽易婦人病新
瘥未平復而男子與之交接得病名曰陰易若一男一女
並不自相易所以呼為易者以陰陽相感動其毒著於人
如換易然其病之狀身熱衝胸頭重不能舉眼中生花四
肢拘急小腹絞痛手足拳則死亦有不即死者病苦少腹
裏急熱上衝胸頭重不欲舉百節解離經脈緩弱血氣虛
骨髓竭便恍恍惚氣力轉小着床不能動搖起止仰久
或牽引歲月方死宜燒視散殺鼠糞湯竹茹湯青竹茹湯
乾姜湯當歸白朮湯選用之海藏云熱者燒視散竹皮湯
至於最正方妙香丸條下治雜病陰陽
易中有牛黃腦射之類是治其熱症也

竹皮湯療發熱復吐腫腹中絞痛欲絕竹皮青刮丁升

用水三升，煮取一升，絞去渣，分三服，立愈。

青竹茹湯：婦人病未平復，因有所動，致熱氣衝胸，手足拘急，搖擗如中風狀，宜此湯。

瓜蒌根兩，青竹茹剉半升，淡竹是。

右以水二升，煮取一升二合，去渣，分三服。

妙香丸方見積熱條

治寒者熱

百一 治交接勞復，陰卵腫或縮入腹，腹絞痛，或便絕，或數條絞取，服之良。

海若陰陽易果，得陰脈，當隨症用之。若脈在厥陰，當歸

四逆湯，逆下燒視散。若脈在少陰，通脈四逆湯，逆下燒

視散。若脈在太陰，四順理中丸，逆下燒視散，所用之藥

各隨其經而效，自速也。

狼鼠糞湯：療傷寒病後，男子陰易。

韭白根把，狼鼠糞十四粒，丹頭大者是

右二味以水五升，煮取半升，去渣，再煎三沸，溫服，得效

未汗再服，亦理諸般勞復。

當歸白木湯：治婦人未平復，因有所動，小腹急痛，腰膝四肢不任，舉動無力，發熱者。

白朮，當歸，桂枝，附子生

甘草，芍藥，黃芪，人參各半

生姜詳

右咬咀，水煎，服食頃，再服，溫覆，取微汗，差。

李良佐：予病太陽症，尺寸脈俱浮，數按之無力，余見其內陰虛，與神朮加乾姜湯，愈後再病，余視之見神不舒，垂頭不欲語，疑其有房過問之犯，房過乎必頭重目眩，曰唯與大建中三四服，邪陽內收，脈反沉小，始見陰候，又與已寒。

加芍藥茴香等九五六服三百內約服九六七百九脈復生又用大建中湯之大汗作而解

因女色病陰証傷寒者用陳皮熱鍋內炒焦以酒烹下瀝酒飲之

四時傷寒不同

冬為傷寒 春為溫病 夏為暑病 秋為瘧

一歲長幼病相似為溫疫 多眠多汗脈浮為風溫 一

身不痛為濕 身反張為瘥

四時傷寒

陰陽大論曰春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷冽此四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏若能固密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能為病惟傷寒為毒者以其最為殺厲之氣也中而即病者為傷寒不即病者為寒毒藏於肌膚中至春變為溫病至夏變

瘟疫

為暑病暑病者熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病皆由冬時觸寒所致非時行之氣也

凡時行者春時應暖而反大寒夏時應熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也

從春分以後至秋分節前大有暴寒者皆為時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰為寒所折病熱亦微其病與溫病及暑病相似但治有殊者要在辨其病原寒熱溫二者之異則用藥冷熱之

品味判然矣

其冬有非節之暖者名冬溫冬溫之毒與傷寒大異冬溫復有先後更相重沓亦有輕重治亦不同

疫者冬溫

冬溫應常紀者有三歲少陰司

天之政五之氣陽明司天之政終之氣厥陰司天之政終之氣皆病冬濕其不應常紀而反常者則不可候之而隨時變也氣候亦有應至而不至者或有未應至而至者或易也

丹溪用

補中益

氣通治

四時傷

寒

海藏用

神木白

木通治

濕症

温

有至而太過者皆成病氣也

凡四時傷寒通宜補散故丹溪治傷寒多用補中益氣新

氣生者四君子湯加參散劑血虛者四物湯加參散劑東

垣治風濕用補中益氣加羌活防風升麻藁本蒼朮海藏

治風濕無汗者用神木湯有汗者用白米湯治剛症用神

木湯加羌活麻黃治柔症用白米湯加桂心芪米治風濕

用白米湯隨證加藥治中腸脈弦細乳遲者用黃芪湯此

皆與仲景所謂辛苦之人觸胃之病傷寒同意也

附子理中湯其議藥則得之矣曰傷曰中未有議其異同

者夫傷寒有即病有不即病因其舊有鬱熱風寒外束肌

傷寒與中寒不同

傷寒

腠自密鬱發為熱病邪循經而入以漸而深初用麻黃桂枝葦微表而安以病体不甚虛也若中寒則倉卒感受其病即發而暴因其腠理疎豁一身受邪難分經絡無熱可發温補自解此氣大虛不急治則死矣傷寒傷暑傷濕亦如傷寒之漸入也中暑中濕亦如中寒之暴受也中寒治法見卒中暴厥門冬為傷寒

春為温病

温病

從立春節後其中無暴寒又不冰雪而人有泄熱為病者此屬春時陽氣發於外冬時伏寒亦為温病春温應常紀陽司天之政初之氣太陽司天之政初之氣陽明司天之政終之氣太陰司天之政二之氣皆病温其不應常紀而

謂之傷寒也治法除濕暑瘧疾外皆傷寒法也

反常者不可候之
而隨時變易也

冬傷於寒春必溫病全文見五臟

者為溫病治見冬溫

陽脈洪數陰脈實大者遇溫熱變為溫毒論見大溫治見春發斑咳嗽為溫毒

風溫

診

發汗不解身灼熱為風溫其證脈浮汗出身重多眠蓋其病不獨見於春間故另立風溫門
尺膚熱甚脈盛躁者病溫也全文見診夫精者身之本也故

針灸

凡治溫病可刺五十九穴成註云所謂五十九穴者刺兩手內外側各二十九十二指間各一凡八痛足亦如之頭入髮際二寸傍三分各二凡六痛巔上一顛會一髮際一廉泉一風池二天柱一
內經云氣口靜人迎躁者取之若氣口人迎皆靜者勿刺

地人迎謂結喉動脈也

王大僕註素問五十九刺云刺頭上五行

五行者以越諸陽之熱逆也謂頭中行上星顛會前項百會後項五穴頭第二行兩傍

背俞此八者以瀉胸中之熱也氣街三里巨虛上下廉

此八者以瀉胃中之熱也雲門髃骨委中髓空此八者

以瀉四肢之熱也五臟俞傍五此十者以瀉五臟之熱

也謂背第五行兩傍臑戶神堂竟門意舍志室十六穴也

溫病續法

活夏至前發熱惡寒頭疼身痛其脈浮緊者溫病也春月傷寒謂之溫病冬傷於寒輕者夏至已前發為溫病蓋因春溫暖之氣而發也治溫病與夏月傷寒夏月熱病不同蓋熱輕故也升麻解肌湯最良熱多者小柴胡湯主之不渴外有微熱者小柴胡加桂枝嗽者小柴胡加五味子

仲景活人論溫不同

煩躁發渴脈實大便秘澀者大柴胡湯微利之產煩用竹葉湯次第服之
仲景謂溫病壯熱不惡寒活人謂溫病發熱惡寒各不同當以仲景為正
升麻解肌湯治傷寒溫病天行頭痛壯熱

葛根升一 黃芩 芍藥各半 甘草炙
桂心各一分 麻黃三分湯泡

汗下後過經不解亦為溫病

右收阻每服五名水一盞半末子一枚煮八分日二服三四白不解脈浮者宜重服取汗脈沉實者宜下之
傷寒汗下不愈而過經其證尚在而不除者亦溫病也經曰溫病之脈行在諸經不知何經之動隨其經所在而取之如太陽症汗下後過經不愈診得尺寸俱浮者太陽陽溫病也如身熱目疼汗下後過經不愈診得尺寸脈

中暍忌汗下溫針 惡寒身熱而渴者白虎加人參者一物

俱長者陽明溫病也 如胸脇痛汗下後過經不愈診得尺寸脈俱弦者少陽溫病也 如腹滿隘乾診得尺寸脈俱沉細過經不愈者太陰溫病也 如口燥舌乾而渴診得尺寸俱沉過經不愈者少陰溫病也 如煩滿囊縮診得尺寸俱微緩過經不愈者厥陰溫病也是故隨其經而取之隨其症而治之如發斑乃溫毒也

夏為暑病

太陽中暍者發熱惡寒身重而頭痛其脈弦細訖遲小便已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚
太陽中熱暍者其人汗出惡寒身熱而渴白虎加人參湯主之活人云夏月自汗惡寒身熱而渴面赤手足重者白虎湯主之
太陽中暍者身熱疼重而脈微弱此由夏月傷冷水水行

瓜蒂

皮中所致也一物瓜蒂湯主之
一物瓜蒂湯用瓜蒂二十七箇以水一升煮取五合去渣頓服

右瓜蒂湯後資罕用蓋其劑緩故也若果疼痛不退者亦宜用之

暑病續法

暑病有

中暑與熱病外證相似但熱病者脈盛中暑者脈虛以此別之甲乙經云脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑蓋寒傷形而不傷氣所以脈盛熱傷氣而不傷形所以脈虛又有濕溫與中暑同但身涼不渴為異耳

暑熱病用黃連香薷飲拔痰者加半夏拔虛者加參芪或用清暑益氣湯

脈共身

夏月發熱惡寒頭疼身體肢節痛重其脈洪盛者撥病

為熱病

也冬傷於寒因暑氣而發為熱病治熱病與傷寒同汗宜桂枝湯無汗宜麻黃湯加煩燥者宜大青龍湯然夏月藥性須帶涼不可太溫桂枝麻黃大青龍須用加減夏至前桂枝加黃芩半兩夏至後桂枝麻黃大青龍加知母一兩石膏二兩或加升麻半兩蓋桂枝麻黃湯性熱及煖處非西北之北夏月服之必有發黃班出之失熱病三日外與前湯不瘥脈勢仍數邪氣猶在經絡未入臟腑者桂枝石膏湯主之此方夏至後代桂枝證用若加麻黃半兩可代麻黃青龍証用也若三夏至夏為晚發傷寒梔子升麻湯亦可選用之

桂枝石膏湯治法見前論有汗脈緩為桂枝證無汗脈緊為麻黃青龍證

桂枝半兩

石膏一兩

黃芩半兩

甘草一兩

梔子錢 白芍藥 升麻 乾葛

生薑三分

右咬咀每服五錢半水一盞半煮至八分去渣食頃再服若得汗即停後服

梔子升麻湯治晚發傷寒二日至實為晚發

石膏半斤 生地半斤 梔子十四 升麻一兩 柴胡

石膏兩半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分頓服病不解更

作

服虎身 熱惡寒 為中暑

靜而得之為中暑中暑者陰證當發散也或避暑熱納涼於深堂太厚得之者曰中暑其病必頭痛惡寒身形俱急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗為房室之陰寒所逼使周身陽氣不得伸越世多以大順散主之是也每歲云

暑惡寒脈沉細靜而濕勝傷形者白虎加蒼朮湯主之大順散見局方甘草一錢半乾姜杏仁桃桂各一錢是也

動而得之為中熱中熱者陽證為熱傷原氣非形體受病也若行人或農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必

苦頭疼發躁熱惡熱捫之肌膚火熱必大渴引飲汗大泄

無氣以動乃為天熱外傷肺氣蒼朮白虎湯主之海藏云

暑身熱脈洪大動而火勝傷氣者白虎加人參湯主之

治音暑其白寒面垢手足微冷煩渴口燥倦怠四肢不痛重

其脈微弱按之無力白虎湯主之方見

不有人頭痛身熱心煩燥渴診其脈大而虛示授以白虎

湯數服愈仲景云脈虛身熱得之傷暑又云其脈弦細訖

遲何也素問曰寒傷形熱傷氣蓋傷氣不傷形則氣消而

脈虛弱所謂弦細訖遲者皆虛脈也仲景以弦為陰朱龐

亦云中暑脈微弱則虛可知

海脈虛身熱自汗惡寒者中暑也白虎加桂湯主之方見
活酒蒸黃連丸治暑毒深伏累取不瘥無藥再治伏暑發
渴者上

黃連四兩以無灰酒浸蒸乾

右為末糊丸熱水下三十九胸膈涼不滑為驗

橘皮湯治中暑痰逆惡寒

橘皮去白 生姜一斤 棗子五枚 甘草兩半

人參錢一 竹茹升半

右分五服每服水一盞二分煮取八分去查熱服

竹葉石膏湯治中暑不惡寒方見

五苓散治中暑頭痛惡心煩躁心下不快方見

海若先飲冷後傷暑者五苓散主之此必心下痞懷生薑

湯調服佳或四君子湯調中亦可中和後或小便不利或

暈中痛宜服下方

蒲黃三 滑石伍 生甘草一

中暈脈弦細菴蓮黃芪湯主之

人參 黃芪 白朮 甘草

茯苓 芍藥各等分

右咬咀每服二錢水一大盞生薑三片煎至六分去查

溫服

丹徐三官六月間發熱大汗惡寒戰慄不自禁持且煩渴

尋曰此暑病脈之皆虛微細弱而數其人好賭致勞而虛

遂以人參竹葉作湯調辰砂四苓散八貼而安

雲口開前板齒乾燥者牙乃骨之精今燥者骨熱也針藥

不能治當灸太樞穴

溼溫者兩脛逆冷胸腹滿多汗頭痛妄言其人常傷於

溼冷腹

針灸

渴而无
温者濕

濕因而中暑濕熱相搏則發濕溫其脈陽濡而弱陰小而急治在太陽不可發汗也出必不能言耳聾不知痛所在身青面色萎名曰重暈如此死者醫殺之耳白虎加蒼朮湯主之

本癸丑年故人王彥龍作毗陵倉官夏季時病胸項多汗兩足逆冷譫語醫者不曉雜進藥已經旬日予診之其脈開前濡關後數予曰當作濕溫治之蓋先受暑後受濕暑濕相搏是名濕溫先以白虎加人參湯次白虎加蒼朮湯頭痛漸退足漸溫汗漸止三日愈此名賊邪悞用藥有死之理有人難曰何名賊邪予曰難經云五邪有實邪虛邪正邪微邪賊邪從後來者為虛邪從前來者為實邪從所不勝來者為賊邪從所勝來者為微邪自病者為正邪又曰假令心病中暑為正邪中濕得之為賊邪今心先受暑

而濕和勝之水尅火從所不勝斯謂之賊邪五邪之中尤逆也難經曰濕溫之脈陽濡而弱陰小而急濡弱見於陽部濕氣搏暑也小急見於陰部暑氣蒸濕也故經曰暑濕相搏名曰濕溫是謂賊邪也不特此也予素有停飲之疾每至暑月兩足汗禁未嘗乾每服此藥二三劑即愈

右見

每濕溫汗少者白虎加蒼朮汗多者白虎加桂枝

白虎加桂枝方

孫保慶門外有酒家姓姜者善歌唱孫愛之忽數日不見使人問之則曰病久將命絕孫診之遍身皆潤兩足冷至膝下腹滿不省人事六脈皆小弱而急問其所服藥取而視之皆陰病藥也孫曰此非受病重藥能重病耳遂用五苓散白虎湯十餘貼病少甦再服全愈姜氏既安請孫謝因請問曰某得病劇蒙尚藥一治而甦願聞治法孫曰汝

病傷暑也始則陽微厥而脈小無力象醫謂陰病遂用陰藥其病愈厥予用五苓散大利小便則腹減白虎解利邪熱則病愈凡陰病脛冷則臂亦冷汝冷脛冷臂不冷則非不厥上行所以知是陽微厥也

保立夏之後至立秋處暑之間傷寒者身多微涼自汗四肢沉重謂之濕溫蒼朮石膏湯主之即白虎加蒼朮湯是也

蒼朮兩半 石膏三錢 知母半二錢 甘草一錢

右咬咀水一盞煎至一半溫服謂內有濕也多不欲飲水如身熱脈洪無汗多渴者熱在上焦積於胃中宜桔梗散此非濕溫証

桔梗散 薄荷 黃芩 甘草

梔子各一錢 桔梗三錢 連翹二錢 右剉每服五錢水煮加竹葉如大便澀加大黃半兩

消暑丹

半夏一斤 茯苓半斤 生甘草半斤

右以醋五升煮半夏盡醋熬乾姜汁作糊無覓生水為丸每服五十九丸熱水咽下精意修治用之極效中暑為患藥下即甦 傷暑發熱頭痛服之尤妙 夏月常服止渴利小便雖飲水多亦不為害應是暑藥皆不及此 若痰飲停即並用生姜湯下入夏之後不可缺此

又方消暑丸治頭疼惡心煩躁消渴霍亂

藜蘆粉四兩 石膏四兩 白礬指 硫黃各一月

水浸餅餅為丸彈子大辰砂為衣用姜汁醋點新汲水化開服之

暑風挾痰挾火實可用吐法 至龍丸治一切暑毒伏暑腹脹疼痛神効

用硫黃 硝石 滑石 明礬各一

用無根水調丸

秋為瘧

夏傷於暑秋必病瘧治法見瘧門

診

脈陰陽俱盛重於陰者變為溫瘧

非時之疫

春應暖反寒夏應熱反涼秋應涼反熱冬應寒反溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者為時行瘟疫病也論見傷寒

瘟疫續法

活一歲之中病無長幼率相似此則時行之氣俗謂之天行是也老君神明散務成子螢火丸聖散子敗毒散不拘日數淺深吐下隨症施行所以聖散子不問陰陽表裏也老君神明散治瘟疫

白朮

錢一

桔梗

分一

細辛

分一

附子

一兩炮去黑皮

烏頭

四刀炮去皮尖

右五味為粗末縫絹袋盛帶之居閭里皆無病若有疫癘者溫酒服方寸匕覆取汗得吐則瘥若經三四日抄三寸匕以水一碗煮令太沸分三服

聖散子蘇內翰序全文見活人書時毒流行用聖散子者一切不問陰陽之感連服取瘥不可與傷寒比也若疾疫之行平旦輒煮下釜不問老幼良賤各下大盞即時氣不入

草苴

十箇麩暴煨去皮

猪苓

去

石菖蒲

茯苓

良姜

獨活

去

附子

炮製去

麻黃

根去

厚朴

去皮製

藁本

芍藥

枳殼

去穰炒

柴胡

澤瀉

細辛

防風註

白木

藿香

半夏

吳茱萸湯洗

蒼朮去水

甘草各半

右咬咀每服五錢水一盞半煎取八分去渣熱服餘查

再煎空心服之

右二方治疫雖不分陰陽然亦寒多表多者宜之

丹 衆人病一般皆是謂天行時疫有宜補宜散宜降方

大黃

黃芩

黃連

人參

桔梗

防風

人中黃

滑石

香附

蒼朮

右麩糊為丸每服五七十九分氣血痰作湯使送下氣

虛者四君子湯送下血虛者四物湯送下痰多者二陳

湯送下熱甚者用童便和前藥同送下

本 葉清臘月截淡竹去青皮浸浚取汁治天行熱狂熱痰

非時之
執者察
之

禦瘟疫
法

中毒并惡瘡毒取汁浸皂角甘蔗治天行熱疾

丹 解一切災病用粉草五兩細切微炒量病人吃得多少

酒取無灰酒一處研去香溫服須臾大瀉毒亦隨出雖十

分渴亦不可飲水飲水難救

右三方執多裏多者宜之

潔 雄黃丸治疫不相染

雄黃研一丸

赤小豆炒

丹參

鬼箭羽各二

右為細末煉蜜為丸如桐子大每日空心以溫水下五

丸可與病同床共衣亦不相染矣

活 務成子螢火丸主辟疫疾惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠆諸

毒五兵白亦盜賊凶害皆辟之

螢火

鬼箭羽各一

蒺藜各一

雄黃

雌黃各二

礬石汁盡

燒羚羊角

銀電灰

鐵錘柄入銀處燒用一分半

右九味搗為散以雞子黃并雄雞冠一具和之如杏仁

大作三角縫囊盛五丸帶左臂上仍可掛於戶上

春應燠而清氣折之則實邪在肝并麻解肌湯主之溫方觀

夏應暑而寒氣折之則實邪在心調中湯射干湯半夏

桂枝甘草湯選用之

夏寒調中湯治夏月初秋忽有暴寒折於盛熱結於四肢則壯

熱頭痛寒傷於胃則下利或血或水或赤壯熱暈悶脈數

宜下之

大黃去皮三分

黃芩

芍藥

葛根

桔梗

茯苓去皮

藁本

擇真者无則川芎代之

白朮

甘草炙已上各半升

右吹咀每服五錢水一盞半煮取一盞移時再服之得

快利便止小兒減與服虛冷不壯熱但下利或霍亂者不宜服此

射干湯射干見半夏桂枝甘草湯方見

秋應涼而反大熱抑之則實邪在肺白虎加蒼朮湯茵陳

汁調五苓散白虎蒼朮湯見多

冬溫為病非其時而有其氣者冬時嚴寒君子當閉藏

而反發泄於外專用補藥帶表藥

作人中黃方以竹筒兩頭留節一節中作一竅內甘草於

中仍以竹木釘塞其竅置大糞缸內浸一月取出晒乾用

治溫毒用此藥一味入神

冬應寒而反大溫抑之則實邪在腎宜姜桂湯方見

多眠多汗脈浮為風溫

陽脈浮滑陰脈懦弱更遇於風變為風溫論規

發汗已身灼熱者名曰風溫風溫為病脈陰陽俱浮自汗

秋熱

冬溫

診

出身重多眠睡鼻息必齟語言難出若被下者小便不禁
直視失溲若被火者微發黃色則如驚滿時與癡若火
薰之逆而引日再逆促命期經云傷寒發汗已則身涼
若發汗已身仍熱者非傷
寒乃鼻
溫也

風溫續法

風溫息
發汗
風溫者脈尺寸俱浮頭疼身熱常自汗出體重鼻息必
喘四肢不收黑也但欲眠浴在少陰厥陰不可發汗發即
謔言獨語內煩躁不得臥苦驚癩目亂無精如此死者醫
殺之耳加減法風溫息發汗宜萎蕤湯身灼熱者知母乾葛湯
如渴甚者括蕤根湯脈沉身重汗出者漢防已湯
萎蕤湯治風溫兼瘡多溫及春月中風傷寒發熱頭眩痛
喉咽乾舌強胃內痞痞腰背強

葛根碎

萎蕤分

石膏碎

白芷半

麻黃

用沸湯洗去
泡半升

川芎錢

甘草兩半

杏仁

去皮尖
仁者半升

青木香錢

右吹咀每服五錢水一盞半煎半鍾日三四服

知母錢

葛根錢

石膏錢

甘草

黃芩

木香

升麻錢

萎蕤錢

南星二錢

人參

川芎錢

麻黃錢

防風

杏仁

羌活錢

右吹咀每服五錢水一盞半煎至一鍾去查服

防已錢

甘草

黃芪略

生姜分

白朮分

人參分

右吹咀每服五錢水一盞半煮取一中盞去查飲訖仍

坐被中汗出如魚行或被臥取汗出許李士云風濕誤汗用防已黃芪湯

救

海城以白木加 治風濕活人本方萎蕤湯以有麻黃不敢用宜白木湯

海城以白木加

主之方見前太陽若頭眩汗出筋惕肉瞤者加牡蠣

若腰背強硬者加羌活若舌乾發渴者加入參若身

灼熱甚者加知母若身體重多汗者加黃芪若內傷

冷者不加

一身盡痛為濕

痛而發黃為中濕痛不得轉側為風濕活人又以身痛脈

沉為中濕脈浮為風濕亦通治法見太陽病體痛門

身反張為瘥

有汗為柔瘥無汗為剛瘥治法見柔瘥門

婦人傷寒 熱入血室 姪娠傷寒 產後傷寒

濕病有

熱入血室

血結胸者刺期門

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之東垣云妄見妄聞夜夢上其人皆肝木火盛而為邪也刺期門是此又同

許學士云有婦人患熱入血室證醫者不識用補血調氣藥延養數日遂成血結胸或勸用前藥予曰小柴胡已遲

不可行也無已則有一馬刺期門穴斯可矣予不能針請

善針者治之如言而愈或問曰熱入血室何謂而成結胸

也予曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流行或遇經水適來適斷邪氣乘虛而入血室血為邪迫上入肝經肝受

邪則譫語而見鬼復入膈中則血結於胸也何以言之婦人平居水當養於木血當養於肝方未受孕則下行之以為月水既姪則中畜之以養胎及已產則上壅之以為乳

書明了
夜語
胡省小柴

皆此血也今邪氣畜血併歸肝經聚於臆中結於乳下故
手觸之則痛非湯劑可及故當刺期門也

婦人傷寒發熱經水適來晝白明了夜則譫語如見鬼狀
者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈柴胡和之

犯胃氣謂下之犯也
有一婦人温病已十二日診之其脈六七至而濇寸結

大尺稍小發寒熱頰赤口乾不了了耳聾問之病數日經

水乃行此屬少陽熱入血室也若治不對病則必死乃按

其證與小柴胡湯服之二日又與小柴胡湯加桂枝姜一

日寒熱遂止又云我臍下急痛又與抵當丸微利臍下痛

痊身漸涼脈漸勻尚不了了仍復與小柴胡湯次日又云

我但胸中熱燥口鼻乾又少與調胃承氣湯不得利次日

又云心下痛又與大陷胸丸半服利三行次日虛煩不寧

時亦有所見時復狂言雖知其尚有燥屎以其極虛不敢

攻之遂與竹葉湯去其煩熱其夜大便自通至曉兩次中

有燥屎數枚而狂言虛煩盡解但咳嗽唾此肺虛也恐乘

虛而成肺痿遂與小柴胡去人參大棗生姜加乾姜五味

子湯二日咳減二日而病悉愈以上皆用張仲景方

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為

熱入血室其血必結故如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

熱入血室續法

雲婦人傷寒中風治法與男子無異惟熱入血室妊娠傷

寒則不同也宜以四物散養胎血佐以汗下之藥治之

婦人傷寒中風自汗頭痛項背強發熱惡寒脈浮而緩恐

熱入血室故倍加芍藥桂枝加芍藥湯

桂枝半斤 赤芍藥半斤 生姜半斤 大棗六枚

頭痛熱
入血室

右劉細每服五錢水煎

婦人傷寒脈浮而緊頭痛身熱惡寒無汗發汗後恐熱入血室宜麻黃加生地黃湯

麻黃二刀 桂枝半刀 甘草半 生地黃一

杏仁二十五箇

右咬咀每服五錢水煎

活婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如瘡狂言見鬼宜用乾姜柴胡湯

柴胡四 枳實根 桂枝半刀 牡蠣兩

乾姜 甘草各

右改咀每服五錢水一盞半煎至七分去渣溫服初服微煩再服汗出而愈

熱多者柴胡生 羅小柴胡加地黃湯治婦人室女傷寒發熱經水適來或

斷晝日明了夜則譫語如見鬼神亦治產後惡露方來忽間斷欲死

柴胡一 人參二 黃芩 甘草多

半夏湯洗 生地各七

右為粗末生姜二片棗二枚同煎

雪婦人傷寒身熱脈長而弦屬陽明少陽往來寒熱夜躁晝寧如見鬼狀經水適斷熱入血室不實滿者小柴胡加

牡丹皮主之太實滿者桃仁承氣主之

小柴胡加牡丹皮湯

柴胡二 黃芩七錢 人參二 半夏六

大棗三 甘草 生姜錢半 牡丹皮二

右劉細每服一兩生姜同煎

實滿者桃仁承氣湯畜血

不實滿者柴胡牡丹皮

寒多者柴胡乾姜

桃仁承氣湯

氣柴胡
加補黃

婦人傷寒頭痛脈浮醫反下之邪氣乘虛而傳於裏經水
閉而不行心下結硬口燥舌乾寒熱往來狂言如見鬼狀
脈沉而數者當下之宜小柴胡加芒硝大黃湯主之

柴胡二

黃芩七錢

半夏一

甘草五錢

大黃

芒硝七

大棗七

生姜七錢

右剉每服一兩生姜同煎去渣下芒硝再沸溫服若脈
不沉數即不可下

瑞急者
先化痰
後除熱

本辛亥中寓居毗陵李官王仲禮其妹病傷寒發寒熱遇
夜則如鬼物所憑六七日忽昏寒涎响如乳鋸牙閉緊急
瞑目不知久疾勢極危危予視之予曰得病之初曾值月
經來否其家曰月經方來病作而經遂止一二日發寒熱
晝雖靜夜則有鬼祟從昨日涎生不省人事予曰此熱入
血室之證也仲景云婦人中風發熱惡寒經水適來晝則

自身身
涼經斷
者桂附
經花

明子夜則譫語如見鬼狀發作有時此名熱入血室醫者
不曉以剛劑與之遂致胸膈不利涎潮上脫喘急息高昏
冒不知入事當先化其痰後除其熱予急以三呷散投之
兩時頃涎下得睡省人事次授以小柴胡加地黃湯二服
而熱除不汗而自解矣

雲婦人傷寒表虛自汗身涼四肢拘急脈沉而遲太陽標
病少陽本病經水適斷桂枝加紅花湯

桂枝半

芍藥

生姜各半

甘草一

附子炮

紅花各五

右剉細各每服一兩水三盞煎服

表除汗
解經多
者甘芍
地芍

婦人傷寒太陽標病汗解表除邪熱內攻熱入血室經水
過多無滿實者甘草芍藥湯

甘草

芍藥

生地

川芎各一

大法以參芪四物為君汗下之藥佐之

右吹咀每服一兩水三盞煎至一盞半去渣入髮灰五錢調勻溫服不止者刺隱白

續增妊娠傷寒

黃芪解肌湯治婦人妊娠傷風自汗

人參

黃芪

當歸

川芎

甘草錢五

芍藥錢六

加蒼木生地亦可

右為粗末每服五錢水煎溫服無時

海若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脈浮而弱太陽經病宜表虛六合湯

四物湯

桂枝

地骨皮各七

若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈緊太陽經病宜表實六合湯

四物湯

麻黃

細辛各半

若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脈浮而熱頭痛有太

陽標病也宜風濕六合湯

四物湯

防風

蒼木製各錢

若妊娠傷寒下後過經不愈濕毒發斑如綿紋宜升麻六合湯

合湯

四物湯

升麻

連翹各七

若妊娠傷寒胸脇滿痛而脈弦少陽症也宜柴胡六合湯

四物湯

柴胡

黃芩錢七

若妊娠傷寒太硬小便赤氣滿而脈沉數陽明太陽本

病也急下之宜大黃六合湯

四物湯

大黃酒炒五錢

桃仁去皮尖十箇錢

若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜入參六合湯

四物湯

人參錢五

五味子錢五

若妊娠傷寒後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴六合湯

四物湯

厚朴

枳實錢五

若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合湯

四物湯加 梔子 黃芩各五

若妊娠傷寒大渴蒸蒸而煩脈長而大者宜石膏六合湯

四物湯加 石膏 知母各五

若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜茯苓六合湯

四物湯加 茯苓 澤瀉各五

若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六合湯

四物湯加 琥珀 茯苓各五

若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六合湯

四物湯加 阿膠 艾各五錢一方加甘草同

若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲少陰病也宜附子六合湯

四物湯 附子 桂
若妊娠傷寒畜血證各宜墮胎藥下之宜四物大黃湯下
之 四物湯加 生地 大黃 酒浸各
婦人妊娠或畜血抵當桃仁勿妄施要教子母俱無損大
黃四物對服之

安胎方 胎漏人傷風未解兩足下脛令嗽多不吐痰頭眩蓋其
性急又當臨月

黃芩 錢半 陳皮 白木 各一 蘇梗 三
木通 枳殼 炒各 麻黃 三 甘草 炙二
桔梗 蒼朮 各半 水煎服無時

湯 婦人有孕傷寒脈浮頭重腹中切痛宜桂枝芍藥當歸

桂枝 芍藥 當歸 各一

右對細末服一兩水煎
婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不化脈沉者太陰病也
宜芍藥湯

芍藥 白朮 甘草 茯苓 各一

右如前修服

活治妊娠傷寒安胎宜阿膠散

人參 白朮 阿膠 桑寄生

白朮

右搗羅為細末糯米飲調下三錢日一服

治妊娠傷寒胎宜白朮散

白朮 黃芩 各等分 新

石鍾末每服三錢水一鍾生薑白芷片木香一枚劈破同煎至七分去渣溫服但覺頭疼發熱便可服二三服向

瘥惟四肢厥冷陰症見者未可服

治妊娠傷寒憎寒發熱當發其汗宜葱白湯

葱白 薑 生薑 切

右剉水一斗煮取汁

海葱白一物湯用葱白二把以水一斗煮取汁令食盡亦主安胎若胎死須臾即出

治婦人傷寒妊娠服藥例 若發熱惡寒不離桂枝芍藥

若往來寒熱不離柴胡前胡 若太渴者不離知母芍

膏五味子麥門冬 若大便泄者不離桂附乾姜白朮

若大便燥結者不離大黃黃芩 若月經適來適斷者不

離小柴胡 若胎不安者不離人參阿膠白朮黃芩 若

發汗者不離葱豉生薑麻黃旋覆 若頭痛者不離石膏

山梔前胡 若傷暑頭痛者不離柴胡白芷石膏 若滿

雜方

悶者不離積實陳皮若胎氣不安者不離黃芩枳子升麻
人參若斑發黑者不離黃芩枳子升麻

大治妊娠時氣身太熱令子不落護胎方
伏龍肝研令極細末調塗臍下三寸乾即易瘥即止

又方井中泥塗乾即易之事有效
又方浮萍朴硝蛤粉藍根大黃燉

右為采水調傳臍上安胎解熱極妙

治妊娠霍亂附少陰 杜利門方
治妊娠發斑變為黑色宜梔子大青湯

黃芩升麻 梔子仁各二大青

杏仁各半

右咬咀每服五錢水十盞半細切葱白三寸煎至三盞

去渣溫服

產後傷寒

一表

產後中風數十日不解頭微痛惡寒時有熱心下悶乾
嘔汗出雖多陽且證耳可與陽且湯即桂枝湯方 見太陽病

產後中風發熱面赤喘而頭痛竹葉湯主之

竹葉把 葛根三 防風 桔梗

桂枝 人參 甘草各一 附子一枚

右咬咀每服五錢水一盞半煎一盞去

渣溫服覆便汗出若頭項強用大附子半錢煎藥湯去

沫嘔者加半夏一錢

產後傷寒續法

產後傷寒宜補

丹產後發熱惡寒皆屬血氣虛左手脈不足補血右手脈
不足補氣惡寒發熱又腹痛當去惡血惡寒發熱乳
汁不通及臍者無子當消用來芽二兩炒研細清湯作四

忌發表
忌苦寒

腹痛者
去活血

乳不通
者宜服
熱下乳

服調下_ス 有子當下_ス 用木通_上 草猪蹄_汁 調煎服_ス
產後纏身身熱不可發表_{并一切苦寒藥必用乾姜治之}
大發其熱_{輕則用茯苓淡滲其熱}
凡產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之_{此等多是}
血虛或敗血作梗宜以平和之劑與服必效_{如玉露散或}
四物加北柴胡等分煎服_{若便以小柴胡湯及竹葉石膏}
之類竟不救者多矣

玉露散治產後乳脈不行_{身體壯熱疼痛頭目昏痛大便}
澀滯悉治之_{涼膈厭熱下乳}

人參 茯苓 甘草各半 苦梗炒
川芎 白芷各一 當歸分 芍藥分
右咬咀每服五錢水一盞煎至七分溫服如煩熱甚太
便秘者加大黃二錢半

續增小兒傷寒

傷寒表裏攻發_{有表證惡風惡寒者當發表惡風者}
白朮散惡寒_{者神木湯} 如氣盛能食不大便無表證者可攻裏

春主溫屬木身溫當發汗_{神木湯} 夏主長屬火身熱而

煩躁合大發散_{海藏云神木湯} 長夏主化屬土及居四季

同當調其飲食_{海藏云四君子湯} 秋主收屬金身涼肉溫合微

下_{海藏云通膈} 冬主藏屬水身熱而惡寒是熱在_外而

寒在_內身寒而惡熱是熱在_內而寒在_外_{海藏云熱在內者調胃承氣湯}

寒在_內者_{調中湯丸}

凡傷寒宜依四時陰陽升降逆順剛柔而施治法_{氣升}

浮則順發之氣收藏則下之_{有汗發熱惡風脈浮緩者}

風傷衛桂枝湯 無汗發熱惡寒不當風而自憎寒脈浮

緊者寒傷榮麻黃湯 有汗發熱惡風脈浮緊無汗發熱

惡寒脈浮緩謂之榮衛俱傷，青龍桂枝麻黃各半湯。無汗發熱不惡風寒，脈沉洪者可下之。更詳認其脈與不脈，量寒熱淺深而治之。有汗四肢厥脈沉微者，名陰厥。四逆湯。無汗四肢厥脈沉微者，名陽厥。大承氣湯加膩粉。如四肢不厥身熱，內外皆陽不動，三焦宜涼藥三五服下之。黃芩甘草湯。黃芩白朮湯。黃芩蒼朮湯。黃芩梔子湯。連翹飲子。小柴胡湯。八正散。涼膈散。白虎湯。五黃散。此上中下三焦藥宜選用之。中暑脈虛皆惡寒自汗而渴者，白虎湯。身涼脈緊熱在內者，急下之。口燥咽乾不大便是也。無汗身大熱者，桂枝湯。汗上散。升麻湯。大青膏。天麻膏。有汗身大熱者，桂枝湯。汗上散。解肌湯。小柴胡湯。白朮防風湯。可選用之。發汗者量四時暄暑燥濕風寒，各宜春涼夏寒秋溫冬熱而發之。

表証

傷風貪睡口中氣熱呵欠煩悶當發散與大青膏表証也。紫舌補遺云小兒外感於風寒拘急呵欠煩悶皮毛澀也口中氣熱者當發散秋冬用溫熱藥春夏用涼寒藥。

大青膏

天麻錢一 白附子錢一 錫尾去毒生半錢 硃砂研一字
 青黛研一錢 天竺黃一字 麝香一字 烏梢蛇肉浸酒

右同研細生蜜和成膏每服半卓子或一卓子大序中兒粳米大同牛黃膏薄荷水化一處服之五歲已上同甘露散服

雄黃膏治傷風溫壯熱引飲

雄黃小末火研蘿蔔根水 甘草末 川甜硝各三分
 寒水石研細五分 腦子一字 硃砂分五
 右研勻煉蜜成膏薄荷湯化下半卓子大

右大青膏發散愈睡口氣熱可欠煩悶表症者蓋為三
歲已下小兒未能言者設也

活尋常風壅發熱鼻滯痰嗽煩渴惺惺散主之方見

海傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和者四君子加細辛
瓜蒌桔梗各一分生薑薄荷煎或加防風川芎各一分內
有寒及遇天寒欲發散者則去瓜蒌加桔梗多虛汗夜啼
者加麥門冬傷風身熱頭痛氣促者四君子加川芎防
風等分細辛羌活減半同煎

活咽喉不利痰實咳嗽鼠粘子湯

雲人參羌活散治小兒寒邪及溫氣時疫瘡疹頭痛体疼
壯熱多眠不語潮熱煩渴痰實咳嗽

羌活

獨活

柴胡

人參

芎窮

枳殼炒

甘草炙各

前胡

桔梗

天麻酒浸

地骨皮

白茯苓

右為散每服二錢水一盞入薄荷少許同煎去渣溫服
不拘時候

七寶散治時氣頭昏体熱小兒同乳母服大人亦可

紫蘇葉

香附炒各

陳皮

甘草各

桔梗

白芷

川芎

右吹咀姜煎服

海麻黃七芩湯治小兒傷寒無汗頭痛身熱惡寒

麻黃

赤芍

黃芩碎

甘草

桂枝各二

右為粗末水煎服

升麻黃芩湯治傷風有汗頭疼發熱惡風

升麻

葛根

黃芩

芍藥各五

甘草半錢

右吹咀每服二錢水煎溫服

右惺上散等藥發散頭痛發熱惡風寒表證者蓋為三歲已上小兒能言者設也能言故頭疼惡風寒可問而知也前五方通治有汗無汗惡風惡寒第五方治無汗惡寒第六方治有汗惡風

裏証

錢與大青膏不解散有下證當下大黃丸主之大熱飲水不止而善食者可微下餘不可下也
此裏証也索古補道云大熱飲水能食不可下用大黃丸作散子與服之如清便自調真不可妄下恐外熱逐於內而變結的危証多矣

大小便
秘能食
飲水為
裏証

大黃丸治風熱裏口中氣熱大小便秘赤飲水不止有下證者宜服之

川芎兩
黑牽牛半升半生
大黃酒蒸兩

右為細末稀糊和丸麻子大二歲每服十九溫蜜水乳後服以溏利為度未利加丸數

活頭額痛身體發熱大便黃赤腹中有熱面順散連翹飲

三黃丸主之四順飲連翹飲三身體潮熱頭自昏痛心

神煩躁小便赤大便秘此熱劇也洗心散調胃承氣湯主

之洗心散頭額身體溫熱大便白而酸臭者胃中有食積雙聖丸主

之方見食如身表無大熱而小便不利是有濕熱結膀胱仍用勝

濕藥白木茯苓之類利小便則其熱自退

雲小兒傷寒煩熱小便赤澀大便褐色面赤熱者導赤散

錢傷風兼藏兼心則驚悸兼肺則悶亂喘息哽氣長出氣

嗽兼腎則畏明各隨補毋藏虛見故也

傷風兼
藏
小便不利
大便白而酸臭
為食積

兼脾則
肢冷或
利或瀉
或吐瀉

傷風手足冷脾藏怯也當先和脾後發散和脾益黃散發
散大青膏主之此治陰厥有汗脈沉微者若陽厥无汗脈
傷風自利脾藏虛怯也當補脾後發散補脾益黃散發散
大青膏主之未瘥調中丸主之有下証大黃丸下之後服
温驚丸

兼心則
驚搐

傷風腹脹脾藏虛也當補肺必不喘後發散仍補脾也去
脹塌氣丸主之發散大青膏主之
傷風吐瀉治見吐瀉門治吐瀉用益黃
湯治夾驚傷寒熱極生風薄荷散

薄荷葉全蝎
甘草天竺黃
姜蚕
白附子炮各
右為細末每服一錢水小半盞煎至三分加竹瀝少許
妙

兼肺則
喘嗽

雲小兒表傷寒則皮膚閉而為熱盛即生風欲為驚搐血
氣未實不能勝邪故發搐也大小便依度口中氣熱當發
之宜天青膏
肺盛復有風冷則胸滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後
發散風冷散肺瀉白散風大青膏主之若止傷寒則不
胸滿

兼腎則
畏明
渴分虛
實

腎虛則畏明宜補腎地黄丸有表者間用天
傷風下後虛熱以藥下之太過胃中虛熱飲水無方當生
胃中津液多服白木散小兒結熱於內口乾而渴身黃
體重者宜白木散

湯傷寒發渴宜白虎湯
潔大熱飲水能食不大便用大黃丸作散服之
右三方白木散治虛渴為下後而食少胃虛者設也白

嗽分虛實

虎湯大黃丸治實渴為末經下而能食不大便者設也
傷寒咳嗽吐清水噎氣長出氣是肺之不足也合用阿
膠散面白如枯骨者死不治 身熱咳嗽吐痰者當用福
銀丸方見咳

右二方治咳嗽阿膠散治虛嗽為噎氣長出氣者設也
福銀丸治實嗽為痰盛喘滿者設也若有表証惡風寒
而嗽者當用桂枝散加減四君子湯鼠粘子湯之類是
也

厥分陰陽

陰厥陽厥見大
身大熱吐逆不止者茯苓半夏湯即小半夏加茯苓湯方見嘔門

傷寒嘔者枳殼半夏湯
枳殼 半夏各半
右水一碗姜十片煎至小半碗十歲已下作五服

藿香正氣散治傷寒發嘔

藿香葉 厚朴製 半夏製 甘草炙
陳皮 蒼朮米泔浸拘

右咬咀每服二錢水半盞姜三片棗一枚煎至二分去
渣溫服

然大吐者當下之白餅子珍珠丸消積丸三方俱見癖門 潮熱
有時胸滿短氣嘔吐者桃枝丸積熱門

右七方治傷寒嘔吐前二方治痰飲而吐中一方治有
表而吐後四方治有裏而吐其桃枝丸治裏熱而吐餘
一方治表寒而吐也

自汗為虛 湯傷寒自汗當補虛和陰陽小建中湯減桂加黃芪人參
地黃

黃芪兩 白芍三 甘草 人參

熟地略半

右改咀每二錢水生薑煎至二分去渣服

小兒傷寒形症 頭痛 體痛 鼻塞或流涕 喉內喘

息 兩手脈洪數 頰赤眼澁 身上寒毛起 口鼻出

水 眼赤黃 口乾澁 咳嗽 山根青色 噴嚏

活頭自疼痛而畏入惡寒者此傷寒證也

雲設令小兒卒暴身壯熱惡寒四肢冷或耳尻冷鼻氣熱

為斑疹也與傷寒表証相似此胎氣始發自內之外若與

傷寒表證同治者候也當作斑疹治之

温病温病者春月之温病温病而不熱也

田春曰温病 未滿三日先用惺惺散二服後四五日不

解煩渴嘔用白朮散如自汗口燥用製白虎湯至六七日

大便燥結用四順飲子下心腹太實太滿牛黃通膈丸下

初覺之時疑是瘡疹只用葛根升麻湯解肌

傷寒拾遺 和解因時法 温中法

灰包熨法

治中風自汗用桂枝湯治傷寒無汗用麻黃湯此仲景表

散之法百世不易者也若元氣暴虧者以參芪與桂枝麻

黃等藥表散此丹溪補神景之法亦百世不易者也至於

韓祗和戒桂枝而以中風傷寒通作一法治之者此當時

之權變非百世之常行也王海藏云仲景用桂枝當漢之

末也韓祗和戒桂枝當宋之隆也時世之異不可不知今

編祗和之法於篇末以廣後學之見云

韓氏和解因時法

傷寒病有可汗者論中但統言其可汗症及可汗脈或云脈浮而數或云脈浮緊或云脈浮無汗而喘或云脈浮為

祗和改
用仲景
法因時

寸脈定
發表隨
方氣候立

在表今畧舉數條後人但憑其脈之太緊並不分脈浮有陰陽虛盛之理又不知有可汗不可汗之症誤投發表藥則多變成陽毒之患矣今舉病人有汗惡風無汗惡寒分二等及據立春已後立秋已前氣候輕重各立方治之庶學者易為開悟耳

可開力
奇等未
可發表
病人二三月已前兩手脈浮數或緩或緊按之差軟寸關尺若力齊等其力不甚大不甚小者亦未可便投解表藥此是見裏證未見表脈也宜候寸脈力小如關尺即可投解表藥天抵治傷寒病見證不見脈未可投藥見脈未見證雖少投藥亦無害也凡治雜病以症為先脈為後治傷寒病以脈為先證為後

也若不投藥和之後必惡風及自汗出若立春已後至清明已前宜調脈湯主之清明已後至芒種已前宜葛根柴胡湯主之芒種已後至立秋已前宜人參桔梗湯主之調脈湯

右葛根兩

防風

前胡去苗三分

甘草炙半兩

右為粗末每服二錢水一盞生姜一塊如小指大劈破煎至七分去渣溫服如寸脈依前方小加東三箇同煎

葛根柴胡湯

葛根半兩

柴胡去苗一兩

芍藥

右咬咀每服二錢水一盞生姜二片煎至七分去渣熱服如寸脈依前方小加葱白三十同煎服

人參桔梗湯

人參

桔梗各三分

麻黃去節一兩

石膏兩

甘草炙三分

石膏兩

見中風
脈未見
中風症
亦宜和

右每服二錢水一盞荆芥五穗煎至七分去渣熱服如
寸脈依前方小加麻黃二分去節同煎服
病人兩手脈浮數而緩名曰中風若寸脈力小尺脈力大
雖不惡風不自汗此乃陰氣已盛先見於脈若不投藥和
之後必惡風自汗出若立春已後清明已前宜薄荷湯主
之清明已後芒種已前宜防風湯主之芒種已後至立秋
已前宜香芍湯主之
薄荷湯 薄荷兩 葛根兩 人參分
甘草兩 防風十兩
右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去渣熱服如三五
服寸脈力尚小加薄荷二分同煎
防風湯 防風一兩 桔梗錢 甘草半兩
旋覆花兩 厚朴分

右咬咀每服三錢水一盞姜一塊同煎熱服如三五服
寸脈力尚小加荆芥五七穗同煎
香芍湯 川芎分 石膏兩 升麻兩
甘草兩 厚朴兩

寸小於
尺宜消
陰助陽
表藥

右咬咀每服二錢水一盞煎七分溫服如三五服後寸
脈力尚小加細辛二分同煎
前二段文將中風傷寒各立法者何蓋謂病人始得病
二日已前或因中風脈緩或因傷寒脈緊然脈雖先見
而症猶未見尚可以藥解之故立方耳
病人兩手脈浮數或緊緩寸脈短反力小於關尺脈者此
名陰盛陽虛也若自汗出惡風是邪氣在表陰氣有餘也
素問云陰氣有餘為多汗身寒即可投消陰助陽表劑以
治之若立春已後清明已前宜六物麻黃湯主之清明已

後芒種已前宜七物柴胡湯主之芒種已後立秋已前宜發表湯主之

六物麻黃湯

麻黃去節一兩 葛根七錢 人參五錢

甘草錢五

蒼朮七錢

右咬咀每服三錢水一盞煮二枚煎七分熱服如三五服後汗未止惡風者加荆芥三分三五服後不惡風猶汗者加丁香皮半兩荆芥七錢

七物柴胡湯

柴胡二兩 蒼朮 荆芥

麻黃各一兩

甘草錢七

右咬咀每服三錢水一盞姜一塊棗二枚同煎七分熱服如三五服後汗未止惡風者入葱白三寸如三五服後汗未止者加當歸一兩同煎

發表湯

麻黃去節一兩 蒼朮二兩 人參

當歸各半兩

甘草錢三 丁香皮三分

右咬咀每服三錢水一盞入姜一塊棗二枚同煎至七分去查熱服如三五服汗未止猶惡風者加桂枝三分如汗未止更加細辛半兩以汗止為度

寸大於尺宜消陽助陰表裏

病人脈浮數或緊或緩其脈上出魚際寸脈大於關尺者此名陽盛陰虛也若發胃悶口燥咽乾者乃是邪氣在表陽氣獨有餘也素問曰陽氣有餘為身熱無汗是也可投消陽助陰藥以解表若立春已後至清明已前宜人參湯主之清明已後至芒種已前宜前胡湯主之芒種已後至立秋已前宜石膏湯主之

人參湯

人參兩 芍藥三錢 石膏兩

柴胡

甘草錢三

右咬咀每服三錢水一盞姜一塊煎七分熱服如三五

後熱不解者入鼓三十粒同煎服

前胡湯方缺宜尋祇和方補之傷寒便覽有前胡湯方用石膏一兩前胡半兩竹茹

黃芩知母山柰大青各三錢姜葱煎服疑自是此

石膏湯 石膏三兩 芍藥一兩 升麻三兩

黃芩三兩 柴胡一兩 甘草三兩

右咬咀每服三錢水一盞半豆一合煎八分熱服如三

五服後熱未解者加知母一兩又未解加大黃一兩

病人兩手脈浮數或緊或緩三部俱有力無汗惡風者此

是陰陽氣俱有餘素問曰陰陽有餘則無汗而寒是也可

用藥平之若立春已後至清明已前宜解肌湯主之清明

已後至芒種已前宜芍藥湯主之芒種已後至立秋已前

宜知母湯主之

解肌湯 石膏二兩 麻黃三兩 甘草三兩

升麻各半

右咬咀每服三錢水一盞入鼓半合煎至八分去渣

服如三五服後猶惡風者加麻黃半兩石膏一兩

芍藥湯

甘草多半 芍藥一兩 石膏三兩 荆芥穗一兩

右咬咀每服三錢水一盞生姜一塊煎至七分去渣

服如三五服後猶惡風者每服加生姜一塊同煎服

知母湯 知母 石膏 麻黃

升麻一兩 甘草多半

右咬咀每服三錢水一盞入生姜一塊同煎至七分去

渣溫服如三五服後猶惡風者加麻黃半兩升麻半兩

前三段文將中風傷寒一法治者因病人始得病後脈

症俱見若投解劑必不能愈故立前方同法治之

中風傷寒
法治

仲景云傷寒為病脈緩者名中風脈緊者名傷寒今分此
二端何也始因冬寒毒之氣中人其內伏之陽沉潛于骨
髓之內每至春夏發時或因外傷寒而引內邪出或因外
傷風而引內邪出及乎內邪既出而為病一也古人云立
此二端恐後人疑其緊脈與緩脈治別也若中風與傷寒
脈異何故仲景無別法治之此乃後人不究仲景之心也
病人始得病一上日至五六日尚有表脈及表症亦可依
脈症投藥凡投解表及發表藥一日可飲三服病症其
可至五服外不可頓服藥也如症未解次日依前再投如
症依前未解可作熱粥投之粥內加葱白亦可如有汗出
勿厚衣蓋覆恐汗出太過作亡陽症也
海藏云韓氏微旨可汗一篇有和解因時法言傷寒之脈
頭小尾大傷風之脈頭大尾小李忠訓保命新書亦分尺

寸與仲景同之非若前人總言尺寸脈俱浮而緊尺寸脈
俱浮而緩緊則為傷寒無汗緩則為傷風自汗又有傷寒
有汗者傷風無汗者脈亦互差與症不同前人已盡之矣
惟韓李所言頭小尾大即為傷寒尾小頭大即為傷風人
病間有脈症未顯于尺寸者故韓李述為和解因時法也
又恐後人疑其不與前聖合遂於本方內又立加減法數
條亦不越前人之意何其當哉蓋二公者當宋全盛之時
故又戒麻黃桂枝不可輕用改用石膏升麻葛根柴胡之
平劑當時則可非百代常行之道時世遷移之法也可汗
一篇若隨湯液隨症應見自有定規雖明哲不可踰也
又寸口脈小飲冷與霧露所傷同作中焦治今韓李云傷
寒寸小者勿認與飲冷霧露同傷一體也飲冷霧露所傷
寸口舉按全無是陰氣在胃不和陽氣不能升越也傷寒

寸口小者只於關部下至膀胱本部見之寸口雖小只是舉之微小沉得之有也非若飲冷與按全無也若果寸口舉按全無即不可解表只宜溫中不可不知

韓氏溫中法

陰症

夫傷寒之說始自黃帝以開其端至於仲景方陳其條由自後膚淺之學莫知其數立言者只云病在表可發洩病在裏可下或云不可汗不可下未嘗有溫中之說仲景傷寒例云尺寸俱沉細太陰受病也尺寸俱沉少陰受病也尺寸俱微緩厥陰受病也又辨太陰症云太陰病脈浮可發汗宜桂枝湯又手足溫自利不渴者宜四逆湯又腹滿時痛桂枝加芍藥湯辨少陰證云少陰病始得之發熱脈沉者麻黃附子細辛湯又少陰病二三日麻黃附子甘草湯又少陰病手足寒身體痛骨節疼脈沉者附子湯又厥

陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯又少陰病脈沉急溫之宜四逆湯今舉仲景論中數條最是二陰病之良法于今世用之尚有未盡證者愚常校之自至初歲迄於今三十餘年不以歲之太過不及為則每至夏至已前有病傷寒人斗中七八兩手脈俱沉細數多是胸膈滿悶或嘔逆或氣塞或腸鳴或腹痛與仲景二陰病說理同而證不同因茲不敢妄投仲景三陰藥方總見脈沉及胸膈滿便投下藥下之往往不救常斟酌仲景理中丸與服之其病勢輕者胸中便快其病勢重者半日許滿悶依然或有病人脈沉細遲投仲景四逆湯溫之多藥力大熱後必發煩躁因校量此形證今別立方以治之藥後對證不可不傳焉

病人但兩手脈沉細數或有刀或無刀或關脈短及力小

胸膈塞滿氣短不能相接者便可隨服證投溫中藥以治之。病人兩手脈沉遲或緊皆是胃中寒也。若寸脈短及力小於關尺者此陰盛陽虛也。或胸膈滿悶腹中脹滿身體拘急手足逆冷急宜溫之。若立春已後至清明已前宜溫中湯主之。清明已後芒種已前宜陳皮湯主之。芒種已後至立秋以前宜七物理中丸主之。

溫中湯

丁香

乾姜

白朮

陳皮

丁香

厚朴

右為細末每服二錢水一盞葱白三寸荆芥五穗煎至七分去渣熱服如未快手足尚逆嘔吐者加丁香乾姜各二錢

陳皮湯

陳皮

藿香

白朮

葛根

厚朴

右為末每服二錢水一盞姜一塊同煎至七分去渣熱服如三服未快手足尚逆嘔吐不定者加半夏丁香桂枝各半兩每服加葱白三寸煎服

七物理中丸

白朮

乾姜

人參

桔梗

乾葛

藿香

甘草

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸水一盞煎八分和香熱服如三服未快手足尚逆嘔者加半夏生薑各半兩

病人兩手脈沉細無勞雖三部脈力停等亦是陰氣盛也。更不須候寸脈短治之。或胃腸滿悶身體拘急痠痛手足逆冷速宜溫中藥和之。若立春已後至清明已前宜厚朴丸主之。清明已後至芒種已前宜白朮湯主之。芒種已

後至立秋已前宜橘皮湯主之

厚朴九

當歸兩

丁皮兩

厚朴製一兩

細辛半錢

人參半錢

甘草半兩

乾姜炮半兩

右為末煉蜜為丸彈子大每服一九煎至六分和查熱服三服後脈尚細及寸脈尚細無方者每服加葱白三寸同煎服

白朮湯

白朮

半夏

當歸

厚朴製

乾姜炮各半兩

丁香七

右為末每服三錢水一盞姜一大片煎至七分去香熱服三五服後脈朱有力寸脈尚小者加細辛半兩每服加葱白三寸同煎服

橘皮湯

橘皮

葛根各三

半夏

厚朴製各半兩

右為末每服三錢水一盞生姜如末大煎至七分去香熱服三五服後脈尚小手足逆冷者加細辛半兩病人胸膈滿悶時時嘔逆肢節痛兩脇下痛腹中鳴此是停飲宜二苓湯

赤茯苓

木猪苓

白朮各半兩

滑石兩

通草

白芫蕪各二錢

丁香皮半錢

陳皮兩

桂枝錢

右為末每服三錢水一盞煎至七分去香熱服小便未快加瞿麥七錢半嘔未正加半夏半兩浙浙惡寒甚每服加葱白三寸

灰包熨法

病人服前藥胸膈不滿悶者此上焦有陽也或藥力太過上焦有熱腹滿虛鳴時時疼痛此是被陽藥消逐得焦

陰氣并入下焦也雖是下焦積寒冷奈上焦陽盛更難用
溫下焦藥也當用灰包熨之其法用稻草灰或桑柴灰二
三升許入好醋拌和乾濕得所鉢內炒令灰熱以帛包裹
置臍下熨之頻先炒灰包常更換令常熱以腹不滿痛為
度初熨時病人不受者勿聽但令亟熨之不住可也如灰
包裂後得下利三兩行或小便二三升或微似有汗此是
陰氣外出或下泄也勿疑之病輕者乃得愈後出餘氣而
解病人三部脈沉寸脈小於關尺此為陰盛當溫中藥以
消陰氣宜厚朴丸

厚朴丸

人參

白朮

厚朴

陳皮

藿香



當歸

細辛

神木湯亦同治陰躁而渴不可慢用涼藥若熱藥冷服內

有伏陽則何若脈已虛按之全無力或病人素無食養則
只可溫服

醫學綱目卷之三



醫家論曰...
 氣外則或下清...
 初起時病人不...
 後覺腹下利...
 病入三焦脈沉...
 醫家論曰...
 人參...
 以何藥...
 本以何藥...



醫家論曰...
 三
 三
 三

