

八番
共二
冊

醫學綱目

二千五



醫學綱目卷之三十五

婦人部

胎前症 求子

受胎

惡阻

妊娠經來

胎漏下黃汁或如豆汁

胎動不安

胎上逼心

跌撲傷胎毒藥傷胎

妊病可下胎斷胎

胎自墮

十月未足欲產過期不產

難產縮胎法

坐草法 催生法

下死胎法

求子法

大法調經為先

胎前之道始於求子。求子之法莫先於調經。每見婦人之無子者，其經必或前或後，或多或少，或將行作痛，或行後作痛，或或紫或黑或淡或凝而不調，不調則血氣乖爭，不能成孕。矣。詳夫不調之由，其或前或後及行後作痛者，虛也。其少而淡者，血虛也。多者，氣虛也。其將行作痛及凝塊不散



者滯也紫黑色者滯而挾熱也治法血虛者四物氣虛者四物加參芪澤者香附縮砂木香檳榔杏仁胡帶久而沉痼者吐之下之脈証熱者四物加芩連脈証寒者四物加桂附及紫石英之類是也直至積法滯行虛回然後血氣和平能孕乎也予每治經不調者只一味香附末醋為丸服之亦百發百中也

婦人多痰宜燥

用婦人肥盛者多不能孕者以身中有脂膜閉塞子宮以致經事不行瘦弱婦人不能孕者以子宮無血精氣不聚故也肥人無子宜先服調理

當歸酒洗一兩 川芎七錢 白芍 白朮
半夏湯 香附 陳皮各一 茯苓兩
甘草兩

作十貼每貼姜二片水煎服後生子

白朮兩 半夏麩兩 茯苓兩 橘紅兩
川芎 香附各一 神麩炒半 甘草兩
藥丸每服八十九丸如挾多者加黃連枳實各二兩服前藥訖却服後益斯丸

厚朴 杜仲 桂心 秦艽各二
附子 茯苓各六 白微 半夏
乾姜 牛膝 沙參各二 人參四
細辛兩

右為末煉蜜丸小豆大每服五丸空心酒下加至十九不效竟有娠三月後不可更服忌食牛馬肉則難產當出月

按此方即秦桂丸也丹溪忌服之者蓋忌於瘦人無血者若肥人濕多者又兼前調理藥而所服丸數十減其

丸只服五分無妨也上三方得之於丹溪之子朱懋誠者累試有效

瘦人元血攝精宜潤

海大五補丸同上三方丸

天門冬

麥門冬

菖蒲

茯苓

人參

益智

枸杞

地骨皮

遠志

熟地各等分

右為細末煉蜜丸如桐子大空心酒下三十九服本方數服後以七宣丸泄之

增損三才丸

天門冬

酒浸去心熟地

人參

遠志

五味子

茯苓酒浸去心

鹿角

一法加白馬

莖

一法加附子補相火不足

一法加麥門冬令人有力

一法加續斷以續筋骨

一法加沉香煖下焦虛冷

右為細末煉蜜杵干下丸如桐子大每服五十九空心好酒下年老欲補加混元表全個入藥混元表者是胎用酒浸晒乾細判為末

紫石英丸治婦人無子

紫石英

研水飛三兩

天門冬

酒浸去心焙乾三兩

當歸

切川芎

紫葳

卷栢

熟地

禹餘糧醋炒七次

牡蒙

石斛去根

辛夷

各二人參

肉桂

牡丹皮

桑寄生

細辛根

續斷

川烏炮

食茱萸

厚朴姜製

乾姜炮

牛膝酒浸各一兩

栢子仁

輕炒山蕒

烏賊魚骨

燒灰各一兩半

甘草

炙

寸脈沉者痰情

右二十六味為極細末煉蜜丸桐子大每服二十九酒米飲任下空心食前日一

子和戴人過謙都管中飲念有一卒說出裏事戴人問其故荅曰吾婦為室女時心下有冷積如覆盆按之如水声以熱手熨之如水娶來已十五年矣恐斷吾孕是以去之戴人曰公勿黜也如用吾藥病可除孕可得卒從之戴人診其寸脈沉而遲尺脈洪大有乃非無子之候也可不逾年而孕其良人嘆曰試之先以三聖散吐涎一斗心下平軟次服白朮調中湯五苓散後以四物湯和之不再月氣血合度數月而娠一子戴人常曰用吾此法無不子之婦此言不誣一婦人年二十四歲夢與鬼神交驚怕異常及見神堂陰司舟楫橋梁如此一十五年竟無妊娠至祈覓禱无所不至鑽肌炙肉孔穴万干黃瘦發熱引飲和滿

汚血冷積

七腫委命于天一白甚請戴人戴人曰陽火盛于上陰水盛于下見鬼神者陰之靈神堂者陰之所舟楫橋梁水之用兩手寸脈皆沉而伏知胸中有痰實也凡三涌三泄三汗不旬而無憂一月而有娠

大盪胞湯治婦人立身以來全不產育及斷絕久不產二十三年者

- | | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 朴硝 | 丹皮 | 當歸 | 大黃 <small>蒸一飯入</small> |
| 桃仁 <small>各三兩</small> | 細辛 | 厚朴 | 苦梗 |
| 赤芍藥 | 人參 | 茯苓 | 桂心 |
| 甘草 | 川牛膝 | 陳皮 <small>各二兩</small> | 附子 <small>炮一兩半</small> |
| 蜚虫 <small>炒焦去翅足</small> | 水蛭 <small>炒各十枚</small> | | |

右咬咀每服四大錢水酒各半盞煎至六分去渣溫服空心日三夜一溫覆得少汗必下積血及冷赤膿如小

豈汁斟酌下盡若力弱太困不堪者只一二服止然恐
惡物不盡不得藥力能盡服儘好不爾用坐尊藥
坐尊藥治全不產及斷緒服前盪胞湯惡物不盡用此方

皂角子去皮

吳茱萸

當歸各二兩

細辛去苗

五味子

乾姜炮各二兩

黃葵花

白礬枯

戎塩

蜀椒各半兩

右為細末以絹袋大如指長三寸餘盛藥令滿縛定納
婦人陰中坐臥任意勿行走小便時去之更安一白一
度易新者必下清黃冷汁汁盡止若未見病出可十日
安之本為子宮有冷惡物故令無子值天陰冷則發疼
痛須候病出盡方已不可中輟每日早晚用買菜煎湯
薰之

秦桂丸論

無子之因多起於婦人醫者不求其因起

忌服燕

於何處遍閱古方惟秦桂丸其碎確其意專用溫熱藥近
乎人情欣然授之銳然服之甘受燔灼之禍猶懵然不悔
何者陽精之施陰血能攝之精成其子血成其胞胎孕乃
成今婦人之無子者率由血少不足以攝精也血之少也
固非一端然欲得子者必須調補陰血使無虧欠乃可推
其有餘以成胎孕何乃輕用熱劑煎熬臟腑血氣沸騰禍
不旋踵矣或曰春氣溫和則萬物發生冬氣寒凜則萬物
消隕非秦桂丸之溫熱何以得子臟溫煖而成胎耶予曰
詩曰婦人和順則樂有子和則血氣均平則陰陽不爭今
得此藥經血必轉紫黑漸成衰少或先或後始則飲食驟
進久則口苦而乾陰陽不乎血氣不和疾病路起焉能成
胎縱然成胎生子亦多病而不壽以秦桂丸耗損元真之
陰也戒之慎之按秦桂丸施于肥人而少其丸數兼服調
理補藥亦無效但忌施于瘦人火多者也

督脈主不孕

素督脈生病女子不孕

世治男子無子者用熟艾一團用鹽填臍滿却於鹽上鹽蓋大小做艾丸灸之如痛即換鹽直灸至艾盡為度如一日灸不盡二百三日灸之曾效

東婦人無子胞門在開內左邊二寸五分

又法氣門在開元傍

集又法子宮在中極傍各開三寸

垣又法開元二十壯

中極

甲絕子灸臍中令人有子女子手脚拘攣腹滿疝月水不

下乳餘疾絕子陰痒陰交主之腹滿疝積聚餘疾絕子

陰痒刺石門于金云奔豚上少腹墜女子絕子蛻血在內不下開元主之于金云轉胞不得溺婦人子門不端少腹苦寒陰痒及痛經閉不通中極主之婦人無子湧

泉主之大疝絕子築實主之絕子商止主之穴在內

仲男子脈浮弱而澹為無子精氣清冷

脈婦人少腹冷惡寒及年少者得之此為無子年大者得

之絕產脈微弱而澹年少得此為無子中年得此為絕

產肥人脈細胞有寒故令少子其色黃者胃上有寒

少陰脈浮而緊則疝腹中痛半產而隨傷浮則亡血

絕產惡寒

丹成胎以精血之後先分男女者褚澄之論也愚切惑焉

後開東垣方有曰經水斷後一二日血海始為精勝其血

感者成男四五日後血脈已旺精不勝血感者成女此論

男女分

亦為未瑩何以言之易曰乾道成男坤道成女夫乾坤陰

診

陽之性情也。在右陰陽之道路也。男女陰陽之儀象也。父精母血因感而會精之泄陽之施也。血能攝之陰之化也。精成其骨此萬物之始於乾元也。血成其胞此萬物資生於坤元也。陰陽交媾胎孕乃凝胎之所。若名曰子宮。子宮在下。上有兩岐。一達於左。一達於右。精勝其血。及剛曰陽。時感者則陽為主。受氣於左。子宮而男形成。精不勝血。及柔曰陰。時感者則陰為主。受氣於右。子宮而女形成。或曰分男分女。吾知之矣。其有雙胎者。將何如。曰精氣有餘。岐而分之。血因分而攝之。故也。若夫男女同孕者。剛曰陽。時柔曰陰。時感則陰陽混雜。不屬左。不屬右。受氣于兩岐之間者也。亦有三胎四胎五胎六胎者。猶是而已。或曰其有男不可為父。女不可為母。與男女之兼形者。又其何而分之。耶。予曰男不可為父。得陽氣之虧者也。女不可為

母。得陰氣之塞者也。兼形者。由陰為駁氣所乘。而為狀不一。以女兼男形者。有二。一則遇男為妻。遇女為夫。一則可妻而不可夫。又有下為女。体上具男之全形。此又駁之甚者也。或曰駁氣所乘。獨見於陰。而所成之形。又若是之不同。耶。予曰陰躰虛駁。氣易于乘也。駁氣所乘。陰陽相混。無所為主。不可屬左。不可屬右。受氣于兩岐之間。隨所得駁氣之輕重而成形。故所兼之形。有不可得而同也。

右丹溪此論極造精微。發前人之未發。是知男女之分。已定於萬物資始。乾元之際。陰陽交媾之時。昧者不寤。是聖妄有轉女為男之法。惑矣。夫萬物皆資始於乾元。獨男女之分。不資始於乾元乎。

胎前當清熱養血。產前安胎。白朮黃芩妙藥也。胎前將臨產。以三補丸加炒香附炒白芍藥蒸餅丸服。又批

雜法

熱以三補用生地膏九本連補為未有孕八九個月必
順氣枳殼蘇莖 前至八九月因火動逆作喘急可用徐
芩香附為末調下

驗胎法

神方驗胎散婦人三兩個月月經不行疑是兩身却疑
血滯心煩寒熱恍惚此藥可驗取之內也外已有身病無
邪脈以素問脈法推之十得八九矣

真雀腦考兩當歸全用重一兩
者只用七分

右二味為細末分作二服濃煎好艾湯一盞調下或好
酒調服亦得可待三兩個時辰聞覺腹膈微動初頻即
有胎也動罷即愈安穩無虞如不是胎即不動所帶惡
物自行母亦安也如服藥不覺效再煎紅花湯調下必
有神效

靈苑治婦經脈住三個月驗胎法真川芎為細末濃煎

診

艾湯下七七投腹內漸動是有胎也

試孕有無甘草一寸皂角一寸黃連少許

右為末酒調服有則吐無則不吐每服一錢半

脹婦人懷胎七月而不可知時時吐血而轉筋者此為胎
也動持墮而動者非胎也

素婦人足少陰脈動者任子也平人氣象論謂太溪

別謂之有孕陰陽別論云陰謂尺中也搏謂搏也
於手也尺脈搏擊與寸脈殊別則為有孕之
兆

脈妊娠初時寸微小呼吸五至三月而尺數也脈滑疾重
以手按之散者胎已三月也脈重手按之不散但疾不滑
者五月也此即陰搏陽別之義言尺脈滑數寸
脈微小而尺與寸脈別者有胎也尺脈左
偏大為男右偏大為女左右俱大產二子大者如實狀陰

搏陽別之義謂入狀實大與婦人妊娠四月欲知男女
寸脈殊別但分男女左女右也
法左疾為男右疾為女俱疾為生二子王字宜云妊娠三
部俱疾而疾在左
為男在遺妊娠人面無行還復呼之左迴首者是男右
右為女迴首者是女 看上脣時夫從後急呼之左迴首者是男
右為首者是女也

右按丹溪云男受胎在左子宮女受胎在右子宮斯言
大契是說也蓋男胎在左則左重故迴首時慎護重處
而就左也女胎在右則右重故迴首時慎護重處而就
右也推之於脈其義亦然胎在左則血氣護胎而盛於
左故脈亦從之而左疾為男左大為男也胎在右則血
氣護胎而盛於右故脈亦從之而右疾為女右大為女
也亦猶經云陰搏陽別謂之有子言受胎處在臍腹之
下則血氣護胎而盛於下故陰之尺脈鼓搏有力而與

陽之寸脈殊別也又如癰癤發上則血氣從上而寸脈
盛發下則血氣從下而尺脈盛發左則血氣從左而左
脈盛發右則血氣從右而右脈盛也丹溪以左大順男
右大順女為醫人之左右手蓋智者之一失也

丹婦人懷孕受物乃一藏之虛假如肝藏虛其血氣止能
養胎不能榮肝肝虛故愛酸物吃

大胎動不安或因僵件或因毒藥重者便致傷墮當以母
形色察之母面赤舌青者子死母活唇舌俱青兩邊沫出
者子母俱死面青舌赤口中沫出者母死子活也

脈婦人妊娠八月脈實大牢強弦緊者生沉細者死
脈細者易產太浮緩氣散難產

婦人懷胎一月之時足厥陰脈養二月足少陽脈養三月
月手心主脈養四月手少陽脈養五月足太陰脈養六月

足陽明脈養七月手太陰脈養八月手陽明脈養九月足少陰脈養十月足太陽脈養諸陰陽各養三十日活兒手太陽少陰不養者下主月水上為乳汁活鬼養母懷娠者不可多刺其經必墮胎陳氏大全論云足厥陰肝脈也足少陽膽脈也四時之令始於春木故十二經云胎養始於肝脾而在二月三月主心脾絡脈也手少陽三焦脈也屬火而在三月四月主心脾四月足太陽脾脈也足陽明胃脈也足陽明屬土而旺於夏所以養胎在五月六月主手太陽肺脈也手陽明大腸也足少陽腎脈也足太陽膀胱脈也屬金主而旺於秋冬所以養胎在七月八月九月十月

惡阻

惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也

秦帝曰何以知懷子之且生也岐伯曰身軀有病而無邪

脈也腹中

大妊娠稟受怯弱便有阻病其狀顏色如故脈息和順但覺肢躄沉重頭目昏眩擇食惡聞食氣好食酸酸甚者或

禁忌

作寒執心中憤悶嘔吐痰水恍惚不能支持巢氏謂之惡阻但症有輕重耳

仲婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒熱名妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此証設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之

右絕之者謂絕止醫治候其自安也予常治一二婦阻病吐愈治愈逆因思此仲景絕之之旨遂停藥月餘自安真大哉聖賢之言也

方症

丹惡阻即從痰治多用二陳湯

羅半夏茯苓湯治妊娠惡阻嘔吐心煩頭目眩暈惡聞食氣好食酸鹹多臥少起百節煩疼羸瘦有痰胎孕不寧

半夏洗一兩 赤茯苓錢半 熟地各七錢半 橘紅
 旋覆花千金方無旋覆花有細辛紫蘇 人參 芍藥

川芎 桔梗 甘草各半

右咬咀每服五錢姜七片水煎空心兼服茯苓丸若
有客熱煩渴口瘡去橘紅細辛加前胡知母七錢半
若腹冷下利去地黃加炒桂心半兩若胃中虛熱木
便秘小便赤澀加大黃七錢半去地黃加黃芩二錢五
分

寒痰 茯苓丸治妊娠阻病心中煩悶吐痰眩暈先服半夏茯苓

湯兩劑後服此藥

赤茯苓 人參 桂心 乾姜

半夏湯泡七橘皮各一 白朮 葛根

甘草枳殼各二

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五十九米飲下日三
服一方加麥門冬財後加五味子

仲妊娠嘔吐不止者乾姜人參半夏丸主之

乾姜 人參 半夏

右三味末之以生姜汁糊丸如桐子大飲服十九日三
服大余方論半夏動胎而不用今仲景豈獨不知此而
用於此方乎于治如阻病累用半夏求當動胎也經
云有故無
殞是也

太治惡阻吐清水甚害十餘日粥漿不入者

白朮兩 人參兩 丁香半錢 甘草一錢

右為細末每服二錢水一鍾姜五片煎至七分溫服

歸原散治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥無
効

人參 甘草 川芎 當歸

芍藥 丁香各半 白茯苓 白朮

陳皮各半 桔梗炒 枳殼炒各二 半夏洗炒黃

熱痰

右咬咀每服三錢生姜五片棗仁一枚水同煎
人參橘皮湯治阻病嘔吐痰水

人參

橘皮

白朮

麥門冬去心各

甘草三錢

厚朴製

白茯苓各五錢

右為粗末每四錢加淡竹茹彈子大生姜三片水同煎
治妊娠惡阻嘔吐不下食

青竹茹

橘皮各二兩

生姜

茯苓各四兩

半夏兩

右細切以水六升煮取二升半去渣分三服

治妊娠嘔吐不食兼吐痰水

生薑根社

橘紅分

生姜分

檳榔分

右切以水二盞煎七分空心熱服

治妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

青竹茹

麥門冬各二兩

前胡兩

橘皮兩

蘆根握

右切細以水一大升煮半升去渣分兩服食前

安胎飲治妊娠惡阻心中憤悶頭重目眩嘔逆不食或胎動不安腰腹痛

甘草

茯苓

當歸

熟地

川芎

地榆

白朮

黃芪

白芍藥

半夏泡七次炒

阿膠等分

右咬咀每服三錢生姜四片水同煎

一婦人孕三月吐痰水并飲食每日寅卯作時覺少腹有氣衝上然後膈滿而吐面赤微躁頭暈臥不起牀四肢疼微渴此肝火挾衝脈之火衝上也一日甚一日輕脈和右寸洪大百藥不効者將二片予男病偶用洗香磨水化

庚

抱龍丸一服膈寬氣不上衝二三服吐止眩減食進而安
又應氏婦得胎七月嘈雜吐食脈壅心下滿塞氣攻背兩
肘皆痛要人不任手以熱物摩臑得吐稍踈脈洪大

黃芩二錢 黃連一錢 白朮半錢 半夏各二錢

甘草炙 縮砂各五 陳皮 當歸

山梔 枳殼炒 香附 人參

蒼朮各一 茯苓半錢 生姜七

服二貼後嘈雜吐止心滿塞退但於夜間背肘痛用摩
臑遂與抱龍丸化服其疾如失

丹一婦人年近三十懷孕兩月病嘔吐頭眩自覺不可禁
持以人參白朮川芎陳皮茯苓等藥服五七日愈覺沉重
召于脈之兩手弦左為甚而且弱子曰此是惡阻病必怒
氣所激問之果然肝氣既逆又挾胎氣參朮之補大非所

宜教以時用茯苓湯下抑青丸二十四粒五貼自覺稍安
診其脈略有數狀自言口乾苦稍食粥則口酸予意其為
膈間滯氣未盡行教全以川芎陳皮山梔茯苓生薑煎湯
下抑青丸十五粒十餘貼餘証皆平但食及當時之半食
後覺口酸不食覺易飢予謂肝熱未平則以白湯下抑青
丸二十粒二十日而安予又脈之見其兩手脈雖和平而
左手弱甚此胎必墮此時肝氣既平參朮可用矣遂用始
初參朮等藥補之預防墮胎以後之虛服之一月胎自墮
却得平穩無事抑青丸一味黃連為丸是也

妊娠經來

陽微陰 滑故令 下 激經目 脈何類何以別之師曰寸口脈陰陽俱平榮衛調和按之
滑浮之則輕陽明少陰各如經法身反灑浙不欲食飲頭

婦人經月下但為微少師脈之反言有軀其後審然其

痛心亂嘔噦欲吐呼則微數吸則不驚陽多氣溢陰滑氣盛滑則多實六經養成所以月見陰見陽精汁凝胞散散者損墮設復陽盛雙胎二胎今陽不足故令激經也滑脈有餘今經又少故知孕也

胎漏下血

大法 虛

丹胎漏因氣虛 因血虛 因血熱

仲師曰婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕者有

姪娠下血者假令姪娠腹中痛為胞阻芎歸膠艾湯主之

方見血崩

梅治胎動下血心腹疼死生不知服此湯活即安死即下

此即催生佛手散方見跌撲傷胎即當歸川芎 姪娠無

故卒下血不止取阿膠三兩炙搗末酒一升半煎令消一

服愈

羅立聖散治姪娠下血不止鷄肝三個用酒一升煮熟共食之大效

保治胎漏二黃散生地熟地等分剉水三盞煎半乾去香

服

梅治胎下血阿膠二兩搗末生地半斤搗取汁以清酒三

升絞汁分三服

米治胎漏下血不止胞乾即死且急治之

生地汁一升 陳酒合五

右同煎三五沸溫三服以止為度

保治婦人胎漏下血及因事下血枳殼湯

枳殼 黃芩各半 白朮一兩

右粗末每七錢水一盞煎七分食前服

丹婦人年二十餘三個月孕發瘧疾後淡血水下腹滿口

血熱

虛熱

渴

白芍

白朮

茯苓一

黃芩

歸尾

川芎

陳皮五

東陽婦人三十五歲孕八九個月漏胎不止胎比前時稍

覺收小血色微紫有塊食減平時三之一腹微疼無情緒

人參

白朮炒

白芍一

陳皮

川芎

茯苓

縮砂

大腹皮分三

木連藤七

同煎食前下三聖丸五十粒

血 癥病破

仲婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不止胎動在

臍上者為癥瘕又妊娠胎動者前三月也經水利時胎

下血者後三月也所以血不正者其癥不去故也當下其

癥桂枝茯苓丸主之九胎動多在當臍胎動在胎上故知是癥也

桂枝

茯苓

牡丹去心

桃仁去皮

芍藥各等分

右五味末之煉蜜丸如兔屎大每日食前服一丸不知

加至三九

本治胎下血不正取桃樹上乾不落葉子燒灰和水服瘕

本草云莖如破血又治伏梁積氣

胎漏黃汁下或如葶汁

大治妊娠忽然而下黃汁如膠或如葶汁胎動腹痛

粳米五

黃芪兩

右以水七升煎取二升分為四服

梅銀芎酒治妊娠下黃汁或如赤葶汁

芎根去黑銀斤

右水九升煎取四升每服入酒半升或一升煎分二次

血虛

氣虛

診

虛

服

娠婦人懷軀六月七月暴下斗餘水其胎必倚而墮此非時孤漿預下故也胎漏徐徐下水冷暴下而多故知墮胎也

胎動不安

大娠胎動不安者由衝任經虛受胎不實也亦有飲酒房室過度損動不安者有誤擊觸而胎動者有喜怒氣鬱不舒傷於心肝觸動血脈者有信醫宜服愛補反為藥所害者有因母病而胎動者但治母病其胎自安有胎不堅固動及母疾但當安胎其母自愈

固胎常服

求固孕丸

- 地黄
- 川芎
- 黃芩各五
- 歸身尾
- 人參
- 白芍
- 陳皮各一
- 白朮半
- 甘草三
- 黃柏三
- 桑上羊食藤七葉

糯米立水

右吹咀前服

仲娠宜常服當歸散主之

當歸

黃芩

芍藥

芩窮各一

白朮半

右五味杵為散酒飲服方寸匕日再服娠者當服即易產胎無苦疾產後百病悉主之

娠者養胎白朮散主之

白朮

芩窮各四

蜀椒三升

牡礪煨二

右四味杵為散酒服一錢匕日三服夜一服但苦痛加芍藥心下毒痛倍加芩窮心煩痛吐不能飲食加細辛一兩半夏大者二十枚服後若嘔以醋醬水服之後不解者小麥汁飲之已後渴者大麥粥服之病雖愈服之

勿置

胎動不安

胎動不安取芋根如足大指者一尺咬咀以水五升煮取三升去查服芋根大能補陰而行滯血

大銀芎酒

治胎動不安好銀者水着葱白作羹食之佳

或動或痛者安

治妊娠二三月上至八九個月胎動不安腹痛已有所下

艾葉

阿膠

當歸

川芎

甘草

右細切以水八升煮取三升去查內膠令烊分三服日

三服

立効散治婦人胎動不安如重物所墜冷如冰散方見

大縮砂散治胎動不安墮在須臾者神効物傷胎

胎上逼心

逼心滿

紫蘇飲治妊娠胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛謂之子

紫蘇莖葉

大腹皮

人參

陳皮

白芍

當歸

甘草

右細剉分作三服每服用水一盞半生姜四片葱白七寸煎至七分去查空心服

曾有累白婦人產不下遍服催生治不驗予因此必坐草太早心懷下一點懼氣結而不行故胎不順也素問云恐則氣下蓋恐則精神怯怯則上焦閉則氣還還則下焦脹氣乃不行矣得此藥一服便產及婦人六七月子懸者予用此方數有驗不十服胎便近下坐陳良甫云治一婦

有孕七個月，遠歸忽然胎上衝心而痛，坐臥不安，兩醫治之無效。遂說胎已死矣，用草麻子研爛，加麝香調貼臍中。以下之，命在垂危。召陳診視，兩尺脈絕。他脈平和。陳問：「醫作何証？」治之。答曰：「死胎也。」陳曰：「何以知之？」兩尺脈沉絕。以此知之。陳曰：「此說出在何經？」醫無答。陳曰：「此子懸也。若是胎死，却有辨處：面赤舌青，子死；母活，面青舌赤，吐沫。母死，子活，唇白俱青，母子俱死。今面不赤，口不青，其子未死。是胎上衝心，宜以紫蘇飲子治之。至十服而胎遂下矣。」

大治胎上衝心煩悶方：并治胎動困篤，用葱白二寸，豉濃煮汁飲之。若胎未死即安，已死即出。未效再服。此方神妙，宜之本草云：葱白通陽氣安胎。

以錫胎動上衝心痛：取艾葉如鷄子大，以頭醋四升煎取二升，分溫服。治胎上衝心熱癰，並用麩半斤搗碎和。

遍心疼
有消食
於中用

熟水絞取汁三鍾，無時溫服止。

遍身痛
衝心者
有水

大治妊娠遍身痛或衝心欲死不能飲食

白朮五兩 黃芩二兩 芍藥四兩

右水六升煮取二升半，分作三服。緣胎有水致痛，難易產。

跌撲傷胎毒藥傷胎

跌撲傷
者逐污
芥新

佛手散治婦人妊娠六七月因事觸犯傷胎，或子死腹中惡露下，疼痛不已，口禁欲絕。用此藥探之，若不損則痛止。子母俱安。若胎損立便逐下。又治血上衝心腹滿悶者。

如湯沃雪此藥催生神效。方見眩暈即當歸川芎等分爲散，口禁灌之。

大治胎忽因倒地舉動擊重促損腹中不安子死以川芎末酒服方寸七須臾，二三服出。

治妊娠從高墜下腹中下血煩悶

生地

益母草各一當歸

黃芪各半

右咬咀每服四錢水一盞姜四片煎至六分去渣無時服

丹婦人因內挫傷胎肚疼血崩

歸尾

陳皮

白朮

人參

茯苓

白芍

川芎鎔三

甘草五分

右分四貼水三盞煎取一盞下縮砂末一錢五分五靈脂一錢

毒滋傷者解毒和中

大治婦人服草藥胎墮腹痛用白蘆葦少許去皮為末米飲調服方寸匕或濃煎亦可
阿膠散治妊娠或因傾仆或因毒藥胎動不安腰痛腹滿或有所下或胎上搶心短氣

熟地二兩

白芍

艾葉

當歸

甘草

阿膠

黃芪各一

一方有川芎

痛不可必命將絕者縮砂酒桂苓丸

右咬咀每服半兩姜三片東一枚同煎溫服無時
治妊娠偶有所傷胎動不安疼痛不可忍縮砂不以多少和皮炒黑色一方用仁置熨斗內略炒為細末熱酒調下二錢不飲酒者米飲調下覺腹中熱則胎已安矣此方極效

奪命丸治婦人小產下血子死腹中其人憎寒手指唇口瓜甲青白面色黃黑胎上搶心則悶絕欲死冷汗自出或食惡物或誤服草藥傷動胎氣下血不止胎尚未損服之可安已死服之可下若胎腐爛腹中危其者立可取出此方的係異人傳授至妙此即仲景茯苓桂枝九白用淡醋枝赤白赤芍芍藥分是也丹溪亦稱妙

雄病可下胎斷胎

下胎方

大治妊娠母因疾病胎不能安可止之取七月七日法麩四兩水二大盞煎取一盞三分綿濾去渣分溫三服立下
又方大麩五升清酒一斗煮二沸去渣分五貼隔宿勿食但再服其下如糜毋無疾苦子金不傳妙又方麥蘗一升為末和水煮二升服之即下神效
又方附子二枚為末以淳苦酒和塗右足去之大良
又方取鷄子一枚以三指撮鹽放鷄子中服之立出

斷產方

大斷產方

用白麩麩一升無灰酒五升打作糊煮二升半用絹帛濾去渣作三服候前月經將來日晚下吃一服次日五更吃一服天明吃一服月經即行終身絕子
大斷產驗方故蚕帛方圓一尺燒為末酒飲調服終身不復懷孕
又方油煎水銀空心服如棗核大一丸永斷不

虛熱

損久

胎自墮

大陽施陰化胎孕乃成血氣虛損不足營養其胎自墮或勞怒傷情內火便動亦能墮胎推原其本皆因於熱火能消物造化自然病原乃謂風冷傷於子藏而墮此未得病情者也予見賈氏婦但有孕至三月左右必墮診其脈左手大而無力重取則澹知其血少也以其妙年只補中氣使血自榮時正夏初教以濃煎白朮湯下黃芩末一錢服三四十貼遂得保全其生因而思之墮因內熱而虛者於理為多曰熱曰虛當分輕重蓋孕至三月正屬相火所以易墮不然何以黃芩熟艾阿膠等為安胎妙藥耶好生之工幸無輕視

虛寒

大治妊娠懷胎數落而不結實也

血寒

甘草

黃芪

人參

白朮

川芎

熟地

吳茱萸各等分

右為采空心溫酒調二錢忌松菜葱李雀肉醋物按冊論
皆是虛熱而無寒者今姑存此方以俟施之於百而一者也

醋附丸治數墮胎方見血崩

針灸

姪子不成時時墮胎後漏下五色瘰癧灸胞門門右邊一寸名子戶

十月未足欲產過期不產

先期欲產者涼血安胎

婦人懷胎有七月八月而產者有至九月十月而產者有經二年二年乃至四年而後產者各依後法治治
知母丸治十月未足而痛如欲產難治產難及子煩用知母一味為細末煉蜜丸如鷄壹大溫酒罇下日三服丸如桐子大飲下二十九

治妊娠月數未定而似欲產腹痛者

槐子

蒲黃等分

右為末蜜丸如桐子大溫酒下二十九以痛止為度

又方蒲黃如東核大篩過以井花水調服

十日未足而欲產者搗芎藭根汁一二升灌喉中本草

蒲治胎動不安下血多

羅治婦過月不產方

四物湯

香附

薏仁

枳殼

縮砂

紫蘇

水煎服即生

難產縮胎法

丹世之難產者往往見於鬱悶安佚之人富貴養之家若貧賤辛苦者無有也古方書止有瘦胎飲一論而其方為湖陽公主作也實非極至之言何者見其有用此方者

其難自若子表妹苦於難產後遇胎孕則觸而云之予甚
憫焉視其形惟勤於針指構思旬日忽自悟曰此正與湖
陽公主相反彼奉養之人其氣必實耗其氣使平和故易
產今形肥知其氣虛又坐知其不運必氣愈弱兒在胞胎
因母氣不能自運耳當補其母之氣則兒健易產矣今其
有孕至五六個月來告遂于大全方紫蘇飲加補氣藥與
數十貼因得男而其快後遂以此方隨母形色性真然特
令加減與之無不應者因名其方曰達生散

縮胎飲即達生散

大腹皮三錢

人參

陳皮

紫蘇葉各五錢

分

歸身尾

白芍

白木各一錢

甘草二錢

黃楊樹腦或加枳殼縮砂青葱五葉

右作一貼吞下益母丸臨月得二十服易生產後無病

氣虛著
補氣行
滯

按丹溪云難產死胎此血氣滯病也蓋此方補中行滯

春加川芎氣虛倍參朮 氣實倍香附陳皮血

虛加當歸地黃形實倍紫蘇 性急加黃連熱急

加黃芩濕痰加滑石半夏 食積加山查食後易

饑加黃楊腦腹痛加木香官桂黃芩 冬不用芩

黑神丸一名催生丸 用益母草研末粥丸治婦人臨月

一日三次服之用縮砂飲送下能催生易產產後服能生

新血去舊血只以白湯送下虛者煎白朮人參陳皮湯送

下

縮胎丸九個月用之

黃芩夏一兩秋七錢冬半兩炒

白朮二錢

茯苓七錢半

陳皮三兩

右末粥丸桐子火

氣實著
耗氣抑
陽

又方候九個月用之

黃芩一兩宜熟蒸不宜涼藥性人減半

滑石七錢五分臨月十日前小便多時加此一朱

枳殼炒七錢半

白木兩

右為米粥丸如桐子大每服三十九空心熱湯下

保東胎丸

白木

枳殼各等分

右燒餅為丸桐子大入月一日食前五十九水下服之

至產已

本滑胎枳殼散

甘草各一兩

右為細末每服二錢百沸湯點服空心食前日三服丸

懷孕六七月以上即服令兒易生初生胎少黑一百日

肉漸變白此孫真人滑胎易產方抑陽降氣為衆方之

冠也

妊娠治衝任脈虛補血安胎內補丸

熟地兩

當歸微炒

右細末煉蜜丸桐子大每服三四十九溫酒下上三方

諸集皆載在人用之如何耳大率婦人妊娠唯在抑陽

助陰素問云陰搏陽別謂之有子蓋關前為陽關後為

陰尺中之脈按之搏牢不絕者任身也婦人平居陽氣

微盛無害及其妊子則方閉經隧以養胎若陽氣盛搏

之則經脈不行胎乃不固素問所謂陰虛陽搏謂之崩

也抑陽助陰之方甚多然胎前藥唯惡羣陰若陰陽交

雜別生他病唯是枳殼散所以抑陽四物湯所以助陰

故爾枳殼散差寒若早服之恐有胎寒腹痛之疾以內

補在佐之則陽不至強陰不至弱陰陽調勻有益胎孕

此前人未常論及

本榆白皮焙乾為末婦人妊娠臨月日三服方寸七令產

雜方

極易產下兒身皆塗之信有效

臨產坐草法

診

脈訣欲產之婦脈離經沉細而滑也同及夜半覺時應分
誕來辰日午定知生難經云脈一呼三至曰離經一呼一
經夜半竟日一身重軀熱寒又煩舌下之脈黑復青及舌
上冷子當死腹中須遣母歸真面赤舌青細尋看母活子
死定難應唇舌俱青沫又出于母俱死總高擠面青舌赤
沫出頻母死子活定知真不信若能看應驗此之賢哲不
虛陳

正產候

大十產論○一曰正產者婦人懷胎十月滿足忽腰腹作

陣疼痛相次胎氣頓陷至於臍腹痛極乃至腰間重痛穀
道挺進繼之漿破血出兒子遂生此名正產

正產

二曰傷產者婦人懷胎未產一月已前忽然臍腹痛疼有

如欲產而却無事是名試月非正產也但一切產母未有
正產之候即不可令人抱腰亦不可令產母妄亂用力若
兒身未順總方轉動便教產母虛亂用力使兒子錯落忽
橫忽倒不能正生皆緣產母用力於未當用力之所致也
直待兒子身順臨逼門方始用力一送令兒下生此名
傷產

右傷產一法最為切要慎勿輕忽也凡十月未足臨產
腹痛或作或止或痛不甚者名曰弄痛非正產之候或
腹雖痛甚而腰不甚者非正產之候胎高未陷下者非
正產之候穀道未挺進者非正產之候水墜未破血未
出者非正產之候漿血雖出而腹不痛者非正產之候
凡未有正產候且令扶行執忍如行不得或凭物坐之
或安臥之或服安胎藥一二服得安即止慎勿妄服催

生藥餌不可雜亂產母憂恐而挫其志務要產母寬心
存養調停亦令坐婆先說解諭之如覺心中煩悶可取
白蜜一匙新汲水調下切勿妄亂用力先因其母直待
子逼門戶腰重痛極眼中如火穀道擬進時是正產候
左可用力并服催生藥也予男婦於未產一月已前腰
腹俱痛全似將產其痛至甚但遇已牌穉止如此者將
十餘日計無所出曰閣此條遂與安胎藥加參朮數服
間與肉味養之由是平復不痛又二十餘日始產一男
是時若妄動亂用力并服催生等藥立見危亡矣

見正產
候宜催

三曰催產者若婦欲產破血下已見是正產候但却未
生即可服催生藥以催之忽有經及數日產母困苦亦可
服藥助產母之正氣令兒速生此名催生

冬產宜

四曰凍產者冬月天冷產母經血得冷則凝以至兒子不

夏產宜
適溫涼

能生下此害最深若冬月產者下部不可脫去綿衣并不
可坐臥寒處當滿房着火常有煖氣令產母背身向火令
臍下腿膝間常煖血得熱則流散使兒易生此名凍產

五曰熱產者盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼
傷損胎氣亦不可人多熱氣逼襲產母使產母血沸而有
發熱頭痛面赤昏昏如醉乃至不知人事此名熱產

正橫產宜

六曰橫產者兒先露手或先露臂此由產母未當用力而
用之過也兒身未順用力一逼遂至身橫不能生下當令
產母安然仰臥後令看生之人先推其手令入直上漸漸
逼身以中指摩其肩推上而正之或以指摩其耳而正之
須是產母仰臥然後推兒徐徐正之候其身正前催生藥
一盞吃了方可用力令兒下生此名橫產

倒產宜
順

七曰倒產者產母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒

子不能迴轉便直下先露其足當令產母仰臥令看生之人推其足入去不可令產母用力亦不得驚恐使兒自順云

正偏產宜

八曰偏產者兒身未正產母用力一逼致令兒頭偏柱左腿或偏柱右腿故頭雖露偏柱一畔不能生下當令產母仰臥次令看生之人輕輕推兒近上以手正其頭令兒頭頂端正然後令產母用力一送即便生下若是小兒頭後骨偏柱穀道只露其額當令看生之人以綿衣灸溫裹手於穀道外方輕輕推兒頭令正便令產母用力送兒生也此名偏產

撥礙產宜

九曰礙產者兒身已順而露正頂不能生下蓋因兒身回轉肚帶攀其肩以此露正頂而不能生當令產母仰臥令看生之人輕輕推兒近上徐徐引手以中指按兒肩下撥其肚帶仍須候兒身正順方令產母用力一送使兒生下此名礙產

右橫產倒產偏產礙產四法若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命也按倒產者今世往往隨其倒足生下並無後患子母俱全不必依推足上之法亦可又礙產者往往肚帶有纏在兒頂上而兒頭自出在產門外看生之人以手撥其肚帶從兒頭頂過而下之者又有肚帶纏在頂上一匝而兒與胞衣自然同下者皆無妨不必以此礙產法入產門裏撥下之也

坐產法

盤腸產宜
擇宜

十曰坐產者言欲臨產時高處繫一手中令產母以手攀之輕輕屈足坐身令兒生下非坐在物上也此名坐產
十一曰盤腸產者趙都運恭以每產則太腸先出然後產

子產後其腸不收甚以為苦名曰盤腸產醫不能療偶在建昌得一坐婆施一法而收之其法以醋半盞新汲冷水七分調停喫產母面每喫一縮三喫收盡此良法也

丹產後腸不收香油五斤煎熱盛盆俟溫坐油盆中約一頓食時以皂角末吹入鼻中嚏作立上妙門

大半夏為末搐鼻中則腸上矣 又方以大紙撚蘸香油點燈吹滅以烟薰產母鼻中腸即上矣 又方以葶麻子十四粒去殼研如膏貼產母頭頂中心腸上即減去

催生法

禁忌

大凡生產自有時候未見時候切不可強服催生滑胎等藥或勢不得已則服之又云切不可坐草及令坐婆亂

下手凡催生藥必候腰痛甚胎陷下掣血破方可服

丹催生只用佛手散最穩當又効捷方見婦人通論即考歸湯

滯以流
通滯

催生如聖散黃蜀葵子小半合一方二錢重研爛以酒滾去查溫服神妙或漏血胎乾難產痛極者并進三服良久腹中氣寬胎滑即產須見正產候方可服之歌曰黃蜀葵子炒七十粒細研酒調濟君急若遇臨危產難時免得全家俱哭泣

丹又方以香油白蜜小使和勻各半盞調益母草末服一方止用油蜜小使能下難產

秘錄治橫產不得出車前子末酒服二錢七方 大催生柞木飲子治產難或橫或倒死胎爛脹腹中此方屢用神効

若以驅
逐閉塞

大柞木枝大握長一尺洗淨剉生用 甘草大者五寸剉作五段

右用新汲水三升半同入新磁瓶內以紙三重緊封之文武火煎至一升半令香候產婦腰重痛欲坐草時溫

飲一小盞腰痛未重便覺心下開豁如覺再渴又飲一盞
至三四盞覺下重復生此方至驗
梅治難產礙胎在腹中如已見兒胎衣不出胎死者蒸藜
子貝母各四兩為末米飲下一匙如相去四五里許不下
再服

香以開
血發逐汚

又方通明乳香一塊如皂角子大為末腰痛時用新汲水
一小盞又醋少許同煎令產母兩手捉兩石燕坐麥調藥
飲水須臾坐草便生無痛楚神良 又方開骨膏乳香研
細五月五日午時滴水丸如鷄頭大每服一粒無灰酒吞
下 又方催生神效乳珠丹乳香研細以猪心血為丸如
桐子大硃砂為衣晒乾每服一粒冷酒化下良久未下再
服一粒如大段難產以蓮葉心蒂七個水二盞煎至一盞
放溫化下一粒良久未下亦可再服此藥靈驗如神合藥

時五月五日午時七月七日三月三日効 又方乳香硃
砂等分為細末麝香酒調下 又方腰疼可服乳香人參
各一錢辰砂半錢同研細用鷄子清一個調之生薑自然
汁放開冷服如橫生倒生即時端順子母平善

大勝金散問曰產難若何答曰胎側有成形塊為兒枕子
欲生時枕破與敗血裏其子故難產但服此藥逐其敗血
即自生逆生橫生並治之

麝香 錢一 鹽鼓一兩以青布裹
燒紅急研細

右為末取秤錘燒紅以酒燂之調下一錢

催生丹治產婦生理不順產育艱難或橫或逆並皆治之

十二月兔腦髓去皮膜 乳香另研極細
錢半

母丁香末錢一麝香一字

右三味拌勻以兔腦髓和丸如鷄頭大陰乾油裏每

服一丸溫水下即產兒握藥出

勝金丹治難產神妙敗兔毫筆頭一枚燒為灰研細搗生藕汁一盞下之立產若產母虛弱及素有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器內重湯煖過後服

主難產搗益母草取汁七合煎半頓服立下無新者以乾者一太握水七合煎服

易產天麻丸 天麻即益母草六月間帶根採晒乾

右為末不拘多少煉蜜丸如龍眼大臨產時熟水嚼化一丸能除產後百病

難產 縮砂 香附醋 枳殼 甘草

右為末白湯調服

催生蒲黃地龍陳皮等分地龍洗去土於新瓦上焙令微

黃各為末臍足心三處貼如經日不產各抄一錢土新水調服立產此常親用甚效

大催生神效七聖散臨產腰痛左用之

玄胡索 沒藥 白礬 白芷 姜黃 當歸 桂心

右為細末臨產陣痛時燒制頭銜赤碎酒調三錢服一二盃立產

難產吞槐子十四枚逆產燒銅錢通紅放酒中飲之

治胞漿先破惡水來多胎乾不得下時須先與四物湯補養血氣次更煎濃葱湯放冷令坐婆洗產戶須是款曲

洗令氣上下通暢更用酥調滑石末塗產戶裡次服神妙乳珠丹或蔡子如聖散見前方

催生如聖散治逆產橫生瘦胎

先破惡水者固血

百草霜 香白芷不見火

右二味等分研勻每服二大錢於臨產時以童子小便并少米醋打為膏沸湯調下集驗方用酒童便各半盞同煎過沸即熱服不過再服丹法用芍藥湯調血得無則止此藥大能調血免生毒

滑胎方 又方治橫倒生者

明阿膠炒 滑石末略 葵子配

右水一盞半煎至一盞去渣分二服

治難產五六日不得分娩者疲困虛乏光明水膠二兩用好酒一升半微火焙膠入新鷄子一個搗一錢七攪溫令產母坐椅上伸腰大口作二次服覺小便重便生緣坐草耳驚動故也

破汚血 方 緊半夏湯治胎乾而不能產

半夏麩半 一大黃錢五 肉桂半 七錢 苑仁三十個 微炒

右為粗末先服四物湯一二服次服半夏湯生姜三片水煎服 又方當歸為末調方寸匕酒服之

外敷方 如聖膏治難產併治胞衣不下兼治死胎

草麻子七粒 去殼細研成膏塗脚心胞即下速洗去 不洗腸也却用此膏塗頂上腸自縮入 下方草麻子百粒雄黃一錢細研用妙 上法塗之

催生萬金不傳遇仙丹

草麻子十四粒 去殼 硃砂 雄黃各一錢半

蛇蛻一尺 燒

石為末漿水飲和丸如彈子大臨產時先用椒湯淋滌臍下次安藥一丸於臍中用蠟紙數重覆上以潤常繫之須生下急取去藥一丸可用三次下方草麻子三粒

世三麻四豈脫衣裳研碎將來入麝香若有婦人遭產難
 貼在臍中兩分張用草珠子三粒巴昔四粒
 治產危急者立聖丹寒水石四兩內二兩生二兩煨赤取
 出同生者研細入硃砂同研如深棗花色每用三分并花
 水調如薄糊用紙花剪如杏葉大攤用貼臍心候乾再易
 不過三上便產橫逆惡候死胎不下並治神驗寒水石非
 方解石也即今人謂軟石膏也此方國初異人傳之妙

雜方

圖經催生令產婦兩手各握石燕一枚須臾子下
 救產難經日不生雲母粉半兩溫酒調服又口即產馬不
 失一三五百入效治橫逆產理不順用伏龍肝細研每
 服一錢酒調服之以上着兒頭上戴出妙
世如神散治律生累効靈效於理固難通於事實殊効臨
 產時令人路上尋草鞋一隻取耳燒灰溫酒調下三錢七

針灸

得左足者生男右足者生女覆兒死側者有驚此藥委
 是神奇用此送下催生尤妙

東婦人將產預先胎破惡水長流坐草草無血可養粘墻
 獨陰指第三節間 承陰五分

玉催生難產及死胎 太衝八分 合谷補 三陰交
五分 足小指節三壯心術 產子上衝逼心 巨

張仲文 橫產難產 右脚小指尖頭灸三壯
 又法 獨陰七壯 禁刺 合谷 三陰交 瀉

難產 三陰交
 下死胎法

以藥行之

天下死胎法 方用桂枝二錢麝香當閉子一個同研煖酒

熱者暴以行之

服須更如手推下比之用水銀等此藥不損血氣趙和叔傳一方無麝香單用桂末一錢痛時童便調下名效苦散

鄧知縣傳療死胎不出扑硝研細半兩以童便溫服下屢效治死胎不下指用青香青脹悶口中作屎與先以平胃散一匙作兩服每服酒水各一盞煎至一盞却投扑硝半兩研細再煎三五沸溫服其胎化血水下治子死腹中不出其母氣欲絕水銀二兩吞之立效

燥者滑以潤之

取酒服之立出
治子死腹中不出用辰砂一兩以水煮數沸未出然後
以療子死腹中真珠二兩為末酒調服盡立出
治姙娠三五個月胎死在腹中不出
大腹子 赤芍藥 榆白皮 各三當歸一兩
滑石末 錢七 瞿麥 葵子 茯苓

粉草

黃芩 各半

右為粗末每服四錢水煎

小兒死腹中葵子末酒服方寸匕若口噤不開格口灌之藥下即活 療姙娠胎死腹中或母疾欲下胎榆白皮煮汁服二升

治子死腹中或半生不下或半着脊骨在臍不產血氣上壅母心面無顏色氣欲絕

猪脂升

白蜜升

淳酒升

右三味合煎取二升分溫二服不能飲隨所能服之

雜方

世治生產不順胎死腹中胞衣不下臨產危急效

蛇退 一條全者香 油煎上燒研

麝香 鈔

右為末童便酒各半盞調一服即生效

楊氏療有孕月數未足子死腹中母欲悶絕取大豆三升

醋填濃汁三升頓服立瘥

本治妊娠熱病胎死腹中鹿角屑一兩水一盞葱五莖草豉半合同煎至六分去渣溫分三服

大取死胎烏雞一隻去尾細切以水三升煮取二升去雞通手用衣皂醮摩臍下胎自出

產後症 胞衣不下 血暈 血不止 虛弱 無乳 乳汁自出

陰脫 血塊痛見腹痛

伏凡生產異人飲童便一盞不得便則且宜閉口而坐須臾上床仰臥不宜側臥宜堅膝未可伸足高倚床頭厚鋪茵褥遮圍四壁使無孔隙免致賊風兼時令人以物從心捍至臍使惡露不滯更三日內令產婦常聞醋炭氣或燒乾漆烟若無乾漆以舊漆器燒之以防血暈不問腹痛

熱多宜清之

不痛有病無病以童便和酒生盞溫服五七服妙海藏云

法與產婦服之將苦麻與產婦上則止

產後當大補血氣為先雖有雜症以未治之

地黃丸治產後腹痛眼見黑花或發狂如見鬼狀或胎衣不下失音不語心胃脹滿水穀不化口乾煩渴寒熱往來口内生瘡咽喉腫毒心中忪悸夜不得睡產後出風角

弓反張面赤牙關緊急或崩中如豚肝臍腹疔痛煩躁恍惚四肢腫滿及受胎不穩唇口指甲皆黑

生地研取汁 生薑各二斤研 當歸各四兩 蒲黃

右於銀石器內取生地黄汁炒生薑滓以生薑汁炒地黃查冬令乾四味同焙研為細末醋煨麩糊為丸如彈子大每服一丸食前當歸酒化下神效一方只用生薑

生地無蒲黃當歸依交加法制之為末每服三錢溫酒調下

黑神丸產後服之能生新血去舊血用白湯送下虛者參朮陳皮湯送下方見催生門益母膏治產婦一切傷損一切血病方見調經門

凡婦人因暑月產乳取涼太多得風冷腹中積聚百病就起迄至於死百方不差桃仁煎主之出產後服之

桃仁一千二百枚去皮尖及仁殼令黃色

右一味搗令極細熟以上等酒一斗五升研三四遍如作麥粥法以極細為佳納小長項瓷瓮中密塞以糊封之納湯中煮一伏時不停火亦不令火猛使瓶口常出在湯上勿令浸之熟乾溫酒服一合日再服

黑神散治婦人產後惡露不盡胞衣不下攻衝心腹痞滿

或臍腹堅脹撮痛及血暈神昏眼黑口噤產後瘀血諸疾

孰地 蒲黃炒 當歸 乾姜泡
桂心 芍藥 甘草各四兩 黑荳炒去皮半升

右為細末每服二錢酒半盞童便半盞同煎調服

胎前母滯 產後母虛 產後一切皆不可發表 產後不可用芍藥以酸寒伐生發之氣故也

不可吃物過多恐成積滯若未滿月不宜多語喜笑驚恐憂惶哭泣思慮急怒強起離床坐久行動或作針刺之恣食生冷粘硬油膩魚肉之物及不避風寒當時未覺滿月之後即成虛勞凡產後滿百日乃可交合不爾至死虛羸百病滋長慎之凡婦人患風氣臍下虛冷莫不由早行房

甚忌

也
或曰初產之婦好血已虧汚血或留彼黑神散非要藥乎
答曰至哉乾元萬物資生理之常也初產之婦好血未
必虧汚血未必積藏府未必寒何以聚為飲食起居勤加
調護何病之有誠有活血體怯而寒與之救貼亦自簡便
或有他病當求病起何因病在何經氣病治氣血病治血
何用海制此方例令服餌設有性急者形瘦者本有怒火
者夏月坐震者時有火令姜桂皆為禁藥至于將護之法
尤為停理肉汁發陰經之火易成內傷之病也先哲具有
訓戒胡為以羊鷄濃汁作糜而又常服膏藥丸當歸建中
湯四順理中丸雖是補劑並是偏熱臟腑無寒何處消受
若夫兒之初生母腹頓實便啖鷄子且吃夥益不思鷄子
難化夥益發熱展轉生証不知所困率爾用藥寧不悞人

診
乎每見產婦之無疾者必教之以却去黑神散與夫鷄子
夥益諸品肉食且與白粥將理間以此小養魚煮令淡食
之半月後方與少肉若鷄子亦須豁開淡煮大能養胃却
疾彼富貴之家驕恣之婦卒有白帶頭風氣痛膈滿痰逆
口乾經事不調髮禿身倦皆是陽盛陰虛之病天生血氣
本自和平曰勝曰虛又烏知非此等繆迷有以啓之耶
脈診婦人生產之後寸口脈洪疾不調者死沉微附骨不
絕者生 診婦人新生乳子脈沉小滑者生實大堅弦急
者死

胞衣不下

敗血
大奪命丹治血入胎衣為血脹不得下

附子炮半 牡丹一 乾漆一分碎之
右為末以醞醋一升大黃末一兩熬成膏和藥丸如桐

子大温酒吞五七丸不拘時此藥逐去胞中之血血散
脹消胞衣自下矣

花蓋石散治產後氣欲絕緣敗血不盡血迷血暈惡血奔
心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭爇急以童便調一
錢取下惡血如猪肝終身無血風血氣疾膈上有血化為
黃水即吐出或從小便出也方見珠 黑龍丸治胞衣不
下神效方見產後 黑神散治惡露不快胞衣不下方見
用

牛膝湯治胞衣不出臍腹堅脹急痛即殺久服此藥胞即
爛下死胎亦下

- 牛膝
- 瞿麥各四兩
- 當歸三兩
- 通草六兩
- 滑石八兩
- 葵子五兩

右咬咀以水九升煮三升分三服若衣不下腹滿即殺

久推其源皆胞衣有血奔心是以不出服此藥衣即爛
出

治胞衣不出牛膝一兩葵子一合以水一升煮半升去渣
分二服

備急丹治產後惡血衝心胎衣不下腹中血塊以錦紋
大黃一兩為細末用醞醋半升同煎如膏丸如桐子大患
者用醋七分蓋化五丸至七丸服之須臾血下即愈

保胎衣不下或子死腹中或血衝上昏悶或血暴下及
胎乾不能生產半夏湯主之見前催

下胎丸 半夏 白欬各半兩
右細末丸如桐子大食後半夏湯下三十六丸加至五
十九丸如未効者須臾其藥輸白皮散主之又効大
聖散主之有宿熱者宜服人參荆芥散

雜方

太治胞衣不下惟有花蓋右散一件最為要緊若鄉居藥局遠者倉卒無之今採得胡氏方一妙法若產訖胞衣不下稍久則血流胞中為血所脹上衝心胃喘急疼痛必致危篤若有此証宜急斷臍帶以少物繫帶必用力牢固繫之然後截斷使其子血脈不潮入胞中則胞衣自當痿縮而下縱淹延數日亦不害入只要產母心懷安泰終日下矣累試有驗 治胞衣不下以蛇退炒為細末酒下二錢如聖膏方見胎前催生 若胞衣不下腹脹則殺人黑豈一合炒熟入醋一盞煎去豈分三服 胞衣不下取龜內黃土一寸研碎同醋調勻內於臍中續煎甘草湯三四合服之出

針灸

山胞衣不下用取初洗兒湯服下一盞勿令產母知 集胞衣不下 三陰交 中極各瀉之

表

標幽又法 照海 內關

甲女子字難若胞不出其命三之

產後血暈

仲問曰新產婦人有三病一者病痊二者病鬱見三者太便難何謂也師曰新產血虛多汗出喜中風故令病痊亡血復汗寒多故令鬱見亡津液胃燥故太便難產婦鬱見謂血暈也

大產後血暈者氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷亂心神故眼前生花極重者令人悶絕不知人口噤神昏氣冷但服清魂散即醒

澤蘭葉

人參各二錢半

荆芥一兩

甘草一兩先

右為末用溫酒熱湯各半盞調一錢急灌之下咽即開

眼氣定省人事

保治產後風虛血暈精神昏昧荆芥散

荆芥一兩 莖仁五錢

右細末温水下三錢微帶加杏仁炒甘草各三錢

衍治產後血暈用荆芥穗為末童便調下二錢極妙驗

產後血暈身疼直戴眼口角與目外眦向上牽急不知

久取鷄子一枚去殼取清以荆芥末二錢調服遂仍依次

調治若無他疾則不須治甚敏捷

右荆芥例氣虛人不宜服

大下血多而暈者但昏悶煩亂而已當補血下血少而暈

者乃惡露不下上搶於心心下滿急神昏口噤絕不知人

當破血行血

丹婦人產後血暈此乃虛火載血漸漸暈將上來用鹿角

下血少而暈者

血

宜破血

燒灰出火毒研極細用好酒童便調灌下一呷即醒此物

行血極効

獨行散治產後血暈昏迷不省衝心悶絕五靈脂半生

半炒各二錢為細末温酒調下二錢口噤者幹開口灌之

入喉即愈一方加荆芥等分為末童便調下

世治下胎或產後血上衝心已死用礬金燒存性為末二

錢醱醋一合調灌之立活

簡產後血暈心悶氣絕紅花二兩搗為末分作二服酒二

鍾煎取一鍾併服如口噤幹開灌之速効一方用紅花

三兩新者無灰酒童便各半升煮取一盞服之

肘治血暈蘇木三兩細剉水五升煮取二升分再服產無

蘇木方取緋表煮汁服之亦得

聖產後血暈不知人及狂語麒麟竭二兩細研為末非時

温酒調下二錢七

保紅花散治產後血昏血暈血崩及月事不勻遠年乾血氣

乾荷葉 牡丹皮 川歸 紅花

蒲黃炒等分

右細末每半兩酒煎和查温服如胎衣不下榆白皮湯調半兩立效

右破血輕劑

無牡丹散治產後血暈悶絕口噤則幹開口灌之

牡丹皮 大黃煨 芒硝各一兩 冬瓜子半

右剉每服五錢水三鍾煎至一鍾半去渣入硝又煎分二服

產書治產後心煩手脚煩熱氣力欲盡血暈連心頭便及寒熱不禁接骨木破之如算子一握以水一升煎取半升分温二服或小便數惡血不止服之即瘥此木煎三遍其力一般此是起死之方

右重劑血點酒不出者宜用

下血多而暈者宜補血

大花蕊石散治產後氣欲絕惡血奔心至死者但以童便調一錢取下惡物極妙方見跌撲傷損 黑神散治產後血暈用細酒調服佳方見產通用

右二方寒多者用之

芎歸加芍藥湯治產後去血過多而暈方見產後血不止

保又方治產後血暈危困

生地汁一大盞 當歸半錢 赤芍藥半錢 右水前三五沸温服如覺煩熱去當歸入童便半盞服

梅治產後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷氣欲絕
新羊血一盞飲之且三服妙

大產後忽冒悶汗出不識人者暴虛故也破鷄子二枚吞
之便醒若未醒可與童便一升甚驗 若產後去血多者
又增此疾與鷄子不醒者可急作竹瀝汁一服五合須臾
不定再與五合頻與三五服痊

氣虛

丹婦人年三十餘面白形長心中長有不平事忽半夜誕
子絕分娩後侵晨暈厥不知人遂急於氣海灼艾十五壯
而蘇後以參朮等藥兩月方安
一產婦鬱冒其脈微弱不能食大便反堅但頭汗出所
以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛
下厥孤陽上出故但頭汗出所以產婦喜汗出者是陰血

陽盛陰虛

雜方

虛陽氣獨盛故當汗出陰陽不復大便堅嘔不能食小柴
胡湯主之鬱冒即

大治產後血暈全不省人事極危殆者用韭菜切入有嘴
瓶內煎熟醋沃之便密封瓶口以瓶嘴向產婦鼻孔令醋
氣透入須先扶病人起坐即醒 又方如覺暈即以醋噴
面醒來即與醋細細呷之又以醋塗口鼻并置醋於傍使
常聞其氣 又法治血暈去者急取乾漆燒取烟以向鼻
即醒如無乾漆舊漆器亦可 又方治產後血暈用生半
夏末少許吹入鼻中

本治胎後血上衝心生姜五片切以水八升煮取三升分
三服

丹醋墨防產時血暈好墨半錠火燒赤投醋中如此三遍
出火毒研細每服五分淡醋湯調下

針灸

摘產後血暈不省人事 三里 支溝 三陰交此心術無

標幽又法 陰交 陽別 關元灸

世又法 神門 內關不應取

產後血不下

保治婦人惡血不下

當歸炒 芫花炒等

右為細末每服三錢酒下又用好墨醋煨末小便酒下

妙

太產後惡露方行而忽然斷絕驟作寒熱臍腹百脈皆痛

如以錐刺

當歸研分 桂心 芍藥各半 桃仁去皮尖

沒藥研分 蜃虫去翅 水蛭炒各三

右為末醋糊丸如豌豆大醋湯下

尤峻劑

治產惡露不下

乾荷葉兩 鬼箭羽 莢仁 劉寄奴

蒲黃各一

右為粗末每服三大錢以童便一大盞姜二片生地一分推碎同煎至六分去渣無時熱服

梅治產後血不下蒲黃三兩水三升煎取一升頓服

本治產後血不下益母草搗絞汁每服一小鍾入酒一合

温攪勻服

千生產後血不去麻子五升酒一升浸一宿明旦去渣温

服一升不瘥再服一升不吐不下不得與男子通一月將

養如初瘥

寒滯

大黑龍丸治產後一切血疾產難胎衣不下危急惡疾垂

死者但灌藥得下無不全活神驗不可言

當歸 五靈脂 川芎 良姜

熟地各三

右細剉入沙罐中赤石脂泚縫紙筋蓋泥固濟炭火十斤煨令通赤去火候冷取開看成黑糟色取出細研却入後藥

百草霜錢五 硫黃 乳香各一 花蕊石

琥珀各三

右五味並細研如桐子大頓服立效

產後血不止

虛

芎歸加芍藥湯治產後血崩眩暈不知人事

川芎 當歸 芍藥各等

右咬咀每服四錢以水一鍾半煎至七分去渣無時熱

服

產後血崩加薑汁紫黑過多者四物湯加蒲黃生地汁

阿膠煎根艾白芷煎服

虛中有寒

四七二孺人產後身寒哭多血再下身潤服沉

當歸 白木 陳皮 川芎

乾姜 黃芩各二 芍藥錢一 甘草些

右分二貼煎服

虛中有滯

王孺人因憂慮墮胎後兩月餘血不止腹痛此躰虛氣滯

惡物行不盡

陳皮錢一 白木二錢 芍藥錢一 木通

川芎分五

作湯下五芎丸六十粒食前

膈下者舉之

千治產後惡血不盡或經月半歲芎麻三兩清酒五升煮

脫者進

取二升半分溫再服

雲牡礪散治產後惡露淋瀝不絕心悶短氣四肢乏弱頭目昏重煩熱

牡礪

川芎

熟地

茯苓

龍骨略一

續斷

當歸炒

艾葉酒炒

五味

人參略半

甘草半兩

地榆兩

右為末每服三錢生姜三片葱一枚水同煎食前用

產書產後猶有餘血水氣者宜服豆淋酒黑豈五升熬令

烟盡於瓷器內以酒一斗燂之

右豆淋酒治汚血又能發表也

治產後惡血不絕腹中絞痛氣息急

亂髮燒一兩

阿膠兩

代赭石

乾姜各三兩

馬蹄燒一個

乾地黄兩

牛角鯁五兩

汚血

寒

右為細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下三四十九日

治產後崩中下血不止菖蒲一兩半劉酒二鍾煎一鍾

去渣分三服食前溫

產後血崩取木月及斤者或半斤者燒灰為末用麝香

一錢枳殼去穢內用濕紙包煨令香熟研細入藥每用一

錢烏毒湯下

右木月蓋木耳之類木屑疊也按木耳治崩中滯下效

木產後下血不止炙桑白皮煮水飲之

秘錄治胎落下血不止以桑木中蝎虫燒末酒服方寸七

日二服

產後虛弱

丹產後補虛

虛熱

人參

白朮各一錢

黃芩

歸身尾各五錢

川芎兩

陳皮分

右煎服如有寒加乾姜三分茯苓一錢

保三元湯治產日久虛勞而脈浮大者方見婦人門大法條乃小柴胡合四

也物

治產後日久虛勞鍼灸不效者三合散此四君子四物小柴胡三方合和是

也

白朮

川歸

芍藥

黃芪

茯苓

熟地兩

柴胡半兩

黃芩六錢

人參半兩

半夏

甘草各六錢

川芎兩

右為粗末每二兩水一鍾半服日三

大當歸羊肉湯治產後雖無疾者但覺虛弱兼心腹痛

肥羊肉

煮取八升去肉去脂水一斗當歸五兩

黃芪四兩

虛寒

生薑六兩

右以肉汁煮三味取二升五合分為四服若食惡露不

去加桂三兩惡露下多加芎三兩有寒加茱萸二兩有

氣加細辛二兩有熱加生地汁二合

保治產婦虛勞不能食十全散方見治虛寒法氣血各症

當歸建中湯治婦人一切血氣俱損及產後勞傷虛羸

不足腹中疝痛吸以少氣小腹拘急痛引腰背時自汗出

方用當歸四兩肉桂二兩甘草二兩白芍六兩姜棗煎服

之 雲治產後虛損飲食不下四物加建中人參白朮茯苓主

產後無乳

大累經產而无乳者亡津液故也須服滋益之藥以動之

若雖有乳却又不甚多者須服通經之藥以動之仍以藥

耀引之蓋婦人之乳資於衝脈其曾空通故也太抵婦人
素病有疾在衝任經者乳汁必而其色帶黃所生之子怯弱
多病

無乳汁不行有氣血盛而壅閉不行者有血氣弱澁而不
行者虛當補之實當疎之疎用通草漏芦土瓜葶藶用鍾
乳粉猪蹄鯽魚之屬

大治乳无汁

土瓜

漏芦各三

甘草二

通草四

右水八升煎取二升分温三服

下乳汁括萎子淘洗控乾炒令香熟瓦上揅令白色為
末酒調下二七合卧以時 產書下乳汁土瓜為末酒服
一錢日三服

下乳汁以京三稜三杯水二碗煎取一碗洗取汁下為

度極妙

之虛者補

婦人乳不行高苣子糯米各一合細研水一盞攪勻入
甘草末一斗煎之温呷頻與妙

立効方下乳汁

糯米

高苣子各半合

甘草半兩

右煎汁一升研藥令細去渣分作三服立下

又方 猪蹄隻

通草兩

右以水一斗煮作羹食之

羅湧泉散治婦人乳汁因氣絕少

瞿麥穗

麥門冬去

龍骨

川山甲炮

王不留

右為細末每服一錢熱酒調下後吃猪蹄菜少許又用
水梳於左右乳上各梳三二十梳日三服依前法

又方治癩汗少

瓜蒌根 薄荷幹身等

右為粗末先吃羊蹄汁一碗次服藥後再吃葱絲羊羹

湯必許出効

有人乳脈不行已十七日諸藥無効遇有人送赤豈一斗遂時常煮粥食之當夜乳脈通行

乳汁自出

虛實

產前乳汁自出者謂之乳注生子多不肯產後乳汁自出蓋是身虛宜服補藥以止之若乳多急痛而出者温帛熨之漏蘆散亦可

漏蘆半錢

蛇蛻一條

瓜蒌汁

右為末酒調二錢無時

產後陰脫

虛

一婦人三十餘歲生女二日後產戶一物如手帕下有帕大約重一斤子思之此因胎前勞乏傷氣成疔痿所致却喜血不甚虛其時歲暮天寒恐冷乾壞子急與灸黃芪半錢人參一錢白朮五分當歸一錢半升麻五分三貼連服之即收上得汗通身乃安但下齋沾席處乾者落一貼約五六兩重蓋脂膜也食進得眠診其脈皆瀉左略弦視其形却實與白朮芍藥各錢半陳皮一錢生姜一片煎三貼以卷之 一婦人產子後陰戶中下一物如合鉢狀有二歧其夫來求治子思之此子宮也必氣血弱而下墜遂用升麻當歸黃芪木料二貼與之半日後其夫復來曰服二次後覺響一聲視之已收陰戶訖但因經宿乾着席上破一片如掌心大在席其妻在家哭泣恐腸破不可復生子思之此非腸胃乃糟粕也肌肉破尚可復完若氣血

雜方

充盈必可生滿遂用四物湯加入參與二百貼三年後復
 有子 治子宮不用黃芪一錢半人參一錢當歸七分升
 麻三分甘草二分作一貼水一鍾煎至三分去食前服
 却用五倍子末泡湯洗又用末傅之如此數次宜多服藥
 永不下 治陰脫蓋產努力太過致陰脫若脫肛狀及陰
 挺出逼近腫痛舉重房勞皆能發作清水續續小便淋露
 用硫黃烏賊骨各半兩五味子一分為末傅患處兼服參
 芪歸草升麻等補藥 治產後陰下脫人尿燒酒下方寸
 七日一 千金無異蠟皮散加警
 治產後陰腫下脫內出玉門不開存灰一升炒極熱湯
 二升投灰中滴溫冷澄清坐水中以浸玉門斯須平復如
 故 又方以鐵精粉上推內之又灸臍下橫紋七壯
 一法用鐵精羊脂二味攪令稠布裏灸熱熨推內之鐵精

是鍛鐵灶中飛出如塵紫色而輕虛可以坐磨器血者
 又方單炒蛇床子一升乘熱以布裏熨患處亦治產後除
 戶痛

子母療產後陰下脫燒鬼頭末傅之

針灸

東女入胞胎門落顏不收常濕 神關 玉泉壯五十 身

交臍下指縫中灸 又法 玉泉傍開三寸壯三十 女

人陰門冷腫 飯來壯三十

甲婦人陰挺出四肢淫瀼身悶少海主之一作

