

八番
回拾冊

養子綱目

三子



醫學綱目卷之三十六

小兒部

小兒通治

錢氏診
五臟虛
五臟所主


心主驚，實則叫哭發熱飲水而搐，虛則困臥悸動不安。

肝主風，實則目直視大叫呵欠項急煩悶，虛則咬牙多欠氣熱則外生風氣溫則内生風。

脾主困，實則困睡身熱飲水，虛則吐瀉生風。

肺主喘，實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者，虛則哽氣長出氣短。

腎主虛，無實也惟瘡疹腎實則黑陷，更當別虛實證如肺病又見肝證咬牙多呵欠者易治肝虛不能勝肺故也若目直視大叫哭項急煩悶者難治蓋



肺病久則虛冷肝強實而反勝肺也宜視病之新久虛實
虛則補母實則瀉子

五藏病證

肝病哭叫目直視呵欠煩悶項急 心病多叫哭驚悸手
足動搖發熱飲水 脾病困睡洩瀉不思飲食 肺病悶

亂哽氣長出氣短氣喘急 腎病目無精光畏明體骨重

五藏雜證

肺藏法 唇白色當補肺阿膠散主之若閉亂氣喘促
哽氣者難治肺虛損故也 脾肺病久則虛而唇白脾者

肺之母也母子皆虛不能相宅故名曰怯肺主唇唇白而

光澤者舌白如枯骨者死此以唇診肺之法也唇白色者
肺藏法也阿膠散主之若手尋

衣領及肘腋物者肺熱也宜甘桔湯之類是也

心實 心氣實則氣上上行瀉若合面臥則氣不得通故

喜仰臥使氣得上下通也瀉心湯主之心氣熱則合面
臥笑則仰臥也

腎虛 兒本虛怯由胎氣不成則神氣不足目中白睛多

顯解顯開面色晄白者皆為難養雖長不過八八之數若

恣色慾不及四旬而亡或有因病而致腎虛者非也又腎

不足則下竄蓋骨重惟欲墜下而身縮也腎者陰也腎氣

虛則畏明皆宜補腎地黃丸主之心氣熱則上竄宜導赤
散腎氣虛則下竄宜地

黃丸是也

五藏相勝
時令

肝病勝肺 肝病秋見一作肝勝肺也肺怯不能勝肝當
補脾治肝益解者母令子實故也補脾益黃散治肝瀉青

丸主之

肺病勝肝 肺病春見一作肺勝肝也肝怯故受病當補
肝腎治肺補肝腎地黃丸治肝瀉白散主之

五臟相勝輕重 肝病見秋木旺肝勝肺也宜補肺瀉肝

輕者肝病退重者唇白而死

肺病見春金旺肺勝肝也當瀉肺輕者肺病退重者自淡

青必發發黃更有赤者當搖海藏云為肝候故目淡青色也
心病見冬火旺心勝腎也當補腎治心輕者心病退重者
下竄不語腎怯虛也

腎病見夏水勝火腎勝心也當瀉腎輕者腎病退重者悸
動當搖

脾病見四旁皆做此治之順者易治逆者難治脾怯當面
赤目黃五臟相反隨證治之

右五臟相勝病隨時令乃錢氏擴充內經藏氣法時論
之旨矣發前人所未發者也假如肝病見於春及早晨

乃肝自病於本位也今反見於秋及日晡肺之位知肺
虛極肝往勝之故當補脾肺瀉肝也餘倣此

凡病先虛或已經下有合下者必先實其母後瀉其子也
假令肺虛而痰實此可下之症先當益脾後方瀉肺也

五藏補
法

瀉青丸又名瀉 導赤散海藏云瀉 瀉心湯海藏云

安神丸錢氏治心虛痛 益黃散又名補脾散海藏云此

散錢氏益黃散治胃中寒濕嘔 瀉黃散又名瀉脾散海

阿膠散又名補肺散海藏云杏仁本瀉肺 瀉白散又名

散海藏云治肺熱骨蒸自汗用此直瀉之梔子黃芩亦瀉

肺道以氣血分之○已上八方並見臍腹部治虛實法

地黃丸海藏云治腎虛解頰即瘰癧

潔熱則從心寒則從腎嗽而氣上從肺風從肝瀉從脾假

令瀉兼嗽又氣上乃脾肺病也宜瀉白益黃散合而服之

脾苦濕肺苦燥氣上逆也其症見瀉又兼面色黃腸鳴嘔

吐者宜服理中湯瀉而嘔者宜服茯苓半夏湯如瀉而渴

熱多者宜服黃芩厚朴湯不渴而熱少者宜服白朮厚朴

湯其他五臟若有兼症皆如此類推之更詳後論四時推
移用藥

瀉命
五藏病
與錢氏
微異

五藏
正脈

移用藥

心自病

心主熱自病或大熱瀉心湯主之 實則煩熱黃連瀉心湯主之 虛則驚悸生犀散主之

五邪乘心法

肺乘心微邪喘而壯熱瀉白散主之 肝乘心虛邪風熱煎大羌活湯下大青丸主之 脾乘心實邪泄瀉身熱瀉

肺自病

黃散主之 腎乘心賊邪恐怖惡寒安神丸主之 肺主燥自病則喘嗽燥則潤之 實則喘而氣盛瀉白散主之 虛則喘而少氣先益黃散後阿膠散主之

五邪乘肺法

心乘肺賊邪熱而喘嗽先地黃丸中導赤散後阿膠散主之 肝乘肺微邪惡風眩冒昏憤嗽羌活膏主之 腎乘

肝自病

肺實邪增寒嗽清利百部丸主之 脾乘肺虛邪體重吐痰洩瀉嗽人參白朮散主之 肝主風自病則風搖拘急肝苦急食甘以緩之佐以酸苦以辛散之 實則風搖力大瀉青丸主之 虛則風搖

五邪乘脾法

力小地黃丸主之 心乘脾實邪壯熱而搐利驚丸涼驚丸主之 肺乘脾賊邪氣盛則前伸呵欠微搐法當瀉肺先補本臟補肝地黃丸主之 瀉肺瀉白散主之 脾乘脾微邪多睡體重而搐

脾自病

先當定搐瀉青丸主之 搐止再見後症則別立法治之 腎乘脾虛邪憎寒呵欠而搐羌活膏主之 脾主濕自病則洩瀉多睡體重昏倦脾苦濕急食苦以燥之 實則泄瀉赤黃睡不露睛瀉黃散主之 虛則泄瀉

五邪乘脾法

色白睡露睛白朮散主之 肝乘脾賊邪風瀉而嘔茯苓半夏湯主之 心乘脾虛邪壯熱體重而瀉羌活黃芩蒼朮甘草湯主之 肺乘脾實邪能食不大便而嘔吐嗽煎檳榔大黃湯下葶藶丸 腎乘脾微邪惡寒泄瀉理中丸之類主之

腎自病

腎主寒自病則足胫寒而逆人之五臟惟腎無實小兒瘡疹瘦黑陷則是腎實水尅退心火

五邪乘腎法

心乘腎微邪內熱不惡寒桂枝湯主之 肺乘腎虛邪喘嗽皮溢寒百部丸主之 肝乘腎實邪拘急氣搐身寒理中丸主之 脾乘腎賊邪體重泄瀉身寒理中丸主之

五臟隨四時補

凡五臟虛弱是自己正令不行乃鬼賊之所尅害當補本臟之正氣假令肺病喘嗽時於初春見之法當補腎見於夏救肺見於秋瀉肺見於冬補心瀉本臟又名寒嗽太抵

五臟各至本位即氣盛不可更補到所克位不可更瀉云五歲子母虛實鬼賊微正若不達旨意不易得而入焉在前者為實邪在後者為虛邪妻乘夫為微邪夫乘妻為賊邪本臟自病為正邪

參顏色

潔肝病面白 肺病面赤 脾病面青 腎病面黃 心病面黑 若肝病驚搖而又加面白痰涎喘急之類此

漢古辨藏補錢氏法

皆難治餘倣此推之假令春分前風寒也宜用地黃羌活防風或地黃丸及瀉青丸相間服之春分後風熱也宜用羌活防風黃芩或瀉青丸導赤散下之立夏後熱也宜用三黃丸導赤散夏至後濕熱也宜用導赤散瀉黃散合而服之或黃芩人參木香之類秋分後用瀉白散立冬後用地黃丸主之謂腎不受瀉也

海補肝丸四物湯內加防風羌活等分為細末煉蜜丸是也

鎮肝丸瀉青丸去梔子大黃治肝虛 瀉腎丸治脈洪而實前熟地改生地山茱萸是也此治左手本部脈若右尺洪實以鳳髓丹瀉之此地黃丸即仲景八味丸去桂附若加五味子腎氣丸也此益肺之源以生腎水焉

禁忌

丹慈幼論○人生十六歲已前血氣俱盛如日方昇如月

將圓惟陰長不足腸胃尚脆而窄養之道不可不謹童子不衣裘帛前哲格言具在人耳裳下體之服帛溫煖甚於布者也裘皮服溫軟甚於帛者也蓋下體主陰得寒涼則陰易長得溫煖則陰暗消是以下體不與綿絹來厚溫煖之服恐妨陰氣實為確論血氣俱盛食物異消故食無時然腸胃尚脆而窄若稠粘乾硬酸醃甜辣一切魚肉水菓濕麪燒炙煨炒俱是發熱難化之物皆宜禁絕只與熱菜白粥非惟無病且不縱口可以養德此外生菓味鹹乾柿性涼可為長陰之助然栗太補柿太澁俱為難化亦宜少與婦人無知惟務姑息畏其啼哭無所不與積成痼疾雖悔何及所以富貴驕養有子多病迨至成人筋骨柔弱有食則不能忘口以自養居喪則不能食素以尺禮小節不謹太義亦虧可不慎歟至於乳母尤宜謹節飲食下咽

乳汁便通情欲中動乳脈便應病氣到乳汁必凝滯兒得此乳疾病立至不吐則瀉不瘡則熱或為口糜或為驚搐或為夜啼或為腹痛病之物來其溺必少便須詢問隨證治毋母安亦安可消患於未形也夫飲食之擇猶是小可乳母稟受之厚薄性情之緩急骨相之堅脆德行之善惡兒能速肖尤為關係古之胎教具在方冊愚矣多贅若夫胎孕致疾事起茫昧人多玩忽醫所不知兒之在胎與母同體得熱俱熱得寒俱寒病則俱病安則俱安母之飲食起居尤當慎密不可不知也

田大凡小兒過煖生熱七極生風提抱生癩餵飼生癖最宜慎之

錢大喜後食乳食多成驚癇大哭後食乳食多成吐瀉

丹乳下小兒常多濕熱食積痰熱乃是傷乳為病小兒易

雜診

怒肝病與肺病最多

錢脈亂不治弦急和氣不沉緩傷食保急虛驚浮風沉細冷

本候兒脈當以太指按三部一息六七至為平和八九至

為發熱五至為內寒脈弦為風癰沉緩為傷食保急為虛

驚弦急為氣不和沉細為冷浮為風木小不勻為惡候為

鬼祟浮太數為風為熱伏結為物聚單細為疳勞凡腹痛

多喘嘔而脈洪者為有虫沉而遲潮熱者胃寒也温之則

愈訣曰小兒脈驚風癰候沉緩食傷多嘔吐弦急因知氣

不和急促急驚神不守冷則沉細風則浮牢實大便應秘

久腹痛之候緊而弦脈亂不治安可救變蒸之時脈必亂

不治自然無過繆單細疳勞洪有虫木小不勻為惡候脈

沉而遲有潮熱此必胃寒來內寇瀉利脈大不可醫仔細

酌量宜審究云岐子云未及五歲不可視所者未可別脈

五歲已上方可以脈別浮沉遲故按錢氏論

又不拘五
歲上正也

嬰兒未可方脈者俗醫多看虎口中紋顏色與四肢冷熱
取之亦有可驗予作一歌紀之曰紫風紅傷寒青驚白色
疳黑時因中惡黃即困脾端又冷熱症歌曰鼻冷定知是
瘡疹耳冷因知風熱證通身皆熱是傷寒上熱下冷傷食
病若能以色脈參伍驗之所得亦過半矣

不瘥

世百日內不治症 發斑 臍風撮口 馬脾風 龜背

錢不治症目赤脈貫瞳人 胸腫及陷 鼻乾黑 魚口

氣急 吐虫不定 瀉不定精神不好 大渴不定止之

又渴 吹鼻不噴 病重口乾不睡 時氣唇上青黑點

頰深赤如塗胭脂 鼻孔開張 喘急不定

靈嬰兒病其頭毛皆逆上者必死論疾診大篇

脈小兒病困汗出如珠着身不流者死 小兒病而胸陷

口唇枯乾目直視口中氣冷足與頭相低臥不舉身手足四肢垂其臥正直如縛掌中冷皆死至于且不可復治之病重面有五色不瑩不澤者死

生下胎疾

雜方

無小兒初生氣絕不能啼者必是難產或胃寒所致急以綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶且將胞衣置於炭中燒之仍燃大紙條蘸油點於臍帶下薰之蓋臍帶連兒臍帶時有火氣由臍入腹更以熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可洗浴了即斷臍帶

百壽散小兒初生未滿月已裹用之者老無瘡疥

黃連兩 硃砂錢

右水煎令老母拭去口涎淨灌下餘藥傾盆中浴兒遍身搽妙 又方淨黃連一錢水一盞預先煎下待兒生

未出聲時便用灌下以去腹中惡物臍屎兼解胎中蘊積熱毒終身不生瘡又去臍風等病

虛實

胎實面紅目黑睛多者善笑胎怯面黃目黑睛少白睛多者多哭更別父母肥瘦肥不可生瘦瘦不可生肥也胎肥者生下肌肉厚遍身血色紅滿月以後漸漸羸瘦目白睛粉紅色五心煩熱大便難時時生涎浴體法主之

天麻二錢

蝎尾去毒

硃砂各五

烏蛇肉酒浸焙乾

未為

白礬各三

麝香一

青黛三

右研勻每用三錢水三碗桃枝一握并葉五七枝同煎至十沸溫熱浴之勿塗背

胎怯者生下面無精光肌肉薄大便白水身無血色時時嘔氣多歲目無精采亦宜以浴法主之 世母氣不足則羸瘦而肉薄父精不足則解顛眼白多

寒熱

胎熱生下，有血氣時時哭身壯熱如淡赤色，目赤大便赤黃糞稠急，釀乳浴法主之。

湯小兒受胎時因母有熱或次食酒麪熱毒之物傳於胎中，令兒生下面赤眼閉身體壯熱哭聲不止，口熱如湯乃胎熱之候也，宜生地黃湯。

生地 瓜蒌根

赤芍藥

川芎

當歸

右件等分，咬咀，每服半兩水一盞煎六分，產婦亦可服，以些抹入兒口中。

凡胎熱服藥不可求速效，治法當釀乳漸解之，若處以涼藥攻之，必損脾胃，加以嘔吐，乃成木患，宜服生地黃湯，用釀乳。小兒胎中有寒生下，不能將護，再傷於風，其候面色青白，四肢逆冷，手足顫動，口禁不開，及胎寒之故，或寒

胎驚

氣乘虛入臟，作腹痛，盤腸內，胎寒治法見

田月裏生驚，急取豬乳細研，辰砂牛黃各少許，調抹口中，神效。乳母服防風通聖散三劑，其驚自消。

孝治小兒未滿月驚搐，似中風欲死者，用辰砂以新汲水濃磨汁塗五心，止最效。

湯治胎癩驚風，皆可服。全蝎頭尾全，用生薑葉包外，以麻線纏，火上炙燥為末，別研生硃麝香各少許，煎麥門冬湯調下。

胎黃

小兒生下，遍體面自皆黃，狀如金色，身上壯熱，大便不通，小便如柏汁，乳食不思，啼叫不止，此胎黃之候。凡有此症，乳母宜服生地黃湯，仍忌酒麪五辛之物。

生下

錢木瓜丸治小兒生下吐者，因兒初生下，拭口中穢惡，不盡咽入喉中，故吐木瓜丸主之。凡初生急須拭喉口中，令

淨若啼聲一發則咽下多生諸病矣

木瓜

麝香

臙粉

木香

檳榔各等分

右同研細末麪糊丸如小黃米大每服一十九其草水下無時

田月裏生嘔先用硃砂丸下之如利後用硃沉煎墜其邪氣使穢物自下而不嘔也

生赤

月裏生赤肌膚如赤丹塗者先用牛黃散托裏續用藍葉散塗外乳母服清涼飲子于木劑

右小兒初生下月裏諸疾蓋胎毒之淺者若丁十歲後所生之疾乃胎毒之深者宜種法治之

垣李叔和丁日問東垣曰中年求得丁子至丁十歲後身生紅絲瘤不救後三四子至丁二十歲皆病癩而死敢問何也

胎瘕

曰予試思之翌日見叔和曰吾得之矣汝腎中伏火精中多有紅絲以氣相傳生子故有此疾遇觸而動發於肌肉之間俗名胎瘕是也汝試視之果如其言遂與滋腎丸數服以瀉腎中火邪補天真之不足忌酒肉辛熱之物其妻以六味地黃丸養其陰血受胎五月後以白朮黃芩二味作散與服後生兒至三歲前症不復作矣叔和曰先生乃神醫也遂從受學其子今已年壯矣

丹溪補遺謂小兒心氣鬱而多瘡疽由胎食過而受毒此至論也小兒識見未萌欲想未動心氣何鬱先哲謂乳下小兒常多濕熱與胎食過而受毒又有成胎之時父母氣血有寒熱之偏多能致子之病况形體未堅完盲膜尚脆嫩何為畧而未論向見一人連年疔病新愈而成一男生來三月病熱右腋下陽明少陽之間生一瘰疬甫平左腋下

相對又生一瘡膿血淋漓無復生意醫者王壽甫以四物湯敗毒散加參以香附為佐犀角為使木料飲乳母兩月而安踰三月忽腹脹生赤疹如霞片取剪力草汁調晚香沙傳之隨消半月脹移入胞囊為腫黃瑩可畏越兩日囊裂開兩丸顯露出清水以紫蘇葉承麩炭細末托之旬餘而合夫以父之久病其母寧無憂鬱之火與疔之餘熱毒致此亦不可不知

胎胎
張進士次子二歲滿頭有瘡一日瘡忽自平遂患痰喘予視之曰此胎毒也慎勿換解利藥衆皆愕然予又曰乃母孕時所喜何物張曰辛辣熱物是其所喜因口授一方人參連翹川芎黃連甘草陳皮芍藥木通濃煎湯入竹瀝與之數日而安何以知之見其精神昏倦受病特深決無外感非胎毒而何予之次女形瘦性急體本有熱懷孕

三月適當夏暑口渴思水時發小熱遂教以四物加薑今陳皮生甘草木通因懶於煎煮數貼而止其後生子二歲瘡疾遍身忽一白其瘡頓愈遂成痰癆予曰此胎毒也瘡若再作病必自安已而果然若於孕時確守前方何病之有

胎淋
鄭廉使之子年十六初生七箇月患淋病五七日必一發其發則大痛水道狀如黍如粟者約一杯許然後定診其脈輕則泄重則弦視其形瘦而長其色青而蒼意其父必因多服下部藥遺毒在胎留於子之命門而然遂以紫雪和黃柏末左桐子六晒極乾熱湯下百丸以食物壓之又半日痛大作腰連腹水道乃行下如黍如粟者一太碗許其病減十分之八後又與陳皮一兩桔梗木通各半兩作一貼與之又下如黍粟者一合許而安父得燥熱且能

胎漏

病子况母得之者乎予書此以證東垣紅瘤之事此亦熱在血分也

陳氏女八歲時癩病遇陰雨則作遇驚亦作口出涎沫聲似羊鳴予視之曰此胎受驚也其病深痼調治半年亦可安仍須淡味以佐藥功與燒丹在繼以四物湯入黃連隨時令加減半年而安
燒丹丸方原本未考按類藥用女精白入寒食麩一水滴水種成餅再用麩黃取去麩再研細滴水種如米大一歲五九一十歲十九歲水送下取下惡物為度未如是否

胎主風 角弓反張 搖頭 偏風

驚搐 驚癇 天吊 眼目 眼白多

雀目疳瘡 赤眼 通睛 偏墜

陰腫囊腫脫囊 疝氣 小便不通

淋病 遺尿 喉痺

風熱

錢肝有風目連劄不搐有熱則直視亦不搐得心熱則搐治肝瀉青丸治心導赤散 凡病或新或久皆引肝風風動而上於頭目目屬肝風入於目上下左右如風吹不定兒不任故目連劄也若熱入於目牽其筋脈兩眦皆緊不能轉視故目直視也若得心熱則搐其子母俱有實熱風火相搏故也治肝瀉青丸治心導赤散

角弓反張

錢肝有風甚則身反張強直不搐心不受熱當補腎治肝補腎地黄丸治肝瀉青丸

虛風

丹溪云瘧比癩為虛宜帶補多是氣虛有火兼痰用入參竹瀝治之不用兼風藥此論實發前人所未發湯氏雖云瘧候十無一生蓋未嘗有此法施於人也

針灸

明角弓反張鼻上入髮際三分灸三壯 太樞下節間灸

診

三壯
身軟時醒者為癰身強直反張如弓不時醒者為瘧瘧候七無一生

搖頭

肝風搖頭諸方不戴鄒都承子患七年搖頭二年下血已服百餘方前後所服治搖頭者無非風藥止血者或作痢或作腸風百藥無效予既視其病又知其詳亦不明其標本退而思之乃肝血液盛外有風熱乘之肝屬木盛而脾土為木所克脾與肺是子母俱為肝所勝而血遂清於大便故便血不止遂處一方但損肝祛風而益脾初亦一時之見只數服而愈十餘日後血止而下白膿遂得以安

- 犀角屑
- 甘草各一分
- 瓜蒌根一分
- 蛇退皮一分
- 防風五分
- 鈞藤鈞子
- 麻黃去節
- 黃芪蜜炙

風

錢全蝎散治小兒驚風中風口眼喎斜言語不正手足偏廢不舉

- 全蝎去毒炒
- 僵蚕直者炒
- 川芎
- 黃芩法
- 甘草
- 桂枝
- 赤芍藥
- 麻黃去節各
- 天麻錢
- 大南星湯泡七次去皮切焙乾五錢

右為錢末每服三錢水一鍾半薑七片煎七分溫服無

羌活 白芍藥各半
右為末末肉丸食後薄荷湯下只二服作效頭搖即止便血隨愈次間服胃風湯數日頓除沈舍令子服之亦驗

海食療云蛇脫皮主去風邪明目治小兒一百二十種驚癰寒熱痔瘻毒安胎熬用 治癰弄舌搖頭者宜用全脫

時量大小與之一日三內服忌羊肉

驚搐

按驚搐一也而有晨夕之分表裏之異身熱力大者為急驚身冷力小者為慢驚亦地作聲醒時吐沫者為癇頭自仰視者為天中角弓反張者為瘵而治各不同也

藏府非時相瀉法

潮熱變發搐在早晨寅卯時者此肝用事之時也身體壯熱日上視手足動搖口内生熱涎項頸強急此肝旺也當補腎治肝補腎地黃丸治肝瀉青丸潔古云木之位肝旺也

因潮熱發搐在巳午未時者此心用事之時也心惕目止視白睛赤色牙關緊急口內涎生手足動搖此心旺也當補肝治心導赤散涼驚丸補肝地黃丸潔古云火之位心熱也

廣親宅七太尉方七歲潮熱數日欲愈錢謂父二太王曰七使潮熱將安八使預防驚搐王怒曰但使七使愈勿

言八使病錢曰八使過來日午間即無苦也次日午前果作搐急召錢治之三自而愈蓋預見其目直視而顛赤必肝心俱熱更坐石枕子乃欲就冷此熱甚也又肌膚素肥盛而本實其脈急促故發搐所言午時者自寅至午皆心肝用事之時治之乃瀉心肝補腎自安矣

因潮熱發搐在申酉戌時者此肺用事之時也不甚搐而喘目微斜視身熱如火睡露睛手足冷太便淡黃水是肝旺當補脾益黃散治肝瀉青丸治心導赤散潔古云脾病以性其強而後補脾為當

徐氏子三歲病潮熱每自酉則發搐身微熱而目微斜露睛四肢冷而喘太便微黃請錢與李同治錢問李曰病何搐也李曰有風何身熱微温曰四肢所作何目斜睛露曰搐則目斜何肢冷曰冷厥心內熱曰何喘曰搐之甚也曰

何以治之曰涼驚丸鼻中灌之必搐止錢反問曰既謂風病濕壯搐引目斜露睛內熱支冷及搐甚而喘併以何藥治之李曰皆此藥也錢曰不然搐者心肝實也身微熱者日西肺用事之時也肺主身溫今自熱者肺虛也目微斜露睛者肝肺相乘勝也四肢冷者脾虛也肺若虛甚則脾母亦弱木氣乘脾四肢即冷治之當先補脾肺用益黃散阿膠散得脾虛症退然後治其心肝以瀉青丸導赤散涼驚丸治之九日愈

因潮熱發搐在亥子丑時者此腎用事之時也不甚搐而臥不穩身體溫壯目睛斜視喉中有痰大便銀褐色乳食不消多睡不少當補脾治心補脾益黃散治心導赤散涼驚丸

表裏傷風發搐因傷風後得之口中氣出執呵欠頓悶手足動

指驚發散大青膏主之小兒生來怯弱者多此病也大青膏方

見傷寒

傷風發搐因傷風而得之症同大人傷風寒痰之類當辨有汗無汗陰陽二症用大青膏小續命之類開發則愈

大青膏陰症小續命陽症也

傷寒發搐因傷食後得之身體溫多睡或吐不思乳食而發搐當先定搐搐退白餅子下之後服安神丸

熱傷食發搐謂不因他症忽然而搐此因飲食過度致傷脾胃故兒多睡多吐不思飲食脾胃既虛引動肝風則發搐當先定其搐加羌活防風前下瀉青丸後用白餅子下

其食漸漸用調中丸異功散養其氣

百E搐 真者內生驚癇假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝任乃

發搐也欲知假者口中氣出熱治之可發散大青膏主之
 及用塗頤浴體法 李司馬孫百白病來搐三五次請眾
 醫治或作天栗或作胎驚或作驚癇皆無應者後錢氏用
 大青膏如葶許一服發之復與塗頤法及浴體法二白而
 愈何以然嬰兒初生肌骨嫩怯一被風傷遂不能任故發
 搐也然類發者輕以客風在內每遇不任即搐輕則易歇
 故發頻也搐稀者是內臟發病不可救也類搐者宜散風
 冷故用大青膏亦不可多服蓋兒至小易虛易實多即生
 熱止宜用下塗頤法

麝香一

蝎尾去毒為薄奇字

蜈蚣炙

牛黃

青黛各一

右同研末用熟棗肉劑為膏新綿帛上塗勻貼額上四
 葉許出三指許火止吹手頻熨百自裏外兒可用此塗

頤法

外物驚宜苦寒

內動驚宜寒

外物驚宜鎮平之以黃連安神丸若氣動所驚宜寒水
 石丸黃連安神丸黃連安神丸見燥條

按外物驚者元氣本不病故治以黃連安神之苦寒氣
 動驚者不因外物驚元氣自有病故治以寒水石安神
 之甘寒也

錢鎮心丸涼心經治驚熱痰盛

甜稍白者一兩

人參一兩

甘草炙

寒水石燒各兩半

山藥白者二兩

白茯苓二兩

硃砂一兩

龍腦

麝香各一錢三未另研

急驚屬陽慢驚屬陰

凡急慢驚陰陽果證切宜辨而治之急驚合涼瀉慢驚合
 溫補

右急驚症屬木火上實也水實則搐而力大目上目劄

所謂木太過曰發生其動掉眩癩癩是也火實則身熱面赤土實則不吐瀉睡合睛故其治法合涼瀉而用涼驚丸利驚丸之類慢驚症屬木火土虛也水虛則搖而力小似搐而不甚搐經所謂木不及曰委和其病搖動注恐是也謂手足搐動腹注泄心恐悸也火虛則身冷口氣冷土虛則吐瀉睡露睛故其治法合溫補而用羌活膏益黃散有熱者用東垣黃芪益黃散其東垣非錢氏羌活膏治慢驚者謂土虛泄瀉火木乘之謂手掌典腹俱熱之症若火木土俱虛而搖動恐悸注瀉手腹冷者非羌活膏不能治之

急驚屬
痰熱慢
驚屬脾
虛

急驚主痰熱當京瀉之只用降火下痰養血之藥慢驚主脾虛所以多死先實脾土後散風邪只用硃砂安神丸更於血藥中求之如四物四君子東垣黃芪益黃散詳用

急驚力
大身熱
不吐瀉

錢急驚因聞大聲或大驚而發搐過則如故此無陰也此下利驚丸主之小兒急驚者本因熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱大小便黃赤劇則發搐蓋熱甚則風生風屬肝此陽盛陰虛也故利驚丸主之以除其痰熱不可用巴豆及溫藥大下之恐搐虛熱不消也小兒熱痰客於心胃因聞大聲非常則動而驚搐矣若熱極雖不聞聲及驚亦自發搐

急驚者陽症也俱腑受病熱痰客於心肺是少陽相火旺經云熱則生風因聞大聲而作蓋謂東方震卦得火氣而發搐火本不動觸得風而動當用利驚丸導赤散瀉毒丸地黃丸搐止宜服安神丸

急驚內有熱即生風又或因驚而發則目上連劄潮涎搐搦身體與口中氣皆熱及其發定或睡起即了了如故

此急驚症也當其搐勢漸減時與鎮心治熱之藥一二服
如麝香丸鎮心丸抱龍丸辰砂丸紫雪之類候驚勢已定
須更以藥下其痰熱如利驚丸軟金丹桃枝丸之類利下
痰熱心神安寧即愈

丹大黑龍丸治小兒急驚神效方見後急慢驚治條
小兒急驚輕者

青礞石煨一兩 青黛一錢 膽星一兩
右為極細末甘草湯為丸如鷄頭大每一丸薑蜜薄芎
湯下

右一方礞石膽星瀉濕痰之劑為君痰多者宜之

京敬馬丸
草龍膽 防風 青黛兩各 龍腦
黃連末五分 牛黃 麝香各一分

右為細末麪糊為丸如粟米大每服一二九金銀花
湯下之

無治陽癇即急驚風

硃砂研一 膩粉 麝香各五分 薑薈
白附子 甘草各一錢 胡黃連一錢 蝎稍七
僵蚕蜜炙十條 金箔十片 赤脚蜈蚣炙一條
右為末二歲已上服半錢七金錢薄荷湯調下三歲下
錢七如口不開灌入鼻中

脈有方者利之

輕粉 天竺黃 青黛各一錢 黑牽牛頭末半兩
右同研蜜丸豌豆大一歲下丸溫薄荷湯下食後服海
藏天涼驚溫驚利驚自有分別南星胭脂輕粉青黛色
味各有輕重

羅鎮肝丸治小兒急驚風目直上視抽搐昏亂不省人事是肝經風熱也

天竺黃研

生地

當歸

竹葉

草龍膽

川芎

大黃煨

羌活

防風已上各錢半

右為細末煉蜜丸如雞頭大每服二丸沙糖水化下先服此後服天麻散

右五方瀉肝木之劑為君前三方輕劑通用後三方峻劑必脈有力血氣實者宜之又間氏所謂候搐勢定下其痰熱之類是已

海五福丸治急驚風生蚯蚓一條研爛入五福化毒丹一丸再研如泥煎薄荷湯少許調化旋灌量兒大小加減服之無不效者

錢五福化毒丹治驚風心膈

生地

熟地焙各五兩

天門冬

麥門冬焙各

三

甜硝

玄參

甘草各二

青黛一兩半

右土六味為細末後研入硝黛煉蜜丸如雞頭大每服半丸或一丸食後熟水化下

安神丸方見法

鎮心丸方見前表裏條

右三方甘寒瀉火之劑為君小兒血氣虛而急驚者宜之又潔古間氏所謂候搐止勢減宜安神鎮心之類是已

錢慢驚因大病後或吐瀉或只吐不瀉變成脾胃虛損遍身冷口鼻氣出亦冷手足時瘳痰昏睡露睛此無陽也括葵湯主之

慢驚方
小身冷
曾吐瀉

潔慢驚者陰證俱臟受病蓋小兒吐瀉病久脾胃虛損若不早治則成慢驚名曰瘳痰似搐而不甚搐也因脾胃虛損故大便不聚當去脾胃風先用宣風散導之後用益黃散史君子丸平之則其利自止既已失治則脾胃俱虛致被肝木所乘是為慢驚當用溫補羌活膏主之

錢東都王氏子吐瀉諸醫用藥下之至虛變慢驚其候昏睡露睛手足瘳痰而身冷錢曰此慢驚也與瓜蒌湯其子胃氣實即開目而身溫王疑其子不大小使令諸醫以藥利之醫用八正散等數服不利而身復冷令錢氏利小便錢曰不當利小便利之必身冷工十日果身冷矣因抱出錢曰不能食而胃中虛若利大小使則脾胃俱虛當身冷而閉目即死今幸胎氣實而難衰也錢氏用益黃散史君子丸四服令微能飲食至日牛果能飲食所以然者謂利

大小便脾胃虛寒當補脾不可別攻也後又不語諸醫作矢音治之錢曰既失音何開目而能飲食又牙不數而口不閉也諸醫不能曉以地黃補腎錢曰此因用涼藥利外便致脾胃俱虛今脾已安腎尚虛故補腎必安治之半月而能言一月而痊

瓜蒌湯

瓜蒌仁

白甘遂末

右同於慢火上炒焦黃研勻每服下字麝香薄荷湯調服

右瓜蒌湯錢氏治慢驚法脈有力者宜用蓋濕痰積於膈中使風火不得開矣而身冷故用瓜蒌湯劫去濕痰使風火得伸而身溫搐止若脈無力者不宜用之便當補脾及溫白丸羌活膏之類

膠方
者漫

開青州白九子治小兒驚風大人諸風

半夏^{勝七} 南星^{勝三} 白附子^{勝二} 川烏^生 蚌^脚

右為末以生絹袋盛并花水攪出如未出者更以手揉
出如津更研再入絹袋攤尺為度於磁盆中日晒夜
露至曉撒去舊水別用井花水攪又晒至來日旦再換
新水攪如此法春五日夏三日秋七日冬十日去水晒
乾後如玉片研細以糯米粉煎粥清在菘草大每服三
五丸薄荷湯下雞風酒下並無時

錢氏異功散温中和氣治吐瀉不思食方見吐瀉門

海驚帝手足瘳癢睡臥不穩四君子加全蝎去尾大毒炒

釣藤白附子炒等分同煎方見治虛寒法 脾胃虛弱生風多困

四君子加炒半身麩沒有十等分為細末入冬瓜子少許
同煎服

溫白丸治小兒脾氣虛困泄瀉瘦弱冷痺洞利及因吐
瀉或久病成慢驚瘳

天麻^{生半} 白殭蚕^炒 白附子^生 天南星^{剉湯}

乾各一兩 乾蝎^{去毒}一錢

右為末湯浸寒食麩為丸如菘荳火仍於寒食麩中養

七日取出用每服五七丸至二三十丸空心生薑米飲

下量病勢漸加丸數服之寒食麩謂寒食日煮與麩取之以焙乾貯用也

釣藤飲子治吐利脾胃氣弱虛風慢驚

釣藤^生 蟬殼 防風^去 人參^去

麻黃^去 白殭蚕^炒 天麻 蝎尾^{炒去毒}

甘草^炙 川芎^{各一} 麝香^{一錢} 一方有蛻螂

三箇去頭足炙黃

右為末每服二錢水一盞薑三片煎六分温服量多少

與之寒多者加附子半錢服無時

羌活膏治脾胃虛或吐瀉後為慢驚者亦治傷寒無不效

防風去蘆 川芎 人參去蘆 白附子炮

赤茯苓去皮各半兩 天麻兩 白僵蚕湯浸

乾蝎炒去毒 白花蛇酒浸焙各一分 川附炮去

麻黃去節各二 沉香 母丁香

藿香葉 木香焙二 輕粉 真珠末

牛黃各一 龍腦半 麝香 辰砂

雄黃各一 羌活兩

海返竟丹治小兒諸癩癩潮發瘰癧只眼相引項背強直
牙關緊急目直上視及諸病久虛變生虛風多睡者因在
右為細末煉蜜作劑旋丸如芫花每服一十九食前服
或薄荷湯或麥門冬湯化下實熱急驚勿服性溫故也

萬不解速宜服之在毒藥弱也

烏犀剉屑二兩 水銀兩半 天麻酒洗 檳榔各半

僵蚕去絲嘴微炒 硫黃半兩研末 八水銀置磁上在蓋

白附子炮 川烏炒通赤 草解炒各 肉桂去麩

獨活去蘆 乾蝎炙 防風去蘆 天南星薑汁

當歸酒浸焙 細辛根 藿香洗去土 烏蛇酒浸一

黃炒 阿膠炙碎 槐膠 羌活

骨去皮 沉香 麻黃去根 半夏薑汁浸

白花蛇酒浸一宿炙 陳皮去白炒已 敗龜板醋酒 藁本去

羚羊角鑊 人參去蘆 乾薑炮 茯苓去

木香 蔓荆子去白 晚蚕沙微 何首烏米泔浸

桑螵蛸炒 白芷 敗龜板炙黃 藁本去

桑螵蛸炒 白芷 何首烏米泔浸

虎骨酒醋塗炙黃 砂仁 白朮泔浸一宿切焙 枳殼炒去白
 丁香 厚朴去皮薑汁塗炙 附子水浸泡去皮尖 石斛根去 肉苳蔻去殼微炒
 川芎 龍腦研另 雄黃研水 珠砂研水飛已 麝香另研各 烏雞一隻去嘴翅足 孤肝三具已
 膩粉研另 麝香另研各 烏雞一隻去嘴翅足 孤肝三具已
 右藥五十八味炮製如法煉密合和鴨三五千下丸如桐子大金箔為衣每丁歲兒溫薄苛自然汗化下無時右關氏宗錢氏治慢驚法脈無力者量之其法以青州白丸子兼異功散羌活膏溫白丸釣藤飲子之類服之至有往亡死中得生者今如其法又增入海藏四君子法次於異功散之後返魂丹次於羌活丸膏之後相參用之也

湯法

凡吐瀉成虛風慢脾先用奪命散青州白丸子末煎稀糊入蜜調控下涎後服祛風醒脾等藥

奪命散方見後通治急慢驚上
 治虛風八仙散風盛者服之

白天花麻 白附子 花蛇肉 防風
 南星 半夏 冬瓜子 全蝎各等分
 加川烏

醒脾散昏困者服之
 右吹咀每服一錢水半盞薑一片棗半枚煎十分熱服加薄荷尤佳

白朮 人參 甘草 橘紅
 茯苓 全蝎各半 半夏 木香各一分
 白附子炮四箇 南星炮兩枚 陳倉米二百粒下方无白朮半夏加蓮肉丁

醫學綱目卷三十六

可亦
右為末每服一錢水半盞薑三片速半箇煎十分漸止服之不可頓服頓服必吐

釀乳方

人參

木香

藿香

沉香

橘皮

神麩

麥芽各等

丁香各等

右咬咀每服四錢水一椀薑三片紫蘇十葉棗三枚煎至半椀乳母食後須去乳汁盡取服之即仰臥霎時令藥入乳之絡次令兒吮數口不可過飽此良法也如嘔定下日急宜截風服八仙散兩日後宜醒脾散如前件藥俱用不效危困可憂須診太衝脈未絕者當灸百會一穴取前後髮際兩耳尖所中乃是穴也方書所載但云頂上旋毛中殊不審有雙頂者又有旋毛不正者庸

撥痰方

川烏尖

白附尖各七箇去皮生用

蝎蛸七枚

石綠抄

右為末一處和勻用軟雞翎蘸藥入喉中遂漸抽出頻用帕子拭之

右湯氏治慢驚法先用奪命散白丸子控涎候涎下下
回用八仙醒脾等一回令乳母用醃乳法如危極者却
灸百會及擦痰法但奪命用礞石氣虛者難用必與東
垣益黃散相兼服之可也

陳氏治慢驚風先服芎蝎散用手法幹出寒痰冷涎自不
痲呆次服油珠膏後服益真湯溫世元氣時服前扑
散寬上寬下

芎蝎散治小兒腦髓受風顛顛開解皮肉筋脈急脹腦骨
縫青筋起面少血色或腹中氣響時便青白色沫或嘔吐
痰涎欲成慢驚搗足脛冷者

川芎一兩 細辛二錢 葶撥兩 半夏酒浸一宿湯洗
右細末一週兒用一銅錢用數沸湯調稍熱飢服如

痰滿胸喉中眼珠斜視速與服若目上直視不轉睛者
難救或痰氣壅塞不能燕藥用一指於兒喉嚨膠中探
入就幹去痰涎氣稍得通次用補脾益真湯以油珠
膏選用此方累世活人多矣

油珠膏治氣逆嘔吐風痰作搐
石亭脂硫黃中揀取 滑石半兩 黑附子炮去皮
半夏酒浸一宿湯洗七次焙乾 南星醋浸一宿湯洗七次焙乾

右細末每服一錢用冷清薑汁半盞滴麻油下點如錢
放藥在油珠上須臾墜下却去薑汁與兒服之更用清
薑汁三五口嚥下肚飢服訖後一時方與乳食
補脾益真湯治胎弱吐乳便清而成陰瀰氣逆涎潮眼珠
直視四肢抽掣或因受驚客忤及受驚誤服京藥所作
木香 當歸 人參 黃芪

丁香 訶子 陳皮 厚朴薑製
 甘草炙 肉蔻燻 草菓 茯苓
 白朮 桂枝 半夏湯泡 附子炮各半兩

全蝎炒每服一枚

右咬咀每服三錢水一盞半薑一片漚十枚煎六分稍熱飢服服訖令揉心腹以助藥力候一時方與乳食渴者加茯苓人參甘草去附子丁香肉蔻瀉者加丁香訶子肉桂嘔吐加丁香半夏陳皮腹痛者加厚朴良薑咳嗽加前胡五味子去附子官桂草菓肉蔻足冷加附子丁香厚朴惡風自汗加黃芪官桂痰喘加前胡枳實赤茯苓去附子丁香肉蔻草菓氣逆不下加前胡枳殼檳榔去當歸附子肉蔻腹脹加厚朴朴丁香前胡枳殼

前朴散治心腹結氣或嘔噦吐瀉腹脹痛驚悸

前胡 白朮 人參 陳皮
 良薑 藿香 甘草 厚朴

右剉每服三錢水一盞煎七分稍熱空心服
 小兒誤服涼藥或用煎離水繳口因此傷動脾胃或泄瀉或腹脹或腹中響小兒面少血色常無喜笑不看上而視下小兒顛顛高急頭縫青筋時便青糞小兒肥壯糞如清涕或如凍沙小兒時時脫眼糞便青白沫有時乾硬已上五症忽然嘔吐者必成陰癘俗謂慢驚是也小兒頭雖熱眼珠青白而足冷或腹脹而足冷或瀉而足冷或嘔而足冷或渴而足冷頭熱目赤痰壅鼻噴咽皆元根之火逆也已上五症忽然吐而作搐者名曰慢脾風速與補脾益真湯下服三錢重加蝎丁枚如因驚而搐者前朴散一服三錢重

雜法

加附子前胡各半錢同煎

右陳文忠治慢驚法其治之次第即成一家故足錄之以備採用其醫案所言等蝎散油珠膏累上取效

世治慢驚神效用一粒丁香一箇蝎一字辰砂一點血已上俱為末男用男左手中指血女用女右手中指血蘸末

擦唇上愈

本醒脾丸治小兒慢脾風因吐利後虛困昏睡欬生風痲

厚朴

白朮

硫黃八五腐中
煑三五沸

天麻

全蝎

防風

官桂

人參各一

右為細末酒浸蒸餅和丸如鷄頭大每一丸搥碎溫米

飲下

蝎稍丸治小兒胎虛氣弱吐痢生風昏困嗜臥或潮搐

全蝎微炒

白附煨裂各半兩

半夏薑汁製各

兩

右為末薑汁糊丸如麻子大每服三十丸荆芥湯下量兒大小加減服之

世小兒慢驚風身冷瘵癢

天麻

防風

川烏

全蝎去翅足薄黃葉

炮

南星

等分水煎服

湯氏治慢驚

真川烏一枚生肌皮生肌

全蝎分

右二件以咀分二服水一盞薑十片煎半匙旋滴入口中

無陰癩即慢驚風

黑附子生去皮臍南星生

半夏各二

白附子一分

右研細井水浸七日每日換水浸訖控乾入硃砂二錢麝香一錢研勻每服一字薄荷湯調下量兒加減一方用黑附子生去皮脂為末每服二錢以水一盞半生姜二片煎至半盞分二服量兒加減吐者入丁香五箇同煎空心服或水浸炊飯為丸如粟米大每服二十九生姜湯下亦何

錢同生散治小兒吐瀉或誤服冷藥脾虛生風成慢驚木南星重入九錢已上磨用地坑子一箇深三寸許用炭火五斤燒紅入好酒半盞在內然後入南星却用炭火三兩條蓋在地坑上候南星微裂取出剉碎再炒勻熟不可稍生放冷為末每服半錢濃煎生薑防風湯調下又方梓朴散

梓朴

半夏湯洗七次姜汁浸半日晒乾

右米泔三升同浸工百刻水及為度如百刻水未及少加次熬乾去厚朴只將半夏為末每服五分或一字薄荷湯調下無時

萱卷散治小兒慢驚多因藥性太溫及熱藥治之有驚粟退而別生熱症者有因病愈而致熱症者有反為急驚者甚多當問病幾日因何得之曾以何藥療之可用解毒藥無不效宜此方

大豆黃卷

水浸黑豆生芽是也晒乾

管仲

板藍根

甘草

右為末每服半錢水煎服甚者二錢藥水內入油數點煎又治吐虫眼不拘時

右諸家雜治慢驚其首一方用入血蘄藥末擦唇者甚效後一方解毒太過之毒尤見錢氏憂入之切也

垣驚兒瀉青色先鎮平以硃砂之類勿用寒涼之藥大禁
涼驚丸蓋風木旺必克脾土當先實其土後瀉其木其風
木旺症右關脈洪大掌中熱腹皮熱者是也今立一方黃
芪益黃散主之人參甘草黃芪各等分此三味皆溫能補
脾土益元氣其能瀉火內經云熱淫於內以甘瀉之以酸
收之白芍藥酸寒能瀉火酸能瀉肝木而大補肺金所
補得金土之位大旺則火虛矣風木何由而來尅土然後
瀉風木之旺脾虛者以火邪乘其土位故也故曰從後來
者為虛邪火旺能實其木木旺故來尅土當於心經中以
甘溫補土之源更於脾土中瀉火以甘寒補金以酸涼故
致脾土中金旺火衰則風木自虛矣
黃芪益黃散治胃中風熱

黃芪生五分 人參生五分 白芍藥生五分

陳皮不去白 黃連少 白茯苓四分
右為每服每服水二盞煎五沸去渣溫服

冊治小兒驚而有執者
人參 茯苓 白芍藥酒 白朮

右入生薑煎服身再加黃連生甘草竹葉煎服
陳明遠治小兒驚因脾虛肝乘之手足搐動四肢惡寒而
食少

白朮二錢 茯苓一錢
右煎湯入竹瀝熱下龍薈丸二十丸保和丸二十九丸

湯奪命散大能控風涎不問急慢驚風痰潮壅盛塞於咽
喉其響如潮名曰潮涎百藥不能過咽命在須臾但先用
此藥入喉痰即墜下功有萬全奪天地之造化也

青礞石一兩入甘膏于同煨稍下兩炭火煨
通紅須補虛為度候冷如金色取用

通治急
慢驚
痰盛氣
實者頓
擊之

右為細末急驚風痰壅上熱如火用生薄荷自然汁入蜜調微溫服之良其藥自裏痰墜下從大便出如稠涕膠粘乃藥之功也次服退熱祛風截驚等藥慢驚風亦以痰涎潮上寒性咽喉藥食俱不能入醫者技窮勢迫以待其盡但用此藥以青州白丸再研為末煎如稀糊熟蜜調下其涎即墜入腹次服花蛇用烏金蝎蜈蚣等藥

丹 大黑龍丸治小兒急慢驚風神效

膽星 礞石硝煨各一兩 天竺黃 青黛各半
 蘆薈二兩 辰砂 蜈蚣燒灰一兩 僵蚕五分
 右為末甘草汁為丸如鷄頭大每服一丸或二丸薑蜜薄苛湯下如慢驚用桔梗白木湯下

鎮驚丸

琥珀二錢 青黛半兩 辰砂二錢 天竺黃二兩
 天麻一兩 真珠母二錢 蘆薈 柴胡各半兩
 青皮 甘草各二兩 膽星一兩 雄黃半錢
 乳香一兩 青礞石硝煨半兩
 右為末甘草膏丸如鷄頭大慢驚參末湯下急驚薄荷薑蜜湯下

小兒急慢驚風

金蝎四十九箇 辰砂半兩 研極
 右取蛭蝎十條洗淨入小瓶內以溫火煨蛭蝎化為水和先如胡椒大每三丸用順流水化服下

小兒急慢驚風
 僵蚕三條 辰砂豆大 全蝎一箇 真珠末撮
 右末取蓬蒿中小虫兒每一箇研作一丸如麻子大每

丁粒用乳洗下

本 保命丹治小兒急慢驚風四肢逆冷眼直口禁涎不止

虎睛一對安瓦上以瓦蓋之慢火通乾

硃砂兩

全蝎半

天麻分一

蜈蚣二條去頭尾赤脚者

麝香半

右為細末煉蜜丸如大豆大瓦罐貯之又入腦麝膏定

急驚薄荷蜜湯化下慢驚薄荷湯化下各二九

溫驚丸一名粉

南星為末入膽月半膽中陰乾百白為末四兩

硃砂半錢

天竺黃兩

坏子胭脂半龍腦五分

右用牛膽汁和丸如雞頭大每服一丸小者半丸沙糖

水下

抱龍丸治傷風瘟疫身熱昏睡氣促風熱痰實壅嗽驚風潮搐及蠱毒中暑沐浴後並可服壯實小兒宜時與服之

痰盛濕濁者煉之

丹溪云抱龍丸心脾用藥也

南星如無牛膽者只將生者剉炒熟用四力

天竺黃一

雄黃飛

辰砂另砂各麝香一另研

右為細末煮甘草膏和丸皂莢子火溫水化下百白小兒每丸分作三四服五歲兒一丸大人三五丸亦治室女白帶伏鼻用鹽少許嚼一二丸新汲水送下臘月雪水煮甘草和藥尤佳一法用漿水或新水浸南星三日候透煮軟三五沸取出乘軟切法皮只取白軟者薄切焙乾炒黃色取末八兩以甘草二兩半拍破用冰二碗浸一宿慢火煨至半碗去香漸出傾入南星末內慢研令甘草水尽方入餘藥

世 奪命散治急慢驚風諸藥不效此藥隨手奏功

白附子三

黑附子炮去皮脂半刃急驚不用

南星炮一

天麻三

辰砂另研 二防風

半夏各半

全蝎去毒

蜈蚣條

麝香半

僵蚕炒 慢驚

右為末三歲見半錢薄荷生薑自然洗加好酒沸湯各少許調服急驚加輕粉腦子各少許

湯治慢驚其驗

赤脚蜈蚣酒塗炙

白僵蚕炒 七辰砂另研

全蝎用薄荷葉包炙七枚

青州白丸子三十粒

右為末入麝香少許慢驚人參麥門冬湯調下急驚加腦子牛黃各少許金銀薄荷湯調下

羅天麻散治小兒急慢驚風及大人中風涎盛半身不遂言語難遊不省人事

半夏七

天麻二

甘草炙

茯苓

白朮各三

右用水一盞入磁罐內煮令水乾將老薑五錢同煮依乾為細末每服一錢五分薑棗湯調下

經治驚風墜涎天南星一箇重一兩者換酒浸七伏時取出新瓦上炭火炙乾烈地止去火毒搗末入硃砂一分研為細末每服五分荆芥湯空心及午時各調下一服

天麻防風丸治小兒驚風身執喘屢多睡驚悸搐掣神昏涎痰不利等症

天麻

防風

人參各一

蝎尾去毒

甘草

硃砂

雄黃

牛黃

麝香各一

僵蚕炒 半

右為末煉蜜丸如櫻桃大硃砂為衣每服薄荷湯下二二九

雲七味羌活膏治急慢驚風壯熱

氣弱身熱者天麻參蝎

羌活 獨活 天麻 全蝎去毒

人參 僵蚕炒略 烏蛇肉酒浸一宿焙乾一劑

右為末煉蜜丸如皂子大每兩作五十九丸每服一丸荆芥湯下

經治小兒驚風全蝎一錢不去頭尾用薄荷葉裹炙乾同研為末作四服湯下

衍治小兒驚風殭蚕蝎稍等分天雄尖附子尖共一錢炮過為末每服一字薑湯調下

羅小兒驚風釀乳方用白羊頭一箇丁香同熬至熟乳母空心吞食之

丹孫女因胎中受濕熱日午發搐唇黑面青每日作一次未半週難與藥且釀乳飲之

白木 陳皮 半夏 芍藥

青皮各五 人參 川芎 木通各三

黃連錢二 甘草錢一 右分八服薑五片與乳母煎服

痰積癩者攻積

小兒急慢驚風發熱口瘡手足伏熱痰熱痰喘痰嗽並用涌法重劑用瓜蒂散輕劑苦參赤小豆末酒酸薑汁調服之後用通神散蜜丸服之間以桑牛陰乾研末調服以平其氣

本編銀丸治小兒急慢驚風積癩

青黛錢三 水銀一卓角子大同 寒食麩 黃明膠炒焦為末各二錢 輕粉炒炒子 雄黃

粉霜 硃砂略一 巴豆共一粒去油 腦麝少 右研細滴水為丸如麻子大埋編曝乾籠盒盛之一歲一丸隨意加減前菓子湯送下不得化破

雜方

博治急慢驚風乳香其逐各半兩同研細每服半錢用乳香湯調下或用童便調下尤妙

右二十方通治急慢驚風蓋謂虛實兩見急慢互出故有通治之法合而言之急慢雖異皆本之於痰故礞石星半之屬通能治之者也分而言之礞石之屬瀉痰青黛之屬瀉木硃砂之屬瀉火皆治氣實之劑參草之屬補土天麻金蝎之屬補木烏附之屬補火又皆治氣虛之劑故補瀉兼施虛實通治之法也

山 小兒驚風胡孫糞燒存性碗覆出火毒生蜜調灌少許

海 心神不安四君子加辰砂半分棗湯調下 又有丁症欲發瘡疹先身熱驚跳或發搐搦此非驚風當用發散藥

閻 驚風或泄瀉等症煩渴者皆津液內耗也不問陰陽宜煎錢氏白朮散使滿意取足飲之彌多彌好

針灸

明堂急慢驚

印堂

灸急驚瀉慢驚補

急驚 支正

下廉

小兒慢驚風灸天澤一穴

文內正中注如小麥大

睡中驚掣

厲兌

睡中驚目不令久

屈肘橫紋上三壯

錢咬呀甚者發驚

目直面青身反折者生驚

呵欠面青者驚風

呵欠面黃者脾虛驚

目赤兼青者發搐

錢驚癇發搐男發搐目左視無聲右視有聲女發搐目右

視無聲左視有聲相勝故也更有發時症故左視本位無

聲右視金位相擊則有聲女為金故左視金位無聲左視木位亦相擊有聲

李寺丞子三歲發搐自卯至巳目右視大呼哭錢見曰此

逆也男為陽本發左視無聲則順右視有聲則逆所以然

者左肝木也右肺金也逆則三臟相戰金木相擊而有聲

也治宜瀉強補弱假令女發搐目左視是肺來乘肝肝不能任故耳哭也當瀉其肺後治其心續治其肝若病在秋則肺兼旺位當大瀉其肺若病在春早晨此肝旺之時尚不能勝肺是肺強而肝火弱也當補其肝腎大瀉其肺若男發搐自右視是肝來勝肺而叫哭當瀉其肝心若病在春夏早晨肝心旺時當大瀉其肝若病在秋冬早晨此肺旺之時尚不能勝肝是肝強而肺極虛也當補其肺大瀉其肝所以言自反視者及肝主目也凡搐則是風熱相搏於內風屬肝故外見於目也今此病男反女症故稍易治於女也先瀉其肺以瀉肺湯主之二日不銷亂知病退也後用地黃丸補腎子服後用瀉青丸各二服以瀉心肝五日而愈又肺虛不瀉者何也曰假令男目右視水克金肝旺勝肺而但瀉肝若更病在春夏金氣極虛故當

補其肺慎勿瀉也

湯凡搐男左女右為順易治男右女左為逆難治

心脈急甚為癩瘵全文見診治法脾脈急甚為癩瘵

陳驚風不治證 搐而不休休而再搐 驚叫發搐 汗

出足冷 痰滿胸喉 口開目直

禁忌

閤治小兒急驚方搐不用驚擾此不足畏慢驚雖靜乃危病也急驚方搐時但扶持之不可掄捉蓋風氣方盛恐流入筋脈或至手足成拘攣也

驚癇

陰陽

驚癇即急慢之症但驚癇發時仆地作聲醒時吐沫急慢驚則不作聲不吐沫也陽癇初作時病先身熱癩瘵驚啼散而後發懸浮者為陽癇乃急驚也內在六腑外在皮膚為易治若病先身冷

不驚瘈不啼呼而作脈沉者為陰癇乃漫驚也此病內在

五臟所主

錢凡治五癇皆隨臟治之每臟各屬一獸宜以五色丸主之
大癇反折上竄犬叫肝也 羊癇目瞪吐舌羊叫心也
牛癇目直視腹滿牛叫脾也 雞癇驚跳反折手縱
雞叫肺也 猪癇如刀吐沫猪叫腎也

五色丸

硃砂兩半

水銀分

雄黃兩

鉛三兩同水銀熬

真珠末兩

右煉蜜丸如麻子大每服三四丸金銀薄荷湯下

身熱驚啼脈浮為陽

紫如有客痰發熱而有聲煎大黃荆芥湯下五色丸
潮熱有時積熱也桃枝丸主之壯熱不退當用地骨皮散下
五色丸 風熱當用防風黃芩湯下大青膏 身溫不熱

當用白虎湯加蒼朮下五色丸

本雌黃丸治小兒癇癇欲發眼暗瘈瘲聲惡躑躅

雌黃

黃丹兩

麝香一錢

右為末拌令極勻用牛乳汁半升熬成膏入前藥末杵三五百下丸如菽大每服三丸溫熱水下二日三服此方得自名醫之家極有神效

湯蛇黃丸治驚癇

真蛇黃三兩

鬱金三分一麝香一錢

右為末粳米飯丸如桐子大每服三十九丸煎金銀磨丸水化服

海古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡疾者取此和諸藥煮服之彌古者尤佳
治癇方治太陽陽明二經為病

荆芥穗兩 白礬為細末

右束肉為丸如桐子大每服二十九粒荆芥湯下次三十

身冷不驚喘脈沉為陰

羅沉香天麻湯魏敬甫之子四歲從長老摩頂授記衆

僧念呪因而大恐遂發驚搐痰涎壅塞目多白睛項背強急喉中有聲一時許方醒後每見皂吏人輒發多服硃犀龍麝鎮墜之藥四十餘日前疰猶在又添行步動作神思如痴予診其脈沉弦而急黃帝針經云心脈滿大癰瘕筋攣又云肝脈小急癰瘕筋攣蓋小兒血氣未定神氣尚弱因而驚恐神無所依又動於肝肝主筋故癰瘕筋攣病久氣弱小兒易為虛實多服鎮墜寒涼之劑復損其氣故添動作如痴內經云暴擊癰眩足不任身取天柱穴是也天柱穴乃足太陽之脈所發陽蹻附而行也又云癰瘕瘰癧

不知所苦兩躄主之男陽女陰潔苦云書發治陽蹻甲脈夜發治陰蹻照海先各灸兩躄各二十七壯次處

沉香二錢 天麻三錢 羌活五錢 防風三錢

益智二錢 川烏炮去皮二錢 甘草炙 當歸各一錢半

半夏湯泡三錢 獨活四錢 附子炮去皮三錢 薑屑半錢

右咬咀每服五錢生薑三片水煎溫服瘰癧論云恐則氣下精怯而止燕閉又云從下上者引而去之以羌活獨活苦溫味之薄者陰中之陽引氣上行又入太陽之經為引用故以為君天麻防風辛溫以散之當歸甘草辛甘溫以補氣血之不足又兼胃氣故以為臣黑附子川烏頭益智仁大辛溫行陽退陰又治寒客傷胃腎主五液入脾為涎以生薑半夏燥濕化痰十劑之重可去怯沉香辛溫體重氣清去怯安神故以為使氣味相合

升陽補胃恐怯之氣自得平矣

湯牛黃丸治因驚中風五癇天吊客忤潮涎灌

白花蛇酒浸取肉白附子 全蝎 真川烏半兩

生者 天麻 薄荷葉各半

已上六味先為細末次入

雄黃兩五 辰砂錢三 腦子另研半兩 牛黃錢三

麝香錢一

右為一處和勻麻黃去根二兩酒一升煎麻黃至一盞

去麻黃用酒熬藥得所勿至焦未聚手疾如皮實大

密器盛之一丸作五服煎金銀薄苛湯磨化大能散

驚邪

治五癇得效方

露蜂房兩 石綠兩一 桂心 遠志去

人參各半

右為宋粥丸如桐子大每服二十丸白湯下

濕痰

膽星兩二 全蝎去翅足半兩 白附子兩一 薄荷兩半

僵蚕兩一 川芎兩一

右為宋粥丸青黛為衣每服一二十丸薑湯下

治小兒癇用甘草末一錢猪心一箇取二管頭血三條和

其逐末將猪心批作兩片入藥在內以線縛定外濕帛包

裹入文武火煨熟不可過度取藥細研入辰砂末一錢和

勻分作四丸每服一丸猪心湯化下再服另取猪心煎湯

此方神效

湯斷癇丹治癇瘳後復作連綿不除服之有驗

黃芪蜜水塗灸 釣藤 細辛 甘草灸

蛇蛻皮略半 蟬蛻去土

牛黃另研

治遠年驚癇心氣不足神驗方蝎虎一枚褐色用前子取下四足瓜連血細研入生珠末麝香腦子各少許同研細薄苛湯調下作一服須先用奪命散控吐涎次服之能奪造化雖數年癲癇亦能治之此藥所以神效者蓋癲皆心血不足此物名守宮其血與心血類也取下如室女之紅錯服之於心故能補也此乃怪重去其足而復能行又散方見

驚搐門

小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成癲當歸末小荳大乳汁灌之日夜三四服

治小兒卒得癲用釣藤甘草各二分水五合煮取二合服如小惠天日夜三次服

廣濟及崔氏方治小兒驚癇諸湯飲皆用釣藤皮又野猪

黃味辛甘平療癲癇水研如棗核日三服效衍義云野猪

黃膽世不常有間得之能治小兒癩癇

李氏一小兒病手足搐搦戴人曰心火勝也勿持捉

其手當從搐搦此由乳母保抱太極所致乃令掃淨地以

水洒之乾令復洒令極濕俛臥兒于地上良久渾身轉側

泥漿皆滿仍以井水洗之少頃而瘥

杜治小兒胃寒虫上諸危惡與癲相似者乾漆搗炒烟盡

入白無美等分為細末米飲調下一字至一錢瘥

針灸 甲小兒癲癇瘰癧春強互相引項灸長強穴三十壯在脊

骶端跌地取之乃得 小兒驚癇瘰癧春強強目轉連上

插筋縮主之

田小兒癲癇驚風目眩灸神庭穴七壯在鼻直上入髮際

五分 小兒風癇灸鼻柱止髮際宛宛中三壯炷如小麥

大
小兒驚癇先驚怖啼叫後乃發也灸頂上旋毛中三壯及
耳後青絲脈炷如小麥大旋毛中即百會穴也青絲
明驚癇灸巨闕三壯

甲小兒驚癇本神及前頂顛會天柱主之小兒驚癇反

視臨泣主之小兒癇症嘔吐泄注驚恐失精瞻視不明

睛眩瘳脈主之羊癇會宗下空主之錢氏云羊癇目

癇發目上插攢竹主之馬癇金門及僕系主之風從

頭至足癇瘳口閉不能開每大便腹暴滿按之不下瘳

喘崑崙主之小兒癇瘳遺精溺虛則病癇積實則癇瘳

小腹中熱善寐太敦穴主之癇驚如有見者列缺穴主

之并取陽明絡

錢五癇重者死病後甚者亦死

診

天弔

風熱

天弔亦驚風之證但天弔發時頭自仰視驚風則無也

湯小兒瘳瘳不定翻眼擡睛狀若神崇頭自仰視名爲天

弔凡有此疾宜服蘇合香丸灸兩手大拇指兩甲肉相半

男先灸左女先灸右及兩足大拇指中間各三五壯又灸

前後手心各五壯此皆得效之法

九龍控涎散治天弔

赤脚蜈蚣酒塗灸

滴乳

天竺黃二味

各一錢

臈茶

雄黃另

甘草各

荊芥穗炒

白礬枯各

菘豆半生半炒

右爲末每服半錢人參薄可湯調下

釣藤飲治天弔潮熱

釣藤

人參

犀角屑各半

全蠍

天麻各分 甘草半
右為末每服一錢水煎服
丹瀾迷嚙舌仰視牛黃木豆許和蜜水調廣利

眼目

針灸
明目澁羞明狀如青盲 未渚性非小兒艾 兒三五
歲忽生白翳遮睛掩瞳人疼痛不可忍 九椎止灸壯
如癰目不明者 有中脘灸壯

診

錢目赤兼青者發搐 目直而射身反折強直者生驚

虛

世治眼白多屬虛

鹿茸兩 澤瀉 茯苓兩 山茱萸兩
地黃 牡丹皮 牛膝兩
右為末蜜丸如桐子大鹽湯食後下二十九

雀目海眼

濕痰
羅煮肝丸治小兒疳眼翳膜羞明不見物服十日必退如
大人雀目者一服效

夜明沙 青蛤粉 穀精草

右件為細末每服一錢五七歲已上二錢純猪肝一大
片批開糝藥在內攤勻麻線纏定以米泔半碗煮肝熟
取出肝湯傾碗內重煎分肝作三服乾却用肝湯下
一白三服不拘時候大人雀目空心服至夜便見物如
患多時且二服

熱
龍膽飲子治疳眼流膿生海翳濕熱為病神效不治寒濕
為病者

青蛤粉兩 羌活 草龍膽各三錢 炒二
蛇蛻皮兩 麻黃二錢 穀精草兩 升麻二錢

壽金

甘草各半錢

右為細末每服二錢食後茶清調下

針灸 灸雀目疳眼法○小兒雀目夜不見物灸手大指甲後一

寸肉廉橫紋頭白肉際各一壯姓如小麥大 小兒疳眼

灸合谷二穴各一壯姓如小麥大在手大指次指兩骨間

陷中

赤眼

湯導赤散治心熱小便赤眼自赤腫

赤芍藥各一錢 羌活各一錢 防風各半錢 大黃

甘草各一錢

右為末燈心黑草煎食後服

余平生無赤眼之患用之如神小兒小兒可通用凡眼赤

澁之勿只用自已小便張自溺出用一指接抹眼中便洗

閉目眼翳此以真氣通去邪執也

本治小兒赤熱腫眼

小大黃 白礬

右二味等分為末同冷水調作卷子貼眼立效

針灸 明眼忽太小皆赤合谷灸三壯 熱毒風盛眼疼灸中指

本節頭一壯

通睛

肝病 湯半黃丸小兒通睛皆因失慎築枓觸着頭面額角兼倒

撲令兒肝受驚風遂使兩目閉睛名曰通睛宜服此

牛黃 白附子炮 肉桂 全蝎

芎藭 石膏各一錢 白芷二錢 藿香各一錢

硃砂二錢

麝香分

右為末煉蜜為丸如芡實大三歲已下每服一丸薄荷

湯下乳食後忌油麩猪肉

右為偏墜

雜方

小兒狐疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛十四枚熬焦

桂枝半兩二物為散每服八分日再酒調下蜜丸亦通

針灸

偏墜赤宜防葵丸令兒坐於上中午時灸印下偏墜之處

雜方

七壯精藥丸

小兒偏墜若非胎中所有在後生者於莖下腎囊前中間

莖子上灸七壯立愈

胎產疝卵偏墜囊縫後十字紋止

陰腫囊腫脫囊

滯氣

湯小兒陰腫由啼叫怒氣閉縱於下成此疾宜海蛤散

海蛤錢

茴香分二

薏苡仁

白朮

檳榔各半

右末食前溫酒調下大小如減

活血陰腫又方

桃仁去皮尖及雙仁者炒三分

牡丹皮

桂枝

白茯苓炒去刺各半兩

郁李仁湯浸去皮一分

右水煎服

熱丹脫囊即外腎腫大

木通

甘草

當歸

黃連

黃芩

右水煎服

雜方 蚯蚓散治腎子腫硬成疝用乾蚯蚓為末唾調傳常避

風冷濕地先用花椒蔥湯避風處洗却用此傳之累驗

世治小兒囊腫如升用甘草煎汁調地龍末塗之立退累

效

丹用紫蘇葉為末水調傳上又用青荷葉包之治脫囊效
明陰腫 崑崙命壯

疝痛

湯治小腸疝氣家傳妙方

芫花醋浸

木香

茯苓

青皮

全蝎

桂枝

附子

礪砂各一分

檳榔

三稜各半

右為末將礪砂浸澄去土頓在湯瓶上候成膏和糖
醋打麵糊為丸如芫大每三十九空溫酒下未效再
服

小便不通

錢檢頭散治小便不通

玄胡

川苦練各等分

瀉血

右同為細末每服半錢或一錢檢頭湯調下量多少與
之檢頭湯即湯中滴油數點食前服

熱湯水通散治心經伏熱小便不通啼呼

木通兩

牽牛子炒半兩

滑石兩

右為末燈心蔥白煎服

冬葵子散治小兒腹急悶

冬葵子兩

右為末每服一錢煎服

錢尿深黃色久則尿血小便不通久脹滿當利小便

淋病

血湯治血淋神效方

紫草

連翹

車前子各等分水煎服

又方

海螵蛸

生地

白茯苓

右等分為末柏葉車前草煎湯調下

氣治氣淋

赤芍藥 檳榔 麩

右為末燈心同棗子煎湯調下

遺尿

虛湯治小便不禁或睡中遺出不覺

雞腸草

牡礪粉

龍骨

麥門冬

符

白茯苓

桑螵蛸

右件咬咀每服一錢棗子一枚擘破煎食前服

又方破故帛一張炒為末黃栢煎湯調下

外療小兒睡中遺尿不自覺桂末雄鷄肝等分搗丸如小

豈大溫水下血阿服

難勞

世小兒夢中遺尿意改仁一合許去心不去殼敲碎入菹

一小撮同炒蕉汁用水一鍾煎至半鍾空心服之累效

喉痺

凡治小兒喉痺宜於大人喉痺法察用之

上實

湯喉痺別無治法非吐不可至此證萬一危極前法無效

急用官局碧霞丹砂細用薄荷自然汁入醋調以鷄翎蘸

藥送入喉內徐徐導引得吐出痰涎為佳本事方論碧霞

丹能害入此不然蓋當時遇有合死之人耳

碧雲丹

石綠

附子尖

烏頭尖

蝎稍

右為末為丸薄荷汁化取涎出

針灸

明喉中鳴咽乳不利

璇璣

急喉痺

天突灸壯之不宜

