



醫學綱目

卷七

八番
四拾冊
共二



醫學細目卷之三十七

小兒部

心主熱 潮熱 積熱 溫病 變蒸

熱 心痛 弄舌 重舌 木舌

舌白胎 鼻衄 遲言 盜汗 自汗

癰癤 腮腫 惡核癰癧 赤丹

疥癬 眉煉 耳瘡附凍 面瘡 口

瘡 癩頭瘡 脚凍瘡 痘疹治法通論

痘出太密 痘出不快 痘痒塌


痘灰白色 痘黑陷倒靨 痘寒戰 痘

發熱 痘寒熱 痘渴 痘渴瀉 痘

瀉不渴 痘吐逆 痘腹脹 痘腹痛

痘喘 痘大便秘 痘餘毒 痘入目

痘咽痛 痘風 痘癩搔 痘瘡痛



痘膿而不痂 痘後瘡癩 痘癰 中惡

客忤

五臟熱

錢 肝熱手尋衣領及亂捻物瀉青丸主之 壯熱飲水喘

悶瀉白散主之 壯熱者一向

肺熱手掐眉目日西熱甚咳嗽寒熱壯熱飲水甘桔湯主

之若肺虛熱唇深紅色輕者瀉白散重者涼膈散主之

心熱視其睡口中氣溫或合面臥及上竇搖頭咬牙皆心

熱也導赤散主之 能而有就冬之意故合面睡

脾熱則目黃肚大怠惰嗜臥身熱飲水四肢不收瀉黃散

主之 腎虛則下竇畏明地黃丸主之 頰赤由心臟邪熱上攻

也宜服導赤散

五臟面

錢 面上證左腮為肝右腮為肺額上為心鼻為脾頰為腎

赤者熱也隨證治之 目內皆赤者心熱導赤散主之淡

紅者心虛熱生犀散主之 青者肝熱瀉青丸主之 淺淡者

補之黃者脾熱瀉黃散主之 無精光者腎虛地黃丸主之

紫者天目五色其者瀉本臟色淺者宜補之又云自是

寒小便清四逆湯黃赤是熱承氣湯瀉本藏青是腹痛捻

頭散主之桂枝 芍藥湯亦主之

表裏 脈 小兒脈沉而數者骨間有熱飲以腹按冷清也

錢 身熱不飲水者熱在外身熱飲水者熱在內

海 四順飲子治熱在內而不厥 連翹散治熱在外而不

厥 丹 小兒發熱手足伏熱痰熱必用吐法輕劑苦參赤小豈

末重劑瓜蒂散淡薤汁調服之如不用用鵝翎探之

虛熱 錢 朱監簿子五歲忽發熱醫曰此心熱也頰赤而吞紅煩

燥引飲遂用牛黃丸三服以干物瀉心湯下之來自不愈

反加無力而不能食又下之便利黃沫錢曰心經虛而有留熱在內必被涼藥下之致此虛勞之病也錢先用白木散生胃中津液次以生犀散治之朱曰太便黃沫如何曰胃氣正即瀉即止虛熱也朱曰醫用瀉心湯如何錢曰瀉心湯者黃連一物耳黃連性寒多服則利能寒脾胃也坐久眾醫至皆曰實熱錢曰虛熱若實熱何以瀉心湯下之不安又加面黃頰赤五心煩躁不食而引飲醫曰既虛熱何太便黃沫錢笑曰便黃沫者服瀉心湯多故也錢與胡黃連丸治愈 鄭人齊郎中者家好收藥散施其子忽臟熱齊自取青金膏三服并一服餌之服畢至三更瀉五行其子困睡齊信子睡多驚又與青金膏一服又瀉五行加口乾身熱齊信尚有微熱未盡又與青金膏其妻曰用藥十餘符未安莫空他病否召錢氏至曰已成虛羸先用前

白木散時時服之後服香朮丸十三日愈香朮丸即香朮散方見自汗條

海風熱邪熱四君子湯加生薑荊芥煎

雲小兒客熱在內不思乳食先用導赤散次用益黃散

實熱在內者因順飲之類在上者吐之方見表裏條

丹小兒熱病六乙散妙藥也

食傷胃熱薑棗

白木兩 半夏 黃連酪半

加平胃散粥食後白湯下

本治小兒驚熱

全蝎 天南星取心為末一錢 人參三錢

蛇蛻三錢 右為末薄荷蜜湯調下

錢風濕熱壯熱相似 潮熱時發熱過時即以來日依

潮熱

驚熱

實熱

雲

丹

食傷胃熱薑棗

白木兩 半夏 黃連酪半

時又熱此欲發驚候也

壯熱者一向熱而不已甚則發驚癇也

風溫者身不熱而口中氣熱又有風溫症者但溫而不熱

傷寒熱口熱呵欠頓悶煩急冷見傷寒部

瘧熱瘧瘡熱嘔噎悸動耳尖冷冷瘧部

變蒸熱唇上白泡珠起耳冷冷不必

疳熱面黃與炭土羸瘦鼻下赤爛冷瘧部

驚風熱發搐瘳癇脈數煩躁顛叫恍惚冷見急驚部

素帝曰乳子而病熱脈懸小者何如岐伯曰手足溫則生

寒則死通評虛實論甲乙經謂婦人乳子者

錢熱證疎利或解化後無虛證勿溫補熱必隨生

潮熱

熱有作止每日應時而發也

虛熱 錢地骨皮散治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱

知母 甘草 半夏洗七 銀柴胡去蘆

人參 地骨皮 赤茯苓已上等分 如有驚熱

加蟬蛻天麻黃芩若加藜蘆名藜蘆飲子

右為細末每服二錢生薑三片水煎食後溫服量大小

加減海藏云地骨皮散即小柴胡湯加減法自注者地骨皮散無汗者柴胡湯三黃湯仲景所用錢氏改

諸九散加減並出古法

生犀散治症同前

生犀角挫末 池骨皮 赤芍藥 柴胡

葛根各一 甘草各半

右為犀末每服一錢水煎食後溫服海藏云生犀湯加減法此少陽

田犀角散治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾晚潮熱夜有盜汗

陽明相合也

即犀角地黃湯

五心煩躁四肢困倦飲食雖多不生肌肉

犀角末

地骨皮

麥門冬

枳殼炒

大黃蒸

柴胡

茯苓

赤芍藥

黃芪

桑白皮

人參

鱉甲醋塗各等分

右為麤末每二錢入青蒿少許水煎量兒大小加減下
鍾煎八分食後溫服

丹 小兒潮熱次汗胡黃連柴胡等為細末煉蜜丸芡實大
每二九酒化開入少水煎小沸服

錢 朱監簿于五歲夜發熱曉即如故眾醫有作傷寒治者
有作熱治者以涼藥解之不愈其候多涎而喜睡他醫以
鐵粉丸下涎其病益甚至五日大引飲錢曰不可下之乃
取白朮散一兩煎藥汁三升使任意取足服朱生曰飲多
不作瀉否錢曰無生水不作瀉縱多不足怪也但不可下

耳朱生曰先治何病錢曰止瀉治痰退熱清神皆此藥也
至晚服盡錢視曰更可服三升又煎白朮散三升服盡得
稍愈第三日又服白朮散三升其子不渴無涎又投阿膠
散二服而安

秦芫散 治潮熱減食蒸瘦

秦芫去頭切焙

甘草炙各

薄荷葉切焙

右為麤末每服二錢水一鍾煎八分食後溫服

潮熱 有時胸滿短氣者桃枝丸方見小兒積熱

風痰 熱晚熱早涼粟水無時此候乃痰作朝而生風熱
即宜金星丸下之或氣弱者不可下宜奪命散以控下涎

次服惺惺散加南星白附子奪命散方見驚風門

金星丸治風熱結聚喉內痰鳴喘急咳嗽面紅腫咽膈

壅塞發熱狂躁多渴

實熱
風痰熱

鬱金末

雄黃另研一分 臙粉半

巴豆十枚 去油

右為末米醋糊丸麻子大薄荷湯茶下

宿食熱 脈經云小腸有宿食常暮發熱明白復止此宿食夜熱也 海藏云夜熱屬陰四順飲之類此血熱在夜也

積熱

久熱也瘧熱亦久但兼面黃喫炭土真下爛也

表裡虛 小兒積熱者表裏俱熱遍身皆熱頰赤口乾小便赤大便焦黃先以四順清涼飲子利動臟腑則熱去既去復熱者內熱已解而表熱未解也當用惺惺散紅綿散加麻黃微發汗表熱乃去表熱去後又發熱者何也世醫到此盡不能曉或再用涼藥或再解表或以謂不可醫誤致天傷者甚多此表裏俱虛氣不歸元而陽浮於外所以再發熱非熱證也只用六神散入粳米煎和其胃氣則收陽歸內

身體便涼熱重者用銀白散

清涼飲子每服二錢薄荷三錢同煎方見治寒熱法 惺惺散方見

紅綿散

白殭蚕炒二兩

天麻生用一兩

天南星切薄片油浸黃二兩

蘇木節另研二兩半

右為末每服一錢水一小盞入紅綿少許同煎至五分溫服此小兒風熱頭目不清並宜服之若傷寒有表證發熱者每服入去節麻黃末五分有裏熱心燥渴者入滑石末半錢同煎服之

六神散

人參

白茯苓

乾山藥

白朮

白蘆豆

甘草炙各等分

汗後氣不和之者

下後表熱未解者汗之

右為末每服一木錢水一小盞薑一朮同煎至五分服此藥用處甚多治胃冷加附子治風症加天麻治痢加鴛粟殼

銀白散

乾山藥

白朮

白茯苓各半

人參

白扁豆

知母

甘草

升麻各等

右為末每服一木錢水一小盞薑一朮同煎溫服不拘時候

桃枝丸

取精熟及結胸又名桃符丸

巴豆霜

大黃

黃柏各一

輕粉

礪砂各半

右細末麩糊丸粟米大煎桃枝湯下小兒五七九五七歲二十三十九未醉兒二十三九臨臥服

胸滿短氣者

煩躁者吐之

梔豉飲子治小兒畜熱在中身熱狂躁昏迷不食

梔子仁七枚

豆豉兩

右用水三盞煎至二盞看多少服之無時或吐不吐立效

變蒸熱

診治

變蒸者陰陽水火蒸於血氣而使形體成就是五臟之變氣而七情之所由生也蓋兒生之日至二十日一變每變蒸畢即覺性情有異於前何者長生臟腑意智故也何謂二十日長骨添精神人有二百六十五骨以象天數以應期歲以分十二經絡故初生至二十二日一變生癸屬足少陰腎藏精與志木十四日一變一蒸生壬屬足太陽膀胱其發耳與龍令至九十六日一變生屬手少陰心經心藏神其性為喜丁百二十八日四變一蒸生丙屬

手太陽少陽其發汗出而微驚，丁百六十日五變生乙屬足厥陰肝，肝藏魂喜哭，丁百九十二日六變三蒸生甲屬足少陽膽，其發目不閉而赤，丁百二十四日七變生辛屬手太陽肺，肺藏魄生聲，丁百五十六日八變四蒸生庚屬手陽明大腸，其發膚熱而汗或不汗，丁百八十八日九變生巳屬足太陰脾，脾藏意智至三百二十日十變五蒸生戊屬足陽明胃，其發不食腸痛而吐乳，又手厥陰心包經，手少陽三焦，此二經俱無形狀故不變而不蒸也。前十變五蒸乃天地之數以生成之，然後始生齒，能言知喜怒，故云始全也。太倉云氣入四肢長碎骨於十變後六十四日為一太蒸計三百八十四日，長其經脈手足，手受血故能持握，足受血故能行立。經云變且蒸謂蒸單而足一歲之日有餘也。師曰不汗而熱者發其汗，大吐者微止不可別

治又六十四日為一太蒸計四百四十八日，又六十四日三太蒸計五百一十二日，共五百七十六日變蒸既畢兒乃成人也。變者變生五臟也，蒸者蒸養六腑也，所以成人變者上氣蒸者體熱每經一變一蒸情能既異輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或吐或汗或煩喘躁渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相似亦有變蒸之餘續感寒邪者但變蒸則耳冷翕冷上唇發泡狀如泡珠若寒邪搏之則寒熱交爭腹中作痛而啼呼之聲日夜不絕變者易也蒸於肝則目眩微赤蒸於肺則噎嗽毛聳凡五臟六腑筋脈骨節循環各有證應其治法和平之劑微表之熱實者微利之或不治亦自愈

湯千金變蒸論云凡兒生三十二日一變六十四日再變變且蒸九十六日三變丁百二十八日四變變且蒸丁百

木十日五變一百九十九日六變變且蒸二百六十四日
 十變二百五十六日八變變且蒸二百八十八日九變三
 百二十日十變變且蒸積二百二十日小蒸畢後六十四
 日木蒸蒸後六十四日復木蒸蒸後一百二十八日復木
 蒸凡小兒自生三十二日一變再變為二蒸凡十變而主
 小蒸又三大蒸積五百七十六日木小蒸都畢乃成人小
 兒所以變蒸者是榮其血脉改其五臟故一變竟輒覺情
 態有異其變蒸之候變者上氣蒸者體熱變蒸有輕重其
 輕者體熱而微驚耳冷尻冷上唇頭白泡起如魚目珠子
 微汗出重者體壯熱而脈亂或汗或不汗不欲食食輒吐
 喙自白睛微赤黑睛微白又云目白者重赤黑者微變蒸
 畢自精明矣此其證也單變小微兼蒸小劇凡蒸平者五
 日而衰遠者十日而衰先期五日後期五日為十日之中

禁服

熱乃除耳或連日數不歇切不可妄治及灸刺海藏云言
不入次蓋前三十日二十日為十日蒸後二十日五
十六日為十日太蒸也現乎與切不嘔而吐也
 無若身熱耳熱尻亦熱此乃他病可作別治
 紫霜丸治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒溫壯熱汗後熱
 不渴及腹中疝瘕嘔乳不進乳則吐喙食癩先寒後熱
 者

代赭石醋碎赤石脂兩 巴豆三十粒 杏仁五十箇
 右坑將杏仁巴霜細研為膏却入二石相和更搗一二
 千杵當自相得若硬入少蜜同杵之密器中收二十日
 兒服如麻子大一粒與少乳汁冷下食後與少乳勿
 令多至日中當小下除熱若未全除明白更與一粒百
 日兒服如小荳大一粒以此准定增減紫霜丸無所不
 治雖下亦不虛久

心痛

診治

心痛當於大人心痛門參用之
心痛吐水者虫痛 心痛不吐水者冷心痛
靈鑿散治小兒虫咬心痛欲絕

五靈脂二錢 白礬半錢
右同研每服一二錢水一鍾煎至五分温服無時當吐
出虫

弄舌

脾熱

弄舌脾藏微熱令舌絡微緊時時舒舌治勿用冷藥及
下之當少與瀉黃散漸服之田氏云若肥廣者用牛黃散治之 或欲飲
水醫疑為熱用冷藥下之者非也飲水者脾胃津液少故
也又加面黃肌瘦五心煩熱即為疳宜加胡黃連輩 若
太病未已用藥弄舌者凶

重舌

診治

湯重舌附舌下近舌根生形如舌而小謂之重舌其着舌
下如此者名重舌其着頰裏及上腭如此者名重腭其着
齒斷上如此者名重斷皆刺之去血可也

熱痰

田重舌治法用苦竹瀝漬黃柏末點舌上如不愈後用真
蒲黃傅之不過二次愈用真蒲黃微炒布鋪地上出火氣
研細每挑此參舌上更以温水蘸
熱扁畏指輕輕
按之按罷參藥

姚治小兒重舌馬牙硝塗舌下日三度

世治小兒重舌木舌先用新水搽口并舌上下後用皂角
針燒灰入腦子少許每用半字糝舌上下出涎立效

子母治小兒重舌燒烏賊魚骨細研和鷄子黃傅喉及舌

上
簡治小兒重舌欲死亂髮灰細研以半錢傅舌下日不在

雜方

用之
四重舌葉白皮煮汁塗乳飲之 秘錄又以蜚蠊燒末唾傳之

木舌

湯木舌者舌腫漸漸大滿口不急治即塞殺入也

熟 回木舌治法用局方中紫雪丁分竹瀝平合和之時時抹入口中自消

丹小兒木舌百草霜滑石苦硝為末酒調傳

舌白胎

雜方 丹舌上生如粥粒桑白皮汁傳之三兩次妙

鼻衄

血熱湯地黃湯治滯中熱及肺壅鼻血生瘡一切丹毒

生地

赤芍藥

當歸

川芎各等分

雜方 右吹咀水煎去渣量木小加減服如鼻衄臨熱入生蒲黃少許生瘡加黃芪等分丹毒加防風等分同煎煎驗春冬衄者用生地黄研取汁加生蒲黃少許砂糖并花水浸服之愈 秋夏衄者用車前草一握洗淨同生薑一處研取汁入生蜜一匙先畔查塞鼻孔用新汲水和蜜并車前草生薑汁飲之即愈 又方生蘿蔔取根搗自然汁仰頭滴入鼻管中即止次以新汲水和蜜蘿蔔汁飲之良

遲言

虛 錢首蒲丸治小兒心氣不足五木歲不能言

石菖蒲三錢

人參五錢

丹參三錢

天麥門冬心

各一兩

赤石脂二錢

直指有當歸川芎硃砂

右為細末煉蜜丸如菘豆大溫水下十九至二十九日二三服久服效又有病後腎虛不語宜兼服六味地黃

丸海藏云地黃丸足少陰也與葛蒲丸上下通經

雞頭丸治小兒諸病後不能語

雄雞頭炙一箇 鳴蟬炙三箇

當歸分三 木通

遠志心法 麥門冬去心各三分

大黃煨一兩 甘草兩

黃芪各半兩

川芎門之

右同為細末煉蜜丸如小菘豆大平旦米飲下五九空
心日三四服兒大者加之冬服取效雞蟬二物宜求死
者用之不可旋殺孫真人所謂殺生求生去生更遠矣

海百舌鳥今之鶯也名反舌小兒不語灸食之又治虫

咬

腎怯朱音相似病吐瀉及大病後雖有聲而不能語此
非朱音為腎怯不能上接於陽故也當補腎地黃丸主之
朱音及瘁病即口禁不止則朱音聲遲亦同

針灸

明五六歲不語者

心膈壯

盜汗

錢黃芪散治虛熱盜汗

牡蠣服

黃芪

生地各等

右為末煎服不拘時

盜汗睡而自汗出肌肉虛也止汗散主之遍身汗香瓜丸
主之

止汗散用故蒲扇灰研細每服三錢溫酒調下無時如無
以故蒲代之

寶熱

虎杖散治寶熱盜汗虎杖水煎服量多少與之無時

海晉郎中子自嬰至童盜汗凡七年矣諸藥不效予與涼
膈散三黃丸二百病已蓋腎為五液化為五濕相火逼腎
腎水上行乘心之虛而入手少陰心火炎上而入肺欺其

不勝已也皮毛以是而開腠理玄府不閉而為汗出也出於垂柱者為盜汗以其覺則無之故經曰寢汗憎風是也先以涼膈散瀉胸中相火相火退次以三黃丸瀉心火以助陰則腎水還本臟玄府閉而汗為之自止

雜

汗遍身

錢治病有等

張氏云手病大者汗遍身次者止至頂下

至胸小者但額有汗衆醫以麥煎散治之不效錢曰大者與香瓜丸次者與益脾散小者與石膏湯各五日而愈

香瓜丸

胡黃連

大黃瓜黃色者

大黃濕倍

柴胡去蘆

鱉甲醋炙 黃柏

黃連

蘆薈

青皮各等

右除黃瓜外同為細末將黃瓜剖其頭項入諸藥却蓋口用杖子插定火內煨熟將黃瓜及藥同用麩糊丸如菜豆大每服二三丸食後冷漿或新水下大者五七丸不過十九

頭汗

胃怯汗上至頂下至臍此胃虛當補胃黃散主之

太陽虛汗止至頂不過胸也不須治之喜汗厚者臥而額汗出也止汗散主之

癰癤

表散

湯凡癰癤未見之物微見有紅頭瘰子起隱疹者急用不語唾夜半頻頻塗之飲酒了不可用

治發背癰癤方

羌活兩

川山甲炒焦 生人骨煨存性

麝香許

右末煎麻黃湯苛酒調如陰瘡頭平向內者服之即定
出其功效不可盡述若小兒痘瘡黑陷者只一服而定
萬不失

眼腫

本治小兒毒氣攻眼赤腫可畏者

皂角去核 天南星生用

糯米一合

右為細末薑汁調塗立效

惡核瘰癧

除本於裡

湯小兒惡核生於項頸止遇風寒所折不消結成瘰癧又
而潰膿生瘡也宜服四味大黃飲即四順清涼
瘰癧又方

升麻

射干

連翹

犀角屑

大黃微

枳殼各半

右咬咀水煎太小加減忌酒麪炙煖物

治瘰癧貼惡核方

赤小豆

猪牙皂角

黃藥

木鱉子各半

右末雞子清調塗患處

貼散瘰癧神效方

白膠香

降真香用心無土氣者

海螵蛸

右等分為末糝患處外以水帛掩之一夜而退

赤丹

田亦遊治法宜服犀角散下法先鑱去惡血服上藥犀角散方

風熱

湯小兒丹毒乃熱毒之氣極與血相搏而風乘之故亦腫

及游走遍身者又名赤遊風入腎入腹則殺人也大抵丹

毒雖有各種病源一也有赤丹毒遍身痒者或女子十五
六而脈未通者多發丹疹皆由血有風毒乘之宜服防已
散

漢防已半兩

朴硝一分

犀角一分

黃芩一分

黃芪一分

升麻各二分

右咬咀竹葉煎太小加減

丹 小兒黑斑紅斑瘡癩癰疹並用防風通聖散治之

荆芥散

防風

天花粉

羌活

生地黃

當歸

蟬蛻各等

水煎服

解毒散

寒水石

滑石

石膏

辰砂

右三石等分爲末入辰砂少許量兒大小燈心湯下

又方

赤小豆

木鱉子

椽椰子

南星

大黃

朴硝

右爲末用葱姑薄苛龍青和蜜水調塗患處外用熱氣
圍之却服荆芥解毒散

聖 小兒發斑散毒氣用生菜葉絞取汁少與服之

治 小兒丹發真火草生一握搗取汁傳之效

秘錄 治小兒赤遊丹行於上下至心即死搗芭蕉根汁煎
塗之

女部 治孩子赤丹不止以胡荽汁傳瘡

秘錄 小兒赤遊行於體上下至心即死以芒硝納湯中取
濃汁以拭丹上

錢 丹瘤熱毒氣客於滕理搏於血氣發於外皮止赤如丹

敷貼法

當以白玉散塗之

白玉粉即滑石

寒水石半

右末之，用米醋或新水調塗。

山火丹磨銅鐵水調，則上泥傳之。小兒赤遊風用朝散。

燕窩泥，雞子清調，傳將腫處，用針割破，鮮魚血塗之，尤妙。

敷貼反治法

小兒天火丹臍腰起者，赤溜不妨用蚯蚓泥，研細香

油傳之。

回又法用牛膝一兩，去苗，甘草半兩，生剉碎水煎，一大盞

去渣，調伏龍肝塗之。

山小兒赤丹，伏龍肝為末，芭蕉油調傳。又法用雄雞毛

及鷲毛，燒灰香油調傳。

又傳丹毒方，只一夜消盡，用花蕊石生薑薑蒜自然汁

調鷲毛，刷上患處為妙。

虛

張三太尉女十五歲，病此諸醫自藥俱試而不能中，召彭

視之，以生料四物湯加防風黃芩，二日而愈。

生料四物湯治血熱生瘡，遍身腫癢及脾胃常弱，不禁大

黃等冷藥，尤宜服之。調用麻香末，半兩，煎金

生地，以藥上赤芍藥，用蘇川芎，末米醋當湯。

六水防風各半黃芩半錢風末蘇煎金

石咬咀，水煎量大小，加減忌酒麪猪肉豆腐。

雜方 小兒赤溜，主傷血熱，宜生地黃木通，荆芥，苦藥帶發表

之類，冰以芭蕉油塗患處。

丹毒者，用韭菜，揆些搗，與香油以手摩熱於丹上，搯之

立愈。

丹小兒丹瘤，麻子五箇，去皮研入麪，是水調塗之，甚

蘇丹

七種丹

本小兒十種丹瘡腫毒所起形候并方治法
 一飛龍丹從頂頭起先腫用茵白研取自然汁塗
 二毒龍丹從頭上紅腫痛用赤小苔末雞子清調塗方同
 不拘何處皆治
 三惡火丹從面赤赤腫用灶心土雞子清調塗按不拘何處皆治
 四天火丹從背起赤點用桑白皮末羊脂調塗
 五天火丹從兩腎赤腫黃色用柳葉燒灰水調塗骨一
 六水丹從兩脇虛腫用生鐵屑為末猪糞調塗
 七胡火丹從臍上起黃腫用檳榔為末米醋調塗
 八野火丹從兩脚赤腫用乳香末羊脂調塗
 九烟火丹從兩脚有赤白點用猪槽不出麻油調塗示不
 十胡漏丹從陰上起黃腫用屋漏處土羊脂調塗
 右此十種丹毒變易非輕治之或緩則終不救故予不

洗法

診

虛

洗法

借是方能逐一仔細辨認依此方治之萬不失一
 經三日不治攻入臟腑則終不救不可緩也
 四赤遊風於身上下至心即死藉藿煎汁洗之子母秘錄
 藥也
 世百日内發必死不治
 亦癰
 海小兒經絡蘊熱頭面及身體生瘡四君子加瓜蒌相桔
 梗各半錢煎服
 湯小兒惡瘡天氣溫和頻與澡洗更衣名曰外宣亦不宜
 服藥小兒不得已而服藥此及下法若將養合宜何疾可
 復更令乳哺有節勿令過飽其身及如藥樹此養生之理
 也
 湯惡瘡方頻浴身安外宣無病

春用柳條荆芥，夏用桑葉桐枝，秋冬用苦參，煎湯洗。

敷藥傳瘡藥方 剪刀草 黃連 苦參

右等分爲末先洗淨次用麻油輕粉調傳

回瘡癬泊法浸湯瘡宜用苦瓠散塗之乾癬宜用羊蹄根絞自然汁調膩粉塗之濕癬宜用青金散貼之

苦瓠散治小兒浸淫瘡漸展不止

苦瓠二 蛇蛻皮燒灰半兩 蜂房微炒半兩 梁上塵合

右爲細末生油調塗攤帛上貼

青金散治小兒濕癬浸淫瘡

白膠香研 輕粉附 青黛二錢

右研爲細末乾粉瘡上

秘錄治小兒風癩不止白礬十二分煖熱酒投化用馬尾

煎湯塗之

出小兒頭面爛瘡木耳春細蜜調傳又冷水調平胃散傳俱乾則易之

眉煉

田眉煉治法用青金散傳之如不愈燒小麥存性研細好油調塗

耳瘡耳東瘡

雜方

丹小兒耳後月蝕瘡蛭蚓糞燒以猪油和傳之 耳上生瘡竹葉燒末猪脂傳之妙

楊氏以雞子白和傳立瘡 耳月蝕方胡粉和上傳之

耳後月蝕黃連末傳之安

湯白欬散治小兒凍耳成瘡或痒或痛

黃栢 白欬各半兩

右為末先以湯洗瘡後用生油調塗

面瘡

世治小兒面瘡通面爛無全膚膿水流瀉百藥不效者陳年鴈猪油不入鹽者傳之神效

口瘡

塗頰門法

簡如聖散治小兒口瘡不能喫乳者江子一粒或二粒研爛不去油入硃砂黃丹傳紙絹止亦許剝開小兒頰門貼在頰上如四邊起粟米泡便用溫水洗去藥恐成瘡更用葛蒲水洗便安其效如神

塗脚心法

世南星膏治口瘡小兒難用藥以大天南星去皮取中心龍眼大為末却用酸醋調塗脚心甚妙
子治小兒口瘡飲乳不得以白礬如鷄子大置醋中塗兒足底二十七次即愈

無牡礬散治小兒口瘡

牡礬煨通紅取出候冷切細以紙裹入上中七日出火氣三錢

甘草炙為末一錢

右和勻時時挑少許糝口中或吐皆無害

田口瘡治法乳母同兒宜服洗心散瀉心湯然後用黃柏末研細糝之瀉心湯方黃連一兩味為末蜜水調不可煎

湯治口瘡驗方

黃柏蜜炙赤 青黛分

右二件為末頗糝口中愈

從治法

口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火泛上宜附子理中湯

癩頭瘡

治熱正

世治癩頭用黃連細末傅之治年久癩頭內用苦參丸食後服之外用黃參末油傅之二月愈
丹又仿用防風通聖散酒製除太黃另研為末再用酒拌

晒乾為末無一錢水煎服日四五服至三十點見效
又方

川芎

片苓酒

芍藥酒

陳皮各半

白木酒

當歸酒各一兩

天麻酒

蒼耳七錢

黃栢酒

粉草酒

防風各三錢

右咬咀煎服四五次服之服過睡片時

反淨

小兒癩頭用燒紅灰燄長流水令熱洗之仍用芫荽子煎

猪脂去子用脂傳患處又法用胡荽子伏龍肝懸龍尾

雜方
頭瘡方

猪油一錢半雄黃生半熟

水銀各二錢半

右研和勻傳瘡上

又方治小兒癩頭并身癩等證用松皮燒灰白膠香枯礬

大黃黃栢油調傳患處又法用腦月為脂油搽患處

妙

簡頭瘡太第殼燒為灰量瘡大小用灰調生油傳又加臍

粉佳

秘錄小兒頭身諸瘡燒雞卵殼和猪脂傳之

世治癩頭

松香上兩乾銚溶開安在石上後冷取起輕研細

黑龍尾三錢即屋

塵垂

白芷兩

松樹皮燒灰二錢

黃丹錢

雄黃

白礬各二錢

右為末以血餘入香油煎爛調傳患處

脚凍瘡

湯生附散治爛脚瘡用生附子為末麪水調傳之愈

痘瘡治法通論

大法

疹惟用温平藥治之不可妄下及妄攻發受風冷云温平者非熱劑如荆芥薄荷防風牛蒡子甘草之類活人鼠粘子湯與潔古解毒防風湯相兼選用是也丹溪云鼠粘子連翹山查甘草此四味症瘡始終必用之藥

診睦親言中十大主瘡疹云瘡疹始終出未_有他證不可下但當用平和藥類與乳食不受風冷可也如瘡疹三日不出或出不快即微發之鼠粘子湯之類如瘡疹後不多出即加藥如十日一服加藥不出即大發之升麻葛根防風羌活獨活麻黃桂枝類如發後不多及脈平無証即瘡本稀不可更發也有大熱者當利小便小熱者宜解毒利小便四類若不快勿發勿下攻止用抱龍丸治之瘡疹若起能食者大黃丸下一二行即止有大熱者當利小便有小熱者宜解毒若黑紫乾陷者百祥丸下之不黑者慎勿下身熱煩躁腹滿而喘大便澀面赤悶亂大吐此當利小便不瘡者宜風散下之

救古海
藏宗錢
氏法

也若五七日痲不焦是內發熱氣蒸於皮中故瘡不得焦痲也宜宣風散導之用生犀角蘇汁解之使熱不生必着痲矣

論曰癩疹之病其為證各異瘡發焮腫於外屬少陽三焦相火也謂之癩小紅厲行皮膚中不出者屬少陽君火也謂之疹凡顯癩疹若自吐瀉者不可妄治而多苦謂邪氣上下皆出也大凡癩疹首尾皆不可下恐動則生變此謂少陽通表宜和之也當先安裏解毒次微發之解毒須安五臟防風湯是也如大便不秘者須微發之藥宜錢氏方中選而用之如大便過秘宜微利之當歸丸或變百祥丸是也初知癩疹若得之併出小兒難禁是以別生他症也首尾不可下者首曰上焦尾曰下焦若既吐利安可下便宜安裏若不吐瀉者先與安裏藥三五服如能食而大

便秘結內實者宜疎利之若內虛而利者宜用安裏藥一
二服末後一服調以微發之藥要之安裏之藥多發表之
藥少秘則微疎之令邪氣勿壅併而能作番次出使見易
禁也身溫者順身涼者逆二者宜多服防風湯和之
安裏解毒防風湯

防風兩

地骨皮

黃芪

芍藥

荆芥

枳殼

鼠粘子各等分

右為末水煎四五錢服若能食而大便實宜當歸丸微
利之

當歸丸

東變百祥丸

二方並見痘瘡大便秘門

海夫癍之為病皆由子在母腹中時浸漬食母血穢蘊而
成毒皆太陰濕土壅滯君相二火之所作也因小兒真氣
既盛止氣又旺邪無所容或遇天寒賊傷表或因傷裏癍

由是而出焉治當何如外者外治內者內治中外皆和其
癍自出至於惡寒者發之表太熱者奪之渴者清之太便
秘結者下之小便不通者利之驚者安之泄者分之可以
執一為哉大抵傷寒同治隨經用藥最為高論假令五日
已裏諸病與癍疹不能別辨者不可疑作癍疹必須發之
但各從其所傷應見治之皆不妨癍出若強發之其變不
可勝數矣前人言首尾俱不可下者為癍未顯于表下則
邪氣不得神越此脈證有表而無裏故禁首不可下也尾
不可下者為癍毒已顯於外內無根蒂大便不實無一切
裏證下之則癍氣逆陷故禁尾不可下也又言溫煖蓋覆
不令通風以癍昧或身表涼而惡寒或天令寒而惡冷溫
煖蓋覆不令通風也癍若已出身熱天暄何必用蓋覆而
不使之通風乎後人執此二句首尾俱不敢下溫煖不令

通風不知天令之所加人身之所盛致使誤人多矣太抵
前人之言隨時應變後之人不知其變故常執而不移也
噫首尾俱不可下者以其始終臟腑元無凝滯也若有一
切裏證及大便結者安得不下温煖不使之通風以其發
在冬時故如此也若發在夏時痲雖未出亦不用此也痲
之用藥太率以脈為主浮中沉之脈平舉按之候察其虛
實定其中外則可以萬全矣

如外傷升麻湯主之方見本門 內傷枳實丸主之大便與
者枳木丸主之若傷冷者温之神應丸三方俱見 惡
寒者發之宜防風蒼朮湯方見本門前條 表大執者奪之此表
者通言三陽也夫陽盛者氣必上行言奪者治之不令上
行也是知無三陽表證有三陽裏證染於有形也此言表
總三陽之名也 渴者清之太渴者白蘆湯暑月用之 小渴

者涼膈散涼膈散去硝黃加甘桔者穩 大便秘結者下之桃仁承氣
湯四順飲子柴胡飲子選用察其在氣在血必內實能食
而秘者可用但當微潤之 小便不通者利之導赤散
八正散之類當求上下二焦何經而用之 驚者安之涼
驚丸重者瀉之瀉青丸 泄者分之寒則異功散四君子
湯執則澤瀉茯苓湯

小兒痲疹初發未能辨認間但求所出之由因內因外及
不因外內隨其所傷如法服餌防其變故抑其盛氣比之
他證尤不可緩或發或瀉或解其肌或化其毒求其所起
之由涼血清肺調其臟腑平其飲食謹其禁忌嚴其養攝
適其寒温將理有法俾盡其道使出無不快之經成無不
痲之潰既愈之後不致遊毒流汗虛糜目疾膜翳瘡癩癰
瘤喉閉噎膈潮熱汗泄此治痲之大畧也 凡未出而發

冊溪分
氣血虛

搔者是外感風寒之邪內發心熱之所作也當用茶粉下
解毒丸犀角地黃湯主之 一發出便密如針頭形勢重
者合輕其表而涼其內連翹升麻湯 若痲已發密重微
喘飲水者有熱證用去風藥微下之 若出不快清便自
調知其表不在裏當微發升麻葛根湯 若青乾黑陷
身不大熱木小便澀則是熱在內煎大黃湯下宜風散
若身表大熱者表證未罷不可下 若痲已出見小熱小
便不利當以八正散利之 若已發後有餘毒未散復有
身熱瘡腫之類當茶粉下解毒丸 凡瘡疹已出後有聲
音者乃形病而氣不病也 瘡疹未出先聲音不出者乃
形不病而氣病也 若瘡疹出而聲音不出者是形氣俱
病也當清其肺氣宜用八風湯并涼膈散去硝黃亦可
冊溪分
小兒痘疹分氣血虛實以四君子四物酒炒蒼朮連等服

乏

氣虛參朮加解毒藥 血虛四物加解毒藥

右加解毒者酒炒黃芩炒黃連是也海藏云解毒者三
黃湯金花丸之類

痘瘡分人之清濁就形氣上取勇怯 痘瘡黑屬血熱
涼血為主白屬氣虛補氣為主中黑陷而外白色起遲者
則補氣中畧帶涼血藥

陳氏惟
主溫補

陳痘瘡未出已出之間或瀉瀉或腹脹或氣促謂之裏虛
速與十一味木香散治之 如已出之間其瘡不光澤不
起發根窠不紅謂之表虛速與十二味異功散治之 如
已出之間其瘡不光澤不起發根窠不紅或瀉瀉或腹脹
或氣促是表裏俱虛也連與十二味異功散送下七味肉
苳薹丸治之 冊溪云木香異功散二藥治裏 如瘡始出
的當若虛而不寒者禍不旋踵

一由至十日，渾身壯熱，大便黃，是表裏俱實也。其瘡必光澤，必起發，必飽滿，必易腐，而不致損傷。若無他疾，不宜服藥。表裏俱實者，易出易腐；表裏俱虛者，易出難腐。表虛難出，裏虛難腐，隨症治之。

張巽之治痘要法：吐瀉少食為裏虛，陷伏倒靨灰白為表虛。二者俱見為表裏俱虛，全用異功散救之。其至喜附靈砂亦可用。若止裏虛，減官桂；若止表虛，減肉桂。豈不減官桂丁香若能食便秘而陷伏倒靨者，為裏實，當用錢氏及丹溪下法。若不吐瀉能食為裏實，裏實而補則結癥毒，紅活綻凸為表實，表實而用表藥則潰爛不結痂。凡痘但見痲點，便忌葛根湯，恐發得表裏俱虛也。

辨陳氏之偏
讀前人之書，當知其立言之意，苟讀其書而不知其意，求適於用不可得也。痘瘡之論，錢氏為詳，歷舉源流，經絡

分明，表裏虛實開陳施治之法，而又證以論辨之言，深在著書垂教之體。學者讀而用之，如求方員於規矩，較平直於準繩，引而伸之，觸類而長之，可為無窮之應。國也。今人不知致病之因，不求立方之意，倉卒之際，據證驗方，護爾一試，設有不應，并其書而廢之，不思之甚也。近因局方之教久行，素問之學不講，抱疾談醫者，類皆喜溫而惡寒，喜補而惡解利。忽得陳氏方論，皆用燥熱補劑，其辭確其文簡，歡然用之，翕然信之，遂以為錢氏不及陳氏遠矣。或曰：子以陳氏方為不足歟？曰：陳氏方誠下偏之論，雖然亦可謂善求病情者。其意大率歸重於太陰一經，蓋以手太陰屬肺，主皮毛，足太陰屬脾，主肌肉，肺金惡寒而易於感脾土惡濕而無物不受，觀其用丁香官桂所以治肺之寒也，用附米半夏所以治脾之濕也。使脾與肺果有寒與濕而

兼有虛也量而與之出病則已何傷之有也不然但見
出遲者身熱者泄瀉者驚悸者氣急者渴思飲者不問寒
熱虛實率投木香散異功散間有偶中隨至獲效設或誤
投禍不旋踵何者古人用藥製方有向導有監制有反佐
有因用若錢氏方固未嘗廢細辛丁香白木參芪率有監
制輔佐之藥不專務於溫補耳然其用寒涼者多而於補
助一法更示端緒未嘗深及癡人之前不可說夢錢氏之
慮至矣亦將以候達者擴充推廣用之耳雖然渴者用溫
藥痒塊者用補藥自陳氏發之迨出前輩然其多用桂附
丁香辛芳燥熱恐未為適中也何者桂附丁香輩當有寒
而虛者固是的當虛而未必寒者其為患當何如耶陳氏
立方之時必有挾寒而用一偏之方寧不過於熱乎予嘗
會諸家之粹求其意而用之實未敢據其成方至正甲申

雜錄

陽氣早動止月間也間痘疹不越一家率投陳氏方竟勿
死者百餘人雖由天數善惡人事亦或未之盡也

傷寒男體重面黃女面赤喘息急各憎寒口中氣熱呵
欠頓悶頰急瘡疹則顯赤躁多噴嚏悸動昏倦四肢冷傷
寒當發散之瘡疹當溫平之有大熱者宜解毒昏睡喜
嚏悸者將發瘡疹

辨痧證 呵欠 噴嚏 睡中急驚 耳尖冷 眼澁
辨傷寒 口熱 口中醋氣 姪辦不消 腹中疼痛

瘡疹候面燥顯赤目胞亦赤呵欠頓悶乍涼乍熱咳嗽
嚏噴足稍冷夜臥驚悸多睡此瘡疹症天行之病也

錢氏論
屬五臟

睡親官十太尉瘡疹衆醫治之王曰疹未出屬何臟腑一
醫言胃氣熱一醫言傷寒不退一醫言在母腹中有毒錢
氏曰若言胃氣熱何以乍涼乍熱若言母腹中有毒屬何

臟也醫曰在脾胃錢氏曰在脾胃何以驚悸皆無以對錢氏曰夫胎在腹中月至六七則已成形食母腹中穢液入兒五臟食至十月即穢液滿胃至生時兒口中猶有不潔產母以手拭淨則無疾病俗以黃連承粉下其臍糞之穢此亦母之不潔餘氣入兒臟也本先因微寒又遇風寒邪氣相搏而成痘疹也未出欲作之時熱動五臟則五臟之症先見初欲病時先呵欠頓悶驚悸乍涼乍熱手足冷面顯煩赤燥咳嗽嘔噦此五臟症俱見也呵欠頓悶者肝也時發驚悸者心也乍涼乍熱手足冷者脾也面赤顯煩赤咳嗽嘔噦者肺也惟腎無候以在臍下不能食穢故也凡瘡疹乃五臟毒若出歸一症肝水痘肺膿痘心為癩脾為疹腎雖無症其候惡者瘡變倒靨而黑暗則歸腎也此由不慎風冷而不能食肉虛所致也今太尉疹子無他證當

用平和藥為治因用抱龍丸數服愈海藏云本先因微寒冷而不能食肉虛一旬勿認作寒証用抱龍丸即知疹多熱也

瘡疹始出之時五臟症見惟腎無候但見平症耳况凉耳凉是也况耳俱屬於腎其居北方主冷也

痘疹始出之症必先見面燥腮赤目胞赤赤呵欠頓悶乍熱乍涼咳嗽嘔噦足稍冷多睡睡驚並瘡疹之症或生膿泡太癩或生小紅癩或生癩疹此三等不同何故俱顯上症而後乃出蓋已上諸症太陽寒水起於右臂之下煎熬左臂足太陽膀胱寒水夾脊逆流上頭下額逆手太陽丙火不得傳道逆於面上故顯是症蓋壬癸寒水尅丙丁熱火故也諸痘症皆從寒水逆流而出也醫者當知此理乃敢用藥夫胞者一名赤宮一名丹田一名命門男子藏精施化婦人繫胞有孕俱為生化之源非五行也非水亦

非火此天地之異名也象坤土之生萬物也夫人之始生也血海始淨一百二十日精勝其血則為男子三百四日五日血脈已旺精不勝血則為女子及二物相搏長先身生謂之神又謂之精道與釋二門謂之本來面目是也其子在腹中十月之間隨母呼吸呼吸者陽氣也而生動作茲益精氣神飢渴皆隨母血兒隨母長筋骨皮肉血脈形氣俱足十月降生口中尚有惡血啼聲一發隨吸而止此惡血復歸命門胞中僻于一隅隱伏而不發直至兒因內傷乳食濕熱之氣下陷合于腎中二火交攻榮氣不從逆於肉理惡血乃發諸瘡皆出於腎水其陽後聚肉理歸於陽明故三番瘡始顯之症皆足太陽王膀胱尅丙小腸其始出比見於面終歸於陽明肉理熱化為膿者也二火熾盛反勝寒水遍身俱出此皆從足太陽傳變中來也

候驗

用藥驗

治驗

錢始發潮熱三日已上熱暈入皮膚即發瘡疹而不甚多者熱留皮膚之間潮熱隨臟出如早食潮熱不已為水泡之類也膿疱反成壯未潮熱為疹也
主驗瘡法若三日未覺形迹當以生酒塗身上時時看之狀如蚤痕者是也或曰傷寒傷食潮熱與瘡疹不能辨者宜以辛涼之劑調之五日已更發出即注五日已外無者非瘡也各隨應見而治之
關治小兒壯熱昏睡傷風風熱瘡疹傷食皆相似未能辨認間服升麻葛根湯惺惺散小紫胡湯其驗蓋此數藥通治之不致誤也惟傷食則大便酸臭不消化畏食以吐宜以藥下之海藏云宜以藥下之者當察其所傷何物生硬升麻葛根湯太陰陽明也惺惺散治風熱咽不利脾不和少陽滑小使不利也小柴胡湯治往來寒熱胸膈微痛少陽也然欲知其經當以脈別之

雖在末顯服藥

小兒耳冷尻冷手足乍暖乍涼面赤時嗽時噎驚悸此瘡疹欲發候也未能辨認間服升麻湯消毒散已發未發皆宜服仍用胡荽酒黃柏膏暑月煩燥食後與白虎湯玉露散熱盛與紫雪咽喉或生瘡與甘桔湯甘露散餘依前說大人小兒同治法惟大小不同耳海藏云消毒散太陽藥也白虎湯治身熱也鼻乾不得臥陽明藥也其露散肺腎藥也其桔湯少陽藥也紫雪天冬麥冬黃芩生地芎藭血劑玉露散肺腎藥也膏藥水石為氣劑已上五方皆瀉時身之藥

升麻葛根芍藥甘草
右同為細末每服四錢水一盞半煎至一盞無時溫服海藏云升麻葛根湯太陽陽明之藥陳文忠云身熱腹痛者身熱淋瀝者身熱驚悸者身熱汗出者身熱足冷者俱不宜服升麻葛根湯張巽之云凡痘見麻點忌葛根湯恐發得表虛也

惺惺散治小兒風熱瘡疹傷寒時氣頭痛壯熱目澁多睡咳唾氣壅鼻塞清涕

白朮 桔梗 細辛 瓜蒌根
人參 茯苓 甘草各等分

右咬咀每服一錢水一盞生薑三片入薄荷二葉煎至半盞時時與服活人云加防風川芎亦各隨經也海藏惺惺散治風熱咽不利脾不和少陽渴小便不利也右二方發表平劑

王簡奉四物解肌湯

芍藥 黃芩 升麻 葛根

每服四錢水一盞煎至七分去渣服或云小兒傷寒疫癘潮熱瘡疹五日已衰疑似不能辨別者並皆辛涼之劑調之即以四物湯解肌之類海藏云此論即有表也若內傷腹中有物未得

大便而發熱者當以食藥去其物則可若得便後仍發熱在表者亦宜此解肌湯此錢氏升麻葛根湯減甘草加黃芩以有表熱之意也

防風蒼朮湯治小兒邪熱在表惡風惡寒瘡疹未出可

解表發瘡疹

防風

蒼朮

石膏各一兩

甘草半兩

川芎

黃芩各二兩

右為蠶末每服二錢生薑二片薄荷七葉水煎日二服

此方惡寒者宜用之

右方辛涼之劑表有熱者宜之

大便酸臭不消化畏食或吐乃內傷飲食宜枳朮丸傷冷

食飲神應丸

一男子年十六歲發熱而昏目無視耳無聞兩手脈皆

豁大而畧數知其為勞傷矣時里中多發痘者雖不知人

傷食宜消導之

脈虛大宜補之

與藥則飲與藥則食遂教以參芪當歸蒼朮陳皮木料濃與之飲至二十餘貼痘始出又二十貼則成膿痘身無全膚或曰病勞可畏何不用陳氏全方治之予曰此但虛耳無寒也只前方守之又數十貼而後詢其病因為先四五日忽有出痘之患遂極力採種道自出干甚矣

五臟各有下證 肝臟水疱 肺臟膿疱 心臟瘰

脾臟疹 婦腎變黑

海肝臟水疱色或青肺臟膿疱色或白脾臟疹或如麩糠

色心臟瘰其色赤變婦腎則色黑矣此五色凡痘疹一色

者善或二色三色相合而作者凶 第一大小不等

小兒在胎十月食五臟穢血生下則其毒當出故瘡疹之

狀皆五臟之液肝主淚肺主涕心主血脾為裹血其瘡出

有五名肝為水疱以淚出如水其色青而小肺為膿疱以

五臟見症

為稠濁如膿其色白而大心為癰主血其色赤而小次於
 水疱脾為疹其色赤黃而小涕淚出多故膿疱水疱皆大
 血榮於內所出不多故癩疹皆小又病水疱膿疱者涕淚
 俱少以液從瘡出故也譬如泡中容水水去則泡瘦矣
 右水疱者俗謂之水痘也膿疱者俗謂之痘子也癩者
 俗謂之瘡子也疹者俗謂之麻子也痘之形狀最大水
 痘次之癩瘡又次之麻子最小隱隱如麻子也

辨逆順
輕重

更看時月重輕大抵瘡疹屬陽出則為順故春夏病為順
 秋冬病為逆冬月腎旺又盛寒病多歸腎變黑又當辨春
 膿疱夏黑陷秋癩子冬疹子亦不順也
 凡瘡疹只出一般者皆先發膿胞後發疹子者順先
 發水疱後發疹子者逆先發膿胞後水疱多皆順少皆
 逆先發水疱後發癩子多者逆少者順先發疹子後

發癩子者順

先發膿胞後發癩子者逆

海藏云此下起
是以知雜出者

諸臟相合而不齊也用藥亦難矣前斷云五色各隨五臟
亦有二色相合或有二色即無定也此與前後膿水癩疹
大小不同先後
逆順大意相若

凡瘡疹若出辨視輕重若一發便出盡者必重也痘夾疹
 者半輕半重也出稀者輕裏外肥紅者輕外黑裏白者微
 重也外白裏黑者大重也瘡端裏黑如針孔者熱劇也青
 乾黑陷昏腫汗出不止煩燥熱渴腹脹喘喘大小便不通
 者困也凡瘡疹當乳母慎口不可令飢及受風寒必歸腎
 變黑難治海藏云或熱極反兼水化者亦能變黑當以涼
者內素有熱類反陷色或淡青似黑中有針眼下陷當急
以青涼藥陳之便結者大黃犀牛之類便軟者金花丸之
類主

陳軀者作三尖出

大小不一等

頭面稀少

眼中無

根窠紅 肥滿光澤

重者一齊並出 密如蚕種 身熱腹脹 瘡灰白色
稠密無縫 瀉渴不止 頭溫足冷
輕變重 犯房室 不忌口 先嘔瀉 飲冷水 餌涼
藥

重變輕 避風寒 常和暖 大便稠 不燥渴 忌生
冷 忌外人

右飲冷水餌涼藥者內有實熱者不須忌之
二日三日痘瘡始見微微纔出如粟米大或如黍米大或
如菜豆大似水珠光澤明淨者佳不須服藥
四日五日痘瘡大小不等根窠紅活光澤明淨者輕如稠
密陷頂灰白色瀉渴者重
六日七日痘瘡肥紅光澤者輕如身溫氣促口乾腹脹足
指冷者重

八日九日痘瘡長足肥滿蒼蠟色者輕如寒戰悶亂腹脹
煩渴氣急咬牙者至重也
十日十一日痘瘡當腐瘡痂欲落而愈如身熱悶亂腹脹
泄瀉寒戰咬牙者重

黃栢膏如瘡疹已出此藥塗面次用胡荽酒外治法

黃栢 兩 菘荳粉 兩 甘草 兩 紅花 兩

右同為細末生油調從耳前至眼眶並厚塗之且三兩
次如早塗瘡不至面縱有亦少彭氏云痘疹護眼人多
錢氏黃栢膏最好諸家
護眼法無出此方也

疔瘡初出用鼠粘子為末水調傅額門並無患眼亦妙
胡荽酒 胡荽一味細切四兩以好酒三盞煎一二沸入
胡荽再煎少時用物合定放溫每吸一大口微噴從頂至
足間遍勿噴頭面病人左右常令有胡荽氣即能辟去活

噴體令
快法

塗面護
眼法

氣瘡疹出快

變重為輕法

丹痘疹初出時或未出時見時人有患者宜預服此藥多者令少重者令輕以絲水近帶三寸連皮子燒灰存性為末沙糖拌勻乾喫入硃砂末更妙
消毒救苦湯治癰症悉具消化便令不出若已出稀者再不生癰十月立此方隨四時加減惟通造化明藥性者能之

麻黃根

羌活

防風各五分

柴胡

川芎各二分

細辛

藁本二分

升麻五分

葛根

黃芩酒炒各二分

黃連三分

黃柏酒炒五分

紅花少許

蘇木一分

梔子三分

吳茱萸一分

白朮一分

蒼朮二分

甘草生

橘皮各一分

連翹半錢初出者大者加

生地五分

橘皮各一分

右改阻每服五錢水二大盞煎至一盞去滓其藥服癩疹者因內傷必出班乃榮氣逆故也大禁牽牛巴豆峻藥宜去夏初實木黃益智仁之類去瀉止吐若耳尖冷呵欠睡驚噫噴眼溢知必出癰也宜

升麻

葛根

白芍藥

甘草

歸身

連翹各等分

分五藏施治

右改阻水煎服此定法也後隨症加減如肺出膿癰先顯喘嗽或氣高而喘促少加入參黃芩以瀉伏火而補元氣如心出小紅癍必先見隘乾驚悸身熱肌肉腫脈弦洪少加黃連如命門出癰疹必先骨痛身熱其疼痛不敢動搖少加生地黃柏諸癍疹皆為陰症瘡皆因內傷乳食脾胃不足榮氣逆行雖火勢內熾陰覆其外故錢氏製四物升麻湯發之如有

傳變症依加減法服之

世如疹痘則發於脾宜陳氏人參清腸散疹者皮膚隱隱如麻名曰麻子

水疱者多因傷寒熱毒而發宜升麻散及羌活散方見下

分乾溫

丹瘡乾者宜退火濕者用瀉濕退火止用輕劑荆芥升麻

葛根連翹之類瀉濕乃肌表間濕宜用風藥防風白芷之

類痘初起時自汗不妨蓋濕薰蒸而起故也

診生死

世痘瘡不治症有七 一憂齒痘黑陷喉中涎喘因先受

風冷血氣虛弱即變此症 二憎寒困倦痘子縮伏 三

瘡作坑內無膿血或黑色洵或瘡跡作黑色 四痘瘡壅

腫痘毒變毒口臭齙爛牙落 五聲啞氣喘或因藥腹中

鳴 六痘初出而半在皮膚紫黑色不出者 七誤於

疎轉氣啞者 凡出前後心密及兩手心兩足心密者皆

不可治

陳論痘不治有五 瘡場寒戰咬牙煩躁不止 紫黑色

喘渴不寧 頭溫足冷悶亂欲飲水 眼睛上視齒齙氣

促泄瀉不止 灰白色陷頂腹脹喘渴不止

禁忌

活小兒瘡疹與傷寒相類頭痛身熱足冷脈數疑似之間

只與升麻湯解肌兼治瘡子已發未發皆可服但不可疎

轉此為大戒傷寒身熱固不可下瘡疹發熱在裏猶不可

轉世人不學乃云初覺以藥利之宜其毒也誤矣海藏云

當在經則可若熱過極足冷或內傷腹熱足冷宜以寒

藥如洗心調胃及化食藥通膈之類主之然當求貴職府

秘與不秘脈道何如耳許氏云上熱下冷傷食也瘡疹初

熱手足亦冷惟傷寒下身盡熱不與足冷相類此傷食非

傷冷也若傷冷不宜用 痘瘡已出不可疎轉出得已定

王德用感應丸治之 膿血太盛却用疎利亦非也海藏云此言若在經而出不

時後重如痢疾及服 木抵瘡疹首尾皆不可下海藏云

瘡在裏者亦當微下 小兒身耳尻冷咳嗽輒用利藥即害云此

可拘此

言裏和而少湯之氣在經熱出故用化毒犀角
 湯為氣出裏和若氣不出裏未盡求其利何
 痘纔瀉則令內陷決不可輕易轉下惟大小便多日不利
 宜微微利之及痘已靨尚有餘熱停留或作熱或作瘡瘻
 或成癰宜四順飲下之不特消餘毒亦免生他症累試累
 驗每見疹痘者服發表麻黃藥出汗陽氣盡出膚表遂
 至癰爛臟虛虛則腹痛自利或作寒戰或作陰瀉死皆多
 矣

陳痘瘡自初出至已愈之際父母切忌房事

世凡痘瘡勿令親近其鼻漏腋者房中淫慾者及婦人經
 候醉酒葷穢硫黃蚊藥一切腥臊疫汚蒸濕誤燒油髮五
 辛潑糞淋尿熬油煎卵俱當忌之

海瘡疹忌外人及穢觸之物雖不受風冷亦不可擁逼當
 令衣服得中並溫涼處坐臥

痘瘡發熱口乾煩渴不止者切不可與水喫亦不宜與

蜜紅柿西瓜橘子等冷物食之若服實中有實熱者不必忌生冷痘瘡

欲靨已靨之間忽不能靨腹脹煩渴不可與冰蜜等冷物

食之或頭溫足指冷或瀉渴氣促亦不可與之十一二日

十三日瘡痂已落其痂猶黯或凹或凸肌肉尚嫩不可濕

浴亦不宜食炙煖物酸辣五辛有毒之物恐熱毒熏膈眼

目多生翳障

海世人徒知憐惜過愛信其俗而不藥病已成而左癩摩

撫從容無所不從豈知愛之適足以害之憤之適足以棄

之始不早治治不全終卒之殞斃勞而無功至是各醫嗚

呼其計亦繆矣

痘出太密

丹疎則無毒密則有毒用涼藥解之雖數十貼亦不妨無

害眼之患

潔一發便密如針頭形勢重者合輕其表而涼其內連翹
升麻湯主之

垣鼠粘子湯治癰疹已出稠密身表熱急與此藥防後青
乾黑陷

鼠粘子炒二錢當歸身酒浸甘草炙柴胡
連翹 黃芩 黃芪各一錢地骨皮二錢

右吹咀每服二錢水煎去渣溫服空心服藥且勿食
乳食

田調肝散治瘡疹太盛宜服令瘡不入眼

生犀半錢草龍膽一錢黃芪兩半大黃錢
桑白皮炒黃節去麻黃去節釣藤子各一錢石膏兩半
瓜蒌仁去皮甘草炒各二錢

右為麤末每服二錢水煎食後溫服微利效

海出太多者犀角地黃湯地骨皮鼠粘子湯犀角地黃湯
皮散加鼠粘子湯是也

丹又解瘡毒藥

絲瓜 升麻 芍藥酒炒 甘草生
山查 黑豆 赤小豆 犀角

右吹咀水煎服

緊癰已發密重微喘飲水者有熱證用法風藥微下之
丹治男子勞傷出痘昏不知人身無全膚者方見痘
未愈痘出不快

大法 錢氏消毒散 化毒湯活人鼠粘子湯此上三方並見本
防風皆發痘之要劑也

右三方發瘡痘皆溫平溫涼藥錢氏所謂三日不出或

此不快即微發之者是也如微發不出者即就與前項藥該每服二錢者即加至三四錢該每日二服者即加至三四服如加藥又不出者即用升麻葛根麻黃桂枝大發之如大發後不多及脈平無事者即瘡稀不可更發如脈洪有熱有大熱者當用四聖導赤八正葷利小便有木熱者當用芩連及金花九葉解毒若利小便解毒後又不快則勿發勿下止用抱龍丸治之此皆錢氏心法也

虛

丹勉效痘已出第三日色淡不肯發此血氣俱虛與此方

人參錢一 白朮炒 黃芪酒 歸身酒洗各
陳皮分二 甘草許少 訶子煨 荳蔻煨半
右煎入好酒些飲之
右治氣血俱虛

彭疹痘發未透宜四君子湯加黃芪紫草糯米煎成醫百病不可損胃氣故用四君子及糯米等助其胃氣也續錢氏方

世六一湯專發痘瘡之膿

黃芪錢大 甘草錢一

右咬咀每服二錢水六分煎入酒二分同煎至半盞服更加橄欖同煎尤好加山藥亦得

右治氣虛

活活血散治瘡子或出不快用白芍藥末酒調如欲止痛

只用溫熱水調嚥下海藏云張和之治四肢出不快加防風大效此症乃大陰藥也

四物湯治痘瘡出不快不甚紅活不起根窠緣血虛故也此藥能活血調順痘疾無如此方自古及今用之如寶只加甘草服之

右治血虛

虛寒

女子瘡後出痘血氣俱虛又值冬寒熱易退不出

丁香粉五

附子分五

桂枝錢

甘草分二

人參兩半

黃芪錢一

陳皮

當歸酒洗各五分

陳異功散治痘瘡已出之間不允澤不起發根窠不紅謂之表虛

木香

當歸錢各三

桂枝

白朮

茯苓錢各二

陳皮去白

厚朴薑製

人參去蘆

肉桂錢各二

丁香半錢

半夏薑製一錢半

附子炮去皮一錢半

右吹咀每服二錢水一盞薑五片連三枚煎服

右治虛寒用此必脈虛細四肢身冷者方可用之

虛熱

藍根散治瘡疹出不快及倒靨一名二聖散救小兒垂死

板藍根兩一

甘草錢各七

右末每服半錢取雄雞冠血三兩點同溫酒少許食後

調下無時甚則三五服立效丹溪云藍能散敗血

擦若出不快清便自調知其不在裏當微發之宜升

麻葛根湯

錢消毒散治瘡未出或已出未能勻遍又治一切瘡涼膈

去痰治咽喉痛

牛蒡子兩三

甘草錢半

荆芥穗二錢

右同為釐末每服三錢水一盞半去渣溫服海藏云此藥皆溫中

之劑下法加防風薄荷

活鼠粘子湯治小兒痘瘡欲出未能得透皮膚熱氣攻咽

喉眼赤心煩

鼠粘子兩四

荆芥穗

甘草兩一

防風兩半

右為細末沸湯點服臨臥大利咽喉化痰涎止嗽老幼皆宜海藏云太陽少陽之劑首論溫平者此也

海又法用牛蒡子炒熟為末同荆芥煎服右三方消毒飲加減法也

活化毒湯治小兒瘡痘已出未出並宜服之紫草茸 升麻 甘草各等分

右咬咀冰二鐘粳米五十粒同煎此陽明之藥也海藏云出不快者化毒湯本事方用糯米去糲米

丹亞玉痘出兩日不甚透食稍進汗微出執復減但食物口中覺有惡味此出得遲發未透須微微表之

升麻 甘草 紫草 白木 陳皮 芍藥炒半錢

作一貼加少酒同煎白芍須炒見其大便雖出不多却

白帶瀼滑

世透肌湯治痘不透

紫草 白芍藥 升麻 秫米粉炒各半兩 右三方皆化毒湯加減法也

海太陽出不快身之後也 荆芥甘草防已湯 升麻加紫草湯聖惠方升麻葛根加紫草

陽明出不快前也 連翹防風湯即連翹散 少陽出不快側也 防風芍藥甘草湯 四肢出不快

痘疹煩不得眠者其桔加梔子湯 桔梗 甘草 梔子 各等分煎服

煩不得眠者宜汗利之

活治痘出不快煩躁不得眠者水解散麻黃黃芩湯升麻黃芩湯主之海藏云其若定其氣血用石膏梔子之類尤佳麻黃黃芩湯升麻黃芩湯亦當求黃芩是太陽陽明方可用之

水解散治天行頭疹壯熱一二日兼治痘疹未出煩躁或出尚身體發熱者

麻黃去節

大黃

黃芩

桂心

甘草

芍藥各二兩

右為藥末患者以生熟湯浴訖以暖水調下二錢相次二服得汗利便痊強人服二方寸七風實之以三伏中亦宜用之若去太黃春夏通用

升麻黃芩湯治痘疹出不快煩躁不得眠麻黃黃芩湯治痘疹出不快盆煩躁昏憤或出尚身疹熱者已上二方見小兒傷

便溲宜流行

門寒

四聖散治痘疹出不快及倒靨一方有黃芪

紫草茸

木通

甘草炙

枳殼炒

右等分為麤末每服一錢水一鍾煎至八分溫服無時

劉提點云疹痘最要大小分曉錢氏四聖散用木通枳殼極好若大小流利不必苦泥

田紫草迴毒散小兒痘疹出不快或倒靨毒氣入腹

紫草茸

黃芪

桑白皮

木通

枳殼

白木各等分

右為麤末每服三錢水酒各半麤麤者少許同煎服

海紫草木通散治小兒痘疹

紫草

木通

人參

茯苓

粳米各等分

甘草炒

右為末每服四錢水煎此小便不利之劑也

世人參蠟蛻散治小便不利瘡痘不散燥躁多渴葛弟咬齒氣麤喘滿

人參

蠟蛻

白芍藥

木通

赤茯苓

甘草

紫草茸各等分

水煎服

錢 紫草散發癩疹

鈎藤鈎子 紫草茸各等

右為細末每服丁字或五分一錢溫酒調下無時

海 小兒瘡疹出未快可濃煎紫草汁服

右紫草例為通利膝理要藥也

活 瘡不綻黃狗蠅四五枚用常酒研細服之未綻再服各月

在耳內取之

雜方

痘瘡塌

虛實

痘瘡塌者於形色脈上分虛實實則脈有力氣壯虛則脈無力氣弱實則勢熾虛則氣怯虛者以實表之劑加涼血藥實者以太黃寒涼之藥少許與之下其結糞痘瘡瘡塌不掩

白朮 一錢

黃芪 錢半

當歸

陳皮 各五分

甘草 錢

水煎溫服

雜方

予治一子七歲痘將出未出之際腹泄數行其泄色黑不發根窠三日後瘡場抓即黑色口渴其根窠如水疥狀不紅澤不起發食少脈浮數有力按之虛遂用參芪歸朮陳皮肉苳蔻為君炙甘草訶子桂為佐使水煎熟好酒些少咽下瘡立止食立進根窠紅澤而起發二服全愈

丹輕者用淡蜜水調滑石末以雞羽潤瘡上

陳痘瘡難在搔之成瘡或膿或血出者敗草散治之切不可用牛糞灰貼則臭穢癩瘡多矣

屋爛草 屋上爛草也如無磚頭爛草亦可用此

右丁味為末每研碎篩末若瀉身瘡破爛膿水不絕粘貼衣裳難以坐睡可用二三升攤於床褥上令兒坐臥

其效如神

小兒痘瘡，難任候搖，成瘡及瘡，痴欲落，不落，用上好白蜜，下味塗於瘡上，其痴易落，可無紫黑癩痕。世傳痘瘡落後，痘毒不盡，變成癩癧，其痒難任，用陳年鴈脂油，傳神妙。

又方用羊髓、骨髓，煉一二十沸，入輕粉少許，研成白膏，糞合盛之，塗瘡效。

痘灰白色

寒熱丹爐灰白色，靜者怯者，作寒看，躁者身者，炊發者，作熱看。

凡痘疹白色，將靨如豆殼者，蓋因初起時飲水多，其靨不齊，俗呼倒靨，不妨，但服實表之劑，如毒氣鬱裏，消息他木。

虛裏泉店小兒，周歲痘瘡，色白甚，瘳藥中，每加參芪半兩。

白木五分

丁香兩

當歸錢

官桂分

黃芪兩

水煎服

虛熱予族姪女，笄年出痘，灰白色，身熱喘嗽，渴脈洪，有力，與八物湯，加連翹、桔梗、犀角、犀半、夏木、通紫草、乾葛、石膏、香枳、蓮蓉、前胡、瓜蒌仁，服之，十貼後，色紅活，喘嗽緩減，漸微，但熱未除，遂於前方，減其香胡、枳、連蓉、萎七味，服三十餘貼，而安。安後，髮皆落，月餘方起床，虛之盛也。○又一男子，二十餘歲，出痘已破，未破者，灰白色，又雜間以黑陷，倒靨者，發熱寒戰，身痛，脈洪，或時弦，亦與八物，加木通、紅花、紫草、陳皮、連翹，服十餘貼，而安。

痘黑陷倒靨

虛國紫草散，治瘡痘黑陷，曾服此方，愈。元錢晉云，有枳殼難服。

紫草

甘草

糯米充云此味極好助胃氣

黃芪各等分 水煎服

丹痘瘡黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡出者用黃芪人參酒炒紫草治之顏色正者如上治法參芪之補佐以紫草之通利也如將出成就之際却色淡不正者屬血虛宜用補血藥當

婦川芎白芍酒洗之類或加紅花色紫解毒如將成就之際却色紫不正者屬熱宜用涼藥解毒升麻芩連桔梗連翹之類其堵用犀角屑如用後項諸藥色仍不正者宜兼用二法

世回生散治瘡疹倒靨黑陷用入牙燒灰存性入麝香少許研細每服半錢用黃芪白芍藥煎湯調下立效錢氏方中用溫酒調下雲岐方中用升麻紫草煎湯調下海藏云油膩腸垢者通膈丸下之殊妙為衣與宜風散相表裏彭氏云只用紫草湯自好錢氏方用麝香及酒蓋瘡疽畏怕觸禁不可用

湯治痘瘡黑陷藥不能發者有驗用川山甲一味燒存性為細末入麝香當閉子少許一歲五分三歲一錢溫酒調下一服取效雖半身黑陷欲絕者亦能轉醒而發紅色但有目閉無翳者不復生矣此方雖驗回生散又佳今謹麝香恐不宜服

麻黃湯用麻黃剪去根節五錢用蜜一匙同炒良久以水半升煎候沸去上沫再煎去三分之一不用查病瘡疤倒靨黑者乘熱盡服之避風俟其瘡復出下法用無灰酒煎更速但小兒不能飲酒者難服以此藥入表也世傳此法累用效有

大小結
疔疔者
調和裏

活瘡黑倒靨猪尾湯無比散龍腦膏子無不驗海藏云若似勝腦藥必不得已而後用之可也

活猪尾膏治瘡倒靨用小猪尾尖刺血兩點入生腦子少許同研新汲水調下食後立效

龍腦膏子治時疫發痘瘡及出瘡子未透心煩狂躁氣喘
妄語或見鬼神或已發而陷伏皆宜速治不治其毒入臟
決死用生龍腦一錢研細滴猪心血和丸如豆子大每服
一丸心煩狂躁者用紫草湯化下若瘡子陷伏者用溫酒
化下少時心神便定得睡瘡疹發透依骨將息取安海藏云此
下法証極而用故
冷人云不得已也

海四查散治癰瘡倒靨黑陷出御院
藥方 歌曰人指猪犬腦

辰燒每服三錢蜜水調選甚倒靨并黑陷萬兩黃金也合

臘月辰日合
此藥甚驗

子神人中黃臘月者最佳通風處以火煨成煤水調下三
五錢陷者自出丹溪云子和黑陷其者用燒人尿即此方

也 **世治**疹痘不透乾黑危困用山查肉一味為末每服二錢

紫草酒送下量兒大小加減徐徐進三四服即紅活

海劉守真涼膈散治小兒癰疹黑陷亦妙然止能治大便

結硬小便赤澀為當若大便小便已通不宜用此惟以易

老去大黃硝者最為穩當

寒戰咬
牙者下

錢凡痘疹重者猶十活四五黑者無問何如十難救其

候或寒戰咬牙或身黃腫紫宜急以百祥丸下之復惡寒

不已身冷出汗耳尻反熱者死何以然腎氣大旺脾虛不

能治故也下後身熱氣溫飲水者可治以脾氣生勝腎

寒去而溫熱也治之宜解毒不可妄下妄下則內虛多婦

於腎若能食而痴頭焦起或未焦而喘實者可下之宜四

順飲瘡赤陷而耳尻反熱者為逆用百祥丸牛李膏各

三服不愈者死

百祥丸一名南陽丸治瘡疹黑陷寒戰咬牙身黃紫

腫

紅牙木戟不以多少陰乾藥水煮乾去骨日中曝乾復納牙黃汁盡焙乾為末
右水丸如黍米大每服一二十九研芝麻湯下吐利同
無時此方治身齒甚效

牛李膏用牛李子不以多少取沸石器內熬成膏牛李子
生野道邊至秋結實黑子成穗如無生者以乾者為末水
熬代用每服臍子大煎杏膠湯化下此藥須於九月中取
之

睦親宅一木王病瘡疹始用一李醫又召錢氏錢留與抱
龍丸三服李以藥下之其疹稠密錢氏見大驚曰若非轉
下則為逆病王曰李已用藥下之錢曰瘡疹始出未有他
症不可下也但當用平和藥頗與乳食不受風冷可也瘡
痴若起能食者大黃九瀉一二行即止今先下之瘡疹未

能出盡而稠密甚則難治此誤也縱得安其病有三一者
疥二者癩三者目赤李氏不能治經三日黑陷後復召錢
曰幸不發寒病未困也遂用百祥丸為主牛李膏為助各
二大服至五日間瘡復紅活七日而愈蓋黑者歸腎水也
腎旺勝脾土不剋水故脾虛寒戰則難治所用百祥丸者
以瀉膀胱之腑腑若不實臟自不盛也何以不瀉腎由腎
主虛不受瀉如二服不效即加寒而死矣

子和治瘡疹黑陷鐵脚歲靈仙為末炒一錢腦子一分用
溫水調服取下瘡痴為效
活無比散治小兒瘡疹惡候

硃砂先研一兩 牛黃 麝香 獐腦
膩粉細研各一錢

右同研細如有患者小兒一字太人五分入水銀少許

用小猪尾上血三兩點新水同調服寧穩得睡者然後取轉下如爛魚腸蒲萄穗之類涎臭惡物便安小兒用乳汁調妙海藏云此瀉內熱之極不能開發於外則宜此內雖過泄外亦開發自透肌膚之藥與云

雲小兒癩疹黑陷方

乾胭脂三錢 胡桃一箇燒存性

右為細末煎胡荽酒調下藥一錢立效

右治死血黑陷凡前方用川山甲及麝香等藥治黑陷皆為氣滯者設也

雜方

雲治癩疹黑陷用臘月兔鼻腦子一箇或二箇以好酒調服若乾者以好酒浸少時化開依上條服立效兔鼻百無葉散治割腐用葉葉下味燒灰為末麝香酒下

診

然且瘡黑屬腎脾氣本強或嘗服補脾藥脾氣得實腎雖用事脾可制之令瘡入腹為膿血及連痂皮得出是脾強腎退即病出而安也瀉米穀及瀉乳不化者是脾虛不能致腎故自泄也此必難治海藏云瀉出痂皮根在內也表水穀不化皆逆

痘寒戰

世憎寒困倦或發寒戰能令痘子縮伏宜用陳文中鼻功散方見黑

虛寒

錢寒戰咬牙黑陷者百祥丸下之方見黑嘗治痘瘡寒戰

虛熱

用白朮葛根加灸治之愈

熱

丹胡宅痘瘡發熱此血少有餘毒也

陳皮

白朮

歸身

白芍藥各三

牛蒡子

研破炒

木通

犀角

生甘節

川芎各一

分六貼水薑半煎食前稍熱服

治連翹散治一切熱兼治瘡疹如神

連翹

防風

梔子

甘草各等

右為末水煎服海藏云治熱在外而

易老云涼膈去大黃芒硝者能解六經中熱此不惟解熱

治小兒癰疹熱候亦使發之則本藥與防風荆芥十物各

半白水煎服

河梔子金花丸

黃芩

黃連

黃柏

山梔炒各

右末滴水丸如葶子大每服五丸白湯下

錢三黃丸治諸熱

黃芩兩半

大黃煨

黃連各二錢半

右為細末糊丸葶草大每服五七丸至十五二十丸食

後米飲送下

右錢氏云有小熱者解毒海藏謂解毒者三黃丸金花

丸之類是也

四聖散

方見出

海藏此葶草木通湯方見

道赤散方見

煩渴腹滿喘便

八正散

方見

丹有初起煩躁譫語狂渴引飲若飲水則後來瀝不齊急

以涼藥解其標如益元散之類可用

右五方利小便退熱之劑錢氏云有大熱者利小便又

云身熱煩渴腹滿而喘木小便澀面赤悶亂大吐此當

利小便蓋此用導赤散之類是也

利小便
後熱不
退者下
之

錢宣風散

檳榔兩

陳皮

甘草各半

牽牛四兩生

右為細末三三歲蜜湯調下五分已上丁錢食前易老
加防風

雲通膈九利上下氣血藥也

大黃

牽牛

木通各等

右為細末滴水先如粟粒大每服三五十九丸量兒大小
虛實加減

右錢氏云有太熱利小便不瘥者宜宣風下之

瘡癰得
水而活

子和蔡河有舟師偶見敗蒲一束沿流而下漸泊舟次似
聞啼聲而微開視之驚見一兒四五歲許瘡疱周匝密不
容隙兩目皎然飢而索食因以粥食之其妻怒曰自家兒
女後惹瘡疱傳染奈何私料蔡河流緩必不遠持兒下鞋

逆流而上徧問皆曰無此兒行二十里又至一村落舟師
呼於市曰有兒年狀如許瘡疱死棄河中本復活忽酒即
中有入出曰我其村某人也兒四五歲死於瘡疱舟師出
其鞋其人泣曰是吾兒也奔往視驚見兒活流涕拜謝舟
師抱兒歸今二十餘矣此兒本死得水而生第未驗其瘡
疱之疾寒耶熱耶

痘寒熱

虛

大和散治瘡痘後寒熱往來嗜臥頰腮躁亂

生地

當歸

地骨皮

人參

甘草

白芍藥各等分

右咬咀每服一錢水半盞煎至三分去渣溫服

痘渴

虛

丹陳十妹年九歲出痘而有孕七箇半月太渴不甚出透

寒熱交作血虛氣虛

人參

白朮

黃芪

陳皮

甘草多

歸身各一

薑三片酒水各半盞煎服

海瘡疹太腸閉澁或發渴四君子加瓜蒌根桔梗主之

若身熱小渴者六味人參麥門冬散治之如不愈或身熱

太渴者七味人參白朮散治之又不可愈十一味木香散

六味人參麥門冬散

麥門冬

去心入參

甘草多

陳皮

白朮

厚朴薑製各半兩

右段咀每服三錢水一盞煎至六分去渣溫服虛人減

厚朴

七味人參白朮散

方見消渴門○已上四

丹初起煩躁渴引飲者急以涼藥解其標

澁為熱

錢發熱煩渴腹滿而喘大小便澁而赤悶亂大吐此當利

小便不澁者宜風散下之

面白腹

陳十一味木香散集驗方本治瘡疽身熱作渴方見後

瘡

文中云腹脹渴者瀉渴者足指冷渴者驚悸渴者身溫渴

者身熱面眇白色渴者寒戰渴不止者氣急咬牙渴者飲

水轉水瀉不已者已上九證即非熱也乃津液少脾胃肌

肉虛故也宜木香散治之如不愈更加丁香官桂加審用

牙渴亦多屬熱者不可不察

虛

丹陳牙兒十九歲出痘有紅癍吐瀉而渴

蒼朮錢

白朮三錢

黃芪半錢

陳皮二錢

茯苓

甘草炙

硝砂

當歸各一錢半

薑三片同煎服

身熱脈洪數為熱

從子六七歲時患瘡痘發熱微渴自利一小方脈視之用木香散每貼又增丁香十粒予切疑焉觀其出遲因問自利而氣弱察其所下皆臭滯陳積因腸胃熱蒸而下也恐非真寒而虛遂急止之已投一貼矣繼以黃連解毒湯加白朮與十貼以解丁香之熱利止瘡亦出其後肌常有微熱而手足生瘡癩與涼劑調補踰月而安一男子十餘歲出痘熱時出根脚密嘔吐不食腰背骨節痛太渴喉痛腹亦痛全不食者半月餘脈浮弦洪而數與參芪歸朮灸甘草陳皮半茯苓煎服之至五日色淡又加桂些少婦莖再用酒製至七日瘡甚加丁香三粒附子些少瘡止至今日九日渴大作而腹泄瀉瘡甚至十日寒戰遂用白朮為君其陳參炙甘草歸為臣至十日不屬或瘡或謔語但守前藥半月後自吐出疹多而安

逆冷脈虛遲為寒

陳十一味木香散治疹痘腹脹渴其效如神必須密察或身熱四肢俱冷者可用此方出集驗

木香

大腹皮

人參

官桂

赤茯苓

青皮

前胡

訶子皮

半夏

丁香

甘草灸各三兩

右咬咀每服二錢水一盞薑三片煎空心溫服

表裏俱虛

異功散集驗左瘡痘頭溫足冷腹脹瀉渴出見瘡不快張藥之云吐瀉渴少食為裏虛異功散減官桂主之此症瀉渴不可與蜜水痘出之間不光澤不起發根窠不紅或瀉渴或腹脹或氣促是為表裏俱虛與異功散送下七味肉苳蔻丸治之異功散方見痘出不快

痘瀉不渴

虛寒

海瘡疹不渴臟寒下利四君子加乾薑減半主之

痘疹大便不固痘漸黑陷小兒乳母同服

人參 白茯苓 肉苳菴 黃芪各半

甘草錢二

右吹咀每服一錢水半盞薑五片棗二枚煎五分乳母倍服若太瀉手足厥冷加附子用驗

陳苳菴丸治痘疹泄瀉

木香 砂仁 白龍骨 訶子肉

肉苳菴麩裹煨各半兩 赤石脂 白礬粘各七錢半

右為末糊丸如黍米大一歲二十九三歲百丸溫米飲下瀉止勿服

痘吐逆

寒熱世痘瘡吐逆無痰益黃散有痰二陳湯或橘皮半夏湯不止者加丁香若吐而瀉者亦宜益黃散及陳氏木香散異

功散 吐而身熱煩渴腹滿喘大小便澀面赤者當利小便

便不澀者宜風散下之全文見

痘腹脹

熱丹 勉奴痘後渴肚急小便少發熱

芍藥分五 川芎分三 白朮分五 陳皮分五

乾葛分三 甘草錢半 木通分三 水煎服

胃子五歲痘後肚急

白朮錢一 陳皮 木通各五分 犀角

川芎 白芷各七分 甘草分三 水煎服

虛寒 陳文中木香散治痘瘡腹脹渴瀉方見痘

實熱 腹滿而喘大小便澀身熱面赤悶亂木吐者當利小便不

澀者宜風散下之全文見

痘腹痛

痘腹痛多是痘毒當臨證消息

寒 丹 吳店子出痘瘡腹痛

丁香二枚 官桂 芍藥各一錢 白朮

當歸各五分

熱

右作丁貼服，常治痘始出腹痛或身痛服洪數首解表涼藥加芍藥甘草漸安

痘喘

世瘡痘出後喘急痰盛宜杏甘湯人參清膈散

表熱 杏甘湯治瘡痘煩喘渴躁

麻黃 桑白皮 杏仁 甘草

右等分為麩末，每服三錢水一盞煎食後服

海瘡疹肺不利紫葺甘草枳殼湯

虛熱 陳人參清膈散

人參 桑白皮 柴胡 當歸

芍藥 知母 茯苓各半 白朮

黃芪 紫苑 地骨皮 滑石各半

甘草 桔梗各一兩 黃芩兩 石膏兩

右吹咀，每服三錢水煎溫服

實熱 痰貫壯熱胸中壅悶臥則喘急前胡枳殼湯主之

前胡 枳殼 赤茯苓 甘草各五錢

大黃量兒加減

右吹咀，每服三錢水一盞煎六分旋服

喘而腹滿大小便澀者利小便不澀者宜風散下之錢氏法

痘出之間或氣促堵水香散主之

痘大便秘

虛 海治瘡疹已出未出大便秘澀或時發渴四君子加瓜蒌

實 根桔梗治之
當歸丸

當歸^兩 甘草^分 黃連 大黃^{各二錢半}

先將當歸熬膏子入藥末三味為丸加服之以利為度
海惠變百祥丸治癰疹大便秘結

紅牙大戟^{去骨} 青州惠^{去核}

右用水二盞同煎至水盡為度去大戟將惠焙乾可和
作劑旋丸從少至多以利為度

治 洗心散治痘瘡壯熱木小便不利狂言多渴

大黃 甘草 當歸 麻黃^{去節}
白米 芍藥 荆芥^{各等分}

雜方 脫 右吹咀量病輕重多少薑薄苛煎溫服則平熱服則在
四五日不大便者可用肥嫩猪脂一塊白水浸熱切如

豆大與兒食之令臟腑滋潤瘡毒易落自無得滯

診治 痘餘毒

海瘰瘡餘毒或肝虛入眼且或肺虛為癰疥或為癰癩發
在骨節腎之虛也發在肌肉脾之虛也或在筋或在頭或
在面或牙齒疳蝕或咽喉腫痛各隨經而見皆毒不散蘊
積而成或病人始不早治或醫者失治遺於經絡其所由
來蓋有自矣宜服解毒等劑

世痘毒攻脾則泄瀉身浮攻肝則眼生翳膜攻心則煩躁
啼哭攻腎則耳疼膿聚攻肺則咳嗽痰涎

丹治小兒痘瘡餘毒未散食穀太早補往毒氣

鼠粘子^{六錢} 甘草^{五分} 犀角^錢 荆芥
防風^{各一錢} 白朮^{三錢} 枳殼^錢 水煎溫服
痘入目

丹溪法

如痘傷眼必用山梔赤芍决明歸鬚連翹防風桔梗升麻小劑末之調服如眼無光過百日後血氣完復則自明矣

張炳治瘡疹後毒氣攻眼或生翳膜赤黑之類宜用四物湯加荆芥防風煎服兼用黑豆皮殼精草海蛤甘草等分爲末用熟猪肝切片蘸服神妙方治痘毒目翳用江西蛤粉黑豆皮甘草蜜蒙花等分爲末調服

痘後生翳數服效用葳靈仙仙靈脾等分洗淨不見火與日爲細末每服隨時宜第三次米泔下

錢氏法

錢氏黃柏膏痘初出塗面護眼方見痘大方法調肝散治瘡疹

大盛服之不入眼痘方見羊肝散即下蜜蒙散方見消人條

蟬蛻散治瘡疹入眼半年已裏者一月取效

猪羊蹄甲二兩入罐子內搥泥固封燒存性蟬殼去土取末一兩

錢氏法

右二味研入羚羊角細末二分拌勻每服一字百日外兒一二十分三歲三四分漿水或新水調下日三四夜一二食後一年已上者不治

治瘡疹入眼

馬尾勃兩皂莢子十四粒蛇皮兩半

右入小罐子內鹽泥封固燒存性研細溫酒調下三錢食後

治瘡疹入眼或翳

括嬰根兩半蛇皮錢

右爲細末用羊肝一箇批開入藥末二錢麻線纏定米泔煮熟頓與食之兒未能食肝乳母多食之

又方用蟬蛻末以水漬羊肝湯調服一二錢

海藏法

地黃散治小兒心肝壅熱目赤腫痛生赤翳或白膜遮

睛四邊散漫者尤易治若暴遮黑睛者多致失明宜速用此方亦治瘡疹入眼

熟地 當歸各一 黃連 大黃煨各一錢
生地去心 木通各一錢半 防風 羌活
生犀末 蠟蛻去土 木賊 穀精草
白蒺藜 沙苑蒺藜已上各一錢 甘草半錢
玄參五分

右為細末每服一字或五分量見大小加減煎羊肝湯食後調下日三夜一忌口將息大人亦治

東垣法

治痘瘡風熱毒翳膜暈遮睛以瀉青丸治之大效初覺易治

淨法

用竹葉湯和沙糖水化下瀉青丸十九漸至微利神效
瘡入眼用决明撥雲密蒙花通聖蛤粉散之類

此書海藏云莫若病時隨經而取不使毒氣轉入眼中為尤妙然眼有五輪亦當求責此言為失治者說也
决明散治瘡痘疹入眼海藏云此少陽太陰之劑

决明子 瓜蒌仁各半兩 赤芍藥 甘草炙各五分
右為細末入麝香少許令勻每服一錢生米泔調下臨臥服

撥雲散治瘡痘入眼及生翳用桑螵蛸真者一兩炙令焦
細研搗為末入麝香少許每服一錢米泔調下
密蒙花散治小兒痘瘡入眼及無辜痘氣入眼

密蒙花兩 青箱子 决明子 車前子各一兩
右末拌勻用羊肝一大片薄批糝上濕布裏煨熟量多
少空心服之錢氏海藏云即羊肝散

通聖散治疹痘瘡入眼及生翳

白菊花如無甘菊代之然不如白菊好 菴豆 穀精草去根

右為細末每服一大錢柿乾一箇米泔水一盞同煎候
米泔盡只將柿乾去核食之不拘時且三枚日近者五
七日遠者半月取效

蛤粉散治小兒瘡子入眼

穀精草 蛤粉各等分

右為細末每錢七猪肝一兩許批開搗藥捲了用竹
箸裹麻線縛定水一碗煮令熟入收口菴蕪薰眼候溫
取食之日作不過十日退

針灸明瘰癧入眼 大行

痘咽痛

表熱

活如聖餅子治小兒瘰癧毒攻咽喉腫痛海藏云隨經此方即是隨經

牛蒡子炒

甘草各一兩

麥門冬去心

桔梗兩

右為末加竹葉同煎細細服之海藏云咸閉多竹葉甘

桔梗子湯治咽喉不利

鼠粘子湯

消毒飲

方並見前痘出不快條

雲小兒癩出欲透皮膚身熱咽喉不利甘草桔梗升麻湯

甘草兩

桔梗兩

升麻兩

右剉細每服一大錢水煎服

血熱

甘露飲子治心熱咽喉痛口舌生瘡并瘡疹已發未發
並可服之治熱上攻牙根腫痛動搖

生地

熟地

天門冬去心

麥門冬去心

枇杷葉去毛

枳殼炒

黃芩去心

石斛去苗

甘草炒

山茵陳

右各等分為麤末每服二錢水一大盞煎食後溫服牙齒
腫痛則含嗽并服海藏云甘露飲為血劑

田地黄丸治小兒痘疹口瘡喉腫痛牙疳鼻爛

天門冬

麥門冬

玄參各三兩

甘草

薄苛各一
右為細末，生熟地黃汁和，九櫻桃火，每服一丸，溫蜜水化服。

痘風

虛實
痘風分氣血虛實，以日子守之多，帶氣血不足，虛則黃芪生血之劑助之，畧佐以風藥，實則白芍黃芩為君，連翹白芷續斷之類為佐，若屬寒，陳氏方可用。

楊氏：汝年十餘歲，痘發不透，屬落後，骨節痛，食少，夜間或熱，此餘毒在內，虛甚，難於疎導，須在補中有通，此方主之。
男子七歲，痘瘡初出，不透，毒氣攻內，骨節作痛，兩足不可

- 當歸 犀角各一錢 陳皮一錢
- 通草 甘草根各三分 牛膝五分 蘇梗三分

痘痕次紅，活脈浮而和小便赤少

- 犀角屑 白朮各一錢 陳皮
- 人參 茯苓各五分 木通
- 右分二貼煎服

痘癩瘡

風火
瘡疹瘡由風火相勝也。惟瘡疹能作瘡疹為脾所生，脾虛而肝旺乘之，木來勝土，熱氣相擊動於心神，心喜為熱，神氣不安，因瘡成癩，癩子為心所生，心生熱，熱則生風，風屬於肝，二臟相搏，風火相爭，故發瘡也。治之當瀉心肝，補其母，括萎湯主之。

海藏云：諸痛瘡皆屬於心，心火無論虛實，火相合，故用括萎湯。若脾土實，火旺逆乘，而成癩者，此實邪也，便結者，瀉青丸便軟者，瀉青湯亦當以脈別之。

括萎湯方見驚風
潔凡未出而發瘡者，是外感風寒之邪，內發心熱之所作。

也當用茶粉下解毒九犀角地黃湯主之

世治瘡痘欲出身熱煩躁忽發驚搐宜驅風膏小如聖飲

丹欲發瘡疹先身熱驚跳搐搦此非驚風宜發散藥

世麻痘風搐方
人參 羌活 防風 殭蚕醋炒
南星薑製 白附薑製 甘草炙

右等分生薑三片水煎服其搐立止

錢癩疹病後欲發癩餘瘡難發癩以木勝脾木歸心故也

若涼驚用涼驚丸溫驚用粉紅丸即溫驚丸

活血治痘瘡痛用溫驚丸水化下方見前驚搐條

帶氣海治瘡出煩痛五物木香散

青木香兩 丁香 零凌香各一兩 麝香分

白礬兩

每服四錢水一小盞煎服之熱盛者加犀角一兩如無犀角以升麻代之輕者一服大效

雜方

又方以芒硝和猪膽塗瘡上令動而落無痕仍用黃土抹之良此病小便澁有血者中裏瘡背裏磨不出膿者死不瘳

世痘將結腐乾硬而痛宜塗酥潤之腐可揭去則去之如無酥用猪油煎代之此痛非服藥可免也

痘膿而不痂痂居牙切瘡腐曰痂

海癩疹膿而不焦此本治失清涼之氣有如五穀得陽氣而成熟非涼風至則不能實也天地嚴肅之氣一加則萬物秀而實矣與癩疹何異須察何經而清涼之或下而成

雜方

嚴肅之氣則瘡氣必不至於膿而不痂矣要當知之餘毒不盡而疾作蓋出於此實是清涼飲非陽和則苗不秀非嚴肅則秀不實劉涓子訣云痘發如膿窠不肯腐者但調沙糖水與喫劉提點云亦曾試用但後來結痂痕白

錢五七日痂不焦是內發熱蒸於外故不得焦痂也宜宣風散導之用生犀磨汁解之必著痂矣陳痘已腐未愈之間忽被風邪搏之成疔瘡宜雜黃散線蜜散治之又不愈多潰骨傷筋殺人雄黃散治小兒牙齦生疳蝕瘡

雄黃錢一

銅碌錢二

右二味同研極細每用量瘡大小乾貼

綿黃散治小兒因痘瘡身體及肢節上生疳蝕瘡藥水不絕用出蠟綿黃以生白礬搥碎入蠟內令滿炭火燒令白

粉汁盡取出研極細每用乾貼瘡口上

凡痘瘡方纔著痂即用菜油不住潤之可揭則揭若不潤及遲揭瘡痂硬即隱成癩痕矣

陳痘痂雖落其癩猶黯或凹凸肉起當用滅癩藥塗之

韶粉兩

輕粉字一

右研細以煉過猪脂油拌和如膏塗癩上

痘後瘡癩

熱毒

世連翹散治小兒瘡疹癩痘疹餘毒作楚或生於頭面耳

疹頰赤生瘡

連翹

黃芩

瞿麥

木通

滑石

柴胡

荆芥

牛蒡子

防風

羌活

赤芍藥

甘草各等分

每服三錢水一盞煎半盞又入生薄荷尤好

實熱毒

痘瘡

丹痘瘡多是實毒血熱成瘡分上下用藥一曰不可緩成膿必用清熱涼血為主赤芍藥甘草節連翹桔梗之類上引用升麻葛根下引用檳榔牛膝更助以貝母忍冬草白芷瓜蒞太便燥用太黃寒熱用芩柏此法累效保木香散治小兒痘後生瘡如神

地骨皮兩

木瓜兩

川山甲 灸黃三錢半

麝香一字

右為末米飲下二三錢

丹痘瘡傳藥用貝母南星殭蚕天花粉寒水石白芷草烏太黃猪牙皂角醋調傳患處效

中惡

錫小兒神守則強邪不干正若真氣衰弱則鬼毒惡氣中

之其狀卒然心腹刺痛悶亂欲死是也凡中惡腹大而滿診其脈緊細而微者生脈大而浮者死即服蘇合香丸則醒以皂角末搐鼻次服沉香降氣湯加入參茯苓又能辟邪客忤亦宜服

降真香

白膠香

沉香

虎脛骨 酥炙

人參

鬼箭草

草龍膽 各五錢

石為末次入雄黃五錢麝香一錢煉蜜丸乳香湯化又令兒帶及燒臥內尤妙

廣治中惡客忤唾化麝香一錢重研和醋二合服之即瘥

海龍腦膏治小兒發熱在心胃卒不知久方見痘黑龍腦

湯凡中暑悶倒急扶在陰涼處切忌與冷若得冷即死當

用補藥用熱湯熨臍腹間煖即瘥如無湯即搗熟土量於

臍上仍撥小窩子尿於中可代湯熨之良久嚼大薑一塊

中暑

以水嚥下續用解暑藥

針灸
甲小兒口中腥臭腸膈氣滿勞官主之

客忤

湯客忤者小兒神氣軟弱忽有非常之物或未識見人觸之或經歷神廟佛寺與鬼神氣相忤也故謂之客忤亦名中客其狀吐下青黃白色水穀將下時腹痛反倒面變五色其狀若癇但目不上插耳其脈數者是也亦宜服蘇合香丸并真珠散

真珠散治客忤驚風鬼疰驚邪痰熱心舍不寧精神不定心常怔忡睡中驚跳時或咬牙五心煩熱有汗兼喘面赤舌白呵欠煩渴小便赤瀉或吐利黃沫常服辟邪安神

真珠

海螵蛸

滑石

白茯苓

人參

白附子

甘草

全蝎

麝香

銀二片

腦子

另研各五錢

生珠

另研一錢

金銀箔

金片三

右末和勻半錢煎燈心麥門冬湯入蜜少許調服日午臨臥各一服

回客忤因而驚忤者治法用竈中黃土研二兩鷄子丁枚去殼二枚相和入少許水調先以桃柳枝湯浴兒後將此藥塗五心及頂門上陳無擇法用此中黃土蟬翅屎等分如此法塗之外治卒客忤噤口不能言細辛桂心等分納口中效

