

改正醫學正傳

六



京板校正大字醫學正傳卷之六目錄

○便濁門五十六

論

脉法

冊溪方法 九十九條

治便濁丸藥方

二陳加升提藥方

埤珠粉丸

半苾丸

虛癆便濁方

張子元氣血兩虛

燥濕痰白濁方

妙香散

秘真丸

萆薢分清散

治濁固本丸

九龍冊

水陸二仙冊

定志珠粉丸

冊溪活套

祖傳經驗秘真冊

已試醫驗一條

○淋閉門五十七附閱格

論 脉法

冊溪方法 九九條

參苓琥珀湯

琥珀散

傷寒後脫陽方

老人氣虛淋閉方

小便黃澁方

下焦無血小便澁方

通關丸即補腎丸

清肺飲子

導氣除燥湯

腎疽湯

小薊湯

八正散

醫學正傳



牛膝膏

葵子散

鐵脚丸

集驗治小便淋瀝方

治小便溺血方

孕婦轉胞方

附冊溪閣格方法

已試醫驗一條

秘結門五十八

脾約丸

潤腸丸

活血潤燥丸

脩急大黃丸

茯苓湯

濟生葵子散

廣濟雞蘇飲子

石膏散

又治溺血方

又治血淋方

祖傳經驗方

論

脉法

通幽湯

麻黃白朮湯

潤腸湯

枳殼丸

枳實導滯丸

倒換散

琥珀散

又方治小便不通

祖傳經驗方

治沙淋莖痛方

閣格難經法語

論

脉法

丹溪方法

潤燥湯

升陽馬熱湯

潤體丸

已試醫驗二條

○黃疸門五十九

治黃疸方

大溫中丸

大黃栢桅芒硝湯

治酒疸方

胃苓湯

茵陳茯苓湯

茵陳蒿湯

茯苓滲濕湯

葶藶苦參散

針砂丸

祖傳經驗褪金丸

○瘡瘍門六十

論

脉法

丹溪方法

又治氣實黃疸方

調胃承氣湯

又治疸法証

茯苓湯

腎疸湯

梔子大黃湯

茵陳大黃湯

小茵陳湯

當歸白朮湯

綠礬丸

已試醫驗一條

脉法

丹溪方法

小溫中丸

治黃疸法語

硝石礬石散

治穀疸方

茵陳五苓散

半溫半熱湯

梔子栢皮湯

茵陳四逆湯

抵當湯

棗礬丸

取刺骨法

升陽益胃散 治背疽

當歸羌活湯 治腦疽

栳榔散 飲瘡口

千金托裏散 治背疽

丹溪治背疽方

丹溪治附骨疽法

羌活防已湯 治附骨疽

托裏黃芪酒煎湯

黃連消毒飲 治骨疽附

黃芪柴胡湯 治附骨疽

丹溪治腎癰方法

內托羌活湯 治骨疽

丹溪治內疽方法

丹溪治肺癰方法

又治肺癰方法

黃昏湯 治肺癰

葶藶大棗瀉肺湯

蕭葉湯 治肺癰

桔梗湯 治肺癰

又治肺癰方

又治肺癰方法一條。吐膿血如肺癰方。祖傳經驗治肺癰方

丹溪治腸癰方法 千金論腸癰法語 要畧治陽癰方

腸癰灸法 意以附子敗醬散。大黃牡丹湯。已試醫驗一條

丹溪治乳梗方法

治乳癰方 又治乳癰方法

升麻托裏湯

程石香治妳岩法 十六味流氣飲

單黃青皮湯

橘葉散 丁香散 治妳頭破裂

丹溪治囊癰方法

癰疽入囊方

野紫蘇心囊癰方

丹溪治便毒方法

又治便毒方

又便毒成膿方

石香程氏便毒方法

蘇方木散 治便毒

王燭散 治便毒

牡蠣大黃湯 治便毒

丹溪治瘰癧方法

又治瘰癧方法

治血少馬刀瘡方

程石香論治瘰方法

蟾酥膏 治瘰

綠雲膏 治瘰

金寶膏 治瘰

龍珠膏 治瘰

救苦化堅湯

柴胡連翹湯

消腫湯

柴胡通經湯

散腫潰堅湯

升陽調經湯

連翹散堅湯

龍泉散

三聖丸

立驗大聖散

王胥妙靈散

六丁神散 治二十一

濟生破結散 治瘰

南星散 治瘰

又治瘰方法

龍珠膏 見前條

流氣飲 見前條

丹溪治癭氣方法

丹溪治結核方法

又治臂核方

耳後頂門有核方法

程石香論疔腫方法

返寬冊

按行法

奪命丹 雄黃丸

化毒丸

獨蟾丸

雄射湯 二活散

取疔散

解毒丸

賀藍先生解毒丸

萬病解毒丸

千金漏蘆湯

取疔腫方

破毒散

灸疔腫法

祖傳經驗秘方

活寬冊 治惡瘡 又方

治諸惡瘡方

又治諸惡瘡方

又治惡瘡方

天泡瘡方九二條

脚上沙瘡方

裏外腫瘡方九四條

桃花散生肌長肉

火燒湯泡瘡方

又治火燒湯泡瘡方

下疳瘡方九二條

頭瘡方

金絲瘡方

手癩瘡方

沙瘡方

瘡痛不可忍方

疥瘡方

白癩風癩方

風癩疔瘡方

癩瘡方

身虛痒方

又通身虚痒方

秘傳一擦光方

又治疥瘡及癩頭方

五香連翹湯

內托復煎散

白芷升麻湯

托裏散

又托裏散

烏金散

黃芪六一湯

治一切瘡癩方

內托護心散

小五香湯

復元通氣散

金銀白芷散

正鐵籬散

大鉄籬散

三消散

雲母膏

太乙膏

神異膏

祖傳萬槌青雲膏

又經驗治癰腫方

豨莶散

又治緒般癰腫神効方

癩風門六十一

論

脉法

冊溪方法九五條

換肌散

醉仙散

通天再造散

愈風丹

一家治癩疾法

又一家治癩疾法

又治手指攣曲法

加減通聖散

神仙紫花丸

治跌撲傷損方

治骨損方

元戎接骨丹

論損傷宜補氣血

治金瘡方

又治金瘡方

治損傷腹痛方

當歸導滯湯

雞鳴散

沒藥乳香散

杖丹膏藥方

河間沒藥散

○破傷風門六十二

論 脉法

丹溪方法一條

羌活防風湯

白朮防風湯

小芎黃湯

大芎黃湯

發表雄黃散

大蜈蚣散

大羌活湯

防風湯治破傷風

小蜈蚣散

左龍丸

小羌活湯

養血當歸地黃湯

雄黃散治表藥

地榆防風散

白朮湯

江鰮丸

祖傳經驗秘方

已試醫驗一條

附翻花瘡

新刊京板校正大字醫學正傳卷之六

花溪恒德老人虞 搏天民編集

姪孫虞守愚惟明校正

金陵三山街書肆松亭吳江繡梓

便濁遺精 五十六

論內經曰諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱夫便濁之証因脾胃之濕熱下流滲入膀胱故使便溲或白或赤而渾濁不清也原病式曰如夏月天氣熱甚則水液渾濁林木流津是也血虛而熱甚者則為赤濁此心與小腸主病屬火故也氣虛而熱微者則為白濁肺與大腸主病屬金故也丹溪曰大察多是濕痰流注宜燥中宮之濕又曰治宜燥濕降火兼升舉之法此皆至要之語也外有遺精滑泄之候與濁相類不可一例而推夫遺精者多夢與鬼交而泄名曰夢遺或隨溲溺而

出謂之精滑亦有思想無窮所願不遂而得之者治宜安心神以降火又有因好色太過房勞致虛而得之者治宜滋水藏以復真陰是皆千古不易之定論也學者詳之

脈法

兩尺脈洪數必便濁失精

女尺脈濇而弱者或洪數而促者皆為便濁白帶

心脈短小因心虛所致必遺精便濁

方法丹溪方法九條

丹溪曰便濁屬濕熱有痰有虛赤屬血由小腸屬火故也

白屬氣由大腸屬金故也

○大率皆是濕痰流注宜燥中宮之濕赤者乃是濕傷血

○胃中濁氣下流滲入膀胱

○肥白人多痰

○治宜燥濕降火兼升提之大法二陳湯加二朮升柴赤者加

白芍藥煎服

○一人便濁嘗有半年或時夢遺形瘦作心虛主治以珍珠粉

丸和定志丸服效見怔忡門

○夢遺主熱精滑主濕熱則流通故也

○內傷氣血虛不能固守當補以八物湯加減吞檉木根丸

○大法用清代海右黃栢

○精滑用知母黃栢降火牡礪蛤粉燥濕白濁因法治

○一方用良姜三錢芍藥黃栢炒焦各二錢檉根白皮一两伍

名為末糊丸每服二十九

○思想而得病在心治當安心神以薑補丁法用溫膽湯去竹

茹加人參遠志蓮肉酸棗仁茯神煎服

○一方治便濁丸藥

檉白皮

黃栢炒

青黛

乾姜炒

滑石

煨粉炒

神麴糊為丸服之

戴氏曰黃栢治濕熱青黛解熱蛤粉鹹寒入腎滑石利竅炒干姜味苦飲肺氣下降使陰血生且能益制

○二陳湯治濁加升提之藥使大便潤而小便長

○珍珠粉丸治精滑白濁等証

黃栢

真蛤粉各一斤 珍珠各三兩 一方無此味而有

右為朱水和丸如梧桐子大每服一百丸空心溫酒下或加檉根白皮滑石青代等藥

○半苓丸治白濁

神麴

半夏燥溫

猪苓分水

麴糊丸服

○虛勞者用補陰藥胃弱者兼用人參及升麻柴胡升胃中之清氣

清氣

○張子元氣血兩虛有痰濁陰火痛風

秘傳元氣血兩虛便濁有痰痛風時作陰火間起小便白濁或帶下赤白

人參一兩

白朮半兩

熟地黃

黃栢炒黑色二兩

山藥

海石

瑣陽各半兩

乾姜性半兩燒存

南星煨裂兩

龜板酥炙二兩

右為細末酒麴糊為丸如梧桐子大每服一百丸姜鹽湯下

○燥濕痰治白濁方如肝脉弦者須以青黛瀉肝大槩不可純

涼藥盧氏曰病因溫熱藥誤矣然亦不可輕用寒涼藥故用炒栢之類又以干姜之溫而佐之也

○妙香散治心虛遺精白濁

射香另研

人參五分

木香二錢

茯苓

茯神

黃芪

遠志去心炒

桔梗

甘草各二錢

辰砂另研

山藥二兩

姜

右為細末每服二錢溫酒調服不拘時

○秘真丸治思想無窮所願不遂意淫于外入房太甚宗筋

弛縱發為筋痿及為白淫及白物隨溲而下或夢與陰人通泄耳

白龍骨另研訶子皮五枚者縮砂仁半兩去壳硃砂一分另研以右為細末麩糊為丸如菴葶大每服一丸空心溫酒下冷水亦可不可多服大秘或用葱白茶湯下

楊氏家傳 ○草薺分清飲治真元不足下焦虛寒小便白濁頻數無度凝面如油光彩不定凝脚澄下凝結如膏糊之狀

石菖蒲 烏藥 益智仁 川草薺 白茯苓各一錢甘草稍半錢

東垣 ○治濁固本丸 右細切作一服水一盞半入鹽一錢煎至一盞空心服

蓮花鬚 黃連炒各二兩 白茯苓 砂仁 益智 半夏 黃柏炒各一兩 甘草炙三兩

猪苓二錢 為末蒸餅為丸空心溫酒下五十九

冊 ○九龍丹治精滑

枸杞子 金櫻子 山果子又名蓮肉 佛座鬚蓮花心也 熟地黄 芡實 白茯苓 川歸各分

右為末酒麩糊為丸如梧桐子大每服五十九或酒或鹽湯送下如精滑便濁者服二三日溺清如冰飲食倍常行步輕健婦人厭產者二三服便往孕

錄 ○水陸二仙丹治遺精白濁夢泄脫精等証

金櫻子一斗 芡實二斤 右以芡實去壳杵為細末取金櫻子黃熟者用器盛於水中杵去刺又於石臼中杵碎去核淨再杵細絞取自然汁煎熬成飴糖和芡實末為丸如梧桐子大每服五

七十九空心姜鹽湯送下

○定志珍珠粉丸治心虛夢泄

人參

白茯苓

遠志

石菖蒲

海蛤粉

黃柏炒焦色 樗根皮各三兩

青黛二兩

右為細末麩糊為丸青黛為衣如梧桐子大每服五十丸空心姜鹽湯下

○丹溪活套云赤白濁乃胃中痰積下流滲入膀胱宜用二陳湯加升麻柴胡防風之類以提之肥白人屬濕熱加蒼朮白朮炒黃柏黃荊子之類或有挾寒者本方加炒乾姜肉桂甚者加附子○有心虛不能固守及平素虛寒之人本方加萆薢石菖蒲益智炒乾姜牡蠣龍骨之類○氣虛者本方加黃芪白朮人參或加附子之類○赤者多者血虛瘦弱之人得之宜四物湯加酒知母酒炒黃柏煎湯送下

珍珠粉丸○赤白濁小腹疼痛不可忍者宜作寒治東垣酒煮當歸丸最妙方見婦人門

○祖傳經驗秘真丹治好色腎虛遺精夢泄白淫白濁等証

兔絲子

韭子

栢子仁各一兩

龍骨

牡蠣

山茱萸

去核取肉

赤石脂各半兩

補骨脂一兩

遠志

巴戟

覆盆子

拘杞子

黃柏鹽酒炒黑色

山藥各七錢

芡實

杜仲

姜汁炒

金櫻子

半青黃者去皮核取肉焙乾

鹿角膠

一兩半炒成珠

乾姜炒黑色

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸空心姜鹽湯下

○蓮塘末顯二里病遺精潮熱不起床三月矣召予治脉之左右寸關皆浮虛無力兩尺洪大而軟與補中益氣湯加熟

地黄知母黃柏地骨皮煎吞下環珠粉丸外做小箋籠一箇以籠陰處勿使搭肉服藥三十餘貼一月平安

林開明

附關格五十七

論

內經曰飲食入胃游溢精氣上輸於脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱夫膀胱者主足太陽寒水之化其體有下口而無上口者也長生在申是故西方肺金以為之母而資其化也肺金清肅則水道通調而滲營於下耳然肺金又藉脾土健旺以資化源而清氣得以上升而歸於肺以運行也故經又曰清陽出上竅濁陰出下竅故清陽不升則濁陰不降而成淋閉之患矣先哲以滴水之器譬之上竅閉則下竅不出此理甚明故東垣使灸百會穴丹溪使吐以提其氣之橫格是皆開上竅之法也原其為病之由皆膏粱之味濕熱

之物或燒酒炙肉之類鬱遏成痰以致脾土受寒之力不能運化精微清濁相混故使肺金無動而水道不清漸成淋閉之候或謂用心太過勞傷無節以致心腎不交水火無制清陽不升濁陰不降而成天地不交之否皆先哲之法言也古方有五淋之別氣砂血膏勞是也若夫氣淋為病小便澀滯常有餘瀝不盡砂淋為病陰莖中有砂石而痛溺不得卒出砂出痛止膏淋為病溺濁如膏勞淋為病遇房勞即發痛引氣衝血淋為病遇熱則發甚則溺血候其鼻準色黃者知其為小便難也東垣分在氣在血而治之以渴與不渴而辨之取如渴而小便不利者熱在上焦氣分肺金主之宜用淡滲之藥茯苓澤瀉琥珀燈心通草車前子葵麥菡蓄之類以清肺金之氣瀉其火以滋水之上源也不渴而小便不利者熱在下焦血分腎與膀胱主之宜用氣味俱陰之藥知母黃柏

之類滋腎丸是也除其熱泄其閉塞以滋膀胱腎水之下元也治淋之法無越於此學者不可不知

脉法

脉經曰少陰脉數婦人則陰中生瘡男子則為氣淋脉細而數○脉盛大而實者生虛細而澁者死

方法

丹溪方法九九條

○丹溪曰淋雖有五皆屬於熱宜解熱利小便山梔子之類不可發汗汗之必便血

○老人氣虛淋閉參朮中帶木通梔子之屬

○有腎虛極而淋者當補腎精而利小便不可獨用利水藥

○有死血作淋者用牛膝膏用之云牛膝膏能損胃不食宜斟酌

○一方治淋用益元散加梔子仁木通或用梔子一合炒為末白湯調下夏月以苗香煎湯調益元散服効

○痰熱膈滯中焦淋澁不通二陳湯煎大碗頓服探吐之以提其氣

○淋澁有血因火燥下焦無血氣不得降而滲泄之令不行也宜補陰降火以四物湯加知母黃柏或用四物湯煎下滋腎丸

○陰莖痛乃厥陰氣滯兼熱用甘草稍蓋欲緩其氣耳

○小便因熱鬱成淋不通用赤茯苓黃芩澤瀉車前子麥門冬肉桂滑石木通甘草稍氣虛者加黃芪木香淋痛加黃柏生地黃夏月煎調益元散

○參苓琥珀湯治小便淋澁莖中痛相引脇下痛不可忍

- 人參
- 茯苓各五
- 川練子核去
- 生甘草稍
- 玄胡索各七
- 琥珀
- 柴胡
- 川歸尾
- 澤瀉各三

右細切作一服水一盞半加澄心十數蒸煎至一盞服

琥珀

沒藥

海金砂

蒲黃各一兩

右為細末每服三錢空心前管草湯調下

○傷寒後脫腸小便不通用生薑自然汁調茴香末敷貼小

腹上又服益智茴香丸調益元散送下

○老人氣虛而小便不通四物湯加黃芪人參吞滋腎丸下

焦血氣乾者死

○小便黃用黃柏如澁數加澤瀉若濕熱流注下焦而小便黃

赤澁數用梔子澤瀉切當濕多者宜用滑右利之

○下焦無血小便澁數而黃者用四物湯加黃柏知母牛膝母

草稍

○通關丸即滋腎丸治不渴而小便閉澀在下焦血分

黃柏酒洗

知母酒洗

肉桂五分

右為細末熟水如梧桐子大每服一百丸空心白湯下

服後須頻兩足令藥易下行也如小便已利莖中如刀

刺痛當有惡物下為驗

○清肺飲子治渴而小便閉澀不利邪熱在上焦氣分

燈心一分

通草二分

澤瀉

瞿麥

琥珀各半

菖蓄

木通各七

車前子炒另研

茯苓去皮

猪苓去皮各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞空心稍熱服

○導氣除燥湯治小便閉塞不通乃血澁致氣不運而竅澁也

茯苓去皮

滑石各一錢

知母浸炒

澤瀉各一錢

黃柏二錢

酒炒

右細切作一服水二盞煎至一盞空心稍熱服

東垣

東垣○腎疸湯治腎疸目黃甚至渾身黃小便赤

羌活

防風

藁本

獨活

柴胡各五分

升麻一錢已上治目黃

白茯苓二分

澤瀉三分

猪苓四分白朮五分

蒼朮一錢已上治小便赤澀

黃柏三分

人參三分

神麩六分

甘草五分

右細切作一服水二盞煎至一盞食前稍熱服

東垣○小蘗湯治下焦熱結血淋

生地黄

小蘗根

通草

滑石

梔子仁

蒲黃炒

淡竹葉

當歸稍

生藕節

甘草稍各五分

右細切作一服水煎六分服

扁鵲○八正散治大小便俱閉

大黃

瞿麥

木通

滑石

萹蓄

車前子

梔子仁

甘草各等分

右細切每服五錢重入燈心七莖水煎服

○牛膝膏用川牛膝一合細切以新汲水五大盞煎耗其四入

射香少許空心服或單以酒煮亦可

東垣○茯苓湯治胃疸陽明積熱食已輒飢面色黃瘦胃滿脇脹

小便閉澀

赤茯苓

陳皮去白

澤瀉

桑白皮各三分

赤芍藥

白朮

人參

官桂各二分

石膏八分

病甚者加大黃朴硝各一錢

右細切作一服加生姜五片水一盞半煎至一盞溫服

河間○倒換散治無問久新癃閉大小便不通小腹急痛肝門腫

痛

大黃通減半

荆芥穗大便不通減半各等

右各別研為細末每服二錢溫水調下臨時加減服

○葵子散治小便不通

黃蜀葵子 研細 赤茯苓 各二錢

右作一服水一盞煎二三沸食前服

○濟生葵子散治膀胱實熱小便不通

方見疝氣門

○琥珀散治五淋

木通 當歸 木香 蔚金 蒲蓄 錢一 琥珀

右作一服為末用蘆葦葉同煎水一盞半煎數沸食前溫服

○鐵服丸治大小便不通神效

大皂角 燒存性

右一味不拘多少煉蜜為丸如梧桐子大每服七十九白

湯下

外 ○廣濟鷄蘇飲子治小便不通

鷄蘇 二兩

生地黄

通草 各四兩

滑石

杏仁 各二兩

冬葵子 五兩

石葦 各去毛

右七味細切以水六升煎至二升半去粗分三服空心進

一服如人行四五里又進一服必通

外 ○又方治小便不通

冬葵子

滑石 各三兩

通草

赤茯苓 各一兩

茅根 二兩

芒硝 半兩

右細切以水六升煎至二升去粗納芒硝分作三服連進

即通

外 ○集驗方治小便淋瀝不通

滑石 半斤

石葦 三兩

通草 四兩

榆莢

冬葵子各半斤一方加黃芩三兩

右細切以水一斗煎取三升分作三服頓飲

石葦散治小便不利莖中作痛

石葦去毛二兩 瞿麥一兩 滑石五兩 車前子三兩

冬葵子二兩

右為細末每服方寸七日三服

祖傳經驗秘方治小便淋閉莖中作痛神效

石葦去毛 滑石 瞿麥 篇蓄

冬葵子 木通 王不留行 地膚草各等分

右為細末每服三錢白湯調下

又經驗治小便弱血立効

金陵草一名旱蓮草 車前草 俗名蝦蟆衣

右二物各等分杵自然汁每服半茶盞空腹服

又方治前証用壯年無病人頭髮不拘多少燒灰存性以側

栢葉搗汁入糯米糊為丸如梧桐子大每服一百丸白湯

下或四物湯下尤妙

又方治沙淋乃莖中有砂作痛

石首魚腦骨五對火煨出火毒 滑石研兩

右共研為細末分作二服煎木通湯調下未愈再服數劑

必待砂出盡乃安

又方治孕婦轉胞小便不通及男子小便不通皆効

冬葵子兩半 山梔子兩半 木通三錢 滑石兩半

右作一服水一盞半煎八分溫服外以冬葵子滑石梔子

為末田螺肉搗膏或生葱汁調膏貼臍中立通

又方治血淋

側栢葉 藕節 車前草各等分

右三味同搗取真汁調益元散神効

△附關格証

難經曰關則不得小便格則吐逆○脉兩寸俱盛曰關格

其証嘔逆而小便不通者是也
按素問謂人迎大四倍於氣口名曰格氣口大四倍於人迎名曰關乃二証也蓋有格而不關者亦有關而不格者又或有人迎氣口俱盛而吐逆不便者故丹溪總而言之曰關格者是也

○丹溪曰寒在上而熱在下故多死法當吐以提其氣之橫格不必在虫痰也用二陳湯探而吐之吐中便有降

○有氣虛不運者補氣藥中升降用補中益氣湯加枳榔使清氣升而濁氣降也

○治關格証吐逆而小便不利急宜先灸氣海天樞等穴各三七壯其吐必止然後以益元散等藥以利小便

○祖傳經驗秘方治關格吐逆小便不通用霍香平胃散合五

苓散加姜棗煎服立効

予長老脩德翁年七十秋間患小便不通二十餘日百方不効後得一方取地膚草搗自然汁服之遂通雖至微之物而有廻生起死之功故錄於此以為濟利之助云地膚草俗云白地芩是也

論

秘旨門

五十八

內經曰北方黑色入通於腎開竅於二陰藏精於腎夫腎主五液故腎實則津液足而大便滋潤腎虛則津液竭而大便燥結原其所由皆房勞過度飲食失節或恣飲酒漿過食辛熱飲食之火起於脾胃滿慾之火起於命門以致火盛水虧津液不生故傳道失常漸成結燥之証是故有風燥有熱燥有陽結有陰結有氣滯結又有年高血少津液枯涸或因有所脫血津液暴竭種種不同固難一例而推焉經云腎惡燥急食辛以潤之以苦泄之陽結者散之陰結者溫之太法治燥者潤之以大黃當歸桃仁麻子仁郁李仁之類風燥者加以防風羌活秦芫皂莢之屬丸以煉蜜取其潤燥以助傳道之勢故結散而踈通矣仍多服補血生津之劑助其真陰固

其根本庶無再結之患切勿以巴豆牽牛等峻劑攻下雖暫得通快必致再結愈甚反釀成病根膠固卒難調治或有血虛脉大如葱管發熱而大便結燥者慎不可發汗汗之則重亡津液閉結而死此豎殺之耳活人書有脾約証謂胃強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱故小便數而大便難制脾約丸以下脾之結燥使腸潤結化津流入胃而愈丹溪曰然既曰脾約必陰血枯槁內火燔灼熱傷元氣故肺受火邪而津竭必竊母氣以自救夫金耗則土受木傷脾失轉輸肺失傳化宜其大便閉而難小便數而無藏蓄也理宜滋養陰血使陽火不熾金行清化脾土健旺津液入胃大小腸潤而通矣今以此丸用之於熱甚而氣實與西北人稟賦壯實者無有不妄若用之於東南方人與熱雖盛而氣血不實者雖得暫通將見脾愈弱而腸愈燥矣須知在西北以開結為主在

東南以潤燥為要學者其可不知此乎

脈法

脈多沉伏而結 陽結脈沉實而數 陰結脈伏而遲或結
老人虛人便結脈雀啄者不治

方法 丹溪方法 九二條

丹溪曰有虛有風有濕有火有津液不足者有寒者有氣結者切不可例用芒硝大黃及巴豆牽牛等利藥

○久病腹中有實熱大便不通宜用潤腸丸微利之不宜用峻利之劑

○脾約丸麻仁一兩半用生絹袋盛百沸湯連袋泡浸湯冷

次日曝乾藥中與水而差一指許勿著水一寒之粒粒皆完 枳實麩炒 厚朴姜制

芍藥各三 大黃四兩 杏仁去皮尖炒另

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九溫水下

東垣

○通幽湯治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥閉氣不得下治在幽門以辛潤之

炙甘草 紅花各一 生地黄 熟地黄各半

升麻 桃仁泥 當歸身各錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗調枳榔細末半錢食前稍熱服

東垣 ○潤燥湯

升麻二分 生地黄二分 熟地黄

大黃酒濕煨 生甘草 桃仁泥 當歸稍

紅花五分 麻仁各一錢

右除桃仁麻仁另研細外餘細切作一服水一盞半入桃仁麻仁煎至一盞去粗空心稍熱服

東垣 ○潤腸丸治脾胃中伏火大便閉澀或乾燥閉塞不通全不

魚食及風結血閉皆能治之

桃仁湯泡去皮畧炒麻仁去壳各一兩當歸稍

大黃酒濕煨

羌活各半

右除桃仁麻仁另研如泥外其餘杵為極細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五十九空心白湯下○如風濕而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利之○如脉澁覺身有氣澁而大便結者加郁李仁大黃以除氣澁燥

垣東

○麻黃白木湯治大便不通五日一次小便黃赤渾身腫面不能舉動喘促不安

青皮去穢酒黃連各二黃芪
桂枝 白木 厚朴剉 柴胡
蒼朮 猪苓各四 酒黃栢 陳皮去白

升麻各三

白芷各三

吳茱萸

白茯苓

澤瀉各五

白芷各三

炒神曲各六

麻黃一錢不去節

杏仁四個

右細切分作二服每服水二盞先煎麻黃令沸掠去沫入諸藥同煎至一盞去粗稍熱服

垣東

○升陽瀉熱湯治膈噎不通逆氣裏急大便不行

青皮 槐子各二 生地黄 熟地黄
黃栢各三 當歸身 甘草稍各四 蒼朮五分
升麻分七 黃芪一錢 桃仁十箇去皮尖另研

垣東

○活血潤燥丸治大便風秘血秘常燥結

右細切作一服入桃仁泥水二盞煎至一盞食前熱服
當歸稍五錢 防風三錢 大黃酒煨 羌活各一兩
皂角仁燒存性一兩 桃仁二兩去皮另研 麻仁二兩半去壳另研

醫本正傳

右除桃仁麻仁另研外共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九白湯下三兩服後須以麻子仁煮粥每日早晚食之大便須日久再不結燥也此丸藥以磁磬盛之紙包封毋令見風

垣東 ○潤腸湯治大便結燥不通

生地黄

生甘草

大黃

熟地黄

當歸稍各五分

升麻

桃仁

麻子仁各一

紅花三分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗空心服

垣東 ○潤體丸能潤血燥治大便不通

麻仁

當歸稍

生地黄

桃仁

枳壳各等分

右為細末煉蜜為丸服

垣東

○備急大黃丸治胃中停滯寒涼之物大便不通腹痛方見內傷門

問河

○枳壳丸治三焦約大小便不通穀氣不得下行

枳壳兩

陳皮兩

枳殼兩

木香二錢半

黑丑四兩一分半生用一分炒熟

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸姜湯下

垣東

○枳實導滯丸治傷熱物大便不行氣滯胃腹作痛方見內傷門

○本邑趙德秀才之母年五十餘身材瘦小得大便燥結

不通飲食少進小腹作痛召予診治六脉皆沉伏而結澁予作血虛治用四物湯加桃仁麻仁煨大黃等藥數服不通反加滿悶與東垣枳實導滯丸及備急大黃丸等藥下咽片時即吐出蓋胃氣虛而不能安留性速之藥耳遂以備急大黃丸外以黃蠟包之又以細針穿一竅令服三丸蓋以蠟置者制其不犯胃

氣故得由幽門達大小腸取效也明日下燥屎一升許繼以四物湯加減作湯使吞潤腸丸如此調里月餘得大便如常飲食進而平安

予族姪有一通判之子因出痘大便閉結不通見醫云便實為佳兆自病至痘瘡愈後不如廁者九二十五日肛門連大腸不勝其痛叫號聲達四隣外醫及予二三人議藥調治用皂角末及蜜煎導法服以大小承氣湯及枳實導滯丸備急丸皆不效計無所出予曰此痘瘡餘毒鬱熱結滯於大小腸之間而然以香油一大盞令飲自朝至暮亦不效予盡一計令待婢口含香油以小竹筒一箇套入肛門以油吹入肛內過半時許病者自云其油入腸內如蚯蚓漸漸上行再過片時許下黑糞一二升止困睡而安

論

黃疸五十九

內經曰中央黃色入通於脾又曰諸濕腫滿皆屬脾土夫黃疸為病肌肉必虛腫而色黃蓋濕熱鬱積于脾胃之中久而不散故其土色形于面與肌膚也蓋脾主肌肉肺主皮毛母能令子虛母病子亦病矣是故有諸中者必形諸外取其証有五曰黃汗曰黃疸曰酒疸曰穀疸曰女勞疸雖有五者之分終無寒熱之異丹溪曰不必分五同是濕熱如禽麪相似正經所謂知其要者一言而終是也外有傷寒熱病陽明內實當下而不得下當汗而不得汗當分利而不得分利故使濕熱沸鬱內甚皆能令人發黃病也先哲制茵陳五苓散茵陳湯茯苓滲濕湯之類無不應手獲效故曰治濕不利小便非其治也又曰濕在上宜發汗濕在下宜利小便或二法並

用使上下分消其濕則病無有不安者也學者詳之

脉法

脉經曰凡黃候寸口脉近掌無脉口鼻黑色並不可治

脉沉渴欲飲水小便不利者必發黃也

酒疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐鼻燥其脉浮者先吐之

沉弦者先下之

酒疸下之久久為黑疸目青面黑心頭如噉蒜薑之狀大便

正黑皮膚四肢不仁其脉浮弱顏黑微黃故知難治

穀疸寸口脉微而弱微則惡寒弱則發熱當發不發骨節疼

痛當煩不煩而極汗出跌陽脉緩而遲胃氣反強飽則煩

滿上則發熱客熱消穀食已則飢穀強肌瘦名曰穀疸

陽明病脉遲者食難用飽上則發寒熱頭眩者必小便難此

欲作穀疸雖下之腹滿如故

跌陽脉緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食則滿也

尺脉浮為傷腎跌陽脉緊為傷脾風寒相傳食已則眩穀氣

不消胃中若濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱

身體盡黃名曰穀疸

方法 丹溪方法九五條

丹溪曰不必分五同是濕熱如奮麴相似輕者小濕中丸重

者大濕中丸熱多加黃連濕多者茵陳五苓散加食積藥

戴氏曰食積者量其虛實下之其餘但利小便清

利則黃自退或曰黃疸宜用倒倉法又曰黃疸倦怠

○一方治黃疸

黃芩

黃連

梔子

茵陳

豬苓

澤瀉

蒼朮

青皮

草龍胆各五分 穀疸加三稜莪朮縮砂陳皮神麴

右細切作一服水煎服之

○又方治氣實傷濕渾身發黃宜吐法

撫芎

梔子

桔梗各二錢

右細切作一服加姜煎入葶汁服探吐之

○小濕中丸治黃疸與食積又可制肝燥脾脾虛者須以白木

作湯使

針砂

十兩醋炒七次令通紅另研

苦參夏加冬減

山查各二兩

茱萸加一兩 蒼朮半斤

白朮五兩

川芎夏減

神麴各半斤 香附米一斤童便浸一宿

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服七八十九食前

鹽湯下○一方無白朮山查苦參茱萸有梔子

○大濕中丸

針砂十兩如陳皮

蒼朮

青皮

厚朴制

三稜醋煮

義木醋

黃連

苦參

白朮各五兩

生甘草二兩

香附浸一宿 白朮一方又無

右為細末醋糊為丸一方無黃連苦參白朮

○調胃承氣湯方見傷寒門

叔和曰腹滿舌痿煩燥不得睡屬黃家又曰病黃疸發熱

煩喘胸滿口燥者以發病時火劫其汗兩熱相傳然黃家

所得從濕故一身盡發熱而黃如壯熱者熱在裏也當下

之安用調胃承氣湯

○又曰黃疸之病當以十八日為期治之十日以上為差又劇

者為難治○又曰病疸而渴者其病難治疸而不渴者其

病易治發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而發熱

也師曰諸黃家病但宜利小便假令脉浮當以汗解之宜

桂枝加荳湯又名黃荳建中湯方見傷寒門

和叔

○又曰男子黃小便利自當與小建中湯○又曰黃疸腹滿小便不利而利自汗出此為表和裏實當下之用大黃黃栢

和叔 ○大黃黃栢梔子芒硝湯

黃栢

芒硝

大黃各四

梔子三枚

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

和叔

○又曰黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱必噦者宜服小半夏湯方見傷寒門

和叔 ○又曰夫病酒發黃疸必小便不利其候心中熱足下熱是其証也又心中懊懣而熱不能食時欲唾名曰酒疸又曰

酒疸心中熱欲嘔者吐之即愈又曰酒疸黃色心中實熱

而煩脈絳者吐

和叔 ○又曰額上黑微汗出手足心熱薄暮則發膀胱急小便自

利名曰女勞疸腹如水狀不治

和叔 ○又曰黃家日晡所當發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱

急小腹滿一身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如

水狀大便必黑時溏此女勞之病非水也腹滿者難治硝

石礬石散主之

和叔 ○硝石礬石散

右以二石各等分燒煨為末每服貳錢以大麥粥汁和服

日三服取汗愈若小腸滿急小便不利用滑石石膏各二

錢入粳米一撮同煎服之

和叔

○治酒疸用小柴胡湯加茵陳豈鼓大黃黃連葛根煎服効

問 ○茯苓湯治胃疸消穀善飢面色痿黃心中煩熱胃脇脹滿

小便赤澁方見淋秘門

和叔 ○一方治穀疸以柴胡穀芽枳實厚朴梔子大黃等分水煎

服効

局○胃苓湯治脾胃不和黃腫如小便赤澀加滑石五苓散合平胃散是也

升麻

羌活

防風

藁本

獨活

柴胡各半錢

蒼朮一錢

猪苓四分

葛根五分

澤瀉三分

黃芩二分

甘草二分

神麩炒三分

黃柏二分

白朮五分

人參三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

人活○茵陳五苓散治傷寒或伏暑發黃小便不利煩渴等証

本方倍加茵陳入姜棗煎服之

人活○茵陳茯苓湯治發黃脉沉細數四肢冷小便澀煩躁而渴

茯苓

桂枝

猪苓各一錢

滑石一錢半

茵陳二錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞服如脉未出加當歸一錢半

人活○梔子大黃湯治酒疸心中懊懣或熱而痛

梔子十四枚

大黃一兩

枳實五枚

豈豉一升

右作一服用水五升煎至二升分三服

人活○半溫半熱湯治酒疸身黃無熱靖言了了腹滿欲嘔心煩

足熱或有癥瘕心中懊懣其脉沉弦緊細

半夏

茯苓

白朮各七

前胡

枳殼黃色炒

甘草炙

大戟各五分

黃芩

茵陳當歸各三分

右細切作一服入生姜三片水二盞煎至一盞溫服

人活○茵陳蒿湯治身熱鼻乾汗出陽氣上奔小便赤澀不利濕熱發黃

茵陳蒿^{一兩} 大梔子^{三枚} 大黃^{三錢半}
右細切作一服水三盞煎至盞半温服

茵陳蒿 梔子 柴胡 黃栢
黃芩 升麻 大黃^{各七} 草龍胆^{三分半}

人活 ○梔子栢皮湯治身熱不丟大便利而煩熱身黃

梔子 黃栢 黃連^{各三錢半}

人活 ○茯苓滲湿湯治黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲冷水身目俱黃

右細切作一服水一盞半煎至一盞温服

人活 ○茵陳四逆湯治發黃脉沉細而遲肢體逆冷腰以上自汗

甘草^{兩一} 乾姜^{兩半} 附子^{八枚炮} 茵陳^{二兩}

人活 ○葶藶苦參散治湿熱内甚小便赤澁大便時秘飲食少進

苦參 黃連 瓜蒂 黃栢

大黃^{各一} 葶藶子^{二兩}
右為細末每服一錢七清米飲調下以吐利為度隨時

看虛實消息加減

人活 ○當歸白朮湯治酒疸發黃心下有痞癖堅滿身體沉重妨

害飲食小便赤黃此因内虛飲食生冷脾胃痰結所致

白朮 茯苓^{各一} 當歸 黃芩

茵陳各三分 前胡 枳實 甘草炙

杏仁各六分 半夏八分 炮透

右細切，作一服，加生姜三片，水一盞，半煎，至一盞，溫服。

○抵當湯治傷寒熱鬱瘀血內結，身黃，脈沉細，狂言譫語，小便不利，大便黑。方見傷寒門

集驗

○針砂丸治穀疸酒疸濕熱發黃等証

針砂半斤 醋 蒼朮四兩 米 香附四兩 童便浸

茵陳炒 麥蘖各取二兩 炒 芍藥

生地黃 川芎 青皮去穰 炒 各

陳皮去白 莪朮醋煮 三稜醋煮 各

姜黃 升麻 乾漆炒 各半兩

右為細末，醋湖為丸，如梧桐子大，每服六七十丸，姜湯送下。

集驗

○綠礬丸治黃腫病最捷

五倍子半斤 炒 黑綠礬四兩 炒 白針砂四兩 醋 神麩半斤 炒

右為細末，生薑汁煮紅，束肉為丸，如梧桐子大，每服六七十丸，溫酒下，不能飲酒，米湯亦可，終身忌食蕎麥麩，犯之再發，難治。

鑑室

○束礬丸治食勞身目俱黃者

綠礬半斤 火煨通紅

右研細，紅束肉為丸，如梧桐子大，每服五十九丸，或酒或姜湯下。

○祖傳經驗退金丸治黃腫絕妙

蒼朮半斤 白朮各二兩 甘草炙 半

陳皮去白 針砂醋炒 香附童便浸 神麩炒 厚朴姜汁拌炒

麥蘖炒 有瑰加 三稜醋煮 莪朮醋煮 各一兩

右為細末麪糊為丸服忘魚腥濕麪生冷水菓等物
 ○一男子年三十餘得穀疸症求予治以胃苓湯去桂加茵陳
 數十貼黃退自以為安不服藥十數日後至晚目盲不見
 物予曰此名雀目蓋濕痰盛而肝火有餘也用獾猪肝煮
 熟和夜明砂作丸服之目遂明如故來謝予曰未也不早
 服制肝補脾消痰之劑必成蠱脹不信半月後腹漸脹
 痞滿復來治予仍以胃苓湯倍二朮加木通麥門冬煎湯
 下銀金丸一月平安

瘡瘍六十

論

內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又曰膏粱之變疰生大丁菜
 氣不從逆於肉理乃生癰腫東垣謂榮氣即胃氣也蓋胃氣
 調和則榮衛之氣皆順流而無逆於肉理耳若夫飲食失節
 肥甘過傷以致濕熱蘊積于腸胃之間燒爍府藏煎熬真陰
 此經之所謂陰之五宮傷在五味味焉發熱久而增氣故溫
 熱之氣聚於下焦陰火熾盛蓄於八脉八脉沸騰逆於經絡
 氣凝血滯故其滋養精微之氣不能如常榮於肉理是以結
 聚而成癰腫矣經曰熱勝則肉腐是也法當視其所發之地
 各從其經而處治焉夫發於身之表者其名一十有七曰腦
 發督脉曰背發中属督脉曰髮發手少阴曰眉發手少阴
 少經手少阴曰頤發手少阴曰頤發手少阴曰鬚發手少阴曰腋

發陽經曰穿當發督衝任曰腿發表足三陽曰肝癱足厥曰
喉癱任脈陽曰臍癱任脈曰乳癱內四明足厥少陽曰腎癱
陽經曰驕馬癱手經太曰囊癱足厥發於腔子之內者其名有
四如疽曰肺癱手經太曰腸癱手經太曰胃脘癱足經夫十
二經有氣血多少之不同癱疽淺深之有異是故為治之法
或疎散或消毒或針烙或內托或外消或瀉利或補益是故
腫瘍為實宜瀉利潰瘍為虛宜補益浮露而淺者為癰宜外
消藏伏而深者為疽宜內托此千古不易之定議也雖然其
証有善而易治者為順惡而難治者為逆其為眼白睛黑目
緊小者一逆也不能飲食納藥而嘔食不知味二逆也傷痛
渴甚三逆也膊項轉動不便四肢沉重四逆也聲嘶色脫唇
鼻青黑面目四肢浮腫五逆也煩燥時咳腹痛甚泄利無度
小便如淋六逆也膿血大洩愀腫尤甚膿水臭敗莫近七逆

也喘麤氣短恍惚嗜臥八逆也未潰先黑陷下青唇黑便汚
九逆也又如噫氣痞塞喘咳身冷自汗目眩耳聾恍惚驚悸
語言錯亂皆是惡証若夫動息自寧飲食知味一順也便利
調勻二順也神彩精明語聲清明三順也膿潰腫消色鮮不
臭四順也體氣和平五順也九五順見三則吉九逆見六則
危矣先哲垂訓班班可攷學者其可不詳察乎

脈法

肺經曰脈數身無熱內有癰也二云腹無積聚身無熱脈數
此為腸中有膿意以附子敗醬湯主之
諸浮數脈應當發熱而反洒淅惡寒若有痛處當發癰膿脈
微而遲反發熱弱而數反振寒當發癰腫
脈浮而數身體無熱形嘿嘿胃中微燥不知痛之所在此人
當發癰腫

脉滑而数数則為熱滑則為實滑則主榮數則主衛榮衛相逢則結為癰熱之所過則為膿也

羽林婦病醫者脉之知婦人腸中有膿為下之即愈蓋寸口脉滑而数滑則為實數則為熱滑則為榮數則為衛衛數下降榮滑上升榮衛相干血為濁敗小腹痞堅小便或澁或時汗出或復惡寒膿為已成設脉遲緊聚為瘀血下之則愈

腸癰之為病其身體甲錯腹皮急按之軟如腫狀夫腸癰者小腹腫按之則痛小便數如淋時時發熱自汗出復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當有血脉洪數者膿已成不可下也大黃牡丹湯主之

方法丹溪方九
丹溪曰癰疽因陰陽相滯而生蓋氣陽也血陰也血行脉內

氣行脉外相並周流寒與濕搏之則凝滯而行遲為不及熱與火搏之則沸騰而行速為太過氣得和而鬱津液稠粘為痰為飲積久滲入脉中血為之濁此陰滯於陽也血得和而鬱緣道阻隔或溢或結積久滲出脉外氣為之亂此陽滯於陰也百病皆由於此又不止於癰疽而已

○癰疽因積毒在藏府當先助胃壯氣使根本堅固而以行經活血藥為佐參以經絡時令使毒氣外發施治之早可以內消此內托之意也

東垣○或問內托之法予曰河間治腫愀于外根盤不深形証在表其脉多浮病在皮肉非氣盛則必侵于內急須內托宜復前散除濕散鬱使胃氣和平如或未已再前半料飲之如大便閉及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱已退却與復前散如此使榮衛俱行邪氣不能內傷也

閉異本行

溪丹 ○外科精要謂排膿內補十宣散治未成者速散已成者速潰誠哉是言也若用之於小瘡癰與冬月亦可轉重就輕移深居淺若潰瘍與夏月用之其桂朴之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難為倚仗此見世人用此不分輕重時令經絡前後正若盲人騎瞎馬半夜臨深池危哉

溪丹 ○諸經惟少陽厥陰二經生癰疽宜預防之以其多氣少血也血少而肌肉難長瘡久未谷必成死証苟不知此遽用驅逐利藥以伐其陰分之血禍不旋踵

溪丹 ○腫瘍內外皆壅宜以托裏表散為主如欲用大黃者宜戒猛浪之非

溪丹 ○潰瘍內外皆虛宜以補接為主如欲用香散者宜戒虛虛之失

○外科精要一書惟務紀錄舊方應酬輕小証候耳

溪丹 ○癰疽始發即以受多灸之可使輕淺騎竹馬灸法最妙蓋艾火暢達拔引鬱毒此從治之意惟頭為諸陽所聚艾炷宜小而少若身上必痛灸至不痛不痛灸至痛亦有因艾而死者蓋虛甚孤陰將絕其脉必浮數而大且不鼓精神必短而昏無以抵當火氣宜其危也○按河間灸刺法曰九瘡瘍須分經絡部分血氣多少腧穴遠近從背出者當從太陽經五穴選用至陰通谷束骨崑崙委中是也從鬢出者當從小陽經五穴選用竅陰夾谿臨泣陽輔陽陵泉是也從髀出者當從陽明經五穴選用厲兌內庭陷谷衝陽解谿是也從腦出者則以絕骨一穴治之各穴點法俱見銅人針灸經茲不再具

溪丹 ○蟻針之法可施於輕小証候吮出惡血若積毒在臧府者徒竭其血於外無益也

溪丹 ○蟻針之法可施於輕小証候吮出惡血若積毒在臧府者徒竭其血於外無益也

○外施貼藥亦發表之意精要謂貼冷藥有神效夫氣得熱則散得冷則斂何謂神效經曰發表不遠熱是也點冷藥惟輕小瘡毒

也可

○外科用針烙得膿後服神仙追毒丸此藥能下積取毒無取膿之功若血氣壯實則膿自出當以和氣活血藥佐參芪補劑服之

○腫瘍用手按之熱則有膿不熱則無膿

○膿出而反痛者此為虛也宜補之亦有穢氣所觸而作痛者宜和解之風冷所逼者宜溫養之

○疽發深不痛者胃氣大虛必死肉多而不知痛也

○腫瘍時嘔者當作毒氣上攻治之潰後當作陰虛補之若年老潰後發嘔不食又宜參芪白朮膏峻補隨証加佐使藥河間謂瘡瘍嘔者濕氣侵于胃也宜倍白朮

○癰疽發渴乃血氣兩虛用參芪以補氣當歸地黃以養血或忍冬九黃芪六一湯皆効

○加味十全大補湯治癰疽潰後補氣血進飲食實為切要凡膿血出多陰陽兩虛此藥有起死之功但不分經絡不載時令醫者觸類而長之可也或見腫平痛寬遂以為安慢不知首無補接調養之功愈後虛証復見因而轉為他病而危劇者多矣

○蒲公英化熱毒消惡腫散結核有奇功田間路側皆有之三四月開黃花似菊花味甘行義補遺云四時常化花罷飛絮節葉間折之有白汁出者是能解食毒散滯氣可入陽明太陰二經同忍冬藤煎以少酒佐而服之搗爛置之亦妙

○白蠟屬金稟收斂堅凝之氣外科之要藥也生肌止血定痛

接骨續筋補虛當與合歡皮同入長肉膏藥用之有神效
但未試其可服否若谷散皮常服之驗矣

○草麻子性善收能追膿取毒亦要藥也

○癰疽已破未破用皂角刺能鑽引至痛處

△取刺骨法

肥上皆取久疽久痔漏中朽骨刺骨用烏骨雞脛骨以信砒

實之塩泥固濟火煨通紅地上出火毒用骨研細飯丸如

粟米大以皮紙撚送入竅内外以拔毒膏藥封之其骨自

出

△惡瘡發背腦疽等証方法

垣東 ○升陽益胃散治一切惡瘡發背腦疽等証

羌活一分 獨活五分 防風五分 藁本一錢半

知母一錢 生地黃一錢 黃芩一錢 黃連半錢

黃栢五分 當歸三錢 防風稍五分 連翹一錢

人參五分 黃芪一錢半 生甘草一錢 陳皮五分

當歸稍五分 蘇木五分 炙甘草半錢 酒防已五分

澤瀉七分 桔梗一錢

右細切分作二服每服用水二大盞浸半日煎至一盞

滴酒數十點去粗臨卧温服忌飲水再作膿効遲初患

二三日者服之立消作膿者立潰隨病上下食前後服

一人患腦疽第八日腫硬如拳即日晚服此藥一劑次

日便平復腫勢消更不疼痛又服半劑七日全愈如常

明之言凡瘡皆陰中之陽陽中之陰二証而已我治此

瘡陽藥七分陰藥三分名曰升陽益胃散勝十宣也老

人宜之亦名復煎散或加乳香沒藥各一錢尤妙

○當歸羌活湯治腦疽証

黃芩 酒炒 黃連 酒炒 各黃栢 酒炒
 連翹 一錢 當歸身 二錢 防風 澤瀉 五分
 甘草炙 一錢 山梔子 一錢 獨活 七分 藁本 七分
 右細切作一服水二盞先浸一時許入酒一匙煎至八
 分去粗食後稍熱服日進二服三日盡六服俱將藥清
 汁調下後項栴柳散

栴柳散大斂瘡口

栴柳 木香 各三錢

右為細末用前藥調下或斂瘡口用之次無疼痛以蠟
 油調塗瘡口生肌斂肉甚速別無惡肉瘡口易合平復
 膏梁熱瘡所宜用也貧人寒地及寒濕外來之寒瘡禁
 不可多用

△背疽方法

○千金托裏散治背疽併諸惡瘡如二百以裏未耐灸及利大
 便者則可消矣

羌活 一錢半 防風 酒洗半 防風稍 五分 藁本 一錢半
 當歸身 三錢 當歸稍 半錢 連翹 三錢 黃芩 三錢 酒浸
 黃耆 一錢半 人參 一錢半 炙甘草 半錢 生甘草 半錢
 陳皮 半錢 蘇木 五味子 酒黃栢
 酒防已 各半 桔梗 梔子 生地黃 酒洗各
 酒大黃 三錢 酒黃連 一錢 木猪苓 一錢 麥門冬 二錢
 右細切分作二服每服用水三大盞浸半日前至一盞
 稍熱服後一服如前併粗煎服忌冷水此方如覺病
 即便忙服無不効者若瘡勢已發三四日或成膿則不
 消也崔經瀝二次發背疽皆得此方而愈

○丹溪治背疽方用大黃防風羌活甘草節生地黃當歸身貝

母白芷赤芍藥皂角刺黃芩作大劑煎服氣虛加入參黃芪瘡潰後亦宜加之

△附骨疽方法

○丹溪曰附骨疽者皆因以得厚味及勞役與酒後涉水得此陽滯於陰之証也又曰環跳穴痛不止防生附骨疽以蒼木為君佐以黃柏之苦行以青皮冬加桂枝夏加條芩體虛者加杜仲牛膝以生甘草為使作大料煎入姜汁食前飲之痛甚者先煎藥十數貼發不動少加麻黃一二貼又不動者恐疽將成急掘地坑以火煨坑通紅沃以小便令患赤體坐於坑中以蓆或綿衣圍抱下體使熱氣薰蒸腠理開氣血通暢而愈

○羌活防已湯治附骨疽初發太陽厥陰太陰分者

羌活

川芎

蒼朮

防已

木香

連翹

射干

甘草

白芍藥

木通

當歸尾

蘇木 各七分

東垣

○托裏黃芪湯治骨疽初發於足少陽也明分者

柴胡

連翹

肉桂

黍粘子

黃芪

當歸尾

黃柏

升麻

甘草

白芷

右細切作一服酒一盞水一盞半煎至一大盞空心服

美膳壓之

東垣

○內托黃芪酒煎湯治瘡生腿外側或因寒濕得附骨疽於足少陽經分微侵足陽明經堅破漫腫行步作痛或不能行

柴胡

連翹

肉桂

大力子

黃芪 各四錢 當歸尾 八錢 黃栢 五分 升麻 七分
甘草 炙五分 白芷 二錢

右細切水酒各一盞煎至一盞食前溫服

堦 ○黃連消毒飲治附骨疽

黃連 一錢 黃芩 黃栢 各半錢 生地黄 四分
知母 四分 羌活 一錢 獨活 四分 防風 四分
藁本 五分 當歸尾 四分 桔梗 五分 黃芪 二分
人參 二分 甘草 三分 連翹 四分 蘇木 二分
防已 五分 澤瀉 二分 陳皮 三分
右細切作一服水煎服 老人年七十因寒濕地氣得
附骨疽於左腿外側少陽膽經之分微侵足陽明經分
爛六七寸長 一尺堅硬漫腫不辨肉色皮澤但行步
作痛以指按至骨大痛與此藥一服即止次日堅軟腫

消而愈

堦 ○內托黃芪柴胡湯治附骨疽

生地黄 二分 黃栢 二分 肉桂 二分 羌活 五分
當歸 稍七分 土瓜根 酒洗 柴胡 稍錢 一連翹 一錢 三分
黃芪 二錢

右細切作一服酒一盞水二盞煎至一盞去粗空心熱
服賈德茂小男於大腿近膝股內出附骨疽不辨肉色
漫腫光澤木硬瘡勢甚又其左脚乃肝之髀上也更在
足厥陰肝經之分少侵足太陰脾經之分其脉左二部
細而弦按之洪緩微有力與此藥而安

△腎癱方法

○丹溪曰腎癱者腎居小腹之後在下此陰中之陰道遠位僻
雖白太陽多血然氣運不到血亦罕來中年後尤慮患此

絕有腫痛參之脉証但見虛弱便與滋補血氣可保終吉
若無積補之功其禍多在結茄之後或半年已來乃病多
致失乎慎之慎之

鍊○內托羌活湯治是太陽經中左右尺脉俱緊按之無方死
腎生癰堅硬腫痛大作

羌活

黃栢酒炒各

防風

當歸尾

各一

肉桂三分

連翹

蒼朮

陳皮各五分黃芪一錢半

石細切作一服水二盞酒一盞煎至一盞去粗稍執空

心服以衣覆蓋癰上使藥力行去衣

內疽方法

○丹溪曰內疽者皆因飲食之火挾七情之火相鬱而發飲食
者陰受之七情者藏府受之宜其發在腔子而頭向內非

午腸胃盲膜也宜以內托之藥托出于外以針開之而愈
先用四物湯加桔梗香附生薑煎服膿出後亦用四物湯
調理而安

△肺癰方法

○丹溪肺癰先須發表千金方曰病咳唾膿血其脉數實或口
中咳胃中隱隱痛脉反滑數者為肺癰其脉緊數為膿未
成緊去而但數者膿已成也

○要畧治肺癰先以小青龍湯一貼以解裏之風寒邪氣然後
以葶藶大棗瀉肺湯桔梗湯葶藶湯隨証用之以及農
治腫瘍之例也終以守宙獨行方各湯以補裏之陰氣此
治潰瘍之例也

驗錄
○黃昏湯治胞中甲錯隱痛知為肺癰
合歡木皮一掌大

右以水三盞煮取一盞半分二服

驗錄

○葶藶大棗瀉肺湯治肺癰或肺脹喘促不得卧

葶藶子兩炒黃研為細末煉蜜丸如彈大棗十枚

右以水三盞煎大棗至二盞去棗入葶力一九再煎至一盞攪勻服之

驗錄

○葶藶湯治欬有微熱煩燥骨心甲錯出千金方

葶藶 二升 薏苡仁 半斤 桃仁 五十箇 瓜瓣 半升

右以水一斗先煮葶藶至五升去粗入諸藥煮取二升分溫再服當吐痰如粥而愈

驗錄

○桔梗湯治肺癰心胞氣壅咳嗽膿血心神煩悶咽乾多渴兩脚腫滿小便赤黃大便多澀

桔梗 貝母 各一錢 當歸 瓜婁子 各八分 枳殼 炒五分 薏苡仁 八分 桑白皮 防已 各五分

甘草節 三分 黃芪 五分 杏仁去皮炒 百合 各三分

右細切作一服水一盞半加生姜五片煎至八分去粗

溫服不拘時若大便秘者加大黃小便澀者加木通

驗錄

○又方治前証

瓜婁子 當歸 桔梗 貝母

白芷 甘草 各一錢

右細切作一服水一盞煎食後服一方無貝母白芷有

葶藶子

○肺癰已破入風者不治或用太乙膏丸服以搜風湯吐之

○有吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者宜消風散入無病男

子髮灰清米飲調下可二服而愈

○祖傳經驗秘方治肺癰未成膿者立消已成膿者立清其效

如神用章漆樹葉一名接骨木又名繼骨樹又名野黃楊

田塋路側皆有之右一味細研畧入漚過以酒調服不飲酒入入生姜研服

△腸癰方法

○丹溪曰腸癰當作濕熱積治入風難治

○千金謂腸癰安治必殺久其病小腹重強按之則痛小便數淋時時汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫狀脉數者微有膿也巢云洪數已有膿脉若遲緊者未有膿甚者腹脹大轉側有水聲或逆臍生瘡或膿自臍出或大便膿血淋婦証具前脉法下

○腸癰治法要畧以薏苡附子敗醬散千金以大黃牡丹湯

○灸法屈兩肘正肘頭銳骨端灸一百壯下膿血而安

○薏苡附子敗醬散

薏苡仁一歲炮附子一分敗醬三分

賈金 溪丹

右為細末每服方寸匕水二盞前至一盞連粗頓服之小便當下膿血而愈

○大黃牡丹湯

大黃四分 牡丹皮一兩桃仁五十枚去皮尖另研

芒硝三分 瓜婁子半升

右細切用水六升煎取一升去粗入芒硝再煎一沸分三服頓服之有膿即下膿無膿即下益

○東陽呂俊文得潮熱微似瘧狀小腹右邊有一塊大如雞卵作痛右脚不能伸縮一醫作臍脉氣治十餘日不驗忍予診候其脉左寸乳而帶瀦右寸乳而洪實兩尺兩關俱洪數予曰此大小腸之間欲作癰耳幸膿未成儘可治療與五香連翹湯加減與之間以蜈蚣炙黃酒調服之三日內平安

△乳梗方法

○丹溪曰乳梗多因乳母不知調養所致蓋乳旁陽明所經乳頭厥陰所屬忿怒所逆鬱悶所逼厚味所釀以致厥陰之氣不行故竅閉而汗不通陽明之血沸騰故熱甚而化膿或成膿或因所乳之子膈有滯痰冷乳而睡口氣焮熱所成或成結核初便忍疼揉令核軟吮令汗透可散否則結成矣治法以青皮疎厥陰之滯石膏清陽明之熱生甘草節行汚濁之血瓜婁子消導腫毒或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸身或湯或散須以少酒佐之若加艾火二三炷於痛處灸之尤妙彼粗士便用針刀必成拙病

○乳癰用蒲公英同忍冬藤入少酒煎服即欲腫是其效也
○乳癰未潰以青皮瓜婁桃仁連翹川芎橘葉皂角刺甘草節隨証加減煎服已潰以人參黃芪川芎當歸白芍藥青皮

連翹瓜婁甘草節煎服

○東垣升麻托裏湯治婦人兩乳間出黑頭瘡瘡項陷下作黑眼子其脉弦洪按之細小

- 黃柏二分
- 肉桂三分
- 黍粘子五分
- 黃芪
- 炙甘草
- 當歸身各一錢
- 連翹
- 升麻
- 葛根各一錢半

右細切作一服水一盞酒半盞同煎至一盞食後熱服
△妳岩方法

○石香程氏曰妳岩始有核腫結如贅菴子大不痛不痒五七年方成瘡初便宜多服疎氣行血之藥瀆情思如意則可愈如成瘡之後則如岩穴之凹或如入口有唇赤汁膿水浸淫胸脇氣攻疼痛用五灰膏金寶膏去其蠹肉生新肉漸漸收斂此疾多生於憂鬱積念中年婦人未破者尚可

治成瘡者終不可治
漏○十六味流氣飲治妳若

人參

黃芪

川歸各一錢川芎

肉桂

厚朴

白芷

甘草各半錢

桔梗三分

防風

烏藥

檳榔

芍藥

枳殼

木香各半錢紫蘇一錢半

右細切作一服或加青皮一錢水二大盞煎至一盞服
單煮青皮湯治婦人百不如意久積憂鬱乳房內有核如

贅碁子

每服用青皮四錢細切以水一盞半煎至一盞日二服已
上二方間服至核消住藥

丹○橘葉散治証如前

青皮

石膏

甘草節各五分瓜婁子一錢

當歸頭五分

皂角刺一分半去尖畧炒

金銀花五分

沒藥

蒲公英各五分

右細切作一服加青橘葉一小握以酒一盞半煎至一
盞食後或卧時服

丹○丁香散治乳頭破裂或因小兒吹乳血乾自裂開多痛

丁香不拘多少

右一味為末乾付裂處如燥唾津調付

△囊癰方法

○丹溪曰囊癰者濕熱下注也有作膿者此濁氣順下將流又
滲道因陰道或虧水道不利而然膿盡自安勿藥可也惟
在善於調攝耳又有因腹腫漸流入囊腫甚而囊自裂開
罪九懸掛水出以輔炭末付之外以紫蘇葉包裹仰卧養
之

丹 ○癰疽入囊者曾治數人悉由濕熱入肝經處治而用補陰藥佐之雖膿潰皮脫畢丸懸掛者皆不死
○一方用野紫蘇葉面青背紅者是也焙乾為細末付之如燥以香油調付囊脫無皮者外以青荷葉包之其皮自生

丹溪便毒方法

○便毒是厥陰經濕熱因勞倦而發用射干三寸同生姜煎食前服得利二三行効射干開紫花者是紅花者勿用

丹 ○一方用破故紙黍粘子微炒黑牽牛炒大黃酒蒸焙乾各等分為末每服一兩酒調下

丹 ○又方已結成膿者用大黃酒拌連翹各五錢枳實三錢厚朴甘草節各二錢桃仁二十一个生薑三片分三服水煎服之

○石香程氏曰便毒一名騎馬廐此奇經衝任為病而癰見於

厥陰經之分野其經多血又名血疝或先有痒瘡而發或卒然起核疼痛而發皆熱鬱血聚而成也初發宜疎利之即散變膿後如常用托裏內補之藥

瘡瘍

○蘇方散治便毒

木鱉子

去壳

當歸尾

芍藥

白芷

粉甘草

川芎

射干

忍冬

即金銀花

大黃

川山甲

煨時沒藥

蘇木

各六分

右細切作一服水酒各一盞前一盞食前服

瘡瘍

○玉燭散治便毒

川芎

當歸

生地黄

赤芍藥

朴硝

大黃

甘草各八分

右細切作一服水煎食前服

○牡蠣大黃湯治同

大黃

牡蠣各五分甘草一錢

瓜蔓一箇去皮

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

△瘰癧方法

○丹溪曰瘰癧必起於少陽一經不守禁忌延及陽明木抵食味之厚鬱氣之積曰風曰熱皆此二端拓引變換瀆分虛實者易治虛者可慮以其屬膽經主決斷有相火且氣多血少婦人見此若月經不作寒熱復生稍久轉為潮熱危矣自非斷慾食淡神仙不治也

溪丹 ○治瘰癧用立効散與瓜蔓散相間服神効

○本草云夏枯草大治瘰癧散結氣有補養厥陰血脉之功而經不言觀其能退寒熱虛者可仗若實者以行散之藥佐之外以艾灸亦漸取効

○治血少馬刀瘰瘡肚泄以四物湯倍酒炒芍藥牡蠣粉陳皮

柴胡甘草黃連玄參炒神麩桑椹膏

○石香程氏曰瘰癧之証內經謂之結核者是也結核有大小如大豆銀杏連串而生者形大如馬刀者謂之馬刀瘡經別為火類夫火亢之甚必薰水化制之其核故堅也凡瘰癧之起始生於耳後足陽明少陽二經浸淫于太陽之經漸隨經流注于腋脇手足皆有也治法以火針刺入核中不可透底納蟾酥膏于中外用綠雲膏貼之三日後取去核中稠膿膿盡取去核外薄膜先破初起之核一枚以絕其源服藥後出者皆愈或不肯收如銀杏者盡皆開了用藥取之其自潰者猶如木菓之腐熟肉雖潰而核猶存故膿水淋漓久難得愈治者用鉄烙燒赤烙去其破核猶存者併肉潰處次用金寶膏龍珠膏等藥追去蠹惡之根遂能長肉而愈隨經絡証候服除風熱引經之藥以除根

本可獲全功也

○蟾酥膏

蟾酥

寒食麩煨

右各另研和作一處再研煉蜜為丸如棗豆大每用二丸或二三丸納入針竅中如膿未盡再用數丸以膿盡為度

○綠雲膏

黃連

大黃

黃芩

玄參

黃栢

木鱉子

去壳以上各一歲

右細切用香油一兩同煎焦色去藥入淨松香五兩再煎成膏濾入水中扯接令金色入銚再熬放溫入後藥猪膽汁三箇銅綠三禾醋浸一宿綿去粗

右用竹筴帶溫攪勻然後如常攤貼兼治瘡口不乾加乳香沒藥輕粉尤妙

○金寶膏去腐肉不傷良肉新肉

桑柴灰

五碗用沸湯十碗淋汁用草帚一層皮帚二層

穿山甲

二兩煨

信砒

杏仁七枚去皮

山甲研細

生地黃

二兩辰砂一錢

粉霜另研

射香各五分

右將灰汁濾澄清下鍋煎濃下甲末候焦乾一半下射香次下粉霜乾及九分下辰砂候成膏下炒石灰末以成塊子即收入小罐子內勿見風

○龍珠膏

龍牙草五兩棘棗根半兩海藻二錢半蘇木半兩

右細切量水二十碗煎至十二三碗濾去粗又用

石上皆

桑柴灰 二碗半 石灰 二碗半 蒼耳草 灰 二碗半

以草紙二層皮帛二層放羅底次置灰於上用煎湯熱淋取灰汁十碗許澄清入鍋內煎成膏用巴豆霜白丁香石膏射香輕粉磁罐子收貯每用取付核上再付即去舊藥併靨再上新藥其核即潰而愈根小者但只途藥於根上其核自潰

○收若化堅湯治癩瘻馬刀披癩在耳下或耳後下顛至有上或入缺盆中乃手足少陽之經分其癩瘻在頰下或至頰專乃陽明之經分受心脾之邪而作也今將二証合而治之

黃芪 一錢 護皮毛 間腰理虛及活血氣為瘡家之聖藥 又實表補元氣之妙劑也
人參 三分 補肺氣之藥也 如氣短不調及喘者宜加之
炙甘草 半錢 能調和諸藥 淨火益胃氣 亦能去瘡中之

真漏蘆 升麻 各一錢 葛根 半錢 以三味俱足 陽明

連翹 一錢 以一味乃十二經瘡中之藥 不可無也 能散

牡丹皮 三分 去腸胃中滯宿血 當歸身 三分

生地黃 三分 熟地黃 三分 以三味諸經中和血生血活

白芍藥 三分 如夏月倍之 其味酸氣寒能補中益氣之

肉桂 二分 大辛熱能散結積 陰症瘡瘍須當少用之 以

浮凍之氣如有煩燥者去之 柴胡 八分 功同連翹如瘡不在少陽經則去之

黍粘子 三分 無腫不用 羌活 一錢 獨活 半錢 防風 半

巴上三味必問手足太陽証脊痛項強不可回顧腰似

折項似接者是也 其防風一味辛溫如瘡在膈已上金

無手足太陽經証亦當用之 為能散結去上高風邪

昆布 二分 其味太鹹 若堅硬者宜用 荆三稜 炮 二分

廣木 炮 三分 以一味若瘡堅硬甚者用之 如不甚堅硬

益智一分如唾多者胃不和也或病人吐沫吐食胃中

麥蘖又治腹中急神效炒二分食不消化者用之

黃連三分治煩悶厚朴姜制一錢二分黃柏炒

分如有熱或腿脚無力加之分右件共為細末湯浸蒸餅捏作餅子日乾搗如米粒大

每服三錢白湯送下○如氣不順加橘紅甚者加木香

少許量病人虛實臨時斟酌與之母令藥多妨其飲食

此為大治之法也○如止在陽明分者去柴胡黍粘子

二味餘皆用之○如在少陽分為馬刀挾瘵者去獨活

漏蘆升麻葛根更加瞿麥三分○如本人素氣弱其病

勢來時氣盛而不短促者不可考其平素宜昨氣盛而

從病變之權也宜加黃芩黃連黃柏知母防已之類視

和氣在上中下而用之○假令在上焦加黃芩半酒洗

異本作
為深之法

在中焦加黃連半酒洗在下焦則加酒制黃柏知母防

已之類選而用之○如大便不通而滋其邪盛者加酒

制大黃以利之○如血燥而大便乾燥者加桃仁泥酒

制大黃二味○如風結燥不行者加麻仁大黃以潤之

○如風澁而大便不行加煨皂角仁大黃秦朮以利之

○如脉澁覺身有氣澁而大便不通者加郁李仁大黃

以除風燥也○如陰寒之病為寒結秘而大便不通以

局方中半硫丸或加炮附子干姜煎水冷服之○大抵

用藥之法不惟瘡瘍一家諸疾病重人素氣弱者當去

苦寒之藥多加人參黃芪甘草之類為火而先補其元

氣餘皆做此

○柴胡連翹湯治男子婦人馬刀瘡

中桂一分 當歸稍五分黍粘子 炙甘草

東垣

酒黃栢

生地黄錢一錢半 柴胡一錢半 黃芩炒

酒知母

連翹各一錢 瞿麥二錢

○消腫湯治馬刀瘡

黍粘子炒

黃連各五分 當歸稍

甘草各七分

瓜蒌根

黃芪各一錢 生黃芩

柴胡去芦各一

連翹二錢

紅花少許

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱服

○柴胡通經湯治小兒項側有核堅而不潰名曰馬刀瘡

柴胡去芦

連翹 當歸稍

生甘草

黃芩

桔梗 黍粘子

荆三稜各二分

黃連五分

紅花少許

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後稍熱服忌

垣東

苦藥泄大便

○散腫潰堅湯治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆中或肩
上或脇下皆手足少陽經中及瘰癧遍於頸或至頰車堅
而不潰在足陽明經中所出或二証瘡已破流膿水並皆
治之

黃芩八分 酒洗半炒 半生 草龍胆酒洗四變

瓜蒌根 酒洗 黃栢 酒制炒 知母 酒炒

桔梗去芦

昆布 酒洗各 柴胡四分 炙甘草

荆三稜 酒洗炒

廣木 酒拌炒 連翹各三分 葛根二分

白芍藥二分

當歸稍二分 黃連 升麻一分

右細切作一服水二盞先浸半日前至一盞去粗食後
稍熱服於卧處伸足在高處頭低垂每含一口作十次
燕下服畢少頃依常安卧取藥在膈上停蓄故也另攪

垣東

一料作細末煉蜜為丸如菽豆大每服百餘丸以前藥送下或加海藻五分炒入亦妙以海藻反甘草以東垣
 ○升陽調經湯治瘰癧遠頸或至頰車此皆出足陽明胃經中來若瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎經中來乃戊脾傳於癸腎是夫傳與妻俱作塊子堅硬大小不等並皆治之或作丸亦妙

升麻 八分 葛根

黃芩 廣木

炙甘草 各四分 當歸 稍

知母 酒炒一錢 一本有黃連洗連翹桔梗各五分生黃芩分

右細切作一服水二盞先浸半日煎至一盞去粗臨卧

稍熱服外另稱十貼之數為細末煉蜜丸如菽豆大每服一百丸服藥時足高去枕仰卧啗一口作十次嚥之

留一口在後送下丸藥服畢寢卧如常

棟

○連翹散聖湯治耳下或至缺盆或肩生瘡堅硬如石動之無根名曰馬刀瘡從手足少陽經中來也或生兩脇下或已流膿作瘡未破並皆治之

柴胡 一錢 草龍膽 酒制 四錢 土瓜根 酒制炒各一錢

黃芩 酒炒七分 當歸 稍 生黃芩 廣木

荆三稜 酒炒 連翹 白芍藥 各五分 炙甘草 三分

黃連 酒炒二錢 蒼朮 米泔浸各二分

右細切作一服外另稱十貼之數為細末煉蜜丸如菽豈大每服百餘丸煎者用水二盞先浸大半日煎至二盞去粗臨卧稍熱服去枕仰卧每口作十次嚥之留一口送下丸藥服畢如常安卧更以後藥塗之

瘡瘍 ○龍泉散

龍泉粉 炒即磨刀石上粉也 瓦粉 廣木

荆三稜 酒洗炒 昆布 各五錢

右同為細末煎熱水調服之用此藥去疾尤速

生

○三聖丸治癩癧神效切藥

丁香 五十粒 班猫 十箇去翅及頭足炒射香 另一錢

右為末用鹽豉五十粒湯浸爛研如泥和前藥末丸如

菘豉大每服七丸食前温酒送下日三服至五七日覺

小便淋瀝是藥之効便如服或小便下如青筋膜之狀

乃病之根也忌温麪毒食

瘡瘍 ○立驗大聖散治癩癧切藥

班猫 大者三十箇去頭及翅足用糯米一合同炒米黃

白姜蚕 一錢去系紫炒 黑牽牛 半生半炒共三錢取頭

荆芥穗 一錢

右為細末每服一錢空心無灰老酒下服此藥須忌魚

肉酒醋塩醬及發風動氣等物止可吃菜蔬白粥且如

次早服藥隔夜不吃夜粥黃昏煎川木通湯調下玉雪

妙靈散二錢重次日五更酒調立驗大聖散一貼如不

能飲酒用燈心木通湯調下至日中覺小腹攻痛小便

澁痛又用燈心湯調下琥珀末一錢或玉屑妙靈散亦

可當利惡物從小便中出如蒲荷肉狀中有凝血一點

或未下三日後可再服至日中前用六丁神散一服催

之必然自下五六日後再催一服以病根除盡為度如

項上有癢一枚取下惡物十枚則盡病根如有小腹攻

急莖中澁痛之惱不必驚恐過後便自平復無事

○玉屑妙靈散

活石細研為末每服一錢煎川木通湯調下

○六丁神散

苦丁香 六枚或秤六錢重 白丁香 一錢 苦參末 五分
赤小豆 一錢 磨刀泥石者佳 一名龍粉 大班猫頭去
白姜蚕 去糸消炒各一錢

△瘦瘡方法

破結散治石瘦氣金瘦血瘦肉瘦馬刀瘦癩等証
海藻 酒洗淨 龍胆草 酒洗 海蛤粉 通草
貝母 去心 昆布 酒洗淨 礬石 枯 松蘿各三錢分
麥麩 炒四錢半 夏麩 二錢
右為細末每服二錢熱酒調食後服忌甘草鯽魚雞肉
五辛生菓○有欠於項上生瘰大如茄子朝熱不食形
瘦日久百方不效後得此方去松蘿加真桑寄生一倍

瘡瘍

服三五日後其瘡軟而散熱退而愈屢醫數人皆效
○南星散治皮膚頸項面上瘡大者如拳小者如粟或軟
或硬不痒不痛宜用此藥切不可輟用針灸多致不效

生南星 大者一枚

右細研爛入好醋五七點許如膏如無生者即以乾者
為末醋調如膏先以細針刺患處令氣透却以膏藥攤
貼覺痒則頻換貼取效

瘡者氣血凝滯結聚而成或如桃李或如瓜瓠其名有六曰
骨瘤曰脂瘤曰膿瘤曰血瘤曰筋瘤曰風瘤以其中各有
此物而名之也已上諸瘤通用龍珠膏治之

龍珠膏 方見前瘰癧條下

瘡宜服十六味流氣飲 方見前瘰癧條下

○九瘦氣先須斷厚味用海藻一兩黃栢二兩為末置掌中時

時紙之以津唾嚥下待消三分之一止藥
△結核方法

○丹溪曰但九結核在項在臂在身如腫毒不紅不痛不作膿者多是痰注不散名曰痰核用二陳湯加酒炒大黃連翹桔梗柴胡煎服

○又方治臂核作痛用二陳湯加連翹川芎皂角刺防風黃芩酒炒蒼朮煎服

○治耳後項門各有二核用炒姜蚕酒蒸大黃青黛牛胆南星為末蜜丸噙化

△疔腫方法

○石香程氏曰疔腫之証皆蓄熱毒之深而成者也近者多見因食炙牛疫馬之肉而成此証其形有十三種皆以形而名之耳一曰麻子疔二曰石疔三曰雄疔四曰雌疔五曰

火疔六曰爛疔七曰三十六種疔八曰蛇眼疔九曰指背疔十曰水洗疔十一曰刀鏹疔十二曰浮鷗疔十三曰牛狗疔惟三十六種疔最為可畏其狀頭黑浮起形如黑豆四畔大赤色今日生一明日生二後日生三乃至十數亦為可治若滿三十六則為不治之証也夫十三種疔其形狀雖各不同而其所由皆熱毒之甚也治法並急用奪命丹下之去其毒之銳勢次服化毒丸及內托散二活散雄射湯隨証經絡病勢緩急用引經藥斟酌施治如無他証有熱即退熱有腫則退腫如身冷自汗嘔逆燥喘狂喝妄語直視者皆毒氣入內不可治矣如疔已拔去用金銀白芷散加減十宣散調之方獲全安也

今將十三種疔証候開列于後

○一曰麻子疔其狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤多痒也

食麻子近油衣布衣并入麻油中行

○二曰石疔其狀皮肉相連色如黑豆其硬刺之不入肉微痛
忌瓦礫磚石之屬

○三曰雄疔其狀炮頭黑靨四畔仰炮漿起有冰出色黃大如
錢孔形高者忌房事

○四曰雌疔其狀瘡稍黃向裏靨亦似灸瘡四面炮漿起心凹
色赤如錢孔者忌房室

○五曰火疔其狀如湯火燒灼瘡頭黑靨四邊有煙燭又如赤
粟米者忌火烧烙

○六曰爛疔其狀色稍黑有白斑瘡中潰有膿水流瘡形大
小如匙面者忌沸熱食爛物

○七曰二十六疔其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤色今日
生二明日生二及至十數未滿三十六猶可施治若滿三

十六藥所不能治也忌嗔怒蓄積怨恨

○八曰蛇眼疔其狀瘡頭黑皮浮生形如小豈狀似蛇眼大體
硬忌惡眼人看瘡痕妬个見忌毒藥

○九曰鹽膚疔其狀大如匙面四邊皆赤有黑粟粒起大忌食
鹽味

○十曰水洗疔其狀大如錢形中如錢孔瘡頭白裏黑靨汁出
中硬忌飲漿水水洗渡河

○十一曰刀鎌疔其狀闊狹如薤葉大長一寸左側肉黑如燒
烙忌刺及刀鎌切割鐵刀所傷可以藥治不可亂攻

○十二曰浮漚疔其狀瘡體曲圓小許不合長而狹如薤葉大
內黃外黑黑處刺之不痛黃處刺之痛

○十三曰牛狗疔其狀肉色炮起翳不破
右十三種疔瘡初起瘡心先痒後痛先寒後熱熱定則

寒多四肢沉重心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆者難治其麻子疔一種始末惟瘡初錄忌者不得觸也觸犯者發作難治其浮瀉疔牛狗疔兩種無所禁忌縱不瘡亦不能殺久其狀寒熱與諸疔不同皆宜將護依法治瘡禁忌不得觸犯若或觸犯脊強瘡痛極甚不可忍者是也又云疔腫初發時突起如釘故謂之疔今又惡心惡寒四肢強痛一日瘡變為焦黑色腫大光起根硬刺之不覺痛皆其候也在手足頭面胸背骨節間最急其餘處則可治毒入腹則煩悶恍惚似醉如此者三二日間死矣皆不可不速治也

○返竟丹經云汗之則瘡愈必用此藥汗之

- 乳香 沒藥 辰砂 雄黃 各一錢半
- 輕粉 片腦 射香 各五分 海羊 即蝸牛也

- 蟾酥 青黛 粉草 朋砂 各一錢

右為細末用海羊搗膏為丸如難丸加酒麪糊些少丸如彈子大每服一丸煎生葱頭二三箇細嚼燕下疔腫及癰腫毒氣入膈者得微汗即解○一方加銅綠寒水石輕粉枯礬各一錢重按上藥皆非發汗之藥蓋能解也化

○拔疔法以黑牯牛牽於石塔上必撒糞候糞上生菌取焙乾與菴養草葉等分為細末先用竹筒兩頭去節一頭解十字路將不解頭套在疔上以線緊縛竹筒陷入肉內為度以前藥末一匙滴水和之放於筒內少時藥滾起則疔自拔起若一次未效漸加度數其疔必拔也

○奪命丹 巴豆時 兩去壳醋煮一伏黃丹 三錢 硃砂

雄黃 各三錢 乳香 鬱金 各五錢 大黃 一兩

輕粉 二十兩 蟾酥 半錢 或 飛羅麪 三兩

右為細末 蠟水糊為丸 如菉豆大 隨身年分虛實加減 丸數服之 以下其毒如無奪命丹 雄黃丸代之亦效

○雄黃丸

雄黃 鬱金 各一錢 巴豆 十四枚 射香 少許

皂角 全蝎 各一錢

右為細末 滴水為丸 如菉豆大 每服二十九 清茶送下 亦看大小虛實斟酌 加減丸數

○化毒丸

射香 各五分 硃砂

片腦 雄黃 各二錢 輕粉 十兩 蟾蛻 二十枚

右為細末 新取蟾酥為丸 如菉豆大 每用二丸 放於舌

上取涎而愈

○獨蟾丸 併取蟾酥法

拿取活蟾 即大壯蝦蟇 通身有倪偏者 俗名癩蝦蟇 又

捉住後脚 以大桑葉或油單紙包掩其頭 用鉄釘一箇 拈取眉間白汁 澱於葉上 凝結如濕真粉 就丸如菉豆

大一蟾 或作一九多者 作二九 懸當風處 陰乾 如患疔 腫者 即以一二九置舌尖上 仰卧片時 其苦水滿口 就

以此水燕下 或以銀鍼刺開疔腫 頭上納藥 一九於中 外以薄皮紙貼護之 勿令藥脫落 背癰及一切癰腫 初

○雄射湯解疔毒如神

雄黃 另研 硃砂 另研 各 真菉豆粉 錢 射香 另研

乳香 另研 各 白芷 茜草根 地丁草 各二錢

卷之六 五十四

牡蠣 姜蚕 牛蒡子炒 大黃

金銀花 青木香 梔子 荊芥穗

朴硝 甘草各一錢 胡桃壳膜去

右以白芷以後一十四味細切用無灰酒一碗浸少時
搗細又加水一碗同煎至一碗去粗及濁脚入前雄黃
等五味調勻作一服更審患處經絡分野依東垣引經
瀉火藥加之尤妙欲利倍加大黃朴硝二味臨後下○
茵草即過山龍地疔即大蘊也一云剪刀草開黃花者
名紫花地丁

○二活散

羌活 獨活 當歸 烏藥

赤芍藥 金銀花酒洗連翹 天花粉

甘草節 白芷錢各五 紅花 蘇木

荆芥 蟬蛻 乾葛各三錢 檀香二錢

右為細末每服三錢煎蒼耳湯調下

○取疔散

雄黃 硃砂 蟾酥 信石各一錢

巴豆十粒 輕粉十盞

右將疔四畔用針刺破醋調塗疔落後用長內拔毒

膏藥貼之

已上候見 瘡瘍集驗 ○鮮毒丸

白芷十兩 丁香五兩 蘿蔔子去壳醋浸炒另研細末

貫衆取新者去皮切晒乾 朴硝四兩 硃砂一錢六分

京墨八錢各另研

右和勻糯米糊丸如龍眼大青黛為衣陰乾每服一丸
無灰酒磨化下

○賀藍先生解毒丸 解毒及山嵐瘴氣 災牛馬猪羊肉毒 魚腥麩菜毒 暑熱濕毒 傷寒濕毒 小兒斑疹 喉痺急証 紅赤 癰腫及諸般無名腫毒

- 黃栢 貫衆 茯苓 藍根
 - 葛根 生地黄 雄黑豆 甘草
 - 滑石 硝砂 陰地蕨 薄荷 各三兩
 - 益智 大黃 寒水石 紫河車 即人乳
 - 馬勃 草龍胆 姜蚕炒 百藥煎
 - 山梔子 各一兩
- 右為細末 煉蜜丸 每一兩分作十九丸 細嚼新汲水送下
小兒驚風 薄荷汁下 蜜水浸蒸餅為丸 亦可 或加黃連 白芷

扁 ○萬病解毒丸

- 射干 文蛤 即五倍子 杏仁 石膏
 - 續隨子 去壳 蚤休 即金線 土珠 大戟
 - 山豆根 山茨菰 白藥子 大黃 酒蒸各二兩
 - 射香 二錢 青黛 威靈仙 白芷 各一兩
 - 黃連 風化硝 各半兩
- 右為朱糯米糊為丸 如彈子大 青黛滑石細研為衣 陰乾 此藥解一切毒 蠱毒 鼠菴毒 河豚毒 魚毒 菌毒 疫死牛馬肉毒 喉痺 骨鯁 竹木刺毒 並用急流水磨下 癰疽發背 疔腫 瘡瘍 毒蛇犬咬 蜈蚣蜂蝎 螫毒 刀斧湯火傷 並用井花水磨下 併塗傷處 婦人鬼胎惡氣 積塊虫積 心胃痞滿 肚腹膨脹 並用好酒磨下
- 千金漏蘆湯 治疔腫神效
- 漏蘆 連翹 黃芩 白欵

枳壳 升麻 麻黃 去根節 朴硝 礞石 一兩另
大黃 地丁 金銀花 各半兩

右除朴硝外為細末後入硝和勻每服三錢水一盞生
姜三片薄荷三葉煎至七分空心溫服利下惡物止藥

瘡瘍 ○取疔腫方

青木香根 鐵木香 雄黃 甘草 各一錢

右為末湯調下以利去毒氣四五行即愈

瘡瘍 ○破毒散

信石 礞砂 黃丹 雄黃

乳香 各一字 班貓 五箇 去射香 少許

右為末取新蟾酥和丸如棗豆大以鐵針破開疔頭納
藥一九在內外以膏藥護之如無蟾酥加麩糊些少

○灸法以大蒜爛搗成膏塗瘡四圍留瘡頂以艾炷灸之以爆

為度如不爆稍難愈宜多灸百餘壯無不愈者

○祖傳經驗秘方治食災牛馬肉成疔腫欲死者以柏油木葉
搗絞取真汁一二碗頓服之得大瀉毒氣而愈如冬月無
葉時取嫩根研水服之亦効未利再服以利為度

△諸瘡方

活菟丹治一切惡瘡大有神効

血竭 沒藥 銅綠

枯白礬 黃丹 穿山甲 煨 鱗 輕粉

蟾酥 各五分 射香 少許

右為細末用蝸牛搗膏為丸如棗豆大每服一丸重者
二丸又用葱白一寸嚼爛裹藥熱酒送下食前服

○又方用真姜蚕蝉蛻二味等分為末香油調付拔疔効

○治諸般惡瘡

醫方正傳

卷之六

五十六

經霜芭蕉葉為末香油調付先用忍冬藤葱椒蒼耳草煎湯洗瘡淨挹乾付藥外以油紙掩之

○又方治諸般惡瘡用松木上白蟻泥黃丹各等分炒黑香油調付用油紙夾上日易後用龍骨沒藥歛瘡口收肉

○又方治惡瘡用黃丹入香油煎入朴硝抹之

○天泡瘡服防風通聖散及用蚯蚓糞炒蜜調付之從肚皮上起者裏熱發外還用通聖散藥炒

○又方治天泡瘡用野菊花棗木根煎湯洗黃栢滑石末付

○治脚上沙瘡清水出者用紫燕窠泥畧炒黃栢二味共為末香油調付

○治賺瘡用白膠香二兩黃栢石膏各二兩青嵐五錢龍骨半錢為末香油調付

○又治賺瘡方以香油一兩入胎髮如梅大煎焦煇去粗入白膠香黃蠟各一兩煇化入生龍骨赤石脂血竭炒各一兩攪勻候冷磁器盛捏作薄片貼瘡上外以竹箬包之二日

後翻過藥再貼以活血藥煎湯洗之

○又治賺瘡方用箭筈剪去兩頭以黃栢煮汁令稠和白膠香草蘇子同搗成膏攤箬糙面折縛光面貼之先以清茶於

溫洗挹乾貼之

○又方治外賺脚瘡用竈心黃土研極細入黃栢赤石脂黃丹各半兩輕粉乳香沒藥各一錢細研和勻以清油調如膏

以油絹攤藥將絹面貼於瘡上外以油紙掩之札縛定縱

痒不可開視數日後未愈再換藥緊縛直待結痂去藥先必以茶清洗瘡淨付藥

○桃花散治一切瘡生肌藥

白芨

白斂

黃栢

黃連

乳香另研 射香另研 黃丹各等分

右為細末摻於瘡上二三日生肌平滿如故

○治火燒及湯泡瘡用經霜桑葉焙乾燒存性為細末香油調付或乾付二三日結痂平復

○又方治火燒湯泡瘡時取黃蜀葵花以香油浸之其花日漸燥於油中以此油付瘡即愈或只收花焙乾為末香油調付亦妙

○下疳瘡用青黛海蛤粉蜜陀僧黃連為末付之○又方以雞內金燒存性為末付之

○又方治下疳瘡用鳳凰退燒存性為細末香油調付外者瘡大小剪壳中白膜貼之須靜坐一日不動即結痂矣

○頭瘡用猪油一錢半生雄黃水銀各二錢伍分和勻付之金絲瘡其狀如繩線巨細不一上下行至心即死可於瘡頭

上截經刺之以出血後嚼萍草根付之立愈

○手痴瘡用皂角枯礬輕粉黃連黃栢為末付之

○砂瘡用搨地藤燒灰付之

○諸瘡痛不可忍者用苦寒藥可施於資稟厚者若稟氣薄者宜於補中益氣湯中加苦寒藥也若血熱之人瘡痛宜四物湯加黃芩鼠粘子連翹左下加黃栢若肥人濕熱瘡痛宜防風羌活荆芥白芷蓋風能勝濕故也

○疥瘡併馬疥瘡用馬鞭草不犯鐵器搗取自然汁半盞飲盡十日內愈神效

○白癩風癬以小麥攤石上以鐵器燒紅壓出油搽之立效

○治風癬疥瘡用梓桐葉木綿子羯羊屎鼠屎盒澄付之

○治癬瘡用浮萍末一两蒼耳子蒼木各二两苦參一两半香附二錢半黃芩五錢水煎洗之

○身上虛痒用四物湯加黃芩煎調浮萍末一錢服
○又方治通身痒用凌霄花為末酒調服一錢
○秘傳一擦光治疥瘡及婦人陰蝕瘡漆瘡天火丹諸般惡瘡
神効

蛇床子 苦參 蕪荑 各一兩 雄黃 半兩
枯礬 錢一兩 二硫黃 五錢 輕粉 二錢 樟腦 二錢
大風子 取肉 川椒 半兩

○又方治証如前煎小兒癩頭瘡治之
右為細末生猪油調付
蛇床子 一兩 雄黃 五錢 硫黃 一兩 枯礬 二兩
大風子 取肉 川椒 半兩 黃栢 一兩 輕粉 二錢 另拌
牛皮岸 薰牛皮烟岸也如無以香炉岸代之 一兩
黃丹 一兩

右為細末生猪油調付

○凡先哲治癰疽要方俱採撫于後以備選用
精製 ○五香連翹湯治癰疽未成膿者服之可散但當看時令
及資稟加減用之

乳香 木香 沉香 丁香
連翹 射干 升麻 木通
桑寄生 射香 獨活 大黃 各等分
右細切每服三錢水一大盞煎七分去粗溫服
東垣 ○內托復煎散托裏健胃
地骨皮 黃芩 茯苓 芍藥
人參 黃芪 白朮 桂心
甘草 防已 當歸 各半兩 防風 一兩
蒼朮 半斤

右細切先以蒼朮用水五升煎至三升去朮入前十二味再煎至三四盞取清汁作三四次終日飲之又煎蒼朮粗如前再煎諸藥粗服之

○白芷升麻湯治手陽明經分臂上生癰左右寸部脉皆短得之俱弦按之洪緩有力此得之八風之變者

白芷 一錢半 升麻 桔梗 各一錢 甘草 炙半錢

黃芪 四錢 酒黃芩 四錢 生黃芩 三錢 紅花 五分

右細切分二服水酒各一盞煎至一盞溫服

○托裏散治一切惡瘍發背疔腫便毒始發脉洪數弦實腫甚將作膿者三服消盡

大黃 牡蠣 瓜蒌根 皂角刺

朴硝 連翹 各六分 金銀花 當歸 各二錢

赤芍藥 黃芩 各四分

右細切作一服水酒各一盞煎至一盞四分服

○又托裏散

黃芪 當歸 金銀花 甘草 各等分

右細切每服一兩酒水合煎更詳部位各加引經藥尤妙

○烏金散治癰疽疔腫時毒附骨疽諸惡瘡等証若瘡黑

隔如石堅四肢冷脉細或時昏冒謔語循衣煩渴危篤服此汗之即瘡起

蒼耳頭 五月五日午時收 草烏頭 火麻頭 六搗

木賊 去節 蝦蟇頭 搗皮節 酥炙麻黃 去根節

右晒乾各等分同入磁器內鹽泥固濟烈火烘從早至申時如黑煤色為度研為末每服二錢病重者三錢熱酒調下未汗再進一服如汗已乾却服解毒疎利之藥

如修合此藥必選天時清明好日於靜室中合勿令雞犬猫畜及陰人孝子見之

陳○黃芪六一湯治癰疽發渴

黃芪六兩 甘草一兩

右細切水煎不拘時服

精要○一方治一切瘡癰疽發背殊效亦能下瘀血

大黃三錢 甘草 辰砂 血竭各一兩

右為細末酒調服

精要○內托護心散 真菘豆粉四兩一方用二兩

乳香一兩 右為細末每服二三錢煎甘草湯或新汲水調下

瘡瘍○小五香湯

沉香 乳香 藿香

方局○復元通氣散 連翹各二錢射香另研少許 右為細末每服二錢水一盞煎七分溫服

當歸 穿山甲煨 川芎 天花粉炒 酪

青皮 陳皮各一兩 大黃 甘草

黑丑頭末各半兩

右為細末每服二錢溫酒調

陳○金銀白芷散 黃芪 當歸各一錢 枳榔 川芎各五分

甘草一錢 天花粉五分 乳香 沒藥各三分

皂角刺炒 金銀花各半 防風三分 白芷一錢

右為細末分三服每服水酒各半匙煎連租服

瘡瘍○正鉄箍散

瘡瘍○正鉄箍散

蒼耳醋拌晒乾

貝母去心 白芷

或加龍骨二錢尤妙

右為細末水調或香油調貼瘡上

瘡瘍○大鉄箍散

芙蓉

猪卷皮

木鱉子酪 白芷

黃柏

寒水石各二兩

大黃

紫荊皮各一兩

赤豆

白欵各二兩

白芨一兩

防風半兩

貝母二兩

真地青

羌活各一兩

右為細末凉水調圍癰四畔如肉脆去白芨白欵加生

地黃地榆用芭焦油調付熱甚者用三消散

瘡瘍○三消散退極熱証赤腫炊開者

朴硝

焰硝

大黃

梔子炒黑色

寒水石

南星各等分

瘡瘍○雲母膏治一切癰疽瘡癤折傷等証

右為末生地黄汁調塗貼芙蓉葉汁調亦可

蜀椒去目及開口者微炒 白芷

肉桂

當歸

沒藥

赤芍藥

麒麟竭

黃芪

藍花

芎藭

木香

龍胆草

白芨

防風

厚朴

射香

白欵

柴胡

松脂

人參

桔梗

黃芩

乳香

附子

蒼朮

良姜

合歡皮銹五

硝石

茯苓

雲母各四兩

栢葉

桑白皮

甘草

柳枝

水銀以絹另

槐枝

陳皮各二兩

清油四十兩

黃丹二十兩

特膏成以手細彈鋪在上

右除雲母硝石麒麟竭乳香沒藥射香黃丹鹽花八味
另研外余藥並細切入油浸七日文火煎以柳枝不住
手攪候匝沸乃下火沸定又上火如死者三以藥黑
色為度去租再煎後入丹與八味末仍不住手以槐柳
枝攪滴水中成珠不軟不硬為度磁器收貯候溫將水
銀彈上用特先刮去水銀或服或貼隨宜用之其功甚
大也

○太乙膏治一切癰疽瘡癤貼之神效亦可內服須詳証經絡
作湯使送下

玄參 白芷 當歸 肉桂
大黃 赤芍藥 生地黃 各一黃丹
真麻油 二斤
右細切入油浸夏二日冬十日春秋七日文火煎黑色

去租入黃丹再煎以槐柳枝不住手攪滴水中成珠不
軟不硬磁器收貯

○神異膏治諸般癰腫毒殊效
露蜂房 有蜂思多者佳 一玄參 半兩 黃芪 七錢半
金蛇退 兩 用水盪洗淨 杏仁 一兩 去黃丹 五兩 飛
香油 十兩 亂髮 如雞子大一塊 無病壯年男子者佳

右先將香油入亂髮於鈹中文火熬候髮焦燂盡以杏
仁換入候杏仁黑色用真絹濾出租再將油入鈹中然
後下黃芪玄參二味文火熬一二時久住候片時火
力稍息旋入露蜂房蛇退二味以柳枝不住手攪慢火
熬至紫黑色又將用綿濾過去租入爐中文武火熬下
再急攪千餘轉滴水中成珠子膏即成矣冬月畧嫩此
夏月畧硬此磁器盛貯隨意攤貼

驗○萬槌青雲膏治諸般癰腫未成膿者貼散已成膿者拔毒

追膿腹中痞塊上瘡疾貼大椎及身柱其效如神

白松香 一斤去木屑 草麻子 三百粒去壳

杏仁 三百粒 銅青 三兩 乳香 沒藥 各一兩半

輕粉 二錢

右共作一處用鉄槌木砧於日中搗成膏如燥少加香

油杵之或用石臼木杵搗亦可用磁器盛緋帛攤貼湯

中做不見火

驗○一方治背癰附骨疽乳癰及一切癰腫未成膿者發散極

效了

槐花 一兩炒 胡桃 十個新鮮不油者連壳煨火煨熟去

右二味於沙盆中研爛如泥熱酒調和粗温服如能飲

酒人多飲愈效一醉後而癰腫散矣

○稀養散治癰疽發背及一切癰毒等証效如神

稀養草 其葉長如牛舌其氣如猪臭者 小薊根

五瓜龍 即五葉藤 生大蒜

右四味各等分細研用酒和勻瀝去粗服二碗得大汗

通身而愈

○又方治諸般癰腫神效 此上並祖傳方

新掘天門冬一味約三五兩洗淨入沙盆內研細以好

酒盪起瀝去粗頓服未效再服一二服必愈

論

內經曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癩風又曰癩者因榮衛熱腐其氣不清故使其臭柱壞而色敗皮膚癩潰風寒客於脉而不去名曰厲風丹溪曰是受天地間殺物之風故也然近見病此者原其所由多是熱血得寒所致或夏月勞甚而入寒泉澡浴或冬月酒後而乃踢水復霜及入水取魚由是濕熱鬱于內而不散風寒客于外而不行內外怫鬱既久而漸成肌肉之敗腐矣經所謂熱勝則肉腐是也木抵此証肺歸重於手足陽明之經蓋手足陽明者胃與大腸主之脾肺二經之府也脾主肌肉而肺主皮毛乃府及於藏病也經又曰腸胃為市無物不受無物不包故其熱毒積于中而形於外耳故治法必先取陽明而後及於太

陰亦本而標之之義也又濕熱甚必生風風甚則生虫如腐草為蠶之類又治法必先殺其虫瀉其火然後生血涼血祛風導滯降陽升陰皆為治之急務也治雖多門大畧不越乎此也李者詳之

脉法

脉两寸浮而緊

或浮而洪

陽脉浮弦陰脉實大

脉浮緩者易治

洪大而數者難愈

沉實者難愈

脉溢者病在上

脉浮者病在下皆為不治之証也

方法 丹溪方法凡五條

丹溪曰大風病是受天地間殺物之風古人謂之癘風者以其酷烈暴悍可畏耳人得之分在上在下氣受之則在上血受之則在下氣血俱受則在上復在下然皆不外乎陽明一經陽明者胃與大腸也無物不受治之者須致意者

其疔瘡瘡上體先見者多者在上也下體先見者多者在下也在上者以醉仙散取涎血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物重積於穀道中出後用防風通聖散調之更用三稜針於委中出血夫上下同得者甚重自非醫者神手病者鉄心卒能免此夫從上或從下以漸而來者皆是可治之証人見其病勢之緩多忽之以法治之雖已全愈若不絕味斷慾皆不免再發而終於不救也予治五人矣其不死者惟一婦人因貧甚無物可食取餘皆三四年後再發孫真人云嘗治四五百人終無一人免於死非真人不能治蓋無一人能守禁忌耳其婦於本病外又服百餘貼加葳四物湯半年之上月經行十分安愈

○醉仙散須量入大小虛實與之証候重而急者須先以再造散下之候補養得完復與此藥須新鹽醬醋諸魚椒菓煎

炒燒灸等物止可淡粥及淡羹熟時菜雖茄亦不可食惟烏稍蛇菜花蛇淡酒蒸熟食之可以助藥力也

○外科精要為諸瘡立法而不及瀰風蓋風為百病之長以其殘害膏體去死不遠一有染此鮮能免者比之瘡瘍治法為難乃不言及夫八方之風起因於八方應其時則物生違其時則殺物人之稟受有殺氣者則感而受之如持虛受物後又因起居飲食男女游成鬱氣一氣積于厥躬脾先受之乃為濕病濕積之久火氣出焉火氣滋蔓氣濁血汚一云血熱類結其氣不清化生諸虫以次傳歷臟腑必死之病而有可生之理其始病者胃氣微傷脾主肌肉流行甚緩傳變以漸或可藉醫藥之功而免謂之必死非惟醫不知藥悉是不能禁慾可哀也夫

○近見粗工用藥佐以大風子油殊不知此藥性熱有燥痰之

功而傷血至有病將愈而先失明者

○宋洞虛云大風有五黑色不治餘皆可治虫食肝眉落食肺鼻崩食脾聲啞食心足底穿膝虛腫食腎耳鳴啾啾耳弦生瘡或痺或痛如針刺狀食身則皮痒如虫行自頭面來為順風自足起者為逆風多因感寒熱與於濁雜氣而成治法先以雷公散即再造散下之以稀粥養半月勿妄動作勞後以醉仙散中間或吐或刺不必怕怯但顯喉頭面腫吞不得下旋出惡水或齒縫中出臭水血絲或言不得或悶而死難以飲食只以稀粥用管灌入或一旬或半月一月面漸白而安重者又與換肌散

○換肌散治大風年深不愈者以致眉毛脫落鼻梁崩塌服此藥不踰月取効如神
黑花蛇 白花蛇皆斷黃來者並用酒浸一宿地龍去土各三

當歸

細辛

白芷

天麻

蔓荆子

威靈仙

荆芥穗

甘菊花

苦參

紫參

沙參

木賊

不灰木

炙甘草

白蒺藜

天門冬

赤芍藥

定風草按本草即天麻也今皆用野天麻即益母草未知可否再宜詳之

胡麻子

草烏頭去皮臍

何首烏

石菖蒲

木鱉子各二兩

蒼朮米泔浸去皮

川芎

木鱉子各二兩

○醉仙散

胡麻子

牛旁子

蔓荆子

枸杞子四味俱炒紫色

白蒺藜

苦參

瓜蒌根

防風各五錢空

右為細末每一兩半入輕粉一錢拌勻每服一錢茶清

調下晨午夕各一服後五七日先於牙縫內出臭涎渾身疼痛昏悶如醉後利下膿血惡臭屎為效

○通天再造散

鬱金半兩 皂角刺獨生黑者去尖 大黃炒各一兩

白丑頭末六錢半生半炒

右為末每服五錢日未出時以無灰酒調面東服之當日必利下惡物或臭膿或虫如虫口黑色乃是多年赤色乃是近者數日後又進一服無虫積乃止

○愈風丹治癘疾手足麻木毛落眉脫遍身瘡疹皮膚瘡痒爬乏成瘡及一切疥癬風疾皆効

苦參一斤研取頭末四兩 土桃蛇一條酒浸二三日去骨取肉日乾

烏梢蛇一條並同上制

右為細末以皂角一斤剉長寸許段無灰酒浸一宿去

酒以新水一碗擦取濃汁去粗銀石器內熬膏和前末

丸如梧桐子大每服六七十丸煎防風通聖散送下粥

飯壓之三日浴以大汗出為應再三日又浴取

大汗三浴乃安浴法見後條

○一法用桃柳桑槐楮五般枝濃煎湯大缸浸坐沒頸一日俟

湯如油安矣○本草治惡疾遍身生瘡濃煎萍湯浴浸半

日大效此神方也○又以荆芥穗大黃梔子蔚金地黃杜

仲防風羌活獨活白疾藜等分為細末以大風子油入熟

蜜丸如梧桐子大每服茶清送下四五丸一日三服須

守戒三五年日誦觀音千萬聲以攝其心禁其慾乃安也

○一法以苦參五斤好酒三斗漬一月每服一合日三服常與

不絕竟脾既安細末服之亦良尤治癩疹方出圖經陶隱

居以酒漬飲治惡瘡久服輕身日華子以為殺虫本草除

伏熱養肝膽氣子常以蒼耳葉為君以此物為佐更以酒煮為蠶魚代補蛇之或缺研細糊丸如梧桐子大每服五六十丸加至七八十九丸熱茶清送下日三服一二月而安若入紫萍尤捷紫萍多水蛭須寒月於山沼取之淨洗去泥畧蒸透乾用

○一法治手指彎曲節間痛甚漸至輒落用葶麻子去壳黃連剉如豌豆大各一兩水一升小瓶浸春夏三日秋冬五日取葶麻子破平旦時面東以浸藥水服一粒漸加至四五粒微利不妨忌猪肉魚腥宜茹淡累獲神效
冊上皆○一法先服加減通聖散大瀉惡毒穢積又用三稜針看肉黑處及委中紫脉刺出死血不引令出太過恐損真氣後服神仙紫花丸
防風五錢 連翹三錢 川芎五錢 白芍藥三錢

當歸三錢浸洗 薄荷二錢 荊芥穗五錢 麻黃三錢去根
梔子三錢去壳 桔梗五錢 枳殼三錢炒 石膏各五錢
甘草三錢 滑石三錢 黃芩三錢去根 柴胡五錢
黃連五錢 黃柏三錢 生地黄三錢酒洗 羌活五錢
熟地黄三錢半酒洗 錦大黃六兩 芒硝一兩
皂角刺一兩生者去尖

右細切分八服每服用水一碗半煎至一碗空心服日進二服五六日後又進二服待補養完又行二次然後服後丸藥

外錄試

○神仙紫花丸治癘風及諸般惡瘡風瘡其效如神但要藥真無有不効者輕者一料可愈重者二三料除根

白花蛇一具出斬黃州黑鱗白紋龍頭虎口皆上二十者不堪用去頭尾各四五寸許一兩為率連皮骨用一兩半

何首烏

荊芥穗

葳靈仙各四錢

麻黃連根節一錢

胡麻子一錢

蛇床子二錢

右六味細切同蛇用無灰酒一大碗浸一宿去蛇皮骨通晒乾仍還原酒內再浸再晒酒盡為度待晒極乾共為細末另包

木香

沉香各二錢

當歸七錢半

胡天麻

猪牙皂角各五錢

射香一錢半

倍之

乳香

沒藥各一錢

明雄黃

辰砂各五分大塊者佳

肉苳蔻煨一枚定風草二錢半

還瞳子即草決明一兩

右射至辰砂五味各另研極細不見火其餘草木味亦

另研細羅過連前五味和勻另包

防風去芦

羌活

甘草

細辛

川芎

獨活

蒼朮一宿

批把葉焙乾

白芍藥

白蒺藜

金銀花

五加皮

香白芷

苦參各五錢

胡麻子

白附子浸水

麻黃

川牛膝

草烏頭浸水

川烏炮

石菖蒲各二錢半

右為細末另包

摠合法治用大風子三斤新鮮者佳發油黃以磁罐一箇盛

之少入無灰酒以皮紙竹箬重重包口勿令泄氣滾湯

中勿令沒罐口外以物蓋鍋口密封固文武火蒸候黑爛

為度杵無查滓成油分作三分每一分入第二號藥八錢

重第一號藥六錢重第三號藥一兩五錢重和勻加糯米

飯搗極膠粘如梧桐子大晒乾勿見火每服二十九漸加

至五六十丸鷄鳴時午時臨臥時各一服茶清送下忌房

勞醜酸酒醋糟淹猪羊雞馬驢肉魚腥煎燻水菓五辛姜
椒木料辛辣熱物蕎麥菜豈之類若不思旨斷慾則藥無
功雖愈再發其餘肉味病愈後一年可食但猪羊雞肉終
身用忌此法乃治癩之神方也不可輕忽

跌傷方法

○治跌撲損傷用蘇木以活血黃連以降火白朮以和中童
便煎為妙在下者可下瘀血但先須補托在上者宜飲韭
汁或和粥吃切不可飲冷水蓋血得寒則凝但一絲血入
心即死

溪丹

○骨損者用古文錢五分醋浸乳香沒藥各一錢酒研服或用
接骨散

○元戎接骨丹

沒藥

乳香

當歸

川椒

自然銅火醋淬赤芍藥

骨碎補酒炙敗龜板酥炙

虎脛骨

白芷

千金藤即郁李仁已上各等

右為細末化蠟五錢九如彈子大每服一丸好酒半升
化開煎用向東南柳枝攪散熱服○一方加龍骨川芎

○凡治損傷妙在補氣血俗立不知惟在速効多用自然銅
以接骨然此藥必煨煉方可服新出火者其火毒與金毒
相扇挾香熱藥毒雖有接骨之功其燥散之禍甚於刀劍
戒之戒之

○治金瘡急以石灰厚傅裹之如瘡深不宜速合者加滑石末
付之

○又方老杉木皮為末付之

○凡跌撲損傷腹痛者知有瘀血用桃仁承氣湯加蘇木紅花
下之

東垣○當歸導滯湯治跌撲損傷瘀滯不行等証

大黃當歸在上方用頭在中用身在下方用尾通身

右細切等分每服一兩重酒煎服

大成○雞鳴散治從高墜下及木石所壓一切損傷瘀血凝積

痛不可忍並以此藥推陳致新

大黃一兩 杏仁二十一粒去皮尖另研

右研為末酒大碗煎七分濾去粗雞鳴時服至曉必取

下瘀血即愈愚按此方用杏仁而不行氣中之血矣

河間○沒藥乳香散治跌撲損傷痛不可忍

白木炒五兩 當歸焙 甘草炙 白芷

沒藥另研各一兩半 肉桂去鹿皮 乳香另研各一兩

右為末和勻再研極細每服二錢溫酒調下

外錄○杖丹膏藥方治受杖責後如死血壅腫宜先刺出惡血然後

以此膏貼之二三日平復或早失調理成癱者貼之即散
及治諸般癰疽瘡癤毒已潰未潰貼之無不神效

甘草 肉桂 蛇蛻 蟬蛻

露蜂房 連翹 白芷 白芨

白欵 白木 蒼朮 人參

玄參 苦參 芍藥 南星

升麻 厚朴 梔子 百合

金銀花 天花粉 川歸 川芎

穿山甲煨研 羌活 獨活 黃連

黃芩 黃柏 大黃 生地黃

紅花 蘇木 柴胡 鱉甲酥炙

青木香 何首烏 防風 荊芥穗

藿香 雲母石 花蓋石各一兩 亂髮壯年無病者塊

乾蟾一隻即鳳凰胎一隻即雞黃也陰乾用不轉頭

桃柳桑枝各五莖

右各細切用香油六斤重浸藥三五日入鍋內熬色去粗入黃丹三斤別用槐柳枝不住手撓膏成候溫入後藥末

乳香沒藥 龍骨各一兩 輕粉

血竭一兩 射香二錢

右撓勻磁器收貯臨期看瘡大小攤貼

驗錄

○沒藥散治刀箭傷止血住痛

定粉 風化石灰各一兩

枯白礬另研

乳香另研 沒藥另研

右各研為細末同和勻再研乾搽之

論

破傷風 六十二

內經曰風者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風苛毒而弗能為害也若夫破傷風証因事擊破皮肉往往視為尋常殊不知風邪乘虛而客襲之漸而變為惡候又諸瘡久不合口風邪亦能內襲或用湯淋洗或用艾棗灸其湯火之毒氣亦與破傷風邪無異其為証也皆能傳蟠經絡燒燥真氣是以寒熱間作甚則口禁目斜身躄強直如角弓反張之狀死在旦夕誠可哀憫治之之法當同傷寒處治因其有在表在裏半表半裏二者之不同故不離乎汗下和三法也是故在表汗之在裏者下之在表裏之間者宜和解之又不可過其法也閭閻野人多不識此証殺人之易早不求醫迫療而袖手待斃衰哉

脈法

表脈浮而無力太陽也

脈長有力陽明也

脈浮而弦小者少陽也

河間曰太陽宜汗陽明宜下少陽宜和鮮若能明此三法而治

不中病者未之有也愚按河間先生論破傷風脈証詳明甚邪在於三陽之經便宜按法早治而愈若傳入三陰蓋風已危或腹滿自利口燥咽乾舌卷外縮皆無可生之証故置論而弗論也

方法

丹溪曰破傷風同傷寒壞証治者在何經而用本經藥驅逐之誤則殺人劉河間有法有方宜選而用之

河間○羌活防風湯治破傷風邪初傳在表

- 羌活 防風 川芎 藥本
- 當歸 芍藥各一錢 甘草 地榆

細辛 各五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗熟服不拘時候量緊慢加減用之熱則加大黃一錢大便秘只加大黃五分緩緩令通

河間○白朮防風湯名服前藥太過令自汗者宜服此藥

- 白朮一錢 防風二錢 黃芪一錢五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服不拘時候藏府和而有自汗可用此藥破傷風藏府秘小便赤自汗不止者因服熱藥汗出不休者故知無寒也宜速下之先用小芎黃湯二三服後用大芎黃湯下之

河間○小芎黃湯

- 川芎二錢 黃芩一錢五分 甘草五分
- 右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服不拘時候三

服即止再用後藥

間河 ○大芎黃湯

川芎一錢

羌活

黃芩

大黃各一錢五

右細切作一服水一盞溫服宜和為度

間河 ○發表雄黃散

雄黃一錢

防風二錢

草烏一錢

右為細末每服一字溫酒調下裏和至心悶可服裏未和

不可服

間河 ○大蜈蚣散

蜈蚣黃赤足各一條

江鱧五錢即魚膠炒

左蟠龍

五錢炒烟尽為度即野鴿糞

右為細末每服一錢清酒調下治法依前用裏和至心悶可服但有裏証不可服次當下之用蜈蚣散四錢已豆

霜半錢飯丸如菘菹大每服一丸漸加至六七丸清酒調蜈蚣散少許送下宜利為度內外風去可服羌活湯緩緩而治不拘時候服之羌活湯者治半在裏半在裏之藥也

○大羌活湯

羌活

菊花

麻黃

川芎

石膏

防風

前胡

黃芩

細辛

甘草

枳殼

白茯苓

蔓荊子各四分

白芷各二分

右細切作一服入生姜五片水一盞半煎至一盞稍熟服不拘時日進二服

間河 ○防風湯治破傷風同傷寒表証未傳入裏宜服此藥

防風

羌活

獨活

川芎各一錢二分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○小蜈蚣散

蜈蚣黃赤足各一條

江漂三錢

右為細末用防風湯調下如前藥解表不已竟轉入裏當服左龍丸漸漸看大便硬軟加巴豆霜服之

間河 ○左龍丸

左蟠龍^炒 鐵白僵蚕^炒 鐵江鰾^{半兩}

雄黃一兩

右同為細末飯丸如梧桐子大每服十五丸溫酒下如裏証不已當於左龍丸末一半內入巴豆霜半錢飯丸如梧桐子大每服一丸漸加至以利為度若利後更服後藥若搐瘥不已亦宜服後藥羌活湯也

間河 ○小羌活湯

羌活

獨活

防風

地榆各一錢二分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服如有熱加黃芩有痰加半夏若病日久氣血漸虛邪氣入胃全在養血為度

間河 ○養血當歸地黃湯

當歸

地黃

芍藥

川芎

藁本

防風

白芷

各一錢 細辛半錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞服

間河 ○雄黃散治表藥

南星

三錢

半夏

五錢

天麻

五錢

雄黃

二錢半

右為細末每服一錢溫酒調下如有涎於此藥中加大黃為下藥

間河 ○地榆防風散治破傷風中風半在表半在裏頭微汗身無汗不可發汗宜以表裏治之

地榆

防風

地丁香

馬蔴茸各等

右為細末每服三錢溫米飲調下

○白朮湯治破傷風大汗不止筋攣手足搐搦

白朮

葛根各二錢升麻

黃芩各三不

芍藥四錢

甘草五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服不拘時候

○江鱧丸治破傷風驚而發搐藏府秘澁知病在裏宜以此

藥止之

江鱧劉炒野鴿糞炒雄黃一錢

蜈蚣黃赤足天麻半錢

白僵蚕炒

右為細末分作三分用二分以燒飯為丸如梧桐子大

如梧桐子大不用硃砂為衣每服以前硃砂衣九

硃砂為衣用一分入巴豆霜一錢同和亦以燒飯為丸

十九巴豆霜九一九第二服二九加至利為度再單服

硃砂衣九子病愈止藥

○祖傳經驗秘方治初破傷風發熱紅腫風邪將欲傳播經絡

而未入深者屢驗

杏仁研細羅白麩各等分

右以二味和勻用新汲水調和如膏付傷處腫消熱退

○一方治破傷風發熱用蟬蛻炒研細酒調一錢七服效

○安文陳珙四兄因勸聞毆眉稜骨被打破得破傷風頭面大

腫發熱予適在彼家以九味羌活湯服取汗外用杏仁搗

爛入白麩少許新汲水調付瘡上腫消熱退而愈後以此

法治若干人皆驗

○附翻花瘡一名綿花瘡

川芎各五天花粉各五

輕粉二錢雄黃

辰砂各分半

86
4926

醫酉學正傳卷之六終

射香五分 右為細末蒸餅丸如菉豆大每下服八分
○一方無川芎天花粉二味亦效

醫酉學正傳

卷之六

二十一



