醫療手引草 巻之一

加藤謙齋 著

禁帯出

研医会図書館蔵和漢書整理票	
書名	医療手引草統編
撰・編・著	加藤謙斎著
訳述・筆録	
原本年代	安永5年 1776年
再・復刻年代	
写記年代	
巻・冊数	2巻 2冊
刊・写	刊行本
形態	縦18.8cm 横12.5cm
登録番号	原簿第 頁
備記	

ケ・ワ1 31

醫療手引草 續編

整骨手引草續編序

昔時吉田意庵法印入于異域見於名醫劉純齋留學有年矣歸乎我邦而後著整骨學以教學之次第其大意以謂初學先宜講習藥性諳氣味温涼升降浮沈而某藥以治某病某證則不宜焉於是乎知病證什之二矣次宜攷求方劑審寒熱補瀉緩急標本而可用乎其病不可用乎某病如斯則知治法什之五焉因其所既知者益明病論數其所患之因與狀則所識之者至什之八矣次體玩古人之案以觀病變精脉學以窮其徵是乃下學上達也迨用之時則練熟診法以察病辨折藥性以處方此所學與所用次第不同本末先後

所以不可紊也愚謹思焉至哉此言也行遠升高必由卑而近下之藝術皆如此而醫豈外焉常怪業此業者負篋擔簽以詣乎京師見其所學則始臨素靈難經之席聞格致滌洞等之講焉此是皆至達之事也欲上達而後為下學耶未知其可矣愚雖未揀之艸醫也而欲倣意菴法印之意以由學之次第矣是以集徒弟五六輩講切近之藥性二百種許弟等記以成一書名六八木艸次撰良劑七百餘首為主方矣加減進退之則得二千八百有餘以為客方矣蓋方者則縱也其方治某病者衡也明縱則知病極衡則生方第等復記為帙名縱衡良方重說素靈難經而

僭踰乎上達之事矣豈以此為法乎誠循次第耳或問吾子之言既是矣而藝術各有師傳吾子之師者誰也曰愚始受業於名古屋丹水先生之門人小山臨節者也家書口密大抵傳焉然其術以偏乎溫補故棄而不學自患莫遵從而自名家時流之徒逮曲巷小師之技搜乎彼索乎此終得二先生學仲景之書於張璐路玉先生聞東垣之術于北山友松子先生路玉先生者清康熙中之人也友松子先生亦不幸不贅謁俱雖不有半面之識而其書存則有吾師矣宋之林億校正傷寒論金匱要略其書固非全書然後朱奉議咸無已輩註解論擇者數十家未復仲景之舊及方有執之著條辨以意例

爲非仲景之言。乃削去之。雖愈喜。然豈之明敏。蹈襲以首除矣。於是乎愈詳愈晰。造程應旄之後。條辯張隱庵之集註。出畔經背理。十顛八倒。四分五裂。卒以醫聖之經。爲塗山灰矣。微路玉先生。則仲景之書。殆幾乎烏有矣。是以論路玉先生恢復之功。而比之於王覇之業。則歷代英雄可屈指而數也。范公所謂良相之任。豈空言哉。東垣之書。含蓄甚深。而得意者稀矣。丹溪薛立齋之輩。未窺其室。況其餘乎。非本邦友松子先生者。有究心精思而後得。則和漢何人開示其蘊奧哉。嗚呼。仲景東垣者。聖也賢也。路玉先生者。長沙之復肉。南陽反魂而友松子先生者。醫門之哲匠也。愚因或問。姑雖託師名於二先生而其實者妄言耳。不堪自罪。唯俟能學二先生者而已矣。享保癸卯孟冬甲子三河烏巢道人謙齋加滕順謹書

續編引

是享保年間烏巢道人謙齋會於諸州之醫生五六輩編輯縱衡良方二十六卷之自序也今此續編就良方衡法十三卷擧全編各門每方之意記以國字者口授之草稿也或本證主用例他病活用例依諸方書載之惟恐有差謬已博洽君子幸訂之矣

明和戊子孟夏

平安　盛塘誌

續編凡例

一全編各門ノ每方ノ方意ヲ詳ニ述ス即藏書良方中ノ衡法也蓋シ某ノ證ニ某ノ藥方ヲ用ルハ縱ナリ其ノ藥方ハ其ノ證ニ用ルハ衡ナリ古今ノ方八百餘方ヲ撰ニ國字ヲ以テ方旨ヲ記ス縱衡良方上云フ夫レ方某ニ拘定スル者ハ先ノ聞活方幾千餘首ナリ名テ縱衡良方上云フ夫レ方某ニ拘定スル者ハ先輩株ヲ守リ兎ヲ待ノ謗リアリ然レ乍其謗ル者モ古今ノ方ヲ考用ト云コトナレ用テ要ヲ得レバ活方ナリ拘定スレバ死方ナリ豈待兎株ヲ守ルノ謗ヲ免レンヤ又編題言中ニ云ヘル如ク初學某品ノ能毒ヲ學ンテ其次ニ某方ヲ理會スレバ醫術ノ十ノ中ニテ五ヲ知ルナリ其カニテ病論ヲ學ベバ十ノ中ニテ八ヲ知

ルナリ其次ニ古人ノ医按上脉ヲ学テ医術十分ノ功ヲ遂ルナリ

一方後人論初學ノ理會シ難キモノハ國字ヲ以テ細書メ僻ス

一分兩後世修合ニ便ナラレメンカ為メ古方ノ分兩水ノ升合俱ニ本論本方ノ割合ヲ記シ亦今時ノ分兩煎法ヲ記ス

一每方本證主用ノ例ハ主方ヲ云ナリ

一每方他證活用ノ例ハ活方ヲ云ナリ

一每方活用ノ例此限ニアラス上云ヘル諸書并本邦先人目擊スル所ノ例ヲ以テ盡メ盡ヲガ近世見聞ノ古方者流ノ治法ヲ補記ス

平安 盛塘識 里篤甫

醫療手引草續編方目

卷之一

發表

桂枝湯一　疎邪實表湯二　麻黄湯三　升麻發表湯四
小青龍湯五　大青龍湯六　三拗湯七　芎藭散八　參藭飲九
香藭散十　行氣香藭散十一　藿香正氣散十二　不換金正氣散十三
神朮散十四　人參養胃湯十五　羌活沖和湯十六　神効沃雪湯十七
葛根湯十八　升麻葛根湯十九　柴葛解肌湯二十　香葛湯廿一　十神湯廿二

解表升麻湯廿三 治頭風疼嘔吐方廿四 川芎茶調散廿五 人參敗毒散廿六
陽旦湯廿七 茱萸鼈湯廿八 麻黃附子細辛湯廿九 麻黃附子甘草湯三十
八解散卅一 加味益氣湯卅二 芩連消毒飲卅三 牛蒡芩連湯卅四
半夏茯朮湯卅五 選奇湯卅六 消毒犀角飲卅七 葛根橘皮湯卅八
驅風觸痛湯卅九 惺惺散四十

表裏

五苓散四一 五積散四二
羌活導滯湯四三 人中黃九四四 桂枝加大黃湯四五

防風通聖散四六 雙解散四七

攻裏

小承氣湯四八 調胃承氣湯四九 大承氣湯五十 桃核承氣湯五一
三乙承氣湯五二 加味承氣湯五三 大柴胡湯五四 枳實大黃湯五五
六乙順氣湯五六 涼膈散五七 十棗湯五八 禹功散五九 瀋川散六十
三白散六一 半硫丸六二 三花神祐丸六三 三物備急丸六四 三化湯六五

湧吐

瓜蒂散六六 梔子豉湯六七 稀涎散六八 三聖散六九 一方七十

和解

小柴胡湯 七十一　柴胡桂枝湯 七十二
卷之二
風
三生飲 七十四　星香湯 七十五　攝生飲調藕合香丸 七十六　小續命湯 七十七
大蓁艽湯 七十八　加味大補湯 七十九　疎風湯 八十　省風湯 八十一　大省風湯 八十二
滌痰湯 八十三　蓁艽升麻湯 八十四　正舌散 八十五　資壽解語湯 八十六
地黃飲子 八十七　升麻胃風湯 八十八　犀角升麻湯 八十九　舒筋三聖散 九十
參歸三聖散 九十一　沉香天麻湯 九十二　天麻丸 九十三　搜風順氣丸 九十四
牛黃清心圓 九十五　清心牛黃圓 九十六　至寶丹 九十七　藕合香圓 九十八
治中風不語舌不能言方 九十九　加味豆淋酒 百　羚羊角散 百一　葛根湯 百二
痺
除濕觸痺湯 百三　羌活湯 百四　靈仙除痛飲 百五　通痺散 百六　三痺湯 百七
加減除濕湯 百八　加減潤燥湯 百九　疎經活血湯 百十　大防風湯 百十一
獨活寄生湯 百十二　清濕化痰湯 百十三　犀角散 百十四　羚羊角散 百十五
麻黃復煎湯 百十六　防已黃耆湯 百十七
寒

四逆湯 頁十八　四逆加人參湯 頁十九　茯苓四逆湯 頁二十　通脉四逆湯 頁一
通脉四逆加豬膽汁湯 頁二　當歸四逆湯 頁三　當歸四逆湯 頁四
白通湯 頁五　白通加豬膽汁湯 頁六　附子湯 頁七　吳茱萸湯 頁八
高良姜湯 頁九　桂枝附子湯 頁十　乾姜附子湯 頁一　白朮附子湯 頁二
甘草附子湯 頁三　理中圓及湯 頁四　附子理中湯 頁五　丁香理中湯 頁六
藿香安胃湯 頁七　真武湯 頁八　桂枝人參湯 頁九　甘草乾姜湯 頁十
四陽反本湯 頁十一　回陽救急湯 頁十二　溫經益元湯 頁十三　治中湯 頁十四
大順散 頁十五　冷香飲子 頁十六　漿水散 頁十七　二神丸 頁十八　薏苡附子散 頁十九
青娥丸 頁十　木香散 頁十一　益中散 頁十二　閱甫驅邪湯 頁十三
暑
香薷散 頁十四　十味香薷飲 頁十五　六和湯 頁十六　益元散 頁十七　生脉散 頁十八
清暑益氣湯 頁十九　近制清暑益氣湯 頁十　消暑丸 頁十一
濕
羌活勝濕湯 頁十二　除風濕羌活湯 頁十三　神朮湯 頁十四　升陽除濕防風湯 頁十五
除濕湯 頁十六　四苓散 頁十七　胃苓湯 頁十八　滲濕湯 頁十九　腎着湯 頁二十　滲濕湯 頁一
消導滲濕湯 頁二　當皈粘痛湯 頁三　清燥除濕湯 頁四　茵蔯蒿湯 頁五

茵蔯五苓散 百七十六
桂苓甘露飲 百七十七
經驗白朮酒 百七十八
二妙散 百七十九
劉草窓方 百八十

燥

五味子湯 百八十一
麥門冬湯 百八十二
地黃煎 百八十三
生地黃煎 百八十四
通幽湯 百八十五
潤燥湯 百八十六
清涼飲 百八十七
四順清涼飲 百八十八
滋燥養榮湯 百八十九
繅絲湯 百九十
清燥湯 百九十一
生津補血湯 百九十二
當皈養血湯 百九十三
麻仁丸 百九十四
潤腸丸 百九十五
豬膽導 百九十六
蜜煎導 百九十七

火鞕

伊尹三黃湯 百九十八
金花湯 百九十九
黃連解毒湯 二百
三黃丸 二百一
三補丸 二百二
金花丸 二百三
瀉青丸 二百四
三黃石膏湯 二百五
三黃巨勝湯 二百六
三黃梔子湯 二百七
梔子檗皮湯 二百八
大黃黃連瀉心湯 二百九
附子瀉心湯 二百十
既濟解毒湯 二百十一
龍膽瀉肝湯 二百十二
四逆散 二百十三
芍藥湯 二百十四
芩連芍藥湯 二百十五
同銘雜著方 二百十六
左金丸 二百十七
當皈龍薈丸 二百十八
瀉黃散 二百十九
香連丸 二百廿
白頭翁湯 二百廿一
瀉白散 二百廿二
東垣瀉白散 二百廿三
寶鑑瀉白散 二百廿四
加減瀉白散 二百廿五
大補丸 二百廿六
滋腎丸 二百廿七
升陽散火湯 二百廿八
當皈六黃湯 二百廿九
滋陰降火湯 二百三十
清肺湯 二百卅一
柴胡湯 二百卅二
黃芩湯 二百卅三
清火安神湯 二百卅四
清神化痰湯 二百卅五
導赤散 二百卅六

火鬱湯二百廿七　甘利水湯二百廿八　白虎湯二百廿九　白虎加人參湯二百卅　如神白虎湯二百卅一
竹葉石膏湯二百卅二　竹葉黃耆湯二百卅三　清燥解毒湯二百卅四　括蔞根湯二百四十五
金鈴子飲二百卅六　玉竹飲子二百卅七　麥門冬飲子二百卅八　蘭香飲子二百卅九　甘露飲子二百五十
連附六一湯二百五十一　清燥解鬱湯二百五十二

卷之三

補 上

四君子湯二百五十三　異功散二百五十四　六君子湯二百五十五　黃耆建中湯二百五十六　小建中湯二百五十七
內補當歸建中湯二百五十八　金匱大建中湯二百五十九　樂令建中二百六十　十四味建中二百六十一
黃耆桂枝五物湯二百六十二　保元湯二百六十三　補中益氣湯二百六十四　調中益氣湯二百六十五
升陽順氣湯二百六十六　升陽益胃湯二百六十七

補 中

參朮調中湯二百六十八　補肺湯二百六十九　濟生歸脾湯二百七十　當歸補血湯二百七十一
和劑逍遙散二百七十二　滋陰至寶湯二百七十三　二因茯苓補心湯二百七十四　機要八物湯二百七十五
十全大補湯二百七十六　人參養榮湯二百七十七　雙和湯二百七十八　聖愈湯二百七十九　加減益氣湯二百八十
保眞湯二百八十一　百合固金湯二百八十二　清心蓮子飲二百八十三　辰砂妙香散二百八十四　益元湯二百八十五
參苓白朮散二百八十六　參胡芍葉湯二百八十七　酸棗湯二百八十八　人參散二百八十九

蓼芫鱉甲散 三百 九一 獨參湯 三百 九二

卷之四

補下

人參飲 三百 九三 參附湯 三百 九四 蒼附湯 三百 九五 參蒼湯 三百 九六 黃蒼六一湯 三百 九七

人參實衛湯 三百 九八 芎朊鱉甲飲 三百 九九 錢氏白朮散 三百 參朊芍蓼湯 三百 一

真人養藏湯 三百 二 四柱飲 三百 三 六柱飲 三百 四 温脾湯 三百 五 加味柴胡湯 三百 六

益氣養神湯 三百 七 參朊益元湯 三百 八 四君子湯 三百 九 柴胡芎朊湯 三百 十

人參截瘧飲 三百 十一 參朊養營湯 三百 十二 參朊鱉甲飲 三百 十三 參連湯 三百 十四 開噤湯 三百 十五

溫脾散 三百 十六 六君子湯 三百 十七 安胃湯 三百 十八 當朊補血湯 三百 十九 參蒼湯 三百 二十

四君子湯 三百 二一 補中益氣湯加減 三百 二二 滋陰健脾湯 三百 二三 加味八仙湯 三百 二四

養血清心湯 三百 二五 四物安神湯 三百 二六 益氣安神湯 三百 二七 當朊地黃湯 三百 二八

參朊升麻湯 三百 二九 黃蒼益氣湯 三百 三十 調中益氣湯 三百 三一 補中益氣湯 三百 三二

補陰湯 三百 三三 參朊養營湯 三百 三四 黃連地黃湯 三百 三五 千金調經湯 三百 三六

大補經湯 三百 三七 加減八物湯 三百 三八 芎朊補中湯 三百 三九 補氣養血湯 三百 四十

人參膏 三百 四一 參朮膏 三百 四二 參朮膏 三百 四三 地黃膏 三百 四四 人參固本膏 三百 四五 瓊玉膏 三百 四六

五味子膏 三百 四七 二冬膏 三百 四八 白朮膏 三百 咒龜鹿二仙膠 三百 五十 崔氏八味丸 三百 五一

錢氏六味丸 三百 五三 後世八味丸 五三 加減八味丸 三百 五四 加減金匱腎氣丸 三百 五五
左皈飲 三百 五六 右皈飲 三百 五七 還少丹 三百 五八 朱砂安神丸 三百 五九 大補陰丸 三百 六十
虎潛丸 三百 六一 加味虎潛丸 三百 六二 三才封髓丹 三百 六三 天王補心丹 三百 六四 九龍丹 三百 六五
固腎丸 三百 六六 縮泉丸 三百 六七 滋營養衛湯 三百 六八 醒脾散 三百 六九 啟脾丸 三百 七十

氣

七氣湯 三百 七一 四七湯 三百 七二 大七氣湯 三百 七三 深師七氣湯 三百 七四 分心氣飲 三百 七五
三和散 三百 七六 蕪子降氣湯 三百 七七 沉香降氣湯 三百 七八 秘傳降氣湯 三百 七九 烏沈湯 三百 八十

木香流氣飲 三百 八一 二十四味流氣飲 三百 八二 嘉禾散 三百 八三 勻氣散 三百 八四 勻氣散 三百 八五
五膈寬中散 三百 八六 香砂寬中湯 三百 八七 分氣紫蘇飲 三百 八八 正氣天香湯 三百 八九
建中散 三百 九十 木香調氣散 三百 九一 木香調氣散 三百 九二 木香順氣散 三百 九三
木香順氣湯 三百 九四 分氣補心湯 三百 九五 四磨湯 三百 九六 六磨湯 三百 九七 加味四七湯 三百 九八
十六味流氣飲 三百 九九 烏藥順氣散 四百 一 八味順氣散 四百 二 舒筋湯 四百 三
氣鬱湯 四百 四 六鬱湯 四百 五 解鬱調胃湯 四百 六 柴胡抑肝湯 四百 七 平肝流氣飲 四百 八
烏苓通氣散 四百 九 疎肝飲 四百 十 推氣散 四百 十一 神効湯 四百 十二 神効七疝湯 四百 十三
和氣養血湯 四百 十四 天台烏茱散 四百 十五 開鬱道氣湯 四百 十六 上下勿消道氣湯 四百 十七

調肝散 罌 十七 紫蘇和氣飲 罌 十八 越麴丸 罌 十九 破鬱丹 罌 二十 小安神丸 罌 廿一
止痛捷法 罌 廿二 反魂丹 罌 廿三

卷之五

血

四物湯 罌 二四 芎歸膠艾湯 罌 二五 芎歸湯 罌 二六 海藏八物湯 罌 二七 桂枝桃仁湯 罌 二八
補中芎歸湯 罌 二九 却勞散 罌 三十 當歸芍藥湯 罌 三一 涼血地黃湯 罌 三二 安胎飲 罌 三三
增損四物湯 罌 三四 鱉甲地黃湯 罌 三五 四物補心湯 罌 三六 神秘加味芎歸湯 罌 三七
斃乾地黃散 罌 三八 加味逍遙散 罌 三九 四物調經湯 罌 四十 芎歸調血飲 罌 四一

犀角地黃湯 罌 四二 天門冬湯 罌 四三 茅花湯 罌 四四 止衄散 罌 四五 三黃補血湯 罌 四六
黑神散 罌 四七 地黃散 罌 四八 鬱金散 罌 四九 四物苦練葉胡附子湯 罌 五十 柴胡清肝散 罌 五一
人參飲子 罌 五二 團參丸 罌 五三 白芨桃杷丸 罌 五四 當歸散 罌 五五
沿血淋方 罌 五六
黃土湯 罌 五七 和中益胃湯 罌 五八 胃風湯 罌 五九 連蒲散 罌 六十 十灰散 罌 六一 香墨散 罌 六二
花蕊石散 罌 六三 復元活血湯 罌 六四 復元通氣散 罌 六五 一方 罌 六六 當歸活血湯 罌 六七
代抵當湯丸 罌 六八 秘傳斗門散 罌 六九 逐瘀湯 罌 七十 秦艽羌活湯 罌 七一 紅花桃仁湯 罌 七二
秦艽羌活湯 罌 七三 涼血清腸散 罌 七四 奪命丹 罌 七五 清魂散 罌 七六

瘀

二陳湯 罟 七七 道寸痰湯 罟 七八 清鬱道寸痰湯 罟 七九 加減道寸痰湯 罟 八十 五飲湯 罟 八一
橘皮湯 罟 八二 橘枳姜湯 罟 八三 前胡半夏湯 罟 八四 枇杷葉散 罟 八五 甘遂半夏湯 罟 八六
瓜蔞枳實湯 罟 八七 温膽湯 罟 八八 加減温膽湯 罟 八九 加味温膽湯 罟 九十 三因温膽湯 罟 九一
十味温膽湯 罟 九二 青州白圓子 罟 九三 滾痰丸 罟 九四 沉香化痰丸 罟 九五 運痰丸 罟 九六
消痰餅子 罟 九七 潤下丸 罟 九八 指迷茯苓丸 罟 九九 杏仁五味子湯 五百 消風散 吾 一〇〇
金沸草散 吾 一 貝母湯 吾 二 加味二陳湯 吾 三 清痰順氣湯 吾 四 五虎二陳湯 吾 五 六
藕況九寶湯 吾 六 定喘湯 吾 七 二陳湯 吾 八 二陳湯 吾 九 茯苓半夏湯 五百 十一
清胃保中湯 吾 十二 小柴胡湯 吾 十三 黄連竹茹湯 吾 十四 茯苓半夏湯 吾 十五 二陳湯 五百 十六

星半湯 吾 十七 清鬱二陳湯 吾 十八 清鬱豁痰湯 吾 十九 治吐清水 二十 化痰清火湯 吾 二一
二陳湯 吾 二二 清心抑膽湯 吾 二三 二陳湯 吾 二四 二陳湯 五百 二五 半夏白朮天麻湯 五百 二六
清暈化痰湯 吾 二七 芎朮姜桂二陳湯 五百 二八 臂痛湯 吾 二九 參合湯 吾 三十 順和湯 五百 三一

食

平胃散 吾 三二 對金飲子 吾 三三 香砂平胃散 吾 三四 香砂六君子 吾 香 三五 砂 養胃湯 吾 三六
香砂二陳湯 吾 三七 枇杷葉湯 五百 三八 葛花解醒湯 五百 三九 和中湯 吾 四十 九味清脾湯 吾 四一
七味清脾湯 吾 四二 枳朮丸 吾 四三 保和丸 吾 四四 枳實道滯丸 五百 四五 紅丸子 三百 四六

卷之六

痞滿水腫

消痞散 五百 四七 養胃湯 五百 四八 加減補中益氣湯 五百 四九 大消痞丸 五百 五十 實脾飲 五百 五一
加減胃苓湯 五百 五二 五皮散 五百 五三 加味五皮湯 五百 五四 分氣香穌散 五百 五五 木香多氣湯 五百 五六
消導實中湯 五百 五七 調胃白朮澤瀉散 五百 五八 白朮木香散 五百 五九 疏鑿飲子 五百 六十
導水茯苓湯 五百 六一 道滯通經湯 五百 六二 當皈散 五百 六三 實脾飲 五百 六四 理苓湯 五百 六五
復元丹 五百 六六 沉香琥珀丸 五百 六七 香砂和中湯 五百 六八 厚朴七物湯 五百 六九 沉香散 五百 七十
木香散 五百 七一 中滿分消湯 五百 七二 中滿分消丸 五百 七三 經驗大橘皮湯 五百 七四 忽忘氣飲 五百 七五
補中治濕湯 五百 七六 索氏三和湯 五百 七七 紫蘇子湯 五百 七八 平肝飲子 五百 七九 強中湯 五百 八十
參香散 五百 八一 温胃湯 五百 八二 參朮健脾湯 五百 八三 啟峻湯 五百 八四 壯原湯 五百 八五 當皈活血散 五百 八六
散血消脹湯 五百 八七 和血通經湯 五百 八八 琥珀入參丸 五百 八九 柴胡湯 五百 九十 化積湯 五百 九一
加味補中益氣湯 五百 九二 參民陰陽攻積丸 五百 九三 天仙藤散 五百 九四 澤瀉湯 五百 九五
木香槟榔丸 五百 九六 消痞飲 五百 九七 淨府湯 五百 九八

利水

八正散 五百 九九 五淋散 六百 一百 必効散 六百 一 猪苓湯 六百 二 通關丸 六百 三 清肺飲子 六百 四
加味五苓散 六百 五 括蔞瞿麥丸 六百 六 生附子散 六百 七 參苓琥珀散 六百 八
海金砂散 六百 九 地髓湯 六百 十

面

升麻黃連湯 六首 十二 升麻附子湯 六首 十三 清上防風湯 六首 十三 鼠粘子散 六首 十四

耳

桂星散 六首 十五 滋腎通耳湯 六首 十六 犀角飲子 六首 十七 蔓荊子散 六首 十八 治玉耳風方 六首 十九

梔子清肝散 六首 二十

眼

洗肝散 六首 二一 大明散 六首 二二 養心明目湯 六首 二三 瀉火升陽湯 六首 二四 物龍騰湯 六首 二五

東垣瀉脾黃連湯 六首 二六 消毒飲 六首 二七 羌活勝風湯 六首 二八 人參補胃湯 六首 二九

冲和養胃湯 六首 三十 加味十全大補湯 六首 三一 龍氏曰日晡 六首 三二 一方 六首 三三

助陽和血湯 六首 三四 益氣聰明湯 六首 三五 參芪湯 六首 三六 火服不愈 六首 三七 石決明散 六首 三八

除風益損湯 六首 三九 夜明橘皮湯 六首 四十 年少雀目 六首 四一

鼻

麗澤通氣湯 六首 四二 辛夷散 六首 四三

口

涼膈散加減 六首 四四 甘露飲 六首 四五 綠袍散 六首 四六 王損庵曰 六首 四七 龍氏曰上焦 六首 四八

玄參升麻湯 六百 四九
清鞕化痰湯 六百 五十
薛立齋曰 六百 五一
牙齒
清胃散 六百 五二 加味清胃散 六百 五三 清胃保中湯 六百 五四 甘露飲 六百 五五 定痛散 六百 五六
當皈連翹湯 六百 五七
唇
薏苡仁湯 六百 五八 王損庵曰 六百 五九
咽喉
甘桔湯 六百 六十 清咽利膈湯 六百 六一 清涼散 六百 六二 利膈湯 六百 六三 滋陰降火湯 六百 六四
加味益氣湯 六百 六五 王損庵曰 六百 六六 奇方 六百 六七 硼砂丹 六百 六八 烏龍膏 六百 六九
蟲蝕
理中安蚘湯 六百 七十 椒梅湯 六百 七一 大七氣湯 六百 七二 烏梅丸 六百 七三 集效丸 六百 七四
膠艾荊皈湯 六百 七五
癰疽
癰疽初發 六百 七六 荊防敗毒散 六百 七七 內疎黃連湯 六百 七八 五香連翹湯 六百 七九
托裏榮衛湯 六百 八十 活命飲 六百 八一 皈者飲 六百 八二 四順清涼飲 六百 八三 參蒼內托散 六百 八四
千金內托散 六百 八五

瘍瘍

潰瘍膿潰而宜公六 清瘵消毒湯宜八七 潰瘍十宣散六百八八 千金內托散六百八九

竹葉黃耆湯宜卒 補中益氣湯宜九一 托裏溫中湯六百九二 托裏和中湯宜九四 托裏建中湯六百九五 托裏定痛散宜九六 凡瘡瘍兼六百九七 一法六百九八

瘡瘍秘方宜九九 凡瘡瘍一切七百

疔

追疔奪命湯七百一 一方七百二 扶毒方七百三 凡疔癰七百四

凡疔癰有七百五 疔癰熱甚七百六 一法用七百七

瘰癧馬刀氣腫瘀核

十六味流氣飲七百八 木香流氣飲七百九 山錫杖湯七百十 一方七百十一 一方七百十二

流注

夫流注七百十三 十全大補湯七百十四

風毒腫

人參敗毒散七百十五

下疳

消斑敗毒散七百十六 龍膽瀉肝湯七百十七 數方七百十八

楊梅瘡結毒

消風敗毒散 七百 十九 二十四味風流飲 七百 二十 搜風解毒湯 七百 二一 瘡毒後狂亂 七百 二二

瘡毒後一身 七百 二三 因遺毒 七百 二四 遺毒下血 七百 二五 瘡毒或遺毒 七百 二六

便毒

便毒痛甚 七百 二七 黃耆內托散 七百 二八 一方 七百 二九 又方 七百 三十 敷方 七百 三一 又方 七百 三二

又方 七百 三五 一法 七百 三四

疥瘡

升麻和氣飲 七百 三六 疥瘡因誤治 七百 三七 一法 七百 三八

便毒血虛 七百 三五

癬瘡

敷方 七百 三九 神授衛生湯 七百 四十

臁瘡

敷方 七百 四一 臁瘡先用 七百 四二 一法 七百 四三

瘧風

敷方 七百 四四

瘰癧

敷方 七百 四五 防風通聖散 七百 四六

附骨疽
附骨疽者 七百四七　八物湯 七百四八
多骨疽
多骨疽者 七百四九　八味丸 七百五十
囊癰
囊癰者 七百五一　龍膽瀉肝湯 七百五二
懸癰
懸癰者 七百五三　龍膽瀉肝湯 七百五四

臀癰
臀癰者 七百五五　内托羌活湯 七百五六
陰癰
婦人陰癰 七百五七　加味逍遥散 七百五八
傷寒發顚
傷寒發而又 七百五九　十全大補湯 七百六十
雜方
和漢經驗方 百餘方

總八百餘方

三河　滕謙齋烏巢先生著

男　平安　玄順懿之　校補
門人　越前　尾崎正龍　再校
南部　前田元常　全
大和　伊藤元春　全
阿波　渡邉玄立　全
同州　堀　順伯　全

發表

桂枝湯一寒

桂枝三兩　芍藥三兩　甘草二兩　生姜三兩　大棗十二枚

右五味咬咀以水七升微火煮取三升ヲ仲景ハ後漢人ナリ漢時ノ一兩ハ今日本ノ秤三

戔三分ナリ大棗モ日本ノ棗ニヨリハ一倍ホドモ大ナリ約スルニ二十五枚ホドナリ五味合テ秤三十七戔目ナリ外ニ大棗二十五ホド此ヲ四升煎シ減ジ三升ヲ取用漢ノ一升ハ和ノ一合五六タナリ然レバ七升ハ和ノ菜茶碗一合五六タホドヅヽ七杯ナリ此ヲ四杯煎レ減レ三杯ヲ取用和升四合ハタナリ和常例ノ煎法ナレバ菜茶碗二杯ニ菜目十戔余レ減ス甚タ濃キ煎法也去滓適寒温服一升服已須臾歠熱稀粥一升餘以助茶力温覆令一時許遍身漐々微似有汗者益佳此ナレバヤスクヨシレサレモソレヨリ多ク出ルコモアルベレ不苦不可令如水流漓病必不除ナガレシタヾルヨウニ多ク汗スルハアシヽ病必反テ不除盡劑俗ニ一度用ルト云コ濃キ菜ヲ一度ニ一合五六タモ用ルホドニ大抵一度ニテ差ルソレナレバアトハ用ルニ及ナリ若不汗更服依前法モトヨリ汗アル症ナレバ菜カテ汗ノアンバイガ違フモノ今ノ出ルト病デ汗ノ出ルトハ出ヨウバイナリソレナラバ更ニ菜ヲ用テ三ヨ此アンセズバ又不汗後服小促役其間半日許令三服盡菜ヲ小促役トヨ大抵ハ半日ニ一度用ルト三ユル也若病重者一日一夜服一劑一升三合和升ヲ一日一夜ニ用ル大抵ナレバ一劑ヲ二日ホドニモ用ルナリ周時ヒルニ一時觀之容躰ヲ見ル服一劑盡病證猶在者更作服又一度若汗不出者乃服至二一劑ヘデモアンバイヨク汗ガ出テ不差ニ三劑モ用ルコモアリ禁生冷粘滑肉麪五辛酒酪臭惡等物此ガ菜ニ反スルモノデモ無レ妬此類ヲ飲食スレバ菜ノ功ガナイモノナリ

張璐曰此方專主衛受風邪之證以其衛傷不能外固而自汗所以用桂枝之辛發其邪即用芍藥之酸助其陰然一散桂枝一收芍藥又須甘草以和其胃況發汗必須辛甘以行陽故復以生姜佐桂枝大棗佐甘草也又曰按桂枝入心血藥也而仲景用以治風傷衛之證麻黃走肺氣藥也而仲景用以治寒傷營之證皆氣病用血藥血病用氣藥故許學士有脉浮而緩風傷營浮緊無濡寒傷衛之誤殊不知風傷衛則衛受邪衛受邪則不能內護於營故營氣不固而自汗必以桂枝與芍藥透達營衛又須芍藥護營固表營衛和而自汗愈矣寒傷營則營受邪營受邪則不能外通於衛故氣鬱而無汗必以麻黃氣藥開通腠理又須桂枝實營散邪汗大泄而鬱熱散矣

此葉冬月正傷寒表證太陽膀胱經中風頭痛項強發熱惡風汗出濇々惡寒漸々惡風翕々發熱鼻鳴乾嘔者主之

○服法如本書此後漢ノ分量ナリ後世ハ異邦モ段々違テクル況ヤ日本ヲヤ時代土地風俗ニテサ〻クノ遠アリ一定ノ法ナシトイヘ仲景ハ方祖ナリ卷首ニ載ル方ナレバ如是詳ニ記メ上代ノ方ヲ見セ令ルナリ

○此方意ヲ考ルニ桂枝ハ發汗解表ノ葉ナリ芍葉ハ補助陰收

飲スル一散一收ノモメヤヒニ〻ノ微汗ニツレテ風邪去ル此症モトヨリ汗出ルト云ヘ𪜈ハヅミナレニ汗ノ出タ計ニテハ邪ハ不去モノナリ一散一收ノモメアフハヅミニテ汗ニツレテ邪去ルナリ甘草生姜大棗ヲ佐トスル訣張璐ノ説ノ如シ○上ニ挙ル営衛氣血風寒ノ論許叔微ガ誤ヲ正スヌ又麻黄湯ノ下ニモ此議ヲ論シ汪石山李瀕湖ガ説ヲ載スル右ノ論イカフムツカシキ論ニテ傷寒論デ無レバスマヌ故略之予竊ニ説アリアノ如クムツカシク論メハ未熟ノモノ意得ガタシ先何ノコナシニ麻黄桂枝ノ二味𪜈ニ辛溫發汗ノ菜ナリ麻黄ハツヨク発汗シ桂枝ハヤワラカニ発汗ス麻黄ハ瀉菜桂枝ハ補菜也営衛ノ差別ナシニ皆発汗ノ菜ナリ桂枝湯ハ芍菜ト同用メ解肌ノ菜トスルナリ麻黄湯ハ瀉剤ナリ桂枝湯ハ補剤ナリ虚弱ノ人ニハ麻黄湯ヲ用ベキ症ト云ヘ𪜈桂枝湯ニ加減メ可用也

凡小建中湯黄耆建中湯當歸建中湯等ノ補剤ハ皆此方ヨリ來レリ後世氣血兼補ノ剤ハ皆建中湯ノ意也仲景此方ヲモツテ傷寒開巻第一ノ主剤トスル微意自ラ存ス仲景ハ百世ノ方祖ナリ桂枝湯ハ仲景ノ方中ニ於テ示方祖ナリ

此方本證主用例

此湯ヲ與ヘテ風邪不解(ゲセヌ)反テ煩熱スルニハ風池風府ノ穴ヲ刺(サシ)テ督脉ヲ通ズレバ差(イエ)若シ菜デ加減セバ羌活細辛藁本ヲ加テ刺法ニ代ルナリ○麻黄湯其外發汗ノ菜ヲ用テ一旦解シテ後半日計スギテ復脉浮數煩熱セバ重子テ強ク發汗スルニハアシ、用此湯補フナリニ發汗スベシ○汗吐下ノ後身疼不止表

證不解此湯ヲ與ヘテ営衛ヲ調和スベシ再ビ麻黄湯ノ類ハ不可用○大汗出テ後脉ナホ洪大ナルモノニハ復此湯ヲ與フベシ○若如瘧一日ニ二度計發スル者ニハ桂枝湯ニ貼麻黄湯一貼合劑ニメ與レバ汗出テ癒ユ此ヲ名桂枝二麻黄一湯○病人煩撩汗出レバ解ス又如瘧午後ヨリ發撩スルハ陽明ノ症トナル脉實ナルモノハ府症ナリ下劑ヲ用ベシ脉虚スルモノハ經証ナリ此湯ヲ與ヘテ發汗スベシ○病人身太寒衣ヲ近ケンコトヲ不欲ハ其人素リ熱ヲ畜ヘテソレヲ寒邪デ閉テ内ニ鬱スルナリ寒ハ皮膚ニアリ熱ハ骨髄ニアリ此湯加黄芩○風傷衛之證中ニワヅカニ陽明ノ一症ヲ見サバ此湯加葛根寒傷榮之證中ニワヅカニ陽明ノ一症ヲアラハサバ麻黄湯加葛根○傷寒六七日不大便頭痛有熱モノニハ承氣湯ヲ與フ若小便ガ清ムナラバ表証ナリ可發汗若頭痛ノアルモノハ必衄血スルモノナリ可用此湯○發汗ノ藥ヲ用テ後惡風シ小便難ク四肢スクミヒツハルニハ此湯加附子○三陰轉ノ肌表ニ出ルヿアリ太陰ノ証轉ズルハ脉浮ナリ此湯ニテ發汗ベシ○少陰ノ中風ト云ヿアリ唯寒ヲ恐レテ厥冷セス病人自云ハ腹ガ滿ルト云ソレヲ按レテミレバヤハラカナリ大便秘シ小便頻數吐セントシ欲メ不吐卧メ起ント欲スル恍惚多數ノ鐵ノ様ニテ食スレバツカヘル舌上灰黑或淡紫帶青脉弦細浮弱此ガイカフムツカシキ症ナリ傷寒論ニハ無レ此ヲ湯ニ葱白生附子ヲ加ルナリ

此方雜病活用例

感冒　凡冬月ノ感冒通ノ此湯ニ加減シテ用ベシ　風濕　一身重着痛楚不能轉側風濕ナリ此湯加ニ附子ニ

邪三陽經ニ客スレバ頸項強ク痛ム寒邪ナレバ筋急ナリ風邪ナレバ筋弛ル此湯加葛根然レ共痙痓忘ニ此ガ多キモノナリ二陳湯加酒黄　腰痛　腰痛兼ル外邪ニハ用此湯表邪ヲ解スレバ裏氣芎羌活紅花　ガ疏通シテ痛ミ少シ緩ル寒邪ニハ加附子

欬嗽　感風欬嗽スルハ脉浮惡風自汗或身躰發熱鼻塞リ或清涕流清涕語未竟ノ欬ス但シ風欬ハ酒後風ニ中リ汗多ノ嗽ス痰飲ヒ火欬ハ急ニ欬ノ痰無シ白朮麻　同　此ヲ漏風ト云此湯加澤瀉黄根　同　惡風ノ欬嗽スルニハ此湯加人參杏仁五味子喘ニハ此湯加杏仁嗽ニハ加五味子渇ニハ加人參　同　陰虛

火動ノ人客邪アツテ欬嗽者此湯加牡丹皮牡丹皮ハ陰虛ノ潟火ヲチニ辛味アツテ解表ヲ兼子極メテ良法ナリ　虛損

下焦虛ノ精滑遺精ナド　同　宋麗安常云桂枝湯ノ病症ハ常ニ自スルニ此湯加龍骨牡蛎　同　汗出テ小便不數手足温和ニ手足ノ指外ヘ露ルレバ少シ冷ル此ヲ覆ヘバ温ニナル渾身熱シ微煩メ又憎寒ス始メテ可用此湯○謙云此虛寒ノ症ナリ如此ノ病症ナレバ誰ニテモ桂枝湯ヲ用ベシ隨分タレカナル云分ナリ此症アツテ始テ此湯ヲ用ヨト云ハアニリ用心深キヤウナレ共渾身熱シ微煩スルト云ニ若シ熱症デハナイカト疑アツテ不用ユモアルベシサレ共熱症ニテハナイホドニ無疑可用ナリ　霍乱　冬月或初春暮秋霍乱吐利止デ身痛不止モノハ此湯ヲ小劑ニシテ用ユベシ　婦人陰腫　婦人陰門腫痛スルハ風

熱陰經ニ客タリ此湯加羌活防風荊芥當皈細辛木通悪阻婦人悪阻ニ此湯ヲ用ルコトアリ小兒傷寒小兒發熱時ニ遍身痒キハ此表虚ノ中風寒也此湯加黄耆防風白芷蟬脱小兒陰腫小児強啼テ不止陰器ヲ動シ結聚メ不散睾丸腫レ大イナル者ハ此湯加細辛當皈木香蝦蟆瘡瘡身面起發メ四肢不悪寒身痛面青癢不收モノハ風ヲ引タルモノナリ此湯加黄耆防風同瘡癢可掻トキ發熱

此湯不可用例

其人素多濕熱モノニ此湯ヲ用レバ吐スルモノナリ後ハ吐膿血コトアリ若不濕熱シテ此湯ヲ用テ吐スルナラバ加半夏ト戴元禮が云ヘリ○酒客ニハ不可用此湯酒客ハ不善甘故ニ嘔吐スルモノナリ謙云甘キヲイヤガルト計デモナシ酒客ニ用レバ嘔吐せずト云ヘル胸ガトキくスルト云モノナリ

傷寒

疎邪實表湯 陶

治冬月正傷風頭痛發熱悪寒脊強脉浮緩自汗為表證此足太陽膀胱經受邪當實表散邪無汗者不可服

桂枝 芍藥 甘草 防風 川芎 羌活 白朮

水二鍾薑三片棗二枚搥法六書中殺車搥加膠飴二匙煎之溫服○如汗不止加黄耆○喘加柴胡疑前胡歟杏仁○胸中飽悶加枳殻桔梗此方陶節菴ガ仲景ノ桂枝湯ニ加味シタルモノナリ回春等ニハ陶氏桂枝湯ト称ス陶氏ガ意ハ方下ニ云如ク正傷寒ノ藥ナ

麻黄湯三 寒

麻黄 杏仁各一兩二分 桂枝八分 甘艸四分

右四味以水二盞四分先煮麻黄減二分去上沫入諸藥煎六分
温服覆取微似汗不須啜粥此モ本方ノ刻合ノ分兩ナリ四味
勺ニ煎シ滅スレバ桂枝湯ニ比スレハ尚々濃キ煎湯ナリ此
モ時方ニ隨ヒニ貼ニ分チ一夕ハ分ト〆水四杯入一杯ニ煎
シ三度ニ用ベシ此湯發汗強キユヘ熱粥ヲ啜テ藥力ヲ助ク
ルニ不及ナリ餘ハ桂枝湯ノ服法ノ如シ本論ニ詳ナリ
張璐曰夫寒傷營則營血受病而見骨節煩疼營血寒邪ヲ受凝テ不流故ニ骨節煩疼

レ𪜈正傷寒ニハ原方ノ桂枝湯デヨヒ此様ナ雜駁ノ藥ハ用ヒラレヌ畢竟感冒ノ藥ト意得ベシレ故ニ此書ニハ感冒門攝入ス○方意此方桂枝湯ニ加味羌活防風川芎白朮丹水子纂言方考云肝風恐傳脾土加白朮助脾土大陽惡風頭痛不可無川芎羌活防風ト云ヘリ予云此方考以レアラク見ユル羌活川芎ト同用スレバ太陽厥陰ノ頭痛ヲ治ス防風ハ足太陽ノ治風去濕ノ仙藥ナリ白朮燥濕補脾凡此藥陶氏ガ意ハ傷寒ノ藥ト云ヘ𪜈今活メ感冒ニ用ヒンナラバ風邪ニ兼濕症ニ用ベシ羌活防風ハ除風濕藁川芎モ又除濕治頭痛藥ナリ白朮ハモトヨリ燥濕ノ藥ナリ扨桂枝湯ニ加減メ用ヒンナラバ此方ニ限ルコニテハナシ臨時因症種々ノ加減アルベシ詳ニ升麻發表湯ノ下ニ論ス考ベシ丹水子桂枝湯ニ加味ノ和解湯ヲ制セラレタリ上編

ス尤レリ當矣其筈ノナリ當ニ何反勝理閉密無汗而喘耶衛ニ病ハナイニコトスルナリ蓋營既受傷於內必無衛氣獨和於外之理營ガ內ニ寒邪ヲ傷ラルレバ衛氣カニヒナレニ外ニ和メ有ルベキ道理ナレ所以用麻黃發汗必兼桂枝以和營用杏仁者所以散氣除喘用甘艸者所以助陽和衛營衛流行始能作汗也按時珍云仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝歷代名醫未有究其精微者夫津液為汗卽血也在營卽為益在衛卽為汗寒傷營營血不能外通於衛衛氣閉固故無汗發熱而惡寒風傷衛衛氣不能內護於營營氣不固故有汗發熱惡風以正麻黃湯

雖太陽發汗重劑實為發散肺經火鬱之藥正氣內ニ鬱閉スレバ熱トナツテ火邪肺經ニ鬱スルナリ桂枝湯雖太陽解肌輕劑實為理脾補劑ナレバナリ救肺之藥也又汪石山云辛甘發散為陽此甘草ヲ用ル意ヲ說ク仲景發表藥中必用甘草以戴在邪氣不使陷入陰分也若邪既入裏則モハヤ裏ニハレバ表ヲ發スルコトハイラヌ內臟脹必無復用甘草之理試觀五苓抵當承氣大柴陷胸十棗輩並不用甘草也惟調胃桃核二湯此二方ハ重症ノ藥ト云ヘドモ甘草ヲ用ユル訣ハニタ太陽ノ表邪ヲ兼ルナリ以其尚兼太陽部分之表邪故不得不用也當知發汗藥中之甘草必不用少 兎角發散ノ葉ニハ必甘草ヲ少クト云フハナシ

此湯麻黄湯也須脉證全在於表方可用之脉不緊而
若脉微弱自汗者不可用也麻黄湯ヲ用ベキ症ナレドモ
表並宜發汗設尺中弦數虚大此麻黄湯ヲ不可用ノ脉ナリ為陰虚多火汗之
則亡陽熱厥而死尺中遲弱足冷為陽虚夾陰夾虚寒症ナリ汗之則亡
陽厥逆而死可不慎歟

此条冬月正傷寒太陽膀胱經ノ證頭痛項強リ悪寒發熱身疼腰
痛嘔逆脉浮緊無汗喘者主之此即麻黄湯正面ノ的證ナリ
○方意張璐說ニ詳ナリ寒邪営ヲ傷リ営血凝テ不流衛氣ト不
和然ルニ内営血ガ傷ルヽカラハ衛氣モ邪ヲ受ズカヽヒナヒ
ト云理ナレ衛氣モ又寒邪ノ為ニ鬱閉セラレテ邪熱トナルソ
レガ内ニ攻デ肺氣ガ沸鬱ス麻黄ハ發汗皮毛ノ氣ヲ温メ去邪
泄寒實故ニ麻黄ヲ主トシ桂枝ト同用メ営分ノ邪ヲ引出シ肌
表ニ達スニ味モニ發汗ノ要薬ナリ杏仁ヲ用ユ杏仁ハ潤下ノ性喘逆ヲ止ル甘草ハ助陽氣和衛氣
流下メ始メテ能汗ヲナスナリ

此方本證主用例

此湯ノ證ニメ病八九日ニデ不解モ病仍太陽經ニアルホドニ
用此湯發汗メ愈ユ若此湯ヲ服シ已テ煩熱目瞑シ劇モノハ衄
血ス病欲解ナリ○太陽陽明ノ合病喘メ胸滿ルモノ表ニ屬ス
此方ヲ用テ發汗メヨシ○病人身大熱反テ衣服ヲ近ケンコヲ欲
スルハ熱皮膚ニアリ此素リ虚寒ノ人邪ニ感メ

皮膚熱ストイヘドモ寒骨髓ニアリ用此湯發汗スベシ○小兒ノ傷寒發熱欬嗽頭面熱者

千金方用此湯加石膏

此方雜病活用例

濕家身煩疼此湯加白朮四兩名麻黃加朮湯 戰慄 凡人陽虛ハタバ畏寒又陽鬱スレバ振寒戰慄スルモノナリソレデ戰慄ハ木抵熱ニ屬ス若又暴ニ寒邪ニ中テ 衄血 太陽ノ衄血及ビ服桂枝湯血脈伏メ戰慄セバ此湯ヲ用テ發散スベシ

血スルモノハヨキコトナリ邪自ラ解セントスルナリ衄メ血流ル、モノハ少刻ノ間ニ解ス若點滴メ不流モノハ邪氣經ニアツテ不解脈浮緊身疼發熱無汗者ハ用此湯汗之若三時ノ感冒ナラバ香薷飲加葱白淡豆豉或參蘇飲ニテ汗之若脈浮緊ナラズ身無熱モノハ不可發汗

風毒腫 盧藤夫云一人形實ニ色黑ク背ニ生紅腫解骨ノ下ニ近ク痛甚ク脈弦數ニメ洪緊正冬ノ月ナリ麻黃桂枝湯加酒黃栢生附子括蔞仁甘草節羌活人參青皮黃芩半夏生姜六貼ニシテ消ス 瘡 李挺云瘡初起煩躁メ喘急セバ加萊白皮及麝香一厘或黃芩湯加麻黃桂枝 中風 老医傳云一男冬日行長途手足攣痙惡寒頭痛胸膈疼痛喘滿面赤大便不通小便澁滯脈緊有力用此湯四貼汗出病症咸退脈浮煩渴引飲微斡用升麻葛根湯二貼煩渴微斡止頭微痛微欬加川芎白芷謙按此症初用麻黃湯者喘滿脈浮緊有力ヲ目アテトス

升麻發表湯四 陶 治冬月正傷寒頭痛發熱惡寒脊強脈浮緊無汗

為表證此レ足太陽膀胱經受邪當發汗以頭如斧擊身如火熾者宜用此湯　麻黄　桂枝　甘草　杏仁　升麻　川芎　防風　白芷　羌活　水二鍾姜三片葱白二莖雄法加汗西荳豉一撮煎之熟服取汗如神宜厚被覆首尤中病即止不得多服多則反加別病矣○本經發熱惡寒頭痛無汗而喘者本方去升麻加乾葛（升麻ヨリ乾葛ガ發表力勝レリ）方加蒼朮芍薬去杏仁（身ノ痛ハ兼濕ユヘ二蒼朮除濕ノ薬ナリ芍薬ノ收斂不レ使多汗濕症ハ急ニ汗ノ出ルヲ○本經惡寒發熱身痒面赤者以其不得小汗出故也

本方去白芷升麻杏仁加柴胡芍薬（此三味ヲ去ルニヨリテ思汗鬱メ身痒面赤レ加ニ入ハナイ此症汗不レ足故ニ芍薬涼血栄胡ハ解熱ノ薬ナリ）加枳殻桔梗（枳殻快ク胸膈ヲ○本經頭痛發熱惡寒忽然飽悶者本方二三劑而汗不レ出者死○本經汗後不解者宜再服量證輕重用麻黄升麻分多寡為當（麻黄ハ太陽ノ薬升麻ハ陽明ノ薬ナリ）

方意陶氏カ意ハ傷寒ヲ治スト云ヘ共今按スルニ冬月感冒ノ重キ症頭痛スグレテ甚シク熱熾ルガ如キ症ニモチユベシ○丹水子云此麻黄湯ニ加味シタルモノ、ソレ即太陽經ニアレバ川芎羌活不可無悪寒アルモノハ必悪風アリ防風不可無升

麻白芷ハ陽明經ノ葉ト云ヘ𪜈能散邪ヲ達外又頭痛スルモノハ必陽明經ノ頭痛ヲ兼ルモノナレバ用ト云云

○疎邪實表湯 升麻發表湯ノ二方ハ陶節庵カ即仲景ノ桂枝湯麻黄湯ニ加味シタルモノナリ是ニツイテ丹水子纂言方考ニ論ヲ設テ為說友松子其說ヲ評議メ其非ヲ格ス纂言方考ノ頭書ニ詳ナリ謙兩子ノ說ヲ熟覽スルニ丹水子メ說旨ハヨシト云ヘ𪜈語ニ病アリソレユヘ友松子ノ為ニ非トセラル友松子ノ說ツイル所感冒ノ葉トスルニ似タリ尤サモ有ルベキコトナリ謙重子テ謂ヘリ陶節庵カ仲景ノ方ニ加味メ改名テ一方ト立ルコト此ニ方ニ限ラズ小柴胡白虎理中湯ノ類皆如是仲景ハ大匠ニメ其本ヲ治スレバ標ハ不治メ自ラ愈ルタトヘバ太陽ノ症桂枝湯麻黄湯ヲ用テ其風寒ヲ去レバ頭痛發熱等ノ症自ラ除クナリ陶節庵カ細エニ標本兼治ス傷寒ハ重病ナリ其本ヲ治メモ仍葉カノトバカザルラズ發レバ陶氏カ方ハ傷寒ノ輕症ニ可用故此ニ方ヲ感冒門ニ攝入スルナリ

小青龍湯 五 寒

麻黄　各三分　芍藥　乾薑　甘草
桂枝　細辛　五味子　半夏　各六分

右八味以水二盞先煮麻黄減二分去上沫入諸葉煎六分去渣温服之　若微利者去麻黄加芫花一錢二分（炒今赤色）　本方ハ發散ノ葉ナリ若大便微泄者去麻黄加利水藥芫花ハ利水ノ藥ナリ　若渴者去半夏加括蔞根三分

若噎者去麻黄加附子三分炮水寒ノ氣裏ニ相搏
不利小腹滿去麻黄加茯苓四分○若喘者去麻黄加杏仁三分
此モ本方割合ノ分兩ハ味合ノ三ゑヲ水二合ハ六勺ニ煎ス
ヤハリ時方ニ隨ヒ二貼トノ一ゑ五分ヲ水三杯ハ一盃ニ煎
レ三度ニ用ルナリ麻黄ハ後世上沫ヲ去リ制スレバ先ツ麻
黄一味ヲ煎レニ分ヲ減レ上沫ヲ去ルニ不及下皆倣之
此藥太陽ノ正傷寒脉浮緩自汗身不痛但重ク乍輕キ時アリ少
陰ノ症無ク或乾嘔或欬或渴或利或噎或小便利腹滿或喘心下
有水氣者此湯主之此即此湯正面ノ的症ナリ蓋シ仲景風ト寒
トヲ辨別スルコ窺メテ嚴密ナリ間ニ不容髮中風ニハ桂枝湯
ヲ用井傷寒ニハ麻黄湯ヲ用ユ此卷首此二方ヲ以テ風寒ノ邪
ヲ治スル兩大門ナリ然ルニ風寒相交テ邪ヲ受ルモノアリ此

青竜湯ノ立ツル所以ナリ其中寒多風少キモノアリ大青竜湯主
之風多寒少キモノアリ小青竜湯主之此湯ハ風寒ノ為ニ營衛
ヒニ傷レ風多寒少キモノニ用之其症脉浮緩身不痛ハ風ナリ
身但重キハ寒ナリ乍輕キハ風多寒少ノ候ナリモ一
ツソコニ念ヲ入レテ少陰ノ證無キモノト云ハ少陰ノ証モ身
重ナリ但レ少陰ノ証ハ身重ク但欲寐
ナリ此湯ノ症ハ重キ片モアル欲寐コハモト
ヨリ無レ此指レ極タ此湯ノ本証ナリ此外或乾嘔レ或欬ス或
或ノ証ハ此内ニ一二三証モアルヘシ不發ソロヘテアルコデ
ハナイ此内ドレガアルト定リタルコモナイソレユヘ或々ト
云ナリ水ト寒ト相搏テ其肺ヲ傷ル人身ニ積畜ル所ノ水飲ガ
或升リ或降リ或熱レ或冷ヘ種々不同ト云ヘ肺ヲ惣司トス

ルナリ病本風多寒ノ証ユヘニ桂枝湯ヲ用テ散風邪加麻黄治
寒邪水飲ガ滞テ欬嗽スルユヘニ用半夏治水飲ナゼニ水飲ガ
滞ルナレバ人ノ肺ノ藏ハ常ニ水液ヲ停ル其肺液ガ升レハ清
湫トナリ降レバ心下ニ留テ水飲トナル其上ノ症欝熱ニ因テ
咽ガ乾ク必湯水ヲ多ク飲ムモノナリ細辛干姜ヲ用テ水飲ノ
結ヲ散シ加五味子欬嗽ヲ治ス尚加減ノ法本文ニ詳ナリ

此方本證主用例

水飲ハ肺ノ液ナリ肺金ハ水ヲ生スルヲ主トス皮毛ハ肺ノ合
ナリ風寒皮毛ヲ傷レバ肺先受之其水液ヲ下焦腎ヘ行ルヿ能
ス中脘ニ停留ノ欬喘乾嘔種々ノ症トナル用此湯風寒ヲ發散
ス○表証熱アルニヨツテ水飲心下ニ滞リテ喘欬自利ス此湯
ニ加減ノ用之輕キモノハ五苓散ニ加減ノ准ナリ○上ノ條ハ

肺自生スル所ノ水此條ハ水飲心下ニ滞ルナレバ胃水ナリ○
本証小便不利者ニ
ハ去麻黄加茯苓

此方雜病活用例

感冒 房事ノ後中風其面胕艶然トムツケタ顔色ニテ欬者此湯
去麻黄加杏仁甚シキ片ハ加附子先去客邪次ニ眞武湯ヲ
用テ治本後ハ味丸ヲ用テ調理ス或曰 痰飲 内經所謂溢飲ハ渇
脉浮緊ハ小青竜湯沉緊ハ用眞武湯 ノ暴飲スソレガ流
レテ肌皮腸胃ノ外ニ入ル以此湯汗之 欬嗽 欬嗽倚息不得臥ニハ此湯主之 同 上氣
雞ノ声ヲナスモノハ此湯主之此藥發表下氣潤燥開痰右ノ四

ツノ功此一方ニ備ル水雞ノ声ト八蛙ノ声ナリ同痰逆氣モ一虚者多甘草湯ニ宜シ喘嗜症多ク寒包熱邪寒ニ遇ヘバ即發ス喉中水雞ノ声ヲナス脚氣脚氣積痰肺絡ノ中ニアリ以此湯探吐スヘシ高氣弱者忌吐肺ニ迫リテ喘歎肺脹肺脹歎メ上氣シ煩躁メ喘シ脈浮水腫水腫者此湯加擴掬者心下ニ水氣アリ此湯加石膏病暴ニ發シ脈浮喘滿歎逆煩熱者此湯主之若上熱戴陽下虚足冷者此湯去麻黄加熟附子減半痿厥秋濕ニ傷メ歎シ發メ痿厥トナル此湯去麻黄加羌活

大青龍湯六

麻黄　石膏各一兩　桂枝　甘草各四分

杏仁二分半　生薑　大棗各六分

右七味以水一盞八分煎六分去滓温服之取微似汗出多者温粉粉之一服汗者停後服汗多以陽逶虚悪○此モ本方ノ刻合ノ四匁六分半ヲ水一合八勺ニ煎ス此モ時方ニ隨ヒ二貼ニ分チ二匁三分餘ニ水三杯入一杯ニ煎シ三度ニ用ル温粉ノ方明理論ニ見ヘタリ

此藥太陽ノ証脈浮緊發熱悪寒不汗出ノ煩躁者主之此方モ亦風寒ノ為ニ営衛ヒニ傷レテ寒多風少モノニ用ユル藥也脈浮緊發熱悪寒身疼痛ハ皆寒邪ナリ然ルニ本經太陽ノ中風ト云ハ難意得ヤウナレヒ不汗出ノ三字ニ氣ヲ付テ見ルベシ無汗ト不汗出ノ語意不同無汗ハ始カラ汗ノナイヿ不汗出トハ元

來微汗アリソレガ寒邪ノ為ニ閉ラレテ汗ガ不透内ニ鬱閉シ營熱甚シソレユヘ麻黄桂枝ノ二方ヲ合シ去芍藥ハ收斂ヲ忌ムナリ麻黄ヲ倍用スルハ發散ヲ急ニスルナリ加石膏ハ煩躁ヲ解スルナリ此方無汗ノ煩躁ヲ解スルナリ若有汗ノ煩躁ニハ眞武湯ヲ用ユベシ

三拗湯 七局

治感冒風邪鼻塞声重語音不出或傷風傷冷頭痛目眩四肢抱倦欬嗽多痰胸滿氣短

麻黄 不去節　杏仁 不去皮尖　甘草 生用各等分

右為麁末每服五錢水一盞半姜五片同煎至一盞去滓通口服以衣被蓋覆睡取微

按方下ニ主治風邪ニ感冒スト云ヘ𪜈其方ヲ見ルニ風寒𪜈ニ感冒スル藥ト意得ベシ鼻塞声重ハ風寒𪜈ニ此候アリ語音不出ハ寒邪鬱閉ノ肺ニ火邪アリ頭痛目眩以下ノ候皆風寒ニ感冒スル的症ナリ此案局方ニ載スル仲景ノ麻黄湯去桂枝多ク用甘草夫傷寒ハ邪深ノ營血ヲ傷ル故ニ桂枝ヲ用テ營血ノ邪ヲ引出ノ肌表ニ達ス感冒ハ膚淺ノ邪風寒但肌膚ヲ閉テ無汗正氣鬱セラレテ右ノ諸症ヲ見スト云ヘ𪜈營血ニハ無傷故ニ但麻黄ヲ用テ衛氣ヲ發スル片ハ不及用桂枝生甘草ヲ等分ニ用テ瀉火其上麻黄慓悍ノ氣ヲ恐レテ以甘草麻黄辛烈ノ氣ヲ和ク

○此案多ク甘草ヲ用ヒ麻黄ト等分ニスル然ルニ本邦ノ人甘キヲ不喜常ニ甘草ヲ少計用ユ若シ此案甘草ヲ減スルヤハ制法ノ意ニ不遂異邦ノ先輩此方ヲ用ルヲ考ルニ丹溪纂要云氣實ノ人誤テ服黄耆ニヨッテ發喘スルニ用ユ又医通ヲ按スル二風寒傷肺欬嗽スル者ニ誤テ五味子瓜蔞仁五倍子ノ類ヲ用テ收斂スルニ因テ肺氣壅リ喘嗽スルモノニ用ユ今テ此方ヲ用ルナラバ此例ニ從フテ用ベシ或先輩感寒ノ欬嗽ニ參蘇飲ト此湯合方ニスル者ナリ

飲ニ麻黄杏仁ヲ加ルモ又參蘇飲ト此湯合方ニスル者ナリ

此方他病活用例

夜欬 風寒鬱熱夜欬嗽甚久嗽年月ヲ經テ不愈此風寒ノ邪久シク肺胃ノ間ニ客ス労嗽ト不同用此湯症スルニ以テ婚婦瘦人多欬ニ用ユルコト勿レ

芎藭散 八濃　治非時感冒　藁本　柴胡各二錢　川芎　葛根　枳殻　桔梗　陳皮　半夏　茯苓各一錢　甘草七分　生薑三片　大棗一枚

右水煎去滓服温覆取微汗紫藁柴胡倍餘蓍專發表解熱之功○本方去川芎柴胡加人參前胡木香名參藁飲○按此為治非時感冒之首劑非正傷寒藥也方中芎藁紫葛西味為通治三陽經外感藥而獨推芎藁二味名方者其重在於邪傷血分也更合之以二陳治內傷飲食加枳殻寬膈利痰誠為總司外內之良方而無引賊破家之虞宜乎世所共推也其參藁飲方即此湯去川芎柴胡而易人

參前胡木香之制其主在於氣分也昔人有用芎藭散不解用參
藭飲即解之說意在人參有兼補之功殊不知其為氣血兩途也
按此為治此論傷寒緒論二出ス感冒ノ首劑トハ凡感冒ハ膚淺
ノ邪ナレバ至極不當ト云ヘ𠮟ルモノナリ若シ的當ノ劑ヲ
云バ此方ナルユヘ首劑トスルナリ論中芎藭散參藭飲ノ二湯
ニ於テ傷氣分傷血分ノ論アリト云ヘ𠮟今感冒ノ症ヲ見ルニ
某ノ症ハ血分ノ傷レ某ノ症ハ氣分ヲ傷ルト指シ示ス所アラ
バ尤ナレ𠮟ソウ云フハナクテ此方名川芎紫藭ノ二味ヲ推ノ
芎藭散ト名クルト云意ヲ以テ血分ノ藥トスルト云タ計ニテ
ハ今受用ニ成難シ昔人芎藭散ヲ用テ効アルハ人參補助ノ力
ト云ヘ𠮟ソレニハ非ズタヾ氣分血分ノ意アリト云謙思ヘリ此說一理アルヤウナレ𠮟病狀ニ
ツイテ氣血ノ分ヲ別タザレバ此又何ト云フヤラ知レヌ恐ラ
クハ昔人ノ說是ト為ベシ蓋シ芎藭散參藭飲二方ノ別ハ芎藭
散ハ頭痛ヲ主トシ參藭飲ハ欬嗽ヲ主トスナゼナレバ川芎ハ
頭痛ノ主藥ナリ前胡ハ風寒ノ欬嗽ヲ治ス如是辨別ノ可ナル
ベシ○更合之以二陳医通內傷門ニ此方ニ消導ノ藥ヲ一二味
ヲ加ヘテ停食ノ感冒ヲ治スト若シ食滯頗ル痞悶噯氣スルニ及
バヽ蘆香正氣散ト云ヘリ枳桔ヲ用テ寬膈利竅此故ニ感冒ノ
總司外內ノ良方トスソレユヘ柴胡少陽ノ藥葛根陽明ノ藥ヲ
リト云ヘ𠮟引賊破家之虞ナシ故ニ
世上推ノ感冒ノ首劑トスルナリ

此方他病活用例

腹滿ノ人外邪ニ感シモ腫滿ト熱証ニ属者可用此湯 積聚ノ症ニ有積聚ノ表邪者宜此湯 欬嗽 風寒ノ欬嗽鼻塞声重キニ八宜此湯

參蘇飲 九高 治感冒發熱頭疼或因痰飲凝滯關節疼痛スルナリ兼以為熱并宜服之若因感冒發熱亦宜服養胃湯法被ヲ以テ蓋ヒ白粥ヲ以テ茶カヲ助ケ以被蓋臥連進數服微汗即愈尚有餘熱更宜徐々服之自然平治因痰飲發熱但連日頻進此茶以熱退為期不可預止痰飲ト雖ガ紛ルヽモノ倶ニ發熱ス幾日モ雖有前胡乾葛但能解肌耳ツバケテ熱ノ退リヽデ用ユベシ

此二味微寒ノ葉ナレ共既有枳殻橘紅輩自能寛中快膈解肌ニテ冷剤ニテハナシ不致傷脾兼大治中脘痞滿嘔逆悪心ヲ此皆痰ノ開胃進食無以踰此 此葉ニ踰ル母以性涼為疑此方微冷ノ剤ナルヲ以テ寒涼ノ葉デハアルマヒカト疑コトハナシ恐ル、コナカレ一切ノ發熱病因ニ拘ルコナク皆効アリ一切發熱皆能取效不必拘其所因也小兒室女亦宜服之

前胡 人參 茯苓 各七錢半 枳殻 桔梗 甘草 陳皮 各半兩 木香 半兩 藿葉 乾葛 半夏

右咬咀每服四錢水一盞半薑采片棗一箇煎至八分去滓微熱服不拘時候易簡方不用木香只拾味○初欬嗽加杏仁桑白本誌○

久嗽加五味烏梅（本症）或痰
香砂仁（本症）或（痰食）○頭痛加川芎細辛（本症）
風無汗鼻塞吉重欬嗽并加麻黄杏仁（本症）寒（邪强シ）○肺多有熱加杏
仁黄芩桑白烏梅（本症）肺熱欬嗽○心下痞悶或胸煩鞕或停酒不散或
饋雜惡心加黄連枳實倍用葛根陳皮（痰火）○胸滿痰多加栝蔞仁（痰燥）
○心盛發熱加柴胡黄芩（本症）熱（強シ）○姙娠傷寒去夏加附大棗忌
此方前方芎藭散加人參前胡木香去川芎柴胡治感冒功能大抵
同シ芎藭散ニ比スレバ人參ノ補アリ故ニ虚人小兒姙娠ノ感
冒ニ宜用之前胡ハ下気治欬喘感冒有欬モノ尤宜シ木香ハ順
氣ノ藥ニノ衝氣ノ凝滯ヲ行ラズ王節齋明医雜著孫東郊医家
必用去ニ人參木香此ヲ先輩ドレモ苦口ニ非之尤ナリ然ルニ今
人モ亦常ニ去ニ人參不用皆効ヲ得ナリ此ノ方ノ意ニソムクト
云ヘドツラく思フニ此方去人參芎藭散ハモトヨリ感冒ノ首劑ナレバ効アルモ又尤ナリ然
レドモ體虚ノ人ニハ
本方ヲ用ベシ

此方本症主用例

戴元禮云傷風取汗ノ後身熱不退ハ此湯加柱枝敗毒散ニ加ル
モ又可ナリ○又云先壅熱アル
ノ外邪ニ中ラレテ風寒モアリ
熱モアルニハ此湯倍桔梗ヲ

此方他病活用例

發熱 右下二云因瘀飲發熱者又云一切発熱不
連日用此茶以熱退為期 同 拘其所因用之 欬嗽 時行欬悪
塞氣急連欬不止始于病ヲ得于即枕 寒頭痛鼻
二卧ス一兩日在于亦輕此湯加細辛 中風 友松子云胸滿痰多心
下痞日久ク不快後二 老婦 卒中風不省人
八類中風トナル者ナリ陳良甫用此方 同 事半身不遂口眼㖞斜
治之龍雲林モ亦以此方中風門ニ入ル 兼三公湯調理ノ次第
發熱痰喘医者更ルく雜治功ナシ脈浮數ニメ滑與此方未應大
劑トナシテ頻用十餘貼ニ至テ熱退キ喘止人事ヲ省ル七八十
貼始愈後用茯苓補心湯 而欬 氣促喘欬本方 血吸 血ニハ
加知母貝母

豆豉或此湯ニテ汗ス百二十
方云此湯加烏梅麥門茅根ヲ
湯 泄瀉 發熱下利用此湯或此
湯加蓮肉白扁豆白朮 水腫 本邦老医傳云水腫諸医無効
二此方加木通大汗出テ愈
肺 小腸 痙氣初發頭痛身熱
憎寒壯熱此湯加木香 急驚 急驚風初發痰氣
夏胎ヲオトスモノニテナシ按スルニ參蘇飲方中ニ半夏アリ
ト云ヘ𪜈胎ホドノ害ナシ 胎悪 古方家小半夏加茯苓湯或
ハ金匱乾姜半夏人參丸ヲ用テ 墮胎也 胸痺 胸痺ニ用胸中ニ痰ノ
ンコト屢見聞せリ此單方ナル 肺 ルカ水氣アルカ或積
カイヅレニテモ 虛煩 病後虛煩ニ此湯去縈蘇倍人參加麥門或
脉結スルコアリ 煩熨時ニ悪寒身不痛頭不痛但煩熨スル

此毛虛煩也又此湯去桑
薤倍人參或更加石膏
（傷寒）傷寒裏症可下ノ症備テ表症一ツ
モ殘テアラバ先ツ此湯表ヲ解ス
ベシ脈浮或ハ胸項以上有（同）傷
汗ハ表証ノ目ツケトリテ不効邪熱裏ヘ入譫語脈數ニテ解
毒湯凉膈散ナド用ンカト思フ症ニ此方ヲ用テ表ヲヒラキテ
ヨシ脈數譫言口乾口敗レナドスルサレバ脹滿モ甚ヌゾ熱ヲ
強クサヘサントセバ加桑胡黄芩黄
連若大便難ハ大桑胡湯ヲ用ユベシ（勞役感冒）老醫傳云勞役人
ノ感冒可用補中
益氣湯症ニメ喘欬氣促スルモノニ此湯加杏仁桑白或茯苓補
心湯ニ加味シ并ニ小劑ニ修合シ人參倍用或合半ヲ加ルコアリ此ハ此湯ニ宿ヲ用可意得ナリ右ノ症ニ中焦
不行モノニハ八解散ノ類ニ宿ヲ借リテ人參ヲ欵服スルコア

（奇效經驗）（腎痛）丼嗽ノ婦人湯治ノ後發熱欬痰帶血右脅甚痛不食脉弦細而六動一方加五味即此湯加羌
活蔵靈仙貝母芍茅山梔此症湯治ノ後ナルホドニ濕氣ガアラ
ントバカリ意得テモ悪シヽ湯治ノウチニテモ亦後ニテモ同
事モアラフゾ腎痛モ湯ナドガタヽリテ痛ムアルナリ此症敗
毒散ニ氣散ヲ用テモヨケレドモ欬痰ガヒドクテ血痰ヲ治シ羌活蔵靈仙ニテハ痛ヲ
ガヨキブ抑芍茅貝母ニテ血痰ヲ治シ羌活蔵靈仙ニテハ痛ヲ
止ルナリ山梔子ニテ焮毒ヲ解ス又菊水防風モ大事ナケレドモ
茅味多ク其上モハヤ風濕ハ羌活ニテ拂フ故餘（氣）此湯ニ加茯
苓ハ入ヌブ病症ノ大抵ヲヨク見ガ專一ナリ神是モ分心
氣飲香蘇散（勞熱）勞熱ノ輕症（潮熱）久ク潮熱ヲ患テ午後ヨリ夜
ト同意ナリ二加麦門冬半二至テ腰冷ルニ泰艽鱉甲

飲清脾湯ヲ用テ不効ニ用ニ此湯効アリ發班ナドノ証ニモ用ルコアリ又解毒湯加菜白皮用ルコモアリ敗毒散ハ脉浮ニメ大ナルニ用ユ此湯ハ脉沉ニシテアニリハヤクナキニ用ルナリ寒熱寒婦寒熱如瘧此湯加黄芩經驗ノ妙ナリ欬血一男肥熱痰血盜汗不食脉五動有力用ニ此湯加芍茱貝母壯婦湯浴之後發熱欬痰帶血右同肩臂甚痛不食脉弦細而六動此湯加羌活藏靈仙貝母芍茱山梔

感冒

香蘇散十局　治四時温疫傷寒

香附子四両　甘草炙両　紫蘇葉四両　陳皮二両

右為㕮咀毎服三錢水一盞煎七分去滓熱服不拘時候外ノ柔ヒヤウ多本邦古代ノ書ニ傷寒ニコノ茶日ニ三服若作細末只加減ナシニ晝夜二十五六貼用ル仕方也服ニ一錢ヲ入塩點服○頭痛加川芎白芷本症攣頭痛○氣加石膏連須葱頭本症痰厥○頭痛如斧劈加細辛石羔薄荷熱症頭風○太陽穴痛加荊芥穗石羔熱頭痛○偏正頭風加桂枝本症加桂枝芍茱○傷風自汗加桂枝本症加桂枝芍茱○傷風無汗加麻黄并乾葛本症○傷風惡寒加蒼朮本症○傷風發熱不退加柴胡黄芩本症○傷風欬嗽不止加半夏杏仁本症○傷風胸膈痞塞加枳殻本症○傷風鼻塞声重咽膈不和加苦梗旋覆花本症

○傷風痰涎壅盛加白附子天南星（本証）
○傷風鼻內出血加苦花（本症）
○傷風氣促不安加大腹皮菜白皮（本症）
○傷風鼻塞不通頭昏加羌活荊芥（本症）
○傷風不散吐血不時加生地黃（本症）
○傷風不解咽喉腫痛加苦梗（本症）
耳內出膿疼痛加羌活荊芥（本症）
○傷風中脘塞不思飲食加青皮枳殼（本症）
加丁香半夏（本症）
○傷風頭暈眼花顛倒支持不住加製附子（本症）
傷風時作寒慄加柱枝（本症）
○傷風後時々作虛熱不退加人參（本症）
花半夏（本症）
○傷風痰壅嘔惡不止加白附子旋伏
能消化加砂仁青皮（本症）
○初感風頭痛作熱鼻塞聲重加羌活川芎（本症）
○感風腰疼不能屈伸加官桂桃仁（本症）
○感風渾身痛不止加赤芍菜紫金皮（本症）
○感風頸項強急不能轉頭加羌活官桂（本症）
○腹肚疼痛加木香腹肚疼刺不可忍加姜黃菜萸（腹肚痛）
疼痛無時不可忍加木香姜束（小腹疼痛）
○婦人被氣疼所苦加木香砂仁（婦人氣痛）
○傷風嘔吐泄瀉腹痛加乾姜木香（本症）
○心卒痛者加延胡索酒一盞（心痛）
○飲酒太過忽遍身發疽或兩目昏黃加茵陳山梔（發黃）
○婦人經水將行先作寒熱加蘇木紅花（調經）
○脾寒加良

姜青皮草菓 瘧 ○感風寒發熱頭疼加不換金 本症 ○婦人産後風
脇手疼痛生料五積散人參敗毒散加木瓜不換金二氣散加生
地黄川芎同煎 産後 ○虚熱不退加人參 本症別不 如用補劑 ○潮熱加人參
黄芩 本症 ○欬嗽加桔梗五味 本症 ○欬嗽不止加半夏杏仁 本症 ○鼻
塞声重咽膈不和加桔梗 本症 ○胸膈痞塞加枳殻半夏 本症 ○飲食
不化加縮砂青皮 本症 ○腰痛不能屈伸加肉桂桃仁 腰痛 ○腹肚痛
加木香 本症 ○身疼加芳茅因桂 本症 ○心氣痛或疝氣痛加延胡索
烏藥茴香 心 ○風濕脚氣加槟榔木瓜疎通氣道名之槟蘇散 脚氣

○春夏氣溢腫而痛加五加皮木瓜槟榔川練子 時氣 ○濕氣周遊
脚膝痛加忍冬木香芳茅 膝痛 ○疝氣偏墜疼痛初發憎寒壯熱甚
効加茴香木香三稜莪朮木通 疝氣 ○小児傷寒夾食夾驚四時瘟
疫瘧疾加青皮葛根名香葛散 濟世小方 感冒 ○婦人足冷上氣或娠婦
四五ケ月而腰下浮腫皆與本方得奇驗 子腫 ○鼠咬而發熱腫痛
加黄連黄芩山梔 雜

此茶感冒ノ輕症ニ用ルナリ局方ヲ按スルニ此方ノ始リ白髪
老人一人ノ富家ニ教テ疫癘ヲ治スト然レバ時疫ノ茶ナレ𪜈今
デ此茶ヲ頼ンデ治時疫ヲハナイサレ𪜈芳ノ茶春時氣温疫

ノ輕症ニ用ユ畢竟利氣ノ輕劑加味ノカヲ以テ其功ヲトグルソレデ古昏ニモ随分加味ノ多キ某也氣滯テ胸膈不快或頭痛不楽忘通ノ此湯ヲ主トスヌ又能ク食毒ヲ消解ス食傷ト食毒ト八水ト違アリ食傷八医者モ病家モ皆常ニ知ル所ナリ食毒八或魚腥ノ毒饌中ノ食毒其外一口ノ食物ニ因テ忽然ー腸胃脘大ニ痛ム等ノ暴症ハ食毒ナリ此方主之

○友松子云來食來氣ノ感冒常ニ用之甚効アリ衆方現矩云春月用之探病恐ラクハ愚者聞之不論氣之血虚用之害人ノ多カルベシ云云

此方他病活用例

脚氣　脚氣血虚芎芷香薷散

瘧毒初發頭痛躰痛作寒作熱　産前　産前加木瓜紫蘇芎芷香薷散加防風當歸

脚氣俗名腳脚此湯加木瓜檳榔木香　姙娠　本邦老医傳胎婦四五月腰下腫気必用　腫滿　本邦老医傳胎婦引頭痛耳　痰水　暴怒悲號川投身入井ナドシタルヲ引上テ後利鳴ニ用ユ　痰水　氣ノ劑ヲ肝要トス此湯加川芎木香烏薬若シ打身ナドアラバ　痰火　痰火因風寒ニ更加當歸杏仁　痰火　發宜此湯　濁　濁氣者宜此湯　泄瀉　積聚アリ兼氣滯ニ病濁症因　泄瀉　頓ニ瀉者宜此湯加生姜石菖蒲半夏枳殻或人參養胃湯加肉桂吳茱萸　心痛　食生冷傷ラレテ食熱物シバラク痛減者此　番沙　此湯加薄荷荊芥　積聚　積聚兼表證小建中湯合香薷散　頭痛　氣虚ノ頭痛ヲ除キテ其外ノ頭痛ハ此湯加川芎羌活薄荷又頭風ニハ加苦蘞細辛荊芥大黄人參　補遺　傷寒

三位法眼傳云傷寒脉中按之則數動重按之則不數動者府ノ有熱而藏無熱香薷散ニ山梔子一捻リ加テ晝夜ニ二十服モ與フベシ梔子ハ府ノ熱ヲサヘスモノナリ但義术挾柮ヲモ加テ與ノ手當ヲスベシ蟲ノ脉ハ兩寸ノ脉ニテ覺ル皿ナドノ上ニ線ヲヒツハリ其上ニ一撮ノ大豆ヲオトスヤウナ氣味ゾ○肺ニ有熱ニハ此散ニ塩ヲ加テ二十貼モ一日ニ用レバヤガテ下ル如此四五度モ下レテ本方ニ蟲ノ加味ヲレテ用○藏ノ熱ヲ下スニ大黄バカリニテ不可トキ加黄芩妙ナリ寒ニヨリテ桂心カ乾姜ヲ加テ能下ルナリ○汗サスルモ此散ニ塩ヲ入ル夫レデモ不應ハ加麻黄

内傷 十四歳婦全不食服麪果雜穀如常

頭痛 不食脉弦宜此湯加黄芩黄連神鬱裁术

熱 大熱アリテ何ヒ不知病ニ此湯加大黄黄芩梔子人參荊芥多入テ下スベシ

脚氣 四十餘歳肥白之男自今年五月入ル專之日定時而自足大拇指痛発而至膝髀腫処少發熱食少減時々大便結脉素細沉弱発則浮五動差後導滯湯當皆粘痛湯或三和散不効如右毎年五月入ル專之日定而痛發而五十日或六十日而雖不用某諸症退如故此散加挾柮小木瓜中蒼朮大牛膝少黄蘗中悉愈狂

狂亂トナラントスル病ノ下地ニ此散ヲ用ヒ度々効ヲ得タリ大抵此散ト分心気飲加茯神狂亂一旦愈ルトイヘ共

眼目 俗ニヤミ目ト称スル肯ノ灸ヲ世子バ根不拔ルモノナリ二人參敗毒散ニテイツモ神効ヲ得ル又香薷散ニテモ得効鬱症ノ眼ニハ敗毒散ニテイカヌニ此散ニテヨキコトアリ○糠味噌ハ眼ノ毒ナリ効ア

リ不可食 感冒 本邦老医傳云上焦ノ風邪ニ用ル茶ナリ風熱上衝メ目赤微頭痛スルニ尤佳ナリ赤目痛ニハ此方デナケレバナラヌ 同 頭汗必用此上焦ノ傷風ナリ 傷寒 傷寒裏熱ニ表ヲ發メサニスハ釜ノ湯ノタギリタル ニ蓋ヲ取テサニス意ナリ當流ノ秘ナリ謙云此是正傷寒ニ非ス時疫ノ輕症ナリ 鬱 婦人氣鬱ノ病サニ くノコアリ先用之 同 婦人ニ三年發則上氣面赤口乾医ア一テ不効ニ予用此方ニ三貼ニシテ効アリ 胸痛 瞬痛脉實ナル ニ用ルコアリ 雜 有馬湯治ノ々、 補益 補茶血茶或烏附ノ類ノ茶久シク用ルニ用之有効 トキハ間々ニ此方ヲ用テ気ヲメグラシ發ス 痛風 痛風カ風毒カニ此方ヲ九茶ニメ三五十粒ツヽ用テ愈ル故ニ九茶トスル也 加減 感風寒發熱頭痛合不換金○感寒頭痛壯熱惡寒身痛不能轉動合五積散或敗毒散○濕氣周遊脚膝痛加忍冬南容○疝氣偏墜疼痛初發憎寒壯熱甚加茴香青木香三稜莪朮木香○傷濕自汗時行暴瀉加車前蒼朮○感寒濕日久腰脚疼行歩難加蒼朮酒煎服○濕氣久留脾疼瘟疫瘧疾加青皮葛根名香葛湯○身体與手足倦怠腹脹滿或有氣上衝有類虛損實非虛損加蒼朮○傷風一向不解作潮熱白日經日中不退日々如此加地骨皮柴胡人參○脾胃不和中脘不快加麥芽神麹○傷食嘔吐泄瀉腹痛加木香乾姜○卒心痛者加延胡索酒一盞○飲食太過急偏身發疽或兩目昏黄加茵蔯山梔○中酒嘔吐惡心加丁香烏梅○婦人忽然大便痛腫不能下地加木瓜茱萸○婦人被性所苦胸膈痞疼脇肋刺痛小便急痛加穀南○婦人被氣疼所苦加南宕砂○婦人

經水將ニ行先作ニ寒熱ヲ加ヘ藤木紅花ヲ一人産後作ニ虚熱ニ不退ヲ加黄蓍
○産後腰痛不已ヲ加官桂○本方加ニ木香檳榔五加皮名ニ濟世檳榔
子湯ヲ一名ニ桟ヲ治ニ一切
脚痛順氣壅

行氣香蘇散十一回　治ニ内傷生冷飲食厚味堅硬之物ニ肚腹脹滿疼痛
冬感風寒濕氣ニ頭疼身熱憎寒遍身骨節麻木疼痛七情惱怒相
沖飲食不下心腹氣痛

紫蘇　陳皮　香附　川芎　羌活　枳殻　烏葉　麻黄
甘艸　右剉生姜三片水煎温服○因濕加蒼朮○外感

風寒加葱白三根○内傷飲食加ニ山査神麹ヲ一傷飲食

此茶回春ニ出タリ本ハ三山陳氏ガ方ナリ香蘇散ニ順氣化滯ノ品ヲ加味シタルモノナリ感冒夾氣夾食ノ症ニ用ル之此方茶品ヲ見レバサシテ奇妙モナイ茶ナレ圧甚タ効アル方ナリ七気腦怒因鬱滯ツカヘサシ上せ飲食難進生冷厚味中焦ニ鬱シ不化肚腹脹滿疼痛シ外風寒ニ感冒スルモノニ必用ノ茶ナリ右ノ症卒中風ニモギルヽモノナリ意得ベシ

○此茶有餘ノ氣滯ノ者ニ用ル茶ナリ然ル ニ気滯茶甚多可撰用

○感冒氣滯ノ症遍身麻木疼痛スルニ用ユ或感冒ニ氣ガ滯テ俗ニ肩ガツヽルト云ニ此方ヲ用テ効

此方他病活用例

疝氣 疝氣偏墜ノ初發疼痛憎寒壯熱スルニ加莪朮三稜小茴香青木香木通友松子ノ治ニ一人年五十許瘦衰病大如虛ト云ヘ尺脉沉弦ニメ神アリ少年小腹ニ一小塊アリ今又陰囊偏墜ス此疝積ナリ本方加蕪梗莪朮三稜小茴香青木香山楂山査二百貼ニメ半愈ヘ五百貼ニメ全ク愈ユ

藿香正氣散十二局 治傷寒頭疼憎寒壯熱上喘欬嗽五勞七傷八般風痰五般膈氣心腹冷痛反胃嘔惡氣瀉霍亂藏府虛鳴山嵐瘴癘遍身虛腫婦人產前產後血氣刺痛小兒疳傷並宜治之以上局方

以下傷寒大成治四時不正之氣夾食及瘴濕霍亂

廣藿香葉一錢五分 白朮霍亂轉筋換木瓜 厚朴薑制 白芷疼食氣滯換木香 陳皮各八分

半夏一錢五分 茯苓 桔梗各一錢 大腹皮姜湯泡腹脹用之 蘇葉各二錢自下去之

甘草炙五分嘔吐去之

右用生料作一劑加生姜三片大棗三枚水煎去滓熱服無時○熱多加黃連寒多加乾姜寒甚少加附子此本不換金正氣散而立方中腹皮乃傳寫之誤當遵古方用蒼朮爲是專治一切不正之氣非正傷寒某也太陽病可用麻黃惡寒桂枝症

發熱頭疼骨節痛用之先虛正氣外邪不去而雖汗出亦不解故先虛正氣ヲ元氣虛人并來陰傷寒發熱脉沉足冷者禁服加減霍乱轉筋加木瓜霍乱　○腹痛加芍葉本症　○寒痛加官桂本症　○冷甚加乾姜本症　○飲食不化心下痞悶加香附砂仁本症　○米穀不化加神麯麥芽同　○肉食不化加山査子同　○心下痞加枳實青皮同　○中暑冒風加香薷扁豆中暑　○時氣憎寒發熱加柴胡葛根本症　○發熱加麥門冬散心腹痛加木香本症　○若頻欲登圊竹葉口渴小便不利合五苓散　○寒濕相搏霍乱轉筋煩渴悶乱合黄連香薷飲不通加枳殼剩

名之二香散霍乱　○感風寒內傷飲食霍乱轉筋吐瀉合五苓散同　○轉筋不止男以手挽其陰女以手牽其乳此千金妙法同　夏時受涼傷外又飲食生冷傷內頭痛身熱惡寒或腹痛吐瀉若外感重去白朮加蒼朮羌活若內傷重加縮砂本症　○尸厥飛尸卒厥此即中惡之候因冒犯不正之氣忽然手足冷肌膚粟起頭面青黑精神不守或錯言妄語牙緊唇不知人頭旋暈倒此卒厥客忤鬼擊吊死及入廟登塚多有此疾以蘇合香丸灌之俟甦以此湯加南星木香殊驗中惡　○按霍乱主方兼內外有異也殊治山風瘴

氣之第一也○霍乱嘔逆去白芷加半夏姜汁最霍乱吐泻腹痛者必用之霍乱○四時感不正頭運鬱冒悪寒發熱專用之本症○夏月泄泻或傷食濕泻俱以兼腹痛者亦宜泄泻○七情過極逆氣運倒此名中氣亦宜中風○渾身拘急憎寒喘嗽頭目昏重加五味子杏仁塩梅得奇効本症○出遠方治心腹脹滿此方專調栄衛利三焦行痞滯消膨脹不伏水土○腸胃受濕下血不止加黄連烏梅有奇妙下血○瘧疾初發無汗用之則必發汗而愈瘧○傷寒感冒頭痛發熱而無汗亦可也本症○寢間風入於鼻中太陰則咽痛多此

方主之咽痛○飲酒而傷風發熱吐逆亦宜傷酒

方下圈点ヲカロルハ此湯ノ的症ナリ批点ヲ加ルハ主剤ト云ヘ共未為必処アリ点不為モノハ主ノ能ニアラズ或活法ニ因テ用ユ角点ヲ加ルモノハ此湯ヲ用ベキ症ニアラズ○此某方下大成ニ所謂治四時不正之氣挾食及瘴湿霍乱コレ此方正面ノ的症ナリ李梴云甘草桔梗紫蘇ノ辛甘ハ外邪ヲ發散ス厚朴大腹皮ノ苦辛ハ其内滞ヲ通ズ藿香ヲ君主トメ中ヲ和スベシ表ヲ解スベシ諸劑ヲ統領ノ功ヲ成スナリ○医通ニ云大抵非時感冒ニハ参蘇飲苓蘇散香蘇散神朮散皆撰用ベシ兼食滞ニハ宜此湯太陽ノ症見バ加羌活防風陽明ノ症見バ加葛根葱白少陽ノ症見バ加柴胡半夏若シ天氣未熱ニハ

加桂枝羌活佐トス

○又云東南ノ國稟氣孱弱ニノ氣常ニ泄ルハノ地ナリ但癰癤ノ毒アツテ絕テ傷寒ノ患ナシ或他處ニ客遊ノ風寒ニ感ズルモノニハ僅ニ藿香正気散ノ類ニテ主之麻黄青竜ノ剤不可用ニハ加乾姜呉茱萸名加味藿香正氣散

○冬月寒邪ヲ犯シ肚腹疾痛スルモノ

此方他病活用例

暑 医通云伏暑大熱外受寒邪内傷涼水生冷之物腹痛泄瀉霍乱肢逆此湯養胃湯可撰用 霍乱 又云世上皆不論虚實用此方此方ハ胃気不和陰陽錯乱或盲冬秋ノ霍乱寒熱氣急ノ症利霍乱スルモノニハ尤宜シ若シ厥逆冷寒虚煩喘噦面赤戴陽脉虚微細無力脾腎氏二虚シ火衰不能生土虚陽失守此等ノ症此方ヲ用ル片ハ忽チ変ヲ生ズ可 同 又云霍乱頭痛眩暈ハ風邪攻メ上ルナリ宜此湯 同 寒甚キハ加乾姜腹痛加肉桂 痛甚ハ去藿香加呉茱萸小使不利ニハ去茯苓乾霍乱ニハ加枳殻茯苓肉桂 中風 医通云食厥ニハ姜塩湯ヲ煎シ探リ吐シ風寒ニハ藿香正氣散 同 中風醒メテ後氣未尽順痰未尽除ハ調理劑宜藿香正氣散 腹痛 腹痛氣滞ニハ木味順気散 同 此方加木香延不問何症此湯加木香或此湯ニテ蘇合香圓ヲ調化シ用之 同 胡索治心腹痛 胸痛 本邦老医傳云氣欝胸膈痛不食者 心腹痛 又云心痛腹痛気痛種々ノ療治ニテ無効トキ此方ニテ表解シテヨキコトアリ 痢 痢宜用之

血色鮮紅或蛟蟲ノ形ノ如ニメ其間血鮮アリ此湯加黒豆三十粒 泄瀉 七情氣瀉腹常ニ虚痞大便欲去メ不去此湯加丁香砂仁 癥瘕 胡常山宜用之 秘結 大便秘結喜熱惡冷此湯加肉桂枳殻飲半硫圓 調血 經水先期來ル ハ気多ク血虚ナリ此湯加當帰川芎香附勿用冷茶 小児傷寒 小児傷寒夾食ニハ此湯合敗毒散大便閉ニハ加 癰 友松子治 癰ヲ發ス大サ茶碗程ナリ求医治之一癰ヲ治シ了レバ又一癰ヲ生ズ如此丁五六發ニ至大黄 癰 農民背ニ癰ヲ發ス大サ茶碗程ナリ求医治之一癰ヲ治シ了レバ又一癰ヲ生ズ如此丁五六發ニ至ル其脉緩中ニカアツテ滑ニ似タリ此癰ニハ非ス濕痰ナリ此茶與二十四貼其膿将尽テ為痰補中益氣湯加陳皮半夏全愈 水腫 中年ノ男平日過酒肌浮腫微頭痛脉浮濡與此湯愈タリ此方ハ外感内傷ヲ兼タル方ナリ腫氣ニ用ルコアリ風濕ガ表ニ在ルナリ熱氣在表腹下リナドスルニヨシ肌浮腫ト云ハ肥タカ腫タカト云ヤウナリ此方ハ酒毒ヲ發散スル方ナリ香藘散モ苦カラズ酒毒ニ用ユレハ汗ニ出ダス五苓散ハ酒毒ヲ小便ヨリモラス是酒病發汗ヲ利 腹滿 輕症ニ加木通澤瀉猪苓 鼈 本邦老医ノ經驗ナリ 本邦先医傳云腹脹腫気ノ小便不利ノ又云氣鬱ノ病ニ加木香宿砂名增減順氣木香散見得効方 恐 又云大人小児夜夢驚キヤスキニ用ルコアリ晝可驚ノニアラス 本證遺 二十五六歳ノ男常ニ嗜酒強壯肥満能食旅途ノ中卒頭痛發熱面色変黎黒煩渇脉弦數用此湯愈 感冒 感冒咽痛ニ宜用之

感冒

不換金正氣散 十三局 治四時傷寒瘧疫時氣頭疼壯熱腰背拘急五勞七傷山嵐近山瘴氣近海寒熱往來五膈氣噎欬嗽痰涎行步喘乏或霍乱吐瀉藏府虚寒下痢赤白並宜服之

厚朴 藿香 陳皮 半夏 蒼朮 甘草 各等分

右為㕮咀散每服參錢水一盞半生姜三片棗子二枚煎至八分去滓食前稍熱服忌生冷油膩毒物若四方人不伏水土宜服之常服能辟嵐氣調和脾胃養飲食加減 ○頭痛加川芎白芷 本症 ○感寒腹痛加乾姜肉桂 本症 ○潮熱加柴胡黄芩 本症 ○嘔逆加丁香砂仁 本症 ○口燥心煩加柴胡葛根 本症 ○氣塊加三稜枳殻槟榔茴香 積聚 ○冷瀉不止加木香訶子肉豆蔻 泄瀉 ○熱極大便不通加大黄芒硝 本症 ○瘧疾加常山槟榔草菓 瘧 ○腹脹加香附枳殻白豆蔻 本症 ○痢疾加黄連枳殻去甘草 痢 ○胸脇脹滿加枳實砂仁莪朮 本症 ○欬嗽加桔梗杏仁五味子 本症 ○喘急加麻黄紫蘇子桑白皮 本症 ○兩足浮腫加木瓜大腹皮五加皮 足腫 ○身体痛加麻黄桂枝芍菜 本症 ○濕症声哑加石菖蒲 失音 ○寒症声哑加肉桂 同 ○腸胃受濕下血加黄連烏梅 下血 ○小兒感冒風濕頭目昏重時發壯熱

宜此湯（本症）○傷濕重著骨節疼痛淫淅欬嗽加木瓜（渾）按平胃散加藿香半夏之方也是乃辟瘴之劑故遊官四方水土不伏或旅途中可服未病之先也（辟瘴）○旅行後瀉痢帶血腹痛心張加酒芍藥酒黃芩木香檳榔（下血）○旅後憎寒發熱上吐下瀉兩腿痛四肢未冷無汗口渴去半夏甘草加葛根丁香砂仁乾姜（本症）○四十餘日下血不止加芍藥黃芩黃連五貼而愈（下血）○暑濕諸瘧加柴胡黃芩青皮茯苓澤瀉檳榔草菓烏梅

方下ノ圈点批点角点藿香正氣散ノ例ノ如シ此方ノ主治圈点

批点ヲ考ヘ用ベシ温中ノ劑ナリ藿正ニ比スレバ藿正ハ此湯ヨリ發散ツヨシ紫蘇アレバナリ此湯ハ除濕ヲ主トス蒼朮アレバナリ二方ニ二方外ノ殊功アル某ナリト考ヘ用ベシ此方モト平胃散ニ加味ス專ラ傷食除濕ノ某ナリ故ニ吳氏方考ニ此方ヲ中濕門ニ攝入シ藿香正氣散ハ感冒ノ某ナリ其上加白朮茯苓ヲ感冒門ニ入ル、ハ此某モト感冒ノ某ナリ其上加白朮茯苓名除濕湯ナリ除濕湯ハ濕門ニアリ考ベシ

此方他病活用例

水腫　感寒腫者此湯加檳榔枳殼乾姜　婦人崩漏　崩漏因風寒者加川芎肉桂　乳病　乳病煩渴嘔吐甚ダ者ハ毒氣上リ攻テ咽喉ヲ妨ゲ痛ム寒熱スル者ハ膽胃ノ風熱或寒邪ナリ此皆表症ナリ此湯加天花粉　瘧疸　瘧疸夾ム所種々アリ

リ其内夾風気夾食モノ此湯加川芎木香風多ケレバ痒シ加祛風茉氣多ケレバ痛ム加調氣茶食多ケレバ寒熱ヲ發ス加消積茶濕多ケレバ腫ル加滲濕茶

同　分人参木香減半

痘　此湯加川芎白芷防風一男常ニ好魚網一日漁泥川及黄昏連濕衣阪路一二里夜半發熱煩悶ニ便澁一身尽痛首如物蒙脉沉細而濡此湯加羌活枳殻茯苓木通

傷食　有テ此方ヲ多用レハ却テ亦腹痛スルコアリ其時ハ治中湯ヨシ此方能汗ヲ出ス方ナリ敗毒参蘇十神湯ノ類ニテ汗不出ニ香蘇散此湯ニテ汗出ルコアリ

腹痛　壯年ノ男俄然而腹痛兩乳下痞不能屈伸手足冷厥細此湯主之

瘡瘍　足ニ如斑小瘡ヲ生シ頭痛ナドスルニ用之

神木散十四局　治四時瘟疫頭痛項強發熱悩寒身體疼痛及傷寒鼻塞声重欬嗽頭昏并皆治之

蒼木　羌活　細辛　白芷　川芎　甘草炙各一兩　蒼朮五兩

右為細末每服三錢水一盞生姜三片葱白三寸煎七分温服不拘時如覚傷風鼻塞只用葱茶調下

此方医通ニ芎藭参藭正氣散ナドハ并ニ感冒ノ茶トス感冒頭痛ニ用ベシ謙局方ノ方ヲ按ズルニ治四時温疫頭及傷寒ヲ治スルト云ヘリ本時疫ノ主方ナリ故ニ蒼朮五兩餘茶各一兩蒼朮除濕發汗散悪気餘茶各一兩ハ皆頭痛ノ茶ナリ然ラバ温

疫頭痛ニ用ル茉ト意得ベシ然ルニ医通ニ感冒ノ茉トスルハ譬バ敗毒散ハモトヨリ時疫ノ茉ナレド傷寒感冒ニモ用ル意ト同シ○此外ニ羅太無ガ神术散アリ同名異方ナリ即不換金正氣散去半夏代石菖蒲此又温疫ノ茉ニメ感冒ノ茉ニアラズ丹溪纂要ニ紺珠ノ心印ト云ヘルハ羅太無ガ方ト云ヘド元来ハ紺珠經ニ出ルト見ユル至テ古方ナリ大抵局方ノ神术散ト同ク温疫ノ茉ナレド羅氏ガ神术散ハ山嵐ノ瘴氣ヲ治スル妙剤ナリ医学正傳ニ此方ヲ温疫門ニ載スル或ハ去石菖蒲加香附子ト此又一方ナリ

人参養胃湯十五　治外感風寒内傷生冷憎寒壯熱頭目昏疼肢體拘急不問風寒二證及内外之殊均可治療先用厚被盖睡連進此數服以薄粥湯之類佐之令四肢微汗瀝々然サツトヌケ俟汗乾則徐々ニソロく被ヲ去ル去被謹避外風自然解散若元有汗亦須温潤以和解之ニテデニテ後ハ必ス微涼ノ或尚頭疼則濃煎生姜葱白湯下聖餅子三剤ヲ用ルコトアリ或有餘熱以参蘇飲欸々調之始ハ温剤ヲ用證憎寒壯熱頭目昏眩四肢拘急既除不必服茉但節其飲食適其寒温自然平治太抵感冒古人不敢輕發汗者止由麻黄能開腠理用或不能得宜則導泄眞氣因而致虚變生他證此茉乃平和之劑上能温

中解表而已不致妄攪也兼能辟山嵐瘴氣四時瘟疫常服尤佳

厚朴　蒼朮　半夏各一錢　藿香　草菓　茯苓　人參各半錢　甘草二錢半　橘紅七錢半

右為咬咀每服四錢水一盞半姜七片烏梅一箇煎至七分去滓熱服兼治飲食傷脾發為痎瘧或脾胃中脘虛寒嘔逆惡心皆可化之或發寒瘧寒痎及惡寒者並加附子名十味不換金散

此朮本感冒ノ劑所謂温中解表ノ朮ナリ方後ニ治寒瘧ト云故ニ先輩專用テ治瘧ノ朮トスルナリ此方不換金正氣散ニ加人參茯苓草菓烏梅ノ方ナリ不換金ト八解散ト出入加減レタルモノナリ外感風寒內傷生冷ヲ治スルノ朮ナリ然ルニ此証ヲ治スルニ於テハ不換金ト八解散ノ二方ニテ事足ル此方ハ無テモ濟ムサレドモ用テ悪イコトハナシ但此方中ニ草菓アル片ハ宜ナル哉先輩ノ瘧ノ朮ト為ルコ草菓ハ多ク瘧ノ朮ニ用ヒ來レリ加減ニ加附子十味不換金散ト為ル片ハ温補ノ力益々專ナリ用感冒片ハ中焦ヲ温補レ消食ヲ解表其功八解散等ノ朮ニ勝レリ

治瘧加減

百二十方云寒多加肉桂熱多加柴胡汗多去蒼朮藿香加黄耆白朮飽悶去人參加青皮縮砂渴加麥門冬知母友松子云有痰渴而不飲水者雖渴尚宜半夏○瀉加芍朮白朮瀉不止去厚朴草菓加肉豆蔻嘔噦去草菓厚朴蒼朮加縮砂白朮炒米痰多去半夏草菓加貝母竹瀝友松子云濕痰ナラバ半夏要

茱ナリ燥痰ナラバ半夏ヲ去ル　内熱盛ナラバ半夏加黄芩ノミニ非ス此湯モ宜シカラス　○暑熱盛ナラバ去半夏藿香加香薷白扁豆

準繩治瘡加減　脈弱無力或多寒者加乾姜附子脈洪有力熱多者加黄芩黄連柴胡此方蒼朮厚朴藿香陳皮ハ劫痰ナリ人参ハ只虚人尤宜シ

此方他病活用例

腹痛　全不食其人虚弱腹冷痛者此湯ニ以白朮代蒼朮仍加肉桂呉茱萸各半錢木香三分　欬嗽　百二十方云欬嗽悪寒発熱悪寒発熱欬嗽無汗或潮熱ニ與逍遙散ヲ去血多シ此湯加川芎當帰即効ヲ得タリ謙云此証外感風寒然ルニ発表ヲ用ヒズメ用逍遙散タラバ下血其外寝汗アルベシ此湯加川芎當帰即効コト此又不思議ナルコニアラズ

産後　又云産後二十日許悪寒発熱面青不食自汗脈數用逍遙散不効與此湯全愈謙云此証前症ト同シク外感ノ症ナリ與此湯愈ル

病後　又云諸病ノ後洒々憎寒シ或潮熱スル必可用此方甚ダ佳ナリ謙云此病後虚甚タシキモノニハ純補ノ薬ヲ用テ此湯ナドハ用ユベカラズ

本症補遺　瘧初発ノ際風寒在表雖寒熱過後而身体常ニ自喪風寒草菓飲或此湯毎服加川芎草菓各半錢○

他病補遺　水腫　暑瘧此湯一貼和勻作二服

帶下　又云婦人赤白帶下悪寒発熱欬嗽無汗或潮熱ニ與逍遙散ヲ去血多シ此湯加川芎當帰即効ヲ得タリ謙云此証外感風寒然ルニ発表ヲ用ヒズメ用逍遙散タラバ下血其外寝汗アルベシ此湯加川芎當帰即効コト此又不思議ナルコニアラズ

産後　又云産後二十日許悪寒発熱面青不食自汗脈數用逍遙散不効與此湯全愈謙云此証前症ト同シク外感ノ症ナリ與此湯愈ル

病後　又云諸病ノ後洒々憎寒シ或潮熱スル必可用此方甚ダ佳ナリサレド病後虚甚タシキモノニハ純補ノ薬ヲ用テ此湯ナドハ用ユベカラズ

本症補遺　瘧初発ノ際風寒在表雖寒熱過後而身体常ニ自喪風寒草菓飲或此湯毎服加川芎草菓各半錢○

他病補遺　水腫　暑瘧此湯一貼和勻作二服

附砂〔痺〕壯男瘧愈後時々微寒一身甚麻痺肌浮四肢不能擧食少進脉細數此湯加川芎當歸仁

發熱

餘日不止或少惡寒頭痛氣惱不食尿赤脉五動如有力此湯主之此方ハ氣弱虚熱ニ用氣惱ナドカ目的ナリ此症ニ大便結ニ用テモヨシ此方ハ八解散加草藁干ノナリ此症ニテモ初メ病ツキナレハ敗毒散藿香正氣散ヲ用ヒ又此症ニ草臥ツヨキハ補中益氣湯ヨシ小柴胡ナトヲ壯男〔汗〕壯男盜汗久不止煩邑蒼々食減脉用レバ反テ熱氣增ルアリ緩弱用六黄湯不効用此湯而安

羌活沖和湯十六　即九味羌活湯以代桂枝麻黄青龍各半湯等此太陽經之神某也　治春夏秋非時感冒暴寒頭疼發熱惡寒強無汗脉浮緊此足太陽膀胱經受邪是表證宜發散不與冬時正傷寒同治法此湯非獨治三時暴寒春可治温夏可治熱秋可治濕治雜症亦有神効秘之不與庸俗知此奇妙耳本方自有加減法備開于後

羌活　防風各二錢　蒼朮一錢半　黄芩　白芷　甘草　生地黄各一錢　細辛五分不可多　川芎一錢　水二鍾姜二片棗二枚煎至一鍾趁熱加葱白搗汁五匙入菜再煎一二沸如發汗用熱服止汗用温服

○如胸中飽悶加枳殻桔梗去生地黄○夏月本方加石膏知母名神术湯如服此湯後不作汗本方加藿葉喘而惡寒身熱本方

加杏仁生地黃汗後不解宜再服汗下兼行加大黃釜底抽薪之法○其春夏秋感冒非時傷風亦有頭疼惡寒身熱脉浮緩自汗冒賣表本方去蒼朮加白朮汗不止加黃耆即加減沖和湯再不止以小柴胡加桂枝芍葉一錢有神此近來專用之○赤水玄珠柴桂湯甚効

日本湯不獨解利傷寒治雜病亦有神○中風行經者加附子○中風秘渋者加大黃○中風并三氣合而成痺等症各隨十二經上下內外寒熱温凉四時六氣加減補瀉用之煉蜜作丸尤妙

此来春夏秋冶非時感冒代麻黃湯桂枝湯之類其功奇妙十り故

先輩傷寒ノ治ヲ云モノ無不称此方亦赤水玄珠加柴胡頻賛其妙然ルニ張氏纘論緒論等ニ於テ一言不及此湯医通全編ニ此方ナシ不知所以然ナリ謙案ニ冬月正傷寒ニハ仲景ノ正方ア リ春夏秋ノ感冒ニハ苓藕杏籐正氣散等ノ某アリ此方ヲ以テ兼用スレバ無此方可ナリ然ラズ雖無此方可ナリト云ヘ氏的症ノ可頼方ニアラズ此某而可乎曰此時疫ノ某ナリ時疫之説上編中編ニ詳ナリ夫傷寒温熱病并ニ時疫ノ論古代ノ名医未詳タトヘバ劉河間論傷寒云古ハ小柴胡湯ヲ用ユ今ハ防風通聖散ヲ用ト云云夫小柴胡湯ト通聖散ト異ナル某及論豈一病ニ數ノ古今用某ノ不同如是雲泥ナランヤ蓋シ劉河間ノ傷寒ト云モノハ温熱病或時疫ナリ劉氏通云傷寒論此方ヲ者多ク不知之其間温熱病時疫ノ論往々出ルト云ヘ氏一定ノ確論ナレ張路玉ニ至テ其論明白ナ

リ然レ𪜈不用此方謙今此方ヲ以テ時疫ノ葉トスルモノハ温熱病ハ今時希ナリ但時疫ハ不別四時表アリ裏アリ表裏兼ルモノアリ或感冒ト相混ズルアリ其症紛々ーメ似無定候此方發表アリ除濕アリ涼熱アリ治頭痛和中氣尚加減ノ方ナリ內外表裏此ニ進ルヽ所ナレ故ニ時疫門ニ攝入ス非時感冒ノ重症通用メ可ナリ

○李挺云風寒兩傷通用此湯加人參大棗謙云此是方加人參例也不拘風寒兩傷臨症加之可ナリ

○又云太陽少陽ノ合病ハ麻黄湯合小柴胡湯通用ハ此湯加石膏知母枳殼謙云此必合病ニ非ズ此加味ノ症ニ臨レデ用之ヲ

此方他病活用例

中風 珠云本一 方後赤水玄 冬温 冬温ノ治法春温ノ表症ト同レ葱豉湯九味羌活湯ハ裏モノハ加大黄重キモノハ雙解 血 加血黙滴不流者表猶未解此湯 散 加赤芍薬或升麻葛根湯加黄芩 同 寒症色黯黑鼻衄黙滴出者此湯或麻黄升麻 破傷風 破傷風ニハ此レク細辛ヲ用井湯 破傷風 加當皈芍薬等分大便秘加大黄 下痘 下痘初發宜此湯 眼方 風瘡赤眼宜レ 小兒外感 小兒傷寒大抵大陰症見加枳実厚朴少陰症見加川芎柴胡無汗者倍羌活○有汗者減羌活倍防風去蒼朮換白朮○太陽症見加桔梗知母厥陰症見加川芎柴胡太陰症加蒼朮厚朴○少陰症加桔梗知母燈草○厥陰症加川芎柴胡○夏月加石羔知母○眼此湯後不作汗加柴藁○悪風自汗 加減

加桂枝夏月去桂枝加芍茉○欲止汗去蒼朮加白朮再不止加黄
耆芍茉○汗後不解加大黄嘔逆加生姜汁有痰去生地黄加半夏○
肌熱加柴胡葛根○喘而悪寒身熱加杏仁生地黄○虚煩加知母
麥門竹茹○胸中飽悶加枳殻桔梗○本方去蒼朮生地黄白芷甘
草加桔梗枳殻柴胡名二八味羌活湯治傷寒風四時感冒頭
疼發熱悪寒身体痛疼此方解表妙方平和當勝於九味羌活湯
神効沃雪湯十七 治傷寒陰陽二證未辨時行疫癘悪氣相傳服
準之如湯沃雪此茉功力不可具述

蒼朮 乾薑 甘草 各四錢 厚朴 防風 白芍茉 乾葛 各四兩

右㕮咀每服四錢水二鍾煎至一鍾去滓熱服之不拘時必頓取
生薑葱白煮湯投之避風坐臥身體微潤即愈如疫氣正相傳染清
晨進一服為佳常服每用二錢水一盞煎至八分服

此四時感冒ノ茉ナリ方下二陰陽二證未辨ト八陰寒陽熱ノ二
證ヲ未辨別ナリ三陽經ノ証ヲ未辨ト云ニハアラズ或
時疫邪氣表ニアルモノ用之其功方下ニ記スゴトシ
○此方本出百一選方有當畧共ニ八味準繩無當畧七味謙按感冒
温熱病時疫難分疹必用之
○感冒其人素有温痰却テ生薑ノ香ヲ嫌フ者アリ亦宜此湯此方多ク甘草ヲ用ト云ヘ共本
邦ノ例ニ任セテ必ス計用ベカラス前湯ノ氣味ヨク呑心ヨキ茉ナリ

葛根湯十八
寒

葛根四両　麻黄三両　桂枝二両　芍薬二両　甘草二両炙　生薑三両　大棗十二枚

右七味㕮咀以水一斗先煮麻黄葛根減二升去沫内諸薬煮取三升去滓温服一升覆取微似汗不須喫粥餘如桂枝法将息及禁忌

此陽明經症ノ某ナリ陽明ノ經證ハ身熱自疼鼻乾不得臥頭痛脉長ナリ有汗者ハ桂枝湯加葛根無汗者ハ麻黄湯加葛根若夫太陽陽明ノ合病ハ前症ニ兼泄瀉自利スル者ハ與此方經中ノ表邪ヲ散ズレバ泄瀉不治ノ自治ス上編ニ詳ナリ參考スベシ

治大人小児時氣溫疫頭痛發熱肢體煩疼及瘡疹已發及未發疑似之間并宜服之

升麻十両　甘草十両　葛根十五両

右為麁末毎服三銭用水一盞半煎取一中盞去滓稍熱服不計時候日二三服以病氣去身清涼為度小児量力服之

○頭痛加葱白（本症）

○欬嗽加茅根白（本症）

○上膈熱加黄芩薄荷（本症）

○無汗加麻黄（本症）

○咽痛加桔梗甘草（咽痛）

○發黄丹毒加玄參（發黄丹毒）

○癮疹者紅點如蚤蟲之狀宜此湯（癮疹）

○小児傷風身熱頭項強自汗表不

此方モト温疫ノ某ナリ先輩曰痛鼻乾不眠等ノ感冒ニ用故ニ
今感冒ノ某トス或寒熱不時午後暖カニ脱衣午寒ク重衣邪氣ニ
感冒シ或ハ痘疹初起ノ通劑トス若又舊ニ因テ温疫ニ用ル片
ハ胸前熱スルヲ目的トスベシ涼所ニ醉臥メ夜氣ニ感冒シ發
熱腹痛スル ニ香蘇散ヲ合メ効ヲ得タリ
○麦松子陽明ノ經症ニ医者誤テ敗毒散補中益氣湯ノ類ヲ用
テ秋ヨリ冬ニ至ルマデ不治病ナホ本經ニアリ用本方五七貼
ニテ愈タリ謙按ズルニ此ハ陽明ノ感冒ナリ病軽キユヘニ月
ヲ經テナホ在本經若傷寒陽明ノ症ナラハ仲景ノ方
ヲ用ルニシカズ前方葛根湯ノ辨ニ詳ナリ考ベシ

之則俄没然發痙喘心腹強須臾而死矣過與不過勿復覆轍

太陽ノ症アリト云ヘドモ其吟味ナシ二陽明經ノ某
茅加黄芩ヲ用ユルト云ヘドモ其發表メヨシ引賊破家ノ虞ナシ
アニツサヘ加黄芩ヲハ如何ト思ヘドモ經驗スルニナルホド苦
カラザルヨシ兼ル所アラバ此ニ加減スベシ無汗ニハ加茅
蘇テ小兒感冒ヨシ
○瘡疹一見苗不可服慎之痘疹
○冬月加茅穂ハ分四肢厥冷加桂枝一戔同
○腰痛揣知是痘加桂枝一半
○時氣發熱太甚乃善氣盛加牛旁子一戔同
○按治癮疹最上方也○八半
九年己前六七月間天下人民多患紅斑摩之則當手不痛不痒
頭痛發熱悪寒合藿香正氣散二三貼而甘愈尓以來逢此證則
必得奇効矣發症
○當世人多患小瘡甚痒故合藿香正氣散而與

此方他病活用例

温病　温病發汗飲冷水ニ因テ發咳逆者此湯加茅根

温毒　冬暖ニ感温氣至春風氣相搏子癮疹ヲ發シ多痒初起此湯加玄

班疹　參　内傷瘀熱升テ攻頭面者此湯加玄參貝母黄芩麥門生地黄

同　牛旁子荊芥防風

同　爛目痛此湯加香薷黄連

瘡　癮疹甚赤名丹毒本方加黄芩玄參冷若加黄蘗白芷

瘡　其瘡肌肉周出不快者加紫草

同　後便血或下腸垢身熱灌膿ノ前脚根紅紫者屬

面熱　手ノ陽明ノ熱此湯加酒黄芩連翹

面熱　身前皆熱顏面熱者此湯加黄芩黄連白芷犀角川芎荊芥薄荷名升麻黄連

丹毒　丹毒此湯加白朮茯苓木香枳殼通用

同　癮疹八陽明ノ病身熱目赤便秘

同　後

瘡　瘡ハ陽明ノ病身熱目赤便秘

面腫　虚風面腫下関急擣目内

面寒　身前皆寒ヘ面不堪風寒者此湯加附子或去芍藥加人參黄蘗附子

面腫　虚風面腫下関急擣目内

雷頭痛　雷頭風寒熱及面腫痛者此湯加小児老医傳云小児吐血加黄

血　血面黄眼渋多睡此湯加蒼朮荷葉

血　血面黄眼渋多睡此湯加小児

吐血　吐血加黄蘗芎藭名黄蘗芎藭湯

連如神

口舌　口舌心脾熱者此湯加薄荷黄芩桔梗

牙齒　牙齒小児ノ治牙齒痛甚兩頬腫痛此湯加白芷連翹

咽喉　咽喉

水　友松子治一婦人無故咽痛脉浮數聰耳此湯加人參黄蘗薯蕷荊芥牛旁子

明目　明目子黄柏名益氣聰明湯

尋常感風腫者 麻疹 麻疹初起咽咳發熱惡寒欬嚏流涕
此湯加蒼朮 頭眩 此湯加紫蘇葱白解肌ス忌大汗ヲ
久病陽氣鬱シ惡寒者此湯去五心煩熱 發
芍藥加人參白芷草豆蔻蒼朮 五心煩熱者此湯
加防風柴胡葱白 濕 李仲梓破傷風
自汗甚キニ加白朮用之此理ヲ考テ濕邪自汗不
止ニ加白朮用之胃中ノ濕ヲ燥ノ汗ヲ止ルナリ 肩背痛 肩ニ重キ
項重痛スルヲ俗ユレヲケンヘキト云加肉桂ヲ効アリ ヲ負ヒ肩

柴葛解肌湯二十 即葛根湯本湯
陶 治足陽明胃經受證目痛鼻
乾不眠微頭疼眼匡痛脉來微洪宜解肌屬陽明經病其正陽明

府病別有治法

柴胡 乾葛 甘草 黄芩 芍薬 羌活 白芷 桔梗
水二鍾姜三片棗二枚趲法加石膏未一錢前之熱服○本經無
汗惡寒甚者去黄芩加麻黄冬月宜加春宜少夏秋去之加藁葉
○本經有汗而渴者治法開在如神白虎湯下

此方陽明經感冒ノ葉ナリ 細註葛根湯ノ本湯ニ加減スト云ヘ
ド葛根湯ノ本湯ハ麻黄カ桂枝カ無レバ葛根湯トハ云ハレヌ
此ハ錢仲陽カ升麻葛根湯ニ加味シタルモノナリ升麻葛根湯
ノ名先輩称スルニ升麻葛根湯或升麻湯ト云葛根湯トハ云ハ

ヌ葛根湯ト云ハ仲景ノ方ナリ此何ヒ意得ガタシ此ハ右ニ云ル通リ升麻葛根湯ニ加減シタルモノナリ惣メ陶氏ガ傷寒ノ方仲景ノ方ニ各加減メ是デヨカラウト道理デ推テ立タモノ本カラ經驗デ制スルトハ見ヘヌ尤何レノ方ト云ヘヒ藥性ヲ考ヘ君臣佐使七方十劑ノ法ニヨリ制スルモノナレバ皆道理デ組タモノナレヒ其中ニ心融妙達思議ノ不可及モノアリ又道理推量デ組タモノモアリ或ハ此方ト彼方ト合メソレー何ヲカルト云方モアリ自優劣アリト知ベシ

○方下ニ所述ノ病候皆陽明ノ經証ナリ陽明ノ府症ハ治法別ナリ此方太陽少陽ノ藥モアリ汗ニハ麻黄ヲ加ル例モアリ追法ニハ石膏ヲ加ルコモアリ混雜シタルモノナレヒ病人ニ臨ンデハ此ヤウナ藥ガ用ヒタキコガアルモノ其上胸節庵ハ功者ナル醫ト先輩モ云テアルレヒ規矩ニナル藥方デハナシ

感冒

香葛湯　二十一　治感冒頭痛咽乾或胸腹脇痛

香薷散ニ合升麻葛根湯加蒼朮○或加川芎白芷減半

此方感冒ノ菜極テ効アル菜ナリ胸腹脇痛ト云ガ此湯ノ目的ナリ其中ニ山嵐ノ瘴氣ニ兼用ベシ去蒼朮加羌活枳殻名神授大乙散傷風身痛腹痛スルニ用ユ

此方他病活用例

胞痛

一婦人歳四十餘三月ノ末ヨリ胸痛膏肓ノ邊微痛胸中虫衝上而鳴食則胸中滿而不通息則鳩尾邊塞痛全ク不食常有

塊發則吐黃汁太便常結二三日一行脉緊此湯加神麯麥黃連腹痛壯男久腹痛臍下疼痛脉微弦此方即藥毒奇方脾胃中ノ濕熱ヲ去ル菜ナリ久病雜治混雜ノ菜毒ノ為ニ惱サレ、コト多シ其時ハ症ニ隨テ加減メ用ベシ胃中ノ濕熱ヲ去ル故ニ霍乱吐瀉ニモ用ルコアリ頭痛頭痛シテ渇スルニヨシ胸痛胸脇腹痛ノ何ニ脇痛ニテモ胸痛ニテモ腹痛ニテモ此方ノ類ヲ用表ヲ解テヨシ

十神湯二十二局　治時令不正瘟疫妄行人多疫病此菜不問陰陽兩感或風寒濕痺皆可服之

川芎　甘草炙　麻黄　紫蘇　白芷　升麻　陳皮　香附　赤芍菜各四匁　乾葛十四匁

右為細末每服參大錢水一盞半生姜五片煎至七分去滓熱服不以時候如發熱頭痛加連翹柴胡中滿氣實加枳殼數片同前服雖産婦與兒老人皆可服餌如傷寒不分表裏證以此導引經絡不致變動其功效非淺加減此方ハ温疫ノ菜ナレ共寒ノ菜ト意得テ加減シタルモノナレバ此百二十方等ノ加減ハ傷ニ本症ト云ハ傷寒感冒ノコト意得ベシ

白本症　○中滿氣實加枳殼本症　○心腹脹滿加枳實半夏本症　○潮熱加黃芩麥門冬本症　○欬嗽喘急加去白桔梗半夏本症　○大使閉加大

黃芩硝（本疒此症ハ若シ傷寒ナラバ承氣湯大柴胡湯ヲ用ベシ可用（疒感冒熱結ノ是表裏混雜ノ症アルベシ詳ニ考ヘテ之

○嘔吐加薑香半夏（本疒）○泄瀉加白朮茯苓（本疒）○瘧疾加草菓枳殼（瘧疾本疒ノ候ヲ兼ルモノト）○痢疾加枳殼黃連（痢疾甚シ）○腹痛加芍藥（本疒）○發熱頭痛加細辛石膏（本疒）○飲食不進加砂仁白豆蔻（本疒）

○嘔逆加丁香草果（本疒）○衄血不止加烏梅葛根（衄血因ル者外感ニ○疹毒加肉桂人參茯苓（膿）○按此方芎芷香薷合升葛湯加麻黃故專要在麻黃一味矣○感冒風寒者發熱惡寒欬嗽頭痛甚而無汗者宜此湯○傷寒舒發久不退且汗不出口乾頭痛是班可出之證即與此湯間班出而熱退也是乃醫術有功者所爲矣予屢

歲頃見一病人其證肌熱久不退且無汗口乾頭痛故與人參白虎湯則一二貼而死天刑難逭者也（此按證下集ニ出タリ此ハ文章惡キニヨツテ閘ヘ惡シ證下集デ見レバ能キコユル此字面デスム大抵感冒ノ發ハ必朝ハ焚ガリメルモノ俗ニ朝ザメト云瘧疹ナドノ熱ハ朝サメガ爲ヌモノカヤウナコトモ考ヘテ用ベシ但此ニ限リハセヌナリ）

○東井療婦人項筋急而腹脹去麻黃加蒼朮即神授得奇妙尓以來有數奇批曰即香蔔湯也者醫曰東井叟當時治婦人項強腹脹去麻黃加羌活枳殼三貼而奇効又治一人頭痛咽乾心腹痛加蒼朮而大驗

此方時疫ノ初淡頭痛甚強ク如破モノニ用ナリ或感冒頭痛甚キニ用ベシ氣實ノ人ニ用テ氣弱ノ人ニハ酧酌スベシ

此方他病活用例

班疹 疹ハ風邪皮毛ニ客ス輕キ者ニハ荆芥防風前胡桔梗蟬退重キ片ハ用此湯班ハ熱毒肌肉ニ蘊ム輕キ片ハ升麻葛根湯加黄連犀角玄參ノ類重キ片ハ人參白虎湯主之疹ハ發散スベシ甚寒ノ葉ヲ用テ其發散ノ勢ヲ留ルヿヲ大ニ忌ム誤テ班疹ヲ治スル法ヲ以テ疹ヲ治スベカラズ

解表升麻湯二十三回

升麻 藁本 羌活 蒼朮 陳皮 當皈 甘草 麻黄 防風

右剉一劑姜葱水煎熱服出微汗解表升麻湯ハ遍身壯熱骨節疼痛ヲ治ス

方下ニ述ル如ク痛風ノ葉ナリ風寒濕ノ三氣ニ因ル故ニ解表除濕ノ葉ヲ用ヒ加當皈一味潤血行痺良方ナリ此方兼テ感冒有熱身痛ヲ治ス

治頭風疼甚嘔吐方二十四 醫統

甘草 細辛 羌活 荆芥 藁本 川芎 薄荷 白芷 防風

右水盞半細茶一撮煎七分食後温服

主治如方下嘔吐ヲ療ルヲ目的スベシ

頭痛

川芎 荊芥 各調散二十五包

治丈夫婦人諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞声重傷風壮熱肢體煩疼肌肉蠕動腦熱痰盛婦人血風攻注太陽穴疼但是感風氣悉皆治之

薄荷八両 川芎 荊芥 各四両 羌活 甘草 白芷 各二両 防風 両半 細辛 一両

右件為細末每服二銭食後茶清調下常服清頭目

此方傷風頭痛ノ某ナリ亦傷風解ノ後風氣ナオ上部ニ留リテ頭痛スルニヨシ此症常ニアルモノナリ若寒熱ノ症解メ後頭痛バカリ跡ニ殘ルハ此方ニ宜シ若寒邪ニ感冒シタル後ノ頭痛ハ此散ニ宜シカラズ皆風熱ヲ發散スルノ藥品ナリ○篇云

此散近來東武ニテ諸風散ト銘シ賣薬シ海内ニ弘ク用ルユヘ擺薬ヨリ用ルニ便ナル故ナリ然レ共寒邪ニハ禁用

○一方　此方惣薬各一両童便香附加二両為散食後茶調服ス

偏正ノ頭風或産後ノ頭痛ニハ豆淋酒ニテ服ス

○右一方ニ更加酒黄芩酒黄連山梔各一両為散食後茶調服ス

スル片ハ痛ミ煩渇引飲便秘スルモノ用之

○偏正ノ頭風又不愈痰喘ヲ夾ミ熱者此散加細辛各一両為細末每服二銭

○偏正ノ頭風痰ヲ夾ミ又不愈モノ二此散ニテ探リ吐ス

○風熱眩暈シ頭痛スルニハ此散二宜シ

右三症此散ノ本症ナリ

此方他病活用例

烏巣堂藏

眼 赤目爛ル風淚下ル者ハ何ト云フヲ不論此散ニ宜シ 同 熱淚ハ肝腎中ノ伏火ナリ宜此散

人參敗毒散 二十六 治傷寒時氣頭痛項強壯熱悪寒身體煩疼及寒邪欬嗽鼻塞声重風痰頭痛嘔噦寒熱並皆治之

人參 芎藭 茯苓 枳殻 前胡 柴胡 甘草 桔梗 人參 羌活 獨活

右拾味各三拾両為麁末每服二錢水一盞入生姜薄荷各少許同煎七分去滓不拘時候寒多則熱服熱多則温服加減傷寒頭疼身痛項強壯熱悪寒口乾心中溫熱加

黄芩 感冒 ○傷風鼻塞声重欬嗽吐痰加半夏杏仁 同 ○頭目眩暈屬風熱加半夏天麻 同 ○眼目腫痛因風寒所感加防風荊芥當歸赤芍茶去人參茯苓 眼 ○酒毒發熱渴加葛根黄連 傷酒 ○瘡疾不問先後熱先熱後寒頭疼身痛加蒼术葛根草果檳榔 瘧 ○風熱濕毒腰痛加續斷天麻薄荷木瓜 腰痛 ○風熱入大腸下血不止加柒白皮薄荷烏梅生姜兼有蚘血加麥門若因酒毒者加黄連 下血 ○足三陽經受熱毒氣流注脚踝上脈赤腫痛寒熱如瘡自汗悪風或無汗悪寒加蒼术 脚氣 ○皮膚瘙痒加蟬退 同 ○熱而紅

腫加木瓜若水同○大便實加大黃同○風熱上攻咽喉窒塞或痛或不利生瘡或如肉線痛妨悶加黃芩半夏連翹倍加桔梗咽喉○時行瘟疫下利赤白發熱口乾身痛加陳倉米黃連生姜大棗名倉廩散剌○噤口剌加陳倉米蓮肉同○剌後手足痛加木瓜柾抽同○臂痛冷起手甚難舉合五積散名交加散加木瓜牛膝生姜大棗臂痛○諸般瘡毒腫痛或癰疽疔腫發背乳癌瘰癧寒壯熱甚者頭痛拘急似傷寒加荊芥防風連翹忍冬人參名荊防敗毒散癤○身生癮疹血瘕腫極痛且痒或風熱積毒發於面

頭手足如腫脂色加葛根赤芍麻天麻蟬退薄荷麥門生地黃名平血飲癮○小兒急驚風初起發熱手足搐掣上竄天吊角弓反張並一切感冒及瘡疹欲出發搐加天麻全蝎蚕蠶白附子地骨皮驚風○按病人氣實者去人參若氣弱難運蔡力者加人參本症○四時不正瘟疫熱毒鼻塞声重頭面腫痛加人參薄荷生姜同○頭痛甚者加荊芥本症○如心經蘊熱口舌乾燥加黃芩同○傷寒頭痛發熱惡寒半表重半裏輕者宜用之感冒○無名腫物赤而痛處有發熱世俗謂之風毒腫若熱甚加黃芩可也風毒腫○外

科腫物貼某故毒氣不出周身浮腫者宜用此湯（麥）○一卿患痢（痢）世俗謂之腹疫病加粳米蓮肉（痢）熱痢與訶子肉豆蔻則雖痢止而熱不退此湯加二黄或黄芩宜解散其某毒（痢）○腸風下血及近血赤得驗（下血）○風眼目赤多血者用之若甚腫痛加二黄湯或黄芩黄連亦可（眼）○下湯風呂等風中浮血故赤斑出甚痒加當歸薄荷或白朮防風荊芥蒼朮若某生地黄亦宜正傳曰謂之加味敗毒散此方宜用癮疹（疹）○痛風因風濕着百節痛者脚氣痛處煩熱着倶得奇効（痺）○癆気在内難發出與此湯則悉發出又因加減内消亦可（楊梅結毒）○木頭瘟病項面腫及咽痛加牛蒡子黄連（大頭病）○小児急驚風加白附蚕（驚風）○小児啼則口眼喎斜順少腫與此湯得數奇（小児雜病）○瘟疹序病甚發熱與升麻葛根湯其熱不去故此湯加紫草有奇効（瘟疹）○一人冬月患痢無熱腹痛與芍藥湯不効故慮感風濕為痢與此湯得奇妙（冬月無熱痢疾芍藥湯ヲ用ルコト不及評甚タ誤レリ（痢）○或曰鼠咬加貝母（雜）○九欲與此湯者先試口気熱或骨節痛而可也此目的甚タヨシ常ニ此感冒ノ候ト心得ベシ

此方時疫初起ノ某ナリ三因方云本道藏ヨリ出ス異入傑出ス

相傳ノ活人書ハ衆人ノ病ヲ一般ナルモノ加葛根妙タリ羌活獨活
散表邪柴胡前胡川芎行陽氣清不正之氣桔梗枳殼胸中汚濁ノ
氣ヲ下シ人參茯苓補中培土メ邪氣ニ勝ツモ草和諸菜邪ヲ緩
フス時瘧ニ用ル片ハ人中黃ヲ以テ甘草ニ代テ益ヨシ
○舌紙紅色ナルハ時疫ノ邪熱初テ內ニ入ノ此湯ニ加減シ或
升麻葛根湯ナドニ宜シ
○醫通云溫病熱病時行疫癘ヲ病テ素陰虛ノ人治シ難シ家大
人嘗云崇禎辛巳年劍鐘ノ民時疫大ニ行レ凡發表攻裏ノ藥ヲ
服メ皆死スタヾ敗毒散補中益氣湯ヲ用テ多ク得生モノナリ
○時行疫癘ノ片患頭重モノ
此湯加減ニ倉朮藁本雅ナリ
此方他病活用例

感冒　活人書方後云嶺南煙瘴或卑濕ノ地脚氣痿弱此藥不可少ト云ヘリ　同　感冒汗後不解モノ宜
疫ノ初發寒疫ノ汗メ後不解モノニ用云云謙云方中有人參時
疫ノ初發ニ用ルハ正氣ヲメ邪氣ニ勝シム寒疫ノ後ニ用ルハ
補之故ナリ然レバ人參不可必セリ然ル二今皆去人參不
用フレニテモ効アルハ病輕キ故ナリ医通云虛人發散ノ後熱
不止ハ此湯ニ　同　傷風挾メ有汗者此湯加桂枝謙云　同　下人感冒
宜シト云ヘリ　同　此症脈沉細數者加桂枝合半ナリ　同　メ頭痛甚
ク終夜ニオヒウナル　風濕　風濕ノ症
者此湯加麻黃即愈　同　湯去人參柴胡加瓜婁根　風濕　風濕熱メ身痛煩渴者此
去レバ濕殘ル者此湯　痙病　痙病風痰盛者此湯加防風天麻黃
加蒼朮一戔防己半戔　溫毒　溫毒瘧疹此湯
加紫草芍藥

芩全蝎生【頭痛】上焦熱シ頭痛者此
姜蒲荷【下血】腸風下血其血一筋別ニ
湯去柴胡加菊花
明経ノ熱毒ナリ用此湯ニ不
【狂痙】外感ハ此湯加柴草或
應升陽除湿和血湯ニ宜シ
升麻葛根湯加玄参【同】
者此湯或小柴胡湯加防風【腰痛】風傷腎腰痛或左痛或右痛無
翹或補中益氣湯加羌活防風【脚氣】常引脇膝強クヒツパリ倪仰
メ以テ顧ルコナラ【脚氣】脚氣發熱不退者此湯加木瓜
ザル者此湯加杜仲【同】腫痛此湯
加蒼朮【牙歯】腸胃積熱ニ因テ牙歯痛只氣甚臭不
大黄【同】近者此湯加荊芥防風升麻石膏
蟄ニ障リトナル者此湯加黄芩半夏倍若梗薄荷生姜瘀血者加石膏【同】喉痺ノ病一般ニ流行スルコアリ此ハ時疫ナリ荊防敗【咽喉】風燥ノ咽喉乾キ吞

毒散ニ加減スベシ【類瘡】因風熱類瘡瘍者此湯加升麻葛根白芷【丹毒】丹毒通用此湯加柴薤【産後】産後風ラレ身痛無汗者宜此湯虚症ニハ逍遙散去白朮加桂枝縦々ト治スベシ【小児諸驚】小児上焦熱シ驚惕沸常者此湯加小児【小児反張】小児強直發熱メ反張者風傷太陽宜此湯當帰木香【瘡】瘡毒大便堅ク發熱メ不攅瘡腫寒熱メ痛ハ邪表ニアリ宜此湯ニ大便秘【疔】疔瘡表症多キ者メ痛ハ邪裏ニアリ清熱消毒湯ニ加白蜜【疔】此湯加蟬退殭蚕金銀【同】疔脳背ニ發者此湯花【同】加金銀花白芷大黄【腸癰】腸癰湯加薬苡連翹裏急後重便膿血腹痛頭痛熱甚脈弦數此湯加芍薬桃仁大黄ヨレハ風湿ヨリホド二此配剤ヲ與フ此症ニ倉廩散ニ加柴胡而【痢】一男子痢疾晝夜廿四行

用テヨイコモアルナリ是ニ加黄芩テモヨケレドモハヤ栄胡大黄デハタラカス程ニ入ヌゾ傷寒ノ初發ノ如ク壮熱アル二黄芩大黄ヲカロテヨキコトアリ其レハ黄芩ハ大腸ノ熱ヲ醒シ大黄ハ味濃メヨイコモアルゾ　同　一人常ニ過酒ノ近疼出腰脇附腫大便虚坐一日四五十行通只一二次脉細數此湯加黄芩黄連葛根當皈桃仁　同　外熱ヲ的ニスルガ病ニ頭痛ノアルガ又的ナリ又頭痛モアリ腹痛ヲヨキアリ其ニハ加青皮ナリ惣メ腹痛ニツレく二症ヲ見分テ薬ヲ用テ一旦治メ又痛ム痛ンダリ止ンダリシテ諸薬不効ハ休息腹痛ト云木方ニ加青皮用ルト効アリ　中風　中風諸症愈テ手足不遂ニ此湯加木香木瓜青皮　同　中風表症ニ此湯加防風荊芥羚活白朮忍冬桜實猴御愈　同　木瓜烏薬夏去挽御人参茯苓有熱更加大黄　淋

本邦老医傳云淋病並中痛ツヨク百薬不効ニ五淋散ニ合シテ用ユ　楊梅瘡毒後一身熱頭痛自汗甚膈上塊上下如梁　風眼　諸医不効日々羸瘦加薄荷黄芩効アリ○本方ニ加當歸芍薬防風荊芥蒼朮白朮生地黄名加味敗毒散　風濕　表ノ血熱ヲ涼スル薬ナリ亦風湿ヲ治スナリ身ノ痛ガ目的　下血　血風ニ用ル薬風邪ナリ　眼目　目ニ血ノサシタルニ加ニ黄用ユ　楊梅　瘡毒ノ外ニ發シカタキニ用ルコトアリ　大便閉　大便秘結ニ通薬バカリ用テ内ヲクツロゲルコトナイユヘニ不効ニ用此方効ヲ得タリ　淋　淋病並中甚痛膿血出ルニ肥前瘡ノ類ヲ熱湯ニテタデ五苓散ヲ合シ用コトアリ　疥　肥前瘡ノ類ヲ熱湯ニテタデコメテ腫氣トナルニ用ル升

麻和気飲赤小豆湯ナドモヨケレ𪜈此方能効アリ或本方敗毒散加猪苓澤瀉木通大黄即効アリ大小便𪜈二快ルヲ目的トスベシ

冬温

陽旦湯二十七　治冬温発熱咽痛或自利而欬

活人

桂枝三戔　芍薬酒焙　甘草炙各二戔　黄芩酒炒三戔　生姜三片　大棗三枚擘

右水煎去滓温服無時日二三服○本方加乾姜名陰旦湯治内挾寒食者

冬温ト𠮟ハ冬ニ非常ノ燠気行レテ其温気ニ傷ラレ其症心煩シ嘔逆シ咽痛身熱頭痛或欬嗽自汗頭重面腫其初メ咽痛後必下利又此湯加猪梗茎薤若寒食停滞或寒涼ノ菜ヲ服シ寒邪外ニ鬱

シ濕邪内ニ結セバ更ニ加乾姜黄芩

此方他病活用例

刺　痙痢血痢身熱脉浮者用此湯

風温

二十八

薤白湯　治風温欬嗽及冬ニ温発熱頭眩咽乾舌強

活人

薤白一戔五分　白薇　麻黄去節泡　川芎　葛根　羌活石膏甘草炙　杏仁去皮尖砕　青木香各一戔

右水煎日三服

此茎冬温或温病誤テ発汗シ其症脉浮自汗出身重ク多眠ル鼻

息如奔語言難出此湯主之

此方他病活用例

欬嗽 冷熱欬ハ衣服ヲ増タリ減タリスルニ因テ寒熱ヲ感シ但寒ヲ悪ミ熱シ脈浮風重キモノニハ金沸草散若シ脈數或濇ナル者ニハ熱重シ此 同 先ッ風ニ傷レテ欬嗽ノ後亦熱ニ傷レテ湯去川芎加淡豆豉 同 欬嗽スル ハ熱寒邪ヲ包ム歟スル者ニハ此湯ニ

加減スベシ

麻黄附子細辛湯二十カ

寒

麻黄二両　細辛二両　附子一枚炮

右三味以水一斗先煮麻黄減二升去上沫内荼煮取二升去滓温服一升日三服

此荼傷寒少陰ノ證太陽ノ兼表邪モノニ用ルナリ夫太陽ノ表證ハ發熱頭痛脈浮ナリ此證ハ脈沉ニメ發熱シ無頭痛太陽ノ症ナラバ脈浮頭痛スベキニ反テソウナイカラハ少陰ノ表症トメ可汗之以麻黄細辛發表邪以附子温少陰經ソレデ本經ニ少陰病始得之反發熱脈沉者麻黄附子細辛湯主之云反ノ字ニ意ヲ付ベシ

麻黄附子甘草湯三十寒

麻黄二両　甘草二両炙　附子一枚炮

人參 茯苓 甘草 陳皮 白朮 藿香各兩 厚朴二兩半夏兩半

右為細末每服二錢水一盞生姜三片棗子一枚葱白三寸同煎至七分溫服不拘時候。欬嗽桔梗前胡桑白皮杏仁之類臨時加味。頭痛壯熱無汗加羌活去人參（木忘）。瘡後調理加芎藭青皮（瘡）。婦人娠外冒風冷而毫毛寒立或汗出加當歸川芎木香（娠本症）。婦人欬嗽身體疼痛加五味杏仁白芷（婦人欬嗽）。婦人血風加川芎（血風）。本方去茯苓半夏加木香香附子名調氣散（醫林）治小兒驚瘧吐瀉不乳多啼（小兒驚瘧）

右三味以水七升先煮麻黃二十兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

此茅前湯ト同症ナリ前症八日數無ノ只反テ發熱脈沉ト云此症ハ得之二三日ト云病ナホ輕シ故二可微汗去細辛代甘草ナリ本經火陰病得之二三日白麻黃附子甘草湯微發汗ヲ以二十三日無裏症故微發汗也云云右二方上編ト參考スベシ

八解散 三十一 治四時傷寒頭疼壯熱感風多汗及瘵勞傷過度骨節酸疼飲食無味四肢倦怠惰少力欬嗽寒熱羸弱自汗胸膈不快嘔逆惡心

此薬不換金正氣散ニ以白朮代蒼朮加人參茯苓倍厚朴ヲ虚人ノ感冒ノ下ニ所述症ヲ治ス畢竟溫補中焦ノ自法ル

○感冒素其症重ク或療治不應ノ時疫ノヤウニナリ熱ノ指引モアリ或舌ナドモ焦レ其外彼是兼ル病症モアツテ何ヒ見分難ク感冒ヤラ時疫ヤラ不知ニ近代本邦ノ医師ブラ〳〵トシタ療治ヲシテ愈ルコトアリ此方ニ加柴胡黄芩減厚朴ブラ〳〵用テ居ル中ニ即効モ無レヒ少ヅヽ的中ニテハ無レヒ病カラ愈テクル症ナリ去ニヨツテ京師ノ老医高盛子何病ニテモ此薬ヲ随分小貼ニ調合シ柴胡青皮芍薬香附木香縮砂麥門枳殻ノ類或附子ヲ加ルコトアリ其見合ニ加味ス又藿香厚朴ヲ去レバ六君子湯ナリ是ニモ右ノ意得ニテ加味シ薬一貼五六分ホドニ調合メ見合メ居ル中ニ自發ト愈ルコトアリ此ハ不器量ナル療治ナレヒカヤウナ病人ガタ〳〵アルモノソレニハ此療治ヲスベシ假令不器量ナル仕方ニテモ兎角愈ルガ能程ニ是モ時々スルコトモアリ不去コトアリ必死用ルコトアリ或始去後加コトアリ

此方他病活用例

百二十方云此薬補中益氣湯ノ輕症ニ用ル云謙云此薬ヲ用ルトキ不用ハ以輕重云ベカラズ元來薬ノ筋ガ違テアリ補中益気湯ハ労役ヲ主トノ用ヒ八解散飲食労倦ニ因テ内傷ノ諸症ヲ見ス者ニ用是ガ食滞ト云テ脾胃ノ持チナレガ悪サニ草朗同又云去人參加枯梗名タコナリ此症ニハ八解散ガ的當ナリ万安湯此加減器量アル者ノヲカレガルコトナレヒソウデナイ成程効アル薬ナリ其

即的ハ此加減ハ中焦ノ不運故ニ生ズル病ニ用ルナリ内傷外感共ニ此意味ニテ用ベシ前段ニ人參ヲ不去ニ用ルハ飲食労倦ニ因テ中焦ノ草卧ヲ主トス此段ハ中焦ノ不行ヲ主トス

類中風　又云頭痛發熱體倦舌強不能言語是則傷寒カ中風カト云ニ疑アリ可用之謙云外ノ所ニ疑ハナイ舌強不能言語ト云ニ

咽痛　又云頬頸及咽腫津唾難呑者加桔梗羌活升麻友松子云是濕痰或因風濕者アリ

泄瀉　又云脾胃虚而泻せバ除厚朴

欬喘　佛耳草

類勞證　謙云此外種々治方アリ

虚ノ類勞症有欬嗽者此湯加芍茉五味子名十味人參飲經驗ノ方ナリ

痢　中氣虚弱食後困眼上嵐脈細弱此湯加黄耆當歸升麻柴胡

中焦不行或飲食労倦シ或兼鬱滯或氣

一人二十餘歳泄痢之後

感冒

加味益氣湯三十二

即本方加羌活防風久月春寒更加桂枝ヲ

喘急ニ此湯加芫花コレハ百茶不効モ

喘急ノニ不應ト云コトナシ是十束湯変方ナリ

傷寒　四十餘歳之男思慮耗氣之後患傷寒發熱及十日不止甚譫語耳聾舌乾不知苦処脈數弱無倫次用補中益氣湯及寒涼之劑而不効此湯加芍茉思慮耗氣忘多

本證　本邦老医傳云感冒頭痛少有汗足微冷脈微弦無力ニ與二三貼後宣用益氣湯此症正氣散ノ類ヲ用ルト甚アシ、謙按ニ右ノ症夾陰ノ症ニ紛ル、夾陰ナレバハ解散不可用只宜用建中湯ナリ夾陰ハ脈大而虚按之微也以脈可辨之

芩連消毒飲三十三　治天行大頭病發斆悪寒頭項腫痛脈洪取
作瘀火治之其喉痺者亦照此方治之

柴胡　甘草　桔梗　川芎　黄芩　荆芥　黄連　防風
羌活　枳殻　連翹　射干　白芷

先加大黄利去一二次後依本方去大黄加人参當飯調理○水
二鍾生姜三片煎至一鍾量粘子一撮再煎一沸搥法入竹瀝姜

此方労役感冒ヲ治ス中編ニ詳ナリ加味ノ条小異同アリ證ニ
従フテ用ベシ何レニモ羌活防風ハハツレヌ其外極メテハナレ

汁調服

此方天行大頭病ノ某ナリ東垣ノ普濟消毒飲ト云条アリ此方
ト某味異ナリト云ヘ𪜈其効ハ一ナリ故ニ此方ヲ載スル程ニ此
方ヲ用ベシ喉痺ハ此方ヲ照セトアルハ此症必咽ガ腫塞ルモ
ノヲレモ是デヨイ亦大頭病デナレニ喉痺バカリ病ム者モア
リヲレニモ此方ヲ照メ用ベシ扨大頭病ニ荆防敗毒散ヲ用ル
症モアリ小柴胡ニ加味メ用ベキ症モアリ上編ニ詳ナリ

○李挺云大頭病凶荒労役遊用ニ安裡ヲ
虚者普濟消毒飲加参飯便秘加大黄ヲ

牛蒡芩連湯三十四　治積熱在上頭項腫起或面腫多從耳根上

起俗曰大頭瘟并治煙瘴ニ

黄芩（酒炒）各一錢半　黄連（酒炒）各一錢半　桔梗　石膏各一錢半　荊芥　防風　羌活各三分

右剉一劑生姜一片水煎食後細々呷温毎一盞做二十口次服常令藥在上勿令飲食在後也

此方前方ト同シク大頭病ノ茶ナリ此モ咽喉痛ヲ兼治ス但シ并ニ煙瘴ヲ治ストアレバ不正ノ気ニ中リタル症ニ用又時疫ニモ用ベシ然ルニ芩連消毒飲モ不正ノ氣時疫ニ可用茶ナレバ畢竟同シコナリ但シ症ニ臨ンテ病ト茶ト考合テ此方ヨリハ是ガニシト云コカ自然ニ出テクルモノ考ヘ可用ナリ

半夏各錢半生薑十片甘草炙半分　茯苓　神麯　姜汁炒各一錢　蒼朮泔制

半夏湯　治素有風證目瞤頭痛眩暈胸中有痰欲吐如居煖室則微汗出其證乃減見風其證復行當先風一日

痛甚　升麻　柴胡　藁本各等分

此方ハ痰症ニ因テ持病ノ頭痛ニ用ル茶ナリ痰症ノ頭痛ハ持病ノ頭痛サレ起テ欲吐ガ目的ナリ

○眩暈眼クラミ悪心見風亦發ス此湯主之

選奇湯三十六　東垣　治眉稜骨痛不可忍或風熱上壅眩暈

羌活　防風各一錢　夏夏甘草一錢五分冬不用　生姜夜酒黄芩一錢五分冬不用　甚者冬亦炒用　加半夏姜制二錢

右水煎

方下ニ云如ク眉稜骨痛ハ風熱上ニ壅ルニ因テ此症ヲ生ス此藥ハ右ノ方ナリ眉稜骨痛ハ風熱上ニ壅ル故ニ名ケ異奇湯極テ効アル藥ヲ選デ制ス二消熱シ緩々服之冬月ハ去黄芩加炒豆豉薑白

○赤目ニハ加菊花○鼻塞ニハ加細辛○夏月火ニ近ケバ痛ハゲシキハ伏火ナリ加石膏三錢○頭風疼熱不止加石膏麻黄不

湯合消遥散加山梔天麻黄芩若シ兩耳ヨリ膿出ルニ及バヽ急シ

消毒犀角飲三十七回　治癍及癮疹

牛蒡子四錢　荊芥一錢　甘草一錢　犀角一錢　黄芩一錢　防風一錢半　右水煎

此茉熱ニ屬スル斑疹ニ用ベシ呉昆云無發不斑無濕不疹云云牛蒡子ハ風濕ノ癮疹ヲ治スル故ニ以之君トス餘茉皆散風熱ノ茉ナリ方下ニ治斑ト アレ共疹ノ方ガ主治ナリ或斑ト疹ト相交リ出ルコトアリ此方尤宜之

葛根橘皮湯三十八方考　冬月肌中癍爛欬而心悶主之

葛根　橘皮　杏仁　知母　麻黄　黄芩　甘草　各等分

右水煎

此茶冬月ノ發班ヲ治ス其証方下ニ云ガ如シ然ルニ此方モト傷寒溫要ニ出ス冬月非常ノ溫気ニ傷ラレ即不疾シテ春ハ餘寒ノ氣ニオサヘラレ毒氣未發三月時分燥氣行レテ溫毒トナリテ發スル始メ發スル片肌肉錦紋ノ如ク紋メ心閙清汁ヲ嘔吐スル者ヲ之謙按スルニ溫要ノ用法ト方考ノ主治トハ冬月ト春月トノ違アリ寒氣ノ時分ニ用ルトハ各別ナレモ能々考ヘ見レバ此茶品ニテハ冬モ春モ通用ノ用ヒ可然ナリ但冬デモ春デモ嘔吐清汁スルトキナリ

麥門二錢　黄芩酒一錢半　羌活　當歸　川芎　白芷各一錢　藁本五分　細辛　甘草各三分

右ハ姜煎服○一方去藁本加菊花○左痛ニ加柴胡生地各一錢紅花

龍胆各一錢右痛加黄芩一錢葛根八分正額上眉稜骨痛甚者食積痰壅加天麻五分半夏山查枳殻各一錢當頭頂痛加大黄一錢藁本五分風入腦髓而痛加荆芥木瓜蔓蘆子各一錢氣血兩虚有自汗加黄耆一錢半人參白朮生地各一錢

此方ノ上ノ意味未會得ナゼナレバ本方多味其上分量ノ多少未審処アリ但頭痛ノ總可トノ時ニ臨デ意ヲ加ヘ用ベシ眉稜骨痛ハ選奇湯ノ下ニ云如ク風熱ノ上壅ナリ此方ノ加減ニハ食積痰壅ト云此亦時々見及ビタルコトナリ兼テ意得ベシ

○友松子云按雲林此方治諸般頭痛類聚風藥者總其大體而制之也高巔之上唯風可到故味之薄者陰中之陽自地升天散其壅鬱也然亦有三陰三陽之異用茶者知之則有準的矣太陽經頭痛悪風寒脉浮緊川芎羌活為主少陽經頭痛往來寒熱脉弦細柴胡黄芩為主之陽明經頭痛自汗發熱不悪寒脉浮緩長實升麻葛根白芷為主之太陰經頭痛為痰癖脉沉緩者半夏南星為主之少陰經頭痛足寒氣逆為寒厥脉沉細麻黄附子細辛湯主之厥陰經痛痛或吐痰厥冷脉浮緩呉茱萸湯主之若風邪

鞕大過而頭痛服辛散茶則宜用酸澁收斂乳香赤芍茶之類此外因之治法也

惺惺散四十 活人

治外感風寒鼻塞痰嗽發熱

人參 白朮 茯苓 桔梗 細辛 甘草 薄荷

瓜蔞根各ホ分

右水煎服

小兒感冒ノ薬ナリ大人ノ感冒ト大抵同シ此方バカリ小児ニ限テ用ルカ方ナリ虚弱ノ小児風熱甚ノ咽乾或少ク搐搦ナドスルニ用ナリ方中四君子湯ハ補元氣桔梗細辛薄荷ハ散風寒天花粉ハ除渇搐搦ヲ止ムル故ニ痘疹ノ初發ニ用ベシ○一方加茯

五苓散 四十一
寒

豬苓 澤瀉各一 茯苓 桂枝各四分 白朮六分

右五味為末以白飲可為散湯八 和服方寸匕日三服
功劣於散

此兼解表裏之藥故云覆取微汗茯苓豬苓味淡所以滲水腫飲
也澤瀉味鹹所以泄腎邪止渴也白朮味甘所以燥脾逐濕也桂

某ナリ今小兒專門ト
人參感冒痰嗽二通用

表裏

枝味辛所以散邪表和營也欲兼此藥ヲ為治表必
用桂枝專ル為計ニ用ルナラバ桂枝ノ時ニ因テ水道ヲ利ス用利水則宜肉桂妙用在肉桂全
在乎此若テ去ナラバ熱ノ某ヲ恐以其辛熱而去之則何能疎肝肉桂ノ伐肝伐腎ノ邪水ヲ伐テ津液ヲ通利スルナリ肉桂通利小便モノナリ小便過多ナルモノニ忌ム

○此逐內外水飲之首劑利水ノ某多シトイヘ金匱治心下支飲眩冒五飲ノ一ナリ心下ニ支ヘ此某ヲ以首劑トス用澤瀉湯此散去豬苓加甘草治嘔吐思氷湯ス用豬苓散豬苓白朮茯苓三味等分隨意取用二三味成方總不出是湯也祖劑云未詳五苓散治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥

咽乾煩渴飲水或水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴不止者宜服之（本症）又治霍乱吐利燥渴引飲（霍）并治痩人膀胱下有動悸吐涎沫而癎此水也諸如此者咸屬水飲停蓄津液固結便宜取用但須增損令宜耳（動悸）加減熱甚去肉桂加黄芩何病ヤ○中ラ不知暑煩渴身熱頭痛霍乱泄瀉小便赤少心神恍惚宜此湯或為末熱湯調下愈妙加滑石甚奇（暑）○喘欬煩心不得眠加阿膠（喘欬）○恍惚加辰砂上ノ加減○伏暑發熱大渴未解令人參白虎湯（暑）○濕熱所傷身熱煩渴小便赤少宜此湯（濕）○身腫無汗倍加羌活（水腫）○黄疸發偏加茵蔯（黄疸）○水腫從腰以下俱腫加木香茵蔯（水腫）○虚寒小便不通加當歸枳殻牛膝木通甘草燈心（小便閉）○小便虚弱不禁者合四物湯加五味子山茱（小便不禁）○男婦赤濁合沙香散名香香散用天冬二門煎湯而下（濁）○溫瘧者瘧水多而腹不痛腹響雷鳴脈細加黄耆蕎陳皮蒼朮肉豆蔻訶子砂仁甘草生姜烏梅燈心（泄瀉）○傷寒二四日往來寒熱自利者本方合小柴胡湯入姜棗名柴葛湯一切發熱憎寒者邪在半表半裏宜此湯（感冒）○瘧發寒熱病在表裏陰陽不分亦熱無汗加麻黄肉桂枝

寒多加肉桂熱多加黄芩瘡○去桂名四苓散ト○小便不禁有熱
加黄連黄栢五味子山茱 小便不禁
不利加茵蔯 瘡

此葉ノ本旨ハ太陽ノ中風有汗ノ症桂枝湯ヲ用ベキニ此症有汗故解肌ノ葉ヲ不用モ已ト解スベキト意得テ桂枝湯ノ類ヲ不用程ニタベ汗諸出テ風邪ハ不除津液ヲノこ傷テ病ハ不去六七日モブラ〳〵ノヲルウチニ風邪ガ膀胱ノ府ニ陥テ煩渇クル此ヲ纉論ニ風傷衛犯本ノ症ト云故ニ表裏ノ症アリ煩渇スル程ニ水ヲ飲バ即吐出スナゼナレバ府ニ入ル処ノ熱邪ガ其人ノ割リ像ル処ノ水飲ヲツレテ上遊スル理ニ外ヨリ入処ノ水ヲ格テ受ツケヌ此ヲ水逆ノ症ト云府ニ入ル処ノ府ハ膀胱ノ府ナレバ小便不通ノハ知レタコト此葉ヲ用テ表裏ヲ兩解スル茯苓猪苓澤瀉水煮飲澤瀉泄腎邪止渇白朮燥脾逐湿桂枝散風邪和営葉ヲ服ノ後多ク飲温湯覆取汗表裏ノ邪ヲ兩解スベシ兩解スル合点ナレバ用桂枝タベ欲通小便セバ可用肉桂ヲ○吳山甫ガ説ヲ按スルニ茯苓澤瀉猪苓白朮性異ナリト云ヘ𠮟均シク利水ノ功ハ一ツナリ桂ハ辛熱能和氣和スレバ小便自ラ利スト小便利スレバ熱小便ニ従テ泄ル、咽渇ハ不治メ自ラ除ク虽然汗下ノ後津液七テ小便不利モノニ強テ利之則重子テ津液ヲ亡ノ益く其陰ヲ虧ノト云謙云此説甚ヨシ上茯苓猪苓等ノ五味ノ方考ハ医通ニ従フサレ𠮟医通ノ説ハアヘリ向上ニテキコヘニクシ此方考ハ此吳山甫ガ説ニ従フベシ

○呉氏又云傷寒小便不利ノ渇者此方主之謙云此一言此方ヲ用ル端的ナリ目的ナリ本論ニ所云ノ水逆ノ症ハ其人モト水飲ノ停ヘル水飲ナキ者ハ水逆ノ症無ルベシ渇メ小便不利ト云モノハ必定ノ候ナリイワデモ憂ラヌ此条ノ的候ナリ

此方本證主用例

本論ヲ按ズルニ桂枝湯ノ解肌ヲ可用ニサハナクテ麻黄湯ノ類ノ発汗ノ条ヲ用ル程ニ邪ハ不除メ胃中清陽ノ気ヲ傷テ素ヨリ停ル所ノ水飲ヲ発メ水逆ノ症ナル必中満ヲ致スモ若レモ猶発汗ノ条ヲ用レバ悪レハ此症ニ此散ヲ用ベシ

○右ノ症津液ガ込テ燥ク程ニ煩躁不眠渇スル故ニ水ヲ飲タガル者アリソレニハ少々ヅヽ与ヘテ飲セヨ胃ノ気和メ病愈ル水ヲ與ヘテモ不愈外ニ変リタル症ナク厥逆ニメ小便不利宜此散用ニソレハ不用メ水ヲ與フル程ニ水ガ其邪ヲ却メ肉伏スソレガ少陰経ニ入ルコモアリ少陰経ニ入ルナラバ文蛤散ヲ用ベシソレヲ用テ愈ザレバ太陽ノ府ヲ犯ス程ニ宜用ニ此散文蛤ハ渇ヲ止ムルノ聖薬ナリ

○頭痛発熱身疼ハ外感ナリソレニ水ヲ飲ニタガルハ熱邪裏ニ入ルナリ此散ヲ用テ両解スベシ

○病ヲ得テ無欲タヾ狂言煩躁不寧顔色不常ハ此熱膀胱ニ結ス此散ニ宜シ

○誤テ汗シ虚陽擾乱氣上リ或眠リ或吐シ心煩悪寒スルモノニハ此散去白朮タヾノ加ニ酸棗仁

○舌根赤ク舌尖白ク不悪寒身熱シ煩渇者
ハ邪太陽ノ本ヲ犯ス用此散両解スベシ
○病人身体發熱頭面汗出頸以下スベテ無汗咽乾キ小便不利
身燥無汗此熱外ニ不越内ニ蓄ヘテ為黄疸菌蘭ノ前湯飲此散
○小便堅其色赤黄此陰血不足
陽盛ニメ小便堅シ此散加滑石

此散他病活用例

時疫 温疫大行 同 時疫下疳未全備者宜白虎湯汗後不得
此散主之 同 眠微挺メ渇者此散去桂合益元散宜用 温病 温病
發熱自利脉浮者 陽毒 陽毒疫此散去桂加升麻芍薬若 温 春夏ノ
此散去桂加黄芩 陽毒 シ狂言乱語者更加辰砂酸棗仁 温 間交リ
自汗肢体重痛難轉側小便不利ハ風濕ナリ用此散利小便若シ

無頭痛小便利者ニハ邪猶
在経表治勝濕湯ノ類ナリ 同
ン無汗者ハ此散加蒼朮 同 風温身
者加 傷湿症備リ小便秘シ大 痛拘急
麻黄 同 便溏者此散ヲ飲戊己圓 暑 中暑脉洪大発熱煩渇重キ者
ハ乍輕ク乍重キヲ異ナ 暑 陰虧不省人事似熱病暑病
リトス此散減桂加香薷 同 暑病熱甚ノ身痛三重ノ脉微弱ナリ
行ク此散加葱白 同 此多ク冷水ヲ飲ムニ傷ラレ水皮中ヲ
淡豆豉採リ吐ス 同 暑気攻裏熱不解心煩口渇或腫者ニハ辰砂
加木香若シ酒熱ト暑氣ト相合シ発熱大渇小便不利其色如血
ナルニハ此散去桂加黄連若シ大汗不止甚キ片ハ元気虚ス急
可止汗此散倍 同 中暑心神恍惚タルニハ此散加燈心
肉桂加黄耆 同 煎湯トナシ辰砂末有汗者加黄耆 霍乱 霍乱
轉筋

二八此散加泄瀉泄泻遍身浮腫スル者同濕泻二八四苓散加蒼
藿香木瓜　泄瀉泄泻二八此散加升麻葛根同朮火泻二八四苓散加
木通同暑泻腹痛積滯アル者二八此散合藿香正氣散若シ積滯
黄芩ナレト云ヘ尼腹痛甚キ者二八此散加木香或ハ和湯加
木香或ハ此散ト六和湯ト同火瀉二八此散同熱泻八聶色赤黄
煎シ藕合香圓ヲ調下ス同加黄連芳茱有響痛ヲナ
門熱メ五苓湯煩渴小便不利者二八此散二テ用香連丸或傷暑気
泄泻スルモノ暑熱泻ト同シ胃苓湯或ハ此散加車前子少許
水腫大病ノ後腰ヨリ足ニ至テ腫ルヽ者ハ水ナリ同足跗浮腫
牡蛎沢泻湯救之輕キ者ハ此散加大腹皮牡蛎同小便不利
二ハ此散乾癪ノ苗大二早ク身腫ル上半身甚キニ八羌活勝濕
加防已同湯加紫蘇升麻白芷下半身甚キニハ此散ニ以白朮代蒼

朮加木瓜　痿久不愈クタブレ腫テ腫ルヽ者ニハ此散同
大腹皮　加陳皮木香檳榔滑石甘草枳殻大腹皮縮砂同二水腫
リ要ノ附腫トナル者陰寒ノ濕腫痿弱ス淋痛者ニハ此散ニ
二ハ此散去桂加人參同ルニハ此散加茴香淋病熱甚ノ淋滅
桂加滑淋病水氣アリト云ヘ尼腹中不冷小便急滿不通者
后木通同モノハ此散ノ意ニ倣テ可用肉桂コレラ癰閉ト云
燈心ノ煎湯小便澁痛常ニ急ニ欲尿點滴通メ莖中痛甚ノ不
ニテ用此散同可忍者ハ此散加車前子少許或此
散和益元散等分或小便小便數ニメ少キ者ハ実小便数ノ遺溺
此散ニテ飲火腑丹數熱ナリ此散加滑石甘草不禁者ハ属勝
脫宜小便不禁属実熱者此散合黄小便急ニ出テ難保サレ
此散同連解毒湯虚者ハ此散合四物湯同尼小便少ク出テ不多又急

ニ出テ濇リ不痛ハ淋病ニ非ス或小便シ終リテ間モナク已ト出ルコアリ此尿リヲ忍ビ或忍尿行房事此散加阿膠用加減ハ味丸

身體痛 下躰痛者ハ小便ヲ分利スヘシ此散ニ妙散ヲ加ヘレ同ハ合敗毒散加當皈芍薬

身體痛ニ及ヒ重キ者ハ濕ナリ此散ニテ可汗●或風濕相搏脊強

テ身盡ク痛者ニハ此散加羌活防風升麻柴胡藁本蒼朮

脊痛 此症脈沈緩者ハ風濕ナリ此散

腹痛 小便不利ノ腹痛小腹痛者ハ宜此散

痛ノ以白朮代蒼朮ニ以桂枝代肉桂ヲ

心痛 心痛引背 不通小腹痛ニ按之甚タ不堅コレヲ彈テ声アリ脈數有力煩渇引飲ス書甚者ハ此散夜甚者ハ猪苓湯

引脊 牽強スル者ニハ沉香降気湯或此散

頭痛 頭痛ニハ加羌活川芎

瘧 暑瘧 瘧ニ暑濕ノ症ハ色倦怠ニテ不食ニテ九トス

黄疸 黄疸通用宜此散濕多者倍加茵蔯

同 砂仁神麹麩ニハ加黄芩黄連龍胆

小便不利ニハ加山皀子胃弱キニハ合平胃散去厚朴加茵蔯黄連山梔防已枳實

腹脇ノ間ニ結聚積聚ノ形ニ類スルアリ但シ按之甚不堅時々吐涎沫六君子湯

痰多者加

同 陳皮半夏

痰有熱者ハ加合此散加枳實

痰嗽 桑白皮人參前胡

嗽ニハ此散

ハ渇甚シク汗多ク出ス用加味香薷飲其間ニ服辰砂五苓散

疝 小腸不閉伺疝此散加茴香或木香檳榔ヲ下ス或逆上心下ヲ攻メテ痛者ニ

同 大サ如斗如升不痛不痒者ニ加茴香

脚氣 脚氣小便不通者ハ此散ニテ九トス

黄疸 黄疸通用宜此散濕多者倍加茵蔯食積ニハ加莪朮三稜

同 砂仁神麹麩ニハ加黄芩黄連龍胆小便不利ニハ加山皀子胃弱キニハ合平胃散去厚朴加茵蔯黄連山梔防已枳實

腹脇ノ間ニ結聚積聚ノ形ニ類スルアリ但シ按之甚不堅時々吐涎沫六君子湯

痰多者加

同 陳皮半夏

痰有熱者ハ加合此散加枳實桑白皮人參前胡

痰嗽 膀胱ノ痰嗽ニハ此散

加人同欬嗽二ハ加人參一同桔梗五味子喘急喘急ニハ此散ト合導赤短氣水滯心下短氣ト小便難キニハ宜此散加姜汁嘔吐夏月嘔吐不止者此散加姜汁動悸腎下動悸スルハ腎氣上陵スル也此散加茯苓白朮三稜積聚氣塊ニハ此散加葛根ノ煎湯ニ蓬朮三稜傷酒傷酒ハ此散加葛花草蘞根ノ煎湯ニテ用吐血吐血暑氣甚キ時節ニアツテ口渇キ面赤此散吐血ハ加山梔子痛者ヲ血淋トス不痛ハ尿血トス尿血ニハ此散ニ和烏梅尿血四物湯不應ハ其人腎虚ニ屬ス此散ト腰艾湯ヲ和シ鹿茸圓ヲ飲ム或ハ味丸若シ小便自清テ後血數点アルモノハ此散加当茶〇砂石ノ如クニノ色赤ク却テ石淋ノ痛ナキ者ハ

此散ト和膠艾湯或辰砂妙香散ニテ并鹿茸圓ヲ用ル者ハ此散ニ去桂加黄連交腸暑月酒ニヨツテ發血ス同ノ病ハ大小便位ヲ代テ出ルナリ是氣故道ニ不從ニヨツテ清濁道ヲ代ル此散ト合調氣散加阿膠消渇無病人或病後ニ渇スル者ハ四君子湯宿脾飲或七珍散加木瓜皆擇ヒ用ベシ此散加人參名春澤湯或此散ト四君子湯ト合スルヲモ春澤湯火熱心熱ニハ加黄連連肉ヲ同五心煩シ勞症ノ如キハ此散加桔梗柴胡ヲ帶下帶下通用ト名ク此散ニ合四物臨産夏月熱甚キ時産スレバ氣散シ血湯ヲ漉ク此散加冬葵子或三退六一散ニハ生地黄麦門冬ノ煎湯ニテ辰砂五苓散ヲ用ユ宣報痘炎暑ノ時煩渇昏冒ノ不能發出者他病補遺時疫壮歳ノ男子旅行五六里歸家大煩狂言躁動

渾身疼痛便泻脉洪大與此湯二貼畢平愈微熱同方減肉桂　欬嗽　一婦人二十餘歲感冒欬嗽日晡潮熱他醫用參蘇飲十貼許無寸効予用貝母湯二三貼欬嗽減而却熱甚貝母湯合香蘇散五貼而全愈○又一婦人五六年來咳喘或夜甚二陳湯加減ノ愈○又久キ咳ノ何某ニテモ止ス二柳帶一味ヲ用テヨシ　眩暈　二十餘歲ノ男去夏食果瓜飲水過多寒熱往來頭微痛他醫治而病症退及于今眩暈倒臥而難起來醫有大筋至胸下大如寸竹難與數方無効氣方日々衰脉浮弦大便秘小便赤澁于時足冷則眩暈甚此大小無言大小便不通與此湯二貼小便來自已刻至散合二陳湯便閉于午刻二升餘至于申酉刻脉復知人事如平人諸人稱美其奇妙于時頭微疼不食用藿香正氣散二貼全愈　動悸　誤テ不可汗者汗動悸心中煩シ眩暈欬嗽或湯ノ或骨節痛

五積散　四十二局　調中順氣除風冷化痰飲治脾胃宿冷腹脇脹痛胸膈停痰嘔逆悪心或外感風寒內傷生冷心腹痞悶頭目昏痛肩背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進及婦人血氣不調心腹提痛經候不調或閉不通並宜服之此方主治一途ナラズ故二途ナラス衆病ヲ挙ル用ル者意ヲ以テ了簡スベシ故ニ諸病ニ本邦ノ老医專用テ意外之効アリ古代ノ流行茉ナリ

白芷　三両　陳皮　六両　厚朴　四両　桔梗　三両　枳殻　六両　川芎　三両　甘草　三両　茯苓　三両

芎藭末一錢 當歸三兩 麻黃六兩 肉桂三兩 芍藥三兩 乾薑四兩 半夏二兩

右除肉桂枳殼二味別為麤末外一十三味同為麤末慢火炒令色轉攤冷次入肉桂枳殼末令勻所謂藥料五積散也如是不為生料五積散也五苓散倣之

每服三錢水一盞半入生姜三片煎至一中盞去滓稍熱服如冷氣奔衝心脇臍腹脹滿刺痛及胃嘔吐泄瀉清穀及痃癖癥瘕腰脚脫小腸氣痛即入煨生姜三片鹽少許同煎○如傷寒時疫頭痛躰疼惡風發熱項背強痛入葱白三寸敲七粒同煎傷寒○若但覺惡寒或身不甚熱肢躰拘急或手足厥冷即入炒茱萸七粒鹽少許同煎服嗽○婦人難產入速煎服嗽喘滿入蘇子五分醋一合同煎服之並不拘時候臨產○加減冒寒用煨乾薑木忘挾氣加吳茱萸氣○足浮腫加五加皮大腹皮足腫○遍身疼加乳香沒藥細辛痺○己成風痺加羌活獨活防風同○四肢濕痺合烏蛇順氣散同○手足攣拳加桃柳木瓜牛膝同腰痛加桃仁茴香腰痛○效嗽加杏仁桑白皮效嗽○婦人調經催產加艾醋調經○難產加麝香肉桂臨產○腹痛綿綿無增減因寒者宜治腹痛○腰痛感寒濕脾胃氣閉加桃仁腰痛○寒濕傷腎經腰痛不可俛仰加乾姜桃

仁同○感風寒濕臂腰痛或遍身麻木者用之痺○遍身壯熱四肢骨節痛因風寒者加羌活獨活穿山甲同○秋冬脚膝腫滿疼痛因寒濕流注經絡加木瓜牛膝挾拘吳茱萸脚氣○醉飽後色慾不節觸傷小腹成疝氣其疝自小腹痛連腰膀下心頭吊痛額上汗出加延胡索疝氣○又虛弱人中寒疝氣作痛亦宜同○婦人遇經行時身痛手足麻痺或寒熱頭疼目眩去乾姜加羌活獨活牛膝生姜葱白調經○欬嗽加杏仁五味子欬嗽○泄瀉去枳殼加肉豆蔻白朮瀉赤白帶下屬虛寒加香附茴香吳茱萸帶下○新產後以此湯除敗血生新血無寒熱之患去麻黃產後○熱加黃芩同○寢參天時嚴寒不能起發或紅斑初見者除肉桂枳殼外十三味曼火炒令攤冷入二味加生姜水煎熱服則為貫膿痘疹○夏至後去麻黃此方除寒濕故有痛者必用本症○頭疼脣疼腹痛腳氣痛風等皆有發熱而足冷則與此湯可也此諸症発熱アッテ足冷ノ意ヲ的候トス何レノ症ニモ以是目頭疼○寒滯脾腎肝三陰而四肢百節痛有奇効本症○因滯氣而腹筋張加青皮氣○寒疝加吳茱萸疝○因打撲而血滯冷痛立得効打撲○冬月腰不立上氣面赤下冷又腰已下冷

如氷面上火熱煎湯寒並宜下寒
○婦人兩股痛甚有汗足稍冷加
附子三貼安股痛
○婦人淋病加車前木通可秘淋
○婦人身冷經
水不來者可經閉
○赤白帶下屬虛寒有加艾葉黃香附帶下
○難産
腰腹甚痛時寒天加附子得妙又腰腹痛破水下未産經宿亦得
臨産
○産後餘血攻心或有冷塊攻心上氣則取驗若無驗則正気
天香湯有大奇産後
○死胎腹痛大熱脉數加乾姜附子二貼而立
下臨産
○躰虛作瘧寒多無汗加桂椒草菓瘧

此方治寒濕ノ葉ナリ其症太抵脉沉緩惡寒無汗骨節疼痛手足

痛繆ス王海藏云此方桂麻各半湯平胃散桂枝半夏湯等ノ此數
方ヲ相合ス小青龍云麻黃湯桂枝湯二陳湯四物湯平胃散ノ五
方ヲ聚メテ一方トス故名五積散医通云十餘方ヲ類聚メ一方
トナス謙按ズルニ先輩ノ説何レモ如是ト云ヘ𪜈難意得ラア
リ葉味ニ於テハ合方ト見ユレ𪜈分量ヲ考ルニ蒼朮二十四兩
桔梗十二兩ニメ當皷芍葉川芎茯苓肉桂等ハ三兩ニ不過然レ
バ此葉ヲ制スルモノ始ヨリ合方スル合点トハ云ヘヌ皆跡ヨ
リ云タル簡ナリ但如是ノ一方ヲ制ノ解表温中内外ノ病ヲ治
スルナド、思議按排ノ非所及故ニ方下方後ニ云如ク種々ノ
病ニ用テ各效アリ此制方ノ妙ト𪜈若レ夫レ氏ガ方ハ肉桂乾
姜各五分甘草三分餘葉各一錢寒濕ヲ治スト云此ハ本方ノ分
量トハ格別異ナリ五積散ト云ヘ𪜈實ハ本方ノ五積散ニ非ス

此ハ寒湿一途ニ用ル合点ト見ヘタリ又医家必用ニハ枳殻麻黄芍薬各四銭餘薬各三銭甘草一銭半酒水各半ニ煎ス此デハ又思入ガ違フ但医家必用ノ五積散ト意得ベシ又友松子家傳ノ方ニハ諸薬各等分甘草減半ノ治寒那ノ薬トス龔氏ガ方医家必用ノ方友松子ノ方ナレバ成程合方ト見ユル局方ノ原方ハ合方ト云ニヘヌ五積散ヲ用ル人此意得アルベシ

此方他病活用例

傷寒　風寒倶ニ傷レテ難辨疑似ノ間此湯半貼ニ敗毒散半貼合ノ名ヲ交加散ト云

同　麻黄附子細辛湯ノ症此湯加減附子ヲ用アリ

夾食　傷寒ニ夾食ノ傷寒胸滿痞悶嘔逆氣塞ノ症ニハ藿香正氣散或五積散去當歸麻黄加入參茯苓蘇葉ヲ用ル人此意得アルベシ

同　夾食ノ傷寒積滞ノ症ニハ冬ハ五積散去當歸麻黄加入參茯苓蘇葉ヲ用ル人此意得アルベシ

散餘時ハ昔夾食ノ傷寒ニ気口ノ脈反テ濡滞伏結或始ノ澁大蕩散正気散

同　ナリト云ヘ尺次第ニ虚小ニナリ其症身熱足冷或腹痛或頭痛但胸膈滿悶シ或煩燥シ其人必元氣素リ虚シ堅硬ノモノ腹中ニ結ノ陽氣下ニ不行故ニ只足冷ヘテ手ハ不冷ヘ用此湯加減スベシ若シ頭痛せバ陽邪上ニ鬱スルナリ甘草乾姜湯加葱白豆豉腹痛せバ陰氣下ニ結スルナリ枳實理中湯加減

附夾血　雜人負重折骨ノ人外感風寒ニ内傷飲食其人素リ畜血アリ

傷寒　其症渾身壯熱頭痛骨節疼ニ胸脇痞滿或痛ニ六脈洪盛重ノ按せバ反無力或弦緊嘔逆不食或泄瀉シ或便秘ス解表ノ薬ヲ用テ發散スレバ正気イヨく衰ヘ温補ノ薬ヲ以テ理脾ノ片ハ邪気イヨく盛ナリ并ニ此湯ノ加減ニ宜シ大抵此類ノ人食積發血中脘ニアリ噴ンテ不可用白朮悉仁當皈等ノ薬ヲ加ル

二宜レ六七日モ大便不通モノハ用大柴胡湯微利レ若小腹痛テ小便能利せバ畜血下焦ニアリ桃核承氣湯或宜代抵當湯

産後感冒 産後感風寒兼瀉兼嘔者ニハ宜用此湯 溫病 春病ムヲ溫ト云此症ニハ五積交加散加石膏知母升麻 痙 痙風寒多キニハ大黄 同 此湯加天麻附子 同 歷節風毒骨節疼痛發作不定者 虛邪轉筋 ハ筋急ニヒキ 脊痛 睡臥メ為風濕傷レ或睡卧メ手褫ノ外 産後 ツル宜此湯 腰痛 ニ出テ為寒邪襲レテ痛者ニハ宜此湯 中風 産後中風手足癱瘓スル 腰痛 見熱ヒ片ハ減レ見寒ヒ片ハ增ス ハ敗血入經絡宜此湯 引兩足痛者此 打撲閃挫労役メ痛者 夾風寒溫腰痛せバ五積交加散加桃仁 同 生料五積散加全蝎 同 炒

通レ去全 打撲閃挫因瘀血痛者此湯 同 寒傷腎又沃寒ニ過テ蝎煎服ス 同 去麻黄加茴香木香檳榔 同 連背脊痛拘攣レ脉沉弦緊ナル者加吳茱萸杜仲桃仁 同 形寒飲冷ニヨッテ腎氣乘心腰痛スルハ心如懸旗或如饑泄利下重せバ宜此湯便閉ニハ加大黄 心痛 婦人瘀血入心脾心痛甚者此湯加莪朮三稜經水未盡血衝心痛者此湯加桃仁紅花經水止テ痛者七氣湯加當 腹痛 大抵感冒卒ニ腹痛吐利レ以襍湯喜飯 同 臍下疼痛者此湯加吳茱萸木瓜煨葱白 腹痛 急腹者此湯加吳茱萸 脇痛 脇痛虛者ハ肝血虛スルナリ痛ミ悠々トメ不止耳目慌々トメ善恐ル此湯去麻黄加木香青皮 脚氣 脚氣發ル兩足痛不可忍脛跟痛有瘀者此湯加全蝎以酒煎服 同 脚氣或鶴膝風此湯加木瓜

杉才　同　鶴膝風寒熱者五積
節　　交加散　加烏藥彊蚕　疝　寒疝心痛筋縮リ食スル片ハ吐ス
四制茱　萸　痰忘夾寒者此湯　泄瀉　肝虚忿怒ニ傷ラレ木尅土
黄丸　　合獨活寄生湯ノ　泄瀉面青者此湯去麻黄ノ　渇　白濁
八氣分ノ濕熱清心蓮子　瘀血　婦人臨經水過食生冷物或冷ヘテ以
飲或五積散合四君子湯　瘀血トナル者ニハ此湯去麻黄加
牡丹皮　臨産　臨産氣弱者此　同　友松子云〻奇方發揮ニ産婦ニ此湯
紅花　　湯加麝香一厘　同　ヲ用ルコヲ甚タ非トスルト云ヘ
氏古ヨリ此湯ニ催生五積散ノ名アリ予此湯ヲ以テ産前後ヲ
治スルニ用得テ遇宜片ハ不的中ト云コトナシ産婦ニ用ルニハ去
麻黄其餘藥等分或姜桂ヲ減半シ或生料或熟料ヲ用ユ死胎不
下ニハ本方ニ加香仁ヒ粒木香順流水ニ磨シ姜束煎百草霜ノ

末一錢ヲ調服ス未ダ破水ヲ不經モノニハ勿用　産後　産後食滯寒鞕心腹痛者此湯加萩木ヲ　帶下　經脉ニ寒湿滯テ帶下ヲ生スルコトアルモノナリ此湯ニテ下焦ノ寒湿ヲ去ルベシ氣盛ナルガ目的也　他方補遺　腰痛　泯撙跌撲　隧墮以致瘀腰痛日輕夜重宜行血順氣之者補　疝　氣　夏不發冬陰九桃仁紅花或此湯去麻黄加尚香木香梹榔　疝　發ト云ニハ此湯加延胡梹榔木瓜ナリ冬不發夏發ト云ニハ五苓散加延梹木瓜寒氣ニテ發ハ加吳茱萸積氣アラバ加萩木吳茱萸　同　疝氣大使ヨノ通ニハ加石榴皮梹榔大便結ニハ加杏仁桃仁○主治晝大便難通ハ杏仁ニレ氣分陽○主治夜大便難通ハ桃仁ニレ血分　中風　本邦老医傳云中風ト五積散ノ症ナレバ寒湿ナリ寒湿ハ筋ヲ緩クシ唇

ニラズ汗出（加減補遺）婦人調經加醋當歸○躰薄有汗去蒼朮麻黄ルコトアリ○氣虛去枳殼桔梗加人參白朮○若産後餘血流入通身肢節脚腰疼痛去麻黄加人參木瓜桃仁小茴香○此方味辛温散表温中開鬱行氣有殊功去寒濕之聖藥也以防風通聖散為治燥熱萊以生料五積散為治寒濕之萊也

防風通聖散 四十三 宣明

芒硝 連翹 薄荷 麻黄各二錢 石膏 梔子 荆芥各二錢 滑石二錢四分 甘草一錢 桔梗 黄芩各八分 白朮 右細切作一服加生姜三片水一盞煎至一盞温服日再服○勞汗當風汗出為瘧鬱乃經去芒硝倍加芍萊當皈（瘧皈）○或生癮疹或赤或白倍加去節麻黄鹽豉葱白發汗罷依前方加四物湯黄連解毒三萊合煮飲之日二服（癮疹）○小便淋閉去麻黄加滑石連翹煎調木香末一錢匕（淋閉）○腰腸走注疼痛加硝石當皈甘草煎調車前子末海金砂末各一錢匕（腰腸痛）○破傷風者如在表則辛以散之在裏則苦以泄之用此以兼散之汗下後通利血氣驅逐風邪加荆芥穗大黄煎調全蝎末一錢匕差活末一錢匕（破傷風）○諸風潮搐小兒急慢驚風

大便秘結邪熱暴甚腸胃乾燥寢汗咬牙目睛上竄睡語不安轉筋驚悸倍大黃梔子煎調茯苓末一錢匕如肌肉蠕動者調羌活末一錢匕（小兒驚風）○風傷於肺欬嗽喘急加半夏桔梗紫菀（欬嗽）○如打撲損傷肢節疼痛脾中惡血留滯不下加當歸大黃煎調乳香沒藥各一錢匕解利（打撲）○四時傷寒加益元散半兩加葱白豉生姜水一大碗煎至五七沸溫服一半以鵝翎探之即吐吐後更服一半汗出立解（時疫）○如飲酒中風身熱頭痛如破加黃連葱白煎服立愈（本病）○頭旋腦熱鼻塞濁涕時下加薄荷黃連煎服（鼻淵）○

內經曰膽移熱於腦則辛頞鼻淵鼻淵者濁涕下不已也如氣逆者本方煎調木香末一錢匕（同）○（膝風）○大頭病太陽證甚者加牛蒡子玄參（大頭風）○此方最治痢後鶴膝風良驗（鶴膝風）○劉氏ガ原方如是方後二歟二ハ加半夏半兩ト云モノ舉ケ所ノ原方ト少ク異分兩ナレ小青囊ニ劉氏ガ真方ト云モノ有縮砂無芒硝○一方有縮砂無芒硝○此方中風風熱甚シク脉實大便閉表裏氣血ノ苶ナリ呉氏云防風麻黃ハ解表ノ藥ナリ風熱在皮膚モノ汗ヨリメ泄ル荊芥薄荷ハ清上ノ苶ナリ風熱鼻ヨリメ泄ル大黃芒硝ハ通利ノ苶ナリ風熱後ヨリ泄ル滑石山梔ハ水道ヲ通スル苶ナリ風熱溺

ヨリ泄ル風胸膈ニ滀スル片ハ肺胃受邪石膏桔梗清肺胃連翹
黄芩諸經ノ遊火ヲ去ル風ノ為患肝木主之川芎當皈芍茱和肝
血甘草白朮和胃健脾云云謙云此中風ヲ主トメ云トイヘ𠮟此
理ヲ推メ三焦實熱表裏ノ症盡ク皆可用之方下ノ主治方後ノ
加減外ニ他病活用ノ諸法皆倣此（ナラフ）
泰カ所謂一切ノ風毒積熱瘡腫脉弦洪實數浮緊ニメ氣血實盛
ナルモノ不可缺之胃気弱キ者當審察大滿大實ニ非ズンバ不
可用○大黄芒硝麻黄ノ三味症ニ從フテ可進退或減ズルコア
リ或去リ不用コアリ或進ルコアリ欲泄去麻黄進大黄芒硝其
外千變万化他人ニ因ベシ

此方他病活用例

時疫　時氣發熱晩ニ至レハ腰脊痛頭項強リ身重シ輕片ハ涼膈散重片ハ雙解散并ニ加葱白豆豉用之　同　温熱病
毒内ニ盛ニ脉大腹滿大便秘シ狂乱スルモノ承氣湯合黄連解
毒湯若シ脉浮ニメ兼表証モノハ涼膈散双解散三黄石膏湯ニ
宜レ　同　時疫汗出不解脉浮者屬表証白虎湯見裏　同　絞腸瘟　可用此湯　兩感
証承氣湯解毒湯表裏不分涼膈散雙解散
三日以陽ト厥陰ト俱ニ病ム片ハ耳聾温熱病躁擾不知人輕片
嚢縮テ結ス雙解散主之此症重裏アリ　時疫　ハ涼膈散重片ハ
雙解散表裏俱熱　同　邪在半表半裏者古方用小柴胡有客邪通
者亦此治ト同シ　同　湯今用雙解散去麻黄加柴胡用雙解散
去大黄芒硝　同　夾寒片ハ關脉滑盛声如鼻鼾涼膈散雙解散内傷氣
加葱白豆豉　同　虚夾痰片ハ氣口脉滑ニメ濡吐涎飲者ハ二陳湯

加生白朮虛人ニハ六　君子湯加香附縮砂ヲ與フ　同　灰色重暈舌ニハ急ニ涼膈散　麻痺　風熱疼痛麻痺ニハ防　風通聖散主之　大便閉　大便閉デ盜汗咬牙上竄睡後轉筋驚悸ニハ此湯加增大黃山梔調服茯苓末ヲ　暴瘖　暴瘖声不出ニハ宜此湯　下血　腸風痔漏ニハ用此湯　眼　目病瞼腫レ兩瞼如桃　肺經痛不可忍ニハ用此湯　鼻　風熱鼻塞不通不聞香臭或感風寒熱レ濁涕出宜此湯　同　鼻齆ハ息肉生ス肺氣盛ナリ用枯礬和豬脂綿ニ包數日塞鼻ヤハ自消ス又瓜蒂ヲ綿ニ包用テモ可ナリ或朮通細辛鼈附子ヲ蜜ニ和レ綿ニ包鼻中ニ入レテモ可ナリ又防風通聖散加三稜山茱萸海藻酒浸炒末ト　同　膽移熱於腦流濁涕涕レ毎服一錢半　同　鼻痔ハ肺氣熱極日久臭レ此湯加薄荷黃連　同　疑リ濁結ノ生息肉甚者名鼻齆此湯ニ　同　鼻痔ハ肉熱包毒外攻潰穢結レテ便瘡トナル宜此湯　瘡瘍　或人暴骨痛三用風茱萸飲酒一年許不止此湯及ビ蚯蚓泥ヲ少レ炙リ蜜ニ　同　天泡瘡ニ用此湯加犀角浮萍百余貼ヲ與ヘテ一　同　準繩云一外科ノ祕方ニ此湯加人參黃耆蒼朮赤茯苓金銀花名消腫托裏散表症多者此方ニ從フ　腦疽　腦疽ニハ此湯ヲ　楊梅瘡　此湯加土茯苓ヲ　小兒雜病　小兒癨頭酒製ニメ用ベシ　大劑ニノ用ユ　小兒雜病ニ用此湯酒ニ拌セ除大黃別ニ酒炒レ俱ニ末トナレ再ビ酒ニ拌セ乾カ　毎服一錢水煎レ服ス外治ハ炭ノ火ヲ以テ長流水ニ淬ゲ令

熱ハ頭ヲ洗ヒ葫荽子伏龍肝梁上ノ塵黄連白礬ヲ末トナシ酒ニテ調ヘ敷ベシ 歇症 氣虛ニハ四君子湯血虛ニハ四物湯熱厥ニハ承氣湯外感ニ 耳 因聾耳聾者ニハ通聖散ノ內大黄一味ハ雙解散加酒姜汁 耳 ハ別ニ酒ニ煨スルニ遍ノ後餘菜ト一ツニノ又酒 耳鳴 耳鳴因酒者此湯加枳殼柴胡大黄甘草桔梗青炒シ前服ス 皮荊芥大劑トナシ用不愈者ハ四物湯加玄參 癬疥 五癬經久未汗下者ニハ只用此湯去大黄芒硝加浮萍皂刺 痙 痙病風痰盛者此湯加人參柴胡 發熱 久病過服熱茶反惡寒者先探リテ痰ヲ令 狂 吐テ後ニ此湯加生地黄當皈 狂 雙解散四十四 本方加益元散一錢葱白豆豉生姜

加減 此加減ハ防風通聖散ノ加減ナリ此加減ニ本症ト云モノハ中風ノコトナリト意得ベシ ○自利去芒硝大黄 本症 ○自汗去麻黄 同 ○耳鳴因酒過加柴胡枳殼桔梗青皮天南星荆芥 耳鳴 ○痲疹通治如身疼加蒼朮羌活 痲疹 ○痰歇加半夏 痰 ○一切大風癲狂加桃仁生地黄牡丹皮 癲狂 ○兩耳聾者厚味動晝火加酒煨大黄 耳聾 ○頭項偏腫連一目如半毒其脉洪大此風乘陽明經氣血俱多風腫去芒硝大黄加生姜葱白豆豉煎服取汗以草莖刺鼻中出血其腫立消 大頭病 ○治風熱瘡疥癬久不愈 疥癬 ○瘡頭瘡用本方爲末酒浸焙乾九三次食後白湯調

服日三服至頭有汗效（発頭癒）○小兒身常發熱風班及脚指紅腫去芒硝大黄加牛旁子酒黄芩為末服（班珍）○按此方雖古法用表裏客熱三焦實火而其實火用黄連解毒湯腸胃實熱用大承氣湯風熱症專用此湯（謙云此按甚好）理明白如是療治（云）也（狂亂）○或語云春夏專用通聖散秋冬專用五積散是乃時令表裡之方也（此語楊仁齋ガ説ニ因ル）凡天下ノ病寒湿ト燥熱ノ二ツニ不過五積散ハ寒湿ノ藥ナリ通聖散ハ燥熱ノ劑ナリ故大法如是（方意）○狂亂症解毒湯不效則用此湯若不效則備急圓可也（狂亂）○打撲者倍當皈大黄加紅花没薬（新撰）○疥癬楊梅瘡瘡

良久者用此湯間有驗（疥癬）

雙解散ハ温熱病時疫ノ專劑ナリ即防風通聖散ニ加増滑石甘草故ニ通聖散ノ下ニ附録ス下ニ至テ雙解散ト稱スルモノハ通聖散ノ加味ナリ凡通聖散ヲ用ル中風ハ今時希ナリ温熱病時疫ニ雙解散ヲ用ル症ハ倭多シ故ニ通聖散ハモト中風ノ劑ナリト云ヘドモ今ニ至テハ時疫ノ劑ヤウニナル ハ時疫温熱病ニ通聖散ヲ用ユルコト多キガユヘナリ

此方本症主用例

熱病在半表半裏モノハ雙解散去麻黄加柴胡脉弱ニハ加人參

此方他病活用例

胎前　胎前風熱者去小兒傷寒有表後有裡及驚風疟
硝黃麻黃石膏外感見加羌活　天麻強蚕白附子蟬退

羌活導滯湯　四十五　生　治脚氣初發一身盡痛或肢節腫痛便溺阻
隔先以此茉道之後用當皈粘痛湯

當皈一錢　枳實一錢　羌活一錢　獨活一錢　防己一錢　炒　大黃酒浸一錢半

水煎空心服

此方濕熱脚氣初發用ル茉ナリ外ノ病ニ用ルトハナシ羌活獨活防己身躰節ノ腫痛ヲ治シ防己下焦ノ濕熱ヲ去リ小便ヲ通スル專茉ナリ枳實大黃便澁ノ阻隔ヲ主リ當皈血ヲ和ス病初起先此茉ヲ以テコレヲ導テ後ニ當皈粘痛湯ヲ用ルナリ粘痛湯ハ濕熱ヲ除ク主劑ナリ

人中黃丸　四十六　丹溪　治瘟疫諸熱毒

大黃三兩　尿浸　人中黃如無坑溷代之　蒼朮去皮麩油炒　桔梗　滑石各二兩
黃芩酒洗各一兩　防風五錢　香附姜汁拌勿炒一兩五錢

右為末神麴糊丸清熱解毒湯送下二三錢

丹溪氏云衆人病一般ナル毛ノ是天行時疫ナリ其治三法アリ宜補宜散宜降氣虛ニハ四君子湯血虛ニハ四物湯痰多キニハ二陳湯ニテ下ス熱甚キ者ハ加童便謙云此數品ノ藥補アリ散

アリ降アリ此經驗ノ良方ナリ時疫ノ治法詳ニ上中編ニ述ル如シ其中ニ於テ此茅ハ用ヨキ方ナリ先ツ大抵輕キ瘡治シテ不應ノキ此茅ヲ用ベシ輕症重症トモニ効アル方ナリ方後ニ清熱解毒湯ニテ用ヨトアル丹纂ニハ四君子四物ニ陳ニテ用ヨト云カ様ナル二定リタルハナシ時ニ臨ンテ見計ラヒ可用ナリ

桂枝加大黄湯 四十七 寒

桂枝三兩　芍藥三兩酒洗　甘草二兩炙　生薑三兩切　大棗十二枚擘　大黄兩

右六味以水七升煮取二升去滓温服一升日三服

此方ハ本ト太陽ノ病ニメ發表スベキニ医反下之因テ腹滿有時ハ太陰ノ證トナル桂枝加芍藥湯ヲ用ルナリ然ニ有時痛ハ非大實滿若シ大實滿ハ痛ヅメニ痛ム可用下劑以此湯下之或自太陰轉シテ入胃府アリ用此湯下之

攻裏

小承氣湯 四十八 寒

大黄四兩　厚朴二兩炙　枳實三枚炙

右三味以水四升煮取一升二合去滓分温二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

調胃承氣湯 四十九 寒

大黄四兩浸酒　甘草二兩炙　芒硝半斤

右三味咬咀以水三升煮取一升去滓內芒硝更上火微煮令沸
少少温服之
張璐曰承氣者用以制亢極之氣使之承順而下也
亢極ノ氣ヲ承ケ順シメ下ス故ニ名承氣湯傷寒秘要曰王海藏論云仲景承気湯有
大小調胃之殊令人以三一承氣後人ノ不分上下緩急用之豈
不失仲景本意仲景ノ本意ヲ失フ大熱大實用大承氣小熱小
實用小承氣實熱尚在胃中用調胃承氣以甘草緩其下行而祛
胃發也實熱ガマダ胃中ニアリテ下ヘ下ラヌ子バ調胃承氣ヲ
用并甘草ヲ以テ急ニ不下ソロ〳〵ト胃熱ヲ去ルナリ

若病大用小則邪気不伏若シ病大ニシテ重ク甚キニ小承
気ヲ用レバ病ガカレコマラヌ病小
用大則過傷正氣病小ニメソレホド重クモナイニ大承氣ヲ用レバ正気ヲ過シ傷ル病在上而
用急下之劑則上熱不除病胃ノ中焦ニアルハ下焦ニ對メ上
ト云ソレニ大小承氣ヲ用テ急ニ下セバ藥ガ上ニ留ル間ガアリ
ナイ程ニ上熱不除ナリ豈可一緊混治哉如此ノ別有ルニ三
スルハヅハナシ　節庵論小承氣曰上焦受傷去芒硝恐傷下焦血分之
眞陰此カラ陶節庵ガ正誤小承氣ノ論ニ上焦傷ヲ受テ下焦
ニ邪ガナイ故ニ去芒硝下焦ノ眞陰ヲ傷ランコヲ恐ル
論調胃承氣曰邪在中焦不用枳實厚朴恐傷上焦虛無氣以之
元氣邪ガ中焦ニアルユヘ枳實厚朴ヲバ不
用上焦ノ元氣ヲ傷ランコヲ恐ルナリ然此湯獨可用芒

烏巢堂藏

硝以傷下焦乎 此カラ節庵ガ誤リヲ云ソレナラバ上焦ノ元氣ヲ傷ラレヲ恐レテ枳實厚朴ヲ去ルナラハ下焦ヲ傷リテモ苦シフナイカト不審スル ルハ下焦ヲ傷リテモ苦シフナイカト不審スル 吾未聞承氣湯有主上焦者其上調胃承気ニ枳實厚朴ヲ去ルハ上焦ヲ主ルト云フハキカヌ上焦ニカヽヒナイ茉ナレバ枳朴ヲ用テモ上焦ノ恐ハアルヽイ 未聞調胃承氣之證至於堅而燥也 調胃承氣ノ証ニ大便堅メ燥クト云フヲ未聞 仲景調胃承気湯證ハ方中並無乾燥傷寒論ニ調胃承気ノ症ガ八所有ル中皆大便ガ乾燥スルト云コトハ云テナイ不過曰胃気不和曰胃實曰腹滿則胃ノ氣ガ和セヌノヲ胃實ノ腹滿ノト云ニハ不過知此湯專主表邪悉罷而欲結之證也 表症ガ皆罷デ初陽明ノ府ニ入テ大便ガ結セントスル症ナリ故仲景以調胃承氣收入太陽陽明而調胃承氣ヲ太陽陽明ノ部ニ收メ入レラル、 大黃註曰酒浸是太陽陽明去表未遠其病在上不當攻下故宜緩劑以調和之及太陽陽明ハ表症カ去テ未タ間ガナケレバ其病ガ上ニ在ルホドニ急ニ攻下スベカラズ酒ニ浸シテ藥性ヲ緩シ甘草ヲ用ルカ故緩劑ト云 至正陽陽明則皆曰急下之而大承氣湯大黃註曰酒洗是洗輕於浸陽明ノ經証ヨリ胃ノ府ヘ隔ルヲ正陽陽明ト云此ハ急ニ下ス症ナリ大承気ハ急下ノ劑酒洗ト浸スハ洗フ方ガ酒カガ輕シ微升其走下之性以和其中大黃ノ下ヘ走ル性ヲ微シク升至正陽陽明則去正陽而逼太陰其分在下故用小承氣大黃不用酒制裏也 正陽明ノ

經ヲ去テ火陽經ヨリ傳ヘテ太陰ニ逼リ近クカラハ其邪気ノ分ガ下焦ニアル小承気ヲ用テ下スヨリ外ナシ小承気ハ大承気ホド急下ノ剤デハナケレ𪜈兒角下ス合点ナレバ生大黄ヲ用テ酒制ハ不為ナリ

大承氣湯五十　寒

大黄四両　厚朴半斛　枳實五枚　芒硝三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓内大黄煮取二升去滓内芒硝更上火微二両沸分温再服得下餘勿服

傷寒傳ヘテ陽明ノ府ニ入ル片ハ必大便燥結シ潮熱手足𣵀々ト自汗シ腹滿不悪寒悪熱シ煩渴ス或譫語掲去衣被拳手擲足發斑發黄發狂脈沉數ヲ見ス。於是大小調胃ノ承氣ヲ用テ邪熱ヲ下ス然ルニ右三方ニ於テ各分別アリ陶節庵云痞滿燥實堅ノ五症備ル者ニハ大承氣ヲ用井痞滿實ノ三証アッテ燥堅ナキ者ニハ去芒硝小承氣ヲ用ユ去芒硝下焦血分ノ眞陰ヲ傷ンコヲ恐ル燥實堅ノ三証アッテ痞滿ナキ者ニハ去枳實厚朴加甘草調胃承氣ヲ用ユ去枳朴上焦ノ元氣ヲ傷ンコヲ恐レテナリ汪昂ガ医方集解ニ詳之云痞ハ胸悶不食ナリ滿ハ胸腹脹脹ナリ燥ハ煩渴ノ大便燥ナリ實ハ腹滿痛不大便ナリ堅ハ按腹鞕硬ナリ節庵ガ此説甚夕詳ニノ吳崑ガ考徐春甫ガ医統ソノ外先輩皆從之然ルニ仲景ノ本旨ヲ考ルニ陶節庵ガ説非ナリ其訣ハ挙ル所ノ纘論ニ述ル如シ仲景ノ本旨ハ凡右述スル所ノ陽明ノ府症アッテ其病輕ク甚キ者ニハ小承氣ヲ與ヘ重ク甚キ者ニハ大承氣ヲ與フ邪太陽ヨリ來テ邪熱中焦胃ニアリ大便結定シ或欲結定モノニ其結定ヲ候ノ調胃承氣ヲ用ユ

大黄芒硝ハ泄實消熱潤燥更堅ナリ用甘草藥性ヲ緩シ胃中ニ藥ヲ輟留メ邪熱ヲソレテフロ〳〵下行セシムルナリ甘草ガ無レバ芒勢ガ急ニ下テ熱ガ胃中ニ殘ル惣メ甘草ト云モノガ下ル藥ニ加レバ急ニ不下寒藥ニ加レバ寒勢ガ緩クナリ熱薬ニ加レバ熱勢ガ緩クナル何ニ加ヘテモ此合点ナリ此即仲景ノ本旨三承氣湯ノ分別ナリ凡陽明ノ症ニハ陽明ノ經症アリ陽明ノ府症アリ府症ニ三ツアリ所謂太陽陽明正陽陽明少陽陽明ノ異アリ大抵纘論ニ述ル如シ詳ナルコハ可見傷寒論

右三方本證主用例

○陽明ノ病潮熱大便硬キ者ニハ可與大承氣不硬モノニハ不可與若不大便六七日ナラバ恐クハ燥屎アランコヲ試ニ少シ小承氣ヲ與ヘテ見ヨ腹中轉失氣スルモノハ有燥屎大小承氣

ヲ見合ニ用ベシ

○陽明ノ病譫語潮熱ヲ發シ脈滑ニメ疾キ者ハ小承氣主之

○病太陽少陽ノ症ナク煩躁心下硬キハ正陽陽明ノ症ニメ下スベキニ疑ナシサレドモ其人脈弱キ者ニハ能食スト云ヘドモ小承氣ヲ與ベシ大承氣ハ扣ヘテ不可與

○太陽ノ病汗吐下ノ後微煩シ小便數大便硬ニハ可與小承氣

○陽明ノ病多汗譫語スルハ急ニ可下症ナリサレドモ其人汗出ルコト甚多ケレバ津液虛スルホドニ與小承氣其胃ヲ和スベシ

○下痢讝語スル者ハ必燥屎アリ小承氣主之

○下ノ後一日二日ノ中ニタ喘滿スル者ニハ用小承氣復下ス也

○傷寒六七日不大便頭痛有熱モノ其小便清メルモノハ病不在裏承氣湯ヲ用ベカラズ

○手足濈然トメ汗出ルモノハ大便既ニ堅ク大承氣ヲ之謙云
大便硬キモノハ手足ノ汗ニテ試ル調胃承氣ヲ用ル症ノ大便
結定スルカヤヌカト云ハ手足ノ汗ニテ意ヅク手足ニ汗ガ有
ルナラバ大便ガ硬キカ當分硬フナクテモヤガテ結定スルト
合点スベシ扨此症ニ大承氣ヲ用ヨト有レ共先ツ小承氣ヲ用
テ轉失氣スルカヤヌカヲ試テ大承氣ヲ用ユベシ

○陽明ノ病讝語潮熱不能食モノハ胃中ニ燥屎アリ大承氣主
之謙云陽明ノ症ニメ讝語潮熱スルナラバ食ハ相應ニ食モノ
ソレニ不食スルナレバ燥屎ガ有テ内ガメグラヌト知ルベシ
ソレデ大承氣ヲ用ルナリ

○病人小便不利大便乍硬乍安レ時ニ微熱アリ喘胃不能臥
モノハ燥屎アリ大承氣主之謙云小便不利ハ大便ガ秘スルト

小便ガ利セヌモノナリ常ニ二便閉ノ証ニ大便ガ通ズルト小
便ハ自ラ通スルナリソレデ此モ燥屎アリト云サレド小便ガ
利セヌ計デ燥屎アリト極メラレハセヌ其上ニ乍硬乍安ク
喘アツテ不能臥ナレバ燥屎アルニ究ルナリ

○發汗不解腹滿痛ハ急ニ下之大承氣主之謙云陽明ノ餘症ア
ツテ如此ナレバ急ニ下スベキ症ナリ

○太陽陽明ノ併病潮熱手足有汗大便硬ク讝語スルモノハ大
承氣ヲ用テ下之

○陽明少陽ノ合病ハ必下利ス脉滑ニメ數ナル者ハ宿食アリ
大承氣ヲ用テ下之

○汗吐下ノ後不大便五七日ヨリ十餘日ニ至テ潮熱メ不悪寒
獨語如見鬼狀不知人循床摸床微喘レ直視ス是危殆難治ノ証

烏巣堂藏

ナリ脈弦者ハ生ク濇者ハ死ス微者ハ唯發熱讝語スルニテナリ大承氣主之

○少陰ノ病清水ヲ自利シ色純青ニテ心下必痛ミ口乾燥スルモノハ急ニ下ス大承氣主之

○少陰ノ病六七日腹脹不大便モノ急ニ下之大承氣湯ニ宜シ

○少陰ノ病六七日腹脹不大便モノ急ニ下之大承氣湯ニ宜シ謙云承氣ノ症ハ皆陽明ノ府症ナリ然ルニ少陰傳經ノ症ニ用ルコトアリ上ノ二條ハ俱ニ少陰ノ症ナリ

ルコトハタニサカナコトナリ

○紫短舌大承氣下之

○太陽ノ中風可用桂枝湯反テ用麻黄湯汗出ルコト過多ニメ胃中ノ津液ヲ傷リ熱不解乘虚内ニ入リ裏熱ノ症トナリ蒸々ト熱勢内ヨリ外ニ沸騰シ只熱胃ニ在リ調胃承氣主之

○陽明ノ病吐下ニヨラズメ心煩スル者可與調胃承氣讝云陽明ノ病症アツテ如此ナルモノニ可與之

○陽明熱蒸ノ頭痛ハ必ズ小便黄赤ニメ短數ナル者ニ調胃承氣主之

○頭汗ハ多ク裏實ノ症ナリ頭汗出テ脇下滿大便硬キハ大柴胡湯主之頭汗出ルハ調胃承氣主之

○邪熱胃ニ入ルトハ三陽明ノ原ヲ詳ニメ三承氣ヲ與ヘ緩急ヲ別チ結定ヲ俟ツ片ハ邪熱皆盡ク胃ニ歸スルナリ然後下之

右三方雜病活用例

溫病

溫病太陽少陽陽明ノ合病ハ黄芩湯少陽陽明ノ合病ハ大柴胡湯主之同溫病下利脉遲ニシテ骨ナル者ハ宿食内實ナリ利未欲止モノハ宜大承氣腹中滿痛ノ者

補茶○右溫病熱病時疫瘟病口噤卧下不着席足變急ヒ必太抵通用ノ意得ベシ　瘟歯ギリヲスルニハ大承気ニ宜シ戦慄寒慄火盛ニメ似水モノアリ泄瀉下痢愈テ後其年月日ニ一人患痢甚タ逼迫ス其症承気湯ノ症ナリ然レ氏氣口ノ脈弱キヲ以テ先ツ参朮陳皮芍藥ヲ用ルコト十餘貼ニメ三日ノ後胃氣漸完シ承気湯ニ貼ヲ用テ安シ　腹痛腹痛常ニ有熱痛者ハ此承加減　腹滿腹滿ハ邪氣裏ニ入ルナリ發熱スル者ハ陽氣外ニ達肉桂ナリ十日計モ病ムト云ヘ氏邪猶盡クハ不ス入裏ナリ殊ニ能食スル者ハ胃ノ氣ニ權アリ小　積聚癥瘕換スル承氣合桂枝去芍茶湯即厚朴七物湯ナリ　積聚者ニハ大承氣加

モ又宿食ナリ宜大承気湯　熱病熱病甚キ者ニハ大抵調胃承氣合黄連解毒湯用ルコトアリ　大熱極メテ深ク壘下メ不利死症トナル者ニハ大承気ニ甘遂ノ末ヲ調服ス　温毒温毒日久ク發渴腹滿大便硬キ者ハ調胃承気加黄連赤芍生地黄牡丹皮　時疫時疫邪血分ニ留リ斑可出メ不出不下舌純紺色兼テ見裏症者ハ此邪既ニ裏ニ入ル承気湯ノ症ナリ　肉食ト病ト指合メ胃中ニ停蓄スル者ニハ大承氣ヲ用テ連下スレ氏臭水稀糞出テ病不退者ニハ加人参二平ニメ大便二三十日モ不行或時々嘔吐スル者ニハ調胃承気ヲ熱服スレバ宿垢頓ニ下リ嘔吐立処ニ止ムアハテテ勿用

黃連芩茱川芎乾 水腫 膏粱厚味ニ因テ水腫大便大小 溫熱痰火
姜甘草可用之 閉ル者ニハ大承氣加肉桂 便閉 結滯レ脉
洪盛ニメ大小便秘閉レ肢節煩疼ス 溺血 溺血實症ノ者ハ 消渴
ル者ニハ涼膈散或小承氣ヲ擇用ユ 大承氣加當歸ヲ
中消ハ能食メ瘦セ自汗大便 牙齒 實熱腫痛ニハ調胃承氣
硬ク小便數調胃承氣主之 加黃連東垣用テ去芒硝 同歷
凶痛黑爛脫落必口吸冷水片ハヤヽ痛止モ 産前 産前ノ疫癘毒
ノハ膏粱濕熱ノ火ナリ調胃承氣加黃連ヲ 盛ニ勢劇レキ
者ハ急ニ涼膈散承氣湯 産後 産後日久ク外感熱結實邪燥屎ア
黃連解毒湯ヲ用テ救之 ル者ハ急ニ承氣湯大柴胡ヲ用テ
下之

桃核承氣湯 五十一 桃仁五十箇 桂枝二兩 甘草二兩 大黃四兩 芒硝二兩

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒硝更上火微沸溫服五
合日三服當微利

太陽ノ傷寒寒傷営犯本之證ノ藥ナリ表邪裏ニ入テ膀胱ノ府
ヲ犯シ搏血膀胱ノ府ニ結シ邪熱沸騰メ侮心火故ニ其人狂人
ノ如クニ見ユルモ然ルニ血自ラ下ルモノハ邪熱膀胱ニ不留故
ニ自ラ可愈若シ血不下メ小腹急ニ結スル者ハ血不行ホド ニ
下劑ヲ用テ可攻サレバ表症未解ンバ不可攻先ヲ表邪ヲ解ス
ベシ表邪ヲ解シ終テ後可攻之其攻法調胃承氣ノ內ヘ桃仁ヲ
增入テ破血ノ所ニ達シ加桂枝外邪ヲ解スル此兩解ノ方チヨ

フド五苓散ニテ風傷衛犯本ノ症ヲ治スルト同意ニテ皆太陽ノ犯本症ヲ治スル療治ナリ

此方本症主用例

心下滿テ微シ硬ク按スレバ痛ミ不可按其人善テ物忘レノ小便ハ能利スルモノハ血膀胱ニ結スルナリ此湯主之

○小腹急ニ痛ミ身黃瘦ル水ニテロスヽグコト好ミ小便自利スル者ハ蓄血ナリ此湯主之

此方雜病活用例

諸血 準繩云肝角此黃湯ハ上血ヲ治シ吐血衄血ノ類ハ上血ヲ治ス中焦ノ蓄血膿血ヲ下利スルノ類ナリ抵當丸ハ下血ヲ治ス血症狂ノ如キノ類ナリ

血塊 丹溪云雖大無一病僧ヲ治ス黃瘦傷心ニシテ血塊ノ結ヲ治スル人胃院ニ死血アリ撤姜湯ヲ用ルニ必ズ呃逆ス人ニ因テ病ヲナスナリ先ヅ牛肉豬肉等ヲ煮テ食シ半月計ニメ稍快シ與此湯下之下者血塊痰積ナリ以粥調理シテ好シ

心痛 平日熱物ヲ好ミ食フニヨリ死血ト胃口ニ留リ痛ヲナス者用此湯下之

麻木 ラズ陰寒ニ遇リ甚シク書軽ク夜重シ脉濇ニメ或弦此痰死血ヲ挾ハニヘバ益甚シ書軽ク夜重シ脉濇ニメ抗或弦此痰死血ヲ挾ハニ屬ス活血行気ベシ陳湯加當歸川芎桃仁紅花牛膝並ニ此類ノ類ス

老シ大便黑メ不通ハ小剤ヲ與ヘ通ジ頭汗目黃小便清ノ桃核承氣ニテ微利之

畜血 瘀血内ニ滯テ頭汗目黃小便清利大便通黑小腹痛或左脇中脘痛所有脉必關尺弦緊或帶牢虚人瘀血アリト云ヘ尺脉乳必桃核承気湯最宜地黃湯主之

同 一部帶弦補ヲ兼テ以其血ヲ去ベシ此湯ニ加人參大棗ヲ攻之片ハ十人ニ二三人ハ可治又中気盛スル人胃院ニ死血アリ撤姜湯ヲ用ルニ必ズ呃逆ス人

參白朮各二兩末ト㆑桃仁一兩乾漆ト同炒去乾漆
細末㆑蜜ニテ彈子ノ大サニ丸㆑朝夕酒ニテ送下ス 下血 血胸脇
小腹急痛スルニハ此湯或代抵當湯痛ノ從高下撰用ベシ大黃
ハ二方皆二童便制ニメ又其上ヲ韭汁ニテ制ㇾ用ユベシ虛人
ニハ止ㇾ桂附ヲ加ベシ若シ血色瘀 吸血 一婦人形肥氣壯ニメ
臨ニノ不鮮者ハ用温茱萸子温ㇾ呂茱ヲ火
用并血迫リ上行メ衄血ヲナス必一升餘リ醫者上實下虛ト
丹劑ヲ用テ墜之消伯仁云今血氣俱ニ壯ニメ溢レ上ルㇾ可下ス之
用此湯三四下瘀積既去 腰痛 腰痛三屈三伸ス此熱那深ク入
テ與既濟湯二十貼愈 腰痛 血脉閉之此湯ニ多ク用肉桂少シ
ク加熟附子痛者ハ可 頭汗 頭汗小便不利メ渴シ反テ不飲
治不痛者ハ不可治 黃疸 此勝脫ノ畜血ナリ此湯主之

瘀血ニ因テ發黃疸ハ不便必黑ㇾ腹脇ニ塊アリ或服ル藥汎或欬
大便不利脉稍實メ甚タ不弱者ニハ用此湯黑物ヲ下シ盡メ愈
タリ 腸癰 腸癰ハ大腸ニ痰積死血アリテ流注ス此湯加連
翹慕菊若シ肝門ニ近ノ破レテ風ノ入者ハ難治 打撲 打撲
腹痛スル者ハ瘀血ヲ
リ此湯加薏苡仁紅花ヲ

三一承氣湯 五十二
直格

大黃 芒硝 厚朴 枳實 各半兩 甘草一兩

右細切作一服水一大盞煎ニ盞三片煎七分熱服

此方三承氣ヲ合メ一方トスルㇾ友松子云仲景ノ三承氣湯各主
ル所アリ不可紛亂髮河澗此方ヲ制メ亂仲景之方云云謙云仲
景ノ方毫髮ヲ不可亂ハ傷寒ニ於テハ嚴ナリ河澗ノ時代傷寒

温熱病時疫辨別ナシ其説防風通聖散ノ下ニ如述尤温熱病時疫可下ノ忘ニ臨ンテ此又一方ナリ考用ベシ

○温熱病時疫自汗譫語不大便嗌乾腹滿者宜此湯

○温熱病時疫既ニ戰メ不快或戰メ後汗出テ不快或微戰數次或大戰汗不出或戰メ病不去此湯ニ宜シ或此湯合黄連解毒湯

加味承氣湯 五十三 龔氏

治瘀血内停胸腹脹痛或大便不通

大黄　芒硝各壱　枳實　厚朴　當皈　紅花各壱　甘草五分

右酒水各半煎服病急者不用酒按承氣之類可用壯盛人不可用虚弱人若不辨虚實則誤多○對證窺下風而與之則得卒効

脇痛承氣湯ハ調胃承氣湯ニ加入桃仁桂枝其説前ニ如述此湯ハ大承氣湯ニ加當皈紅花甘草軍竟龔氏ガ方雖不足表寒之時疫熱病等ノ症ニ臨ンデ畜血アル者ニハ此方ヲ用井タキヲモアルベシ臨病用之ハ在医意雖非可為規矩方ニ考為載之ナリ

大柴胡湯 五十四 寒

柴胡半斤　黄芩三両　芍薬三両　半夏半升洗　枳實四枚炙　大黄二両　生薑五両切　大棗十二枚擘

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎温服一升日三服

續論曰此湯治少陽經邪漸入陽明之府表症未除裏症亦急ナリ或誤下引邪内犯而過經不解之證少陽ノ症ニ下故於小柴胡方中除去人参ヲ用テ誤ル

鳥巣堂蔵

參甘草助陽入參戀胃甘草之味而加芍藥收實大黃之沉降以滌除熱滯也與桂枝加大黃湯同義彼桂枝加大黃湯以桂枝甘草兼大黃兩解太陽誤下之邪此大柴胡湯以柴胡黃芩兼大黃兩解少陽誤下之邪桂枝加大黃不務易知又定法ナリ　之定法也

此方ノ正面ハ誤下ノ為ニ設ル藥ナリ按本論少陽篇云太陽ノ病過經十餘日ニ及ブ此太陽ノ証傳少陽少陽ノ症トナリテ本寵ソレヲ不知メモハヤ裏症カト意得テ反テ下劑ヲ用テ下之ノ邪内ニ入リ病變種々アリト云ヘ共尚小柴胡湯ノ証アラバ先與小柴胡湯其邪ヲ提出メ後此湯ヲ用ルヲ合法トスルナリ方後續論ノ考ヘ見ベシ然ルニ後世ハ誤下ノ療治ハ少シ故ニ呉氏ガ此湯ノ方於考ニ表証未除裏証亦多忌也ト云ヘリ寒熱往來脇痛口苦キハ表証尚アリ大便硬クメ燥實ナルハ裏証急ナリ仲景ノ本意ハ誤下ノ為ニ設ク呉氏ガ意ハ誤下ノ穿鑿ハナレニ少陽ノ証ガ陽明ノ府ニ傳ヘテマダ少陽ノ証モアリ既ニ陽明ノ裏証モ急ナル者ニ用ナリ此傷寒ニ多ク有ル所ノ症ナリ仲景ノ意トハ少シ異ナリト云ヘ共マヽル所ハ一致ニ落ルナリ偖テ陽明ノ府証承氣湯ヲ可用証也先試ニヒカヘテ此湯ヲ用井ヨト先輩ガ云テアルソレヲ又先輩ガ裏症ニ究マリテ表証ハスキトナイニ左樣ナ窺フタ療治ハ目利ノ定ラヌ不器量ナ療治ナリト叱タモノモアリ謙按ニ仲景サヘ大承気ヲ用ベキニ小承氣ヲ用テ試ヨト云テ置レタ然レバ試ルト云ヿ無イヿニテナレ未熟ノ者ハ此試ミヲスヽジキヿニアラズ然

レモ必ス試ヨ「云フコトデハナイ時ニ依テ不及試的當ノ方ヲ可用コトアルベシ

此方本證主用例

少陽寒熱往來六七日十餘日ニ至リ大便不行腋下汗出者主之

○傷寒外邪不解熱裏ニ入リ心下痞硬嘔吐下利者此湯ヲ用テ表裏ヲ兩解スルナリ

○下證盡ク備テ微惡寒及下利惡寒時々自ラ煩スル者ハ陽邪内伏スルナリ宜此湯ニ

○少陽ノ証寒熱小柴胡湯ヲ服ノ不解其脉反テ浮ナル者ハ柴胡桂枝湯若シ脉數ヲ加ル者ハ宜此湯ニ

○陽明少陽ノ合病日晡寒热如瘧宜此湯ニ

○傷寒発熱汗出不解心下痞硬嘔吐ノ下利スル者ハ宜此湯ニ

○陽明ノ病腹滿微喘シ口燥不大便或譫語スル者此湯主之若此症清水ヲ下利スル者ハ陽熱極ル大承気湯主之ヲ

○白舌色微黄ニ変ズル者ハ宜此湯ニ

○白胎尖灰刺舌此湯主之ヲ

○白胎雙黄舌ハ此湯主之ヲ

此方雜病活用例

時疫　退者ハ此湯合黄連解毒湯ヲ用テ熱不退者ハ此湯合涼膈散加芒硝ヲ用ヨ

心痛　心痛脉堅實心下按ノ滿痛スルモノハ宜此湯ニ

同　癇狂悶亂妄スルニハ涼膈散加芒硝ヲ用ヨ

癇　喜笑寒熱便秘ニハ此湯主之ヲ

同　二十餘歳ノ男子癇疾ニ発大熱煩渇間白トイヘ共餘熱大半頭痛脉弦數汗甚出大便不通小便順用此湯ヲ三貼大便通滿熱

去頭痛煩渴止脉微弦手足冷食
如故因用蕪金飲子而諸症盡愈（怒）肝藏血有餘ナレバ怒気甚シ
散并二諸気生鐵落飲大柴胡小柴胡蹉肝
ノ剤主之（頭搖）不大便ノ頭搖スルハ陽
明ノ府症ナリ此湯主之

枳實大黄湯 五十五 治胸腹有食積大便不通者

枳實　厚朴　大黄
枳擗　甘草

右剉一劑水前空心温服以利為度不可再服○腹痛甚加木香
此方食傷ノ藥ナリ回春ニ積熱ニ属スル者ニ宜シト云小承気
湯ニ加枳擗甘草大便不通ヲ目アテトス此症必腹痛甚キモノ
ナリ方後ニ腹痛甚キニ加木香ト云ヘリ

六乙順氣湯 五十六 陶 以代大承気小承気調胃承気大柴胡三乙
承氣湯大陷胸湯等之神芣也擧世無人知此奇妙耳秘之莫典
俗人言本方自有加減法備開○此湯治傷寒熱邪傳裏大便結
實口燥咽乾怕熱讝語揭衣狂妄揚手躑足班黄陽厥潮熱自汗
胸腹滿硬譫痛等証悉皆治之效不盡述

大黄　枳實　黄芩　厚朴
甘草　柴胡　芒硝

右將水二鍾煎二沸後入藥煎至八分濾法臨時服入鐵秀水三
匙調服立效取鉄性沉重之義最能墜發開結有神此千金不傳

之秘若非吾之子孫承經焉肯泄露玄机故戒耳○潮熱自汗譫語發渴揚手躑足揭去衣被狂妄斑黃大便實者俱屬正陽陽明府病依本方（本）此症傷寒二在于正陽陽明（症）忘リ時疫二在于八大實熱ナリ○口燥咽乾大便實者屬少陰依本方（本）此症計二于八未ダ○下利純清水心下硬痛而渴者屬少陰依本方（本）此症少陰氏定メ難シ（症）ノ症二類ス

手足乍冷乍温大便實者陽厥證屬厥陰依本方舌卷囊縮者難治須急下之（本）傳經厥陰ノ（症）症二類ス○譫語發渴大便實遶臍硬痛者有燥屎依本方（本）遶臍硬痛ハ燥屎（症）アルノ的候ナリ○熱病目不明謂神水已竭不能昭物病已篤矣權且急下依本方（本）救極（症）ノ症○轉屎氣者謂下泄也有燥屎當下之依本方如更衣者止後服不必盡劑不更衣者宜再少與大便通者愈（本）試此法（忘）ル○結胸證心下硬痛手不可近燥渴譫語大便實者依本方去甘草加甘遂桔梗（本）此溫熱病時疫結胸ノ症也如甘遂桔梗大陷胸湯ヲ合スル意也○凡傷寒過經及老弱并血氣兩虛之人或婦人產後有下證或有下後不解或有表證尚未除而裏證又急不得不下者用此湯去芒硝下之則古蓋恐轉某硝性燥急故有此戒大凡傷寒邪熱傳裏結實須看穀氣淺深用某今之庸俗之

豎不分當急下可少與宣微和胃氣之論一槩用大黃芒硝乱投湯劑下之因茲枉死者多矣（本此辨去芒硝八緩字ト○余謂傷症コレヲ可下タメナリ）寒之邪傳來非一治之則殊耳病有三焦俱傷者則痞滿燥実堅全俱宜大承氣湯厚朴苦溫以去痞枳實苦寒以泄滿芒硝鹹寒以潤燥軟堅大黃苦寒以泄實去熱病斯愈矣邪在中焦則有燥實堅二證故用調胃承氣湯以甘草和中芒硝潤燥大黃泄實不用枳實厚朴恐傷上焦虛無之元氣調胃之名自此立矣ト雖實傷則痞而實用小承氣湯枳實厚朴之能除痞大黃之泄實去芒

硝不傷下焦血分之眞陰謂不伐其根本也若夫大柴胡湯則有表證尚未除而重證又急不得不下者（本此辨調胃承氣湯症ノ下ニコトハル○只得以此湯通表裏而緩治之猶有老弱及血氣兩虛之人亦宜用此故經云轄柔執緊有芒硝者緊也大承氣最緊小承氣次之大柴胡又次之其大柴胡加芒硝方爲轉柔蓋爲病輕者設也仲景又云蕩滌傷寒熱積皆用湯液切禁丸茶不可不知也

此茶傷寒ノ茶トイヘド傷寒二ハ用ラレヌ時疫ノ茶ト意得ベ

疫

シ其辨防風通聖散ノ下ニ詳ナリ其某品ヲ考ルニ温熱病時疫ニ用テ然ルベキ方劑ナリ

○回春ニ痢赤白相雜ルヲ不問肚腹痛三裏急後重渾身發熱口乾キ發渴スル者ニ用ユ

涼膈散　五十七　河澗

治膈熱便秘胃實發班表裏俱熱

連翹　梔子　黄芩　薄荷　大黄酒洗　芒硝　各二錢　甘草五分炙

右大棗二枚葱白一莖水煎去滓温服無時○東垣加桔梗治諸般鬱熱浪士經實火○肺金邪熱嗽痰加半夏炙○咽喉腫痛加桔梗炙而嘔加半夏生姜炙○鼻衄嘔血加當歸芍藥熟地黄皐○淋閉加滑石茯苓○風眩加川芎防風石膏腦○酒毒加葛根黄連名清心湯用蜜竹葉同煎酒○班疹加葛根荆芥赤芍川芎防風桔梗班○陽毒發班加當歸陽○欬嗽加桔梗白皮杏仁桔梗嗽○結胸心下滿加桔梗枳殼結胸○譫語發狂踰垣赴井皆陽熱極盛加黄連黄栢赤芍藥狂○眼生翳障赤澁流淚加菊花木賊生地黄眼○血泄熱血熱○一婦證語發狂晝夜不眠不能坐臥飲食與則食

不與則不食大使秘脈細緊而數合四物湯加連ヲ四十餘貼而愈ユ

狂○按除積熱實火之劑ナリ

此方劉河澗制方ノ主意ハ廣ク三焦實火ノ為メニ設ク故呉崑方考火門ニ攝入ス然ルニ先輩ノ用方ヲ閲スルニ多クハ温熱病時疫ノ病ニ用ルナリ故ニ此書ニハ時疫ノ主方トスルナリ黄芩梔子ハ中焦ノ火ヲ治シ連翹薄荷ハ上焦ノ火ヲ清シ大黄芒硝ハ一切ノ實火ヲ瀉ス先輩此方ヲ用ル例下ニ記ス如シ夫涼膈散通聖散大柴胡ノ三方ハ表裏兩解ノ劑ナリ其ノ中涼膈散ハ裏ヲ下ス方ガ專ナリ通聖散ハ熱ヲ解スル方ガ專ナリソレユヘ此書ニハ通聖散ヲバ表裏ノ劑ニ入レ涼膈散ハ攻裏ノ劑ニ入ル只病ニ臨ンデ時ノ見ハカラヒニヨルベシ初ヨリ緩急ハ定ラレヌナリ原方ノ涼膈散ハ大黄芒硝ノ分量山梔黄芩薄荷ニクラブレバ一倍多クシテレソレガアマリ強キ方ユヘ準繩ニ大黄芒硝ノ量ヲ減メ黄芩梔子ト等分ニマルナリ

此方本證主用例

熱病風寒暑濕ヲ問ハズ涼膈散天水散合煎表熱多ク裏熱少キ者涼膈散一天水散半ハ天水散一涼膈散半裏熱多ク表熱少キ者涼膈散一天水散半

○時疫汗出不解脈浮ナルハ表証ニ屬ス白虎湯裏証ニハ承氣湯解毒湯表裏不別ハ此湯雙解散謙云此一條治時疫ノ大要不過之如此療治ノ雖不中不遠平日意得ベシ

○時疫ニハ此湯加人中黄生地黄

○時疫舌胎焦枯唇口裂不大便者ニハ此湯加黄連石膏人中黄

○白胎ノ中小斑点乱生スルニハ此湯承氣湯

○舌尖白ク根黃ナル八表邪火ク重邪多シ天水散此湯ニ宜シ
○温疫ニ二三日舌根厥黑急ニ此湯雙解散ヲ用ベシ紫中紅班下
疹アルモノハ
此湯ニ宜シ

此方他病活用例

中風 口噤不開大實証ノ者 同 二八此湯加犀角黃連 同 痰心竅ニ閉塞シ不語熱
脉浮洪面赤煩熱心痛唇口乾キ喜笑多ク其痰硬メ堀ヲナス此湯加茯苓半夏 欬嗽 夏月ノ欬嗽ニ八小
足ノ心熱シ外發熱セザルモノハ瀉白散加桔梗陳皮不應此湯
去硝黃加 同 火熱欬声唾痰濃カナル 此湯加桔梗 頭痛 火炎ノ頭痛可下モノニハ此湯加清酒 心痛 夏月

心痛大便秘シ心腹鳥 汗 火気上蒸胃中ノ濕 瘧 産前ノ瘧脉實煩
起者此湯ニテ下之 汗 亦能作汗此湯主之 瘧 渇シ大便六七日
不通陽明府實ニ八此 同 瘧瘧山溪藥毒冷人迷困發狂或喘
湯去硝黃加鮮何首烏 同 作寒作熱作有作無加柴胡桂枝 麻疹
麻疹譫語甚者加桔梗地骨皮泄瀉合四苓散便血合犀角地黃湯
吐衄加炒梔子小便赤加木通○吐血衄血輕者黃芩湯加生地山
梔重者此散加 顚狂 大便閉者倍 肉峻 大黃下之
生地山梔童便 顚狂 大黃下之 閉渡加黃連荊芥石膏
濕聾因雨水浸漬必內腫痛此散加羌活防風 鼻 風寒鼻塞肺伏火
俱用酒炒或五苓散加陳皮枳殼紫蘇生姜 鼻 邪鬱甚則喜熱惡
寒加荊
芥白芷

ノ辛ヲ以テ逐飲甘遂大戟ノ苦ヲ以テ泄水大棗ノ甘キヲ以テ脾ヲ助ケテ水飲ヲ胸脇ノ間ニ去ルナリ然ルニ今時ハ誤下ノ症ナシ只用テ以テ雜病ノ藥トスル乃何病ニ因ラズ心下ニ水気アツテ脇下ヘ引痛ノ症皆此方主之但シ峻駛ノ剛劑其人虛ニ屬スル者ニハ決メ不可用有故無殞ト云ヘル是補劑ヲ前後ニ用ルカ見計ヒアルヘシ此某右ノ意得ニテ用ベシアマリ外ノ丁ニ用ルコトハナイ只心下ニ水氣アツテ脇下ニ引痛ト云カ此湯ノ目的ナリイツニテモ脇下痛ムナラバ此湯ノ症デハナイカト先ツ氣ヲ付ベシ脇痛ハ色々ナコニテ痛メル脇痛トキカバ若シ此湯ノ症デハナイカト意ヲ付テ吟味メ見ルベシ偖此方ヲ本トメ張子和ガ禹功散瀉川散控涎丹ナドヲ制メ利水便秘ノ某トスル極メテ峻劑ナリ

大棗湯五十八
寒

芫花熬　甘遂　大戟　大棗十枚

右三味等分各別搗為散以水一升半先煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥末強人服一錢羸者服半錢平旦溫服若下少病不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養

此藥ノ正面ハ傷寒痞症ノ某ナリ夫病陽ニ發シ誤テ下之結胸トナル病陰ニ發シ誤テ下之痞トナル陽ニ發シ陰ニ發ルノ分チハ傷寒論太陽篇首條ニ見ヘタリ此症大抵心下痞シ種々ノ症ヲナスモノハ瀉心湯ヲ之此痞ハ胸脇ニ在テ胃ニ在ラズ其症心下痞滿シ脇下ニ引テ痛ミ乾嘔短氣汗出不惡寒ヘモノハ心下ニ水氣アリ乃熱邪水飲ト搏テ如此ノ諸症ヲナス故ニ芫花

水腫

此方雜病主用例

痰飲　金匱云脉沉弦懸飲内痛此湯主之懸飲十云八痰飲流レテ脇下ニ在テ数痛引痛スルヲ懸飲十云ナリ水腫十九此茉各等分棗肉ヲ煮熟シ度核ヲ去リ搗キ爛シ丸トシ梧桐子ノ大サ毎服四十九清晨熱湯ニテ下ス水氣浮腫上氣喘急大小便不通ヲ治ス

禹功散　五十九子和　治陽水腫便秘脉實初起元氣未傷者ヲ

黒牽牛頭末　四両　茴香炒　木香各一両

爲散毎服二錢加生姜自然汁調如稀糊服

此茉水腫門ニ入ルベシ誤デ攻裏ニ入ル他日處ヲ撰ンデ攻裏スベシ王治方下ノ如シ初起元気未傷モノニ用ベシ牽牛性温ナリト云ヘドモ行水去湿熱ノ專茉ナリ故ニ陽水腫便秘シ脉實ナルモノ主之ヲ

濶川散　六十子和　治水腫脹急大便不通大實大滿證ヲ

大黄　牽牛頭末　各一両　芒硝　甘遂　各半両　木香三錢

爲散毎服二錢入生姜自然汁和如稀糊服○此乃下水積之峻茉火熱沸鬱水液不能宣通停滯而生濕熱在陽不去則化氣而化生ス爲脹在陰不去則化積成形ヲ

水腫

此藥陽水腫濕熱甚ク大實大滿ノ症ニ用ル茉ナリ故ニ大陷胸湯ニ加牽牛郁李仁木香下劑ノ峻茉方下ニ記スカコトシ

三白散　六十一良方

白牽牛頭末　桑白皮姜汁炒　白朮生用　陳皮　木通各二兩

爲散每服二錢空心淡薑湯送下ス

此方牽牛ヲ君トシ白朮陳皮ハ燥濕利氣除痰ノ品ナリ桑白皮木通ハ利水ノ茉ナリ牽牛ニ佐トメ此症ヲ治ス前方ニ比スレバ穩當ナリト云ヘ𪜈此亦水腫初起ニ便不通元氣未衰ヘモノニ用ユベシ但シ陰囊腫脹スルモノモツトモ此方ノ的候ナリ

大便閉

半硫丸　六十二局方

治高年冷秘虛秘及痃癖冷氣ノ

硫黃醋煅柳木槌碎研　半夏湯泡晒乾爲末

右二味等分用生姜自然汁調蒸餅糊杵數百下丸如梧子大每服十五丸至二十丸空心無灰酒或生姜湯任下婦人醋湯下ス

此茉攻裏ノ茉ニ非スト云ヘ𪜈此書大便閉ノ門ヲ不立故ニ攻裏ニ入ル寒門ニ入ル、𪜈又可ナリ大便冷秘ノ茉ナリ冷秘ハ六脉沉遲面白ク或黑ク凝陰固結シ胃氣閉塞腸內氣攻腹中喜熱惡冷ヲ轟香厚朴乾姜肉桂枳殼陳皮生姜ノ煎湯ヲ用テ此丸ヲ服スベシ丸熱茉多クハ大便ヲ秘閉スル、硫黃ノ性緩ノ大便ヲ通スルナリ

痰飲

三花神祐丸 六十三 一切濕熱沉積痰飲變生諸病者主之
河澗
甘遂麪裹煨 大戟 芫花 各半兩 炒 輕粉 四分 大黄 一兩 黑丑 二兩取頭末
前茱為末滴水為丸如小豆大初五丸每服加五丸温水下日三服以利為度服後痞悶極甚者此痰涎壅塞頓攻不開轉加痛悶即初服五丸每加二丸至快利即止

此茱方下二記ス如ク痰飲變ノ諸病ヲ生スル二用ルナリ故ニ仲景ノ十棗湯ニ加輕粉大黄牽牛ヲ十棗湯ハ逐飲ノ駛劑ナホ黑牽牛ヲ以テ逐水ノ佐トスト大黄燥結ヲ潤シ積滯ヲ通ズ輕粉諸藥ニ入テ風痰積熱ヲ逐ヒ頑涎沉積ヲ驅リ其主治定功ナシト云ヘドモ只燥熱鬱痰沉積ノ病ヲ治スル藥ト意得テ甚合点ニテ諸病ニ用ベシ故ニ呉氏方考ニ痰飲門ニ入ル仲景ノ十棗湯ハ棗ノ煎湯ニテ用ル故ニ此茱ホド峻ニハナシ此ハ棗ヲ用ス輕粉大黄等ノ茱ヲ益ノ劘剛劑ナリ非大實病不可用

此方他病活用例

腹痛

麻痺 風熱鬱燥ニ因テ四肢麻痺痰痛メ氣血壯實ノ者主之 痰嗽 痰嗽氣血壅滯 憂思思想結シ積塊トナリ生諸病 經閉 婦人滯氣鬱積ニ因テ經閉シ或赤白帶下等ノ症主之モノニ用之 凝滯 凝滯ヲ瀉ス

三物備急丸 六十四 見千金 司空裴秀為散用 示可先和成汁乃傾口中令從齒間得入至良驗

大黄 一兩 乾姜 一兩 巴豆 一兩 皮心熬

右藥各須精新先搗大黄乾姜爲末研豆內之莫令歇つく金匱要略云主心腹諸卒暴百病若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口禁僵尸卒死者以綾水若酒服大豆許三四丸或不下捧頭起灌令下咽頃更與三丸當腹中鳴即吐下便差若口禁亦須折齒灌之

此茉右下二所謂卒暴ノ病ニ用ルト云ガ最ナリ此丸ノ專トスル所アリ就中心腹脹滿卒痛是的候ナリ此方下劑ト云ヘ共若不下必吐スル吐下ノ功アル茉ト知ルベシ傷寒論ノ誤治ニ誤テ温茉ヲ用テ下スノ下云ハ此類ノ藥或紫圓ノ類ナルベシ

三化湯 六十五 機要

中風外有六經之形證先以加減續命湯隨證治之內有便溏阻隔復以此藥利之

厚朴　大黄　枳實　羌活　各等分

右細切每服三兩重水三升煎至一升半終日服之

此方小承氣湯ニ加羌活中風ノ下劑トス此藥峻ナル故後世ニ搜風順氣丸ヲ以テ代之宜シク考ベシ

湧吐

瓜蒂散 六十六 寒

瓜蒂一錢 炒黄

赤小豆二錢

右二味各別搗篩為散已治之取二十錢匕以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少々加得快吐乃止

此茱本論ヲ按スルニ胸中ニ有痰モノ其證傷寒ニ類ス然ルニ頭痛項強等ノ候ナシ其候ヲ詳ニメ此茱ヲ用テ吐之本論又云宿食在上脘者當吐之云畢竟痰ニモセヨ食ニモセヨ形アルモノガ胸中ニアルニ用ル茱ナリ瓜蒂赤小豆ノ茱性ガ云テアレバ何ノ穿鑿ナシニ只吐劑ト意得タガヨシ本論所々ニ此方ヲ用又雜病ニモ用テアレド胸中ニ在ル所ノ形アルモノヲ吐スル茱ト意得レバ用方此意ニ不出ナリ或寒溫頭中ニ中リ頭痛鼻塞外ニ苦ム所ナク能食メ腹中和スルニ此茱ヲ鼻中ニ吹テ鼻ヨリ黃水ヲ出メ愈ル此症ニ煎茱ヲ用ルナラバ差活勝溫

湯ナドニテ頭中ノ濕ヲハラフハノヘタナリ早ク採リ青キ者曝シ乾シ用ルナリ氣味苦ク歛上気黃疸ヲ主ル外用テ鼻中ノ塞肉ヲ去ル弟等按ニ此近來ノ傷寒金匱茱性辨ノ發明ノ說ナリ外ニ越前府中ノ苦瓜蒂ヲ不及求

此方雜病活用例

瘧 十六七歲男瘧疾ニ發頭痛手足節痛甚ク煩渴引飲胸悶不寧脉弦數結促用茱一貼而愈如神此方主之

梔子豉湯 六十七 寒

梔子 八分

香豉二 炙

右二味以水一合六勺先煮梔子得一合內豉煮取六勺去滓分

為二服温進一服得吐者止後服○梔子湯膈上虚熱香豉散寒熱悪毒能吐能汗為汗下後虚煩不解之聖藥若嘔則加生姜以滌飲必氣則甘草以緩中心煩腹脹則去香豉而加枳朴邪在上而不在下也九藥傷胃則去香豉而加乾姜湯泄而兼安中之意也故欲湯虚煩必先顧慮中気所以病人舊有微溏者有不可吐之戒汗吐下ノ後餘邪胸中ニ窒リ煩悶不安懊憹無可奈何ノ狀ト八胸中気味アレク俗ニドウモニ云ハレヌト云様ニ綵テ見テモ起テ見テモ気ガワルイト云フ症ニ用之吐セレムレバ胸中サツハリトレテヨイ此前方瓜蒂散ト同レク吐剤ナリ瓜蒂散ハ形アルモノヽ吐剤ナリ此湯ハ汗吐下ノ後ノ餘邪無形ノ氣ヲ吐スルニ非ヲ用畢竟胸中ニ物アツテ苦ムニハ瓜蒂散物無レテ苦ムニハ此湯ト意得ベレサレヒニ菜ヒニ用ラレヌ「アリ氣弱虚人ニハ瓜蒂散不可用本論不可吐之證ヲ述ル條ヲ見ルベレ又病人舊脾胃虚寒大腸不硬少レニテモ泄瀉スル者ニハ不可用ト云戒アリ加減方後纘論ニ詳ナリ加甘草加枳朴加乾姜本論ニハ別ニ一方ト立ッレヒソレニ不及此加減ニテ佳ナリ纘論ニ九菜傷胃ト云ハ強イ下レ菜ノ丸菜ヲ用テ胃ヲ傷ルナラバト云フナリ仲景ノ時代ニハ丸菜ノ下劑ガイロ〳〵有リソト見ユルナリ

此方雜病活用例

痰飲

眼瞤 此湯加犀角秦皮牡丹皮赤芍茉

稀涎散 六十八 陳氏 能吐痰涎壅盛此茉不大嘔吐但令涎微々自口角流出而自動

明礬 一両 牙皂 五麦

為末每用一錢温水調下

此茶通用湧吐ノ剤ナリ其ウチ卒中風ナドノ痰涎壅盛メ不省人事モノニ用外ノ吐剤ト違フテ一度ニ大ニ不嘔吐ト云ヘドモ此茶ヲ用レバ痰涎ガロヨリ少レヅヽ流レ出テ甦ルナリサレドモ此症ニ元気弱キ者ニハ吐剤ヲ禁ズルコトアリ其訣ハ中

痰飲

三聖散 六十九 子和 防風 二両 去芦 瓜蒂 三両搗濾 妙微黄 藜芦 聖恵方減用之或一両或半両或三銭

右各為麁末每服約半両以藿汁三茶盞先用二盞煎至二盞却将先二盞同一處熬二沸去滓澄清放温徐々服之以吐為度不必盡剤

藿汁次入水一盞煎至三沸却将先二盞同一處熬二沸去滓澄清放温徐々服之以吐為度不必盡剤

張子和ハ汗吐下ニ長レタルモノナリ此方ヲ以テ吐剤ノ專方トス故ニ載之然ル二今眞ノ藜芦ヲ得ルコト難成若シ藜芦ヲ得バ此方モヨレ又人参蘆芦ノ二味ヲ合用ノ古來奇方トスル也

一方 七十 景岳全書　此方可代瓜蒂三聖散之属

用蘿蔔子碎ク温湯和撹取淡湯徐々飲之頃即吐出即有
不盡者亦必下行之

此方古来ヨリ用来リテ不珍ト云ヘ𪜈景岳此方ヲ以テ吐劑ノ
總司トメ瓜蒂散三聖散ノ類ニ代ルト云テ全昏ニ表章之此方
簡便ニメ用井安シ故ニ載之若シ吐メ不尽モノ有レバ必下行
メ瀉スルト云ヘリ然レバ吐下ノ二ツヲ兼タ某ナリ凡吐劑此
五方ニ限ラズ種々ノ方アツテ諸書ニ出ル或症ニ因テ何某ナ
リ𪜈用テ鳥ノ羽ニテ探リ吐スレバ何ヲ用テモ吐スルナリ

小柴胡湯 七十一 寒

柴胡 八分　黄芩 人参 甘草 各三分　半夏 六分
生薑 大棗 各三分　右七味以水二合四勺煮取一合二勺去滓
再煎取六勺温服之日三服○若胸中煩熱而不嘔去半夏人参
加括蔞實滌飲除煩四分 忘本 ○若渇者去半夏加人参 生津液 合前成四
分半括蔞根四分 忘本 ○若腹中痛者去黄芩 胃中清陽邪攻陰気ヲ傷ル加
芍薬三分 陰邪陽ニ傳ルヲ主ル陰中伐木故ニ 症本 ○若脇下痞
痛去大棗ノ加牡蛎四分 癥飲脇下ニ結ス大棗ノ甘緩ヲ本 証本 ○若

心下悸小便不利者去黄芩加茯苓四分 水心下二停ル黄本忘
若不渴邪未入裏外有微熱者去人參加桂解表三分温覆取微汗愈本忘
○若欬者去人參大棗生姜加五味子斂肺六分乾姜辛散二分○小
便難潮熱腹滿加茯苓三分本症
○下後陰虚生熱脈微悪寒去黄芩加芍藥二分腹痛亦然本症
茯苓五分本症
○飲水過多成水結胸去大棗加牡蛎ヲ軟カニスル五分本忘
○往來寒熱欬嘔胸脇痛去人參大棗加五味子乾姜一分七厘本症
渴甚去半夏加人參一分七厘括蔞根三分本症
○身熱不渴去人參加桂

枝一分本七厘症
○心中飽滿加枳殻括蔞本忘
○心下痞滿加黄連枳實本症
○夜靜而晝発熱者熱在氣分加山梔黄連知母地骨皮本症
晝夜發熱者熱在氣血之分合四物湯加黄連山梔本症
○下剤身熱夾外感者必悪寒發熱煩渴身首倶病此在表去人參大棗加
蒼朮川芎陳皮赤芍茅生姜得微汗愈本症
○傷寒陽證欬逆潮熱加陳皮竹茹生姜本症
○伏暑発熱汗渴暑入心胞不語加茯苓暑
○瘧熱多寒少或單熱頭痛胸滿咽乾宜此湯去半夏加入參瓜
蔞根瘧
○瘧發寒熱作渴病在表裏陰陽不分者合五苓散名柴

苓湯同○無汗加麻黄瘧ノ加味○有汗加桂枝寒多加肉桂瘧ノ加味○熱多加黄芩瘧ノ加味○口酸而苦者肝膽有實熱加竜胆青皮甘草

口酸苦○如膽熱而口苦者謀慮不決也去黄芩加酸棗地骨遠志

口苦○由醉飽房労而後大怒鬱動栄血致吐血者加二門冬吐血

炙後発熱煩悶加竜骨牡蛎炙熱

○産後悪露下忽然斷絶寒攣往來晝靜暮劇語言狂乱如有鬼神此熱入血室而顛狂加生地黄

熱入血室○産後虚羸寒熱飲食少腹脹加陳皮川芎生姜大棗産後

小兒感寒發熱或作瘡宜此湯小兒感冒

○痘疹出不快身熱甚者加生地黄痘

○傷寒百合病加知母百合竹葉粳米百合病

○木方去人参甘草加芍薬大黄各七分枳實三分入姜棗煎服名之大柴胡治傷寒十餘日不解大便不通身熱煩燥譫言妄語此乃攻裏劑故以利為度如身体疼痛者表證未解不可服之本前ノ大柴胡ノ症條ト參見スベシ

○倍加芍薬大黄名數和湯治腹痛大便結小便渋喜飲冷以手按之痛轉甚手不可近或兩手按腹脾熱腹痛

○按大柴胡數和宜實證不宜虚證小柴胡傷寒和解之剤也○百日發熱煩渇小水不利兼傷寒陰陽不分疑似之間者去半夏加麥門五味黄連暑

○下痢赤白腹痛身熱加黄芩若菜（痢病ニ此湯ヲ用ル的的證的的鼻孔煤ケ黒シ）○痢如兼悪寒亦得（同）○熱嗽嘔冷水而暫止者加桑白杏仁（欬嗽）○欬嗽煩熱加麥門（同）○欬嗽嗜臥減食加白朮（同）○欬而寒熱往来去人参加五味子乾姜（同）○寒熱不調作腹痛去黄芩加芍薬（腹痛）○俄耳聾而頭鬱冒合者藉散百發百中（耳）○灸後発熱煩悶加黄連山梔得奇妙（灸熱）○陰嚢湿痒加黄連山梔口苦（陰嚢湿痒）○男婦口苦兩脇脹或痛加黄連山梔口苦也○大飢發熱大食傷胃已成黄疸其候食則腹滿眩暈或心中怫鬱不安加枳實厚朴山梔（黄疸）○婦人傷寒經水適來適斷発熱悪寒夜則譫語此為熱入血室故寒熱如瘧宜此湯（熱入血室）○少壯人発熱悪寒入夜譫語亦宜

此柔傷寒ノ邪少陽經ニ在ルモノ和解ノ劑ナリ少陽經ハ陽經既ニ終テ陰經ニ傳ヘントスル所ナリ故ニ半表半裏ト云其症往來寒熱ニ胸脇苦滿ニ脇下痛三或鞕滿ニ咳メロ苦ク或渴シ或不渴耳聾目眩ニ目赤ク默々不欲飲食心下痞滿心下悸小便不利心中煩ニ或欬ニ頭痛頭汗腹痛身微熱アリ手足温或手足心冷ヘ脉弦或弦細然ルニ此症ガ盡ク在ルニアラズ人ノ気体ニヨリテ同ジカラズ此中ノ症ガ一二三邑モ見ルナラバ即此

湯ノ症ナリ柴胡ハ少陽經ノ某ニメ專ラ往來寒熱ヲ主ル黄芩ハ風熱ヲ去ル專功アリ生夏ハ滌痰飲清痰人參甘草ヲ用テ以テ少陽ノ氣血ヲ助ケ薑棗和胃半表ノ邪肌表ニ從テ散ズ是此菜ノ正面ナリ

此方本証主用例

陽明中風ノ症脉弦浮大短氣腹滿及ビ心痛鼻乾キ不得眠嗜臥及面目尽ク黄色小便難ク潮熱アリ時々乾嘔耳ノ前後腫レ病十餘日ニ及ブト云ヘドモ脉ツバイテ浮ナル者ハ宜此湯ニ

○陽明ノ症ニメ脇下鞕滿不大便ノ嘔シ舌上白胎アル者ハ此湯ヲ與ベシ上焦ノ津液通ルコヲ得テ下リ胃和シ身濈然トメ汗出テ病解ス

○陽明ノ病潮熱ヲ發シ大便溏シ小便ハ常ノ如ク胸膈滿ルモノ此湯主之

○本太陽ノ病不解轉メ少陽經ニ入ル者胸下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱脉沉緊ナルモノ此湯主之

○傷寒十三日胸脇滿テ嘔シ日晡潮發シ終テ後微ク大便利ス此本小柴胡ノ症ナルヲ以テ下之如キ此ノ症トナル先ツ此湯ヲ用テ外ヲ解シ後ニ柴胡加芒硝湯ヲ用ベシ

○婦人ノ外感經水適來テ其儘斷ヘ七八日ニメ胸脇滿チ鞕ク痛ミ結胸ノ狀ノ如ク譫語スルハ瘀血裏ニ結スルナリ即此熱入血室ノ實症ナリ此湯去人參加桃仁牡丹皮當帰尾穿山甲

○右ノ症折節經水來テ經水不殘不下メ鬱ル血結メ瘡ノ形ノ如シ此始メノ症トクラブレゼナレバ始メノ症ハ經水來ルト其ニハ鬱ル故血大分殘テ結

スルユヘ實症ナリ此症ハ經水大方行テ今少シ殘ル其殘リガ結スルユヘニ瘀血ガ火イ此湯加當皈牡丹皮生地黃涼之

○婦人經水來ル最中ニ患傷寒晝ハ常ノ如ク夜ハ譫語メ鬼狀ヲ見ル如シ用此湯經水ガ皆下リテシマヘバ右病自愈ルナリ

○血弱ク氣盡テ外邪ト相搏チ脇下ニ結シ默々不欲食邪高ク痛ミ下メ噫スル者ハ本方主之右ノ四症婦人熱入血室ノ症也

○陽明ノ症ヲ病ンデ下血シ讝語ス此男子ノ熱入血室ナリ多ク頭汗ガ出ルモノナリ此湯ニ合犀角地黃湯若シ熱甚ク神昏キ者ニハ生地黃黃連湯ニ加酒大黃右婦人男子熱入血室ノ症其脉血滯テ不行脉乍濇乍數或沉或伏ソレニ血熱ガ交レバ脉洪盛ナリ血虛スレバ芤ナリ若シ虛中ニ瘀血ヲ兼レバ芤脉ノ中ニ帶弦此一定ノ方ナリ

○外感咽喉乾燥此湯或小建中湯

○太陽ノ病胸滿脇痛ハ此湯ニ疑ナシ但脉浮者宜麻黃湯

○傷寒四五日身熱惡風頸項強リ脇下滿チ手足温ニメ渴スルモノハ此湯主之

○太陽少陽ノ合病此湯或柴胡桂枝湯主之

○傷寒愈後又發熱スルハ此湯主之脉浮ハ汗メ以テ解之脉沉實ハ下メ以テ解之

○婦人經行ノ時外感セバ此湯ニテ和解ス加當皈川芎牡丹皮不然トキハ熱入血室ナリ

○産後傷寒遽テヘ不可用此湯方中ニ黃芩アレバナリ産後傷寒時疫ハ柴胡四物湯ニ加減ス

○傷寒胃實ノ症脇下ト手足ノ心ト兩處無汗ハ未結定尚此湯

ニテ和解シ結定ヲ待ツ
○雜病ノ盜汗ハ責メ陰虛ニ在リ傷寒ノ盜汗ハ半表半裏ニ在リ宜此湯若シ脉浮緊潮熱盜汗ニハ柴胡桂枝湯若シ太陽陽明ノ合病裏實ハ必ズ盜汗出ヅ
○結胸未經汗下ハ此湯加枳實桔梗或更ニ加桂枝
○舌上胎黑ク燥烈神昏譫妄ハ此湯加知母石膏
○陽明脉浮發熱スルハ表未盡宜此湯
○往來寒熱ノ呃スル者ハ宜此湯不應ハ加肉桂乾姜黃連
○少陽陽明ノ合病欬ノ嘔シ腹滿ハ此湯加葛根
○傷寒厥ノ心下悸ニハ與茯苓甘草湯先治厥次ニ與此湯
○食復脉弦大此湯加葛根黃連烏梅
○滿舌白滑尖反テ鮮紹少陽經ナリ此湯ニ加減ス
○白胎中紅舌少陽經ノ症ナリ此湯ニ加減ス
○舌尖白ク其症寒熱耳聾口苦ク脇痛ニハ宜此湯
○舌根白ク尖黃ナルハ宜此湯
○藍紋舌ハ即胃上ノ氣衰フ此湯去黃芩加乾姜或附子理中湯大建中湯
○積聚動悸兼傷寒者和方此湯ヲ不出

此方雜病活用例

溫疫　溫疫多渴ハ此湯去半夏加石膏知母　熱病者此湯ニ加減スベシ　同　熱病欲ニ下之表未解也　只此湯ニテ和之　同　溫熱病時疫脉弦脇痛ハ此湯去人參半夏加枳殼橘可用半夏生姜毛又慎三可用　溫病溫病面赤ク煩燥引水此湯去石膏知母弦小無力可用人參嘔者

半夏加 同 晩発大抵此
葛根ヲ 湯加生地黄ヲ 大頭病 蝦蟇瘟ハ頤頬ノ下腫ル此湯去ヘ
馬勃荆防敗毒散モ亦可ナリ夏暑濕熱ニテ腫ル、 温瘧 温瘧ハ
ニハ消暑十全散加荆芥防風馬勃ヲ方見上編暑門 夏月ノ
温瘧トハ少シ違フ傷寒論序例ニアリ其症胸脇滿煩
渴メ嘔又微ク悪寒ス此湯去ヘ参半夏加括蔞根石膏ヲ 寒熱 寒熱
モノハ此湯ヲ主茶トス夜轉 如瘧
タ甚シキ者ハ加牡丹皮山梔ヲ 瘧 暑瘧ハ但熱メ不寒此
瘧ハ但熱メ不寒春ハ用此 同 労瘧大渴者此湯加常
湯ヲ夏ハ用白虎加桂枝湯ヲ 同 去半夏加括蔞根 瘧疾此湯加常
去半夏加括蔞根 同 山梔柳草菓
同 瘧大渴大熱者去半 瘧痢 瘧痢ハ此湯合四君子
夏加知母麥門黄連ヲ 四物ヲ加黄蓍名三分散ヲ 腸痛 腸痛肝火
動スル者

ハ此湯加黄 腸痛吐血ハ熱傷肝ヲ此
連牡蛎枳殻 同 湯加當帰川芎生地黄ヲ 腹痛 腹痛ニハ此湯
身体痛ニハ此湯 痛風忽痛モノハ此湯去半夏加 身體痛
加麻黄桂枝芍菜ヲ 痛風 防風當帰生地黄大黄黄連滑石ヲ 頭痛 産後
頭痛因外感 潮熱 潮熱虚羸五心煩熱ニハ逍 熱嗽 熱嗽ニハ此 同
者宜用此湯 遙散此湯ニ加減スベシ 湯加桔梗ヲ
夏月嗽發熱ニハ 膽熱此湯加蘆根ヲ 同 寒熱交作リ此湯加知母
此湯加石膏知母 同 胆熱ノ狀見素問 之類或加芍菜五味子桑
白皮ヲ 嘔吐 嘔メ發熱甚ハ此湯主之 同 胃口痛テ嘔吐又熱ノ
治スルニ 加丁香砂仁ヲ 者此湯加竹茹ヲ 同 嘔吐ヲ
モ加竹茹ヲ 口苦 膽逆口苦 吐血 脇痛吐血ハ此熱傷肝此湯
キ宜此湯 吐血 去黄芩半夏加牡丹皮鼈甲ヲ 同 風ヲ

リテ後ニ吐衄下血スルコトアリ初発ナラハ此湯加芍薬傷寒悪寒証ニ脉數實ナルハ血ヲ下スモノナリ【尿血】妊婦尿肝火動スルニ【汗】汗出邪熱アル【同】産後汗出大便硬ク嘔ノ【喘急】血因怒ハ此湯加桂【同】不能食ニハ此湯主之【喘急】喘急ニハ此湯加【積聚】無塊ニハ加枳麻黄蘇子桑白皮【積聚】痞満香三稜【大便閉】熱極不大便此腹脹ニハ加香【胸脇脹満】胸脹脹満ニハ此湯【痢】痢疾ニハ加黄附枳殻白豆蔻【胸脇脹満】加枳實蕪術砂仁【同】連枳殻去甘草【同】夾外感モノハ不悪寒此湯去人参悪寒発熱身首痛ムハ表症【泄瀉】一ナリ微寒和解スベシ用蒼朮川芎陳皮芍薬甘草生姜【泄瀉】人下痢瘧或發シ或止ニ患泄瀉医理中湯ヲ與フ悶厥ノ漸ク甦ルト脉濇長按メ弦數丹溪云是下痢ノ深重ナルモノナリ與當皈藏

薯蕷去麝香四貼ニメ利減シ又此湯去半夏加黄連芍薬川芎生姜數貼ニメ安シ【盗汗】下ノ後盗汗スルニハ此湯去人参生姜加撚皮【陰汗】湿熱陰汗ニハ此湯去人参加茯苓龍胆黄柏【頭揺】卒然トメ頭掉キ少陽經ナリ此湯去人参加防風不大便ハ陽明ノ府症ナリ【陰痿】陰縦ハ前陰受熱此湯加酒黄柏湿熱ニハ龍胆瀉肝湯【消渇】消渇ニハ去人参【火熱】気分虚熱久シキ者ハ陽ヲ升合四物湯加天花粉【火熱】せテ以テ散之此湯合四君子【咽逆】下ノ後咽逆スルハ攻未除ナリ此湯加陳皮竹茹【足腫】両脚浮腫ニハ此湯加大腹皮木瓜五加皮【虚煩】傷寒過經屢下メ熱不解脉虚數ニメ【虚煩】熱未解或煩スル者ハ此湯ニ加減ス【赤膈】赤膈ハ胸膈赤ノ疼痛発熱身痛三或胸脇疱ヲ発ス少陽ノ風熱

二屬ス荊防敗毒散加黄芩黄連星角若シ表症既ニ退キ大便燥結スルハ涼膈散半表半裏ハ此湯去人參加枳殻桔梗破傷風ニアルハ宜此湯耳瘡寒熱爲痛者肘經ノ風熱ニ屬ス此湯加山梔川芎便瘕入房敗精凝滯ノ瘀ト為リ腫痛跨腹ノ間ニアリ先ツ五苓散ヲ用井敗精ヲ利去シ大便結スルニハ加大黄寒熱アル者ニハ此湯加山梔澤瀉若シ躰弱ク大便易小便澁ル者陰瘡濕熱腫痛寒ニハ此湯加川芎當歸知母黄栢澤瀉陰瘡熱スル者ハ此湯加龍胆黄連青皮陰嚢痒産後産後不語ニハ黄疸酒毒熱スル者ハ此湯加釣藤鈎陰嚢痒加蒼朮用之黄疸陽經ニ發スルモノハ風症色黄帶青者ハ此湯加茵蔯葛根黄連澤瀉同必寒熱アリ此湯加山梔茵蔯

同小兒黄疸大人ト同シ熱アル者瘡出ルトキ欬嗽腸痛止貪ニハ此湯加麥芽枳實山梔茵蔯瘡不下モノハ半表半裏ノ邪ナリ此湯加五味子枳殻桔梗小便赤キ者ハ加山梔赤茯苓便血糞黑キハ毒大腸ニアリ屋角地黄湯或此湯加生地黄感冒一男寒熱ノ虫衝上痰多尿黄大便結脉弦實此湯加青皮挾柳香附木香生姜ノ傷寒脉屋漏ノゴトクナルニ此湯ヲ用テ愈

柴胡桂枝湯 七十二 寒

柴胡 八分　桂枝　黄芩　人參　芍藥　生姜　大棗 各三分　半夏 六分　甘草 二分

右九味以水二盞四分煎取一盞二分去滓温服四分此本方ノ量ナリ九味合ノ三ト四ト分ニ水二杯四分ハ二合四勺ナリソレヲ一合二勺ニ煎ス此モ時方ニ隨ヒ右三ト四分ヲ二ツニ

寒微嘔支節疼心下支結ニ用ル其外
用井方上編ニ述ル如シ參考スベシ

柴胡桂枝乾姜湯七十三
寒

柴胡八分　桂枝　乾姜　黄芩
牡蛎各三分　瓜蔞根四分　甘草二分

右七味以水二盞四分煎取一盞二分去滓再煎取六分温服二
本方刻合ノ分量ナリ七味合メ二錢六分二水二合四勺入
分二合二勺ニ煎シ去滓再煎シ六勺ヲ取リ三度ニ用ユモ
時方ニ隨ヒ二貼ニ分チ一錢三分トメ水三杯入一杯半ニ煎
シ去滓再煎シ一杯ヲ取リ三度ニ用ユベシ

此亦傷寒併病ノ条ナリ本太陽少陽併病ナレバ前方柴胡桂枝

分チ一次七分トメ水二杯入一杯ニ煎シ三度ニ用ベシ一杯
ハ大抵一合入リノ茶碗ナリ

此方本論ヲ按ズルニ太陽少陽併病ノ条ナリ傷寒二合病併
ト云ヿガアリ此ハ餘程ムツカシキヿニテ傷寒論ノ上デナケ
レバスヽヌヿナリ畢竟ハ太陽ノ症モアリ少陽ノ症モアル症
ニ用ル条ト意得ベシソレナゼナレバ桂枝湯ト小柴胡湯ヲ合
方ニシタ条ナリ傷寒モ感冒ニモ此方ノ用タキ症ガ大分アル
モノナリ前ノ小柴胡湯ノ條ヲ見ヨ小柴胡湯ニ加桂枝或加麻
黄桂枝方ガヒタモノアル皆此方ヨリ出タルモノナリ小柴胡
湯半表半裏ノ症ニ大陽經ノ表症モ兼テアル病ニ用ル条ト合
点ノ出シヅヽノ加減ハ極タルヿハナシ近世ノ流行条ナリ金
匱ニモ外臺ヲ引テ心腹卒中痛者ヲ治スト云本論ニハ發熱徹

湯ヲ用テ和解スルハヅナリソレヲ医者ガ誤テ発汗ノ薬ヲ用テ太陽ノ邪ハ発散メシテヘビ火陽ニ邪ガ残テ皆ヤデハ不解ホドニ此ハ裏ヘ入ッタカト重子テ意得違ヘテ亦下剤ヲ用テ二度誤ルソレデ微邪ガ上焦ヘ聚テ胸脇満微結シ肺気壅テ小便不利メ渇スサレヒ邪ガ軽キ故嘔逆ハせザルナリ只頭汗出テ寒熱往來シ心胸煩熱スルナリ柴胡桂枝ヲ以テ太陽火陽ノ邪ヲ去リ黄芩甘草内外ノ熱ヲ除キ乾姜ハ胃中ノ寒飲ヲ主ル括蔞根ハ膈上ノ挾渇ヲ治シ牡蛎ハ脇下ノ結ヲ散ズルナリ此傷寒誤治ノ葉ナレヒ誤治デ無テモ此ヤウナ病症ガ平生得テアルモノナリ如此ノ症アラバ考ヘ用ベシ右前方ト此方トノ二方ハ瘧ニ能クアルモノナリソレデ先輩ガ瘧門ニ撰メアル元來ハ瘧ノ葉ニテハ無シト意得ベシ

此方雑病活用例

瘧　金匱ニ瘧寒多ク微熱アリ或但寒不熱モノニハ柴胡桂姜湯主之即柴胡桂枝乾姜湯ナリ

醫療手引草續編一之卷終

醫療手引草續編一之卷終

