
續編

三河　滕謙齋烏巢先生著

男　平安　加藤懿之　校補
門人　越前　尾﨑正龍　校正
同　南部　前田元常　全
同　大和　伊東元春　全
同　阿波　渡邉玄立　全
同州　堀　順伯　全

中風

風

三生飲　七十四　易簡　治中風卒中不知人事口眼㖞斜半身不遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脉沉伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥及氣厥氣虛眩暈悉有神効但口開手

散眼合遺尿聲如鼻鼻者難治

天南星一兩　川烏去皮　生附各半兩　木香二錢半

右入姜煎溫服或口噤不省人事者用細辛皂角為細末以管吹入鼻中候貴處其人出蘇然後進某痰涎壅盛者每服加全蝎薛立齋每用加人參神効冀於他二生飲一兩加人參一兩

此茶方下ニ述ル所詳ニ考ヘテ用ベシ中風蘇テ後表症アラバ小續命湯ニ加減痰涎壅盛ノ脉數有熱モノニハ省風湯痰涎逆シ脉沉厥冷スル者ニハ大省風湯ヲ用テ効アラズ頑痰イヨく盛ニ成轉夕増困重モノニハ此湯主之謙云此ハ中風醒メテ後用ル令点ナリ卒中風ニモ用ルナリ

中風

○卒中風陰中ハ面色青ク或白ク或黑ク痰喘昏乱シ眩暈多汗甚シキ者ハ手足厥冷スル此症危キ者ハ多ク脫症ヲ見ス此湯ニ倍加人參加竹瀝姜汁詳ニ中編ニ見ヘタリ

此方他病活用例

破傷風

破傷風甚シキ片ハ痙ヲ發ス此湯加天麻為細末黑豆淋酒ニテ調服ス

星香湯七十五　易簡　治中風痰盛服藥不得者

天南星　制錢　木香一錢

每服肆錢水一盞姜十片煎七分ニ不拘時温服

此菜方下ニ述ル如ク中風痰涎壅盛ノ菜ナリ畢竟三生飲ノ輕キ劑ト意得ベシ

此方他病活用例

痰飲 此方中風ニ非スト云ヘドモ元來痰飲ノ菜ナル故ニ古ヘ暑途ノ暑代多ク痰症ニ用ヒテ可ナリ

一症アリ虛人此本痰飲流注ニ因テ肩背痛ヲナス者ハ湯加ニ香薷一錢一

肩背痛 此湯或導痰湯ニテ五套丸ヲ下スベシ

瘤 瘤疾此湯加ニ全蝎三箇下酥角圓一

心風 心風者精神恍惚喜怒不常言語時或錯亂有癲之意ニ不如ニ癲之甚亦痰氣所為也宜此湯加ニ石菖蒲參各半錢一下ニ壽星圓一

痙 風痰全蝎

攝生飲 謂蘇合香圓七十六治ニ一切卒中不論中風中寒中濕中暑

中氣及痰厥飲厥之類初作皆可用此先以皂角去皮弦細辛生南星半夏爲末吹ニ入鼻中俟其噴嚏即進前藥牙緊者中指點南星半夏細辛末并烏梅肉頻揉自開

天南星 南木香 蒼朮 細辛 甘草生用

石菖蒲各一錢 半夏百沸湯炮七次 類一錢半

右件劉散分ニ二服水一盞半生姜七片煎一盞半去滓熱調穌合香圓半丸灌下痰盛者加全蝎二枚炙

攝生飲 八星香湯ニ加味ノ此亦中風痰涎壅盛ノ藥ナリ穌合香

九八局方氣門ニ入ル中氣卒倒ノ藥ナリ二方合ノ一切卒倒ノ藥トス此亦一法經驗ノ藥ナリ方下ニ述ル如シ醫門法律ニ出タリ法律ヨリ前ノ出處未詳愈氏詳ノ謂ヘリ風寒濕暑氣痰飲ヲ不論一概ニ用之ト云ハ難意得謙云中気卒厥痰涎壅盛ナルモノニ可用之若シ陽挾ノ證牛黄圓ノ類ヲ可用症ニ此藥ヲ用井バ不宜若シ脫症人參三生飲ノ類ヲ可用症ニ用レバ難救

小續命湯 七十七 千金 治中風外有六經形證及風痺脚氣

麻黄去根節泡 桂枝 甘草炙 杏仁去皮尖炒研 芍藥酒洗 川芎 防風 人參 黄芩 各一錢 防己 二錢 附子炮七分 酒洗 大附子炮七分

右作二劑每劑加生姜五片大棗一枚水煎溫服方下ノ主治右從緒論雜方

正傳曰金匱要畧本方續命湯ト有リ金匱古今録驗防己黄芪本方驗續命湯ト有リ有石膏當皈無附子防風ノ古今録石膏當皈固不可無而附子防風不可缺此恐傳寫者之先簡耳

百二十方加減

精神恍惚加茯神遠志 本症 此ヨリ雲岐子 去附子 本症 加減ノ方ナリ ○心煩驚悸加屋角羚羊角 本症 ○骨節痛有熱倍芍藥 肉桂附子 本症 ○嘔逆腹脹倍人參加半夏 本症 ○臟寒下利去防己黄芩倍附子加白朮 本証 子 倍芍藥 入竹瀝 本症 ○臟寒大便溏去附

○自汗去麻黃杏仁加白朮（本症）○脚膝弱加牛膝石斛（本症）○身疼加蒺苡羌活（本症）○腰痛加桃仁杜仲（本症）○失音倍杏仁（本症）○易老云內經云開則渐然寒閉則熱而悶須知暴中風邪也宜先以加減續命湯隨症治之ノ法ナリ開則一開八皮膚ナリ閉モ皮膚ナリ○中風無汗惡寒易水○麻黃續命湯主之倍加麻黃防風杏仁（本症）○中風有汗惡風易水○桂枝續命湯主之倍加桂枝芍藥杏仁易水云已上二症（本症）○中風身熱無汗不惡寒白虎續命湯主之加知母石膏倍甘草去附子（友松子云易老無去附之言）（本症）○中風身熱有汗惡風加葛根桂枝黃芩易水云已上三症陽明中風也

（本症）○中風無汗身凉附子續命湯主之倍附子甘草加乾姜（此症太陰經中風也）（本症）○中風有汗無熱桂枝續命湯主之倍加桂枝附子甘草（此症少陰經中風也）（本症）○中風六七經混淆（絡）痛麻木不仁羌活連翹續命湯主之加羌活連翹原用小續命八味去麻黃敗陰肢節攣（拘）痛麻木不仁羌活連翹用也（痙）○産後中風脚氣最為要某然手足搐搦者當去附子（産後）（中風）○按不可用多汗者大抵身冷或四肢厥冷而拘急不仁者宜（本症）○一婦二十餘歲産後三十有奇日腰足冷腹痛甚膝屈不伸脉沉遲加附得奇効

此方方下ニ述ル如ク中風外六經ノ形症ヲ見ス者主ニ之千金方ニ出タリ然ルニ此ニ載スル所ハ千金方小續命湯ト称スルモノニ方ナリ方後ニ載スル所正傳ノ考ハ本方ト指スモノハ金匱要畧ノ古今録驗續命湯ナリ此ニ載スル小續命湯ト合ノ一方トスル合点ナリ尤理ニ於テ至極せリト云ヘド金匱古今録驗續命湯并ニ千金方ニ載スル所ノ續命湯大續命湯西川續命湯ノ類方下ノ主治ト病症ヲ考ヘテ用之恐ラクハ古人ノ意ニ不背ベシ其上ニ自分ノ意得ニテ正傳ノ方ナリ尤其ノ外先輩ノ説ニ從テ可ナリ九千金ニ挙ル續命湯ノ類方十方斗アリ參考スベシ

○吳氏方考ヲ按スルニ麻黄杏仁八麻黄湯ナリ桂枝芍薬八桂枝湯ナリ中風ノ病太陽ノ外邪ヲ兼ル者宜用之人參甘草八四物湯ノ二ナリ氣虚血虚ノ者必用之風溼ニハ用防風湿ニハ用防己陰溼ニハ用附子陽溼ニハ用黄芩蓋シ病單ニ不來雜揉ノ至ル故ニ其薬ヲ用ユルモ亦如此兼子該ルナリ方考加減熟者去附子用白附子筋急語遲脈弦者倍入參加薏苡當歸去黄芩芍薬以避中寒煩燥不大便去附子倍加芍薬竹瀝日久大便不行胸中不快加枳殻大黄語言蹇渋手足攣掉加石菖蒲竹瀝口渇加麦門八薯天花粉身痛骨節煩疼加羌活頭項多驚加羚羊角汗多去麻黄舌燥加石膏去附子○此方中風外來ノ邪ニ因テ六經ノ症アルニ用ユ然ルニ後世中風ハ皆内傷ヨリ起ル類中風ニテ續命湯ノ症ハ希ナリ故ニ此方ヲ中風ノ首ニ挙ルト雖モ今ハ疾ニハ疾薬ヲ用井氣ニハ氣薬ヲ用井氣血ノ虚ニハ補薬

ヲ用ユ此方ハスキト不用ヤウニナリ來レル此方元來中風ノ
妙方六經ノ邪混雜メ中リ內ニ人參當歸桂附アツテ補內尚雲
岐子等ガ加減ノ法アリ臨症考ヘ用ヘシ
○萬全保命歌括云子主以小柴胡合桂枝湯以代續命湯者ハ此
胡及足厥陰少陽之藥桂枝湯又治中風自汗之症某也
○張璐云中而口眼喎斜先燒牙皂烟熏之以逐外邪次燒乳香熏
之以順血脈若前症多怒此風動肝氣宜小續命加羚羊角熱湯去
附子加蒺藜恍惚錯語加茯神遠志不得睡加棗仁不能言加竹
瀝脈虛細去麻黃加茯苓
○又云肥人舌根強硬作渾痰治雖病久經絡中之癊火若飲食如常但失音不語
正虛不可純用補藥痰滯經絡俗呼啞風小續命去桂附加菖蒲遠志中心經啞不能言口開面赤者

必死勿治

此方他病活用例

痙 痙病頸項強リ頭搖面赤ク目赤足冷ヘ腰寒ク頭搖背
反張ノ禁口噤牙手足攣急通用岡痙去附子柔痙去麻黃黃耳黃
八耳中痛ニ耳鳴黃色交然トメ悪寒發熱發汗強リ背直痙病ノ狀
ノ如シ此太陽ノ類傷寒ナリ荊防敗毒散去人參甚キ片ハ此湯
去附子加白附子葛根蒼耳天麻外ニ昔參或 腰痛 風痛ハ脈浮或
骨碎補ヲ以テ水ニ磨ノ耳中ニ入ル、ナリ 腰痛 左或右痛ニ定
ル所ナシ兩足ニ攣ル 同 風虛ニハ此 欬嗽 痰嗽失音多ク服寒桑
ニハ此湯ニ加減ス 同 湯加桃仁 欬逆只伏メ不能臥上気
古今錄驗續命湯輕キ片ハ消風散去 同 欬逆只伏メ不能臥上気
殘蚕蛻脫加桔梗薄荷以姜汁調服ス 同 面目浮腫ニハ古今錄驗

續命湯氣盛ニ脉滑實者ニハ多用 脚氣 日久ク枯細或寒ク或挽ク或痛ミ或痺レ或ハ下疳患如ク偏風此湯加木瓜或獨活寄生湯ハ亦多ク秘結ス此湯去附子倍芍藥入竹瀝

眩暈 頭風眩暈用補劑イヨく甚ク外ニ失血ノ症モノ 天便閉 其人本有風症モノ大秦艽湯七十八機要 治中風手足不能運動舌強不能言語風邪散見而不拘一經者

秦艽 石膏生 當歸酒洗 芍藥酒炒 羌活 防風 黄芩酒炒 生地熟地 川芎 白朮酒炒 白芷 白茯 獨活各一錢半 甘草炙五分

右加生姜二錢水煎服

此方活法機要ニ出タリ方下ノ手治云中風外無六經之形證內無便溺之阻隔知血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養血筋自栄云々此ニ載スル方下ノ手治ハ吳昆方考ノ手治ナリ方ハ同ノ主治ハ異ナリ此ニ載スルハ原方ノ手治ヲ吳昆變易ノ方考ニ載スルナリ是ニツイテ面白キ意味アリ先ツ活法機要ノ主治ノ意ハ中風外六經ノ症アレバ小續命湯ノ類ヲ用ユ內便溺ノ阻隔アレバ三化湯ノ類ヲ用ユ然ルニ表症モナク裏症モナク只血虛ノ不能養筋ソレユヘ手足モ不自由ニアリ言語モソレデモノ云ヘナラヌ者ニ用テ其血ヲ養ヘバ筋自ヲ栄テ右ノ病ヲ治スルト云合点ナリ此意ハヨケレ共方ヲ考ヘテ見ルニバス

ヽヌコアリ今嘉言此方ヲ評議云養血筋自ヲ栄スルトニ云サヽ二方中ヲ見レバ風燥ノ薬ヲ用ルコ多シ血ハ静ナルヲ以テ養フモノナリ何ソ以テ風薬動之然レバ方下ノ主治ト悖レリ信用成難シ此湯亦愈風湯三化湯ノ三方ハ通愼子ガ撰ブ所ト云ヘリ通愼子不知其姓名無名ノ下士ト見ユルト云此一云不審尤ナリ又様ナレバ此方ハ信用難成方ト思ハル、然ルニ吳氏方考ヲ見レハ此書ニ載スル如ク方下ノ主治ヲ変易シタリ甲乱手足不遂舌強不能言ハ風邪散見ノ不拘一經者主之ト云テ血弱不能養筋ト云主治ハナシ此ヲ吳松子評云吳氏ガ方下ノ主治ヲ変易スルハ此方ヲ制スル人ノ骨折ヲ惜ンデ其方ヲ助ケテ方下ノ主治ヲ変易シタルモノナリト云謙云此評至極至當ナリ此方古來經驗ノ方ナリ故ニ諸書ニ載之然レ圧活法機要

ノ主治ニ從ヘハ方下ノ主治ト相違ノ難用吳氏方考ノ主治ニ從テ用レバ成程ヨキ方ナリ手足不遂言語不自由ナルハ風邪ガアヽリソヨイコデモナク微邪ガ諸經ニ散在ノ此經ニ在ルト極リモナイソレユヘ補血ノ薬ニ風薬ヲ加味シタルモノナリ此合点ニテ此方ヲ用ベシ本邦老医ノ傳ニ血虚ノ中風脉浮大數ナルモノニ用之トアリ謙云脉浮大數ハ數症ニ屬スル方中ニ石膏生地黄ノ寒薬アリ尤ナルコナリ尤ナルモノニハ用ルコナカレ

○先輩云古大秦艽湯ヲ用井今十全大補湯ヲ以テ代之ト云此説諸書ニ載ス医通ナドニモ如是アレ圧此説ハスキト信用成難レナゼナレバ此方ハ冷補ノ劑ナリ大補湯ハ温補ノ劑ナリ何ゾ冷補ノ藥ノ代ニ温補ノ薬ガナルベキ様ナン不可用

此方他病活用例

眩暈 老医傳云時々眩暈スルハ中風ノ前兆ナリ用此湯可防之云ヘリ謙云眩暈ノ症外ニ中風ノ目當ルレデモ有テ脉浮大數ナル者ニハ可用之只眩暈アル程ニ中風ノ前兆トメ此湯ヲ用ヨト云ハメツホウカヒナルコナリ

加味大補湯七十九回

黄耆蜜炒 人參 白朮 茯苓 當歸酒洗 川芎 白芍藥酒炒
熟地各一錢 沉香 附子 木香各五分 烏藥 牛膝酒洗 杜仲酒炒
木瓜 防風 羌活 獨活 薏苡仁各五分 肉桂 甘草各三分

右剉一劑姜棗煎服○中風手足攣(ナラヌ)縮(ヨボ)口喎(エガミ)語澁(レヌ)等症屬血虛

火盛者宜清補也當作温補

此方回春中風門ニ出タリ主治回春ヲ宜考若医傳云此方ハ本方ニ附子ナドヲ加テ用ベキ症ニ此方ヲ用テヨシタトヘバ本方ヲ用テ其ナヅミズトテ云ヒ此方ヲ用ベシナゼナレハ本方ニ順氣疎風ノ菜ヲ加味スルユヘ甚効本方ヨリ勝レリ經驗ノ方ナリト云ヘリ成程尤ナリ雖然虛甚キ者ニハ本方或本方ニ加附子用ベシソウノ後此方ヲ養生菜ノ様ニソロく用テ効ヲ取ルベシ若シ虛甚キ者ニハ最初ヨリ此方ヲ用テハ補力ヲ不足ナリ症ニ臨ンデ了簡スベシ

疎風湯八十 繫古

麻黄三兩 杏仁 益智各一兩 甘草 升麻各半兩

治表中風邪半身不遂(ナラヌ)麻木語言微澁(ラヌ)季春初夏宜服

右毎服五錢水一小碗煎至六分去滓温服但冬月忌服
此方温薬ヲ用ベキ症ト云ヘドモ時節季春初夏ノ時分ナレハ桂
附ノ類ヲ用ラレヌコトガアルモノ其時此方ヲ用ベシサレモ疹
ニ因テ不可拘之友松子治一老人夏月納涼一夜檐外ニ卧シ外
邪ニ中テ中風ヲ発ス小剤ノ十神湯ヲ一晝夜二十貼餘リ用テ
得効誠謂ヘリ此小續命湯ヲ用ベキ疹トイヘドモ夏暑ノ時節故
十神湯ヲ用テ續命湯ニ代ルナリ小剤ヲ用ルハ老人故大剤ニ
不堪ヲ恐レテナルベシ即此湯ノ方下ニ季春初夏ニ用テ冬月
ハ不可用ト云意ニ倣フモノナルベシ

省風湯 八十一局

治卒急中風口眼喎斜筋脉攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩重胸膈煩滿左癱右瘓拳足痲痺骨節煩疼步履艱辛悩怳不定神志昏憒應一切風證可預服之

防風 南星 各罒半夏 黄芩 甘草 各二両 右吹咀

毎服四大錢用水二大盞生姜十片煎至一中盞去滓温服不拘時候
此方主治方下ノ如シ痰涎壅盛脉數有熱モノニ用ベシ

大省風湯 八十二局

治中風疾破涎潮昏運手足搐掣步身不隨及歴節痛風筋脉攣急並皆治之

南星 防風 各二両 獨活 附子 全蝎 甘草 各二両

右吹咀毎服四錢重水二大盞生姜二十片煎至八分去滓温服

不拘時候且進二服

此方主治方下ノ如シ痰逆嘔泄ノ脈沉厥冷スル者宜用之按ニ省風湯ハ寒劑ニ屬ス大省風湯ハ熱劑ナリ金蝎ノ性下ノ正舌散ノ辨ニ見ヘタリ

滌痰湯 八十三 治類中痰迷心竅

導痰湯加葛蒲人參竹筎

此方痰迷心竅ト雖ドモ痰ガ心藏ノ竅ニ塞リ迷テ昏憒ト心ガイツクラニナリ口噤不能言語モノニ宜用之熱アルニハ加黃連黃芩竹瀝姜汁

秦艽升麻湯 八十四 治中風口自喎斜兼半身不遂

升麻湯 即升麻葛根湯加秦艽人參桂枝白芷防風葱白

此方ハ手足陽明經ノ虛風ニ乘ゼラレテ口眼喎斜不能言語風寒ニ遇ヘバ四肢拘急脈浮ニメ緊ナル者ニ用之或云何ノ故モナキニ口喎ムコアリ外ニカハリタルコトモナキ者ニ此方ヲ用ヘシ惣ノ外ニ何ノ病モナクテ口喎ムコトサイ〳〵アルモノナリ此モ中風ノ類ト見ユル大方ハ菜ヲ用テ愈ルモノナリ面ニ灸ナドスルモヨイゾ但シ二十ヨリ內ノ者ガ口喎ム者アリ此ハ死ヌルモノナリ兼テ知ルベシ

正舌散 八十五 治驚痰壅塞竅隧肝虛生風舌強不正

蝎尾 去毒炒 三錢
藿香 一兩
茯苓 汁拌曬

為散毎服二錢温酒調服并擦牙根日三度○面赤倍蝟尾加薄荷半兩毎服四錢水煎熟服取汗効

此方舌強不能言語者ニ用ユ方下ニ驚痰ト云ニ字ニ意ヲ付ヘシ全蝎ハ厥陰風木諸風掉眩及小兒ノ驚搐ニ用ル要薬ナリ左半身不遂口眼喎斜言語澁リ手足抽掣スル者用之

資壽解語湯八十六 治中風脾緩舌強不語半身不遂 醫通

防風 天麻 煨切姜汁拌焙 附子炮各一 枣仁炒研ニ 羚羊角鎊 觀桂 羌活各八分 甘草炙五分

水煎入竹瀝半杯姜汁數匕服無時脈虚加人參

此方諸書ニ載ス出處未詳圭治方下ニ云如久脾緩舌強不語半身不遂者ニ用ユ或中風ノ漸ニ言語アレキヤ又中風後ドコモカモヨケレドモノイヒアレキト云ニ用テ利ヲ得ルナリ外ノ一ニ用ル菜ニテハナイ一味くニ考ヘハ人ラヌ甚上一方ノ取合せ通例ノ方ニテハナイ一味ヅヽ穿議スル菜トハ三ヘヌ方中ニ桂附ガアレハ温剤ト意得テ用ベレ羚羊角ガ一味寒剤ナレドモ惣体デ温補ノ剤ナリ隨分經驗ノ方ト云ユル舌モツレ半身不遂症ニハ必用ベシ

地黄飲子 八十七 宣明

熟地 巴戟 山茱酒蒸 肉蓯蓉酒洗 石斛 附子炮 五味子

治腎氣虚弱舌喑不能言足痿不能行

白茯　石菖蒲　遠志　官桂　麥門　各等　右姜棗温服

此方方下ニ云如ク腎虚ニ因テ不能言語足痿テ歩行セザル二用ル葉ナリ腎脉ハ舌本ニ至ル一味ツヽ穿鑿ノ見レバ皆補腎ノ葉ナリ麥門五味子遠志石菖蒲ハ心肺ノ葉ナリ河澗ノ制ハ多クハ寒涼ノ剤ナリ此方斗温補ノ葉經驗ノ方ナリ故ニ諸書ニ無不載之

升麻胃風湯　八十八　醫通　治胃風能食手足麻痺目瞤面腫

升麻　當皈　白芷　葛根　各六分　蒼朮　制ハ　麻黄　甘草　各五分　羌活　草蔻研　蔓荊　馨　柴胡　黄蘗　姜制　各三分

右生姜三片大棗一枚水煎食遠服

按風入胃府大便清血四射用人參胃風湯之桂芍祛之内散風入胃經面目瞤動而腫者用升麻胃風湯之升葛麻黄羌活之外散不可不辨

此方風胃經二入テ手足シビレ目ビクツキ面腫ル、者ニ用ユ方後ニ風胃府ニ入ルト胃經ニ入ルト訣ガ云テアル能々考ヘ見テ方下ニアル病ニ用ベシ此亦切々アル症也兼テ可意得

羌角升麻湯　八十九　醫通　治風熱鞕頭面腫痛頬上如糊咽喉不利

羌角　鐫　升麻　各一錢五分　防風　羌活　各一錢　白芷　黄芩　附子　各六分　甘草　各四分

水煎食遠服

此方亦前方ト似タル某ニテ陽明經ノ風挾面腫ニ用ユ然ルニ此方ハ腫レテ痛ミ頰上ガ糊レタヤウニ強ルトアルガ前方ト異ナリ兼テ咽喉不利ヲ治ス

舒筋三聖散 九十 醫通 治口眼喎斜左急右緩血脈受邪者

當歸 肉桂 延胡索 各等分

為散每服五錢水煎去滓早暮各一服

此方中風口眼喎斜左ヘ引キツケ右ハ緩ムニ用ユ此症風血脈中多リ當血不行モノニ用ユ當皈肉桂當血ヲ温補レ且ツ行ラス延胡索血滯ノ運ラス凡榮血冷滯ノ症ニハ中風ニ非ズトイヘ共此方ヲ用ベシ病ニ臨ムノ活法加減ハ醫者ノ意ニアリ

參歸三聖散 九十一 醫通 治風中血脈左半肢癈口目左喎

舒筋三聖散去延胡索加入參○風中血脈急霎流布當氣當行脈中便不當泛用風某所謂血行風自滅也至於左半肢癈氣血不能運行延胡耗血胡敢輕試必藉人參引領當皈肉桂何慮虛風之不散乎

此方左半身偏枯レ口眼左ヘ引ツクルニ用ユ方意大抵前方ト同レ其中ニ延胡索ノ耗血ノ藥ヲ去リ人參ヲ用テ當皈肉桂ヲ引ツレテ榮血ヲ温補ス方後ノ按ヲ詳ニ玩覽スベシ或前方ト合方トナレ或先ニ用前方次ニ用此方ノ一モ有ベシ活法時ニヨルベシ

沉香天麻湯九十二　寶鑑

治因恐懼發癎病猶弱痰涎有声目多白睛強項背一時許脉沉微面急方醒後每見皂衣人即發多服犀角牛黃龍腦麝香鎮墜之藥色如平生餘此證尚在又添行步動作神思如癡先灸兩蹻各二七壯次服此藥

羌活五錢　獨活四錢　天麻　防風　半夏　附子各三錢　沉香　川烏頭各一錢　當皈　白芷　甘草各一錢半

右入姜煎服○百二十方曰救癎壞證之劑○一人足厥冷則有小腹羞上心胸物忙忡或膈塞而心中沉困煩悶如欲絕或食遲則無力生眩暈心如乘舟車久與此湯而安○男子下血或痢婦人產後脫血多失血後有此證四物湯不効則與此湯而可若

蟲出加川練子楝柳

此方羅謙甫方時小兒毛ノ驚キメ癎症ヲ發シソレヨリダンく癎病トナルニ謙甫此方ヲ制メ用テ愈ユ方下ニアル如クノ癎癎病通治ノ藥ト八三ヘヌソレヨリ先輩癎癎ヲ治スル主方ノ諸書ニ多ク載之友松子此方ハ癎癎通用ノ方ニ非ズ然ルニ一概ニ此方ヲ以テ癎癎ノ主方トスルハ誤リナリト丁寧ニ辨之尤至極ノ義ナリ然ルニ百二十方ニ癎癎ノ壞症ニ用ルトアリ癎癎ノ療治ヲイロくレテ誤治ニ因テ壞症ニナリタルニハ

何様用ルトモアルベシ能キク某ト云ルサレ圧壊症ニモイロくアレハ此亦十擬ニ可用ト云モ非ナリ

○本邦老医傳云此方ヲ中風ニ用テ宜シト云ヘリトツケモナイコトノ様ニ思ヘ圧某味ニ意ヲ付テ見レバ成程中風ニ用ベキ方ナリサレ圧目當ナシニハ用ラレヌ方下ニ癇症神志如痴トアリアホウノ様ニナリタル症ニ用ルト見ユル中風ノ目當モ此ト同シ中風ニテアホウノ様ニナリタル壊症ニ用ベシ故ニ癲癇門ノ某ト云ヘ圧此書ニハ中風門ニ攝入スルナリ

此方他病活用例

癇　右ニ記ス如ク癲癇アホウノ様ニナリタル壊症ニ用ベシ　風痰　友松子云予ガ曩年ノ学業ノ師此方ヲ用ルニ枳實南星茯苓苓連梔子ノ六品ヲ加ルコトアリ其所以ヲ問ヘバ答云乃啓廸翁ノ法ナリ況香天麻湯ハ治風痰清心導痰湯ハ治痰火若シ風痰ニ火ヲ兼テ閙熱者ハ合ニ二方ヲ以投之此用權ノ法ナリ

風

天麻九十三　治胷藏虚熱生風

天麻　牛膝二味酒浸一日焙　川芎薤　黒参　羌活各一両　杜仲酒炒七両　附子一枚炮當皮十両　生地酒浸焙十六両　為末煉白蜜丸梧子大空心温酒送下七十九○方中雖以歸地補養陰血為君其效用全在天麻與牛膝同浸同焙俾風痰濁濕咸從下趨而不敢上逆得勿又在附子之雄引領歸地直入下焦填補其空使風邪無復入之慮革薤杜仲以祛在裏湿鬱羌活黒参以疎在表風鬱摽本合法有

法斂散各得其宜此方具矣

此方榮古家珍ニ出タリ奇方ト見ユルソレ故諸書ニ皆載之方下ニ所謂賢藏ノ虚熱生風ト云ハ病因ナリ其病狀ハ云ズ諸君ヲ考ヘ見ルニ病因ハ言テ病狀ハ無シ尓様ノ病狀ニ用ルト云コト知レ子バ目當ナシ衛生寶鑑ヲ披スルニ預防中風ノ某ト云リ凡預防中風ノ某ハ此ニ不限倉風湯ナドデモ中風總司ノ某ナリソレデコソカニ脉症モ云テナイ此某モ預防中風ノ某ト云テアレバ中風總司ノ某ト意得ベシ方後ニ医通ノ發明ヲ載ス脉症ハ云テ無レ匠濁漿溫熱ヲ利シ下焦ヲ補フ某ト云ヘリ此ヲ目當トスベシ

九十四

搜風順氣丸 聖惠

治腸胃積熱大便結燥小便赤澁此藥先通氣血清熱潤燥通利大小便

車前 西半 檳榔 麻子 微去殼另研 牛膝 酒浸 山藥 枳殼 炒 防風 獨活 各 西 山茱萸 酒蒸有核去核另研 大黄 各五錢 蒸酒七次

右為極細末煉蜜梧桐子大每服二十丸溫酒下如覺大腸微動以羊肚肺羹補之膏粱之人大便結燥者常宜服之庶免風秘之人虚秘尤宜保命歌括曰予主以小柴胡合桂枝湯以代續命湯若小柴胡乃足厥陰少陽之藥桂枝湯又治中風自汗之症也經云肝病者大小便難搜風順氣丸以代三化湯者所以治風

痺之病也以十全大補湯代大秦艽湯愈風湯者取其養血益氣收大補十全之功也

方下ノ主治ニ云如ク他病ニ用ルコトナシ中風ノ下劑ナリ方後ニ保命歌括ヲ載ス詳ニ見テ參考スベシ其ウチ大補湯ヲ以テ大秦艽湯愈風湯ニ代ルト云ハ非ナリ其訣大秦艽湯ノ下ニ辨ス

牛黃清心圓 九十五 醫通 治初中痰涎壅盛昏憒不省語言蹇澁口角流涎煩熱氣急

遂一切痰氣閉塞

桂心 當歸 甘草各二錢 麝香 雄黃 鍊水飛 龍腦半錢 人參 犀角各二錢 羚羊角鑿為末 白朮用茯苓 各經火炙 白芍藥 柴胡

右十二味各取淨末配勻蜜和成劑分作五十丸

金箔為衣待乾蠟護臨用開化沸湯姜湯往下原方尚有防風黃芩麥門白芍柴胡桔梗杏仁甘葛荷膠大豆黃花蒲黃神麴白蘞乾姜葛根大棗十十二味因大冗雜故去之

牛黃清心圓 清心牛黃圓至寶丹稍合香圓ヲ中風卒倒ニ用ル辨別各施ス所アリ中風初起痰涎壅盛昏憒不省人事語言蹇澁口角流涎煩熱氣急痙不遂一切痰氣閉塞者用牛黃清心圓此症口角流涎煩熱氣急壅痰甚者用清心牛黃圓右ノ二方ハ痰閉ノ証ニ用ル藥ナリ若寒痰互ニ結シ痰氣壅盛スル二ハ至寶丹前ノ牛黃圓ノ二方ハ寒劑ナリ至寶丹ハ寒痰互ニ用ル方ナリ已上三方ハ中風閉症ノ藥ナリ又中気ノ症卒倒昏迷不省人事有痰無痰俱ニ用稍合香圓利氣則痰自去ル稍合香圓ハ温劑ナリ痰痰ノ症ニハ不可用之然ルニ今時此症ニ用圓藥者多クハ無此辨任手用之或ハ

用糯合香圓一蒸救之謙按二今時見卒中人中氣者多ㇾ故用糯合香圓一方救之ト云ヘ𪜈誤不多況ヤ上ニ述ル摂生飲ニテ調化ㇾ用之則一切卒厥ノ症皆以治之法アリ雖然此方誤テ投爽ニ用之則取誤必せリ如脫症則參者附子ノ外諸ノ香竄ノ劑不可用ㇾ今更不及言ナリ右所擧ノ四方ノ辨ハ中風ニ用ル意得ナリ他病ニ用ルニハ一一方ノ主治有之各方下ニ記ス

○喻子容續医統ヲ按ニ牛黄清心圓ノ原方ハ黄芩麝香龍腦羚羊角犀角雄黄甫黄牛黄金箔ノ九味ナリ局方所載ハ二十九味ナリ右九味ヲ除テ殘ル二十味ハ局方補虚門ノ山芋圓ナリ誤テ以二方ㇾ爲一方モノナリ是若医ノ傳也ト云ヘリ此説ニ從ヘバ原方ハ右ノ九味ナリ今此書ニ所載ノ方ハ從ㇾ医通與金箔共二十三味ナリ殘ル十六味ハ以張碩頑之意去之ト見ユル續医統ハ老医傳來アリト云張碩頑ノ方ハ傳來ナレ𪜈レバ續医統ニ從ベシト云ヘ𪜈ド續医統ノ九味ヲ按ニ黄芩蒲黄牛黄雄黄毒ヲ解レ龍腦麝香開ヲ開キ金箔ノ人一時昏邪ニ中リタル者ニ用テ可ナリ元氣虚弱ノ人ニハ難用ニアリ不知原方者ハ受局方ノ誤ニテ方合スル方ニ從フ也和漢數百年ノ間用來テ相應ニ驗アリト見ユル原方ノ峻ナルニ山芋圓補虚ノ菜ヲ合メ菜勢和緩ナルハ過チノ高名ト云モノナリ李邦亦用之ニ尚矣竹由ノ牛黄圓或初ヨリ去牛黄用井ス名ハ牛黄圓ト銘スル傳アリ何モ相應ニ効アリ以此考之ニ牛黄羚羊角犀角龍腦麝香金箔雄黄ハ無クテ叶ヌ菜ト見ユル碩頑ノ此方ハ其外ハ定テ𪜈ハ無レ𪜈若レクハナイト見ユル

右七味ノ外ニ白朮茯苓桂心當歸甘草人參アリ續醫統ノ方ハ
右七味ノ外黄芩蒲黄アリテ九味ナリ頑頑ノ方ヨリハ峻ニ見
ユルニ十九味ノ方ハ緩過キテ病甚キニハ難用然レバ頑頑ノ
方傳來ヲ云ズトイヘ𪜈中正トメ從ヒ用ベシ次ノ方清心牛黄
圓モ其傳來知ラズ又他書ニテモ未タ見ズ頑頑ノ此二方共ニ
傳受スル所アリト見ヘタリ然レバ弥信ノ可用之
○此方卒中風一切痰氣閉塞小兒ノ驚癇ニ用之
○此方俗云氣ツケニ用ユ其
ウチ有痰喘ヲ目的ニスベシ

急一切痰壅閉塞證

清心牛黄圓 九十六 治暴中神昏不語痰塞心包ニ角流涎煩熱気
医通 丁ニ云ヲ名ク

西牛黄 三錢　陳膽南星 兩　黄連 姜汁浸 兩　姜汁浸 五錢

當歸　甘草 炙各三錢　辰砂 五錢 水飛　為極細末蒸餅和勻作
五十九金箔為衣候乾磁罐貯之
虚實選用調化服

此方出處未詳ト云ヘ𪜈傳來ノ方ト見ヘタリ此前方ニトキハ又
々峻劑ナリ前方ノ證暴卒ニハカヽラズ卒ニノ熱痰甚シキ者主之

至寶丹 九十七 治諸中卒倒痰飲血氣俱閉寒熱交錯者
医通

生烏犀角 鎊 研水飛　雄黄 研水飛　生玳瑁 鎊　琥珀 勿見火研
各一兩　麝香 研　龍腦 研各一錢　金銀箔 各五十片　西牛黄 研半兩　安息香 以無灰酒

飛過濾去沙土約取淨一兩微火
熬成膏如無以蘇合香油代之
右將犀玳為細末入餘茶研
勻將安息膏重用湯煮後入諸藥末搜成劑分作百丸
剖開參湯調化二丸卒中山嵐瘴氣山嵐瘴氣及產後惡血攻心童便
入姜汁化服 產後惡血攻心
此方方下云述ル如シ寒於相変ル閔疟二用之其外他病二用ル
例諸書ニ出ス今尽ク不知覚
他日詳ニ考ヘ副書スベシ
蘇合香圓 九十八 醫通 治傳屍殗殜心腹卒痛僵仆不省一切氣閉虜
證 蘇合香別研白色者 安息香無灰酒熬飛去 薰陸香別研 砂土各二兩
龍腦別研 丁香 麝香別研勿經火各一兩 青木香 白朮
沉香別研極細 香附炒 烏犀角鎊屑研極細
右十一味為末逐一配勻諒加煉白蜜和劑久作五十丸別以硃砂一兩水飛為衣
蠟護臨用剖開井花水生薑湯溫酒化下一丸原方有白檀香草
太濇燥故去之○蘇合香圓取諸香以開寒閉僵用犀角為寒因寒用之鄉導與至寶丹中用龍腦桂心無異李士材曰
牛黃圓蘇合香圓皆中風門中奪門之將而功用迥異孰阻関竅
用牛黃圓開之寒阻関竅用蘇合香圓開之若夫口開手撒眼合
聲鼾自汗遺尿等虛脫證急用參附峻補庶或可救若用牛黃蘇

合之某入口即斃（タフル）也（ス）

此ニ載ル所ハ張碩頑加減ノ方ナリ然レ𪜈此方ハ不限ニ中風ニ他病ニ用ユ多シ局方ノ原方ニ從テ可ナリ卒中寒閉ノ症ニ用ル方ナリ丹溪纂要云中氣身冷渴メ無痰涎者許學士以此丸灌（ソヽ）之又戴元禮云能治風者利ス氣氣順則痰自消（ス）先以麻油調此丸用（ヒ）之或薑汁或小續命湯ノ煎湯ニテ用之或五積散加麝香少許以用ニ此丸小青囊云此丸合清州白丸子服之然レハ中風中氣俱ニ用ニ此丸之例從テ先輩有之元來痰痰甚者用之則即時ニ害アルベシ急ナル場ニテ見分ニクキコトナレ𪜈隨分意ヲツケ見分ベシ先ツ木抵面色赤息麁ノ手足ヲ握リ搐搦ノ氣味アリテ痰涎ツヨキハ痰痰ト知ベシ其外臨時色々ノ目當アリ中氣ナレバ脉ハ勁急ナルモノナレバ中風ノ寒鞕ハ脉牛ニテハ知ヌモノナリ

此方他病活用例

破傷風　破傷風角弓反張ニ六防風散ニテ下之防風散ニ蒼朮独活麻黄半夏各一両名同防風散　同　破傷風ハ因皮肉曽有破傷處風從毫口入其ハ証項強牙關緊狀如發痙不似中風又似産後角弓反張用藁合香圓進防風　暑　傷暑自汗手足厥冷不知人冷散玉眞圓　暑　冷者六和湯下之　同　中暑為証面垢悶倒昏不知人冷或滿切不可以冷水及用十分冷剤以來復丹末同藁合香圓用湯調灌　同　瀉渴兼作未汗自出手足微冷或吐或瀉或喘透者宜上法　霍乱　六和湯倍藿香調下之　泄瀉　泄瀉腹痛有積或無積　積聚　氣作痛心腹ノ間ニ遊走ル或雷鳴ル或已成積或未成聚者五苓散加木香下之

中風

以全蝎四枚為末酒調下此圓 吐血因跌撲損傷吐血者黑神散合小烏沉湯加童便送下此圓 瘀血入腹吐血者亦宜此法医通三八小烏沉湯計三千此圓一ワリ 脚氣脚氣攻心痛三八此圓 腸嘔腸嘔二八此圓合青州白丸子加革麻子足心張ル 小兒吐此圓合驚風瀉黃疸平胃散驚風小兒急疾因氣弊驚風搐掣大便不通此者薄荷煎湯入姜汁一下此丸閉圓加巴豆妙

中風

治中風不語舌不能言九十九 清遠志甘草水泡不去骨 不拘多少為末鷄摘要 如二方下ノ

清調散天突咽喉煎愈三處効

加味豆淋酒百 摘要 治一切中風中氣中濕手足攣痛及産後血黑豆 擇大者一升炒香 當歸 川芎

蒼朮 紅花 牛膝 薏苡仁 羌活 防風

姜蚕各八錢

右麁切與黑豆同入瓶內無灰酒二升拌浸封固置于密室春夏五日秋冬七日取出去滓每服一小鍾自然有功効○愚按此方先師家傳之方也若人腰膝疼痛産婦血弱攣痛等亦用之而穩當

如二方下ノ

羚羊角散百一 治妊娠眉間角弓反張名曰子癇風痙

羚羊角鎖獨活 酸棗仁炒五加皮 薏苡仁炒 防風

當歸酒浸 川芎 茯苓 杏仁各五分 木香 甘草炙各二分

右姜水煎服　主治如方下子癇ノ症下編ニ詳ナリ

葛根湯　百二治妊娠臨月因發風痙悶憒不識人吐逆眩倒小醒復發名曰子癇

葛根　貝母　牡丹皮　木防己
當歸　川芎　桂心　澤瀉　甘草各一兩
獨活　石膏　人參各三兩

右細切以水九升煮取三升分三服日再令入易産若未臨産者以升麻代之忌海藻菘菜醋物

除濕蠲痙湯　百三回　治風濕相搏身體煩疼手足冷四肢沉重

當歸　赤芍藥　黃耆　甘草一錢　生姜三片　紅棗二枚　蠶一有　防風　水煎熱服無時

片子薑黃　羌活各錢半

此方着痙ヲ治ス着痙ハ痲木不仁ス営氣虛スル片ハ不仁ニシテ衛氣虛スル片ハ不仁ニシテ衛著ハ補営衛羌活ハ去風濕薑黃ハ入手臂止痛方下ノ主治ト猶考ヘ合メ用ベシ痙病ノ補薬ナリ

此方他病活用例

臂痛或腫或不腫者痰飲ニ因ル證ノ外ハ一切ノ臂痛宜此湯若シ寒邪ニハ宜五積散

羌活湯 百四 治痛風症 羌活 蒼朮 黄芩 當歸 芎藥 茯苓 半夏 香附 木香 別研 陳皮 各七分 甘草 三分

右剉一劑姜三片水煎服○風痛加防風 本 症○濕痛倍蒼朮 同 ○鬱痰痛倍酒黄芩加瓜蔞枳實竹瀝 同 ○血虚痛加生地 同 ○上痛加白芷藏霊仙 同 ○下痛加黄栢牛膝 同 ○痛甚加乳香 同 ○發熱加柴胡 同 ○小水短澁加木通 同 ○手臂痛加薄桂 手臂痛 ○大抵骨節疼痛加寒熱發腫塊者是濕痰流注經絡與痛風同治法若醫遲不散則成膿矣外用敷薬 痰飲 ○一切痛風肢節痛者痛

爲火腫屬濕不可食肉肉屬陽火能助火食則下有遺溺内有痞塊雖油炒熱物魚麵切宜戒之所以富梁之人多食煎炒炙煿酒肉熱物蓄臓腑所以患痛風悪毒難疽者最多肥人多是濕痰瘦人多痰火遍身壯熱骨節疼痛者是風寒也 一切痛風

此湯痺症初發ニ宜シ痺症ハ風寒濕ノ三氣ノ雜合スル症ト云ヘドモ其中ニ此湯ハ風濕熱ニ宜シ加減ヲ考ヘ用テ殊外能効アル薬ナリ方後一切痛風肢節一ト云ノ一條此薬ヲ用ル目的ナリ此薬初起ル症ニ用ル薬ト云ヘドモ元來此湯ヲ用ベキ症ニイロ〳〵ノ薬ヲ用テ愈タルナリ子ル九三四十日ニモ及タルニ此方ヲ用テ愈タルナリ子ル九ハ諸病ニアリカラズケ様ノ子ハ諸病ニアリ

アニリ深ク念ヲ入レ過テ療治メイヨク重クナリ又ル症ニ老医ガ輕キ某ニテサラリト愈ルアリ此傳ヲ受タルモノサイ〳〵アルコト意得テ病ノ輕重虛實ヲ不論イツモ輕キ某ヲ用テ療治スルモノアリ甚ダ笑ベシサリナガラ此様ナ事モアリト兼知ベシ

此方他病活用例

眼ニアリ意得ヘシ

此方眼病ニ用ル

靈仙除痛飲　百五十四　治肢節腫痛、屬火腫、屬濕兼受風寒而發動於經絡之中濕熱流注於肢節之間而無已也

麻黃　赤芍各一錢　防風　荊芥　羌活　獨活

白芷　蒼朮　蔵靈仙　片黃芩　枳實　桔梗　葛根　川芎各五分　歸尾　升麻　甘草各三分

右剉一劑水煎服○在下焦加酒炒黃柏○婦人加紅花○腫甚加攢撚大腹皮澤瀉沒某○一云瘀血宜桃仁紅花苦皮及酒大黃微利之

此方痛風肢節ノ痛ヲ目當トスヘシ

通痺散　百六十四　醫通　治風寒濕三氣襲於足三陰經腰以下至足冷如冰不能自擧

天麻三両　獨活　蘗本　當皈　川芎　白朮各二両

為散每服二三錢熱酒調服各一服○右方用川烏一兩酒煎製天麻中蒼朮一兩黃檗生兩酒煎製白朮中深得三氣襲於陰經之旨○此方如方下腰ヶ強ク冷テ腰ヌケニナリタル病ヲ治スル也酒煎少

天麻汁二烏頭一兩ヲ浸ス酒煎ノ白朮ノ汁ニ蒼朮二兩黃柏半兩ヲ浸シ用ユヘシ

三痺湯百七　醫通　治風寒濕氣合病氣血凝滯手足拘攣

人參　黃耆炙　白朮　當皈　川芎　白芍　茯苓各一錢

甘草炙　桂心　防己　防風　烏頭炮各五分

細辛三分　生姜三片　紅棗二枚

右水煎不拘時熱服○此方改定三痺湯　合保元湯四君湯内補建中湯方已黃耆湯　防己茯苓湯千金防己湯等方但加防風以搜探同シ氣分之風川芎以搜血分之風細辛以搜骨髓之風於原方中古方三痺湯削去生地牛膝杜仲續斷秦艽獨活增入防己白朮烏頭以祛除風濕目參附湯　蒼附湯　木附湯　桂附湯　真武湯等法俱在其中彼參附者附湯等ヲ指ス　用附子之雄壯以播真陽此藉烏頭之烈以祛痺著痺著ハ痺ノ雜合スルヲ云ヘリ　蓋雜合之氣風寒濕ノ三氣雜合スルナリ須雜合之方方為合

劑第恐古方ノ三痺湯ノ 地黄牛膝輩陰柔之菜難振汎捕早ク之感是
不得不稍爲裁酌ヤヽサレトキ用方著毋以擅改成方爲妄也
後ノ方ヲ用ル者ハヽカリナリ成就シタル菜
方ヲ改メテメツタナコヲスルナト云コトナリ

此方古方ノ三痺湯ヲ改定ノ三痺湯トスタレ人ガ改メ
ラレタヤラ知レヌ大方張碩頑ノ定メラレタルモノト思フ此
方ヲ用ル目當方下ノ如シ手足拘攣スルモノニ用ルト云目當也

此方他病活用例

腰痛 風濕ニ因テ脚ニツヾイテ冷ヘ痛ムニ此湯主之

加減除濕湯 百八治中風右半身不遂手足攣痺及筋骨疼痛

人參去芦 川芎 桔梗 防風各八分 白茯苓去皮
當皈酒洗 赤芍 陳皮去白 半夏薑製 蒼朮米泔制
烏薬 枳殻麩炒 黄連酒炒 羌活各一錢
白朮去蘆一錢二分 白芷九分
甘草五分

右剉一劑生姜三片水煎溫服本症 身痛加姜黄本症 ○脚痛加牛膝
防己蔵霊仙

此方回春右半身不遂中風ニ用ル方ナリ然ル ニ其菜緊雑ニメ
不純中風ハ重病ナリ此等ノ菜ヲ以テ其効難取只痛風ノブラク
シタル症ニ用ベシ故ニ此書ニハ痺門ニ摂入スルナリ其方ヲ

考ルニ人參白朮茯苓陳皮半夏甘草八六君子湯ナリ當皈芍茶川芎四物湯ノ三ナリ蒼朮ハ除湿ノ專藥ナリ古除湿十名クルハ湿痰風熱ヲ去ルヲ主トスルナリ故ニ黄連黄芩羌活防風アリ桔梗烏茎枳殻ハ利肺順氣下痰此陰氣不虧陽氣充實ノ者用之

加減潤燥湯 百九回

治中風左半身不遂手足攣癪及語言謇分 手間ノ入ルヿ

呵欠噴嚏面目口眼喎斜寛弛ユルヿ也頭目眩暈痰火熾盛筋骨疼痛頭或痛心悸

當皈一錢二分　川芎　白朮去芦　白芍令去皮　南星姜汁炒

半夏姜汁炒　天麻各一錢　白芍酒炒二錢　陳皮塩水洗　生地黄酒炒

熟地黄姜汁炒　酸棗仁炒　黄芩酒炒　牛膝去芦酒洗各八分

薄桂　桃仁去皮　羌活　紅花酒洗　甘草炙各四分　防風各六分　黄柏去皮酒炒三分

右剉一剤水煎入竹瀝姜汁少許温服本忘手不遂倍黄芩薄桂共二手ノ臂本ニ入ル忘足不遂倍黄柏牛膝ヲ

此モ亦中風ノ茶ト云ヘ圧此書痺門ニ摂入ス夫左半身不遂為血虚右半身不遂為氣虚此ハ丹溪杜撰ノ段先輩此ヲ辨ズル今更云ニ及バズ左右ノ別無ク血虚痰血痰火盛ナル二因テ痺痛トナリ方下ノ諸症ヲ見スモノ宜用之

疎經活血湯 百十回 治遍身走痛如剌左足痛尤甚左屬血多因酒色損傷筋絡虛而被風寒濕熱感於內熱包於寒則痛傷筋絡是以晝輕夜重宜以疎經活血行濕此非白虎歷節風也

當歸酒洗一錢二分　白芍酒炒一錢　生地黃酒洗　蒼朮米泔浸
牛膝去芦酒洗　陳皮去白　桃仁去皮尖炒　藏霊仙酒洗各一錢
川芎　漢防己酒洗　防風去芦　白芷各六分　龍胆草酒洗八分
茯苓去皮七分　甘草四分

右剉一劑生姜三片水煎空心温服忌生冷濕物本有痰加南星半夏各一錢本痰如上身及臂痛加薄桂三分本痰如下身并足痠加木瓜木通塩炒黃柏薏苡炒各二錢本痰如氣虛加人參白朮龜板各七分本痰如血虛倍四物湯以薑汁酒浸炒用紅花一錢

此方回春痛風門ノ菜主治方下ノ如シ

右回春ノ三方雜駁不純ト云ヘドモ惣ノ回春ノ方ハ此二不限諸痛ヲ兼子合メ目當ナキニ似タリサレドモ異朝ニ時行ル書物ト見ヘテ袖珍本ノ唐本アリ類版多シ袖珍ノ方ノ出來スル書物ハ時行書物テ無シハナイ本邦ノ老医モ此書ヲ用井來リテ稱之尚矣其子細三ツアリ先ツ病ト云モノガ重キ痛ハ少メ輕キ痛ハタダシ專病ハ少メ兼病ハ多シ故ニ雜合ノ菜ハ其効不純ト

云ヘヒ其害モ亦不急此其一也眞眼ノ医者其目當ヲ知ルハ少ノ庸流ノ輩キ、モアタリモせヌ茶ヲ用テ病自ラ愈ルヲ待ツ此其二ナリ如是雜合ノ劑ヲ建立スルコハ襲廷賢カ得物十リ得物ト云モノハ推量ノ外ニ應スルモノナリ回春ノ方思ノ外埒ノ明ヌ茶ノ様ナレヒ推量ヨリ効アルモノナリ此其三ナリ

大防風湯百十局　祛風順氣活血脉壯筋骨除寒濕逐冷氣又治患痢後脚痛痿弱不能行履名曰痢風或兩膝腫大痛髀脛枯瘠但存皮骨抱攣踡臥不能屈伸名鶴膝風服之氣血流暢肌肉漸生自然行履如故

羌活一兩　人參一兩　川芎一兩半
附子一兩半　防風二兩
白芍藥二兩　甘草炙一兩
牛膝一兩　川當歸二兩　黃耆二兩
熟乾地黃二兩　白朮二兩
右為麤末每服五錢水一盞半入姜錢七片大棗一枚同煎八分去滓温服空心食前

此方主治方下ニ詳ナリ詳ニ考ベシ○虞天民曰此方用歸芍為養熟地而補血用參耆白朮甘草以補氣用羌活防風散風濕以利關節用牛膝杜仲以補腰膝用附以行參耆之氣而走周身脉絡蓋治氣血兩虛扶風濕以成痿癖不能行者之聖藥也觀其治痢後風

可知也然可以治不足之痿弱而不可以治有餘之風痺也

此方他病活用例

中風 左右手足皆攣痿ス ル二此湯二加木香烏藥木瓜獨活薏苡仁肉桂名加味防風湯

鶴膝 漸後感寒濕脚膝腫痛ス ルヲ此湯二加防已蕁薢名二防飲

獨活寄生湯 千金 百十二 夫腰背痛者皆由腎氣虛弱臥冷濕地當風得之不時速治喜流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼重或腰痛攣脚是痺證急服此方

獨活三兩 寄生 古今錄驗 用続斷 杜仲 牛膝 細辛 秦艽 茯苓 桂心 防風 芎藭 當歸 乾地黃 人參 甘草 各二兩

右十五味㕮咀以水一斗煮取三升分三服溫身勿冷風虛下利者除乾地黃服復取葫蔥葉火燈厚安席上及熱眠上冷復燎之冬月取根春取莖熬臥之佳其餘藥對不及葫蔥葉熬為愈也諸虛風濕亦用此法新產竟或患腹痛不得轉動及腰脚攣痛不得屈伸痺弱者宜服此湯除風消血腑無寄生人參甘草當飯

此案方下二云如ク素リ腎虛スル人風濕ニ中リテ偏枯冷痺ヲ

病ム モノヲ治スヿ千金方ニ出テ奇驗ノ古方ナリ桑寄生眞物難得統斷二代ヘ用ベシ○白虎歷節風ハ痛風ノ劇キモノナリ虛ニ屬スルモノ此湯主之

此方他病活用例

腰痛 腎虛重子ヲ風濕ニ感胃シ腰痛スルモノ此湯主之 同 天陰ニ遇フ片ハ腰痛シ或ハ久坐ノ痛ム ハ濕也此湯主之

脚気 足三陰風濕ニ犯サレ脚膝痛ミヲナスモノ此湯主之 中風 此方中風癱瘓ニ用ユルコトアリ考ヘ用ベシ

清濕化痰湯 百十三回

治周身四肢骨節走注疼痛牽引胸背亦作寒熱喘咳煩悶或作腫塊痛難轉側或四肢麻痺不仁或背心一點如氷冷皺滑乃是濕痰流注經絡關節不利故也

南星去皮 半夏薑製 陳皮 茯苓去皮 蒼朮米泔浸 羌活

片芩酒炒 白芷 白芥子各一錢 甘草三分 木香五分別研

右剉一劑入竹瀝薑汁同服 本忘 骨體痛甚及有腫塊作痛者名曰痰塊加乳香沒藥海蛤粉硝 頭痛 頭項痛濕痰ニ因テ加川芎藏ヲ仙頭項痛ムハ加 手臂痛 手臂痛加薄桂諸藥ヲ引テ手臂ニ至 引南星等藥至痛所ニ足 脚痛加牛膝黃柏防己龍膽草木瓜

此ハ濕痰ニ因テ痛風樣ナル症ヲ患ルヲ治スル方下ノ主治極メテ詳也宜考用ユ

犀角散 百十四
犀角 銚二 兩
升麻 五味並姜汁拌炒 各四兩
右九味為末每服五錢水煎食後熱服

羚羊角散 百十五
羚羊角 銚二 兩
肉桂 世本作薄桂誤 附子 炮各半兩 白芍 一兩五錢
治熱毒流入四肢歷節腫痛
羚羊角 銚一 兩 前胡 黃芩 梔子仁 大黃 各四兩 豉一升
右為散每服四五錢入生姜三片水煎食遠服

此方脈痺ヲ治ス脈痺ハ即熱痺ナリ藏府熱ヲ移シ其上ニ外邪經絡ニ留テ不行方下ノ如クノ症ヲ患ル処必熱ス或皮膚鼠走樣ニ思ハル、唇ソリカヘリ裂皮膚赤色此方主之

羚羊角散 百十五
羚羊角 銚二 兩
治筋痺肢節束痛
獨活 防風 各七錢半 川芎 一兩 當皈 一兩五錢
右為散每服四五錢入生姜三片水煎食遠服

主治方下ノ如シ束痛ハシメヨセル樣ニ痛ムヲ右羚羊角散羚羊角散ノ二方方意主治未審他日宜考只方下ノ語ニ從テ考ヘ合シテ用ル片ハ雖無疑方意ニ於テハトクト難會得羚羊角散ハ温菜ト云ニ及ズ知レタコトナリ

麻黃復煎湯 百十六 蘭室秘藏
麻黃 去節 二錢
右用水三盞先煎令沸去上沫至二盞入下項藥

治風濕倦怠常汗微出

黃耆二錢　白朮　人參各半錢　柴胡　防風　羌活　黃栢蜜炙汁妙褐色
生地黃各一錢　甘草生二分炙三分　杏仁五箇去二

右十味入麻黃湯中煎至一盞臥時半饑熱服不可飽服後微汗為度不可過汗若汗過則過世ハ熱不止而煩擾不寧也梔子豉湯解之此方蘭室秘藏腰痛門ニ出ルト云ヘドモ一身尽ク痛ムノ某ナレバ痺門ニ入レル也本書ニ方意詳ナリ然レドモ東垣ノ語ハ含蓄多クシテ未熟ノ医ハ卒ニ通暁難成故ニ医通東垣ノ意ヲ酌テ身体痛ニ摸入スル方ノ分料本書ト少シク異ナリ今医通ニ從フ凡人外風濕ニアタリ風濕相搏テ一身尽ク痛ミ陰室ノ中汗出言語モノウク四支困倦無力痛ミ走注レ下焦ニ伏火有テ不得泄燥熱微汗出テ熱不解モノ此方主之謙云此方ハ内傷労倦風濕ヲ兼テ一身尽ク痛ムモノニハ補中益気湯ニ加羌活防風蒼朮用ル症ト此方ヲ用ル症ト大抵相同シヤハリ益氣湯ニ右ノ加味ニテ可用モノナルニ此方ヲ用ルハドコノ違ト云ヘバ常ニ汗出ルト燥熱アルガ違ナリ然ルニ益気湯ノ症モ自汗出ルモノ熱モアルモノニギラハシケレモ此方ノ症ハ下焦ニ尠伏ノ火ガ有ル故ソレガ泄ルヽコガナラヌユヘ浮デ燥熱トナレバ益気湯ニ加味ノ症ノ發熱トハ違ノナリ常ニ微汗出ルト云ハ内傷ノ自汗ト違ヒ脈モ異ナルゾソレデ麻黃ヲ主ニ用ヒ先ツ先キハ一味煎ノ後惣茉ヲ入レテニ復前湯ト云ナリ此ニ度ニ煎スルガ此方ノ肝要ト意得ベシ麻黃発汗ノ漸々ニ火鬱ヲ解ス黃栢生地黃ヲ用テ下焦ノ伏火ヲ除ク麻黃

防已黄耆湯 百十七 金匱 治風濕相搏骨節疼痛腰以下爲重
脉浮自汗惡風

防已 酒洗 黄耆 各三錢半
大棗 二枚 擘

右六味水煎服後當如虫行皮中腰已下如冰後坐被上又以
一被遶腰下腰ヨリ下ヲ衣服蒲團類ニテツヽミヲハス也 温令微汗差○喘加麻黄杏
氣不和加芍薬気上衝加桂枝下有陳氣加細辛陳氣久積之寒気也

此茅方下ノ圏点ヲ目當ニ用レバ無疑症也○此方防已ハ滲利湿熱ヲ去ル峻茅ナリ黄耆ハ行表自汗惡風ヲ除ク白朮健脾去湿蓋シ防已ノ寒茅アリト云ヘ尤黄耆白朮甘草甘温ノ上品也更ニ生姜大棗アリ寒剤ノ恐レ有ベカラズ○方後ノ加減此方ノ的症ニテ兼ル処有ル片ハ此加減ヲ用ベシ麻黄ハ除喘ノ專茅ナリ胃氣不和加芍薬トハ芍薬白朮ト同用スレバ脾胃ヲ和スルモノナリ気上衝加桂枝トハ水氣衝上スルヲ桂枝ヲ用テ腎邪ヲ伐ツタトヘバ傷寒論奔豚トナラントスル症ニ桂枝加桂湯ヲ用ル意ナリ細辛ハ辛熱ノ菜久積ノ寒気ヲ去ナリ

寒

四逆湯 百十八
寒

甘草二兩炙　乾姜一兩半　附子一枚生去皮破八片

右三味咬咀以水三升煮取一升二合去滓分温再服強人性強キ者可ヨイク大附子一枚干姜三兩

續論曰此湯少陰ノ主方トイヘ𪜈畢竟三陰通治ニ陰脉沉思寒手足逆冷之證故取附子之生者上行頭項生附子ナ外徹肌表以温經散寒乾姜亦用生者以内温藏府ニレバナリ炮姜モ亦藏府ヲ温ムル此ニ乾生姜ヲワケテコフ云ハ不審甘草獨用炙者以外温營衛内

補中焦也其云強人可大附子此デハ常ノ分両ヨリ附子干姜ナレバ茶勢ガスルドナリフレデ強人ニ用ル也一枚乾姜三兩者則知平常之人附子不必全用也本方附子一枚トイヘ𪜈常ニハ減シテ一枚ニデハ用ヌト見ユル況宋以前人不善栽培重半兩者即少大者極是難得珠以前ハ附子ノ栽培ヒヤウガ下手デ一枚ノ重サ五錢目アルモノ希ナリ大キナル附子ハ難得所以仲景仲景ノ時ハ附子小ナリ有一方中用二三枚者非若近時附子大ニメ一枚ノ重サ十錢目ノ餘アリ西附所ノ名之多重一兩外也然川中ニ地名ナリ此所ヨリ産ル附子ハ小ナリ所産求一兩者亦不易得近世畢竟仲景ノ時ノ一枚ハ用二三枚錢一劑即與仲景時二三

枚分三劑相等耳○此湯與麻黄附子細辛湯之用麻黄發散經絡之寒邪熟附温補少陰之眞陽細辛發越腎肝之陽氣似異而意實同異ナルヤウデモ畢竟同意ト云フ蓋彼以麻黄治表邪附子温裏虚細辛通其陰經之邪此以附子治表邪干姜温裏虚甘草和其胃中之陽嗣眞趙嗣眞所謂生附配干姜ト云人

黄同用發中麻黄有補熟附子是也

此方ノ正面ハ少陰直中ニ用ル薬ナリフレ少陰ノ証ハ色々アリ此外ニモ有トイヘドモ何ニモセヨ少陰ノ証ノ通レヌ目アテハ本論云為少陰之病脉微細但欲寐也云云此一句カ少陰經ノ惣躰ヘアヅカル直中ノ寒症ニモセヨ表症ニモセヨ未傳寒中ニモセヨ脉カ微細ニテ但欲寐ナリサレドトツクリト寐入ルコハナラヌモノゾ少陰ノ症ナレハ必ス此症ヲ見ハス此症カ無レバ少陰ノ症デハ無キト知ルヘシ又本論云少陰病脉沉者急ニ温之宜四逆湯云是レガ四逆湯ヲ用ユベキ症ナリトイヘドモ但欲寐脉沉也トバカリニテハ分カラヌ右云通リ少陰ノ症ハ傳經直中ドチラニ此脉此症アリ是レヲ直中ト見キハメテ此薬ヲ用ル目アテハ先キニ表症ヲ見ハレ後五六日ヲ經テ脉愛ノ沉細數ニナリロ中燥テ不得臥者ハ

リ少陰ノ表証アリ又傳經ノ熱証カ後ニ變ノ未傳寒中トナルアリ此外ニモ有トイヘドモ何ニモセヨ少陰ノ証ノ通レヌ目アテハ本論云為少陰之病脉微細但欲寐也云云此一句カ少陰經ノ惣躰ヘアヅカル直中ノ寒症ニモセヨ表症ニモセヨ未傳寒中ニモセヨ脉カ微細ニテ但欲寐ナリサレドトツクリト寐入ルコハナラヌモノゾ少陰ノ症ナレハ必ス此症ヲ見ハス此症カ無レバ少陰ノ症デハ無キト知ルヘシ又本論云少陰病脉沉者急ニ温之宜四逆湯云是レガ四逆湯ヲ用ユベキ症ナリトイヘドモ但欲寐脉沉也トバカリニテハ分カラヌ右云通リ少陰ノ症ハ傳經直中ドチラニ此脉此症アリ是レヲ直中ト見キハメテ此薬ヲ用ル目アテハ先キニ表症ヲ見ハレ後五六日ヲ經テ脉愛ノ沉細數ニナリロ中燥テ不得臥者ハ

傷經ノ熱症ナリ可用承気湯此湯ハ不可用始ノ病ミツキヨリ脉細ニメロ中ノ燥キモ無ク但欲漱ハ直中ノ寒症ナリ此湯主之○此方ノ分量仲景ノ時ト八附子一枚ノ重ガ違フニヨツテ分量シカト難定シ医通ノ祖方ヲ按ズルニ生附子一枚乾姜五銭甘草六銭ト有リ謙云附子一枚ト云ハ今案肆ニ云三十掛ノ附子一枚五銭目ホドアル附子ナリ大附子一枚ト云ハ十掛ノ附子一枚十五六銭目アルモノナリ此合點ニテ分量ヲ意得ヨ

此方本證主用例

○厥陰純陰無陽ノ症太汗出テ熱不去内拘急シ四肢痛三或ハ其上ニ泄瀉厥逆悪寒ナド加ヘアルニハ急ニ用テ可回陽○同症吐利發熱悪寒四肢拘急手足厥冷スルニハ此湯ヲ用テ温之○同症スデニ吐シ又清穀ヲ下利シ大ニ汗出内寒外熱シ脉微欲絶ハ不可發汗若發汗スレハ陽気愈虚シ血依テ飯スル処ナクテ吐血シ氣欲絶者ナリ手足厥冷シクタビレ欲寐スルニハ此湯ニアラザレハ温経回陽ヲナラザルナリ○太陽ノ症發熱頭痛スルハ大陽ノ類ナリ脉却テ沉ナルハ其人陽虚スルナリ此症ニ桂枝湯ノ類ノ鮮肌ノ薬ヲ用テ不愈身体疼痛スルハ陽虚陰盛ナリ此湯主之○陽明ノ症脉浮ニメ遅表熱シ裏寒ニ清穀ヲ下利スル者ハ此湯主之○自利不渇者ハ屬太陰其藏有寒ナリ當温之四逆理中ノ薬主之○少陰陰寒ノ諸症アツテ少腹痛ハ真陽ノ不足ナリ宜此湯或此湯ニ加肉桂○其人素ト有痞積テ痛ミ陰筋ヲ引ク者ハ四逆ニ加呉茱萸肉桂○病人自ラ云フ腹滿スト他人按之スレハ腹不滿是屬陰症此湯温之○臍上ニ有寒飲乾嘔スルニ

八此湯二加吳茱萸生姜○直中陰經之症咽喉口瘡痛不腫不潰或渴ノ不能飲ニ八此湯或ハ附子湯急ニ温之○白胎双灰色舌是レ冷食ヲ挾ムナリ七八日ノ後此ノ舌ヲ見ハス有津液者ハ理ニ此湯選用無津液者ハ不治乾キ厚ク見裏症者ハ用下剤○純灰色舌ハ挾冷食ナリ理中湯此湯撰ヒ用ユ○淡紫帯青者直中腎肝ノ陰症也吳茱萸湯四逆湯主之○脉沉自利四逆恐寒ヲ小便難キハ津液竭テ氣化不行然レ共黄赤疵痛せザルナリ此湯ニ合生脉散ヲ

此方雑病活用例

霍乱 吐瀉不止元気耗散病危篤水粒不入口燥喜冷或悪寒戦慄手足逆冷或発熱煩躁揭去衣被是内虚陰盛也理中湯或此湯加食鹽少許

黄疸 胸脇逆冷臍悶自利胸中氣促舌上胎滑脉沉細而緊是陰黄疸也此湯ニ加茵蔯有

痢 下痢身軀疼痛スル食ニハ更加枳實白朮陳皮半夏草豆蔻

温薬与之理中

厥 凡ソ厥症足指ノ裏ニヲコルハ陰厥ナリ表ニ湯四逆湯主之

厥 ヲコルハ陽厥ナリ悪寒手足冷ル者ハ寒厥ナリ此湯

翻胃 嘔メ脉弱ク小便モ亦利シ身有微熱テ見厥者ハ難治ナリ此湯主之

咽逆 若シ氣自臍衝キ上ホせ噫ノ間ニテ咽逆スル者ハ肝腎虚寒ノ至極ナリ其脉沉細此證不在胃在下焦附子理中湯ニ加枌萸姜汁重キ時ハ此湯ニ加

頂痛 躁ハ身躰躁擾或ハ裸躰不欲近衣或投井中為無丁香沉香

根之熱ナリ急ニ附子理中湯四逆湯姜附湯ノ熱薬与之

面 面戴陽ハ下虚ナリ傷寒ニ用ルヿ四逆湯雑病ニハ地黄飲子

労證 此方ヲ労症ニ用ルヿアリ陽虚ノ症ニ用ル

ハ其筈ノ一ナリ陰虚ノ症ノヤウニ見エテアナガチ陰虚トモ見エズ滋陰ノ薬ヲ用テ不應此湯ヲ用テ得驗アリ同シ一ナガラ附子理中湯ヲ用レバ大キニ悪シヽ甚仔細ハ理中湯ニハ白朮デ燥此湯ニハ無白朮附子乾姜甘草ニ味ノ内甘草ガイツチ大分入ル甘草ニテ附毒ヲウスクシ乾姜ノ辛ミモ消シイカフムツクリトナル甘草ニ補陰ノ能アリソレデ理中湯ナドヨリハ思ノ外効アル一アリサレドモ茱ノ味ガ甚甘キユヘ甘キ味ヲイヤガル病人ナラバ不可用甘草ヲ少ニテモ減シテハ此茱ノ思ヒ入レハヌケルゾ時ニ因テ此湯ノ本方ニ加味スルニハ有ルベシ甘草ヲ減スルニハナラヌゾ此思ヒ入レアヽリ唐ニモ云タニヲ見アタラズ病至極不重ルトキハ附子理中湯至極重キ片ハ四逆湯ト何レノ医書ニモ云テアレトモ此合点テ見レバ理中湯ト四逆湯トハイカフイキカタノチガフタ茱ト思ハルヽ巧者ニ談合シテ能々可考ナリ

医通云甘草得干姜之辛不滞干姜得甘草之甘不燥○傷寒下利清穀手足四逆其人面赤或腹痛或乾嘔或咽痛此湯倍干姜面赤者加葱一根腹痛加芍薬一銭半嘔加生姜咽痛加桔梗一銭○若四肢厥逆腹中痛泄利下重而咳四逆湯加北五味乾姜各半銭

四逆加人参湯百十九
寒

甘草二両 炙　乾姜一両 半　附子一枚 生　人参一両

右四味咬咀以水三升二合去滓分温再服

此方四逆湯ノ証而汗出テ厥シ脉微或下利或脉絕ノ復還ル是危篤ノ症ナリ加人參以保其津液且漸得之得力故ニ加人參為此湯或ハ誤テ汗シ戰慄スル症用之畢竟四逆湯ノ症ニメ元氣弱者ニハ加人參テ為此湯白虎湯ニ加人參テ白虎加人參湯ト云ト同意ナリ

此方雜病活用例

産後ノ咽逆ハ悪候ナリ灸氣門宜服此湯

咽逆

茯苓四逆湯百二十寒

茯苓六兩 人參一兩 甘草二兩炙 乾姜一兩半 附子一枚生

右五味以水五升煮取三升去滓温服七合日三服

此方ノ正面ハ太陽ノ症發汗或下之其病不解煩躁スルモノヽタメニ用ル薬ナリ四逆湯ニ人參二兩茯苓六兩用ユ煩ハ心煩スル意躁ハ腎躁フルナリ乾姜附子ハ入腎以除躁人參茯苓入心ニテ以解煩スルナリ茯苓ヲ三倍用ル意ハ茯苓ハ緩キ薬ニテ多ク用ヒテ解心煩原方ノ四逆湯ヨリハ薬ガ和カニシテ峻ニ無キ薬ナリ凡ソ無汗ノ煩躁スルニハ大青龍湯尤宜之有汗煩躁スルニハ此方ヲ合剤トス此發汗ト此方トノ別ナリ是極メテ肝心ノ意得也

通脈四逆湯百二十一
寒

甘草二両 炙 乾姜三両強人可四両 附子一枚 生

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服

此某ハ原方ノ四逆湯ニ加倍乾姜シタルモノナリ大ニ温其裏群陰拒陽脉微欲絶其人面赤或腹痛乾嘔咽痛或利シ脉不出危殆ノ症種々ヲ見ハス二倍乾姜ノ回陽脉出ル者ハ生ルナリ故ニ名通脉四逆湯○面色赤者ニハ去葱白加芍某ヲ用テ敛陰拒於上也故ニ加葱白ヲ通陽氣○腹中痛者ニハ去葱白加芍某二両謙云腹中痛ハ真陰ノ不足也故ニ加芍某ヲ敛陰ヲ○嘔スル者ニハ加生姜二両謙云生姜ハ嘔家ノ聖某ナリ○咽痛ニ去芍某加桔梗一両謙云桔梗利咽スルナリ○痢止ノ脉不出者ニハ去桔梗加人参二両謙云人参補元気也○此方四逆湯トサノミ遠ハナイ加減ノ方ヲ能可考但シ本方ニ此加減ヲ用テモ好シ時ニ臨テ活法ヲ用ベシ

此方本症主用例

○四逆湯ノ症ニメ小便自利スル者此方主之○陰寒ノ症ニメ發斑ヲ生スル者其症甚シキ者ニ可用此方ヲ

通脉四逆加猪膽汁湯百二十二
寒

甘草二両 炙 附子一枚 乾姜三両 猪膽汁半合

右四味以水三升先煮三物取一升二合去滓入膽汁分温再服

此方大抵前方ト同シ加豬胆汁ハ鄕導也陰盛ニメ拒陽ユヘニ豬胆汁苦寒ノ品ヲ加テ用寒因寒用之法ナリタトヘハ理中四逆ノ大熱剤冷服サスル法ト同事ナリ陰寒極レハ拒陽温茱ラウケ付ヌコトアリ其時ハ温茱ヲ冷レテ用レバ病ニサカラハヌホドニ一旦ウケテ其ノアトハ元來熱茱ナルホドニ病ニ應ズルナリ此湯ニ加豬胆汁モ此法ト同前ナリ

當皈四逆湯百二十三寒

當皈　三兩
桂枝　三兩
芍茱　三兩
通艸　二兩
大棗　二十五枚擘
細辛　二兩
甘草　二兩炙
酒洗

右七味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服○如レ素有寒ノ氣加呉茱萸倍姜ヲ寒甚ノ旨違未審　此加減與本

此方ハ意得ノアル方ナリ本論云手足厥寒脉細欲絶トイヘハ陰寒ノ症ノヤウニキコユレドモ又云手足厥寒脉細欲絶者主之手デナイ傳經ノ陽邪流テ厥陰宮血ノ分ニ入リナリ其人素ヨリ虚寒スルユヘ陽邪トイヘドモ熱ヲ発スルコトタハズフレデ脉細欲絶ナリ陰氣内ニ衰ヘ脉ヲ鼓動スルコトタハズ肌表ノ陽モ虚スルユヘニ用桂枝湯テ和其中外ヲ加當皈以和厥陰肝經之當血用通草通太陽之本太陽ノ本ハ膀胱ノ府小便ヲ通スルナリ細辛ヲ以テ少陽ノ源ヲ清ス畢竟厥陰ノ症傳經ノ熱邪ニテ手足厥冷レ陰寒ノ症ノヤウニ其人虚スルユヘニ不發熱却テ手足厥冷レ陰寒ノ症ノヤウニ見ユルナリ病ニ用ル茱ナリ元來陰寒ノ四逆ヲ治スル茱ニハ

アラズフレデ手足厥寒ストイヘドモ乾姜附子ヲバ不用ナリ其デ本論ニ云久寒アルモノニハ宜當皈四逆加呉茱萸生姜湯ト云云久寒トイヘバ本ヨリ寒邪ヲタクハヘテアル症ナレバ熱薬ヲ用ヲ子バ叶ハヌナリサレドモサレアタッテ病ガ傳経ノ熱症ナルホドニ乾姜附子ハ用ラレズ故ニ呉茱萸生姜ヲ加味シテ如此名ツクルナリ

此方本症主用例

○厥陰ノ症強テ劇シク下利シ腸鳴スルニハ此湯主之腸鳴ハ水飲停留スルナリ方中ニ通草アツテ水ヲ利スル也○火陰傳経ノ症其人元気素ヨリ虚シ汗下ノ劑大過ニノ末傳寒中トナリ虚寒ノ候ヲ見ハス者ニハ此湯主之○火陰ノ經症及八九日ニ一身尽ク熱スルノ火陰ノ症ハトカク厥冷レタガル熱ヲ得ルコハ難シ八九日ニ及テハ多ク厥寒ノ症ヲ見ハス然ルニ此症一身尽ク熱スルハ是在臓ノ邪氣府ニ轉ジテヨイ方ヘ向フナリ腎藏ノ熱ヲ膀胱ノ府ニ移スナリ膀胱熱ノタメニセメラレテ小便血ヲナスナリ用ニ此湯ヲ和之○宿食アルニ依テ汗ヲ禁ズヘキ症ニハ吐血スルコアリ炙甘草湯主之若シ厥冷ヲ兼ル子バ此湯主之○厥陰經症ノ頭痛項ヨリ頭角ニ引テ痛ミ脈沉弦細手足厥冷スル者ニハ此湯主之若シ厥陰裡症ノ頭痛ハ乾嘔涎沫ヲ吐スル呉茱萸湯主之○厥陰傳經ノ熱症舌紫キ囊縮ミル者ニハ大抵下劑ヲ用ユルナリ然ルニ脈實シ便秘スル者ニハ可用下劑若シ脈浮ニメ下利スル者ニハ此湯主之○舌色紫ニメ燥クハ厥陰傳経ノ熱症ナリ此湯主之

此方雜病活用例

腹痛 小腹痛傷寒傳經ノ症ヲ兼ルトキハ此湯主之實ニハ加呉茱萸九ノ小腹痛ハ傷寒ヲ兼ズトモ一切ノ小腹痛多クハ此湯ヲ頭痛 項背悪寒シ腦戸極メテ血刺血色瘀晦ナル主之ヲ頭痛 冷ヘ痛ニハ此湯主之 淋濁 九ノ症嚴寒ノ時節寒熱頭痛甚ク自汗ス是風寒ノ陰熱ナリ用此湯テ獲ッテ汗スレハ熱除クナリ

當皈四逆湯 百二十四 寶鑑

治厥疝腹脇下久寒結痛

當皈半錢 附子炮 肉桂 茴香 延胡 柴胡各一錢

芍茱 茯苓各八分 澤瀉 川楝肉各六分

右水煎空心稍涼服

此方疝氣ノ茱ナリ茱名前ト同キユヘ此ニ載スル厥疝ニ用ユル厥氣上ッテ心腹ヲ衝クヲ是肝經本ト有火邪寒氣外ヨリ内ノ火邪ヲ包テ尊スルユヘ脇下結痛スルナリ故ニ桂附茴香ノ熱薬ヲ用柴胡芍茱川楝肉ハ寒剤ナリ如此寒熱合用シ厥疝ニ用キハメテ効アル茱寶鑑ノ當皈四逆湯トテ名高キ薬ナリ

白通湯 百二十五 寒

葱白 四莖 乾姜一兩 附子一枚生

右三味以水三升煮取一升去滓分温再服

此湯四逆湯ニ去甘草倍干姜加葱白タルモノナリ四逆湯ノ症ニ比スレバ危急ノ候アリト見ユル故ニ去甘草甘草ハ葉勢ヲ緩クスル者ナリ加葱白通其陽ス此ルナリ

白通加豬膽汁湯百二十六
寒

葱白四莖　乾姜一両　附子一枚生　人尿五合　豬膽汁一合

已上三味以水三升煮取一升去滓内膽汁人尿和令相得分温再服

此方ハ前方ニ加豬膽汁モノナリ豬胆汁ハ鄉導ノタメナリ即通脉四逆加豬胆汁湯ト同意ナリ此湯ノ症前方ノ症ニ比スレバ益甚レ脉微利不止或厥逆無脉乾嘔メ煩ストイヘバ陰極ツテ拒陽ムコト甚レ故ニ鄉導ノ品ヲ用ユ服此湯レテ後脉暴ニ出ルハ却テ死ス脉ソロ〳〵イツトナク生スルハ不死ナリ

附子湯百二十七
寒

附子二枚生　人参二両　白朮四両　茯苓三両　芍薬三両

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服○或問附子湯与真武湯互換一味真武湯ハ此湯ニ無何人参レテ有生姜何真武湯主回陽

峻補耶蓋真武湯內生姜佐熟附不過取辛熱之勢以去散經中之水飲附子湯中人參助生附純用其溫補之力以恢大也復渙散之真陽且附子湯中參朮皆倍於真武其勺兩亦自不同所以主治迥異豈可比倒而觀乎

本論云少陰ノ病得之一二日口中和シ其背惡寒スル者ハ當灸之此方少陰直中ノ症其人素ヨリ表裏俱ニ虛シ寒邪中之トキ太陽經ノ表ニヲイテ一支ヘモスルコナラズ無キ人城郭ニ入ルガ如ク直ニ少陰ノ裏ニ入ル脈微欬ナレバ少陰ノ總ジ症ナレバ不言シテ知ルベシ口中和スルトハ不渴不燥也惡寒可知故始テ病ム一二日ノ中チ發關元灸ノ大溫補ノ義ヲ用ルハアハテタヤウナ療治ナレバコトノ外危急ノ症ニテ手メカリスルト取後レノ成リ難キ症ナリ急ノ症治准總謂ヘリ人身ノ陰陽陰者陽腹トス陽氣不足陰寒ノ氣盛ナレバ背為之惡寒又若シ風寒在表テ惡寒スル者ハ一身皆惡寒スルニ背惡寒スル者ハ陰寒ノ氣盛ナルコト可知シ但背惡寒スル者アリ是陽氣內ニ陷テ陰中ニ入ル表陽新ニ虛メ背惡寒スル者アリ是ヲハ熱症ナリ白虎加人參湯主之大溫補大寒ヲ用ルノ別是ヲ見ソコナヘハ生死在反掌其陰陽寒熱ヲ見分ケル肝要ハ口中カ潤ホフカ燥ク乾ト此二ツニテタメ也見ソコナヒハ無キモノ以此方先用附子ヲ回陽茯苓白朮人參甘草補陽加芍藥ヲ助陰偏勝ナカラシム謙云背惡寒スルニ令一ツヽキレモノカアル食滯ヲ兼タ感冒アナカヲ食滯ヲ不覺腹痛頭痛モ無ク食カ

吳茱萸湯 寒

吳茱萸 一升洗　人參 三兩　生姜 六兩切　大棗 十二枚擘

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合日三服

此方傷寒ニ用ル二三症アリ一者厥陰ノ症乾嘔吐涎沫頭痛者用之是ハ下焦ノ濁陰ノ気上胸中ヲ清陽ノ氣時々サランストスレ氏為濁氣ニ抑ラレテ升ルコナラス故ニ乾嘔吐涎沫スルナリ頭痛スルハ厥陰ノ脈ハ督脈ト巔ニ會ス此經ノ頭痛ナリ吳茱萸專ラ胸中濁氣ノ逆ヲ開キ人參生姜大棗胃中清陽ノ氣ヲ助ケ厥陰ノ逆氣ヲ除ケハ頭痛ハ自ラ愈ルナリ一者陽明經ノ症欲嘔食穀者此方主之是ハ寒濁ノ

スヽヽス腹少シツカヘタルヤウニテ背ハカリシロ〳〵寒キコトアリ是食滯ナリサレ氏モト方感冒ノコナレハ此症ナトヽハ格別ノ輕重大キニ違フタルモノナリ不換金正気散ナトニ消導ノ葉ヲ加テ用ユベシ謙又云纘論ステニ真武湯ト此湯ノ辨別アリ四逆湯ト此湯ト回陽ノ峻剤ニノ葉品大ニ異ナリ四逆湯ハ附子干姜ヲ主トシレ多ク用甘草以テ其方温潤和緩ナラシム此湯ハ多ク用白朮無甘草而逆湯ニ比スレハ和緩ノ意味少シトイヘ氏有人參芍葉テ亦一方不烈白朮ハ燥渇ノ者ニ忌トイヘ氏有芍葉和陰ニ方氏ニ互ニ相和スルヤウニケ三合スルトイヘ氏其ノ方ノ思ヒ入レハ格別ニ異ナリ此方雜病ニ用ユベシ若シ雜病ニ用ル片ニモ裡中湯四逆湯三方ノ意ヲ辨別シテ斟症テ可考用ナリ

高良姜湯 百二十九 千金

氣胃ニ鬱スルユヘナリ一ニ者必陰ノ痃吐利手足厥冷煩躁欲死者用之是ハ腎肝ノ陰氣上逆ノ為ニ危候此湯寒濁ノ逆氣ヲ下シ補脾土右三症各異ナリ皆用此方テ治之其ノ意ハ一ツナリ

此方雜病活用例

嘔吐 金匱要略云嘔ノ胸滿スル者此方主之 同 久寒胸膈逆滿シ不能食者此方主之 乾嘔 胃虛濁氣上逆ノ乾嘔スル者此方主之 苦嘔 太抵肝胆ノ氣逆スル片ハ苦ヲ嘔ス此湯主之謙云嘔苦ハ嘔スルト頭痛乾嘔吐涎沫知ルヘシ 頭痛 頭痛スル者此湯主之 痢 痢病發嘔逆吐蛕虫者四逆湯參附湯此湯主之

高良姜 厚朴姜製 當歸 桂心各二錢 生姜三片

右五味水煎温服若一服痛止不須更作○虛人加芍藥半夏甘草人參乾姜茵蔯黄芪

此茅寒症ノ心痛ニ用ユ心腹絞痛如刺兩脇脹滿スル者此方主之謙云心痛屬陰寒者ニ此方ノ温熱ヲ用ルノ勿論ノコトナリ其ウチニ良姜ハ心痛ヲ治メ有妙効故ニ君薬トスルナリ

桂枝附子湯 百三十 寒

桂枝 四兩 三枚炮去皮破八片 附子 甘草 二兩 炙 生姜 三兩 切

大棗十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去滓分温三服

此菜ハ風濕ニ用ル菜ナリ風濕ノ治方種々アリトイヘ𪜈此湯風證相搏身煩痛シ不能自轉側不嘔不渇脉浮虚ニメ濇スル者主之此症風濕トイヘ𪜈畢竟虚寒ノ症ナリ不嘔不渇ト云ヲ目當ニスベシ

此方他病活用例

傷寒汗多ク陽汗不止者宣此湯小便少キ者ニハ加茯苓白朮附子湯主之

同痓湯風咽痛脉却テ沉緊ナル者ハ是陽虚ノ陰氣上ニ乘スルナリ此湯或白朮

乾姜附子湯百三十一　寒

乾姜一兩　附子一枚生去皮破八片

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

此菜ハ傷寒太陽ノ痓誤下シテ後復タ発汗シ晝ハ煩躁メ不得眠夜ハ安靜ナリ不嘔不渇無表痓脉沉微無大熱者晝煩躁シテ夜靜ナルハ陰不病シテ陽病ムナリ謙云今時ハ此ノヤウナ誤治ハナイ若シ有ラバ可考用書躁ク夜靜ナルハ陽虚ト云目アテハ何レニシテモハツレハセヌトイヘ𪜈後世ニハ中寒ノ主方トスル故一中寒門ニ摂入ス中寒ノ方理中四逆アリトイヘ𪜈症ニヨリテ乾姜附子ノ外ハ人

參白朮ノ類モ邪魔ニナルコアリソレデ後世ニ八姜附湯ト称メ中寒ノ薬ースル其ノ用井ヤウ医門法律ニ詳ナリ中編ニ記○中寒漸ク身体廻暖稍能言語須更問其別有何證候氣攻刺此湯加木香半錢○挾氣不仁加防風一錢○筋脉牽急者加木瓜一錢○肢節疼痛加桂二錢

白朮附子湯 百三十二
寒

白朮 四兩　附子 三枚炮去皮破八片
大棗 十二枚擘
甘草 二兩炙　生姜 三兩切

右五味以水六升煮取二升去滓分温三服

此方寒濕ノ苦ナリ濕家ノ病一身尽ク痛三身色如薫黄者主之凡ソ濕ニ因テ發黄色者寒熱表裏ノ辨別アリ濕熱在裏者茵蔯蒿湯在表者梔子柏皮湯是レ用寒苓ル例ナリ寒濕在表ニハ麻黄加朮湯在裏此湯主之是レ用温薬例ナリ○寒濕ノ症誤リ下セバ額汗出ヅ額汗出ル八陽気逆スルナリサレ𪜈小便如常手足自温ナル者八陽気逆スルナリ𪜈陰氣暴脱ニ至ラズ雖危症用此湯救之○風温ノ症内不渇外不熱小便自利スルモノ此方主之

甘草附子湯 百三十三
寒

甘草 三兩炙　附子 二枚炮去皮破
白朮 二兩　桂枝 四兩

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服初服得微汗
則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者宜服六七合為妙○
風傷衛氣濕流關節風濕相搏邪亂經中故主周身骨節諸痛風
勝則衛氣不固汗出短氣惡風不欲去衣濕勝則水氣不行小便
不利或身微腫故用附子除濕溫經桂枝祛風和營白朮去濕實
衛甘草輔諸藥而成斂散之功也

此蒸風濕ニ用風ハ上ヨリ受ケ濕ハ下ヨリ受ク風濕相搏聚ル
ニ至テハ經絡關節骨体軀殼ノ間處トシテ流レ至ラザル無シ
レバ處トシテ無不痛此症汗出ル多ケレバ自ラ亾陽ス

亾陽スルユヘニ短気スルナリ濕勝フトキハ水氣ガ行ルホ
ドニ小便不利ナリ陽虛スルニ因テ惡風不欲去衣或ハ身微腫
スルコアリ陽虛ノ症ト知ルベシ此湯主之

理中圓及湯　百三十四
寒

人參　白朮　甘草　炙　乾姜　各三兩

右四味揚篩為末蜜和丸如雞子黃大以沸湯數合和一丸研碎
溫服之日三四夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以
四物依兩數切用水八升煎取三升去滓溫服一升日三服○若
臍上氣病築者腎氣動也去壅滯ニテ氣塞ルモノナリ朮加桂四兩吐是モ氣病多者

去朮加生姜三兩下多者還築噫アリト云ヘ用朮悸（停水）者加茯苓二兩渇欲得水者加朮足前ノ人参ト同用ス還テ用朮ナリ者（陰邪）加人参（補陽）足前レバ利水生津成四兩半腹中痛（陰邪）者去朮加附子一枚服湯（理中湯）ノ服法後如食頃飲熱粥一升許微自温勿発掲衣被

此湯冬月外感風寒内傷冷物尅湯停滞而不化嘔逆泄瀉脉沉細或伏スル者ハ屬太陰是霍乱之症也裏寒ユヘ二食滞不化用干姜ヲ温内散邪参朮甘草扶陽益気甘キ得辛不滞辛得甘テ不燥此方本ト外感寒邪内傷冷物為霍乱者設ノ後世活用ノ温補ノ

茶ノ總司トスルナリ厥逆西寒ニハ加茯附子附子理中湯ト名ク見于下○霍乱轉筋ニハ此湯ニ凍膠ヲ對ニ多リ加一錢必用云加火燒石膏

此方他病活用例

傷寒　大病愈後喜テ唾シ久ク不了々々胃上ニ有寒此湯主之　同　直中太陰ノ症胸膈滿手足冷臍上痛ニ下利清穀シテ不渇是内傷冷物致此症　同　傷寒誤テ下之始テ覚宜此湯甚則加附子　同　太陰經ノ症腹痛結胸之症急與此湯　同　無熱脉沉ナル者八宜此湯不驗用五苓散　同　太陽ノ病二三日不得卧心下結シ脉微弱ナルハ寒飲在胸中此湯主之　同　傷寒汗下ノ後小便難者ハ加厚朴茯苓不應ハ加附子　同　病愈後別スル者ハ此湯去白朮加生姜　同　無他症只

微熱未盡ル ハ其人脾氣久ク虛スルユヘナリ此湯加蜜毛
加葛 痢 蟲注毒痢血色如雞肝心煩腹痛スル者ハ
根 痢 茜根丸主之虛人ニハ此湯ニ加黃連烏梅 同 痢血色紫黯數服冷茶ニテ下スコト愈多
スル者ニハ此湯 同 痢血色紫黯數服冷茶ニテ下スコト愈多
ニ加丁香柿蒂 同 ハ此湯ニ去人參加肉桂木香肉豆蔻烏梅
泄瀉 素ト虛冷ノ泄瀉塡躁引飲轉々泄瀉スル者 傷酒 傷酒ニ因テ
ニハ參附湯或此湯ニ加黃連茯苓名連理湯 同 每朝泄瀉ス
ル者ハ此湯ニ加葛 同 寒瀉ハ惡寒身痛腹脹切痛雷鳴鴨溏生
根用酒煮黃連丸 同 冷丸穀不化四肢冷此湯ニ加茯苓厚朴
似痢非痢寒熱不調ノ症或ハ熱積內テ以冷茶冷物ヲ冷之或寒積
內以熱茶熱物ヲ溫之寒熱相搏或ハ濡リ或ハ溏シ重者急後重ス

ル者ハ香連丸或理 腹滿 腹滿時ニ減シ按之而不
中湯加黃連木香 痛者ハ虛ト ス此湯溫之 腹痛 內傷生冷
泄瀉者ニハ此湯 咳嗽 咳嗽呻熱湯テ斃止ム者ノ 嘔吐 汗下ノ後
ニ加麥芽砂仁 咳嗽 ハ冷嗽ナリ此湯加五味子 嘔吐 關上ノ脈
遲緩而吐者胃寒 同 寒吐ハ挾熱ヲ喜ヒ惡寒四肢冷脈細而 嘔吐
トス此湯主之 同 滑此湯加枳實或ニ陳湯加丁香乾姜 同 蚘厥
ヲナス者此湯炒川椒五粒梅
椒半錢ヲ加ヘ烏梅丸ヲ飲ム 噯氣 胃寒噯氣ハ此 呑酸 中氣虛弱
此湯加 湯加吳茱萸 呑酸者
吳茱萸 胃寒惡心ハ此湯 胃中虛寒津液ヲ約束スルノ
加陳皮半夏生姜 吐沫 不能故涎沫ヲ吐スルハ六君
子湯加益智生姜 嘔逆 雜病嘔ヲ發者多屬虛寒此湯
或此湯加益智 加枳殼茯苓半夏不應更加丁香 吐血 胃虛不
能食化

鴻巢館藏

其氣逆上ニ吐血衄又吐血者先用
血者此湯加木香衄血鼽血飲酒過多或熟食ニ傷ラレ衄血者先用
芽花湯衄血愈甚則此湯加葛根川芎
吐血內生冷ニ傷レ血乱者此湯加葛根川芎黃疸寒証ノ色黃而黯ヲ帶者此湯加茵蔯青皮枳実無汗者加麻黃痃氣久癥瘕ト
積如臂此湯ニ加阿膠口舌口瘡冷茶ヲ服ノ不愈者中焦ノ気不足虚火汎上無制此湯ヲ用ユ甚
者附子或ハ肉桂ヲ加フ婦人帶下ハ水ヲ燥脾ヲ健ニ産後帶下ス
コレヲス、リ又妙ナリ産後霍乱吐瀉煩渴四肢冷者加陳小兒
皮麥門冬厥冷加附子小兒咳嗽胃中虚寒吐蚘ニ痘瘡初起
吐泻內傷ニ因者ニハ此湯加烏梅黃連川椒咳嗽ハ此湯加五味子
此湯去人參加厚朴虚勞十有五歲熱甚朝発熱夕醒咽乾腹微
痛起則眩暈心腹痺滿不食脉弦細濡

ナルモノ兩手脉浮沉不一或左或右往來不定沉濡弱微弦五
此湯主之同一種ノ陰脉ノ狀有テ按之則全無力浮之則指下沉之
則亦損小皆陰脉ナリ先緩治而後急ニスベシ先緩スルニハ此
湯ニ加黃耆芍薬名黃耆湯若大便秘結者此湯加茯苓丸薬ト
ス後急ニスルニハ本丸ヲ用ユ
本丸ト八此方丸薬煎薬俱用ユ

附子理中湯百三十五傷寒

治下焦虚寒火不生土泄瀉嘔逆

理中湯加熟附子

按方中用參二錢僅可用附一錢若峻用温補用參一兩方可加
附三錢如尋常小劑用參一錢止可用附三分設不審此而附過

於咽下之後壯火食気反招陽澤之殃製劑不可不講此方治藏厥其人陽気素虚腎藏直陽衰極者用此症蛇厥ニ似タリ其辨別ハ唯膚冷テ躁ニ暫クモ無安時跌陽ノ脈ナキ時ハ藏厥也蛇厥ハ時ニ煩レ時ニ止是以可別藏厥ニハ用此方用灸法ソウレテモ厥逆不回者ハ死証也謙云仲景ノ方有理中湯無附子理中湯ノ名ハ不立ソレ理中湯ハ内外ノ邪ヲ理スル茅也理字ト補字トチガヒアリ理中湯本ヨリ温補ノ茅ナレ𪜈仲景ノ霍乱ニ用ラレタハ外風寒ノ邪内外ノ邪ヲ理スル為ニ建立レタル方ナリ理ハ治ト同ク内外ノ邪ヲ治スル合点ニテ指出テ補中ノ意ニテハナレ然𪜈茅ハ至極ノ補茅ナレバ後人用テ温補ノ物ト司トス後人加附子名附子理中湯何ニ用ル茅ト云ニ傷寒厥陰藏厥ノ証ニ仲景証ヲ云テ茅方ナレ藏厥ノ証ハ腎藏虚寒衰極ノ脾土ヲ不能生治方此方ニ不出故ニ後人用此方藏厥ノ主方トスル也然レバ理中湯ハ霍乱ノ茅附子理中湯ハ傷寒藏厥ノ茅立方ノ本意ハ各別ナリトイヘ𪜈今日用ルニ於テハ二方𪜈ニ温補茅附子理中湯ハ温補ノ重劑ナリ畢竟同方ニ落レ𪜈立方ノ本意ハ各別ノ茅ナリト意得テ居レハ用ルニ臨テハタラキガチガフ程ニ兼テ可知凡舌中黒ク遍リ白ノ滑表裏𪜈ニ虚寒脈必微弱証必寒ヲ恐ル宜此湯

此方雑病活用例

中寒　夏月中寒ハ大順散冷香飲子附子理中湯冷服又冬月ノ中寒ハ輕則附子理中湯甚則白通湯通脈四逆湯劇則霹靂散灸火焔散救之陰毒陰毒ノ証ニ有二仲景ノ所謂陰毒ハ邪熱中陽

經陽毒ト云中ニ陰經陰毒ト云倶ニ熱証ニメ皆用寒葉又後世ニ
太陰寒ノ證ヲ陰毒（ニ）ト此證ニ可用此方其証陰寒極甚ノ証却テ熱
証ヲ見シ脉モ至極數ニメ裸ニナリテ井中ニ入ト云上編ニ
記ス如シ茉ハ此方或附子散或人參三白散二合四逆湯
食滯久ク大便色白ク腸鳴切痛脉沉遲身（泄瀉）下痢清白腹痛
冷不渴小便清或綿々腹痛此湯加肉豆蔻（痢）不止此湯主之（同）痢病
嘔逆惡心如挑臍不（同）臭物ヲ下シ右関ノ脉沈細而緊厚朴木
香乾姜肉桂吳茱萸等ノ茉ヲ可用虚人ニハ此湯主之ナリ（同）痢
虚冷滑脫脉細皮寒少氣畏食不能言語（同）洞泄不止メ大劑ノ參
或時發虚熱此湯加肉桂肉豆蔻訶子（同）木ヲ服シ不應養藏湯
モ亦不應唯此湯赤石脂ノ（嘔吐）曾テ有人患嘔吐附子理中湯四
味ヲ調服ノ活ルモノアリ（嘔吐）逆湯ニ加丁子ヲ用ル二茉呼ニ至

テ吐ス後去乾姜唯參附ニ加丁子木香煎沉香ヲ磨シ入吐立処
ニ定ル是虚寒ト痰氣ト凝結ノ如此附子丁子大温佐ル二沉香
木香ヲ以通スルノ三乾（不食）若脾冷甚メ食不進者ハ宜
姜白朮ハ即泥ムノミ（理中）理中湯不効則此湯加砂仁（両風）寒
上逆則面不耐寒先此湯數貼ヲ用テ後升麻葛根湯（湿）
ニ去芍茉加人參黄耆附子益智草豆蔻白荳蔻白荳蔻
丁香理中湯百三　治冬月胃虚中寒不食而嘔吐者○即理中湯
十六
加丁香　○主治如方下寒吐ニ用

藿香安胃湯百三　治脾胃虚弱不進飲食嘔吐不ヲ待腐熟
十七
藿香一錢　丁香　人參各二
半　錢　橘紅五錢　每服二錢水二盞

生姜三片同煎至一盞涼服

○主治加二方下寒吐二用

真武湯 百三十八寒　茯苓三両　白朮二両　附子一枚炮去皮破八片　生姜三両

右五味以水八升煮取三升去滓温服七合日三服○若欬者加五味子半升細辛乾姜各一両若小便利者去茯苓若下利者去芍薬加乾姜二両若嘔者此方去附子無温薬亟通二辨アリト云ヘ𪜈意得難シ關疑シテ可ナリ

去附子加生姜足前成半劑

此湯ノ正面ハ太陽病脉黄湯桂枝湯ヲ見合ニ可用ニ誤テ大青龍湯ヲ用テ劇ク発汗スル程ニ汗出ルトイヘ𪜈病不解ス反テ大ニ正氣ヲ傷リ其人発熱シ心下悸シ眩暈シ或ハ身中アチコチカビクく蠕動シ振ヒタフラく人ノ地ニ擗ントスルニ用ル薬ナリ悪寒ニハ去芍薬増附子ヲ悪熱ニハ附子ヲ減シ芍薬ヲ倍ス○此陰ノ病ニ三日不已四五日ニ至テ腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此有水気陰寒甚ノ水ヲ制スルコト不能脾ヲ生スルコトナラズ故ニ右ノ証ヲ見ス小便或利スルコトモ有リ不利コトモ有リ陰寒ノ気水ヲ行コトナラヌ故ニ小便不利又虚寒故ニ小便ヲ通シ過ルコトモアリ或咳シ或ハ嘔シ皆水ノ泛濫スル故ナリ○此方意白朮附子健脾除寒茯苓生姜ヲ兼テ脾ヲ運シ水ヲ滲ラス是人ノ合点シ易キコトナリ芍薬ヲ用ルニ至テハ有深意此方ハ陰虚寒ノ証ト雖モ若シ至極ノ虚寒ナレバ小便必清白ニ禁ナシ反テ不利ノ証不可有此証直陽ノ不足ハ知レタコト真陰モ亦虚スル故ニ陰症ノ中ニ陽邪ガ伏コト有リ故芍薬ヲ用

テ陰ヲ固ク護ルナリ此附子湯桂枝附子湯芍茉甘草附子湯ノ中ニ皆芍茉ト附子トヲ并用ル八此意ナリ

此方本證主用例

○夾食ノ傷寒過汗傷血小便秘濇スルニ八枳實理中湯加當皈芍茉或此湯加當皈

○陰症ノ傷寒初起自覺小腹滿ト云腰腹痛手足厥冷スルモノニ八此湯主之

○太汗下之後惡寒厥逆水茉不得入口身體痛自利此湯加生薑下黑錫丹

○陰症喘唾火陰有之若四肢沉重疼痛小便如常大便自利而欬者此湯去芍茉加北五味子乾姜各半錢細辛三錢

桂枝人參湯

桂枝四兩　人參三兩　白朮三兩　甘草四兩炙　乾薑三兩

右五味以水九升先煮四味取五升內桂更煮取三升溫服一升日再夜一服謙云此方理中湯加桂枝世間常用之未称此湯之名

此方八太陽ノ証未除メニバク下シ裏虛ニ合スルナリ

此方本證主用例

火陰ノ中風八唾寒ヲ畏テ厥冷世ズ自云腹滿トコレヲ按スレバ濡ナリ大便秘シ小便數々吐シト欲ノ不吐臥メ起シト欲シ悩

悒悒多恐心中懸ツテ如饑狀食スレバ痞脹不寧舌上灰黑或淡紫帶青黃脈來弦細浮弱風性ハ上行スル故ニ手足太陰ニ似タリ實ハ少陰中風ノ証ニ用ユ尤辯別シ難シ此湯加乾姜下虛甚而面戴陽スルニハ加葱白生附子○夾食ノ傷寒消導茶大過ニテ自利厥逆痞滿スルニ此湯主之

此方雜病活用例

虛勞 始有表邪發散不足ニテ咳嗽ヲ致ス醫者誤テ陰虛肺熱ト ナレ清肺降火ノ茶ヲ用胃ヲ傷テ咳シ畏寒傷食氣口ノ脈緊細沉弦也大劑ノ桂枝人參湯ヲ四五貼モ用井下血スルカ或積沫アリ小腹微痛温按ヲ喜ハ邪下ヨリモル、也小劑ノ理中湯ニテ和之ヲ七日不止者難治

傷寒 甘草乾姜湯 亖品十 寒

甘草 四兩 炙　乾姜 二兩 炮

右咬咀以水三升煮取一升五合去滓ヲ分温再服此即四逆湯去附子也辛甘合用專復胸中之陽氣其夾食夾陰面赤足冷發熱喘咳腹痛便滑外內合邪難於發散或寒茶傷胃合用理中湯ヲ用ベケレ

㠯參朮ノフサハヌト云コトカ但シ價貴キ茶ユヘニ調カタキカト云コニ見ルソレニハ并ニ可服此湯理中不便ナル參朮者並宜服之真胃虛極寒之聖劑也若夫脈沉長冷嘔吐自利雖無厥逆仍屬四逆湯證ニソレ屬ストイヘバ此湯ヲ用テモヨシ此湯モ四逆湯ノ類ナリ矣

此方ハ太陽ノ柔衛共ニ傷ルヽノ壞証ニ用ル茅也方後ニ此方ノ所論ヲ取テ其用法ヲ云是ニ従テ可用然ルニ其味大ニ甘茅ニテ本邦ノ人ニハ全方ハ難用但方意ヲ用テ加減進退ノ可也

○傷寒始病微ク悪寒発熱坐臥不安胸中煩シ欲嘔善饑脈弱其症陰陽未詳者軽ク発表ノ茅ヲ用ユルコトナカレ先與此湯加葱鼓与テ後陽症ヲ見者ニハ用表茅陰証ヲ見者ニハ温茅ヲ用ユ若陰症或夾陰ノ症ナドニ表散ノ茅ヲ用則必誤ル故ニ此湯ヲ以テ試之

此方雑病活用例

肺癰 吐涎沫而不欬者其人不渇必遺尿小便數所以然者以上虚不能制下故也此為肺中冷必吐多涎唾甘草乾姜湯以温之若服湯已渇者属消渇

陽明反本湯 百四十一陳 此湯治陰盛格陽陰極發躁微渇面赤欲坐臥於泥水井中脈來無力或脈全無欲絕者宜用

熟附 乾姜 甘草 人参 門冬 五味子 臘茶

陳皮 面戴陽者下虚也加葱七莖黄連少許用澄清泥漿水二鍾煎之臨服入蜜五匙頓冷服之取汗為效

方下ニ云フゴトク陰寒極リ却テ格陽所見咸ク熱症也即后世云虚寒陰毒ノ証候也故ニ人参四逆湯ヲ用テ的症ノ剤トス門冬五味子兼テ救陰臘茶ノ苦寒為嚮導仲景四逆湯加猪胆汁之意也戴陽ヲ見ハ加葱白通陽氣加黄連少許亦不過嚮導之意又

入蜜五匙ハ諸某ノ和セン為ナリ但シ本邦ノ人不及用之也陰盛格陽ノ証ハ皆用冷服

回陽救急湯百四十二 即四逆湯本方自有加減法○治寒邪直中陰經直寒症初病起無身熱無頭疼止則悪寒四肢厥冷戰慄腹疼吐瀉不渇引衣自蓋蹉卧沉重或手指甲唇青或口吐涎沫或至無脉或脉來沉遲而無力者宜用

熟附　乾姜　人参　甘草　白朮　肉桂　陳皮

五味　茯苓　半夏　唱吐涎沫或有小腹痛加溫灸茱萸

○無脉者加猪胆汁一匙○泄瀉不止加升麻黄芪○吐噦不止加姜汁○水二鍾姜三片煎之臨服入麝香三厘調服中病以手足温和即止不得多服多則反加別病矣如後止可用前理中飲加減治之無効

此方ハ仲景四逆湯加味ノ方ナリ陶氏常二仲景ノ方ニ加味ノ改名ヲ用之麻黄湯桂枝湯葛根湯白虎湯等ノ加味ト同シ右下ノ証皆直中三陰ノ候也四逆湯ノ方下ニ詳ナリ故ニ方下ニ四逆湯ノ本方ト云トイヘ尾イマデ此方ヲ見レバ六君子湯ニ加肉桂乾姜附子五味子者也然レバ一定ノ法ニモアラズ方後ノ加減モ一定ノ法ニアラズ医者ノ意ヲ加減スヘシ無脉者加猪胆

汁一貼此加味ハ仲景ノ通脉四逆加豬胆汁湯ノ倒ヲ以テ豬胆汁ヲ加ルトイヘ𪜈元來仲景ノ通脉四逆加豬胆汁湯ノ通脉ハ在甘草ニ此ヲ通脉四逆湯トスサヤウナル証ハ多陰盛格陽ノ証アル故ニ加ニ豬胆汁ヲ名ニ通脉四逆加豬胆汁湯ト於豬胆汁ニ通脉ノ功ハナシレ然ルヲ陶節庵此方ニヲイテ無脉者加豬胆汁ト云者ハ仲景ノ方意ヲ不知元來文盲ナル一医者ト見ユルアナガチ理ニ徹ノ經驗シタル者トハ見ヘヌ然レバ陶節庵ガ方ニ功者ラレキ加味アリトイヘ𪜈深意ハナシレト可意得臨服麝香三厘ト云モ豬胆汁ノ合点ニテ見レバ深意ハナシレト三ユル本邦ノ人多ハ香竄ノ品ヲ忌ム不可用之

溫經益元湯

治因發汗太虛頭眩振々欲擗地并肉瞤筋惕及因發汗太多名衛虛以陽汗不止或下後利不止身疼痛者併皆治之

熟地黃　附子　人參　白朮　黃耆　甘草炙

當皈　生地黃　白茯苓　芍藥炒

如飽悶加枳殼去地黃○如瘦人有熱去芍藥去附子○利不止加炒白朮升麻陳壁土去當皈地黃嘔者加姜汁製半夏○渴者加天花粉麥門冬○汗後惡風寒屬表虛去附子肉桂生地加桂枝膠飴

右水二鍾姜三片棗一枚擣法加糯米一撮煎之溫服

此方十全大補湯ノ加減シタルモノナリ然レハ可入補益部此部ニハ不可入ト雖イヘ此方下ノ主治ヲ見レバ皆仲景真武湯ノ主治ト同シ故ニ此部ニ攝入ス真武湯ト此方ヲ用ルト各有主意真リ夫レ汗多ケレバ陽ノ証ニ用真武湯ト此方ヲ用ルト各有主意真武湯ハ附子生姜ヲ以テ補陽用芍茅温補中救陰此湯ハ熟地黄生地蓮當皈芍ヲ用テ補陰滋潤補陰中ニ以肉桂温補下焦陽一則補陽中存補陰一則補陰中存補陽医者臨病改用ベシ真武湯ハ用茯苓泄水此湯ハ以人參保元氣真武湯ト互ニ考索スベシ

治中湯局百四　霍乱吐瀉

理中湯加青皮陳皮

此方本證主用例

壯男霍乱吐瀉虫衝上心下手足冷脈遲此湯加良姜此方ハ理中湯加青皮枳穀者乾霍乱用之云虫衝上心下故加良姜也

此方他病活用例

傷食　傷食之証頭痛發熱悪寒病似傷寒但身不痛耳此湯加砂仁一錢○食過多而腸停留中脘聞食氣則嘔此湯加砂仁一錢丁香十粒　挾傷飲食生冷嘔同　逆積痛者加木香　反胃　枳穀砂仁各半錢半夏一錢入米与生姜　噤口痢　噤口痢者有得病即不能食者或因冷菜并菜過多不食同煎　瘧疾　瘧者却不可拘於赤痢難用熟菜之説當以温中進食為先宜此湯加木香半錢或縮砂一錢　水腫　初起多寒湿自痢不食者加丁香

暑

大順散　百四十五

治暑熱引飲過多霍乱嘔吐

甘草　乾姜　各五錢　杏仁去皮尖　肉桂　各三錢

右先將甘艸用白砂炒次入姜却下杏仁炒過篩去砂合桂為末

每服二錢沸湯調下

此方暑月冷飲過多二因テ泄利嘔吐霍乱中寒ノ病ヲ致ス冝用之杏仁下逆気ヲメアテニスベシ

冷香飲子　百四十六

治中暑夾陰腹痛瀉利

附子生用　甘草炙各一錢　生姜五片

中寒

右水煎冷服

此方中暑ノ茶トイヘ𪜈竟中寒ノ茶ナリ凡夏月ノ中寒ニ理中四逆ノ類并ニ此方皆用ベシ其辨別ハ臨病ノ間在医者意領辨別ハナシ冬月ノ中寒ニモ可用此方ヲ𪜈アルベシ草葉ニ意ヲ付テ考フベシ

漿水散　百四十七

治暑中太陰少陰泄瀉身冷汗出脉弱

附子　乾姜炮　甘草炙　肉桂　各五錢　半夏醋製各二錢五分

右用漿水煎去滓冷服○虚熱喘之加人參汗多加黄耆五味子

緒論曰泄瀉而兼身冷汗出脉弱其為胃虚陽気欲脱之兆最急是
不得不用桂附二姜甘草半夏辛温以理其脾之冷滞也其妙用尤
在漿水之酸收斂以收欲脱之陽氣惜乎世或漿水ヲ用ルヿ忽ニスルヿ忽之〇
合大順冷香消暑生脉清暑益氣及此方觀之大順用白礬炒甘草
乾姜杏仁冷香用水浸冷服消暑用醋者半夏生脉清暑之用互味
子此用酸漿水煎總是因夏月陽氣在外容易耗散之故ニ此ホドニ
ルヽニ故モナリ香薷飲ノ耗散ヲ用ルハ以ノ外ノ誤也ト戒ムルナリ

鑒厥

此方亦暑月ノ中寒ヲ治スト雖必暑月ニ用ト云ニキハメ
リモせズ四逆湯ニ加肉桂良姜半夏者也醋製ノ半夏ヲ用ルハ
消暑丸ノ意ナリ消暑丸ト考索スヘシ緒論妙在用漿水ト云漿
ハ乳酪ニ點スル淡醋トイヘ共本邦ニテハ常ノ水ニ火ニ炙ル醋
ヲ交ヘ用ベシ是猶若水傳也

二神丸百四十
八本事　治脾胃虚弱不思飲食泄瀉不止
破故紙四兩　炒　肉豆蔻二兩

右為末以大肥棗四十九枚生姜取汁肉搗膏入茱萸和丸如梧子
大每服五十丸鹽湯下一方飛霞子加木香二兩名三神丸〇師

曰二神丸之加木香者旋氣機不如砂仁行気尤為善運

此方ハ治五更泻五更泻ハ五更ノ時必洞泄スルヿ一二十三次此レ腎気ノ虚ナリ病状中編ニ詳ナリ方後ニ所謂加木香為ニ神丸ト云ヘルニ此ノ症ニ行気ノ為ニハ木香ヨリハ縮砂ハ腎ニ入リ行気ノ内ニ泻ヲ止ルノ功アリ○加ニ茱萸木香減半名四神丸此モ燥ヲ悪ムモノニハ去木香五味子ニ肋ベシ

意苡附子散百四十九

薏苡　五両　大附子一枚　炮

右二味粗為散服方寸匕ヲ此茶胸痞ニ用ユ胸痞ハ即胸痛ノ症治方種々アリトイヘトモ胸中ノ陽虚ニ因テ経脈痞メ或ハ緩リ或ハ急ナリ薏苡仁経脈ノ痞ヲ舒ベ附子胸中ノ陽氣ヲ復スル故ニ此方主之

腰痛

青娥丸百五十　治腎虚腰与季脇痛ノ局方

補骨脂　炒香

杜仲鹽酒炒断絲各四両

右二味為末連皮胡桃肉三十枚青鹽去砂土淨一両同擣成膏稍入煉白蜜和丸彈子大毎服一丸空心温酒化下

方下ニ記スル如ク腎虚ノ腰痛ヲ治スル經驗ノ方ナリ腎虚ノ腰痛ハ季脇ト倶ニ痛ム季脇ハ腎ノ部ナリ此モ一ツノ目當トス按ルニ此茶近來實茶ニ胡桃子圓ト云ハ是ナリ

泄瀉

木香散百五十一　治虛寒滑泄不止

甘草　乾姜各二兩　附子　丁香　木香　肉蔻　藿香

訶子　赤脂各一兩

右爲散每服三錢陳米湯下ス世本無乾姜如方下良方ナリ多當皈一

益中散百五十二　大人小兒俱治妙方ナリ

白朮　茯苓　陳皮各三錢　芍藥五錢　蓮葉二錢　乾姜一錢

右細末ニシ白湯送下

此方道三翁ノ製案方ナリ經驗ノ方ナリ大抵泄瀉通用ス前湯ト兼子用ルトアリ益ヲ泄瀉ハ前湯ヨリハ厳ナリ能ク應スルモノゾ

瘧

閻甫驅邪湯百五十三

桂枝三錢　乾姜一錢　蒼朮一錢半　半夏一錢　附子七分

生姜煎服○膈脇衝逆加柹柳一錢○小便短少加茯苓倍桂枝

甘草　柴胡一錢

○大便不鞕加白朮砂仁肉豆蔻各一錢○寒去熱獨發者腎水虛脾陰弱加鼈甲知母

此方名古屋冷水子ノ制スル所ナリ寒瘧ニ用テ經驗アリ惣体ヲ寒瘧ト見ツケタラバ脉ノ浮數ナルニモカヽヒナク用ベシ却テ脉數モナホルモノヲ加減ノ法甚ヨレ考ヘ用ベレ

暑

香薷散 百五十四局

治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷過度或起居不節或露卧濕地或當風取涼而風冷之気皷於二焦復於脾胃脾胃得冷不能消化水穀致令直邪相干腸胃虚弱飲食變乱於腸胃之間便致吐利心腹疼痛霍乱氣逆有心痛而先吐者有腹痛而先利者吐利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虚煩者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛或但嘔而無物出或四肢逆冷而脉欲絶或煩悶昏塞而欲死者皆悉能治

香薷去土 一兩
白扁豆 厚朴去麤皮姜汁塗炙黄各半斤

右麤末每服三錢水一盞酒一分同煎七分去滓水中沉冷連喫二服立効不拘時 活人書方不用白扁豆加黄連四兩剉生姜汁同研勻炒黄色名黄連香薷散○呉氏方考用扁豆亦名黄連香薷飲

此方呂方ニ出ストイヘ正局方方下ノ主治未タ信用シ難キモ

ノアリ其信用スベキモノニハ黒圈ヲ加フ其信用スベカラサルモノニハ黒圈ヲ加フ一定セサルモノニハ圈批ヒニ加ヘス

○此方夏月傷暑伏暑ニ用ユ暑熱ニタヘ難ク燥渇乾嘔或吐或利或吐利ヒニ起ルモノニ用ベシ香薷暑邪ヲ温散ス暑邪ヲ温散スレバ暑乃涼ク脾ヲ醒マス又能ク小便ヲ通利ノ暑邪ヲ表ヨリ発シ水道ヨリ泄ス暑邪胸中ニ鬱結シ或痰多ク食滞アリ厚朴ヲ用テ散之白扁豆中ヲ和スル蓋シ暑ハ常ニ湿ヲ兼子挾ム此方暑湿ヲ除ク良剤暑病ノ専剤トメ古来経験ノ薬ナリ暑邪内ニアレバ食ニ傷レ易ク或滞リ易シ故ニ霍乱吐利腹痛嘔逆アリ此方一二剤ヲ煎メ水ニ冷シ服スベシ若シ散薬ナラバ冷水ニテ用ベシ若シ熱服シ或熱湯ニテ用レバ飲食ヲスルノ恐レアリ○方後ニ記スル如ク活人書ニハ白扁豆無メ黄連アリ暑邪犯心トキハ心煩大熱水瀉脈数ナリ此症ニハ活人書ノ黄連香薷飲ヲ用ベシ然ルニ右ニヲノ症兼子發スルモノアリ故ニ吳氏方考ニ局方活人ノ二方ヲ合メ一方トス臨時ニ考ヘ用ベシ

加減

中暑復傷風搐搦不省人事加黄連羌活○伏暑頭痛小便澁濁加茵陳車前○霍乱吐利加藿香木瓜生姜○蔵府積熱便血加枳殻黄連赤芍烏梅○小便血加瞿麥穂車前子○壮熱大渇或五心熱加麥門冬淡竹茹根燈草○脚氣作痛行歩艱辛加木瓜羌活蒼朮炒枳殻陳皮生夏○中風加防風羌活○手足搐搦加羌活白芷○挾痰加南星半夏○腹痛小便赤加枳殻木通甘草○腹痛加梔子

此方本證活用例

暑疫黄連香薷飲ヲ用井挾疫ニ八加生夏南星虚ニ加人參黄芪氏ヲ傷暑煩而渴者渡冷ノ香薷飲カ或五苓散ニテ飲消暑丸ニ〇傷暑自汗手足時ニ痛攣スル者謂之暑風此湯ニ加羌活ヲ理開テ汗出ツ此湯ニ加葱根ニ〇惡心ハ胃中ニ痰飲アリ此湯ニテ下消暑丸ニ〇中暑甦テ後金鹿射香山許ニ〇中暑甦テ後ニ医者冷劑ヲ過用シ吐利不止外熱内寒煩躁多渴傷寒陰盛格陽ノ症ニ似タリ此湯ニ加附子ヲ冷服

此方他病活用例

痢 暑気ニ感メ痢病トナリ甚ク自汗発熱面垢呕逆渴メ引飲腹痛小便不通血痢ヲナス黄連香薷飲ニ五苓散ヲ兼子用ユ

瘧 暑瘧ハ黄連香薷飲ニ加大黄青皮烏梅 頭痛 暑疫ノ頭痛ニハ水腫暑ニ因テ此湯加茵蔯葱白 水腫 水腫暑ニ因テ腹レ小便不利。

十味香薷飲 百五十五
百一選方

香薷二錢 人參 黄芩 白朮 茯苓 甘草炙 扁豆
陳皮醋炒 厚朴姜製 木瓜各一錢

右水煎欲冷作汗熱服欲利小水冷服○緒論曰伏暑去黄芩人參加黄連藿香澤瀉

前方香薷飲ノ証ニ同クメ虚弱ノモノニ此方ヲ可用此方考諸者ニハ此湯ニ加ル麥木通滑石枳穀黄連 疝気 疝氣暑ニ因テ小便濇急

晝ニ多ク出ト云ヘル何ノ丁ハナイ原方ノ香薷飲ノ証ニノ頭重草卧或汗多ク悪寒シ頭重味利スル者ニ用ルト意得ベシナセナレバ原方ノ香薷飲ニ加五味異功散及黄耆木瓜タルモノナリ木瓜ハ陰氣ヲ收メ消脾湿ノ暑ヲ

暑

六和湯　百五十六　繼洪濟療方

半夏　砂仁　杏仁　人參　甘草　各一分　茯苓　藿香　各二分　香薷　厚朴　各四分

右姜棗水煎○一方有白扁豆木瓜二分

此方原方ノ香薷飲ヨリ變シ來ル此方ハ暑邪裏ニ偏ニ〆暑熱ノ片飲食過傷シ泄瀉悪吐スル二用ユ霍乱ノ茅ナリ

此方本証土用例

夏月多ク果瓜冷水ニ傷シ風冷乘之食不化上下隔リ遂ニ霍乱トナルニハ此湯ニ倍藿香蘇合香圓ヲ調服ス○不渴ノ腹乾痛スルニハ此湯ニ蘇合香圓ヲ調服ス○傷暑自汗手足厥冷スルモノニハ此湯ニ二蘇合香圓ヲ下ス

此方他病活用例

感冒

日間冒暑夜間感寒悪寒發熱清湯寒熱瘧ノ如クナルニハ此湯ニ加羌活無汗ニハ加紫蘇兼食滯ニハ加草豆蔻砂仁

同

冒暑作汗乘汗冷水ニ浴シ身痺レ如鍼刺ノ痛ムニ赤ノ腫ルヽ處

アリ或発水泡此湯ニ加蒼朮荊芥防風甚トキハ加肉桂
若シ身熱頭痛躁乱不寧或身如鍼刺ノ如キ白虎加人参湯ニ
清瀦或鼻口ノ気熱ス 咳嗽 感暑咳嗽スルモノハ自汗煩渇ス
此湯ニ加川芎羌活 痢 或滞寒面垢ノ此湯ニ加五味子
暑邪腹痛甚ノ食不進モノニハ此 痰喘 痰喘氣急痞塞菜不得入
湯半貼霍香正氣散半貼合用之
シ麝香少
許ヲ入ル

益元散百五十七〇傷寒直格
即天水散俗名六一散
滑石六銭 甘草一

治暑濕熱蒸小便不利

右為極細末用清水調服〇綱論曰發汗加葱豉安神加辰砂止
泄加炮姜消斑加青黛

此方中暑身熱煩渇小便不利者用藥也暑着心故煩熱而小便不
利吳氏方考云滑石性寒而味淡寒清六府淡利膀胱用甘草滑
石性大寒恐傷中気故用甘草和之謙云下盛之熱阻隔而小便澁
着主之〇凡平人中暑身熱背悪寒面垢自汗大渇引飲煩躁悶乱
痰逆悪心胸膈不快或吐瀉轉筋小便秘澁者此内外皆熱或昏憒
困倦指頭微寒此暑并二五苓散
總司トスベシ〇風ト湿ト尉シ自汗過多或渇シ或不渇小便黄
邑此散二加葱豉

此方他病活用例

溫熱病　非時暴寒悪寒頭痛脉浮緊者此散ニ加葱白香豉方後所謂發汗ニ加葱豉ト云ハ是ナリ此証重キ片ハ涼膈散ニ去大黄芒硝加葱豉　脉兼弦緊重子テ客邪ニ感スレ表探リ吐シテ取汗　同　発汗後症ナリ此散ニ加葛根石羔葱白類　同　餘熱未退此散小柴胡湯ノ加減ニ宜シ或ハ躁ノ不得眠微熱渇スルモノハ五苓散ニ去肉桂合此散　同　熱某ヲ用テ汗不出モノニハ此散ニ加　舌紅色ニメ舌中ニ紫色ノ瘡生シ燥ノハ温疫薄荷葱豉　同　舌多シ黄連解毒湯ニ加弦参薄荷并ニ此散主之　咳嗽而心煩スルニハ此散ニ加辰砂方後　暑月患痢口渇スル二ハ安神ニハ加辰砂ト云ハ此類ナリ　痢　丁甚ノ數日ノ後脉大ニメ不數参朮湯ヲ以テ此散ヲ調服ス數日ノ後倦怠甚ク咳逆ヲ発スル此下焦陰虚ナリ前方ヲ用井次煉蜜為圓某典ヘ咳逆

止ニ利　夏月泄瀉或兼嘔吐生姜汁ヲ以テ此散ヲ調服ス　瀉　止ム也　泄瀉　方後ニハ所謂止泄ニ加炮姜ト云ハ此類ナリ　痢　淋閉ニハ此散ニ加山梔子木通夏月ニ　同　気淋濇滞餘瀝不尽ニハ茴香ノ煎湯ヲ以テ此散ヲ調服ス　同　小便數若シ痛ニハ宜此散　不寐　順メ不得睡　同　加味ト同シ　濁　赤濁ニハ火ノシワク加辰砂ヲ散ニ加　痛風　痛風無虚表実骨節痛者ニハ婦人　暑月崩漏ニハ此散ニ加香附子黄芩牛黄　産　崩漏　散ニ加百草霜　前　臨月ニ加當帰川芎黄芩陳皮白朮香附子各一銭　臨産水道ルコト不能ニハ此散七銭冬葵子五銭ヲ調服ス虚人ニ加参　同　乾濇メ下銭未ト云毎服ニ銭ヲ熱湯ニテ服ス　産後　産後小便不通腹脹満熱ニ属スルモノニハ

此散二加枳殼桔梗木通麻仁冬葵子煎服　産後リ痛ミ産後

此散小兒尿血ニハ甘草升麻ノ主之尿血　前湯ヲ用テ此散ヲ調服ス　瘄疹

麻疹初起譫語ニハ此散ニ加辰砂咳セバ加麻黄杏仁麥門冬石羔ナルモノニハ食前ニ用　瘄疹　小兒

益黄散食後ニ服此散　大暑ノ後吐瀉身熱或乳　吐瀉

生脉散百五十八　千金方　治暑傷元氣喘促煩渇　食ニ傷ラレ大便色黄白

人參五　麥冬去心三錢　五味子二錢　碎

右用長流水一盌煎服無時　孫真人井水煎服之無効

緒論曰孫真人夏月常服生脉散則百病不生東垣云夏月服生脉散加黄耆甘草令人氣力湧出劉宗厚若脚膝痿弱者更加酒黄柏則能治之倍常

此方ノ主治方後ニ記スル如ノ異竟夏月ノ養生茶ト意得ベシ

此方他病活用例

傷寒　舌色中黒ノ乾燥此　同　津液枯竭舌胎燥黒胎厚シテ　小便　盛赤　暑

湯ニ合附子理中湯　乾ニハ此湯ニ合黄連解毒湯

汗多脉脱閉塞スルハ此湯ニ合五苓散　小便難　夜ニ至テ発熱スルハ心經伏暑赤當ニ補血湯ニ合此湯　濁　心經濁ニハ減桂

〆五苓散
二合此湯

加減

○一方加炙黃耆炙甘草黃栢夏月服之氣力湧出○本方加黃芩當皈生地黃名清肺生脉散治暑邪入肺咳嗽及脾胃虛弱氣喘气促○本方加杏仁陳皮姜棗名加味生脉散治手足厥冷之病脉伏喘息者危姑以此救之○本方加陳皮白朮甘草姜棗名解暑補气湯治人遇勞倦辛苦用力過多即服此葉二三貼免內傷發熱之病

清暑益氣湯百五十九 東垣 治長夏濕熱蒸人煩熱喘滿小便赤

黃耆一錢酒炒 人參 白朮姜製 蒼朮泔浸去皮麻油炒 升麻酒洗 神麯炒 陳皮各五分 甘草炙 當皈 麥冬去心 黃檗鹽酒炒冬三分 五味子九粒研 葛根酒煨 澤瀉 青皮各二分

右水煎徐徐服○緒論曰本方去青皮葛根加黃連茯苓柴胡名清燥湯本方見燥門 ○暑令行於夏至長夏則兼濕令矣故此方兼而治之暑熱蒸炎表氣易泄而中氣胃氣者又為諸氣之原黃耆所以實表而固易泄之氣即兼當皈以統養脾之血白朮神麯甘草所以調中而培諸氣之原酷暑橫流肺金受病人參五味麥冬一以補肺人一以清肺一以收肺子此三物名為生脉也以氣虛則脉虛傷暑之

證未有脉不虛者故用補気之某以復脉經所謂扶其所勝也
火盛則水傷故又以黄柏澤瀉清其化原液亾則口渇故又以葛根
升其胃液清氣不升升麻可昇濁氣不降二皮可理蓄木之用為兼
長夏之湿也

此方考方後緒論ニ詳ト云ヘ𪜈北山氏口訣ノ頭書ニ述ル処ノ
方考撮メテ的実也從之受用スベシ其大意𪜈元氣虛乏ノ人暑
湿ニ傷ラレ兼ルニ食滯アルモノニ此方ヲ用ベシ人参白朮黄
耆升麻當帰陳皮甘草ハ補中益気湯ニ去柴胡者也麦冬五味子
人参ハ生脉散ヲ兼テ救肺蒼朮澤瀉除濕神麹青皮化食滯

黄栢去湿熱葛根止渇若シ暑邪ニ傷ルヽト云ヘ𪜈無湿熱小便
赤澁ナラズ亦食滯ヲキモノハ此方非合劑意得用ベシ
○傷寒論太陽ノ中暍發熱悪寒脉弦細抗遅ノ條ニ證有テ治方
ナシ徐春甫此方ヲ以テ充之此発千古之秘ト先輩何レモ褒美
ス然リトイヘ𪜈北山氏ノ方考ヲ按スルニ此方未右ノ證ニ的當
ナラズ謙云傷寒論ノ證ニ的當スルハ張ニ錫ガ近製清暑益氣湯右
ノ證ニ合剤ト云故ニ近制清暑益氣ヲ以テ此方ノ後ニ記ス

此方他病活用例

虛勞 百二十方按ニ云一女子十七八歳夏ノ末贏瘦骨立四肢倦
怠食少肌熱壮熱晝臥形如虛怯脉細緊ニノ數他藥不効加之
地骨皮黄連三十四貼ニシテ為全人謙云此證虛勞ニ似テ実ハ
虛勞ニ非ス故ニ如虛怯ト云脉モ陰虛火動ノ脉ニ似テ元来陰

虛火動ニ非ス此證內傷勞倦シ暑氣ニ中リテ草卧タル證ナリ
此証常ニ有ルコトナリ羸瘦骨立ハ注夏病ノ類ナリ四肢倦怠食
火肌熱ハ內傷ノ本証ナリ聲嗄ハ肺金暑邪ノ火熱ニ傷ルヽナ
リ嗜卧ハ惣体ノ草臥ナリ脉細緊而數ハ陰虛火動脉ノ如シト
云ヘ𪜈大抵十七八歲ノ女子ニ陰虛火動ハ少キモノナリ尤決
メ有ルヿニハアラ子ドムサト腎虛ハセヌモノナリ其
上此脉精ノ取テミタラバ脉ニヨヒ処ガアルベシ其コハ此案
ニ書落シタルトミヘタリ此內傷病ノ陰虛火動ニヿギルヽ症
ナリ加地骨皮肌熱ヲ解ス加黃連補劑ノ內ニ直ニ心火ヲ清ス
ルタメナリ能々考ベシ

頭痛　一男年十歲患頭痛甚而晝夜不寐少モ中頭於枕則氣上於
氣衝而欲絕故常不側卧倚物則息稍平兩手抱頭他治不効予六

月初試脉細數無力加苦細本酸五六十貼而全愈兼云此病人半
年頭痛スルナレバ正月比ヨリ頭痛トミユル此內傷補中益氣
湯ノ症ナリ然ルニ其時節ノ医者誤テ不與ソレユヘ不愈ノ六
月ノ初ニ至ル此時ハ暑氣最中ナレバ時ニ從テ此湯ヲ用テ愈
ルナリ加川芎細辛薑本頭痛ノ加味ナリ加酸棗仁晝夜不寐故
也サレ𪜈此加味　脫肛　一男年十歲太腸頭破四ニ形如錠甚腫痛下血時六
ニ限リハセヌソ　月中旬加黃芪參白杏仁檳榔得奇妙甚後
再三發每發皆得謙云脫肛ニ補中益氣湯ヲ用ルヿ常ニアリ然
ルニ暑氣ノ時節ナレハ此湯ヲ用タルモノナリ　本証補遺挾暑
熱則勝理開而汗泄於外加木香

近制清暑益氣湯百六十
六要

人參 白朮 麥門冬 五味子 陳皮 甘草各

黃柏炒 黃芪蜜炙 當皈身

右隨人加減薑棗煎

太陽中暍者發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細芤遲小便已灑々然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前枝齒燥若發汗則惡寒甚加温鍼則焮甚數下之則淋甚○謙云傷寒論ニ如是アツテ治方ハ不載故ニ先輩東垣ノ清暑益氣湯ヲ以テ此證ニ充然レトモ清暑益氣湯ノ條ニ云如ク此證ニハ清暑益氣湯ハトクトアハズ醫學六要ニ此湯ヲ載ス六要ニ此湯ガ此證ニ合劑ト云テハナケレド新ク此湯制シタルハ證ニ此湯ヲ以テ此症ニアツル

トミユル傷寒論太陽ノ中暍トニクウハナクテ弦細芤遲ナルハ元氣虛ノ脉ヲハリダスカラ無ゾ小便シ終テブンゾトスルハ内ニ伏スル火ナリ手足逆冷ハ陽氣虛スルナリ前枝齒燥クハ此證ノ本症ナリ此方補元氣涼時火若シ病他症ナリ且元氣弱ク暑邪ニ傷ラレタル計ノ證ナラバ此方ヲ用ベシ若シ濕ト食滯トヲ兼子小便赤澁心下痞脹セバ本方ノ清暑益氣湯ヲ用ユベシ

消暑丸 百六十一局 治傷暑發熱頭痛瀉痢煩渴

半夏一斤 粳米醋六升煮乾 甘草生 茯苓各半 麥門冬 人參 觔

右為細末姜汁和丸無雜生水每服二錢不拘時沸湯送下

○緒論曰消暑在消其濕故於二陳湯中除去橘皮而倍用生夏為君也又以生夏性燥故用醋煮以斂酸味收斂其性而使之下行其用生甘草麥冬加之令不耗上焦之津液矣其用二陳湯之意二陳湯為滌痰之藥滌痰消濕之本湯ノ滌痰消濕ノ本意ヲ生甘草麥冬者不忘滌痰之意總レヌト云コトナリ

也去橘皮者恐其上升耗氣也夏月之氣易於耗散一切破氣藥皆當禁用不獨此方之橘皮耳

此方秋暑泄利此方主之○中暑伏暑惡心ス ル ハ胃中ニ痰飲アリ局方ノ香薷飲ニテ飲此丸ヲ○伏暑煩渴而多熱痰者於此圓內每兩入黃連末二錢名黃連消暑圓或二陳湯或小半夏茯苓湯並可加黃連一錢ヲ

濕

羌活勝濕湯百六十二　治風濕上衝頭痛項似拔腰似折

羌活　獨活　防風　川芎　蔓荊子　藁本　甘草炙各一錢　生姜三片

右水煎熱服緩取微似汗過汗則風去濕不去也如無頭痛去蔓

荊子撰著未

此方ハ治風濕之藥也其證如方下述ルノ下ニ載ル通此湯与除風湿羌活湯之二方ヲ合セテ論ス詳考ヘシ凡論濕病雖有傷濕中濕之辨サヤウニ意得ルすハイカフ入組デムツカシクナル只濕在上在外在内在下ヲ分別シテ療治せヨ此湯ハ濕在上ヲ主トスル次ノ除風濕羌活湯ハ濕在外ヲ主トス

此方本證主用例

風濕自汗肢体重痛渇而小便不利者五苓散不渇而小便不利者邪在經此湯或除風濕羌活湯選用○傷濕兼テ感風汗ハ眩暈呕逆煩熱不欲去衣被或額上有微汗或身体微腫汗漬衣當風坐卧多有此證麻黄杏仁甘草湯或此湯ヲ用テ少發汗

此方他病活用例

水腫 因風冷搏乾瘡ノ某太甚ノ者ハ上半身腫上半身甚者此湯加升麻白芷紫蘇下半身甚者五苓散ニ用蒼朮加木瓜大腹皮 腰痛 腰痛夾濕熱者此湯合二妙散 脊痛 太陽經脊痛項強ニハ此湯主之脈浮緊ナル者ハ麻黄湯主之沉緩為風濕五苓散蒼朮ヲ換桂 肩背足太陽經ノ氣不行故也此湯主之諺云百枝加羌活痛 二十方以此湯名通気防風湯治肩背痛 汗 胃中火盛ニ兩濕ノ氣ト相合ノ汗出不止ニハ用此湯去濕用甘寒茅瓜熱ヲ大也此湯加甘草桔梗黄芩 腮腫 屬風熱者葛根甘草桔梗升麻薄荷屬濕熱者脉洪

濕

除風濕羌活湯 百六十 治風濕相搏一身盡痛日晡發熱

羌活 防風 柴胡 蒼本 蒼朮 泔製各一戔 升麻八分

生姜一片

右水煎空心熱服覆暖取微汗○按醫通曰羌活勝濕湯與除風湿羌活湯同源ノ立方ノ本異派未此羌活勝濕湯治頭項之濕故用羌防芎蒼二派羌活勝濕湯ノ某風某以祛上盛羌活勝濕湯ノ症之邪熱雖熱上ニアリト云ヘ共濕ハ本下ニツクモノユヘ獨活ヲ用ユ獨活ハ少陰經ノ某ナリ少陰經ハ內下下ノ主ル上浮濕本下ニ着所以復用獨活透達少陰之經其妙用羌活勝濕湯ノ尤在緩散微似之汗故劑中加用甘草ハ諸某ノ気ノ緩久ノ性ヲ緩ノ濕邪モ亦緩ク去ルヤウニスルナリヨク汗孔ヲ開テ急ニ風邪ヲ去レバ肌膚勝理ガ弱クナリテ濕カ次第ニ內ヘくトンベマツテ風計去テ濕ハ不去ヤウナコニナルトト云コナリ甘草以緩諸某之性則濕著之邪亦得從之緩去無藉大開汗孔急驅風邪之法使肌膚勝餘弱無力濕邪因之內縮但風去而濕不動去也其有腰以下此ヨリ寒濕ニ中ルモノニハ加味スルコヲ云重寒濕之邪費於陰分也本方羌活勝濕湯加防已以逐濕必兼生附以行經或此ヨリ濕熱見身重腰沉沉然濕熱之邪遍於陽分也本方羌活勝濕湯加蒼朮以燥濕必兼黃柏以清

熟非洞達ヲ(ト)ヽコヲオリナ(ク)ク達スルコト長沙(ノ)仲景ノ木附湯桂附桂枝附子湯梔子梔子柏皮柏皮等右ノ方傷寒方ニ不能發用論ノ方ナリ能クナラヒ用ヒタルモノナリ其法其除風濕羌活勝濕湯ハ古云傷寒此ヨリ除風濕羌活湯ノ方考ナリ羌活湯治外濕濕外在テ上ニ無レバ頭項之濕而無上衝頭項之痛則川芎二味頭痛ノ痛ムヿハナイ無レバ此茶ニ蔓荊無預(ル)也亦無濕著腰疼之患與獨活腰痛尤預ルコトナシ蔓荊無交涉(ル)コトハナイ故但除風濕羌用羌防藁蓽入升麻活湯ハ此方ノ手治方下ニ詳ナリ方考ハ方後ニ詳ナリ

神木湯百六十四局方 治風木之邪內干濕土泄利下血

蒼朮泔浸麻油拌炒 藁本 川芎 羌活各一錢 白芷 甘草各二錢 細辛各五分 生薑 葱白二莖連鬚

右九味水煎熱服○壓通日按神木湯純用風茶與羌活勝濕相去不遠如何可治泄利下血蓋火淫陽明之血則燥金受傷祇合清涼最嫌風燥若風乘太陰之血則濕土被鬱法當升散切戒寒涼當知陽明來者色必鮮明太陰來者色必清稀其源各異故其治亦迥乎不侔(ヒトシカラ)其旨不越風能勝濕之義蒼朮專土木邪乘土故

能治外內諸邪以風木之邪內干于土藏故用羌藻芎止辛等風藥兼川芎以引入血分甘草以調和氣胃數布有補泄利下血自止蓋汗即血之液奪其汗則血中之濕熱邪氣悉從外泄而無內滯之患矣

此方ノ主治如方下方考ハ方後ニ論有テ詳ナリアレデ殘ルコトハ無レドモ未熟ノ者ノタメニ方後ノ論ノ大意ヲ述フ此大意ヲノミコメバ方後ノ論モヲノレト合点ユクヅ此方ハ羌活勝濕湯ト近ク似タル方ニメ羌活勝濕湯ハ上ニ在ルノ濕ヲ治シ此湯ハ泄利下血ヲ治スルト云ヘバ上下タトノ大違ヒアルヤ

ウナレドモ火熱淫メ下血スルニハ可用清涼茶風茶ハ大ニ忌ムソノ見分ケハ下血ノ色ガ鮮明トハンナリト赤シ因濕下血スルハ血ウスクメ濃カラズ色不鮮明ナリ治ハ風勝濕道理ナレバ用風茶也ソレデ此湯ヲ泄利下血ノ茶トスル蒼术ハ除濕ノ本茶ヲ引テ血分ニ入ル如此ニメ發汗スレバ濕邪ガ外ニ發出シテ內ニ滯ルコト無クメ下血自止ムナリ

升陽除濕防風湯 即升陽防風湯百六十五

治風濕飧泄及腸風滯下便血

防風二錢　蒼术泔浸去皮飯上蒸　白术土蒸　茯苓　白芍各一錢　生姜一片

右水煎熱服取微汗○医通曰陽陷下則成飧泄濕犯於上則令頭痛清濁倒置而然故用風藥以勝濕也然風木之病稍加此常二是ヲ加味スルガヨシ桂枝甘草監制其功尤健

此方ノ主治方下ノ註ニ用蒼朮白朮除濕健脾茯苓滲濕芍藥伐風木之邪多ク用防風ヲ君ノ君藥トスルハ濕氣ヲ散シ鼓舞上提ノ飧泄腸風滯下便血ノ患皆愈ユ右ノ神朮湯ト此湯ノ二方ハ除濕ノ苦ナレ共下血ニ多用ルユヘ諸血ノ部ニ入ルベケレ共元來ガ除濕ノ苦ナルユヘ二濕門ニ攝入ス故ニ方ノ上ニ濕并ニ下血ト記スナリ

除濕湯 百六十古 治寒濕所傷身体重着腰脚酸痛大便溏泄小便或澁或利

半夏麴炒 厚朴姜製 蒼朮米泔製 薏苡 陳皮 白茯苓 白朮生 甘草炙

右姜棗煎食前服去白朮茯苓即不換金正氣散治瘴氣山嵐ト云海ニ近キヲ瘴氣ト云共ニ不正ノ氣ナリ濕傷之要方也

此方ハ濕着脾四肢浮腫不能屈伸大便多溏是醇酒厚味水濕等ノ物ニ傷ラレ濕内ヨリ中ル此方主之○謙云濕在上在外羌活勝濕湯除風濕羌活湯主之濕在内ハ此湯主之濕中下躰腎著湯主之然ルニ按證治準繩風寒暑濕皆能中人唯濕気積久留滯関

節不如風寒暑濕中於中濕ノ證關節重痛浮腫喘滿腹脹煩悶昏不知人其脈必沉而緩或沉而微細除濕湯主之ト云如此ナレバ此一方諸濕通治ノヤウニ聞ユル此方元來不換金正氣散ニ加味ノ方ナレバ風寒濕ノミヲ用テ無所遁痰食氣滯皆此方ノ主治ナリ雖狀濕之中人大率在上則嘔吐頭重ク胸滿在外則身重ク浮腫按之如泥在下則足脛浮腫大便溏泄ス在內則腹脹中滿痞塞ス是上中下內外ノ辨ナリ治方此意得アルベシ一駁二此一方ニ拘泥スベカラス

此方本證主用例

此方四君子湯理中湯桂枝湯合劑ノ用ルコトアリ証ニヨルベシ○傷濕ヲ兼感風レハ惡風不欲去衣被額上微汗或身体微腫此湯ニ合桂枝湯發徹汗

此方他病活用例

水腫　腫病不一有陽水有陰水并先此湯ニ加木瓜大腹皮ト身之間只與足面ト浮腫ス朝ハ面ノ腫レ甚ク晩ニハ足ノ腫甚面腫ヲ為風足腫ルヲ水トス是則風濕ノ所致ナリ此湯ニ加木瓜大腹皮白芷ヲ通用ス或ハ蘇子降氣湯ト此湯ト合劑ニメ用之

脚氣　風寒暑濕足常蹈之為脚氣不問遠近同濕勝則腫ル此湯乾濕等之事此湯加木瓜檳榔白芷

四苓散　百六十七

五苓散去肉桂

此方五苓散ノ變方後世ノ方ナリ濕熱者宜之サレ𪜈五苓ノ妙

肉桂ニアリ此意得アルベシ

、此方他病活用例

水腫 玉莖腫脹健裂不休者濕熱小便實熱乃勝脫火動合三黃下流者加山梔木通金鈴子不禁湯加五味子山茱萸少許

同 虛熱合四物湯加山梔升麻

胃苓湯 百六十八 治飲食停積浮腫泄瀉脉證俱實者

平胃散合五苓散生料煎服

醫通曰平胃散本平胃氣之壞卑若胃ノ気ノ壞卑ニテハ無テラスコナラザルニハ因脾土之虛不能消運又須稍緝參苓(カツテ)人參(ヲ)ノカヲ籍テ

養胃之類(養胃湯ノ)然復有土衰不能分利而脾土衰テ水穀ノ分利スルコナラヌニハ理中湯ヲ合スベケレ(ニ)類宜レアリソレニハ五苓散ヲ合ノ脾ヲ健ニス正氣散ノ紫蘇藿香ノカヲカリテ客邪ヲ散スル上ニ此兩ツハ後世アチコチト移レ易ルコノナラヌ例ナリ成腫脹且氣壅塞勝參朮難合理中者乃合五苓以健運水土與正氣散之假(カツテ)以散客邪(カ)兩不移易之定例也(本忘)

同 水瀉(カ)滑石(謙云小便赤濇其者可用此加味)氣虛加人參同虛寒加乾姜同

多加生夏同濕勝加防風升麻(痢)暴痢赤白相雜腹痛裏急後重

加木香檳榔(本症)久瀉加升麻同腹痛加肉桂(黃胖病)黃胖者飲食無

味四肢無力行歩倦怠脉濇而濡是也減肉桂加藿香半夏大腹
山査薏苡蔔子三稜莪朮青皮（水腫）脾胃不和而黄腫去芍茱黄連加
肉桂如小便赤渋加滑石（本忘）按此方五苓散與平胃散等分故傷
食之泄瀉專可用焉謙云可有加味若瀉不止加訶子（本忘）夏月之泄瀉去
肉桂加芍茱黄連予常肉桂宜減用之何者肉桂大腸之引經也
（本忘）夏月謙云痢病ヂハ無キカ雖先瀉下而後渋滞當用此湯ノ
ト吟味メ加味スベシ
夏月謙云湿熱甚キナラ瀉下身冷困乾不欲衣按大抵在内故也
リ脉症ヲ吟味セヨ
合解毒湯而治之（痛）風）夏月患痛風按因暑濕而身体骨節痛故用此
湯而愈（水腫）水腫小便澁少大便結是乃食滞與濕熱所為也加秩
御神麹山査砂仁大腹皮香附入姜燈煎服而安○或語云此方
四五月至八九月專用之何者暑濕之故也
此方濕瀉小便赤渋ニ用ル藥其妙在肉桂
此方他病活用例
（水腫）不伏水土而腫ル（腹）腹満初起多寒濕自利スル者（瘧）身体重痛
（腫）者ハ此湯主之（満）加山査麥芽（謙謂可有食積）（瘧）肢節煩疼
寒熱而嘔逆スル者ハ温瘧也此湯加羌活紫蘇（痢）白痢初起裏急後重頻上厠或所下少
砂（傷食）傷食ノ泄瀉ハ此湯加山査麥芽（不能食）病人脉緩怠惰四

肢重着或ハ大便泄瀉不食スルハ是濕勝ツ也此湯主之（四肢重脉緩四肢重ク泄瀉スルハ是濕勝ツ也此湯主之（黄疸）黄疸傷急脾胃不和食少ハ宜此湯小便赤渋ハ加滑石（同）壯年平素過酒面目一身黄色不食尿如藥汁口渇脉五動餘如有為與此湯愈加山梔葛根黄芩（嘔吐）脾經濕痰欝滞上中ノ二焦時々悪心吐出清水或如豆汁者ハ此湯加半夏楝榔（小兒吐瀉）小兒吐瀉小便不清者ハ此湯加肉豆蔻為丸米飲ニテ下ス（暑傷）暑傷暑瀉而渇スル者生料此散和生料五苓散各半貼名胃苓飲間進来復丹

滲濕湯百六十九局　治濕滞經絡腰下重著而痛

理中湯去人參加蒼朮茯苓猪戊丁香姜棗

醫通曰然病有傷中之不傷傷濕者足太陽膀胱經也中濕者足太陰脾經也或足少陰腎經傷膀胱脱則煩渇引飲小便不利而腫脹五苓散著脾則不能屈伸大便多溏此酵酒厚味水濕等所傷濕從內中也除濕湯著腎則腰疼身重小便不利此醉臥濕地或下體濕衣所傷濕從外中也腎著湯濕盛身疼小便不利體重五苓飲加羌活

此方理中湯ヨリ変シ来ル大抵中焦ノ濕ヲ去ル者ナリ腰重痛ニ用ベシ丁子ガアレバ平胃散ナドヨリハ温剤ト意得ベシ嘔噦ナトアルニヨシ

○方後医通曰云云此論ハ此方ニ預ルノ辨ヲ述テ治濕ノ惣体ニ預ルノニナリ宇面ノ如シ傷濕中濕太陽膀胱經ナリ其證煩渇引飲小便不利ノ腫脹ス濕外ヨリ傷ラル、五苓散主之五苓散ハ足太陽膀胱經ノ表裏ノ剤ナリ故ニ主之羌活勝濕湯除風濕羌活湯モ外ヨリ傷ラル、ノ濕ニ用ル其内濕上ト外ニ在テ一向ニ發散スル藥ナリ五苓散ハ發散ト利小便トニツヲ兼テ表裏ニカ、ル中濕ハ足太陰脾經ナリ其症不能屈伸大便多溏濕内ヨリ中ルナリ除濕湯滲濕湯ノ類主之或呂火陰腎經ニ中レバ腰痛ミ身重小便不利腎着湯主之是治濕ノ大抵ナリ濕盛身疼ミ小便不利体重者五苓散加羌活

腎着湯 百七十 三因方

治腎虚傷濕身重腰冷如坐水中不渇小便自利

乾姜炮 茯苓各四兩 甘草炙 白朮各貳兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分空心温服

是即金匱要略ノ甘薑苓朮湯ナリ濕必陰腎經ヲ傷リ腰痛身重小便不利是レ醉臥濕地或下体濕衣ニ傷ラレ濕外ヨリ中ルナリ方下ニ腎虚傷濕トアリ濕腰ニ中ルハ腎虚ナレ𪜈濕ガ腎ノ外部ニ中リテ内真陽ニ傷レバナレ腰冷如坐水中ニトハ虚寒ノ甚キ故ナリ或腰ニ五千錢ヲ帯ルカ如シトハ腰重キノ甚キナリ小便自利スルハ虚寒甚キナリ大抵ハ小便不利症ナレ𪜈自利スルハ虚寒甚キヨリ知ルベシ此藥ハ濕門ノ藥ナリト云ヘ𪜈此藥ノ症ハ是非ニ腰ガ痛ムカ重キカ腰ニ病アル程ニ腰痛門ニ入ルナリ或腰腰スルモノ此方主之ノ

此方本證主用例

大處里濕雨露浸淫為濕所著腰重如石冷如水喜熱物慰之不渴便利飲食如故此方主之

此方他病活用例

衄血 傷濕而衄此湯加川芎名除濕湯加川芎此乃濕毒聲於經絡血溢妄行眩暈 傷濕頭暈此湯加川芎 痿 脾濕流于腎之傷り發痿痺者此湯加革解之

滲濕湯 百七 十一 治坐臥濕地或為雨露所襲身重脚弱關節疼痛煩惡寒或多汗惡風或小便不利大便溏瀉

蒼朮 炒 三錢 白朮 炒 三錢 乾姜 炒 一錢 桂枝 五分 大附 炮 二分 甘草 炙 五分

右姜棗煎服

此方附子理中湯ト桂枝湯ヲ合方ニメ加入参モノナリ左桂枝附子ノ分両少ケレ𪜈里竟右ノ合方ト心得ヨ論ニ不及大溫補ノ劑虛寒ノ證ニ用ル茅ナリ方下ニ述ル所皆虛寒ノ證脉モ定テ知ル沈緩或沈微ニメ弱ナルヘレカヤウナ方組ハ虛寒ノ證ニ出合ヘハ此方ヲ調合セントロ思ハズメ自然ト此方ニナルモノソサレ𪜈古方ニ如此名カ立テアレハイヨイヨヨリドコロアリ前ニ出ル所ノ局方ノ滲濕湯ト虛實ヲ考ヘ用ユベレ

清熱滲濕湯 百七 十二 治夏月濕熱瘧因煩渴泄瀉溺赤

黄蘗 鹽酒 炒 黒三錢 蒼朮 去皮同 芝麻 炒 白朮 生 茯苓 澤瀉 黄連 酒 炒 一戔

甘州炙五分　生三分　竹葉十片　右水煎熱服小使利為效老人虛人加肉桂少許氣虛喘乏加人參脉虛合生脉散內傷生冷加炮姜一〇按此本二妙合五苓之半加黃連甘草以夏令之濕熱良可法也滲濕湯ノ方名多シ此ハ濕熱ニ用ル滲濕湯ハ濕痰ヲ治スル藥ヲ載スル濕ノ滲濕湯ニテスム此カラハ濕ヲ治スルニ先ツ寒濕ト濕熱トノ二ツヲ辨別スルカ治濕ノ肝要也此サヘ別ルレハ大ナ仕損シハナイモノゾ此方ハ方後ニ云ゴトク二妙散ト五苓散ノ半ヲ合レタルモノナリ方下ニイヘル煩渴溺赤ナド皆濕熱肝要ノ目アテナリサラニ可考脉也

羌活　甘草炙　黃芩　茵蔯酒炒各等　人參　苦參酒洗　升麻　多汗易黃耆　葛根　蒼朮柱技　歸身各六分　白朮姜炒　防風下腫易猪苓　澤瀉　知母疼煩易黃柏　各八分　生姜一片　水煎熱服無時

此濕熱疼腫之聖方若不赤不腫痛上不發為寒濕禁用此方蘭室秘藏腰痛門ノ下ニ在テ其方下ニ云治濕熱之為病肩背沉重四節疼痛胸膈不利云々濕熱遍身ニ走リ腫レテ骨節熱痛ニ別ノ肩背沉重ナルカ或足腫疼痛スルニ用ル藥ナリ方後ニ

此方ヲ用ル肝要ヲ挙ル圏点アリ畢竟疼腰ノ二字ガ此方ノ的候腫痛スル上ヲ手ニテ按メ三テ必挽ス不挽モノハ寒湿ナリ方意大抵去湿燥湿泄濕清熱ノ其ナリ呉氏方考ニ載ストイヘ尼脚気門ニ攝入ス東垣脚氣ニ用ラレタハ羌活導滯湯ヲ用テ後ニ此方ヲ用ヨトナリ然ルニ呉氏ハ始ヨリ此方ヲ用ヨトアレバ方考モ意得難クレバ此ニ不載多味ナレバ一味ヅヽ吟味スルニ不及蘭室秘藏或拔萃方ナレバ經驗ノ方ト意得ベシ

此方他病活用例

脚氣脚氣初發一身盡ク痛三或四節腫レ便溺阻隔コレ屬湿熱先ツ羌活導滯湯ヲ以テ導之續ニ以此方除之肩背痛湿挾相搏千肩背沉重ニメ痛ム此方主之膝痛百骨節湿挾ニ因テ沉重ニメ痛ム二此方主之

黄芩　黄連　山梔
蒼朮　青皮　龍膽各等分

右煎服○殼疸加三稜莪朮陳皮砂仁神麯○身熱加柴胡○小水短赤加黄柏○大便實加大黄○胸膈飽悶加蓮蔔麥芽○飲酒人加括蔞仁葛根○虚弱人加人參○按治黄疸之主方也呉氏方考五疸門ニ入テ丹溪治黄疸ノ方ト有テ方名ナシ○湿熱ノ黄疸ヲ治スルトアリ芩連梔子龍膽去湿猪苓澤瀉泄湿茵蔯ハ湿ト熱トヲ兼治ス蒼朮燥湿青皮破滯更ニ加減ノ方ヲ考

用ベシ加減ノ方ハ本症黄疸ノ加減ナリ

茵蔯蒿湯 百七十 治濕搏發黄便秘脈実
五寒 二

茵蔯蒿 三兩　梔子 五枚 擘　大黄 二兩

右三味水煎搏服微利 大便 黄水去為度未去 黄水 越三日再服

○按茵蔯蒿湯其旨方全在通利水道 小便 不得不借幽門 幽門ヲ通利セ子バナラヌソレ故ニ大便秘シ脈實ト云ガ的候ナリ方後意デ大黄ハ鬱導ノタメナリ

此方濕熱黄疸ニ用ユ大便秘シ脈實ト云ガ的候ナリ方後意ハ此方所詮水道ヲ通利スル茶ニテ大黄アリトイヘ圧下剤ナイン水道ヲ通利スルハ幽門ヲモ借リヌト云ヒハナイソレ

チ鬱導ノタメニ大黄ハヲ用ルナリ

茵蔯五苓散 百七十 即五苓散加茵蔯ヲ
六 金匱

此方金匱ノ本方ハ茵蔯十分五苓散五分合用メ濕熱黄疸ヲ治スル吳氏方考ニハ茵蔯梔子澤瀉茯苓白朮各等分挂心許分兩大ニ異ナリ医通ヲ按スルニ五苓散加茵蔯トアリ未久金匱ノ如ク二茵蔯五苓散トチキニ名ハ立ヌ然レハ茵蔯五苓散ト五苓散加茵蔯トハ同シヤウナコニシモ濕熱黄疸ヲ治スル症ニ因テ○按ニテ方ハ各別ノ方ト意得ベシ何黄ニ小便不利ノ渇スル者ハ五苓散加茵蔯ニ云

桂苓甘露飲 百七十 即五苓散加寒水石石膏滑石
此方濕熱甚久煩渴小便不利モノ用之吳氏方考暑門ニ入ル曰ク
河澗此方實治濕熱之簡捷張子和加人參甘草者ハ其脈虛スル
ニ因テ也加乾葛者ハ其暑渴ヲ治スル也加木香者ハ其濕氣ヲ
化スルナリ

此方他病活用例

吐血咯血暑天ニ在リ口渴面垢キ頭暈乾嘔ニハ五苓散或此湯
ニ井ニ加麥門五味子鞕節汁ニ

經驗白朮酒 百七十八摘要 治中濕遍身疼痛不能轉側及皮肉痛難堪者
白朮 去蘆 細切無灰酒一盞半煎至一盞温服

此方和書方書摘要ニ出タリ面白キ方ナリ不能轉側及ビ皮肉
痛タヘガタキ者ト云フガ目的ナリ此一兩ハ四ヌナルベシ

二妙散 丹溪百七十九 濕熱腰膝痛者主之
蒼朮 黄檗 等分爲末空心酒服三錢
乳濕一宿 蒼朮泔浸七日

吳山甫曰濕性潤下病則下體受之故腰膝病然濕未嘗痛積久
而鞕濕相搏然後痛此方用蒼朮以燥濕黄柏以去鞕又黄柏
有從治菜寒ヲ用テ病ノ鞕ヲ治シ菜挺ヲ用テ病ノ寒ヲ治スルヲ從治ト云之妙蒼朮有健脾之
功一正蒼朮一從黄柏奇正之道也

丹溪此方治腰脚骨疼痛濕挾二因ル者ナレバ痛ガ主ナル程ニ痺
症ノ茶ナレド此方元來東垣ノ説ニ蒼朮ハ治痿ノ要茶ト
云カラ思付タ方ナレバ痿門ニ摂入スルナリ勿論痺症濕挾ニ
因ル者ニ用ベシ方下方後ラ見ヨ鬼角痛ヲ目當トスルナリ匝
通云肥盛蒼黒ノ人足膝攣転筋ト濕挾ニ風ス濳行散ニ妙散ヲ受
医学正儀云二味皆勇壮ノ氣表実気実ノ者ハ酒少許ヲ加テ佐
之有氣加氣茶血虚ニハ加血茶痛甚キ者ハ加生姜汁ヲ煖服ス

此方他病活用例

痺 吳氏方考云濕挾作痛者上下ニ拘ラズ此方主之 腰膝痛 又云
濕熱腰膝痛者此方主之 麻木 濕挾下流兩脚麻木或如火燎此方
加牛膝為丸 陰汗 陰間汗アリ下焦濕挾ニ属ス龍膽瀉肝湯加風
茶一二味風能ク濕勝ツ或當歸龍會丸及ヒ此散倶ニ效アリ

劉坤窓方 百八 治泄瀉如神

蒼朮炒三錢 陳皮去白 防風 各一錢

右糊丸如菜豆大○久泄加升麻六分

此方泄瀉ノ妙方ナリ煎茶デ思フ様ニナキ片濕瀉ナラバ此丸
茶甚妙ナリ

燥

五味子湯 千金百八十一 治傷燥欬嗽中有血牽引胸脇痛皮膚乾枯

五味 五分 妙研 桔梗 甘草 紫菀茸 續斷 竹茹

桑根皮蜜炒各一錢　生地黃二錢　赤小豆一撮即赤豆之細者

右九味水煎空心服秘旨加白蜜一匙

燥症ノ論中編ニ載スル如シ此方ヨリ通幽湯ニデノ五方千金方ニ出タリ医通ニ方論詳ナリトイヘド此症希ナルユヘ經歷少シ門外ノ揣摩不足論之故ニ不載只方下ノ主治ト病症ヲ引キ合テ考用ベシ

○欬唾中有血此症ウムニ欬ア血アツテ欬血唾血アリ欬スルトキ脇脇ニ引キツリ痛ミ皮膚乾キ枯ルヽハ此病ノ本症ナリ

欬嗽方下ノ如シ

麥門冬湯千金百八十二　治大病後火熱乘肺欬唾有血胸膈脹滿上氣嚥五心煩熱渴而便秘

麥門冬去心二錢　桔梗　桑根皮蜜炙　生夏　生地黃　紫菀茸　竹瀝各一錢　麻黃七分　五味子十粒碎　甘草炙五分　生姜一片

右十一味水煎空心服○醫通曰按千金麥門冬湯即五味子湯中去續斷赤小豆加門冬麻黃生夏生姜而五味子湯專治燥欬方中反用續斷以燥濕麥門冬湯專治火熱乘肺欬唾有血反用麻黃生夏世都莫解其故是以并其方而置之不知致燥之由皆緣經脉阻滯非續斷不能通之欬唾有血是傷寒大病後餘邪蘊

醸為火而乘於肺非麻黄不能開之痰凝氣結津液不行非生真
不能祛之與活人知母麻黄湯和剤救冬花散等立法不殊令人
毎謂生真性燥一切渇家亦血家禁用又謂生真辛温不當與門
冬竹茹寒潤茅同用若尓則金匱麥門冬湯竹葉石膏湯俱不足
法耶

此主治大病後ト云ヲ目當トスベシ是モ救血唾血アツテ胸膈
脹満咽渇大便秘スル症ナリ

救敝 方下ノ如シ

地黄煎 千金百八十三 治風熱心煩救喘便秘脾胃熱壅食不下

生地黄汁 枸杞子汁 二味酒搗各取汁 荆瀝 竹瀝 各半升

真蘇 生姜汁 各一合

大黄酒蒸 梔子 姜汁炒黒 各五銭

人参 天門冬 各一両 白茯苓 八銭

右十一味以後五味為細末
入前六汁内調服方寸匕再服漸加以利為度

此症喘救アツテ大便秘スルヲ目當トスベシ

生地黄煎 千金百八十四 治積熱煩渇日晡轉劇喘救面赤能食便秘

蔵器 知母 茯神 栝蔞根 鮮地骨皮 各二両

石膏四両碎 生地黄汁二升 麥門冬汁 白蜜 各一合 生姜汁二合

竹瀝六合　半

右咬咀以水一斗二升先煮諸茉取汁三升去滓下竹瀝地黄門冬汁緩火煎至四升下煉白蜜姜汁再煎數沸

初服三合日三夜一服加至四合夏月為散收姜汁竹瀝焙乾蜜丸服前膏尤妙○喻嘉言曰此方生液涼血制火撤熬兼擅其長再加人參乃治虚熬之良劑然非能食便秘者斷不可施此症毛大抵前症卜同ノ日晡轉劇卜云ガ目當ナリ

通幽湯千金百八十五　治大便燥結便出堅黑

當皈二錢五分　升麻三分　酯浸桃仁泥一錢　甘草生炙各五分

紅花少許　熬地黄　生地黄各一錢五分

水煎將成用茉汁磨瀝柳五分調入稍熱服

此症大便秘結此方ノ的ナリ

潤燥湯蘭室百八十六

通幽湯加麻仁大黄各一錢

大要前方卜同ジ前方ニ比スレバ峻剤ナリ

清涼飲百八十七　治上焦積熱肺氣不化口舌乾燥

黄連　黄芩　薄荷　黒參　當皈　赤芍茉各一錢五分　甘草炙一錢

水煎入生白蜜一匙熱服大便秘結加酒蒸大黄
此方治肺燥壬治方下ノ如シ四順清涼飲ノ方後ニ詳ナリ

四順清涼飲 一名四順飲 治血熱便秘脉實者 百八十八

當帰　赤芍　甘草　大黄 酒蒸各一錢五分

水煎入生白蜜一匙服○按清涼飲治上焦之燥埶故用薄荷之辛散四順飲主下焦之燥結故用大黄之苦寒功用天淵此某大便秘結ノ某ナリ方下ノ主治血埶ノ二字ヲ目當トスベシ方後ノ論ハ前方ト此方トノ上下ノ燥ニ用ル別辨スルナリ此方他病治用例

小兒腹痛 挾ニ感ジ作痛モノハ面赤ク壯埶ヲ腹煩挾シ口中氣挾ス此湯加ニ青皮枳殻ヲ

小兒外感 小兒傷風裏ニ入ル與傷寒ニ一同但シ傷風ハ能食ヲ為異如シ煩渴大便赤黄者此湯合ニ小柴胡ノ方後ノ論ヲ參考スベシ

滋燥養榮湯 百八十九

治血燥皮膚皺揭筋攣ル枯燥

四物湯去川芎加生地黄秦艽防風黄芩甘草

此方ハ燥在血脉皮膚ノ燥キ甚ク無所恐肝木見レ風症皮膚皺揭シ筋攣リ麻木ニ見レバ中風ニ紛ル、症ナリ秦艽防風ハ治風ノ某ナリ故此湯ヲ用テ治外大補地黄丸ヲ用テ治内ナリ

大補地黄丸方 方外 治精血枯槁燥埶

四物湯去川芎加生地黒參黄柏知母山茱山茱萸枸杞肉蓯蓉蜜丸每服六七十丸空心鹽湯臨臥温酒下ス

繅繰湯百九
十　治三消渇如神
如無繅繰湯却以原蚕蒴繅繰煎湯皆可代之無時飲之大効
此方出本草綱目回春二載之奇方ナリ繅繰湯ハ一ユノ煮汁ナリ無之トキハ二番目ノカヒコノヌケガラヲ煎代之用ルナリ

清燥湯脾胃論百
九十一
黄連　黄柏酒　柴胡各一分　麥門　當皈　生地　甘草炙　猪苓
神麹各三分　人參　茯苓　升麻各三分　橘皮　白朮　澤瀉各五分　葛根一錢五分　五味子九枚
右㕮咀如麻豆大每服半

兩水二盞煎半盞至一盞去滓稍熱空心服
此方六七月ノ間肺金受尅腰以下癈癱ノ兩足タヾくノ行歩不
正者此方主之

生津補血湯回百九
十二　治年少胃脘血燥故塞
當皈　白芍炒　熟地　生地　茯苓各一錢　陳皮　枳實　黄連炒
蘇子　貝母各七分　砂仁　沉香各五分
右剉一劑姜十片棗一枚水煎竹瀝磨沉香同服

回春云年少之人有患腸噎者胃脘血燥不潤便閉塞而食不下也
○友松子曰此方即後當皈養血湯去川芎瓜蔞厚朴香附加生地

縮砂之劑也後方治痰火氣結升而不降此方治胃脘血燥不潤之設某品尋常不須贅丹溪曰血屬陰陰主靜內外兩靜則藏府之火不起而金水二氣滋養陰血自生腸胃津液傳化合宜何噎之有今夫血燥火積痰凝則用此方濟之又曰陳氏曰五膈者憂思氣勞食也嚴氏曰五膈五噎總是七情之氣鬱於胃口而成如此之類各有主方非此二方之能盡矣

此方他病活用例

胸痛百二十方云一人胸痛痰歠不食大便結故與滋陰降火湯不效更以通此湯則能退痰除虛熱得高效不食又云一老僧不食只羨湯茶而挾痰先與香葛湯順和湯大半愈痰熱未退故用此湯全安

當歸養血湯 百九十三

當歸 白芍 熟地 茯苓 各一錢貝母 瓜蔞 枳實 陳皮 厚朴 香附 撫芎 藕子 各七分 沉香 五分 黃連 用吳茱萸炒煮黃用 用連八分

右剉一劑姜一片棗二枚水煎飯後瀝磨沉香調服

此方回春方下ノ主治分二百二十方ノ按友松子評二盡セリ回春二厚朴七分アリ謙云臌噎ノ初起ニ用ル某ナリ食通リカ子或食下リテ胸痛ムヲ目當トレ用ベシ百二十方按ニ加減ノ得高別アリトイヘ氏通用加減ノ用ベシ大抵前方ト同意老少ノ効ト下アリ此肝心ノ意得ナリ右ノ二方通用ノ加減スルコモアリ又二方ノ某味ヲ作意ニヨッテ加減スルコモアリ石室秘録ニ臌證ヲ以テ二向腎虛トナシ六味地黃丸ニ加減シ用ルコア

リ此ハ腎虛血燥ヲ目當トスル此二方ハ血燥痰火ヲ目當トスルナリ○回春云年老之人陰血枯槁痰火氣結升而不降飲食不下者乃成膈噎之病也

○百二十方云按老人痰支形瘦皮膚燥痒無食味大便二三日不行者血虛也此方加減而專可用也若雖壯年而有此證胸痛者膈噎之先兆也亦加減而得宜効

○支松子曰丹溪先生曰膈噎病大率屬血少氣虛有痰有火也蓋陰血枯槁則痰涎凝滯咽喉窒塞食不能下或食下則胃脘當心而痛此皆血少痰凝將成膈噎之明驗也以此方補血豁痰順氣降火則病漸瘳矣然而必用竹瀝二以潤其燥二以清其痰二以降其火用大棗生姜行脾胃津液以和榮氣也○又曰不拘老少血虛之人有些須輕病為醫所誤服香燥太過以致胃血乾結成前症者世多有之亦必以此方潤之或以前方更加

○老医傳云五十餘男一身憔悴痰粘不食胸微痛食則如支足冷脉濇右寸如有物與此湯愈タリ此方ハ回春ナドニモ若人ノ血枯タルニ因テ挾痰ヲ膈症トナルニ用ルトアリ丹溪云譬ハ膈ノ症ハ無水船ニ舟ヲヤルヤウナモノシヤト云此症ハ膈ニテナケレ共膈ニナル下地シヤニ因テ用タリ惣別膈ノ症ハ食ナトヲスレバ痛モノゾ

麻仁丸　寒百九十四

治脾約大便燥結

厚朴　姜汁炒　芍藥　枳實　炒各二錢　大黄四錢　麻仁　杏仁　各半錢

右六味為末煉白蜜丸梧子大飲服五十丸日三服以利為度

此方ハ其人素リ大便燥結スル宿病アッテソレニ外邪客熱ヲ加テ脾約トナルモノ此方ヲ主之脾約者大便秘結也

潤腸丸 脾胃論百九十五

治大腸風燥血秘

麻仁 桃仁別研各一両 羌活 當帰 皂角仁

大黄 緑礬水浸湿紙裹煨 秦艽各半両一作防風

除二仁別研外為細末蜜丸梧子大毎服五十丸食前温酒下○

本方加郁李仁防風名潤燥丸

方下ノ主治ヲ能々會得メ用ベシ血秘ノ二字ヲ目當トスヘシ

猪膽導 寒百九十六

大猪膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中

如一食頃當大便出虚人不可用膽道陳將酒姜陳醬瓜皆可削為導濕熱肥盛痰鬱可用黄瓜根浸濕削之為導此即土瓜根導也當大便出ト云ヘテ本文ナリ虚人不可用ト云ヨリ以下ハ医通ナリ陳醬姜陳醬酢ハ古キ生姜ヤ瓜ノ香ノ物ナリ此ヲ削リ用ベシ簡便ナル方ナリ若シ肥盛ノ人痰甚メ煩悶メ大便秘結スルニハ土瓜根ヲ削リ用ベシ土瓜根ハカラスウリノ根ナリ

蜜煎導 寒百九十七

白蜜七合一味内銅器中微火煎之稍凝如飴狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭鋭大如指長二寸許當熱時急作冷則硬以納穀道中以手急抱欲大便時乃出

傷寒雜病ニ大使閉結ノ其人虛弱下劑ノ用井方タキトキ此方ヲ用ベシ

火攻

伊尹三黃湯 百九十八

黃連 酒煮
黃芩 酒炒
大黃 酒浸等分

倉公名火齊湯 治三焦實熱煩燥便秘

金匱名瀉心湯

麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服麻沸湯者白水空煎鳥

沸如麻也古方惟降火茉用之

此方ノ出處ハ伊尹三黃湯倉公火齊湯トアレドモ倡ニ書ナケレ

ハ如是言傳ヘナリト見ユル金匱ノ瀉心湯ハ大黃二兩黃連黃芩各一兩トアリ此方ハ各等分トアリ分兩異ナリト云ヘドモ茉味同シケレバ同方ト意得テモ不苦サレドモ瀉心湯ハ煎茉ナリ此湯ハ擺茉ナリ扨瀉心湯ノ主治ニ心氣不足トテナガラ茉ハ瀉心湯ト名ク痞ト茉ト相違セリ此間疑アリ方考繩愆云金匱要畧ハ仲景ノ以後晉宋二代唐ヨリ五代ノ間絶テナシ宋仁宗ノ時ニ切レくニナリタル古本出タルヲ林億カ輩修襲メ今ノ本トナレドモ全書ニテハナシ校正ノ誤リモアルベシカヤウノ疑アルハ尤ナリト云ヘリ謙云千金方此方ノ主治ヲ見レバ心氣不定トアリ定ノ字ト書違ヒトミユルサレドモ定ノ字ニシテカラトツクリトスミハセス此等ハ闕疑スベシ然ルニ活人書ニ此湯ヲ丸茉トメ三黃丸ト称ス若シ此方

用タキヿアラバ三黄丸或傷寒論ノ大黄黄連瀉心湯活人ノ黄連解毒湯ノ類ニ加減スレバ此方ハ不用トテモ事ハ不可闕用井方ハ三黄丸ノ下ニ詳ナリ方後ニ古方惟降火茉用之トアリ強ク火ヲ降サントスル片ニ用ル茉ニテ古方ノ茉ナリ今デハアマリ用ザル茉ト見ユルナリ

右五十年前謙齋カ說ナリ當時ハ古方家ニ非ストイヘドモ專ラ用テ即効アルユヘ流行茉トナリテ素人迄モ用覺ヘシナリ故ニ京師ニ黄丸ノ賣茉所々ニアリ發レドモ何レモ起居食事平常ノ如ク立煩ナレバ醫師ニ不議メ焚實ナル症ニ用井テ瀉下スレバ即効アリテ茉ヲ止ムニ三黄湯モ當時醫家專ラ用ト云ヘドモ既ニ平卧ニ及タル病人ハ病ノ初起ヨリ段々治法ノ次第脈腹等ヲ精ク診ノ不用則忽害アリ此茉ノ所詮治諸實熱不解ノ六字可用ノ的候ナリ又瀉スルニ不拘三黄丸或散ナドヲ用テ病根脫ルト意得ヘ或庸醫ナドニ相談メ不絶用テ脚微腫スルアリソレニモ氣ヅカス莊苒ト用ル中ニ忽氣急ヲ發シ難スルヿアリ予屢目擊セリ又恐ルヽ者ハ焚實ノ症ニ医ニ傳染メ其初メ淋病瘡毒痔疾多ク其餘毒アル症或食毒醇酒厚味ノ為ニ濕熱ヲ生ノ脚膝痛ニ或痞レ或上逆頭痛肩背痛ニ起居食事平常ノ如クニメ彼是申分アル者多シ右ノ症ニ用テ多ク効アリ疥癬ノ餘毒モアリ局方主治ノ如ク三焦積熱五藏俱熱即生癰癤瘡瘍トアリコレ癤癰瘡瘍ト局方時代ニ云ヘルモノ今時ノ黴瘡疥癬ノ類ナリ近來繁華ノ地ハ云ニ及ス邊鄙ニテ黴瘡ノ病多シ故ニ三黄湯三黄丸

ヲ用ル症最多シ是治世久シキニヨリ人々酒色ニ昵リ其上
菜餌流行メ食毒多シ故ニ三黄劑流行メ即効アルヿ宜哉然
リト云ヘ𪜈虚實ヲ考ヘ用捨スベシ予一病人ニ久服セシメ
沉痾ヲ治セリ言長ケレ𪜈記之五十餘歳ノ僧右ノ膝ニ癬瘡
ヲ發シ痛痒不常ヿ一年餘服菜數菜千三医ニメ寸効ナシ後
輕粉劑ヲ服シ癬瘡愈タリ其アト白ク粉ノ吹タルヤウニナ
リ雨天ナトニハ痒シ如此ナルヿ半年余ヲ歴テ冬十月ニ至
リ時々右ノ膝ヨリ股ニ至リ搐搦シ或腰背反張シ大便秘結
ス大便通トキハ搐搦反張モ輕シ雖然食事不労気力不衰ノ
寺務スルヿナラズ予種々菜ヲ與シ𪜈無効大柴胡湯承気湯ノ
類モ用ルト云ヘ𪜈少シハ効アルニ似テ脚股搐搦屢發ル十
一月ニ至リ三黄湯ヲ投ス大黄五分芒消連各二分五厘一剤ヲ

劑トメ投之日ニ二貼大便快利メ次第ニ搐搦定ル然シ𪜈劑
ヲ緩メレバ大便秘シ大便秘スレバ又搐搦發ル此癬瘡ノ内
攻スルモノナリ翌年二月ニ至リ此湯ヲ投スルヿ凡二十百貼
餘ニメ快氣シタリ然シ𪜈服菜ヲ止ル片ハ大便結シ水搐搦
アリテ妄行シ難シ故ニ三黄散トシ日ニ方寸匕ツヽ二三度
用ル片ハ大便快利シ三月下旬ニ至リ全ク愈タリ實ニ此病
僧ノ的劑ト三ヘテ散菜アヿリ昔キヲ不覚其後三四年ノ間
一日ニ一度或二日ニ一度此散ヲ懐中メ津液ニテ潤シ用ユ
最初ヨリ曽テ白湯ヲ不用此節全快シタリ然シ𪜈少シニテ
モ秘結スレバ必方寸匕ヲ用ユ去ル戌冬ヨリ寅ノ冬ニ至リ
凡五年モ持菜トメ全愈タリ此三黄ノ久服ヲ記スル所以ハ
症ハ其毒気ノ内ニツケアルカ故不啻ナリ此藥実ノ趣キヲ以テ

諸病ニ活メ用ベシ其即効経験吾人所知ナリ或一應ノ食毒酒毒ナド二此丸此散ヲ投メ一度瀉下メ其痞脱スル如シ其人全体多ク実実ナル者ナリ然ルニ上編ニ云ヘル如ク大黄ノ性アシケレバ速ニ瀉せズ予試ルニ新渡ノ大黄一斤ノ内七八両ナラテハ性好キ品ナレ吟味スベシ此方ノ所詮或藥毒或食毒一切ノ悪瘧ニヨリテ發ヲ生ズル諸痞盡ク此方ヲ主トスベシ○倫倉傳割解曰火齊者煎煮葉劑之通稱云云○又曰韓非子曰病在腸胃火齊之所及也漢書藝文志亦曰辨五苦六辛致水火之齊以通閉解結其所指太博何必一方哉云云圖南子ノ說實ニ千古ノ矇キヲ發ス然レバ倉公ガ火齊湯ハ一切ノ煎湯ヲ云ナリ倉公傳ヲ熟覽メ考ベシ伊尹三黄湯ト同方ニ非ルコトヲ必セリ

金花湯百九十九　治穀毒肉蘊

三黄湯去大黄加黄栢三味等分煎服更加梔子名梔子金花湯大抵黄連解毒湯ト同ク加梔子名梔子金花湯ト云ヘバ即黄連解毒湯ナリ然ルニ黄連解毒湯ハ中比ヨリアノ方ニテハ擺菜ニスル此方ハ煎湯ナリ然ルニ解毒湯モ活人ノ原方ヲ見レハヤハリ煎湯ナリコレ以テ此方ト同事ナリ用并カタ黄連解毒湯ノ下ニ詳ナリ

黄連解毒湯宣明二百　治穀邪內外俱盛

三黄湯去大黄加黄栢山梔等分煎服

嘔吐　煩滿嘔吐或欲作利者加半夏三枚厚朴茯苓各二兩生姜三片火三忘三

焦實火內外皆熱煩渴小便赤口生瘡加連翹芍藥柴胡各等分

狂亂　狂亂喜笑不往者此心火盛先行吐法而後加半夏竹瀝竹葉

姜汁下血　臟毒下血者必在養後多遠血加連翹桃花細辛甘草謂之八寶湯帶下　婦人赤白帶下屬壯盛而有糞熱者合四物湯加倍

黃連芩芍即解毒按清熱之劑也　崩漏　三十餘歲婦人崩漏如湧身熱口渴合四物湯煎湯與粽灰而安　娠娠　又孕婦有前證合四物湯加升麻白朮而安

此方時疫ノ茶ナリ後世用テ雜病ニテ焦實火ヲ治スルノ總司トスルナリ

活人原方黃連解毒湯

治時疫三日已汗解或因飲酒後劇苦煩悶乾嘔咽燥呻吟錯語不得臥　黃連七錢半　黃柏一兩半　黃芩一壹兩　梔子肆枚擘

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎取一盞去滓服未知再服進粥以此漸差外臺云凡大熱盛煩嘔呻吟錯語不得眠皆傳此方諸人用之亦效此直解熱毒除酷熱不必飲酒劇者

此方本疝主用例

一病壯熱無寒汗多心昏嘔逆痞滿等ノ症凉膈散雙解散三黃石膏湯主之○溫疫大便泄瀉此方主之○陽毒發斑如錦紋大便不燥結者此方主之○熱病大渴煩燥背惡寒脉洪者白虎湯合此湯

衄血者加生地黃牡丹皮喘者加瓜蔞根厚朴○痰病腹滿痛或下利清水痛者調胃承氣湯合此湯○痰病譫語用辛温茱萸症イロく出者皆此湯ニ加減スベシ○温病下症備者三乙承氣湯合此湯○温病餘熱不盡者小劑黃芩湯或此湯ニテ調理スベシ○熱病不問風寒濕暑心腹滿痛讝語煩躁咽燥口燥內痰盛ナルニハ何レニテモ調胃承氣湯合此湯是一法也○温病痰毒畜胸膈內懊憹者凉膈散此湯擬用若シ呻吟錯語不得眠者此湯合五苓散○温病時疫痰毒盛脉大腹滿便秘發狂大承氣湯合此湯○温熱病發班錯語心胸痰甚下症未全備者此湯加犀角玄參○熱病發戰慄者白虎湯合此湯○濕熱病煩悶乾嘔者此湯主之○時疫熱極テ厥逆者凉膈散合此湯○時疫四肢厥冷心胸ノ間有熱大便秘者凉膈散此湯可考用○舌中見白胎外微ク黃ナル者ハ必泄瀉スルモ厚ク燥ハ痰盛ンニ津液枯生脉散合此湯○舌紅而中心見淡黑滑ナル者ハ太陽ノ温病ナリ惡寒表症ニハ雙解散合此湯○舌紅色ノ中生紫色瘡者此湯加玄參薄荷○弄舌ハ舌ヲ出シ唇ノ四方鼻ノ下ヲ子ブルハ惡症ナリ此湯加生地黃○舌色紫而其中ニ有紅斑者ハ人參白虎湯或此湯加葛根黃連青黛黑○大頭瘟病ニハ此湯加天花粉

此方他病活用例

火症 丹陽坊云常ニ單方ニ用ルコトナカレ合諸方可用之タトヘハ痰火ニハ合二陳湯血虛ニハ合四物湯氣虛ニハ合四君子湯謙云此方單方ヲ用ルハ片ハ茶味甚キノ嘔噦スルモノナリソレ

故合方ヲ用ルサレ圧擺茉ニメノ用ル片八茉稀クシテ不甚ナリ

同謙云此方實火ヲ瀉スルノ總司ト意得テ一切ノ實熱ニ用ベシ其例甚タ多メ盡ク載セ難シ故畧之只博ク考用ベシ傷寒寸床八属腎牙歯如ク吐者人多ク不覚其為牙血以涼水漱血則止ム少頃又来者是外用緑袍散内服此湯合犀角地黄湯或生地苓連湯下之頭瘟本症二挙ル如ク大頭瘟ノ症燃腫作痛煩渇好飲冷水宜加天花粉以除痰火濕熱腮嚢實火加黄連者合白虎湯○譫語如狂者合辰砂六一散同瘖疹吐血衄血者加炒山梔童便瘄疹七歳男子瘄瘡發熱微渇自利医用木香散加丁香予以出透因自利気弱也所下皆臭滞陳積乃腸胃熱蒸而下也以此湯加白朮與十貼利止瘡出後肌熱手足生瘡瘍與涼剤調

補而愈同按盛者加葛根白芍防風同瘄瘡口鼻失血城者輔胃禁忌加生地大黄輕者黄芩湯同瘄瘡吐瀉濕熱瀉下臭穢者加白朮血衄老医傳云吐血二犀角地黄湯毛ル十七八歳男皮膚如常素嗜酒依病禁止之二十日已前吐血一碗許與犀角地黄湯太半治之至今吐血少許一日二三度頭重上氣飲食并太小便順脉如常此湯合加味瀉白散服之而安同又云前症ノ如ク酒傷ノ吐血ニ用犀黄丸入ル或菌毒ニ用疔又云疔瘡熱甚ニ加玄参升麻獣傷又云鼠咬瘡某急リ十餘日ヲ經毒氣入裏腹痛壯熱汗出狂言用此湯愈

三黄丸二百一局　治諸實熱不解

三黄湯為末煉白蜜丸梧子大每服五十丸空心麻沸湯下

此方三黃湯ヲ蜜丸ニメ用ルナリ蜜ノ味甘ク和ニメ其性和緩ナリ三黃湯ヲ用ンヨリハ此丸ヲ用タガヨシ局方ノ主治ヲ考ヘ用ベシ

局方三黃圓方

治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心脇煩躁不美飲食下焦有熱小便赤澁大便秘結亦藏俱熱即生癰癤瘡瘍及治五般痔瘧蠱門腫痛或下鮮血

黃連去芦 黃芩去芦 大黃煨各十兩

右爲末煉蜜爲圓如梧桐子大每服三十圓漿水下（ミヅヲ）如（モシ）藏府壅實（セバ）加服圓數小兒積熱亦宜服之

此方他病活用例

吐衄 此方本仲景ノ三黃瀉心湯ナリ故心火盛ナル吐血衄血ヲ治スルナリ分兩ハ異ナレドモ三黃湯ノ下ニ丸如ク畢竟同方ト意得テ可ナリ口舌脾熱口甘キ者此丸主之癰瘡結毒瘡毒久シク不愈或ハ結毒ノ症ニ五寶丹ヲ用ルニ人ニ依テ大便甚タ秘結スルコアリ此大劑ノ一味土茯苓湯煙ス故ナリ此圓ヲ一度ニ壹兩ホトヅヽ日ニ三度兼用スベシ此丸モ大便秘結ニ某ヨリ煉蜜ヨシ大黃ハ苓連ニ倍シ用ベシ

三補丸二百二 河澗

治陰火亢極不解

金花湯爲末蜜丸服

主治方下ノ如シ三黃丸ニ比スレバ無大黃有黃柏タバ腎火盛ナル者ニ用ルナリモアレド三黃丸ノヤウニ大便ヲ下ス力ハナシ三黃丸ヨリハ輕キ某ナリ三焦有火

テ咽喉乾燥シ小便赤濇大便微秘スル者宜之

此方他病活用例

脹滿　食肉ヲ多ク腹脹滿者此丸加二香附半夏蒸餅一ニテ丸シ用之

發揆　温痰夜發揆スル二此丸加二芍藥散某トシ用一

嘈雜　嘈雜温痰氣鬱ニヨリテ不レ喜レ食モノハ此丸加二蒼朮倍加香附一

調經　經水去多ク不レ能レ止モノニ此丸加二香附龜板金毛狗脊一

産前　産前姙娠揆アツテ臨月ニ及ブ此丸加二炒香附炒芍藥一蒸餅ニテ丸トシ用○抑熱ニ八此丸ト合二地黄膏一

金花丸二百三　治二積熱不解一

黄連解毒湯為二末蜜丸一服之

此方黄連解毒湯ノ用方ヲ考ヘ用ベシ但シ暴病ニハ解毒湯ヲ用井緩病ニハ宜用二此丸一

瀉青丸二百四　治二肝經實熱大便不通腸風便血陰汗臊臭一

當歸　川芎　梔子炒黒　大黄　羌活　防風　草龍胆各等分

滴水為丸空心茶酒下七八十丸至二百丸一

此方主治方下ノ如シ下血陰汗ヲ目當トスベシ陰汗ハ單丸陰湿ニ汗アルヲ云

此方他病活用例

下血方下ノ如シ血色清ノ鮮ニテ四方ニ走リ出ル此丸或煎湯ト

ナシ一二劑ヲ用テ後逍遙散ニ加黃連羌活防風烏梅陰汗方下ノ如シ中風中風風熱甚ク大便秘結スルモノ令劑ヲ用ル中ニ時々此方ヲ用テ藏府ヲ利シ經脉ヲ通メ可ナリ令劑ト雖相應シタル茅ナリ驚風肝經實熱搖動痰盛ニ發熱大便秘者主之

三黃石膏湯二百五　此湯治陽毒發班身目面黃如塗朱眼珠如欠狂叫欲走六脉洪大燥渴欲死鼻乾面赤齒黃過經不解已成壞證表裏皆熱欲發其汗則埶發汗メモ不退又復下之下劑ヲ用ント欲發其汗則埶不通大便既下頻小便不利亦有錯誤治温病症而成此症者又八九日已經汗下後脉洪數身壯埶掬急沉重欲治其內

裏由表未解欲發散其表則裏熱甚シ医者ウロクメドヒヌヲ趁趕ハクレくスルヲ不知埶在三焦閉塞經絡津液枯竭榮衛不通遂成此症又治汗下後三焦生埶脉洪數譫語不休晝夜喘息鼻時加鈲身目俱黃狂叫欲走者通用此湯治之有神人所不識

石膏面半　黃芩　黃連　黃栢各七錢　山梔擘　麻黃　香豉二合

水二鍾姜三片棗二枚槌法入細茶一撮煎之輕服

此方時疫ノ茅方下甚タ詳ナリ考用ベシ黃連解毒湯加石膏麻

黄豆豉七ノ升醫通時疫門徃々用之畢竟內外挾盛ニメ大便不秘結ニモノニ用ル茉ナリ

三黄巨勝湯二百　六陶　此湯治陽毒發斑狂乱妄言大渴吐喊目赤脉數大便燥實不通上氣喘急舌巻嚢縮難治者權以此湯救之

三黄石膏湯內去麻黄豆豉加大黄芒硝是也　水二鍾煎一鍾去滓温服

片時ニ枚煎之槌法臨服入泥漿地漿水清水二匙調服即安

前方ノ症ニ大便秘結ヲカルモノニ用ル茉ナリ三黄石膏湯ハ大挾ヲ主ヲ制ニメ時疫大熱大實ニ用ル茉ナリ右二方陶節庵ニレ此方ハ大實ヲ主トス故ニ此方ニハ前方ノ去麻黄豆豉加大黄芒硝

三黄梔子豉湯二百七　治熱病時疫頭痛壯熱

三黄湯合梔子豉　千金去黄芩加黄栢

方下ノ如ク時疫頭痛甚キニ用ル茉ナリ

梔子蘗皮湯二百　八寒

梔子　十五枚擘　蘗皮二兩　甘草一兩

右三味以水四升煮取二升半去滓分温再服

此方傷寒論太陽篇ノ方ナリト云ヘドモ畢竟濕挾黄疸ヲ治スル茉ナリ濕熱在裏ニハ茵蔯蒿湯濕挾在表ニハ此湯主之

此方他病活用例

黄疸　發熱小便不利ノ渇スル者此湯主之

大黄黄連瀉心湯　二百九寒　大黄二兩　黄連一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分温再服○麻沸湯者言滾沸如麻也

此湯元來傷寒誤治ニ因テ痞痛トナル者ニ用之傷寒汗ヲ發スベキニ汗ヲ不發ノ反テ下之其後又發汗首尾相違ノ療治ニテ痞痛トナル表未解不可攻裏先ッ表ヲ解スヘシ表ヲ解スルニハ桂枝湯裏ヲ攻ルニハ此湯主之濕熱凝聚ノ痞トナルヲ攻ルニ茅ナリ三黄湯ノ下ト參考スベシ

附記

半夏瀉心湯　半夏半升　黄芩　乾姜　人參各三　黄連一兩

大棗枚十二　甘草三兩

煮取三升温服一升日三服○此方傷寒惡寒發熱アル痞汗出テ表邪去ルト云ヘドモ但心下痞ノ不痛或ハ嘔吐下利スル者此中氣順ラス邪捺心下ニ鬱テ痞滿スルナリ此方捺ヲ瀉シ痞ヲ散シテ水氣ヲ追ヲ若心下痞シ嘔ノ發捺スル者ハ柴胡湯ノ症ナリ又下後心下滿テ鞕ク按之手モ不可近モノハ大陷胸湯ノ症ナリ半夏瀉心湯ノ症ハ發捺汗出テ其捺解スルト云ヘドモ後心下滿テ不痛ノ痞スル者ニ用ベシ乾姜生夏ノ辛以痞ヲ散シ芩連ノ苦寒以捺ニ勝人參甘草大棗ノ甘以扶中氣又一切ノ雜病瀉アリテ心下痞シ或ハ不食或ハ濕瀉暑瀉ノ類利水ノ劑ヲ用井テ其瀉不止者ニ用テ數効アリ此方世人一切心下痞滿スル者ニ其痞ヲ不辨ノ漫ニ用ユル者ハ

甚誤レリ心下痞スルト云ヘドモ大便秘スル者ニハ宜シカラズ又發揆潮揆ナドアルノ症ニハ用ユベカラズ方中乾薑ノ辛揆以テ苓連ノ苦寒ヲ推ト目見エテ揆多キ者ニ用ユル時ハ反テ揆ヲ助テ不宜ナリ惟心下ノ濕熱水氣ヲ去ルト云ヒ目的トスヘシ故ニ酒客ノ病心下痞メ不食スル者ニ用井テ効アリ先ツ虚痞ニハ半夏瀉心湯實痞ニハ三黄瀉心湯ヲ用ユルヿナリ

生姜瀉心湯　生姜四両　甘草三両　人參各三両　乾薑一両　黄連一両　黄芩三両　半夏半升　大棗十二枚

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

○此方其人素ヨリ胃氣虚メ兼テ服下ニ水氣アリ此誤リ下レテ餘揆虚ニ乘メ裏ニ入テ胃中和セズ穀気不和故ニ心下痞鞕乾嘔ノ食ノ臭ヲ惡ミ鳴レテ下利スルナリ主トシテ生姜瀉心湯ヲ以テスルモノハ其意水氣ヲ散ズルニアリ先ハ嘔多キモノニ用ユルナリ因テ生姜四両ヲ加フルモノナリ此仲景ノ処ニメ両目違ヌト云モノ論ズルニ足ラズ

甘草瀉心湯　甘草四両　黄芩三両　半夏半升　乾薑各三両　大棗十二枚

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

○此方本傷寒中風誤リ下レテ其人下利日久不止日夜數行ニメ穀不化腹中雷鳴メ心下痞鞕ニ或ハ滿或ハ乾嘔心煩シテ安カラザルナリ此火揆上ニアツテ下水ニ交リヲ得ズ

故ニ心煩ノ不安ナリ医心下ノ痞ヲ見テ病不尽トシテ復下之因テ下ルモノ益上リテ其痞益甚シ此攻結ニアラズ又寒結ニモ非ズ誤リ下スニヨツテ中氣虚ノ邪氣上逆シテ痞ヲナスモノナリ故ニ甘草瀉心湯以テ其急ヲ緩クメ中ヲ和スルナリ方甘草ヲ以テ名トスルモノハ和緩ノ意ニ取ルモノナリ甘草大棗ノ甘中氣ノ虚ヲ助ケテ急ヲ緩クス半夏ノ辛逆ヲ降シ嘔ヲ止メ芩連ノ苦寒痞熱ヲサリ乾姜ノ温痞中ノ水寒ヲ散ス故ニ此方中ヲ緩クシ逆ヲ降シ痞ヲ通シ煩ヲ除ク寒熱并ベ用井テ上逆ヲ下スト云ガ此方ノ主意ニメ人参ヲ去ルハ氣ノ上逆ニ害アレバナリ○此方半夏瀉心湯生姜瀉心湯小半夏湯等ノ嘔ヲ止ルノ劑ヲ用ユトイヘドモ反テ嘔甚シクメ不止モノハ此中氣虚ノ上逆スルモノナリ故ニ甘草ヲ以其急ヲ緩クシ上逆ヲ降サシムルナリ是以効アリ後世ニ実等ノ加味ノ場ニ此湯必至ト即効アリ

私云右附記ニ瀉心湯ノ方意ハ近来古方家中ノ人精シク考ヘ經驗ノ的説ナリ

附子瀉心湯ニ百十寒　大黄二両　黄連　黄芩　附子一枚炮別煮取汁

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞出滓内附子汁八分温再服

此又治痞ノ茶ナリ傷寒脉浮緊ナルハ發汗ベキニ反テ下之痞ヲナル心下痞ノ悪寒スルモノニ此方主之此痞濕熱上ニアリ

陳寒下ニ在テ寒塊ヘタヾクニナル症ユヘ此方ヲ用ル上ノ前方ニ加黄芩附子モノナリ大寒葉ノ中ニ大熱ノ品ヲ加ヘ尋常ノ方ニアラズ能々考ベシ

此方他病活用例

脇痛傷寒搏結ノ症ヲ下スニハ大黄芒硝ノ様ナ寒葉ヲ以テ下スベキニ巴豆ノ様ナ熱葉ヲ以テ下ス程ニ腹ガ強ク痛ムニ此湯主之○私云後世傷寒誤下ノ症ハ無シト云ヘド雑病ノ熱結ノ症ニ當時新渡ノ大黄瀉下ノ効ナキニヨリ紫圓梅肉丸ノ巴豆入ノ熱葉ニテ瀉下スルコト流行セリタトヘバ痔痛ナドニ大黄ノ効ナキユヘ巴豆ニテ下スユヘ大塊葉ナレバ下後葉毒ニテ仕モツレルコトタヾレ大黄ノ即利近來医師ハ勿論葉肆ニテモ他國ニハ取扱フ者不案内ナリ錦紋ノ大黄ハ壹斤ノ内壹分ハ有カ無シ隨分吟味スベシ古方家ノ医中モ大黄ノ吟味不案内ニヘ其効ナシ故ニ近來巴豆入ノ丸專ラ行レルナリ予數目撃セリ故ニ雑病熱結ノ症ニ誤下ニテ仕モツレルコトアリ考ヘシタトヒ萬病一毒ヨリ生ズルニ為テカラ其毒大黄ニテ下ス症モアリ巴豆ニテ下ス症モアリ何デモ可デモ紫圓トハ仲景先生ノコノキ玉ヘ手前ハ扁鵲ガ流ナリトハ捧腹ニ堪タリ

既濟解毒湯二百十一東垣　治上拠下寒大便秘

三黄湯加甘草桔梗柴胡升麻連翹當歸

此方上熱下寒上便秘結スル者ニ用ル之蓋シ上熱下寒ノ症大抵既濟湯ヲ用ルナリ既濟湯ハ竹葉石膏湯ニ加ルニ熟附子モノナリ此方ハ其上ニ大便秘結スル者ニ用ルナリフレデ三黄湯ニ加

味ノ名既濟解毒湯令此書ニ大頭病ニ入ルハナゼナレバ此方元來東垣ノ制方ニテ「老人酒病ニ因テ頭面耳ノ前後赤腫痛胸中煩悶咽喉不利身半以下寒ヘ別シテ足脛ノ寒ヘ甚シ飲食減少困倦體痛ム謙云此症大頭病ニメ病因ハ風換ニテハ無メ酒換ナリ東垣治之頭腫ノ上ヲ砭メ血ヲ取リ氣海三里ニ灸ス謙云此療治至極尤ナリ其後此方ヲ制メ用井ラレタリ謙云病人元來換實ノ者ト見エルナリ此療治甚タヨキ療治ナレ共今時頭カラ血ヲ取ルヤウナコトハシレラレヌ私云近來刺絡ノ術行ル甚タ益アリ享保中其事未タ無シ若シ大頭病ニメ元來温疫デモ無ク凡換ニモ不因メ酒毒デ腫ルヽカ他ノ病デ頭腫レテ上換甚シク赤腫メ腰以下寒ヘ大便秘結スルナラバ此湯ヲ用テ下部ニ灸ヲスベシ此茶ヲタバト上換下寒ノ藥ト意得ルハアシ

上換下寒ノ茶ニハ品ニヨリテ温補ノ藥ヲ用ルコトモアリ此方ハタベ上焦ノ實換頭面赤腫レ下焦寒ヘ大便却テ秘結スルモノニ用ル藥ト意得ベシ

龍膽瀉肝湯 十便良方二百十二 治膽癉癰

柴胡一錢 黄芩七分炒 五味子九粒 甘草生 山梔炒黒 知母去毛炒 天門 麥門 黄連炒 人參 龍膽各五分

每服五錢水鍾半煎七分不拘時○吳氏曰謀慮不決肝熱膽溢口苦換盛者此方主之

此方謀慮不決肝膽換盛ニ口苦ノ酸キ者此方主之 徐春甫云謀

鶴巣堂藏

慮不決肝膽虛ノ口苦キ者ニハ人參茯神遠志ヲ君トシ柴胡龍膽ヲ佐トス其キ者ハ六味丸主之

○謙云外ニ加減龍膽瀉肝湯ノ一方アリ世間通用メ本方ノ樣ニ意得十便良方ノ方ヲバ異方ノ樣ニ思ヘ𪜈此書ニ載スル十便良方ノ方ガ本方ナリ

加減龍膽瀉肝湯　治小便澁滯或莖中痛

龍膽　澤瀉各一錢　車前　木通　生地　當皈　黃芩　山梔　甘草各五分

右水煎○按此方治肝經濕熱兩拘腫痛或腹中疼痛ノ○此加減ノ方ヲ東垣ノ用ラレタ症ハ酒濕ニ因テ腹中不和前陰臊臭挾ノ痒キ者ニ用ラレタリ謙云此茉肝經ノ濕挾ニ因テ種々ノ症ヲ生シ脾腎未虛モノ何病ニテモ用ルト意得ベシ

脇痛　肝經ノ濕挾ニ因テ脇脇滿痛小便赤濇ナルニ加減龍膽瀉肝湯ニ去黃芩梔子加生姜淋　小便濇滯或莖中痛ムモノ加減龍膽瀉肝湯主之口病　方後云謀慮不決膽熱口苦キ本方主之便毒　肝經ノ濕熱便毒ヲ生シ兼テ陰莖生瘡ニ加減龍膽瀉肝湯主之

嚢瘡　嚢瘡腫痛小便赤濇發熱渴ヲナス二此湯去柴胡加黃芩施子甘草又嚢瘡挾毒盛ニ腫脹大便秘スル二更ニ加防已連翹赤茯苓大黃右薛氏加減但シ此症モ又虛ニ因テ氣血下溜ノ作ルモノアリ調補升提メ可ナリ瘡口傷レ膿水出バ托裏ノ藥ヲ用ベシ此一方ヲ不可賴懸癰　此症肝經ノ濕熱ニ屬スル者此方主之下疳　下疳肝經ノ濕熱ニ屬メ瘡久ク不愈腐爛スル者加減龍膽瀉肝湯主之然ルニ此症往々屬虛者アリ此一方ヲ不可賴

四逆散 二百十三
甘草 炙
寒 枳實 柴胡 芍藥

右四味各十分搗篩白飲和服方寸匕日三服○咳者加五味子乾姜各五分并主下利悸者加桂枝五分小便不利者加茯苓五分腹中痛者加附子一枚炮令折泄利下重者先以水五升煮薤白三升煮取三升去滓以散三方寸匕內湯中煮取一升半分溫再服

此証傷寒傳經ノ陽邪內陷ノ胸膈中焦ノ陽氣ト不能交通故陽氣四肢ヘ不行四肢厥冷スルナリ此熱厥ナリ溫劑ヲ不可用サレバ腹中痛或大便泄利スレバ承氣ノ類ノ下劑ヲ不可用用柴胡芍藥枳實ハ內滯ノ結塊ヲ破リ甘草補脾胃芍藥散失ノ陰ヲ收ム此少陰否膈和解ノ方ナリ此四逆ハ挾結トイヘド陰進ノ象アレバ寒某ヲ不可用惟用和解之方○加減ノ法字面デキコエルド腹痛加附子ト云ガ不聞ヤウナレド其病人素內有沉寒結滯ノ故加之若挾滯スル片ハ加薤白滌腸垢止下重ナリ

戴氏云傷寒泄利下重其人四逆先以水盞半葱白二根煎一盞去葱煎此散至七分

此方雜病活用例

痢 此方痢病邪氣內挾裏急後重ヲ治スルノ總司トノ加減ヲ用ベシ

芍藥湯 二百十四
保命 行血調氣經曰溲而便膿氣行而血止行血則

便膿自愈調氣則後重自除

芍藥一兩 當皈 黃連 黃芩 各半兩 檳榔 木香 甘草二錢炒 官桂二錢半 大黃三錢

右㕮咀每服半兩水二盞煎至一盞食後溫服清如血痢則漸加大黃如汗後臟盡加黃蘗半兩依前服

劉河澗ノ製ナリ行血調氣ノ方ニノ方下ニ云如クナレヒ專ラ濕熱ヲ除クヲ主トス故ニ初病熱壯實ノ者後重甚ク難通ヲ目的トス聊カ可ト虛者勿用

芩連芍茱湯二百十五 治瀉痢腹痛後重或溫毒下血身熱久而不愈及膿血稠粘者 當皈 芍藥 黃芩 黃連 各二錢 木香 甘草炙 各一錢

右水煎服○按當皈芍藥調血和血黃芩黃連退熱清腸木香行氣甘草和中此血痢腹痛後重除腸清則溫毒膿血止丹陽坊用之口訣有三老人虛人痢疾雖有裏急後重腹痛難疑輕擊者用之其一也雖少壯病邪不甚者或行輕擊而病邪漸輕欲用補劑則猶恐補住者用之其二也或因濕熱而便血下血者加地榆槐花用之其三也

此方濕熱赤白下痢腹痛裏急後重少年者宜用之丹陽坊云老人虛人裏急後重腹痛アリトイヘヒ難攻擊者ハ此湯ヲ用ユト云ヘリ謙按二此方ヲ用テ濕熱ヲ解スル片ハ積滯自ラ去ル道理

痢

芩連芍藥湯 二百十六 名醫雜著 黃芩炒二錢半 黃連炒一錢半 芍藥炒二錢 已上三味痢疾必用之藥 木香 枳殼炒各一錢半 檳榔一錢 炙甘草三分 右水煎○若腹痛加當歸二錢半 縮砂一錢 再加木香芍藥各五分○若後重加滑石炒一錢半 再加枳殼檳榔各五分 芍藥生用 再加五分黃芩條用 白朮茯苓滑石炒 陳皮各一錢 初欲下之實者亦加五分○若白痢加白朮茯苓滑石炒 陳皮各一錢 初欲下之再加大黃五錢 兼食積加山查子枳實各一錢○若紅痢加當歸川芎桃仁各一錢半 初欲下之再加大黃五錢○若紅白相雜加當歸川芎桃仁各一錢半 以理血滑石陳皮蒼朮各一錢半 以理氣有食積亦加山查枳實各一錢半○若白痢久胃弱氣虛或下後未愈減芩連芍藥各一錢半 黃耆茯苓陳皮各一錢 縮砂五分 去檳榔枳殼再加炙乾薑五分○若紅痢久胃弱血虛或下後未愈減芩連各五分 加當歸川芎熟地黃阿膠珠陳皮各一錢 白朮一錢半○若色赤黑相雜濕勝也及小便赤澁短少加木通澤瀉茯苓各一錢 山梔炒五分 以分利之○若血痢加當歸川芎生地桃仁炒槐花各一錢 久不愈減芩連各七分 去檳榔枳殼再加阿膠珠炒側柏葉各一錢半 炒黑乾薑一錢 白朮一錢半 陳

皮一錢○若痢已久而後重不去此大腸墜下去檳榔枳殼用條實
黃芩加升麻一錢以升提之○若嘔吐食不得下加輭石膏一錢半陳
皮一錢山梔炒五分入生姜汁緩呷之以瀉胃火○有一樣氣血虛
而痢者用四物湯加入參白朮陳皮黃連黃芩阿膠之類以補之
而痢自止○有一樣寒痢用黃連木香酒炒芍藥當歸炒乾姜縮
砂厚朴肉桂之類○若得痢而誤服溫澁止瀉之藥則雖稍久亦
宜用前方以下之下後方調之○若得痢便用前正法下之而未
愈又用前調理法治之而久不愈此屬虛寒而滑脫可於前虛補
寒溫二條擇用更加龍骨赤石脂罌粟殼烏梅肉炒等收澁之菜
方下ノ論ニテ痢病通論大要盡セリ方後ノ加減宜考用究メテ
良法ナリ常ニ熟覽メ胸臆ノ中ニアルヤハ此症ノ治法ニ於テ
明白ナルベシ

左金丸二百十七
丹溪

黃連六兩
吳茱萸一兩
湯泡

右二味同炒為末神麯糊丸如桐子大每服三四十丸白湯下

此方肝經火實左脇滿痛スル者主之此症脇痛ンテ胸ニ引テ痛
ミ或脇痛ンデ欬嗽シ或泄瀉ヲ兼ルコアリ或眩暈嘈雜ヲ兼ル
或嘔噦逆ヲ兼ルコアリ或眼赤ク或筋惕ルヤ或吐血狂乱スルコアリ
皆肝火ノ為ス處ナリ此丸主之

此方他病活用例

瞞噎 瞞噎火ニ因ル者此方主之名曰令丸痢挼痢兼テ胸脇痛ノ者此方主之即チ香連丸ノ意ナリ

當皈龍薈丸二百十八 當歸 龍膽 梔子 黃連 錢仲陽 黃蘗 黃芩 各一兩 木香一錢 麝香五分 大黃酒浸青黛 蘆薈 各五錢

右爲細末煉蜜丸如小豆大每服二十二十粒生姜湯下小兒如麻子大服忌發揆諸物云後人加柴胡五錢青皮一兩以神麴麥糊爲丸乃平肝瀉火之計較也

此方錢氏小兒驚風發搐ノタメニ設ル葉ナリサレバ此方ハ肝火ヲ目的ニメ用レハ種々ノ用カタアルベシレサレバ近ク意得ルナレバ怒氣ニ因テ起ル所ノ諸病脉實數ノ者ニハ何病ニテモ此方ヲ用ベシ

瀉黃散 二百十九 錢仲陽 藿香 二錢 山梔 一兩 炒黑 石膏 五錢 甘草 三兩 防風 四兩

右剉同蜜酒微炒香爲末每服一錢至二錢水一盞煎至五分溫服清汁無時

此方小兒木舌吐舌ニ用ル葉ナリ木舌ハ舌硬メ不柔是脾經ノ實熱ナリ吐舌ハ舌舒長スルナリ是心胸ノ積熱ナリ俱ニ此方主之弄舌ト云アリ舌ノサキ少シ見メ即入ル是心脾ノ虛ナリ補脾散主之人參白朮各一錢芍葉茯苓各八分陳皮川芎各六分

黄耆當歸甘草各四分生姜水煎

香連丸二百二十　治冷挾不調下痢赤白膿血相雜裏急後重

黄連四両吳茱萸　木香一両

湯潤過炒

右為細末醋煮麵糊為丸

如梧子大每服二十丸空心米湯下○噤口痢加石蓮肉二両

此方痢病二用ル二痢病サレテ冷痢ヒミヘズ挾痢ヒカタヅカズ大毒痢ニテモナレ或危重ノ症ニテモナクバ煎湯ニ此丸ヲ兼用ルカヨキ療治ナリ腹痛或後重ニ用テ甚タ効アリ煎湯ハ寒挾虚實ヲ見分テ主方ヲ設クベシ

局方大香連圓　治丈夫婦人腸胃虚弱冷挾不調泄瀉煩渇米穀不化腹脹腸鳴胸膈痞悶脇肋脹滿或下痢膿血重表急後重

夜起頻併不思飲食或小便不利肢體倦怠漸即瘦弱

木香四両八錢八分

右為細末醋糊為圓如梧子大每服二十丸

食前日進三二十服

○朱丹溪治噤口痢加石蓮肉○劉河澗治久痢加龍骨○錢氏治小兒冷挾痢加煨薑詞子肉又治小兒瀉痢加煨葛肉豆蔻○王氏治痢渴加烏梅肉以阿膠化和為丸○易簡方粟米飯丸○李兵部治痢久冷者以煨葱搗和丸之

白頭翁湯　二百廿一

寒

白頭翁二両　黄連　黄蘗　蒙皮各三両

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈更服○厥陰熱

利下重渴欲飲水者陰虛生燥也故宜苦寒之劑治之不可作陽虛而用溫劑也所以用白頭翁以升木氣之下陷秦皮以堅肝腎之滑脫連蘗以泄腸胃之濕熱較少陰證便膿血桃花湯之用乾姜迥乎角立也蓋少陰之水氣下奔雖為熱邪故可用從治之法厥陰之風氣摧拔木火騰々內動是以不可復用辛溫鼓激其勢也此方八本論ニイロく云テアレド挾利下重スル者ニ用ル菜ト意得ベシソレヂ全體ニハ下利ノ菜トスル今時剃ニ可用菜也

此方雜病活用例

剃 一種陰虛剃疾切戒攻積之藥凡見剃下五色膿血稠粘滑泄無度發煩渴腑十急痛至夜轉劇而惡食或下鮮血者便屬陰虛忽

宜救挽存陰為主如驢車丸阿膠丸皆連丸千金黃連阿膠湯白頭翁加甘草阿膠湯等選用

瀉白散二百九二錢仲陽

治肺熱欬嗽手足心熱

桑白皮 姜汁和蜜炙 各一兩　地骨皮 各度 甘草 炙五錢

為散每服四五錢入粳米百粒竹葉一把水煎服加橘紅桔梗名加味瀉白散有熱更加知母黃芩如有寒邪禁用醫通曰或問地骨皮三焦氣分藥瀉白用之何義答言三焦屬腎實則瀉其子也門人曰唯吾道一以貫之

此方肺熱ノ喘急ニ用ル薬ナリ粳米必不可欠用ベシ

此方他病活用例

欬嗽方下ノ主治ノ如シ方後ノ加味ハ欬嗽ニ用ル片ノ論ナリ畢竟地骨皮ハ腎火ヲ瀉スル薬ナリ腎火ヲ瀉スレバ肺ノ子ヲ瀉スル程ニ母ノ肺ヲ瀉スル意ニ落ル故ニ名瀉白散同李挺云五更ノ時欬多ク痰少キハ食積痰熱肺中ニ流ル、ナリ此方加知母同又云火欬久キ者ハ痰ナシ此方加桔梗閉之労症又云捻労小便不利ニ加銀柴胡秦艽桔梗木通澤瀉當歸木香小便利メ病去ルナリ火症呉氏方考火門ニ入ル入門云悲哀ノ火肺ニ起レバ氣逆膸聳加黄芩蔓

東垣瀉白散 東垣 二百廿三 治陰氣在下陽氣在上欬嗽嘔吐喘急

桑白皮一両 地骨皮七銭 人参 五味子 陳皮 青皮 各五銭 茯苓三銭

右入粳米一撮煎服〇百二十方云按治虚症久嗽之方也用滋陰降火湯而此症ヒト陰虚火動ノ症ニテアルユヘ肺氣弥虚則與此湯有奇効欬血婦人久嗽不已有欬血而不食脉無力雖清欬湯失血門之證而肺無火邪故用此湯而全愈〇此症與上葉枳實湯則却為吐血慎之上葉枳實湯ノ症トハ素リ雲泥ノ違ナリサヤウナ誤治ヲスルナレバ吐血モスルハヅ何ヤウノコトガ出來テコウヤラ知レヌ

此方方下ノ主治医学綱目云喘ハ陰氣在下陽氣在上諸陽ノ氣浮無所依從故ニ欬上氣喘也謙云陰氣在下陽氣在上下云ハ

喘ノコト覚ヘテ居レバソレデスム此方ノ用方ハ肺熱欬嗽喘ヲ兼テ嘔吐スルモノニ用ル薬ナリ但シ陰虚労嗽ト風寒客邪有テ欬嗽スルニハ宜シカラス勿用畢竟原方ノ瀉白散ニ加ヘ人参茯苓五味子[補虚]加陳皮青皮治痰氣合点ノ製方ナリ

○本邦老医ノ傳ニ仏薬積実湯ノ症ノ虚症ニ用ルト云ヘリ或虚喘ニ用ルコトアリ餘脉皆弱ク右寸ヒトリ有力ニ此方ヲ用ルト云ヘリ意ヲ以テ考用ベシ

寶鑑瀉白散 寶鑑二百廿四

桑白皮 一兩　地骨皮　知母　陳皮　桔梗 各五錢　甘草 各二錢

右煎服

百二十方云按本抵治喘嗽之方也又感冒發熱頭痛後欬痰又不能食尿赤無汗得奇効同又勞欬痰久不止而後成龜胸龜背鷄胸盜汗足冷大便結脉細數與七十餘貼而胸背如常喘止本症常患喘之人因氣鬱發尿赤脉浮數加紫蘇杏仁枳殻茯苓而安羅謙甫當時此方ヲ制表スルハ病ニ臨ンデ方ヲ製シタモノナリ始ヨリ一定ノ方トハ三ヘヌ今デ用ンナラバ肺熱喘急口乾胸膈不利ヒノニ用ベシ

加減瀉白散 準繩二百廿五

桑白皮　桔梗　瓜蔞仁　升麻　半夏　杏仁　地骨皮 各五錢

治欬嗽喘急腸痛胸滿氣促肺經溫熱等症

甘草五分　右㆓姜水煎服○百二十方云按此方治肺火欬嗽要方也

此方欬喘ニ用ル某ナリ肺痰甚シク胸痛喘滿スルモノ主之○右瀉白散四方始ノ原方ハ肺痰喘急ニ用ルヌ欬嗽手足ノ心熱スルニ用ユ第二東垣瀉白散ハ肺熱欬嗽喘ヲ兼テ嘔吐スルモノニ用ル某ナリ第三寶鑑瀉白散ハ肺痰喘嗽ニ用ル某ナリ第四加減瀉白散ハ肺痰欬喘痰甚キニ用ル某ナリ

此方他病活用例

一男子氣積ニ依テ上氣伊豆ノ熱海ニ湯治初メ六七日相應ノ食進ミ氣積快シ然ルニ頻ニ過多ニ因テ気逆シ胸塞痰喘息奄ノ横臥ナラス脉緊實ニメ尺脉虚又足冷膝心ヨリ以上二氣アリテ下ハ虚ス喘促声四隣ニ聞ヘ此場ニ貼ヲ與テ息少シ定リ厥止ニ二貼ニメ平復ス

火

升陽散火湯　二百廿六　本方去獨活加葱白名火鬱湯

東垣

升麻　葛根　獨活　羌活　人參　白芍　各五錢

柴胡八錢　防風三錢五分　生甘草二錢　炙甘草三錢

每眼秤半兩水二盞煎至一盞去粗稍熱服忌寒涼之物及冰水月餘

此一方東垣先生立方ノ本旨卒ニ難解トイヘ𪜈先ツ何ニモセヨ發熱肌熱甚ク手ヲ烙カ如キ者ニ於テ此方ノ痂カ不痂カト云ニ拘ハラス無熱者ニハ一向不與ナリ然ルニ熱ヲ患ル所

因多端ナレハ其所因ヲ精シク吟味セ子ハナラヌ大抵血虛ス
ルキハ咽乾ク故ニ冷物ヲ好テ過食スルユヘ脾胃ノ陽氣ヲ抑
過スルソレヲ升陽ノ劑ヲ用テ火鬱ヲ散スル粗工拠甚キヲ見
テ即苦寒沉降ノ劑ヲ用ユ秋降冬沉春升夏浮此方ハ春夏升浮
ノ葉ナリ

傷寒　六書陶節庵升陽散火湯　此湯治有患人父手肩胸尋衣
摸床譫語昏沉不醒人事俗医不識見病便呼為風証用風葉悞
人死者多矣殊不知肝挾乘於肺金元氣虛不能自主持名曰撮
空証小便利者可治小便不利者不可治

人參　當帰　柴胡　芍薬　黄芩　甘草　白朮　麥門
陳皮　茯神　有發者加姜汁半夏○大便燥實讝語發
渴加大黄泄瀉者加升麻炒白朮　水二鍾姜三片棗一枚擣法

入金銀首飾前之挾眼謙云此症實非傷寒亦非時疫今下所謂
肝挾乘於肺金病而類於時疫傷寒者也
○李挺云此方傷寒撮空ノ症主之此肝挾肺ニ乘シ元氣虛弱不
能主持譫語神昏不省人事ナリ此方本邪老医名撮空散火湯
此方本症主用例
壯年ノ出家三年以來手足心挾気不了々脉弦數四物湯加知
母黄柏不効用此湯愈
此方他病活用例

腹痛　腹痛ニ此湯ヲ用ルハ腹痛ニ去來ガアルナリ炎痛寒痛
ハ痛ニ去來ナシ

大補丸　丹溪
二百廿七　治陰火亢極足膝疼熱不能久立及婦人火鬱

發熱上　厚黃蘗　塩酒拌炒黑色為度　煉白蜜丸梧子大每服二錢空心醇酒下如服之不應每觔加厚肉桂一兩

吳氏方考ヲ按スルニ腎火從臍下起ルモノハ水衰ナリ此方主之或腎火盛ニ足常ニ按着用之是等皆腎火ノ目的ナリ黃柏味苦ノ厚シ陰中ノ陰某ナリ腎經衝逆ノ火ヲ制ス火去ルト水生ス故ニ太補ト云然ルニ單用スベカラズ氣虛ニハ補氣ノ劑ヲ用テ下之血虛ニハ補血ノ劑ヲ用テ下之此丹溪ノ服法ナリ此丸ヲ他病ニ用ルモ又此法ニ依ルベシ

此方他病活用例

痓濕熱陰火盛ニメ痓症トナルモノ主之痓濕熱隊道ニ入テ下身尽ク痛ミ或偏枯トナル是ヲ痛風ト云此丸ヲ散トナレ潛行散ト名ク嘔血嘔血ハ声下焦ヨリ出ヅル此丸主之耳鳴陰火盛ニメ耳鳴聾モノ此丸主之效逆效逆不足者人參白朮湯下此丸

小便閉

滋腎丸　二百廿八　治陰虛大渴小便濇痛捴起足心

大補丸十分　加知母七分　肉桂一分　滴水為丸食前沸湯下二七八十九○丸熱在足心直衝股內而入腹者謂之陰火起於湧泉之下雖熱而不發渴為捴在膀胱此方主之

主治方十ノ如シ咽不渴メ小便閉モノ主之

○東垣先生曰一人病小便不利目睛突出腹脹如鼓膝以上堅硬皮膚欲裂飲食且不下服甘淡滲泄之藥皆不効李曰疾深矣

非精思不能思之一夜曰吾得之矣內經有云勝脫者津液之府必氣化乃能出焉今服淡滲之藥而病益甚者氣不和也啓玄子曰無陽則陰無以生無陰則陽無以化甘淡氣薄皆陽藥獨陽無陰其訣化得乎明白以滋腎丸群陰之劑投之再服而愈

當皈六黃湯 二百廿九 潔古 治盜汗屬陰虛者

當歸 黃耆各一兩 生地黃 熟地黃 黃栢 黃芩 黃連各七分

右煎服

此陰虛盜汗ノ主藥ナリ不得止而輒可用之寒涼損胃ノ藥ナレバナリ○汗石山去黃栢用蒲黃○一方去熟地黃加甘草麻黃根浮麥○赤水玄珠常二加酸棗仁○或曰滋陰降火湯ノ症ニメ焚

甚キ者此方用之○此方ヲ用ヘキ症ニ無疑メ盜汗不止者ニハ正氣湯ヲ用ベシ但シ潤劑ニ宜キモノハ正氣湯ナリ

正氣湯方 黃栢炒 知母炒各一錢五分 甘草炙五分 水煎食遠服

○以上皆陰虛火盛ノ症ナリ若シ傷寒ノ盜汗ハ半表半裏ノ熱不退ニ屬ス此湯ノ症ニ非ス

滋陰降火湯 二百三十回 治陰虛火動發熱欬嗽吐痰喘急盜汗口乾此方與六味地黃丸相兼服之大補虛勞ノ神効アリ

當皈酒洗一錢二分 白芍酒炒一錢三分 生地黃八分 熟地黃炒 天門冬去心 麥門冬去心 白朮各一錢 陳皮七分 黃栢蜜水炒 知母各五分 甘草炙五分

右剉一劑生姜三片大棗一枚水煎臨服入竹瀝童便姜汁少許
同服 本症 骨蒸勞熱者陰虛火動也加地骨皮柴胡如服某數劑熱
不退加炒黑乾姜三分 盜汗 盜汗不止者氣血衰也加黃耆酸棗仁
炒 痰火 痰火欬嗽氣急生痰加桑白皮紫菀片芩竹瀝 欬血 欬嗽痰中
帶血者難治也加片芩牡丹皮阿膠梔子紫菀犀角竹瀝 欬嗽 乾欬
嗽無痰及喉痛生瘡聲啞者難治也加片芩瓜蔞貝母五味子
杏仁桑白皮紫菀梔子 同 欬嗽痰多津液生痰不生血也加貝母
欬冬花桑白皮 咽喉 喉痛生瘡聲音不清或咽乾燥虛火盛也用山

豆根磨水噙之再用吹喉散含噙化丸 方見咽喉門 痰火擁候 痰火作 痰煩燥不安氣隨火升也并痰火壯仲嘈雜加酸
棗仁山梔炒黃連竹茹辰砂竹瀝 痰火驚惕同治 腰痛 血虛腰痛加
牛膝杜仲 痿 血虛脚腿枯細無力痿弱加黃耆牛膝防己杜仲去
天門冬 遺精 夢遺泄精者虛火動也加山藥牡蛎杜仲破故紙牛膝
去天冬 淋濁 小便淋濁加車前龍芻萹蓄牛膝山梔去芍藥 腫痛 陰虛火動小腹痛者加茴香木香少許去麥門冬 足熱 陰虛火盛足
常熱者加山梔牛膝去麥門冬

此方陰虛火動初起脾氣未虛者一旦用之效ヲ取ル其症大抵方下ノ如シ或氣實ノモノト云ヘドモ病後ナドニテ一旦勞症ノヤウニ變スルモノニ用之又病初發ニ非ストイヘドモ氣實モノ陰虛火動ヲ患ルニ醫者アマリ念ガ入リ過テ降火ノ劑ヲ用テ脾胃ヲ傷ランカト恐レテ温補ノ劑ヲ用ヰ友テ病重クナル者ニ此湯ヲ用テ得利アリ本邦ノ老醫回春ヲ貴ンテ虛勞トサヘ云ハ此方ヲ用テ誤ルコト多シ今ノ醫ト云ヘドモ老醫ノ傳ヲ受タル者ハ勞症トサヘミレバ此湯ヲ用ル中比薛己流トヤラン召ビ醫者右ノ弊ヲ撓スギテ此方ヲバスキト用ヌヤウニスル此方モト王節齋ガ明醫雜著ノ補陰瀉火湯ニ加減シタモノナレバ根カラナイ方ニテナレソレホトアレキ方ナラハ薛己ガ刪リスラレソウナモノナレドモ謙云補陰瀉火湯ニ人參ヲ加ヘタリ此不都合ナルコトニテモアルマンサレドモ王節齋ガ雖外ノ人參ギラヒユヘ不用ト見ヘタリ此ニ依テ考ルニ此方モ加減ニヨッテ成程用ヒ樣ノアルベキ菜ナリ元來其症ニ應ジサヘスレバカタノ如ク効アル菜ナリ惣メ此方ニ不限甚タキク菜トソレホドキカヌ菜ガアルモノキク菜ハ活メ他病ニ用テミルニ効多シ去ルニヨッテキク菜ハ自ラ他病ニ用ル例ガ多キモノナリ

○雲林龔氏曰夫虛勞症者自因元氣不足心腎有虧或勞傷氣血或酒色過度漸至眞陰虧損相火隨旺火旺則銷鑠眞陰而爲嗽爲喘爲痰爲涎爲吐血衄血爲盜汗遺精爲上盛下虛腳手心搔皮焦午後怕寒夜間發熱或日夜不退或嘈雜忡嘔噦煩燥胸腹作痛飽悶作瀉疼塊虛驚面白唇紅頭目眩暈腰脊酸疼四肢困倦無力

小水赤色脉來數大或虛細弦急怪症多端犯此難治虛勞不受補者難治候痛生瘡声啞者難治久卧生眼瘡者難治皆是陰虛火動也○丹陽坊云按歸芪生薑二味可以滋陰益血黃柏知母可以滋陰降火動則金衰天門冬門可以救金火盛則氣耗白朮甘草可以養氣陳皮所以消痰利氣也童便何也丹溪曰凡陰虛火動猶燕如燎服藥無益者非童便不能故加竹瀝何也丹溪曰經云陰虛則發熱竹瀝味甘性緩能除陰虛之有大熱者寒而能補與葛蘊寒補義同故加又云竹瀝滑痰非助以善汁不能行故加

○友松子曰古今醫鑑名滋陰降火湯者乃明医雜著之補陰瀉火湯也即本方無麥門有川芎乾姜治色慾症先見潮熱盜汗欬嗽倦怠趨早服之云○又謂王節齋長於補陰瀉火而創制此方尚曰先見潮熱趨早服之其方後曰此病屬火大使多燥須節調飲食勿令泄瀉若胃氣復壞泄瀉則前項寒宗之菜難用矣宜服理脾胃菜又云若見血症涼之止之不應則葛可久十菜神書次第檢用又云救功保後合補陰丸常服之及用葛可久方觀此數條手篤齋亦未嘗全特寒涼之劑以圖退火矣龍雲林既學節齋之方而不悉節齋之法於回春則專恃寒涼用治虛勞加減之菜亦類聚苦寒剋伐元氣之物未知此訣學于何等妖師而殺人不見血耶至於医流依回春作活計者凡見虛勞投症不論藏府陰陽一概妄用直至元陽脫絕亦不回互更用此菜以圖補陰及致菜殺且云用滋陰降火湯而不應乃天命也嗚呼天命有是陰寒殺伐則地上并絕生物耳可哀哉今後用是方者當知節齋立方本旨妬色慾之人先見潮熱盜汗欬嗽則趨早服之若經多日直元受傷則此方禁勿與之

○百二十方按云滋陰降火湯脉細數而無力細弦而數數大而虛

是也眼睛清冷如蕭然有態是也太抵陰虛症譬秋冬之令故顏色青醒眼中清冷惡寒發熱口乾声濁兼以欬嗽故間參藤飲加杏仁五味子以有退其症者若不退當昌此湯參藤飲退表衛之變降火湯清二種營之火豈無辨別而混用哉学者識之

此方他病活用例

喘急陰虛火動喘急二八此湯加蘇子沉香桑白竹瀝藍暈陰虛火動眩暈二八此湯加川芎天麻竹瀝消渴下消八小便如膏此湯去芍藥加天花粉山梔子葛根黃連烏梅濁瀉久虛火赤白濁二八去八加縮砂茴香沉香木香山梔辰砂柿蒂嘔逆膿下ヨリ氣上テ嘔逆スルモノ通二八加豬苓澤瀉木通牛膝吐血吐血ノ後痰アルハ陰虛火動ナリ此湯主之心恍陰虛火動心恍二八加遠志酸棗欬嗽本症ノ欬嗽二八加五味子欬久ノ痰飲本症ノ痰飲二八加貝母瓜蔞盜汗盜汗ハ本症ノ盜汗二八加酸棗仁牡蠣癆勞症後蓐勞脾氣未虛モノ此湯主之積聚陰虛火動積聚アルモノ未虛此湯二合大七氣湯感冒陰虛火動ノ症酒食ト外邪ヲ挾ミ本症ト交リ發スルニ此湯二合藿香正氣散傷寒傷寒大半愈テ陰虛ノ候アルモノ此湯主之同寒熱大半退キ時々譫語不止飲食少ク脉五動餘無力與此湯應ス是其人素リ陰虛スル故ナリ尾抵骨痛小兒尾抵骨痛二此湯加肉桂為引經腰疼腰疼久ク不愈足脛熱スルニ用此湯奇効アリ炙瘡炙瘡血出テ走ルニ此湯主之痛風四十五六歲ノ男体格常色黑ク去年左ノ耳上痛ミ如破大甚キ四五ケ月右邊無効今ニ至リ不愈左膝眼手足腰肩臂共痛右身各無効不堪行歩時ニ胸少痛遇淫雨酷暑トキハ痛甚ク全ク不食得酸味トキ

八食進三脉五動大便順小便順夜必二三度通利此湯主之痢痢病午後ヨリ夜半ニテ十六七行夜半ヨリ日中ニテ二三行裏急後重漸少アルニ此湯ヲ用テ愈タリ惣別痢病去來アリテ諸薬効ナキニ此湯ヲ用テヨキアリ下焦ノ火ヲ瀉スル故ナリ○凡陰虚火炎ニ属スル諸病活メ此方ヲ用テ奇効アリ

清肺湯二百三十二回　治一切欬嗽上焦痰盛ヲ

黄芩一錢半　桔梗　茯苓　陳皮　貝母　桑白皮各一錢　當帰
山梔　天門冬　杏仁　麥門冬各七分　五味子七枚　甘草三分

右剉劑生姜棗子煎食後服○痰咯不出加瓜蔞潤燥枳實降痰竹瀝

清熱去五味子斂忌收○欬嗽喘急加穣子下気竹瀝去桔梗○痰火痰欬嗽面赤身熱咯出紅痰痰血加芥菜生地黄何モ痰血ヲ目的ニスル紫苑阿膠竹瀝去此力害ニモナラ子此去ル多味ニナルユヘ去ル五味杏仁貝母桔梗○又嗽虚汗多者加白朮芍藥生地黄去桔梗貝母杏仁○又嗽喉痛声不清者加薄荷喉痛生地紫苑竹瀝去貝母杏仁五味○嗽而痰湿痰多者加白朮湿痰金沸草去桔梗黄芩杏仁○欬嗽午後至晩發熱者加知母陰虚火動黄柏生地黄芥菜竹瀝去○欬嗽痰結脇痛者加白芥子脇痛ノ主薬瓜蔞枳實砂仁

木香小茴竹瀝姜汁少許去貝母杏仁山梔亦加柴胡引經柴胡ハ少シ陽經而服ヘ引クナリ

肺痰痰嗽ノ症ナリ脈數而無虚候者主之痰嗽ニ三ツアリ痰火ヨリ生スル痰嗽ハ瓜蔞枳實湯主之肺損ヨリ出ル痰嗽ハ二陳湯ニ加減スヘシ主之濕痰ヨリ出ル痰嗽ハ此湯ニ

柴胡湯二百三十二回治肝火盛木氣實或脇痛或氣從左邊起者或目紅腫痛俱肝火也

柴胡　芍薬　川芎　龍膽　當皈　青皮　山梔

連翹各一錢　甘草五分

右剉一劑水煎食後服

方下ノ病候皆肝火ナリ回春云左關脉洪數者肝火ナリ

此方他病活用例

脇痛脇痛肝火盛ナル者此湯主之ノ此湯主之

黄芩湯二百三十三回治肺火熱嗽吐血痰血鼻孔乾燥生瘡或鼻腫痛

黄芩　山梔　桔梗　麥門冬　荆芥　薄荷

芍薬　桑白皮

連翹各三匁　甘草三分

右剉一劑水煎食後服

方下ノ病候皆肺火ナリ回春云右寸脈洪數者ハ肺火ナリ

此方他病活用例

欬嗽肺癆欬嗽此湯主之鼻鼻孔乾燥生瘡或鼻腫痛ヌルモノ此湯主之血血主榮云涼血行血古人方初黃芩湯加鬱金謙云黃芩湯則原方也非回春黃芩湯

清火安神湯二百三十四劑治驚悸癎仲心神慌亂

當歸一錢二分　生地黃酸棗仁炒各一錢　麥門冬一錢　川芎　茯苓酒炒各一錢　黃芩　黃連各八分　山梔子　遠志各七分　甘草二分

右入姜煎服

狂

清慧化痰湯二百三十五治精神不守喜笑不常言語錯亂妄見妄言

登高曷署　南星生薑製　半夏　陳皮　茯苓　黃連　當歸酒洗　生地　川芎　人參　酸棗炒　菖蒲各一錢　甘草二分

右入姜煎服

此狂症ノ一方ナリ痰火ヲ退ケ心肝ヲ補フ劑ナリ

道寺赤散二百三十六錢氏心熱小便黃赤此方主之

癎仲心神慌亂狂症ハ多端ナリ此方ハ血不足氣有餘火升于癎仲不寧症用之ナリ

生地黃　木通　甘草梢等分　右為末水一盞入竹葉同煎至五分食後溫服一本不用甘草用黃芩○局方主治大人小兒心經內虛邪熱相乘煩燥悶亂傳流下經小便赤澁淋澁臍下滿痛

此方心熱小便赤者主之加人參麥門燈心名加味導赤散小便黃赤口乾煩渴不止者宜之

此方他病活用例

小便黃赤方下ノ主治宜考同前症煩渴ヲ加ルモノ加味導赤散主之小便閉熱盛ンニ莖中澁痛者加山梔大黃同上熱者加黃連燈心淋色鮮者心與小腸虛熱也去甘草加黃芩口舌虛熱口瘡糜爛者柴胡地骨皮等分水煎服心胃壅熱水穀不化者此湯合二四芩令散

火鬱湯二百三十七回　治火鬱

山梔　柴胡、乾葛　撫芎　白芍　連翹　地骨各等甘草三分

右剉一劑水煎服

小便赤澁五心煩熱口苦舌乾脉數ナルハ火鬱ノ症也此湯主之

甘梨凝漿二百卅八類篇

甘梨凝水類也生之可平亦府之陽證之可濟五藏之陰實火宜數

實生虛火宜數

生薑ノ服法宜考發症既ニ極テ氣血消耗ドコトモナウ氣分アレキヲ見テ三年ノ中ニ癰疽ヲ病テ可死ト云モノアリ病人數ニ因テ食之豫メ防之他菜ノ非所及毎日食之生梨ナキ片ハ乾梨ヲ以テ湯ニホトバシ食之遂ニ免ルヽヲ得タリ

暍病中暍

白虎湯二百卅九寒　石膏一觔碎　知母六兩　甘草二兩　粳米六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓温服一升日三服

續論ニ諺云世上デ春不服白虎湯為瀉肺也蓋其意春ハ陽気上ニ升ヲ主ルソレニ石膏知母ノ寒降ノ菜ヲ用テ肺ノ春ハ主陽氣上ニ升ヲ石羔知陽氣ヲ瀉ノ生發セザラシムルヲ恐ル春主陽氣上升ヲ石羔知母苦寒降下悪其瀉肺之陽而不得生發也此特ニ此春バカリ白虎湯ヲ不可用ト云ハ春中暍當坐ノ暑氣有氣虚ニ病ヒ氣虚蒸発スル病ナリ有氣虚ニ病ヒ氣虚蒸発スルコトナラズハ加人參不能蒸発者ハ則加人參故ニ張隱菴傷寒集註以為陽明宜劑發散ノ意其於温病ノ作者則加蒼朮白朮ニ虎湯蒼朮温瘧則加桂枝ニ虎湯桂枝一ニ皆皆夏月ノ病ニ用ル夏月所見之證故昔人又八月中氣ノ後ハムサト不用荊也有秋分後不可安用白虎之戒

此方夏月熱病又夏月中暍ノ莖ナリ今此書ハ温熱病時疫一ツニメ主治ヲ立ルナリ熱病ハ悪熱甚ノ無悪寒大渇引飲或身疼ムコトアリ此方主之又夏月天外ノ暴暑ニ傷ラレ中暍ノ病ヲ發ス其症熱病ト全ク同シ熱病ハ脈必盛ナリ中暍ハ脈必虚ス但シ弦細芤遲ナルコモアリ治方ハ同シク此湯ヲ用ルナリ故此湯温熱病時疫暑熱ヲ以テ此湯ノ本症トスルナリ石膏大寒陽明ノ熱ヲ救ヒ知母少陰ノ源ヲ清シ甘草粳米心包絡ヲ護(モッ)テ肺ヲ保ツナリ

此方本症主用例

○中熱脊悪寒スル者ハ人參白虎湯主之 中熱中暍同症也○中熱舌ノ遍(ヘン)紅ニメ中黒ク滑ナルハ人參白虎湯主之○中熱頭痛躁乱不寧或身鍼ニテ如刺(サスガ)ルモノ此熱肉分ヲ傷ル此湯加蒼朮○時疫脈洪長ニメ渇シ大汗出テ未可下者ハ此湯主之○時疫下劑ヲ用テ後脈又浮ナル者ハ可發汗此湯主之○時疫舌上白胎アツテ渇スル者ハ此湯主之○發班未下以前胃熱發班セバ人參白虎湯主之 熱勢盛ナラバ合解毒湯謙云一名化斑湯中暍熱病時疫ニテ發班スルモノ化斑湯ヲ用ヘシ即人參白虎湯ナリ○温熱病熱病暑熱時疫譫語メ面赤キ遺尿スル者ハ此湯主之○温熱病自汗表某ヲ服メ大汗出テ不止煩渇脈洪大此湯主之○温熱病無汗ハ黄耆湯此湯或三黄石膏湯主之○熱病或中暍頭重腹痛スルニハ倶ニ此湯主之○熱病脈洪大自汗舌燥飲水小便不利此湯主之○渇病嘔吐スルハ此湯倶ニ加芦根竹葉○熱病手足厥逆脈滑ナル者ハ此湯主之○熱病懊憹面色忽赤忽不赤煩渇飲水ハ

人參白虎湯主之○痓病眠リカチニテ塞(ふさ)目ト其ノ、眠リ譫語
痓アル者此湯主之○温痓病時疫譫語小便淋瀝眠ルヿ少キ者
ハ此湯加山梔○痓病戰慄ヲ發(おこ)者ハ此湯合黄連解毒湯重表ノ証ア
ル者ハ涼膈散雙解散主之○陽毒ノ症ハ壯痓頭痛躁悶不寧或
狂言鬼語言妄見或膿血ヲ唾シ面ニ發斑ヲ生シ或舌卷キ焦
レ黑ノ鼻煤ケ或咽喉腫痛大便黄赤ヲ下シ脉洪大ニノ數此湯
主之咽痛腫痛ニハ加犀角玄參升麻或犀角玄參升麻甘草四味
各等分煎服

此方他病活用例

瘧鬼瘧又名譚瘧盛暑ノ時發セハ人參白虎湯或桂枝白虎湯主
之嘔吐痞暑月ニ發スル者此湯主之消渴上消ハ舌上赤裂大渴
引飲人參白虎湯主之中消ハ能食而瘦自汗大便硬ク小便數ナ

ル者調胃承氣湯主之淋渴ノ欲飲水モノ人參白虎湯主之積痓
氣分ノ實痓此湯或敗毒散加荆芥青皮白朮

白虎加人參湯三百四　十　寒　石膏一斛　知母六兩　甘草二兩　粳米六合　人參三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓温服一升日三服

白虎湯ノ症ニメ氣弱キ者此方主之故ニ用カタ皆本方ニ入ル
友松子師傳云凡白虎湯之證皆加人參然レバ二方俱ニ皆白虎
加人參湯下意得ベシ今按ニ此人參ノ分兩多少時ニ臨テ差異
アルベシ人參ノ上品下品時ノ宜キニ隨ベシ

此方他病活用例

消渴東垣曰舌上赤裂大渴引飲此高消也調神論云心移熱于肺
傳爲膈消者是也以此湯治之發熱壯男夜發熱證言書則痓不

甚目微赤神如狂溺尿黄赤脉四動少有力此湯主之○此條中編ノ諸痙門ト參考スベシ老医ノ傳ニメ不可解コアリ凡白虎湯ノ症渴甚キ者ハ何レモ人參ヲ加ベシ

如神白虎湯二百四 即白虎湯本方自有加減法 治身熱渴而十一 陶

有汗不解或經汗過渴不解脉來微洪宜用

石膏 知母 甘草 人參 山梔 麥門冬 五味子

水二鍾煮二枚姜一片擣法加淡竹葉十片煎之熱服○心煩者加竹瀝一圓如大渴心煩背惡寒者依本方去山梔加天花粉無渴不可服此菜為大忌

此方陶節庵カ方ナリ何ニモ仔細ハナシ本方ニ加味ノ菜性ヲ緩ルクシタルニテナリソレデ脉來微洪ト云本方ノ脉ハ洪盛ナリ

竹葉石膏湯二百四 十二 鬼

竹葉二把 石膏一斤 半夏半升洗 人參三兩 甘草二兩炙 麥門冬一升去心 粳米半升 右六味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯成去米温服一升日三服

此湯温熱病愈後餘熱有テ煩悶ニ用ル菜ナリ人參白虎湯ニ去知母加半夏麥門冬竹葉病後虚煩ノ氣少餘熱未尽故ニ人參甘草ヲ用テ益氣麥門冬竹葉除虚煩清熱生津液半夏爽飲嘔逆ヲ治ス知母ヲ不用ハ病後ノ餘熱ナレバ熱病最中ト不異

ナリ知母ヲ用テ腎經ニ伏スヲ用ルハ白虎湯ト同シ意味ナリ○加減○氣弱大渴倍人參ヲ○多汗加黃耆○陰虛夜煩加知母燈草生地黃芍藥○嘔吐去石膏ヲ加陳皮茯苓○痰加貝母○泄加白朮澤瀉

此方本症主用例

斑病脉滑而厥逆スルハ陽厥ナリ裏ニ鬱斑アリ表ハ厥冷スルヲ白虎湯或此湯主之○病後不惺々錯誤寒斑疹ニ似タリ煩斑ヲ加麻黃○起居不常虛斑燥渴喘嗽氣乏ス是勞復ナリ此湯去石膏半夏加大棗○農夫田野ニアリ或力役ノ人暴暑ニ傷ラレ頭角額痛發斑大渴引飲脉洪汗大出者急ニ地漿水ヲ作テ葛木白虎湯ヲ煎用ユ若老人衰弱ヲ不可用者ハ此湯ニ加斑附子ヲ但シ平生陰虛多火ノ老人ニテ斑附子難用モノニハ人參白虎湯ニ加竹葉

此方他病活用例

血傷寒或雜病衄血ノ渴シ飲水ヲ水入レバ即吐スルアリ先五苓散ヲ服シ次ニ用此湯霍乱霍乱吐瀉厥逆火氣唇面爪甲皆青六脉俱ニ伏メ酸穢ヲ吐出シ瀉スル所ノ大便甚タ臭ク小便黃赤ナルハ虛寒ノ症ノ様ナレ圧斑厥陰經ニ伏メ斑極リテ陰症ニ似タリ急ニ地漿水ヲ造テ此湯ヲ煎服ス欬嗽上半日欬多キハ有火此湯主之同斑嗽諸藥不効此湯去竹葉入粳米少ク加知母多ク加五味子杏仁此必審ニ是伏斑在上焦心肺間者可用之

異方竹葉石膏湯　治胃實火盛而作渴

竹葉　石膏煅　桔梗　大通　薄荷　甘草各一錢

右水煎服頗生微論云火實則南方必盛以竹葉瀉之火亢則西方必囚以桔梗救之薄荷清其上木通清其下石膏甘草直入戊土而清其中三焦之火皆平則水精上輸于肺水道下輸膀胱燔蒸若掃而津液自克矣

温熱病

竹葉蕎麥湯 二百四十三 微論

竹葉二錢 黄蓍 生地黄 麥門當皈 川芎 甘草 蕎麥 石膏煅 芍藥各一錢 人參

右水煎服○大胃氣虚寒黄甘寒麥門石斛之類皆在禁例禁此云胃虚者其人居恒平生胃虚而又為火邪迫之則水精不能上輸于肺乃為煩渴是非中暑之餘熱即是傷寒之遺害中暑ノ餘熱デハカ様ニ捗ハナイ傷寒ノ遺捗ナリト云謙云傷寒ノ遺捗ト意得ヨ方意ハ書面ノ如シ以竹葉清心用為主劑石膏甘草直入陽明而滌捗黄芩麥冬直入大陰以清燥火甚則血液不栄用地黄苦皈潤澤之品者血主濡之也胃虚則氣道不充用人參黄蓍甘温之品者氣主煦之アタヽムルナリ也芍藥瀉東方安胃土之佐雖言心肺俱治則水精四布五經并行何煩渴之不痊哉

此菜温捗病餘捗ニ用ル菜ナリ竹葉石膏湯モ温捗病ノ餘捗ニ用ル菜ナリ竹葉石膏湯ハ痰逆ヲ主トシ此湯ハ煩渴ヲ主トス

此右他病活用例

瘧疸 龔氏云瘧疸氣血虛ㇾ胃火盛ニ ノ作ㇾ渴ヲ モノ此湯主之

清燥解毒湯 二百四十 四 緒論 治温疫大熱

黄連 酒洗 黄芩 酒洗 白芍 酒洗 生地 人參 各三錢 石膏 鷄子大碎

羌活 知母 各二錢 甘草一錢五分 升麻 葛根 各一錢 生姜二兩 切

右水一斗煮取五升每服一升日三夜二服

此方時疫ノ劑人參白虎湯黄連解毒湯ノ半升麻葛根湯ノ類合方ニシタル某ナリ温熱病時疫熱甚キニ用ユ大便秘スルニ不用大黄芒硝ノ下劑ナケレバナリ只寒涼ノ藥ヲ以テ熱一通リニ用ルナリサレ共大便甚タ不結ハ此方ヲ用テ熱ガ解スレバ自ラ大便モ通スルモノナリソレデ此方ハ熱甚ノ大便モ微シ秘結スルニ用ユ扨ハ下ノ後熱不解ニ用ル藥ト意得ベシ大抵生地黄芩連湯ナドニ類スル方ナリ

括蔞根湯 二百四十五 活人 治風温無大熱而渴

括蔞根一枝 石膏二枝碎 葛根一枝五分 防風 人參 甘草 各五分

右水煎服無時

此方温熱病時疫ニ用ユ前方ト同ク涼解ノ藥ニノ藥品ハ多少ノ意アリ前方ニモ羌活葛根ノ表藥アレハ此方ニモ防風葛根ノ表藥アリ人參石膏ノ涼解ハ何レモ同シ前方ハ大熱ヲ解スルヲ主トシ此方ハ大渴ヲ主トス熱アレバ渴スルモノ渴スレ

バ捷アレ𪜈其中ニ各主トスル所ガ違フ意得ベシ

金鈴子散 二百四十 保命 治熱厥心痛或作或止久不愈
六

金鈴子 即川楝子酒 延胡索 醋炒
煮去皮核 等分

為散毎服三錢温酒調下

此方熱厥ノ心痛ニ用ユ方下ニ所謂或作或止久ク不愈ト云ガ
此方ノ目當ナリ

玉竹飲子 二百四十 緒論 治痰火痰涎湧盛(キニ)欬逆喘滿
七

萎蕤 一名玉竹 三錢 甘草 一錢 桔梗 一錢 橘皮 一錢
茯苓 二錢

紫菀 三錢 貝母 三錢 生姜 同橘皮蜜煎 四枚

右八味長流水煎白蜜二合二服

此方珍キ方ナリ緒論ニ出ツ先輩ノ方ヤラ医通ノ新制ノ方ヤラ未詳痰火盛ニメ喘欬アルニ用ル茶ナリ大抵右ノ症ニハ世間通例括蔞枳實湯ノ類ヲ用ユ此方ハ生姜薤ヲ君茶トメ痰火ノ補剤ナリ欬喘ニハ紫菀貝母ヲ主トメ經驗ノ方ト見エルナリ

麥門冬飲子 二百四十 緒論 治老人津虧大渇
八

生脈散 加茯神甘草枸杞生姜

此方消渇ノ補剤ナリ但シ上消中消ニ專ラ用ル茶下消ハドフ

消渴

デモ六味八味丸ノ類ヲ不用レハ効ナシト意得ベシ

蘭香飲子 二百四十九 蘭室 治消中能食而瘦大渇便秘

白虎湯 去粳米加人參生甘草蘭香防風升麻桔梗連翹半夏白豆蔻

此又前劑ニ比スレバ寒涼ノ品重シ石膏連翹アレバナリ蘭香八脾胃ノ捺ヲ清メ不渇口ノ甘キヲ治スル主薬ナリ防風升麻桔梗八胃中ノ氣ヲ升提シ半夏白豆蔻ハ脾胃ヲ醒スモノナリ

此方當時經驗ノ方ト見ヘテ於今計リ難キ所アリ

甘露飲子 二百五十 緒論 治胃中客熱煩躁口鼻咽痛牙宣口臭

二冬膏加生地熟地菌蔯枳殻黄芩石斛甘草枇杷葉

此モ方下、如ク消渇ノ劑ナリ其中口鼻咽喉、内ニ瘡ノ生レ牙宣風トテ牙齒腫痛シ口臭キヲ目當トスベシ二冬膏ハ天門麥門ノ二味ナリ茵蔯ハ濕捺ヲ去リ生地熟地下焦ヲ補フ三消通治ノ剤ナリサレバ上中消ノ薬ト意得ベシ

心痛

連附六一湯 二百五十一 壽 治胃脘痛甚諸藥不効者

黄連六銭

大附子一枝 製表

姜棗煎稍熱服

此方熱厥ノ心痛通例ノ薬無効ニ用ル薬ナリ

清熱解鬱湯 二百五十二 龔 治心痛即胃脘痛多因氣鬱日久鬱積成熱

而作痛也　山梔子二五半　川芎　枳殻各一　蒼朮　黄連各七分

陳皮　乾姜炒各五分　甘草三分

右入姜煎服服後戒飲食大半日或加香附子一五亦可

此藥鬱攣ノ心痛ヲ治スル良方ナリ惣ノ痛ミ久キ片ハ必鬱攣ヲ生ス乾姜ヲ用テ反佐トスルサレヒ虚分甚キ症ニハ勿用ヒ也

醫療手引草續編二之巻終

每部須認此圖章為證

醫療手引草　二冊　上編

加藤讒齋先生著

此書ハ證ヲ察ノ療治ヲホドコス初學ノ便用ニシテ古方後世方ノ論訣其本方ヲアラハシテ一家方和方妙劑ヲ附シ古今諸名醫ノ說ヲ評撰スルニ國字ヲ以テ通シヤスカラシム實ニ濟世重寶ノ書ナリ

同著　同中編　二冊

蒭端ニ古方家後世方ノ論訣其本方ヲアラハシテ初學ヲ蒭キ次ニ腹診脈法ノ口訣ヲホシ本文ニハ上編ノ病門ヲ再ビ擧テ上篇ニ載セザル諸方ヲコトぐクアゲテモラサズ又病門毎ニ治法藥方ノニッヲ分チ辨別レ安カラシム

同續編　自一至二出来
自三至六未刻
藥方八百餘ヲ撰ミ用藥縱橫ノ論ヲアラハシ病門ヲ立門部中ノ一方毎ニ悉ク主用活用二ツノ例ヲ分チサトス活用トハ其方ヲ他証ニ用ヒ變ニ應ジテハタラカス意得ナリ
又古今老醫先人遺法見聞スルトコロノ方ヲ附スルナリ

同別録　全　二冊
一名和漢経驗方
先生曽テ門弟子ト病門ヲ分チ醫案論證シ和漢古今ノ本方奇方及ビ家方妙劑尤モ治療ニオイテ實事経驗アルモノニシテ空論ナラザルヲアツメ録シ效驗的實ノ方ヲ撰ミタル書ナリ

改正日本輿地路程全圖　水戸長赤水先生著　北極地ヲ出ルノ度數ヲ里程ニ合セ圖面ニ碁局ノ目ヲヒキ曲尺一寸ヲ以テ一里ニアテ山岳江河城地鄉村神社佛閣名勝古跡街道驛亭海路各目標ヲ以テ是ヲ今ツ津ニ浦ク湊ク島ニイタル迄地形方位ヲタヾシ彩色ヲ以テ國界ヲ五色ニ分ツ文化年間ノ再刻アリ新ニ郡界ヲ今ツテ大ニ地名ヲ新増郡分一枚摺折本
増補シテ善美ヲツクス

安永五丙申年

孟夏吉日

皇都書肆　風月莊左衛門
村上勘兵衛
山本長兵衛
梅村三良兵衛

浪華書肆　山本平左衛門
鳥飼市兵衛
島田清兵衛
淺野彌兵衛

烏巢先生著　醫方捷徑　未刻　二冊

傷寒通玄類證　刊行　金匱通玄類證撰註　近刻　一冊

醫療手引草　中編二冊　刊行　病家示訓　增補附錄　刊行　本邦老医傳　一冊

同　下編　嗣出　二冊　方的　的効方附六經證治綱領　各病諸診　刊行　全一冊

同　續編　各門方旨嗣出　全部六冊自三至六嗣出　張氏醫通纂要　全一冊　刊行

同　別錄　一冊　未刻　合刻　治痢經驗　全一冊出來　附和韓人參考　增補刊行

和韓漫考　後編　未刻　附家授切紙傳　一冊　治痢經驗內經金匱論丹水子友松子古考痢疾試効治論等詳記錄之也

六八本草　中山氏片玉本草頭書　和韓人參考　稽若水之論并會韓醫官而正諸參葦語韓參唐參和參品等悉眞僞弁明之也　全二冊

