

讀我書

附南洋治驗

耶斜秘書

禁方錄

全

時遠談我書鏡錄抄

法眼五叔

古法ノ神妙ハ余ヲ俟ナル所ニ余ノ運奇且理
 解セスノ取テ取用ナルト虽之ヲ試テ奇効ヲ
 以テアリ又世人ノ身ヲ慣用ル方ハ其別ニ全
 對スル記アリテ橙鼓影響ノ相忘ル如クナ
 下アリ余カ屢試驗ノ發明スルトニコハ其
 浮文ノ如キ実腫陽水ノ遂致ノ美茲日連用シカ
 ヲリ認事初ナキニ生科リ並服セシメ或ハ大
 シ加用テ其効アリ格各製貴氏ノ如キ十便用ノ
 奇奇氏ヲ用エハキ症ノ地重ク厭フ下アルニ亦
 水煎服セシメテ神ノ如シ其連用ノ如キ靈丸ノ



吐瀉止マズ心脈煩ニスルニ三日脈ヲ連用スル
ニ霍然ヲラス伝テナシ念子日ヤ致傷ノ如キ腸
証ノ食下ラサルニ用テ全愈ハナサレモ一旦
ノ驗ヲ得ルテアルハモト宮河順達ヨリ傳授セ
リ登至日專治ノ如キ瀉藥証ノ羣年愈スメ心下
痛テ瀉水ヲ吐スルニ一是ヲ驗アリ其方ハ曰
ナレモ泥膏セズ寸ノ如ク煎用セムルニ病人
慌服スルテアリ述云山查久リ其病ヲ患テ
動ナカリシニ一人其方ヲ教服セシメテ積病
瘳ナリシヨリ始テ其方ヲ惜リ余モ遂用シテ至
治スルモノ也ナカラス腸以下血ノ症治無効ニ
山查ノ白頭翁湯ヲ用テ奇驗ヲ奏セシテ屢試シ

蓋其妻狂野ニ運リル者豈古方ヲ精熟セザルハ
テシヤ
瀉藥ノ証全愈ヲ得ルテ難シ全長ニハ其証ノ急
ナルニ隨ニ食割ヲ施セシカ曰聖湯ノ如ク及口
者也シ又三因方ノ補脾散ヲ妻盛ニ主トナシ
服セシメテ奇驗ヲ得シトアリ又意外ノ如アリ
又便秘ノ内實スル病人ニハ東洋ノ赤凡性勝
方ニテ早テ佳シ

瀉藥

コロリ

主テノ急瀉藥ニ三日コロリ伝病流行セシトハ
既ニ前録ニ載テリ頃日同窓同リ先法服アル人
ノ隨軍ニシテリトテ一茶ヲ攝シメ贈シリ云其
病寢契之カナリ諸治効ナリ參附ナト却テアシ

傷寒

疔瘰

辰砂一外以膏三外非トナシ密ニテ裏テ一副リ
 一周ニ用エ之ヲ喫ハ蜜壺中ニ於テ小壺中ニ丁
 羊ヲ焚キ紙ニテホヤシカテホヤノ頭ニ穴リテ
 丁煙リシテサシメ病人ノ鼻ト入レシムルニ
 其方余モ曰五人ニ試シ一時ハ咳嗽移ナルト
 アリ狂言驗スヘシ
 余嘗テ一男子ノ傷寒極ヨリ引テ諸語否赤脈
 数ノ力ナリ微下利肌熱ホノ病ニテ胸膈
 セシニ善琴連湯ヲ用テ効リ良ナリシト木橋
 所ニ住セルト河雄商トイハル運來テ寺飯四逆
 湯ヲ午ハ亟ニ快愈ナシヨリ下客
 病ノ至テ治シ難キハ以瘰癧瘰癧ニ如クハナシ就

癰疽

中毒

傷寒

中疔ノ一症ハ患ハ者尤多クシカハハ大柱スル
 毒代母ナルトシ知ラスト女世稱弱冠ナリシニ
 リ淫リコハハ慨々摩ク心シ用テ治瘰ナシ全愈
 セシモノタカラス且諸家疔瘰ノ方命リ臺テ致
 大所トナセリ情イカナ具治驗モ稿モ存口不
 彙集セシ書モ尙丰リ信録スルニ至ラサルト口
 余耳阿魏等ノ入りル氏子リ用シリ見シカ其
 乱髮状ノ如キ者シ下メ反テ瘰癧ヲ招リトモア
 リシ又蛤蚧ヲ好テ用テリ其ハマ、奇印アリ余
 毛蛤蚧ヲ屢試用スルニ吐血合ノ痰嗽ハ時々
 驗ヲ得ルトアリ潤肺疔中ニ加入シテ煎服セシ
 ム毎ニ一對リ一七月ニ用ルニ古方ノ凡矢ホハ

下用ル、比スレハ具初更ニ出ナルトシ覺ユ
 檢本云僂僂者針術ヲ若學ノ所至壅塞胸脘痞急
 ノ証ニ十七椎ノ両傍一寸半シ刺シテ毒邪ヲ掃
 ヲリ全何テ之ヲ掃テ下虛ニ盛精神整塞スルニ
 其穴ニ連差メ奇驗ヲ得ルト時ニコレアリ其穴
 ハ甲心銅人ホハ見ヘス明堂經ニヤテ同之
 ト卷ツアリ發注經ニモ載タリ且ク同スヘシ
 川走山ノ月夜罩ト稱スル者アリ其毒ニ中
 シ者櫻木皮ヲ煎服ノミニ愈ユ其罩ノト先考ノ
 小支驛程記ニモ亦載ラレリ
 横井元琬カ好毒下心下癰咬リ注シ食リ吐セシ
 シ其兄津山藩ノ井岡通貞コシニ和脾ノ套割リ

年ハ三歳又ルニ陳氏ノ字解毒氏ヲ以テ全治セシ
 ト元琬ノ語ニモ亦載ラレリ
 全壯時柳奇ノ言ヲキ、シニ大病人唇色ノ殊ニ
 鮮紅ナルハ不治ノ徵ニト早東之ヲ誡ムルニ
 サルヲ覺ユ
 傷寒下血ノ証腹詢ニテ預メ知ルヘキ理ナレ
 脈部虛軟ニメ按ノ症ナリ予ニ応セサル者ハ
 血ヲ止スルアリ且脈率數ナルアリ數ナラサル
 アリ舌ノ両畔ナト黧黑色ナルアリ舌上黃ナキ
 アリタノ所謂心燥欲嗽水不欲嚥ノ病ニ必ス免
 レサル所ニ然レモ代テ熱ノ血多ク著メルコト
 并腎真候アリ否レハ宜リ參互精審メ的ヲ失フ

腰痛

ルザラシ

黄肝

下ナカレハシ
 一七人アリ久年心腹痛ヲ患テ百治効ナカリシ
 二條繼後アリ教テ水臙樹ノ枝ヲ割テ煎服スル
 三ム年ハ再々決愈ナリシリ但服中ハ謹テ茶
 四ヲ飲ムナリ禁ストリ具士ノ孫患症ヲ若シム
 五モ甲子卯アリシト云リ
 六河田錦橋翁ノ痘疹制疾ノ品ニルザラシト傳
 七ロシ羊アリ之ヲ具嗣靈漢ニ訊フニ胡桃根中
 八下ハメ糸田ノ液スナ一宿シ日乾メ割テ食利中
 九ニ加メスト答リリ
 十十川町島法印ノ法ニ黄肝病ノ古色割合ナルハ
 十一縁管乾漆等ノ葉ヲ用ルモヨリ効驗ヲ得カレシ

死候

口診

脚氣禁忌

癖囊

硫黄アル方ヲ午シハ治愈ロワルナシトリ
 病久シノ指甲ハ温ナシモ両脛ノ冷ハ奇ニ
 不治ノ屬ス腿脛ハ水旨ナリメ逆射ノ危然トメ
 腫ル者モ年由新ナラサル證ニニ有但ニ輕勿ル
 二スハカラス
 三人ノ為疾ニ時ニ以疹ヲ發スル者ニ劉氏盧會
 四瀧腰所リ活ハ人具効是藥シト十餘年古ノ證
 五脚氣ニ怪リ甄量加レヒヲ禁ス既ニ愈ニ試リル
 六病者ニテモ之ヲ毒中ハ俄ニ復發メ危篤ニ至ル
 七ナアリト山平慎庵ノ語ニ
 八萩野台品ノ説ニ癖囊ハ二傳ニ痞為室囊者用江
 九菟菲ハト東垣ヲ引テリ其ニ據レハ癖囊ハ蓋白

種痘

驚堂凡

モアルトシ工造解ニ血割ヲ蒸テ失笑文ノ妻佳
 ニ目具所吐ノ物時疾蓋血ニ下ストコロノ物ト
 大抵同色ニテ赤トシテ鴉ノルカ如キヲ吐下ス
 ルトアリ其ニテモ具血ヲ蒸ルトシテ見ルヘシト
 近時清人ノ種痘ヲナスニハスガ蒸ノ美至テ極
 キモノ・サキハ具毛ノ極テ控キリツテ十餘ノ
 熟睡セル鼻孔ノ外へ垂テ具動揺ヲ伺テ呼吸ノ
 種ヲ知り痘苗細毛ヲ耳控子ニ抑テ鼻孔外ハ鼻
 テ具入息ニ從テ自ウ吸入スルニ任ス左右共流
 ス以テ許過ニメ向ミヨリ怪テ奈胆ノ信見スス
 ト竹島法印長壽ニ控シ中用軟子セシトテ語リシ
 驚堂凡驚眼凡ニ其證共ニ一蓋否仁憂政日中陽リ

耳傷

倭麻疔痛

用ヒ高初アリシヲ見タリト弟子陽奉彦肅ノ語
 ニ天馬醉木ヲ焚置スルモ十川種高屢驗セシト
 コトトテ語ラレリ驚眼凡ハ俗ニモツムシト云
 入心語是ノ清人徐人鳳ノ医法指南ニヤメルリ
 先教諭ノ據ヤナシ玉ヒルニ世医ニツムシテ驚
 堂凡トシホヘリルアリ陸ニ其種ニ其種ハ
 一エ人ノ婢驚ニテ耳ヲ控シ中戸ノ外レテ耳中
 ヲ傷キ疔厚シカリシヲ鐵鑊ヲ刮リ取リ麻油ニ
 和シ敷ヨト敷シ人ノアリテ具言ノ如ク用シマ
 所切リ得タリシトリニ判ハズ
 中年以上ノ人疔久シク是ナルヲ俗呼テ長命
 疔トイフ之ヲ治スルニハ生絲血ヲ切テ疔トナ

此の千ノ細事し日ニ三支リ服せしメテ効アリト
 仰山自白法眼ノ諸ノ
 前録ノ章心トニ口ノ西洋ノ匠こ一ホルト寄興
 一黨也こ中致前ノ樂善老疾遠ノ職ニ在テ彼地
 リ巡見ヲ渠ノ同ニ匠術ノ極意ハイカニヤ倘子
 シテ其国ノ人ヲ治療せしメハ何如ナル法アリ
 リ施スハキヤトアリシカハ其對ニ亞細亞ハ西
 匠亞ノ匠術ニ非シハ病リ己ス下亮ハス政體
 ハ政體已ノ奇事ニ非シハ効ヲ得ル下アリワス
 印度地方ハ佛徒ニ載ルトコロノ命説、本ツル
 コツヨコシテ匠ノ術ハ自ラ其ハエニ随フ元
 ノニテ彼兵相通スハキモノナラヌ是ツノ極意

疑似馬牌疾

此トイヘシト老疾ノ話セラレシ渠カ匠理ニ精
 メ固執ノ念ナキハ誠ニ貴フハキヲニコリ
 久未留ノ地ニ十年來小兒一種ノ病多ク行ル其
 語ハ馬牌疾ニ似テ俄ニ喘鳴軋々トメ祭扱頑直
 羊食下リ雅ク緩ナルハ十許日恙ナルハ三日
 ハメ繁ル匠初ハ馬牌疾ノ垂トノシナレシカ精
 察スルニ喉ノ近キモノハ仍テ鮮烈情熱ト
 字ノ誤ヲ年テ新リ得ルナリ其行ハ極暑極寒
 ノ候ニ多ク且ツ治シ難ク温涼平遠ノ時候ニハ
 ケメ且治シ易シトシ
 大病人ノ面頬赤ノ弛シテ恰モ落架同ノ如クナ
 ルハ不治シト云

死候

ノ、ソレに付テイフ或人嗜シ食スル丁過奇
ノ、吾日ヨリ下板ノ如クニナリテ者シヤルニ
ク、甲テ亦ナカシリ、甲加賀ヨリ来リタル扇子
ノ、日ヤ一葉ヲ煎シ飲シメテニ服許リニ、
和キ快復セシカハ、其故リ同フ、加州ニテ扇ヲ
製スルニ、竹ヲ日中ノ水ニ浸シ又シハ、
ニ和キ心ノマ、ニナルヨリ、
シトリ雲霰死ニ活、
ソレニ兵ヲト同シカラス
丹波、
至ル迄リニ身、
強健無病ニ彼、
姻親、
十兒、
七壯、
乳、

又ハ、
モノ、
位、
老、
清、
エ、
杏、
心、
姫、
ニ、
ク、
女、

養生論 食其辛薑曰拘芥子曰高或曰不食五辛生
魚合 穀說考之則仲景為世所謂五辛即莊子之五
臭之自毒凡條下云禁生食與食五辛之為五臭之
又滋可記矣又桐馬酒之也干漢書有官公卿表則
如漢武之時已有酪矣剖頸以還成無己之說確字
不可易矣而先賢說遠者以還矣謂其汗之也之
頸也介房而頸之下則無有汗之謂之誠同一部傳
寒諺有共句法否汗祭干外也也銀於內也遠也
亦不已也之陽明篇曰津液者還入胃中可証之也
十七難曰諸陰脈皆倒頸為不還按頸汗也奇感是
陽証然則仲景據難經之文亦未可知成無己據難
經立說所以不可據之

人多美ハ青囊中 跌クハカウナルノ元ノ諸脈血
暴下利ホハ其急劇ナルト同 髪リ容レナルモ
ノアリ其際 髪リ煮ル障ナキニハコノ美リ白湯
ニ溶化シ送下スリ 最便捷トコリスルニ
發狂ノ美リ是テ服セナルニ 碎鐵水ヲ以テ諸ノ
飲食ヲ煮テ午ハシカハ 漸次ニ平快ニ及ビテリ
ト同 燉森雲悦法 眼ノ佳驗ナリトテ 諸リシ其理
アルトシ 覺ユ 脈ヲ鑄リト 燉ハリ
陽明篇ニ 陽合病ノ遺尿ハ 尙荒ノ証ニハアル
シキトニ オモワル 穢ニ 放フルニ 遺尿ノ二字ハ
祭汗則 諸語ノ下ニ アリシリ 鑄入ナシテモ
ナラシ 以陰ノ 祕下則 直視失溲ト 汗下ノ 殊ナル

ハアレモ其上盛下虚タルハ一ナルハシ通リ移
致スヘキモノカ

幼科柴田元壽法眼ノ語ニ凡テ下部毒腫ノ語ニ

水腫廣黄杏仁薑豉口中湯ヲ用テ奇効アリ下巻

診案ノ法固ニ概余スヘカウナル者ニ痘科鏡ニ

大都白眉以上有皮点悦可可急又不萌肩不至針

至透體稠密難治可也終不至死トイヘルハ人

信拠スルトヨクノ頃ハ一貴人患腫最弱ノウハ

ニ前秋脚弱シ患至ヒ辛ノ生全シ持ラレシカ痘

瘡ヲ得テ僅ニ五六分ニ至ラサル頃病ニテ飲食

モヨク進テ彼悦可ト云ヘキモノモ見レタリ勝

瀝弟二日ニ至リ下部冷汗アリ其夜遍身漏汗ア

リテ手足漸厥ノ翌日晝前ニ不語ニ及ヒ至ヒタ

リ當局ノ專科ヲハシメ驚愕セスト云フナリシ

蓋是毒抑ノ質固身精液ヲ痘ニ瀝尽メ假ニ佳兆

ヲ見レ遂ニハ元氣ノ痿縮スル下アタワサルユ

ヘナラシム但起脹以後小便至テ短カ而三日ハ瀉

瀝モ通セス又時々自汗アリテ上盛下虚ノ候ハ

アリシユヘ六味氏料ヲト同脈モアリシカト痘

形ノ善ナリシユヘカシハ不測ノ変アラントハ

念及ナルニ至リ憾ムナレ何テ録メ後事ノ鑑ト

大石ノシ

嘉永戊申三月ヨリ案旬大早を暑酷烈ニメ七八

日ノ頃病者尤夥ク死凶スル者如ナカラス就中

抵疾殊多ク其初起後慢ナレモ漸次増劇シ諸
語煩燥シ大抵下利致行シノ常候ニ至ルモノ如
ク在在日シ近キ証候一ナラス邪穢解スルニ及
シテ暴ニ虚憊スル者亦同シアリ大寒禁却湯
重連解毒ノ英犀命蓋量其下利スルハ善序連
ク湯生善洋心湯ナトニ于功ヲ奏スルトヲ持リ
リ更ニ抵野狂熾ナル中ヨリ脚氣ヲ兼發シ痿弱
ヲナシ或ハ心肘ニ通ルモノアリ甚治シ難シ邪
氣殆ニト衰テ痿弱麻痺ヲナスモノ多クハ快
復ス脚氣ノ傷寒ニ似タルトハ同シカラスメニ
症ノ候病ニ云ヘ中モノニテ從來見ルト罕ナル
ト云ハク脚氣ノシノ病人モヤナカラス諸候ノ

コレヲ妻ルモノ大抵衝心メ不治ニ至レリ作氣
ノ柔脆ナル故ナラン痛下ノ証也方ニヨリテハ
流行セシト聞シカ余ノ所見ハ前ノ二病ニ比ス
レハ殊シヤナカリシ時時ナリトニ十年津トモ
ナリ言

時愛読我書鏡抄

正徳三年丙辰春二月以尾陽中村俊英之藏書年
之

越中州 宮永正純子精

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

合水堂治験抄

南洋華岡先生経験

門人種島 柳田廣意哉 撰

石其邇摩郡波積村産夫健而者ノ妻十七才ノメ
孕ニ坐月臨盆ニ及ニテ不娩五日一医カヲ用
テ小腹ヨリ推シ下セハ死胎驚然トナ出ツキ
ヨリ小便常ニ自利メ振蕩スルヲ能ワス且ツ
房事ヲ行フヲリ得ス然レ氏隱蓋メ人ニ告ガ
ナル丁酉年ノメ始テ是リ明メ一痛迄ニ治リ
求ム其医割コリ以テ誤リ誤メテ子戸トナシ
謂テ曰是子戸難産ノカニ破裂ニ具創愈ルニ

從テ由頑固羣縈シ予戸隘ク成リタルニ我一月
ヲ出テスメ是ヲ治セントテ先ツ指リ以テ創口
ヲ牽キ拓ケテ右ニ軟カナル焦リ塗ル如是スル
丁四五日創口愈濶大ニメ小水漏ル、丁日一
日ヨリモ更ニ此ヲ術ヲ行フ毎ニ痛苦是難キヲ
以テ遂ニ治フ辞ス居ル丁四年矣一人是ヲ勸メ
テ治リ難保氏ニ乞ハシム患者即チ備前金川ニ
行テ治リ乞フ難保氏脈ヲ叩シ創ヲ視謂テ曰是
婉難ノ中子宮兒頸ノカニ破レタルニ治スヘカ
ラス唯浪速ニ奈洋華岡先生ナル者アリ若シ先
生ニ委附セハ一ヲ儼俸スル丁アウントテ乃
チ書リ致メ患者ニ託ス患者其書ヲ持來テ之ヲ

先生ニ應付ス先生披テ之ヲ看ルニ其書曰此
八年前婉難ニテ死胎ヲ産シ腹心ニカカレニ破
傷ニシテ小水淋漓情實モ固ヨリ通セズ是れヲ
以テ五ヲ牽スルニ産期カ息滅リニ至リ兒頸宮
口ニ縮ムト至宮口不開勢貴ニヨリ宮口上頸破
裂ニテ今婉スルヲ以テ尿道モ亦大破ニ及ヒ小
水宮内へ漏レ下ルニ至心誠ニニ導水管ヲ尿口ヨ
リ挿入スレハ水小坎ヨリ出ツト虽脬中ヨリ出
ルニ非ス宮内ノ瀦水ノ元ニテ種ヲ子ヲ討セ凡
其管ヲ脬中ニ到ラシムル丁能ワス因テ日夜
溼泳スト至末ヲ棄テ治スルノ術ヲ奈明スル丁
能ハス願クハ先生憐シテ之ヲ救ヘテマヘト云

先生讀完り患者ヲ診テ用室ニ入テ之ヲ見ルニ
腔内陰門ヨリ子宮口ニテノ間ヲラスハテ腔ト
云上至陰門ヨリ實ハ入ル一吋全ノ処横裂ス
ル一吋三分半リニハ麻道ト腔ト稱ツテ近コ
クノ膜破ル腔中ノ故ト以ハ尿心ヲ引
コウ開クニ似タリ眞下應指シ下垂ハ腔ノ中
英ニアリテ子宮ヲ遮ル好密ト視
テハ子宮ハ向ハ
スノ反テ割コニ入テ眞ニ腔内ニ至ル指
調御心切指シ故ニ小便指ニ應テ流シ出ツ又
別ニ腔内下面ニ中ヨリ女ニ左側ニヨリテ瘕瘕
アリシヲ患者ニ問ニ囊ニ運陰門ヲノ廣クカウ

シメント可ク以テ却割セシトナリ先生診完テ
謂テ曰是難治ナリ若シ今之ヲ瘕セント欲セハ
一掃ヲ早テ縫合シモ不瘕者ハ瘕スル一亦如
前尚不瘕者ハ瘕スル一亦如前三回ニ至ラシ
尤一回毎々小瘕ヲ迄リテ半年全ナルハハ唯恐
クハ汝其間ハ厥心ヲ生セシテ患者曰毒ヲ死
生一ニ先生ニ任ス惡シク厥心ヲ生セシトテ請
テ不已於是患者ヲ樂天齋ニ爲セシメ翌日診之
心下瘕軟飲食不美仍テ半年復洋心ヲ生シテ三四
日前瘕ニ至テ瘕工五月十日早晨麻痺湯ヲ服セシ
ム既ニ亭午ニ至ツテ脈洪大舌上乾燥頭面俱赤
發腫開入人事皆忘謔語呢喃撮空摸牀打沸水下

しい下へ廻ワメ拵迄布ヲ履へ上テ蘆管ノ際ニ
 至ツテ裂テニ線トナシ共ニ平ニ掛テ又下ツテ
 蘆管ノ両旁ヲ結テ腰ニ至テ中ニ結束久又別ニ
 麻線ヲ以テ蘆管頸ヲリ、リテ綱帯ニ繫キ止ム
 時台ニ至テ麻師ノ撰取全ノ醒ム習日微ニ察取
 リ奈ス因テ吉四加刺ヲ早外酢及蛋清等ヲ施ス
 下六テ前テノ如ク第四日ニ至ツテ一絨ヲ剪去
 酢蛋ヲ前衝ト先鋒トニ換又陰脣微シリ摩爛ス
 ルヲ以テ紫雲ヲ貼シ内尚吉四加刺ヲ早フ皆傷
 寒ノ病ノ市心ハ痛癢ハ折損傷ノ類ノ疾道及華氏
 如ク無毒ニ以テ熱ハ所傷トスキ者ハ共湯ヲ用
 第七日ニ至ツテ絨盡ク剪去リ諸法前ノ如リス

ル下年月許リメ創口全ク痊エルヲ候ニ蘆管
 ヲ抜キ去ツテ誠ニ小便セシムルニ小便濁モ
 不漏悉者及着守ノ人尋常メ不勝其毒令一日半
 リニメ帰ラシテリヒフ因ツテ蘆湯蒸取シ早ハ
 回リ亭更シ戒メテ帰シリ
 但馬豊岡福田屋庄三郎カ子早兵衛年十九一日
 檉蘇メ山中ニアリテ遠ニ大抵ヲ祭シ頭如裂呻
 吟声喧シ急ニ帰ツテ召返テ祭表割ヲ早ル下ニ
 三日メ表疔稍解スト至眼球腫脹シテ目ツ疼
 痛ス其痛ノ奈スルヤ一日一祭二日一祭ト日ヲ
 延ソシ隠ツテ漸リ稀疎メ早外ニ至レハ旬日
 或ハ年月許リメ一痛ス其劇シキニ至ツテハ

眼珠快心カ如ク不可堪加斯ナルト一ニ時：ム
行ニ止ム於是處ク治ラ曰行ニ求ム諸運熱薰煎
墨刺絡奈河尋術トメ至ラサレハナシ然レモ疾
守之メ膏テ進退ナシ尋テ擦ニ空川異者ニ至ル
曰ク瘡腫奈セニトスルノ非アリ托裏排脾ノ劑
ニ洗葉リ眞用ス服スルト二旬余病尙自若リリ
明年四月浪速ニ來ヅテ治ラ先生ニ求ム之ヲ診
スルニ左眼腫脹メ眞大ナ殆ント右眼ニ信シ白
膜弩張メ微シク烏睛ヲ掩ヒ色淡翳：ム紅縷縱
積ス先生問テ曰ク視力平日ニ異ルト無キカ曰
ク無シ又問フ問フ腫消長スルヤ曰ク然リ眞痛
ノ進退ニ隨ツテ消長ス其長スル中ハ十ノ三四

ヲ加フ消スル寸ハ行今ニ異ルトナシト於是也
生指ニテ眇眼上ヨリ指テ中ニ物アリ眇ニアラ
ス液ニアラスト疑ヒナカウ診スルト須臾ニメ
釋然トメ曰ク是レ赤シ我是ヲ治セシ汝微シリ
痛吾ヲ逐ヘト即チ鉞針ヲ以テ烏睛ヲ去ルト一
命許リノ処痛ニ昏ノ行ニ毎ニ軟弱ニ隆起ハ割
起スルナ場行隆ヲ刺スト深クモ亦一命許リメ
指ニテオスニ白キト雪ノ如キ者取シ一疾口ニ見
ハル、ヲ小鏡ヲテ察ス引出スニ其長サセ寸
余幅僅今半形過リメ質清徹縱横三四条アリテ
皆頭ヨリ尾ニ至ル誠ニ水中ニ放ハ搖擺スルト
三時許リメ方ニ死ス針痕ニ赤明香油ヲ点シ

通明湯
人若老如洗ニ瘳ル下リ得リリ
通明湯

荆芥 行風 川芎 大黃 當歸 芍藥
白芍 石七葉 各等分 水煎

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

春林軒禁方錄卷之一

目次

中風 一

中暑 二

諸証 凡

喘息 凡

痢疾 凡

反胃 凡

吐逆 凡

水腫 十三

癰囊 十六

傷寒 一

中食 三

咳嗽 凡

瘧疾 凡

吐衄 凡

嘔噎 凡

鼓脹 十二

脚氣 十三

癰囊 十六

卷之二目次

積疝

酒積

癰癤

神益

黃胖

脾勞

勞症

諸失血

痢症

動氣

癩病

淋症

遺尿

不寐

大便閉

小便閉

頭暈

卷之二目次

春林軒禁方錄卷之二抄

○中風

治偏枯方

治痿痺方

右一呆去喘入紅花三十支人多十支為兩相溫酒送下發一日內有效既經十日者無効

回生散治卒中風

又方 以葶藶末五錢石絡末 右二呆煎服

又方 塘球五厘 白芷五厘 右二呆煎末酒服

又方 梓桐葉

梓桐葉

右一采細氏 半夏湯中加之有効
稀涎散

治中風暴仆症逆壅盛氣不通又治喉痺不能食
白卷一兩

右二采細氏湯水調下或煎膏一兩立見
○傷寒

解疫散方
木槿乾肉
右一采煎服又治頭疔置之於患者之床下妙

三神氏 治諸血熱心上部能度
○厚根一丈 黃連 積雪中 紅花 芍藥

右五采以水一合半煮取一合服

防己地黃湯

治病如狂狀妄汗独語不伴無它熱其脉浮者

防己一丈 老支 防風各三 甘草一丈

右曰采以酒一盞浸之一宿絞取汁生地黃二斤
吹咀蒸之如干不飲之以銅器盛其汁更投地黃

汗和再服

治傷寒血症奈痛呼罵不避親疎登高而歌棄衣而

走等症方

口舌八水 即綠卷 一丈酒一滿 一黃女

右三采以水許蒸甲

一人年二十餘患傷寒經十餘日表血症奈痛似
三合復命湯症而具喉虛滿心下急過心治於中

川修亭之三年為亭連及菘仁承氣藥用其可將
全愈

又方

丁香一分 竜腦二分

左二采分七煎用本劑之少連湯加沉香浸

沸湯去渣服之

○中暑

消暑氏 治中暑及吐不食頭痛煩熱者

半夏一分 茯苓 石羔 各五 日中一之

生薑 右五采 研氏

治十經中暑方

秦音自然汁 右一采服又治心胸

○中食

解蝨臭毒方

淡竹葉 右一采煎服

又方

正氣藥角滴毒飲

又方

海苔 右一采煎服

中草毒者必安治之方

地漿 地炒 地炒 水炒 へりここアト 毒中

右二采服

解鯉魚毒方

魚賊甲 右一采煎服

又方

杏蘇散加山查子

療中葶毒欲死者方

送石 茶 各五分

右二茶煎服須臾腹大弛明日復常

解河豚魚毒方

細屋ノ夕イ

右一茶服一盃則吐之亦治

解杏葶毒方

櫻皮 右一茶煎服

杏砂 松實氏 治食傷欲作浮或心下痞悶不好食

白朮 三兩 枳實 半夏 各一 橘皮

枳實 各一 麴 五分 杏附 木香 各五分

砂仁 七錢 黃連 一兩 夏 一兩

右十星 糊氏

簡毒氏 治食傷腹痛或吐浮諸毒在心下者

阿仙 羊 百 芍 百 草 霜 胡 連 下 子 終 五

日 十 十 支 右 五 星 糊 氏 熟 水 汁 為 氏

奇疾

治男婦前症及婦人月水不順者

先以繩取手足指而以具繩自三寸指至杏中取

之奇鼻頭月至背於具繩之各心灸一日七壯七

日同或二三日不愈則良効

透膈氏 治男婦氣滿不舒頭疔膈塞噎雜項問局

背背煎煮同氣散痰唯是治標之劑

阿仙美如十 丁香 肉桂 破仁 木香

右二藥絲粥氏六平大每服十氏或二十氏白湯

送下

送下

○咳嗽 喘息

治久嗽不瘳者宜虛勞喘嗽方

紫苑 欬冬花 杏仁 白部根 生薑 各五

烏毒一箇 右五藥水煎

治喘息方

黃連 黃柏 大黃 各三分 黑豆 五

苦更 麥門絡 四 知母 竹節

欬冬花 〇花則代根 三菜二片

右十藥水煎服

治喘息奇方

兔耳合花 冰砂糖

右二藥煮四五白湯送下

丹元小量村是奇患喘息多年矣羊不得寸効傳

溪游一區生診曰我能治之乃投一方不數而得

治矣至運岸本良遠者心具方遂以而金持傳具

所傳即此方也。有

治咳嗽方

深中大 薄荷 廣黃 各五 右三藥水煎

又方

萬金 雞卵壳 右二柔細末服

萬金散 治咳嗽

萬金 滑石 川芎 右三柔細末服

治十兒咳嗽方

敷之子霜 右一柔塗裏服

治痰症声不出方

生脉散

治喘滿欲死方

辰砂 土竜霜 枯管

右三柔細末白湯送下

清喉液 和痰止咳嗽

又木下口 日中

右二柔以水四升煮減二升公隔再文火煮

以糯八十五枚攪之勿令焦枯煮誠以少許投水中

玉屑

杏脂散 治痰飲咳嗽或項背強急手足臂疼疔毒

松脂 牙糖 冬百支 右二柔細末服

化痰錢 驅逐痰飲凝滯者

正フリコ 干姜

右二柔細末每服一匙或六分白湯送下

無印刺歌斯 主治腹疔腰疔頭項疼諸症無通

小便殺就盡通月水唯草服則有腹疔者云

治喘奇方

牛膝十支 羊夏 干姜冬五支

右三葉翻氏每服三五分白湯送下連服三四十日則全愈矣

治喘息奇方

阿片 竜腦各三錢 右二葉蜜或翻氏

六物湯 治咳嗽

杏仁 甘草 白朮 橘皮 枳實 白芍

右二葉水煎

治咳嗽如方

二陣加杏仁

午黃氏 治喘渴欲死者

奉午二錢

右二葉蜜氏蜜水調服善湯亦均

治咳嗽百藥不効者方

白芥子 白礞石 楠葉 右三葉白湯送下

治十兒咳方

白芥子 海人 五苓 日十

右四葉

桑實氏 治喘服之則頓吐也

桑實 白合 姑十 雲石二錢

右三葉蜜氏

青竜丹 治咳嗽痰喘

薄荷 十 杏仁 五錢 川芎 三錢 細辛

一錢 急莫 竜腦 各五分

六葉五厘 右七葉蜜氏

人至竟丹 治痰咳眩暈昏沉香解勞倦咽喉腫疔毒

薄荷十支 苦更三支 意腦五支 石砂

日中粉一五 川芎二支

右六星蜜棗

八星生薑丹千金 治咳嗽上逆者

干薑十支 生薑 日中茶葉

欬冬花格二十 蜜 杏仁恪四支 苦支

二支

右八星先主七星微火煮如飴服之

五羊子丹 治咳嗽晝夜不止者

橘皮二支 麻黃 杏仁 日中 茯苓

干薑 貝母各三支 五羊子二支

胡顏葉散 治喘急虛羸遠年不痊者

胡顏葉兩斤 右一羊細末

治小兒咳逆

丁子生 苦更霜 茯苓霜 十斤ノ四

絡云 右四羊細末

瘧疾

截瘧百中湯 言去疾方 截瘧如神

常山 檉柳 日中粉 胡椒 辛胡

右四羊水煎先祭服二三貼不截則再進如法

截瘧飲

常山 檉柳 苦更三粒 右三羊水煎

又方

崇山 午膝 桎柳各 五分

右三果水煎取夜露服之

○痢疾

治禁口痢方

乳香五分 木香一分 郁李仁 各以

中烏氏 治禁口痢又产白血晕

牛蒡 右一果 糊氏

逆挽汤名古匿方 治痢后脱肛

痢疾眼中青之寸心照必死之

治血氏 主血痢

阿膠 一钱 木香

沉香各三 右四果 糊氏

如神氏

阿片一钱 黄莲 木香各三

右三果 糊氏 辰砂为衣

治痢奇方

土军 一钱 罌粟 四分 白中 五分

右四果水煎

治禁口痢 利欲死者方

赤芍 右一果 冷水服

朝鲜人 奉朝时舟中人 患痢疾 朝鲜医以香椒一

果 散于内 大釜中 水煎 煎煮 减干 为人 怪重 奇全

愈

吐 反胃 嘔噎 呃逆

家方二美湯 治吐此神方

大車皮 櫻茹 焙 二 百中三

右三羊以水二合煮取一合二勻溫服 癖囊若病

氣腹疝吐吐漸甚者加橙實一戈芍藥一戈

治嘔噎諸藥不効者方

玉鷲血 漢香

治反胃方

調胃承氣 加菲花 薑 用反胃氏

水銀 硫黃 苦支 右三羊細末 津液和

治吐逆方

痔瘡 右一羊煎服

治嘔噎方

山志乃膏 五戈 右以水二盞煮取一盞

治嘔方

野蒜 二 百戈

右一羊洗磨如泥以酒水各一升和之加白砂糖

百戈內全煮之如飴服之

治吐奇方

小干夏 加在 荻石 羔 令 冷服

治膈噎方

礞砂 菲仁 各 十

右二羊細末 白湯送下 調胃承氣煎汁亦佳 茗咽

中噎 瘧 飛下 者以 烏茶 白湯 流 入 易 妙

治呃逆方

九年母取一枝 艾葉二支 右水煎

又方 山椒 右一星壳焚大坑地上投山椒於其中

以水濕掃盡上則山椒盡見白吳公之餌未用

神效凡

又一奇方

青皮 山椒 日中

右三果水煎若不効者加麥冬許必効

又晉氏

水銀 硫黃 雄黃 各一分

右曰羊糊氏

膈噎神效

自大椎至七椎每節間灸七八壯息於膈間灸

其効矣自七椎至十日椎

治噎 金匱黃門冬湯

灸乳根三壯知者不待數亦止

治膈噎方

毒酥 禾酥 各三 塩ノニカリ三合

右三果以水凡合煮取三合每服五勺許日一吞

利服三黃湯加黃土

治吃逆方

牽牛子 香附 五靈脂 各一分

右三果細末白湯送下

治吐不止或暴浮後重者方

礞石 右水煎

治諸呃逆方

木乃伊三分

右細末白湯送下病後呃逆殊効

八宝丹 治膈噎反胃或脹滿諸症有塊者

真香礞石 朱砂 雄黃 丹砂 輕粉

礞石 硫黃 水銀各一

右八宝細末入湯城鑊內小蓋鉄灯蓋用鉄絲傳

送丹中塩對固於火内煉五炷香三文二或冷送

取之入每服三厘滾水送下五六服則愈

雷鹿色一農夫妻久年患數脹腹痛急投之則腹

中雷鳴結疝脉絕卒倒眼眩是虫之退矣

奇罕誤

惠美氏所經驗云

○數脹

雞矢代 惠美三伯方

治腹實滿似數脹者

烏骨雞矢 菝仁 大黃 右三果糊氏

數脹者滿其症何程脹り急急ニナリ者此ハ七決

メ下利リ与フヘカラス者此ハ八決ハ八頃心

ヲ得小便却テ不通者ナリ酒客ノ腹脹ハ吐血

治杯ニ多キ者ハ厚朴生薑ハ少半夏日中湯

尚峻氏ニシテ兼用ニテ是効アリ免命速効リ

或ハヘカラス又ハ便ニ三合至リ通セズ是

急急等ノ症加ル者ニ檉葉丹杯女年ハ不若

レ此毒リニ數利リ与フヘカラス限テ下利リ

年ハ元格別ニ水気ハ下ラヌ者ハ是以テ先ツ
 下劑ハ行レヌト知ルヘシ其氣急息迫等ハ強
 キニ寺飯荷羊散ヲ与フヘシ服スルノ十日五
 劑ニ至ルオハ必ス穩カニナル者ハ其中消塊
 氏ヲ兼用シテ治スルニ心下ニ否ナド見ルヤ
 リニ腹滿減シリル者ハ羊夏澤心湯ニ消塊氏
 シ兼用ス又婦人ニ血脹ト称スル病アリ其症
 辛之羸瘦腹滿脹大ニナリハ是レニ一奇方ア
 リ水蟬樹日中女ニ加ヘ用エ大ニ効アリ和モ
 イボシ
 治鼓脹ニ滿行
 鹿肝 麩白 右ニ羊味嚼汁用

又方

生雨蛇 二匹 羊丹

右不噬吞下一時吐浮而治

加減導水氏 治鼓脹ニ滿水腫

大黃 黃芩 葶藶 葶藶 葶藶 葶藶 葶藶 葶藶 葶藶 葶藶

二筒各三 右六呈 翻托

芫花氏 治結癖脹滿

芫花 二筒 巴豆各一 葶藶 葶藶 葶藶 葶藶 葶藶 葶藶 葶藶 葶藶

黃芩各二 兩 右六呈

水腫

皇京永樂屋水氏某

寺飯 川芎 羊夏 葶藶 葶藶 葶藶 葶藶 葶藶 葶藶 葶藶 葶藶

通水封胸方

枇杷核十箇 巴豆八分

才夕リカニキリ五分

右三藥研末以田螺腸鴨氏為一團餅子固封胸

以帛蓋之若無田螺則代用豆豉

二咬湯成養堂方 瘰癧水腫

井五 赤小豆五 高陸二

右二藥以水五合先煮小豆取清二合內高陸更

煮取一合服。汁

治虛腫方

鮓魚十 昆布一幅三寸長

右以水五合先煮昆布為八十戈公歸入鮓

鮓魚天煮為四十戈服之

高陸煎

赤豆一合 高陸二 生薑五

右三藥以水一升先煮高陸生薑平胃散一匙作

豆合玄滷入十豆作一合正三

琥珀高陸湯 治水腫渴而十便不利者

琥珀 茯苓略 高陸五

右三藥以水二合煮

諸水腫十便不利者

於本劑中加荒杖根用之是妙

小豆湯 福升固苦方 主水腫

桑白 杏仁 防己 葶藶 茯苓

アミニシ
水ノ名アリ胡
大坂道修街
イ大ニ利
是

○癰囊

下留飲方

日逐一兩 青礬石 大錢 日中略二

芫花 白朮花

右六羊 翻氏大 煎汁送下 弱人自七八粒至十

四五粒 強人自二十粒至三十粒 服方治者多再

發故方製一方以附再祭

大日中三神三 砂糖三十

右以水一升 煮取一合 又以土器煮之

右以砂糖煎汁 煉大日中三神別上好陳芥十

以以酢豆合煮取五勺 去滓

在屋 牡丹皮各三兩 霜

右二羊 烟末以五章 煎汁 煮之 甄時以糖煎五章

煎各半 分煎 煎酒 許修合 芥子 粉 衣 每服

五凡白湯送下 服至七日 必無再祭之患矣

治癰囊方

七葉白朮散加七切中

二葉湯外 治癰囊

代赭石 大百香 良姜 三七支 干姜

日中 右六羊

治癰囊奇方

夕ラノ木 日中 絡木 右煎服

治癰囊腫疔諸無効者行。羊

者草 裏不利古湯用之驗

治癰囊疔

大辛胡：アウビヤコニリ加其 干姜

又行外 治傷風腫上以契經心藏恍惚神情天陰

心中憊々如醉不醒者行

淡竹葉 今竹筴 全羊命 石羔

交神

右曰羊水煎無用鯉魚或鮑牛嚼汁煮食之聖佳

春林軒禁方錄卷之一 羊

春林軒禁方錄卷之二 抄

○積氣 酒積

治氣 燒行

アヤツリ草 右一羊水煎

勺責散 酒積其方主之

白蘆 羊兩 勺責 葛根 牙牙 各一 兩

右曰羊細末每服二戈酒服

○癰癰

崔氏溫白氏 瘰癧癰癭等

葶苈 芒末 葶藶 紫胡 厚朴 苦更

食莢 茯苓 杏仁 干姜 黃連 芎藭

巴豆 人多各一 戈 魚頭 十 戈

右十五朵細末白蜜和更搗二十杵凡如桔子大

○補益

滋陰氏下焦濕熱小便閉結腰痠癢

松皮酒炒知母焙干 芫花三 戈

右三朵細末熟水氏如桔子大泔湯送下

地黃丹 治腎虛或時脚腫

沃渾二兩 附子 羊兩 五朵二兩 黃芪

一兩 芫花 羊兩

右五朵

○黃肝

治黃肝病及胸中有毒胸動者

赤脂 大黃 鐵粉各五 黃極

厥粉 各半 日中二 分

右六朵以薑黃氏酒或味噌汁或白湯送下

治黃肝方

犀角 葛根 黃芩 鐵砂 日中

右五朵水煎

又方 山口道藥傳

蒼朮 漢桂 香 山柝 十 戈 皂莢 八 戈

陳皮 炒 六 戈 黃連 三 戈 大棗 胡椒

各六 戈 右七朵 鐵漿浸日乾五三次細末

蜂蜜氏如大豆大每服七粒白湯送下日三有枚

事言不傳焉

鐵砂氏 治黃肝

右三柔 鐵砂十支 大黃二支 蒼朮二十五支

鎮神散 治黃胖

白朮 茯苓 各四支 陳皮 厚朴 各一支

百中三

右五柔 細末每服五分 白湯送下 午加鐵砂二分

清黃氏 治水三搶心呼吸息迫咳喘奈黃者

鐵粉 燒二十支 大黃 黃柏 蕪粉 各十支

百中一 支 鹿脂 各二支

右六柔 細末白湯或白湯送下 日一或一或五分 午按午前亦可 行亦不量 必與早

勝金散 治黃胖 以甲反心動悸者

蕪粉 葛根 各十支 鐵粉 硫黃 各二支

枯管 二支 日中三 支 五分

右六柔 細末白湯送下

白管氏 治黃胖

木八支 厚朴 陳皮 各五支 日中三 支

綠管 二支

右五柔 蘇氏白湯送下 隨症加神曲 鐵粉 一奇方

鐵屑粉 葛根粉 各五支 硫黃

右三柔 細末 分力四十二 貼好酒送下 二七日盡 又方

鐵粉 五支 伏龍肝 三支 楊毒皮 三支

右三录

○脾勞

病在右如勞瘵脈紫或細數而緊或虛或步行則動劇或有血痣或爪甲薄或反翻或腹中有塊或無塊者為脾勞病起急而在臍上或咳甚或上衝者千金羊夏湯兼用病起急而在臍下青無尺脈羊夏湯主之

脾勞氏

鐵砂

燒一一夜候酥

午膝燒存

杏附三

羊胃散

五

右氏

如梧子大

羊胃湯

杏仁五

蒼朮

汝中五

陳氏

厚朴

日中粒

右五录水煎

羊夏湯

前胡

梅柳

羊夏

苦更

烙

鼈甲

枳實

吳朱五

右七录

○勞瘵

飯命丹

長州栗山辛藥

治骨蒸勞瘵

天石

沈香

烏犀角

五

黃芩

知母

黃門

生芩

烙

黃柏

朱砂

各

芍藥

川芎

黃連

木香

犀角

各

右十四录

治勞嗽方

山鴨スガカヲ〇五翼ハ長節

右一羊細根以酒蒸如羔

解勞熱及神經熱方甫方

川揚第塊川ヤナキノアマニシ牛

右一羊

治勞熱方

土鷲甲天石芭羅根各多

右三羊和氏

治勞嗽方

地骨皮鼈甲各一五羊子

右三羊蜜氏如梧子大每服五分日三服

仁油丹治勞熱正心煩熱骨蒸汗熱

人油右陰降大湯力散以人油半蜜裹服

正肉丹治勞熱奇驗方

肉豆膏朝鮮產者肉苾蓉吐温有肉芝

連肉膏眼肉各三兩枝天蓋獺肝

牛鼻霜各二兩

人參見合

右十羊細末蜜裹每服三四分白湯送下吃要者

加麥川五羊子牛鼻一本作牛黃當以是方

治勞熱方

鱧羹一斤好酒五合煮如羔服之初發則初

神棟氏治勞瘵下衰奇方初發用之

山椒二 若棟根皮一

右二果酒糊氏如梧子大每服二三十氏漸加至
八九十氏空心米湯送下

貴門丹 治疥瘡咳嗽

貴門一升 正果子一兩 犀皮三兩

右三果蜜棗

神明氏一名神明酒毒症氏

治傳尸疥瘡癩病積聚水腫脹滿疔帶下痔漏脫
肛等

檳榔 雷氏 醋各五 大黃三兩 使君子

無夷仁各一兩 木香 漢產者二兩

右六果氏如大豆大金箔為衣木香煎汁每服一

艾下之

酸棗湯 治虛勞煩熱奇氣在胸中不腹

酸棗五升 人少者支 生薑各三

石三兩 伏苓二兩 日十三兩

右七果以水一斗先煮酸棗取七升下諸藥再煮
一取三升服日三

治勞瘵方

陸龜 十 鱧鱧 臭燒五 雀虱一

一 蚌 伍 右三果以生漆氏

三蛇散 治勞瘵

白蛇 蝮蛇 各等分

右三果浸酒晒日五日 飯末服 薑削芽根湯十神

青黛 委根 赤石脂 各五斤

右三味細末每服一匙以毒石脂分用和產膏

治鼻衄方

芒消 右一味細末清水服

治吐血方

玫瑰花 行一升 佐以加鯨魚昆會車

之迎往 3 家庭有之云方言朝鮮イバウ蝦夷イ

バウ

○癩疔

治失心癩狂膏方

游金 七兩 明礬 三兩

右二味細末如梧子大日服五十片 煎方有

治不食癩方

羊夏陽加海人中使君子

治狂人方

曼陀羅花 三斤 烏頭 一升 老艾 八斤

右三味以水三盞煮取一盞服

治不食癩方

六君子加伯夫益惠不利古後用明脂

宝華丹 治諸狂癩

辰砂 雄黃 乳香 芒消 水銀 雲母

金砂 雄黃 石羔 白苔 石解

右九味生蜜氏或加葶亦良

斷志美本 治日驚言語顛錯膏

奇早誤文
義難通

人少十
酸枣仁
二微
十
乳香
三
分

辰砂五分

右曰桑叶末煉蜜和杵可如彈子大每服一匙薄
荷湯化下

一秘方 治乱心

合離木霜三分 輕粉二分 巴豆五分

右三桑以水一盞平煎已豆取一盞則煎汁解清
海羅太厚以煎汁服煎藥决台合離霜一匙為散

白湯送下

治不食病方

鯉節 猪肝 車前子 各中 日中

右曰桑水煎

醒心痰症氏 治狂乱神方

茯苓八分 茯苓二分 沉香二分

朱砂四分

右曰桑水氏 枳子大朱砂平為衣每日百氏白湯

送下三服重連白虎湯

〇動氣

鎮驚散 桑山誠効 治動氣

犀角 竜胆 琥珀七分 辰砂一分

竜骨二分 狂磁三分

右六桑叶末白湯送下

枳殼湯 治動氣諸事不効者

芍藥 茯苓大 吉飯中 干姜 杏仁

日中 右六果水煎

奇効散 治動氣欲吐勞者

天石五 陳氏 葛根各 鐵粉三

苦艾五 黃芩四

右六果

鐵毫氏 治心下痞動氣大便硬或欲成狂病者

黃芩十 山包十 鐵砂十

大黃二十 右四果

○癩癩

治癩癩疔

人煖場煤大 貝母

右二果細末每服五錢以五苓散煎汁送下但服

至百支

治諸癩癩狂疔下野同日光矣相院佐驗

白木 沉香 丁香 霍香 廣香

硫黃 青皮 黃芩 乳香 蘇胆

黃連 胡連 牽牛 日中 蘇木

陳氏 大黃 輕粉 崔氏 巴豆

三十七 小豆七粒

右二十一果細氏如赤小豆大每服七氏白湯服

治癩癩疔 王負美曰余家世傳之以救之者以百

散

巴豆 麩仁 黃粉 朱砂 日逐

日中 狂 黃蟬

主及夫門冬之

右八美氏如大豆大脂三日亦可煎肉湯

服法詳見千金雙單同之

治癩癧一奇方竹中

唐土一采細末一日一匙白湯送下其病必

臍停有疑望其具上其則必腹中雷鳴是其病之

治癩癧及癩疔

胞衣霜 右一采食生芥不起各者為愈

如切十一氏 治癩

丁香 木 沉 乳 廣香 三積

廣香 各塊 黑丑 微炒 連 雀虱 各炒

黃芩 大黃 焙 陳 青 雄黃

蘇 日中 胡連 各三匙 半

赤小豆 粒百

白下子 三百六十粒

輕粉 四分

巴豆 七粒

雲氏 炒二匙

可後雜說
今醫隨茶
本

右二十三采為細末赤小豆爛煮研泥固蒸麩糊
和為十一氏半炒為衣陰干待水浸一晷化一氏
大便皆隨疔各石形狀取之為驗或作化一晷不
可再服曾注火炎者不治遠年愈印

蜀椒 三粒

丁子 七粒

辰砂

剛子 三粒

右四采和氏

治癩癧奇方

鐵砂 五分

靈砂

唐蟬

硫黃

桐木霜

海人 齋各四

巴椒 二

右七呆發氏

一方治癩癧驚

山茶燻二十

合朴

半夏焙一

白朮

十

奇良二十

右五呆細末服

治癩癧及十絕驚風方

黃連

午時霜

海人參 南京五味各

丁香

右五呆

又方

水蛭取生者候酒未

右一呆

治癩癧方

海人參 紅花

白中各六

茯苓

半夏

右五呆振之：已用工

○淋疾

烏賊骨湯治淋疾諸症

烏賊骨

橙真

茯苓

阿膠各末

右四呆以水二合煮取一合一勻溫服血淋疼痛

難悉者服之有良効

日枯薑湯

悉冬

苦菜

日中

薑中

右四呆水煎

飯下氏

滑石

人中白各半

右二呆糊氏

治淋疾是膏方

阿膠三

大黃二

戈

天雄一

戈

右三果水煎

治淋方

牡礪十匕

大黃五匕

日十

右三果細末白湯送下又治赤白帶下

治血淋少年不愈奇方

燕鳥黑皮

右一果

尤婦人良也

治淋疾諸症數年不愈諸方無効奇方

少解毒加夏枯草大効

治淋疾一奇方

班猫一

蔓陀羅花五分

大黃一

右三果樹氏一日三厘服後大痛一陳而愈如

忘奇方如

治男子淋疾方

菴木

一果煎服

亮秋散治淋

亮秋

合歡皮

滑石

大黃

日十

右白果細末每服一匙生薑湯飲下日三服

療血淋方

牛角

細末

澤黃

各五分

右二果

治淋奇方

芭蕉葉

髮

右二果細末

劉寄奴湯

切草

危子

黃柏

滑石

日十

木通

大黃

右七葉水煎

治淋帶下失清

灸會陰之迎陷處

治血淋疝不可忍膏方

髮灰 蜈蚣焙

右二葉和生藕自然汁服

大黃散聖治 治血淋疝不可忍膏

大黃 煨薑 丸髮 一兩

右二葉細末每服二錢匕溫熱水調下日三

治淋疾方 善蜜八分至 日中四令 右二葉細末服

又方

苞子葉十枚 丁子五箇 木通

右三葉水煎

又方

滑石 大黃 日中 阿膠

右四葉細末每服一錢匕白湯送下日三服

又方

蜂房大 木通大 苞子大 栝柳 日中

右五葉細末白湯送下

○遺尿

治遺尿奇方

阿朮 一葉 栝柳氏每服三五粒日一服七日而痊

灸法

丈夫婦人ニ拘ラス尿口ノ下ニ尿ニ及ス
療小兒遺尿方

蜜蟬 一呆カ氏白湯送下

又方

益智 一呆柳氏每夜酒下五分百日可必愈

又方

猫尿 猫屋上 防己 日中各ホ

右三呆細末每服一匙白湯下日三

又方

雄雞 雄雞尿 右極細末當時食攪飯中而喫

之服至減食生平三之

又方

烏鷄卵霜 丁子 反鼻

右三呆細末白湯送下

〇不寐

三日四日不眠方

煙草 阿片カ入テ烟管ヲ吸フオハ不眠ノ

阿片ヲキ中ハ人ヲ殺ス慎ムヘシ

程中丹 痔瘻散 人連白流湯

大便閉

條勝方 治大便閉結數日不通芒硝大黃巴豆

無効者

胡桃油 コウサワアトル ツリト

右三呆和シ刀キイ止ニテ疝門ニ入ル即通ス

又方 大便不通下利難投者其方主之

防風 芍藥 枳實 梔子 各等分

右四藥以水二合煮取一合加鹽一撮入肛門

更方 治大便秘結者

麻子 杏仁 各等分

右二藥細末以酒調服

若黃散 主治心煩便秘者

若少 大黃 各五分 右二藥糊丸

潤腹丸

芍藥 芍藥 大黃 日干 右四藥糊丸

○小便閉

木通 黃芩 冬湯 治小便不利小腹如鼓者

黃芩 木通 右二藥水煎

雞屎白散 治婦人腹滿小便不利者

雞屎白 二合 麩 一升

右二藥細末白湯送下日一。每服一匙

頭痛

一方

芍藥 白芷 各等分

停疔丸 治頭痛

木姜子 胡椒 右切片以好酒浸之昼則曝

日以乾之夜則浸之如長七日夜而後用之七日

服之

吹鼻散 治頭疔如刺眼赤色生翳者

以亭 急藥各半 右末 橋鼻內

理 煩人血氣 頭疔耳鳴 喉暈不得 起音行

延胡二錢 紅花 苦艾 各五 靈脂 五錢

大黃 三錢 右五 呈以水二合 煮取一合 服

大便不秘 毒去大黃 用可果一艾 亦佳

治頭疔

胆俞 補庭 固地 傷疔 後項 合谷 解

絡刺

治頭疔

茵陳 五兩 二麻黃 石羔 各二

右三 呈細末 茶送下

治頭疔 一奇方

大黃 五 艾 丁子 二 吉飯 川芎

芍藥 各四 艾 右五 呈水煎

都梁 氏 治壯 實上 疔 疔者

川芎 石羔 各半 右二 呈糊氏

二氣 丹 主久 年頭疔

硝石 百枚 硫黃 十 大黃 十

右三 呈糊氏 一方 硝物各三 艾 硫六 艾 為凡 每服一 中 匕 日 二 次 或 二 次

代積 散 治頭疔

黃楊 楊毒 皮 大黃

右三 呈細末 酥制 用之

灸法 治耳鳴耳聾

治耳下流涎灸七壯

治耳痛 治耳下流涎灸七壯

蔞羅 右一毛熨按耳中良効

治耳中腫痛及發腦疼耳中作膿而某無効者

治耳中腫痛及發腦疼耳中作膿而某無効者

治耳聾

支ツヨウサワアトルヲ以テ耳中リ洗ヒ里

猫ノ小便法善汁也許リ以テ尿道ニ入ル即

取猫ノ小便法善汁也許リ以テ尿道ニ入ル即

ナシ候スルニ

治久年耳聾

雄雞胆汁和麝香如許入之於耳中又龜尿亦良効云

薰葉方 治濕毒上攻成耳聾者

カナノシニ 艾 枯草 上昆 霍香 青華

沈香 土知者 辰砂 八戈 白霜 二戈

右六葉細末為修分七若不然加艾葉可之先始

用薰葉后下之四日後用蜜丹用蜜丹有法以大

解劑送下喉用五寶丹以刺葉

此刺葉蟻蛛ヲ末トシテ研リ其汁ヲ滴シ行ハ

疔ニナシト至后必ス疔ヲ奈ス又以此為良按

葉用五六日サホシ湯ニテ解キ餡ニテコシ用

工此サホシ〇スハレ又セハ田ノ物リ上段ト

又色異リハ白点アリ穢イ口ニハ四方ノ板ニ
是ヲ用エ

○鼻病

酒渣鼻散

乳香 硫黄 巴豆 各一 輕粉 少

右四味和蜜塗之

一方

抱子 芎藭根 右二味白湯送下

又方

雄黃 麝香 一末 和鷄子白塗之

治鼻痔方

山錫杖 反鼻 各一 辛夷 知辛

右四味細末点之

治小兒鼻塞不能食乳者方

一 芥子花如氏入鼻中頓治如神

一方 治鼻淵愈方

夏枯草 一錢 辛夷 二分 日中 大黃

川芎 右五味

咽喉口舌

碧雲散 治驚口瘡及口中諸瘡

青黛 二錢 黃柏 三錢 礞石 蕭石

日中 各一

右五味細末竹管吹患處或本口中加清石

治驚口瘡奇方

石羔 黃連 日中 苦更 霍香

右正果水煎

治吐舌方

蟾蛛 右一果

吹香散

蜂房霜 右一果和酥傅

乳香散

紫桓 乳香 川芎 細辛 丁香 生薑

右七果細末管吹之或加丁香皮

治重舌方

吹香文乳香文合方吹之不痊者單用吹香文

此方治口中諸症具効如神

治舌上疼痛膏方

玄明粉二分 辰砂一分 右散患處疔瘰止

黃芩葵散

治喉痺收引 右一果細末以五分噙之則口中生

粘液疾止腫消

治重舌方

橫刺之去惡物而洗之 胡荽水 二十日 艾 薔薇水 三十日

右二果煮減平嗽之

口中吹藥

アカザ 樺干 拾二 日中 明荅 拾一

人多 艾 右五果細末筒裏含口中或管吹

又方

尸斤才 黃栢 樨干 始五 明昏 二 戈

人多 五 戈 昆布 右六 呆

治舌疽及舌瘡方

柿核 燒 漱之

咽喉腫痛及舌瘡木舌重舌腫脹滿口等又言語

不止者又卒死虽几候已絕天柱有動者可刺舌

下穴搗舌取之

舌疽一奇方

梅干 昆布 終 木 右二 羊黑霜 傳之 具上

牽紙 刀 于 燒 燻 以 于 罌 久 內 三 黃 入 姜 隨 症

服之

石羔湯 治舌上爛生瘡者

石羔 五 戈 黃連 一 戈 口中 右三 呆 水

卷蚕散 治喉痺喉風

膽 二 戈 白 羊 蚕 如 五 戈

右二 呆 細 末 每 以 如 許 吹 之 吐 涎 而 治

治纏喉風方

排勝湯 蟻 蛇 大 右 照 常 服 清 咽 利 膈 湯

亦 得 効

治乳贅方

穿山甲 右 細 末 吹 咽 喉 或 以 服

刺膚 夢 年 驚 動

治一切 口中 瘡 疔 者 粟 蠶 四 戈

大酒 一 合

右 四 呆 攪 貯

治喉痺方

明管 魚頭 魚角 各五分

右三藥細末管吹之一分至許隨症野酌又療

風腫疔毒

治纏喉疔方

赤蜻蛚 一末為霜吹之百發百中

牙疔

治齒疔方

丁子 辰砂 枯管 右三藥細末吹之

治走馬牙疔方

兩蛤 明管 大皂 各十錢霜

右三藥末擦患處

治黧齒疔方

巴豆末 右一末傅患處外面

治一切齒疔術

以鐵割患處出血后塗丁子山椒之末若無腫

者以燒錄製之

治動齒方

茄子花霜 右一末

治齧齒疼痛疔毒者及銀腫疔毒方

丁子 鉄精 右二藥為末入齧齒中

拔齒方

仙人草 一末以塩搽之即欲拔之齒

治齒疔方

此ノ針治リ施サント欲セハ須ウク皮ヲ以テ
雪電阿曇リ避テ青天快晴ノ日ヲ以テ候シ睛下
ニ注メ席ヲ設ケ患者ヲ以テ向仰ニ臥サシメ
一身ヲ伸シ新葺リ以テ天日ヲ蓋シ家族ヲ以
テ下胞ヲ開カシメ自己ハ患者ノ枕邊ニ坐シ
テ左手ニテ上膝ヲヒラキ大ハニ抱ラヌ候モ
鏡ヲ鍼ヲ鳥睛腫行中ニ回シ六分ニ至テ極斜
シ眩メ厚紙一片ノ底ヲ這テ鍼柄腫ノ中止カ
シ過ルヲ視テ針ヲ直ニ起シ七三分ノ分ニ候
テ捻下テ膝ニ至ルヲ度トシ捻是カ時腫輪ニ
注テ揉廻シ而右静カシテサム誤テ勿新切腫
輪若シ輪ヲ新切スルハ中ハ假令腫輪于一ツト

明リ發ス氏瞳睛漸ニ流散メ竟ニハ高スル者
心不可慎ニ傷針ヲ収メ紙ニテ眼ヲ覆ヒニリ
心細色ノ痛ヲ以テ覆テ眼上ヨリ頭右ニ至ル
乃テハ果枕香湯一椀ヲ午正患者ヲ起シ用盥
ニツイテ七日動搖ヲ禁シ身ヲ寧ラセ厚服産婦
ニ同シ服薬日ハ三椀念薬日ハ一次次ニ針ヲ
用ルヲ十二日リ針于一穴ス法前ニ同シ穴ヲ
針ヲ行フ二十日一針右准之若シ針穴發症衣
ヲ以テ繫覆頭可次ハ川芎芍薬調々加五果ヲ服
ス蓋シ針ニ三次ニ及テ腫腫ノ底傷凝滞メ不
サテアリ若シ腫凝テ不發則順迎針法曾テ小
筒ヲ刺中ハ迎針大筒ヲ刺ス法前ニ同シ針又

スルヲ一次本教刺ナシ針法后記一鳥睛瞳仁
ノ中三瞳ニ五回ノ穴ヲ刺ス二前ノ法穴針長
下ヲ刺連送刺之其年眼有鏡高不可解者
三一番ノ穴ヲ太心ノ針長下連刺之
四ニ番ノ穴ヲ刺ス 牙五ノ穴ヲ刺ス
六ヲ三ノ穴ヲ刺ス 牙七ニノ穴ヲ刺ス
八ヲ三ノ穴ヲ刺ス 牙九三ノ穴ヲ刺ス
十ヲ二ノ穴ヲ刺ス 十一ヲ一ノ穴ヲ刺ス
十二ヲ三ノ穴ヲ刺ス
穴十二針之法 迎針一次脾ノ加減ニ随フ
八果沉香湯
寺飯 川芎 芍藥 芩 芎根 沉香

黃連 日中 右八果水
川芎 芍藥 芩 芎根 沉香
川芎 芍藥 芩 芎根 沉香
右十果水
治一切眼病

治諸眼病疾疔赤翳或淚中疔或以眼內障外障
無不治者

芦眼石 黃粉 各二分
各三分 唐土 二分
黃連 擦葉

右五果先芦眼石ヲ臍中許為末后三果同煮
取一合平太渣入唐土又煎取半分厚芦眼石一

若又于以煎汁尽为度细末平日许内蜜用其菜
入眼中疔毒可治不疔毒不可治
洗眼汤

老艾 菊花 各二两 黄莲 卷石 百叶

右五果每瓶三钱以水一盞煮取六分洗之

治小兒疳疔

先服消疳汤许去其虫方是嚼其虫痰弱者
莫不治奇

味嚼菜疔有虫按

黄栢 生黑 黄等分 右半匕许加川乌颈霜女
许为一包煮果嚼一钱五分研内水二钱如泥

調和加以以綠蠶冥胆二物细切煮内果嚼中上
火炭女许以前栢食散加其上食之
正明美

芦眼石 三钱 寒水石 剉 吐 滑石 微煨

意胆 一钱 辰砂 水 飞 广毒 一钱

右六果细末芦眼石 煨水于

一疔 治内障 諸眼疾

石羔 意胆 明蓉 广香 硼砂 樟脑

芦眼石 煨 一 硝石 一分 辰砂 分

右凡果细末蜜集

治小兒疳疔

治小兒疳眼疔

鷄肝一戈

山菜

山菜

茯苓

沃浮

右五果蜜氏

刺心 水漏 肝俞

神庭

目疔 上星 外踝

下目睛

天癰

赤疔 小海 天柱

晨赤腫 灸可會

赤眼 三音

心疔 胸滿

治心疔奇疔

食朱萸根方

杏茹中

百中方

右三果水

治疔疔

黃連六分

烏頭一分

右二果以水三合煮取一合

○腹疔

黑豆 胡菜湯 治久腹疔

黑豆 海人 檳榔 樺皮 苦棟皮

附子 大黃 蜀椒 生姜

右几果水

腹疔秘灸

灸乳ノ通り回ノ寸リトリ喉骨ニアテ治正

灸ノ尽ル処ノ二行通へ同干脇底スル処ニ

灸ス

奇性氏 治一切腹痛

揚梅皮 十戈 胡連 五戈 胡椒 一戈

右三柔柳氏

开金丹 主治同上

阿仙菓 而戈 竜胆 二戈 乳香 肉蓯蓉

各一戈 丁香 三戈 人參 小

丁子 一戈 右七柔 蘇合 訶嚨

仙貴氏 治諸腹痛及食傷

胡連 若多 各十戈 楊梅皮 七戈 木香

黃連 各二戈 黃柏 芍藥 霜

右七柔 柳氏 治一切腹痛

○腰痛 治一切腰痛

烏頭 治久年腰痛

烏頭 右二柔 浸酒一夜 服有良効

肩痛 秘灸

又沃横紋ヨリ中指本節ノ横紋迄ノ寸五分

指ノ寸トシリ中指ノ中節ノ一寸ヲ取リ

用喉嚨ノアテ合ハ重シニ行通り臨台徹底

スル処ニ点ス左右痛ニ從フ

足疔 秘灸

足趾ノ外輪ノ寸シリ喉嚨ノアテ合ハリ

レ尺心処ノニ行通り同干臨台徹底スル処

ニ点ス

海藻 独活湯 治腰脚及手膺寒疔者

海藻 附子 白朮 防風 高陸 独活

茯苓 大黃 右八星水

草薺湯 治五種腰痛 連膝脚筋拘急 痲痺者

草薺 午膝 羌活 附子 狗脊 杜仲

杏仁 桑寄生 各二兩

右八星細末 盛絹袋 以酒二升 浸之 密封 七日 可

同 每服 一匙 食前 溫服

○歷節風

治痛風 疔 和 刺 杏 村 疔

治疔風 發 惡 疥 疔 或 身 作 微 腫 者

土骨 羌活 防風 午膝 大黃 木通

惡骨 蒼朮 白朮

右九星加 茯苓 木白 薑 苡 水 煎 溫 服

非痺湯 治風痺 周身 歷節 疼痛 者 及 濕 痺 疔 具 患

唯在 一 處 不 走 注 轉 移 者

威靈 麻黃 木通 各 大 草 烏 頭 羌 活

蒼朮 肉桂 各 甲 日 中 夕

右八星水 以 溫 痺 加 防 風 濕 年 血 擊 作 腰 疔 者 加

午膝 延 胡 索 若 服 此 疔 不 効 其 疔 屬 有 餘 者 更 用

白朮 花 威靈 絡 一 日 逐 日 分 右 三 星 以

服 取 下 六 七 行 亦 后 用 本 疔

痿 痺 散 治 歷 節 風

蔓 陀 羅 花 白 朮 芍 藥

蘇 葉 一 疔 治 痛 風 了 濕 霍 膝 風

厚朴大 蓮葉 惡老 薑豉 肉桂老小

右正氣以水二升煮取一升半

治疝疝散年不治附子不心青方

桂枝 芍藥 甘草 湯加阿膠

○心氣

藤天藥散 姜美方

大黃 冬青皮 右末白湯送下

白石 生薑 酒方

主治疝氣 虫積 腰痛 痞中 風子 疝 瘰癧 疔 等症

肉桂 木香 防風 紅花

何首烏 丁子 路路通

羊夏 一 方

右八藥以白砂糖百五十文盛袋同諸藥浸煎

兩一升中內壺密封夏四十月冬三十一日為止

一 亥 停服

金鈴氏 治寒疝 腰連 女腹 疝 青

胡索 金鈴子 各三 大 當 = 戈

右曰 果

治疝氣 疝 疝 疝 青

樞實 右以油煮熟食五日許必良効

○癩疝

治十兒 偏墜 疝

雞卵 一箇

右三藥俱煮為細末以三聖湯不洽者宜用偏墜

氏真可引亨 胡連各二錢 蒼木 知母
栝榔 車前 右六錢 柯氏白湯送下

○痿弱

治痿痺方

乾蘗 一呈燒細末每服三錢溫酒送下
一二次
治背脊骨節痛如毫的背狀者方
治背脊骨節痛如毫的背狀者方

乾蘗 一呈細末酒服兼用香飯刮

一可治痿躄或腰疝不可起者又治產後痿弱

地黃 川芎 午膝 栝榔 香附 杜仲
芍藥 羌活 蒼朮 木瓜 杜仲

各二兩 紅花 烏頭 日中略 羊夏

茯苓 各三兩 生薑

右十七錢分十四貼以水三合煮取二合七日服

之可了結寸四分以共為食餅

治十絕痿躄方

七葉清脾 加芭蕉煎甲

清渴

停湯液

蓮根汁 一呈服又全食蓮根良効

治渴症方

車前葉 一呈煎服良効

又可

蝸牛霜 右一朶

鉛丹 治清渴止小便數兼治渴中

鉛丹 胡粉各一 枯三根 口中 沃淨

赤石脂 白石脂 石羔 五分

右八朶蜜氏水服一氏

一奇方 治清渴

水飛 鉄砂 黃色 雞油 各三 牡研 二兩

右三星細末和油更以蜜氏無患子大

虻虫

毒花散 虻虫 雁 鷓 胡 菜 湯 石 無 効 者 或 雜 用 融 石

加大黃美者宜其方宜効

霍香 陳皮 丁子 莪朮 木香 紫蘇

杏附 白梅花 右八朶水

殺貴一奇方

海人 大黃 黃極 兗糞 右四朶水

治小兒吐虫吐諸菜不納奇方

黃連 木香 各小 樟腦 大 右振之乃服

安貴氏 治蚊虫心疔奇

胡粉 煨 樞柳 苦棟 各核 霍亂 各二

白朶 一錢 右五朶細末煎疔時白湯送下

香杯軒禁方錄卷之三 畢

春林軒禁方錄卷之四抄

○產後

治產白脫血了暈者方

反竅 廣參各五分

右二朮水煎

治血暈方

枳實 合歡皮 黃連 各霜

右三朮細末溫酒送下枳實用漢產者

抵古液 治產白脫血衝逆心腹病者病疑痛早

午膝磨 一羊細末煎湯服即腹大鳴吞下利

突似十死中之一生之方也

黃靈散

治產白脫血打撲上攻心腹作疔者

五靈脂

蒲黃各一匁

右二星酥水各半服一服而必治今五靈脂一星
服尤好

沉香散 治产前后或全愈上逆刺者

沉香 紫葳 川芎 黄芩 芍药 白芷

厚朴 茯苓 芍药 冬一戈 丁子

二钱 木一戈五分 木香五分 大黄

辛冬二戈 右十三星 振心已用儿丁七日

已于八日月、煎服又

下胞夜方

乳香 雲母 各半兩 右細末二戈白湯送下

治产台水腫方 治产前浮腫者効

肉桂 人参 大黃 瞿麥 芍药 与飯

牡丹 亭歷 干減 右八星水以

坐某 治产台阴门破裂大便不禁者 贊川和南方

雞卵一箇 枯骨 口寸酒 乳香

右四星 藥合大温入阴中五六分 同者七八分

而愈

芍药于姜湯 治产台下列及经闭累下上气逆冷

發熱乾噎 食臭 心腹肺脹 喘切 疝不下利者

芍药 于姜 饒磁 石 香附 一戈

白中三分 右五星 以水五合 煮取一合 日三

服三剂 神效 有坚者 加干夏二戈 亦可

治产台子通不闭 小便不利 不禁者方

荆芥 谷石 右二星 为坐某或阴门痒者或

痒者药剂一服外以水洗之

治产后期血少腫毒方

加羊通遂加红花大黃 又桑白皮洗之

治产后期腰不立毒方

芭焦湯之 洗温之 又芭焦之 于腰之 尤

奇効了り

寺飯散

治内虚淨状如黄胖身体黄腫短气之急

虚里及心下動甚眩暈動振之 痿弱平素動悸

之 毒或产后期血過多及失血后内虚動悸者

寺飯 茯苓各四錢 寺飯十五錢 于姜

至支各十錢 白朮 鉄砂 百中

右八果

治产后期胞衣不下惡血衝心者

五灵脂 羊甲 羊皮 右細末每服二錢酒下

治产后期血暈方

礞石 石灰

右手掌裏摩向病者之鼻令同氣

治产后期水腫方

牛屎 中阴子 一羊 未服

奪命丹 治胞衣不下而攻心胞脹疔毒

附子 炮干兩 牡丹 二兩 午時 一錢

大黃 一兩

右四藥凡指子大每服五六丸温酒送下

黑神散 道三方

益母草

合觀

白芍各霜五分

右三葉

白芍一方車厘方

益母

芍飯

川芎各霜五分

右三葉

○帶下

崩漏

奇聖野蘭丸 白帶者吹之於子宮可沃

大麥芽

以水三升煮取一升

煙中荃曰艾 丁子

右曰葉合之帶下青洗子宮疾去痢毒洗肚門

白木芍連湯 治赤白帶下大便疝連綿歷年不止

諸藥無効者

白木

黃連

芍飯

川芎各中

厚片大

白中

右六葉水

八葉帶下 治濕熱蘊結下臭物之美

高良

芍飯

川芎

茯苓

橘皮

銀花

大黃各五分

右七葉水

解不可考

生地黃湯 治崩中血不止或月水過多者

生青

艾葉

阿膠各九分

右三葉水

沉香散 治白帶下及一切血症

羊膾

角石

沉香

川骨云云 梨十枚 日中

右七葉浸酒一盞入土器 經一為細末飲湯若果

嚼汗送下 一按身可慎或

〇乳疾

乳泉陽 治乳汁不通青

大行 葛苴子 瞿麥 木通花 苦苣

吉更 帝不英 日中 右八葉水以

治婦人乳房腫起汁不通青方

益斷 乾婢 霜 繁華 和 好 細 末

右方細末六兩調塗患處

泉乳方 治乳汁不通青又治為兒被噬乳房潰爛

青

瓜呂根 乳香 右細末 煎 調 傳

浪花橋本宗吉者西洋家之具乳岩ノ説ニ曰ク乳

岩ハ全ク膜質ニメ成状婦人子藏中ニモ如女

膏リ生ス名テモノニト云胎ニ似テ胎ニ非ス

乳岩モ亦乳中ニモトシノ生シヨルニテ卒竟

ハヨシヨル者ニ其一人ハルサモノ気アレ

ハ消化メ腴トナリ乳蒸ノ美トナルハキナレ

モハルサモノ気ヲキ人ハ消化セズ因テ如女

塊トナリ何レ腐潰スルナリ故ニ五十枚以上

ハルサモノ氣ハ頃ヨリ多ク其毒ニカ、ル者

ニ又三十枚ハカリノ人ニテモハルサモノ氣

ハキ人ハ生スルヲアリト見ユ且ツ子藏中ニ

生じたりハハハヨリ候つ下リセス唯自汗下
スハ腹ヲ極セハ峻子ニ當心者是レ子歳ノ若
下トタルト先哲のワホガウテス以来ノ説ハ
其症寒熱ヲ祭メ死ス因テハ心サモノ気ヲ助
クルハ如ク故ニ樹脂ノ美ハ心サモノ物ハ美
之内外共脂樹ノ美ヲ用リリ内難選要壞液
病萃創其方ニ
青洲先生曰其説得ル所有心ニ似テレ氏余之
ヲ莫實ニ就テ考究スルニ大ニ妄説ナリ信ス
ヘカラス如何トナレハ今其妻者リ心ニ十
ハ九カノ處ニアルアリ妊婦ニアルアリ又
乳岩ニ痲痘ヲ侵スルニ其痲痘勝セテ全リ症テ

台積カ復常スト虽岩ハ自若トメ治セス三回
幸リ姪子漸ク潰爛シ岩洞ノ如リニナリ死ス
ル者アリ又乳岩ヲ割テ大塊抜サレハ其創ハ膠
シナスト速カナリ其ニ由テ之ヲ觀レハ未必
スシモハハサモノ気ニ故ニ膠ニナラスト
言フヘカラス膠ニナラサル者ハ唯岩ニ峻ノ
心具餘ハ皆膠ニナラサルハナシ故ニハハサ
モノ気ニキ者ノ病トハ難云又其形色ハ脂又
ハ和液ノ凝ル者ノ如シ

篇蓋 江陽有一婦人妻乳岩其夫者也野採一草
來使婦煎服之其塊遂消散卒紀本草第十卷澤
三郎青圃之求其草觀之則篇蓋之云虽未誠記

以廣異聞

薰葉 治乳岩及結毒

卷石 三戈

白松 三戈

雄黃 研破

石羔

朱砂

銀砂 和製三朱

板葉 煨

沈香 各一戈

右几呈研末分爲二十一爰再以一爰末搥入熱
穴三分中先以紅花造細箇長約三四寸乃以柔
次填實鐵定具口中時候具口念冷水取箇灼灰
鼻半寸許向穴裏之一箇一喫日宜用三箇七月
而後右以藥下之

下菓方 代赫石 二戈 巴三 一戈 手

治乳岩奇方 右二呈凡梧子大每服五氏白湯送下

若棟皮

露房房

雄草屎

始煨存性各三

又方 右三呈細末每服一戈溫酒送下日三次

夏枯草

花葉俱雪入食塩以許再和勻敷患

如具効如神塩多量以適口力佳

乳岩神方

守宮 煨存性

爲末和酥敷患處

之乳汁方

乾草

露蜂房 各五十

日中 二十

竟腦

五分 右各燒存性日二戈承飲送下有効

治乳房腫疔膏奇方

樟葉一戈 吹乳 附苧葉 各

川芎三分 右酒一服又和酒貼患處

妊娠 不孕 隨胎

治惡阻方

伏竜肝五分 白朮 猪苓各二分

右三葉細末每服白三分至五分日數白湯送下

產后吐吐亦佳

犀角湯 治妊婦口中生瘡者

犀角三分 當飯 芍藥 各七分 川芎

五分 生芩 八分

右五葉以水二合煮取一合服日二

治產前口中腐爛不得食者方

楊梅皮 南星 各二分 口中

右三葉以水二合煮取一合食前含之初慘疔不

可悉如女二三次止食乃進

隨胎方

午膝根五寸二分 切リ一寸ノ切口ヲハスニ

切リ片膏ノ末ヲツケ子宮迄サシコムニ血下

レハ引ル其方ヲ行フ中胎子ニ戈以水二合煮

取一合服神如

〇血塊 經閉

婦人腹滿如鼓脹致卒不治者アリ経用ニヨル者

人

ハ菝仁承氏驚甲削ニ直ニ月信通メ而満者ハ
難治之疾病ニハ小苗膏露水ヲ茶椀ニ三杯宛
中ニ若又子宮中ノ下ニアヲ入和液病ニハト
ルニスリ用ユハニ趨移ニ加用ルモ可ナリ一
日ニ五厘宛十日モ用暝眩ナキ者ハ分量リマ
スヘシ

驚甲散 治下血塊住水用茶狂者

土驚甲 酥製 琥珀 大黃

右三葉知末每服ニ戈白湯送下日一

流杖抵者氏 治月水不利膀胱急滿者

流杖 大黃各ニ戈 桃仁三戈 水蛭

一ニ十或ハハ分量

坐菜 右四葉氏梧子大

杏仁 口中焙ニ 丁子 一分 胡荽 二分

片腦 五厘

右五葉知末盛綿袋内藏中三日一換之

浮石氏 破瘀血塊癖

浮石 菝人丸 大黃 三積 莪朮 各ホ

地黃氏 療瘀血

芥子 白芍藥 一分 日中五分 黃芩

生膝 三分 菝仁 杏仁 各一

二蟲 介五 介五 介五 水蛭 一分

右九呆蜜氏每服五分日三服

治經閉帶下或生塊手足痿弱者

香附 阿膠 反鼻 大黃 各五分

右四呆 每服一錢 溫酒送下 日三服

下瘀血方

芍藥 酒 干漆 各一斤

灸法 治血塊癥瘕赤白帶下瘕病

先取自大椎至胸之寸以具寸自腫者背假点具

心而以無名指一寸折半為五分自假点左右上各

開五分下一寸无右四穴十一壯上下穴五壯

乾膝氏 治內有乾血經行不調者

干膝 三錢 大黃 十錢 右二呆 糊氏

加呆 乾膝氏

大黃 十錢 干膝 水蛭 各三錢

右四呆 糊氏

陰挺 陰蝕

薰方 治陰蝕

雄黃 一錢 硫黃 五錢 非仁 絡五 木鼈 子肉

一箇

右五呆

治陰脫方

一呆 漢煎早朝洗之是妙

五疳

山科象 蟲某方 治十兒五疳

紅花 積雪草 馬明 海人 大黃

白中 右五果水

寬胃托 山科象 治十兒癩疾驚積夜啼蓋治大人

堯積腹戶甚香

三積 黃芍 荒 木香 枳實 連

戎木 青皮 雷氏 霍虱 胡連 各四戈

赤豆 白丁香 各三戈五分 棟子 亭午

乳香 丁香 雄黃 丁香 熊胆 各一戈

右二十果細末以蕎麥粉為丸辰砂為衣每方小

兒 直視驚怖者有劫若喘者為散薑汁送下

治五疳方 一後通三齋枳方 治十兒疳疾日暮不了者從兒年數服午黃氏

七日疳疾者七日右眼中之翳如散米粉

人多 紅花 山菜 大黃 丁子 輕粉

挑人 芎藭 右八果為細末盛絹囊投煎湯

須臾絞去滓服痰血下后以微火炙眼中

石羔 五倍子 石決明 各五分 右四末以

大芦會氏 治疳積蝕脊膈自熱羸瘦十指生瘡頰

喘指甲等症 無黃仁 青黛 枳柳 黃連 酪一

胡連 使君子 各七戈 南木香 三戈

蟬退 二十戈 丁香 五許

右十果為末取獾狢二枚之汁和氏如麻子大每

服三十凡不飲送下

馬明湯 療十兒疳瘵一切虫疳毒

馬明湯 一匁 紅花 青黛 各五 日中

大黃 二匁 右五羊水煎

治疳眼疔

鱗肝及心一具 芒硝 七分 辰砂 一分

右以好酒浸肝入土器於湯中煎之酒尽則合大

一再煎之合和二羊氏之

一疔 治十兒口眼喎斜毒

丁香 一匁 海人 十匁 十之 二十 辰

右三羊

十兒浮利脈者不治之

疳瘵

治疳瘵異論者疔

黃連解毒加鮫鯉反鼻

疳瘵見点ヨリ十二日ヲ控テ眼下同者ハ速カニ

合セサレハ毒氣凝結メ眼中星ヲ生シ生匠失

眼ス速ク早ク蒸メ同カシムハシ若シニ三日

モ合レハ必星ヲ生メアル者ハ其症ハ世匠

内大連竟加散精草外ヨリ種々ノ点葉ヲスレ

疔具初速カナラズ今左ハ一疔ヲシテ尤奇驗

アリ

蘇方 治疳毒入眼毒

兔糞 一羊 絹裏浸温湯頻蒸之又別有方

白艾子 阿膠 南星 以上三羊 細末 飯裏

疔瘡泉內服大連竟加大黃
 伊勞海海皮一發疔瘡及諸瘡疔毒亦同穿山甲
 治疔瘡眼入膏方
 大方子 一星為末毒飯和貼而會兒
 白華散 治疔瘡黑陷者
 白花地連煨熟 大丁香
 右二星細末每服五分水和沈酒下須臾亦發熱
 瘡之紅活
 瘡瘡咽中 一星用之入心可
 瘡瘡人拔一星煎用如之又咽中 一星用之
 者二星用之可也
 拘靛氏 治疔前發驚者

天竺 木香 沉香 雄黃 琥珀 人參 檀香
 辰砂 珍珠 廣香 犀角 金箔
 右十二星日中汁和氏大星大每服一凡嬰兒半
 凡服
 治疔瘡發熱星香
 象牙 一星水服初勝於一角
 馬脾風 走馬疔
 走馬疔
 刺毒中沃尺寸血
 又方
 金箔 三枚
 括落 三枚

右二星研合以兩傳患也

又方

夏草燕兒薑霜 一星知末按之神效

琥珀丹 治馬脾風及氣急症

意胆 琥珀各一戈 辰砂二戈

右三星知末蜜漿每服五十三粒大兒服五內

年者門石羔杏仁口中湯

胎毒 頭面瘡

治大人十兒頭瘡方

天花粉五戈 輕粉二戈 土竜霜凡多

右三星知末和調敷患處油

馬明湯 治諸頭瘡

馬明湯 治諸頭瘡 江花 荒 日中 石羔

刺艾 梓艾 苦多 右八星水

石羔黃連口中湯

治頭面諸疾或刺鼻中愈肉若疔是或毒疔者

石羔三枚或 黃連 日中

右三星水

驚風

治慢驚風方

浮石 一星白湯送下

三聖湯 神效

治急慢驚癇或小便青色或黑或

如膠惡椒入服吐乳不止喘急手足寒冷者或可

紅花 鬱金 山礬 各五分

右三味浸酥一為取以閉于

治慢驚風方

地骨 地床子 口中銜 骨

右四味細末白湯送下下咽即愈

治小兒驚心吐毒衝咽喉瘡癩煩悶不止者

胡薄荷 連錢 中 右一味搗取汁服

又方

熊胆 一兩 浮石 十支 辰砂 三錢

右三味先以水溶解熊胆和諸藥乾以未冷水服

小兒雜疾吐乳

十兒吐乳大便青色者必死之卜本草丁子ノ附方

見ヘリナリ南説ニ芒硝リ蒸露鑿ニテトリ用
テ可シト云リ

紫胡驚風湯 十兒胎中宿熱母因飲食粗惡乳汁

辛苦毒黃瘦瘠致回支瘡癩淹疾者其湯主之

紫胡 芍藥 驚風 茯苓 枳實 大棗

口中 右七味

治吐乳方

二陳湯加連莖

治十兒吐乳搐搦青便奇方

鹿角霜 琥珀 鱗蛤石 各二 酒石 壹一

今作別方 硫黃 一錢

右五味少散蜜菓中用

香林軒禁方録卷之四

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

視力之弱病論

晴厄利亞

ヨラニステヘニクニ 著

和蘭

ライスセニ

沃

牙一偏

論視力之弱病症候及原因

凡ソ此病ハ外ヨリ見テ以テ明カニ診定スルコトナリ難ク何者倍膜ノ
脈絡盈脹スルナクモ餘ハルキキリ明カニ変化ヲ失ワス事モ
損傷ノ此レヘキナケレハナリ

惟此病ノ明徴トスヘキ候ハ眼目ノ知覚ナリ敏捷ニシテ其及
ヒ外来ノ刺戟ニ堪ユラユナル者ナリ則チ其証之氣赫灼ナル

香林軒禁方録卷之四

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

視力之弱病論

晴疋利亞

ヨラニステヘニクニ

著

和南

ライスセニ

沃

牙一偏

論視力之弱病症候及原因

凡ソ此病ハ外ヨリ見テ以テ明カニ診定スルコト難ク何者信膜ノ
脈絡盈脹スルコトナクモ像ハルキキリ明カニ變化ヲ失ワスモ
損傷ノミルヘキナケレハナリ

惟此病ノ明徴トスヘキ証候ハ眼目ノ知覚太ク敏捷ニメ支氣及
ト外来ノ刺戟ニ堪ヒテラユサル者ナリ則チ其証支氣赫灼ナル

者ニ向ハ患者勿ニ疼痛ヲ奈ニ稍重痛ナル者ニ至テハ太陽ノ光
像ヲシテ眼ニ入ハ疼痛スルヲ殊ニナリシク其疼痛眼底ノ一部ニ至
テ牽張壓迫困重ヲ童子外ヨリ之ヲ推セハ殊ニスラニ見フ故ニ
光氣明亮ノ病室アル中ハ其疼痛益増進ス

患者之カガニ光像ノ正直ニ来ルヲサリトノ知ラス自ラ眉ヲヒソメ
テ下ニ推シ或ハ手ヲ前頭ニオキ平岡ノ状ヲ以テ物ヲ眺視ス
〔註〕スタイチエ用ノ人其地ニ水山雪野等ニ有テ其反光ノ劇
是ナルカ故ニ正視スルヲ克クス皆視視ノ癖アリ其形状恰ニトコ
ノ患者ト一歟ナリ

患者流書ロトシ若シハ微々ノ者或ハ光輝アル者ヲミニトスル中
ハ視瞻速ニ能キトシテ錯乱ニ次テ疼痛牽張ヲ奈ニ以テ速カニ
其ノヲ瘥ヤルヲラエサルニ至ル
虹彩ノ運動モ又尤敏銳ニシテ光像洞膜ニ徹スル中ハ瞳孔直ニ縮
小スルヲ太リシ之ニ又此病ノ明徴ナリ
光氣ノ眼ヲ刺戟スルヲ已甚ナル中ハ偏涙液分泌損スルヲアリ然
レニ是ハ太リ稀ナルヲニメテクハ涙液分泌増進スル者ナリ
向ソ此病ヲ誘発セル所ノ遠回ハ假令必シモ常ニ然ルニ非ストモ
大卒皆全身ノ衰弱ナリ
是故ニ此病ニカニル所ノ人ハ病后及ヒ筋力乏シク弛緩セル人ニシテ
又男女比ニシテ病ハト雖尤婦人ニ多シ

凡ク眼焮瀉ハ急性ノモノ慢性ノモノニ拘ラス治法必ス僅微ノ刺戟
ニ在フト虽忽々病ヲ痊シ易キノ癖ヲ疾ス其他久シク眼ヲ劇シキ
光氣若クハ反光ニ暴射シ或ハ流書シ或ハ微激ノ物品ヲ見テ以テ
眼カラ賈純スルハ皆此病ノ因トナル
以病ノ近目ハ余カ按ニ目テ之ヲコレニ是眼目一部ノ衰弱ニ非ズメ
反テ角膜ノ感觸非常ニ増進スルナリ而モ其感觸増進ハ角膜若クハ
脈絡膜ノ破瀉ニ由テ其脈絡ノ盈脹スルヨリ起ス身ノ両膜ノ中何
レカ一膜ニ破瀉アルハ他ノ一膜モ亦必ス受ル一トヲ得サルカ故ニ以
病ニ於テハ大抵兩膜共ニ破瀉スル者ナリ

夫レ寒冷ナル氣ハ運康ナル肺臟ニ吸入スルハヨク其運動ヲ促進

スト虽モ角膜破瀉スル者若クハ然ラスモ牽張シテ感觸ニ易
キ中是ニ抵觸スルハ忽々因重ニ侵蝕スルカ如キ感觸即視力
弱ヲ起スル是其光線ノ刺戟血液ヲ以テ既ニ非常ニ盈脹セル
脈絡ニ瀉入セシムルハ
日常ノ実験ニ由テ之ヲコレニハソノ身体一部刺戟ヲ受ルトアルハ
ハ諸液コトニ運動輻湊スル者ニ
又コタルレニハノ液ニ云ク凡ソ諸液度ヲ差テ一部ニ盈脹スルハ
手ヲクハ其侷積ノ虛弱ナル者ナリ
ニ夕生活侷ノ纖維牽張スルトアレハ愧テ物ニ如何ノ症ヲカ起
セシニコレ疾疢ニアラスヤ而メ疾疢ノ強弱ハ必ラス其質纖維

知所

ノ剛柔ト其部感觸ノ銳鈍ニ関心スル者ナリ字者此三件ニヨツ
テ以テ工夫セハ明ニヨリ此病ノ本性ヲ察スルニ足ニ視力乏弱
病ノ真性ニ網膜ノ後性燭性燭傷病ニ關係スル者ナルトハ亦内
部頭水病ノ初発ニ於テ之明ヲ忌避スルノ症ヲ以テモ確知スヘ
シソレ此病即頭水病始メ脳内ノ燭傷ヨリ発スル者ニメ其燭傷視神
經ヨリ網膜ニ施及スト虽其始ニ於テハ此ニモ眼ノ燭傷ノ候ヲ見ツサ
ス結膜ノ脉絡盈脹セス実ニ此漏ノ初ニ萃ル諸症ト分明ニ其致
ヲ一ニス

白内匠ヲ曳出スル件毀傷スル所アルニ由テ深クアル処ノ膜ニ後性
ノ燭傷ヲ起シ由テ以テ屢々発スル所ノ視態妨碍ノ症ヲ以テモ

此病ノ本症ヲ明徴スルコトヲウヘシ

〔注〕サウニデルム即サウニデルム曾テ発明セル所ノ白内匠方術ハ古来曾
テアル所ノ者ト大ニ異ニメヨリ如女危篤ノ症ヲ受ルニ適吉
ス自ラ屢ニテ試ルニモ後ルコトナシステヘンソニ即味書ノ著者カ白
内匠著書ニサウニデルムノ尺牘ヲ載メリ其言ニ云ク余カ
術ヲ施スヤ其始先ツ衰弱ノ落劑ヲ用テ十分ニ瞳孔ヲ開カシ
メヘルリールズグクテ止蓋ニ眼ヲ保持スル
所ニ置キテハナリ若シクハ自ニノ指
ヲ以テ其眼ヲ保持シタルヲリ運轉スルコト毎ラシメテ所向ニ
シテ行フニ而シテ針ヲ眼ニ入ルノ目的ハ大抵水晶素水溶液
ノ前面ニ於テ截断ニアリ然レニ水晶液ハ其中央凸起セルカ

故ニ必ス女シク水晶液ヲ貫カサルコトヲエスト至心ヲ用テナルヲ
ケ針ヲ囊ニ近接ス是故ニ針ニ尤細クメ扁ク両开アル者ヲ
要ス実験ニ由テ之ヲコルニコカルル及ヒコトエイ人ホカ用所
ノ針ノ如キハ水晶作海ト囊トヲヲニテ動カスノコトメ利貫
スルコト毎ク之ヲ虹彩ニ遇迫セシメテヨク破衝ヲ登スルコト至
余カ用ル所ノ針ハ鏡ニメ至剛ノ水晶作ニヨク利貫スルカ故ニ未
メ嘗テ如女ノ害アルヲニス而メ水晶液実作ノ方術ニ至テハ
ノ宜キニ随テ斟酌スルニハ唯其実履ヲ載破ルノコトメ拵下
コトヲ要セサルコトアリ

針ニ宜クモ様鞆帯後一分許ノ処ヨリ剛膜ヲ貫テ水晶液作上
部尤柔軟ナル処ニ達セシム水晶囊ヲ截分フヘキ症ニアフテハ其
囊ヲ截分フ前若クハ後ニ医ノ但懺自ラ溶解スルコトアリ而シテ
其囊ニ何レノ病ニ拵テモ必ス截分ラシムハアラス向テ水晶液
實履ニ拵レル者ニ就テハ余ハ天心意ヲ勞セス時トメハ其自ラ
ルニ任セテ其液ノ毒分ヲ前室即角膜虹彩ニ流移セシムル
アリ然レモ拵下スルコトハ虹彩ヲ壓迫スルノ恐レアルカ為ニ取
テ之ヲセス

生レテカラ病ニ所ノ白内医ハ通例水晶液ニ在テ即囊水晶液
ノ実作ハ胎内ニアルハ既ニ早ク自ラ脉絡ヨリ吸收シトラル
者ナリ余カ此症ニ施ス所ノ方術ハ前ニ拵ル者ト異ナルコト

ナク加之ニ具規則大抵水晶作匠ニ於ルカ如ク具目的ハ唯具
 中央ニテクノ孔ヲ開テ光線ノ射入ニ妨碍ナカラシム哉或ハ具
 匠水様液中ニ溶解消去スヘキヲ預メ察スルハ此ヲ微塵ニ
 破碎スルニアリ故ニ此ヲ術ハ以前ノ者ニ比スルハ針ノ運轉作
 用ニテ容易ナリルノ尺牘以上ヲウシテ
 ステヘソニ其法ニ從テ術ヲ施スト至精盡フ処アリ即術后
 ニ刺戟物ヲ以テ匠ヲ吸收セシムト針ヲ短フメ佃カラシムトコ
 レニ此針ハ近傍ノ部分ニ毀傷疼痛如衝ヲ起スト益ニニメ具フ
 具下ノ凹キカ為ニ針孔間隙ナクメヨク水様液及硝子液ノ滲ミ
 ラ停リ然レトモ此針モ一ツ至剛ナル表匠ヲ截分フニハキリ十分

ナラサルカ為ニ彼自ラ又一種ノ佃刀ヲ發明ス其刀ノ長サ一寸許リ
 ニメ以端曲レリ其曲レル所四分許リ兩刀ヲ汝ケ具部ノ幅大抵五
 重許ニメ末ニ至ルニ從テ漸ク太トカラシムベシソールスリシラレ
 前ノ製モヌリヌク女ノ具眼收ニ抵ル処ヲ大ニ一部ノ壓
 迫ヲナストヌクニ眼球ノ保持益堅固ナラシム
 右件ノ諸命ニ由テ之ヲミルニ視力至弱ノ原目ハ眼内ニ於ル膜ノ如
 衝子視神經ニ依テ眼ノ網膜ニ波及スル所ノ脳間如衝子或ハ白内
 匠ノ施術后ニ発スル眼内ノ如衝ニメ皆其症ノ外部ニ見レサル者
 之至劇ノ支障モス眼ニテ同種ノ症ヲ発スル者カ又然ラサルカ
 下条ノ解説ニ由テ之ヲシヨ

過度ノ支線実ニ洞膜脈絡ヲ盈脹セシメテ以テ疾疢破衝失明
ヲ起ス^{未詳蓋ニ就テ明ニ徴スルニ足ル}トハアルヒス

其眼^{即ア眼}ノ感觸尤敏銳ナルトハ皆人ノ知ル所ニメ^己其眼中魚
海ノナキカ故ニ支線ヲ吸收スル^{ナク}直ニ剥露セル洞膜ニ暴觸セ^己

ムル由ル^ト疑ナシ

コカ為ニ支線非常ノ射入只ニ控疔ヲ起ス^ノミナラス血線ヲ盈脹セ^己
メテ以テ眼底^ニ澱^江色若シクハ鉄色ヲ見ワス^而メ其射^ハ長ク保

続スル^ハ其血^絡血液ノ之積盈脹スル^ト愈増進メ^遂ニ急性盲
ヲ発ス^ルニ至ル

〔注〕フリユメニバツク^人ノ書中ニ曰クアルビノスノ眼具虹彩

及瞳孔内ニ江色ヲ見シテ其感觸^太リ敏銳ナル者ハ蓋シ

魚^粘液ノ全ク^缺ニスルニヨル者ナリ

其書中又「ボニリエウス^人ノ夜ヲ引テ曰一盲目其眼ノ

内膜魚^粘液^缺ニ由テ感觸^劇シク^支輝ノ刺戟^ニトヘス^己

テ発セル者ヲ^コタリ

夫レ破地ヲ^キ南方ノ国及^ニ干^年汗^リモ白雪ニ掩ハル^トハ^方ノ地

ニ於テ^盲者ノ味^ヲキ^ハ亦日^之ノ^反照^ニヨル^ニア^ススヤ

〔注〕^之輝強キ物品ヲ^コル^トノ^己ム^トラ^エサルヨリ眼^ニ至^大ノ

害ヲ^ウクル^ト尤明ナル例トス^ヘキ者ハ^東国ノ^盲人^ニト^ムソ^ニ

人曰^ハ其地ノ人ハ日^之ノ^高ク^眼上^ニ照^スラサケニカ^ヲニ^下視^シテ

却テ更ニ蒸氣ノ蒸弁ト劇ニキ反照トニ具眼ヲ損傷セラ
ルニ者ナリ

赤帶以下ニ住ル処ノ至細至人ハ昼間瞳子ヲ眼内ニカリコテ
唯白膜ノミヲ見スカ故ニ破上ニ映スル日支ノ反照ニ具眼ヲ害セ
ラレス白雪ヲキル地ニ於テハ盲目ヲ以テ取テ非常ノ病ト
セス又「正キセニホニ」人ノ語ニ云ク「セイリユス」ナル人軍ヲ曾
テ他國ニ送ルハ数日間深雪ノ山中ヲ行カシメ軍卒皆白雪
ノ光輝ニ具眼ヲ侵サレ或ハ全ク明ヲ失セル者アリト最故、意ヲ
用ル旅客ハ劇ニキ反照ノ害ヲ防ニカニ常ニ祖偏ヲ眼上ニ掩

〇第二編

論視力之弱病年他病之區別

ヒツボカラテス人カ所謂ルアムブレイオスモスアニターウス人カ
滑所アムブレイテスアーナウス人カ所謂ヒエスヘビチユトニ
挿良斯人カ所謂ヒエゴヒエセイバイブレフセテラヒエエ及ヒニウ
ハイセホハ皆其書ニ論スル所ノ視力之弱病ト同一ノ病ナリ
視力遲鈍病ト視力之弱病トハ人ノ常ニヨリ相混メ錯誤スル
太リキカ故ニ今又両病ノ區別ハ明ニ解説セサルヲラス
視力遲鈍病ハ其病獨膜感融ノ過度ニ非スメ実ニ其感融ノ缺ニ
係ル

此病ニ於ル症候ノ尤顯著ナル者ハ唯此コリ距離セル処ニ於テ明ニ
 物ヲ辨スルノ難キノミナラス又随時随処ニ於テトメ視瞻錯乱ス
 ルコトイフス
 眼目ヲ使フテ強ケレハ勿ク速ニ疲勞シ又同眼ヲトナテ麻擦スル
 ニ非レハ再ヒ整復スルコト克ワス
 瞳孔ヲ散大シ強烈ノ光輝ニ逢フト虽只僅ニ運動シ或ハ全ク然セ
 ズ然レトモ取テ別ニ光輝ノ妨害ヲ免ハス此病ハ中年ヲ過ルルニ至リ
 且ツ眼鏡ヲ過用スルカ若クハ誤用シテニ至ルニ身作ヲ衰弱セシ
 ムルコトアルヨリ余ス所メ其病通例同症ニ冬ニ於テモ症ニ由テハ且
 増進ナリ速カニメ早ク十分ノ盲眼トナルコトアリ

女病 視力違

ノ瘡法ハ諸家種々ノ論説アツテ各相違フト虽今

コノニ一ノ牧草スルニ違アラス

且瘡法ノ尤知ラサルヘカラサレ者ハナルヲ務テ静止ナラシムルト

此病ヲ誘発シ易キ諸因ヲ表クルトナリ

余自ラ実験ニ由テ之ヲ此ルニ此症ヲクハ難治ノ者ニメ余カ此症

ニ用テヨク功ラサル所ノ瘡法ハ眼目一部ノ刺戟ナリ其法ハ則チ

エシキテールカルバニアテル及チ番椒浸劑或ハ桑葉劑ヲ眉ニ施ス

ホシ此諸劑ヲ以テ真ノ視力之弱病ニ施ストキハ其功ナキノミナラ

ス或ハ却テ至害ヲナスコトアリ
 内服劑ハ水銀劑ヲ用テ吐涎スルニ至ラシメ且テアルニカ及ヒ

解疑ノ諸果ヲ平テ屢切ラユリ
又両面凸起ノ眼鏡ハヨク支障ヲ軋奏セシムルカ故、此病ニ用テヨク
視瞻ノカラ助ク

〔注〕余曾テ実ニ真ノ盲眼トスヘキ者ヲ真ノ視力遲鈍病トナ
スルキテル及ヒカルハニラ施シ以テ大ニ切ラユコトアリ

或後ニ云フ盲眼ノ一種視神經ノ麻痺ヨリ起シテ其麻痺唯腸
胃ノ汚物ヨリ波及スルコトアリ故ニ唯汚物ヲ疎修メテ之ノ快暢
ヲウルト

又ソフ^ト人書中ニ一種ノ眼病ヲノセタリ即其言ニ云ク眼日衰弱
メ一症較著ノ原由ナク唯コレニ強烈ノ刮壁言ハハ□カ^地ヨリ取

來ル所ノ故兒撒漢ロニ^地製ノ亞的尔^{單果}ヲ用^{或同量}

テ大切ヲ長スル者アリト又曰此病時トシテハ他ノ刺戟劑ヲ用テ
劇ニキ^{破傷}ヲ起セシ由テ以テ始テ眼内諸部ノ衰弱ヲ整^返スル

コトヲウル者アリト
視力遲鈍病トカラウ^ムノ^{灰白}眼^{トモ亦大ニ}蓋フ視力遲鈍病ニ

於テハカラウ^ムノ如ク深ク^{眼底}ニ^{コレ}灰白色ト^支沃アル真珠
色ト共ニコレ毎ケレハナリ又^{破傷}眼ノ^較症ニ^看眼ヲ以テハ実

ニ視力多弱病ト同一病ナルカ如キ者アリ「^{コト}」^人此両症ヲ以
テ同一病トセルカ故ニ余今^此両症ノ^征候ト及^治法相異ナルト

ヲ^詳カニ^説テ以テ明カニ^其全ク^別アルコトヲ^示サスニハアラス

此ヲ以テ今更ツワリヒカモ線病ニ於ル命夜ヲ辱テ次ニ余カ夜
 ラ演ヘ以テ妾ク之ヲ命定セトス即ワリヒカモ線痒破眼ハ屢
 且眼内及眼睫ニ些ク破衝ヲモ見ス一毎キ者アリ余如此症ヲ
 コルヲ女ナカラス其実験ノ事キト諸患者ノ言トニ由テ明ニ此病
 ノ本性ヲ知ルヲ要タリ余親シク之ヲ此ニ患者眠ルホノ事件
 ニ由テ眼睫ヲ閉ルヲ有ハ眼者互ニ相回着シ場クカツ夜間
 ニ於テハ眼睫ニ困重ヲ覺ヘコレカガニ睡眠ヲ催スモノモアラス亦刺
 戟物ノ眼ニ入ルニモ非ス人患者知ラス自ラ眼睫ヲ閉ルニ至ル此ニ因
 テ此症ハ此ニモ線ノ分泌一種ノ疾病ニ係ル者ナルヲ察セリ故ニ
 膏毒銀脂名物考水銀ノ毒ニ出ツヲ用ルニ其功ヲ奏スルヲ實ニ此症ノ外

部ニ見ハヒテ爛傷赤色ノ眼睫ニ発スル者ニ於ルカ如シ

然レ此モ線病ト視カニ弱病ト互ニ相異ナル徴候太クマナシ

視カニ弱病ニ於テハ一トボム線其ニ一トボム線ハ膜ノ内面ニアル膏

毛線ト云モノハ即チメーボム線ト同物ナルカトシ 女ニ妨害ナク其極衝ヲ進フスルカ故ニ夜

間眠リヲ催スニモ非ス又僅微ノ害モアルニアラスメ唯眼睫困重ヲ覺

テ蓋因ニ且腫潤ニ眼膜ノ固着スル患害ホアルヲナシ

故ニ水銀劑痒破衝益ハ 膜縁ニ施シメタニモ功アルヲ毎ク却テ屢

危害ヲ招クヲ要シ加之ニ支線ノ射入ニ由テ発スル所ノ劇症ハ

痒破衝眼ニ絶テコレ毎キ処ニメ実ニ両証互別ノ一大証徴ナリ

或ハ痒眼破衝ノ重症ニ於テハ屢ク視カニ弱ヲ極度ノ症ヲ重ル

者アリ医ノヨク心ヲ注カサルヘカラサル者ナリ
 然レニモ如此重症トナルニ至テハ皆破衝眼既ニ看クモ涙ノ必分
 液酷而トナリテ刺戟スルカガニ益々ハレキ破衝ヲ発シ其破衝脈縁
 ヲリ漸ク結膜ニ及ヒ施ラ逐ニ角膜ニ至ル
 余以為此症ニ於ル光輝ノ妨害ハ唯淚及ニヨルカ若クハ角膜感觸ノ至
 劇ナルニ曰ル者ニメ真ニ洞膜ノ疾病ヨリ発スル者ニアラス夫レ角膜
 常ニ感觸連鈍トシ破衝ニ由テハ極度ノ感觸ヲウルニ至ルテ行テ勤
 帯軟骨ハ常ニ知覺ナシトシ疾病ニ由テハ劇甚ノ疼痛ヲ発スルニ至ル
 ト同一般ナル者ナリ

〔注〕余ヨリ之ヲコレニ此命ハ尚感觸極ト物ニフテ疼痛感觸極
 ヲ覺ルル極限

物ニフテ運動ヲ
 発スルノ極限ノ區別ヲ設クテ詳カナラサルニ似タリ夫レ角膜ノ破衝
 ハモ様伴脈絡膜及虹彩ノ破衝トモニ感觸極ノ症ニ屬スル者ニメ如
 此ニ洞膜視神經ホノ如キ感觸器ノ破衝ヲ發ルニ非ハ始ヨリ感
 觸極ニ屬スルノ症ヲ発スヘキ者ニアラス凡ソ諸器ノ生活及其精カハ
 ミナ此兩極ノ内合ニ心スル者ニメ其均合度ヲ変スルテ有レハ必ス疾
 病ヲ発スルメ其発スルヤ侵サル部ノ異ナルニ心メ極内何レカ先ツ
 強テ他ノ一極ニ変ラ生ス故ニモニ感觸極進テ極度ニ至ルハ先
 ツ疼痛疼痛ヲ發シ其發シノ感觸極ヲ増進セシメ而シテ終ニ其
 益ヲメ死産セシムルニ至ル而シテ感觸極ニツ増進スルハ血液直ニ其
 部ニ輻湊充積ス然レトモキリ疼痛ヲ發スルテ毎ニ若シ血液輻湊

増進ニ由テ感觸極ヲ刺戟スル中ハ前症終ニ歟衝ニ至ス是於テハ
 両極互ニ増進スルカ故ニ唯赤色腫疔ヲ發スルノミナラス痒疔及具
 它ノ感觸極ノ諸疔ヲ起シ因テ痒癢及諸液分泌ノ發ヲ生スルニ至ル
 其命ヨリ中ハ視力之弱病脈絡膜歟衝病及ヒカトカ書中ニミセル
 外候ナキ眼歟衝ホノ病理自ラ明ナルニシ且諸眼病療法ニ於ル利
 益又チナカラス尙オベ子ニク上カ以書中ニ詳命アリ就テ之ヲミヨ
 且ツ此症ニ在テハ長時間ノ視察ナリ著ナルト有ルカ故ニ又真ノ視力
 之弱トナスヘカラサルト明ケシ然レ前ニ云ルカ如キ痒歟衝眼ニ視力之
 弱ヲ令促スル者全クナシ云フニアラス余モ又自ラ其症ヲ目撃セルト
 屢アリ但シ此合候ハ唯眞症ノ実ニカトカ説ノ如ク兩病同者

ニ非ス両症相異ナル所以ノ征徴尤モ輕著ナル者ハ眞ニ此ノ網膜
 感觸ノ疔兩ヲ同療法ヲ以テ治スノ方ニナルナリ即候縁腺毛腺ハフ
者ト同物
 如ルカノ輕歟衝ニ切アル者ハ必ラス視力之弱病ニ害アリ

〔注〕余嘗テ親母兄ノ此合候ノ病ニカルラシル其始メ先フ埋針法
 シ下腺ニ施シ之ニ眞ニ他ノ強壯性過度ナラサル滋養劑ヲ与テ視
 カ之弱速ニ治シ次テ水銀劑ヲ著ニ施メ毛腺ノ病状痊愈由テ以
 テ十分ノ快復ヲモタリ

右件ノ諸命ニ由テ余今視力之弱ノ眞症ト混雜錯雜ニ易キ諸
 病ノ區別ニ於テ要ナル者ハ殆ト皆之ヲ尽セリ故ニ次編ニ於テ
 ハ將ニ余カ実験ニ由テ自得セシ此ノ遺奇ノ療法ヲモサントス

○牙三偏

○論視力之弱病之療法

余カ以視力之弱病ヲ始テ此ノ患者ハ其作癩極テ軟弱其病
ヲウルヤ文字至細ノ書ヲ読テ非常ニ視カラ賈シ習字ヲ研精シテ
屢夜ノ深キニ至リヨリスル者シ

是ニ於テ余以テ此ノ症ニ於テ其網膜感納ノ非常ナルハ是レ神經
カノ虚脱ヨリ發スル者シト

故ニ鎮痙收斂ノ劑ヲ外用シ強壯神經劑ヲ内用メ之ヲ防カント
ス然ルニ其劑印ナキノミナラス反テ害アルヲモル

單ニ刻苦ニテ種々ノ療法ヲ行フト至クモ一モ印ラレトノ毎カリシ

カ故ニ始メテ從來定メル迄回ノ考按當ラサルコトヲ疑ヒ再ヒ思

惟メ以テ此ノ病ニ於テ非常ノ感納ハ實ニ網膜若シクハ脈絡膜ノ線

燭燭カ或ハ然ラスモ其血絡ノ盈脹ニヨル者ナラント以テ考按ヲ以

テサウシテルルニ適當ノ療法ヲ回フニ彼モ亦未ク實驗ナキカ故

ニ明ニ答ルコトヲエス是ニ於テ再ヒ先ノ考按ニ由テ以テ其療法

ニ安リニ冷性收斂ノ劑ヲ外用シ強壯劑ヲ内用メ眼ノ精カラエ

ヘカラス唯且シク眼ノ内膜ニ於ル血絡盈脹ヲ減退シ且テ網膜ノ

感納非常ナルヲ鎮靜セスニハアルヘカラスト所レモ其患者已ニ辟去

ルヲ以テノ故ニ終ニ此考按ノ當否ヲ試ルコトヲエス

其向日ナラスノ同症ノ一患婦ニ招カル往テ之ヲモルニ他匠已ニ強

此劑ヲ用テ切ラエサル者シ
此件衰弱已ニ殆ニト碍大及ヒ尋常ノ日影ラニルト至大害ナキ
ヲエス

其病ノ始ヲ尋ルニ自ラ常ニ碍下ニ書ヲヨシ画ヲ習ヒ針縫ヲ
事トスルヨリ登スル者ナリ

此トキタニモ痒破瘻眼ニ頃クノ侯ナクニ夕結膜ノ血絡毫モ盈脹ス
丁毎ク其發中半シト至其作質嫩汚加之ニ屢分扱セルト種

疾病ニカルトニ由テ大ニ肌瘦セリ

強壯劑ハ他医已ニ其配合及ヒ分量ヲ種々ニ用ヒ居セシモ
切ラウルノ毎リニカ故ニキメ治例ヲシスト至余カ考按ノ旨否

ヲ試是セシカ為ニ種ノ療法ヲ施セリ其法先フ蟬針ニ箇ヲトシテ

下脰ニ吸貼セシメ夜間ニカロメシヤ汗ヲ午ハ翌朝下劑ヲ飲シ

メ朝ソノ加密列盤乘菜ニ早ノ侵劑ヲ以テ眼ヲ温シヨク拭ヒ去

テ阿芙蓉液製法及用法
第五篇ニシツヲ治飢ニ昼間ハ鉛糖製法及用法
オニ篇ニシツ

ノ魚眼水ヲ以テ眼ヲ掩フテ之氣ヲサケ清涼緩和ノ境生法ヲナシ

蟬針ニ由テトシ所ノ血太メ僅微シト至患者衰弱ヲ覺ハ翌日下劑ニ

登スル所ノ下劑適宜ニト至衰弱ヲ覺ルニスルニ是ニ是具體

復ノ薄弱ナルニヨリ

然レトモ下劑治患者自ラ眼中ニ輕快ヲ覺ハ尙且ツ強烈ノ之氣
ニモタヘルヲ得ルニ至ル

〔自注〕或眼科家ノ説ニ如以眼ニ近接メ錐針ヲ施ス_トラ禁セル
 者アリ且後ニ云ク錐針法ハ 著ク眼眩ノ腫脹ヲ起シ施后
 暫時ニメ反テ眼ノ刺戟ヲニス_トアリ之ヲ防カニ為ニ宜ク之ヲ
 顛顛ニ行フトヘシト云ルニサワニテルス_ル及余カ之ヲ眼眩ニ施セル
 諸症ニ於テハ切ヲ得ル者毎ク尙且ツ玫瑰色ノ破衝ニ委ロトス
 ル劇キ症ニ於テモ芟菁_ニ同切ヲ委スル_ルコメリ加之_ニ眼
 破衝ニ於テナル_ルケ此_レ之ヲ眼眩ニ施スト顛顛ニ施スト且切ヲ比
 較スルニ其優_レル_ト遠_ニ殊_ニ眼眩ノ班_{或ハ}特ノ失色ニハ施后
 速ニ破衝精ニ阿芙蓉ト水トヲ加テ洗ハ_ハ其功尤著_シ
 如此余カ新療法ノ適當セル_ト愈明ナルカ故ニ尙カロム_ル及_レ下

劑ヲ三四日毎ニ服用シ且_フ其他ノ諸症皆懈急スヘカラナル_トラ命
 シ由テ視力乏弱速ニ治セリ其後只阿芙蓉液ヲ以テ洗サレ_メ強壯
 劑ヲ与ヘ特_ク催下ノ氏_系 大黃膏_ノ會石_酸
ニ_系ヲ以テ製スヲ用レ_メ皓_容ノ_魚眼水
 ヲ与テ_テ飲ニ全治ヲウル_ニ至_レリ且_レ后
 一婦人來テ治_ラレ_ルフ具_數二十五才許_ニ且_レ作_レ煩軟弱_ニシテ_レ感動_シ易
 ク一二月前ヨリ乏弱ノ劇症ニカル_ル且_レ病ノ始ヲ尋ル_ルニ久ク微_密
 ノ針筵ヲ事トス_ルト_レ碯_下ニ_レ流_書ス_ルト_レヲ_レキ_キヨリ_テ奈_スル_者シ
 〔註〕ロウ_ノイ_ノ人_ノ書_中ニ_云ク_一患者_針筵_ヲ事_トス_ルノ_太キ_{ヨリ}
 瞳孔縮_閉ヲ_奈メ_盲ト_{ナル}者_シコ_レ銅膜_ノ感_觸増_進ス_ルヨ_ル
 者_ニメ_且虛_脱ニ_ヨル_者ニ_アラ_ス何_者銅膜_虛脱_スレ_ハ瞳孔_必ス

脹大なる者ナレハハシクノ如ク微細事業ハ大ニ眼ヲ刺戟メ血
海ノ輻湊ヲ増進スル者ニト

テレニカ人^名白ク一牡羊燭下ニ流書スルノ太キヨリ刺戟ノ眼燭
ヲ祭メ清美^名印ナク^名飲ニ生命ヲ墮セル者アリト

此症^名眩ト前ノ患者ト同症ナルカ故ニ同一ノ療法ヲ施サニト欲スト至其
体^名質薄弱ニメ神^名經ノ感^名動強キカ故ニ取テニヲナシテス^名支フ試ニ強

壯^名收^名欽ノ劑ヲ与ルニタシモ印ヲ^名奏セス^名是ニ於テ意ヲ決メ^名錐針四箇ヲ
眼^名眩ニ施シ^名前ノ^名与フ

此療法ニ由テ諸症ノ減退スル^名前ノ患者ニ於ルカ如ク^名其功優ル
モ^名考ラス

患者自ラ云フ^名錐針ノ功^名實ニ神ノ如ク^名次前^名支^名氣ニ向テ^名實^名ハシ^名所ノ劑

疔^名唯一回ニメ^名輕快スル^名十ノ八九ニ至レリト故ニ^名余再^名ニ^名之ヲ施サス

朝メ阿芙蓉^名散ノ治劑ヲ用レメ^名点眼水ヲ与フ^名時ニ^名催下ノ氏^名ヲ

服セ^名メ日ナラス^名メ^名余症^名亮ク消散ス^名是ニ於テ尙^名具^名再^名登^名ヲ^名防ニ^名為

ニ強壯^名性ノ^名点眼水ト^名吉那ノ^名内服ヲ^名ナサレ^名ム^名后一二月ニメ^名来リ^名報

曰^名視^名瞻^名ニ^名十全^名健康ヲ^名エリ^名ト

女^名両^名疔^名ニ由テ^名ニ^名ラ^名コ^名ル^名ニ^名日^名茶^名種^名ノ^名方^名法ヲ^名施メ^名治シ^名易キ^名諸^名病モ
又^名浮^名血^名下^名劑ニ由テ^名如^名此ノ^名峻^名切^名ヲ^名得^名タル^名者^名有^名ニ^名モ^名知^名ル^名ハ^名カ^名ラス
實^名ニ^名此^名兩^名疔^名ニ於^名ル^名カ^名如^名キ^名峻^名切^名ヲ^名エ^名ル^名ト^名ハ^名余^名輩^名ノ^名治^名ニ^名於^名テ^名未^名曾^名有^名事
件^名ナリ

然トモ若シ実ニ網膜ノ虚脱ヨリ発スル症ニ於テ此療法ヲ施サハ又
 物サニ如何ノ大害ヲカシニ宜ク戒慎セヨ
 而ルニ此症ニ於テハ其実ニ精カラ脱セムヘカラサル如キ薄弱ノ作
 廢ニノ此過ニ心セルカ故ニ余今此病ノ症回ヲ明ニ徴セシカガニ又薄
 弱ナラサル作廢ニ於テモ此療法ノ過ニ心スヘキ者ナナカラサル治例
 ヲ設テセトス
 作廢健強ニメ排世劑ハ浮血下劑ヲ用ト虽容易ニ衰弱スヘカラサル
 今ニ於ル同種ノ視力乏弱ヲ同種ノ瘵肉ニ由テ具功ヲエシト
 一般ナル者ナリマシ
 今一ヲ具功ヲシル者牧岸スルハ却テ毎益ノ贅言ニ廢スルカ故ニ

唯個ノ例ヲ岸テ之ヲ示サントス
 千八百九年十二月一廿年獨莫太ハラ生業トスル者来テ余ニ治ラレ
 フ其眼視力大ニ乏弱メ日支燭下終テ之氣ノ強キ者ニ向ヘハ疼痛太
 メシク其來病發後已ニ二週ヲヘタリ
 余評ニ之ヲ診スルニ其眼中ヤモ破傷ナク毫モ毛線ヲノ症候アル
 ナレヨク諸症ヲ比較スルニ作廢精薄弱ニト虽健康毎恙ナルカ故ニ此
 病ハ全ク是只一部ニ限レルノ者ナルヲ察ス
 是ニ於テ以為即是視力乏弱ヲノ症ニメ其回莫太ハラ造ルニ視カラ
 賈スニ因テ網膜若シクハ脈絡膜ノ血管ニ血ノ輻奏スルヨリ發セル
 者ニト是故ニ先ツ錐針ニ個ヲ下腹ニ施シ夜ニ入テカロメル四日

ラ子(聖)朝催下ノ敬奉ヲ用ニ朝夕先フ喫ニキホトノ担湯ヲ以
テ眼ヲ洗ヒ次テ阿芙蓉液ヲ許ラ以テ治シ昼間一二回星ノ鉛浴
水水ノ一為押即鉛ヲ滴入シ具生業ヲヤメシメ肉食飲酒ホテ禁シ縁
魚ノ類ヲ以テ眼ヲ掩ハシム

患者其教ヲウケ去リ后一周ニメ再ヒ来テ云フ指刺皆大ニ切ラニ去ス
殊ニ蟬針ハ施后直輕快ヲ覺ヘ今諸症大ニ減退ロリト是ニ於テ余再ヒ
飯カロメルト下劑ヲ用シメ尚且ツ動脈ノ運動ヲ降鎮メ病勢ヲ腹
部ニ導カガカハ吐酒石ノ溶液ニ指ニ里斯厚利塩ヲ加テ隔日ニ飲
服セシメ其他ノ療法ハ此ノ前ニ同フス
其後十四日ヲヘテ又来リ謝メ曰フ視態大ニ明カナルト常ノ如ク之氣

ニ向ヘモ害モ害ヲ覺ヘス取テ疹疹セス
是ニ於テ強壯性ノ点眼水ヲ手ヘ己前ノ方法ニ代ルニ昔那ノ内服ト
滋養ノ摂生ヲト時々催下ノ氏業ヲ用ルテ命ス后遂ニ他ノ方法ヲ
用ルト毎ク不日ニ全ノ快復ヲエタリ

次ニ奉ル所ノ治例ハ益ヨク此病ノ症候ト療法トヲ明ルニ足ルヘシ
一壯年視カ至弱ヲ病ム由テ十八百十年來テ治ラレフ此中己ニ疹疹
大ニシラメ事業皆廢スルに至リ
自ラ云フ兒タル時瘡ヲ患ヒヨリ以來時ニ此病ニカニリ今時ハ其痊スル
丁巳ニ二月汗收斂劑及ヒ水銀劑ヲ外用シ種々ノ方法ヲ施スト至
皆切アルト云ク口トニ名ノ一眼科ニ漂ルニ此瘡瘡復眼ノ即眼膜ノ一種

ニメ下法ヲ授ク用テ皆功ナシ

年カニラコトニ燭下向ハ疾疔ナリシリ淚液大ニ流出シ日支ラシハ
尤則シク虹彩ノ運動ナク敏捷ニ強ク身伴他ノ疾病ナク眼中毫
モ破傷ノ候ヲ見サス又毛腺ナク疔ニテ故ニ余以テコト明ニ視カシ
弱ノ真疔ナリト

〔自注〕年カニ所ノ視カシ弱ノ患者ニテ燭下ニテヨリ日支ニテ元
ヲ雅コトス是怪シムヘキニ非スコウレル人ノ算ニヨルニ日支ノカノ
燭下ニテ元ト一テ千三百倍ナハ者ナレハナリ

是ニ直ニニ類針ニ個ヲ下腹ニ施シ夜ニ入テカロメルヲ年ハ翌朝
下劑ヲ用シメ朝ノ眼ヲ洗淨シテ阿芙蓉液沾粘シ翌日キノ事件ヲ

止メ洗薄清涼ノ攝生法ヲナシム昼間ニ綠色ノ翳ヲ被ラシメ頻リニ
濕ナル鉛劑ノ点眼水ヲ用シム

后三日患者未漸日ク革切ナク較著ニメ速疾ニ疾疔殆ト消又
シ支氣ニテ元ト一テ容易ニメ好害ヤク諸疔取テ翌日ノヒミアスト
又日類針ノ功殊ニ尤モ著ク其施ス件下テ輕快ヲ覺ヘタリ

是ニ於テ余再ヒカロメルト下劑ヲ年ハ且ツ病疔ヲ腹部ニ導カ
シカガニ吐酒石ノ溶液ニ純精酒石ヲ加テ日ニ三次用シム

后四日彼又來テ日支氣ナリ強キニ非レハ已ニ毫モ疾疔ヲ奈スル
ナシト余ニテ珍スルニ虹彩ノ運動殆ト常ニニテ前ノ如ク劑ニカラス
此トキ余將ニ旅行セトス故ニ患者ニ教ルニ下劑ノ下ヲ以テス次ノ

一週間尚オ一回カロメルト下劑ヲ用ヒ具時間絶ヘス尚催下ノ
温劑即此酒石浴液ニ也ヲ服シ其後若強キ先氣毛全ク疾疔
ヲ寛ヘサルニ至テハ方ヲ変メ收斂劑ノ点眼水ヲ用ヒ滋養ノ抵達
法ヲナシテ舌那ヲ内服セシム

右一週ニメヌテコレニ快復セリトキ約メ日ク再発スルコト有ラ
ハニテ来ルヘシト而ルニ血脈ニ來ラス因テ思フニ其十分ノ全治ヲ立
コト疑ナシ故ニ附録メ尙學者ニ示スヘキコトアリ強壯ノ患者ニ於テ
ハ下劑浮血ノ量宜ク衰弱ノ人ニ於ルキリ手ナカルヘシ衰弱ノ患者ニ於
テハ之ニ反スヘシ燼燻ノ度ニテハ浮血僅微ニト雖コレニ他ノ病
勢ヲ他部ニ導ク即下劑ヲ宜テ十分ノ治ヲウルコトアリ

凡ソ浮血下劑ハ度ヲスキテ量ナルヘカラス宜ク唯先氣ノ害ノ止ムヲ
以テ度トスヘキコト

第四編

揚子症候療法之正誤

余今ワローレカ昏中ニスル処ノ此ナト全ク明ニ同一ナルカ治例ニ種
ヲ引テ妄ニ揚子セハ余カ実験施治メ灼リナキヲ証スルミナルヘシ
何者且症候原因余カコレ所ノ者ト同一ニメ療法モ亦施ス所ノ
者ニ異ナラサレハナリ

余カ今コレ引ク所ノ第一種ハ其書中ニスル所ノオセ種ニメ題ス
ルニ次數語ヲ以テス病性全ク眼燼燻ヨリ發スル者ト同リメ明ナル外

候ナリ 蟬針法ニ由テ大切ラシク所ノ視力ニ弱ニ病

一婦人年三十四年七十七年車印度ヨリ來テ視力大ニ衰弱スルカガ

ニ余ニ治ラセテ婦人久シク恐國ニ住テ蚊ニスルノ太リキキニ由テ

且作廢太リ痛セリ 痒ニシラ疹スルニ両眼モモ病状ヲ見ハサス

以カラシクニ之類多ク必腹ノ酷厉トナルヨリ答セシ者シト故ニエニシラ

エニトシトリニム 取ラ両背ニ施サシムルニ三日瘡法尋常ノ痒

歟 瘡眼ニ於ルカ如此然レニ病状タシモ減良セス

是ニ於テ痒ニ具平生ノ撰生ホラ問フニ知ルトキ以此疾ニカカリ 蟬

針法ニ由テ大ニ輕快ラエトテラ覺フ由フ

是故ニ余其衰弱ノ太キト歟 瘡ノ症候ナキニ拘ラス誠ニ蟬針ニ

個ヲ両眼額ニ施シ三四日毎ニ答泡ヲ耳后耳上ニ貼シ且ツ冷水ノ

流劑會アルトテラ覺シカ故ニ朝メカシレ浸劑ヲ布疋ニ浸シ眼ヲ

掩シ又間拭ヒ去テ接骨木花浸劑ニ毫脳精ヲ加テ前頭及ヒ

額額ヲ洗ハシム

患者以テ方ヲ去テハムブスヒ 地ニ至リ後一月許リニ余登

ラ贈テ白ク蟬針ニ即切アルカ故ニ數次之ヲ用ヒ加密例抵浸劑太

ク快テラ覺ヘ今兩眼共ニ昏闇好ケナク唯強劑ノ支氣ニ向フ件ハ

婦下ニ流書ホラナス件ハ視カマシク弱キヲ覺フノミ

按ニ此症ハ明カニ視力ニ弱ナノ真症ニメ具回突ニ血液ノ眼ニ滲

スルヨリ答スル者シ若シ然ラスハ患部ノ浮血直ニ切ラ去セルノ理奇

知スヘカラス

次ニ卒ル所ノ者ハ其書中第十種ノ症ニ題スルニ左ノ教言ヲ以テス頭痛ト上脰垂下トヲ蓋テ燠衝ノ外候ナリ蛆蛆法ニ由テ切ラタル所ノ視カク弱病

一二年以前女子年二十未テ治ラセテ其視カ大ニ衰弱ノ日支母大ニ患ミルヲナリ難ク眼脰弛垂メ指ヲ以テ搦ルニ非レハ角膜ヲ見クヲエス之ニ蓋シテ頭痛同初ナク其症殊ニ前頭ニ是レ所メ此件具衰弱疾疔共ニ已ニ候徳セリ一ニ過ナリ蓋シテ女子ハ名譽ノ画エシ故ニ余以爲ク此病ハ其画ヲ研精スルニ眼カラ賈セルヨリ登スル者ニト

具外魚眼脰ノ垂下ノ外十全健康ナルカ如ク皮表ニモ疾病ノ候立ク脈動常ノ如ク清排泄大十便百十全ナリ試ニゴングウミニテユムニトリ軟名ヲ用ルニ蓋モ切アルト豆クエレキテルハ太リ細カニ施スト虽却テ衰弱頭疔ヲ増進シ強壯劑ハ内外共他医己ニ之ヲ用ヒ余モ亦年テ僅微ノ輕快ヲモセス

是ニ於テ余以爲ラク其病頭中ニ在テ其波及眼ノ如ク症ヲ起ス者ナラニト曰テサウニテルス名ニ導テ共ニ試ニ前頭疼痛疔尤利甚ナル処ヲ山ク截定テ瘡口ノ太サ治シトコロニ鐵貨ノ平命并ニト虽頭蓋骨脳膜瘻共ニ甚モ疾病ノ状ヲ見ス処ナシ然レトモ術后大ニ輕快ヲ覺ヘ眼脰自ラ完テ芝氣ノ漸入ニ前ノ如クニ

疼疔ヲ起サス

如此治愈ラサル者一週ニメ又再発シ疼疔衰弱全ク前ノ如ク
此疔以為ク前日外科術ニ由テウル処ノ輕快ハ蓋シ失血ノナス所ナラ
ニト故ニ試ニ蛆三四個ヲ頭額ニ吸貼セシムルニ速切アリ之ニ由テ病
患衰クテ三日又頭疔再発メ其強キテ前日ニ異ナラス故ニ又蛆
六個ヲ前額ニ吸貼セシメテ大切アリ

治切ニテ患部ノ止痛ニ施ケル淨血ノ一回ルカ故ニ尔後或ハ二
個或ハ三個時トメ八十个ノ蛆ヲ前額ニ吸貼セシメ或ハ頭額ニ
ス者一週間ニ二回如クスルテ十週許施ス毎ニ輕快著ク頭部ノ
疼疔視カノ衰弱及眼瞼ノ諸症漸次ニ減退シ三月間ニメ全治

ラエリ

按ニ此疔ハ内部眼瞼瘻ノ一種ニメ上瞼弛垂ト頭疔トハ其瘻疔
シテ眼目ヲ過度ニ使役スル中ハ血液ヲ其部ニ輻湊充積セシメテ
神経截傷ヲ牽張ロシメテ疔ヲ發スルト矣ニコレ当然ノ必
理ニメ即生活力固有ノ性ナリ

又其頭疔ト眼瞼弛垂トハ明ニ血絡ノ充張ニヨルテ疑ナシ余モ
又嘗テ同回疔ノ者ニムラ見タリ

又其強壯劑ノ内外相用テ全ク切ナキ者モ其病其部ノ弛緩衰
弱ヨリ發スルニ非スメ而モ其回疔ニ眼窠内ノ瘻疔ニアルノ明徴シ
是故ニ患部ノ淨血直ニ諸疔ヲ減退セリ

〔註〕 蠅針法ノ視力之弱ニ即切アルヲ又按和蘭ノ眼科医「メニセル」ト実験セル治例アリ又「テ」トスヘシ即其法曰

女壯ノ一因暮士作廢健強ニノマ血一ニ年前凡眼ニ視力之弱ヲ患ヘ過古ノ療治ニ由テ治ラ正后一年ヲヘテ

更ニ又視力ノ衰弱ト且感融非常ニ大ニキトヲ患フ然レ疾疴アルト益ク而ノ其諸症精細ノ伎備ニ眼自ヲ使役スル子曰

ニ向フ件ハ本々増進ス
余此ノ施スニ尋常以疾ノ諸症ニ切アル諸劑ヲ以テシ強壯衝動性ノ益眼水ヲ午へ揮登ノ精劑ヲ外用シ之ニ益ルニ催嚏劑ヲ施

シ登泡ニ耳后ニ貼シ然テ眼カノ使ヲサレシムト虽一モ切ナリ

却テ諸症増進シ瞳孔變動ノ縮張度ナク圓形ヲ失ノ非常ニ

張大シ角膜且透明ヲ失スルニ至シ是ニ於テ余更ニ「法」ヲ換ヘ縁布ヲ眼ニ掩ヒ「ステ」ヘソニ即「書」ノ「法」ニ從テ蠅針法ヲ行

フニ切アリテ終ニ十分ノ全治ヲエメリト
右件掲示スルノ諸說明ニ以テ余カ此病ノ正回ヲ以テ眼内ニ於ル血

絡ヲ膜ノ破傷眼ニアリトスルノ考探ヲ記スルニ是レリ
余又「ア」ヒ「コ」テ「カ」眼病ノ諸症ヲ察集セルニ昏ヲ「ア」テ「シ」ヨ

ムニ其昏中又幸ニ余カ考探ヲ記スヘキ一症アリ云ク
五才許ノ一男則ニ「傷」冷毒ニ由テ重症ノ疾病ニカ「リ」益テ

右眼ヲ病ム且「前」疾共ニ疾疴則ニ「ク」老氣ノ漸入大ニ好

害アルヲ覺フ瞳孔強ク縮閉ス然レモ其外異常ノ如ク女モ破
 傷ノ候ナク只死スルノ前ニ目ニ至テ角膜始テ透明ヲ失ヒ曇
 褐色トナリ剛膜微ニ破傷ヲ起セルノニ其死スル中其病ノ真症
 ナラ明ニセシカカニシテ解剖シルニ角膜ヲハキキノ右剛膜一部破
 傷メ血液溢サシ脈絡膜微ク腫脹メニ化濁セシトセルヲ此
 此病具初起ニ於テ微毫モ外候安毎クメ視瞻感觸本是ニク視
 カ尤モ至弱メ全身ノ衰弱ヲ感ルカ故ニ自ラ是視神経ノ衰弱
 ノ感觸非常ナルヨリ察スルノ膿痂ヲ生セシト至死後解剖ヨリ
 具痂ノ不着ナルヲ示シ明カニ其病ノ本性脈絡膜ノ破傷ヨリ察
 スル者ニメ外部ニ其候ヲ見ハザル者ナルヲ示セリ

其病中ノ症候死後ノ解剖豈斷余カ考按ノ視カ至弱病ハ唯
 網膜ノ感觸病ノニテラス又眼内一部ノ破傷病ヨリ察スルノ明
 徴トナスニ足ニヤ

實ニ此病ハ一部ノ疾病ナルカ故ニ独リ患者ヲ死セシムルノ毎キヲ
 以テ如死後ニ解剖メ其病ノ位置ト本性トヲ明証セル他ノ例
 ナラ見ハス

ハイルリト名ノ昏中人身ノ諸病ニ於テ解剖セル実験ヲノス
 ルコトヲ考メシト至モ眼病ニ於ル事件ヲカキ且醫ノモルカクニ人
 ノ後ニ白ク

年死屍ニ於テハ未ダ曾テ内部破傷眼ノ症ヲ見コトナシ唯一次

盲犬ノ眼ニ於テ之ヲミコトアリ且網膜血色ニメ殆ニト黒色ヲ帯
ヒ且状恰モ脈絡膜ニ於ルカ如ク脈絡膜及葡萄膜ハ血絡太リ
トテナリカ故ニ健康ノ人ニ於テモ特トトハ血色ナリ者アリ
以上余カ所後ノ者如ト虽撤メ同病ニナレモ唯浮血ニ由テノ
治スル者シト決定スルコト勿レ

〇第五編

論下利

夫レ患部ニ施ス所ノ浮血ノ以病ニ於ケルヤホリ速切アルコト実ニ他
ノ諸瘰癧ニ卓絶シテ且ツ余カ施ス所ノ瘰癧ニテ以テ主トスレ
カ故ニ今他ノ瘰癧ヲ復クニ免テ尙一回且切カラテコトス

余己ニ二年ヲ経ルノ劇症ト虽蝨針法ヲ施メ直ニ切ラ得ル者大
タヤナカラス然レトモ明ナル外候ナリメナ任再持久ナル眼病ニ只
蝨針法ヲ施メ速切アリトスレハ或ハ奇トシ信セサルノ人有ニ
余カ以症ニ浮血ヲ施ス所以ノ者ハ唯眼内ノ血絡充脹メ後性ノ破傷ニ
カレト尙才偶結膜ニ後性ノ破傷ヲ登メ且尿管ヲ変スルコトナリ在
再持久ナル者ナルカ如ク一般ニトスルニアルコト

又血脈病ノ症候モコレヲ記スルニ何トナレハ其脈大ニ充盈膨脹
スト至蒂ニ較著ノ患害ナク唯之ヲメ著ク其膨脹ヲ増進セシム
ル所ノ刺戟物アルハ其膨脹ノ度ト其部ニ循ルニ神経ノチヤトニ
心メチヤノ劇症ヲ登スルニナレハナリ

憶フニキリ蟬針ノ功カラ明ニ知ラサルノ徒ハ或ハ云ニ全身ニ生カ
 強壯ノ候ナク眼ノ外部ニ破傷ノ疔ナク結膜ノ血絡充脹スハ何
 ノ毒ニ蟬針ヲ施メ血ヲ減スルノ理アラント
 然レモ実験ニ由テシラヒルニ以病ニ於テハ宜ニク外候ニ於テ
 治法ヲ謬ルルハカラサル者ニ
 向ノ以病ニ於テ蟬針ヲ用エキ毎ニノ徵候ハ老氣ノ漸々由テ
 登スル所ノ眼底ノ疼痛ナリヨニ常ニ之ヲ用テ輕快ヲ覺ハ宜具
 切アルノ証ニアラスヤ
 假令徵候トモモ蟬針ヲ用テ輕快ヲ覺ルテアラハ必ス預メ具切ヲ斷
 言スヘク患者其病ノ必復治スヘキヲフケテ觀喜セムヘシ

然レモ其蟬針及眼翳ニ角法ノヨリ切アルニ習テ刺烙ヲナス
 勿レ刺烙ハ全身ノ血液ヲ減ニスルカ故ニ危篤ノ衰弱ニ進ム恐アレハ
 ナリ

下劑ノ眼破傷ニ於ルニ大貴羊ニメ具用テ廣ク古今一般眼科
 家ノ実ニ貴フ所ナリ
 ヒツボカラテスツ言リ「下劑善治眼破傷ト云テ實ニ奇事不勝
 ノ論ニメ自ラ実験ニ由テシラヒルニ自然ニ登スル者ト云ニ其者
 トニ拘ラス皆必定ノ偉切アリ
 學者ヨリ腸胃ト眼目ト互ニ相関心スルテ假令ハ小兒ニ於テ飲
 食不消化或ハ蛔虫ヨリ一種ノ眼破傷ニ生ラズ眼
 破傷ト云クテ登スルト有

ルホノ例ヲ考ヘ諸下劑ノヨリ諸病ヲ導去スルト具ヨリ腸胃ニ節
蓄セル汚物ヲ掃除シ血ヲ乳糜ノ吸收ヲ妨ケ腸門ノ蒸氣及ヒ諸
分泌ヲ催進スルニ由テ全身血液ノ量ヲ減損スルノ理ヲ思ハ、具
ヨリ眼内ニ滲透スル血ヲニテ消散セシムヘキノ理亦昭々リラン
又血液ノ頭部ニ到リテ衝正スル痛症ニ於テ下劑ハアラサレハ取
テ之ヲ鎮静スヘキ者ナキハ各人ノヨリ知ル所ナラスヤ然レテ或
ハ若唇ノ匠筆ニテ眼病ニ功ナシトシテ信用セサル者有ルハ又何
ノ理ソ

トトリカ昏中ニ云ク「ケイフセ眼焮衝」眼焮衝ノ一極ナリニ於テハ
下劑造テ「アアル」毎レタトトヒ他手ノ缺ルノ途フニ取テ之ヲ用

ル「勿レト然」トモ傳染性ノ眼焮衝病ニ於テハ自然ニ痊スルノ下劑
ト術ニ由テ催進スル者トニ拘ラス其功下劑ニ優ル者毎レ「リ」
「母」トツカ下劑功ナシハ「者」ハ「慢」ニ不当道ノ抵性下劑ヲ手ルニ
ヨル者ニ何ト「レ」ハ抵性ノ下劑ハ血液ノ運行ヲ催進メ其運動ヲ強
シ却テ刺戟ノ性ヲ増進スルナリ

是故ニ下劑ヲ用ルニ當テモ又其方法宜シク戒慎スニアルベカラス
右來諸医ノ内外眼焮衝ニ尋常施用スル所ノ下劑ハ「ニ」ナ其用量ニ
於テモ回数ニ於テモ「太」僅微ニ然レテ預メ必ス其功アルコトヲ察セ
ハ宜ク「尋」量ニシテ用テ「度」ノ下劑ヲ起サシムヘク其功ヲ「安」スルノ
度ニ「心」メ回数ニテ「於」スヘシ患者ノ体質強壯ナル者ニハ「先」ツカロメ

止ニ女黄没扭ノ末ヲ加テ寸量ニシテ午ハ其後一時ヤラフ。公
 未遠宜ニ同量ノ他精酒石ヲ加ヘ薄湯水看シクハ大妻水ヲ以テ
 送下セシムヘシ其功ヨク稀薄ノ大便ヲ過クテニ排泄シ著シク血行
 ノカヲ抑製ス
 作黄薄弱ノ人ニ於テハ宜シクカロメルノ量ヲカフニヤラフ。ハ
 ニ付ルニ同量ノ浮利塩ヲ海那葉ノ浸劑ニ加ヘ用ヒシムヘシ但シ度
 劑ハ香澤水薄湯水ヲ以テ製スルヲ佳トス
 今実験ニ由テシラコレニ劑シキ熱性ノ下劑ハ不適キト云々ナリ
 緩性ニ過ル中ハ又切ナシ故ニ峻功ヲモトスル中ハ宜シク強カラシムル
 且ツ下劑ヲ用ルニハ初施ノ後ニ三日ヲ経テ其功カノ全ク

尽ル中ニ至ラサシハ再用セサル一若俗ノ曰俗ナルカ故ニ余ハ患者ノ便
 ルニ心メ常ニ一頓ニ寸量ヲ用ルテナス
 六ツ下劑ヲ用ル標的ハ唯全身血液ノ量ヲ減スルニアルノコトナラヌ
 又血液ノ管内細絡充積盈脹スルヲ防リニ在ルカ故ニ宜ク同時ニ
 清涼緩和ノ摂生ヲ施スニアルハカラス然レモ清涼稀釈ノ飲液
 ヲ過度ニ用ルテハ之ヲ禁ス又右件ニ準ル下劑ニ相交換メタ
 量ノ吐酒石ニ緩下ノ塩劑ヲ加ル者屢回復メ用ヒ以テ不新
 適宜ノ通利ヲエセシムヘシ
 以瘰癧ニヨルヤ眼内ノ嫩嫩若クハ其脈絡ノ充脹スル諸症大抵復
 治セサル者無キ一是余カ実験ニ由テ明ニ知ル所ナリ

人或以爲ラク眼嫩濁ノ諸症但こ皆偉切下劑ノ優ル者無こと其
具弊衰弱虛脱ヲ起スこと實ニサリハカラサルカ故に又恐怖セスハ
アラスト而して其衰弱虛脱ハ尤も想像病ノメ具害實ニ其本病
ノ長ク保続スルカ如キ太キ者ニアラス余カこれ処ノ視カ至弱ノ
真症ニハ殊ニ然ルコトヲ実験セリ

又此病ニ於テ或ハ血浮ノ量ヲタリ微ニシ全ク益ナシトスレ後ノ如キハ其
日ヲ同メ術スヘカラス若し患者タリ則針ヲ忌嫌スルカハ浮血ヲ施ス
難ク而メ病勢過度ニ太シカラサルハ偶具下劑ヲ少量ニ用ルニ回
テ減退スル者アリ然レトモ其切浮血ノ如ク迅速ナラス又其例一症
アリ之ヲ凡ニ罕ク

高貴ノ加ハ丹其辛也ハ視カ至弱ニナリ輕症ニカマリ来テ治ラ余
ハフ且来レバ久シク病メリ且ツ自ラ云フ曾テ抵用ニアル件重
ノ間歇抵ヲ患テヨリ此病ヲエリリトハ則則ハ
余之論スルニ蟻針ヲ直ニ下脈ニ吸知セシムキテラ以テス然レ他人ノ
之ヲ後テ益ナシトスル者アルト且ツ之ヲ蟻患スルノ太キカハ再レ
来テ他ノ療法ヲ求ム

余是に於テ此ニ唯一唯下劑ノニ用テ切アルヤ否ヤヲ試ニカガニ夜レ
カロメルヲ量ヲ用ヒ翌朝ヤラツバト純精酒石トノ峻下劑
ヲ服スルコト一週間ニニ回ナラシメ朝夕服ヲ治シ此些女ノ疏
食ヲナシカ所及ツトメテ鮮明ノ芝気ヲナクヘキコトヲ教ユ

右ハ白ニメ来ル其時限ノ感融著ク減退メ自ラ輕快ヲ覺フ余仍
テ同療法ヲ用ヒル一十日逐ニ強制ノ支氣ニ向フト至ルヤノ如害
ヲ覺ヘサルニ至テ苦味劑ニ燻下劑ヲ兼テ飲服セシメ収斂ノ魚眼
水ヲ与フ

疔名ノ誤認ヨリ其療法ヲ誤テ危馬ニ至ル者メナカラス何トナハ
視力至弱ノ名ニ拘テ其疔ヲ一部ノ弛緩若クハ衰弱ニアリトス
ノ徒アルハシ又是故ニサシ以テ精カヲ強シ運動ヲ杜ニスルノ
劑ヲ与ヘ其眼ヲ洗淨スルニ冷水ヲ以テメ温湯ヲ禁スコ温湯ハ
弛緩セシメ冷水ハ收斂スレハシ
然レモ実験ニヨリ然ラス冷水ニ由テ輕快ヲウルト有ルハ只是一時ノ

輕快ニメ真ノ仮治ニアラス是其脈絡ヲ收縮メ融動極ヲ抑制
シ疼痛ニ女問ノ休ヲナシルノ故ニ其水ヲメ患者ノタユル
汗リノ程度ナラシメ其蒸漏ニ一朝夕十分収一収百三十分ヲ一
加収ト云フ
餘ニ至ルハ患者愈快緩和ノ感ヲ覺ヒトスノ次テ眼内ノ感大ニ
輕解ス

余此病ニ温蒸漏劑ト眼上ニ施ス処ノ者ノ或ハ麝香粟米或ハカニ
ルニ或ハ白虎茶或ハハクラーゲニトロースト詳或ハ迷迭香ホ
レ
ノ復劑ナリ然レモ此諸藥實ニ切アル字キリテラ明ニスルトテエス
但ニ温湯ノ切ハ較著シメ實ニ缺クヘカラス只諸藥ヲ加ルト加ヘ
サルハ宜ク患者ノ推シヨルハシ

「シキタリス」ハ此諸薬ノ如ク忽ニ患フト勿レ其侵劑ノ実ニヨク
視瞻感納ノ強劑ナルヲ鎮靜減却スル「阿芙蓉劑」優ル者ニ
キメ曾テ此劑ノ害アルヲシテ「阿芙蓉劑」ハ佛ニ害ヲナスコト有リ
ト虽單味ノ温湯若クハ之ニ草葉ヲ加ヒ温蒸扇劑ハ固ヨリ此
ニ倖アル「」已ニ前ニ云ルカ如クト虽然「」モ又下ニ卒ル「阿芙蓉液」
具功カラ助ル「」ヲ実験ス但シ「シキタリス」ハ鎮痛ノ功カ
尤モ強大ナル故ニ之ヲ用ル件ハ取テ此劑ヲ用ル「」ヲセス

阿芙蓉液方

阿芙蓉 他碎者

雜腹瀉 各ニセ

燒酎以白酒良野酒
製者一多

蒸餾水七セ

右調勻シ密閉セル器中ニオシ「」六日「」過メ液「」ヲトル
此劑ヲ用ルノ標的ハ其鎮痛ノ功カニ由テ眼目感動ノ過度ナルヲ
試却スルニ在リ「」ナ「」ニノ眼ニ切アルヤ「」ニラ温浸劑トメ眼上ニ
施スニ筋疼痛ヲ日加シテ度ノ感觸ヲ鎮靜スル「」屢試テ知ル
所ニ「阿芙蓉」ノ切アル「」ハ古来皆人ノ用テヨク知ル所ナルカ
故ニ之ヲ贅セス

阿芙蓉雜腹瀉ニ味ノ治眼劑ハ古人モ徃々之ヲ用ル者有テ「
ルニユス」ハカ点眼水劑ノ「」唇中ニ「」嚙栗亮ノ倖切アル「」

ヲトキ又アアラニテ加テ用ルノ劑ヲセセリ

此諸藥ヲ取テ或ハ各別ニ用ヒ或ハ數種相配合メ用ヒ種々之

ヲ試ルニ視カ乏弱ニテ於テハ一モ前ニ準ル阿夫客液ノ如キ傳

功ノモノアラス又劑ハ之ヲ用ルハ女時間ニ_分時眼中ニ_分テテテテ

呈次テ必軽快ヲ覺ヘ眼ノ運轉自在ナルヲウレ

又次劑ハ再縮燒酒ニ代ルニ白梅良斯燒酎ヲ以テセルガ故ニ太

ク緩ニメ刺戟スルコノヤキヲコル

偶々劑ヲ用ルニ次テ淚液過多ニ流ルニ微シク白膜ニ赤色ヲ發

スルコトアルニ尋常ハ然ルト毎クメ其印ヲ去スル者シ又其疾固

コト也 阿夫客液一樽 ハ其劑中_分者澤劑ヲ加ルト阿夫

客ノヨリ量テルト蒲桃酒ニ由テ刺戟スルト強ク

亦阿夫客液一樽アリ

亦アルコトニテ加ルニ由テ害アリ此ヲニ於テ其感_分殊ニ尤ク

些微ノ刺戟ニモ難堪者ハ此劑ヲ用ルニ宜ク戒慎メ注意セサルナリ

今其法ヲヒニ示ス患者ヲ仰以セシメテハ_分頭ヲ高フ_分眼膜

ヲ閉サシメ_分液又汗ヲトリテ_分内_分資_分洋_分キ_分頭_分ヲ_分傾_分ケ_分テ_分兩_分眼_分ノ_分間_分ニ

流シメ_分眼_分膜_分ヲ_分上_分下_分ニ_分動_分搖_分シ_分テ_分其_分内_分ニ_分滲_分入_分セ_分ム_分但_分シ_分其_分膜_分ヲ_分ヒ_分ラ_分シ_分ヤ

宜シク戒慎注意メ急卒ナラサラシムヘシ

又駝毛ノ筆ヲ以テ施用スルノ法アリテノ如シ

医一子ノ兩指ヲ以テ_分輕_分ク_分患_分者_分ノ_分下_分眼_分ニ_分押_分下_分シ_分以_分テ_分マ_分シ_分ク_分反

張セシメ_分他_分キ_分筆_分ヲ_分取_分テ_分其_分液_分ヲ_分浸_分シ_分横_分ニ_分其_分内_分面_分ニ_分引_分キ_分毎_分ニ_分指_分ヲ

故予年々如く困すに云へし

如此ノ法ヲ用ル者ハ是唯角膜ノ刺戟ヲサレニカガナリ而メ
此西法ヨリヤ其液ヨリ眼球ノ前面ニ普達メ疾スルナリ

余カ此液ヲ用ルヤ其量ノ多クナリトテ直ニ角膜ニフルニ非レハ未嘗テ
一モ疾戸刺戟ヲ起ス者アルヲリス

人或云ニ余カ此液用法ヲ示スヤ実ニ唯蛇足ニ屬スルノこと然レモ余屢
其用法ヲ知ラサル患者ニ此劑ヲ与ヘ彼自ラ眼ヲヒラキナカラ角膜上ニ

滴入シ由テ以テ疼痛増進シタニ其功カラ害スルヲナカラサル故ニ故
スル者ナリ

其病日時ヲ経ルル太リ久キ者ニ於テハ屢ニ前ニ示ル所ノ指法

法切ヲ奏セサルコトアリ

如此非常ニ頑固ナル病ニ在テハ皮ツ浮血下劑ヲ用テ芟菁ニテ頭
上耳位或ハ眉中ニ貼スルニ其刺戟回耐毎クメヨク津液ヲ滲サセシ

ムルカ故ニ眼ノ病勢ヲ奪フヲ以テ偉功又毎ビナリ

余カ親友曾テ習字ヲ研精メ夜學スルノ太キヨリ此法ヲエテ因
者スルコト曰サシニ匠之ニ強壯劑ヲ用テ久日更メス疴候ニスル増

進ス是ニ於テ彼其匠ノ瘵由ラステ自ラ久ク暗室ニ入り二月間
カハス芟菁ニテ背ニ貼メ愈ストナク回テ以テ遂ニ全治ヲ
得コトアリ

○天

〇第六編

〇命点眼水

世に眼目ニ外用スル薬方及瘡法ヲミルニ膠漆ヲナス者太リマナ
カラス故ニ余今ホソシ人ノ老疾ニ憑テ論説ヲ改テ以テ字者ニホ
サントス

夫レ眼破傷ノ初発ニ於テ收斂性ノ洗劑ヲ用ルトハ世人ノ一般ニスル
処ナリト雖大ニ膠漆ヲナス故ニ破傷疼痛兩ツナカラ共ニ劑シク増
進ス然レニ其初発ノ時限ヲ述テ治ニシテ用ルルハ必ス其俾切アル
ヲ以前ノ害ニ反スル者ナリ

眼破傷ニナリ時自ラニテ強壯劑適宜ノ時ニ用ルガ故ニ其切カ
奇俾ナリトラタル者ナリ

世又ニテ膠漆トメ用ルルハ害ナシトス雖余自ラ眼破傷ニシテ用テ
其切ラ強ル者アルヲミルニ太リマナカラス或ハニカカニ腫脹ヲ角膜
ノ膜間ニ發メ不透明トナリ不治盲ニ陥リ或ハ角膜ノ急性ノ腫瘍ヲ
發シ破裂メ蒲桃膜腫脹セル者ホアリシテ總ルニ眼劑ハ其時限ニ注
意セスメ安ニシテ用ルルハ必治ノ症ヲモ不治ニ陥ラシムル者ニ豈或メ
ナルハケニヤ是故ニ余白如クノ瘡法ヲ行テ不害ヲ請言リ寧ク其手メ
其眼ヲ全フセヨ

凡ソ收斂性ノ眼劑中其切能唇ニ如ク者ナシ故ニ若眼破傷ハ其部ノ弛

和断

弱ヨリ奈クハノ臆新ニ由テ收欬劑ヲ適当ニトスルハ眼劑ハ唯
 是一事ニメ足ルヘシ然レニ屢実験ノ以テ之ヲミルニ先ツ^{排泄劑}
 ヲ用テ血絡盈脹ノカラ減スルニ非ハ必ス害有テ殊ニ視力至弱ノ
 症ニ尤モ然ルコトナシ
 若シ收欬劑ヲ用テサレテエナル症アルハ余ハ唯其血脈ノカラ減メ
 疼止ラ鎮メ置テヨリ收欬ノ功アル者ヲ与フ即チ^{是ナリ}
 鈹糖一々 右様花水一多ニ溶シ蓋錫錯ニ清ヲ加テ清澄ナラシメ用
 ルニ当テ又并テ一ハ蓋ニ入レ且蓋ヲ沸湯中押シ温メテ以テ用ヘシ
 〔连接花水ハ大抵清膏水ト同シ今用ヘキハ蓋錫酢仁様ハ固シ
 前ニ言ヒ如ク冷水病ハ大害アリ已蓋蓋氣化ノ以欬ノ閉塞

眼球上面ノ血ヲ馳逐メ以テ充脹セル内部ノ血絡ヲメ益ク充脹セシム
 レハナリ
 若シ之ヲ用テ却アルヘキコト察スルハ宣クヨク數次回返ノ之ヲ用ヘシ
 世ニ魚眼水ノ種多クアリテ其製造種々アリ或ハ酸化金屬鈹^鈹
 酸^酸ヲ製シ或ハ刺戟解疑メ却アル散^散ヲ以テ之ヲ製シ或
 ハ或ハ液^液ヲ配合メ之ヲ製ス然レニ夜^夜柔^柔偶々各自ニ之ヲ見ルハ
 清澄透明ナレシヲ合スルハ飽和メ其性ヲ衰シ重濁ノ液トナ
 リテ或ハ全ク功カラ失スル者アリ
 世ニ一般ニ鈹糖ヲ常ニ溶メ魚眼水トスト虽其液烟濁ニメ鈹^鈹
 手クハ速ニ沈シ石灰状ノ沈下ナルモモコノ粗糲ナル沈下眼ニテ角膜

又印カ高才之ニ優レト所ノ下アリ

録香油一々 蒸餾水一々

右ヨリ混和シ醋三々ト燒酎生女ヲ加フ

又下

刺必斯印散刺那刺斯 羊乳或一々 蒸餾水一々

硝石精 羊乳或一々 右調勻強壯性前ノニ下ニテララス

此諸点眼水ハ皆宜リ日ニ三四回用スルヲ佳トス

〇第七編

〇論刺症除去右之療法

視力之弱病ノ原因ト療法トニ年ニシテ檢定セリ然レニテハ

ホスキアリ且眼力之衰ハ始善ヲ覺セ向ハ患者ノ作廢精カト且症候ノ微是トニ從テ少量ノ熟食ヲ野酌ノ手ハ全ク刺戟有寧ノ飲液ヲ禁ス

然レニ已ニ眼ニ強壯性ノ劑ヲ外用スルノ時限ニ至テハ宜ク直ニ療法ヲ轉メ強壯劑ノ食料ヲ用ヒシメ若那美ノ強壯劑ヲ内服セシメテ之ニ宜シク身休ヲ遠直ニ運動セシメ冷浴若シクハ海浴ヲナサシメ十分ノ沐浴ヲ得セシムルノ尤要也

眼自乾燥スルノ太クメ眼室内ニ痒キ因直ヲ覺ルテアルハハチキタリスキノ嚏劑スルヲ若クハチキタリスニ葉細末ニ味ホ命ノ嚏劑大ニ控快ヲ覺セシムル者シコヨク鼻所膜ノ分泌ヲ催

ナルハ施スルノ療法違フノ功ヲ奏セス
且ツ其病尚ス日ヲハルヘト由シカラス其日唯習慣守ルノ過度ノ支
氣ヨリ発スルノミナリト大母ノ遺毒アルニモアラス又前々ラレハ眼病ア
ルニモアラサルハ唯其病発ノ日ヲ除去スルノミナリト十年ノ後治ラウ
ル者屢コレアリ

余頃日一少冊子ヲ得テ之ヲヨムニ例トスヘキ者ニ疔アリ疔ヲ以徴トス
一女子故ト由舎ニ生レ故有テ都下ニ移ス疔眼内疾疔ヲ發シ視力
減耗シ其疾疔石壁ニ反映スル日支ヲコレ毎ニ必ス増進スコレ其
患者ノ患トス此所ノ者即其病ノ本因ニ何者其眼故ト郊野ノ瘴
ヲタルニ慣レシニ今始テ都下ノ石壁ニ映スルノ日支非常ナルヲ

ヨリ發スル者ナレハ故ニ窓前ノ小檜樹ヲ植ヘシメ返照ノ支氣ヲ
遮リ掩ハシム其眼疾ハ盲タラントセリト雖唯此一節ノミナリ他ノ
瘴法ヲ施スト毎ク卒ニ全治ヲモリ

若シ其疔ニ於テ其源ヲコレト毎ク患者尙久レク支氣ニ是ハ触セハ
其血ノ眼内ニ衝スルト益ニ是ノ卒ニ以書ノ始ニ瘴ル如キ瘴療
法ヲ尽スニ非レハ治ラユサルニ至ルハコレ所ルヲ幸ニ早ク支氣ニ是ハ
ヲサレシカ故ニ後治ラユシ者ナリ

一儼者果シルニ此ノ地ノ北西ニ住ス其居室ニク日中ノ支氣ニ向イ
右室ハ窓外ニ高墻アリテ室内太リ暗シ彼室ニ入室中ニ昏冥
コレ以食時毎ノ前室ニ出テ鮮明ノ支氣ニ向フ

且視瞻漸ク衰弱ノ眼ヲハス疾疔ス故ニ彼自ラ眼鏡ヲ用イ
 眼科医ニ謀テ療治ヲ用ニテ切テ而メ其疔常ノ前並ニ出
 ル殊ニ日中ニ於テ増進スルカ故ニ自ラ其目ノ光アルヲ察シ
 速ニ居テ他ニ移レテ且ツ場下ニ昏浮スルヲ去ク是レ由テ其疔全
 治セリ
 又學者ノ尤モ懐フヘキ例ニメ世人皆其トヲ知レ其理ヲ知ラザル者
 アリ往々我部下ノ衆馬盲トナル者太リテ其疔當特ノ人以為是
 レ其眼ノ暗処ニアルヨリ発スル者レ暗ノ眼ヲ害ス宜ク明処ニ移ス
 レト云々然レモ右言馬ヤレ其利今ニ施及セリコト即慣レザル
 支氣ニフレテ其眼ヲ害スルニ由ルヲスヤ而ルヲテ其疔

ラスニ吾徒ノ人モ亦知ラスメ意ヲ味ニ用ヒス自ラ眼ヲ損害スル者
 多キハ何ソヤ
 如キノ不意ノ由ヨリメ視力ニ弱シラウテ或ハ全ク明ヲ失スル者
 太リヤナカラス
 而メ其疔ヲ生シ劣メ治シ難キカ故ニ杖臺モ視瞻ノ害アル
 ナ覺ル所ハ且ク配意戒慎メ儘ヤモ眼ノ害アラトスル所ノ者ハ
 カ所及恐レサクヘシ
 向ソ視瞻ヲヨク保持セトスルノ徒ハ読書習字針縫ハ其他ヤム
 ラエスメ微細ノ支氣アル者ラコレトアル所ハ務テ其明ヲ遠直メ
 強カラシメス弱カラシメス殊ニ暗明急卒ノ交換ナカラシムヘシ

身夫弱之ノ害ハ強之ノ害ニ比スハ大ナク久只其害不明ノ処ニ
 視カヲ弱メ物ヲ此レトアルノ此レハ強之ノ害ニ其害ヲ久或ハ
 全ク明ヲ失セシムルニ至ルナリ
 視力差弱キ人ト云右件ノ戒ヲヨク慎守スル件ハ生涯尙才十分ノ
 明ヲ有ツヘキニ或ハ之ヲ守ラス加之黄昏ノ件ニマコリ余暇ヲ
 吝テテヲナシ終ニ早ク明ヲ失フ者ヲシテ豈可不慎哉
 然レニ患者去テヲアストノ間新ナク其眼目ヲ使ハサル可ラサル件
 ハ宜ク明暗共ニ過度ナラサル室ヲ扱ヒ且ツ具ヲヲナス間施ス
 一ツ所謂御筆鏡ノ用ヘシ緑鏡ヲ用ルルハ其由テ來ル所久メ具
 眼ニ利切アリトスルト実ニ古来一般人ノ云フ一ツナリ

夫レ春日輝野ヲ望ムト夏日ノ破地を日ノ雪中ノ反照ニ向フ
 ト眼中ニ覺ル疾快其レ実レカ優ル実ニ草木ヲニテ緑色ナラ
 シムルハ是レ造物者ノ賜ナリ
 然レニ縁ヲ此ルト縁ヲ母實テ此ルト大ナル別アリ學不可不知ニ
 今縁鏡ヲ用ルルハ即縁ヲ此レシ以テヨルヤ其物色較然リヤル
 カ故ニ視カヲ賈スト実ニ白鏡ヲ用ルヨリ大ナル疑トナシ
 且ツ之ヲ除キ去ルニ当テヤ眼ニハルノ光氣度ヲ違フト又大ニ
 ナカラス
 猶且ツ之ニ加ルニ今用ル所ノ縁鏡ハ其面ノ凸ナルカ為ニ光線
 ナ眼内ニ聚入スルヲ手メ視瞻ヲ害スルト余自ラ屢試テ明

ニ知ル所ノ
 是故ニ眼鏡ハ唯赫灼ナル日支ノ劑甚ナルヲ掩フノ器ニ付ル
 足ルノミダトモ是ニハ相吉ノ器アリ何ソ付用ノ者ヲ求ル
 ナセニ
 唯其眼過度ノ刺激非常ニ視カラ賈ストヨリ真ニ衰弱スル
 ノ已是ナル者ニ於テハ以テ眼鏡トス
 向ノ視力之弱ニ付テハ眞病ニ於テ用フヘキ眼鏡ニ宜ク用ル
 ニ於テモ之ヲ去ルノ向ニ於テモ些々ノ疾戸モ発ラス又疾戸状
 ノ感解ラモ起サレ者ヲ佳トス
 總テモルハ大ナラニルノ鏡ハ用ルルヲ禁スコト具銅膜ノ感解

過度ニメ光線ノ強ク聚合シ來ルニ堪ハサハ是故ニ余ハ唯
 平面ノ白鏡ヲ以テ云フ

近來視学家亦一種ノ眼鏡ヲ發明ス之レ綠白ニ鏡ヲ用ル者
 ニメ其製巧機ヲ尽シヨリ劑甚ノ光輝ニ向フニモ疾戸太キ
 眼ニモ些々ノ妨害アルト云フ

此層ノ著ヤ余自ラ実験シ考據スル所ノ者ヲ以テ廣ク學者
 ニサント欲スルノ老眼ニ付リタルニ近頃聞ク弟七枚ヲ鑄行メ
 セルヨリ以來四方ノ學者幸ニ取テ信用スル者サント余カ歡
 喜宣偉ナラニヤ

學者ヨリ此層中ニ記載スル所ノ症治ト經驗ト由テ參考ニ

凶坂トスガラスナリ曰脾胃ニアル者ハコレヲ疎通メ愈ユハ此ノ
 告ケニ坤ヲ以テ示シモフ一モ有ハナリ 良卦ヲ以テ脾胃ノ
 ハソナクニ重乾 ヲ得タルトモ亦凶兆トセサルコトアリ具稟賦ニ陽氣
 偏勝シタル人思慮過度ナル件ハ重坤ノ卦ヲ得ルコトアレハシ
 ハソ怪症ニメ **明夷之象** ヲ得タルハ必ス速ニ愈ユキ象トスノ曾熱
 タレハ石運黄連ナトヲ以テ解抑スル件ハ陽衰メ乾トナリテ 又大
 地天泰ノ象事ト連ニ復スルト云フノ義ナリ 又大
 疔ニメ此卦ヲ得タルハ是レ必死ノ凶兆アリ コレ陽ノ心坤ノ太陰ノ下
 消テ乾ノ元トナルト 云ノ凶兆ナリ ○ハソ卒否豫師トシテ費ノニ卦ニテ塚墓
 ノ卦ト称ス是ヲ以テ太一ニメ此六卦ヲ得タルハ危ツ容易ナラサルコト
 知ルヘシ又明夷盡逐漁解睽夫革鼎訟トノ十卦太一ニメコレヲ

得タルハ危ツ卦名ヲ以テ不吉ヲ知ルヘシ○既濟未濟ノニ卦モ
 難治ノ兆トス○解毒ノ物ニ附テ用ルル一吾門ノ秘ナリ又主トメ附子
 ヲ用ルルモ必ス大黃ヲ加ルナリ又解熱劑ヲ主トスルハ石運黄連ナ
 ト主タルト勿命ニメ必ス大黃ヲ加テ引導ノカラガ為ルル一秘
 ナリ又附子主トメ用テ其功不見トキニハ必ス石運ヲ加
 加フヘシ又石運ヲ主トメ用テ功ナキ件ハ必ス附子ヲ加テ効神
 ノ如キ者ナリ

痘瘰

痘瘰ニ本卦ニ **泰** ヲ得タルニハ危ツ危篤ノ告ケトス尙其之卦
 ヲ見テ野酌スルト勿命ナレトモ危ツ本卦ニ泰ヲ以テ告ケ玉フコト

其害ノ情其痘瘡ノ一條理ナラスメ加毒年遠アルコト示セルレ
ハ何レノ道ニ各易ナラサル一知ルレシ

象ヲ告ケテモフ理ナレコト必々情 ○疾ノ本卦ニメ之ニ 大壯 夫
微ヨリコトモフアルナリ

ラ見セリルハ是ハ毒ノ増加セル象ナレハ危殆太甚シ

又本ノ本卦ニメ之卦ニ 姤 大壯 鼎 恒 童蒙 井 賁 無妄

隨 噬嗑 童蒙 益 屯 頤 復 ホラ見セリルハ殊ニ太メ可

夏ノ象シの本卦ニ童蒙ヲ得タルモ不時ノ妄ナトアリ又童蒙
七十二日頃可有聲也ニ危篤ノ症トス

本卦ニ益ニ得タルモ尤不容易ノ兆ナリ是必瘡毒ニシリ痘
ニメ起脹ナトニケリカルヘシ○白ノ痘室ニ 泰 一勿命ノ一ニメ其他

童蒙 童蒙 益 大壯 需 飯妹 賁 既濟 未濟 大過 豚 夫

ホラ得タル者ハ皆不容易ナリ

白ノ痘人其初ハ風邪ノ如クナル症ニメ医家モ是ヲ外邪トシテ

表ノ劑ヲ与テ発汗モアリツレモ兎角ニ其脈ノ數ナルニ減セス頭痛

モアリ惡寒モアリ發熱モアリ咳嗽モアリテ紫胡劑ナト与テ曰

循トメ日ヲ延ヘ月ヲ累子テ其症自若トメ其脈ハ愈數ナリニシテ

指ニテ其症ニ名ツクヘカラサルノ件ニメ是ヲ室メ之卦ニ 沢 大車 ヲ

得タル者ハコレヲ滑骨蒸勞瘵ニナラントスルノ象トス宜ク本卦

ノ象ヲ照シテ急ニ之ヲ治療シ之卦ノ幸ニ往シメサル一肝要シ

本卦ニ 澤 ヲ見シ或ハ幸ノ不変ナトヲ得タルニ至ツテハ是内証ノ

業大已十分ニ骨作ラ燒キ升ルノ功熾キルノ卦象タレハ氣早治術
有ルコ無シトヌロ傳○


梅毒空白

ハソ病入且外症及四疹ノ上テ何トモナ名モ決定シ難キ者ニ逢
テ是ラ空メ盡ラ得タル者ハ是梅毒ノ象タリ又飯妹ヲ得
タルニ梅毒アリ感モ亦然リ

清芝院口授

ナリ

本草綱目



150
5216

天
宗
曆

