

十五指南篇(其ノ二)古活字版

茶葉社

活1




研医会図書館蔵和漢書整理票 古法 15	
書名	十五指南篇上(才蔵 才5冊で)
撰・編・著	
訳述・筆録	
原本年代	
再・復刻年代	
写記年代	
巻・冊数	1冊 (25葉)
刊・写	刊行本
形態	縦 28.7cm 横 20.3cm
登録番号	原編第27頁 1760
備記	慶長元和年間 古活字本 寛永頃整備 7-2131





清室之寶



十五指南篇目錄

醫學	一
醫法	二
診切	三
立方	四
用藥	五
用藥	六
辨劑	七
辨治	八
治療	九
治例	十
治法	十一



辨治諸証師丹溪尚從天民

外感法仲景何一極也

內傷法東垣日

熱病法河間日

雜病法丹溪

○玉機熱論曰

先仲景書者以傷寒為主恐誤內傷作外感

先東垣書者以胃氣為主恐誤外感為內傷

先河間書者以熱為主恐誤以寒為熱不若先主內經則自然活潑潑地自與水卷

法除天地自由自在  
變之而起神話也轉轉  
々地切一ヤ  
中唐始有之切天單地水躍トム一注シト也

○正傳曰今之醫者不識機變不偏於此則偏於彼也

一戒妄傳之例

○五部九候論帝曰余聞九鍼於夫子衆多博

大願聞要道以屬子孫傳之後世著之骨髓藏之肝肺軟血而受不敢妄泄

○氣變論曰帝曰善言天者必應於人善言古者必驗於今善言氣者必彰於物善言化

言變者通神明之理非夫子孰能言至道藏之靈室每旦讀之非齋戒不敢發

○雜病治例曰諄諄求究藏為家寶切不可示

此伯也  
夫子トハ師シ也  
孔子シモ夫子ト

○三部一公素問  
オニノ篇也  
○歌血ハ大君ニハ  
起請シ書牛  
我ニ其血シ軟  
地牛如クニナラト  
也也

臨杭應ニ考シ切テ也

岐伯也

用也

本考 十一卷  
註文選因札  
酒六經也

入傳諸不道不義之士  
一宜廣通遍閱之說

雜著

醫之有內經猶儒道之六經無所不備張李  
劉朱四子之說則猶學庸語孟為六經之階  
梯不可缺一者也四子之書初無優劣但各  
發明一義耳

一有方發揮

朱彥脩撰

按粹

○有方之為書據証檢方即方用藥不必求醫  
不必修製尋贖見成丸散病痛便可安痊人  
民之意可謂至矣

自宋迄今

官府守之以為法  
醫門傳之以為業  
病者持之以立命  
世人習之以成俗

樽

斜座面計地不盡滿

活天影也

客盈弓影全非地

夜塚留跡元是水

○操舟 不極自由自在舟  
○操舟 操舟之義生之行在心  
○按面 紫驥 十里外  
○三下 給書 見下

然予竊有疑何者古人以四知言醫又曰醫  
者意也其傳授雖的造詣雖深臨機應變如  
對敵之將操舟之工自非盡君子隨時取中  
之妙寧無愧於醫乎

○今乃集前人已効之方應令人無限之病何  
異刻舟求劍按圖索驥

○今觀有方別無病源議論止於各方條述證  
候繼以藥石之分兩修製煎服之法度而又  
勉其多服常服久服

○至寶丹靈寶丹曰治

中風不語  
中風語識  
朱音不語  
舌強不語

夫 不語 語澁 之因不一有 神昏不語 口噤不語 舌縱語澁 舌麻語澁

又曰治口鼻出血

夫口鼻出血陽盛陰虛有升無降血隨氣越

出上竅法當補陰抑陽豈可以輕揚飛竄之

腦麝佐之以燥悍之金石乎

又曰治皮膚燥痒

經曰諸痒為虛血不榮肌腠所以痒也當與

滋補以養陰血血和肌潤痒自不作

十七兩金石

五兩腦麝香桂

一兩當歸

一升童便

一升地黄汁

以此劑枯槁之血果能和而生乎果能潤澤肌肉之乾瘦乎

潤體圓等卅餘方皆曰治

諸風 一應風 男子卅六風

其為主治甚浩博

且寒熱虛實判然迥別一方通治果合經意

乎果能去病乎

○五志木火土金水怒喜思憂恐志大之入持ハ各火ト成ルソ

○波烈波烈ハ常ルヲ切流ス心ソ

寧ノミ不犯誅伐無過之戒乎  
不助病邪而伐根本乎

治ハニ何嘗例用辛香燥熱之劑以  
火濟火各將誰執

五藏各有火五志激之其火隨起所以氣之  
病寒者十無一二

或曰子有方用藥太熱未合經意若平胃散  
之温和可以補養胃氣乎 予曰

蒼木性燥氣烈行濕解表甚為有力  
厚朴性溫散氣非脹滿實急者不用  
兼氣用之可見

雖有陳皮甘草其緩其辛亦是决裂

耗散劑

實無補土之和

經曰土氣太過曰敦阜亦能為病况胃為水  
穀之海多氣多血故用之以瀉有餘使之平  
爾非補之謂其可常服乎

或曰婦人一門經候胎產帶下用藥無非溫  
煖於理頗通乎予曰婦人以血為主血屬陰  
易於虧欠餘方是非姑置之

若神仙聚寶丹則治血海虛寒虛熱盜汗理  
宜補養琥珀之燥麝香之散可以用乎面色萎黃肢體  
浮腫理宜導濕乳香沒藥固可活血可以用  
乎胎前虛實不同養新攻補難並積塊堅癥赤白崩漏

○胎產又不用藥

遂敗百血遂養  
新血生

○考亭餘緒ハ莊子ヨリ也

○海本白流流也

泉流也

格致餘論

局方發揮

傷寒論疑

本行

丹

宜於彼者必妨於此欲以一方通治乎服者無不被禍自非五藏能言醫者終不知覺

一丹濱與天民之相兼正學傷存家

正傳曰吾邑丹溪朱彥修先生初遊許文懿

公之門得考亭之餘緒緣母病立志於醫求

師於武林羅大無而得劉張李三家之秘故

其學有源委術造精微所著格致餘論局方

發揮等皆折衷前哲足以救偏門之弊偉然

百世之宗師也發前人所未發補前人所未

備耳以醫道大鳴于當世正傳或問曰予曾

叔祖識齋幸與丹溪生同世居同鄉於是獲

杜子曰

家傳之學有所自來予惟愧才疎質鈍為憾

耳

同序曰愚兼祖父之家學私淑丹溪之遺風

其於素難靡不若志鑽研

○曾叔祖曾母方之シソノ十

ノ只カ

○許文化燒物トテ自燃然

衣裳トシテシテシテ

○苦志コノ志ハ心ト書ト

十ト書トハ教トハ教ト

傷寒例  
 新病例  
 素脈法玉材微義例宗  
 經小學  
 淨言言作時日下ト云右  
 牛能解三手三手正ト也  
 能解三手三手正ト也

醫法指南篇二

臟腑互用之說

難知曰

六腑表也氣也其體在上其用在下  
 五臟裏也血也其體在下其用在上

經曰

天氣上為雲言天ノ三ノホルヲ見  
 天氣下為雨雨ニ至ニ温ナレ見

此之謂歟

又曰

雨出地氣在云心邊互用  
 雲出天氣在云心邊互用

脾胃論曰


六腑瀉而不藏  
 五臟藏精氣而不瀉

一諸證虛實明解

眩暈背上盛下虛所致上盛痰涎風火也下虛血與氣

醫法指南篇二

醫法指南篇二







經云汁不茶々木汁々不茶々針  
 各其三三不茶非也上者又過行  
 之計計茶スルイモ多計皆勿論  
 韵府書云下ル語

刺之

老者絕戚  
不本復  
 壯者不復

若此等語皆有瀉無補之謂也

一緣父母元氣盛衰有三壽之異

正傳或問

父母元氣


兩盛者得上中之壽  
 偏盛者得中下之壽  
 兩衰者能保養得下壽不然

或問推命者皆以所生日時星辰推其生死  
 安危無不應驗子以父母元氣為天命恐非  
 至當曰天人之理衰盛無不脗合聖人盡八

二代聖賢... 易新經ノ  
 政一シタニナトシタルニヨリ 意氣  
 不違ノ末也ニルニイテ 唯卷セ  
 ソメ長命ナラント丹カヨシ

卦而成湯書以下 莖毫髮無差雖然聖賢諄  
 諄教誨心使盡人事以副天意則凶者化吉  
 未嘗令人委之於天命也○傳曰修身以俟  
 命而已○是故醫者可以通神明而權造化  
 能使夭者壽而壽者仙醫道其可廢乎

格致餘論曰



醫正指歸卷上

珍貴篇、脈、大庭也診、音珍ト扁  
約倉公カ傳、有然、尺、流、心  
ニトヨリ診、トリコト也、手、  
ト心ニトナレ也

龍車、會、耳、響、聲

診切指南篇三

一 左右氣血辨例

左脈虛小而驚悸血  
右脈虛小而耳聾氣  
虛也

小學曰

心法及胃曰  
氣虛右脈無力四君子湯  
血虛左脈無力四物童便

一 浮沉氣血弁劑

湯液曰年高虛人燥秘

浮在氣杏仁陳皮  
沉在血桃仁陳皮

一 沉弦筋骨辨例

正傳痛風曰脈  
沉主骨腎  
弦主筋肝

附腫痛濕火之辨例

醫工指南篇三

○地ヨリ天ノ  
 水木土金火ノ相生相克ノ理也  
 色之疾也見ノ心脈カカレ而也  
 赤脈ト記相生ノ理也 諸病皆

又曰 痛屬火 腫屬濕 忌禽獸魚麩

一滑瀉燥潤辨劑 心法痛風

肢節腫痛脈 滑者宜燥濕 蒼朮 南星 枳 殼 防己 之類 瀉數瘀血 桃仁 紅花 芎 藭 大黃 之類 潤之

一弦滑辨因 五機腹痛門曰

腹痛有部 分臟位有高下宜分治 弦者食 滑者痰 輕則食之重則極本九十九

一色脈相生順逆辨例 此事難知曰

夫脈地也色天也 地生天則順 瘥速也 天生地則逆 愈遲也

一形氣色脈辯察 外科精義十言

經曰 形壯脈細少氣不足以息者危 形瘦脈大胃中多氣者斃

又曰 形氣相得者生 三五不調者病

形氣相得者生 三五不調者病 三謂參考 伍謂類伍

色澤以浮者病易已 脈從四時者可治

脈弱似滑者是有胃氣 形氣相失

又曰 色夭不澤 脈逆四時 皆不可治

昔々ア子アヤル  
 金ニシツタヤリ  
 三五ノ字記  
 三錯文ト云ヨヒツヤテ言  
 脈ト記トスリ遠々交ヲ三  
 五ト云

醫心方卷之十一

脈經下云云云云云云云云

脈經下云云云云云云云云

脈實益堅

經曰必察四難

病熱脈靜  
泄而脈大  
脫血衄實  
汗後衄躁

此皆難治

衄經曰

陽邪來見浮洪  
陰邪來見微細  
水穀邪來見實堅  
寒痺邪來見弦小

正傳曰

一膈噎氣血不足診察

衄  
瀦而小血不足  
大而弱氣不足

一人迎氣口神門之所在

正傳或問

人迎在病人左手關前寸後之位  
氣口在病人右手關前寸後之位  
兩手神門在病人兩手關後尺前之位

今人多不識此人迎氣口

或指之兩寸指之兩關皆非也

一一腎兩根解說

正傳或問

腎為一臟配五行而言者屬之水矣  
以其兩腎之形有二象而言者以左  
右分陰陽為五臟之根元  
左為陰陰為水水為血  
右為陽陽為火火為氣

相火之變...  
火者常也  
 水者變也

於是

左腎陰水生肝木肝木生心火  
 右腎陽火生脾土脾土生肺金

考明堂命門一穴在脊中行第十四椎下陷  
真元之根本  
 性命之所關

雖為水臟而實有相火寓乎其中

一四脈為祖  
火者常也  
 水者變也  
 醫林正宗曰

浮而

有力風  
 無力虛

沉而

有力積  
 無力氣

遲而

有力痛  
 無力冷

數而

有力熱  
 無力瘡

一五脫診察

吳梈之脈...

鼻部...  
鼻部...  
 中土當人...

醫家大法曰



凡此五者其脈俱虛此其候也

一面上五行

心法曰

左頰肝部合左關肝膽  
 額者心部合左寸心小腸  
 鼻者脾部合右關脾胃  
 右頰肺部合右寸肺大腸  
 頤者腎部合左尺腎膀胱

此至...  
此至...  
 精上...

故脉要精微論曰

色合五行  
脉合陰陽

難知曰

浮沉長短滑瀉形陰陽  
寸關尺部位陰陽  
在右血氣陰陽

立方指南篇四

一 法方難釋

玉機二十五及胃

五膈寬中散方後曰及胃諸方悉是香燥大熱之藥皆不足為法

丹溪所謂

潤燥 益陰 補血 和胃 調中

雖無其方觀立論隨證用之

發揮許學士曰我善讀仲景書而未嘗全用其方

一 醫法貴適中之說

和劑局方校書之冊漢方發揮作之  
適中藥病之藥中  
病熱藥用之適中

偏十 病中和藥... 又中病... 〇イモ... 死... 病証... 〇大中小... 一モト...

玉機二十六 脹滿神應丸方後曰隨其邪之  
所在高下淺深輕重虛實影響無間萬舉萬  
全是謂中行

假如 病大而湯劑小則邪氣  
少強而藥力已乏  
病小而湯劑大則邪已  
盡而藥餘力傷正  
是乃粗

工也千治萬論惟中而已過與不及皆為偏  
廢然而太過尤甚於不及

正傳一九味羌活湯後曰然亦不可執一執  
中無權猶執一也

必 視經絡前後左右之不同  
從輕重大小多少之不一  
增損用之

正傳小兒痘部曰

夫 依陳氏者多用熱藥  
宗劉張者多用涼劑  
故不偏於熱

則偏於寒此刻舟木劍之道也

寶鑑一汗多亡陽部曰

今當汗之一過亦中絕其命况不當汗而強

汗之者乎 又下多亡陰部曰不當下

而強下之令人開陽洞泄便溺不禁而死

一 立方本意 因用分兩 之例

寶鑑六滋腎丸治下焦陰虛脚軟無力陰汗

陰痿足熱不能履地不渴而尿閉

桂 二錢 知母 二兩 酒洗 黃柏 二兩 酒洗

經曰 熱者寒之 腎惡燥急食辛以潤之

〇今當汗... 〇大中小... 一モト...

〇今當汗... 〇大中小... 一モト...

○後半我善  
殺其毒上小  
三平之毒下和  
了我重致怪  
善半下分九料  
善半下

黃柏若辛寒瀉熱補水潤燥為君

知母若寒以瀉腎火為佐

肉桂辛熱寒因熱用也

正傳或問曰彼雖畏我而主治之能在彼當

彼重我輕以殺其毒耳我重彼輕盡奪其權

而治病之功劣矣

玉機三十五眩門六合湯四物加秦苳羌活

當歸

其溫而補血

補血之陽

川芎

辛而溫散故解鬱

補血之陽

芍藥

酸而寒收故補陰

補血之陰

地黃

其寒而生血

秦苳羌活為佐使不宜等分而用

正傳三虛門曰

四君治氣虛

參一 朮各二

苓各二 甘草一

其一

右細切水煎

如自汗出  
或小水利

者去苓加芪

四物治血虛

歸二 芍各一

芎各一 地二

熟地二

右細切水煎

春倍芎  
秋倍地

夏倍芍  
冬倍歸

八物治氣血兩虛四君四物合為一劑加減

如上法

十全大補治氣血俱虛而挾寒暑

八物加黃芪肉桂

右細切加大棗生姜水煎加減如上法

一五臟六腑虛實寒熱

醫家大法曰

陳米トシ 蘇フホリ  
 法道トアアノテ  
 カビタルカキ

肺

有餘為寒  
氣參姜丁子藿陳桔  
 血五味烏梅木瓜

實

不足為熱  
氣知門貝苓梗  
 血桅苓

大腸

實 杏 桃 大黃 芒硝 牽  
 虛 膠 龍 訶 罌 乳

脾

實有餘為濕  
本姜參甘陳青  
 木桂

胃

實能食 大黃 芒硝 巴豆 輕粉  
 虛不能食 姜 木 麩 棗 耳  
 能食能便胃實腸虛 枳殼 朴 石脂

不能食不能便胃虛腸實木枳殼蜜  
 能食不能便胃實腸實大黃巴牽  
 不能食能便胃虛腸虛理中湯

心

有餘為熱  
氣牛黃腦子黃連  
 血辰砂生地栝

心悸

不足為寒  
氣參苓薑  
 血桂地歸

痞悶

寒 姜 溫 散  
 熱 連 心 部 散  
 濕 澤 瀉 茯苓 後 白  
 燥 木 瓜 芍 藥

小腸

實 赤小豆 苓 燈 草 車 瓠 通 生 地 瞿  
 虛 白茯苓 茵 稂 白芍 龍骨 赤石脂

三焦之々ハコカレトヨム  
其子毛換モコカレ中有子毛  
コカレ下ニ毛子毛コカレ教書

腎

有餘為寒

氣山茱萸附子  
血菴蓂桂巴戟熟地

不足為熱

氣山藥遠志五味  
血蛭粉蛤粉生地

命門

有餘生地楮辰砂知母  
不足附子烏頭桂硫黃

精滑連栢益縮地蛤粉牡蛎遠

膀胱

寶澤芩滑猪苓牽  
鹿桔山茶黃

三焦

寶麻黃枳芩翹  
虛桂附磁菴

肝

有餘則聚聚則宜通

氣薄荷荆芥防風羌芎龍膽  
血紅花莪稜鱉

不足則燥燥則宜潤

氣吳茱萸菊花枸杞子大麻  
血歸杜仲牛膝川芎白芍熟地  
血竭沒藥槐花兔絲

風實則泄羌活細辛大黃牽皂角

風虛則補白花蛇天麻牛膝杜仲續斷

兔絲草薺

膽

實柴翹連芩膽

虛參歸熟地酸棗仁

一救補辨例

玉機十七內傷門補中益氣湯方後曰

加

黃栢  
地黃

以

救  
補腎水

一和平字訓

玉機四十九婦人門曰

詩言婦人和平則樂有子  
和則血氣不爭  
平則陰陽不乖

詩ハ毛詩ア  
玉機ハ百多

一藥食違順 **寶鑑六**

假如欲使收斂則必須忌辛散之飲食也

一棗薑功能 **寶鑑五**

脾胃之使

衛之源益衛

榮之本補榮

必以

其

辛

脾胃者

其辛相合脾胃建而榮衛通是故以大棗

生姜為使

**用藥指南篇五**

一五味所用之大概

**湯液 集要**

酸束而收斂

能收緩收散

苦直行而泄

能燥濕堅軟

夫其上行而發

能緩急

辛橫行而散

能散結潤燥

鹹止而軟堅

能下行

甘平下  
行三味  
之味

其味

有升降浮沉

可上可下

可內可外

有和有緩

有補有瀉

一用藥

專土產

之說

集要

原行

辛

弁時月

昆虫草木產之有地

九藥

根葉花實採之有時

失其地則性味少異

失其時則氣味不全

一幽微斟酌

醫家大法

必妨

用參以治肺必妨脾

用菴蓉以治腎必妨心

服于姜以治中必僭上

服附子以補火必涸水

假令

〇上下之妨ト云ハ心  
ノハクハ肝ノ水ヲ  
ナイヤミロニスルツツ  
クニ子トトスルツツ

叔和曰

治脾必連其胃

治表必連其裏

治上必連其下

治下必及其上

但主病者多而連及者少理所當然也

一内傷

用藥多寡之分別

雜著醫論

仲景處方藥品甚少

東垣用藥多至二十餘味

私曰

雖外感

初法仲景

雖内傷

後則東垣

一上下引用酒塩製例

弁疑十書

上焦氣熱 酒炒 芩連 下焦 塩炒 枳 栝

一上下因用之藥劑 心法痘部

上因用升麻葛根

下因用檳榔牛膝

一因用明說 玉機九補中益氣湯方後

病熱因寒用

病寒因熱用

伏其所主先其所因

一藥劑所主宜本偏長

湯液曰藥味所主偏長為本

本草一物主十餘病

當推潔古藥之所主不必多言只一兩句

多則不過三四句非務簡取其所主之偏

長耳

王好古  
湯液曰藥味所主偏長為本

多言  
○竹簡  
ノリ  
ノリ  
ノリ

一生熟異用之九例 湯液

地黃若朮 洪實者宜生 虛弱則宜熟

甘草 生用瀉火 灸用溫能補上中下焦元氣

集要曰卷栢 生用破血 灸用止血

一本經引藥 正宗

手足太陽 小腸 膀胱 藁本羌活

手足少陽 三焦 柴胡

手足厥陰 命門 柴胡

手足陽明 大腸 葛根白芷升麻

醫江特滿篇止

二十一

毒藥非毒藥擊之業  
病ノ為ニ毒薬ナク

手太陰 肺 白芷升麻葱白

足太陰 脾 升麻白芍

手少陰 心 獨活

足少陰 腎 獨活少加桂

通經用此藥為使豈能有病到膏肓

一欲用毒藥便當察胃之虛實

格致餘論曰

凡攻擊之藥

有病則病受之  
病輕而藥重則胃氣受傷

胃與穀肉菜菓相宜藥石皆是偏勝之氣雖

參芪輩為性亦偏况攻擊之藥乎

一馮正之明例

寶鑑十二

瀉肺用苦寒非瀉肺瀉肺中之火實補肺氣

也

本草曰

瀉肺正氣辛味

補肺正氣酸味

私曰餘臟宜倣之

一隨時換氣之說

脾胃論

凡藥之所用皆以氣味為主

補瀉在味

酸補肺  
辛瀉肺  
辛補肝  
酸瀉肝

假令欲補肺

熱時方藥  
寒時五味

隨時換氣

一氣味不宜偏廢

素問曰

天食人以五氣  
地食人以五味  
人以五氣自中見之

〇五氣ハ

〇換氣トル業ニテハホトト

五氣ノ入鼻藏於心肺使五色ヲ彰明音聲ヲ能シ

十全大補湯ノ氣血ヲ兩虛ニ良ク偏ニ記ス

五氣入鼻藏於心肺使五色彰明音聲能  
五味入口藏於腸胃以養五氣津液相成神  
乃自生

一藥性能毒之明例 正傳

或間虛損之病世俗例用十全大補湯五種  
以補氣虛五種以補血虛吾子將何以議之  
乎 曰此乃氣血兩虛之劑

或血虛而氣尚實者其可一例施乎蓋  
氣虛而血猶充

藥性有能毒 中病者籍其能以獲安  
不中病者從惹其毒增病

茯苓 宜無汗少溺之人  
不宜尿數多汗之人

黃芪 宜肥白氣虛多汗之人  
不宜蒼黑腎氣有餘之人服之滿  
悶不安

甘草 宜健脾補中瀉火除煩  
禁嘔吐中滿嗜酒之人

芎 宜補血行血清利頭目  
禁骨蒸多汗氣弱人散真氣也

地黃 生用 能生血脉  
胃弱忌之損胃不食  
熟用 補血養血  
痰盛者恐泥膈不能行

人參

宜潤肺健脾元氣虛損不可缺  
久嗽勞嗽咯血鬱火在肺禁之若

誤用

加嗽  
增喘

白芍

涼血益陰專收斂宜血虛腹痛  
形瘦氣弱素虛寒人忌之伐發生之  
氣也

餘種例而可知藥性能毒未易承舉學  
者宜究本草之詳

29  
1960

