

啓  
神  
集

寫本 平野文庫舊藏



啓迪集

寫本


平野文庫舊藏

啓迪集

寫本


中卷

平野文庫





啓迪集

二



啓迪集 享本 中卷  
旧平野神社 献上本  
原装手綴方特別号9.





啓迪集卷之二目錄

道主編

中寒門

一養藏之道

一中寒之脈

一正治從治之異

平野

一里急治之論

一治寒之宜禁

一氣分血分之辨

一主溫散氣溫血

一難治之証

一宜灸之法

中暑門

一中暑熱之因

一暑傷中之証目治

藥

一動靜二受之別

一暑邪輕重即病變病

富

一暑熱兩目散收二法

一治法之宜禁

中濕門

一濕証由來

一濕之証因

一表裏

一濕邪重証

一中濕証例

一濕証內外

一濕証寒熱

一濕証兼餘毒

一脈

一內外因証

一入濕之所在

一治濕之大槪

一諸濕治例  
 一忘情肥瘦并治  
 一三焦濕治之劑  
 一腫痛肥瘦并治  
 一上下內外之并治  
 一標本緩急治濕妙規

○瘰癧疾門

一內經瘰癧名  
 一傷寒之瘰癧并明  
 一遠近淺深氣血早晏  
 一汗之有無  
 一暑風之瘰  
 一累劫胃損治例  
 一瘰癧并禁慎  
 一脈治  
 一隨經之証治  
 一陰有血分久瘰治法  
 一陰陽之瘰多汗無汗  
 一三白作陰經受病  
 一瘰癧母証治  
 一陰虛一証專似瘰  
 一瘰骨暑之三瘰  
 一陽經陰經治例  
 一日久虛瘰無邪之說  
 一寒熱大作三陽合病  
 一渴不渴  
 一治瘰大法

○痢病門

一浮子痢之并  
 一治痢既宜性味  
 一痢証并因治法  
 一脈并  
 一行血調氣治痢權衡  
 一三因分治

一宜下宜升之并  
 一治痢主方并後重厚矣  
 一久血痢治法  
 一凡宜溫敷証  
 一痢嘔之焦并劑  
 一泄痢吃逆  
 一痢色青黑皆為熱  
 一通滯劑有輕重  
 一糟粕未實治法  
 一雖痢久宜下一証  
 一紅白治劑  
 一不執一家  
 一痢証腹痛治法  
 一死痛二治  
 一少兒痢疾  
 一治清世滋藥加福皮  
 一東垣治痢大法  
 一虛坐努責回治  
 一重急後宜証因  
 一紅白之痢氣血必衰  
 一大抵宜下數証  
 一疫痢之論  
 一禁口之因治  
 一治痢之宜禁  
 一治陰血虛痢  
 一巴豆芫花宜禁  
 一下痢惡証

○泄瀉門

一泄瀉痢疾之并  
 一泄瀉之因  
 一穀不化亦有熱証  
 一暴久陰陽  
 一暴注宜調水  
 一五虛  
 一脈  
 一泄深寒熱  
 一胃氣不降為飧泄

一哮喘功能  
 一諸方治痰厚之藥甚少  
 一治本之法  
 一賢厚治法  
 一消積斷下前後  
 一久世元氣下陷脫肛  
 一世浮因証治  
 一脾厚治法

欬嗽門

一欬係節之理  
 一五痰  
 一肺脹之并  
 一痰盛能食不食并治  
 一欬嗽治法大抵  
 一杏仁用捨  
 一啞嘶之因  
 一五味子用捨  
 一欬子嗽或為三  
 一痰之有無別治  
 一欬嗽新久并因  
 一夏冬二治  
 一雜者治法  
 一火當乾欬房常欬  
 一晚禁不治  
 一二陳用捨  
 一欬嗽之脈  
 一六氣皆能為欬  
 一肺虛肺實并治  
 一傷酒之欬  
 一欬痰兩主  
 一肺痿  
 一欬嗽脇痛  
 一潤燥劑之用捨

降痰奇効緩劑

一欠完

痰飲門

一痰飲之本  
 一五痰  
 一內因五痰  
 一雜者治痰大抵  
 一留飲無補法  
 一順氣并劑  
 一醫者治病者之戒  
 一脈辨  
 一痰飲新久  
 一頑痰痰結  
 一膈痰吐法  
 一亦有挾虛挾寒証  
 一海粉治諸痰  
 一痰飲諸証  
 一在陽在陰  
 一仲景治法  
 一腸胃痰治法  
 一眼皮外候  
 一降痰奇藥

喘急門

一哮喘本因  
 一新久虛實并治  
 一陰虛氣虛  
 一脈  
 一未發已發并治  
 一治法  
 一哮喘之別  
 一喘脹肺腫標本前後  
 一治哮喘方

一喘之惡候

水腫門

一水病既因

一腫子滿之并

一水始之候

一水腫始終

一脉

一濕腫之并

一風水之証

一腎肺之末

一陰陽水腫証

一脈肢前後

一五臟水証

一平治權衡

一腰上腰下并治

一毒通之戒

一通利是非

一辛苦寒治濕熱之解

一水腫非脾虛而脾濕矣

一丹溪補脾之說

一手足大陰俱病之說

一治水大抵

一十種水根流并異

一八絕

一諸忌

脹滿門

一腫脹之辨

一腫脹之因

一脉并

一日夜寬急氣血并治

一春否之論

一虛實并治

一補脾養肝滋腎論

一速得効之戒

一脹者大抵屬內傷

一脹証有寒有熱

一肥瘦并劑

一蓄血脹治劑

一怒氣當脹

一治脹初久

一食積脹滿寒熱二劑

一用厚朴則量量劑

一大抵治脹藥劑

一符夏宜劑

一水先

積聚門

一積聚陰陽

一五積并証

一三塊并候

一積聚之脈

一因業毒大小積分限

一初後劑下可各

一癥瘕之辨

一皮裏膜外之塊

一治積之揔辭

一治積之大抵

一有塊難婦難能峻劑

一治諸積異劑

一瓦龍王殼能治積

一倒倉用揔

一病加於愈之說

一不可信者石功德

霍亂門

- 一霍亂之因
- 一乾濕二證易難
- 一乾霍亂証治
- 一女法
- 一吐厚前後之并
- 一脉
- 一治霍亂大抵
- 一初病即時之禁
- 一轉筋因証治
- 一瀉手不瀉別有

嘔吐門

- 一嘔吐因証
- 一嘔吐諸証
- 一吐証之因之并治
- 一陽嘔吐噦之并
- 一貴并惡寒之証
- 一嘔吐治法大抵

卷之二目錄畢

案證辨治格通集卷之二

海下翠竹菴一溪史道士編

中寒門

一養藏之道

經曰冬三月此謂閉藏。寒者天地收厲之氣也。人微  
為半受寒必傷腎。早臥晚起必待日光。使志若伏。  
去寒就溫。是養藏之道也。逆之則傷腎。春病

一宜急治之論

中寒卒感病。果自膝理。踈豁。身受之。雖令經絡無  
可救。溫補自解。此胃氣大虛也。不急治則死矣。  
中陽甚加附子

由胃氣大虛。感受。胃虛則肺不能旺。皮氣先絕。氣弱  
則表失衛。寒易入。使周身陽氣過絕。而不行。四肢厥逆。得固

春言此謂養藏。在外早趨  
夏言此謂蕃秀。在夜下早  
秋言此謂容平。早臥早  
冬言此謂閉藏。早臥晚起  
注曰。早。不謂。蓋。地戶  
閉。寒。陽。氣。伏。藏。

而僵直故口噤目睛而色青白

或自汗表絕內外俱虛寒邪留盛治失稍緩脈散而死

一 主溫腎氣溫血 傳

謂受寒少傷腎故使知溫腎而不知溫血未百十全之功  
溫腎藥寒薑附  
血散寒桂歸

一 中寒之脈

脈經中寒下或細細  
或吐細

凡解浮脈暈不仁  
濕脈需腫滿疼痛

一 治寒宜禁

不可每下每吐  
當補陽消陰  
桂枝湯固真氣

一 難治之証 全

如舌卷而囊縮者難治

一 正治從治之異 心

正治溫散 桂枝四逆湯草

從治用熱藥加涼劑引之或熱藥須後飲最妙

一 氣分血分之分 丹

如氣分寒宜仲景桂枝湯  
血分寒宜當歸四逆湯  
桂枝湯加附  
歸桂枝芍細甘通平寒

一 宜灸之法 選

甚者手足厥冷脈中絞痛唇青氣冷  
急於胸下守丹田灸之俟手足暖為度  
或三壯五壯視其輕重施之



五

中脘而死者不用冷宜溫養以湯熨臍中

或嚼生薑送下不能嚼者水研灌之  
嚼大蒜送下亦佳也  
生干薑末湯送下亦佳也

林

凡治暑之法利小便甚好自汗者不利尿

凡不能服諸熱燥劑殺莊黃尿不通則亂而死矣

脉沉弱不宜寒涼  
陰寒宜黃連香薷煎

○中濕門

一

濕証之由來

林

濕為土氣熱能生濕故夏熱則万物濕潤秋涼則万物

乾燥

濕病不自生因熱實水道不行停滯生濕

五

况脾土脆弱之人易感  
人只知風寒之麻痺  
不知暑濕之麻痺

一

中濕証例

經

諸濕腫滿屬脾土

濕勝則濡泄

地之濕氣感則害皮肉筋脉

一

脉

脉沉而緩皆中濕

一

濕之証因

五

濕者土之濕氣自於濕首如果頭者  
其位高故聰明係乎  
其氣清  
其伴虛

謂桑葉黃連清道不通沈重不利似手有物蒙之濕鬱為  
熱極留不去血不養筋助故拘攣濕傷筋不榮骨故痿

弱

惟應家諸濕是謂則謂  
注脾胃受濕則吐酸不食水  
穀相和故大腸飭道而注  
以濕內盛而身發熱濕字  
又曰天和氣感則害人至哉  
小教之失致感則害於六者  
如濕氣感則害於筋脉  
注濕氣感則害於筋脉  
致感則害皮肉筋脉

一 濕証內外 五

濕挾寒 內甚則脈痛下利 外甚則肢重疼痛

濕挾風 外甚則身重痛汗出

濕挾熱 內甚則溼痺 外甚則或

一 內外因証 五

中濕 內則多中滿痞胸溼痺 外則身疼痺肘腫疼痛

一 表裏 五

一身全腫痛無汗是濕區關節邪氣在表

五苓散加桂枝 微汗

若自汗多出熱燥津液內水不利切勿利之宜損津液宜防風白木甘草湯


一 濕証寒熱 五

濕熱証多 寒証少

脈濡數身赤引飲為濕熱 小便自利大便溼身疼自汗為濕寒

一 濕之所在 并

其人虛弱故濕之中



一 濕邪之變証 選

清而為喘嗽 溼而為浮腫 人關節一身疼痛 積而為吐下 黃脾中黃發 痰而為泄瀉 流注身重腰痛

一 濕証氣餘系 選

挾風頭目昏眩吐噦心煩 帶重煩渴引飲心脈疼痛多汗 氣寒奉掌刺痛無汗惡寒

一 治濕之大抵

凡治法宜（理解）利小便為上 治濕不利小便非其治

二 陳如（陳本）酒芥尾活蒼朮不通（散氣）尤妙

脾胃受濕沈困無力怠惰好臥用木去痰

一 諸濕之治例 傳

丹溪曰亦氣之中濕熱為病十居八九

濕在上山苦溫甘辛宜濕行不欲多汗故不用麻葛根

濕在中下利尿妙法後多治濕也

濕自外入者法兩濕地皆從外治宜汗

濕自內得者久則疎通後宜汗

大君本治濕上下部皆可治

一 上下內外之并治



一 三焦治濕之劑

上焦濕熱用苓 實熱亦用苓 浮腫大故也

中焦濕痛用連 實亦用連 得心大故也

下焦濕腫用酒防己黃柏知母龍膽

一 怠惰肥瘦之并治

肥白 沈困怠惰是 兼虛 二木 冬 半 朴 芎

一 腫痛肥瘦之并治

肥人兼虛腫痛 二木 南星 滑石 茯苓

一 標本緩急治濕妙觀

不可執一論全在活法加減而用之

治濕之法 以二木為君 補脾為主

有濕盛氣滿臃腫者以利水行氣為先 補脾藥未可

適用 或心（二木）為君 利水藥 為臣

看緩急而施治則百舉百全

瘧疾門

一 經之瘧者 早

經曰夏傷暑秋必瘧瘧

先寒後熱者曰寒瘧

又曰 先熱後寒者曰溫瘧

但熱不寒者曰瘧瘧

傷風陰勝內外俱寒故戰慄  
是溫瘧也  
寒熱身重骨痛脹滿自汗嘔吐  
陰氣先絕陽氣後發肢熱而嘔

脈治 再

經曰瘧脈自弦

弦遲溫

弦急下

浮大吐

弦數以發也 飲食消息止  
微則為瘧

弦急汗針灸

代散則死

一 疾常暑之三瘧 林

疾結背膈心下脹滿氣逆嘔煩謂之瘧瘧

宗本多苦甘  
小柴胡  
加牡蛎

瘧久不瘳表裡俱復 若邪未散  
真氣不復 故疾愈暫間少常便

教謂之瘧瘧

暑瘧 熱多 或但熱咳嗽煩渴 小柴胡加烏梅  
門各地骨

一 傷寒瘧疾之并明 林

瘧先起毫毛伸欠寒慄腰脊痛寒去則內外皆熱頭

痛渴

傷寒發熱惡寒頭項痛腰脊痠

一 隨經証治 林

太陽表証 麻桂羌活湯

脈不浮而弦教柴實 大柴胡下

半表半裏小柴胡或桂枝黃芩湯 桂枝湯多味膏甘知半

陽明裏証 大柴胡 傳瘧者滿熱多大便實大柴胡

在陰經夜發 赤仁 兼氣 赤大桂枝青芒

一 陽經陰經之治例

再

太陽經 寒癰 多汗之  
在陽明經 謂 熱癰 多汗之  
少陽經 風癰 多汗之

三陽受病謂暴癰在後 此乃傷之淺者近而暴也  
在陰經則不分三經總謂之濕癰

位太陽論之在後至前

此乃傷之重者遠為癰

一 遠近淺深氣血早晏

再

傷在 陽者近而暴  
陰者遠而深

在氣則教之早  
在血則教之晏

深則

一 陰分血分久癰之治法

再

丹後曰邪深入陰分血分久癰者必用升發其自解出之  
於脈熱後自復作汗而解  
若用下藥則邪氣愈陷下難出也

一 日之虛癰無邪之說

再

日之虛癰寒熱不消或無寒但微熱者邪氣既無只  
八物如柴苓芍陳滋補氣血

一 汗之有無

傳

若無汗要汗散邪為主下藥補  
若有汗要無汗正氣為主下藥散  
虛者必用灸不二點托住其氣不使下陷後用他  
藥

藥

一 陰陽二癰之汗無汗之別治

再

陽癰 多汗用柴苓芍陳  
無汗用柴苓芍陳

陰癰 多汗用芍甘地黃相飲  
無汗用柴苓芍紅花散

再 散於 三陽者熱多寒少而愈發  
三陰者寒多熱少而愈發

一 寒熱大作太陽之合病

再

桂枝芍藥湯治寒熱大作不論先後此大湯也  
之大有寒熱作則必戰經曰至勝發熱則必汗世經曰汗出  
甲也也當內實外虛不煩惡人傳陰經此湯主之  
桂枝芍藥湯知膏芍各一兩

一 暑風之瘧 宜汗之  
廿後日更暑風皆外邪也非汗必不解未求治者多  
試劫劑胃氣重傷似難連愈必先冬木加減以取汗  
得汗而愈又行補下俾屬陰最難得汗補藥力汗出至  
足方是佳也

一 三日一作石陰經受病  
廿後日發子午卯酉少陰瘧也  
啖慾七飲七及試劫藥胃氣大傷其病難愈必于冬木

一 渴不渴 俱  
陳苜蓿引經者得汗伴虛須重補後汗通身方是佳也

一 果劫胃損之例  
廿後日唇去得瘧果試劫藥綿延至夏求治者知久  
得汗胃氣未定非補不可味木丸少汗而安

一 瘧母証治  
瘧瘧多成癖於左眼之下右曰瘧母乃肝積也瘧屬少  
陽病人沈久瘧病在血分血亦屬肝敵魚甲為君臣佐  
使隨証入厚實不必泥一也  
瘧母用丸導之醋敵為君桂枝青桃紅麩香附海粉  
隨証加減為丸醋湯送下

一治瘰癧之法

看

外邪發散之熱以抹持胃氣為第一  
瘰癧及新發可散可截  
虛癰及久者宜補氣血  
若過服截藥傷胃則必綿延不終

主方柴葛陳二木甘

每日發午前在陽加苓苓半少

甚甚頭痛加青膏  
口渴加膏知母

間日三日發午後在陰加青歸酒芍酒紅酒柏熟地  
升麻提陽介截

間一日連發二日或日夜各發氣血俱病

加冬苓苓補氣  
四物補血

一截劑 并禁慎

是欲截之加換苓青常梅

穿山甲木鱉魚子等細末二不空心酒下

大抵瘰癧母多有燥痰之功大傷胃氣 中虛者戒

此病人忌飽食發日食飽病必重

都飲食  
避風寒  
無不愈者  
遠居者

瘰癧愈後陰陽兩虛宜遺咳嗽不善保養遂成骨癆  
瘰癧中惟忌用心過度勞役憂心最為難治

一陰虛一証專似瘰癧必真誤

夫有陰虛証每日午息寒發熱至晚亦得微汗而解  
脈必虛而分教誤為瘰癧用常砒柴葛等藥至不救

○瘰癧門

瘰癧母多用硫霜大毒之  
藥其性至燥大忌  
燥痰也黃丹不是勝痰  
去積之藥大抵瘰癧母  
多有燥痰之功大傷胃  
氣也

私按素問謂腸辟者  
謂腸下近代謂之瘰  
癧

一 得子刺之并  
以下小穀者為刺

一 痢証并因 并治法

痢是濕府及食積  
白濕熱傷氣分  
赤濕熱傷血分  
赤白相雜氣血俱傷  
黃食積

治法 厚腸胃濕熱  
用前結之氣  
消化積滯

母液日 赤屬血自少腸未  
白屬氣自大腸未  
皆濕熱為毒

其濕熱為毒  
燥黃 燥白  
燥濕 燥金  
燥火 燥木

一 行血調系治痢權衡

行血則便自安  
調氣則後重除  
膿血血停  
每迫後重氣實也故  
行血自愈  
調氣自除  
此語實  
百有日月  
龍耳者雷聲

一 治痢宜之性味

苦 燥濕  
辛 能發散開通常結  
寒 以勝熱苦以燥濕  
無不效者  
使氣宣平耳

一 脈并

腸辟下膿血脈 沈小流連者生  
救疾且大有熱者死  
下痢脈 微小生  
脈微熱而得脈弱自愈  
脈微而得自愈  
脈急死  
脈急死

一 三因之治法

先相其歲運以平其外  
審其氣結以調其內  
審其所傷以治其內外  
明察不容揆

脾胃論 夫腸辟者為少穀  
手血別作一仙如御桶漏出  
也值長氣在太盛正當若  
氣勝而主氣弱也  
五按此公生死亦是文辭言  
之必須更詳證以詳審之

一 宜下宜升之年

元氣未復壯氣初病宜升  
血弱衰老下積久劇虛宜升

一 血痢久宜下之証

若得痢後脈溫或止澀之藥則血稍久宜下之  
後方調之

年老及虛弱人不宜下

一 經急後重之証

裏急後重者宜迫急痛也其証有五



一 治痢之主方

後重虛寒加減  
赤白連一芍一木香一鼓一枳一甘

痢疾初後重加滑石再加枳殼檳榔生芍再加條芩  
若痢已久而後重不減此大腸滯下也枳殼枳用  
條芩加升麻提之

一 紅白痢治劑

白痢加木苓滑陳初欲下加大黃

紅痢加歸芍枳初欲下加大黃

若紅相安加滑陳木以理之

有食積加枳實

一 紅白痢氣血必衰

若紅痢久胃弱血虛下後未愈  
赤連芍木苓滑陳  
歸芍地膠陳木

一 久血痢之治法

久血痢不愈屬陰虛四物為主  
涼血當歸桃仁屬

一 不執一家



局方不并三自專用治熱其失甚矣  
河間專用苦寒踈下之藥亦未甚為當

何則病有厚實  
病氣暴至氣壯滑固宜下之  
病久氣脆腸胃虛滑不難溫之治之


一 大抵宜下之教証 五



傳 仲景法


下痢 初得二日氣未虛宜下之  
五日後不可下  
虛者初不可下  
天氏曰 實者日久宜下

一 凡宜溫之教証 五



一 痢証腹痛治法 五

泄痢腹痛其証甚多內氣鬱結所致理宜散氣為先



腹痛 白芍甘草為君  
當歸白朮為佐  
痢初腹痛 用生薑桂枝  
禁之冬白朮  
寒加桂  
熱散  
實痛 可下  
苦梗散  
虛痛 不可下  
有熱用 芍芍  
無熱用 桂

傳腹痛因脾金是未前  
在大腸之側以苦梗散  
後用痢其一二更則可  
下虛則以苦梗散

一 疫痢之論

一 疫痢之內

上下傳染  
長幼相似

是疫痢也

察運氣之不及

介凡寒暑濕燥火病

并病者 虛寒冷熱

用敗毒散加人參少之 其何其自神也

一 痢嘔三焦并利

痢而嘔

上焦  
中焦  
下焦 不和用

生薑橘皮  
芍藥桂枝

亦有

胃火逆上吐者  
胃虛而吐者  
積滯毒氣上攻而吐者  
陰虛而吐者

一 孔痛之治

傳

久病身冷自汗脈沉少  
暑病身熱脈洪大  
木香干薑溫  
黃芩黃連清 而大孔痛 溫  
清  
俱用檳榔冷下達

一 禁口之因治

傳

禁口胃口極甚故也 參連煎湯終日嘔

參苓蓮肉少黃芩細末 即思食

人搗田螺塗臍中 以引下其熱

人不知 用甘溫 參  
苓  
蓮  
肉

亦有 誤服利劑  
毒在胃  
早服  
散邪  
開胃

蓮肉 壁土炒橘皮 二味細末 粳米煎湯 伏下

一 世痢吃蓮

具

吃蓮氣自下衝上 屬火象 陰弱也 虛之甚也 痢久

多見 乃自下而陰虛也

古方以胃弱言 殊不知陰弱也

一 小兒痢疾

傳

大抵用三黃加甘草 赤痢加黃芩  
白痢加滑石末

傳 飢餓同古以飢  
為致連又誤以飢  
為致連亦有益  
為吃連者皆誤也

一治痢之宜禁 再

腸胃虛滑者不下

中氣虛弱者不吐

血熱積滯在腸胃壅滯不通者可下  
痰飲在膈上氣不降者可吐

一痢色青黑皆為熱之論 再

青痢為寒誤也仲景少陰病下純青水極在裏大

兼氣下作

見熱甚急利色多青為熱即矣

黑痢亦極也由大熱元基則反氣水化劑之故色黑也

一滑泄泄藥如橘皮之妙訓 再完 傳

久痢伴虛氣弱滑泄不止泄藥止之訶子豆蔻 半夏牡蛎之類抵

而用之須以陳皮為尤恐大泄亦作疼

甚虛滑泄不止全天樞氣海

值天樞在膈心西傍右兩  
氣海在膈下寸半

一治法血虛痢 再

苓 芍 甘草 三不治痢腹痛後重身熱脈洪疾

膿血稠粘

酸收甘收酸甘相合以補陰血後其陰

一通導之劑有輕重 再

古方用厚朴積滯疑滯之氣滯氣行則去之

積穀雖少緩亦不可久服

只以陳皮和藥可也

一東垣治痢之大法 再

後重則下之

身重則涼之

膿血稠粘宜劑之

致胃滯為利當溫之

腹痛則和之

身表自汗毒氣溫之

身表起者內疎之

湯寒飲食脹滿後世以溫熱之劑消導可也

毒藥 以熱藥溫之



一 巴豆等入豆豉 再

巴豆等菜 使用人傷冷物者則可  
若用人於熱者則為害非輕

一 糟粕未實久治法 傳

刺後糟粕未實或能食粥 脈夜以白木陳皮二味煎  
眼白如

一 虛坐努責回治 傳

刺後氣行血積積少但虛坐努責此為無血証  
倍用歸尾芍地加杏仁陳皮和血生自安

一 下痢之惡証 傳

下痢 如魚肚 身熱脈大 者半死



泄瀉門

一 世深痢疾之并 再

以下 中穀 者為痢疾

一 暴久陰陽 再

凡得利寒少 寒則不能久也  
故曰暴利非陽 然亦以脈証訂之

一 脈 再

脈經世深脈 緩時小結者生  
得大數者死

再按此證之是少陰陽正  
如傷寒之病始為多而終  
則傷寒而為極也

應春論春傷於風夏  
生於世法中於表則內  
應於肝之氣來脾故發  
世日新按正云生之通春  
云春傷於風邪氣留連  
乃為同世

又洞世食不化不得留膿血脈微小生 脈數目下利脈微小生 大便共無言日

一世深之日

傳

濕勝則濡厚

田維日

春傷於風必致後世  
暑注下迫皆屬熱  
諸病水液澄徹清冷皆屬寒

但

濕熱良多耳  
瓜多苦少

濕得由坐臥濕起濕傷脾梅雨之陰多有此病

除濕湯治

半升大者若佳凍艾令甘

一暴注宜調水

世厚多目濕有利小便為上策也

一暑注保水不忌暴速甚者屬大宜調水

一世深寒熱

傳

子和  
桂多薑苓本甘白以薑  
宜明  
苓以薑苓本水隔不桂猪  
桂苓甘露  
五苓益元備甘  
本猪桂只苓

保首

青黃赤黑

為寒  
清白為熱

大便完穀不化色不變吐利不腥穢水液澄徹清

又冷外清不設身冷不渴脈遲細而微皆定証也

大便穀由消化無問色及他証便斷為救寒世而穀

消化者未之有也

熱深薑赤黃肝門焦痛薑出穀道如湯燒類渴小便

不利

一穀不化亦有救証

人性急速傳化失常完穀不化而為強泄者亦有之

仲景曰邪熱不殺穀

然熱得濕則為強泄

一五虛

再



其 將水劑合胃 虛者活  
世注止則

一 胃氣下降為飧泄 再

胃氣平 飲食入 胃精氣 則輸於脾 上歸於肺 行而脈 而成榮衛

若飲食一傷 起者 必時損 胃氣 則上升 精化之氣 反下 降為飧泄 久則 太陰傳 少陰 為腸澼

三味之功能 再

木苓苦 治濕深 食停 和中也  
木甘 會除脾胃濕  
芍藥 收除胃濕 越四肢困  
苓 淡利水道 除濕  
三味泄利 須用之  
足太陰經藥也

一 消積斬下前後 再

浮証直須積滯已消 然後用斬下 某今人性便固 止 之 多 成 劑

治法 先理中 後 治中 必効 然後斬下

一 久泄元氣下陷 脫肛 治法 再

久泄穀道不食 或脫肛 此元氣下陷 大腸不行 收斂而 熱 木芍 麩陳訶菴 五倍 烏梅 為丸 以四君子湯 加防風 升麻 煎湯 送下

一 諸方治泄 得之者 甚少 再

角者 泄深 必為寒 故治泄 深之方 甚少 並 仲景 治渴 寒 挾熱 下利 用葛苓 連入 未之 思耳

一 按之

一人吐瀉 三日 垂死 予 予 天樞 立止

元氣下陷 宜用 升 有 及 字

挾熱 傷多 內 四 有 挾 寒 挾熱 証 協 挾 通用 散

垂 自 上 越 下 又 幾 也 府 將 及 也

心  
久泄大腸虛氣逆脹熱地白芎知母干薑甘草炙  
一百會之壯

一 泄深目証治

丹溪曰泄有



浮水脈不痛濕也

飲食不化完穀不化氣虛也

腹痛泄水腸鳴痛一陣浮一陣也

或浮或沉或多或少或痛或不痛也

脈痛甚而浮泄後痛減食積也

戴氏解

燥便四苓散

氣虛天不芎加茯苓柴胡之類提之

伐痰海石青黛黑芥子通棗

食積消滯之少大黃枳實

治法之法

泄瀉在東偏日春陽於  
凡身生陰世  
法中於支則內應於肝  
肝氣乘脾故泄世

一 明醫雜書治世大極

世本屬陰多日飲食不節傷腸胃而作

須看時令而絕法

亦有下用瓜蒌心勝

久泄腸胃虛滑不聚收止

主方木不苓芎各一陳一不廿五

傷食世或食積加連朴實

承赤法少加法特通棗

口渴引飲加葛冬門升梅

積而泄深加連前葛通

久泄中虛食少難化加茯苓

久泄腸胃虛滑不聚加訶藜

外調六系  
胃氣下泄升

內平五腑  
自取強世共解散

治法  
健脾  
利尿  
補脾

惟曰湯疑深加妙研蘿蔔也

一 脾浮治法

白朮散不向陰陽調神脾胃

夫木甘甘溫補胃和中

木香藿香辛溫芳助解

茯苓甘平分陰陽厚水也

薤白根甘平氣滯信象葉散胃氣

右治脾胃虛弱世浮勝也

一 腎深治法

每五更初曉必世一汲此方皆世肺沈細專力

五味龍骨五倍已乾補骨辰砂之類

擇而為丸用之

○ 咳欬門

一 喉係肺之理

欬論曰春三府皆令欬  
非獨肺也

欬者因聲為病故多本於肺

一 欬子欬或為

咳

欬謂有聲而有痰肺氣傷而不清也

咳謂有聲而有痰脾濕動而生痰也

林

應象論曰秋傷濕人主咳

二論義同而無嗽字乃知欬乃嗽明矣

一 欬嗽之脈

浮緊虛寒

沈數實熱

脈 洪滑多痰

弦滿少血肺氣散而不收宜之春五味忌耗氣之藥

一 五痰

凡肺法秋氣欬情虛反動則氣上為咳甚則

動濕為痰是知脾無血則濕生傷脾氣不為痰也

有痰者寒少隨脈而治之

應象論曰秋濕既多水  
復主水濕相得肺氣又重  
故入寒且是則為嗽  
春風通天傷風濕謂地濕  
氣也秋濕既勝水水復  
乘未乘肺故欬逆  
病生

欬論注邪謂寒

孔子下云有亦字



一 咳之有無別治

五 類而無痰者以辛甘潤其肺

易老半夏 止能世痰之標 是也

痰者密之 戴人曰咳動便有痰者痰出咳止是也

一 六系皆能為咳之證

皮毛者肺之合邪者之則為肺咳後人見之則咳為

寒不較他篇宜知六系皆能為咳

日夜無度汗出頭痛痰涎不利

急喘咳嗽面赤潮熱肢寒死子有

咳喘上應汗唾出血

形寒飲冷秋久感濕冬嗽而急喘 唾粘



一 肺脹之并

肺脹者主收欬 戴日喘滿氣急動則引重者是也

有嗽而肺脹應平過不得眠者難治

一 咳嗽新久之并目

新病 久病

咳 嗽



一 肺虛肺實之并利

治嗽要分肺虛肺實

肺虛者嗽五時紫莖紫冬馬薤之類神

肺實者天黃芩瓜蒂桑白杏仁之類

一 痰盛能食不食之并治

痰盛 能食者小黃芩 不能食者朴湯

一 夏冬之并治

傷酒之類

夏冬之并治 益甚者謂之極嗽小紫胡加薑知 桂枝 芍藥 甘草 麻黃 杏仁 桂枝 芍藥 甘草 麻黃 杏仁

自酒傷肺痰嗽苦杏仁和黃連苦杏仁蘇葉湯一方

一 咳嗽治法之大抵

咳而尿多者加益智

咳而面浮加沉香陳皮

咳而無痰者以辛甘潤其肺

夫咳治法必以潤其肺為先

南星半夏勝其痰而咳飲自除

一 雜考之治法

主方 杏仁 陳七 五味 桔甘 各五分

四 春多升氣加芍藥辛以平之抑肝潤肺

秋多濕熱加不來風芥穗清熱保濕

肺經有熱每加酒芥心

善治頭痛鼻聲重加薄荷

辰

凡有痰加半夏枳殼凡痰加南星

有痰口燥咽乾加南星加知貝蘇茶

五更咳者胃火又加貝真骨連

午後咳者陰虛勞嗽加四物柏和以蘇貝

久咳肺虛補氣血加參朮膠歸以款生薑酒芍

大抵咳血多是肺熱氣得熱而重為火盛而陰血

一 咳痰兩主

回咳而有痰者辛治在解肺

一 杏仁用按

杏仁得肺氣之虛久嗽者一二服即止

杏仁散肺氣自肺寒者用之

一火鬱乾咳房勞咳

火鬱者有咳聲痰少面赤降火為主

本質枯萎辛青海粉香附類為丸用之

乾咳者自呼呼之誤傷肺口燥吐白涎煩熱自汗咽乾

咯血此得神傷心

乾咳者咳而無痰血液衰少痰大在肺中用苦梗

用之凡補陰降火之已則必為常

四物知補藥一陳桑五味地骨之類痰急先治痰

自肩背痛目發寒熱咳而喘滿引腰脊而痛

一肺痿

痿論云痿使人痿之故肺痿者則皮毛虛弱生痿是也  
私按五痿之內肺痿者形之痿也今此改者欬久而肺為破損而為痿也

熱在上焦者為

咳嗽

或曰

呼叫久發而完汗液故寸脈滑滑屈數濁唾涎沫留肺便難快下痿

燥嗽胸中停痛咳唾膿血脈

數而虛肺痿數定者肺癰

大抵肺痿者其氣已破入心者不治

一啞嘶

咳久肺癰聲啞嘶啞血此屬陰虛火熱入甚

門冬湯地骨散此系花散清肺湯補肺湯宜採用

人不得尿教遺尿必眩多涎唾屬寒用炙甘草玉

如此有寒熱入異宜分治

一脫管

欬証不能息息思戒居室而性躁脫管之人皆難

疏五過論當責後賊  
雖不中邪病從內生者  
日脫管者有富後貧  
者曰失精

升造海粉法取紫貝粉  
不計多少二月取炭火  
煨成粉收貯之候秋燥  
善靈時子皮并搗爛  
粉和白固之字才之雙  
透風氣陸乾次用余

療

一 咳嗽眼痛

（以青皮、陳、所、治、庫、香、附、青、黛、酒、嗽、而、眼、痛、用、法、歸、芎、青、柴、騰、茶、）

五味子、用、捨、酒、

東垣曰

治嗽必以五味子為君、

然有外邪者、陳、用、閉、佳、邪、氣、

必先發散、後用之、

一 陳、用、捨、酒、

二 陳湯治咳去痰伐病根

（陰虛、血虛、大盛、乾咳）

有、勿、用、

一 潤燥二劑、用、捨、

口燥咽乾、有、痰、

（不用、半、兩、用、藥、具、）

水飲、

（不用、公、姜、恐、泥、肺、不、快、）

一 降痰奇效、緩劑、

陳皮

（去、白、半、斤、以、鹽、半、斤、煎、化、少、陳、皮、以、煮、乾、）

甘草、一、五、

石為末餅丸、

看虛實、作湯、使、

一 痰、

多嗽者、

（天寒、肺、俞、）

欬者、乘、西、氣、下、黑、自、降、若、數、十、壯、即、差、

上氣咳嗽、短、氣、滿、食、不、下、六、不、下、六、肺、中、府、三、元、五、

十、壯、在、氣、上、三、助、間、兩、膏、相、法、六、寸、

○ 痰飲門

一 痰飲、

看、


痰屬濕、乃、津、液、所、化、或、因、風、寒、濕、熱、之、感、

液、滑、重、為、痰、飲、

哈所洽切  
敵飲也

丹 心 卷 五

津液既凝為痰不復周潤三焦故口燥咽乾大便秘  
 面如枯骨毛髮焦枯婦人見月水不通  
 吐痰上出疑肺肺膈隨氣升降通身上下無不到也  
 或留聚胸膈胃經絡四肢  
 治痰之法脾去是治其本也  
 涎者脾胃之津液結為痰者痛在也人皆責其  
 手順行則無倒上之理  
 蓋脾行經也系血濕盛何痰之有  
 過思損經絡脾血既虛孤系招遠濕氣發矣  
 傷食損經絡脾血既虛孤系招遠濕氣發矣  
 肺喘咳  
 心怔忡恍惚  
 肝眩暈不仁胸肋脹痛  
 腎之略而多痰唾  
 胃脘吐酸而作寒熱  
 胃脘膈不利眉骨痛  
 腸瀉之有聲



三懸飲者飲後水滯在胸  
 下飲唾引痛  
 留飲者背寒如手太陰經  
 長而得四五脈節夜臥下  
 痛引缺盆咳則轉甚

慎王分切憂也  
 又寸脈中 慎胡郭切  
 二因嗜煩怔悸慎也  
 謂經論心由喘動  
 音疑喘 而自反  
 又音軟

散則有聲皆痰所致也  
 治法須氣為先氣順則津液流通  
 實解為平脾實則收約痰飲  
 脈奇 值  
 凡痰脈弦微沈滑也 脈偏弦飲也  
 肺飲不強但苦喘短氣沈而弦懸飲內痛  
 弦數者寒飲 春弦 兩關大膈上痰也吐  
 短氣四肢麻節走痛脈沈者有留飲

喘  
 世  
 松博如畏人捕  
 痰痛  
 喉閉  
 耳鳴  
 齒頰疼痛  
 身如芒刺  
 手麻臂疼  
 喘

咳  
 眩暈  
 煩擾  
 腫滿  
 瘧瘧  
 口眼喎斜  
 經項結核  
 心下如錐水缺  
 四肢節骨痛  
 眉睫耳輪俱痛

嘔  
 嘈煩  
 寒熱  
 牽壁  
 頭眩  
 噫酸  
 目粘濕痒  
 口舌糜爛  
 吞上每日如線毛起  
 身如麻奇怪

相於人切  
膠力加什淨也

喉痺  
唯唯不利路不盛噎下  
喉癰  
喉癰未有不痛者  
四散風腫硬癰痰涎

一 五痰

子種曰凡人病痰者有五  
一曰風痰  
二曰熱痰  
三曰濕痰  
四曰酒痰  
五曰食痰

王德君曰

風痰自感風  
寒痰自冒寒涼  
熱痰飲食辛辣炙博重稠厚脹而並也  
氣痰自艾逆意而並也  
味痰自酒醪厚味而並也

此皆素抱痰氣自感寒氣熱味而作非別有種種  
治法  
痰為本  
痰無扶氣為標

一 痰飲新久

痰飲新久  
新而輕者色清白稀薄味淡  
久而重者黃濁稠粘難結  
難出漸成臭味酸辣燥膩甚


一 在陽在陰

痰涎在  
陽不生者久則化氣  
陰不生者久則成形

一 內因五痰

有  
積而得之者  
困之而得之者  
思慮而得之者  
痛飲而得之者  
熱而得之者  
飲証至多其因無出於此

標濕  
積痰  
在左眼者曰肥  
在右眼者曰息  
久則成痰



一 頑痰痰結

老痰  
用海石半萸香附五倍他藥丸大治頑痰

五水有門曰漏水證如淫毒  
畏重喉癰或遍身腫痛  
按脈不堅疾行則潤  
有寸或喘咳  
又曰肺移寒於胃名曰  
留水

頑痰也



痰在膈上必用吐法

解者宜吐

膠固稠濁者必用吐法

五 諸亡血厚家不可用之

一 腸胃痰治法

痰在腸胃間可下而愈大寒芒巴豆甘遂之類也

利藥之多則脾虛

一 留飲無神法

十和日世俗例以散為寒積皆用溫熱補之燥之水濕未

除反增心火沈留飲無神法系方神則飲增增豈知

內經所謂留飲者攻之且不失其脈尚加閉塞少

又五飲丸用枳實巴豆攻之並是下攻終同燥熱

一 亦有扶虛扶寒之証

子積飲並無神法亦有扶虛之証不可不察

夫痰結位膠固寒凝不用溫散亦何以開胃行滯也

又有血氣虛人痰者中焦塞清道四肢百骸發理

宜道守痰常兼補難拘于和之說

一 眼皮外候

眼皮及眼下如灰相黑者痰也

一 頰系之并刺

頰系則痰自下 紫蘊枳殼肺之系菜也

一 海粉治諸痰

海粉 熱痰能降 濕痰能燥 結痰能散 頑痰能消 可丸末不可煎茶

一 洋痰奇藥

單用洋皮塩水炒乾為末餅丸白湯下

哮喘  
喘以言息言


林

一 喘急之方因  
鹽水炒橘皮四兩加甘草半兩為末白湯煎服  
利下痰塊肯滿頓愈而語無何用半兩平

一 醫者有病者之戒  
第恨醫者不善也治  
病者不守禁忌

遂使某助病邪展轉深痼去生漸遠深可哀

喘急門



經曰諸逆衝上皆屬於火

又曰起者如欲而息有音者此肺絡脈逆也

河間曰病寒則氣衰而息微

法曰冬寒陰主急數是也寒則息遲氣微

林

一 脈  
肺者諸藏之上而為華蓋喜清虛不欲寧

喘急脈 滑而俗者生

凡喘脈 宜浮虛

上素面浮腫者息脈浮大不治

肺數有熱喘咳吐血者不治

上久肺脹脈沈心下有水者

哮喘之別

夫喘從喉中如水雞舌謂哮喘

心由痰火動者也

新久虛實之辨

新病氣實而喘藥莊

久病氣虛而喘膠參

未發已發之辨

凡喘急之証未發時扶正氣為主  
已發時用攻邪為主

喘脹肺脾標本前後

喘脹相因皆不利

但要識標本前後

先喘而後脹者主於肺

何則肺司降外主皮毛經曰肺朝百脈通調水道下輸

膀胱之別都之官津液藏焉氣化則能出矣是

小便之行由肺氣之降下而輸化

若肺受邪上喘則失降下之令故小便漸短水溢皮膚

生腫滿此則喘為標

治當清金降氣為主

脾土惡濕外主肌肉土能剋水若脾土受濕不能剋水則

水濕充斥浸漬肌肉水既上溢則邪反浸肺氣不得降生

喘此則腫為標

治當實脾行水為主

苟肺証而用燥脾則金得燥而喘愈如

近世治喘脹者但知實脾行水而不知肺脾美

法虛氣息

陰虛致喘者從肺下起直衝清道而高

氣虛致喘短氣不能以持續者

故知喘証有虛

治法天劑

上氣躁而喘者為肺脹欲飲水發行則愈

氣虛致喘者為肺虛欲飲水發行則愈

痰逆者降痰下氣為主

陰虛致喘補陰降火四物加洋參

林水腫門寸口腫地喘者中  
有水氣面目腫大有熱或身  
伴及重而酸或身重身寒  
腫脈浮不渴續自行無天  
熱者皆為風水

陰虛氣喘四物加橘甘白芍 同服日干

陰虛自小腹下火起而上喘者降心火補陰

氣虛短氣大急甚者不用苦寒大盛故也宜溫劫

人劫藥

胡椒自五七末研極細末生薑湯下喘止後因天治火

一法蘿蔔子蒸熟身角燒灰等分細末薑汁蜜丸

如梧子五六十丸噙化他

一治哮喘奇方 他

治哮喘用葶根和砂糖爛煮時時嚼嚥水送痛根

神效

一喘惡候 選

汗出髮潤喘不休者肺絕 身汗如油而喘者余絕

直視謔語喘滿者危

及諸病年氣欲絕之時邪氣盛行聲連而為喘

然則喘之危惡又可忽之耶

### 水腫門

一水病所目

腎者胃之關也關不利故聚水而流其類亦溢

皮膚腫故為水腫

人身以解為至脾土旺則善食而養肌肉

或飲食所傷使濕熱積中焦故腫滿之患作矣

一腫子滿之并 他

通身面目手足皆浮而腫曰水腫

脈大如鼓而面目四肢不腫曰脹滿

其在水腫之文也  
其目上果上微腫如新  
起人快其類脈動云

一水始之候

其

諸有水氣者微腫先見於目下也  
目眶下微起肢伴重者咳嗽怔忡腹間清冷黃皮  
尿法是也

一水腫之始終

其

水始起自臬上微腫如卧蚕之起狀脈動時發陰股  
間寒足腫腫脈大乃水已成也按脈隨平而起也

一脈

其

水病脈微細不活

水病脈閑其脈浮大軟生  
沈細虛死

水病脈大如鼓脈實生  
虛死

一濕腫之并

其

竿按之成凹不即起者濕也

一風水之証

其

一身腫脈浮不滑續自行無大熱風水也

一腎肺之末

水病其末在腎  
其末在肺皆積水也

故中病下為附腫大便  
上為喘呼

不得臥者標本俱病故腎為中腫  
肺為喘呼

一陰陽二水之脈証

陽病水者氣陽証其脈必沈數

陰病中者氣陰証其脈必浮遲

一身腫煩渴身赤法大便閉  
煩渴大便通小便少不渴赤腫水

一四肢之前後

凡中腫先起四肢而後散四肢者可活

或四肢先起而後歸於腹者不可活

一五臟水証

其

心水身重少氣不得臥煩躁陰大腫  
肝水腫大難妨側臥腹痛最續通  
肺水身腫不能時時喘急  
脾水腹大四肢重少氣不居  
腎水腹大睛腫腰痛不得臥陰下濕足冷面瘦

平治權衡

林

夫法精擅者於內則三焦閉水道溢

凡此類濕動肺中急而咳

如此者小氣格拒於胸膈之內故窮標本其可得乎

平治權衡謂氣胸浮沈

脈在表行在裏故經曰開鬼門也

腰上腰下并治

再

腰上腫下并治之愈平溥曰漸令消矣

妄通之戒

藥腫有厚實

今人治腫者每行利藥腫消氣下之云得乎九珠不知脾胃愈深愈厚

古人之氣虛中滿利之至腫氣暫下隨消隨起

病人心躁易驚醫者誤求速効仍行利藥而腫不

消矣所以胸實背平唇黑並有角鵠不能瘦也

諸家只執治濕利在一途用諸去水藥性多死

蓋脾極虛而敗愈下愈虛亦不旋踵而

猛烈之劑反致人損

通利之是也

辛甘寒法濕熱之解

以辛散結隨其利而氣和

寒除濕熱

結散而氣和

一水腫者非脾虛而脾土濕定也  
俗說水腫由脾虛則腎水水氣妄行脾土散故中  
走散似是非也

經曰 中滿者後下 經內  
諸腫滿屬脾土 守得大陰脾土濕氣定其  
大陰脾土主附腫下 然何以為脾虛乎  
濕是則水附附腫

又曰 諸腫脹大屬熱  
附腫疼酸屬火 皆謂心火實熱  
熱勝則附腫

故諸水腫者 濕相兼也

一丹溪補脾之說  
水腫目脾虛當以矣未補脾之氣定則健運升降  
動其樞機則水自行宜補中行是利尿不可下  
用二陳加三木人為主 芥門黃末為佐  
服脹少飲厚利

氣 不運加木香木通  
臨下加升柴提氣

一手足大陰濕病之說  
水氣如非氣前飲食濕熱諸証亦下  
如積飲留飲滯脾若土之濕兩為泥

或同七情所致  
手足大陰濕病身面浮腫似水氣者用燥脾道才氣

二劑即愈  
則若泥去得風日濕去而物其  
則脾氣開世後導通利不傷於脾

此正內經  
諸濕腫滿皆屬脾土之謂也  
諸系積前皆屬於脾

故亦不待開鬼門潔淨府而已

一治水大抵  
身無熱水在 表可行  
裏可下

其間通尿 須臾 俱不可緩耳

水腫用青蒿濃煎汁成膏丸去暑利水  
 有熱清肺心冬黃芥 一方種末湯下  
 水腫用菜小俾清利 腫脹消而後服中治調養良藥

一十種水根治劑并異

先從九足助腫根在肝 大戟  
 從舌根云從胸根腫根在心葶藶  
 從腰腹根在脾 甘遂炒  
 肺腫根在肺 桑白  
 從外腎腫根在腎連翹  
 面腫根在外腎芫花 醋炒  
 從四肢腫根在胃 芫花  
 從骨腫根在膀胱 葶藶  
 從小脈腫根在少陽 巴豆  
 或鹽或裏根在腹 赤小豆  
 右十味所主之藥一兩餘菜皆二

一八絕

瘰癧 缺盆平 臍凸 足平 背平  
 掌平 由硬 大便滑泄  
 並皆治

一諸忌



一腫脹之并

脹滿門  
 傷

此下之條前改水腫門

脹內 仍作田脹

通身面自手足皆浮而腫  
皆脾土濕熱為病  
右曰水腫  
左曰脾腫

一 腫脹之目

身解為主  
脾旺則善食而養肌肉  
胃中強而動作不裏憊  
或飲食所傷  
使濕熱積於中焦故腫滿之患作矣

一 脈并

大生滿者脹也  
胃上脈息即脹內  
浮者易治  
虛者難治

一 傳脈脹便血

脈大時絕者  
劇脈小疾者

一 日夜寬急氣血并治

朝寬朝急血虛  
朝急朝寬氣虛  
朝寬皆急氣血俱虛

一 泰否之論

紅曰飲食會滯溢精氣上輸脾氣散精上歸肺通

調水道下輸膀胱水精四布五經並行

是脾有神健運

故能使脾土之運轉輸官失職胃雖受養

人令也

脾土之法受陽轉輸官失職胃雖受養

不能運化

故陽自降而成天地之交

清濁相混遂道壅塞濕熱為熱又生濕濕熱

相生遂成脹滿

一 虛實之并治

腹滿按之不痛為實過之升以神為要  
痛者為實下之消而後補之

一 補脾養肺滋腎之論

遂在條前切徑路

宜補脾

治脹 須養脾以制木使脾無賊邪之患  
宜滋胃以制火使脾得清化之令

一 速得効之戒

林

醫者不察而急求功效  
病者苦脹而妄欲快利  
故行利藥求速快竟  
得一日半日其腫益甚  
且此病起根深蒂固欲取速効自求禍耳  
道者可乎語也

一 脹者大抵屬於內傷

再

凡傷酒濕麪味厚物膏粱之入食已便外濕熱之氣  
不能施化而致腹脹是亦起脹也

一 脹証有寒有熱

再

經曰積脹脹大皆屬熱

吳樞曰內虛不足中寒濕冷入中滿  
宜從權以寒熱藥治之  
大抵寒脹多詳者  
熱脹少詳者

一 肥瘦之辨

林

肥而脹必氣虛用炙甘草

林加福朴

瘦人脹是熱用芩連樞朴

林加石膏附白芍

一 蓄血脹之治劑

林

如固有故蓄血而脹用赤紅花

一 怒氣衝脹

林

如目多怒衝氣而脹蒼朮芍藥青皮香附

一 治脹初起

凡腹脹初起氣脹未積敲樞朴青陳之類  
久則病出脹宜行便利水之劑

一 食積脹滿寒熱二劑

林

心用木香桂枝丸  
木香青陳蘇連枳  
枳大砂

行義補遺曰厚朴  
治脹因其味辛以  
提其氣

一 胃食積脹者（熱不香枳） 寒木香丁子香滑結朴

一 胃朴則宜薑制表

厚朴治脹因味辛以氣聚於下焦故也須薑制表

一 大抵治脹之藥制

治脹大法 神中宜主

參本為君 枳苓為臣 本門為使以制肝木

加朴以消脹 脹少 氣不運加通不

血虛加神血藥 痰盛加利痰藥

一 脹宜辛熱亦有輕重

大寒滿燥定痞閉氣滯 或始因內傷 脈洪實宜下

脹下利也 或厚朴後 所致者皆宜補脾行濕

或素脾胃虛 血苦白血瘕致氣從血藥治之



皆宜通宜為

一 禁更宜制 林

却厚味 則無有不奇

遠音樂 夫木大制佐以橘苓類

一 痰完 林

肝俞隨年壯  
 脾俞百壯  
 中百壯  
 三三壯  
 三三壯

積聚門

積聚之陰陽

林 積聚 其右雖異而病則同也

積聚 陰陽 故陰陽而伏 積五脈也  
 積聚 故陽而動 積六脈也  
 積聚 故始有根 痛有部 以是別積聚  
 積聚 有定 停蓄 總右

五積之辨証

素音八  
 洒利 病下反下音利  
 寒聲兒

肝積肥系在左脇下久不愈發咳逆痰癰連歲  
 心積伏果起膈上至心下久不愈煩心  
 脾積痞系在胃脘右側久不愈四肢不收黃疸而脾  
 肺積息在右脇下久不愈而漸寒熱喘咳  
 胃積牽脈在少腹上至心下久不愈時吞酸噯氣

三塊之辨証

丹溪曰塊乃有形之物系不能成形痞塊者食積  
 此說深得病情之肯綮

在 右為食積  
 中為痰飲  
 左為疝血  
 大抵 固以軟  
 行氣 固以削  
 開痰 為主

系傾胸下寸而旁各寸


一 積聚之脈 五

脈來細而附骨者積也

在寸口積在背脊中  
在關上積在膈脘  
做下關積在小腹  
脈出在右積在左  
脈出在左積在右  
右脈兩出積在中矣  
做出寸口積在喉中  
上關上積在心下  
天中積在氣衝

一 曰毒毒大小去積有限 五

治積道守化腐起之毒莫欲除之



大積大聚衰大半而止滿矣中有積毒毒利奇過之  
况虛中亦有積者乎

一 初後消下可否 五

若傷飲食致者元氣未病之積  
然治之不早元氣日減正氣日偷不可下削

一 癥瘕之辨 五

癥者腹中堅硬按之應手如石

瘕者中雖硬急散之無常未及癥

一 婦人腹中有塊之屬死血 四

或重腹外之塊

痞塊在皮裡膜外須用補藥善附用氣上陳加  
補氣先須割厚味

一 治積之摠辭 五

益元氣  
破積氣  
削其堅  
宜隨証加減用之

偷他候切薄也盜也

鎔銷也鑄也

一治積之大極

傳

察其痛所以知其應有餘不足

可神則補無逆天時



全其真氣補益之

節飲食和其中

徒笑毒之刺攻積不能除慎之

宜清導使之鎔化其死血痰塊去後復大補

有血塊之婦難服峻劑

香附醋煮 薤仁去衣 白朮 海粉 醋煮 二兩

石末神麴糊丸

一治諸積之異劑

木香 檳榔

神麴 麦芽

蜜 水 蛭

礞石 巴豆

犀牛角 日逐

雄黃 膩粉

硃砂 水 銀

或

以

群藥

分其勢

則難取效

反有所損

積

積

積

積

積

積

積

積

積

積

積

積

積

積

一病加於愈之說

一倒倉之用捨

一瓦龍殼能消血塊

一瓦龍殼能治積

一若以群藥分其勢則難取效反有所損

一或

以

群藥

分其勢

則難取效

反有所損

積

積

積

積

積

積

積

積

積

積

積

積

積

積

積

積

積

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

傷寒百證歌仲景之病有  
霍亂者何也言曰吐而利  
此名霍亂

然有除病未久元氣未復而色雖起七情病遂復  
起者不得其天年矣

一不可信方名功德

御藥院方名助氣丸下

後蘇青陳樸不敵不 右細末為丸服之  
按此方離氣之藥也半而另助氣恐未必然也

霍亂門

一霍亂之因

林

由溫涼不調陰陽混淆二氣相干  
寒氣若于則吐  
亦由酒肉生冷已交  
或外濕當取涼  
歸三焦傳脾胃水穀不消遂成霍

亂下

多因寒食

陰陽未備吐利而躁擾痛劇卒揮霍

霍亂之因  
而成皆屬飲食不節鬼神

一吐得先治之并

先心痛則先吐

先腹痛則先瀉  
甚則轉筋手足攣

心腹便痛則吐瀉俱作

一初病即時禁

如菓子米湯等之即死

一乾濕二証之易難

濕霍亂有吐瀉死者少

乾霍亂不得吐瀉死者多

蓋所傷之物同吐瀉而世出則止  
若不得吐利所傷之物難消正氣  
闕滿陰陽躁擾喘脹其能生

一脈傳



霍乱之脉或

微而伏 代而散 大而虚

結 代 皆奇刺治之

脉 大者生 微弱漸遲者死

選日加以藥少不語皆危者難治

脉 洪者為厥 洪者為熱

探 兼口脉弦滑膈食留飲須其性塩湯探吐之

轉筋之証治

轉筋屬血熱

胃氣上逆其陰 女年事氣逆而也

四物加酒芍紅花蒼朮南星

陰陽互度風寒乘之筋夫氣血所榮而為牽急

結痛甚則 相傳 為難治危於風燥

心腹卒痛吐利憎寒壯熱頭痛眩暈甚則轉筋

入腹即死 霍乱惡化血越於期

乾霍乱之証治

五

此指腸胃素存形氣  
定有感四夫則吐利不行  
而乾揮霍撩乱也

忽然心腹脹滿絞刺疼痛欲吐 不利 若神志所

附須刻刻絕或 腸虛 腸胃素厚 故吐利不行


音 用極鹹塩湯令吐滿食便止 吐更脹之吐可止此

法勝諸法 俗以為淺近而不用朱死而已吐在

理中藥

大抵 熱勝發前則開利 形氣虛者不旋踵

如 飲食自倍 而乾霍乱者 宜吐



心 死在須臾 升降不通 紐提其氣是良法 多用塩湯

吐後用温散不用涼藥 三陣加芍木風甚

一 治霍乱之大抵

五

脉浮（自汗、四肢、如桂）主心

理中湯（加陳皮、法霍亂吐利、心腹疼痛）

肺上藥動者皆多動也去朱加桂

吐多者去朱加生薑半夏

利多者倍朱

心悸如坐

腹痛加薑

服滿去朱加附子厚朴

吐利轉筋腹下痛脈弦平胃散加干姜

吐利四肢拘急脈沈遲此少陰也四君加生附朴

吐利後轉筋理中加大椒石黃

吐字用蒼朮朴陳綿芷甘草冬人炒麩煎服

微寒共（加薑）

甚寒（加薑）

頻全備（不通、正氣散、加枳殼）

治霍亂（帶佳、正氣、加生薑、為上）

為傷胃致（不可、邊、用、沈、冷、帶、連、類）

先治中脘（如、福、半、生、薑、用、散、作、結）

一 治法

或用香薷五苓之類溫服（散暑）

或扶寒氣厥冷腹痛理中之類溫之

一 渴子不渴之別有

寒多而不渴者宜生薑理中湯

熱多而渴者用五苓散（值、昇、五、味、門、冬）

一 灸法

天柱穴在膈心兩傍各開二寸

氣海一穴在膈下一寸半

中脘一穴在膈上四寸

已死而背尚暖者以鹽填滿膈心灸之不可壯救

轉筋十指者急灸不得屈伸灸之外踝骨上七壯

嘔吐門

一 嘔吐之因証

胃虛之人不能攝養或

為寒氣所中  
為暑氣所干  
皆能嘔吐

入脈血停胃則吐雜涎血

懷妊吐味名曰惡阻

治法各以脈証并之

一 嘔吐之諸証

傷寒陽明實熱甚吐

內傷飲食胃氣不運吐

胃熱而吐

久病虛弱胃氣衰則吐

脾濕甚不運精微痰滯上中時要吐

不可執一見以類推而治之

有

為

一 吐証三焦并治

吐因有三氣積聚也即從三焦論之

上焦在胃口主納而不出故上焦吐皆從胃脈浮而共食

已即吐滑飲飲大便燥結亦上衝胃發痛其治降

氣和之

中焦在中脘主腐熟水穀故中焦吐皆從積有陰食

不氣相假為積而痛脈浮而長其治以毒藥去積

積木行氣

下焦在臍下主出而不納故下焦吐皆從寒脈沉而遲

其証且食大吐大食且吐尿清大便秘其治以毒藥

通秘室溫寒氣大便漸通以中焦某和之

平水曰食不得入是有火也食入而出是無火也子此同意

一 三陽嘔吐喘之并

併

夫吐噦者，胃中宿食，胃不和也。

吐者，胃中宿食，胃不和也。吐者，胃中宿食，胃不和也。吐者，胃中宿食，胃不和也。

一 貴并惡毒之說

大抵治

由氣致者，治氣。由血致者，治血。

豈可類用香熱之劑，反耗陰血乎。

俗不究病情，拘泥用香燥，遂成危証也。悲夫。

一 嘔吐治法之大概

嘔吐者，不可下，逆之故也。

久病吐者，胃氣虛，不可穀，生薑、茯苓、木香附。

胃熱膈痰，二陳加炒枳、炒連、生薑。

吐而吐黑，鐵炒灰、枳、糯米、飲下。

胃寒，用丁香、香薷、桂枝類。眼痛、脾痛、右關脈弦，吐不止，二陳加柴、青、黃芩、芍藥。惡心吐清水者，有少熱，皆用生薑、茯苓、隨証。

杯

時常惡心吐清水，心胃痛，得食暫止，飢則甚，胃中有蠅，二陳加棟根、史君煎服。


嘔吐者，出胃氣，不和。

寒吐，喜熱惡寒，四肢清冷，溫之。

熱吐，喜寒惡熱，煩躁，中乾，涼之。

痰吐，睡床，怔忡，先喝後吐，清痰逐水。

宿食吐，胸腹脹滿，若酸消食去積。



察証辨治啓迪集卷之二

2281

