




卷
 婦人
 崩漏
 胎前
 產後
 經行違
 帶下
 未嗣
 整容



察證辨治啓迪集卷之七目錄

道三編



○婦人門

一婦情鬱結

○月經和違篇

一月信本源 一經候先後之說 一經候閉而不行因治

經閉不通心血虧耗崩漏不止心火元甚 一經變諸証悉隨氣化 一紫黑色為熱之說

一經候脉法 一調經方法

○帶下篇

一赤白帶下氣血并治 一帶下五色 一提氣之說

一肥瘦并治 一帶下脉并 一一例難治之說

一 帶下禁事 一 帶下方法

○ 崩漏篇

一 經漏不止因治 一 崩漏因証 一 崩血脈法
一 崩漏治法

○ 婦人雜証篇

一 師尼寡婦 一 血痕証治 一 筋痿因治
一 婦人腰痛 一 婦人風輕專察 一 角弓反張
一 血分弁治 一 夢與鬼交 一 熱入血室
一 白淫濁液 一 陰腫因治 一 陰痒因治
一 陰瘡治方

○ 求嗣篇

一 戒服熱求子之誤 一 求嗣肥瘦弁劑 一 求嗣交合例法

○ 胎前篇

一 有胎諸察 一 諸經養育 一 胎產三禁
一 妊婦攝養 一 妊婦雜病因治 九例 胎動
胎漏 胎痛 心腹痛
浮腫 子淋 子懸
腰痛 欬嗽 不語
胎兒哭 傷寒 一 惡阻証治
一 墮胎因治 一 妊胎不長養 一 斷產

一胎死因治 一妊娠禁忌 一臨產須知

一催生藥弁 一產難源論 一易產方法

一礙產証治 一盤腸產証治 一產難胎死方法

一難產惡証 一新產診切 一胞衣未下論法

○產後篇

一母子呼吸同異 一新產三証 一產後血暈証治

一惡露不盡腹痛証治 一兒枕心腹刺痛証治 一餘血奔心煩悶証治

一產後內煩治方 一乍寒乍熱附瘧 一產後蓐勞証治

一虛羸証治 一四肢浮腫証治 一產後乳汁弁治

一乳癰論治 一中風暴瘳角弓反張 一欬嗽治方

一喘急弁治 一口鼻黑色及衄血証因 一吃逆証治

一產後雜証治方 補虛 寒熱口眼喎斜

惡血腹痛 血虛內熱自汗頭痛 虛汗不止

陰虛發熱朝明暮發 腰痛 惡露不止

惡露不下嘔吐 腸脹氣痛 積癥

血虛煩渴不止 腹滿嘔吐 痢疾脚下痛

小便不通 尿數遺尿 小便不禁

陰脫腫痛 子腸不收

○整容篇

一熱毒面瘡 一粉刺 一面上黑風瘡

- 一 染髮
- 一 梳髮令不落
- 一 面藥
- 一 太真紅玉膏
- 一 孫仙少女膏

卷之七目錄畢

察證辨治啓迪集卷之七

日本洛下雖知苦齋

道三編



○婦人門

○婦情鬱結

婦夫婦人嗜慾多於丈夫况又思悲愛憎嫉妬憂恚
 抑鬱不能自釋深固所以比之男子十倍難療由
 是婦人別立方能推其所自而調之可謂盡善盡
 美矣

傳

大抵

男子屬陽得氣易散
 女人屬陰遇氣多鬱

故男子之氣病常少
 故女子之氣病常多

○月經和違篇

○月信本源

林岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脉通太衝脉盛月事以時下天謂天真之氣降也也腎氣全盛二脉流通經血漸盈應時而下謂之月事者平和之氣常以三旬一見以像月盈則虧也

○惠女人經候謂之月信善於調理則應時而行疾病不生一有所乖則怫抑而逆諸病生焉
○經候先後之說

選

血性

得熱則宜流得寒則凝澁

陰氣

乘於

陽內寒血澁故其來乍少陰血熱流散故其來乍多

心

婦人經水

過期血少不及期血熱也

○經閉不行諸曰並治法

選經脉不行其候有三

一則血氣盛實經絡過閉其脉滑實法當通經疎利也

一則形體憔悴經絡涸竭其脉虛弱法當滋養血氣也

一則風冷外傷七情內賊以致經絡痺滯其脉浮瀦法

當散風冷逐瘀血生新血也

玉經曰二陽之病發心脾不得隱曲女子不月其傳為風消為息責者死

東垣曰婦人脾胃久虛或羸氣血俱衰而致經水斷絕不行

或病中消胃熱善食漸瘦津液不生夫經者血脉津液所化津液既絕為熱所燦肌肉消瘦時見渴燥血海枯竭病名曰血枯經絕宜瀉胃之燥熱補益氣血經自行矣

或心胞脉洪數大便秘澁小便雖清不利而經水

閉絕不行此乃血海乾枯宜調潤血脉除胞中火而經自行矣

行矣

或曰勞心心火上行月事不來宜安心神血經自行矣

行矣

著

經閉不行脾胃之損經血之凝

婦人經脉不行多有脾胃損傷而致者不可便認作經閉血死輕用通經破血之藥

若曰飲食勞倦損傷脾胃少食惡食泄瀉疼痛或因誤服汗下攻剋藥傷其中氣以致血少而不行者只宜補養脾胃脾旺則能生血而經自行

矣○又有飲食積滯致損脾胃者亦宜消積補

脾

若脾胃無病果有血塊凝結方宜行血通經

○經閉不通心血虧耗崩漏不止心火亢甚

傳

若夫經閉不通先因心事不足心血虧耗故乏血以歸肝經曰母能令子虛是以脾不磨而食亦少因食少故肺亦失養而氣滯不行則無以滋腎陰况月經全藉腎水施化腎水既乏則經血日以乾涸以致或前或後淋瀝無時○若不早治漸閉塞不通甚則為癥瘕血膈勞極之証不易治也

又如崩漏不止先因心火亢甚於是血脉泛溢以致肝實而不納血經曰子能令母實是以肝腎之相火挾心火之勢亦從而相扇所以月水錯經妄行無時而泛溢也○若不早治漸崩中不止甚則為白濁白淫血枯發熱勞極之証不可治矣

經曰正氣奪則虛邪氣盛則實所謂心血虧耗者正氣奪也心火亢甚者邪氣盛也邪氣者相火也

丹溪曰天非此火不能生物人非此火不能有生但貴乎適中


故或問曰可少而不可壯云云

大抵經閉不行經漏不止其初皆由心事不足早不調治直至危篤求醫雖妙手莫能為矣

○經變諸証悉隨氣化


經水者陰血也陰必從陽故其色紅稟火色也

血為氣之配氣




上應於月其行有常故名之曰經

血因氣而行



也

今人但見



者率為風冷乘之行溫熱之

劑禍不旋踵矣

○以紫黑色為熱之說

因

或曰

黑者北方水之色
紫者黑之漸

也非冷而何

丹溪曰經云亢則害兼乃制熱甚者必兼水化所以熱則紫甚則黑也。况婦人性執而鄙嗜欲加倍藏府厥陽之火無日不起非熱而何。且寒則凝既行而紫黑故非寒也

○經候脉法

尺脉滑血氣實婦人經脉不利○少陰脉弱而微
微則少血○寸脉浮而弱浮則為虛○肝脉沉
主月水不利腰腹痛

傳少陰脉微而遲微則無精此為虛經遲則陰中寒月

一來○跌陽脉微而瀼微則胃氣虛胃氣瀼

則失液○凡脉微血氣俱虛年少者亡血也三月

一來○跌陽脉伏水穀不化脾氣衰則驚瀼

○調經方法

心經水過期血少也芎歸參朮及痰藥○經水不及
期血熱也四物黃連○過期紫黑有塊亦血熱也

必作痛四物加香附黃連○色淡過期痰多二陳
加芎歸○過期而來血虛四物加芪橘升○未及
期先來氣血俱熱柴芩歸芍生地香附○過期而
作痛乃虛中有熱○將來作疼者血實也桃仁香
附黃連○臨行時腰疼腹痛乃鬱滯有瘀血四物
加桃紅莪玄胡香附發熱加芩柴○肥人飲食過
度經水不調乃是濕痰宜半朮芩滑香附芎歸
四物湯治衝任虛損月水不調臍腹疼痛

當歸 川芎 芍藥 熟地黄 各等
右剉散水煎服加減法干後

經候過多去熟地加生地芩朮。○經行身熱脉數頭昏加柴胡。○氣充經脉故月事頻併臍下痛倍芍藥。○經水澁少加葵花紅花。○經水適來適斷往來寒熱先小柴胡後四物湯。○經候過而作痛血氣俱虛對加四君子湯服之。

選若婦人常服

春脉弦頭痛倍等
夏脉洪飧泄倍等
秋脉濇血虛倍地
冬脉沉寒而不食倍婦

傳虛中有熱月事不來四物加芩

肥人軀脂滿經閉者導痰湯如芎歸連不可服地黃泥痰故也如用薑炒

夫經不通或回

墮胎及多產傷血
久患潮熱銷血
久盜汗出耗血
脾胃不和飲食少進而生血
久痢失血
治宜生血補血除熱調胃之劑隨証用之
七情傷心氣停結故血閉不行宜調心氣通心經使血生而經自行矣

調經散治經水或

前
後
多
少

或

踰月不至
一月兩來

皆可服

當歸一各

麥門冬二各

吳茱萸去閉目者沸湯泡七次焙乾

川芎一各

人參一各

半夏湯泡七次一各

白芍藥一各

甘草各七分半

牡丹皮一各

桂枝半各

阿膠炒珠

右咬咀入生薑水煎空心溫服

和經湯治月經過期不行

當歸 一斤 熟地黄 一斤 芍藥 一斤 桃仁 二十斤
去皮研

紅花 三分 香附子 一斤 桂 半斤 一斤 莪茂 一斤

甘草 五分 蘓木 一斤 木通 八分

右剉散水煎空心溫服

安經湯治月經先期而來

當歸 一斤 川芎 半斤 生地黄 一斤 芍藥 八分

阿膠 半斤 炒珠 艾葉 半斤 條芩 一斤 甘草 半斤

香附子 一斤 黃栢 半斤 知母 半斤 黃連 八分
姜炒

右剉散水煎空心服之

獨聖丸治月經不通

馬鞭草燒存性為丸紅花常歸煎湯送下

四物湯加荊芥條芩止血神效

婦人血病宜用常歸若肥白人與參芪同用瘦人與生地香附同用

經候不調以四物為主治

如經候過而腹痛綿綿無休血虛本方倍歸地兼

氣虛加參芪挾寒加干薑

如經候將來腹中陣疼乍作乍止血氣實也本方

用生地黄加桃紅牡連香附玄胡

如經水常過期而來者

瘦人血少本方倍歸地加菖甘少佐以桃紅為生血引用也

肥人氣虛挾痰阻升降本方去地加參芪甘苓半橘香附

如過期血淡者痰多血少本方用生地合二陳

如經候適來適斷往來寒熱如瘧本方合小柴胡

或先服小柴後服四物

或肥盛三二月一名行者痰盛而閉經脉導痰湯加

二朮歸芍香附

經水過多本方加芩朮

經水澁少本方加葵花紅花

○帶下篇

○赤白帶下氣血辨治

傳帶下是濕熱白屬氣赤屬血

二陳加蒼朮治濕為主

氣虛入參朮
血虛入芩歸

葵花

白者治白帶
赤者治赤帶

用之早驗

○熱入小腸為赤帶大腸為白帶

其本實熱寬結于脉不散故為赤白帶也熱去濕除病自愈也

○帶下五色

林風邪中經脈流轉藏府

而發下血名為帶下

若傷

足厥陰肝經其色青如泥
手少陰心經其色赤如紅津
手太陰肺經其色白如涕
足太陰脾經其色黃如爛瓜
足少陰腎經其色黑如衄血

○提氣燥濕之說

傳帶下是胃中痰積流下滲入膀胱當升之無人知

乏二陳加二木升柴

甚者上用吐法提其氣仍用瓦壟子以燥濕痰

○肥瘦辨治 傳 心

肥人帶下多是濕痰用海石南星黃栢朮芳香附
樗皮冬加干薑

瘦人少有此病有者是熱以黃栢滑石樗皮海石

芩黛丸服

○帶下脉辨

玉 漏血下赤白脉

遲者小虛滑者生

急疾者大緊實數者死

尺脉急而弦大風邪入少陰之經女子漏白下赤

○丁例難治之說

集

前人或

下之而復吐以提其氣
發中兼補
燥中兼升發
補中兼利
潤中益氣
温而兼收澁

之例不同

蓋病有輕重淺深之異耳

○帶下禁事 傳

帶下必須斷厚味凡用藥寒月少加薑附臨機應變

○帶下方法

傳東垣除濕湯治漏下惡血月事不調或暴崩不止多下中水漿之物皆因飲食不節勞倦所傷或素心氣不足心火乘脾必怠惰嗜卧困倦氣短脾主滋榮周身者也脾胃虛而心胞乘之故漏下月水不調也况脾胃為血氣陰陽之根蒂也當除濕去熱

抑風清氣上伸以勝其濕又云火鬱則發之

當歸 酒洗 獨活 各半 蔓荊 七分 防風 炙甘草

升麻 藁本 各一 柴胡 羌活 黃耆

蒼朮 各一

右剉作一服水煎空心溫服少時以早飯壓之可一服而已止後服參芪甘歸之類以補之若遇夏月白帶脫漏不止此湯一服立止

補經固真湯治白帶下流不止其心胞尺脈微細蓋始血崩久則血少復亡其陽故白滑物下流不止所謂日久為白帶也乃血海枯竭津液復

亡不能滋養筋骨

本部行經藥為引用
大辛甘油膩之藥潤其枯而流津液
大辛熱之藥補其陽道生其血脉
苦寒之藥泄其肺火而救上熱
人參調補傷氣
微苦溫之藥為佐而益元氣

白葵花 研爛 四分 陳皮 留白 五分 生黃芩 郁李仁 去皮 大研

炙甘草 柴胡 各一 干薑 人參 各一

右剉水煎空心熱服少時以早飯壓之

血虛者加減四物湯

氣虛者參木陳皮間與之
濕勝者固腸丸
相火動者諸藥中少加黃柏
滑者加龍骨赤石脂

滯者加葵花
性躁者加黃連

傳一人 上有頭風鼻流
下有濕爵白帶

酒苓川芎辛夷
炒黃栢滑石牡蛎

南星蒼朮半夏
右為丸服之

崩漏篇

經漏不止之諸因并治法

經曰陰虛陽搏謂之崩

東垣曰婦人脾胃虛損命門脈或
然皆由脾胃有虧下陷於腎與相火相合濕熱下
迫經漏不止其色紫黑加夏月腐肉之臭中
有赤帶者脉必
弦細寒作於中
洪數濕熱明矣

必腰痛或臍下痛臨經欲行先見寒熱往來兩脇急縮兼脾胃証出見四肢困熱心煩不得眠卧心下急宜大補脾胃而升舉血氣可一服而愈

或故貴今脫勢人事疎先富後貧心氣不足其火大熾旺於血脉之中

又致脾胃飲食失節火乘於其中形質肌肉容顏

似不病者此心病者

或經水不時而下治法當先說惡死之言勸

暴下不止喻令拒死而心不動

以大補氣血之藥養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣

○崩漏回証

心崩中者由臟腑傷損衝任二脉血氣俱虛二脉為經脉之海血氣之行外循經絡內榮臟腑若氣血調經行依時若勞動過極臟腑俱傷衝任之氣虛不能約制其經血故忽然而下謂之崩中崩下治宜大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮心藥治心揚陰抑陽崩漏自止也

○崩漏帶下 丹溪曰有虛有熱熱則流通虛則下溜

○崩血脉法

三 漏下赤白日下血數斗脉急疾者死遲者生尺寸脉虛者漏血々々脉浮不可治也

林熱傷衝任血流散者至於昏悶其脉數疾小為順大甚者逆

崩漏治法

傳治血崩不止蒼耳草燒存性好酒調服立止或四物湯調下亦效

老婦年五十三血崩久不止諸藥不効予以椽斗

蒼耳根二物燒存性四物加白芷于薑茅花煎湯調服其經血自此而止再不行矣

心急則治其標用白芷湯調百草霜末

纂甚者用棕毛灰後用四物加干姜調理

惠緩則四物加芩連參芪香附子干姜又云四物加

荊芥止血妙或加髮灰

心曰勞者用參耆帶補陰

曰寒者用干姜熱者用黃芩

崩過多者先用五灵脂末一服當分寒熱

蓋五灵脂能行能止

紫色成塊熱四物加黃連

氣血虛四物加參芪

崩中白帶用椒目末又用白芷末粥丸服

婦人血崩每淋瀝 椒目蓮房燒研之

藕節亦堪乾作末 二方連服効無疑

林歌曰

玉涼血地黄湯治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守
包絡相火故血定而崩也

生地黄 黃連 羌活 柴胡 薈本

細辛 川芎各二分 甘草 荊芥 蔓荊子

黃芩各一分 當歸半 紅花少許

右以咀水煎按汁劑也經漏不止氣血下陷非
此不能治

傳益母丸治婦人惡露時下不止赤白帶下亦可用
益母草五月採陰乾磨為細末忌鉄煉蜜為丸童
便加酒化下或只以末每服二錢或酒或童便調

下凡婦人之仙藥也

柴胡調經湯治經水不止其色鮮紅項筋急腦痛

脊骨強痛

炙甘草 當歸身 葛根各三分 獨活 薈本

升麻各半 柴胡七分 羌活 蒼朮各一分 紅花少許

右細切水二盞煎一盞空心溫服取微汗立止

○婦人雜証篇

○師居寡婦 玉

師居寡婦獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽
交爭乍寒乍熱全類溫瘧久則為勞史記曰韓女

病腰痛寒熱衆醫多以為寒熱倉公曰病得之欲
 丈夫不可得何以知其肝脉弦出寸口是以知之
 蓋 男子以精為主男子精盛以思室
 女子以血為主女人血盛以懷胎
 今厥陰脉弦出寸口又上魚際則陰盛可知

○血癥証治

惠婦

婦人血癥為病多因
 產蓐失於保養
 經候失於調適
 七情內傷
 六欲外縱
 遂致氣凝血滯而成癥
 經曰小腸熱已滿移熱于大腸則為伏癥結硬如

塊小腹重疼支滿胃腸腰背相引四肢疼痛飲食
 不進月事或前或後恍惚多夢陰中生氣腫小便
 淋痛面色黃黑則不得妊宜用通經和血之劑
 桃仁煎治血癥血積經候不通

桃仁去皮 大黃 朴硝各一兩 蜚虫五條去翅足炒

右為末先用米醋二升半熬一升半下大黃等
 攪稍冷下朴硝攪候凝丸如梧子大五更初温
 酒下五六丸下如赤豆汁或如雞肝赤下再服
 鮮紅來則止服調血氣藥補養之

傳增味四物湯治婦人血積血癥

當歸 川芎 白芍藥 熟地黄 三稜

干漆 炒烟尽 別研 肉桂 廣茂 各等分

右細切每服五升水煎去粗空心温服

○筋痿因治

全婦人思想無窮所願不得意淫於外不能入房甚發為筋痿為白淫男溺澀而下女陰中綿綿而下粗立為白帶多用辛熱病微者誤中有之蓋辛熱能開鬱結散氣流濕故取効或病甚者鬱結不能開通旧病轉加熱証新起以致死

開結 除濕

凡主辛劑佐苦寒 

或思慕為筋痿

○婦人腰痛

婦腎主腰婦人腎繫胞若腎虛 外感六氣 內傷七情 皆致腰痛

風腰痛小續命湯加桃仁杜仲

脾胃氣蔽及寒濕腰痛五積散加桃仁

氣滯腰痛牽牛茴香橘核必有功

如神湯治男女腰痛真是如神故名之

延胡索 當歸 桂心

右等分為細末酒下一方 無當歸 有杜仲

一方治腰脚疼痛

草薢

牛膝

當歸

桂心

栝榔

芍藥

川芎

枳殼

右各等分細剉水煎食前熱服

○婦人中風輕重辨察

婦

風是四時八方之氣常以冬至之日自坎而起候其八方之風從其鄉來者長養万物若不從其鄉來者名為虛邪賊害万物其體虛則風入藏府俞俞皆在背隨所中之俞而乃發病婦人血氣虛損故中風當察口眼開闔以別輕重

如眼



閉手足不開涎不作聲者可治
開聲如鼾睡遺尿者死

○角弓反張

婦

婦人角弓反張者體虛受風入諸陽經腰背反折變急如弓宜小續命湯

○血分辨治

婦人經滯化為水流走四肢悉皆腫滿名曰血分証與水腫相似醫不能審輒作水腫治之誤也

一方

人參

當歸

瞿麥

赤芍藥

大黃

煨

白茯苓

桂心

各五

草薢

紙炒三

右細劉水煎温服

傳婦人 經血先斷後病水 先病水後經血斷 名曰 血分難 水分易 治

○夢與鬼交 婦

夫以稟五行秀氣而生陰陽和則藏府盛邪氣不能傷之攝理失節血氣衰邪氣干其正得為病其狀不欲見人如有對誤時獨言笑時悲泣是也脉息遲伏顏色不變可與蘇合香圓

丁方

茯苓 一兩 半
石菖 赤豆 各半 兩

茯苓

人參

右細劉水煎温服

○熱入血室 婦

婦人傷寒發熱經水適來晝則明暮則譫妄如見鬼此為熱入血室 加味柴胡湯

柴胡 八分 黃芩 人參 生干地黄

甘草 各三 半夏 二升

右細劉水煎温服

○白淫濁液 惠

濕熱屈滯於小腹氣血虛耗精氣累滯濁液下流

經曰思想無窮所願不得意淫於外白物淫積如
精之狀不可為白帶治宜開結除濕去熱散氣此
謂白淫如米漿然至於湛濁頻下白水或黃水如
葵汁

○陰腫因治

婦

胞絡虛風客之風氣乘於陰與血氣相搏氣痞腠
理閉不泄越故腫也

菖蒲散治婦人月水澁陰腫痛

菖蒲

當歸

各一兩

秦艽

二分

吳茱萸

半兩炒

右剉散入葱白水煎空心溫服

一方治陰腫痛不可忍

艾葉

五兩

防風

三兩

大戟

二兩

右細剉水煎熱洗日二宜避風冷

○陰痒因治

婦

婦人陰痒者是虫蝕所為三虫在腸胃間因臟虛
三虫動作蝕陰內熱則痒重者乃痛

一方蒜煮湯洗之

一方以蛇床子白礬煎水洗之

全一方陰痒不可忍杏仁燒作灰乘熱綿裹內陰中
日一易之

○陰瘡治方

婦

一方治陰中生瘡

杏仁焙

雄黃

礬石

各一分

麝

少許

右四種研細付陰中

全陰中生瘡硫黃研抹付之

一方搗新桃葉綿裹內陰中日三易之

○求嗣篇

○戒服熱末子之誤

玉丹溪曰無子之因多起於父氣之不足豈可獨歸罪於母血之虛寒乎况母之血病奚止虛與寒而已哉然古方治婦人無子執用熱劑率皆服之夫求子於陰血何至輕用熱劑耶

或曰

春氣溫和則物生冬氣寒凜則物消

不假熱劑何由子臟得暖而成

胎予曰詩言婦人和平則樂有子

和平則陰陽不乖今

得熱劑經血不轉紫黑漸成衰少或先或後始則飲食驟進久則口苦舌乾陰陽不平氣血不和焉

能成胎縱使有成子亦多病以其能損真陰也
纂無子由血少不攝精俗為虛冷用熱藥煎臟腑血
氣沸騰禍不旋踵或皆服艾不知艾性至熱

熟艾
入火灸則下行
入藥服則上行
多服則必致毒

傳夫人欲求嗣必先視其婦人之經脉調否如未調
必以藥調之

○求嗣肥瘦辨劑

纂肥女軀脂滿溢閉塞子宮不得孕宜行濕燥痰

南星半夏川芎防風羌活

或有木
無風活

瘦婦子宮乾澁不能受胎宜滋陰養血四物加香

附子黃芩


○求嗣交合例法

婦男雖十六而精通必三十而娶女雖十四而天癸
至必二十而嫁皆欲陰陽完實然後交合則孕々々
而育々々而為子堅壯強壽○若未笄女天癸始至
已近男色陰氣早洩未完而傷未實而動是以交
而不孕々々而不育々々而子脆不壽

傳月經方絕金水纔生此時子宮正開乃受精結胎
之候妙合大和之時也過此佳期則子宮閉而不


受胎也

月候方絕



交合者成男安女

過此則不孕矣



衝縱氣來乘血開，畏精陰外，陽內象坎而為男。參橫氣來助精開，畏血陰內，陽外象離而為女。

傳曰不孝有三無後為大
古詩曰無官一身輕有子万事足

誠哉是言也無嗣

者宜深思之無怠

○胎前篇

○有胎諸察

經

少陰脉動甚者妊子也手少陰心主血足少陰腎主精

血精交而

成孕

傳

經曰陰搏陽別謂之有子謂陰脉搏手其中別有陽脉也是為

血氣和平陽施而陰化也蓋人之夫婦猶天地

然天地之道陰陽和而万物育夫婦之道陰陽

和而男女生故欲求嗣者先調婦人經脉經脉

既調則氣血和平氣血和平則百病不生而樂

乎有子矣

脉經曰

手少陰脉動甚者，妊子也。腎為胞門，子戶，尺中腎脉按之不絕，當妊也。

又曰妊娠四月脉

左疾為男，右疾為女。

又曰妊娠

左手沉實為男，右手浮大為女。

又曰妊娠

左尺偏大為男，右尺偏大為女。

又曰妊娠六七月脉

實大牢強弦緊者，生沉細者，死。

又曰看上圓時，夫從後呼

左圓首是男，右圓首是女也。

太


陰洪而女孕，太陽者肺也。陽大而男，太陽者膀胱也。

羸母生女，必瘦補羸母，則養血壯脾。

衰父生男，必弱補衰父，則壯脾節色。

○諸經養育

脉經曰婦人妊娠



養之諸陰陽各

養三十日活兒

手太陽少陰不養者

下主月水，上為乳汁。

活兒養母懷妊

者不可灸刺其經，必墮胎也。

傳若至期當養之，經虛實不調則胎孕為之不安甚，則下血而墮矣。

婦妊一月，肝脉養之不可針灸其經，肝主筋不為力。

事舉重腰痛胞急卒有所下

膠炒甘參芍朮門生薑

妊二月膽脉養之不可針灸其經膽主精當謹驚動有寒胎不成有熱胎即萎中風寒心滿臍急腰背強痛卒有所下

歸參艾膠連地甘棗生薑

妊三月心主脉養之不可針灸其經莫悲哀思慮驚動驚恐頓仆而動經脉臍腹滿痛卒有所下苓參膠芩朮芍門甘棗生薑

妊四月三焦脉養之不可針灸其經當靜形和心

志節飲食有寒膈滿嘔吐有熱小便難數如淋臍急腰痛往來有時胎上迫卒有所下

菊花門膠甘歸參棗生薑

妊五月脾脉養之不可針灸其經此月兒四肢成無飢飽無食乾燥有熱頭眩心乱嘔吐有寒腹痛尿數卒恐肢疼胎動腰痛頓仆卒有所下

膠參門歸芍芩甘生薑

妊六月胃脉養之不可針灸其經此月兒口目成莫靜處出遊野觀走獸莫飽卒動驚怖寒熱往來腹滿躄腫卒有所下

門 參 地 芩 膠 甘 棗 生 姜

妊七月、肺脉養之不可針灸其經此月兒皮毛成
莫大言號哭莫薄衣莫洗浴莫寒飲勞身搖肢
莫定止動作屈伸以運血氣忽驚恐腹痛卒有
所下

門 半 歸 芩 芪 參 膠 甘 葱 白 生 姜

妊八月、大腸脉養之不可針灸其經此月兒九竅
成無食燥物中風寒身痛寒熱胎動不安頭眩
臍寒目視茫茫


芍 參 歸 甘 朮 朴 薤 白 生 姜

妊九月、腎脉養之不可針灸其經此月兒脉續縷
皆成無處濕冷無著多衣卒下痢腹急胎上腰
痛不可轉側

半 門 歸 膠 棗 生 姜

妊十月、膀胱脉養之納天地氣於丹田五藏備六
府通候時而生

傳 夫手足十二經氣血多少不同



安胎之法宜各按月依經視其氣血虛實而調之固無胎墮之患

其或感冒風寒別生異証又宜按法而調治之

○胎產三禁 傳

治胎產之病當從厥陰之經論之毋犯胃氣及上

二焦謂之三禁不可

汗下利小便

若

發汗者如傷寒下早之証利大便者則脈數已動于脾利小便者內亡津液胃中枯燥

制方之法能不犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣皆醫人之繩墨也

○妊婦攝養

婦一氣方凝始受胞胎母須行坐端嚴性情和悅常處靜室耳不聞非言目不見惡事則生男女福壽敦厚忠孝賢明不然則男女既生則多鄙賤不壽而愚此謂曰外象而內感也

傳其妊婦早當絕去嗜慾安養胎元

性

宜靜而
不宜躁

躰

宜動而
不宜著

味

宜涼而
不宜熱

衣

宜溫而
不宜寒

毋

又立
又坐
又行
又卧

忌一切肥甘煎燂油膩辛辣鹹酸水果魚鱉狐兔

鵠雀之類，即無胎漏胎痛胎動下血子腫子癩等証及橫產逆生胎死腹中之患矣

傳曰古者婦人妊子




夜則令警誦詩道正事則生子形容端正才過久矣古所謂胎教也

丹溪曰難產之婦皆是八九箇月內不能謹欲以


致氣血虛故也

全

妊母



孕婦食



○妊婦雜病回治凡例

凡妊婦有疾投以湯藥有傷胎破血之忌必醫人審疾勢輕重量藥性高下處以中庸不必多言即瘵勢衰藥便止

傳安胎丸

白朮

條芩

神麩

各等分

右為細末粥丸每服五十九清米湯下蓋木苓
乃安胎之聖藥也俗以苓為寒而不用反謂溫
熱能養胎殊不知胎孕宜清熱養血使血循經
而不妄行乃能養胎苓必取細挺沉實者用之
傳胎動者因火逼動胎逆上作喘急用條苓香附之
類

婦胎動不安由衝任經虛受胎不實○有飲酒過房
損動不安○或登高厠風攻陰戶入子宮胎動
不安○或勞力觸冷熱○或飲食不適○或居
處失宜

輕者轉動不安重者傷墮以母形察之面赤舌
青兒死母活唇口青兩邊沫出子母死面青舌
赤口中沫出母死子活也

艾 膠 歸 芎 甘 芪 菴 白 粳 米
生姜之類隨証用之

婦胎漏者妊數月而經水時下此由衝任虛不能約
制手太陽少陰經血故也衝任為經絡之海起
胞内手太陽小腸脉也二經為表裏上為乳汁下為月水
妊婦月經所以斷者壅之養胎穡之為乳汁衝
任虛胞内泄不能制其經血故月水時下亦名

胎漏血盡則斃

勞役喜怒
飲食生冷
感冒風寒

遂致胎動令下血

續斷 艾葉 竹茹 膠 歸地

傳胎漏者屬氣虛有熱四物加膠珠朮芩 縮炒

香附炒入糯米煎服

玉內補丸治胎痛

當歸 熟地黃 各一兩

右為末蜜丸用之或為煎劑亦可

大率妊婦唯在抑陽助陰然胎前藥惡群隊若

陰陽交錯別生他病

枳殼散所以抑陽
四物湯所以助陰

然枳殼散差寒若單服之恐有胎寒腹痛之疾

以內補丸佐之則陽不至強
陰不至弱陰陽調停愚詳陰

陽調停不若不服為愈

傳胎痛血少四物加香附為細末紫蘇湯下大妙

傳妊娠二三个月忽心腹疼痛不安用歸膠三條
炒

甘草一 葱白右剉水煎溫服

妊娠四五个月忽心腹疼痛大棗十四个
炒黑 塩一條
炒

右為末下撮許酒調服

妊婦偶有所傷腹痛不安或

從高墜下
重物所壓

觸動

胎元痛不可忍及下血者縮砂仁略炒為末温

酒調服不飲酒者米飲艾湯塩湯皆可覺胎中

熱其胎即安

傳胎腫謂有胎或手足頭面通身浮腫者是也屬濕多梔子一

合炒末米湯調下九服亦可

五白朮散治妊娠面目虛浮支躄重白朮一兩

生姜皮 大腹皮 陳皮 白茯苓皮 各半兩

右為末米飲調服指迷方有桑白皮無白朮

傳安榮散治妊娠小便澁少遂成淋瀝謂之子淋

麥門冬 通草 當歸 灯心

甘草 各五 人參 川芎 各一兩

右為細末麥門冬湯調下

五參朮飲治妊娠轉胞

四物湯加入參 白朮 半夏 陳皮 甘草

右咬咀入生薑水煎温服

按丹溪曰轉胞之病胎婦

稟受弱者
憂悶多者
性急躁者
食味厚者

庸或有之古

方皆用滑利藥鮮有應効曰思胞不自轉為胎

所歷展在一邊胞系了戾不通耳胎若舉起居

於其中胞系自疏水道自利

吳宅寵人患之其脉似瀋重按似弦左手稍和予
曰此得之憂患瀋為血少氣多則胎氣弱而不
能舉弦為有飲血少則胎弱氣多有飲中焦不
清而隘則胞知所避而就下乃以上藥與服隨
指探喉中吐出藥汁候少頃氣定又與之次早
亦然至八貼安後治數人亦效

婦血氣

和平兒在胎則安產亦易
乖理兒在胎則亟動產亦難
子上逼心則悶絕胎下乃甦甚死

紫蘘飲治妊胎不和近上滿痛謂之子懸連白不

下用之

當歸 分三

甘草

大腹

人參

川芎

陳皮

白芍藥 各半

兩

紫蘘 一兩

右細剉入薑葱水煎溫服

保安散治胎動心悶唇青口乾上衝下築手足厥

冷

當歸

人參 各一

兩半

甘草 二

兩

右細切水煎入膠珠一兩葱白一握再煎溫服

丁方治妊娠身痛或衝心欲死不能食

白朮 五兩

黃芩 二兩

芍藥 四兩

二兩

芍藥

四兩

右細剉水煎服之

婦腎主腰曰勞損其經虛風冷乘之則腰痛甚則胎墮

當歸 三兩 甘草 一兩

右細切水煎入膠珠二兩蒼白一升再煎温服
方治妊娠腰痛如折

大黑豆 二合炒熟 以酒煮熟去豆空心頓服

婦肺主氣外合皮毛毛竅不密則風寒乘虛入肺為嗽
嗽花散治心膈痰壅肺氣不順咳嗽頭痛

款冬 麻黃 前胡 貝母 煨

桑白皮 紫苑 各半 旋覆花 白朮

甘草 各一分 石膏 一兩

右細切水煎温服

丁方治妊娠咳嗽不止胎動不安

甘草 杏仁 各一分 紫苑 一兩 桑白皮 一分

桔梗 三分 天門冬 一兩 竹茹 一塊

右細切水煎入蜜半匙温服

婦孕婦不語非病間有如此者不須服藥臨產月但服保生丸四物湯類產下便語

黃帝問人有重身九月而瘡治之柰何歧伯曰無

治也當十月復

婦治妊婦腹中兒哭

用黃連濃煎母常呷之

傳治兒在腹中哭叫用多年空屋下鼠穴中土一塊令妊婦噙之即止

婦凡妊婦傷寒仲景無治法藥宜有忌不可與尋常婦人通治也

一方治妊婦傷寒憎寒發熱

葱白 十莖 生姜 二兩

右細切水煮連服取汗愈

一方治妊婦傷寒感風身熱眩暈頭痛心煩

紫蘊 川芎 白朮 白芍藥

麥門冬 陳皮 葛根 甘草 各一兩 二分

右細剉入薑葱水煎溫服發表即安

傳妊婦傷寒百節疼痛熱甚不急治即落胎

柴 葛 知 枳 升 石膏 大青 葱白

右細切水煎溫服

一方治妊婦傷寒安胎

白朮 黃芩

右等分新瓦上炒令香加生姜水煎溫服

一方治妊娠傷寒

柴前歸參芍生地甘

右細切入薑葱水煎溫服

○惡阻証治

婦惡阻顏色如故脉息和順肢躄沉重頭目昏眩擇食惡聞食氣好食酸鹹甚寒熱心悶嘔吐痰水膈滿惚惚輕不及藥重用藥

一方治婦人經水不行身無病而似病脉六部滑大而勻是孕脉也精神如故惡食臭或大吐或吐清水名曰惡阻

人參一分 甘草一分 白朮 香附子

烏藥 橘紅 各二分

右細切水煎溫服

傳惡阻乃有孕而惡心阻其飲食者是也多從痰治

一曰 肥人是痰 瘦人是熱

參橘散治妊娠三月內惡阻吐逆不能食或心虛

煩悶

橘紅 茯苓 各一分 麥門冬 白朮

厚朴 制姜 甘草 各半

右細切加生姜竹茹水煎溫服

○墮胎因治

傳墮胎乃血氣虛損不能養胎元而自墮耳

猶

枝枯則果落
幹萎則花墮

又因怎怒傷情乃火便動亦能墮胎猶

風撼其木
人折其枝

火能銷物造化自然病源風冷傷於子藏未得
病情者也

大抵

屬虛
屬熱

二者又當視其輕重而治之

一婦有胎即墮其脉左大無力重取則瀉乃血少
也以其妙年與補中氣使血自榮濃煎白朮湯
調芩末一錢服未至三四兩得保全而生

婦

夫陽施陰化故有胎榮衛和則經養周足故胎安

若血氣虛損子藏被風冷血氣不足養胎所以
數墮妊而腰痛者喜墮胎也

千金治妊娠三月數墮胎

灸膝下一寸左右各七壯

固蒂散治妊娠數墮

甘草 參 芎 朮 地 吳茱

右等分爲末空心酒下忌菘桃李雀肉酸物

下法治數傷胎

鯉 二斤 粳米 一斤

右如法作臛加塩食之甚良一月中三遍効莫

入葱豉醋

○妊胎不長養

婦人有宿病而後有妊

或妊後乖理而生疾

藏府衰氣力虛令胎不

長故服藥去病益氣血以扶養胎也

鯉長一尺者去腸鱗內塩棗煮熟飲汁令胎長大

平安

一方縮砂抹米飲調下

○新產

婦

欲新產者不易之事雖曰天地大德曰生然亦有

臨產艱難或為屈為媚用汞虫蛭之類難免受

病故平和異驗方具之

括樓

桂心 各二兩

豉 一升

右細切水煎服之

一方附子二枝末之酒和塗右足太良

一方

括樓根 兩

肉桂 五兩

牛膝 三兩

瞿麥 一兩

右細切水煎温服

○胎死因治

婦

各通卷之七

三十一

夫妊娠謂之重身，二命係之，損胎不特病重所致，或因頓仆，或因驚恐，或出入冒觸，或素病癥積，壞胎最多，候舌青即知子死。

一方治熱病胎死，因兒死冷，不能自出，服藥暖胎自出。

肉桂

當歸

白芍

甘草

干薑

生地黃

各一兩

黑豆

炒去皮二兩

附子

炮去膽二分

右為末，空心酒調下。一方無附子，有蒲黃。

一方下妊娠熱病胎死。

紅花一味，酒水煎飲一二三盞。

一方朴硝細末，童便調下。

○妊娠禁忌

傳

自妊娠初得，以至臨月，藥石禁忌歌。

虬斑水蛭及虫虫

烏頭附子與天雄

野葛水銀并巴豆

牛膝薏苡連蜈蚣

三棱代赭芫花麝

太戟蛇蛻黃雌雄

牙硝芒硝牡丹桂

槐花牽牛皂角回

半夏南星與通草

瞿麥干姜蟹甲瓜

礞砂干漆兼桃仁

地膽茅根莫用好

飲食謹弁

雞肉合糯米食令子生寸白。鮎鯉同雞子食
令子生疳蝕瘡。○食羊肝令子多危難。○食鱉
肉令子項短縮頭。○鴨子與桑椹同食令子倒
生心寒。○鮮魚同田雞食令子瘡癩。○雀肉同
豆醬食令子而生雀卵斑點。○食螃蟹橫生。
食薑牙令子多指。○食冰梨令絕產。○食雀肉
飲酒令子多淫無耻。○食茨菰消胎氣。○豆醬
合藿菜食墮胎。○鰍鱖無鱗魚難產。○食諸般
菌生子驚風而大。○食雀腦令子患雀目勿妄
服湯藥。○勿妄針灸。○勿過飲酒漿。○勿舉重

登高陟險。○心有大驚子必癩癩。○勿多睡卧
須時時少步動和血脉。○勿勞力過傷使腎氣
不足子必解顛不合。○衣母太温食母太飽若
脾胃不和榮衛虛損子必羸瘦多病戒之戒之

○臨產須知

傳

臨月不可洗頭以免橫生逆產

懷妊十月已滿陰陽氣足忽然臍腹陣痛胎孕偏
陷腰間重腹穀道挺迸漿水淋下其兒遂生此
乃正產若當生自有其時如瓜熟蒂懸粟熟自
落之類

九臨產宜擇年高有職穩婆及純謹婦人三四人
扶持一應外來閑雜之人喪服穢濁之婦預宜
杜絕勿令觸犯胎氣致產不利

九臨產房中不得喧鬧宜緊閉門戶靜以待生月
數滿足方覺腹痛不可驚動太早早則舉家霍亂
卜筮問神巫覡之流稱說鬼神多方哄味媒利產
婦聞之恐怖夫恐則氣怯氣怯則上焦閉下焦脹
氣乃不行以致難產如犯之急宜服柴蘓飲以寬
其氣

臨月忽然腹痛或作或止或一日二三日胎水已

來腹痛不容名曰弄痛

一月前忽然腹痛如欲便產却又不產者名曰試
月

以上二証非當產也不問胎水來與不來俱不
妨事但當寬心候時若果當產時腰腹痛極不
已穀道挺迸眼中火出其時便產豈有或痛不
痛欲產不產之候耶人多於此胡行亂做枉了
性命可不慎哉

九初覺腹痛而腰不甚痛者未產也且扶行熟忍
若行不得則僦物而立行得又行

世人不識但見腹痛纔作便謂生產坐婆踈狂者
不俟時至便言試水試水併胞漿先破風入產
戶以致產門狹脹乾澁難產

將產之時產母甚痛不肯舒伸行動固執曲腰眠
睡胎元轉動尋到生門已被遮閉又轉又尋再
三胎元無力決至難產

產母初覺欲生便惜力調養不可妄用力兒方轉
便用力一逼令兒錯路以致橫逆必待到產門
用力一逼即生此所當用力也譬如登廁時候
未至用力何益

凡產母如覺心中憤悶白蜜一匙溫水調服
產母如覺飢進軟白粥不令飢渴以致乏力亦不
可食硬飯之類

未產之先或煩渴欲飲水只可與清米飲

凡不可服催生符水況血得寒即凝血一凝則胎
滯而反致難產夫催生符法是野道士求食媒
利之設有何益哉

凡產婦胞漿未下但當穩守無妨胞漿既破一二
時後不生便當服催生藥要緊夫胞漿者本胞
內養兒之水也兒既折胞其水既下胎隨水而

下則為易生胎元無力轉頭遲慢漿下即血來
 閉塞道路令子無路可通故難產也如用蜀葵
 子等破血之劑逐去惡血兒得路而生故曰催
 生藥也

○催生藥弁

- 一 多用滑利迅速之藥如兒腦筆頭灰弩
 牙蛇退之類是也
- 二 若見水先下子道乾澀不能下者如猪脂油蜜
 酒葱白葵子牛乳榆皮滑石之類是也
- 三 若結骨停勞力之久風冷寒虛入子宮氣血凝滯而
 難產如牛膝 葱 桂 五積散 順元散之類
- 四 觸犯惡氣心煩躁悶難產者如麝香
 辰砂 乳香 青升茹之類

凡催生

○產難源論

傳

夫產育之難者皆由產婦不曾預聞講說生育道
 理臨事倉惶用力失宜遂有難產之危

是故有 逆產
橫生
坐產 者則先露其 足
手
臂

此皆用力太早之過

婦產難六由

一 富家保惜產母恐運動羞出入氣閉而不舒快血
 凝而不流暢胎不轉動臨產必難甚悶絕貧者生
 育日及勞苦血氣舒暢生理甚易何俟於藥然則

孕婦當貴於運動明矣

二妊者六七月胎形已具恣交合敗精瘀血聚胞中產必難何以知之生子頭上有白膩如膠名曰戴白生兒身有青有黑俗名宿痣此入月交合所致也不特母病子亦浸爛瘡瘍戒之

三坐草太早太小揮霍或信巫或說祟多誤產母心驚神恐臨產必難

四臨產初腹痛或作或止坐草太早頻試水流風乾產道產亦難也

五坐草稍久用力太過產母困睡抱腰之人又不穩

坐立傾側胎死腹中產難

六盛暑居幽房日色遠處開窗戶貯清水以防血暈血悶血溢妄行冬末春初凝寒密閉產室內外生火暖氣如春衣下部免胎寒血結不如此則產難也

○易產方法

婦二神散治橫倒及瘦胎

百草霜 白芷

右等分末研二錢匕童便醋和粘沸湯調下一方明乳香末一錢匕既腰痛甚時新汲水一盞入

女科通串
四十一

醋調服

一方治橫倒 滑石末一兩 葵子 二合

右剉煎明膠炒末入合再沸二服

一法胞漿先破下多胎乾先與四物湯養血氣次濃煎蒸湯放冷令坐婆洗產戶令氣上下通暢仍滑石末蜜調塗產戶裏次服催生藥乳香末蜜九温湯下佳

一法治橫倒諸治不効灸右脚小指尖頭三壯

一方蟬退一兩燒存性 大蛇蛻一條燒存性 滑石五兩 葵子炒一兩

右細末温順流水調下

惠臨產時紅莧馬齒莧同煮食易產

傳治橫逆不順子死腹中亦用 伏龍肝 細末一

二錢七温酒調下其兒頭戴土而出甚驗竈心之

紅土也

若手足先露者用細鍼刺兒手足心一二分深三四刺之以塩塗其上輕々送入兒得痛驚轉下縮即順生之矣

或兒脚先下急以塩塗兒脚底又可急搔之併以塩摩母腹上則正生矣

灸法治難產及胞衣不下灸至陰二穴在足小指外

側去爪甲角如韭葉窵々中三壯又灸大衝二穴
在足大指本節後二寸肝經之俞骨鐻間陷者中灸三壯

○礙產証治

傳

兒身已順門戶俱正兒已露頂而不能生此由兒
身回轉肚帶攀住兒肩不能下治法急令產母仰
卧輕輕推兒向上徐徐引手以中指按兒肩下其
臍帶須猴兒身正順產母用力一送兒即下生
凡兒身向未順生路未正產母用力一逼令兒偏
生或左腿或右腿或髻或左右額角雖兒身已逼
產門而不能下但云兒已露頂非頂也治法令產

母仰卧看生人輕々推兒近上以手正其頭用力
一逼即下

若又頭之後骨偏拄穀道兒則露額看生人以綿
衣灸令煖裹手急於穀道外傍輕輕推兒頭令正
然後用力一逼兒即下生

○盤腸產証治

傳

臨產則子腸先出甚可驚恐治法以盆盛溫水溫
潤其腸令產母仰卧且以言語安慰其心却用米
醋半盞和新汲水七分忽喫產母面或背打頓而
收每一喫令一縮三喫三縮腸則盡收矣用參耆

婦芎等大劑加升柴風之類以升舉之未有不安者也

又法急以葶麻子去殼研細貼產母顛頂上即收

○產難胎死方法

傳治產難數日子死腹中不出母氣欲絕

瞿麥六兩 水通 肉桂各三兩 牛膝四兩 榆皮四兩

右剉用水九升煎取三升分三服頓飲即下

一方無榆皮有天花粉四兩
一法治子死腹中而不出用黃牯牛尿不拘多少塗母腹上立出

又以牛屎炒令太熟入醋半盞裹青布於母腹上下慰之立下

婦產難子死腹中者多因驚動太早穢露已盡胎燥故子死其候母舌青黑及胎上冷也

救生散下死胎 桂 末二錢

右溫童便調下

一方治死胎不出 朴硝末二錢溫童便調下

豐城救垂死胎死猫牛不可勝計

婦妊婦下血過多子死腹中增寒手指甲青面色黃黑胎上搶心悶亂欲死冷汗自出喘滿不食或食

毒物或誤服草藥傷胎下血不止胎尚未損可安極妙若已損即下

牡丹皮 赤芍藥 桂心 桃仁 白茯苓

右各等分細末蜜丸如彈子大每服一丸細嚼

淡醋湯送下連服數丸立驗

○難產惡証

身重躰熱乍寒面黑舌青及舌上冷子母俱死○

面赤舌青母活子死○面青舌赤口沫出者母死

子活○唇口俱青吐沫子母俱死○不可不審當

先與其家言之

婦舌下脉青黑而反卷冰冷者子母俱死

○新產診切

婦新產脉緩滑吉實大弦急死○沉重小吉堅牢凶

○寸口澁疾大小不調死○沉細附骨不絕生○

產後諸疾脉大凶○分明記心察之

傳丹溪曰產

前脉細小後脉洪數皆死

又曰產前脉當洪數既產而洪數如故豈得不死

此亦太槩言之今見產後豈無脉洪數而生者

○胞衣未下論治

傳分免之後胞衣未下者不可令粗率之婦摘取嘗

見擗破尿睥致終身之害者有取下肝葉而殞命

者一方治胎胞衣未下 牛膝 三升 歸尾 二升

木通 三升 滑石 四升 葵子 二升

右細切水煎連進二三服即下 加瞿麥三升 名牛膝湯

婦由產時用力兒出體已疲不能更用力經停之間

產胞受外冷血道澁故胞衣不出須急以藥治冷

氣傷兒先依法截臍帶以少物繫墜而已 斷臍帶 今用竹

刀線先繫墜 使其子血脈不潮入胞中則胞衣自

萎縮而下縱及數日不害人只產母心懷安終自

下

一說母生子訖流血入衣中為血脹故不下治之

緩徐脹滿上衝心痛喘急但服奪命丹逐衣中血
血散脹消衣自下

奪命丹 附子 炮半 牡丹皮 一兩 干漆 一分碎炒 令煙盡

右細末醋一升熬大黃末一兩成膏和藥丸

溫酒吞下衣爛下

或坐婆斷帶收兒衣失繫住帶縮入腹中便不得

出 牛膝湯 之

一方紅花一兩酒煮濃汁服之

一方皂角棘燒末每一錢溫酒調下

心 一方取皂屋黑塵研為細末酒調方寸

纂一方用童便調朴硝末一二錢飲之立下

林一方燒鉄杵令赤投酒飲之

○產後篇

○母子呼吸同異

傳若夫妊娠婦子在腹中母子一氣流通全賴漿水滋養十月數足血氣完全形神俱備忽如夢覺自能用手折胞末路而出既出胞外母子分躰呼吸殊息

○新產三証

玉問曰新產婦人有三病一者病瘥二者病鬱胃三

者大便難何謂也

師曰新產

亡血虛多汗出喜中風故病瘥
亡血復汗寒多故鬱胃
亡津液胃燥故大便難

傳脉經曰產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當

汗出陰陽乃復大便堅者嘔不能食也小柴胡主之

又曰產後七八日無太陽証小腹堅痛此為惡露不盡四五日不大便跌陽脉微實再倍其人發熱日晡煩躁譫言不食利之即愈宜兼氣以熱在裏結在膀胱也

按丹溪曰產後宜大補氣血又曰不可汗下叔和以仲景治傷寒法用葦氣柴胡等藥欲退產後之熱恐非至當可法之語

○產後血暈証法

婦產後血暈由敗血入肝經眼見黑花頭目旋暈不能起坐甚致昏悶不省人事謂之血暈其目有三

- 一有用心使力過多而暈者
- 二有下血多而暈者
- 三有下血少而暈者

右暈雖同治異下血多而暈者但昏悶煩亂而已

用補血清心○下血少而暈者惡露不下上搶心
心下滿急口噤神昏不知人用破血行血

生子了燒硬炭或江中黃石令通赤置器於床前
以醋沃之得醋氣除血暈產後一臈時々作妙

一法燒乾漆令烟濃熏母面

一方治產後血暈危困 當歸一分 赤芍藥二分

生地黃汁 一盞

右水煎數沸温服如煩熱去歸入童便妙

清魂散治產後氣虛未安血隨氣上迷亂心神故
眼前生花甚悶絕不知人口噤神昏氣冷

澤蘭 人參 各一分 荊芥 一兩 川芎 半兩

右細末温酒熱湯調灌即醒 一方有甘草

神助散治血暈悶絕不知人乱語惡血不盡腹脇

絞痛 紅花 半兩 右細末童便和酒煮候冷服留

滓再煎服

心 凡血暈皆熱乘虛逆上湊心或以好醋

塗口鼻 細々少飲之 於傍使聞其氣

林 治產後血暈心悶氣絕

以丈夫小便濃研墨服一升

○產後惡露不盡腹痛証治

婦產後雖惡血方盡或感邪 喜怒斬然而止餘血停滯故

腹痛又妊時犯風涼則產時血少或產時取風涼則血壅不通惡露不盡故腹痛

一方治惡露不盡腹痛往來胸滿少氣

沢蘭 煎 生干地黄 當歸 各三分 芍藥

生姜 各十分 甘草 六分 棗 十四个

右細切水煎温服欲死塗身得差

一方治產後下血不盡腹内堅痛不可忍

當歸 芍藥 肉桂 各三兩 桃仁 百二十个

右剉煎温服末差加大黃三兩

一方治產後惡物不盡腹内疝痛

生干地黄 當歸 並畧炒 各一兩 生薑 切如蠅頭大 瓦炒令焦

右細末薑酒調下
○又方五靈脂為末神麩糊丸陳皮
白朮煎湯下

血刺痛用當歸乃是和血之法若曰積血而刺痛
者宜桃仁紅花當歸頭 血在下焦 當用歸尾

林鯉鱗燒灰治產後腹痛酒調下
治產後腹中絞痛末桂溫酒方寸匕日二服
治產後血不盡疼悶心痛荷葉熬令香為末煎水

下方寸匕

治產後餘血不盡奔上衝心煩悶腹痛以生藕汁
二分飲之

傳養血丸治產後惡血不散發熱腹痛及惡露不盡
臍腹堅脹兼治婦女經候不調赤白帶下腹脇疼
痛

當歸 赤芍藥 各四兩 牡丹皮 肉桂

延胡索 炒各二兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服二十九或 溫酒 米湯 任下
丹溪曰治腹痛非芍藥不可雖新產亦可用但酒炒

○產後兒枕心腹刺痛証治

婦產母胎中宿有血塊產時其血破散與兒俱下則無慮若產婦藏府風冷血凝滯在小腹不通則結疼名曰兒枕也

一方治產後兒枕腹痛

延胡索

當歸

各一兩

琥珀

蒲黃

各一分炒

芍藥

半兩

桂心

一兩

紅花

二兩

右為細末童便和酒調下食前

一方桃仁

半升

芍藥

當歸

川芎

干漆

碎熬

肉桂

甘草

各二兩

右細切水煎服之

一方治產後心腹內外痛

生地黄汁

藕汁

童便

各三合

右同煎數沸溫服

傳三聖散治兒枕心腹疼痛

當歸

肉桂

玄胡索

各等分

右細末每服二錢溫酒或童便調下

因失笑散治產後心腹絞痛欲死及兒枕痛

蒲黃

炒

五靈脂

各等分

右為細末醋調二錢熬成膏湯化服之

○產後餘血奔心煩悶証治

婦

是由 分免了不與童便
心下不辨卧太早
飲食不且 而所致也

一方治產後餘血不盡奔衝心煩悶腹痛

川芎 生乾地黄 枳殼 芍藥

右等分爲細末酒服日二

一方生藕汁服之効 竹瀝亦得

一方治產後七日內宿血不散時々衝心迷悶

荷葉 三分 延胡索 八分 地黄汁 二合

右細切水二升煮沸下延胡空心三服忌肉一日

○產後內煩治方

婦

一方治產後內虛煩熱短氣

甘竹茹 一分 人參 茯苓 甘草 各一兩

黃芩 三兩

右細切水煎溫服

一方治產後短氣欲絕心中煩悶

竹葉 切 麥門冬 小麥 各一分 甘草 一兩

生薑 二兩 大棗 二十

右細剉先水一斗竹葉小麥煮取八升內餘藥

煮取三升溫服若虛悸如人參少氣力加粳米

五合

一方治產後煩悶不安

人參

當歸

麥門冬

桂心

地黄

各一兩

棗

二十個

粳米

一升

淡竹葉

三升

芍藥

四兩

右細切先煮竹葉粳米去滓入藥煎服

一說尋常諸虛煩熱用竹葉石膏湯產後與常不

同如石膏不輕用用之必死

○惠知母湯治產後寒熱通身溫壯心煩

知母

四分

赤芍藥

黃芩

三分

桂心

一分

甘草

灸一分

右細剉分二貼水煎溫服

○產後乍寒乍熱附瘧

婦陰陽不和敗血不散令乍寒乍熱陰勝則乍寒陽勝則乍熱敗血

不散入肺則熱脾則寒醫為瘧治之則誤矣

陰陽不和加減四物湯但寒熱而無他証也

敗血不散奪命丹時有刺痛者敗血也

一說敗血不散豈止入脾肺耶九一陰閉一陽

閉即寒熱生陰勝則寒陽勝則熱

知母湯治產後乍寒乍熱通身溫壯心胃煩悶在方

前條
一說治產後瘧疾熱多寒少清脾湯養胃湯佳也
產前病瘧而產後未愈者最難用藥如常山砒石
斷不用

○產後蓐勞証治

婦產理不順疲極筋力憂勞心慮令虛羸容悴食不
消邪感肺咳嗽口乾痰逆喘乏頭昏節痛腹中絞
刺榮衛受邪頻發時盜汗寒熱如瘧背膊煩悶肢
重著床名曰蓐勞
一方治產後蓐勞

熟地黄

人參

白芍藥

白茯苓

白朮

各一兩

續斷

黃耆

桂心

五味子

當歸

麥門冬

川芎

各三分

右細剉入生薑水煎溫服

一方治產後羸瘦煩熱自汗欲變蓐勞寒熱自汗
羸瘦用之

白芍藥

當歸

地骨皮

人參

各半兩

沒藥

肉桂

各二分

牡丹皮

各二分

右細切水煎溫服

傳當歸羊肉湯治產後發熱自汗肢軀疼痛日久不

愈名曰薄勞

歸身 人參各 黃耆一兩 生薑半兩

右細切用羯羊肉一竹煮取清汁五大盞去肉入藥慢火煮取四盞分六服徐徐服之

○產後虛羸証治

婦曰產傷損藏府勞侵氣血輕者將息滿月即瘥重者日月雖滿氣血猶不調故患虛羸或飲食不節調適失宜風邪冒氣血注藏府則肌膚不榮容顏憔悴

一方治產後虛羸補益榮血

當歸 羌活各一兩 延胡索半兩

右細切水煎溫服

一方治血虛勞倦盜汗多困少力咳痰

當歸 黃耆 川芎各一兩 柴胡 前胡各一分

右細剉入桃柳枝三寸大棗烏梅各一枝生薑三片水煎溫服若有痰不用烏梅

一方治產後虛乏不食四肢倦怠心腹陣痛補虛治氣

人參 芍藥 肉桂 甘草 生薑各一兩
當歸一兩半 生地黃二兩

右細剉入大棗水前溫服

○產後四肢浮腫証治

婦敗血乘虛停五臟循經流入四肢日深不得腐如冰故令面黃肢腫醫不知用導水藥凡產後皆虛又以藥虛之謂之重虛必致夭橫但血行腫消則愈

調經散治產後浮腫

沒藥 琥珀 肉桂 芍藥 當歸 各一兩

細辛 麝香 各二分

右為細末酒調下

評曰產後浮腫多端有自妊腫至產後不退者又產後乖理外感四氣內傷七情血與氣搏滯經絡有滯氣分滯血分之異當目脉証治之如調經散治血分固効力淺難憑枳朮湯治氣分佳也枳朮湯治心腹堅大如盤水飲所作

枳實 一兩 白朮 三兩

右細切每服四錢水煎溫服中軟即當散也

○產後乳汁辨治

婦皆由氣血虛弱經絡不調所致也乳汁投地勿令食虫蟻令乳無汁若盈溢潑東壁

年少初經產乳雖脹汁不行有風熱耳服清利藥則乳行○累經產而無乳亡津液故也服滋溢之藥以動之○雖有乳不多者服通經之藥以動之仍以美腫引之○屢經產乳汁多者血氣不衰之候也○婦人素衝任之經有疾乳汁少而其色黃生子怯弱多疾也

婦人乳汁不行二治

氣血盛壅閉而不行疎之通草漏芦土瓜根桂也
血少氣弱澁而不行補之猪蹄鯽魚鍾乳佳也

產後乳汁自出 身虛所致服補藥○亦未產前乳汁

自出多者生子多不育書未曾論及矣

乳子忽嗜乳不時泄結痛亦有不痒不痛腫脹如石名曰吹妳不急治則癰腫急與括樓散以手揉之則散

括樓散

乳香 一分研

括樓根末

一兩

右研和酒調下

新產兒未能飲脹結搵其汁不盡皆蓄留與血氣相搏熱痛手不得近便以手搵去汁更傍人吮之不介成癰

輕為吹妳妬乳重為癰

一方治吹妳作癰

葵莖及子

右細末酒服方寸匕

○丹溪方治乳汁不通

桔梗

二不

通草

七分

天花粉

瞿麥

柴胡各一

赤芍藥

白芷

水通

連翹

甘草

青皮

各五分

右細剉水煎食後細飲更以手摩乳房

○乳癰論治

婦足陽明之經澁不通血氣不散故結聚成癰四十歲以下治之愈五十歲以上宜速治之難瘥不治者多死○又妊娠乳癰無害謂起陽明陽明者胃

脉也主肌肉不傷臟故無害也右開脉沉也

產後宜勸去乳汁不宜蓄積惡汁內結則硬腫痛渴

以赤小豆末水調塗之尚數担去乳汁與連翹

湯即方

連翹

升麻

芒消

各十分

玄參

芍藥

白欬

防已

射干

各八分

大黃

十二分

甘草

六分

杏仁

八十个製

右細剉水煎下芒消服之

○產後中風口噤角弓反張証治

婦血虛風入額頰夾口之筋手三陽筋結入額因產
臟虛筋脉傷風乘之三陽之經偏搏之筋拘急故
口噤躄虛受風邪乘虛入諸陽經則腰背反折如
角弓也

血虛肉理不密故多汗風搏之則變瘡口噤背強
搖頭身反折幹口灌小續命湯稍緩若汗出兩手
拭不及者不治

一方荆芥

畧焙末

右每服三錢豆淋酒調下童便亦可
一方治產後中風不省人事吐涎搐搦

口噤者灌之
噤甚吹鼻中

當歸

荆芥

等分

右細剉煎灌之牙關緊急幹開微及灌之
產後氣血不足月未滿起早勞動虛損風冷客皮膚
經絡頑痺不仁寧急也

一方治產後中風四肢攣痛背項強急

防風

一兩

芍藥

桂心

各半兩

羚羊角

屑

川芎

羌活

當歸

酸棗仁

牛蒡子

炒各三分

右細切水煎溫服

產後中風口眼喎斜等証不可作風治
必大補氣血然後治痰

非真中風也

傳產後中風口眼喎斜八物加附子荊芥少加防風
羌活煎服

○產後咳嗽治方

婦一方治產後肺虛感微邪咳嗽

甘草 桔梗 各六分 款冬花 四分 生麥門冬

生地黄 各十二分

右細剉水煎食後溫服

一方治產後咳嗽痰唾稠粘氣急

前胡 五味子 紫苑 貝母 各六分

桑白皮 茯苓 各八分 淡竹葉 二十片

右細剉水煎食後溫服

或 風熱 宜辨治之 寒濕

若產後喫塩太早而效者難治

○產後喘急辨治

婦一方治產後血入肺面黑喘欲死

人參 二兩細末 蘓木 二兩

右蘓木一味剉煎去滓隨時加減入參末服之

惡露不快敗血停上薰肺喘急但服奪命丹血去喘

定 友在

日產所下過多榮暴竭衛無主獨聚肺故喘名曰孤

陽絕陰難治

評曰產後喘可畏敗血上薰肺奪命丹可効

若感風寒目憂怒者奪命丹未可况孤陽絕陰者乎
食鹹冷

○產後口鼻黑色及衄血証因

漏陽明者經脉之海起鼻頰出額交人中左之右右之左產

後氣消血散亂入諸經不能還故口鼻黑氣起變

衄此証胃絕肺敗也不治故無方

○產後吃逆証治

漏產後氣血傷藏府損風冷搏氣則逆上肺虛聚冷

胃中伏寒日食冷物冷熱相衝氣厥不順則吃逆
經曰吃逆者胃寒藥無効灸期門期門胃之太絡也

一方治產後吃逆三日不止欲死

肉桂 半兩 生薑汁 三合

右同煎以火灸手摩背熱時塗藥汁盡

一說治產後吃逆 橘皮半夏生薑干薑之類皆効也

○產後雜証治方

傳丹溪曰產後當大補氣血為主雖有雜証以末治之

產後補虛用參朮耆橘歸芍炙甘

如發熱平 輕則加苓滲之其熱自除

重則加乾薑

入肺利肺氣
入肝引衆藥生血

產後發熱惡寒或口眼喎斜等証皆是血氣虛甚當
以大補氣血為主治

左 右 手脈不足

補血藥多於補氣藥
補氣藥多於補血藥

產後惡寒發熱腹痛者當去惡血若腹不滿者非惡
血也

參朮湯治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱

令人心煩短氣自汗頭痛

熟地黄 當歸身 人參 肉桂 麥門冬

白芍藥 炒各
一名

右細切作一服入竹葉生姜水煎溫服

益肌湯治產後虛汗不止

黃耆 二各 白朮 防風 熟地黄 牡蛎 煨粉

白茯苓 麥門冬 各一
各 甘草 炙半

右細剉加大棗水煎溫服

濟陰湯治產後陰虛發熱或日間明了暮發寒熱

當歸 川芎 生地黄 柴胡 各等
分

右細切水煎温服

婦人腎繫於胞產則勞腎損胞諸虛未復感風乘腰故腰痛

一方治產後風冷腰痛不可轉側

獨活 川芎 芍藥 桂心 續斷 生薑

桑寄生 各六分 當歸 防風 各八分

右細剉水煎空心温服

一方治產後七八日惡露不止

當歸 六分 芍藥 續斷 各八分 川芎

生地黄 炒乾十分 二分

右細剉水煎空心頓服

一方治產後三四日惡露不下嘔吐

芍藥 十分 知母 八分 生薑 當歸 蒲黃 各四分

紅花 二分 荷葉中心蒂 七個 生地黄汁 一合

右細切水煎去滓入蒲黃沸空心温服

一方治証同前

牛膝 大黃 各八分 牡丹皮 當歸 各六分 芍藥

蒲黃 肉桂 各四分

右為細末生地黄汁調服血下愈

一方治產後脇脹氣痛

當歸 一兩 芍藥 檳榔 桔梗 枳殼 各三分

肉桂 木香 柴胡 各二分

右細切水煎空心温服

一方治產後積癥

積陰氣痛有部位
聚陽氣痛無定處

青皮 干漆 沒藥 枳榔 當歸 桂心

炒各三分

芍藥 牡丹皮 大黃 桃仁 鱉甲

各半兩

炒

厚朴 三稜 延胡索

各兩

右為細末煉蜜丸酒送下

門冬飲治產後血虛煩渴不止

芦根 括樓根 人參 甘草 茯苓

切一分

各三兩

大棗 麥門冬

二十個

生用四兩

右細切水煎頓服四劑而即瘥忌菘菜

一方治產後腹脹滿悶嘔吐

赤芍藥 半夏 澤蘭 人參 陳皮

各一分

甘草 一糸

右細剉入生薑水煎温服

一方治產後赤白痢疾臍下氣痛

當歸 厚朴 黃連 肉豆蔻

八分

各十分二分

五枚

甘草 六分

右細切水煎温服四君子湯亦能治此証

一法產後小便不通腹脹悶亂不醒用鹽填臍中却
用葱白剝去麁皮十餘根作一縛切作一指厚安塩
上用艾滿葱上灸之熱氣覺入腹即小便通効難具
述

一方治產後尿數并遺尿

益智仁為細末米飲下

一方治產後小便不禁

雞尾毛燒末温酒調下

一法治產時勞力太過陰脫如脫肛狀逼迫腫痛以
鉄精粉上推肉之

又灸臍下横文二七壯

又用枳殼煎湯浸良久即入

又用五倍子白礬煎湯浸良也

又葶麻子十四枚去殼研塗頂心如入即去

傳 一方治產後子腸不収

八物湯加升麻防風須以酒炒黃耆為君

○整容篇

婦一法治面上有熱毒惡瘡

胡粉炒 大黃栢 黃連各等分

右為細末猪脂調傳

一法治粉刺

白礬末酒調塗之

一法治面上黑風瘡

黑牽牛半斤 甘松 香附子各四兩

右為細末作面藥逐日洗之

染髮方

用黑桑椹一升科斗一升以瓶盛密封於土中
東屋角百日化為黑泥染髮如漆染男子白髮

亦妙

傳梳頭髮令不落方

側栢葉如手大 榧子三十 去皮 胡桃二ヶ去皮

右和合用雪水浸三日取水用梳頭髮未不脫
落

傳面藥一方

益母草不拘多少燒灰煮糯米和如毬子大炭
火燒通赤細研依常用之滋潤顏色令光澤

本草曰治風刺

團大真紅玉膏

杏仁去皮 滑石

輕粉各等分

右為細末蒸過入腦麝少許以雞子清調勻早
起洗面畢傳之旬日後色如紅玉

團孫仙少女膏

黃栢皮寸三 土瓜根寸三 大棗七枚

右同研細為膏常早起化湯洗面用旬日容如
少女以治浴尤為神妙

察證辨治啓迪集卷之七

