




卷之三
雜記
續
...

仙
田
觀
家



察證辨治啓迪集卷之八月錄

道三編

○小兒門

一療兒醫難之說 一諸証因源

一醫師謹節
病家

○嬰子保護篇

一拭穢法 一除痰去癖之法 一臍帶斷法

一護臍法 一臍風撮口証治 一臍汁

一通便法 一貼顛之法 一摘泡之法

一洗浴法 一乳哺之法 一乳母之戒慎

一護養法 一月裏看承

○詳審觀察篇

一 審脉	一 觀形	一 察色
一 聽聲	一 視手紋	一 察外証
一 五臟虛實証治	一 臟氣虛實勝乘証治	一 變蒸証候
一 顛陷顛填証治	一 解顛証治	一 壽夭弁察
一 小兒惡候		

○ 雜病証治篇

一 驚風因源	一 急慢驚風弁論	一 合病戒偏治
一 急慢驚風治方	一 林中誠驚風不治証	一 慢脾風証弁
一 搐發証治	一 驚搐先証	一 五癩察療
一 天癆証治	一 吐瀉因証治	一 腹脹証治

一 腹痛弁治	一 夜啼証治	一 兒痰弁治
一 吃泥	一 欬嗽弁治	一 欬逆因治
一 脫肛奇治	一 口瘡治法	一 牙疳治法
一 重舌 木舌 証治	一 弄舌	一 齒不生
一 語遲	一 行遲	一 腳拳不展
一 手拳不展	一 鶴節	一 滯頤冷熱
一 項軟筋軟	一 脫囊	一 敗病
一 丁奚哺露証治	一 龜背龜背	一 尾骨痛
一 中惡	一 客忤	一 瘰疾
一 痢病	一 霍亂	一 諸汗

一痞癍 一名赤瘤

一遍身赤腫 一名赤遊風

一癩頭 附白禿不髮

○疖証篇

腎疖難治 劇疖五絕 之說 一疖因 一五疖

一無辜疖毒 一雜疖 一治疖方治

五疖保童圓 化虫丸 歌

一方 下虫丸 水香丸

胡黃連丸 大蘆薈丸 如聖丸

一方 肥兒圓 一疖瘡 七方

一灸法

○痘癍篇

一痘疹 一弁內外因 傷寒表裡前後痘疹

一瘡疹察証 一弁治例 一偏用戒慎

一痘証順逆輕重 一痘疹形證數輕重 一痘疹虛實証治

一痘瘡色弁 一形氣証治 一隨經治例

一出不快証治 一治痘雜法 二十二案 一妄汗之變

一辨不藥而愈 一平治方法 一乳嬰之兩治 童卅

一危惡証狀 一瘡疹入目 一瘡後餘毒 九案

一傷地風 一姪婦瘡疹 一論中稱名方劑

五加皮散	至聖丸	鱉血丸
大連翹湯	化毒湯	麻黃黃芩湯
百祥丸	人齒散	山梔子湯
紫蘊飲	蜜蒙花散	蟬蛻散
消風散	五苓散	脾積圓
小柴胡湯	木香棋榔丸	四物湯
白虎湯	來復丹	人參竹葉湯
止汗散	阿膠散	人參敗毒散
鼠粘子湯	涼膈丸	五香連翹湯
十六味流氣飲	五積散	十補湯

卷之八目錄畢

察證辨治啓迪集卷之八

日東洛下雖知苦齋道三編

○小兒門

○療兒醫難之說

闕小兒方序曰古人云寧望十丈夫莫望一婦人寧望十婦人不望一小兒何也

蓋小兒謂之啞科疾痛不能言
精神猶未備
形声尚未正
脉理猶未全所以

難理者
語不能問其得病之由
脉不能診其必然之理况臟腑虛實
更變易如反掌主治者苟有毫髮之差以致千里



之謬

○諸証因源

傳夫孺子在襁褓內無七情六欲之交戰外無大風大寒之相侵奚其

幼科之疾若是之繁且甚與

抑考其証大半胎毒而外感風寒之証十而一耳

變蒸 痘疹 班爛 驚悸 風癩 發搐
痰壅 赤瘤 白禿 解顛 重舌 木舌

已上諸証豈非孕母不謹胎毒所致與

纂小兒肝與脾病多肝只有餘大人亦然病因

有二日飽 日煖

傳夫小兒之在胎母飢亦飢 母飽亦飽辛辣適口胎氣隨

熱情欲動中胎息輒躁

或多食煎燂 恣味辛酸 嗜慾無節 喜怒不常皆能令子受惠

其為母者胎前既不能謹節 產後又不能調護惟務姑息不能防

微杜漸

或未滿百脾而與鹹酸之味 未發週歲而與肥甘之物百病由是而生

吐瀉黃疸五疳腹脹復痛水腫瘡疥痰涎

豈非吃物過傷 調養失宜之所致與

○醫師 謹節 病家

傳抑且小兒臟腑脆嫩而孟浪之劑 峻寒峻熱之藥俱不

可輕用

古者婦人妊子

寢不側
座不邊
立不踣

不食邪味厥有肯哉今

見稟性温良之婦有娠

不嗜慾
不縱口

生子而少病痘

稀亦可以為師法

○ 嬰子保護篇

○ 拭穢法

婦小兒生下坐婆急綿裹指拭去兒口中惡物令盡

不可遲若嚙入腹生諸疾

○ 除痰去癖之法

愚灸甘草細切水煎去滓綿裹指蘸灌兒口中令嚙
須臾吐痰涎及瘀血方與乳汁年長智睿無病也
綿既稠裹了以黃連甘草二味煎汁綿蘸令兒啞三
日則佳也

○ 臍帶斷法

愚初生氣欲絕不能啼者蓋因難產氣悶或冒寒所
致急以綿絮包裹未可斷臍帶且將胞衣置炭火
上燒之仍用大紙撚蘸油燒臍帶得火氣由臍入
腹須臾氣回方可斷浴臍帶也

婦先斷臍帶可只留三寸許帶中有小虫急去之留

之必異病或線扎定然後洗之不然濕氣入腹生臍
風
兒生三日烙臍帶三壯為中別處勿加火艾恐成驚
癩

○護臍之法

新臍之後為水濕所傷或襦袍濕氣傷於臍中或
風冷乘之臍腫多哭不乳

黃栢 釜下墨 乱髮灰
右等分為細末少許傅之

○臍風撮口証治

傳小兒臍風提口曰臍斷傷風或尿在胞中遂成臍
風發熱面赤啼聲不出名曰撮口風

赤足金頭蜈蚣一条 瞿麥五分 蝎梢四个 彊蚕七

右末鴉管吹入鼻中如嚏噴叫聲可治後用薄
苛汁調服之

○臍汁

纂臍中汁出并痛用枯礬傅之
或以黃栢末傅之

○通便之法

○初生二便不通腹脹欲絕急令婦人熱湯漱口吸

嗵小兒前後心并臍下手足心共七處每處九三五次漱口吸嗵紅赤為度須臾自通遇此法乃再生

○貼顛之法

○出胎時被風鼻塞天南星末薑汁調為膏貼于顛上病去除之

○摘泡之法

○初生下即死急看口中上腭有泡以手指摘破用綿拭淨便活若入喉不可治矣

○每白頰於無風處看小兒上腭頰內有白泡起以

指甲刮破拭淨之

○洗浴法

○小兒初生浴躰

寅卯酉日吉 壬申丁巳癸巳日凶

洗浴小兒用益母草金銀草煎汁則必不生諸瘡

○小兒浴湯冷熱失所則令兒驚亦致五藏疾矣

小兒臍帶未脫不可頻浴頻浴則水入臍中致臍風撮口

小兒新洗浴之用五根湯終身不生瘡疥

柳 桃 棟 梅 槐 謂之五根

乳哺之法

婦乳母當擇精神爽健性情和悅肉肥無疾謹節飲食安心絕欲則佳矣

愚凡初乳先須捏去宿乳○每欲寐即奪之○啼未定勿與之○乳母小兒俱禁肥甘濃厚之物


乳哺後不與乳食脾胃怯弱乳食相併難以化


幼則成嘔而結於腹中作痛大則成疳積從此始

乳母戒慎

乳母飲食下咽乳汁便通情欲動中乳脉便應若不謹節兒之病立至

良違和說





婦乳母交接即乳兒必生癖

妳婦不可頻飲酒恐小兒痰嗽驚昏

能調和乳哺者承愛護如法則病不生也

乳母初病其尿必數即須調理母安則兒安防患

於未形善之善者也

○護養之法

○天氣和暖抱之使見風日則血盛氣剛可堪風寒

○常令著地氣使筋骨壯○若厚衣過煖傷皮膚

損血脈發瘡瘍汗出滕理開風邪易入○十六歲

已前陰氣未成不遏溫飽下体主陰得寒涼則陰

易長○腸胃尚脆而窄凡魚肉麪燒炙稠粘等物

皆宜禁絕苟務姑息隨所欲積成痼疾雖悔何及

婦夫天寒用父母常著舊衣忌新綿大煖則筋骨軟弱勿令兒枕乳母臂作豆袋枕之

良乳母與兒同睡口鼻氣吹小兒顙門兒必鼻塞

母過愛，襦衣遇寒，火烘兒，必丹毒熱疾。
乳母以兒衣服，晒月下，被惡鳥羽屎落，遂成無辜之疾。
或將惡相異物，嬉戲，忽見，遂成驚忤。

○朔懷看承

○有胎中受驚，故未滿月而發驚，肉吊目睛上視，腹硬，手足抽掣，角弓反張，痰涎壅盛，名胎驚。宜辰砂研牛黃少許，乳汁調抹入口中，太妙。母服防風通聖散。

○生赤肌膚如丹塗者

先用牛黃散托裏，次用藍葉散塗外，乳母服清涼飲子。

○生黃生下，遍躄如金黃色，身熱二便不通，乳食不進，啼不止，因母受濕熱，或衣被太煖，所致宜漸減厚衣，新綿服，生地黃湯子，母俱服之。
○初生不大，便用葱尖，任入肛門內，次用牛黃散送下朱砂丸。
○鼻塞，乳汁不下，用牙皂草烏葱涎，杵成膏，貼顙會穴，甚妙。

○詳審觀察篇

○凡小兒之疾，不能言

△惟當

審脈 觀形 察色 聽聲 視手紋 詳外証

○審脈

○惠凡診小兒大指按三部一息六七至平和八九至發熱五至內塞弦脈風癩沉緩傷食促急虛驚急氣不和沉細冷浮風小大不調鬼崇浮大數風熱伏結物聚單細疳勞若風腸痛多喘嘔而脈洪有虫浮而遲潮熱者胃寒也脈亂不治變蒸之時身熱汗出不欲食食即嘔吐者脈亂無苦也

七八歲曰齒

九十歲曰髻

一息七八至為無病

十一歲至十四歲曰童非以一息五六至為常脈也

遲則為寒○數則為熱○浮則為虛○沉則為積

浮而數者為乳癩驚悸○虛而軟者為慢驚癩瘵

○緊而實者為風癩○牢而實者為便秘○洪數

者為熱○沉而弦者為腹痛○伏結為傷食○緊

而弦者為風寒○軟細者為虫疳○若氣促脈代

散亂無倫次者死在須臾而不治也

業幼斜者其可不盡心於此乎


○觀形

林觀形先視其眼若兩眼無精光黑睛不運轉目睫無鋒芒如魚眼猫眼者不治或神藏於內而外若昏困神氣不脫者無妨

○察色

補察

圖之色形



額 印堂 山根

額紅大熱燥 青色有肝風 印堂青色見 人驚
是火紅 山根青隱隱 驚主是重重

年壽

年壽上平并更陷

時人壽大亦其由

忽曰痢疾黑色候

霍乱吐瀉黃色浮

鼻準 人中

鼻準微黃此度幾

深黃死証黑應危

人中短縮吐日痢

唇及死候黑正醫

正口

正口當紅号曰平
白主失血黑繞口

燥乾脾熱即黃生
青黑驚風盡死形

承漿 兩眉

承漿青色食時驚
煩躁夜啼青色吉

黃多吐逆是真形
久病眉紅死証遲

兩眼

白睛青色有肝風
若見黑睛黃色見

有積黃色未及瞳
傷寒病後此為縱

風池 氣池 兩頤

風氣一池黃吐逆

躁煩啼叫色鮮紅

更有兩頤胚樣赤

肺家客熱此非空

兩太陽

太陽青色驚方始
要知死証是如何

紅色赤淋萌藥起
青色從茲生入耳

兩臉

兩臉黃為痰實咽
傷寒赤色紅主淋

青色客忤紅風熱
二色請詳分兩頰

兩頤 金貴 風門

吐虫青色滯頤黃
風門黑疝青驚水

二色頤間兩自詳
紋青金貴主驚狂

眉頰 唇眼

傳痢疾眉頭皺 驚風面頰紅

渴來唇帶赤 毒熱眼朦朧

山根

山根若見脉橫青 此病明知兩度驚

赤黑困疲時吐瀉 色紅啼夜不曾停

太陽 一首

青脉生於左太陽 須驚一度見推詳

赤是傷寒微燥熱 黑青知是乳多傷

右邊青脉不須多 有則頻驚怎奈何

紅赤為風抽眼目

黑青三日見閻羅

眼背搐

先望孩兒眼色青

次看背上冷如冰

陽男搐左無妨事

搐右令人甚可驚

女搐右邊猶可治

若逢搐左疾非輕

歪斜口眼終為害

縱有仙丹也莫平

鼻 面 唇 腹

鼻門黑燥渴難禁

面黑唇青命莫存

肚大青筋俱惡候

更嫌腹有直身紋

命門部位之圖




中庭與天庭
有病定存亡
不可陷兼損
昏暗亦堪傷

司空及印堂
青黑驚風惡
唇黑最難當
此是命門地

額角方廣處
体和滑澤光
青甚須憂急
醫師妙較量

面目俱青眼睛竄視
面紅唇紅惕惕夜啼
面青惡叫啣物咬牙
面色淡白喘息氣乏
面黃嘔吐不食虛汗多睡
又面部赤紅乃心氣絕蓋心屬火主炎上故知心絕
死
又胸背百會穴下有二條青脉下對耳尖久而愈青
不治
○聽聲



察聲

悲呼 是肝病

雄笑 是心病

聲歌慢 是脾病

聲哭促 是肺病

聲呻沉 是腎病

已上臟病也

聲清 是膽病

聲短 是小腸病

聲速 是胃病

聲長 是大腸病

聲微力弱 是膀胱病

已上腑病也



惠

睡中驚啼聲

浮者易治 沉不響者難治

傳

忽作鴉聲心氣急此時端的命難過氣喘汗流

林

身不熱手拿背膈定遭殃

聲如鴉中彈者不治

○視手紋

傳一歲至六歲曰嬰孩惟以

男左手 女右手 次指三關

脈以為驗病輕重死生之訣名曰虎口

第一節 二節 三節 名

一節 風關無脈則無病有脈則病輕

二節 氣關脈見則病重尚可藥治而已

三節 命關脈見則病劇九至一生惡候

也多不治 三關通度脉候是極重之証必死

次指三關之圖



一風關易治
二氣關病重
三命關死候

三關青是四足驚

三關赤是水驚

三關黑是人驚


青如魚刺在 命 氣 關 易治初驚之候黑色難治
主疴勞身熱易治
主虛風傳脾難治

如懸針 青黑在風關主水驚易治
赤色在氣關主疴兼肺積熱可治
命關凡在此脉不問五色皆死候
三關通
度如懸針慢驚難治

如水字在 命 氣 關 主 驚風入肺咳嗽面赤
驚風疴極
不拘五色三關通度者不治

乙如乙字在 命 氣 關 主 肺藏驚風易治
主驚風病重
青黑色主慢驚風難治

如曲虫在  關主
 肝病積聚
 大腸穢積
 心痛傳肝難治

如環在  關主
 肝藏疝積
 疝入胃吐逆不治
 惡候不治

此紋若在  關
 易治
 可治
 通度難治

又凡頭面上或肚腹上有大脉并青筋如此者并是食毒物及驚積難治

歌曰紫風紅傷寒 青驚白色疝 黑時口中惡

黃即困脾端

第二節紫是驚疝青紋是肝疝白紋肺疝黃紋脾疝赤紋心疝惟黑色紋為腎疝難治
 第三節青黑紋現三關通度斜入指甲者不治

○審外証

○咬牙甚者發驚○口吐涎沫而叫者虫痛○昏睡善噎將發瘡疹○吐瀉昏睡露睛者胃虛熱也○不露睛者胃實熱也○吐稠涎咯血者肺熱也○瀉青白穀不化者胃冷也○吐瀉乳不化者傷食

宜下之○身熱飲水熱在內也○身熱不飲水熱
 在外也○瀉青黃者胃熱毒也○呵欠面赤風熱
 也○呵欠面青驚風也○呵欠面黃脾虛驚也○
 呵欠而多睡者內熱也○呵欠而氣熱者傷風也
 搖頭揉目 肝熱生風 多淚憎明 三焦積熱
 鼻出清涕 肺經感寒 頰赤面黃 風傷肺熱
 盜汗頻頻 藏府虛熱 胃熱生斑 氣傷冷厥
 長嘔噦齒 風盛氣生 上竄搖頭 涎高脊結
 小便淋赤 熱聚膀胱 喉腫丹瘡 肺之受熱
 噎喫泥土 脾臟生疳 消渴口瘡 心家積熱

面黃浮腫 積氣所致 行遲語澁 胎積氣傷
 項硬肝風 氣傷水舌
 愚先視其眼無光精不運轉目睫無鋒芒如魚眼猫
 眼者不治或神藏於內而外若昏困神氣不脫者
 無妨

圖語遲心氣不足五六歲不能言 長大不得行
 肝腎虛筋骨弱 羚羊角丸 長齒不生齒乃骨餘腎所
 主腎虛而然 地黄丸 髮久不生則不黑腎衰也 地黄
 丸 尿深黃久則尿血 五苓散 尿不通久則脹滿 拾頭散
 心痛吐水虫痛 安虫丸 心痛不吐水冷心痛 理中丸

凡病先虛或合下者先實其母然後下之假令肺虛而痰實此可下先當益脾後方瀉肺

○五臟虛實証治 錢氏曰

肝主風

實則目直大呼呵欠項急頓悶瀉肝散
虛則咬牙多欠地黃丸
熱則手尋衣領亂搥物直視不搖
有風目連翳不搖

心主驚

實則叫哭發熱飲水而搖導赤散
虛則困時悸動不安粉紅丸
熱則有熱不言而有就涼之意故人口面卧
實則困睡身熱飲水瀉黃散

脾主困

虛則吐瀉生風異功散
困弱則困睡泄瀉不思食

肺主喘

實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者瀉白散
虛則噎氣長出氣阿膠散怯肺唇白
熱手搯眉目鼻面
悶亂氣喘喘促噎氣者難治肺虛損故也

腎主虛

無實也惟瘡疹腎實則黑陷百祥丸
腎虛兒本虛怯由胎氣不成則神不足目中白睛多其
顛即解面色皓白此皆難養縱長不過八之數若
恣色不及四旬而亡
虛則畏明神之

視病之虛實

虛則補母
實則瀉子

○臟氣虛實勝乘証治

小兒初在襁褓未有情慾只是形骸脆弱血氣未定

定腑臟精神未完所以有臟氣虛實勝乘之病但世俗不審此理往往為外感內傷而用藥致枉死者多矣悲夫錢論脫略幸而梨古補之

梨古曰五臟子母虛實鬼賊微正若不達肯意不易

得而入焉

在前者為實邪
妻來乘夫為微邪
本臟自病為正邪

在後者為虛邪
夫來乘妻為賊邪

○心主熱自病則大熱瀉心湯

實則煩熱黃連瀉心湯

虛則驚悸生犀散

肺乘心微邪喘而壯熱瀉白散

肝乘心虛邪風熱大卷活湯下大青丸

脾乘心實邪瀉而身熱瀉黃散

腎乘心賊邪恐怖惡寒安神丸

凡心病必先調肝腎二臟腎者心之鬼肝氣通

則心氣和肝氣滯則心氣乏此心病先求于肝

清其源也或診其脉肝腎二臟俱和而心自生

病察其心家虛實治之

○肺主燥自病則喘嗽燥則潤之

實則喘而氣盛瀉白散

虛則喘而少氣先益黃散後阿膠散

心乘肺賊邪熱而喘嗽先地黃丸中導赤散後阿膠散

肝乘肺微邪惡風眩暈昏憤嗽卷活膏

腎乘肺實邪憎寒嗽清利百部丸

脾乘肺虛邪躄重吐痰瀉嗽人參白朮散

凡肺病必先觀心之虛實若心火炎盛鑠金先

抑心氣後喫肺藥若心氣和即看脾脉若脾氣

虛冷即不能相生而肺家生氣不足則風邪易

感故患肺寒者皆脾虛得之若脾氣盛實中焦

熱隔則肺大腸不通故患肺熱者多脾實得之
心氣盛瀉之脾氣虛益之脾氣實通之故有抑
心益脾通脾三藥若診其脉心脾二臟俱和而
肺自生疾則但察肺家虛實而治之

肝主風自病則風搐拘急肝苦急急食甘以緩之

實則風搐力大瀉青丸

虛則風搐力小地黃丸

心乘肝實邪壯執而搐利驚丸涼驚丸

瀉白 地黃

肺乘肝賊邪氣盛則前晨呵欠微搐當瀉肺先補本臟

脾乘肝微邪多睡体重搖先瀉育丸搖止且後証治之

腎乘肝虛邪憎寒呵欠搖卷活膏

凡肝病必先察肺腎二臟根其病所起腎者肝

之母金者木之賊今肝病若非腎水之不能相
生必是肺金之鬼來相攻擊其來在肺以其鬼
其來在腎滋其根然後審其肝家本臟之虛實
而寒溫之

脾主濕自病則泄瀉多睡体重昏倦脾苦濕急食
苦以燥之

實則泄瀉赤黃睡不露睛瀉黃散

虛則泄瀉白色睡露睛白朮散

肝乘脾賊邪風瀉而嘔茯苓半夏湯

心乘脾虛邪壯熱体重而瀉卷活黃芩蒼朮甘
草湯

肺乘脾實邪能食不大便而嘔枳榔湯下葶藶
丸

腎乘脾微邪惡寒而泄理中丸

凡脾病必先察肝心二臟之虛實根其病之所起肝是脾之鬼心是脾之母肝氣盛則鬼勝心氣虧則脾家生氣不足盛者抑之虧者益之診其脉肝心二臟俱和則是脾自生病察其虛實而治

○腎主寒自病則足脛寒而逆

人之五臟惟腎無實小兒瘡瘡變黑陷則是腎實水尅心火是以水能制火也
心乘腎微邪內熱不惡寒桂枝丸
肺乘腎虛邪喘嗽皮溢寒百部丸
肝乘腎實邪拘急氣搖身寒理中丸
脾乘腎賊邪體重泄瀉身寒理中丸
本臟虛弱是自己正令不行乃鬼賊之所尅害

當補本臟之正氣腎病必先求之於肺若肺臟安和而腎忽然受病者不過脾之濕相刑於腎而生病若脾肺二臟俱和而腎自病則察其本臟而治之

○大抵五臟各


至本位即氣盛不可更補
至所尅位不可更瀉

○變烝証候

變烝有十變五烝者乃生精神意智也俗謂之牙生骨長如蚕之有眠龍之脫骨虎之轉爪
丹溪曰是胎毒散也
每變烝為虛熱諸証
有胎氣壯實暗變而無發証者
此

骨脉藏府由變而全胎毒亦因變而散也

○夫小兒之初生



未



分挽之後每

三十二日一發熱或



此為長血脉全智

惠之常候不須治而自愈

諸家所論自生之日始每三十二日一變凡人有三
百六十五骨節除手足四十五碎骨外正有三百二
十骨自生下骨而上一日十骨三十二日乃為一變
骨氣始全一歲生一歲或一府十變則藏府始足為

兒醫者可不審乎

小兒在母腹乃生骨氣藏府成而未具全自生之後
即長骨脉藏府神智變者易也生變者自內而
長自下而上每變畢情異於前也三十二日為一
周十周則小蒸畢計三百二十日生骨氣乃全而
未壯

一變生腎志

二變生膀胱

耳聾冷

三變生心喜

四變生小腸

汗出微驚

五變生肝呼

六變生膽

目不閉

七變生肺聲

八變生大腸

膚熱而汗

九變生脾智

十變生胃

不食腸痛吐乳

此後乃齒生言知喜怒

其治 不汗而熱者發其汗 不可別治 大吐者微下

林心包絡三焦俱無形狀故不變蒸也

變主裏 始得之上唇有白珠泡子身熱微驚或嘔

變兼蒸主表 始得之上唇微腫身熱額熱或乍涼乍熱唇口鼻乾哽氣逆時驚多帝

十三日

三大蒸主表裡 唇口乾燥效閉哽氣腹痛

前，十變五蒸既訖後又有三代蒸

六十四日為一大蒸計二百八十四日

又六十四日為二大蒸計四百四十八日

又六十四日為三大蒸計五百一十二日

至五百七十六日變蒸既畢

所以變者生五藏也變而蒸者養五藏也兒乃

成人也

變蒸之時切不得艾灸即宜少與乳食亦不可妄投藥餌若不依此必致殺兒

玉變者上氣蒸者躰熱變蒸有輕重

輕者躰熱虛驚耳冷微汗唇中白泡狀如珠子重者寒熱脈亂腹疼啼叫不能乳食輒吐

袖變蒸者陰陽水火蒸於血氣而使形躰成就是五藏之變氣而七情之所由生也

○顛陷顛填証治

袖顛陷者曰藏府熱飲水漿致泄痢久則血氣虛不能上充腦髓故陷不滿。用狗頭骨炙黃為末雞子清調付之

顛填者腫起也脾主肌肉乳哺不常飢飽無度或寒或熱乘於脾家藏府不調其氣上衝為之填脹顛突而高毛髮短黃自汗是也。防風栢子仁白及各末乳汁調塗顛上十日愈

傳顛門腫起定作風此候應知最是凶忽陷成坑如盞足未過七日命須終

○解顛証治

袖解顛生下而腎氣不盛長必少突白睛多眦白色者多愁少喜年大頭縫開解而不合腦不足也人無腦髓猶木之無根。細辛桂心乾薑各末乳汁調付顛上乾則再塗面赤則愈

解顛曰母氣虛與熱多也用八物加酒炒黃連煎服以帛束緊白斂傳之
○壽夭弁察

園凡小兒三歲已上十歲已下視其性氣高下即可知其壽夭

初生

叫聲連延相屬者壽
聲絕而復揚急者不壽

啼聲散啼聲深汗出不流頭四破尿凝如脂膏常搖手足頭毛不周匝者並不成人

小兒回舒轉首遲滯費人雕琢壽相也

小兒預知人意身輕力懦者難養也

枕骨不成能言而死
尻骨不成能偃而死

小兒初生

掌骨不成能匍匐而死

踵骨不成能行而死

臏骨不成能立而死

金小兒陰大而黑與身色相等者可養之子也

黑睛大白睛少面黑眼中黑白分明壽相也

小兒陰小而白者難養之子也

白睛大黑睛少面眈白非壽相也

○小兒惡候

林一十五候歌

眼上赤脉 下貫瞳人 顛門腫起 兼及作坑

鼻乾黑燥 肚大青筋 目多直視 視不轉睛
指甲黑起 忽作鷓聲 虛舌出口 齒齒咬入
魚口氣急 啼不作聲 虻虫既出 必是死形
用藥速救 十無一生

察小兒中風熱喘鳴肩息脉緩生急死

小兒痢疾脉浮大腹痛者必死

乳子病熱脉懸小手足溫則生寒則死

小兒困汗出如珠著身不流者死

小兒有病胸陷口唇乾目直視口中氣冷頭低卧
不舉身手足垂軟身体強直掌中冷皆不治

愚小兒無故驚起忽然大叫是火大發其氣虛甚故
也必死

傳痘五不治

痒塌寒戰咬牙渴不止 痘紫黑色喘喝不寧

灰白色陷頂腹脹 頭温足冷悶亂飲水

氣促泄瀉渴

○雜病証治篇

○驚風因源

傳經曰諸風掉眩皆屬肝木夫小兒八歲已前日純
陽蓋其真水未旺心火已炎故肺金受制而無以

平木故

肝木常有餘而脾土常不足也

父母失於保養

衣服寒暄不調外邪侵襲飲食飢飽失節中氣損傷

故急

慢驚風之候作矣

○急慢驚風辨論

傳夫急慢驚風屬

肝木風邪有餘之証脾土中氣不足之候

治宜

清涼苦寒瀉風藥中和甘溫補中劑

急驚之候目聞不常之聲或馬禽獸之吼以致面青口噤或聲嘶而厥發過則容色如故良久復作○身熱面赤引飲口鼻中氣熱二便黃赤惺惺不睡○蓋熱甚則生痰痰盛則生風偶因驚而發耳

宜用利驚丸瀉青丸宜風散

慢驚之証多因飲食不節損傷脾胃以致吐瀉日久中氣大虛而致驚搐發則無休止時其身冷面黃不渴口鼻中氣寒二便青白昏睡露睛目上視手足瘰癧筋脉拘急○蓋脾虛則生風風盛則筋急俗名天吊風者即此候也宜用黃耆湯參朮湯白朮散

錢氏謂

急驚慢驚

為

無陰之証心經實熱也無陽之証脾土虛甚也

天民按小兒急慢驚風其虛實寒熱如天淵之隔故急驚者十生一死慢驚者十死一生俗醫不諳此理混為一

途而治誤人多矣

丹溪曰 慢驚養脾參朮煎湯下安神丸

急驚養血藥作湯下降火清痰丸子

惠急驚陽証也俱腑受病客痰熱於心膈宜降火下痰養血○小兒急驚方搐不用驚惶但扶持不可擒捉蓋風氣方盛恐流入經絡或至手足拘攣擺跳口中出血尋衣摸躄噴藥悶亂心中痛絕忽大叫者不治

慢驚陰証也臟受病尔雖靜乃危一名瘈瘲似搐而不甚搐面青白身冷口氣冷多啼不寐目上視牙

噤嘔涎或自汗多且病後或吐瀉脾胃虛損宜温白丸等藥○或肢冷吐瀉加嗽面黯唇慘胃痛稿聲口舌白瘡髮直頭搖喘急痰響口眼手足一邊牽引者不治

陽動而速故陽病日急治之合涼瀉陰靜而緩故陰病日慢治之合温補 俗以一藥通治之甚妄

○合病戒偏治

因身凉脉浮沉精神倦怠不吐不瀉又能乳食發搐者亦是半陰半陽合病正如傷寒半是表半是

裏也

有急驚涼瀉不愈或與吐下藥太過變為慢驚
有慢驚溫補不愈或與溫補劑太過變為急驚
况小兒藏氣未實而有夾火夾熱夾痰夾食
病自不同至風邪內陷入藏入府亦與中風相似
故治此者本錢氏虛實補瀉法不致犯禁之誤藥
有太過不及之失

○急驚風治方

利驚丸治急驚風神效

天竺黃 二小 輕粉 青黛 各一 黑丑 頭末半
兩生用

右研勻蜜丸如梧子大一歲一九三歲二九五
歲三丸溫薄荷水下食後

瀉青丸治肝熱急驚搐搦等証

羌活 大黃 煨 川芎 梔子 龍膽

當皈 防風 各等分

右細末蜜丸如芡實大每服半丸竹葉湯下

宜風散治急驚風搐搦不定

枳榔 二枚 陳皮 五 甘草 一 黑丑 四兩半
生半炒取頭末二兩

右細末蜜湯調下半匙食前

黃香湯 治慢驚風之神藥也

黃耆二斤 人參一斤 甘草一斤 加白芍藥一斤

右細切作一服水一椀煎至半椀食遠服

上三味皆甘溫能助元氣甘能瀉火經曰熱淫

于內以甘瀉之以酸收之白芍藥酸寒寒能瀉

火酸味能瀉肝而大補肺金所補得金玉之位

大旺火虛風水何由而來尅土然後瀉風之邪

白朮散 治積痛和胃生津止瀉頻瀉利將成慢驚風者服之奇効

人參 白朮 木香 茯苓白 甘草炙 藿香

各二斤 干葛二斤

右細切分二服水煎溫服

益黃散 治風水旺右關脉洪大掌中熱腹皮熱或

寒水乘脾土嘔吐腹痛瀉利青白亦可瀉火補金大

補其土是為神治之法

黃耆二斤 陳皮香 人參各一斤 白芍七分 生甘

灸甘各五分 黃連少許

右細切水煎食前服

安神丸 治邪熱驚啼心疳面黃頰赤壯熱

麥門冬 馬牙硝 白茯苓 山藥 寒水石

灸甘各半 辰砂一兩 龍腦一字

右為末蜜丸糖水化下慢驚用參朮煎湯化下

○林中誠驚風不治証


林項筋無力 魚口氣麤 啣齒咬入 瀉如瘀血
目似開不開 身軟口噤 不食 木舌乾澀
反張脊強 顛陷不動 啼不作聲 冷汗如油
至如慢脾 灸之不醒 視不轉睛 眼上赤脉
皆不可治

○慢脾風証辨

林小兒慢風蓋為吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟
脾所受故曰慢脾若逐風則無風若鎮驚則無驚

但脾間痰涎虛熱往來其眼合者脾困氣乏神志
沉迷痰涎凝滯而然

一云九小兒頭雖溫



而足冷已上

五証忽然吐而作搐者名曰慢脾風速與補脾益
真湯一服每服三劑更加全蝎一枚○身冷粘汗
出直臥如尸喘嗽頸軟二便不禁虛痰上攻氣麤
者不治○且慢脾十救三抵當生胃回陽

補脾益真湯 治小兒胎稟怯弱外實裏虛吐沫糞

便青色而成慢風氣逆涎潮直視四肢抽掣或因
變蒸各件而作或曰特拘驚嚇而作或曰誤服鎮
心寒涼藥而作

木香 當歸 人參 黃耆 丁子 訶子

陳皮 厚朴 甘草 肉豆蔻 草果 茯苓

附子 炮各七分 全蝎 去毒微炒每服用一個

右咬咀每服三升水盞半薑二片棗一枚煎熟
服服訖心腹揉動以助藥力候一時久喫乳食
○渴者去附子丁子豆蔻加苓參○瀉者加丁
子訶子○吐者加丁子半夏陳皮○腹痛者加

厚朴良薑○腹脹者加厚朴丁子前胡枳殼○咳
嗽加前胡五味子去附桂果蔻○痰喘加前胡枳
殼赤茯苓去附丁蔻果○足冷加附子丁子厚朴
○氣逆不下加前胡枳殼去附歸蔻○惡風自汗
加官桂黃耆

○搐發証治

男發搐目

女發搐目

左視無聲
右視有聲
左視有聲
右視無聲

相勝故也更看所發時

早晨發搐目寅卯辰時潮熱目上視手足動搖口流
熱涎頸筋急此肝水太旺當

地黃丸補腎
瀉青丸抑肝

日中發搐回巳午未時潮熱心神驚悸目上視白睛
 赤色牙緊口涎四肢動搖此心火太旺地黃丸補肝
 目晚發搐自申酉戌時潮熱搐而喘目微斜視睡則
 露睛肢冷大便下淡黃水此肺病補脾益黃散
 夜間發搐因亥子丑時潮熱不堪搐而卧不穩身體
 温無壯熱目斜視喉痰大便銀褐色乳食不消多
 睡不醒益黃散補脾
 傷風發搐口氣熱呵欠頓悶肢搖大青膏散之
 食發搐身温多睡多唾吐而不食先退搐初日餅子
後安神丸

真者内生驚癇不過三二次必死

百日内發搐有真假二証

假者外傷風冷蓋血氣未實不能
 勝邪發搐口氣熱大青膏散之

地黃丸治肝疳腎疳小兒年長不能行神効

熟地 山茱萸 山藥 澤瀉 牡丹

白茯苓 各三

右為末蜜丸熱水空心下

導赤散治心熱

生干地黃 木通 甘草 各

右細切入淡竹葉水煎食後温服一本無

益黃散治脾胃虛寒脾疳体黃腹大好食泥土肺疳

氣喘口鼻生瘡等証

陳皮一各 青皮 訶子 甘草灸各 丁子二分

右細切水煎溫服天民每加參朮各一各神効

白餅子治小兒腹中有癖但飲乳嗽而生痰

滑石 輕粉 半夏洗 南星各一 巴豆二十四個去皮心炒

右研巴豆後入衆藥末飯丸薄苛湯下

○驚搐先証

目眩目白目青目斜目闕目轉目瞪声焦声嘎声顫聲輕啞口弄口搯舌露筋哽氣噎氣撮唇噎乳噎食忽定睛吐涎仰身搖頭擦面藏頭畏明手攣

手顫足攣不伸恍惚精神失張眠睡不寧睡中喜笑心煩啼哭咬人面臉弄色或紅或青伸舒用力微微作聲有已上候驚搐先証也預防之

夫驚搐在陰陽兩証陰者拇指在內陰拳逆陽者拇指在外陽拳順也

凡身體壯熱耳輪鼻尖及肢梢俱冷忽發搐者此非驚是痘搐也○斑疹能發搐風火相爭故也

○五癩察療

傳九治小兒五癩皆當隨臟治之每歲各有一獸所屬

犬癩反折上竄犬叫肝

如

羊癩目瞪吐舌羊叫心
牛癩直視腹滿牛叫脾
雞癩驚跳反折手縱雞叫肺
猪癩口吐沫猪叫腎

也五色丸治之

五癩重者死○病後甚者亦死

廢手足如癱或口喎

傷內食肢搐角弓反張大聲吐食方定

癢頭目牙口目或一或昏或邪視

似狂耳不聞目不視如夢如醉或日發

手足搐動食不知飽寐中發飽亦發

灸法治急慢驚風危証及諸癩瘕病縮帛縛兩手足
大指甲角縫半甲半肉之間艾灸三壯先足後手

或髮際或顙會或神庭

五色丸

辰砂 別研 各五 水銀 二各半 雄黃 一兩

黑鉛 二各半 同水熬

右煉蜜丸如麻子大每服三丸薄荷湯下

○天齋証治

林小兒壯熱翻眼手足搐制如魚之上鈞皆由乳母
過食熱毒即乳兒兼挾風邪所致解利風熱則應
手而愈○小兒蘊熱痰塞經絡頭自仰名爲天吊
乳香雄黃白朮甘草荆芥人參天麻之類主之

○吐瀉因証治

傳經曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱。又曰濕勝則濡泄。夫兒之吐瀉皆由乳食過度傳化失常蓋食鬱則成熟熱鬱則酸酸而成吐此必然之理也

又曰食滯於

胃口者為吐
大小腸者為瀉

有生下而遂吐不休者胞胎中穢惡流於腸胃為吐也丹溪曰錢氏五補五瀉之法俱可選用小兒初生下吐蓋口中穢惡拭掠不盡嚥入喉中故

吐木瓜丸主之

木瓜未 木香未 射香未 輕粉 檳榔未各一字

右再研勻麩糊丸黍米大每服二丸甘草湯下

初生三日內吐瀉壯熱不乳大便不消或白色知是

傷食當下之而後和胃下白餅子

初生三日已上至十日吐瀉不乳乍熱乍涼大便青

白不消益黃散

吐瀉泄黃傷熱乳 皆白餅子下之而後

泄青傷冷乳

玉露散
益黃散

玉露散 石膏 寒水石各半 生甘草二各半

右為末每服一匙溫水調下

嘔吐吐乳不止恐脾風白朮散或掌中散

驚吐目驚而吐乳面青安神丸藿香湯下

冷吐益黃散姜棗煎服

積吐脾胃傳食不化所吐酸臭益黃散姜梅湯服

熱吐熱湯發吐小柴胡加生姜

交吐父母交後即乳兒吐乳眼慢糞穢氣四君主之

泄瀉錢氏補瀉俱可用丹溪曰頻瀉將成慢驚用白

朮散

驚瀉回驚而瀉用丹溪方

積瀉瀉下極臭穢腹痛宜消積

冷瀉藏府虛冷洞泄如水宜白朮散

熱瀉口渴尿赤或五心熱宜五苓散

疳瀉瀉如爛泥肚緊用蟾蜍丸

腎瀉面黑齒消脫骨力弱腹痛多泄白膿

傳小兒吐瀉若不須下者即用溫中丸

人參 白朮 各一分 甘草 一分

右為末麩糊為丸粳米飲下

惠掌中散 治吐乳

白豆蔻 砂仁 各十粒 甘草 一分

右為末安掌中乾嗽牙兒乾摻口中

○腹脹証治

傳小兒腹脹由脾胃虛氣攻作也

實 腹脹 悶亂喘滿可下之
虛 不喘滿不可下若誤下脾虛氣上附

肺而行肺與脾子母皆虛肺主目胞腮 脾主四肢之類

母氣虛甚則目胞腮腫也色黃者屬脾治用搗氣

丸漸消之不可以丁子木香桂枝大溫散藥治之

蓋脾虛氣未出腹脹而不喘者可以溫散藥治之

上下分消其氣則愈若虛氣已出附肺而行則脾

胃內弱每生虛氣入於四肢面目矣

小兒易為虛實脾虛不受寒溫

服寒則生冷証
服溫則生熱証

胃又虛熱多生疽病或引飲不止

脾虛不能勝濕隨肺之氣上行於四肢若水狀濕

氣浸浮於肺則大喘當服搗氣丸而愈

搗氣丸治小兒虛脹如腹大加蘿蔔子

胡椒一兩 蝎尾去毒 半兩

右為細末麵糊為丸如粟米大每服五丸米飲

下

○方治腹脹

蘿蔔子 紫蘇梗 乾葛 陳皮各等分 甘草少許
右細切水煎服食少者加白朮

○腹痛辨治

憲腹痛丹溪云多曰邪正交爭 臟氣相擊而作有挾熱挾
冷又云多是飲食所傷

挾熱作痛面赤或壯熱手足心熱四順清涼加青皮 枳殼
挾冷作痛面或青白冷甚面黑指爪青理中湯

傳治飲食所傷腹痛

白朮一糸半 陳皮 青皮 山查去核 神曲炒

麥芽炒 縮砂各一糸 甘草炙半

右為末清米飲 或白湯調下有寒加藿香吳茱 熱加黃芩

腹痛口氣温面黃目無精彩及多睡畏食或大便酸
臭當磨積白餅子下之後和胃白朮散

心腹痛面皸白口中清水出發痛有時蛇虫痛也小
兒本怯故胃冷虫動而心頭痛與癩略相似但目不
斜手不搖耳安虫散主之

安虫散 宝鑑用米糊為丸名安虫丸

黃粉炒黃 檳榔 川練子去核 鶴虱各二兩 枯丸二糸半
右為末臨痛時米飲下

夜啼証治

傳小兒夜啼心經

有虛 有熱

人參

黃連

炒姜

甘草

竹葉

二十片

右細切入生姜水煎服

一本無人參

一方

燈花

三顆

以乳汁調抹兒口或抹乳上令兒

吃之

○兒痰辨治

傳小兒風痰壅盛

南星

五斤切片

以白礬湯泡曬乾

白附子

二兩

小兒痰熱骨蒸

右二件共末麩糊丸姜蜜薄苛湯化下

二陳湯

半兩

加升麻

二斤

葛根

白芍

各一斤半

人參

一斤

五味子

三十粒

右細切分三貼加姜棗水煎服

○吃泥

傳小兒吃泥胃氣熱也

石膏

芩

陳皮

苓

朮

各等分

右細切水煎溫服

○咳嗽辨治

各通卷八

三十九

○惠治嗽大法盛即下之更量虛實以意增減

有肺盛者咳而後喘面腫欲飲水有不飲水者其
身即熱以瀉白散瀉之

有肺虛者咳而哽氣時時常出氣喉中有聲此久
病也以阿膠散主之

有嗽而咳膿血者乃肺熱食後服甘桔湯久嗽者
肺亡津液阿膠散補之

有嗽而吐水或青綠水者以百祥丸下之

○咳逆因治

○惠咳逆上氣曰乳哺無度內夾風冷傷於肺氣或啼

叫未定與乳飲之乳與氣相逆氣不得下用紫蘓
飲

○脫肛奇治

用東壁土泡湯先薰後洗

一方用五倍子為末付而頻托入之

一方用鱉頭燒存性香油調付

○口瘡治法

○傳小兒口瘡用黃栢細辛各等分為末付之

白屑滿舌及兩脇名鵝口用髮纏指頭醮井花水

拭口令淨以煨過黃丹搽之即愈

一方用黃連為細末蜜水調服

○牙疳治法


一方治走馬牙疳 枯礬 黃丹 京棗 連核燒存性 共為末付之

一方用白礬置於五倍子內煨過為末付之

○重舌 木舌 証治

林重舌乃心脾熱也蓋脾之脈絡出於舌下 故心脾熱則血氣俱盛附之根而重生一物形如舌而短小曰重舌○著頰及上腭曰重腭著牙齦曰重齦○木舌者其舌腫大而滿口中緊硬也

治法皆當鍼刺去其血也



傳鍼舌下紫脉出惡血即愈

竹瀝調蒲黃末付之

○弄舌

林脾臟微熱令舌絡微緊時時虛舌舐之治之勿用冷藥及下之當少與瀉黃散漸服之○或飲水鑿

疑為熱非也飲水者脾胃虛津液少也

又如面黃肌瘦五心煩熱弄舌即為疳黃胡黃連九
加減用之

大病後弄舌者凶

瀉黃散

藿香

七分

梔子

一分

石膏

半斤

甘草

七分半

防風

四分

右細切作一服用蜜酒炒香熟以水一盞煎至
半盞時時與之

○齒不生

林

齒者骨之餘髓之所養稟氣不足則髓不能充於骨
故齒又不生

芩黃散 治小兒久齒不生

川芎

當歸

白芍

地黄

山藥

各一兩

沉香

五分

粉草

三斤

右為末温塩湯調服半錢仍用少許擦牙根

一法雄鼠糞三七粒兩頭每日用一粒揩齒根上至

二十一日當生

○語遲

林小兒在胎其母卒有驚怖邪乘心舌本不通長四

五歲猶不能言，菖蒲丸治之。

人參 菖蒲 麥門冬去心 遠志去心 姜汁炒

川芎 當歸各三 乳香別研 辰砂別研 各一名

右為末煉蜜丸如麻子大，米飲下十九。

○行遲

林乃稟氣氣血不充 骨髓不滿 軟弱不能行

或肝 俱虛肝主筋 筋弱不能束 腎主骨 骨弱不能載 故行遲

也宜地黄丸方見前 又用五加皮散

虎骨丸 治小兒筋骨虛弱行遲

虎骨酒灸 赤 當歸 川芎 桂心

酸棗仁酒浸 炒 生地黄 白茯苓 防風

牛膝各等分

右為末煉蜜為丸如麻子大，每服十九，或酒下 木瓜

湯下

○脚拳不展

林乃稟受腎氣不足，血氣未榮，脚指拳縮無力，不能

伸屈，宜牡丹、地黄、牛膝、山茱補骨，右剉煎

○手拳不展

蓋稟受肝氣怯弱，致兩脉攣縮，兩手伸展無力，宜

飯芫、薏風、羌、酸棗

○鶴節

林乃稟受不足血氣不充故肌肉瘦薄骨節呈露乃得之腎虛精髓內枯膚革不能榮為邪氣所襲日就枯悴其始如鶴脚之節宜地黄丸方在前

○滯頤冷熱

林

乃口涎常流而瀆於頤頤也
○涎者脾之液脾胃虛冷故流涎不能收約宜温

脾散

半夏湯泡 丁香 木香各五 白姜蚕
白朮 青皮 陳皮各二

証熱

右為末糕糊丸麻子大每一歲十九米湯下

○通心飲通心氣利小便退潮熱分水穀

木通去節 連翹 瞿麥 梔子 甘草

黃芩

右等分細剉水煎温服
春加蟬蛻防風
夏加茯苓車前
秋加牛蒡子外麻
冬倍翹梔

○項軟筋軟

林治項軟 五加皮末酒調塗敷項脊上

一方 附子去皮 南星剉等
右為末薑汁調貼項軟處

肝膽風熱致令筋軟

小茸丸 治胎中受熱遍身筋軟

鹿茸 菴蓉 牛膝 木瓜 兎絲 地黄

當歸 天麻 杜仲 青塩各等分

右為末煉蜜丸塩湯化下

○脫囊

惠

脫囊腫大墜下不取用紫蘇莖葉為末水調付荷葉包之

又野白蘇葉末

濕則摻之 乾則香油調付

錐皮潰子墜

皆神效

此用紫蘇亦同力也

○戕病

惠戕病孕婦被惡祟導其腹中致令兒病其証下利

寒熱去來或令兒喫孕母乳亦作此病宜龍膽湯

龍膽 柴胡 黃芩 釣藤皮 桔梗 芍藥

甘草 茯苓各二 蠅娘二 大黃二兩濕紙裹煨

右細切水煎服之得利即止量大小多少與服

○丁奚哺露証治

惠

手足極細頸小脊高尻削休痿臍突胸陷啼叫或生穀癥是名丁奚

虛熱往來頭脊分開飀食吐虫煩渴嘔噦是名哺露

二者皆無辜種類之疾最為難治宜十全丹救

之

青皮 陳皮 蓬朮煨 白豆蔻 川芎

五靈脂 枳榔 芦荟各五 木香

史君子焙 蝦蟆灰各三

右為末猪膽汁浸蒸糕丸麻子大每服二十九
米飲下

○龜背龜背

傳 龜胸乃肺熱脹滿攻於背膈胸高如龜

蓋乳母多食酒麪熱物得之

加芩瀉白散 治小兒龜背

桑白皮蜜水拌炒 地骨一 甘草炙半

加黃芩一

右細剉水煎溫服

傳 龜背小兒生下客風入脊逐於骨髓即成龜背治

之以龜尿點背脊骨節即平

取龜尿法用蓮葉置龜於上尿自出或令向龜於

明鏡則必尿出

灸肺俞三五壯

○尾骨痛 集

醫火盡處太陽所適於此尾骨痛屬陰虛有痰
陰虛補血四物加炒栢酒知少桂為引痛不止加乳
沒
有痰二陳加知栢澤必用前胡木香為引陰虛故痰
甚也痛不止亦加乳沒

○中惡 惠

小兒中惡卒死 以葱白內下部及鼻中立活

○客忤 林

小兒神魂微弱外邪客氣卒暴觸忤口吐青黃白沫
面色變易喘腹痛反側癱瘓狀似驚癇但眼不上窺

視其口中上腭左右若有小小腫泡

即 竹針刺之
指甲摘破 服蘇香圓姜湯化開頻頻與服

安神丸亦可方在前

一方 竈心黃土 蚯蚓糞 等分

右研細水調塗兒頭上及五心

○癩疾 惠

小兒癩疾與大人同法施治但藥劑減少耳

○痢病

林小兒痢病逐積解熱依大人治法施療
逐積紫霜丸脾積圓之類

解熱連栢赤芍芍苓榆之類

○凡小兒痢疾亦作食積論之

初得時木香煨榔丸下之而後用木芍苓

甘滑石

裏急後重加煨殼木香

久不止者用豆蔻 粟殼炒黃

史君子丸 治臟腑虛滑疳瘦下痢此安虫補胃治

疳肥肌

史君麩煨取肉一兩厚朴製甘草炙

陳皮一青黛如熟驚熱瀉用之

訶子各五分半生半熟

右為末煉蜜為丸米飲化下

○霍亂

小兒霍亂治法與大人同宜詳証撰用

來復丹能通暢三焦分陰陽兼治反胃嘔吐中暑昏

亂

若吐瀉後已覺虛損若虛發熱必變慢脾用米飲

下特效

若胃氣已衰四君加陳皮調理

○諸汗

發熱自汗虛煩宜入參黃耆散

人參 黃芪 白芍 各五 甘草 三

右咬咀入浮麥三十五粒水煎溫服

盜汗 睡而汗出肌肉虛也止汗散

胃怯汗 上至項 下至臍 胃虛也宜益黃散 左在

六陽虛汗 上至頭 下不逾背 不須治之

○痞癖 林

因寒溫不調乳哺失節或啖糯米食生冷瓜果脾胃
微弱不能消化致五臟不利三焦壅滯腹內結硬或
發寒熱如瘧漸致羸瘦

木鱉膏 治痞癖

木別子 多用 去壳 獨蒜 半 雄黃 半

右搗為膏入醋少許蠟紙貼患處取積後調理

宜

異香散 治腎氣不和腹脇膨脹痞悶噎塞喘滿不

快飲食難化噫氣吞酸一切氣痞腹中刺痛能破

癥瘕結聚大消宿食沉積調五臟三焦和胃進食

蓮肉 一兩 莪朮 煨 三稜 炮 益智 炒

甘草 炙各六兩 青皮 陳皮 各三兩 厚朴 製二兩

右細末每服二勺姜棗湯水煎溫服

灸法

灸乳下一寸左右各三壯

小兒癰氣久不瘥宜灸中脘一穴章門二穴各七壯

臍後脊中灸二七壯

治小兒脇下滿瀉利躄重四肢不收瘰癧積聚腹痛不嗜食寒熱灸脾俞二穴各七壯

○浮腫小便不利

林惠小兒通身浮腫小便不利以五苓散加燈心長流水煎時時灌服小便利則愈更於無風處頻浴汗出腫消餘並依大人浮腫參治

○丹毒一名赤瘤一名赤遊風

林惠小兒丹毒赤腫身熱如火由風熱毒氣在於腠理搏於血發於外其皮上熱而赤如丹塗之狀若治不得其法肌肉壞爛毒氣入腹則殺人矣

藍青 知母 甘草 杏仁 梔子 黃芩

升麻 柴胡 寒水石 石膏 赤芍 羚羊

角 生地黄 麥門冬 黃連 黃柏之類

細剉煎服

青黛土朱為末井水入蜜調敷

又大黃 朴硝 浮萍 水苔 梔子 生地

研爛蜜水調敷

林小兒赤遊行於上下至心即死杵菘菜傳之

修真秘旨 治小兒丹瘤 蓖麻子五個 去皮研入

麪一匙水調塗之甚妙

廣利方 治小兒火丹熱如火透腰杵馬齒莧傳之

日二

惠五種丹毒如三日不和攻入腸胃則不可治

纂小兒赤瘤熱毒鬱結肉間發於皮膚赤如榴

宜用生地 通荆芍 桃 苦寒帶表之劑

外芩翹連之前湯入芒硝泡洗之

又以芭蕉根汁塗之

海上方 治小兒丹毒腫痛如火 大黃朴硝細沫

水調敷之

○遍身赤腫

林小兒遍身赤腫乃是久伏熱毒之氣防其入腹之

腎則殺入宜

防已散

防已五斤 朴硝 犀角 黃芩 黃芪 升麻各二斤

右咬咀入竹葉五片水煎與服

○耳後月蝕瘡

林治小兒耳後月蝕瘡

胡粉和玉塗上

黃連末傅之

惠 黃連枯礬細末付之

○癬瘡 附胎毒瘡煉銀癬

惠 妳癬用赤芍 黃連 蛇床子 等分 輕粉 少許

右為末油調付

胎毒瘡小兒一二歲內頭滿延乃遍身生瘡皆因在

胎中父母恣情交合所致

先與化毒丹消毒飲 方在痘部

却用父小便以鵝翎刷洗青黛末乾擦之效

眉叢中生瘡名曰煉銀癬穿山甲前膊鱗灸焦為夫

入輕粉少許油調付

○癩頭 附白禿不髮

樽小兒癩頭用通聖散酒拌焙乾每服一不煎服外

以燒紅炭入水中乘熱洗之更以胡荽子伏龍肝

懸龍尾黃連白礬為抹油調付之

又松樹厚皮燒存性二兩黃丹一兩枯礬黃連大

黃各五不輕粉二不共末熱香油調付

惠 小兒白禿瘡先剃頭去瘡痴死血出盡河水洗搥

乾用輕粉韶粉付

頭禿瘡秘灸

耳後或腦後傍摸有核如彈按之不痛當頭灸五
七壯如幼少三壯即頭禿瘡不發

一方治白禿瘡及髮中生癬取熊脂付之

林治小兒白禿頭瘡團團白色以牛屎傅之

子母秘錄 治小兒白禿瘡搗榆白皮醋和塗之虫

即出髮即生

傳治小兒白禿髮不生汁出滲痛濃者陳香薷汁少
許和胡粉傅上

千金方 治小兒頭無髮鯽魚燒末醬汁和傅之

○諸熱証治

潮熱者胃熱也時發時退來日依時發

熱此欲發驚也地骨皮散主之

地骨 知 柴 參 苓 半 甘 等分

右細剉水煎

壯熱者心熱也一向熱而不已甚則發驚癇也導赤

散主之

一云觀其睡口中氣溫或合面睡及上竄咬牙昏

冒心熱也導赤散主之有就冷之意故合面而卧

風熱者肝熱也身熱而口中氣熱有風証入參生犀

散主之方在後

一云肝熱者尋衣捻物瀉青丸主之

肝熱目視不搖瀉青丸主之搖導赤散

濕熱者脾熱也但溫而不熱也瀉黃散主之

肺熱者手搯眉目鼻面甘桔湯主之

桔梗 五升 甘草 一兩

右細剉水煎溫服

肺盛復有冷風背滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺瀉白散主之後發散風冷肺只傷寒則不胸滿

肺虛熱唇深紅色少服瀉白散

肺臟怯唇白色宜補肺阿膠散主之

若悶亂氣粗喘促噎氣者難治肺損故也

脾肺病久則虛而唇白脾者肺之母也母子皆虛不

能相榮故名曰怯肺主唇白白而澤者吉如枯骨死

厚丹溪云

上竄搖頭咬牙心熱連甘額上紅心熱連目連

閃肝熱柴風甘左腮紅肝風瀉青丸右腮紅肺

風瀉白散鼻上紅脾熱瀉黃散頰下紅腎熱知

栢甘五心煩熱傷食証也

濕熱肖膈煩滿皮膚色如橘黃睛白赤黃加減瀉黃散

骨蒸熱及病後餘熱 ㊦

小兒骨蒸肌膚頰赤口乾日晚潮熱有盜汗五心煩躁四肢困倦飲食雖多不生肌肉及大病餘毒不

解或傷寒後食肉體熱不除宜生犀散

大黃 蒸焙 鱉甲 醋炙 麥門冬 黃芪 秦艽

犀角 鎊 桑白 人參 茯苓 地骨皮

赤芍 柴胡 枳殼 各等分

右咬咀入青蒿少許水煎○一方有知母○有痰加半夏

一方犀角 地骨 芍 柴 葛 甘 各等分

右咬咀入薄荷水煎 瘧疾生 姜煎服

○通治例

㊦四君子湯 調脾胃進飲食隨証加味量兒大小用之

人參 白朮 白茯苓 甘草 各等分

右咬咀入棗姜水煎加陳皮縮砂名六君子湯○殺虫苦練根煎湯調服○常服調氣加山藥○吐

瀉腹痛煩渴加芪藿葛白扁豆○心神不定怔忡
心煩加辰砂茯神○驚啼手足微搐睡卧不安加
全蝎釣藤白附○脾腎虛弱生風多困加半夏沒
石子冬瓜仁○發渴加乾葛木瓜枇杷葉○胃冷
嘔沫加丁香○脾胃不和倍木姜棗或六君子更
佳○傷食加神麩○涎嗽加杏桑半○風壅邪熱
加荆風○頭面生瘡加括桔○盜汗加陳皮浮麥
黃耆○虛汗多夜啼加犀角麥門冬○小便赤澀
加麥門冬茯苓○吐逆四肢逆冷低陷加藿香丁
子○泄瀉加陳皮厚朴○赤痢加芍飯○滑泄加

煨訶子○霍乱吐瀉手足冷加白薑○腹脹去棗
加枳殼木通蘇子○大便不利加大黃朴硝○小
便不通加木通車前○喘嗽加知貝杏蘓子○唾
血加生地藕節○衄血加梔子竹葉

○疳証篇

腎疳難治之說
劇疳五絕之說
林小兒五疳之証唯腎疳為害最速者蓋稟受不足
腎虛受邪熱氣奔上焦故以走馬喻初作口氣次
弟齒黑甚則齧爛熱血迸出為齒牙脫落宜急治
之縱得全活齒不復生

其餘諸疳或飲水不已滑泄不休舌上黯黑目睛青筋眼角黑氣小便如乳牙黑骨枯脫肛欬逆氣促唇白腹高入中平滿抱著手足垂躄無力襯著脚心全不知痛身體變冷為五絕皆不可救也

○疳因

惠丹溪云小兒嬌嫩飽則易傷飲食不調甘肥無節或嬰兒缺乳粥飲太早耗傷形氣延及歲月五疳病成甚者背陷喘噦直瀉腫滿腹脇疼脹肌肉光紫與夫疳勞渴瀉而稿色骨齒露張肚硬不食者雖盧扁難治其攻

傳經曰

數食肥令入內熱數食甘令人中滿

蓋其病曰肥甘所致

故命名曰疳

若夫

襁褓乳子四五歲孩提

或

乳哺未息胃氣未全穀氣未完

父母不能

調攝惟務姑息舐犢之愛遂恣食肥甘與瓜果生冷漸成積滯膠固以致身熱躰瘦面色萎黃或吐大青筋虫痛瀉利而諸疳之証作矣

錢氏云見疳

多曰大病後吐瀉以蒸下之

致脾胃虛損亡津液而

成此說特一端耳未可悉以為然其所謂大病吐瀉豈非飲食之所致與

○五疳

困

腎疳、體瘦身有瘡疹、寒熱時作、頭極熱、足冷如冰、宜

地黄丸方在前

心疳、面黃臉赤、煩滿壯熱、心煩、口瘡、虛驚、宜黃連丸

脾疳、體黃肚大、愛吃泥土、脹滿、氣鹿利、下酸臭、宜益

黃散

脾疳、搖頭、揉目、白膜遮睛、汗流、腦熱、合面、而卧、筋青

髮立、肉色青黃、羸瘦、宜生熟地黃湯

生地 熟地 芎 苓 殼 杏 連 麩

甘 歸 地骨 天麻

右細剉入生薑水煎溫服

肺疳、欬嗽氣逆、多喘、揉鼻、咬甲、寒熱、宜清肺湯

桑白 紫蘆 前 苓 歸 翹 風 苓

桔 地 天門 甘

右細切水煎溫服

○無辜疳毒

○無辜疳毒、腦後項邊有核、如彈、按之轉動、而不痛

其間有虫、如米粉、不速破之、則隨氣流散、淫蝕臟

腑、以致肢體作瘡、便利膿血、壯熱羸瘦、頭露骨高

皆由氣血虛、所致、用三稜、鍼刺破、膏藥貼、愈

徒結
增

林蕪萸丸 治無辜疳毒

蕪萸 黃連 胡黃連 青黛 蝦蟆炒焦 等分

右為末作丸米飲下

九晒小兒衣須火烘恐雌鳥落羽所汚虫入小兒皮毛亦致此疾

○雜疳

傳 疳則 瀉血而瘦 宜地黃丸

骨節 喜卧冷地 目腫腹脹利色無常或沫青白瘦弱 此冷証也水香丸 鼻下赤爛自揉鼻頭有瘡不結痂繞 耳而生白粉散

熱疳潮熱如火大便乾澀肌肉黃瘦雀目夜視不見

用胡黃連丸

冷疳時時泄瀉虛汗如雨不止至聖丸

脊疳虫食脊脂身熱下利羸瘦類咬指甲大芦荟丸

乾疳瘦悴少血舌乾搭口癡眼乾渴身熱手足青冷

大便乾結宜鱉魚血丸

蛇疳食肉太早或腸胃停蓄肥膩其証多啼嘔吐清

水腹痛脹滿唇白紫黑腸頭及齒痒宜下虫丸

尿白乳哺失節脾傷便濁白色久而成疳亦心膈伏

熱兼而得之宜茯苓散

菝 稜 苓 縮各五 青 陳 滑 甘各二

啓迪卷八

六一

右為末門冬燈心湯調下

走馬牙疳牙斷潰爛由臟腑虛熱乳食不調致成疳病內有疳虫上蝕齒牙腫爛消黑口多臭氣

鼻疳上焦壅滯疳虫上蝕鼻中赤痒壯熱啼叫皮毛乾焦肌膚瘦削鼻下連唇生瘡赤爛宜麝香散

麝半外雄黃研升麻各二白礬枯五

右細末入乳汁調敷

○治疳方法

林五疳保童圓 治小兒五疳蓋其骨肉輕軟腸胃微細若乳哺有節則臟腑相調或乳母寒溫失理

飲食無常醉飽喜怒及小兒百晬以後五歲以前乳食漸多不擇生冷好食肥膩甘酸之物即成五疳謂五臟疳也並皆治之

黃連 白鱧 龍膽 青皮 五倍子

蟾頭炙焦 夜明砂炒 棟根 雄黃 麝香

青黛 天漿子 熊膽 芎藭 胡黃連

各一兩

右為末糯米糊丸麻子大一歲兒每服一九米飲下一方有乾蝸牛炙

化虫丸 治因疳生虫五心煩熱

蕪荑 黃連 神麩炒 麥芽炒
右爲末麩糊丸粟大空心米飲下○五疳陳皮湯
下○寒熱往來薄苛湯下○虫咬心痛苦練子湯
下○乳癖氣結或下利赤白腹痛後重腸鳴泄瀉
陳米湯下○加烏梅炒 陳皮治喫泥土炭五心煩
熱鼻赤齒搖

歌曰

小兒疳病瘦疳羸 保童丸內入蕪荑
更兼苦練史君子 等得孩兒日漸肥
一方治小兒疳病肚大用癩蚶蚱三個五月五日佳

將鹽塞口內用碗蓋地上候死了新丸上文武火
焙乾爲末 木香 枳榔各五分 輕粉一貼
右爲末和勻前藥猪肉蘸喫利出黑糞效

一方加巴豆燒存性

下虫丸 治蛇疳

水香 貫衆 桃仁 蕪荑焙 棟根皮酒浸
枳榔各二分 輕粉半 蝦蟆灸焦 史君子五十個
右爲末麩糊丸菜豆大每服二十九天明肉汁下
加歸 連各二分 治疳疔疔勞

傳 木香丸 治冷疳

木香 青皮 檳榔 肉豆蔻 各二

麝香 二各續隨 一兩 蝦蟆 大者三小 燒存性

右為末蜜丸薄荷湯下

胡黃連丸 治熱疳

胡黃連 黃連 各半 辰砂 二各半 別研 蘆薈

麝香 各一 青黛 半

右細末和勻飯丸麻子大米飲下一方用蝦蟇

半兩 焙乾 不燒

大蘆薈丸 治脊疳即胡黃連丸內

去辰砂蝦蟇加檳榔蕪荑蟬退

傳如聖丸 治冷熱疳瀉

史君子 一兩 胡黃連 黃連 蕪荑 炒各二兩

麝香 半各 別研乾蝦蟇 五個酒 煮成膏

右細末和蝦蟆膏丸麻子大人參湯下

一方治疳積腹大

胡黃連 去疳積 果積 阿魏 醋浸去肉 麝香 當門子 四粒

黃連 炒去熱 積酒積 神麴 炒去冷積 各二各

右為末和飯丸麻子大木湯送下一方有蘆薈

半各

肥兒圓 治諸疳多因闕乳喫食太早或回患泄瀉

胃虛虫動日漸羸瘦腹大不能行髮豎發熱無精

神

黃連

神麩

各一兩

麥芽

炒五

木香

二

楨榔

三

史君子

肉豆蔻

麩裹煨各五

右為末麩糊丸蘿蔔子大每服三二十九量兒

歲數加減熱水吞下

○疳瘡

○自孩提至成童潮熱發瘡乃疳氣使然疳虫蝕其肌膚空虛疳熱流注遍身熱瘡發渴無已

銅青散 治走馬牙疳口内生疳瘡牙斷潰爛齒黑

欲脫或出血臭氣

白芷

馬芽硝

銅青

各一

麝香

一分

右為末敷口角擦齒上

蟾酥散

治走馬牙疳齒齦臭爛浸蝕唇鼻一應疳

瘡

蚶蚱燒

黃連

青黛

等分

右為末入麝少許敷之

洗方

大腹皮

苦參

白芷

等分

右細剉煎湯淋洗尤妙

一方 甘草 黃栢 馬鞭草 連鬚葱

荊芥 各等分

右細切水煎洗之

金線錠子

治走馬牙疳凡貼疳瘡無如此藥最效

人言

一名雄黃 二名乾胭脂 半名飛羅麩 四名

右細末水和搓成條如線先用米泔洗淨患處

搗碎貼神效

傳白粉散

治疳瘡

烏賊骨

末七

白芨

末三

輕粉

一七

右和勻先用清漿水洗瘡拭乾付之

林聖惠方

治小兒疳瘡虫蝕鼻用熊膽半名湯化

調容於鼻中

○灸法

林疳瘦灸翠尾脊上三壯脫肛瀉血亦灸此

瀉痢瘵癖積聚臍腹痛不嗜食痰喘寒熱腹脹黃

瘦灸脾俞二穴各七壯在十一椎兩旁各一寸半

○痘疹篇

○痘疹源因

傳經曰諸痛痒瘡皆屬心火

夫小兒痘瘡之証最為酷疾不日之間死生反掌
蓋因胎毒蔽命門遇歲火太過熱毒流行之年則
痘毒從之而發作矣

發則出於心肝脾肺四臟而腎無留邪者為吉也
若初發便作腰痛見點則紫黑者多死蓋毒氣留
於腎間而不發越故耳錢氏有百祥丸大下之法
然活者十無一二

大抵痘瘡之法多歸重於脾肺二經

蓋脾主肌肉肺主皮毛故遍身為之斑爛也

夫小兒斑駁瘡毒之病俗言癩子是肺胃有熱其

肺胃蘊積熱毒或以時氣所作薰蒸於膚狀如蚊

蚤所咬赤斑遍体凡赤斑十生一死黑斑十死一生

又云藏府蘊熱不同表裏受証各異

小兒時氣欬嗽聲重涕唾稠粘目睭愀赤煩熱渴
燥此則肺胃蘊積熱毒發則易出一出遍於肌皮
見而漸沒病在表受毒之淺此名疹子俗曰麻子
又或時行溫毒薰蒸病在裏受毒之深發皮膚遍
躰狀似錦紋或如虫咬痕類小豆大或赤或黑是
名曰癩

又有水痘一証與正痘不同易出易靨不宜燥濕

苟濕之不為害但不能結痂則爛成瘡矣

○辨內外因

九

瘡欲出而未出曰發搐者是感風寒之邪而
內發心熱宜惺々散或外麻葛根湯參蘓飲
瘡欲出而未出而吐利者是中焦停寒或挾
宿食宜四君加縮陳但挾宿食紫霜丸

惺惺散

木 桔 細 參 苓 甘 括各三分

右細剉作一服入薄苛三葉水煎與服

水香參蘓飲

參三分 蘇 桔 葛 前各四分 陳

苓各半

殼炒 木一分 半一分

右細切入生姜水煎溫服

紫霜丸

杏仁五十枚 赤石脂一兩 巴豆三十粒
去皮 別研 去膜油

代赭石

煨醋淬 研一兩

右各別研和勻餅為丸食前米飲下或乳汁送下

傳夫嬰兒之胚暉必資胎養以長其形緣母失節慎

縱慾恣食感其穢毒之氣藏之臟腑迨自孩提遠

至童非值寒暄不常之候瘡疹由是而發曰其所

受淺深而為稀稠焉

夫瘡疹皆由于在母腹浸漬食母血穢而成毒皆太

陰濕土壅滯君相二火之所作也或因天寒傷表

傷裏痲曰是而生當

外者外治 內者內治 中外皆和其

癍自出。○惡寒者發之。○表大熱者奪之。○渴者清之。○秘者通之。○驚者安之。○泄者分之。不可執一。

○傷寒表裡前後

瘡疹証狀雖似傷寒而其治法實異

傷寒

從

表入裏

也

瘡疹

裏入表

○瘡疹察証

○傳夫小兒瘡疹木抵與傷寒相似發熱煩躁臉赤唇紅身痛頭疼乍寒乍熱噓噴呵欠喘嗽痰涎

始發之時有


目傷風傷寒

時氣傳染

而得者

目傷食發熱嘔吐

為目竄驚搐如風之狀



証候多端卒未易弁

必須以耳冷尻冷驗之蓋瘡疹屬陽腎臟無証其

耳與尻俱屬腎故腎之所部獨冷

又不若視其耳後有紅脉赤縷為之真

凡瘡疹分入清濁就形氣上取勇怯

○瘡疹由內相勝也惟斑疹能作搐疹為脾所生脾

虛而肝旺乘之木來勝土熱氣相擊動於心神心喜為熱神氣不安因搐癇。斑子為心所生心生熱熱則生風風屬肝二臟相傳風火相爭故發搐也治之當瀉心肝補其母括萸湯主之

惠宜并外感瘡疹食傷

外感錢氏曰傷寒男躄重而面黃女面赤喘急憎寒口中氣熱呵欠頓悶項急也

痘疹則腮赤多嚏噴悸動昏倦四肢冷尻冷耳冷



潔古云凡

傷風則皮澁拘急鼻塞斑疹則睡中驚悸呵欠嚏是為易識矣


傷食則大便酸臭腹緊不消化畏食宜下之

○辨治例

痘疹治法首尾俱不可妄下但溫涼之劑兼而



凡熱不可驟過但輕解之若無熱則瘡又不能發也



輕清
消毒

溫者如 黃耆 木香 當歸
涼者如 前胡 葛根 升麻 之輩

佐之以芎藭枳殼桔紫通菴之屬則調適也

夫痘疹用藥固有權度二便不可不通一有秘結則腸胃壅遏脉結氣滯毒氣無從發泄者大便黃黑色其毒氣已盛不可多與熱劑

若一秘結目閉聲啞肌肉黧黑不旋踵而變矣

傳王氏指迷曰痘疹亦時氣之一端一人受正傳染其餘

又曰瘡疹有熱則易出一出遍及於肌膚

張喚曰痘子氣均則出快蓋血隨氣行氣逆則血滯

滯

錢氏曰 肝風 二臟交爭而致搐

又曰痘疹未形而先搐大忌涼心蓋瘡屬心心主血心寒則血不能行

大抵治驚 推平肝 利小便 最妙 均氣

仁齋楊氏曰 大熱當利小便宜五苓散導赤散 小熱當解毒宜消毒飲四聖散

林或不出服藥不効者用無價散劫之

若五七日痲不焦是內發熱熱氣蒸皮中故瘡不得焦痲宜風散導之用生犀磨汁解之使熱不生必著痲矣

○若憎寒困倦而成縮伏是脾虛也急宜先治預保脾土

○偏用戒慎錢氏田氏不備劉張專涼陳氏貴溫

○丹溪曰痘癍之論錢氏為詳田氏保嬰度幾近理然二書多略而不備劉張多用涼藥陳氏多用溫藥專門不通者偏用之立見殺人

陳氏之意蓋歸重於太陰二經手足太陰肺主皮毛惡寒足太陰脾主肌肉惡濕故

用桂附果有寒濕量而用之若不問寒熱虛實槩投之寧無誤妄之禍哉

○近時治痘疹者悉宗陳文中木香散異功散殊不知彼立方之時必運氣在寒水司天之令及值嚴冬大寒為因其氣鬱遏痘瘡不得起發紅綻故用辛熱之劑發之其宜也

今人不分時令寒熱下槩施治誤人多矣愚按陳氏之二方乃素問從治之法又謂之熱曰

熱用者也

蓋痘瘡熱毒怫鬱于內而不得發起故

輕用參歸朮朴橘 等之辛散劫鬱之劑一

二服劫而開之使鬱于內者盡回藥氣而發越乎

外故痘子陷伏灰白色者皆翕然紅活凸綻而內

無遺邪矣切勿過劑如一二服後劫而不起者示

不可多與多則反其毒轉增黑爛泪閉聲沉而死


近世儒醫悉引內經病機諸痛痒瘡皆屬心火之語

以正陳氏之失此知常而不知權之論也故後人不

決疑當用而不敢用袖手待斃哀哉

傳今醫往往不同依陳氏而行者多用熱藥宗劉張而治者多用涼劑是故不偏於熱則偏於寒此刻舟求劍之道也

經曰



多觀其事

陳氏用從治之法權 劉張用正治之法常

也

然皆不外乎參朮耆甘芩歸苓茯苓芍藥等補氣血藥為主治焉

亦當看時令寒熱緩急施治固不可執一見也

林古方以升麻葛根湯治痘疹已發未發皆可服世習以為常蓋葛根升麻性皆寒涼能虧損胃氣倘

小兒臟腑虛弱恐水凝血脉使未出者腦伏上故

陳氏只用於未見紅斑之後

愚謂小兒纔覺發熱未明痘証疑似之間不如用

參蘓飲加青皮木香尤為穩當若痘証已明或微

見根窠光澤紅活者亦不必服此

○古方凡痘出宜溫煖不令通風

後人執此二句不知天令人事通變致誤者多若

已出身熱天暄何必蓋覆不使之通風乎當以脉

為主

林丹溪曰讀前人之書當知立言之意苟不知其意

求適於用不可得也痘疹之論錢氏為祥歷舉源

流明經絡分表裏虛實開其治法証以論辨深得

著書垂教之躰使後人如求方圓於規矩較平直

於準繩引而伸之觸類長之可謂無窮之應用也

今人不知致病之因倉卒一試設有不應并

其而棄之近曰局方之學行素問之道不明皆喜

溫而惡涼喜補而惡解利忽得陳氏方論遂以為

錢氏不及也雖然陳氏亦可謂善求病情歸重於

太陰經也

○痘証順逆輕重

傳其為証

宜發起宜紅活凸綻

不宜鬱滯不宜紫黑陷伏

凡痘疹

春夏為順
秋冬為逆

身躰

溫暖者順
寒涼者逆

能食

而大便

實者順
利者逆

輕者

作三次出眼
中無大小不一
根窠紅活
乳食如常
頭面稀少
肥滿光澤
大小便調

重者

密如蚕種
身溫肢脹
外白內黑
外黑內赤
瘡灰白色
頭溫足冷

輕變重

犯房室
不忌口
先曾瀉
飲冷水
餅涼菜
妄下妄汗
冒風寒
食生冷
過飽失飢
誤服升麻湯
信巫不信醫
不避穢

重變輕

避風寒
常和暖
大便稠
忌生冷
避穢

先發搐而後發瘡者生
瘡後發發驚者危

春膿疱

金尅木

夏黑陷

水尅火

秋斑

火尅金

冬疹

土尅水

皆不順也
雖重病
十活四五
果者無問
何時
十難救一二

其候或寒戰噤牙或身黃腫紫急百祥丸下之下
後惡寒不已身冷汗出耳尻反熱者死

林

瘡黑而忽瀉便膿血并痂皮者順水穀不消者逆

是

脾強腎退即病出而安
食乳不化者脾虛不能制腎故自泄難治

○痘癍形証日數輕重

傳
微甚

者其邪在

腑發細疹狀如蚊象所螫點赤色俗名熱瘡
臟發痘瘡狀如豌豆根赤頭白
穴出膿水俗名豆瘡

二三日始見微微欲出或如

黍粟
菜豆
水珠
光澤明淨

者佳

四日

大小不等根窠紅光澤者輕
稠密陷頂併瀉者重

六七日

瘡形肥紅光澤者輕不須服藥
身熱氣喘口乾腹脹足指冷者重

八九日

長足紅滿瘡蠟色者輕不須服藥
寒戰悶亂腹脹煩渴氣急咬牙者至重

十日十一日瘡當結壓痂痂欲落之時將愈

十二十三日當靨而不靨者為逆身熱稍利之以

防其餘毒身不壯熱或腹脹或瀉渴異功散救之
○痘疹虛實証治

傳鑿當察色詳証以弁表裏虛實用藥

其

吐瀉不能食為裏虛
不吐瀉能食為裏實

吐瀉
陷伏

二者俱見表裏俱虛

夫

灰白色陷頂多汗為表虛
紅活凸綻無汗為表實

痘疹初出色白大補氣血○但見紅點已甚葛根湯

忠表
虛也
又
諸痛為實
諸痒為虛

如表 虛者瘡易出而難醫
實者瘡難出而易收

如裏 實則出快而輕
虛則發遲而重

如 表實裏虛則陷伏倒靨
裏實表虛則發慢收遲

裏 補則結壅毒

表 用實表之藥則潰爛不結痂

治法三日已前未見紅點必用升麻湯參蘇飲以發

其表務令發汗為度○若未汗表猶未解雖略見

紅點隱約於肌肉間而升散開發之劑尚未可除

凡瘡瘡須分氣虛血虛用補藥

氣血 虛用參朮四物 加解毒藥酒炒芩連各解毒

蓋芩連為瘡家之要藥酒炒以制峻寒之性
獨存酒涼解毒之能故

痘瘡用殺其毒耳

雖分氣血虛實多屬氣血不足當於不足中別其

優劣以補氣血藥中分輕重當用以平為期耳

瘡塌者當於形色脉上分虛實

實則脉有力氣壯實 實 瘡 如大便不通少用大黃下結糞
以實表之劑加涼血藥

虛則脉無力氣怯虛 虛

氣怯輕者用淡蜜水調滑石末以鵝翎刷瘡上潤

之

乾者宜退火止用輕清之劑荆苛升葛之類


○痘瘡色辨



五臟 形色 見証

其源實系於心一云相火之氣所為


故入於




腎居下獨不受於毒故無候但耳尻冷耳若痘瘡

黑陷耳尻反熱者為逆

見証



赤疹屬



痘瘡將成就而脚色淡者宜助血藥芎歸酒洗芎藥之類

或如紅花色紫者宜涼血解毒芩連升翹葛之類
○甚者必用犀蓋犀能解痘毒
將靨時白色如豆殼者曰初起多飲水

其腦不齊名曰倒腦不好宜服實表之藥及消息

二便何如

如 大便秘宜利若秘內煩外熱者小柴胡加穀最穩
小便秘宜利若澀赤大連翹湯甘露飲

○形氣証治

瘡已出聲不變者形病也形病身溫者宜解毒防風湯
瘡未出而聲變者氣病也宜補肺散
若 瘡已出而聲不出者形氣俱病也
大便閉者宜當飯丸
形氣俱病素弱兒宜預服十奇散

肺主氣氣不足則致

自汗出不止
瘡頂陷塌
不綻肥

並宜十奇散

自汗倍甚
舌不出倍枯

心主血血不足則致

皮白色
根窠不紅
不光澤

並宜芎歸湯

加紅芍
紫艷

解毒防風湯

防風 地骨 生芪 芍 荆 大力子

炒各半

右細切水煎或為末湯調服

補肺散

膠珠

一名

大力子

炒三

馬兜鈴

半

甘

二

杏仁 三粒 糯米 一名

去皮炒

右剉分二服煎食後時服 加生芪

當歸丸

歸

兩

連

一名

大黃

二

甘

一

右細末丸食前米飲下漸加至利為度

十奇散 芪 參 歸各二 朴 桔各一 桂三 芎

風 甘 芷各一

右細末酒水溫調下或剉煎亦可

芎歸湯 歸 芎各二 各半

右細剉水煎溫服

○隨經治例

林王海藏云痘瘡治法大抵傷寒同治隨經用藥最

為高論

治^天傷寒當發散 痘疹行溫平有大熱宜解毒

傳六經証治

○大陽病惡寒身熱尿赤澁出不快宜荊芥湯

○少陽病乍寒乍熱出不快宜連翹湯

○陽明病身熱目赤大便閉實瘡遍肌肉出不快宜

升麻葛根湯加紫草

○大陰病自利厥冷宜附子理中湯木香散

○少陰痘瘡黑陷口舌燥宜四物加紫紅

○厥陰病舌卷卵縮時發厥逆宜異功散

病法當救裏故溫劑助之

荊芥湯 荊 芎 牛蒡子 風 甘 各六分

右細剉水煎溫服

連翹湯 翹 風 瞿 荊 通 柴 車 飯

赤芍 滑 蟬 蛻 芩 柴 各三分 甘

右細剉水煎溫服一二便自利者不用

升麻葛根湯 葛 升 芍 甘 各一分

右細剉加粳米五十粒紫草三分煎與

理中湯 參 甘 灸 木 姜 炮各八分

右細剉加炮附水煎熱服

木香散 木 參 桂 青 芩 前 大腹皮

訶 煨去核 半 丁子 甘 各三分

右細剉加姜棗煎與

異功散 木 飯 桂 木 苓 陳 朴 參

薤 丁子 半 泡七次 附 泡各三分

右細剉加姜棗煎與

三陽証治

凡痘瘡春夏為順當純陽之時也



瘡疹一發便密如蚕種布或如糠粃者合清表升麻

葛根湯加翹

瘡未出而先搗是兼外風寒宜犀角地黄湯
瘡出不快清便自調知其表當微發散升麻葛根
湯

若瘡清乾黑陷身不大熱二便澀滯是熱蓄於內大
黃煎湯下宜風散

若表大熱者不可下

若瘡已發稠密微喘渴欲飲水宜微下之

當歸丸 外以黃柏膏塗面佳

值盛夏暑熱正熾適瘡大發煩渴大便實者宜甘露

飲

犀角地黄湯 犀角鎊 生地 牡丹 赤芍各等分

右細剉水煎溫服

黃柏膏

栢一兩 酒炒

菘豆一兩 去殼

甘草四兩

右細末以生麻油調從耳前至眼眶並厚塗之
日三二次如用早能令瘡不至面縱有亦稀少

甘露飲 生地 熟地並酒洗 天門 麥門 枇杷葉

灸去毛 枳殼炒 黃芩 石解 茵陳 甘草

右各等分細剉水煎食後溫服

○三陰証治

凡痘瘡發於秋冬為逆當純陰之時也

足脛寒
腹虛脹
糞青色
面皖白
嘔乳食
目睛青
脉微細

凡七証不宜服寒藥

痘盛出四肢逆冷或自利係太陰脾經異切理中急溫之

痘平塌灰白色不澤是正氣不足宜十奇散倍加

附

或四肢厥冷時發搐搦係厥陰宜異切散加防風青

皮

○出不快証治

凡痘瘡出不快者有五証

一証天時嚴寒為寒所折不能起發宜散寒溫表冬寒甚紅斑初見正氣散調解散可也

正氣散

甘 炙三
炙半 陳 藿 朮 各半
朴 半 各姜制炙
炙半

右剉入姜棗煎與

調解散

青 陳 殼 炒 麩
桔 參 半 泡七
次 芎

通

葛 各四
分 甘 蘓 各二
分

右細剉入姜棗煎與一方加紫草糯米

丁証炎暑隆盛煩渴昏迷瘡出不快宜辰砂五苓散

生地 麥門煎湯調服

辰砂五苓散 五苓散加辰砂細研為末是也

小柴胡 白虎 人參竹葉 湯宜擇用

丁証服涼藥損傷脾胃或胃虛吐利當溫中益氣宜理中湯吐利甚加附

丁証或成血疱一半尚是紅點此毒氣發越不透必不能食大便如常者宜半溫裏之劑四聖散加減紫草湯亦可

丁証外實之人皮膚厚肉腠密毒氣難以發泄因出不

快宜消毒與透肌散○若大便秘實於消毒飲內加大黃梔子煎與○瘡出大稠宜犀角地黄湯解毒防風湯○血氣不足宜十奇散○咽嗌不利宜如聖湯加苛殼○口中氣熱咽痛口舌生瘡宜甘露飲

透肌散 紫 升 甘 各一

右細剉水煎溫服

消毒飲 牛蒡子三各 荆一各 生甘半各 風半各

右細剉水煎加生犀尤妙

如聖湯 桔梗二 甘草一 一方加牛

右細剉水煎時時溫服

瘡出不快

活血散 加防風湯 白芍藥

右細末每服一匙溫水調下止痛酒調尤驗

王海藏曰四肢出不快加防風一方赤芍也

紅花湯 紅花一

右以水半外煎百沸服之

紫草湯 治瘡出不快及大便自利

紫草 木香 茯苓 白朮各一 甘草半

右細切作一服入糯米一百粒水煎食前服

四聖散 紫草 木通各一 甘草 枳殼麩炒黃色各半

○治痘雜法

解肌之法 葛根升麻紫蘓之類可也

或氣實煩躁熱熾大便秘結則犀角地黃湯

或紫草飲多服能利之

大便不通者少加大黃尤宜仔細斟酌不可妄用孟

浪

小便赤澀者分利小便則熱氣有所滲而出

凡瘡疹但覺身熱証似傷寒

疑似未明

或_{惺惺散}

熱甚者_{升麻葛根湯}

若見紅點便忌葛根湯恐發得表虛也

凡瘡疹初欲出時身發熱耳尻冷呵欠欬嗽面赤必是出痘之候宜升麻葛根湯加大力子痘必稀而易愈

一方以辰砂一味細末看兒大小或_{一茶匙}蜜水調服

痘熱之時大力子為末蜜調貼顙門免眼障之患凡痘初出之際宜前稠密急消毒飲加芩紫煎服減

食者加參

痘瘡初出之時色白者便當大補氣血參朮芪芍升芎甘木丁子酒歸白芍如大便泄加訶薤

凡痘初發時自汗不妨蓋溫熱薰蒸故也甚者少以參芪實表

凡痘初發時煩躁譫語狂渴引飲若飲水則後來不齊急以涼藥解其標

凡痘瘡已出少與化毒湯出不快者加味四聖散紫草飲子快斑湯之類

疎則毒少

九痘瘡

密則毒甚宜清涼藥解之酒炒芩連之類也雖數服亦不妨度不害眼

九黑陷用無病小兒糞燒存性蜜水調服

瘡

乾者宜退火止用輕清之劑荆芎升菖之類濕者肌表間有濕氣也宜瀉濕兼芷風之類蓋風能勝濕也

咽喉痛者如聖湯鼠粘子湯

喘滿氣壅者麻黃黃芩湯

痘瘡膿汁不乾蓋瘡出太盛表虛難靨粘衣著席濕

痛難轉側宜白龍散敗草散

白龍散 黃牛糞日乾火煨成灰取心中白者為末

帛裹撲之

敗草散 用蓋屋及墻背上遠年腐草洗焙乾細末

帛裹撲之

或以麥麩摻席簾上可

若靨後二便自利下黃黑則毒氣已減不必用藥一

或閉焉則腸胃壅毒脉結凝滯毒無從而瀉眼閉

聲啞肌肉黧黑不旋踵而告變矣宜消息之

○隱伏倒靨黑陷

傳一証變壞歸腎黑陷宜宣風散

一証外感風寒所致

冬宜五積散減麻黃加桂芩春宜不換金正氣散加芎芷風

一証乳食所傷內氣壅遏宜調解散或四君加縮

木 芎 紫大便自利理中可也

不換金正氣散 朴 藿 甘 半 木 陳各半

右細剉入棗薑水煎溫服

陷入者元加味四聖散

更以胡荽酒薄付其身噴其床帳衣被厚付其足併以

厚綿衣蓋之若未起獨聖散入木香煎服

其壞瘡者

- 一曰內虛泄瀉
- 二曰外傷風寒
- 三曰變黑婦腎

團痘瘡黑陷青紫者錢氏百祥丸下之不黑者謹勿

下

下後身熱氣溫欲飲水者可治
水穀不消或寒戰者為逆

丹溪曰

所下者瀉膀胱之邪

可治者知其脾強土可以治水也

然百祥丸太峻宜以宣風散代之

瀉後溫脾 參 朮 苓 芍 木 甘各半為妙

蓋發肌肉陽明主之脾土一溫胃氣隨暢不可消

已而又泄之腎水乎此錢氏不刊之秘旨也

陷伏紫黑弁曰有胃寒榮衛氣虛而陷伏者

瘡斑皆白肌膚慢不欲食或嘔大便溏小便清白宜

溫之活血散入茵散

虛寒甚而自利雖附子理中豆蔻亦可少用瘡出為

期

有毒氣內外壅遏熱蓄不散毒氣壅於肌膚急出不
得遂致倒靨黑色蓋血活如朱砂如雞冠色若毒穢
血聚則黑色由毒氣暴出瘀熱搏之故血凝而不得
出為黑靨其証最惡○二便秘腹脹喘滿煩躁者宜

山梔子湯

○妄汗之變

傳心九 已發未發 並與紫蘇飲為當

者之是為權度備喻而言亦如庖人

籠蒸之法但欲鬆耳

毒發於表

毒根在裏

若苟妄

汗則榮衛益虛重令開泄轉增瘡爛
由是風邪乘間夾証者多矣
下則內氣益虛不能出而反入由是
土不勝水變黑埽腎

身體振寒
耳尻反熱
眼合肚脹
其瘡黑壞

十無一生

汗下二說古人深戒以此

或脾衰腎旺致黑陷埽腎以百祥丸下之是皆不
得已而用之十救其一○下之後若加寒戰身
冷汗出不食水穀不化耳尻反熱者乃脾弱腎水
勝其死必矣

醫者其下膀胱於既壞之後何若保脾土於未陷之

先為上策

○辨不藥而愈附慎

痘脚稀疎
根窠紅綻
不瀉不渴
乳食不減
四肢溫和
身無大熱

九六証並不須服藥

惟宜善加調護須使居室溫屏

忌

見外人
犯房色
近月水婦人腋臭者

宜燒大黃蒼朮以辟惡氣燒木香亦佳勿燒沉檀

降真乳香腦麝

困凡瘡疹不可令受風冷必當賢而變黑難治也

○平治方法

傳諸治以平為期万不失

石壁胡氏曰小兒難保非常之熱不可任非常之冷

若熱藥太過輕則吐利腹脹重則陷伏倒腐是宜溫涼適中

可也

仁齊楊氏曰諸熱不可驟去宜輕解之蓋痘瘡無熱則不能起發史氏曰比之種豆值天時暄暖則易

生

凡值天時不正，鄉隣痘瘡盛發，宜服三豆湯。

三豆湯：赤豆、大黑豆、菘豆各一升、甘草三兩。

右淘淨，用水八升，煮熟，逐日空心任意食，豆飲

汁七日，永不復出。

惠一云

氣虛用參朮血虛用四物各加酒炒芩連等解毒藥調解之法活血調氣安表和中輕清消毒溫涼之劑二者得急

溫歸芪木輩佐以芎芍、藜蘆、桔梗、通紫甘之屬，則

可以調適矣。

○乳嬰之兩治

乳嬰當兼治乳母，俾其氣血清和，飲食有節，授以

調氣通榮之劑，以釀其乳，兒飲之，則瘡心肥滿，光澤無陷伏之憂。

童非當備切脉，審表裏虛實，以汗下之，苟不實不虛

則，但保其中和，使脾氣流暢，則肺金藉母之助，膿

速痂成，無倒塌之憂。

壯盛而膚腠厚密，尤須預為汗解，一便結澀者，宜

下之，利之度無患也。

○危惡証狀

痘疹五不治

痒塌寒戰咬牙渴不止。○痘紫黑色喘渴不寧。○

灰白色陷頂腹脹○頭溫足冷悶亂飲水○氣促
泄瀉渴

患痘疹死候

瘡正出而吐利者困○出而譫語不止者惡候○
便血而乳食不化者脾虛已死○瀉血而瘡爛無
膿不治○大小便秘目閉聲啞肌黑者死○遍身
黑陷目閉無魂者死○面色青黑者死○瘡後發
驚者危○面黑或鼻有黑氣不治○燥渴尿澀泄
瀉不食者危○頭面腫瘡盡抓破臭爛不可近或
足冷至膝不治○面腫鼻陷目閉咬牙不治○痘

瘡黑焦風攻頤頤唇項腫硬或胸膈高突不治

○痘疹入目

患瘡疹入目蓋心熱毒生肝風肝主目熱毒衝之故
為目患涼膈丸蜜蒙花散主之○秦皮散洗之○
或目食毒物睛突出外仙靈皮散○暴赤腫痛麻
子散○患半年一年餘者蟬蛻散○目中痘瘡成
翳者大黃散○瘡入眼裏侵睛者樺皮散○赤脉
侵睛者羚羊角丸

傳決明散 治痘入目

草決明子 赤芍 甘草 天花粉

右等分細末食後茶清下

撥雲散 治痘毒入眼

羌活 防風 柴胡 甘草 各等分

右細剉水煎食後臨卧時服○或細末薄荷汁

茶清或菊苗煎湯調皆佳

忌藏塩鮮醬濕麪炙燂炊氣一切發風動火之物

洗方 黃連 剉 白滑石 研 銅青 等分

右用絹帛包泡湯候温洗瘡傷眼目

治出疹眼内有翳 輕粉 黃丹 各等分

右研勻左眼翳吹入右眼內

○瘡後餘毒

患痘癰者毒氣當出而不得出流於脾經則瘍發四

肢手腕并膝臏腫痛頭項胸脇赤腫宜消毒每飲

或五香連翹散解之未成膿者小柴胡加減用之

重者或 面赤便秘 渴嗽眸中驚叫尿赤澁 或十六味沉氣

飲去附加大黃

若稟受怯弱屬後面青不能飲食身軀倦怠無熱証

與調平藥安養之不可一於解利也虛則十補湯

加殼桔

傳九痘後不問壅毒發於何經初起紅腫時却用黑

某赤三豆以嚴醋浸研名コウ漿時時以鵝翎刷之隨手退去神效

必勝膏

馬齒莧汁

猪膏脂

石蜜

右三味共熬為膏塗腫處

毒氣

流於太陰脾經壅發四肢消毒飲

流入大腸則便膿血或下腸垢或大便秘結

犀角地黄湯

小兒痘後二旬大便不通糞燥為痛垂死チチ用硝黃巴殼及蜜導俱不通愚令一婦以真麻油含口內用小竹筒一个納穀道中吹油入腸內須臾即通

真良法也

○若又瘡疹後再作瘡疹者此亦餘毒未盡宜解利之氣虛者未可解利

滅癩散 治瘡疹愈後痂已落其癩尤黑或凹或凸

韶粉 輕粉 猪脂 調塗

升麻同蜜煎敷亦可

○傷地風

○瘡疹愈後忽遍身青或黑色手足厥冷口噤涎喘如鋸者此名中地風瘡疹方愈榮衛尚弱而暴感時令寒暑風雨地氣毒氣龍虛而入致之宜

消風散不入蟬蛻末二分分三服酒生薑薄荷汁數

點湯調只二三服立醒

或少汗而解再出癰疹而愈

○妊婦瘡疹

傳孕婦發痘罩胎散可也○胎動不安安胎飲○身

熱甚木香參蘇飲○或瘡稠密十奇散倍芍歸減

桂加香附烏藥○如胎已五月則桂半之屬俱不

必禁

罩胎散 苓 朮 歸 白芍 赤芍 柴 葛

參 桔 條 芩 風 陳 荆 殼 此 膠

糯 芷 甘 芎 縮 大熱加鬱金各三分

右細剉作一服水二盞前至一盞柿蒂七个芎

根七寸瓜蒂一个用磁器煎以荷葉解定熬至

八分去粗仍用荷葉蓋覆空心温服

安胎飲 大腹皮酒洗焙乾再參 陳 朮 白芍

歸 芎 香附童尿浸縮 蘓 苓 甘各半

右細剉為一服入燈草七莖糯米一撮前食前

温服

○論中各方劑

五加皮散 治三歲不能行

五加皮一兩 牛膝 木瓜各五
右為末每服 粥飲調次入好酒兩滴調勻
日二服

惠至聖丸 治冷疔

丁香 丁皮 木香 厚朴 製史君 煨陳皮

肉豆蔻 濕紙 煨

右為末麩糊丸麻子大米飲下

惠驚血丸 治疔勞

人參五 川芎 蕪荑 柴胡各一 史君二

胡黃連各二兩用驚血二盞吳茱萸二兩和二連浸一宿次日炒

右去茱萸并血同眾藥為末粟米粉糊丸麻子
大食前熟水下

林大連翹湯 治痘瘡發熱

連翹 防風 梔子 甘草各等分

右細剉水煎溫服減梔子名連翹防風湯

同化毒湯 治痘疹已出出不快

紫草茸 升麻 甘草各等分

右細剉入粳米水煎溫服

惠麻黃黃芩湯 治痘疹出不快煩躁不得眠

麻黃去節 一兩 赤芍 黃芩各半 桂去麋皮 甘草各

右細剉水煎溫服

同百祥丸

一名南陽丸

治嗽而吐水

用紅芽大戟陰乾水煮軟去骨晒乾再納汁中煮汁盡焙乾

右為末水丸粟米大每服一二十九研赤芝麻湯下

林人齒散

治痘疹初出光壯忽然黑陷心煩性躁

氣喘妄語或見鬼神並宜速治不然毒氣入臟必死

人齒燒存性右為末每齒作一服酒下

憲山梔子湯

治瘡疹毒黑色

梔子

白鮮皮

赤芍

升麻

各一兩

寒水石

甘炙各半兩

右細剉入紫草薄荷少許水煎服

紫蘇飲

治欬逆上氣乳哺無度內挾風冷乳與氣

相逆氣不得下

蘇子

訶子

蘿蔔子

杏仁

去皮炒

木香

人參各一分

青皮

甘各七分半

右咬咀每服一水煎溫服

林蜜蒙花散

治痘疹諸毒氣入眼昏暗生翳膜

蜜蒙花各半 青箱子 决明子 車前子各半
 右為末白羊肝一片破作一二片摻藥令勻却
 合作一片濕紙裹煨於地上出火毒空心米泔
 嚼下

回蟬蛻散 治驚風天釣心熱夜啼癩疾

蟬蛻六十個 去足翅 荆芥一兩 甘草蜜炙 大黃煨 黃芩各四
 蝎梢五十個 去毒

右細剉每服一水半盞入白茅根少許煎至
 半分二三次服

消風散 荆 甘灸 陳 朴各五 白姜蚕

蟬蛻炒 參 苓 風 芎 藿 羌各二
 右細末荆芥茶清調下

五苓散 脾精圓

小柴胡湯 木香棋榔丸

四物湯 白虎湯

來復丹 人參竹葉湯

止汗散 阿膠散

人參敗毒散 鼠粘子湯

涼膈丸 五香連翹湯

十六味流氣飲 五積散

十補湯

已上一十七方宜閱諸書不及枚舉

所從證經籍

心	丹溪心法	小	醫經小學	鑑	衛生室
傳	醫學正	泝	醫經	泝	精義外科
行	義本草	本集	本草集要	經	內
著	明醫雜	玉	機微義	格	致餘論
得	効方	辨	疑	林醫林集要	或集
蘭	室秘藏	液	湯	本草	脾
說	醫	難知	此	支	選
惠	濟方	纂	丹溪	要	掌
宗	醫林正	百	傷寒	問	全
					全九集

脉經	王氏	脉訣	林和	局	和劑	方
因	三方	靈	樞	本事	一方	
鍼經	靈樞	濟	生	難	八十二難	經
垣	東	十書	原	病式		
秘	丹溪	秘傳	方	臺	外	秘要方
聚英	針灸	源	巢氏	病源論	集驗	外科
明	醫學	發	精要	外科	囊	青
瑣	碎錄	婦	人良方	或	詩	毛
嗣	廣	要語	千	全方	博	物志
事	林廣	記	兒	小	方	小袖小兒袖

察	病指南	錢	氏小兒方	廣	利方
海	上方	子母	秘錄	迷	王氏指方
嬰	田氏保集				

凡六十四部之隱括樞機又試既効耳拾集之而成此書云

察證辨治啓迪集卷之八畢

啓迪集

慶安貳

己歲

仲秋日

上村次郎右衛門

板開

慶安貳

上村次郎



