



阿蘭陀外科明鑑拔萃

目錄

一 下疳瘡

一 陰蛇

一 櫻梅瘡

一 小瘡

凡四篇

目錄終

阿蘭陀外科明鑑校萃

下疳

夫下疳之來由大抵有三也一者所謂男子之慾念陽動  
淫火為之興起驚精濁血聿依流滯中途結而為茲種也  
二者婦人之陰間濁精宿結或小瘡宿起或大素煎血濁  
精伏有之依不知而錯媾之其毒咸咸用陰漆痒而為是  
症也三者乳酪炙魚飲酒房勞或酷而侵是或過服辛香  
燥熱丹石等之藥俱蘊積於濕熱而以成乎皆是厥陰肝

經之濕熱注下而生者也生一瘡也或痒或痛其根  
硬大者厥毒深乎遂潰爛膿臭而重則陰莖脫落也或始  
起則一瘡唯滿瘡而破乎爛汁甚洩重則有逐日遂陰落  
也或依過疝磨潰瘡腐爛者矣大槩如斯乎咸初發小便  
赤溺如麻大便結滯兩寒發熱頭痛莖疼牽池小腹合縫  
之間甚則發便毒重則遂為瘡毒也內治之法瀉肝火道  
濕通二便清血平坐龍胆瀉肝湯消疳敗毒散蓮菴解毒  
湯蘆薈丸清肝道滯湯主之也潰爛久元氣虛者四君  
當之平

○阿蘭陀曰是症初發生一瘡之粟粒也或痒或痛平宜  
アルフィンカンフラトカスミンコロスト類以可當之也若一粒已  
破潰爛膿臭且ハセリミン或アボストロウルニケビシヤアミン  
ヘスヒタル類加付之不腐止痛瘡不速ラフメント以頻洗  
之其後可付膏藥腐止痛退テヤハルニテキススイビンカ  
ンフラアド類治之平

○若磨老等爛或痛或痒滿腫膿滴且以粉藥治之也

若唯滿腫皮盖如泡永光透者前ラブメント洗之皮盖間

ハセリヨニカンフラアト等分合綿塗入之腫上尤可當之

皮盖腫隱障頭者名曰袋下疳也矣

○亦婦人陰腫或痒或痛重者惡寒發熱潰爛生漏也

治法同前平

○ラブメント方

一 フウリアブセニテヨム

一撮

一 フロウリスロウサ

一撮

一 ラブテキスチイナ

二撮

一 ラブテキスソチイニ

一撮

一 ゴムメナ

四錢

一 ゴムニスチキス

四錢

一 コムアルワイ

四錢

○右水七合入五合煎フランドヒイニヨ一合加洗也若腐潰

膿瀾甚者石榴皮四錢青木葉叶一撮ヒツトリヨウロ

二錢加之前洗半

粉藥

セルウサ

カルゴ

ベツテ

ゲイルボウム

フル子イルカシスル

右粉一合可付之若膏膿有之者或アルユニ或ビツ

リヨウロシニ三度燒微加雜合可付之也重者ヘレスヒ  
タアル加之斯一定之法也

フルガアニヤ方

ラアデキスチイナ

セイモンブラスタアコ

セイモンセイリサアト

ヘレスヒタアル

龍胆草

二錢

二錢

二錢

一錢

一錢

皂角刺

一錢

ムシクス

三分

アルワイ

三錢

テバルバ

八錢

右粉而合凍之以蜜○是程丸自三九至十九

搗人生之虛實病新久淺深可用之也

陰蛇

阿蘭陀曰是症有婦人過小蛇入陰開不出者也

以手采其尾直引之時依中截斷其蛇不出若不出時其蛇毒走諸經其人必鬱念死也

治法曰先枇杷葉粉一錢蒼朮一錢右以酢可服之也  
儲截破彼蛇尾蜀椒粉一錢ヒツトリヨウロコ五分加入彼  
疵納之蛇忽自出也

楊梅瘡

夫瘡毒之症初生或下疳或便毒都依厥陰肝濕邪皆引  
而以今發瘡毒為其症哉有陽有陰在寒在熱在虛在實

且正能別之可治之平用藥初發疑道必為滑痛不一生治也矣

○案瘡毒之一症其發狀重者初發先卒絕死平漸醒後頭痛如破惡寒發熱耳鳴傷寒類也二三日如斯而後浸發瘡也其毒屬氣者多於上部也屬血者多於下部也初發先用荊防敗毒散可表發於其毒也必怖以真補平若為天受虛體者可加味人參一味也若越不出者升麻葛根湯或前方加麻黃也勿使在必其毒裏內筋骨平若時冬

而閉寒者宜五積散如斯而終發瘡其狀似楊梅者氣主茲平似綿花者血主茲平皆是屬濕熱者也此時宜防風通聖散也虛者去二石是湯宜多服瘡既爛膿流真堪真向且後欲瘡少燥時以搜風解毒湯可瘡之茲湯至平腹必變而固斂矣

○搜風解毒湯

一 土茯苓

一两生半  
至愈焙

十錢

一 薏苡仁

少焙

五分

一金銀花

五分

一防風

五分

一木瓜

五分

一木通

五分

一白鮮皮

五分

一皂莢子 黃去炒

四分

右氣虛者加人參血虛者加當歸各七分也

右水煎以用晝夜二劑也初發至干今不耳鳴止者加石

葛前胡杏仁香附也咽痛破者加桑葉也惣在病上部加芎在病下部加童末除難疾痊餘毒或手足攣骨節痛或耳鳴或身熱如走虫匍匐者亦防風通聖散加紫出用十餘貼也且後前湯加乳香沒藥黃芩紫草等用之則病自痊是則聖傳之受法自然之道理古今一定之法也若味除尚餘毒見前症宜通仙五寶丹平茲湯必勿早用也惣傷寒中風瘡毒等之諸症儻誤錯龍腦石藥麝香牛黃香劑等早用之則走邪氣筋骨不治唯病久痼筋骨

則曰以香劑是彈半以餘劑可治之矣

案今見俗醫治瘡以土茯苓為初劑也是乃非中非也夫土  
茯苓為陽明本藥而以濕燥瘡瘡專之若早則瘡瘡隱毒筋  
骨口曰發瘡解毒則從內瘡至外學者必畧之也

○治古方

○屬虛唐瘡疹而後隱毒筋骨骨痛不止節筋掌肌肉瘦  
不覓於行或為瘡毒血結瘡膿膿流或痔漏尻蓮或歷年  
脚氣等咸用之為奇効如神妙不可有謹而不秘也

一 土茯苓 焙過

十錢

一 當歸

三錢

一 川芎

三錢

一 羌

三錢

一 遠

三錢

一 澤蘭

三錢

一 將 但和

三錢

一 萃

三錢

一 皂子

三錢

一 土骨皮

八錢

一 葛

四錢

一 云

四錢

一 貝母

四錢

一 鮮

四錢

一 忍冬

五錢

一 右細末一服一錢一日三服五服之間用平瘡毒忍冬

煎湯虛症之瘡物以酒用之依病上下用食前後也

○五寶丹

一 右本方二劑飛白二錢半入平古瘡毒筋骨有加重五  
八草六分欬疹早以瘡也加土龍六分新病者加  
三分實症者飛白於膏輕粉一錢二分用之也  
號神仙走髓散也

○采鐘乳石毒方

一 右以白水入唐金鍋之裏乳石一枚而煮之二日其

後能洗冷亦以常清水煎之半日可且水不變濁是  
乃毒盡之驗也若病古或虛人時其後乳石二十錢  
破鷄腹入此石縫裏於口以火燒之鷄燒焦腸焦  
入時把出以清水冷取上細末甘草湯水飛晞堅遣  
之者也是藥人參白朮之二味洪濟平服藥之間必勿  
用之也乳石色為黃白鮮明以為上平其形尚珠璣中  
有穴如竹中長五六寸研不厚以薄為上其色潤物以  
為良平不瀆不辨在青白者有大毒也手足陽明氣分  
之藥也

○輕粉毒取方

○右酥一合之中黃連抹二兩土茯苓二兩天名二兩  
入煎之漸而去渣米藥汁入輕粉浸一日一夜其後藥  
汁共壺入燒久藥汁盡輕粉在如塩也其時凝去米之  
是則毒盡方也

○珍珠米取方

○豆腐之中為穴入之以鑑菘之一時可且後取出入乳鉢

研是及一日二日若研兼則五臟傷為毒平能不可不辨在矣

阿蘭陀曰新生者名曰楊梅曰綿花瘡痊而后沉其毒骨髓而為諸症之患者名之謂結毒也

內藥秘方

楊梅瘡之症初治筋骨疼痛頭痛等症病矣

種

一川芎

一錢

一當歸

一錢

一防風

一錢

一蒼朮仁

一錢

一木瓜

一錢

一金銀華

一錢

一木通

一錢

一白鮮皮

一錢

一蒼木

一錢

一 威靈仙

一錢

一 天華粉

一錢

一 風藤

一錢

一 連翹

一錢

一 皂角子

五分

一 丹草

五分

一 土茯苓

二兩

○右煎用是新久通用之靈方也但初生大便結加大黃

一錢病古氣虛者加人參三五分難外發者加薄荷麻

一錢若毒氣入鼻者加辛夷一錢咽破者桑白皮桔

梗桑葉一錢可加之也

○湯丸秘方

一 黃連

一 人參

一 耳草

一 川芎

一 杜中

一 知母

一 當歸

一 生地黃

一 白茯苓

一 大黃

一 黃芩

一 土茯苓

但泔水一宿  
浸剉焙

各二錢

八錢二分

一 右剉二合而一劑分二十五包煎法

一 初一日

一 番水 入二盞八分煎

一 番水 入一盞半八分煎

一 番水 入二盞八分煎

○右朝晝夜三度用至用每夏丸藥五十粒可以是湯服之

平 一 番水 入 三 盞 八 分 煎

○中二日 蓋半八分煎

一 番水入三盞半八分煎

二 番水入三盞八分煎

三 番水入三盞半八分煎

右朝晝夜三度以是湯丸藥五十粒充用之也

方

一 黃芩

一 大黃

一 黃蓮

一 錢

二 錢

一 錢

一 人參

一 甘草

一 沉香

一 丁香

一 木香

一 栝櫚

一 菝葜

一 防風

一 錢

一 錢

二 錢

一 錢

二 錢

二 錢

一 錢

二 錢

一 鷄腸草

一錢

一 古上茶炷

一錢

一 白物

五分

一 土茯苓

二錢

右十五味為細末以米飲○是程九一度五十粒宛右  
以前湯用之也

右是丸湯楊梅瘡遠近骨疼筋攣肉枯或結毒瘡破潰  
久不痊或氣腫附骨疽風毒等破而歷年不痊或黑白

癩風或久衣疔風等皆能治之也

○鷄霜丸藥方

楊梅瘡之症初起欲出者其以大素氣血虛衰故雖可其  
毒相發勿力有藥無効時用是藥可驚發其後左右之  
秘方等主之平亦遠年為結毒不痊或瘡潰或骨痛筋攣  
手足固枯心氣不稜平或虛勞中風久年不治其外氣腫  
附骨疽等皆數年不治者必用也

○秘方

真土茯苓

百錢

人參

二錢

防風

一兩

生地黃

一兩

川芎

一兩

辛荑

三錢

細辛

一兩

香附子

一兩

栝櫚

六錢

黃芩

六錢

黃連

六錢

山梔子

六錢

錦文大黃

十二錢

紅華

一兩

沉香

一兩

黑白牽牛子

七錢

○右十六味大粗而鷄一羽毛腸瓜背截去拔骨彼藥腹內  
 入納則以針縫其疵而入土器封口燒之也其後米出  
 鷄藥俱細末以米飯○是程九極上為茶衣每服五丸  
 或十粒病新久隨人之虛實矣

○丸豆秘方

楊梅瘡遠近筋骨疼痛腐爛臭敗或咽喉破唇割竟破壞  
 諸藥不有效平必用之百發百痊古今不易之妙方也

○方

一 黃連

二兩

一 生腦

一兩

一 輕粉

二錢

○右粉而之リカラアラス 凍包布可替之也

○亦方 大肥前

一 雷丸油

二兩

一 之リカラアラス

二兩

一 へツテ

一兩

一カニル

一錢

一セウシ

二錢

右一合而可凍去平効妙也

○内藥方

一土骨皮

二錢

一忍冬

三錢

一山歸來

五錢

一白鮮皮

二錢

一和大黃

焙

一錢

一耳草

少

一連翹

七分

右七服分之如常恒煎之可用湯也

