



千金方撮要方

嘉慶三年寫 蘆河杏菴編







杏菴記事











千金撮要方目錄

表目

一頁

婦人門

七頁

小兒門

十九頁

目病門

同上

鼻病門

二十頁

口病門

二十三頁

舌病門

二十五頁

唇病門


同上

齒病門

二十六頁

喉病門

目一



二十七頁

身病門

二十八頁

面病門

二十九頁

脚氣病門

脛骨拘急、入腹氣悶、骨節疼、

三十頁

風熱門

所謂中風是也

三十一頁

傷寒雜治門

傷寒後如瘧、嘔噦、手足皴、盜汗、痛、止、汗、鼻、血、勞復、利膿血、

四十一頁

黃疸病門

活卒死

四十五頁

濕瘡門

四十七頁

肝臟方門

目不明、結下、停食不消、痞不通、腹脹滿、食急、

四十八頁

膽腑方門

病後不眠

四十九頁

吐血血下血門

心下痞滿、乾嘔下利、吐衄、

五十二頁

心臟方門

心下痛、髮黃、赤、治、髮、思、

五十七頁

小腸腑方門

口瘡、好忘、見鬼、妄語、

五十八頁

脾臟方門

大便不通、腹痛、一切利、痛、

六十四頁

小兒痢門

一切利、痛、痢後虛腫、

六十六頁

胃腑方門

反食、噎、咽、渴、反胃、

六十八頁

嘔吐噦逆門

噎、針、灸、法、

七十二頁

脹滿門


傷火、行、

七十二頁

痼冷積熱門

腸下偏痛、心中煩滿、骨蒸、

目二



七十五頁

肺臟方門 嗽、膿血、肺癰、

七十頁

大腸腑方門 下利、青白、喉中水雞聲、

八十二頁

九蟲門 肝勞、恐、畏、脾勞、白蟲、腎勞、四肢

八十頁

腎臟方門 腰痛、驚、不、虛、夢、人、常、耳、聾、目、暗、腹、濁、拘、急、

九十頁

膀胱腑方門 及三焦門 小便不利、膿血、腰痛、灸法、

九十二頁

霍亂門 不渴、小便、散、方、大、利、消、渴、吐、食、

九十四頁

消渴門 服三黃散、方、大、利、消、渴、吐、食、

九十五頁

淋閉門 服三黃散、方、大、利、消、渴、吐、食、

九十七頁

水腫門

九十九頁

丁腫門

百頁

癰疽門 一切腫毒、諸瘡復發、治瘡、

百二頁

癰疽門

百三頁

丹毒門

百五頁

癰疹門 風疹、此證、即所謂胡瘡也、

同上

癰疽門 手足、疥、癩、脚、折、裂、指、瘡、代、脂、

百九頁

九漏門

百十二頁

腸癰門 附乳癰、一切乳癰、

百十四頁

五疔門

各名、詳千金方、新產漏下、

百十五頁

疥癬門

白癩、風、白、駁、死、目、

目三

惡疾大風門

百十七頁 解食毒門  
 百十八頁 解百藥毒門  
 百十九頁 陰癩門  
 百二十頁 卒死門 附立絕  
 百二十一頁 蛇蟲毒門 及諸獸咬  
 百二十二頁 被打及諸傷損門

目錄終

千金撮要方

盧川杏菴典從編

嘔逆

○婦人門

治惡阻嘔吐不下食方 千金方下从之

生竹茹 橘皮 各八銖 茯苓 生薑 各一兩 半夏

三十銖 右五味以水六升 煮取二升 半分三服 不

差 頻作

同上

橘皮 竹茹 人蔘 白朮 各八銖 生薑 一兩 厚朴 十二銖

同

下利

右六味以水七升，煮取二升半，分三服，不差重作。

妊娠九月若卒得下利，腹滿懸急，胎上衝心，腰背痛，不可轉側，短氣。

半夏 三兩 麥門冬 一兩 吳茱萸 當歸 阿膠 各

兩 乾薑 兩 大棗 十二枚

右七味以水九升，煮取三升，去滓，內白

蜜八合，微火上溫服四服，利即止。

胎動

治妊娠二三月上至八九月，胎動不安，腰痛已者，所見方。

艾葉 阿膠 芍藥 當歸 各 三寸 草 二

下血不止

右五味以水八升，煮取三升，去滓，內膠令消，分三服，日三。

治妊娠血下不止，名曰漏胞，血盡子死方。

心痛

乾地黄 黃芩 各 以三四撮許酒服，不過三服差。

治妊娠心痛方。

心腹痛

青竹皮 一升，以酒二升，煮取一升，頓服。

治妊娠忽苦心腹痛方。

頸痛嘔吐

燒鹽 令赤熱，三指撮，酒服之，立差。

治妊娠頭痛壯熱，心煩嘔吐不下食方。

知母 四兩 粳米 五合 生薑 根 一升 青竹 筍 三

右四味以水五升，煮取二升半，稍飲之，盡更。

時疾子不落

作差止

治妊娠遭時疾令子不落

取伏龍肝水和塗臍乾復塗必一方酒和塗方五升又河清和塗之並佳

墮下血

馬通湯治妊娠卒驚奔走或從高墮下暴出血數升方

馬通汁一升代童尿乾地黄 阿膠各四當歸

艾葉各三

右五味咬咀以水五升煮取二升半去滓內

尿血

馬通汁及膠令烱分三服不差重作治婦人無故尿血方

遺尿

龍骨五兩治下篩酒服方寸匕空腹服日三久煮二十服愈

治婦人遺尿不知出時方

礬石 牡蠣各二

下痢

右二味治下篩酒服方寸匕亦治丈夫

治妊娠下痢方

人參三兩黃芩三兩檉皮四兩粳米三升酸石榴皮三

右五味咬咀以水七升煮取二升分三服

膿血利殺痛

治妊娠患膿血赤滯魚腦白滯臍腹絞痛不可忍者方

雞白切一升酸石榴皮 萸藜各二兩黃連

水腫

阿膠二地榆四

右五味咬咀以水七升煮取二升半分三服

不差更作

治妊娠體腫有水氣心腹急滿方

茯苓一白朮四黃芩四杏仁四旋復花三

右五味咬咀以水六升煮取二升半分作三

服

同

鯉魚湯治妊娠腹大胎間有水氣方

鯉魚一頭斤二白朮五芍藥五

各三茯苓四

運絕

右六味咬咀以水一斗先煮魚鮓澄清取八

升內藥煎取三升分五服

治產乳運絕方

半隻一兩搏篩丸如大豆內臬孔中即愈此

方扁鵲

治產時子但趨穀道者方

熬鹽一煎之自止

治胞衣不出方

取小麥合小豆煮令濃飲其汁立出亦治橫逆生者

胞衣不出

子趨肝門

火乳

治婦人乳無汁方

土瓜根治下節服半錢七日三乃乳如流水

煩悶

知母湯治產後乍寒乍熱通身溫壯胸心煩悶

知母兩芍藥黃芩各二桂心升草各一

右五味以水五升煮取二升半三服一方

不用桂心加生地黃

煩悶

竹葉湯治產後心中煩悶不解方

生淡竹葉麥門冬各一升甘草兩生薑

茯苓各二大棗枚十四小麥各三

右七味以水一斗先煮竹葉小麥取八

升內諸藥煮取三升去滓分三服若中心虛

前證及短

悸者加人參二兩其人食少無穀氣者加粳

米五合氣逆者加半夏二兩

淡竹葉湯治產後虛煩頭痛短氣欲絕心中悶

亂不解方

生淡竹葉分麥門冬小麥各五升甘草兩生

薑三兩產室大麥用石四枚產室

右以水一斗煮竹葉小麥取六升去滓乃

內諸藥煮取二升去滓分二服羸人方作三

服若有人後入一兩若無人後入茯苓一兩

半亦佳人後茯苓皆治心煩及心虛驚悸安

定精神有利為良藥自依方服一劑不差更

自及張  
產後諸疾  
折傷

作若氣逆者加半隻二兩

大豆紫湯治產後百病及中風癱瘓或強口噤

或但煩熱若渴或頭身皆重或身癢劇者嘔逆

直視此皆因虛風冷濕及勞傷所為驗方按有前條

忘大藥汗  
吐利之德

大豆升五清酒升一

右二味以鐵鑊猛火熬豆令極熟焦煙去以

酒沃之去滓服一升日夜數服服盡更合小

汗虫以愈一以去風二以消血結如妊娘傷

折胎死在腹中三日服此酒即愈

小獨活湯治前狀方

前證

獨活升葛根升生薑兩六甘草兩二

右四味以水九升煮取三升去滓分四

服微汗佳按此下桂枝有附子方黃蘗證加之

桃仁芍藥湯治產後腹中疾痛方

桃仁升半芍藥升當歸升乾漆升桂心升

甘草兩二

右七味以水八升煮取三升分三服

赤小豆散治產後煩悶不能食虛滿方

赤小豆升三七枚燒為末以冷水和頓服之良

內補芎藭湯治婦人產後虛羸及崩傷過多虛

竭腹中絞痛方

產後  
腹痛

崩傷過多

煩悶不食

六

崩傷過多

內補芎藭湯治婦人產後虛羸及崩傷過多虛

竭腹中絞痛方

赤小豆散治產後煩悶不能食虛滿方

獨活湯治前狀方

大豆紫湯治產後百病及中風癱瘓或強口噤

或但煩熱若渴或頭身皆重或身癢劇者嘔逆

直視此皆因虛風冷濕及勞傷所為驗方按有前條


忘大藥汗  
吐利之德

大豆升五清酒升一

右二味以鐵鑊猛火熬豆令極熟焦煙去以

酒沃之去滓服一升日夜數服服盡更合小

汗虫以愈一以去風二以消血結如妊娘傷



心痛

芎藭 乾地黄 各四兩 芍藥 桂心 附子 各一兩  
 乾薑 各三兩 大棗 四十枚  
 右七味 以水一斗二升 煮取三升 去滓  
 分三服 不差復作 至三劑 若有寒苦 微下加  
 附子 三兩 始婦人 虛羸 腹中拘急 痛崩傷 虛  
 竭 面目無色 及唾吐血 甚良 按加艾最妙

治婦人 心痛方  
 布裹鹽 如彈丸 燒作灰 酒服 愈

變蒸時行

○小兒門

蒸散治 小兒變蒸中夾時行溫病或非在蒸時而得時行者方 按變蒸論

麻黃 杏仁 各半 大黃 銖六 按六銖今二分  
 右三味 先搗麻黃 大黃 為散 別研杏仁 如脂  
 乃細々入散 又搗令調和 內密器中 一月 兒  
 服 小豆大 一枚 以乳汁和服 抱令得汗 汗出  
 溫粉粉之 勿令見風 百日 兒服 如棗核 以兒  
 大小量之

諸瘕病

紫圓治小兒變蒸不解 並挾陽寒 溼壯 汗後熱  
 不歇 及腹中有瘕瘕 哺乳不進 乳出吐

見與以  
 不顧而吐切

也。嘔乳食痢先寒後熱方

赤石脂

代赭石

各一巴豆

三十枚

杏仁

五十枚

右四味為末

巴豆杏仁

別研為膏

相和更搗

二千杵

當自相得若硬入少蜜同搗之密器

中收三十日

完服如麻子

一丸與少乳汁令

下食頃後與少乳勿令多至日中當小下熱

除若未全除明旦更與一丸百日兒服如小

豆一丸以此準量增減夏月多熱善令粃疹

二三十日輒一服佳

紫圓

無所不療雖下不損

人

夫痢者小兒之惡病也

或有不及求醫而致困

痢論

者然氣聚於內必先有候常宜審察其精神而

採其候也  
身白肉魚際脈黑者是痢候魚際脈赤者熱

脈青大者寒

脈青細者為平也

鼻孔乾燥大小便不利是痢候

眼不明上視喜陽是痢候

牙後完骨上有青絡盛卧不靜是痢候


者脈

刺必令血出也

小兒髮逆上啼笑面暗色不變是痢候

鼻口青時小驚是痢候

目閉者時小驚是痢候



身熱、頭常汗出是痲候  
 身熱、吐衄而喘是痲候  
 身熱、目時直視是痲候  
 喜欠、目上視是痲候  
 目腫、卒大黑於常是痲候  
 目惕々而驚、手足振是痲候  
 臥夢笑、手足動搖是痲候  
 意氣下而妄怒是痲候  
 咽乳不利是痲候  
 身熱、小便難是痲候  
 吐利不止、厥痛時起是痲候

諸痲

大字、桑云物種曰六  
 痿、強也

弄舌、搖頭是痲候  
 大黃湯治少小風痲、積聚、腹痛、大矯、二十五疔  
 按、痲命名、  
 友、見千金方

大黃 人蔘 細辛 乾薑 當歸 升麻  
 各三 各三

石膏湯  
 治小兒中風、惡痛不能語、口眼了突、四肢不隨、  
 口眼了突、四肢不隨  
 石膏 一合 麻黃 銖八 升麻 銖二 射干 桂心 芍藥  
 當歸 銖四 細辛 銖二

右六味、以水一升、煮取四合、服如棗許  
 日三  
 右八味、以水三升、先煮麻黃三沸、去

灸痛

上沫內餘藥煮取一升三歲兒方為四服日

夜啼

諸痛灸法見新採千金撮要方少小嬰孺方三十二頁

少小治夜啼方

以下妊娠時食飲偏有<sup>物</sup>思者以是哺兒則愈

夜啼

又方取馬骨燒灰傅乳上飲兒啼即止

治小兒夜啼不已醫所不治者方

取狼屎中骨燒灰為末水服如黍米二枚即

定

驚啼

治小兒驚啼方

取雞屎白熬末以乳服之佳

治小兒腹大短氣熱者進退不安穀為不化方

大黃 黃芩 甘草 麥門冬 芒消各半

石膏一 桂心一

右七味咬咀以水三升煮取一升半三服若

歲以下小兒作五服

治小兒傷寒完黃方

搗土瓜根汁三合服之

又方

搗韭根汁澄瀋取如大豆許滴兒鼻中即出黃水差

嗽益差  
夜甚

四物款圓治小兒嗽益差夜甚初不得息不能  
啼方

款冬花 紫苑各一兩 桂心兩 伏龍肝六銖  
右為末蜜和如泥取如棗核大傅乳頭令兒  
飲之日三漸令兒飲之

卒暴  
有息

麻黃湯治小兒卒暴有息上氣不得安此惡風入

小兒諸病

脈方

麻黃四兩甘草二兩桂心半兩杏仁半兩半復生薑各二兩右六味以水五升  
煮取二升百兒服一合大小有節度服之便愈

雙紫圓

治小兒身熱頭痛食飲不消腹中脹

瀉或小腹絞痛大小便不利或重下數起小  
兒無異疾惟飲食過度不知自止哺乳失節  
或驚悸寒熱惟此丸治之不差更可重服小

兒欲下是其蒸候哺食減少氣息不快夜啼  
不眠是腹內不調悉宜用此丸不用他藥  
用神驗千金不傳方

巴豆

雞核仁各十銖 麥門冬十銖 甘草五銖 甘遂五銖

朱沙

各二銖 牡蠣各八銖 蠟各八銖 芫花各八銖

右八味以湯洗已豆研新布絞去油別搗  
芫草甘遂牡蠣麥門冬下篩訖研雞核仁令  
極熟乃內散更搗二十許藥燥不能相死更  
入少蜜定之半歲兒服如荏子一雙一歲二  
歲兒服如半麻子一雙三四歲者服如麻子  
二丸五六歲者服如大麻子二丸七歲八歲

腹滿瘕黃  
瘦瘠癯瘵

治

小兒胎前胎後飲食不化，肚腹痞滿，黃瘦瘠癯，四肢

瘕瘕瘕瘕，服之可悅方

芍藥 紫胡 各二 大黃 人蔘 各一 乾薑 各一

以松茸草略半 蠶甲 茯苓 各半

右八味為末，蜜丸，如大豆，服一丸，一歲已上

乳服三丸，七歲服十丸，日三

小兒瘕瘕

芒消紫圓，治小兒宿食，癖氣，瘕冷，往來寒熱，不

欲食，消瘦方

芒消 大黃 各四 半 芡 各一 代赭 各一

巴豆 二 杏仁 十 枚

右七味為末，別搗巴豆杏仁，治如膏，旋內藥

末，搗三千杵，令相合，強者，四少蜜，百日兒服

如胡豆一丸，過百日，至一歲，服二丸，隨兒大

小，以意節度，當候兒大便，中藥出為愈，若不

出，更服如初，宜常服，不妨乳方

治小兒羸瘦，惛憒，心驚，驚悸，

甘草五兩，為末，蜜丸，一歲兒，如小豆，十九日

三服，盡更合

地黃圓，治少小胃氣不調，不嗜食，生肌肉方

小兒常服

不嗜食，生肌肉

乾地黄 大黃各一兩 茯苓十 當歸 茶

胡杏仁 右六味為末，以蜜丸如麻子大，服五丸，日三

霍亂吐利 治小兒霍亂吐利方

人蔘 厚朴 甘草 白朮各八

右四味，以水一升二合，煮取半升，六分

日服一合，百日兒分三服，暮歲分三服，中間

偏乳服之，乳母忌生冷油膩等，一方如乾薑

一分，或如生薑三分

吐利 治少小吐利方

亂髮 燒灰 鹿角六 錄

赤遊腫

治小兒赤遊腫，末汁服一升，日三服

半身紅赤

治小兒半身皆紅赤，漸長引志方

牛膝 甘草

右二味，以咀合得五升，以水八升，煮三沸，去

身赤腫

治小兒身赤腫起方

熟米粉令黑，以唾和傳之

暴卒腹皮青黑

治小兒卒腹皮青黑者方 以酒和胡粉傳上，若不急治，須臾便死。又灸

不生髮

臍上下左右、左臍半寸、鳩尾下一寸、凡五處各三壯

治小兒頭不生髮、一物椒葉方

椒葉搗取汁、傳頭上、立生

治小兒頭不生髮方

燒鯽魚灰末、以醬汁和、傳之

治小兒風臍、遂作惡瘡、歷年不差方

取東壁上土、傳之大佳、若汁不止、燒蒼身子

粉之

治小兒臍不合方

取車轄脂、燒灰、日一傳之、又方燒蜂房灰、為

同

風臍

臍不合

口中白漫

來傳

治口瘡白漫方

先以父淨髮拭口、次取桑汁塗之

室舌不乳

治室舌不乳、不能收喉方

鹿角末、如大豆許、安舌下、日三四度、亦治小

兒不能乳、又方取蛇蛻、燒末、蘸醪醕、點藥、掠

舌下、愈、又方取田中蜂房、燒灰、酒和塗喉下

愈、按掠字、索、拂過也

治小兒口瘡、不得吮乳方

礬石如雞子大、置醋中、塗兒足下、二七遍、愈

口禁

雀屎圓、治小兒卒中風、口噤、不下一物方

雀屎如麻子丸必飲下昂愈大良雞屎白亦

佳

涎虫

治小兒口中涎虫方

以東行牛口中涎塗口中及頤上又桑白汁

塗之差

咽痛  
用交赤

升麻湯治小兒喉痛若毒氣盛便咽塞並治大人咽喉不利方

升麻

生薑

射干

各二  
橘皮一

右四味咬咀以水六升煮取二升去滓分三

小兒  
喉痹

服  
治小兒喉痹方

桂心

杏仁

各半

解頤  
不行

右二味為末以綿裹如棗大含咽汁

治小兒腦長解頤不合羸瘦色黃至四五歲不能行半復愈方

半復

生薑

芎藭

各一

細辛

三

桂心

一

頤


十枚

右六味咬咀以醇苦酒五升漬之晬時煮三沸絞去滓以綿二片浸藥中適寒溫以解頤上冷更溫之復愈如前朝暮各三四服乃止

二十日愈

治小兒解頤用生蟹傳方

按用生蟹非孫氏本  
色恐後人攙入矣



蟹代試可以身

生蟹足白飲各半

同上

右二味搗末以乳和傳顛上立愈

治小兒解顛方

細辛桂心各半乾薑十

右三味為末以乳汁和傳顛上乾復傳必兒

面赤即愈

同上

治小兒顛開不合方

防風一柏子仁一白芨各一

右三味為末以乳和傳顛上日一十日知二

十日愈

狐疝癩  
大人亦治

治小兒狐疝傷損生癩方

桂心十白朮一地膚子二

右三味為末以蜜和凡白濁服如小豆七丸

日三亦治大人

又方

芍藥茯苓各十防癩一作防風大黃各半

桂心蜀椒各六服如大豆一丸日五服可

右七味為末蜜和服如大豆一丸日五服可

加至三丸

治小兒氣癩方

土瓜根芍藥當歸各一

十六

氣癩

陰腫

脫肛

右三味、以水二升、煎取一升、服五合、日

二

治小兒陰腫方

搗薑青、薄上、

蟹頭圓、治小兒積冷久下、差後餘脫肛不瘥、腹

中冷、肛中疼痛、不得入者方

死蟹頭二枚、灸磁石四桂心三小帽皮一枚、

同法

右四味、為末、蜜丸如大豆、兒三歲至五歲服

小兒脫肛方

灸頂上旋毛中、三壯、即入、又灸尾翠骨三壯

疳濕瘡

又灸臍中、隨年壯

治小兒疳濕瘡方

鐵衣、著下部中、即瘥

久痢

灸第七椎、挾脊兩傍、七壯、未瘥、加七壯

治小兒久痢膿濕重方

艾葉五升、以水一升、煮取一升半、分為三服

便後

治大便竟出血方

蟹頭一枚、灸令黃黑、為末、以飲下五方已多

尿血

治小兒尿血方

灸第七椎兩傍各五寸、隨年壯

遺尿

治小兒遺尿方

瞿麥 石韋 龍膽 皂莢 桂心 各半 雞

腸草 人參 各一 車前子 六銖

右八味為末，蜜丸，每食後服，如小豆大，五丸

日三，加至六七丸

又方 小豆葉搗汁服

又方

燒雞腸為末，漿水服，方寸匕，日三，一云，面此

斗服

又方 灸臍下一寸半，隨年壯，又灸大敦三壯，亦

治尿血

小便不通

治小兒小便不通方

車前子 切一 小麥 升一

右二味，以水二升，煮取一升二合，去滓，煮粥

服，日三四

又方

冬葵子一升，以水二升，煮取一升，分服，入滑

石六銖

治小兒淋方

取蜂房亂髮燒灰，以水服一錢匕，日再

治小兒鼻塞生息肉方

通草 細辛 各一

鼻塞

淋

六

聾耳

右二味、搗末、取藥如豆、著綿纏頸、內鼻中、日

身瘡

治小兒聾耳方  
末石硫黃、以粉耳中、日一夜、

不語

治小兒身瘡方  
燒雞屎白筒中吹之

治小兒四五歲不語方  
末赤小豆、酒和、傳舌下、

食不知  
饑飽

又方、灸足面踝、各三壯、  
治小兒食不知饑飽方  
糞屎二七枚、燒為末、服之、

明目  
常服

○目病門

補肝蒸薯散、常服明目方

蒸薯子三升、浮淘、以清酒三升、煮令熟、曝乾、  
治下篩、以井花水和、服方寸匕、稍加至三匕、  
無所忌、可少小作服、令人克肥、明目洞視、  
水煮酒服亦可、  
按翼用水  
三易水

雀目

治雀盲方

地膚子、西決明子、一

右二味、為末、以米飲汁和丸、食後服二十丸、  
至三十九日、二盡、即更合、差止、

治眼暗方

明目  
常用

十九

出目眩

治 每朝含黃蘗一瓜甲許使津置掌中拭目眩  
以水洗之至百日眼明也此方可終身行之  
永除眼疾神良  
治 目中眩不出方  
以蠶沙一粒吞下即出

鼻鼈

○ 鼻病門

治 鼻鼈方  
通草 細辛 附子  
右三味各等分為末以蜜和綿裹少許內鼻  
中

息肉不  
聞香  
臭

又方

灸皂莢為末如小豆大以竹管吹鼻中  
治 鼻中息肉不聞香臭方

燒礬石末以面脂和綿裹著鼻中數日息肉  
隨藥消落

又方

末瓜丁如小豆許吹入鼻必消如此三四度  
良

又方

細辛 釜底墨  
右二味為末水知服方寸匕

同上

治鼻中息因方

灸上星二石壯穴在直鼻入髮際一寸

鼻中生瘡

治鼻中生瘡方

擣杏仁乳傳亦燒核壓取油傳之

大便出血  
口鼻皆  
火

治大便出血及口鼻皆出血血上心胸氣急此

是勞熱所致方

生地黄<sub>兩</sub>蒲黃<sub>升</sub>地骨皮<sub>兩</sub>黃芩<sub>兩</sub>芍藥

生竹筴<sub>兩</sub>各三

右六味咬咀以水八升煮取二升七分溫

三服

凡吐血衄血溺血皆藏氣虛膈氣傷或起驚悸

吐血  
尿血

治之方

生竹皮<sub>升</sub>芍藥<sub>兩</sub>黃芩<sub>兩</sub>各二  
芍藥<sub>兩</sub>當歸

桂心<sub>兩</sub>甘草<sub>兩</sub>各一

右七味咬咀以水一斗煮竹皮減三升下藥

煎取二升分三服

白鼻衄

生地黄湯治鼻衄方

生地黄<sub>兩</sub>黃芩<sub>兩</sub>阿膠<sub>兩</sub>甘草<sub>兩</sub>各二  
柏葉<sub>把</sub>

右五味咬咀以水七升煮取三升去滓內膠

取二升半分三服

又方

生地黄<sub>兩</sub>阿膠<sub>兩</sub>蒲黃<sub>兩</sub>各六

二十五

右三味以水五升取三升分三服

又方

取亂髮五兩燒作灰以管吹鼻中棗核大不止益吹之以血斷止並水服方寸匕日三甚者夜二已困不識煮服亦佳

治鼻中出血不止方

持楮葉汁飲三升大良

同上

口中瘡

○口疳門

治口中瘡久不差入胸中並生瘡三年已上不差者方

同上

濃煎薔薇根汁含之又楷々咽之日三夜一冬用根夏用莖葉

治口瘡不歇方

牛膝 生薑荷根 各三 黃蘗 一

右三味改咀以綿裹酒三升漬一宿微火煎

一兩沛細々含之

治口中瘡爛不得食方

升草 十 黃連 六 杏仁 二十

右三味為末合和綿裹杏仁大含之勿咽日

三夜一

治口吻瘡方

二十二

吻瘡

同上

以松白皮及濕貼之三四度差

又方

一 梔子 月草各十 細辛 桂心各十 芎藭

右五味為末蜜丸食後服七丸日再服差

又方

芎藭 白芷 橘皮 桂心 棗肉各一兩半

右五味為末蜜和為丸食後服十五丸又念

口鼻身臭

五香圓治口及身臭令香止煩散氣方

豆蔻 丁香 藿香 零陵香 香木香

白芷 桂心各一兩 香附子二兩 升麻 當歸

右十一味為末蜜和丸常含一丸如大豆許

咽汁日三夜一亦常可含咽之五日口香十

日遍體香二七日衣被香三七日下風人聞

香四七日洗手水落地香五七日把他手亦

香慎五辛下氣去臭

含香圓治口氣臭穢宜常服之方

丁香 升麻 細辛 桂心各二兩

右五味為末蜜和丸如彈子大臨卧服二丸

主口香去臭方

同上

同上

二十三

升草錄三十 白芷錄十 芎藭四錄二十  
右三味治下節以酒服方寸匕日三服三十  
日香

舌卒腫

○舌病門

治舌卒腫滿口溢血如吹猪胞氣息不得通須  
史不治殺人方

急以指刮破舌<sup>西</sup>邊去汁即愈亦可以鉞刀決  
而邊破之以瘡膏傅之按瘡膏下條釜

同上

又方

刺舌下面邊大脈血出勿使刺著舌下中央

猪胞如

治舌腫起如猪胞方

脈血出不止殺人如上治不愈或血出數升  
以燒篋令赤瘡數週以絕血也

舌腫滿口

治舌腫滿口不得語方

鹽一升一蠶蟲三十枚

釜下薑末以酢厚傅舌上下脫去更傅須史  
昂消若先決出血汁竟傅之彌佳凡此患人  
皆不識或治益困殺人甚急但著其舌下自  
有噤蟲形狀或如蝶蛭或如卧蠶子細者之  
有頸尾其頸少白燒鐵針烙頸上使熱即自  
消

古強

右二味、以水三升、煮三沸、含之稍々咽之、日三、

治舌強不得語方

礬石 桂心 按、古礬方只礬石

右二味、等分為末、安舌下、立愈、

舌上里有數孔、大如筋、出血如湧泉、此心藏病、

古聖  
孔有數

治之方、

戎鹽 黃芩 一作葵子 黃蘗 大黃 各五 人參

桂心 甘草 略二

右七味末、蜜丸梧子大、以飲服十丸、日三亦

燒鐵籠焙之、

緊唇

○唇病門

治緊唇方

纏白布、作大燈炷如指、穿符又上、燃炷令又

汗出、拭取傳唇上、日二三度、或故青布亦佳、

並治濡唇、按、濡

又方

取蛇皮拭淨、燒為灰、傳之又方、青布灰、以酒

服之、脂和塗亦可、

治唇生瘡方

以頭垢傳之、日三度、

唇瘡

同上

冬月唇乾

唇面皴裂

治唇邊生瘡連年不差方 按今代深

以八月藍葉十斤絞取汁洗不過三日即差

治冬月唇乾拆血出方

搗桃仁以猪脂和傅之

治遠行唇口面皴裂方

熟煎猪脂將行夜常取傅面行萬里野宿不

損 按皴七人切皮細起也杜詩手脚凍皴皮因死

齒根腫

○齒病門

治齒根腫方

松葉切一把鹽合

齒動

治齒根動欲脫落方

○生地黃綿裹著齒上咋之又咬以汁漬齒

根日四五度著之並咽汁十日內大佳 按咋

治齒斷間津液血出不止方 按斷與齧同齒根內

生竹筴二面醋煮含之 按加枯礬

治齒根血出方

溫童子小便半升取三命含之其血即止也

治風齒疼痛方

灸外踝上高骨前交脈三壯又以線量手中指至掌後橫文折為四分量橫文後當臂中

同上

灸二壯、愈、灸之、當隨左右

治齒痛方

取自死蚯蚓乾者、搗末、著痛處、即止

齒齩痛

治齒齩痛、不可食生果方

馬齒莧一把、嚼之、即差

喉痺

○喉病門

治喉痺方

燒牛角末、酒服之、良

同上

治喉痺、卒不得語方

未桂心、如枣核大、綿裹著舌下、須臾破

同上

凡喉痺、深腫、連頰、吐氣、數者、名馬喉痺、治之方

咽痛

治咽痛、逆氣不能食方

麻子一升、熬令黑、以酒一升、淋取汁、空心一

服一升、漸至二升、多汗好、覆勿觸風冷、此方

兼理產婦及丈夫中風、如角弓反張、口噤不

開、大驗

咽腫面腫

治卒風咽腫、面腫者方

杏仁末、和雞子黃、更搗、傳上、乾復易之、七八

度、若腫出、煮醋和、伏龍肝、傳、乾更易之

耳出膿血

○耳病門

治腎熱背急變痛耳膿血出或生肉塞之不聞人聲方

磁石 白朮 牡蠣 各五  
地黃汁 各一芍藥 西大 五  
右九味 以水九升 煮取三升 分三服

耳聾方

治耳聾方

單麻一百顆 炆大棗 十五枚  
右二味 熟搗 丸如杏仁大 內耳中 三十日 差

又方 硫黃、雄黃、各等分 為末 綿裹內耳中 數日 聞人語 聲

又方

先以紙纏去耳中汁 次以礬石末粉耳中 次以石鹽末粉其上 食久乃起 不過再度 永差

治聾耳方

鹽礬 聾耳 即礬礬也 按燒礬可也

蟲入耳

取黃礬燒綿裹內耳中 不過三二日 愈 或以葦管吹耳中 卒腫出膿 耳

治石蟲入耳方 取車轄脂 傳耳孔 蟲自出 聾耳膿血

以葱淡灌身中、蟲即出、亦治耳聾、

令面

○面病門

令人面潔白悅澤、顏色紅潤方、

採三株桃花、陰乾為末、空心飲服方寸匕、日  
三、並細腰身、

又方

酒漬桃花服之、好顏色、治百病、二月三日、

野

梅二月、三月、

治外膏、主面野、

梅治去、

白礬、石硫黃、白附子、

面黑

右三味為末、以酢一盞、漬三日夜、淨洗面、傳

之、莫見風、慎三七日、可白如雪、

松丹散、治面黑、令人面白如雪方、

右二味、治下篩、酒服一、刀圭、日三、男十日、女

二十日、知、知、知、止、黑色皆從大便出、面白如

雪、

治面野方

李子仁為末、和雞子白、傳一宿、即落、

又方

白附子為末、酒和傳之、即落、

治人面黧黯黑膏色粗陋皮厚狀醜方  
白蜜和茯苓粉傅之七日愈

又方

杏仁酒浸皮脫搗碎絹袋盛夜取拭面  
又方酒浸雞子三枚蜜封四七日成傅面白如  
雲

又方

杏仁為末雞子白  
右二味相和夜塗面明旦以米泔洗之

粉澤

治面粉澤方

搗生葱絲子汁塗不過三上

又方

熬礬石以清酒和傅之不過三上

年少面  
瘡

治年少氣盛面生瘡瘡方

按瘡心癩瘡也藥軍切

胡粉研水銀一

右二味以臘月猪脂和熟研令水銀消白

以傅面旦起布拭之慎勿水洗至暝又傅面

不過三上按此方眼也莊子三攬梧桐而顛

治面皯方也梅也此方眼也莊子三攬梧桐而顛

生地黄三枸杞根十

右二味先搗枸杞次搗地黄曝乾合篩空服

酒服方寸匕日三久服顏如童子此秘方也

面皯

灸法

脚弱

脚氣病門

論詳千金方

八所灸法

按此法勿忽諸  
治要亦在灸法

越婢湯治風痺脚弱方

麻黃六石膏半斤白朮四大附子一枚生薑三芎藭三

草二大棗十五

右七味以水七升先煮麻黃再沸掠去沫入諸藥煮取三升分三服覆取汗

微腫

小蠶甲湯治身體虛脹如微腫胃心痞滿有氣

壯熱小腹厚重而脚弱方  
蠶甲 黃芩 升麻 麻黃 羚羊角 桂

脛骨腫疼

治脚氣初起從足起至膝脛骨腫疼方

取麻子似牛蟬蟲故名蟬麻也若冬月無蟬麻

取蒴藿根搗研和酒糟三分根一分合蒸熟

及熱裹腫上如前方日二即消亦治不仁頑癩

梅時珍曰范赤  
作蟬即范麻也

菜羹湯治脚氣入腹困悶欲死腹脹方

吳茱萸六木瓜切顆

蒸熱搗碎當茶服

入腹困悶

腎節疼  
四肢拘急

右二味以水一斗三升煮取三升方三服相  
去如人行十里久進一服或吐或行或利或  
大熱悶即差此起死方  
物附子湯治風濕相搏骨節煩疼四肢拘急  
不可屈伸近之則痛白汗出而短氣小便不利  
惡風不欲去衣頭面手足時々浮腫方  
附子二枚桂心四兩白朮二兩甘草二兩  
右四味以水六升煮取三升分三服微  
汗愈大汗煩者一服五合體腫者加防己四  
兩悸氣小便不利加茯苓三兩既有附子今  
加生薑三兩

入腹氣急

半復湯治脚氣上入腹腹急上衝白氣急欲絕  
方

半復升桂心八兩乾薑五兩射草  
附子各三兩蜀椒合二人漫細辛  
右八味以水一斗煮取三升分三服初  
稍々進恐氣衝上格塞不得下小々服通人  
氣耳

紫蘇子湯治脚氣上氣昔宋湘東王在南列患脚  
氣困篤服此湯太得力方

紫蘇子半復各一前胡厚朴射草  
當歸各一橘皮三大棗二十生薑一桂心四

身體疼痛

右十味、以水一斗三升、煮取三升半、分

為五服、日三夜一

附子湯治濕痺緩風身體疼痛如欲折肉如錐刺

刀割方

附子三枚芍藥 桂心 甘草 茯苓 人蔘

各三白朮四兩 右七味、以水八升、煮取三升、分三服

中風冒昧  
便利遺失

○風懿門按所謂也

小續命湯治中風冒昧不知痛所拘急不得轉  
側、四肢緩急遺失便利此大續命湯同偏宜產後

失血並老小

麻黃 桂心 甘草各二 生薑五兩 芍

藥 白朮一方作附子 防己 芍藥 黃

芩各一兩 防風半兩 右十二味、以水一斗二升、煮取三升、分

三服

瘡癰偏枯

大續命湯治肝風卒然瘡癰依古法用大小  
續命二湯通治五藏偏枯賊風方

麻黃 芍藥各三 乾薑 石膏 人蔘 當

歸 桂心 甘草各二 杏仁四十枚

右九味、以水一斗、煮取三升、分三服

灸法

卒中

筋急不行

眼戴精  
上挿

不語

不識人

中風不拘  
久卒

扁鵲云治卒中惡風心悶煩毒欲死急灸足大

趾下橫文隨年壯立愈趾作止

若筋急不能行者內踝筋急內踝上四十壯外

踝筋急灸外踝上三十壯三愈

若眼戴精上挿灸目眵後二十壯

若不能語灸第三椎下百壯

若不識人灸肋頸七壯

治久風卒風緩急諸風卒寤動不自覺知或心

腹脹滿或半身不隨或口禁不言涎唾自出目

閉身覺或冷直或煩悶恍惚喜怒無常或唇青



口白戴眼角弓反張始覺寤動灸神庭一處

七壯穴在當耳直上髮際是次灸曲差二處各

七壯穴在神庭而傍各一寸半是次灸上關二處

各七壯一名客主人穴在耳前起骨上廉陷者

中是次灸下關二處各七壯穴在身前下廉動

脈陷者中是次灸頰車二處各七壯穴在曲頰

陷者中是次灸廉泉一處七壯在管頤直下骨後陷

者中是次灸山會一處七壯穴神庭上二寸是

次灸百會一處七壯穴在當頂上正中央是次

灸本神二處各七壯穴在耳正直上入髮際二

分是又作次灸天柱二處各七壯穴在項後兩

九、必管作五  
印心俞也

大筋外入髮際陷者中是次灸陶道一處七壯  
穴在大椎筋下間是次灸風門二處各七壯穴  
在第二椎下而傍各一寸半是次灸心膈二處  
各七壯穴在第九椎下而傍各一寸半是次灸  
腎膈二處各七壯穴在第十四椎下而傍各一  
寸半是次灸膀胱膈二處各七壯穴在第十九  
椎下而傍各一寸半是次灸曲池二處各七壯穴  
在西肘外曲頸陷者中屈肘取之是次灸肩髃二  
處各七壯穴在西肩頸正中而骨間陷者中是  
次灸支溝二處各七壯穴在手腕後臂外三寸  
兩肩間是次灸合谷二處各七壯穴在手大指

虎口而骨間陷者中是次灸間使二處各七壯  
穴在掌後三寸而筋間是次灸陽陵泉二處各  
七壯穴在膝下外尖骨前陷者中是次灸陽輔  
二處各七壯穴在外踝上絕骨端陷者中是次  
灸崑崙二處各七壯穴在外踝後跟骨上陷者  
中是下畧

肝風台候其口不能言

當灸鼻下人中次灸大椎次灸肝膈第九椎  
下是五十壯餘處隨年壯眼暗灸之得明二  
三百壯良

乾薑附子湯治心虛寒風半身不遂骨節離解

半身不遂  
口面喎邪



緩弱不收、便利無處、口面喎邪方

乾薑 附子各八 桂心 麻黃各四 芎藭各三

右五味、咬咀、以水九升、煮取二升、分三服、三

不仁善笑 日後服一劑

芎藭湯治卒中風四肢不仁善笑不息方

芎藭半一兩 黃芩 石膏一兩 當歸 秦艽

麻黃 桂心 乾薑 甘草各一 杏仁二十枚

右十味、咬咀、以水九升、煮取三升、分三服、

口眼禁不識人暴腫

排風湯治諸毒風邪氣所中口噤閉絕不識人及身體疼煩面目手足暴腫者方

犀角 貝子 升麻 羚羊角各一

右四味治下節為粗、以水二升、半內四方

寸匕、煮取一升、去滓服五合、殺藥者以意增

之、若腫和羅子傳上日三度、老小可斟酌加

減、神良、亦可多合備用

體痛如錐刀所刺

治濕風體痛欲折肉如錐刀所刺方

附子 乾薑 芍藥 茯苓 人參 甘草

桂心各一 白朮四

右八味、咬咀、以水八升、煮取二升、日三服、

無名腫痛

打 大棗湯治歷節疼痛

大棗十枚 附子一枚 芍草一斤 黃耆四兩 生薑二兩 麻黃

五  
右六味、咬咀、以水七升、煮取三升、每服一升、  
日三

針法

偏風針法

風池 肩髃 曲池 支溝 五樞 陽陵

患脚針法

泉 巨虛下廉 凡針七穴、即差

仁壽宮 備身患脚、奉勅  
環鈿 陽陵泉 巨虛下廉 陽輔 凡針

患偏針法

庫狄欽患偏、不得挽弓  
針肩髃一穴、即得挽弓、甄權處行

不語四肢不收

譚丁可切  
垂下貌

獨活湯治風懿不能言、四肢不收、手足譚曳方

獨活 西桂心 芍藥 枯萐根 生葛 各二

生薑 西甘草 三

右七味、咬咀、以水五升、煮取三升、分三服、日

三

舌強不語

桂湯治卒失音方

濃煮桂汁服一升、覆取汗亦可、末桂著舌下

漸々嚙汁、濃煮大豆汁、含亦佳

附子散治中風、手足臂不仁、口面喎僻方

附子 桂心 各五 細辛 防風 人蔘 乾

薑 各六

已偏著身古強

治 右六味治下筋酒服方寸匕日三稍增之  
中風面目相引口偏著身牙車急舌不得轉

獨活 西竹瀝 生地黄汁各一  
右三味合煎取一升頻服之即愈

又方

酒煮桂取汁以故布搦病上正而止左喎搦  
右右喎搦左此秘方不傳余常用大效

又方治口身僻

防風 附子 葛根 各二 柏實 麻黃 各三  
獨活 生薑 各四 杏仁 各三十

半身不遂

治 半身不遂手足拘急不得屈伸身體冷或  
四服

狀 半身不遂或欲得食或小便不利皆療之  
古今錄驗各  
八風續命湯

人參 桂心 當歸 獨活 黃芩 乾薑  
身草 各八 銖 石膏 半 西 杏仁 枚 四十  
右七味以井花水九升煮取三升分三  
服日三取汗不汗更合加麻黃五兩合服  
按厥逆者加附子一枚

瘦不傳染

○傷寒雜治

按。載世傷寒論者。其餘詳撮要。

斷溫疫轉相染著。乃至滅門。延及外人。收視者。

方

赤小豆

鬼箭羽

鬼白

雄黃

各三

右四味末之

按。傷寒總病論。可併見。

以蜜和。服如小豆一丸。可與病人同床傳。

表裡大熱

治時病表裡大熱欲死者

大黃

寒水石

芒消

石膏

升麻

麻

黃葛根

紫葛

傷寒後症

治傷寒後不了。朝夕有熱如瘧狀方

知母

麻黃

甘草

芍藥

黃芩

桂心

各一

右六味。以水七升。取二升半。服五合。日

三。溫覆令微汗。若心煩不得眠。其人欲飲水

當稍飲之。令胃中和。即愈。

嘔噦

治傷寒嘔噦方

通草

生薑

橘皮

粳米

各三

右四味。以水五升。煮取一升。隨便稍飲。

不差更作。取差止。

治熱毒攻手足。赤腫焮熱。疼痛欲脫方

濃煮虎杖根。適寒溫。以漬手足。令至踝一尺。

手足焮熱  
疼、痛

病後鼻衄

止、又方、稻糠灰汁漬之。按、穰、字、穰、也、穰、又方、  
取常思草、絞取汁、以漬之、一名蒼耳。  
治傷寒鼻衄、肺間有餘熱也、熱因血自不止、用  
此方、

牡蠣

二兩 石膏 六兩

右二味治下節、酒服方寸匕、日三四、亦可蜜

丸如梧子大、用大治、病差後、小勞便鼻衄者、

治傷寒熱病後、口乾喜唾咽痛方

大棗 二十枚 烏梅 十枚

右二味合搗蜜和、含如杏核大、咽汁、甚驗、

治傷寒下利膿血方

阿膠 一斤 黃蘗 二斤 黃連 四斤 梔子 十枚

右四味、咬咀、以水六升、煮取二升、去滓、內阿

膠、更煎令消、方為三服、

甲乙方、無黃蘗、

止汗方

杜仲 牡蠣 各等

右二味治下籠、臨夜臥、以水服五錢匕、

牡蠣散、治卧即出盜汗、風虛頭痛方、

牡蠣 白朮 防風 各三

右三味治下籠、酒服方寸匕、日二、止汗無虫

此方一切泄汗服之三日皆愈、

黃龍湯治傷寒差後更頭痛壯熱煩悶方、仲景

甲

瘧後熱頭痛

盜汗頭痛

止汗

下利膿血

熱病後喜唾咽痛口乾

病後鼻衄

合復

名小柴胡湯方或用竹葉石膏湯其効如神

治病新差過美飲食過多食復者方

早起復

取所食飲燒為末調飲二錢匕日以三服  
治重病新差早起勞及飲食多致危欲死方

勞復欲絕

燒鼈甲末飲服方寸匕

麥門冬湯治勞復氣欲絕起死人方

麥門冬一斤 西芹草二斤 系二斤 竹葉一斤

右四味以水七升煮粳米一升令熟去

米內諸藥煎取三升分三服不能服者綿滴

禁勞復

湯內口中用之有効

燒頭垢如桐子大吞服之

黃疸證

○黃疸病門按千金方原出此論詳千金方易檢

黃者芍藥桂酒湯治黃疸方

黃耆五兩 芍藥二兩 桂心三兩

右三味以苦酒一升水七升合煎取三

升飲一升當心煩也至六七日稍々自除心

黃疸治法

煩者苦酒阻故也

黃疸之病疸而渴者其病難治疸而不渴其病

微熱

四十一

黃疸利復

桂枝黃耆湯治諸病黃疸、宜利其小便、假令脈浮、當以汗解方

桂枝 芍藥 生薑 各三兩 甘草 二兩 黃耆 五兩 大

棗 十二枚 右六味、咬咀、以水八升、微火煎取三升、去滓、溫服一升、晝微汗、須臾不汗者、飲熱稀粥、以

黃疸取汗

助藥、若不汗、更服湯。麻黃醇酒湯治傷寒熱出表、晝黃疸方。麻黃三兩、以醇酒五升、煮取一升半、盡服之、

溫覆、汗出即愈、冬月寒時用清酒、春月宜用水。

黃疸治方

茵陳湯治黃疸身面目盡黃方

茵陳 黃連 各三兩 黃芩 一兩 甘草 人

同上

茵陳湯治黃疸身面目盡黃方。茵陳 黃連 各三兩 黃芩 一兩 甘草 人。右七味、咬咀、以水一斗、煮取三升、分三服、日

同上

三黃散治同前。大黃 黃連 黃芩 各四兩。右三味、治下節、先食服方寸匕、日三、亦可為丸。

四十二

五苓散治黃疸利小便方。猪苓 茯苓 澤瀉 白朮 桂心 各三錢

活字九

右五味、搗篩為散、湯時服方寸匕、極飲水、利小便、及汗出愈、  
小半復湯、治黃疸、小便色不異、欲自利、腹滿而喘者、不可除熱、除熱必噦、方

半復 生薑 各半

右二味、以水七升、煮取一升五合、分再服、有人常積氣結而死、其心上暖、以此湯小許、汁入口、遂法

黃疸治法  
黃疸多赤  
或逆冷

治完黃身面目悉黃如金色、小便如濃煮藥汁、家醫不能療者方

茵陳 梔子 略 四 黃芩 大黃 柴胡 升

麻略 三 龍膽 而二

右七味、以水八升、煮取二升七合、分三

服、若身體羸、去大黃、加梔子五六兩、生地黄

一升、芒消二兩、近効方加梔子四兩、枳實三兩、

夫黃疸已久、變作桃皮色、心下有堅、嘔逆不

下、飲食、小便極赤、少手足逆冷、脈深沈極

微、細遲者、不宜服此方、得下必變、碗也、宜與

大茵陳湯、除大黃、與生地黄五兩、服湯盡消

息者、脈小、浮出形小、見不甚沈、微便可治也

脈浮見者、黃當明、不復作桃皮色、心下自寬

也、再按大茵陳湯方、次出十一味者、是

治黃

治瘧黃方

茵陳 黃蘗 梔子 大黃 各三 黃連

右五味，以水九升，煮取三升，分三服，先

服湯後服丸方

大黃 五 茵陳 梔子 各三 黃芩 黃蘗 黃

連 各二

右六味為末，以蜜丸如梧子大，白飲服二十

丸，令微利。

茵陳湯治傷寒七八日，實瘀熱結，身黃如橘，小

便不利，腹微脹滿，宜下之方

茵陳 六 大黃 二 梔子 四 十

黃脹

酒疸懷

右三味，以水一斗二升，先煮茵陳取五

升，去滓，次內梔子大黃，煎取三升，分服，日三

小便當利，如皂莢沫狀，色正赤，當腹減，黃悉

隨小便去也。范注：用石膏，用石膏，用石膏。

枳實大黃湯治傷寒飲酒，食少，飲多，痰結，瘧黃

酒疸，心中懊懣，而不甚熱，或乾嘔方。

枳實 五 大黃 三 豉 半 梔子 七

右四味，以水六升，煮取二升，分三服，心

中熱，痰懊懣，治之。

大茵陳湯治內實熱盛，瘧黃如金色，脈浮大

滑實，脈數者，大瘧黃，多是酒客，勞熱，食少，胃中

色如金色

四十四

熱或溼毒內熱者故黃如金方

茵陳 黃蘗 大黃 白朮 黃芩 枳實 枳殼 茯苓 前胡 枳實 枳殼

子 枚二十

右十一味、以水九升、煮取三升、分三服、得快下、消息三四日、更治之

悉黃短氣

茵陳圓、治氣淋、臌脹、腹大、身體面目悉黃、及酒疸、短氣不得息方

茵陳 天門冬 梔子 大黃 桂心 通草 石膏 各二半 復升 右八味、蒸大黃、通草、天門冬、半復、梔子、曝令

身黃額黑便重其熱

乾、合搗篩、蜜丸、加大豆、服三丸、日三、忌生魚、以豆羹服、不得用酒、一方、去石膏、內滑石、二

額黑、大便溏黑、足下熱、此為女勞、腹滿者難治、治之方

滑石 石膏 絡等 右二味、治下節、大麥粥汁、服方寸匙、日三、小便利便差

有針灸法、余未試、畧之、詳千金方

○ 溫瘧門

按周禮疏云。瘧。寒熱也。故有瘧寒之疾。此疾。寒熱。而此疾。寒熱。漸可。似。之。變。證。累。起。唯。同。用。紫。胡。類。極。妙。

三四空回可用

紫故枯萎根湯

治瘧而空喝者方

按喝。喝。訛。許。葛。切。又。於。邁。

切。斯。聲。又。喉。喝。怒。聲。

柴胡

黃芩

人蔘

甘草

生薑

各三

枳實

桔萎根

四

右七味

以水一斗二升

煮取六升

多寒

牡蠣湯

治瘧者多寒治之方

牡蠣。一。作。牡。蠣。三。兩。代。之。

牡蠣

麻黃

四

甘草

蜀漆

恒。山。代。之。

空汗妙

麻黃湯治瘧須空汗方

麻黃

桔萎根

大黃

各四

甘草

一

右四味

以水七升煮取二升半分二服

夜空回空

治瘧或間日空夜空者方

恒山

竹葉

三

輔米

石膏

右四味

以水八升銅器中漬藥露置星

月下

高淨處橫刀於其上明日取藥於病人

房中以銅器、緩火煎取三升、分三服、清旦一服、未晡前一食頃一服、臨晡一服、三服訖、靜室中臥、莫與人語、當下一日勿洗面及漱口、勿進食、取過時不覺、乃潔洗進食、並用藥汁塗五心、曾前額面、藥滓置頸邊、曾用神驗、救急

二日一完

烏梅二枚

恒山圓、治瘡癰、說不可具、方按瘡與癰同、二日一完

恒山、知母、甘草、大黃各十銖、麻黃四

右五味、為末、蜜和、凡如梧桐子、未食服五丸

日二、不知漸增、以瘡為度、肘后、大黃無

象治無効

治勞瘵、積時不斷、象治無効者、方

生長大牛膝一握、切、以水六升、煮取二升、分再服、第一服、取未晡前食頃、第二服、取臨晡時、

目不明

○肝藏方

治肝虛目不明方

灸肝腧二百壯、小兒酌飲、

神明度明圓、治久患腹內積聚、大小便不通、氣

上搶心、腹中脹滿、逆害飲食方、

大黃、芍藥各三兩

右二味、為末、蜜丸、如梧子大、服四丸、三不知、

赤不血腹痛脹滿

三下懸

四十七

心下結積

可加六七丸以知為度  
陷胃湯治胃中心下結積飲食不消方

久痞堅滿

枯藟實 大黃 黃連 各三  
右四味以水五升煮取五合分三服  
芒遂湯治暴堅久痞腹有堅方

黃芩 芒消 桂心 細辛 各一大

中食急結

右六味以水八升煮取二升半分三服  
土瓜圓治諸藏寒氣積聚煩滿熱飲食中蠱毒  
或食生物及水中蟲卵生入腹而成蠱若為魚  
蟹留飲宿食婦人產瘕帶下百病陰陽不通利

大小便不節絕傷墮落寒熱交結唇焦黑身體  
消瘦嗜卧少食多噎產乳胞中餘疾股裡熱少  
腹中急結痛引陰中<sub>中</sub>方

土瓜根 桔梗 各半 杏仁 升大黃 一斤 蓬二  
乾 升米下曝

所食不消

右四味為末蜜丸如梧子大空<sub>腹</sub>飲服三九日  
三不知加之以知為度  
治凡所食不消方

取其餘類燒為末酒服方寸匕便吐其宿食  
昂差有食桃不消作病者以時食桃就樹間  
得槁桃燒服之登時吐病出甚良

常欲食米、不得米、以曾中清水出為米糞、治之方、

○雞屎白米合

右二味、合炒、令米焦、搗末、以水二升、頓服、取盡、須臾、吐出、病如、研米、若無、米當出、痰自此永憎、米不復食之矣。

病後不眠

○膽腑方

澀膽湯、治大病後、虛煩、不得眠、此膽寒、故也、宜服此方、

半復

竹筴

枳實略

二橘皮

三

生薑

草

右六味、以水八升、煮取三升、分三服、酸棗湯、治虛勞、煩擾、奔氣、在胸中、不得眠方、

○酸棗仁、人葠、桂心、生薑、石膏

茯苓

知母

各三

甘草

右八味、以水一斗、先煮酸棗仁、取七升、去滓、下藥、煮取三升、分三服、日三、

嘔吐血

○吐血、血下血門

生地黄湯、治憂恚、嘔血、煩滿、少氣、曾中痛方、

生地黄、斤大、棗

五枚

阿膠

甘草

各三

四十九

唾血

右四味咬咀，以水一斗，煮取四升，分四服，日三夜一。

治噫止唾血方

石膏<sub>四</sub> 厚朴<sub>三</sub> 麻黄 生薑 五味子 半

复 杏仁<sub>略</sub> 三 小麥<sub>一</sub>

右八味咬咀，以水一斗，煮麻黄去滓，澄取七

吐血色如土

升，内藥煮取一升半，分再服。

治吐血内崩，上氣高色如土方

乾薑 阿膠 柏葉<sub>各二</sub> 艾<sub>把</sub>

右四味咬咀，以水五升，煮取一升，内馬通汁

一升，煮取一升，頓服。

忽然吐血

治忽吐血一兩口，或是心衄，或是内崩方

熟艾三雞子許，水五升，煮取二升，頓服

又方

燒亂髮灰，水服方寸匕，日三。集驗云：治各上

虛勞吐血

者亦治小 便虫血者

治虛勞吐血方

生地黃肥者五升，搗以酒一斗，煮滂三上三

下，去滓頓服。

又方

柏葉一斤，以水六升，煮取三升，分三服

又方

同上

五十

吐血

生地黄汁伴大黃末方寸匕  
右二味先溫地黄汁一沸次內大黃攪和空  
腹頻服日三瘥

犀角地黄湯治傷寒及溫病身發汗而不汗之  
內畜血者及鼻衄吐血不盡內餘瘀血大便黑  
面色黃消瘀血方

犀角一生地黄八芍藥三牡丹皮二

右四味咬咀以水九升煮取三升分三服喜  
忘如狂者加大黃二兩黃芩三兩其人脈大  
來遲腹不滿自言滿者為無熱但依方不須  
有所增加

吐衄血

治五藏熱結吐血衄血方

伏龍肝一雞子生竹筴一升芍藥一當歸一黃芩一

芍藥一甘草二生地黄一

右八味咬咀以水一斗三升先煮竹筴減三

同上

升下藥取二升分三升有桂枝

當歸湯治血吐血方  
當歸 乾薑 芍藥 阿膠各三黃芩三

吐衄下血

右五味咬咀以水六升煮取二升分三服  
治上焦熱傷吐血衄血或下血連日不止欲死  
並主之

艾葉 竹筴格一阿膠如手乾薑二

五十一

吐血大便血

右四味、以水三升、煮取一升、去滓、內馬通汁半升、煮取一升、頓服。

竹筴湯治吐血、汗血、大小便下血方。

竹筴<sup>二</sup>升、甘草、芍藥、黃芩、當歸<sup>各六</sup>芍藥、白朮、人參、桂心<sup>各一</sup>。

右九味、以水一斗、煮取三升、分四服、日

吐血痔便血

三夜一、治吐血、盡毒、痔血、女子腰腹痛、大便後出清血

者方

取東白蘘荷根、搗絞取汁二升、頓服、立差。

赤小豆散、諸下血、先見血、後見便、此為遠血、宜

遠血近血

金匱要略卷之九  
門作先便後血此遠  
血也黃土湯主之先  
血後便此近血也赤  
豆湯主之散主之令  
以金匱為正皆從  
之

服黃土湯、咳衄、下血、門、驚悸、先便後見血、此近血、

宜服赤小豆散方

赤小豆<sup>三升</sup>、熬、當歸<sup>三</sup>、

右二味、治下篩、每服方寸匕、日三

麥門冬湯、治凡下血、虛極方

麥門冬、白朮<sup>各四</sup>、甘草<sup>一</sup>、牡蠣、芍藥、

阿膠<sup>各三</sup>、大棗<sup>十</sup>、

右七味、以水八升、煮取二升、分再服、

三物備急丸、大黃、乾薑、巴豆<sup>細</sup>、

心腹諸卒病  
百病

下血虛極

字處隔乾  
嘔下利

○心藏門

瀉心湯治老少下利水穀不消腸中雷鳴心下痞滿乾嘔不安方

人參 黃芩 甘草 乾薑 黃連

半隻 大棗 枚二

右七味以水八升煮取二升半三服並治霍亂若寒加附子一枚渴枯姜根二兩嘔加橘皮一兩痛加當歸一兩客熱以生薑代

吐血衄血

瀉心湯治心氣不定吐血衄血方

大黃 黃連 黃芩

心痛

右三味以水三升煮取一斗頻服亦治霍亂

桂枝三物湯治心中痞諸逆懸痛方

桂枝 生薑 膠飴

右三味取二味以水六升煮取三升去滓內飴分三服

心痛徹背

烏頭圓治心痛徹背背痛徹心方

烏頭 附子 蜀椒 乾薑 赤石脂

右五味為末蜜丸如麻子大先食服三丸日三不知稍增之

辛三



心痛

治心痛方

桃白皮煮汁空腹以意服之

同上

治卒中惡心痛方

桂心一兩

右一味、咀、以水四升、煮取一升半、分作三

寒冷腹痛

治寒冷腹中痛方

當歸二兩

桂心

芍草

人蔘各一兩

生薑五兩

半

復小麥一石、枳一石、芩一石、芒一石

右八味、咀、以水一斗五升、煮取三升、分三

服、日三、亦治產後虛冷

冷氣腸痛

治冷氣腸下往來、衝胸臍痛、引脇背悶者方

當歸

桂心

人蔘

芍草

吳茱萸

芍

按野留亦積下三章同

藥 大黃一兩、芍二兩、茯苓一兩、枳實一兩、乾薑三兩

右十味、咀、以水八升、煮取二升半、分三服

日三、治尸瘡亦佳、外臺仲景方、無茯苓枳實

腹痛下利

治久寒疾、胸腹中痛下利方

當歸三兩

芍草

枳皮各二兩

附子一兩

乾薑四兩

四

右五味、咀、以水八升、煮取二升、分三服、日

三

治久寒宿疾、胸腹中痛、短氣、時滯下利方

當歸

桂心各三兩

乾薑四兩

附子一兩

一

五十四

臍下痛

右四味、以水八升、煮取二升、分三服、日  
三、范王、黃附子、用甘草二兩、云、虛冷、激痛甚

溫脾湯、治腹痛、臍下絞結、繞臍不止方、  
甘草 附子 人參 芒消 各一 當歸 乾

薑 各三 大黃 五

白月瘕

右七味、以水七升、煮取三升、分服、日三  
枳實 薤白 桂枝 湯 曾瘕 心中痞、氣在曾曾滿、腸

下逆、搶心方

枳實 四兩 薤白 一斤 桂枝 二兩 厚朴 三兩 薑實 一枚

氣塞短氣

右五味、以水七升、煮取二升半、再服、  
茯苓 湯 治曾中氣塞短氣方

茯苓 兩 甘草 兩 杏仁 五十枚

右三味、以水一斗三升、煮取六升、去滓、

胸滿短氣

為六服、日三、未差再合服、  
通氣湯 治胸滿短氣噎方

半夏 八兩 生薑 六兩 橘皮 三兩 吳茱萸 四十枚

右四味、以水八升、煮取三升、分三服、  
用桂皮二兩

胸痺微背

細辛 散 治胸痺達背痛短氣方

細辛 甘草 枳實 生薑 桔萸根

乾地黄 白朮 各三 桂心 茯苓 各五  
洗方脫衣十  
金方可書只

治頭眩屋轉眼不開方

人蔘 當歸 防風 黃芪 麥門冬 芍

藥 各一獨活 白朮 桂心 各三

右九味以水一斗煮取三升分三服

防風湯治風眩嘔逆水漿不下食輒嘔起則眩

倒瓷有時手足厥冷方

防風 防己 附子 乾薑 芎藭 各一 蜀

椒 桂心 各二

右七味以水四升煮取二升分三服

治頭傾強不得顧視方

赤石脂 白朮 各一

蒸好大豆令色變肉囊中枕之

防風散治頭面偏身風腫方

防風 白芷 白朮 各三

沐頭湯治脈極虛寒鬢髮墮落令髮潤澤方

桑根白皮切三升以水五升淹漬煮五六沸

去滓洗沐髮數令為之自不復落

又方

麻子 碎三升 白桐葉 各一

右二味以米泔水二斗煮五六沸去滓以洗

沐則髮不落長甚有驗

同上

治髮鬢墮落令長生方

麻葉 桑葉

右二味以泔煮去滓沐髮七遍長六尺

生眉毛

生眉毛方

鐵生衣 牆上青衣

右二味等分為末以水和塗即生

髮黃赤

治髮黃赤方

燒梧桐灰用乳汁和塗傳髮髮並皮內髮髮

治禿

治禿無髮者方

黑熟棗二升內鬢中日中曝三七日化為水

鬼能頭

治鬼能頭方

紙切

洗瘡口三七日髮生神效

燒貓兒屎以臘月猪脂和傳上

又方

博采和蒜搗傳日一度未好燒陶瓦同音藥俗作磚

口瘡

○小腸腑方

柴胡澤瀉湯治小腸熱脹口瘡方

柴胡 澤瀉 橘皮一用 黃芩 旋覆花

枳實 升麻 芒消各三 生地黃切一

右九味咬咀以水一斗煮取三升去滓下芒

平七

見鬼妄語

消方二服

茯神湯治五邪氣入人體中見鬼妄語有如所見聞心悸跳動恍惚不定方

茯神 人蔘 菖蒲 茯苓 酪 三 赤小豆 十四枚

寤狂

治卒寤狂方  
右五味呔咀以水一斗煮二升半分三服

鬼魅

治百邪鬼魅方  
令其患人著地仰臥以冷水終日淋其面良

同上

服頭垢小豆大佳按小豆下  
恐脫許實

時之寤狂

以水服鹿角末方寸匕日三  
定志小圓治心氣不定五藏不足甚者憂悲愁傷不樂忽々喜忘朝羞暮劇暮羞朝劇寤狂眩者方

菖蒲 遠志 酪 二 茯苓 人蔘 酪 三

好忘

右四味為末蜜丸如梧子大飲服七丸日三  
加茯神丸散服之亦佳

枕中丸  
龜甲 龍骨 遠志 菖蒲

右四味等分治下篩酒服方寸匕日三常服  
令人大聰或食後  
水服

五六

同上

治多忘令人不忘方

菖蒲 茯苓 茯神 人參 遠志 各五錢 右五味治下篩酒服方寸匕日二夜一五日

同上

治健忘方

天門冬 遠志 茯苓 乾地黄 右四味各等分為末如梧子大酒服二十丸日三加至三十丸當服勿絕

大便秘結

脾藏方

三黃湯治下焦熱結不得大便方

大便不通

大黃 兩 黃芩 兩 梔子 枚二十 芒硝 兩 右四味以水五升煮取一升八合分三服若大閉加芒硝二兩

治大便不通方

脹滿不通

蜜和胡燕菜肉大孔中昂通

芒消丸治脹滿不通方

芒消 芍藥 各半 杏仁 大黃 各三 黃芩 兩

大便不通

治大小便不通方

右五味為末蜜丸如梧子飲服十五丸加至二十九丸取通利為度日三

辛九

同上

又方

葵子升一 青竹葉把一  
右二味以水二升、煮五沸、頓服

葵子升二 消石兩二

右二味以水五升、煮取二升、分二服

下利神妙

下利熱、諸治不差方

烏梅升一 黃連一升

右二味為末、蜜和、服如梧子二十丸、日三夜

二、神效

久利下

治積久二三十年常下利神方

赤松皮去上 蒼皮切一 為散、麩粥和一升 服

血利腹痛

之日三服差 不過服一斗 永差、三十年下利、服

龍骨丸、治下血腹痛方

龍骨 龍膽 羚羊角 當歸 附子 乾

薑 黃連各十 赤石脂 礬石各兩 犀角

甘草 熟艾各十

右十二味為末、蜜和、丸如小豆、先食服十五

丸、日三、加至二十九

黑血絞痛

治熱毒下黑血、五內絞切痛、日夜百行、氣絕欲

死方、 黃連升一 龍骨 白朮各兩 二阿膠 乾薑 當

六

水穀利

治熱利水穀方

歸 赤石脂各三 附子一  
右八味、以水一斗、煮取五升、分五服、余  
以正觀三年七月十二日、忽得此熱毒利、至  
十五日、命將欲絕、處此方、藥入口即定、  
黃連 阿膠各三 黃蘗一 烏梅四 梔子三  
枚

下痢絞痛

治下利絞痛、腸滑不可差方

右五味、以水五升、煮取二升半、分三服、  
亦治蠱神良  
黃連六 阿膠 鼠尾草 當歸 乾薑各三

赤白連年

右五味、以清酒一斗、取三  
升、分三服、苦熱及不痛者、去乾薑、當歸、以水  
煮之

溫脾湯治下久赤白、連年不止、及霍亂、脾胃冷

實不消方

大黃四 人參 芩草 乾薑各二 附子一  
右五味、以水八升、煮取二升半、分三服、  
臨齋下大黃、與後溫脾湯小異、須大轉瀉者、  
當用此方、神效、按後溫脾湯故取此

黃連湯治赤白痢方

黃連 黃蘗 乾薑 石榴皮 阿膠各三

六十一

赤白痢六孔  
生虫

當歸 升草

右七味、咬咀、以水七升、煮取三升、分三服、

聖湯治下赤白痢、大孔蟲生、悉皆差方、

鼠尾草<sup>二</sup>、豉<sup>一</sup>、梔子仁、生薑<sup>略六</sup>、桃皮<sup>一</sup>、

右五味、咬咀、以水七升、煮取二升半、分三服、

一本、單用桃皮、以酒煮服之、

治赤白滯下方

酒四升、煮錢四十文、取二升、分二服、

又方

亂髮、雞子大、燒末、水服、不過三服、

溼脾湯治積冷熱赤白痢者方、

久利冷熱

冷利

大黃、桂心<sup>略三</sup>、附子、乾薑、人蔘<sup>略二</sup>、

右五味、咬咀、以水七升、煮取二升半、分三服、

駐車圓治大冷洞痢、腸滑下赤白如魚腦、日夜

無節度、腹痛不可堪、忍老方、

黃連<sup>六</sup>、乾薑<sup>二</sup>、當歸、阿膠<sup>各三</sup>、

右四味、為末、以大酥八合、烱膠<sup>和之</sup>、並手丸如大

豆許、候乾、大人飲服三十丸、小兒以還三丸、

暮年者五丸、餘以意加減、日三服、

大桃花湯治冷白滯痢腹痛方、

赤石脂、乾薑、當歸、龍骨<sup>各三</sup>、牡蠣<sup>三</sup>、

附子<sup>二</sup>、白朮<sup>一</sup>、人蔘<sup>半</sup>、升麻<sup>一</sup>、芍藥<sup>略一</sup>、

赤白痢

右十味、以水一斗二升、煮取九升、內諸藥、煮取三分、三服、膿者、加厚朴三兩、嘔者、加橘皮三兩

又方

龍骨<sub>六兩</sub> 厚朴 當歸<sub>略三</sub> 赤石脂<sub>五兩</sub>  
右四味、以水七升、煮取二升半、分三服、熱、加白頭翁二兩半、牡蠣三兩

冷利、下痛、  
桃花圓、治下冷、臍下攪痛方

乾薑 赤石脂<sub>略十</sub>  
右二味、蜜丸、如豌豆、服十丸、日三服、加至二十丸

新久冷利

附子湯、治暴下、積日不住、及久痢方

附子<sub>一枚</sub> 石榴皮<sub>一斤</sub> 阿膠<sub>二兩</sub> 龍骨 甘草  
藥 乾薑 黃連<sub>略一</sub> 黃芩<sub>半兩</sub> 粳米<sub>三兩</sub>

三十年久利

右十味、以水八升、煮取三升、分三服、厚朴湯、治三十年久痢不止方

厚朴 乾薑 阿膠<sub>各二兩</sub> 黃連<sub>五兩</sub> 石榴皮  
艾葉<sub>各三兩</sub>

久痢

右六味、以水七升、煮取二升、分再服、烏梅圓、治久利、諸藥不差、數十年者、消穀下氣、補虛方

烏梅肉 黃連 乾薑 吳茱萸<sub>各四兩</sub> 桂心

同上

七味散治痢下久不差神驗方

黃連八分 龍骨 赤石脂 厚朴 烏梅肉 各二分 芩草一分 阿膠三分

右治下節漿水服二方寸匕日二小兒一錢

腹中雷鳴、  
性下利、  
乃利、

治下痢心胸滿不快腹中雷鳴或嘔吐方

黃連五兩 橘皮 芩草 各二兩 龍骨 生薑 半斤 復略三人 薑西大棗十五枚 右八味以水一斗先煮一大沸乃入藥

嘔逆下利

煮取一升分四服並妊娘良

瀉心湯治卒大下利熱唇乾口燥嘔逆引飲方  
人蔘 黃連 黃芩 橘皮 各一斤 黃連 西半復西三乾薑 半一斤

痢後虛腫、  
產後虛滿、

女痢散治痢後虛腫水腫者服此藥小便利得

桂心 西各一 女痢 小麥 一升 按即乾薑 細辛 椒目 附子

六十四

右六味治下節漿水服方寸匕不知加至二三匕日三產後虛滿者亦良

下利乾嘔

○小兒痢門

濕中湯治小兒夏月積冷洗浴過度及乳母亦將冷洗浴以冷乳飲兒壯熱忽值暴雨涼加之兒下如水胃虛弱面青肉冷眼陷乾嘔者宜先與此調其胃氣下利止方

乾薑 厚朴 各一當歸 桂心 甘草 各三人

薑 茯苓 白朮 桔梗 各二

右九味以水二升煮九合六十一日至百

下者

日兒一服二合半餘皆隨兒大小

經驗大黃湯治小兒暴冷水穀下或乳冷下者結不消或冷實吐下乾嘔煩悶及冷滯赤白下

者良若已服諸利湯去實胃中虛冷下如水乾嘔眼陷煩擾不可利者可除大黃若中乳乳母洗浴水氣不消飲兒遂為霍亂者但用大黃小兒諸霍亂宜利者便用大黃不須利宜溫和者除之方

大黃 桂心 厚朴 甘草 乾薑 各一人

薑 茯苓 白朮 當歸 各二 桔梗 各三

右十味以水二升半煮取八合凡兒三十日


至六十日一服二合七十一日至一百日一服

二合半二百日已來一服三合

龍骨湯治少小壯熱渴引飲下利方

熱渴下利

字五



龍骨 甘草 大黃 赤石脂 枯萐根

石膏 寒水石 桂心各二

右八味治下節以酒水各五合二沸去滓量

兒大小服之

洞注下利

治少小洞注下利方

酸石榴燒灰末服半錢匕日三

又方

燒蜂窠灰水和服之

又方

亂髮灰 鹿角灰 右二味等分三歲兒以水和服三錢匕日三

赤白利

治小兒赤白利方

白蘘荷根汁 生地黃汁各五

右二味微火上煎一沸服之

治小兒熱利方

煮木瓜葉飲之

治小兒暴利方

小鯽魚一頭燒灰服之亦治大人

又方

燒鯉魚骨末服之一方作龍骨

又方

赤小豆末酒和塗足下日三度油和亦得

暴利

熱利

去盡利

治小兒盡痢方

藍香汁一升二分合方為四服

湯利

治小兒湯利方

搗冬瓜汁飲之

○田府方

反胃

反食

治胃虛反食下喉便吐方

人蔘一兩澤瀉一兩芡草一兩桂心二兩橘皮二兩乾薑一兩  
右九味、以水八升、煮取三升、一服七合

湯反胃

治反胃而渴方

茯苓一兩澤瀉一兩半復各四兩桂心一兩芡草一兩  
右五味、以水五升、煮取二升、分三服、一

反胃

治反胃大驗方

前胡一兩生薑各四兩阿膠一兩大麻仁二兩橘皮三兩  
桂心三兩芡草五兩大棗十枚吳茱萸四兩  
右九味、以水三升、酒二升、煮取一升、七

食吐

治胃反食吐上氣方

六十七

蘆根 前根各切二兩  
右二味水四升煮取二升頓服得下良

又方 淘小芥子曝乾為末酒服方寸匕日三

又方

灸兩乳下各一寸以差為度又灸臍上一寸  
二十壯又灸內踝下三指稍邪向前有穴三

醉咽

壯外臺三指作一指也

治醉咽方

麴末一升地黃三升  
右二味合搗日乾以酒服方寸匕日三

噫醉咽

治噫醉咽方

吳茱萸半升生薑三兩人蔘一兩大棗十二枚  
右四味以水以六升煮取二升先食服一升日  
再

嘔吐 六十八

嘔吐噦逆門

論曰凡服湯嘔逆不下腹者先以甘草三兩水  
三升煮取二升服之得吐但服之不吐益佳消  
息定然後服餘湯即流利便不嘔也凡嘔者多  
食生薑此是嘔家聖藥  
半復湯治逆氣心中煩悶氣滿嘔吐氣上方

小菴湯

半復升生薑分茯苓 桂心各五

右四味、以水八升、煮取二升半、分三服、

嘔吐止

若小氣、加封草二兩

小麥湯治嘔吐不止方  
小麥一斤、人蔘、厚朴各四、甘草一、香竹茹二

半生薑汁三、茯苓三

右七味、以水八升、煮取三升、去滓、分三

同上

服、犀角人蔘飲子治嘔逆、胃氣虛、邪風熱、不下食、  
無皆治之

乾嘔

犀角 人蔘各二、薤白五、粟米合五

右四味、以水四升半、煮取一升七合、下

米煮、令米熟、分再服、相去七里久、進一服

治傷寒後、噦、乾嘔、不可食方

生薑根切一、香竹茹一、粳米合三、生薑二

右四味、以水五升、煮取二升、分三服、不

止服三劑

治乾嘔方

灸心主尺澤亦佳、又灸乳下一寸三十壯、

又方、乾嘔不止、粥食湯藥皆吐不停、灸手間使

三十壯、若四厥脈絕不至者、灸之便通、此起死

六九

灸法

人方 按翼云手間使厥陰心主經

又方

濃煮蓋根汁飲之

又方

灸承漿七壯，炷如麥大，又灸臍下四指七壯

吐食

翼云承漿在頤前下唇之下

治食已吐其食方

大黃 四兩 甘草 二兩

右二味，以水三升，煮取一升半，分三服

吐逆不得食，灸心臍百壯

吐逆不得食，灸巨闕五十壯 翼云拒闕在鳩尾

灸法

噎

吐逆食不佳，灸胃脘百壯，三報

五噎圓，治胸中久寒，嘔逆逆氣，飲食不下，結氣

不消方 按五噎者，氣憂勞食思也

乾薑 蜀椒 食茱萸 桂心 各五 細辛

白朮 茯苓 附子 各四 橘皮 六

右十味，為末，蜜和，丸如梧子大，以酒服三丸

日三，不止，稍加至十丸

竹皮湯治噎聲不出方

竹皮 一兩用竹葉細辛各二 甘草 二 生薑 通草

人蔘 茯苓 麻黃 五味子 桂心 各一

右十味，以水一斗，煮竹皮減二升，去竹

同上

同上

皮下藥、煮取三升分三服

乾薑湯、治飲食嘔噎方集驗

乾薑 石膏各四 人蔘 桂心 桔葉根各

二棗各 半復 小麥各一 甘草一 吳茱萸二

赤小豆三

右十味、以酒五升水一斗、煮取二十枚

去滓、合、煮取三升、分三服

通氣湯、治胸滿氣噎方

半夏八 生薑六 桂心三 大棗三十

右四味、以水八升、煮取三升、分五服、日

三夜一

氣噎

同上

治氣噎不通、不得食方

杏仁 桂心各三

右二味、為末、蜜丸、如棗大、稍咽之、臨食先含、

彌佳、

卒噎

治卒噎方

刮春杓頭細糠、含之、即下、神驗、

諸噎

治諸噎方

木火炭、蜜丸、如彈子大、含少、咽、即下、

噎

治諸噎方

作竹篾、刮令滑淨、綿裹、內咽中、令至、噎處、可

進、退、引之、噎、即隨、出、

七十一

吞髮不去

治食中吞髮咽不去繞喉方

取亂髮燒末酒服一錢匕

吞錢

治吞錢方

艾蒿五兩以水五升煮取一升頓服之昂下

又方

木火炭酒服方寸匕水服亦得

吞釘針

誤吞釘針及箭鏃等方

但多食脂肥肉令飽自表出

同上

治誤吞針方

取懸針磁石末飲服方寸匕下古今錄驗云  
石中而服磁石末入腹若含磁

脹滿嘔逆

○脹滿門

附子粳米湯治腹中寒氣脹滿腸鳴切痛胸脇

逆滿嘔吐方

附子一枚半復粳米各半甘草一大棗十枚

右五味以水八升煮米熟去滓每服一

升日三服薑二兩加乾

氣脹

厚朴七物湯治腹滿氣脹方仲景云治腹滿數

故飲者加

厚朴半斤芍藥五兩大黃三兩枳實五枚桂

心二生薑五兩

右以水一斗煮取五升去滓內大黃煮

腹滿空飢

取四升、服八合、日三、嘔逆者、加半夏五合、利者、去大黃、寒多者、加生薑至半斤、厚朴三物湯、治腹滿、空飢、數十日、脈浮而數、飲食如故方、

厚朴伴大黃、陳枳實大者

右咬咀、以水一斗二升、煮取五升、內大黃煎

取三升、去滓、服一升、腹中轉動者、勿服、不動

者、更服、一方加芒消

吳茱萸湯、治久寒、胸脇逆滿、不能食方、

吳茱萸各半、半夏小麥、芍藥各一、甘草人

桂心略一、大棗二十、生薑面

虛羸胸滿

右八味、咬咀、以酒五升、水三升、煮取三升、分三服、

大桂湯、治虛羸、胸膈滿方、

桂心、生薑各一、半夏行、黃芪面

右四味、咬咀、以水一斗半、煮取五升、分五服、

日三夜一、

內傷汗出腹脹心痛

治男子卒勞、內傷、汗出、中風、脹滿、大飢、食不下、心痛、小便赤黃、時自大便不利方、

大黃、葶藶、寒水石、苦參、黃連、枳

芩根各等

右六味、為末、蜜為丸、以豉汁和、飲服、如梧子

大二九日三加至十九

溫中下氣

○痼冷積熱門

生薑湯溫中下氣方

生薑一斤甘草兩桂心四

右三味、咬咀、以水六升、煮取一升半、一服五

合日三

虛羸氣欲絕

甘草湯治虛羸、氣欲絕方

甘草一斤、生薑兩、人參一、吳茱萸一

右五味、咬咀、以水四升、煮茱萸令少沸、去滓、

大痛

入藥煮取一升六合、分二服、數劑佳

大建中湯治心脇中大寒、大痛、嘔不能飲食、飲

食下咽、自知偏從一面下流、有聲決々然、若腹

中寒、氣上衝皮、面出見、有頭足上下而痛、其頸

不可觸近方

蜀椒二、乾薑四、人參二、饴糖一

右四味、咬咀、以水四升、煮取二升、去滓、內糖

微火煮、令得一升半、分三服、服湯如炊三升

米、久、可飲、粥二升、許、更服、當一日食糜、溫服

之、

大黃附子湯治脇下偏痛、發熱、其脈緊急、此寒

脇下偏痛

七十四

也、當以溫藥下之方

大黃三兩 附子一枚 細辛二兩

右三味、以水五升、煮取二升、分再服

半復湯、治胸中客熱、心中煩滿、氣上、大小便難

方

半復一分 生薑八兩 前胡四兩 茯苓五兩

草黃芩各二兩 人參二兩 杏仁各三兩 枳實三兩

右十味、以水九升、煮取三升、分三服、胸

中大熱者、沈冷服之、大小便澀、加大黃二兩

一方、用梔子仁二兩、為十一味、

骨蒸短氣 治 骨蒸、熱羸瘦、煩悶、短氣、喘息、鼻張、日西即覺

方

龍膽 黃連 枯葦根各四分 芒消二分 梔子十枚

苦參 大黃 黃芩 芍藥 青蘘子各二兩

右十味、為末、蜜丸、如梧子大、飲服二丸、日二

以止為度、一方、無苦參、止五味、飲方寸匕、散

治骨蒸方

天靈蓋如梳大 灸令黃、碎、以水五升、煮取二

升、分三服、起死神方

又方

水服芒消一方寸匕、日二服、神良

欬喘

○肺臟腑方

橘皮湯治肺熱氣上欬息奔喘方

橘皮各三 麻黃各三 柴胡各三 乾紫蘇各三 蘇藍各三 乾

宿薑 杏仁各四 石膏八

右七味咬咀以水九升煮麻黃而沸去沫下

諸藥煮取三升玄澤分三服不差與而劑

治肺熱飲酒當風風入肺膽氣妄泄目昏氣喘

方

麻黃四 月草 五味子各三 杏仁五枚 母薑

五 淡竹葉切一

右六味咬咀以水七升先煮麻去沫下諸藥

喘

欬唾膿血

煮取三升玄澤分三服  
麻子湯治肺氣不足欬唾膿血氣短不得卧方

麻子一升 桑白一 錫各一 桂心 人蔘各二 阿

膠紫苑各一 生薑三 乾地黄四

右九味咬咀以水一斗五升合煮取四升分

五服

欬唾涎沫

生薑芽草湯治肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴

方

生薑五 芽草四 人蔘三 大棗十二枚

右四味咬咀以水七升煮取三升分三服

桂枝皂莢湯治肺瘕吐涎沫不止方

吐涎沫

欬上氣

桂枝 生薑各二 甘草二 芍藥一 大棗十五  
右五味、以水七升、煮取三升、分三服、

麻黃湯、治肺脹欬而上氣、咽燥而喘、脈浮者有  
水方、

麻黃 芍藥 生薑仲景用 細辛 桂心各三  
西半復 五味子各半 石膏四兩、一本云 炙甘草一

肺癰

桔梗湯、治欬、胸中滿而振寒、脈數、咽乾而不渴、  
時々出濁唾腥臭、久久吐膿、如粳米粥、是為肺  
各此為小音龍加石膏  
湯用其草二兩為丸

癰者方

桔梗三兩、集驗、用二 甘草二  
右二味、以水三升、煮取一升、分二服、必吐膿血也、  
肺癰、治肺癰喘不得臥方、

葶藶三兩、未 大棗二十  
右二味、先以水三升、煮棗取二升、去棗、內藥

三四劑、治肺癰、胸膈脹、一身面目浮腫、鼻塞  
清涕、出不聞香臭、欬逆上氣、喘鳴迫塞、未進  
此方、宜先服小音龍湯、却服前藥、

三日服一劑、  
按三日忌一  
日訖矣。

胸心甲錯

黃昏湯治欬有微熱煩滿胸心甲錯是為肺癰者方

黃昏手掌大一片是合昏皮也吹咀以水三升煮取一升分二服

又方

薏苡仁 瓜瓣 桃仁 五十 葶藶 一切 二升 水 五升 煮取

四味按三味能平

察類

右四味吹咀內葶汁中煮取二升服一升當有所見吐膿血尸症鬼症者即五尸之中尸症又挾諸鬼邪為害者也其變動乃有二十六腫大略令人寒熱

淋瀝沈沈熱熱不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頻滯以至於死死後症易傍人乃至減門覺如此候者宜急療必方  
獺肝一具陰乾治下節水服一方寸匕日三如一具不差更作

下利青白

○大腸腑方

黃連補湯治大腸虛冷利下青白腸中雷鳴相逐方

黃連 四 茯苓 各 三 酸石榴皮 五 伏龍 肝 一 雞 子 大 地 榆 五



欬下利

海藻湯治欬而下利、胃中痞、而短氣、心中時悸、四肢不欲動、手足煩、不欲食、有背痛、時惡寒方、

海藻

四兩五味子

半復

各半生薑

一兩細辛

二兩

茯苓

六兩杏仁

五枚

右七味、以水一斗、煮取三升、去滓、分三

欬嗽

服、日三、一方、無五味、生薑、治欬嗽、胸脇支滿、多唾、上氣方、

薑汁

半升沙糖

合五

右二味、煎薑汁、減半、內糖、更煎服之、

嘔逆

小半復湯治病心腹虛冷、遊痰氣上、胃腸滿不、下食、嘔逆者方、

半復

升生薑

一兩橘皮

四兩

右三味、以水一斗、煮取三升、分三服、若

心中急及心痛、內桂心四兩、若腹滿痛、內當

歸三兩、羸弱及老人、尤宜服之、一方、用人蔞

二兩、仲景、無橘皮、人蔞

又方

半復

升生薑

一兩桂心

三兩

甘草

一兩

右四味、以水七升、煮取二升半、分三服、

甘草湯治心下痰飲、胃支滿、目眩方、

甘草

二兩桂心

白朮

各一兩

茯苓

四兩

右四味、以水六升、宿漬、煮取三升、去滓、

療飲目眩

八

喘滿

服一升、日三、小便當利、

木防己湯、臍間有支飲、其人喘滿、心下痞堅、面色黧黑、其脈沈緊、得之數日、醫吐下之不愈者、

用此方、

木防己 兩三 桂心 兩二 葶藶 兩四 石膏 兩十 羅子 兩二

右四味、以水六升、煮取二升、分二服、虛者即愈、實者三日復罷、罷以復與、若不愈、去

石膏、加茯苓 兩四、芒消 兩三、以水六升、煮取

二升、分去滓、下消令烺、方二服、微下利、即愈、

一方不加茯苓、

厚朴 兩二 大黃 兩二 枳實 兩四

酒客飲支飲、厚朴 兩二 大黃 兩二 枳實 兩四 酒客飲者必致吐血、此坐久飲

酒客飲支飲

過度所致也、其脈虛者、心胸滿、胃中本有支飲、支飲曾滿、主之方、

厚朴 兩二 大黃 兩二 枳實 兩四

右三味、以水五升、煮取二升、分為二服、

溫服之、

吐涎沫頭眩

五苓散、假令瘦人臍下有悸者、吐涎沫而癩眩

水也、此方主之、方見傷寒論

治胃中痰飲、腸中水鳴、食不消、嘔吐水方、

茯苓 兩五 橘皮 兩三 杏仁 兩四 白朮 兩四 半復 兩八

茯苓 兩五 橘皮 兩三

右七味、以水一斗、煮取三升、去滓、分三

半

心嘈心背痛

版

吳茱萸湯治胃中積冷心嘈煩滿注下不下飲

食心胃應替痛方

吳茱萸 三兩 半夏 四兩 桂心 人參 各二兩 芍藥 一兩

生薑 五兩 大棗 二十枚

右七味 以水九升 煮取三升 去滓 分三服 日三

兩腸脹滿 留飲痰癖

順流紫圓治心腹積聚而脇脹滿留飲痰癖大

小便不利小腹切痛臍上塞方

石膏 五分 代赭石 烏賊骨 半復 各三 桂心

加巴豆 七枚

右六味 為末 蜜丸 如胡豆 平旦服 一丸 加至 二丸 按 胡豆 迎 雅 脫 豆 也

九蟲門 即大腸府

論曰人腹中有蟲尸此物與人俱生而為人大害尸蟲之形狀似大馬尾或如薄筋依脾而居乃有頭尾皆長三寸又有九蟲一曰伏蟲長四分二曰虺蟲長一尺三曰白蟲長一寸四曰肉蟲狀如爛杏五曰肺蟲狀如蠶六曰胃蟲狀如蝦蟇七曰弱蟲狀如瓜瓣八曰赤蟲狀如生肉九曰鏡蟲至細微形如菜蟲狀伏蟲所居蟲之

主也、蛇蟲貫心、以殺人、白蟲、相生子孫、轉多、其  
母轉大、長至四五心、亦能殺人、因蟲、令人煩滿、  
肺蟲、令人欬嗽、胃蟲、令人嘔吐、胃逆、喜噦、弱蟲、  
又名膈蟲、令人多唾、赤蟲、令人腸鳴、燒蟲、居腸  
腸之間、多少為痔、劇則為癩、因人瘡、痰、即生諸  
癰疽、癬、癩、疔、疥、齒、蟲、無所不為、人亦不必盡有、  
有亦不必盡多、或偏有、或偏無、類子、婦人常多、  
其蟲凶惡、人之極患也、常白、草、休、浴、佳、根、菜、  
皆可用、既是香草、且是尸蟲、所畏也、按、白、草、亦、未、詳、

肝勞恐畏

治肝勞生長蟲、在肝為病、恐畏不安、眼中方、

蠶 吳茱萸、東行根皮、各二、乾漆、四、雞子、五  
黃粳米粉、伴

脾勞白蟲

右五味、搗茱萸皮為末、和藥、銅器中煎、可丸  
如小豆大、宿勿食、可平旦飲服一百丸、小兒  
服五十九、蟲當爛出、集驗方、無茱萸、

腎勞四肢腫急

治脾勞、熱有白蟲、在脾中為病、令人嘔、方、  
大麻子、半、東引、吳茱萸根、大、尺者、橘皮、二  
右三味、咀、以水煎、臨時量服、凡合時禁聲、  
勿語、道作藥、蟲當聞便不下、切忌之、  
治腎勞、熱、四肢腫急、燒蟲、狀如菜蟲、在腎中為  
病、方、

牛三

好方

治燒蟲方  
以好鹽末二兩苦酒半升合銅器中煮數沸  
宿不食空心頓服之  
仁四枚 吳茱萸五十枚  
右七味治下篩平旦井花水服方寸匕加至  
一匕半差止

攻心腹痛

治枕蟲攻心腹痛方  
劉蕒茲根二斤以七升水煮取三升先食服  
之蟲即死火

又方

匿蟲

治濕匿蟲方  
榧子四十九枚去皮以月上旬辛旦空腹服  
七枚七日服盡蟲消成水永瘥

下部生瘡

治下部生瘡方  
黃連 生薑各十兩 艾葉八兩 苦參四兩  
右四味咬咀以水一斗煮取三升分三服久  
者服二劑  
治下部生瘡方  
濃煎桃皮如糖取內下部口中瘡含之

蟲蝕下部

治蟲蝕下部方  
胡粉 雄黃  
右二味各等分為末著穀道中亦治小兒

半

目無視齒  
焦髮落

○腎臟方

治精極實熱、眼視無明、齒焦髮落、形衰體痛、通身虛熱方、

竹葉切 二 黃芩 茯苓 各 三 封草 麥門冬

大黃 各 三 生薑 各 六 芍藥 各 四 生地黃 各 四

右九味、以水九升、煮取三升、去滓、分三

服、

虛羸心驚

治五勞六極、虛羸心驚、怔弱、多一魔七陽方、按、

茯苓 各 四 封草 芍藥 桂心 乾薑 各 三 大

枣 各 五 遠志 人參 各 二 脫煎法、以十五方可改、

治虛勞少精方

少精

夢中泄精

治夢中泄精、尿後餘瀝、及尿精方、

人參 麥門冬 赤石脂 遠志 續斷

鹿茸 各 一 柏子仁 丹參 韭子 各 六 銖 各 一 茯苓

各 二 龍齒 磁石 從蓉 各 二 乾地黃 各 三

右十四味、為末、蜜丸、如梧子大、酒服、二十丸、

日再、稍加至三十丸、

白濁夢泄

治虛損、小便白濁、夢泄方、

菟絲子 車前子 韭子 各 一 礬石 當歸

各 二 附子 芎藭 各 三 桂心 各 一

小便失精夢泄

右八味為末、蜜丸如梧子大、酒服五丸、日三、

韭子散、治小便失精、及夢洩精方、

韭子 麥門冬 各一 菟絲子 車前子 各一

芎藭 二 白龍骨 三

右六味、治下節、酒服方寸匕、日三、不止稍增、

甚者夜一服、肘后、用澤瀉、

有十二味來、仁湯、略汰、方、在千金方、

治夢洩失精方

失精

韭子一升、治下節、酒服方寸匕、日再三、立效、  
禁精湯、治失精、羸瘦、痠削、水氣、目視不明、惡聞  
人聲方、

韭子 二升 粳米 一斗

右二味、於銅器中、合熬、米黃黑反熟、以好酒  
一斗投之、絞取汁七升、每服一升、日三、盡一

劑、

夢洩精灸法

同上

夢洩精、灸三陰交二壯、夢斷神良、內、四指、大、

丈夫夢洩失精、及男子小便濁難、灸腎腧百壯、按、

云、腎腧、在第十、四、

男子陰中疼痛、溺血精出、灸裂缺三十壯、在、手、魚、

小便不利灸法

小便不利、小腹脹滿、虛乏、灸小腸腧、隨年壯、

骨髓疼

治骨髓中疼方

虎骨<sup>四</sup>芍藥<sup>一</sup>生地黄<sup>五</sup>

右三味、以酒一斗、漬三宿、曝乾、復入酒中、如此取酒盡為度、搗篩、酒服方寸匕、日三、

同上灸法

治骨髓冷疼痛方

灸上廉七十壯、三里下三寸、此穴、

腰脊

治腎虛腰痛方

萸薊<sup>按加鹿茸或鹿角亦妙</sup>桂心<sup>按鹿茸或鹿角亦妙</sup>白朮<sup>各</sup>三牡丹皮<sup>分二</sup>

右四味、治下酒服方寸匕、日三、亦可作湯服

之、甚良、

又方

附子<sup>分二</sup>桂心<sup>分二</sup>牡丹皮<sup>各一</sup>

右三味、治下篩、酒服一<sup>分</sup>、日二、甚驗、<sup>按、圭、</sup>

<sup>一分也、見吳醫彙講、</sup>

腰重

腎著湯、腎著之為病、其人身體重、腰冷如水洗、狀不渴、小便自利、食飲如故、是其證也、從作漿、汗出衣裡冷濕、又<sup>得之</sup>、腰以下冷痛、腰重如帶五千錢者、方<sup>結</sup>、<sup>於</sup>、<sup>鞣</sup>、<sup>灑</sup>、

芍藥<sup>二</sup>乾薑<sup>三</sup>茯苓<sup>各四</sup>白朮<sup>各四</sup>  
右四味、以水五升、煮取三升、分三服、腰

八十七

虛人常用

中即溫、積聚病之五藏小異

又方治五勞七傷、虛羸不足、面目黧黑、手足疼痛、久立腰疼、起則目眩、腹中懸急、而有絕傷、外引四肢方、

生薑 芍藥 乾地黄 甘草 芎藭 各五

大棗 三十枚

右六味、以水六升、漬一宿、明旦復以水五升、合、煮取三升、分三服、藥入四肢百脈、似醉狀是效、無生薑、酒漬乾薑二兩、一宿用之、常行此方、神妙、

虛人腹痛

大建中湯治虛勞寒、在 瀉飲、在 脇下、決々、有聲、飲已


如從一邊下決々然也、有頸並衝皮起、引而乳內痛、裡急、善夢失精、氣短、目眩々惚々多忘、方

蜀椒 二合 半夏 一升 生薑 一斤 甘草 二兩 人參 二兩 饴糖 三兩

右六味、以水一斗、煮取三升、去滓、內糖、

虛人腰痛

治五勞七傷、小腹急、臍下彭亨、兩脇脹滿、腰背相引、鼻口乾燥、目暗眩々、憤々不樂、曾中氣急、不下食、飲薑中策々痛、小便黃赤、尿有餘瀝、夢與鬼神交通、去精、驚恐、虛乏方、



飴糖半斤 黃芪 遠志 當歸翼 澤瀉各 芍藥三  
藥 人參 龍骨 甘草各 二 生薑各 大棗三

右十一味、以水一斗、煮取二升半、湯成、內糖令烱、一服八合、消息又一服、糖遠志澤瀉各

病後不復常、小腹拘急

小建中湯、凡男女因積勞虛損、或大病後、不復常、苦四體沈滯、骨肉疼痛、酸吸、小氣行動喘悞、或小腹拘急、腰背強痛、心下虛悸、咽乾唇燥、面體少色、或飲食無味、陰陽瘵弱、悲憂慘感、多臥少起、久者積年、輕者百日、漸致瘦削、五藏氣竭、則

難可復振治之方

甘草二 桂心 生薑各 芍藥六 膠飴斤 大

右六味、以水九升、煮取三升、去滓、內膠飴、每服一升、日三、間三日、復作一劑、後可與

諸丸散、仲景云、嘔家不可服、時后、加黃芪、除膠飴、胡洽方、有半復、湯、黃

虛勞裡急

黃芪建中湯、治虛勞裡急、諸不足方

黃芪 生薑 桂心 芍藥各 大

右七味、以水一斗、煮取三升、去滓、內飴

凝唾不出

令消、澀服一升、日三、間日、可作、嘔者、倍加生薑、腹滿者、去棗加茯苓、四佳、加減詳方、凝唾湯、治虛損短氣、咽喉凝唾不出、如膠塞喉方、

麥門冬 五 人蔘 二 前胡 三 射干 二 乾地黄

桂心 二 芍藥 三 大棗 十 茯苓 二

身熱、目暗、石痛、 右九味、以水九升、煮取三升、分溫三服、

腎氣圓、治腎氣不足、羸瘦、日劇、吸口中氣、體重、

可龍眼暗、石病方、

桂心 四 乾地黄 一 澤瀉 一 薯蕷 一 茯苓 各六

牡丹皮 六 半隻 一

右七味、為末、蜜丸如梧子大、酒服十丸、日三、

導尿

○膀胱腑及三焦門方

凡尿不在胞中、為胞虛僻、津液不通、以葱葉除尖頸內陰莖孔中、深三寸、微用口吹之、胞脹津液大通、即愈、

小便不利 治丈夫、婦人、胞轉不得小便、八九日者方、


葵子 一升 滑石 一 寒水石 各一

同上、腰脊灸法、

治腰痛、小便不利、苦胞轉方、

灸玉泉七壯、穴在闕元下一寸、大人、從心下

九十



下利膿血

度取八寸是也。一按，即是胃元也。玉泉在此下。  
 玉泉穴，小兒，斟酌以取之。一按，非散毒，酌心  
 其心下九折也。又，灸第五椎，五十壯，又  
 灸臍下一寸，又灸臍下四寸，各隨年壯，小翼有  
 赤石脂湯，治下焦熱，或下利膿血，煩悶恍惚方。  
 赤石脂 兩 烏梅 枚 二十 梔子 枚 十四 糯米 升 白朮 升 麻 兩 各 三 乾薑 兩 二  
 右七味，咬咀，以水一斗，煮米取熟，去米下藥，  
 煮取二升半，分為三服。  
 治膀胱三焦津液下，大小腸中寒熱，赤白泄利  
 及腰脊痛，小便不利，婦人滯下方。

男女赤白利

大小便澀

灸小腸腧五十壯。一按，翼云，小腸腧，在第五  
 黃蘗止澀湯，治下焦虛冷，大小便澀不止方。  
 黃蘗 人蔘 地榆 阿膠 三 黃連 兩 茯苓 兩 檉皮 兩 各 四 艾葉 升 一  
 右八味，咬咀，以水一斗，煮取三升，去滓，下膠  
 消，分三服。  
 茯苓圓，治下焦虛寒，損腹中瘀血，令人喜忘，不  
 欲聞人語，曾中噎塞而短氣方。  
 茯苓 乾地黃 當歸 各 八 升 草 乾薑  
 人蔘 各 七 黃芪 各 六 芍藥 各 五 桂心 各 四 厚朴 各 二 杏  
 仁 各 十

喜忘不欲聞人語

近或利或不

右十一味為末，蜜丸如梧子，初服二十丸，加

至三十丸為度。日清白飲下。伏龍肝湯治下焦虛寒，損或先見血，後便轉此

為近血，或利不利方。

伏龍肝五合 乾地黄五兩 阿膠一兩 牛膝

芍藥半斤 封草 乾薑 黃芩 地榆各三 髮

灰二合

右九味，以水九升，煮取三升，去滓，下膠

煮消，下髮灰，分為三服。

遠血或利或不

治下焦虛損，或先便轉，後見血，此為遠血，或利

或不利，好困勞，冷即聚，宜續斷止血方。

續斷 當歸 桂心 蒲黃 阿膠各一 封

草二兩 乾薑 乾地黄各四

右八味，以水九升，煮取三升半，去滓，下膠

取烱，下蒲黃，分三服。

○霍亂門

凡霍亂，務在溫和，將息。若冷，即遍身轉筋，凡此病，定一不食為佳。乃須三日少少粥食，三日以後，可恣意食息，一日勿雜食為佳，所以養脾氣也。

人參 乾薑 白朮 封草各三

轉筋嘔逆冷汗

右四味、咬咀、以水八升、煮取三升、分三服、不

差、頻服三劑、下略

四順湯、治霍亂轉筋肉冷汗出嘔啞者方

附子一人 薑各三 甘草各三

右四味、咬咀、以水六升、煮取三升、分三服、

通脈四逆湯、治吐利已斷汗出而厥四肢拘急

不解脈微欲絕方

大附子一枚 甘草半 乾薑者三兩

右三味、咬咀、以水三升、煮取一升二合、分二

服、脈出即愈、若面色赤者、加葱白九莖、腹中

痛者、去葱、加芍藥二兩、嘔逆加生薑三兩、咽

痛、去芍藥、加桔梗一兩、利止脈不出者、去桔

梗、加人參二兩、皆與方相應而服、仲景用通

猪膽汁

附子粳米湯、治霍亂四逆、吐少嘔多者方

中附子一枚 粳米各五 半復特大棗十枚 乾薑方

右六味、以水八升、煮米熟、湯成去滓、溫服一

升、日三服、


人參湯、治毒冷霍亂吐利煩嘔轉筋肉冷汗出

手足指皆腫、喘息垂死、絕語音不出、百方不效

脈不通者、服此湯取差乃止、隨吐續服、勿止

四肢厥逆、吐多嘔逆

吐利脈絕轉筋



人蔘 附子 厚朴 茯苓 甘草 橘皮

當歸 葛根 乾薑 桂心 各二

右十味、咬咀、以水七升、煮取二升半、方為三

洞下不止

治霍亂、洞下不止者方。

吐下腹痛

治霍亂、吐下腹痛方。

轉筋

治霍亂轉筋方。

以桃葉煎汁服、立止、冬用皮、車穀中脂塗足心下差。

消渴

○消渴門

浮萍圓、治消渴方。

乾浮萍 枯萆根 各等

右二味、為末、以人乳汁和、丸如梧子、空腹飲

服三十九、日三、三年病者、三日愈、治虛熱、大

佳。

同上

治消渴、日飲水一石者方。

鉛丹 二 附子 一 葛根 枯萆根 各三

右四味、為末、蜜丸如梧子、飲服十丸、日三、渴

消生尿七分

治消中、日夜尿七八升者方。

九十四

渴利

用鹿角炙令焦末以酒服五分匕日三漸加至方寸匕

治下焦虛熱注脾胃從脾注肺好渴利方

竹葉切三升三甘草三桔槩根三生薑各五麥門

冬各四茯苓各四大麥三十小麥三十地骨皮各一

右九味以水三斗煮小麥取一斗去滓澄瀆取八升去上沫取七升煮藥取三升

分三服按極加石不渴而小便大利遂至於死方

不渴而大便利

治用牡蠣五兩以患人尿三升煎取二升分再服神驗

消渴吐食

治消渴陰脈絕胃反而吐食者方

茯苓八澤瀉四白朮四生薑各三桂心各三芍藥一

右六味以水一斗煮取麥三升取汁三升去麥下藥煮取二升半每服八合日再

五勞七傷

巴郡太守奏三黃圓治男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者方


春三月黃芩四大黃三黃連四

夏三月同秋三月同冬三月同

同六同六同六

同三同三同三

同三同三同三



熱病後治四肢煩疼

治熱病後、虛熱渴、四肢煩疼方

葛根斤人葎斤月草各一竹葉把

右四味、以水一斗五升、煮取五升、渴飲

之日三夜一

渴頭痛發熱

治熱渴、頭痛壯熱、及婦人血氣上衝、悶不堪者

用茅根切三升、三搗取汁、令盡、渴而飲之

○ 淋閉門

淋痛

治淋痛方

滑石四貝子七枚茯苓 白朮 通草 芍

藥各二

右六味、治下節、酒服方寸匕、日二服、十日差

又方

葵子五茯苓 白朮 當歸各二

右四味、以水七升、煮二升、分二服、日三

氣淋

治氣淋方

熬鹽熱熨小腹、冷復易、亦治小便血治時后便

不

小便不通

灸法

臍中著鹽灸二壯

石淋及嗽

治石淋方

取浮石使滿一斗許治下篩以水三升酢一升  
煮取二升澄清服一升不過三服石出亦治  
之酒煮

又方

桃膠棗許大復以冷水三合冬用湯三合和  
服日三當下石子如豆卵石盡止亦治  
淋

膏淋尿血

治膏淋方

搗葎草汁二升酢二合和空腹頻服之當尿

房勞尿血

治房勞傷內尿血方

如小豆汁也又濃煮汁飲亦治淋瀝蘇澄用  
壯蠶桂心黃芩車前子各等  
右四味治下篩以飲服方寸七稍加至二七日

小便血

治小便血方

生地黃八柏葉一黃芩阿膠各二  
右四味咀以水八升煮取三升去滓下膠  
分三服一方加甘一兩亦按亂髮奇

九十七

○

水腫門

禁忌詳

面腫小便澀  
心腹脹滿

治面腫小便澀心腹脹滿方

茯苓 杏仁各八 橘皮 防己 葶藶各五

蘇子 合三

右六味為末蜜丸如小豆服十丸以桑白皮

湯送下日二加至三十丸  
氣息不通命在旦夕

治大腹水腫氣息不通命在旦夕者方

牛黃 分二 椒目 分三 昆布 海藻 牽牛子 桂

心 各八 葶藶子

右七味為末別搗葶藶如膏合和丸如梧子

飲服十丸日三稍加小便利為度大良正觀

九年漢陽王惠水醫所不治余處此方日夜

水腫

茯苓圓治水腫甄權為安康公處方

茯苓 白朮 椒目 各四 木防己 葶藶

澤瀉 各五 葶藶 分十二 赤豆 前胡 羌花

桂心 各二 芒消 別研

右十二味為末蜜和丸如梧子蜜湯下五丸

日一稍加以知為度

治水腫利小便方

大黃 白朮 葶藶 木防己 各等

右三味為末蜜丸如梧子飲下十丸利小便

九六

為度，不知加之。

澤漆湯治水氣通身浮腫，四肢無力，或從消渴，或從黃疸，支飲內虛不足，營衛不通，氣不消化，貫皮膚中，喘息不安，腹中響脹滿，眼目不得視。

澤漆根十斤 鯉魚斤五 生薑斤八 赤小豆斤二 茯苓斤三

人後斤二 芡草斤二 麥門冬斤二

右八味，以水一斗七升，先煮魚及豆，減七升，去之內藥，煮取四升，米一服，三合，日三，人弱，服三合，再服，氣下喘止，可至四合，晡時，小便利，腫氣減，或大便溏下，小便若下利，還

治水氣通身治洪腫百藥治不差待死者方

吳茱萸 葶藶 昆布 杏仁 葶藶 各等  
右五味為末，蜜丸如梧子，服五丸，勿令飽食，訖，飽悶氣急，服之即散。

增以大利便止，若無鯉魚，亦可。若水甚，不得臥，臥不得，轉側加澤漆一斤，渴加枯葶根二兩，欬嗽加紫苑二兩，細辛一兩，欬冬花一合，桂心三兩，增魚汁二升。  
胡洽：無小豆，麥門冬，澤瀉，五兩，杏仁，二兩，欬嗽，加紫苑二兩，細辛一兩，欬冬花一合，桂心三兩，增魚汁二升。  
二：一兩，古合，錄驗，無小豆，治水在，五藏，令人，欬逆，喘，上氣，腹大，而響，短氣，有腫，目下，有，小便，便，難，少，而數，肺病，曾滿，隱痛，宜利小便，水氣，迫，寒，熱。



排膿

豆粒者各跑子皆始起急服五香連翹湯下之  
數劑取差乃止按方見千金方  
瞿麥散治癰排膿止痛利小便方

瞿麥 一兩 芍藥 桂心 赤小豆 酒浸麥門冬

芎藭 黃芪 當歸 白欬各二

右九味治下節先食酒下方寸匕日三千金用  
細辛 薤白 苡仁 白芷 不用桂心 麥門冬 白欬 治  
諸癰潰及不潰瘡中疼痛膿血不絕不可忍  
者

潰後虛熱

黃芪 茯苓 湯治癰疽潰後太多虛熱方

黃芪 麥門冬 三生薑 五味子 各四 芎藭

茯苓 桂心 各二 大棗 二十枚

癰癧大便不通

右八味咬咀以水一斗半煮取四升分六服  
梔子湯治表裡俱熱三焦不實身體生瘡及癰

癰癧大小便不利方

梔子 仁 二十枚 芒消 二兩 黃芩 甘草 知母 各

西 大黃 四兩

右六味咬咀以水五升煮減半下大黃取一

升八合去滓內芒消分三服

潰癰膿

治癰有膿令潰方

用雞羽三七枚燒末服之即潰

治癰奇絕

治癰肉中如眼諸藥所不効者方

取附子削令如碁子安腫上以唾貼以火灸

癰堅若

之令附子欲焦復唾濕以火灸之如是三度  
令附子熟氣微內即差此法極妙也

治石癰堅如石不作膿者方

用生高陸根熟搗傳之乾即易取軟為度又

治濕漏諸癰瘡

又方

蜀桑根白皮陰乾搗末煇膠以酒和藥傳腫

根即拔

又方 蛇蛻皮貼之經宿便差

又方

梁上塵 葵根莖灰 各等

脚腫至腹

右二味酥和傳之即差  
治脚腫向上至腹即殺人方

用赤小豆一斗以水三升煮令爛出豆以汁

浸脚至膝每日一度差止若已入腹不可浸

但煮豆食之忌鹽菜米麪等湯飲汁差乃止

一切腫毒

治一切腫毒疼痛不可忍者方

以取葶麻子熟搗傳之即差

治諸瘡著白痴復發方

大蒜 鼠屎 書墨

右三味各等分為末傳之日三

治癰子方 鼠粘根葉貼之

治癰

諸瘡復發

又方 水和雀屎傳之

陰而下脫  
難治三矣

○ 竅背門

按千金方未見療方夫癰者陽而  
易治者陰而所謂癰可背見其年有  
觀父年六十許病瘧而可背見其年有  
老如小瘧云地界火如燔會腹其色  
詩如病云以巨火如燔會腹其色  
煤而瘧云以巨火如燔會腹其色  
日而瘧云以巨火如燔會腹其色  
竅小瘧用薑薇煎之皆無恙蓋薇  
煎方薑薇花茯苓或連翹金銀花  
方加反鼻鹿角大黃或連翹金銀花  
妙不可言唯加  
減在共人耳

治竅背背上初欲結腫方

大黃 升麻 黃芩 甘草 枳實 梔子  
右五味、咬咀、以水九升、煮取三升、分三服、取

癰亦可

癰竅背

快利便止、不利更進、  
內補散、治癰疽竅背已潰、排膿生肉方

當歸 桂心 西各二人 葶藶 芍藥 厚朴 防  
風 甘草 白芷 桔梗 西各二

竅背癰疽

治竅背方

右丸味、治下篩、酒服方寸匕、日三夜二、未瘥  
更服、勿絕、用十金、大防風、甘草、白芷、按此證、  
用亂髮灰、酒服方寸匕、亦治癰疽、


丹毒

○ 丹毒門

論詳千金方

治丹毒單方

百三



水苔 生蛇吻 生地黃 生菘菜 菡萏

葉 以上取一味單搗塗之

大黃 梔子 黃芩 芒消 以上取一味

下水和用

右十三味或搗成末單用一味立差按藥品

可並見千金方

又方凡天下極冷無過藻菜最冷但有患熱毒

腫並丹等取渠中藻菜細切熟搗傳之厚三分

乾即易

治諸丹神驗方

以芸薹菜熟搗厚封之隨手即消如餘熱氣

治諸丹

未愈但三日內封之便醒醒好差止縱乾亦

封之勿歇以絕本余以正觀七年二月八日

於內江縣飲多至夜腫中覺四體骨因疼痛

比至曉頭痛目眩額左角上如彈丸大腫痛

不得近手至午時至於右角至夜諸處皆到

其眼遂閉合不得開幾至殞斃縣令周公以

種々藥治不差經七日余自處此方其驗如

神故疏之以傳來世云耳

治小兒丹毒方

搗馬齒莧一握取汁飲之以淨傳其上

又方

同上

百四

丹毒

濃煮大豆汁塗之良，差後無癢痕。

又方 搗藟藟葉傳之。

治小兒火丹赤如朱，走皮中方。

搗荏子傳之良。

治小兒天花毒，肉中有赤如丹色，大者如手，甚者偏身或痛或癢或腫方。

用赤小豆二升為末，雞子白和，如薄泥傳之。

乾明易便差，一切丹並用此方，皆差。

治小兒骨火丹，其瘡見骨方。

搗大小蒜厚封之，著足踝者是。

治小兒殃火丹毒著面脅及腋下者方。

同上

用伏龍肝為搗末，雞子白和傳之，日三。

風疹

○

癰疹門

以論詳千金方

治風癢癰疹心迷悶亂者方。

礬石二兩為末，酒三升漬，冷消帛塗搽病上。

治風癢癰疹方。

牛膝為末，酒下方寸匕，日三，並治骨疽癰病。

及瘡癰，見瘡癰字彙無所。

治舉體癢痛如蟲嚙而搔之皮便脫落作瘡方。

蒺藜子 蛇床子 芫蔚子 各一 防風 西五大

戟 一 大黃 西二 礬石 西三

即胡之癰

風癩骨疽

右灸方

右七味、咬咀、酒四升、水七升、煮取四升、去滓、內礬石、以帛染拭之。

又方

灸曲池二穴、小兒年壯、瓷即灸之、神良。

○療疽門

論詳千金方

治療疽方

亂髮灰、服方寸匕、日三、亦治疔毒。

又曰

枸杞根、並莖根、葉煮汁、煎令如糖、隨意服之。

疽似癰

治疽似癰而小、有異膿、如小豆汁、今日去、明日滿者者方

五指疽灸法

用芸蓼熟搗、濕布袋盛之、埋熱灰中、更互熨之、不過再三度、安差、冬用乾者。

治疽卒著五指、筋急、不得屈伸者方

風疽

灸踝骨中央數十壯、或至百壯、凡脚腫反曲、厥中、瘡搔、治風疽方、黃汁出、是也、灸法見後。

骨疽

嚼胡麻、傳以綿裹之、日易、神良。

治久癰瘡、敗壞成骨疽方、  
用末龍骨、粉瘡四面、厚二分、以膏著瘡、日二

易、蟲出、如髮、盡愈、膏方如左、

大蝦蟆一枚、自亂髮子大、雞猪脂一斤

右三味、取二味內脂中、煎、略消盡、下待冷、更

同上

內鹽一合攪和充前用

治附骨疽方  
槲皮燒末飲服方寸匕

又方

灸間使後一寸隨年壯立差翼云後三寸間使在掌中

治疽

治久疽方

用鯽魚破腹勿損內白鹽於腹中以針縫之於銅器中火上煎令乾作末傳疽瘡中無膿者以豬脂和傳上小痛勿怪也十日差  
苦匏散治浸淫瘡方瘡表裏相當

ツラゲ

類上

苦匏西蜂房乾蛇蛻各半大豆半梁上塵一

右五味治下節以粉為粥和傳紙上貼之日

三大豆録驗三

治癰瘡方 燒松根取脂塗之

治濕癰方 燒乾蝦蟇豬脂和傳之

治癰疔百療不差方

棟實半桃皮 苦參 地榆根略五

右四味咬咀以水一斗煮取五升稍溫洗之

日二度

治久癰疔濕瘡浸淫日廣瘡不可堪搔之黃汁  
出瘡後復灸方

百七

ヒゼン  
シツ

惡瘡

用羊蹄根、淨去土、細切、熟熬、以酢和、熟搗、淨洗、傳上一時間、以冷水洗之、日一度、又陰乾、為末、瘡時、搽以汁、出以粉之、又以生葱根、搗之、千金翼、每葱實

治惡瘡方

麩一升、作餅、大小以覆瘡、灸上令熟、汁出盡

差

風疽灸法

治一切瘡

凡脚腫反曲、脚中、瘡、搔、灸足大趾、奇間、二七壯、又灸大趾、預亦佳、

似癩

治惡瘡十年不差、似癩者方

用蛇脫皮一枚、燒為末、下節、豬脂和、傳之、酢

癰疽良

又方

和亦得

苦匏一枚、以胆、煮取汁、洗之、日三度、又煎以

積年諸瘡

治反花瘡、並治積年諸瘡方

取牛蒡根、熟搗、和臘月豬脂、封上、差止、並治久不差、諸腫、惡瘡、漏瘡、等、皆差

代指

治代指方

用芣草二兩、以胆、水五升、煮取一升半、漬之、

若燕、代、

又方 取萎黃、葱葉、煮沸、漬之

同上

又方 以蜀椒四合、水一斗煮三沸、漬之

治指痛欲脫方

用猪脂和鹽、煮令消熱、納指中、一食久佳、  
金

手足皴痛

又方 灸指端七壯、立差

治手足皴痛方

用煮茄子根、洗之

又方

芎藭<sub>三</sub>、蜀椒<sub>二</sub>、白芷、防風、鹽<sub>各一</sub>、  
右五味、以水四升、煎取濃塗之、或猪脂  
煎更良

脚折裂

治尸脚方 常折、脚裂、冬夏

用雞屎一升、水二升、煮數沸、停水、冷漬半日、  
差止、亦用馬屎、忌踏酒、吐及婦人穢血

割甲痛

又方 煇膠、乾故帛、貼上

治割甲侵肉不差方  
以碓沙礬石為末、裹之、以差為候

指瘰癧

治著指頸瘰癧方

此從患按、用四物湯加桂枝等分、濃煮、日服  
令之二三合、別取右五味、是亦濃煮、取二合  
納器中、適寒溫、漬指、痛即止、唯食時不漬耳、  
急之則復痛、隨而漬之、則又痛即止、如是二

三田而疼痛全差、後用家方黃膏敷之日五  
六度、差止、療中前後唯服前方身、禁油膩酒  
辛等、黃膏方、麻油一合、煙草二錢、裹之、鍋中  
煎沸小減、去煙草、入蜜臘二十錢、烱盡、置冷  
處用之、腫類、奇驗、可一試  
杏菴託事、四篇、亦別必二方

一切漏

○九漏門

各有其名

治一切漏方

死蛇和臘月猪脂合、燒灰為末、內孔中

又方

燒死蟻銀為末、醋和塗、又死蛇灰、醋和傳之

同上

治漏作瘡孔方

用露蜂房為末、臘月猪脂和、傳孔中

治漏穿心骨以下者方

松脂 武都雄黃 各三

○右二味和為塊、刀子刮為散、飲服一方寸匕

日二、不差更合

鼠瘻堅

治鼠瘻腫核痛未成膿者方

以柏葉傳腫上、熬鹽著葉上、熨之、令熱氣下

即消

治螻蛄瘻方

先以泔漬、煮取汁、洗瘻拭乾、次以槲葉灰、內

百十

漏教孔

瘡中

治蜂瘻方論

初生狀如桃而癢搔之引如雞子如覆手者  
熬鹽煎之三宿四日不差至百日成瘻其狀大  
如四五寸石廣三寸生蜂作孔乃有數百以石  
硫黃隨多少燃燒令汁出著瘡孔中須臾間見  
蜂數十蜂盡乃差

蜂漏

治蜂瘻方

取蜂窠燒灰臘月猪膏和傳孔中

蟻漏

治蟻漏孔容針亦有三四孔者方

鯪鯉甲二七枚燒末以猪膏和傳瘡上

螻蛄

又方

半隻一枚搗末以鴨脂和傳瘡上

治螻蛄瘻方

用牛屎燒灰臘猪脂和傳之

蠍瘻

治蠍瘻五六孔皆相通者方

搗茅根汁著孔中

蛇瘻

治蛇瘻方

用蛇蜕皮燒灰臘月猪脂和封之

顛頭瘻

治顛頭瘻方

以搗土瓜根傳至差慎口味

膿瘻

治膿瘻方

百十一



愈、  
屈面肘、正灸肘頭銳骨各百壯、肘下膿血即

婦人女子、乳頭生小淺熱瘡、瘡極之黃汁出、浸淫為長、百種治不差者、勤經年月、名為妒乳、婦人飲兒者、乳皆欲斷、世謂之苟抄乳是也、洗方有

赤龍皮湯方  
方、未試、故略此、  
妒乳、俗作妬、非也、妬者、妬女子口妬、妬音都、妒志以上字、景說、

右用槲皮、切三升、以水一斗、煮取五升、夏冷用之、冬溫用之、方以洗乳、亦洗諸深爛久瘡

鹿角散、治婦人乳生瘡、頭汁出、疼、痛欲死、不可

忍、者、方、

鹿角分三甘草方一

右二味、治下節、和以雞子黃於銅器中置溫處、

灸上傳之、日再、即愈、神驗不傳、  
治妒乳方

以葵莖灰、搗篩、飲服方寸匕、日三、即愈、集驗方直

凡女人多患乳癰、年四十以下治之、多差、年五十以上、慎勿治、治之多死、不治、得終天年、

連翹 芒消各一芍藥 射干 升麻 防己 杏仁 黃芩 大黃 柴胡 甘草各三

西

右十一味、以水九升、煮取二升五合、方

三服、

治乳癰始作方廣濟方云、治乳癰大堅、硬赤紫、色、衣不得近、痛不可忍者、

大黃、棟實、芍藥、馬蹄各等分

右四味、治下節、飲服方寸匕、取汗出、差廣濟方云、

酒服方寸匕、覆取汗、當著眠、

排膿散、治乳癰、除惡肉方、

菴蓉、鐵精、桂心、細辛、黃芩、芍藥

人蔘、防己一作防風、乾薑、當歸各三分、甘草五分

右十二味、治下節、酒服方寸匕、日三夜一服

同上

馬蹄、馬懸蹄也、

同上

同上

藥十日、膿血出多、勿怪、

治乳癰方

大黃、蘗屎新者、各一分、黃連

右三味、搗為末、以黍米粥清和、傅乳四邊、痛

止即愈、無黍米、粟米、粳米亦得

治乳癰二三日、家瘵不差、但堅紫色、青柳根煎

方、

以柳根、割取上、皮搗令熟、熬令溫、盛著練囊、

中、煎乳上、乾、以易之、一宿即愈、

同上

百十四

○ 五痔門各名、方詳

痔敷法

治五痔方

塗熊膽取差止神良一切方皆不及此

洗法

又方取槐根或桃根洗之

五痔

獾皮圓治痔方亦治漏

獾皮具礬石當歸連翹乾薑附子

續斷黃芪各二槐子三乾地黃五

右十味為末蜜丸如梧子大飲服十五丸日

再加至四十丸集驗方礬石地方黃

同上

治痔方

以蒲黃水服方寸匕日三良外臺云治腸痔者

同上新  
產漏下

治痔下血及新產漏下方

附子好礬石各一

右二味為末白蜜丸如梧子大酒服二丸日

三稍加不過數日便斷百日服之終身不瘳

雀子方有乾薑一兩

去痔虫

治痔下部出膿血有虫傍生孔竅方

檉上必眩一

以槐白皮檉剉內釜中煮令味極出置木盆

中適寒溫坐其中如浴狀蟲悉出冷又易之

不過二三度差

大孔痛

治穀道痛方

用菟絲子熬黃黑和雞子黃以傅之日二度

百十五

又方  
取杏仁、麝香、令黃、搗作脂、以傳之

治癬

○疥癬門 附癩風

治癬方  
搗羊蹄根、和乳、塗之

同灸法

治癬灸法

八月八日、日出時、令病人正當東向、戶長跪、平舉兩手、持戶兩邊、取脊頸小骨、解宛々、中灸之、兩火俱下、各二壯、若七壯、十日愈

白癩風

治白癩方

礬石 硫黃

又方  
右二味、各等分、為末、酢和、傳之

白駁

取羅摩草、煮汁、拭之、亦搽令傷、滴白汁、塗之、治凡身諸處白駁、漸々長似癬、但無差方、取鱧鱠魚脂、塗之、先搽病上、使痛、然後塗、

治皮中紫赤疵痣、塗之、去壓穢方、  
乾漆 雌黃 礬石 雄黃 巴豆 五枚

炭皮 斤

右六味、治下節、以雞子白和塗、故帛貼病上、日二易

去死目方

松柏脂合和塗之、一宿失矣

又方

以猪脂瘡搽之、令少許血出、即差、神驗不可

加

又方

苦酒漬石灰六七日、滴取汁、點死上、少作死

即落

又方

著艾炷死目上、灸之、三壯、即除

○惡疾大風門

治風身體如蟲行方

用鹽一斗、水一石、煎減半、澄清、溫洗浴、三四

遍、并療一

又方

成煉雄黃、松脂各等分、蜜和、丸如梧桐子大、飲下十丸、日三服、百日愈、慎酒肉鹽豉等

肉毒

○解食毒門

治食六畜肉中毒方

燒小豆一升為末、服方寸匕、神良

同上

治食生肉中毒方

掘地深三尺，取下土三升，以水五升煮土，五

六沸，取上浮清者，飲一升，立愈也。按：即地漿也，唯煮異耳。

野菜肉毒

治諸菌及

治食野菜馬肝肉諸肺肉毒方

取頭垢如枣核大吞之，起死人

狗肉毒

治食狗肉不消，心中堅，或腹脹，口乾，大渴，心急

死，熱狂言妄語，或洞下方

杏仁一升，合皮研，以沸湯三升和，絞取汁，分

濕肺肉

三服，狗肉完片皆出，即靜，良驗。

治鬱肉濕肺毒方。張文仲云：肉閉在室器中，經宿者為濕肺。

鱸蟹毒

燒狗屎為末，水服方寸匕。凡生肉熟肉，皆不用深藏，密蓋不泄氣，皆殺人。又肉汁在器中，

密蓋氣不泄者，亦殺人。

治食魚中毒，面腫煩亂，及食鱸魚欲死者方

剉蘆根，春取汁，多飲良。並治蟹，亦可取蘆葦

中魚鱸生肉

葦汁飲之。按：次有中蟹，冬瓜亦可食之。葦

治食魚鱸及生肉，在胃膈中不化，吐之，不必便

成癥瘕方

厚朴三兩 大黃二兩

右二味以水二升，煮取一升，頓服之

治食魚鱸不消方

同上

百十八

大黃三面朴消二面  
右二味以酒二升煮取一升頓服之仲景方  
一兩必成癥下之方亦無橘皮  
治食山中樹菌中毒方  
人屎汁服一升急右按龍膽丸地漿水最妙亦

○解百藥毒門

論曰甘草解百藥此實如湯沃雪有同神妙有  
人中烏頭巴豆毒甘草入腹即定中藜蘆毒葱  
湯下咽便愈中野葛毒土漿飲訖即止如此之  
事其驗如反紫要使人皆知之然人皆不肯學

誠可歎息方稱大豆汁解百藥毒余每試之大  
懸絕不及甘草又能加之為甘草湯其驗尤奇  
有人服玉壺丸治嘔不能已百藥與之不止藍  
汁入口即定如此之事皆須知之此成規更  
不須試練也解毒方中條例極多若不指出一  
二學者不可卒知餘方例爾  
中毒方詳千金方及  
救急靈方中藥毒門

○陰癩門

論曰癩按與有四種有腸癩卵脹氣癩水癩腸  
癩卵脹難瘥氣癩水癩針灸易治  
治男子陰腫大如升斗核痛人所不能療者方

雄黃研一西礬石研二西甘草一尺  
右三味以水五升煮減半洗腫痛處集驗方

陰囊腫滿

有人陰冷冷氣漸入陰囊腫滿恐死日夜疼悶  
外臺作夜不得眠方

取生椒揮令燥以布帛裹著丸囊令厚半寸  
須更熱氣通日再易取消差止

又方 搗菟菜根傳之

又方 車前為末飲服之

陰腫灸法

治陰腫痛方  
按翼云在足大指端去爪甲如韭菜及三毛中即足厥陰肝經

陰蝕瘡

治陰蝕生瘡或癢方

雄黃 礬石各二麝香半

右三味治下節為末粉瘡上即差

治男女陰癢生瘡方 嚼胡麻傳之佳

治陰下生瘡洗湯方

地榆 黃蘗各八


右二味咬咀以水一斗五升煮取六升去滓  
適冷煖便洗瘡日再或只煮黃蘗汁洗亦佳

卒死

卒死閉附五絕

治卒死無脈無他形候陰陽俱竭故也治之方

百二十



同上

牛馬屎、絞取汁飲之、無新者、水和乾者、亦得。  
肘后方云、乾者、以人溺解之、此希鶴方。

治卒壓死方

持韭汁灌鼻口中、劇者灌兩耳。張仲景灌口中。

同上

治鬼壓不悟方

伏龍肝為末吹鼻中。

又方

皂莢為末、如大豆許、吹鼻中、嚏、山氣通、起死。

同上

回生、集驗方惡。

灸法、治卒死。

灸十指爪下各三壯。

備急方云、治卒死而

同上

張目及折者、又灸人中三壯、又灸眉井百壯、又灸

間使七壯、又灸巨闕百壯。

還魂湯、治卒感忤、思擊飛屍、諸奄忽氣絕、無復

覺、或已死、咬口、口噤不開、去齒下湯、湯入口不

下者、分病人髮左右、足踏脊引之、藥下復增取

盡一升、須臾立蘇方。

麻黃、三桂心、二甘草、一杏仁、七粗、十

右四味、咀以水八升、煮取三升、分三服、肘

方云、張仲景

治五絕方、夫五絕者、一曰自縊、二曰墻壁壓、

取半、復一面、細下、節吹、一大豆許、內鼻中、即

五絕死

自縊死  
同上

治心溫者、一日亦可治、  
治自縊死方救法、在救急、遺方、

刺雞冠血、滴著口中、即活、男雌女雄、

又方

梁上塵、如大豆許、各內一小竹筒中、四人各  
捉一筒、同時吹西耳、而鼻、即活、

又方 藍青汁灌之

治熱喝方

取道上熱土、以壅心上、少冷、即易、氣通止

又方

濃煮蓼、取汁三升、飲之、即愈、不愈更易、

入水手足腫痛  
又方 灌地漿一盞、即愈、

治入水手足腫痛方

搗生胡麻薄之

治酒醉不醒方

飲葛根汁一斗二升、取醒止、射后方云、治大

飲、連日煩毒不

飲酒令急酒氣方

乾蔓青根二七枚、三遍蒸為末、取兩錢許、酒

後水服

蛇入孔

○蛇毒毒門 及諸獸咬

治因熱逐涼睡熟有蛇入口中挽不出方

以刀破蛇尾内生椒三四枚裹著須臾即出

肘后方云艾灸蛇尾即出若無火以刀周帛割蛇尾截令皮斷乃將皮倒脫即出

治卒為蛇繞不解方 以熱湯淋之無湯令人尿之

治諸蛇毒方

雞屎二七枚燒為灰投酒中服之亦可良余

上每以蠶毒用火點之一瓷立時瘡

治象蛇螫方 灸上三七壯無艾以火頭稱瘡口大小熱之

同上

刺蛇骨

治蛇骨刺人毒痛方

鐵精如大豆許內管中吹內瘡中良

治虎咬瘡方

濃煮葛根汁洗數十遍反擣為散以葛根汁

服方寸匕日五甚者夜二


又方

青布急卷為繩止一物燒一頭燃內竹筒中

注瘡口薰之妙不限虎毒本朝所能解猛獸毒此方

禁殺生

論曰凡見一切毒螫之物必不得起惡心向之亦不得殺之若輒殺之於後必遭螫毒治亦難



差慎之慎之按觀千金方序文可見殺生者聖人之所禁也戒之  
 凡狗犬所咬未盡其惡毒者灸其上一百壯已  
 後當日灸一壯若不血出刺出其血百日灸乃  
 止禁飲酒及猪犬肉  
 余每治之先針瘡口四圍凡六七刺或十刺  
 唯隨小大耳若不堪刺者灸瘡四傍各一壯  
 如是七日黃膏加膽礬少許貼瘡上日五六  
 易七日而愈或膽礬貼黃膏亦日五六次待愈  
 止先未療直造小豆粥隨意服之服大豕氣  
 湯四貼翌日服白虎如人浸湯亦四貼如是  
 日夕互服七日而止但七日內使瘡不乾為

要灸

○被打及諸傷損門  
 論曰凡被打損血悶搶心氣不能言絕可下擊開口  
 采中冷下咽即醒又墮車落馬及車碾木打已  
 死者以死人安著以手袖掩其口鼻眼上一食  
 頃活眼開與熱小便二升  
 治被打傷破腹中者瘀血方  
 蒲黃一當歸桂心略二  
 右三味治下篩以酒服方寸匕日三夜一  
 又方

劉寄奴 延胡索 骨碎補各一  
右三味、以水二升、煎取七合、復內酒反  
小便各一合、熱溫頓服

又方

麩蟲 水蛭各十 桃仁五 桂心二

大黃五

右六味、以酒水各五升、煮取三升、分五

疾忘心全

治有瘀血者、其人喜忘、不欲聞人聲、胸中氣塞  
短氣方、

甘草一 茯苓二 杏仁五

墮下疝

右三味、以水二升、煮九合、分二服

治從高墮下、傷損疾痛、煩燥啼叫、不得臥方、

取鼠屎燒末、以猪膏和塗痛上、尋急裹之、肘

肉斷

方云、裹

治墮車馬、問馬鞍、反諸物、隱體肉斷方、

諸傷損

以酢和麵塗之

當歸散、治落馬、墮車、諸傷、腕、肘、臂、脚、痛、不止方、

當歸 桂心 蜀椒 附子各二 澤蘭一 芎

藭六 甘草五

右七味、並熬令香、治下節、酒服方寸匕、日三

凡足傷損、皆服之、十日愈、小兒亦同、救急方

腕折足折

散呼呼吸之間、被打傷腕折、臂、叫喚痛、聲不絕、服此

同上

治腕折骨損痛不可忍者方  
以大麻根及葉、搗取汁飲一升、無生麻、煮乾  
麻汁服亦主墜墮、搗打瘀血、心腹滿、短氣

鹿角散治同前

酒服方寸匕、日三

又方

大豆二升、水五升、煮取二升、以淳酒六七升  
合和豆汁服之、一日盡、如湯沃壺、治墜方云

損傷見五婦公册下

治丈夫從高墮下、傷五藏、微者唾血、甚者吐血

及金瘡傷經、崩中皆主之方

阿膠 艾葉 乾薑各二兩 芍藥三兩

右四味、以水八升、煮取三升、去滓、內膠  
令消、分二服、羸人分二服、兼治女人產後崩  
傷、下血過多、虛喘、腹中絞痛、下血不止者服  
之悉愈

同上及  
產後崩  
傷

大膠艾湯治男女傷絕、或從高墮下傷五藏、微  
者唾血及金瘡傷經者方

阿膠 艾葉 甘草 當歸 芍藥各一兩

薑 芍藥 乾地黃各三兩

右八味、以水八升、煮取三升、去滓、內膠

令煇分再服，羸人分三服。此湯治婦人產後崩傷，下血過多，虛喘欲死，腹中激痛，下血不止者，神良。

竹皮湯治寫兵杖所加木石所連血在胸背反腸中痛，不得氣息方。

青竹刮取茹亂髮各如雞子

右二味於炭火上炙令焦燥，合搗下篩，以酒

一升，煮三沸，止一服，盡之三服，愈。

治墮落馬車間，心腹積熱，唾吐無數方。

乾藕根為末，以酒服方寸匕，日三，如無取新

藕汁服。

同上

又方治墮落瘀血方。

桃仁五枚 水蛭 蠱蟲各十枚 甘草 桂心

當歸各二兩 芒消三兩 大黃四兩

右八味，以水八升，煮取三升，絞去滓，適

寒溫，服一升，日三服。深師方，無芒消。

又方


桃仁五枚 蠱蟲 蠱蟲 水蛭各十枚 大黃五兩

桂心二兩

右六味，以酒水各五升，合煎得三升，適

寒溫，飲一升，日三服。

又方治腕折瘀血方。



竹木齒

桃仁四十枚亂髮握一大黃如一枚

右三味以布方廣四寸以繞亂髮燒之咬咀

大黃桃仁以酒三升煮取一升盡服血盡出

略此下詳千金方

治竹木刺在皮中不出方

薔薇灰水服方寸匕日三服十日刺出

又方

用牛膝根莖生者併搗以薄之昂出瘡已合

猶出也

又方

鹿角燒末以水和塗立出久者不過一久

破傷風

又方

嚼白梅以塗肘后方用烏梅小搗敷絕妙范麻

治瘡中水腫方

白灰 胡粉 炭各等分

右三味脂和塗孔上水虫即痛止

治因瘡腫痛者皆中水及中風寒所作腫入腹

山殺人方

溼桑灰汁漬冷復溼之當令熱神祕

治漆瘡方

生梔葉三斤細切以水一斗五升煮取七升

適寒溼洗之日三柳皮方老

同上

漆瘡

56  
4326

又方 礬石、著湯中令消、洗之、按芒消、赤良、消

平時嘉永三庚戌年梅里於三月三日  
四月廿五日

七十四年  
吉川公金卷尾誌

