傷寒雑病類方　嘉永五年　喜多村直寛記

禁帯出

傷寒雜病類方

嘉永壬子新鐫

# 傷寒雜病類方

學訓堂藏版



傷寒雜病類方序

余少時辱喜多部槐園先生之愛屢相過時令嗣士栗君齡尚多沈靖寓言芙好讀書終日佔畢不停聲余竊謂先生博學洽聞非

祿二刀圭家所能擬宜承
選躋華膴帝卞與命朕
其潛德以發于士栗君矣
後二十餘年大進果擢為
樂晉侍醫活眼聲華藉二



動在余心私自喜藏鑑之
來奭也士栗君博涉羣籍
尤刻心傷寒論輯請家之
說帝洮汰焉勠會焉粹然
歸于正仲景疏義十卷後進
者崇奉改為醫門之圭臬

實藥籠中不可無一部也頃將鋟諸梓授余序之余於醫書望洋向若而歎何足以序之焚膏爇又嘗愛先生之一言但先生宰木已拱矣又識君於髫豈可無



今又著傷寒雜病類方蓋清涂靈胎纂傷寒類方而遺雜病吉益公言則并雜病載之而不能無躐駁焉士栗君就二子之書取醇去駁綱提領挈極為明備

得覩君之榮進與其著書之富是則大可憾耳

嘉永癸丑之元

良齋安積信撰

蓮庵戸川清書





傷寒雜病類方叙

本邦寶曆間吉益公言爲則纂類聚方清乾隆間徐靈胎大椿編傷寒類方時代頡頏彼是見同亦可奇也夫方之治病有定而病之變化無窮故仲景之書應類方而不可類證其識卓矣想靈胎之著僅止傷寒而雜病乃不載公言之撰傷寒雜病併採而未免踳駁學者憾焉愚不揆擣昧竊就二子之書更加釐正勒爲一編題曰傷寒雜病類方雖未知有愜長沙見病知源

之旨否。然其於臨證施理之際。庶乎亦不無小補云爾。

弘化紀元閼逢執徐臘月除夜江戸喜多村直寛士栗撰



凡例

一徐靈胎類方。成於乾隆己卯。吉公言類聚方。竣於寶曆壬午。其間相距僅四年。而識見之相合。如印券符契矣。葢文運之盛衰。隨時轉變。而醫術之汚隆。亦與世軒輊。此乃天地生生之機。造物者之無盡藏也。今就二家之著。捨瑕取瑜。折諸其衷。綱領節目。秩然有條。昔人云剏始者難工。踵事者易密。非敢欲凌前哲也。

一漢之一銖卽今一釐四豪五絲。一兩卽今三分四釐八豪。一斤卽今五錢五分六釐八豪。六銖爲分。四分爲一兩。而其量則一升。當今一合有奇。一合當今一勺有奇。惟半夏五味子類。則係藥升量之。藥升說。見本草序例。今竊據周尺制造。以充家墾用。以今曲尺計。大約上徑八分。下徑五分五釐。深六分五釐。權量之說。從來紛呶。而此乃當世識者所檢核。最爲綦詳。今舉桂枝湯一方徵之。桂枝三兩。卽今一錢四釐四豪。芍藥生薑。各三兩。三品合三錢



一分三釐二豪。甘草二兩。卽六分九釐六豪。大棗十二枚。重四兩。以三枚準一兩。卽今一錢三分九釐二豪。凡一劑之藥。約五錢二分零。以水七合有奇。煮取三合有奇。較之方今醫家藥。一貼一錢七八分已上。以水二合。煎取一合服者。約略爲均。蓋古今之口相似。古今之病亦相同也。

一豬膽。本邦稀有。今以熊膽代之。梓白皮亦少有。以桑白皮代之。羊肉絕鮮。以牛肉。或鹿

脯代之。人尿。使用不便。以童子小便代之。白酒未詳。以苦酒代之。并是先哲所試驗。而應機制變之妙。自存乎其人矣。愚嘗著越俎藥誌一書。竊述古人代藥之義。亦要參看。

一玄武湯。本曰眞武湯。避宋諱也。人漫莊胡。原作人參。柴胡。從俗便也。凡此類。今皆改訂。以復其舊。說具于傷寒。及金匱疏義中。

一金匱雜療。所載單方捷驗者。常須熟識。茲不備錄。愚嘗著廣傷寒類方。要是推擴仲景之法。今是著乃係約此之法。故其編類間有不同。觀者恕之。可也。

一此編。詮次僅畢。及門頻催刊布。因校以授剞氏。然金根白及。猶或未免。若正其謬。補其闕。固所企望乎後之博雅也耳。

壬子春二月　　喜多村直寬識

傷寒雜病類方目錄

桂枝湯類一 凡三十五方
桂枝湯一 小建中湯二
桂枝加桂湯三 桂枝附子湯四
桂枝加附子湯五 桂枝去芍藥湯六
桂枝去芍藥加附子湯七 桂枝加芍藥湯八
桂枝加大黃湯九 桂枝去芍藥加皂莢湯十
烏頭桂枝湯十一 桂枝甘草湯十二
桂枝加茯苓白朮湯十三 桂枝加厚朴杏子湯十四

桂枝加芍藥生薑人蔘新加湯 十五
桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯 十六
桂枝加龍骨牡蠣湯 十七
桂枝甘草龍骨牡蠣湯 十八
桔蔞桂枝湯 十九
黃耆桂枝五物湯 二十
桂枝加黃耆湯 廿一
黃耆建中湯 廿二
黃耆芍藥桂枝苦酒湯 廿三
內補當歸建中湯 廿四
桂枝生薑枳實湯 廿五
當歸四逆湯 廿六
當歸四逆加吳茱萸生薑湯 廿七
桂枝麻黃各半湯 廿八
桂枝二麻黃一湯 廿九
桂枝二越婢一湯 卅
桂枝芍藥知母湯 卅一
芍藥甘草湯 卅二
桂枝茯苓丸 卅四
麻黃湯類二 凡二十六方
麻黃湯 一
還魂湯 二
甘草麻黃湯 三
麻黃醇酒湯 四
麻黃細辛附子湯 五
麻黃附子甘草湯 六
桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯 七
麻黃加朮湯 八
小青龍湯 九

射干麻黃湯 十
大青龍湯 十二
厚朴麻黃湯 十四
文蛤湯 十六
越婢加朮湯 十八
續命湯 二十
麻黃升麻湯 九二
牡蠣湯 九四
麻黃連軺赤小豆湯 九六
麻黃杏人薏苡甘草湯 十一
小青龍加石膏湯 十三
麻黃杏人甘草石膏湯 十五
越婢湯 十七
越婢加半夏湯 十九
半夏麻黃丸 九一
三黃湯 九三
烏頭湯 九五



葛根湯類三 凡五方
葛根湯 一
葛根加半夏湯 三
竹葉湯 五
葛根湯 二
桂枝加葛根湯 二
葛根黃芩黃連湯 四
芫胡湯類四 凡九方
大芫胡湯 二
小芫胡湯 一
芫胡加龍骨牡蠣湯 四
芫胡加芒消湯 三
芫胡桂枝湯 六
芫胡去半夏加括蔞湯 五
芫胡桂枝乾薑湯 七
四逆散 八

芘胡飲子 九
梔子湯類五凡九方
梔子豉湯 一
梔子生薑豉湯 三
梔子乾薑湯 四
梔子厚朴湯 五
梔子藁皮湯 六
枳實梔子湯 七
梔子大黃湯 八
茵蔯蒿湯 九
承氣湯類六凡三十二方
大承氣湯 一
小承氣湯 二



調胃承氣湯 三
麻子仁丸五
厚朴七物湯 七
大黃甘草湯 九
抵當丸十一
大黃䗪蟲丸十三
大黃牡丹湯十五
治食鱠成癥方十七
大陷胷湯 十九
桃核承氣湯 四
厚朴三物湯 六
厚朴大黃湯 八
抵當湯 十
下瘀血湯十二
大黃消石湯十四
大黃附子湯十六
大黃甘遂湯十八
大陷胷丸二十

小陷胸湯 卅一
葶藶大棗瀉肺湯 卅三
走馬湯 卅五
巳椒藶黃丸 卅七
甘遂半夏湯 卅九
豬膽汁方 卌一
瓜蒂散 一
鹽湯 三
十棗湯 卅二
白散 卅四
三物備急丸 卅六
治馬墜及筋骨損方 卅八
蜜煎導 三十
九痛丸 卌二
瓜蒂散類七 卌四方
一物瓜蒂湯 二
飲食中毒煩滿治之方 四





瀉心湯類八 卌十五方
半夏瀉心湯 一
生薑瀉心湯 二
甘草瀉心湯 三
大黃黃連瀉心湯 四
瀉心湯 五
附子瀉心湯 六
黃連湯 七
黃芩湯 八
黃芩加半夏生薑湯 九
黃芩湯 十
三物黃芩湯 十一
乾薑黃芩黃連人蔘湯 十二
旋覆代赭湯 十三
黃連阿膠湯 十四
澤漆湯 十五

白虎湯類九凡五方
白虎湯一　白虎加人蔘湯二
白虎加桂枝湯三　竹葉石膏湯四
竹皮大丸五
五苓散類十凡二十一方
五苓散一　茵陳五苓散二
豬苓湯三　茯苓甘草湯四
豬苓散五　茯苓桂枝白朮甘草湯六
茯苓桂枝甘草大棗湯七　澤瀉湯八
茯苓澤瀉湯九　茯苓杏人甘草湯十
桂苓五味甘草湯十一　苓甘五味薑辛湯十二
茯苓五味甘草去桂加薑辛夏湯十三
苓甘五味加薑辛半夏杏人湯十四
苓甘五味加薑辛半杏大黃湯十五
茯苓戎鹽湯十六　葵子茯苓散十七
牡蠣澤瀉散十八　文蛤散十九
蒲灰散二十
理中湯類十一凡十一方

理中丸 一
桂枝人蔘湯 三
茯苓飲 五
甘草乾薑湯 七
白朮附子湯 九
天雄散 十一
四逆湯類十二方
四逆湯 一
四逆加人蔘湯 二
通脈四逆湯 三
人蔘湯 二
大建中湯 四
朮湯 六
甘草乾薑茯苓白朮湯 八
甘草附子湯 十
附子湯 十
赤丸 十二
半夏湯類十三方
半夏湯 一
小半夏加茯苓湯 二
大半夏湯 四
乾薑人蔘半夏丸 六
乾薑附子湯 五
白通加豬膽汁湯 七
茯苓四逆湯 八
烏頭煎 十一
烏頭赤石脂丸 十三
半夏湯類十三方
小半夏湯 一
生薑半夏湯 三
半夏乾薑散 五
白通湯 六
玄武湯 九
大烏頭煎 十一

附子粳米湯 七
厚朴生薑半夏甘草人蔘湯 八
苦酒湯 十
半夏厚朴湯 九
麥門冬湯 十二
半夏散及湯 十一
甘草湯類十四 凡七方
桔梗湯 二
生薑甘草湯 四
排膿湯 六
甘草湯 一
炙甘草湯 三
甘草粉蜜湯 五
甘草小麥大棗湯 七



芍歸湯類十五 凡六方
溫經湯 二
當歸芍藥散 四
當歸貝母苦蔞丸 六
當歸生薑羊肉湯 三
當歸散 五
雜法方類十六 凡七十一方
桃花湯 二
禹餘糧丸 方闕四
腎氣丸 六
薯蕷丸 八
吳茱萸湯 一
赤石脂禹餘糧湯 三
烏梅丸 五
括蔞瞿麥丸 七

橘皮湯 九
橘皮枳實生薑湯 十一
木防己去石膏加茯苓芒消湯 十三
防己黃耆湯 十四
防己地黃湯 十六
酸棗湯 十八
蜀漆散 二十
柏葉湯 二十二
赤小豆當歸散 二十四
橘皮竹茹湯 十
木防己湯 十二
皂莢丸 廿一
黃土湯 廿三
括蔞薤白白酒湯 廿五
括蔞薤白半夏湯 廿六
枳實薤白桂枝湯 廿七
百合知母湯 廿九
百合雞子湯 卅一
百合滑石散 卅三
薏苡附子散 卅四
薏苡附子敗醬散 卅五
葶藶湯 卅六
白頭翁加甘草阿膠湯 卅八
紫薇湯 卅九
訶黎勒散 四十
訶梨勒丸 四十一
侯氏黑散 四十二
風引湯 四十三

狼牙湯 六十二
升麻鱉甲湯 六十四
藜蘆甘草湯 六十六
蜘蛛散 六十八
救卒死客忤死方 七十
燒褌散 七十一
以上共二百八十一方
小兒疳蟲蝕齒方 六十三
猬肪散 六十五
雞屎白散 六十七
旋覆花湯 六十九
紫石寒食散 四十四
豬膚湯 四十六
枳實芍藥散 四十八
紅藍花酒 五十
豬膏髮煎 五十二
雄黃熏方 五十四
杏子湯 方闕 五十六
黃連粉 五十八
消石礬石散 六十
白朮散 四十五
王不留行散 四十七
排膿散 四十九
頭風摩散 五十一
百合洗方 五十三
苦蔆湯 五十五
礬石湯 五十七
礬石丸 五十九
蛇床子散 六十一

桂枝味辛性甚宣行陽気
桂枝純陽之品宣行人身表裏之陽以補其不足得芍薬則和営得麻黄則發汗佐附子而壮陽佐人参而補虚桃仁大黄配之破血阿膠地黄配之通脉膠飴甘草藉之調中朮與茯苓藉之逐湿名醫別録曰桂枝宣導百薬良有以也
大陽病頭痛發熱汗出悪風者桂枝湯主之夫風邪之傷人表陽虚者鉾汗自出邪気乘従之而散於是用桂枝為君佐以生姜専其宣陽之力芍薬走陰而和液甘草大棗和其中気乃諧営衛而祛邪風也若其表候而汗不出則以麻黄配桂枝得走表疎気之力而挙逓發寒邪頓去是桂枝解気之功也發汗遂漏不止其人悪風小便難四肢微急難以屈伸傷寒陽脉濇陰脉弦腹中急痛者其人中気固自不足及為邪所傷益失和潤仍以建中湯主之益桂枝之温補陽以調不足便芍薬得膠飴之甘緩急和中以芍薬滋養筋脉之陰後其人又手冒心心下悸者主以桂枝甘草湯此症不唯汗多表虚則膻中之陽従致不足故心如無所頼而悸欲得按者以桂枝透表微裏宣行陽気補其不足合甘草以和中気矣燒鍼令其汗鍼処被寒核起気従小腹衝心必發奔豚者桂枝湯加桂二兩用之發汗後其人臍下悸者欲作奔豚者茯苓桂枝甘草大棗湯主之二方倶用桂枝補其裏陽以防陰邪之上逆是則桂枝在表宣陽以其味之辛在裏



# 傷寒雜病類方

江戸　喜多村直寛士栗　編

## 桂枝湯類一　凡三十五方

### 桂枝湯

桂枝　三兩　去皮
芍薬　三兩
甘草　二兩　炙
生薑　三兩　切
大棗　十二枚　擘

右五味、咬咀三味、以水七升、微火煮取三升、去滓、適寒温、服一升、服已、須臾歠熱稀粥一升、以助薬力、温覆令一時許、遍身漐漐、微

似有汗者益佳。不可令如水流離。病必不除。
若一服汗出病差。停後服。不必盡劑。若不汗。更服依前法。又不汗。後服小促其間。半日許。令三服盡。若病重者。一日一夜服。周時觀之。
服一劑盡。病證猶在者。更作服。若汗不出。乃
服至二三劑。禁生冷粘滑。肉麵五辛。酒酪臭
惡等物。
太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者熱自發。陰弱者
汗自出。嚌嚌惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾



嘔。
太陽病。頭痛發熱。汗出惡風。
之後。其氣上衝者。可與桂枝湯。
得與之。
太陽病三日。已發汗。若吐。若下。若温
針。仍不解者。此為壞病。桂枝不中與之也。觀其
脈證。知犯何逆。隨證治之。
桂枝本為解肌。若
其人脈浮緊。發熱。汗不出者。不可與之也。常須
識此勿令誤也。
若酒客不喜甘故也。
之則嘔。以酒客不喜甘。
太陽病。初服桂
枝湯。反煩不解者。先刺風池風府。却與桂枝湯

汗不得服桂枝湯。家不得重發汗。若用桂枝。是重發其汗。汗多者用桂枝甘草湯。此又用桂枝
鬪汗也。一藥二用。
矣。
其義相
通否乎。曰。有甘草
言。桂辛甘大熱。能
宣導百藥。通血
脈。止煩出汗。是調
血而汗自出也。傷寒
云。太陽中風。陰弱者
汗自出。衛實營虛。
故發熱汗出。又云。
太陽病。發熱汗出。
者。為營弱衛強。
補陽。資其性之熱。
君夫桃核承氣湯。
治太陽病不解。熱結
膀胱。有畜血。
草湯。治脈結代。心
動悸。方中並用桂
枝。籍其辛熱之力。
以破血。以通脈
也。甘草附子湯。五
苓散。用桂枝。亦
籍其辛熱之力。
而逐水燥湿也。
玉進之曰。或問。
甘草言。桂止煩出汗。張仲景治傷寒有當發汗。凡數處。皆用桂枝湯。又云。無

則愈。太陽 上 太陽病。外證未解。脈浮弱者。當以汗解。

太陽病。外證未解。不可下也。下之爲逆。欲解外。

太陽病。先發汗不解。而復下之。脈浮者不愈。浮爲在外。而反下之。故令不愈。今脈浮。故在外。當須解外則愈。

病常自汗出者。此爲榮氣和。榮氣和者。外不諧。以衛氣不共榮氣諧和故爾。以榮行脈中。衛行脈外。復發其汗。榮衛和則愈。

病人藏無他病。時發熱。自汗出而不愈者。此衛氣不和也。先其時發汗則愈。

傷寒不

陰虛陽必湊之故皆用桂枝發汗乃調其營氣則衛氣自和尺邪無所容逐自汗而解非桂枝能發腠理發出宜汗也汗多者用桂枝以之調和營衛則邪從汗出而汗自止非桂枝能閉汗孔也昧者不知出汗閉汗之義遇傷寒無汗者亦用桂枝誤之甚矣桂枝湯下發汗字當認作出字汗自然發出非若

麻黃能開腠理發出其汗也其治虛汗亦當逆察其意可也

張仲景曰。官桂尊引陽氣只是辛甘助氣上行陽道血爲營氣爲衛營衛不相和諧官桂尊引陽氣宣通血脈使氣血同行爲和諧也

芍藥味苦辛性微寒。和液。本草經曰。止痛



大便六七日。頭痛有熱者。未可與承氣湯。其小便清者。知不在裏。仍在表也。當須發汗。

發汗已解。半日許復煩。脈浮數者。可更發汗。

傷寒醫下之。續得下利。清穀不止。身疼痛者。急當救裏。後身疼痛。清便自調者。急當救表。救裏宜四逆湯。救表宜桂枝湯。

太陽病。發熱汗出者。此爲榮弱衛強。故使汗出。欲救邪風。太陽中傷寒大下後。復發汗。心下痞。惡寒者。表未解也。不可攻痞。當先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝

湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯太陽下陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脈實者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯陽明太陰病脈浮者可發汗太陰下利腹脹滿身體疼痛者先温其裏乃攻其表温裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯厥陰吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之霍亂下利後身疼痛清便自調者



急當救表宜桂枝湯發汗可發汗婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒熱名妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此證設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之婦人妊娠產後風續之數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽旦證續在耳可與陽旦湯即桂枝湯婦人產後小建中湯二倍芍藥以和其液合膠飴甘和之味緩中止痛及使桂支芍佐而補陽氣

桂枝湯原方加膠飴一升芍藥六兩

右六味以水七升煮取三升去滓內飴更上



裏則為腹痛下利呃逆之症表後有四肢沈重疼痛之證若太陽病発汗不解陽氣已於外而頭眩身瞤水飲擾於內而心下悸虛陽浮散仍発熱者並以真武湯主之蓋附子壯陽扶陰溫散水氣白朮燥濕姜之禦寒得芍藥之和液而緩中相依為功太柴胡湯之方皆領袁上中之邪自下焦而泄之其苗十姜棗六而諧氣血一舉廓然是方中所以用芍藥也少陰病其人素有水氣外為寒邪攻

微火消解。温服一升。日三服。嘔家不可用建中湯。以甜故也。

傷寒。陽脈濇。陰脈弦。法當腹中急痛。先與小建中湯。不差者。與小茈胡湯主之。傷寒二三日。心中悸而煩。太陽中虚勞裏急。悸衄。腹中痛。夢失精。四肢酸疼。手足煩熱。咽乾口燥。虚勞男子黄。小便自利。當與虚勞小建中湯。黄疸婦人腹中痛。婦人雜病衆可知裏虚為痛

桂枝加桂湯 三倍用桂枝補其裏陽以防陰邪上逆

桂枝湯原方。加桂枝。二兩

燒針令其汗。針處被寒。核起而赤者。必發奔豚。氣從少腹上衝心者。灸其核上各一壯。太陽中

桂枝附子湯 四得病之初而邪相合以涇性濡滯故數日之間猶淹留節而其衛虚其寒亦甚治宜温灸

桂枝四兩。去皮。附子三枚。炮。去皮。破。生薑三兩。切。大棗十二枚。擘。甘草二兩。炙。

右五味。以水六升。煮取二升。去滓。分温三服。

傷寒八九日。風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。不嘔不渴。脈浮虚而濇。太陽風非中風之風。蓋總括風寒之詞下



證也有熱邪裏則痞氣壅塞結以致上下不交乃用柴胡黄芩以表邪破痞之根實湯實之大黄。然藉為某和液之力而致疎滌其新逆氣大寒和其胃氣也仲景用為某之微旨當就是三方以詳味之

明理論曰桂枝湯用為某其味苦酸微寒以酸收之夫後世註傷寒論者因循其說謂收斂陰液之品合之桂枝於發汗中寓斂汗之意此言不可信何則仲景於汗漏不止之證不陪為某至其汗後身疼痛脈沈遲或脈弦濇腹中急痛或下後腹滿時痛者加為某是蓋誤發其汗而後外邪表證裏無熱邪所身疼

桂枝加附子湯　五　汗多亡陽筋脈津燥其未解眩勢亦劇故用此方復陽斂液

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸太陽上

桂枝去芍藥湯　六

桂枝湯原方去芍藥

太陽病下之後脈促胸滿太陽上　因誤下胸虛邪氣乘入以為胸滿

桂枝去芍藥加附子湯　七

桂枝湯原方去芍藥加附子一枚炮去皮破八片

桂枝加附子湯　五　汗多亡陽筋脈津燥其未解眩勢亦劇故用此方復陽斂液

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸太陽上

桂枝去芍藥湯　六

桂枝湯原方去芍藥

太陽病下之後脈促胸滿太陽上　因誤下胸虛邪氣乘入以為胸滿

桂枝去芍藥加附子湯　七

桂枝湯原方去芍藥加附子一枚炮去皮破八片

桂枝加芍藥湯　八　此方芍藥亦取通壅

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也　益誤下之後胃氣生裏表邪陷實以致是證

桂枝加大黃湯　九　主在温利

前方加大黃二兩　大黃取用猶大黃附子湯之大黃

桂枝去芍藥加皂莢湯　十　取之扶胸中陽氣非和調營衛

前證大實痛者太陰　病勢更劇大實痛者加大黃以疏之

前證若微惡寒者太陽上　虛稍甚者加附子救之

桂枝加芍藥湯　八　此方芍藥亦取通壅

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰

桂枝湯原方加芍藥三兩

前證若微惡寒者太陽上　虛稍甚者加附子救之

桂枝加大黃湯　九　主在温利

前方加大黃二兩　大黃取用猶大黃附子湯之大黃

前證大實痛者太陰　病勢更劇大實痛者加大黃以疏之

桂枝去芍藥加皂莢湯　十　取之扶胸中陽氣非和調營衛

痛及其脈沈遲氣衛陽不甚耗而陰液已滿脈行不快而所使然故於桂支湯內加芍藥一兩配薑棗辛甘行陽生津之品以和陰液而滋養營分註者謂是又為飲液而加芍藥則宜減生姜棗其酸收令增此二藥者何耶傷寒陽脈濇陰脈弦是浮沈並之和滑之象可知裏虛為痛桂枝湯倍芍藥以和其液合膠飴甘和之味緩中止痛及使桂枝為佐而補陽氣是豈救而行津斂補中之義耶太陽病下後邪陷太陰以表邪未解仍用桂支湯倍芍藥以緩中氣祀滿止痛觀大實痛改用大黃則可見其為和液開之非因傷脾以陰氣矣太陽病下後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之註者謂去

桂枝　生薑各三兩　甘草二兩

大棗十枚　皂莢一枚去皮辛温能開諸竅而驅風痰炙焦

右五味以水七升微微火煮取三升分温三服

肺痿吐涎沫肺痿引千金

烏頭桂枝湯十一

烏頭

右一味以蜜二斤煎減半去滓以桂枝湯五合解之令得一升後初服二合不知即服三合又不知復加至五合其知者如醉狀得吐者爲中病

寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸藥不能治抵當烏頭桂枝湯主之寒疝

中絞痛賊風入攻五臟拘急不得轉側發作有時使人陰縮手足厥逆同上引外臺烏頭湯卽烏頭桂枝湯

桂枝甘草湯十二桂枝透表微裏以行陽氣補其不足合甘草以和中氣補

桂枝四兩去皮　甘草二兩炙

右二味以水三升煮取一升去滓頓服



學訓堂藏版

其醫收以避滿蓋則太陰腹滿之症信用之者何是惟用桂枝之溫專使胸中陷入之耶遠表以宣陽氣非走陰之品所宜故去芍茱也傷寒脈浮以火劫之亡陽驚狂者桂枝去芍茱加蜀漆龍骨牡蠣湯主之註者謂芍茱性滯恐妨桂枝迅走之勢然則用龍蛎鎮重之品者何甚方中用芍茱意旨於是乎可知焉後世醫家不明其義因循相倣遂謂產後及血虛寒人不可用芍茱噫是何等胡說仲景治虛勞裏急用建中湯產後腹痛用枳實芍茱湯則其課固以桂枝合蜀漆挩陽以救火邪之逆用龍蛎治驚狂是又非走陰之所宜故去芍茱也傷

發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按。太陽中是過汗胸虛盜其邪既解虛示為輕故治法宜下方而師試令款修其病加重者也

桂枝加茯苓白朮湯 十三芩之滲泄水之溫燥能去水濕而止胃陽

桂枝湯原方。加白朮。茯苓。各三兩。小便利則愈。

服桂枝湯。或下之。仍頭項强痛。翕翕發熱。無汗。心下滿微痛。小便不利。太陽是表有邪裏有水為水飲未行津液內滲之候

桂枝加厚朴杏子湯 十四表邪壅遏氣逆生喘于桂枝湯以解表加杏仁利肺厚朴降氣以治喘

桂枝湯原方。加厚朴。二兩。炙。杏人。五十枚。去皮尖。

喘家。作桂枝湯。加厚朴。杏子。佳。太陽上太陽病。下之。微喘者。表未解故也。太陽中是表虛而飲邪相得者也俱係太陽病有前第二者矣

桂枝加芍藥生薑人參湯 新加湯十五加芍藥和陰液加生薑人參以專救陽

桂枝湯原方。加芍藥。一兩。人蔘。三兩。生薑。一兩。

右六味。以水一斗二升。煮取三升。去滓。溫服一升。

發汗後。身疼痛。脈沈遲。太陽中是汗後虛燥其邪已除脫勢稍緩故治漸救

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯 十六

桂枝湯原方。去芍藥。加蜀漆。牡蠣。五兩。蜀漆。三兩。熬。

新加字專為人參而言蓋芍亦方固有而人參本方無故彼但言加此言新加以為其別也

桂之為品。色辛不燥。虽溫不僭。是以能使火邪之內犯不待辨矣

盧子由曰芍藥時值閉藏便行甲拆一派生陽絕不以當熏鍋為禁忌是所謂引導最先透機捋者也世称气味酸斂性堪降火殊失芍藥之功用矣

者誘之外越始所謂從治也蜀漆之治火邪正如茵蔯之於黃黃者之於濕徐大椿所謂藥有專長者乎

芤與微反動與緊反益芤動微緊自是二脈則上文脈大為勞極虛亦為芤之意故下一諸字也



味辛有毒 洗去腥 龍骨 四兩 是竜骨牡蠣取其質之重墜也

右七味以水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂臥起不安 太陽中 火邪者驚悸

桂枝加龍骨牡蠣湯 十七 桂扶陽芍補陰以收氣以姜宣浮熱佐以甘棗益胃氣也加以二竜牡收斂其浮越也

桂枝甘草龍骨牡蠣湯 十八

火逆者謂凡火劫取汗致逆者也此火逆因火鍼也桂山先生云燒鍼即火逆非火逆而又燒鍼

煩躁即救逆湯驚狂卧起不安之漸也故用四物以扶陽安神為義不用薑棗之溫補不用蜀漆之辛快正是病輕則藥輕也



桂枝一兩 去皮 甘草二兩 炙 龍骨二兩 牡蠣二兩 熬

右四味以水五升煮取二升半去滓溫服八合日三服

火逆下之因燒鍼煩躁 太陽中

桂枝三兩 芍藥三兩 括蔞桂枝湯 十九

括蔞根二兩 桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩 生薑三兩 大棗十二枚

右六味以水九升煮取三升分溫三服取微

汗。汗不出。食頃啜熱粥發。

太陽病。其證備。身體强几几然。脈反沈遲。此爲痙。痙

黃耆桂枝五物湯二十

黃耆三兩　芍藥三兩　桂枝三兩

生薑六兩　大棗十二枚

右五味。以水六升。煮取二升。温服七合。日三服。一方。有人蔘。

血痺。陰陽俱微。寸口關上微。尺中小緊。外證身體不仁。如風痺狀。血痺

桂枝加黃耆湯 此一

桂枝湯原方。加黃耆二兩

黃汗之爲病。兩脛自冷。假令發熱。此屬歷節。食已汗出。又身常暮盜汗出者。此勞氣也。若汗出已。反發熱者。久久其身必甲錯。發熱不止者。必生惡瘡。若身重。汗出已輒輕者。久久必身瞤。瞤卽胸中痛。又從腰以上必汗出。下無汗。腰髖弛痛。如有物在皮中狀。劇者不能食。身疼重。煩躁。

小便不利。此爲黃汗。水氣諸病黃家。但利其小便。假令脈浮。當以汗解之。黃疸

黃耆建中湯 尤二

於小建中湯內。加黃耆一兩半。餘依上法。

氣短胸滿者。加生薑。腹滿者。去棗。加茯苓一兩半。及療肺虛損不足。補氣加半夏三兩。

虛勞裏急。諸不足。虛勞

黃耆芍藥桂枝苦酒湯 尤三

黃耆 五兩 芍藥 三兩 桂枝 三兩

右三味。以苦酒一升。水七升。相和。煮取三升。温服一升。當心煩。服至六七日乃解。若心煩不止者。以苦酒阻故也。

問曰。黃汗之爲病。身體腫。一作重 發熱汗出而渴。狀如風水。汗沾衣。色正黃如蘗汁。脈自沈。何從得之。師曰。以汗出入水中浴。水從汗孔入得之。

水氣

內補當歸建中湯 尤四

桂枝生薑枳實湯 廿五

桂枝　生薑各三兩　枳實五兩

右三味、以水六升、煮取三升、分温三服。

心中痞、諸逆心懸痛、心痛

當歸四逆湯 廿六

當歸三兩　桂枝三兩、去皮。　芍藥三兩

細辛三兩　甘草二兩、炙。　通草二兩

大棗二十五枚、擘。

一法、十二枚。

右七味、以水八升、煮取三升、去滓、温服一升。





小建中湯原方、加當歸四兩

右六味、以水一斗、煮取三升、分温三服。一日令盡、若大虛加飴糖六兩、湯成內之、於火上煖、令飴消、若去血過多、崩傷內衄不止、加地黄六兩、阿膠二兩、合八味、湯成內阿膠、若無當歸、以芎藭代之、若無生薑以乾薑代之。

婦人産後、虛羸不足、腹中刺痛、不止、吸吸少氣、或苦少腹中急、摩痛引腰背、不能食飲、産後一月日、得服四五劑爲善、令人强壯。婦人産後、引千金。

日三服。

手足厥寒。脈細欲絕。厥陰當歸四逆加吳茱萸生薑湯 方七

當歸四逆湯原方。加吳茱萸二升。生薑半斤。切。

當歸四逆湯方

當歸 三兩 桂枝 一兩十六銖。去皮。 芍藥 三兩 甘草 二兩。炙 細辛 三兩 通草 二兩

右九味。以水六升。清酒六升。和煮取五升。去滓。温分五服。

前證。若其人內有久寒。厥陰桂枝麻黃各半湯 方八

桂枝 一兩十六銖。去皮。 芍藥 一兩六銖。 生薑 一兩六銖。切。 甘草 一兩二銖。炙 大棗 四枚。擘。 杏人 二十四枚。皮尖。及兩人者。 麻黃 各一兩。去節。

右七味。以水五升。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取一升八合。去滓。温服六合。

太陽病。得之八九日。如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。其人不嘔。清便自可。一日二三度發。脈微緩者。爲欲愈也。脈微而惡寒者。此陰陽俱虛。不可更發汗。更下。更吐也。面色反有熱色者。未欲解也。以其不能得小汗出。身必痒。太陽上

桂枝二麻黃一湯　共九

桂枝一兩十七銖。去皮。　芍藥一兩　麻黃十六銖。去節。
生薑一兩六銖。切。　杏人十六箇。去皮尖。　甘草一兩二銖。炙。
大棗五枚。擘。

右七味。以水五升。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。日再服。

服桂枝湯。大汗出。脈洪大者。與桂枝湯如前法。

若形似瘧。一日再發者。汗出必解。太陽上

桂枝二越婢一湯　三十

桂枝去皮　芍藥　麻黃
甘草各十八銖。炙。　大棗四枚。擘。　生薑一兩二銖。切。
石膏二十四銖。碎。綿裹。

右七味。以水五升。煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。

太陽病。發熱惡寒。熱多寒少。脈微弱者。此無陽也。不可發汗。太陽上

桂枝芍藥知母湯　三十一

桂枝四兩　芍藥三兩　甘草二兩

麻黃二兩　生薑五兩　白朮五兩
知母四兩　防風四兩　附子二枚炮
右九味以水七升煮取二升溫服七合日三服

諸肢節疼痛身體麻羸脚腫如脫頭眩短氣溫溫欲吐歷節

芍藥甘草湯三十二方後之藥皆相合用神妙

芍藥　甘草各四兩炙

右二味以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足温者與作芍藥甘草湯與之其脚即伸

芍藥甘草附子湯三十三

芍藥　甘草各三兩炙　附子一枚炮去皮破八片

右三味以水五升煮取一升五合去滓分温

三服。

發汗病不解。反惡寒者。虛故也。太陽中 気血俱虛而其病頓重

桂枝茯苓丸 三十四

桂枝　茯苓　桃人 去皮尖熬　芍藥 各等分　牡丹 去心

右五味。末之。煉蜜和丸。如兎屎大。每日食前服一丸。不知加至三丸。

婦人宿有癥病。經斷未及三月。而得漏下不止。胎動在臍上者。爲癥痼。害妊娠。六月動者。前三月。經水利時胎也。下血者。後斷三月而衃也。所以血不止者。其癥不去故也。當下其癥。婦人妊娠

土瓜根散 三十五

土瓜根　芍藥　桂枝　蠐螬 各三兩

右四味。杵爲散。酒服方寸匕。日三服。

帶下。經水不利。少腹滿痛。經一月再見。婦人雜病

麻黃味微苦性溫發陽　某性論麻根節止汗麻黃其質輕而其性溫主治傷寒衛実無汗肺壅喘咳停飲風水以其發陽仍通氣疏水閉勝理与裹某相配隨症而為用矣

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之是風寒束表衛気閉実而不得宣通乃使麻黃得桂枝之辛温走表而発汗得杏仁之臧潤疎気而利肺一拳両解因其発陽之性能助諸某以為功也病入素有寒飲及邪假表分仍壅肺気則更當与心下阻気之升降雖汗解之表邪未去裏症又為飲所持而渴利喘滿之諸候錯然為患治用辛熱升散之品以麻黃為君裏則散寒而疏水気表則発汗而以管領裏某小青龍湯是也発汗若下之後傷津液是雖身無大熱餘邪在肺肺行気於玄府輸精於皮毛今熱壅不解則在表為汗出在裏為喘逆以麻黃疏気壅以石膏浮上熱杏仁之潤甘草之甘相合使肺藏清粛則汗自止喘又止麻杏甘石湯是也麻黃之性合之桂枝則発汗合之石膏則止汗能隨其所配而為用未詳此義也少陰病始得之反



桂枝則発汗合之石膏則止汗能隨其所配而為用未詳此義也少陰病始得之反発熱脈沈者宜己属陰寒邪犯在表用附子細辛熱散寒之品合麻黃引之外達併去表邪其発陽之迅非桂枝所及仍以配之迅越婢湯用麻黃治風水升越婢気之沈滯也麻黃連軺赤小

## 麻黃湯　一

麻黃湯類二　凡二十六方

麻黃三兩去節　桂枝二兩去皮　甘草一兩炙
杏人七十箇去皮尖

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓温服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘太陽與陽明合病喘而胸滿者不可

豆湯、麻黄醇酒湯、治黄、疏通瘀熱濕気之当著也、血虚者禁用、張子曰、欬逆倚息不得卧、気従小腹上衝胸咽、手足痙者、乎桂苓五味甘草湯、後其人形腫者加杏仁主之、其症当内麻黄、以其人遂痛故不内之、若逆而用之者必厥所以然者、以其人血虚麻黄発其陽故也、



下、太陽病十日以去、脈浮細而嗜卧者、外已解也、設胷滿痛者、與小柴胡湯、脈但浮者、與麻黄湯、太陽病、脈浮緊、無汗發熱、身疼痛、八九日不解、表證仍在、此當發其汗、服藥已微除、其人發煩目瞑、劇者必衄、衄乃解、所以然者、陽氣重故也、脈浮者、病在表、可發汗、脈浮而數者、可發汗、傷寒脈浮緊、不發汗、因致衄、太陽中陽明中風、脈弦浮大而短氣、腹都滿、胷下及心痛、久按之氣不通、鼻乾不得汗、嗜卧、一身及面目悉黄、小便難、有潮熱、時時噦、耳前後腫、刺之小差、外不解、病過十日、脈續浮者、與小柴胡湯、脈但浮、無餘證者、與麻黄湯、若不尿、腹滿加噦者不治、陽明病、脈浮、無汗而喘者、發汗則愈、陽明

還魂湯二

麻黄三兩、去節、杏人去皮尖七十箇、甘草一兩、炙、

右三味、以水八升、煮取三升、去滓、分令咽之、通治諸感忤、

救卒死。客忤死。雜療

甘草麻黃湯 三

甘草二兩　麻黃四兩

右二味。以水五升。先煮麻黃。去上沫。內甘草。煮取三升。溫服一升。重覆汗出。不汗再服。愼風寒。

裹水 水氣

麻黃醇酒湯 四

麻黃三兩



右一味。以美清酒五升。煮取二升半。頓服盡。冬月用酒。春月用水煮之。

黃疸 黃疸。千金。引

麻黃細辛附子湯 五

麻黃二兩 去節　細辛二兩　附子一枚 炮。去皮。破八片

右三味。以水一斗。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。少陰病。始得之。反發熱。脈沈。少陰

麻黃附子甘草湯 六

麻黃二兩 去節 甘草二兩 炙 附子一枚 炮 去皮 破八片

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也少陰水之爲病其脈沈小屬少陰浮者爲風無水虛脹者爲氣水發其汗即已脈沈者宜麻黃附子湯 方本浮者宜杏子湯 未見水氣

桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯 七

桂枝 三兩 生薑 三兩 甘草 二兩

大棗 十二枚 麻黃 細辛 各二兩

附子 一枚 炮

右七味以水七升煮麻黃去上沫內諸藥煮取二升分溫三服當汗出如蟲行皮中即愈氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作水氣

麻黃加朮湯 八

麻黃湯原方加白朮四兩

濕家身煩疼可與麻黃加朮湯發其汗爲宜愼

不可以火攻之溫

小青龍湯 九

麻黃去節　芍藥　細辛

乾薑　甘草炙　桂枝各三兩去皮

五味子半升　半夏半升洗

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升若渴去半

夏加栝樓根三兩若微利去麻黃加蕘花如

一雞子熬令赤色若噎者去麻黃加附子一

枚炮若小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓

四兩若喘去麻黃加杏人半升去皮尖

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴

或利或噎或小便不利少腹滿或喘傷寒心

下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此

寒去欲解也太陽中病溢飲者當發其汗欬逆

倚息不得臥痰飲婦人吐涎沫醫反下之心下

即痞當先治其吐涎沫婦人雜病

射干麻黃湯 十

射干十三枚一法三兩麻黃四兩生薑四兩
細辛三兩紫菀三兩款冬花三兩
五味子半升大棗七枚半夏大者洗八枚一法半升

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫內諸藥煮取三升分溫三服
欬而上氣喉中水雞聲欬嗽
麻黃杏人薏苡甘草湯十一
麻黃去節半兩湯泡甘草一兩炙薏苡仁半兩

杏人十箇去皮尖炒
右㕮麻豆大每服四錢匕水盞半煮八分去滓溫服有微汗避風
病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也濕
大青龍湯十二
麻黃六兩去節桂枝二兩去皮甘草二兩炙
杏人四十枚去皮尖生薑三兩切石膏如雞子大碎大棗十枚擘

右七味。以水九升。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。取微似汗。汗出多者。溫粉撲之。一服汗者。停後服。若復服。汗多亡陽。遂虛。惡風煩躁。不得眠也。

太陽中風。脈浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不汗出而煩躁者。大青龍湯主之。若脈微弱。汗出惡風者。不可服之。服之則厥逆。筋惕肉瞤。此爲逆也。

傷寒脈浮緩。身不疼。但重乍有輕時。無少陰證者。

太陽中病。溢飲者。當發其汗。痰飲



小青龍加石膏湯十三

小青龍湯原方。加石膏。二兩

強人服一升。羸者減之。日三服。小兒服四合。

肺脹欬而上氣。煩躁而喘。脈浮者。心下有水。欬嗽

厚朴麻黃湯十四

厚朴五兩　麻黃四兩　石膏如雞子大

杏人半升　半夏半升　乾薑二兩

細辛二兩　小麥一升　五味子半升

右九味。以水一斗二升。先煮小麥熟。去滓。內

諸藥煮取三升溫服一升日三服

欬而脈浮欬嗽

麻黃杏人甘草石膏湯十五

麻黃四兩去節 杏人五十箇去皮尖 甘草二兩炙

石膏半斤碎綿裹

右四味以水七升煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者

太陽中 下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱



者太陽是表邪既解而飲拄迫肺者也可更發汗宜麻黃湯

文蛤湯十六

文蛤五兩 麻黃 甘草

生薑各三兩 石膏五兩 杏人五十箇

大棗十二枚

右七味以水六升煮取二升溫服一升汗出

即愈

吐後渴欲得水而貪飲兼主微風脈緊頭痛嘔吐

越婢湯十七

麻黄六兩　石膏半斤　生薑三兩
大棗十五枚　甘草二兩
右五味、以水六升、先煮麻黄、去上沫、内諸藥、
煮取三升、分温三服、惡風者、加附子一枚、炮、
風水、加朮四兩、古今録驗
風水惡風、一身悉腫、脈浮不渴、續自汗出、無大
熱、水氣
越婢加朮湯十八
越婢湯原方、加白朮、四兩

肉極、熱則身體津脫、腠理開、汗大泄、厲風氣、下
焦脚弱、中風、引千金、裏水者、一身面目黄腫、其脈沈、
小便不利、故令病水、假如小便自利、此亡津液、
故令渴也、裏水、水氣
越婢加半夏湯十九
越婢湯原方、加半夏、半升
欬而上氣、此爲肺脹、其人喘、目如脫狀、脈浮大、
欬嗽
續命湯二十

麻黃　桂枝　當歸
人蔘　石膏　乾薑
甘草各三兩　芍藥　杏人四十枚

右九味、以水一斗、煮取四升、温服一升、當小汗、薄覆脊、憑几坐、汗出則愈、不汗更服、無所禁、勿當風、并治但伏不得臥、欬逆上氣、面目浮腫、

中風痱、身體不能自收、口不能言、胃昧不知痛處、或拘急不得轉側、（姚云、與大續命同、兼治婦人産後去血者、及老人小兒、○中風引古今錄驗）

半夏麻黃丸 丸一

半夏　麻黃等分

右二味、末之、煉蜜和丸小豆大、飲服三丸、日二服、

心下悸（驚悸）

麻黃升麻湯 丸二

麻黃二兩半、去節　升麻一兩一分　當歸一兩一分
知母十八銖　黃芩十八銖　葳蕤十八銖

芍藥 六銖 天門冬 六銖 去心 桂枝 六銖 去皮
茯苓 六銖 甘草 六銖 炙 石膏 六銖 綿裹 碎
白朮 六銖 乾薑 六銖

右十四味、以水一斗、先煮麻黃一兩沸、去上沫、內諸藥、煮取三升、去滓、分溫三服、相去如炊三斗米頃、令盡、汗出愈。

傷寒六七日、大下後、寸脈沈而遲、手足厥逆、下部脈不至、喉咽不利、唾膿血、泄利不止者、爲難治、厥陰



麻黃 五分 獨活 四分 細辛 二分
黃芪 二分 黃芩 三分

右五味、以水六升、煮取二升、分溫三服、一服小汗、二服大汗、心熱加大黃二分、腹滿加枳實一枚、氣逆加人蔘三分、悸加牡蠣三分、渴加栝蔞根三分、先有寒加附子一枚、

中風手足拘急、百節疼痛、煩熱心亂、惡寒、經日不欲飲食、中風、引千金、

牡蠣湯 尤四 性平味鹹泄水質重鎮驚

牡蠣四兩 熬。　麻黃去節。四兩。　甘草二兩

蜀漆三兩

右四味。以水八升。先煮蜀漆。麻黃。去上沫。得六升。內諸藥。煮取二升。溫服一升。若吐則勿復服。

牡瘧。瘧。引外臺。

烏頭湯 尤五

麻黃　芍藥　黃芪各三兩

甘草炙　川烏五枚。咬咀。以蜜二升。煎取一升。卽出烏頭

右五味。咬咀四味。以水三升。煮取一升。去滓。內蜜煎中復煎之。服七合。不知盡服之。

脚氣疼痛。不可屈伸。歷節

麻黃連軺赤小豆湯 尤六

麻黃二兩。去節。　連軺二兩　杏人四十箇。去皮尖。

赤小豆一升　大棗十二枚。擘。　生梓白皮切一升。

生薑二兩。切。　甘草二兩。炙。

右八味。以潦水一斗。先煮麻黃。再沸。去上沫。

內諸藥煮取三升去滓分温三服半日服盡

傷寒瘧熱在裏身必發黃 陽明



葛根湯類三品五方

葛根湯一

葛根四兩　麻黃三兩去節　桂枝二兩去皮
生薑三兩切　甘草二兩炙　芍藥二兩
大棗十二枚擘

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去白沫內諸藥煮取三升去滓温服一升

太陽病項背强几几無汗惡風　太陽與陽明合病者必自下利 太陽中

太陽病無汗而小便反

少氣上衝胸口噤不得語欲作剛痙痙

桂枝加葛根湯二

桂枝湯原方加葛根四兩

右六味以水九升先煮葛根減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升

太陽病項背强几几反汗出惡風太陽上

葛根加半夏湯三

葛根湯原方加半夏半升洗

太陽與陽明合病不下利但嘔太陽中

葛根黃芩黃連湯四

葛根半斤　甘草二兩炙　黃芩三兩

黃連三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二升去滓分溫再服

太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出太陽中

竹葉湯五

竹葉一把　葛根三兩　防風

桔梗　人蔘
甘草各一兩　附子一枚炮　大棗十五枚
生薑五兩

右十味以水一斗煮取二升半分温三服温覆令汗出頸項强用大附子一枚破之如豆大煎藥揚去沫嘔者加半夏半升洗産後中風發熱面正赤喘而頭痛婦人産後



## 柴胡湯類四凡九方

### 小柴胡湯一

柴胡半斤　黄芩三兩　人蔘三兩
半夏半升洗　甘草炙　生薑各三兩切
大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服若胷中煩而不嘔者去半夏人蔘加栝樓實一枚若渴去半夏人蔘加栝樓根四兩半栝樓根四兩若腹中

痛者去黃芩加芍藥三兩若脅下痞鞕去大棗加牡蠣四兩若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩若不渴外有微熱者去人蔘加桂枝三兩溫覆微汗愈若欬者去人蔘大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

傷寒五六日中風往來寒熱胷脅苦滿嘿嘿不欲飲食心煩喜嘔或胷中煩而不嘔或渴或腹中痛或脅下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬

血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脅下正邪分爭往來寒熱休作有時嘿嘿不欲飲食藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也

服柴胡湯已渴者屬陽明以法治之

得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足温醫二三下之不能食而脅下滿痛面目及身黃頸項强小便黃者與柴胡湯後必下重本渴飲水而嘔者柴胡湯不中與也食穀者噦

傷寒四五日身熱惡風頸項强脅下滿手足温而渴

傷寒陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛先

與小建中湯。不差者。傷寒中風。有芫胡證。但見一證便是。不必悉具。凡芫胡湯病證而下之。若芫胡證不罷者。復與芫胡湯。必蒸蒸而振。却復發熱汗出而解。傷寒十三日不解。胸脅滿而嘔。日晡所發潮熱。已而微利。此本芫胡證。下之以不得利。今反利者。知醫以丸藥下之。此非其治也。潮熱者實也。先宜服小芫胡湯以解外。太陽病十日以去。脈浮細而嗜卧者。外已解也。設胸滿脅痛。太陽中 婦人中風七八日。續得寒熱。發作有時。傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。大便鞕。脈細者。此爲陽微結。必有表。復有裏也。脈沈亦在裏也。汗出爲陽微。假令純陰結。不得復有外證。悉入在裏。此爲半在裏。半在外也。脈雖沈緊。不得爲少陰病。所以然者。陰不得有汗。今頭汗出。故知非少陰也。可與小芫胡湯。設不了了者。得屎而解。傷寒五六日。嘔而發熱者。芫胡

湯證具而以他藥下之。芫胡證仍在者。復與芫胡湯。此雖已下之。不爲逆。必蒸蒸而振。却發熱汗出而解。太陽下陽明病。發潮熱。大便溏。小便自可。胷脅滿不去。陽明病。脅下鞕滿。不大便而嘔。舌上白胎者。可與小芫胡湯。上焦得通。津液得下。胃氣因和。身濈然汗出而解。陽明中風脈弦浮大。而短氣。腹都滿。脅下及心痛。久按之氣不通。鼻乾不得汗。嗜卧。一身及面目悉黃。小便難。有潮熱。時時噦。耳前後腫。刺之小差。外不解。病過十日。脈續浮。陽明本太陽病不解。轉入少陽者。脅下鞕滿。乾嘔不能食。往來寒熱。尚未吐下。脈沈緊。若已吐下發汗温鍼。讝語。芫胡湯證罷。此爲壞病。知犯何逆。以法治之。少陽嘔而發熱。厥陰傷寒。差已後。更發熱。小芫胡湯主之。脈浮者。以汗解之。脈沈實者。以下解之。差後勞復諸黃。腹痛而嘔。黃疸產婦鬱冒。其脈微弱。嘔不能食。大便反堅。但頭汗出。所以然者。血虛而厥。厥而必冒。冒家欲解。必大汗出。以血虛下厥。孤

陽上出。故頭汗出。所以產婦喜汗出者。亡陰血虛。陽氣獨盛。故當汗出。陰陽乃復。大便堅。嘔不能食。婦人產後婦人在草蓐。自發露得風。四肢苦煩熱。頭痛。同上引千金。

大芫胡湯 二

芫胡 半斤　黃芩 三兩　芍藥 三兩

半夏 半升。洗。　生薑 五兩。切。　枳實 四枚。炙。

大棗 十二枚。擘。

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓再煎。



溫服一升。日三服。一方加大黃二兩。若不加。恐不爲大芫胡湯。

太陽病。過經十餘日。反二三下之。後四五日。芫胡證仍在者。先與小芫胡湯。嘔不止。心下急。鬱鬱微煩者。爲未解也。與大芫胡湯。下之則愈。太陽中傷寒十餘日。熱結在裏。復往來寒熱。傷寒發熱。汗出不解。心中痞鞕。嘔吐而下利。太陽下傷寒後脈沈。沈者內實也。下之解。可下按之心下滿痛者。此爲實也。當下之。腹滿

芫胡加芒消湯 三

小芫胡湯原方加芒消二兩

傷寒十三日不解胷脅滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本芫胡證下之以不得利今反利者知醫以攻藥下之此非其治也潮熱者實也先宜服小芫胡湯以解外後以芫胡加芒消湯主之太陽中

芫胡加龍骨牡蠣湯 四

芫胡四兩　龍骨　黃芩



生薑切　鉛丹　人蔘

桂枝去皮　茯苓各一兩半　半夏二合半洗

大黃二兩　牡蠣一兩半熬　大棗六枚擘

右十二味以水八升煮取四升內大黃切如碁子更煮一兩沸去滓溫服一升

傷寒八九日下之胷滿煩驚小便不利讝語一身盡重不可轉側者太陽中

芫胡去半夏加括蔞湯 五

小芫胡湯原方去半夏加括蔞根四兩

瘧病發渴者亦治勞瘧瘧

## 柴胡桂枝湯六

桂枝去皮　黃芩　人蔘　各一兩半
甘草一兩炙　半夏二合半洗　芍藥一兩半
大棗六枚擘　生薑一兩半切　柴胡四兩

右九味以水七升煮取三升去滓溫服一升
傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下
支結外證未去太陽下發汗多亡陽讝語者不可
下與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自愈

發汗後心腹卒中痛寒疝引外臺

## 柴胡桂枝乾薑湯七

柴胡半斤　桂枝三兩去皮　乾薑二兩
括樓根四兩　黃芩三兩　牡蠣三兩熬
甘草二兩炙

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎
取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗
出便愈

傷寒五六日已發汗而復下之胸脅滿微結小

便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心煩者。此爲未解也。太陽下瘧寒多。微有熱。或但寒不熱。服一劑如神。○瘧附方。

四逆散 八

甘草炙 枳實破。水漬。炙乾。 芫胡

芍藥

右四味。各十分。擣篩。白飲和服方寸匕。日三服。咳者。加五味子乾薑各五分。并主下利。悸者。加桂枝五分。小便不利者。加茯苓五分。腹中痛者。加附子一枚。炮。令拆。泄利下重者。先以水五升。煮薤白三升。煮取三升。去滓。以散三方寸匕。內湯中。煮取一升半。分温再服。

少陰病。四逆。其人或咳。或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重。少陰

四時加減芫胡飲子 九

冬三月加 芫胡 八分 白术 八分 陳皮 五分

春三月加 枳實 減 白术 共六味 大腹檳榔 四枚。并皮子用。 生薑 五分 桔梗 七分

夏三月加生薑三分
秋三月加陳皮三分 共六味

枳實五分 甘草三分 共八味

右各㕮咀。分爲三貼。一貼以水三升。煮取二升。分温三服。如人行四五里。進一服。如四體壅。添甘草少許。每貼分作三小貼。每小貼以水一升。煮取七合。温服。再合滓爲一服。重煮都成四服。

退五藏虛熱。雜療

## 梔子湯類五凡九方

### 梔子豉湯一

梔子十四箇擘 香豉四合綿裹

右二味。以水四升。先煮梔子。得二升半。內豉。煮取一升半。去滓。分爲二服。温進一服。

發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者。必反覆顛倒。心中懊憹。發汗若下之而煩熱。胷中窒。傷寒五六日。大下之後。身熱不去。心中結痛者。未欲解也。凡用梔子湯。病人舊微溏者。不可與

服之。太陽中 陽明病。脈浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒。反惡熱。身重。若發汗則躁。心憒憒反譫語。若加温針。必怵惕煩躁。不得眠。若下之則胃中空虚。客氣動膈。心中懊憹。舌上胎。陽明病下之。其外有熱。手足温。不結胸。心中懊憹。飢不能食。但頭汗出。陽明下利後。更煩。按之心下濡者。爲虚煩也。厥陰

梔子甘草豉湯 二

於原方。加甘草二兩炙。

原證若少氣。太陽中

梔子生薑豉湯 三

於原方。加生薑五兩。

原證若嘔。同上

梔子乾薑湯 四

梔子十四箇擘。乾薑一兩

右二味。以水三升半。煮取一升半。去滓。分二服。温進一服。

傷寒。醫以尤藥。大下之。身熱不去。微煩。同上

梔子厚朴湯 五

梔子十四箇擘 厚朴四兩炙去皮 枳實四枚水浸炙令黃

右三味以水三升半煮取一升半去滓分二服温進一服

傷寒下後心煩腹滿臥起不安同上

梔子蘗皮湯 六

肥梔子十五箇擘 甘草一兩炙 黃蘗二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分温再服

傷寒身黃發熱陽明

枳實梔子湯 七

枳實三枚炙 梔子十四箇擘 豉一升綿裹

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子煮取二升下豉更煮五六沸去滓温分再服覆令微似汗若有宿食者內大黃如博碁子五六枚服之愈

大病差後勞復差後勞復

梔子大黃湯 八

梔子 十四枚　大黃 一兩　枳實 五枚

豉一升

右四味。以水六升。煮取二升。分温三服。

酒黃疸。心中懊憹。或熱痛。黃疸

茵蔯蒿湯 九

茵蔯蒿 六兩　梔子 十四枚。擘。　大黃 二兩。酒洗。

右三味。以水一斗二升。先煮茵蔯。減六升。內二味。煮取三升。去滓。分三服。小便當利。尿如皂莢汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。



陽明病。發熱汗出者。此爲熱越。不能發黃也。但頭汗出。身無汗。劑頸而還。小便不利。渴引水漿者。此爲瘀熱在裏。身必發黃。　傷寒七八日。身黃如橘子色。小便不利。腹微滿。陽明　穀疸之爲病。寒熱不食。食即頭眩。心胷不安。久久發黃。爲穀疸。黃疸

承氣湯類六 凡三十二方

大承氣湯一

大黃四兩酒洗 厚朴半斤炙去皮 枳實五枚炙
芒消三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃更煮取二升去滓內芒消更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿服

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足

濈然汗出者。此大傻已鞕也。陽明病。潮熱。大傻微鞕者。可與大承氣湯。不鞕者。不可與之。傷寒若吐若下後不解。不大傻。五六日。上至十餘日。日晡所發潮熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。若劇者。發則不識人。循衣摸牀。惕而不安。微喘直視。脈弦者生。濇者死。微者但發熱讝語。大承氣湯主之。若一服利。則止後服。陽明病。讝語。有潮熱。反不能食者。胃中必有燥屎五六枚也。若能食者。但鞕耳。汗出讝語者。以有燥屎在胃中。此為風也。須下者。過經乃可下之。下之若早語言必亂。以表虛裏實故也。下之愈。二陽併病。太陽證罷。但發潮熱。手足漐漐汗出。大傻難而讝語者。下之則愈。陽明病。下之。心中懊憹而煩。胃中有燥屎者。可攻。腹微滿。初頭鞕。後必溏。不可攻之。若有燥屎。宜大承氣湯。病人煩熱。汗出則解。又如瘧狀。日晡所發熱者。屬陽明也。脈實者。宜下之。脈浮虛者。宜發汗。下之與大承氣湯。發汗後。六七日不大傻。煩不解。腹

滿痛者。此有燥屎也。所以然者。本有宿食故也。

病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。喘冒不能臥者。有燥屎也。得病二三日。脈弱。無太陽柴胡證。煩躁。心下鞕。至四五日。雖能食。以小承氣湯。少少與。微和之。令小安。至六日。與承氣湯一升。若不大便六七日。小便少者。雖不受食。但初頭鞕。後必溏。未定成鞕。攻之必溏。須小便利。屎定鞕。乃可攻之。 傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難。身微熱者。此爲實也。急下之。 陽明病。發熱。汗多者。急下之。發汗不解。腹滿痛者。急下之。 腹滿不減。減不足言。當下之。 陽明少陽合病。必下利。脈滑而數者。有宿食也。當下之。陽明少陰病。得之二三日。口燥咽乾者。急下之。 少陰病。自利清水。色純青。心下必痛。口乾燥者。可下之。 少陰病。六七日。腹脹不大便者。急下之。少陰下利。三部脈皆平。按之心下鞕者。急下之。 下利。脈遲而滑者。內實也。利未欲止。當下之。 寸口脈浮而大。

按之反濇。尺中亦微而濇。故知有宿食。當下之。

下利不欲食者。以有宿食故也。當下之。下利差。至其年月日時復發者。以病不盡故也。當下之。病腹中滿痛者。此爲實也。當下之。下利脈反滑。當有所去。下乃愈。脈雙弦而遲者。必心下鞕。脈大而緊者。陽中有陰也。可下之。可下脈數而滑者。實也。此有宿食。下之愈。宿食痙爲病。胃滿口噤。臥不著席。脚攣急。必齘齒。痙病解能食。七八日。更發熱者。此爲胃實。



八日。無太陽證。少腹堅痛。此惡露不盡。不大便。煩躁發熱。切脈微實。再倍發熱。日晡時煩燥者。不食。食則譫語。至夜即愈。宜大承氣湯主之。熱在裏。結在腸胱也。婦人産後

小承氣湯 二

大黃 四兩 厚朴 二兩炙去皮 枳實 三枚大者炙

右三味。以水四升。煮取一升二合。去滓。分溫二服。初服湯。當更衣。不爾者。盡飲之。若更衣者。勿服之。

陽明病。脈遲。雖汗出。不惡寒者。其身必重。短氣。腹滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。手足濈然汗出者。此大便已鞕也。大承氣湯主之。若汗多。微發熱惡寒者。外未解也。其熱不潮。未可與承氣湯。若腹大滿不通者。可與小承氣湯。微和胃氣。勿令至大泄下。陽明病。潮熱。大便微鞕者。可與大承氣湯。不鞕者。不可與之。若不大便六七日。恐有燥屎。欲知之法。少與小承氣湯。湯入腹中。轉失氣者。此有燥屎也。乃可攻之。若不轉失氣者。此但初頭鞕。後必溏。不可攻之。攻之必脹滿不能食也。欲飲水者。與水則噦。其後發熱者。必大便復鞕而少也。以小承氣湯和之。不轉失氣者。愼不可攻也。陽明病。其人多汗。以津液外出。胃中燥。大便必鞕。鞕則讝語。小承氣湯主之。若一服讝語止者。更莫復服。陽明病。讝語發潮熱。脈滑而疾者。小承氣湯主之。因與承氣湯一升。腹中轉氣者。更服一升。若不轉氣者。勿更與之。明日又不大便。脈反微濇者。裏

虛也。爲難治。不可更與承氣湯也。太陽病。若吐。若下。若發汗後。微煩。小便數。大便因鞕者。與小承氣湯和之愈。陽明厥陰 大便不通。噦數譫語。噦引千金翼。

調胃承氣湯 三

大黃四兩。清酒洗。甘草二兩。炙。芒消半斤

右三味。切。以水三升。煮二物。至一升。去滓。內芒消。更上微火一二沸。溫頓服之。以調胃氣。傷寒脈浮。自汗出。小便數。心煩。微惡寒。脚攣急。反與桂枝。欲攻其表。此誤也。得之便厥。咽中乾。煩躁吐逆者。作甘草乾薑湯與之。以復其陽。若厥愈。足温者。更作芍藥甘草湯與之。其脚即伸。若胃氣不和。譫語者。少與調胃承氣湯。太陽上發汗後。惡寒者。虛故也。不惡寒。但熱者。實也。當和胃氣。太陽病未解。脈陰陽俱微。必先振慄。汗出而解。但陽脈微者。先汗出而解。但陰脈微者。下之而解。若欲下之。不可與承氣湯也。傷寒十三日。過經譫語者。以有熱也。當以湯下之。若小便利者。大便當

鞕而反下利脈調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者此爲內實也太陽病過經十四日心下温温欲吐而胷中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胷中痛微溏者此非茈胡湯證以嘔故知極吐下也太陽中陽明病不吐不下心煩太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也傷寒吐後腹脹滿陽明

桃核承氣湯四

桃人五十箇去皮尖　大黃四兩　桂枝二兩去皮　甘草二兩炙　芒消二兩

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒消復上火微沸下火先食温服五合日三服當微利

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外外解已但少腹急結者乃可攻之太陽中



學訓堂藏板

麻子人九 五

麻子人 二升 芍藥 半斤 枳實 半斤 炙

大黃 一斤 去皮 厚朴 一尺 去皮 杏人 一升 去皮尖 熬 別作脯

右六味。蜜和九如梧桐子大。飲服十九。日三服。漸加。以知爲度。

跌陽脈浮而濇。浮則胃氣強。濇則小便數。浮濇相搏。大便則鞕。其脾爲約。陽明厚朴三物湯 六 陽明

厚朴 八兩 大黃 四兩 枳實 五枚

右三味。以水一斗二升。先煮二味。取五升。內大黃。煮取三升。溫服一升。以利爲度。

痛而閉者。腹滿

厚朴七物湯 七

厚朴 半斤 甘草 三兩 大黃 三兩

大棗 十枚 枳實 五枚 桂枝 二兩

生薑 五兩

右七味。以水一斗。煮取四升。溫服八合。日三

服。嘔者。加半夏五合。下利。去大黃。寒多者。加生薑至半斤。

病腹滿。發熱十日。脈浮而數。飲食如故。同上

厚朴大黃湯八

厚朴一尺　大黃六兩　枳實四枚

右三味。以水五升。煮取二升。分温再服。

支飲胸滿痰飲

大黃甘草湯九

大黃四兩　甘草一兩

右二味。以水三升。煮取一升。分温再服。

食已即吐。嘔吐

抵當湯十

水蛭熬　虻蟲各三十箇。去翅足。熬。桃人二十箇。去皮尖。

大黃三兩。酒洗。

右四味。以水五升。煮取三升。去滓。温服一升。不下更服。

太陽病六七日。表證仍在。脈微而沈。反不結胸。其人發狂者。以熱在下焦。少腹當鞕滿。小便自

利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也　太陽病身黃脈沈結少腹鞕小便不利者爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也太陽中陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞕大便反易其色必黑　病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已下脈數不解令熱則消穀喜飢至六七日不大便者有瘀血陽明婦人經水不利下亦治下男子膀胱滿急有瘀血者○婦人雜病

抵當丸十一

水蛭二十箇熬　蠐蟲二十箇去翅足熬　桃人二十五箇去皮尖

大黃三兩

右四味搗分四丸以水一升煮一丸取七合服之晬時當下血若不下者更服

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之不可餘藥太陽中

下瘀血湯十二

大黃二兩　桃人二十枚　蠐蟲二十枚熬去足

右三味末之煉蜜和爲四丸以酒一升煎一丸取八合頓服之新血下如豚肝

産婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此爲腹中有乾血著臍下宜下瘀血湯亦主經水不利婦人産後

大黃蠐螬丸十三

大黃十分蒸 黃芩一兩 甘草三兩

桃人一升 芍藥四兩

乾地黃十兩 乾漆一兩 蠐螬一升

水蛭百枚 蠐螬一升 蠐螬半升

右十二味末之煉蜜和丸小豆大酒飲服五丸日三服

五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷飢傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛虛勞

大黃消石湯十四

大黃 黃蘗 消石各四兩

梔子十五枚

右四味。以水六升。煮取三升。去滓。內消。更煮取一升頓服。

黃疸腹滿。小便不利而赤。自汗出。此爲表和裏實。當下之。黃疸

大黃牡丹湯 十五

大黃 四兩　牡丹 一兩　桃人 五十箇　瓜子 半升　芒消 三合

右五味。以水六升。煮取一升。去滓。內芒消。再煎沸。頓服之。有膿當下。如無膿。當下血。

腸癰者。少腹腫痞。按之卽痛如淋。小便自調。時時發熱。自汗出。復惡寒。其脈遲緊者。膿未成。可下之。當有血。脈洪數者。膿已成。不可下也。腸癰

大黃附子湯 十六

大黃 三兩　附子 三枚。炮　細辛 二兩

右三味。以水五升。煮取二升。分溫三服。若強人煮取二升半。分溫三服。服後如人行四五里。進一服。

脇下偏痛。發熱。其脈緊弦。此寒也。以溫藥下之。

寒疝

治食鱠成癥方 十七

橘皮 一兩　大黃 二兩　朴消 二兩

右三味以水一大升煮至小升頓服卽消鱠食之在心胷間不化吐復不出速下除之久成癥病蟲魚禁忌

大黃甘遂湯 十八

大黃 四兩　甘遂 二兩　阿膠 二兩

右三味以水三升煮取一升頓服之其血當下

婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴生後者此爲水與血俱結在血室也婦人雜病

大陷胷湯 十九

大黃 六兩　芒消 一升　甘遂 一錢七

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒消煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服

太陽病脈浮而動數浮則爲風數則爲熱動則

爲痛。數則爲虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒者。表未解也。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中空虛。客氣動膈。短氣躁煩。心中懊憹。陽氣內陷。心下因鞕。則爲結胸。大陷胸湯主之。若不結胸。但頭汗出。餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身必發黃。傷寒六七日。結胸熱實。脈沈而緊。心下痛。按之石鞕。傷寒十餘日。熱結在裏。復往來寒熱者。與大柴胡湯。但結胸無大熱者。此爲水結在胸脅也。但頭微汗出。太陽病。重發汗。而復下之。不大便五六日。舌上燥而渴。日晡所小有潮熱。從心下至少腹鞕滿而痛不可近。傷寒五六日。嘔而發熱者。柴胡湯證具。而以他藥下之。柴胡證仍在者。復與柴胡湯。此雖已下之。不爲逆。必蒸蒸而振。却發熱汗出而解。若心下滿而鞕痛者。此爲結胸也。太陽下

大陷胸丸二十

大黃半斤　葶藶子半升。熬　芒消半升

杏人半升。去皮尖。熬黑

右四味。擣篩二味。內杏人。芒消。合研如脂。和散。取如彈丸一枚。別擣甘遂末一錢匕。白蜜二合。水二升。煮取一升。溫頓服之。一宿乃下。如不下更服。取下爲效。禁如藥法。

結胸者。項亦强。如柔痙狀。下之則和。太陽下

小陷胸湯二十一

黃連一兩　半夏半升洗。　栝樓實大者一枚。

右三味。以水六升。先煮栝樓。取三升。去滓。內諸藥。煮取二升。去滓。分溫三服。

小結胸病。正在心下。按之則痛。脈浮滑。太陽下

十棗湯二十二

芫花熬　甘遂　大戟

右三味。等分。各別擣爲散。以水一升半。先煮大棗肥者十枚。取八合。去滓。內藥末。强人取一錢匕。羸人服半錢。溫服之。平旦服。若下少病不除者。明日更服。加半錢。得快下利。後糜粥自養。

太陽中風。下利嘔逆。表解者。乃可攻之。其人槃

漿汗出。發作有時。頭痛。心下痞鞕滿。引脅下痛。乾嘔短氣。汗出不惡寒者。此表解裏未和也。太陽病懸飲。欬家。其脈弦。爲有水。夫有支飲欬家。欬煩。胷中痛者。不卒死。至一百日或一歲。痰飲

葶藶大棗瀉肺湯 二十三

葶藶熬令黃色搗如彈丸大棗十二枚

右先以水三升。煮棗。取二升。去棗。內葶藶。煮取一升。頓服。

肺癰。喘不得臥。肺癰。胸滿脹。一身面目浮腫。鼻塞清涕出。不聞香臭酸辛。欬逆上氣。喘鳴迫塞。肺癰 支飲不得息。痰飲

白散方 金匱名桔梗白散○二十四

桔梗 三分 巴豆 一分去皮心熬黑研如脂貝母 三分

右三味。爲散。內巴豆。更於臼中杵之。以白飲和服。強人半錢匕。羸者減之。病在膈上必吐。在膈下必利。不利進熱粥一杯。利過不止。進冷粥一杯。金匱云。飲冷水一杯則定。

寒實結胷。無熱證。太陽下欬而胸滿。振寒。脈數。咽

乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿。如米粥者。爲肺癰。肺癰。引外臺。

走馬湯二十五

杏人二枚　巴豆二枚。去皮心。熬。

右二味。以綿纏搥令碎。熱湯二合。捻取白汁飲之。當下。老小量之。

中惡心痛。腹脹。大便不通。通治飛尸鬼擊病。腹滿。引外臺。

三物備急丸二十六

大黃一兩　乾薑一兩　巴豆一兩。去皮心。熬。外研如脂。

右藥。各須精新。先擣大黃。乾薑爲末。研巴豆。內中。合治一千杵。用爲散。蜜和丸亦佳。密器中貯之。莫令歇。見千金。司空裴秀爲散用。亦可。先和成汁。乃傾口中。令從齒間得入。至良驗。

心腹諸卒暴百病。若中惡客忤。心腹脹滿。卒痛如錐刺。氣急口噤。停尸卒死者。以煖水若酒服。大豆許三四丸。或不下。捧頭起。灌令下咽。須臾

當差。如未差。更與三丸。當腹中鳴。卽吐下。便差。
若口噤。亦須折齒灌之。雜療

已椒藶黃丸 二十七

防已　椒目　葶藶 熬　大黃 各一兩

右四味。末之。蜜丸如梧子大。先食飲服一丸。
日三服。稍增。口中有津液。渴者。加芒消半兩。
腹滿。口舌乾燥。此腸間有水氣。痰飲
治馬墜及一切筋骨損方。二十八



大黃 一兩。切。浸。湯成下。緋帛 如手大。燒灰。亂髮 如雞子大。燒灰。
用。久用炊單布一尺。燒灰。敗蒲 一握。三寸。
桃人 四十九箇。去皮尖。熬。甘草 如中指節。炙。剉。
右七味。以童子小便。量多少。煎。湯成內酒一
大盞。次下大黃。去滓。分溫三服。先剉敗蒲席
半領。煎湯浴。衣被蓋覆。斯須通利數行。痛楚
立差。利及浴水赤。勿怖。卽瘀血也。雜療

甘遂半夏湯 二十九

甘遂 大者三枚。以水一升。
半夏 十二枚。以水一升。煮取半升。去滓。

芍藥五枚　甘草如指大一枚炙

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半升和藥汁煎取八合頓服之

病者脈伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此爲留飲欲去故也痰飲

蜜煎導三十

食蜜七合

右一味於銅器內微火煎當須凝如飴狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則鞕以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之

大猪膽一枚

瀉汁和少許法醋以灌穀道內如一食頃當大便出宿食惡物

陽明病自汗出若發汗小便自利者此爲津液內竭雖鞕不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及大猪膽汁皆可爲導陽明

九痛丸 三十二

附子 三兩炮 生狼牙 一兩 炙香 巴豆 一兩去皮心熬研如脂 人薤 乾薑 各一兩 吳茱萸 各一兩

右六味末之煉蜜丸如桐子大酒下強人初服三丸日三服弱者二丸忌口如常法

九種心痛兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連年積冷流注心胸痛并冷衝上氣落馬墜車血疾等心痛





瓜蒂散 一

瓜蒂 一分熬黃 赤小豆 一分

右二味各別擣篩爲散已合治之取一錢匕以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與瓜蒂散

病如桂枝證頭不痛項不強寸脈微浮胷中痞鞕氣上衝咳咽不得息者此爲胷有寒也當吐

之。太陽下宿食在上脘當吐之。宿食

一物瓜蒂湯二

瓜蒂二十七箇

右剉。以水一升。煮取五合。去滓頓服。

太陽中暍。身熱疼重。而脈微弱。此以夏月傷冷水。水行皮中。上所致也。暍諸黃。黃疸

鹽湯三

鹽一升　水三升

右二味。煮令鹽消。分二服。當吐出食。瘥差。

貪食。食多不消。心腹堅滿痛。

飲食中毒。煩滿。治之方。四

苦蔆三兩　苦酒一升半

右二味。煮三沸。三上三下。服之。吐食出即差。

或以水煮亦得。果實菜穀禁忌

瀉心湯類八凡十五方

## 半夏瀉心湯一

半夏 半升洗　黃芩　乾薑
人蔘　甘草炙各三兩　黃連一兩
大棗十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

傷寒五六日嘔而發熱者此胡湯證具而以他藥下之此胡證仍在者復與此胡湯此雖已下

之。不爲逆。必蒸蒸而振。却發熱汗出而解。若心下滿而鞕痛者。此爲結胸也。大陷胸湯主之。但滿而不痛者。此爲痞。此胡不中與之。太陽嘔而下腸鳴。心下痞。嘔吐

生薑瀉心湯　二

生薑　四兩。切。　甘草　三兩。炙。　人蔘　三兩

乾薑　一兩　黃芩　三兩　半夏　半升。洗。

黃連　一兩　大棗　十二枚。擘。

右八味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。

傷寒論古訓傳　卷之二　瀉心湯

升。溫服一升。日三服。

傷寒汗出解之後。胃中不和。心下痞鞕。乾嘔食臭。脅下有水氣。腹中雷鳴。下利。太陽下

甘草瀉心湯　三

甘草　四兩。炙。　黃芩　三兩　乾薑　三兩

半夏　半升。洗。　大棗　十二枚。擘。　黃連　一兩

人蔘　三兩

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。

傷寒、中風、醫反下之、其人下利、日數十行、穀不化、腹中雷鳴、心下痞鞕而滿、乾嘔、心煩不得安、醫見心下痞、謂病不盡、復下之、其痞益甚、此非結熱、但以胃中虛、客氣上逆、故使鞕也、太陽狐惑之爲病、狀如傷寒、默默欲眠、目不得閉、臥起不安、蝕於喉爲惑、蝕於陰爲狐、不欲飲食、惡聞食臭、其面目乍赤乍黑乍白、蝕於上部、則聲嗝、

狐惑

大黃黃連瀉心湯 四

大黃二兩　黃連一兩

右二味、以麻沸湯二升漬之、須臾絞去滓、分温再服、

心下痞、按之濡、其脈關上浮、傷寒、大下後、復發汗、心下痞、惡寒者、表未解也、不可攻痞、當先解表、表解乃可攻痞、解表宜桂枝湯、攻痞宜大黃黃連瀉心湯、太陽下

瀉心湯 五

大黃二兩　黃連　黃芩　各一兩



享和己巳歲版

右三味、以水三升、煮取一升、頓服之、

心氣不足、吐血、衄血、亦治霍亂、吐衄婦人吐涎沫、醫反下之、心下即痞、當先治其吐涎沫、小青龍湯主之、涎沫止、乃治痞、婦人雜病

附子瀉心湯　六

大黃二兩　黃連一兩　黃芩一兩

附子二枚、炮、去皮、破、別煮取汁、

右四味、切三味、以麻沸湯二升漬之、須臾絞去滓、內附子汁、分溫再服、



心下痞、而復惡寒、汗出、太陽下

黃連湯　七

黃連三兩　甘草三兩、炙、　乾薑三兩

桂枝三兩、去皮、　人蔘二兩　半夏半升、洗、

大棗十二枚、擘、

右七味、以水一斗、煮取六升、去滓、溫服、晝三夜二、

傷寒、胷中有熱、胃中有邪氣、腹中痛、欲嘔吐、同上

黃芩湯　八



浪華　浮川堂藏板

黃芩 三兩　芍藥 二兩　甘草 二兩 炙
大棗 十二枚 擘

右四味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。
日再夜一服。

太陽與少陽合病。自下利。太陽下

黃芩加半夏生薑湯 九

黃芩 三兩　芍藥 二兩　甘草 二兩 炙
大棗 十二枚 擘　半夏 半升 洗　生薑 三兩 切

右六味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。
日再夜一服。

前證。若嘔。同上 乾嘔而利。嘔吐

黃芩湯 十

黃芩 三兩　人蔘 三兩　乾薑 三兩
桂枝 二兩　大棗 十二枚　半夏 半升

右六味。以水七升。煮取三升。溫分三服。

乾嘔下利。嘔吐。引外臺。

三物黃芩湯 十一

黃芩 一兩　苦蔘 二兩　乾地黃 四兩



靜嘉堂藏版

右三味、以水六升、煮取二升、温服一升、多吐下蟲。

婦人在草蓐、自發露得風、四肢苦煩熱、頭痛者、與小茈胡湯、頭不痛但煩者、婦人産後、引千金。乾薑黄芩黄連人蔘湯 十二

乾薑　黄芩　黄連　人蔘各三兩

右四味、以水六升、煮取二升、去滓、分温再服。

傷寒本自寒下、醫復吐下之、寒格更逆吐下、若食入口即吐厥陰

旋覆代赭湯 十三

旋覆花三兩　人蔘二兩　生薑五兩　代赭一兩　甘草三兩、炙。　半夏半升、洗。　大棗十二枚、擘。

右七味、以水一斗、煮取六升、去滓、再煎取三升、温服一升、日三服。

傷寒發汗、若吐、若下、解後、心下痞鞕、噫氣不除、太陽下

黃連阿膠湯 十四

黃連四兩　黃芩二兩　芍藥二兩

雞子黃三枚　阿膠三兩

右五味。以水六升。先煮三物。取二升。去滓。內膠烊盡。小冷。內雞子黃。攪令相得。溫服七合。日三服。

少陰病。得之二三日以上。心中煩。不得臥。少陰

澤漆湯 十五

半夏半升　紫蘇五兩　澤漆三斤。以東流水五斗。



煮取一斗五升。

生薑五兩　白前五兩

甘草　黃芩　人蔘

桂枝各三兩

右九味。咬咀。內澤漆汁中。煮取五升。溫服五合。至夜盡。

欬而脈沈。欬嗽

白虎湯類九 凡五方

白虎湯一

知母六兩　石膏一斤碎　甘草二兩炙　粳米六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

傷寒脈浮滑此以表有熱裏有寒太陽下三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢讝語遺尿發汗則讝語下之則額上生汗手足逆冷若自

汗出。陽明 傷寒。脈滑而厥者。裏有熱。厥陰

白虎加人蔘湯二

知母六兩　石膏一斤。碎。綿裹。甘草炙。二兩。
粳米六合　人蔘三兩

右五味。以水一斗。煮米熟。湯成去滓。温服一升。日三服。

服桂枝湯。大汗出後。大煩渴不解。脈洪大。太陽上

傷寒若吐若下後。七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升。傷寒無大熱。口燥渴。心煩。背微惡寒。傷寒脈浮。發熱無汗。其表不解。不可與白虎湯。渴欲飲水。無表證。太陽下若渴欲飲水。口乾舌燥。陽明

太陽中熱者。暍是也。汗出惡寒。身熱而渴。暍

白虎加桂枝湯三

知母六兩　甘草二兩。炙。　石膏一斤
粳米六合　桂枝去皮。三兩。

右五味。以水一斗。煮米熟。湯成去滓。温服一升。日三服。

温瘧者。其脈如平。身無寒。但熱。骨節疼煩。時嘔。
瘧

竹葉石膏湯 四

竹葉 二把　石膏 一斤　半夏 半升 洗。
麥門冬 一升 去心。　人蔘 二兩　甘草 二兩 炙。
粳米 半升

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。內粳米。煮米熟。湯成去米。温服一升。日三服。

傷寒。解後。虛羸少氣。氣逆欲吐。差後勞復



竹皮大丸 五

生竹茹 二分　石膏 二分　桂枝 一分
甘草 七分　白薇 一分

右五味。末之。棗肉和丸彈子大。以飲服一丸。日三夜二服。有熱者。倍白薇。煩喘者。加柏實一分。

婦人乳中虛。煩亂嘔逆。安中益氣。婦人產後

五苓散類十凡二十一方

五苓散一

猪苓十八銖去皮　澤瀉一兩六銖　白朮十八銖
茯苓十八銖　桂枝半兩去皮

右五味擣爲散以白飲和服方寸匕日三服多飲煖水汗出愈如法將息

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴發汗已脈浮數煩渴

傷寒汗出而渴。中風發熱六七日不解而煩。有表裏證渴欲飲水水入則吐者名曰水逆（太陽中）病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利（太陽下）太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明



也小便數者大便必鞕不更衣十日無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者（陽明霍亂）頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水（霍亂）脈浮小便不利微熱消渴者宜利小便發汗（消渴）假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癲眩此水也（痰飲）

## 茵蔯五苓散 二

茵蔯蒿末 十分

## 五苓散 五分

右二味和先食飲方寸匕日三服

## 黃疸病（黃疸）

豬苓湯 三

豬苓去皮 茯苓 澤瀉

阿膠 滑石 碎各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烊消溫服七合日三服

陽明病若脈浮發熱渴欲飲水小便不利 陽明病汗出多而渴者不可與豬苓湯以汗多胃中燥豬苓湯復利其小便故也 陽明少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠 少陰

茯苓甘草湯 四

茯苓二兩 桂枝二兩去皮 甘草一兩炙 生薑三兩切

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者 太陽中 傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也 厥陰

豬苓散 五

豬苓 茯苓 白朮 各等分

右三味杵爲散飲服方寸匕日三服

嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者

嘔吐

茯苓桂枝白朮甘草湯 六茯苓朮以竭飲氣桂枝甘草以生陽氣

茯苓 四兩 桂枝 三兩去皮 白朮

甘草 各二兩炙

右四味以水六升煮取三升去滓分温三服

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胷起則頭

眩脈沈緊發汗則動經身爲振振搖 太陽中倒裝互

有痰飲胸脇支滿目眩 夫短氣有微飲當從

小便去之 痰飲此其人素虛飲停今自誤治陽更虛而飲亦動其證輕重不同如此證其病重而飲停中焦者也

茯苓桂枝甘草大棗湯 七此方多用桂者以津幹脇氣也

茯苓 半斤 桂枝 四兩去皮 甘草 二兩炙

大棗 十五枚擘 所以十五枚者甘以治水勢之橫

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內

諸藥煮取三升去滓温服一升日三服

作甘爛水法取水二斗置大盆內以杓揚之

水上有珠子五六千顆相逐取用之 甘瀾水要取不助水勢



孚川堂藏板

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚 太陽中

澤瀉湯 八

澤瀉 五兩　白朮 二兩

右二味以水二升煮取一升分温再服

心下有支飲其人苦冒眩 痰飲

茯苓澤瀉湯 九

茯苓 半斤　澤瀉 四兩　甘草 一兩

桂枝 二兩　白朮 三兩　生薑 四兩

右六味以水一斗煮取三升內澤瀉再煮取

此證與前證相同其病豈不定乎



二升半温服八合日三服

胃反吐而渴欲飲水 嘔吐

茯苓杏人甘草湯 十

茯苓 三兩　杏人 五十箇　甘草 一兩

右三味以水一斗煮取五升温服一升日三

服不差更服

胸痺胸中氣塞短氣 胸痺

桂苓五味甘草湯 十一

茯苓 四兩　桂枝 四兩去皮　甘草 三兩炙

五味子 半升

右四味。以水八升。煮取三升。去滓。分温三服。

青龍湯下已。多唾口燥。寸脈沈。尺脈微。手足厥逆。氣從少腹上衝胸咽。手足痺。其面翕熱如醉狀。因復下流陰股。小便難。時復冒者。與茯苓桂枝五味甘草湯。治其氣衝。

苓甘五味薑辛湯 十二

茯苓 四兩　甘草 三兩　乾薑 三兩

細辛 三兩　五味 半升

右五味。以水八升。煮取三升。去滓。温服半升。

日三服。

衝氣即低。而反更欬。胸滿者。用桂苓五味甘草湯。去桂。加乾薑細辛。以治其欬滿。

苓甘五味薑辛夏湯 十三

茯苓 四兩　甘草 二兩　細辛 二兩

乾薑 二兩　五味子　半夏 各半升

右六味。以水八升。煮取三升。去滓。温服半升。

日三服。

欬滿即止。而更復渴。衝氣復發者。以細辛乾薑爲熱藥也。服之當遂渴。而渴反止者。爲支飲也。支飲者。法當冒。冒者必嘔。嘔者復內半夏。以去其水。

苓甘五味加薑辛半夏杏人湯 十四

茯苓 四兩　甘草 三兩　五味子 半升
乾薑 三兩　細辛 三兩　半夏 半升
杏人 半升 去皮尖

右七味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服半升。

日三服。

水去嘔止。其人形腫者。加杏人主之。其證應內麻黃。以其人遂痺。故不內之。若逆而內之者必厥。所以然者。以其人血虛。麻黃發其陽故也。

苓甘五味加薑辛半杏大黃湯 十五

茯苓 四兩　甘草 三兩　五味 半升
乾薑 三兩　細辛 三兩　半夏 半升
杏人 半升　大黃 三兩

右八味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服半升。

日三服。

若面熱如醉。此爲胃熱上衝。熏其面。加大黃以利之。痰飲

茯苓戊鹽湯 十六

茯苓 半斤　白朮 二兩　戊鹽 彈丸大一枚

右三味。先將茯苓白朮。煎成入戊鹽。再煎。分温三服。

小便不利。淋

葵子茯苓散 十七

葵子 一斤　茯苓 三兩

右二味。杵爲散。飲服方寸匕。日三服。小便利則愈。

妊娠有水氣。身重。小便不利。洒淅惡寒。起即頭眩。妊娠

牡蠣澤瀉散 十八

牡蠣 熬　澤瀉

葶藶子 熬　商陸根 熬

括樓根 各等分　蜀漆 煖水洗去腥。洗去鹹。

右七味。異擣。下篩爲散。更於臼中治之。白飲和服方寸匕。日三服。小便利。止後服。

大病差後。從腰以下。有水氣。差後勞復

文蛤散 十九

文蛤 五兩

右一味。爲散。以沸湯和一方寸匕服。湯用五合。

病在陽。應以汗解之。反以冷水潠之。若灌之。其熱被劫不得去。彌更益煩。肉上粟起。意欲飲水。反不渴。太陽下 渴欲飲水不止。消渴

蒲灰散 二十

蒲灰 七分 滑石 三分

右二味。杵爲散。飲服方寸匕。日三服。

小便不利。淋 厥而皮水。水氣

滑石白魚散 二十一

滑石 二分 亂髮 二分。燒 白魚 二分

右三味。杵爲散。飲服半錢匕。日三服。

小便不利。淋

理中湯類十一 凡十一方

理中丸一

人蔘　乾薑　甘草炙

白朮各三兩

右四味搗篩蜜和爲丸如雞子黃許大以沸湯數合和一丸研碎溫服之日三四夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四物依兩數切用水八升煮取三升去滓溫服一升日三服若臍上築者腎氣動也去朮加

桂四兩吐多者去朮加生薑三兩下多者還
用朮悸者加茯苓二兩渴欲得水者加朮足
前成四兩半腹中痛者加人蔘足前成四兩
半寒者加乾薑足前成四兩半腹滿者去朮
加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升許
微自温勿發揭衣被
霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散
主之寒多不用水霍亂大病差後喜唾久不了
了胷上有寒當以丸藥温之差後勞復

## 人蔘湯二

人蔘　甘草　乾薑
白朮各三兩

右四味以水八升煮取三升温服一升日三
服

胸痺心中痞留氣結在胸胸滿脇下逆搶心胸痺

## 桂枝人蔘湯三

桂枝四兩別切　甘草四兩炙　白朮三兩
人蔘三兩　乾薑三兩



京都書肆　皇和學川

右五味、以水九升、先煮四味、取五升、內桂、更煮取三升、去滓、溫服一升、日再、夜一服。

太陽病、外證未除、而數下之、遂協熱而利、利下不止、心下痞鞕、表裏不解、太陽下

大建中湯 四

蜀椒二合、去汗 乾薑四兩 人蔘二兩

右三味、以水四升、煮取二升、去滓、內膠飴一升、微火煎、取一升半、分溫再服、如一炊頃、可飲粥二升、後更服、當一日食糜、溫覆之。



心胸中大寒痛、嘔不能飲食、腹中寒、上衝皮起、出見有頭足、上下痛而不可觸近、寒疝

茯苓飲 五

茯苓 人蔘 白朮 各三兩 枳實二兩 橘皮二兩半 生薑四兩

右六味、水六升、煮取一升八合、分溫三服、如人行八九里進之。

心胸中有停痰宿水、自吐出水後、心胸間虛氣滿、不能食、消痰氣、令能食、痰飲、引外臺、

枳朮湯 六

枳實七枚　白朮二兩

右二味，以水五升，煮取三升，分温三服。腹中爽，卽當散也。

心下堅大如盤，邊如旋盤，水飲所作，水氣

甘草乾薑湯 七

甘草四兩炙　乾薑二兩

右二味，以水三升，煮取一升五合，分温再服。

傷寒脉浮，自汗出，小便數，心煩微惡寒，脚攣急，

反與桂枝，欲攻其表，此誤也，得之便厥，咽中乾，煩躁吐逆者，作甘草乾薑湯與之，以復其陽。太陽

上肺痿，吐涎沫，而不效者，其人不渴，必遺尿，小便數，所以然者，以上虛不能制下故也，此爲肺中冷，必眩，多涎唾，甘草乾薑湯以温之，若服湯已渴者，屬消渴。肺痿

甘草乾薑茯苓白朮湯 八

甘草二兩　白朮二兩　乾薑四兩

茯苓四兩

右四味。以水五升。煮取三升。分温三服。腰中即温。

腎著之病。其人身體重。腰中冷。如坐水中。形如水狀。反不渴。小便自利。飲食如故。病屬下焦。身勞汗出。衣裏冷濕。久久得之。腰以下冷痛。腰重如帶五千錢。五藏風寒

白朮附子湯 九

附子 三枚。炮。去皮。破。 白朮 四兩 生薑 三兩。切。

甘草 二兩。炙。 大棗 十二枚。擘。



右五味。以水六升。煮取二升。去滓。分温三服。初一服。其人身如痺。半日許。復服之。三服都盡。其人如冒狀。勿怪。此以附子。朮併走皮內。逐水氣未得除。故使之耳。

傷寒八九日。風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。不嘔不渴。脉浮虛而濇者。桂枝附子湯主之。若其人大便鞕。小便自利。太陽下 風虛頭重。眩苦極。不知食味。煖肌。補中。益精氣。中風引近效。

甘草附子湯 十

甘草二兩 炙 附子二枚 炮 去皮 白朮二兩
桂枝四兩 去皮

右四味。以水六升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。初服得微汗則解。能食汗止。復煩者。將服五合。恐一升多者。宜服六七合爲始。

風濕相搏。骨節疼煩。掣痛不得屈伸。近之則痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫。太陽下

天雄散十一

天雄三兩 炮 白朮八兩
龍骨三兩 桂枝六兩

右四味。杵爲散。酒服半錢匕。日三服。不知稍增之。以知爲度。慮勞

四逆湯類十二方 一凡十三方

四逆湯 一

甘草二兩炙 乾薑一兩半 附子一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服强人可大附子一枚乾薑三兩

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若

厥愈足温者。更作芍藥甘草湯與之。其脚即伸。若胃氣不和。讝語者。少與調胃承氣湯。若重發汗。復加燒針。太陽上傷寒醫下之。續得下利。清穀不止。身疼痛者。急當救裏。病發熱頭痛。脉反沈。若不差。身體疼痛。當救其裏。太陽中脉浮而遲。表熱裏寒。下利清穀。陽明自利不渴者。屬太陰。以其藏有寒故也。當温之。宜服四逆輩。太陰少陰病。飲食入口則吐。心中温温欲吐。復不能吐。始得之。手足寒。脉弦遲者。此胷中實。不可下也。當吐之。若膈上有寒飲。乾嘔者。不可吐也。當温之。少陰大汗出。熱不去。内拘急。四肢疼。又下利厥逆而惡寒。大汗若大下利。而厥冷。下利腹脹滿。身體疼痛者。先温其裏。乃攻其表。温裏宜四逆湯。嘔而脉弱。小便復利。身有微熱。見厥者。難治。厥陰吐利汗出。發熱惡寒。四肢拘急。手足厥冷。既吐且利。小便復利。而大汗出。下利清穀。内寒外熱。脉微欲絶。霍亂



靜嘉堂藏版

四逆加人蔘湯 二

四逆湯原方。加二人蔘一二兩

惡寒。脈微而復利。利止。亡血也。霍亂

通脉四逆湯 三

甘草二兩。炙。 附子大者一枚。生用。去レ皮。破二八片一

乾薑三兩。强人可二四兩一。

右三味。以二水三升一。煮取一升二合。去レ滓。分温

再服。其脈即出者愈。面色赤者。加二葱九莖一。腹

中痛者。去レ葱。加二芍藥二兩一。嘔者。加二生薑二兩一。



咽痛者。去二芍藥一。加二桔梗一。利止脈不レ出者。

去二桔梗一。加二人蔘二兩一。

少陰病。下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脈微欲

絶。身反不二惡寒一。其人面色赤。或腹痛。或乾嘔。或

咽痛。或利止脈不レ出。少陰下利清穀。裏寒外熱。

汗出而厥。厥陰

通脉四逆加豬膽汁湯 四

通脉四逆湯原方。加二豬膽汁半合一。

右四味。以二水三升一。煮取一升二合。去レ滓。内二豬

白通湯 六

葱白 四莖　乾薑 一兩　附子 一枚 生去皮破八片

右三味以水三升煮取一升去滓分温再服

少陰病下利少陰

白通加豬膽汁湯 七

葱白 四莖　乾薑 一兩　附子 一枚 生去皮破八片

人尿 五合　豬膽汁 一合

右五味以水三升煮取一升去滓內膽汁人尿和令相得分温再服若無膽亦可用



膽汁分温再服其脉即來無豬膽以羊膽代之

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絶

霍亂

乾薑附子湯 五

乾薑 一兩　附子 一枚 生用去皮切八片

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沈微身無大熱者太陽

滲利之品恐無其功益脾胃書燥而愚濕其燥必傷陽氣以旺其濕必冷胃氣以衰水穀淡滲津液不行苓之滲利能去水濕配茯苓以逐內寒乎裡甲之於相近矣

少陰病。下利。脉微者。與白通湯。利不止。厥逆無脉。乾嘔煩者。白通加豬膽汁湯主之。服湯脉暴出者死。微續者生。少陰

茯苓四逆湯 八

茯苓四兩　人蔘一兩　附子一枚。生用。去皮。破八片。

甘草二兩。炙。　乾薑一兩半

右五味。以水五升。煮取三升。去滓。温服七合。日二服。

發汗。若下之。病仍不解。煩躁。太陽中

玄武湯 九

茯苓三兩　芍藥三兩　白朮二兩

生薑三兩。切。　附子一枚。炮。去皮。破八片。

右五味。以水八升。煮取三升。去滓。温服七合。日三服。若欬者。加五味子半升。細辛一兩。乾薑一兩。若小便利者。去茯苓。若下利者。去芍藥。加乾薑二兩。若嘔者。去附子。加生薑足前爲半斤。

太陽病。發汗。汗出不解。其人仍發熱。心下悸。頭

眩。身瞤動。振振欲擗地。太陽中少陰病。二三日不已。至四五日。腹痛。小便不利。四肢沈重疼痛。自下利者。此爲有水氣。其人或欬。或小便利。或下利。或嘔。少陰

附子湯十

附子二枚。炮。去皮。破八片。茯苓三兩　人蔘二兩

白朮四兩　芍藥三兩

右五味。以水八升。煮取三升。去滓。温服一升。日三服。

少陰病。得之一二日。口中和。其背惡寒者。當灸之。少陰病。身體痛。手足寒。骨節痛。脉沈。少陰

大烏頭煎十一

烏頭大者五枚。熬。去皮。不咬咀。

右以水三升。煮取一升。去滓。內蜜二升。煎令水氣盡。取二升。强人服七合。弱人服五合。不差。明日更服。不可再服。

腹痛脉弦而緊。弦則衛氣不行。即惡寒。緊則不欲食。邪正相搏。即爲寒疝。繞臍痛。若發則白汗

出手足厥冷其脉沈弦寒疝
赤丸十二
茯苓四兩 烏頭二兩炮 半夏四兩洗
細辛一兩
右四味末之內眞朱爲色煉蜜丸如麻子大
先食酒飲下三丸日再夜一服不知稍增之
以知爲度
寒氣厥逆寒疝
烏頭赤石脂丸十三



蜀椒一兩法二分烏頭一分炮附子半兩炮一法一分
乾薑一兩一分赤石脂一兩一法二分
右五味末之蜜丸如桐子大先食服一丸日
三服不知稍加服
心痛徹背背痛徹心胸痺

學訓堂藏版

半夏湯類十三凡十二方

小半夏湯 一

半夏一升　生薑半斤

右二味以水七升煮取一升半分温再服

嘔家本渴渴者爲欲解今反不渴心下有支飲故也痰飲黄疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者黄疸諸嘔吐穀不得下嘔吐

小半夏加茯苓湯 二

小半夏湯原方加茯苓三兩

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸先渴後嘔爲水停心下此屬飲家痰飲

生薑半夏湯三

半夏半斤　生薑汁一升

右二味以水三升煮半夏取二升內生薑汁煮取一升半小冷分四服日三夜一服止停後服

病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憒憒然無奈嘔吐

大半夏湯四

半夏二升洗完用人蔘三兩　白蜜一升

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮藥取二升半溫服一升餘分再服

半夏乾薑散五

半夏　乾薑各等分

右二味杵爲散取方寸匕漿水一升半煎取

七合。頓服之。

乾嘔吐逆。吐涎沫。嘔吐

乾薑人蔘半夏丸 六

乾薑 一兩　人蔘 一兩　半夏 二兩

右三味。末之。以生薑汁糊爲丸。如梧子大。飲

服十丸。日三服。

妊娠。嘔吐不止。婦人妊娠

附子粳米湯 七

附子 一枚。炮。　半夏 半升　甘草 一兩

大棗 十枚　粳米 半升

右五味。以水八升。煮米熟。湯成。去滓。温服一

升。日三服。

腹中寒氣。雷鳴切痛。胸脇逆滿。嘔吐。寒疝霍亂

四逆。吐少嘔多。外臺。引仲景。

厚朴生薑半夏甘草人蔘湯 八

厚朴 半斤。炙。去皮。　生薑 半斤。切。　半夏 半升。洗。

甘草 二兩　人蔘 一兩

此半夏蓋猶茯苓四逆用茯苓之意。此所以佐薑附以逐內寒。

右五味。以水一斗。煮取三升。去滓。温服一升。

日三服。

發汗後、腹脹滿、太陽中風停飲

半夏厚朴湯 九

半夏一升　厚朴三兩　茯苓四兩

生薑五兩　乾蘇葉二兩

右五味、以水七升、煮取四升、分温四服、日三、夜一服。

婦人咽中、如有炙臠、婦人雜病

苦酒湯 十

半夏洗破、如棗核、十四枚　雞子一枚、去黃、內上苦酒、著雞子殼中。

右二味、內半夏、著苦酒中、以雞子殼、置刀環中、安火上、令三沸、去滓、少少含嚥之、不差更作三劑。

少陰病、咽中傷生瘡、不能語言、聲不出、少陰

半夏散及湯 十一

半夏洗　桂枝去皮　甘草炙

右三味、等分、各別擣篩已、合治之、白飲和服方寸匕、日三服。若不能散服者、以水一升、煎

七沸。內散兩方寸匕。更煮三沸。下火令小冷。
少少嚥之。

少陰病。咽中痛。少陰

麥門冬湯 十二

麥門冬 七升半夏 一升 人蔘 二兩
甘草 二兩 粳米 三合 大棗 十二枚

右六味。以水一斗二升。煮取六升。溫服一升。
日三夜一服。

大逆上氣。咽喉不利。止逆下氣。肺痿



甘草湯類十四 凡七方

甘草湯 一

甘草 二兩

右一味。以水三升。煮取一升半。去滓。溫服七合。日二服。

少陰病。二三日。咽痛。少陰

桔梗湯 二

桔梗 一兩 甘草 二兩

右二味。以水三升。煮取一升。去滓。溫分再服。

少陰病二三日。咽痛者。可與甘草湯。不差。少陰
欬而胸滿。振寒脈數。咽乾不渴。時出濁唾腥臭。
久久吐膿。如米粥者。爲肺癰。肺癰
炙甘草湯 三

甘草 四兩 炙。 生薑 三兩 切。 人蔘 二兩
生地黃一斤 桂枝 三兩 去皮。 阿膠 二兩
麥門冬 半升 去心。 麻人 半升 大棗 三十枚 擘。
右九味。以清酒七升。水八升。先煮八味。取三
升。去滓。內膠烊消盡。溫服一升。日三服。一名

復脈湯

傷寒脈結代。心動悸。太陽下 虛勞不足。汗出而悶。
脈結悸。行動如常。不出百日。危急者。十一日死。
虛勞。引千金翼 肺痿。涎唾多。心中溫溫液液。肺痿。引外臺
生薑甘草湯 四

生薑 五兩 人蔘 三兩
大棗 十五枚 甘草 四兩
右四味。以水七升。煮取三升。分溫三服。
肺痿。欬唾。涎沫不止。咽燥而渴。肺痿。引千金

甘草粉蜜湯 五

甘草二兩　粉一兩　蜜四兩

右三味，以水三升，先煮甘草，取二升，去滓，內粉、蜜，攪令和，煎如薄粥，温服一升，差即止。

蚘蟲之爲病，令人吐涎，心痛發作有時，毒藥不止。蚘蟲

排膿湯 六

甘草二兩　桔梗三兩　生薑一兩

大棗十枚

右四味，以水三升，煮取一升，温服五合，日再服。瘡癰

甘草小麥大棗湯 七

甘草三兩　小麥一升　大棗十枚

右三味，以水六升，煮取三升，温分三服，亦補脾氣。

婦人藏躁，喜悲傷欲哭，象如神靈所作，數欠伸。

芎歸湯類十五凡六方

芎歸膠艾湯一

芎藭二兩　阿膠二兩　甘草二兩
艾葉三兩　當歸三兩　芍藥四兩
乾地黃四兩

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去滓內膠令消盡溫服一升日三服不差更作婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕者有妊娠下血者假令腹中痛爲胞阻婦人妊娠婦人

陷經漏下不解者。婦人雜病

溫經湯 二

吳茱萸 三兩　當歸 二兩　芎藭 二兩

芍藥 二兩　人蔘 二兩　桂枝 二兩

阿膠 二兩　生薑 二兩　牡丹皮 二兩去心

甘草 二兩　半夏 半升　麥門冬 一升去心

右十二味。以水一斗。煮取三升。分温三服。亦主婦人少腹寒。久不受胎。兼取崩中去血。或月水來過多。乃至期不來。

婦人年五十所。病下利。數十日不止。暮即發熱。少腹裏急。腹滿。手掌煩熱。唇口乾燥。何也。此病屬帶下。何以故。曾經半産。瘀血在少腹不去。何以知之。其證唇口乾燥。故知之。婦人雜病

當歸生薑羊肉湯 三

當歸 三兩　生薑 五兩　羊肉 一斤

右三味。以水八升。煮取三升。温服七合。日三服。若寒多者。加生薑成一斤。痛多而嘔者。加橘皮二兩。白朮一兩。加生薑者。亦加水五升。

煮取三升二合服之。

寒疝。腹中痛。及腸痛裏急。寒疝 產後。腹中疠痛。并治腹中寒疝。虛勞不足。婦人產後

當歸芍藥散 四

當歸 三兩　芍藥 一斤　茯苓 四兩

白朮 四兩　澤瀉 半斤　芎藭 半斤

右六味。杵爲散。取方寸匕。酒和。日三服。

婦人懷妊。腹中疠痛。婦人妊娠 婦人腹中。諸疾痛。婦人雜病



當歸散 五

當歸　黃芩　芍藥

芎藭 各一斤　白朮 半斤

右五味。杵爲散。酒飲服方寸匕。日再服。妊娠婦人妊娠。宜常服。婦人妊娠 常服。即易產。胎無苦疾。產後百病悉主之。

當歸貝母苦蔆丸 六

當歸　貝母　苦蔆 各四兩

右三味。末之。煉蜜丸。如小豆大。飲服三丸。加芎歸湯

至十九。男子加滑石半兩。

妊娠。小便難。飲食如故。婦人妊娠



吳茱萸湯一

吳茱萸一洗。升。 人蔘三兩 生薑六兩。切。

大棗十二枚。擘。

右四味。以水七升。煮取二升。去滓。溫服七合。日三服。

食穀欲嘔。屬陽明也。吳茱萸湯主之。得湯反劇者。屬上焦也。陽明乾嘔吐涎沫。頭痛。厥陰少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死。少陰嘔而胸滿。嘔吐

桃花湯二

赤石脂一斤。一半全用。一半篩末。乾薑一兩

粳米一升

右三味。以水七升。煮米令熟。去滓。温服七合。內赤石脂末方寸匕。日三服。若一服愈。餘勿服。

少陰病。下利便膿血。少陰

赤石脂禹餘糧湯三

赤石脂一斤。碎。太一禹餘糧一斤。碎。

右二味。以水六升。煮取二升。去滓。分温三服。

傷寒服湯藥。下利不止。心下痞鞕。服瀉心湯已。復以他藥下之。利不止。醫以理中與之。利益甚。理中者。理中焦。此利在下焦。赤石脂禹餘糧湯主之。復不止者。當利其小便。太陽下

禹餘糧丸方本闕 ○四

汗家重發汗。必恍惚心亂。小便已陰疼。太陽中

烏梅丸五

烏梅三百枚 細辛六兩 乾薑十兩

黃連 十六兩　當歸 四兩　附子 六兩炮去皮　蜀椒 四兩出汗　桂枝 去皮六兩　人蔘 六兩　黃蘗 六兩

右十味異擣篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五斗米下飯熟擣成泥和藥令相得內臼中與蜜杵二千下丸如梧桐子大先食飲服十丸日三服稍加至二十丸禁生冷滑物臭食等

傷寒脉微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此爲藏厥非蚘厥也蚘厥者其人當吐蚘令病者靜而復時煩者此爲藏寒蚘上入其膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭出其人當自吐蚘蚘厥者又主久痢厥陰

腎氣丸 六

乾地黃 八兩　薯蕷 四兩　山茱萸 四兩　澤瀉 三兩　茯苓 三兩　牡丹皮 三兩　桂枝 一兩　附子 一兩炮

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五丸



孱川堂藏版

加至二十五丸。日再服。

脚氣上入。少腹不仁。（中風引崔氏方）虛勞腰痛。少腹拘急。小便不利。（虛勞夫短氣有微飲。當從小便去之。痰飲）男子消渴。小便反多。以飲一斗。小便一斗。（消渴）婦人病。飲食如故。煩熱不能臥。而反倚息者。何也。此名轉胞。不得溺也。以胞系了戾。故致此病。但利小便則愈。（婦人雜病）

括蔞瞿麥丸 七

括蔞根二兩　茯苓三兩　薯蕷三兩

附子一枚炮　瞿麥一兩

右五味。末之。煉蜜丸梧子大。飲服三丸。日三服。不知增至七八丸。以小便利。腹中温。爲知。小便不利者。有水氣。其人苦渴。（消渴）

薯蕷丸 八

薯蕷三十分　當歸　桂枝

乾地黄　麴　豆黄卷各十分

甘草二十八分　芎藭　麥門冬

芍藥　白朮　杏人各六兩

人蔘七分　芫胡　桔梗
茯苓各五分　阿膠七分　乾薑三分
白斂二分　防風六分　大棗百枚。爲膏。

右二十一味。末之。煉蜜和丸。如彈子大。空腹酒服一丸。一百丸爲劑。

虛勞諸不足。風氣百疾。虛勞

橘皮湯九

橘皮四兩　生薑半斤

右二味。以水七升。煮取三升。温服一升。下咽即愈。

乾嘔。噦。若手足厥。噦

橘皮竹茹湯十

橘皮二升　竹茹二升　大棗三十枚
生薑半斤　甘草五兩　人蔘一兩

右六味。以水一斗。煮取三升。温服一升。日三服。

噦逆。噦

橘皮枳實生薑湯十一

橘皮 一斤　枳實 三兩　生薑 半斤

右三味，以水五升，煮取二升，分温再服。

胸痺，胸中氣塞，短氣，胸痺

木防己湯 十二

木防己 三兩　石膏 十二枚，雞子大　桂枝 二兩

人蔘 四兩

右四味，以水六升，煮取二升，分温再服。

木防己去石膏加茯苓芒消湯 十三

木防己 二兩　桂枝 二兩　人蔘 四兩

芒消 三合　茯苓 四兩

右五味，以水六升，煮取二升，去滓，内芒消，再微煎，分温再服，微利則愈。

腸間支飲，其人喘滿，心下痞堅，而色黧黑，其脈沈緊，得之數十日，醫吐下之不愈，木防己湯主之，虚者即愈，實者三日復發，復與不愈者，宜木防己去石膏加茯苓芒消湯主之，痰飲

木防己湯 十四

木防己 一兩　甘草 半兩，炒　白朮 七錢半

黃耆 一兩一分去蘆
右剉麻豆大每抄五錢匕生薑四片大棗一枚水盞半煎八分去滓溫服良久再服喘者加麻黃半兩胃中不和者加芍藥三分氣上衝者加桂枝三分下有陳寒者加細辛三分服後當如蟲行皮中從腰下如氷後坐被上又以一被繞腰下溫令微汗差

風濕脉浮身重汗出惡風濕風水脉浮身重汗出惡風腹痛者加芍藥風水脉浮爲在表其人或頭汗出表無他病病者但下重從腰以上爲和腰以下當腫及陰難以屈伸水氣

防己茯苓湯 十五
防己三兩 黃耆三兩 桂枝三兩
茯苓六兩 甘草二兩
右五味以水六升煮取二升分温三服
皮水爲病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動

水氣

防己地黃湯 十六



夢山堂藏板

防己 一分　桂枝 三分　防風 三分
甘草 一分

右四味。以酒一盃。浸之一宿。絞取汁。生地黃二斤。咬咀蒸之。如斗米飯久。以銅器盛其汁。更絞地黃汁。和分再服。

病如狂狀。妄行獨語不休。無寒熱。其脉浮。中風奔豚湯 十七

甘草　芍藥　當歸 各二兩　半夏 四兩　黃芩 二兩　生葛 五兩

芍藥 二兩　生薑 四兩　甘李根白皮 一斤

右九味。以水二斗。煮取五升。溫服一升。日三。夜一服。

奔豚氣上衝胸腹痛。往來寒熱。奔豚氣病 酸棗湯 十八

酸棗人 二升　甘草 一兩　知母 二兩
茯苓 二兩　芎藭 二兩 ○深師有生薑二兩

右五味。以水八升。煮酸棗人。得六升。內諸藥。煮取三升。分溫三服。

虛勞虛煩不得眠虛勞虛勞

鱉甲煎丸 十九

鱉甲 十二分炙 烏扇 三分燒 黃芩 三分
柴胡 六分 鼠婦 三分熬 乾薑 三分
大黃 三分 芍藥 五分 桂枝 三分
葶藶 一分熬 石韋 三分去毛 厚朴 三分
牡丹 五分去心 瞿麥 二分 紫威 三分
半夏 一分 人蔥 一分 蠐螬 五分熬
阿膠 三分炙 蜂窠 四分炙 赤消 十二分



蠐螬 六分熬 桃人 二分

右二十三味爲末取鍛竈下灰一斗清酒一斛五斗浸灰候酒盡一半著鱉甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁內諸藥煎爲丸如梧子大空心服七丸日三服

病瘧以月一日發當以十五日愈設不差當月盡解如其不差當云何此結爲癥瘕名曰瘧母急治之瘧

蜀漆散 二十

蜀漆 洗去腥 雲母 燒二日夜 龍骨 等分

右三味杵爲散未發前以漿水服半錢溫瘧加蜀漆半分臨發時服一錢匕

瘧多寒者名曰牡瘧瘧

皂莢丸 二十一

皂莢 八兩刮去皮用酥炙

右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服三丸日三夜一服

欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠欬嗽

柏葉湯 二十二

柏葉 乾薑 各三兩 艾 三把

右三味以水五升取馬通汁一升合煮取一升分温再服

吐血不止 吐衄

黃土湯 二十三

甘草 乾地黃 白朮

附子 炮 阿膠 黃芩 各三兩

竈中黃土 半斤

右七味。以水八升。煮取三升。分温二服。

下血。先便後血。此遠血也。亦主吐血。衄血。吐血赤小豆當歸散 二十四

赤小豆三升。浸令芽出。曝乾。當歸十兩

右二味。杵爲散。漿水服方寸匕。日三服。

病者脉數。無熱。微煩。默默但欲臥。汗出。初得之三四日。目赤如鴆眼。七八日。目四眥黑。若能食者。膿已成也。狐惑下血。先血後便。此近血也。下血括蔞蘆白白酒湯 二十五



括蔞實一枚。擣。蘆白半斤 白酒七升

右三味。同煮取二升。分温再服。

胸痺之病。喘息欬唾。胸背痛。短氣。寸口脉沈而遲。關上小緊數。胸痺括蔞薤白半夏湯 二十六

括蔞實一枚。搗。薤白三兩 半夏半升

白酒一斗

右四味。同煮取四升。温服一升。日三服。

胸痺不得卧。心痛徹背。胸痺

枳實薤白桂枝湯 二十七

枳實 四枚　厚朴 四兩　薤白 半斤
桂枝 一兩　括蔞實 一枚搗

右五味、以水五升、先煮枳實、厚朴、取二升、去滓、內諸藥、煮數沸、分温三服。

胸痺、心中痞氣、氣結在胸、胸滿、脇下逆搶心、胸痺

括蔞牡蠣散 二十八

括蔞根　牡蠣 熬等分

右爲細末、飲服方寸匕、日三服。



百合病、渴不差、百合病

百合知母湯 二十九

百合 七枚擘　知母 三兩切

右先以水洗百合、漬一宿、當白沫出、去其水、更以泉水二升、煎知母、取一升、去滓、別以泉水二升、煎取一升、去滓、後合和、煎取一升五合、分温再服。

百合病、發汗後者、

百合代赭湯 三十

百合 七枚 擘 滑石 三兩 碎 綿裹 代赭石 如彈丸大一枚 碎綿裹

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎滑石代赭取一升去滓後合和重煎取一升五合分温服

百合病下之後者

百合雞子湯 三十一

百合 七枚 擘 雞子黄 一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓內雞子黄攪勻煎五分温服

百合病吐之後者

百合地黄湯 三十二

百合 七枚 擘 生地黄汁 一升

右以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓內地黄汁煎取一升五合分温再服中病勿更服大便當如



孱川堂藏板

漆.

百合病.不經吐下發汗.病形如初者.

百合滑石散 三十三

百合 一兩.炙. 滑石 三兩

右爲散.飲服方寸匕.日三服.當微利者止服.熱則除.

百合病.變發熱者.以上百合病.

薏苡附子散 三十四

薏苡人 十五兩 大附子 十枚.炮.

右二味.杵爲散.服方寸匕.日三服.

胸痺緩急者.胸痺

薏苡附子敗醬散 三十五

薏苡人 十分 附子 二分 敗醬 五分

右三味.杵爲末.取方寸匕.以水二升煎減半.頓服.小便當下.

腸癰之爲病.其身甲錯.腹皮急.按之濡.如腫狀.腹無積聚.身無熱.脈數.此爲腸內有癰膿.腸癰

葦莖湯 三十六

葦莖二升　薏苡人半升　桃人五十枚　瓜瓣半升

右四味。以水一斗。先煮葦莖。得五升。去滓。內諸藥。煮取二升。服一升。再服。當吐如膿。

欬有微熱。煩滿。胸中甲錯。是爲肺癰。肺癰。引千金。

白頭翁湯三十七

白頭翁二兩　黃蘗三兩　黃連三兩　秦皮三兩

右四味。以水七升。煮取二升。去滓。溫服一升。

不愈更服一升。

熱利下重。厥陰

白頭翁加甘草阿膠湯三十八

白頭翁　甘草　阿膠各二兩　秦皮　黃連　黃蘗各三兩

右六味。以水七升。煮取二升半。內膠令消盡。

分溫三服。



產後下利虛極。婦人產後。

紫菀湯三十九

紫蘞半斤　甘草三兩

右二味。以水五升。先煮紫蘞。取二升。內甘草。煮取一升半。分溫三服。下利肺痛。下利

訶梨勒散四十

訶梨勒十枚。煨。

右一味。爲散。粥飲和頓服。氣利。下利

長服訶梨勒丸四十一

訶梨勒煨　陳皮　厚朴各三兩

右三味。末之。鍊蜜丸。如梧子大。酒飲服二十丸。加至三十丸。雜療



侯氏黑散四十二

菊花四十分　白术十分　細辛三分

茯苓三分　牡蠣三分　桔梗八分

防風十分　人蔘三分　礬石三分

黃芩五分　當歸三分　乾薑三分

芎藭三分　桂枝三分

右十四味。杵爲散。酒服方寸匕。日一服。初服二十日。温酒調服。禁一切魚肉大蒜。常宜冷食。六十日止。卽藥積在腹中不下也。熱食卽下矣。冷食自能助藥力。

大風四肢煩重。心中惡寒不足。中風風引湯 四十三

大黄　乾薑　龍骨 各四兩
桂枝 三兩　甘草　牡蠣 各二兩
寒水石　滑石　赤石脂

白石脂　紫石英

右十二味。杵麤篩。以韋囊盛之。取三指撮。井花水三升。煮三沸。温服一升。

除熱癱痫。大人風引。少小驚癇瘈瘲日數十發。醫所不療。除熱。中風脚氣。同上。引巢氏。

紫石寒食散 四十四

紫石英　白石英　赤石脂
鍾乳 研鍊　括蔞根　防風
桔梗　文蛤 各十分　鬼臼

大一餘糧十分燒 乾薑 附子炮去皮 各四分 桂枝去皮 各四分

右十三味杵爲散酒服方寸匕

治傷寒令愈不復雜療

白朮散 四十五

白朮 芎藭 蜀椒三分去汗 牡蠣

右四味杵爲散酒服一錢匕日三服夜一服

但苦痛加芎藭心下毒痛倍加芎藭心煩吐痛不能食飲加細辛一兩半夏大者二十枚服之後更以醋漿水服之若嘔以醋漿水服之復不解者小麥汁服之已後渴者大麥粥服之病雖愈服之勿置

妊娠養胎婦人妊娠

猪膚湯 四十六

猪膚一斤

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和令相得溫分六服

病金瘡癰

枳實芍藥散 四十八

枳實燒令黑勿大過

芍藥等分

右二味杵爲散服方寸匕日三服并主癰腫

以麥粥下之

產後腹痛煩滿不得臥婦人產後

排膿散 四十九

枳實十六枚

芍藥六分

桔梗二分

右三味杵爲散取雞子黃一枚以藥散與雞





少陰病下利咽痛胸滿心煩少陰

王不留行散 四十七

王不留行十分八月採

蒴藿細葉十分七月七日採

桑東南根白皮十分三月三日採

甘草十八分

川椒三分除目及閉口去汗

黃芩二分

乾薑二分

芍藥二分

厚朴二分

右九味桑根白皮以上三味燒灰存性勿令

灰過各別杵篩合治之爲散服方寸匕小瘡

即粉之大瘡但服之產後亦可服

黃相等。揉和令相得。飲和服之。日一服。瘡癰

紅藍花酒 五十

紅藍花 一兩

右一味。以酒一大升。煎減半。頓服一半。未止再服。

婦人六十二種風及腹中血氣刺痛。婦人雜病

頭風摩散 五十一

大附子 一枚。炮。鹽等分

右二味。爲散。沐了。以方寸匕。已摩疾上。令藥力行。中風

豬膏髮煎 五十二

豬膏 半斤 亂髮 如雞子大三枚。

右二味。和膏中煎之。髮消藥成。分再服。病從小便出。

諸黃 黃疸 胃氣下泄。陰吹而正喧。此穀氣之實也。膏髮煎導之。婦人雜病

百合洗方 五十三

右以百合一升。以水一斗。漬之一宿。以洗身。

洗已食煮餅勿以鹽豉也

百合病一月不解變成渴 百合病

雄黃熏方 五十四

雄黃

右一味爲末筒瓦二枚合之燒向肛熏之

狐惑病蝕於肛 狐惑

苦蔘湯方闕○ 五十五

蝕於下部則咽乾苦蔘湯洗之 同上

杏子湯方闕○見麻附甘草湯○五十六



礬石湯 五十七

礬石 二兩

右一味以漿水一斗五升煎三五沸浸脚良

脚氣冲心中風救卒死而壯熱者 礬石半斤以水一斗半煮消以漬脚令沒踝○雞療

黃連粉方未見○ 五十八

浸淫瘡 瘡癰

礬石丸 五十九

礬石三分燒 杏仁一分

右二味末之煉蜜和丸棗核大內藏中劇者再內之

婦人經水閉不利藏堅癖不止中有乾血下白物（婦人雜病）

消石礬石散 六十

消石 礬石（燒等分）

右二味爲散以大麥粥汁和服方寸匕日三服病隨大小便去小便正黃大便正黑是候也



黃家日晡所發熱而反惡寒此爲女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溏此女勞之病非水也腹滿者難治（黃疸）

蛇床子散 六十一

蛇床子人

右一味末之以白粉少許和令相得如棗大綿裹內之自然温陰中坐藥（婦人雜病）

狼牙湯 六十二

狼牙 三兩

右一味。以水四升。煮取半升。以綿纏筯如繭。浸湯瀝陰中。日四遍。

少陰脉滑而數者。陰中卽生瘡。陰中蝕瘡爛者。

婦人雜病

小兒疳蟲蝕齒方 六十三

雄黃 葶藶

右二味。末之。取臘日猪脂鎔。以槐枝綿裹頭。



四五枚。點藥烙之。婦人雜病

升麻鱉甲湯 六十四

升麻 二兩　當歸 一兩　蜀椒 炒去汗 一兩

甘草 二兩　雄黃 半兩研　鱉甲 手指大一片炙

右六味。以水四升。煮取一升。頓服之。老小再服取汗。

陽毒之爲病。面赤斑斑如錦文。咽喉痛。唾膿血。五日可治。七日不可治。陰陽毒

升麻鱉甲湯。去雄黃蜀椒。

陰毒之爲病。面目青。身痛如被杖。咽喉痛。五日可治。七日不可治。同上

獺肝散 六十五

獺肝一具炙乾末之。水服方寸匕。日三服。

冷勞。又主鬼疰一門相染。虛勞引肘後。

藜蘆甘草湯 未見○六十六

病人常以手指臂腫動。此人身體瞤瞤。跌蹩

雞屎白散 六十七

雞屎白



右一味爲散。取方寸匕。以水六合。和温服。

轉筋之爲病。其人臂脚直。脉上下行。微弦。轉筋入腹。轉筋

蜘蛛散 六十八

蜘蛛十四枚。熬焦。桂枝半兩

右二味。爲散。取八分一匕。飲和服。日再服。蜜丸亦可。

陰狐疝氣者。偏有小大。時時上下。陰狐疝

旋覆花湯 六十九

旋覆花 三兩 葱十四莖 新絳少許

右三味。以水三升。煮取一升。頓服之。

寸口脈弦而大。弦則爲減。大則爲芤。減則爲寒。芤則爲虛。寒虛相搏。此名曰革。婦人則半産漏下。（婦人雜病）

救卒死客忤死方 七十

韮根一把 烏梅二七箇 吳茱萸半升炒

右三味。以水一斗煮之。以病人櫛內中。三沸。櫛浮者生。沈者死。煮取三升。去滓。分飲之。（雜療）



燒禪散 七十一

婦人中禪。近隱處。取燒作灰。

右一味。水服方寸匕。日三服。小便即利。陰頭微腫。此爲愈矣。（婦人病）取男子禪燒服。

傷寒陰陽易之爲病。其人身體重。少氣。少腹裏急。或引陰中拘攣。熱上衝胸。頭重不欲舉。眼中生花。膝脛拘急。（陰陽易）

# 傷寒雜病類方

弟子　信濃柏原公均校對



傷寒雜病類方後序

班史所録。經方之書。散佚弗傳。古之遺方。可徵于今者。唯張長沙之經而已。清徐大椿嘗類集其方。名曰傷寒類方。而我　邦吉益東洞亦著類聚方。其書出于一轍。而彼此年代相適。可謂奇矣。爾

後豪杰輩出。迭相唱和。如尤在涇諸子。亦與大椿相拮抗。皆唱古方。長沙之經。煥然復顯于世矣。蓋醫道之興廢。與氣運相應。而其顯晦通塞。有不偶然者也。昔者孔子刪詩書。定禮樂。贊周易。修春秋。弟子三千。通六藝者七十二人。可謂盛矣。而老莊之言。出於其時。東漢立辟雍。養三老。臨白虎。論五經。大學諸生至三萬人。而馬鄭賈服之徒。皆明經術。其盛如此。而佛氏之教行於其古。嗚呼異端之說。聖賢弗能禁之。況於我醫之道乎。方今圭運大闢。名師指匠。世不乏其

人。而侏離鴃舌之流。橫行海內。極其譎詭。然吾道之卓然。不可泯滅者。自存於其中焉。則何必喋喋。與之詆詰哉。牕窗喜多邨先生研古之餘。有傷寒雜病類方之著。蓋繼徐吉二子書。而集成之者。其傳播寰宇。而嘉惠後學。固弗淺鮮也。

嘗聞白氏有長慶集。元氏亦著長慶集。韓氏有黎通。張氏亦著醫通。而後世並稱不置。即此書殆亦可謂其類焉。惟常厚先生之知。有年于茲矣。平生服其才學絶特。挽頹波以回黎流。今又讀此書。喜經方之益顯于世。而異端之徒。有可

57
336



自省也。遂忘固陋。敢題數語於巻末。以
寓欽仰之意云。

嘉永五季歳次壬子季夏日

信濃　淺田惟常謹誌

江戸　成齋清熙書

邨嘉平刻

三 醫譚堂藏版