

繪下集



春林軒燈下醫訣目錄

疔疽
瓜藤疔
紅糸疔
鬚疔
急喉痺
喉疔
灸瘰
肉疔
髮疔
虫疔

腦疽
火爛疔
脫疽
咽喉結毒
單喉風
時毒
陰瘰
粉疔
骨疔
痰疔

疔瘡
紫焰疔
瘰癧
纏喉風
單喉風
血瘰
血瘰
脂疔
石疔
肺疔

甲疽 跌撲 疥風 癰唇 痰泡 口疳 舌疽 齒漏 骨槽風 腋瘡 穿窬疽 鶴口疽

龍泉疽 大疔風 脇瘡 牙槽風 附牙瘡 梅毒舌瘡 重舌 吻瘡 落唇 白敷風 杖瘡 嵌甲疽

石猫疽 齰花瘡 鼻痔 宣露風 上齰漏 舌疔 水舌 滯頤 腦漏 破傷風 湯瘡 胝疔

火傷

流注 乳岩 乳癰 多骨疽 疔毒 魚痔 梅毒 妬精瘡 林漏 楊梅瘡 陰痔 疔瘡

敗血流注 乳核 乳癰 雀巢風 痔漏 脈痔 膿便毒 囊瘡 石淋 治毒 傷寒發頤 瘰癧

乳癰 附疔疽 腸瘡 腸痔 透腸痔 腐肉便毒 懸瘡 腎瘡 婦人陰瘡 痢后風 小腹瘡

瘡癬 牙疔出血 驚掌風 凍瘡 肺風 荏班 耳癢 聾耳 座痛瘡 吹傷 瓊蛇傷 脚了作痒

天蛇毒 血箭 腎囊風 血風瘡 火丹 粉刺 油風 耳痔 疔疔 風大瘡 鈕叩風 手足破裂

合谷毒 血瘰 疥癬 膿窠瘡 天泡 酒皸鼻 白屑風 漆瘡 濕腫 崩毒 枯筋箭 眼丹

眼痔 仍癬 蟻蝥串 小兒走馬疔 瘡疔 臭田螺 虫蝕瘡 葡萄瘡 中砒毒 委中毒

脈氣 驚拱頭 小兒痘風瘡 胎疔 黃水瘡 牛程瘡 腹痛 誤吞針鍊 河豚毒 失榮

白禿瘡 小兒遺毒爛班 小兒赤燕丹 瘡癩 大人口破 僵脚蛙 陰虱 疔瘻咽喉 陰毒 瘰

春林軒燈下医談

瘰癧

毒ノ深キハ燒鑊淺キハ灸也瘰癧ハ一症タリト云ヒ惡症顯
 シタレハ不治也早ク可截割割割ノ如キ者出ルヲ候テ截割ス初
 札裏消毒飲ヲ与疔口割割ノ后毒割キ症ハ伯州散ヲ用煩症ナ
 ハ後次札消止燒鑊ハ一〇ニニ度程燒ケハ腐肉トル者也⊕和
 此ニ閉割ス杖瘰癧大渴熱癉或ハ泄瀉淋閉スル者ハ準繩ノ竹葉黃
 臣湯惡寒喘寒ニハ十全大補加荊芥于姜此又一等重キハ医王生脉
 不食吐吐ニハ參理中湯多ハ御種ヲ用ユ或ハ補中加附子于姜至テ
 惡症ノ瘡ノ四辺紫色ニナリ肉卷込六十補神内鹿茸ヲ加疽ノ微
 ハ不痛ノ粟粒少々牡羊ノ人ニハ不出疽ハ背重者也疽ハタヤスハ

色付。者也。色付ケハ紫黑色ニ成者之

疔瘡。此モヤハリ瘡アリ。治瘡。瘡疽ニ從ベレ

疔瘡。十果敗毒散ヲ用ヒ。鉞針ニテ破血スベシ。中黄ヲ貼ス。又面

部ニ瘡スルハ惡症之其内眉ヨリ上ニ瘡スルハ煩也

瓜藤疔。十果敗毒加連壳犀角

火焰疔。瘡疽テ云ハ瘡之口ノ知レヌ者之其内堅リ凝ル起ラ乱

刺ス青蛇ヲ貼ス陰起ニ瘡スル者ハ烟ノ様ニ紫黒ニナル也

紫烟疔。紫黑色ニ成テ黒ク腐ル者之至テ劇症也疔ニ別ルハ

シナシ其内ニ三小泡ヲ瘡ノ末ル之其内火焰疔ハ色赤キ也

紅糸疔。○此如ニ針ス瘡餅ハ上ニ同シ破傷濕ニ紅筋ノ引ラ

リ疔ノ治瘡ニテ宜シ惣テ疔ニハ心ガアル也

脱疽。急症アリ。黒瘡ニナツテホツクト指力薄色ニ成テ針ラスレハ

水出ル者之此後症之急症ハ初痛出ルヤ否足方黒クナル也是ハ

疔症故ニ截割ス。タトヒ截割ス。タトハ截割ス。ルナレハ生肉ヲ截テ

切ル後症ハ十補加鹿茸千金犀角湯瘡口ニ六雞蛋清ヲ左

突ニ練交貼ス後症ハ手ヲ下サザル也

瘰癧。瘰癧ハ淺ノ瘡ナリ。瘰癧ハ小キ成疔ヨリ夏枯草並

ハ散ラヌ者之真ノ瘰癧ハ用テ梅瘰癧ハ膿出真ノ瘰癧ハ出ル也

白シ馬刀瘰癧モ夏古艸並ヲ用テ消散シ真ノ瘰癧モ治スル者

真ノ瘰癧ノ強キハ奈連ニ陳一等瘰癧ノ弱キハ檳榔白刀並

湯。散腫潰堅湯。海藻ノ二丁。杏丸合方。至之膿出飛杭ヲ見

ハサハ呂飯養榮湯。益氣養榮湯。梅瘰癧ニテ骨痛ノ状ヲサハ

去膏皮湯。葛根木附檳榔。或ハ大解毒湯。瑞的丸。消毒丸。亦

用真ノ瘰癧潰シ毒ノ深キハ甘黍凡ニ分ヲ用ル等。瘰癧アリ能

カッベシ症ノ上ニ灸スベシ

鬢疽 至テ惡瘡之是モ瘰癧ノ如ク治療スベシ髮ヲ刺テ禰托
スルカヨシ頭ハ先灸治惡シト心得ベシ

咽喉結毒 治方ハ喉癰湯糞ハ向ケテ瘰癧ノ来ルハ加辛夷

瘰癧ノ止難キハ五宝丹ヲ用ル之毒ヲ推ヘ付ルモノ之然レヨリ

シマリヲナス者也咽ノ上ハ毒ノ付タルハ喉癰湯毒下ヘ付タル

咽府解毒ヲ用ルテ五宝丹ヲ用レハ益茶禁ス

纏喉風 喉癰是ハ四邊腫リ重キハ下迄モ腫キ也刺破ノ堅風

加石ヲ与ヘシ膿潰前後ハ堅風加石宜シ

急喉痺 結喉大ニ腫ル也堅風加石金鎖ヒニ齒砂ヲ加ヘ吹女高ノ

穴ハ灸ス

單喉風 片方腫ル也内藥堅風加石

單驚風 片方ニ生スル也及驚風ハ両方ニ生スニツレニ驚風之

膿ハナキ者也截割スベシ出血スル者也金鎖ヒヲ貼ス初起

肩背ノ凝者堅風加石清咽利膈ノ美候用スベシ

喉癰 至テ難症也癰候ノ傍ニ生ス準繩ニ猛疽ト云堅ク凝テ

及肉スル者也治ノ難也老人ニ出来ル者アリ清咽利膈散

針ノ金鎖ヒヲ貼ス及肉シタルハ截テセツトシテ貼ス

時毒 多ハ首ニ出ルヲ云 瘰癧區時毒別テアレモ笑ハ一種ナリ時毒

モ体ノ弱キヨリ起ルナリ是モ柴古加石ニテ推ス劇症ハ耳疼

三面迄モ痛ニ便秘スル也頭瘡ノ上ニクルハ萬黃散宜シ初ハ

柴古ニテ首迄ノ腫レヲ散搽ス膿潰スレハ伯州散ヲ与時毒兩

方ハ来ル者アリ劇症ハ首ヨリ起テ肩腋下迄赤ク成来ル患ク

スルト結毒ニ凝似スルナリ矢張柴古加石ニテ推ス之矢張流注

ノ治療ニテヨシ

血癭 外治スルヲ出来ス自潰スル様ニテ寸ハ活命久化毒ヲ用
ルヲアリ血癭動アリ癭トハアレモ餘リフタクスルハ見又之堅ク
ノ失榮ノ如シ及危スル也其内ニ故ル也血癭ハ血痛ヨリハ緩ニ
ノ運轉アル之血痛ハ多ク首筋版下上部へ出来ル者也手サハリ
硬ク皮色不変発起ノ動氣アルヲモアリ血癭血痛辨別最如
氣癭 多ハ咽ニ生ス然レ因ヨリ耳下アリ点半面ニ及フアリ急
症半面ニ及紫黑色アリ又ナクナリタリ大ニナリタリスル之此モ膿ニ
成ス者也出水シタリ出血シタリスル也初起急症緩症トニ色不変初起
十全湯而米散海藻玉壺湯急症皮色変セハ仙方活命飲之針
ハ出来ヌ之紫黑色ニナレハ痛モアリ寒熱モアリ膿ニテラス自潰セ
之者之

陰癭

血痛

内癭ノ如シ治療同シ長ク延ルヲアリフナヨリ出来ルヲモアリ
何処へ出来テモ動氣アリ運轉スル也夫故ニ治療易キ様ナ
レニ初心ノ内ハ出来ヌ者也切斷スルナレハ條挿ノ瘻ヲセ之然レ
氏運轉セヌハ難治ノ者也脈尺部カ浮ニナル者也血痛ノ毛ヲアル
ノハ下ヨリモミアケクハ鉄切テハ縫ヒクスル血痛癭治
ノ症能ハ如ク黒赤ク成テ来ルカカサノ如キ色ナリフツクト高
クナリモ孔ヨリ血カ湧出ルハ條刺核三角針ノハラニ刺テ付ケテ
針ト刺違ヒニスル也其上ト破敵ヲ貽スル之初起ノ症ト后ノ赤ク成
テ来ル症トヲ能氣ヲ付ケテ見ベシ

肉痛

癭ニル知不定堅クナルカ真ノ肉癭ニハ膜ナシ皮ト離シ
テアル之一種又中毒ト皮ノ境ノナキアリ何処カラ取テヨキヤラ
知ス運轉スルモア也コツト團子ヲツラ子夕様ニ堅クモアリ瘻

痛

リテ及肉スルモアリ治后水ノ出ル者アリ軟肉痛ト云者アリ是
癭ノ皮ノ延クガ軟肉痛之運轉セカレ凡分界ノ別シタルアリ其皮
ノ別シテアルトナキトノ徴ハ手ノ甲ヲ撫ルカ如シ

粉瘤

多ク頸肩ニ發ス治療初ノ投針ヲサシテ破歌誰ヲサシ膏
ヲセル之或ハコヲ開キ膜ヲ引出ス一モアリ肉痛トコカウコアリ
粉瘤ハ運轉スル者之運轉シ難キモアリ粉毛ク中ニ有サナリテ
アルモアリ又右ニ膿ニナル者アリ負リテ未ハ托而ナリ此痛
治シ易シ小兒耳キハニ出未ルハ粉瘤多シ

脂瘤

堅キ内ニ軟ナル如アリ中ノ物薄ク成テ后ニ膏墮スアリ
又筋ニ出未ル者ハ先生手ヲ下サス是非筋瘤トテ筋ニ依テ未之
俗ニ云疝氣筋之膏故建中ノ莖之此ハ手ヲ下スハカラス

髮瘤

此ハ粉瘤之髮ノ生スル如ハ出未モヲ包込故ニ痛ノ上ニ髮ハ着

者也治療粉瘤ニ同シ

骨痛

骨ノ枝ノ様ナル者カ下ヨリ出ルアリ一種一面ニ骨ガ高ク
成テ未ルアリ是ハ散液ヲスキ上ヨリ卷木綿ス

石痛

此ハ石淋ノ由未ル理ト同シ別ニ外ヨリ石ノ入ニアラヌ美ハ
粉瘤ノ硬キノ之癭スニ延不定多ハ骨ノアル如ハ出未ル之運
轉セルモアリ運轉セサルモアリ

虫痛

脂瘤粉瘤ノ腐リタルニ虫ノクイタル

疥癩

疥癩湯同散ノ合方吉更白散ニテ吐サスルノ消毒ヲ撰
ル一アリ脱癩トナラハ正宗ノ桃膿散人參補肺湯準繩ノ

硫黃散

蜜煉ニテ鼻服スル之肺癆ハ吐血スル者之養肺湯清
肺湯寧肺ノ美ヲ用外臺千金ノ方也

流注 痲カ有テヨリ流注スルノアリ陰症陽症瘰癧有リ別ト曰
シテ越水附又熱勢強キハ紫円ニテ下ス伯州散ヲ用ルナリ
管カ付テ膿ニテラ又ナシハ托消加及鼻勢ナキ人ハ神内ヲ用ユ
順ニ行ケハ夫ナリニテ良シ内托ヲ服スル内ニ膿ニテラ又水ノ出ル
トアリト補加附子廣東ヲ用ヒハ粘膿ヲトル又膿軟肉ニテ方ヘテ
出ヌトアリ其時ハ注ノ先ニ左突本ニ青蛇ヲ向然凡瘰癧ニ軟肉
ハ青蛇ナリノ注ヲ刺シ青蛇ハ久シクツケ推シ又軟肉ノトシテ後ハ
鮮血出ルナリ軟肉ノ出未ルハ七八分モ愈カケタル時ニ血カ膿ニテ
ルベキニ其血膿ニテラナルハ血ノ巡リ悪キ之故ニ參附ニテ補メ
ケラヌ之是ダケカ順也浮萍並ノ目当ハ血ノ凝強ク或ハ紫黑色
ニ成テモアリ管サヘ付子ハ消散ノ方ヲ投ス凝強キ程消散
易シ

浮萍並ノ功勝レタルト云可ラス流注附而疽癰瘰癧破傷
濕一切消散セスト云トナシ此目当ハ腫物凝血ノ強キ程ヨク愈
スルニテモ膿多クテハ消散セヌ也腫物紫黑色ニテ是ヲ推スルニ
堅硬ナルハ是浮萍並ヲ用ル場合也一人破傷腫ニテ踝骨内外ハ腫
シ色紅紫ナルニ此湯ヲ用ヒ内越水烏ヲ服セシメ速ニ愈タリ也如
此症ニ毎度用テ度モ功ヲ奏セサルナリ又餘ノ遠系ハ此湯アリ
テ用ハ彼ニ轉シ移ルトアリ此劑ハカハルナリ
致血流注 此症ハ小産ノニ限テ本産ニテモ月経ニテモ一切血久
ニカノリシ事ヨリ未ル瘰癧キ症ニ此症ノ目的ハ多ク服ニ生メ色紫
ナリ又堅硬知ヲ轉シ朝ニ左ノ服ニ生メ互ニ又右ノ服ニ移ル是
他症ト異ナル也然レ疼痛アリ敗液ニ痛ナシ中黄ヲ貼シ而割ハ
通経導滯湯之膿積ノモ神内托而ハ不用ハ物湯ニ宜シ膿ニテラハ

針スヘシ針ノ后寒戰ヲ発スルコトアリ是師家所謂血氣不和ヨリ来
ル此時ハ十補加乾附ヲ与フ

敗液流注

初起痛苦ヲ覺ヘス只テ痺ニ知ル皮色不変ムツリ
ト地場一面ニ腫レ上リフラクトシタル者又能推テ見ル底ニ肉
ノ凝タル如ク軟カク處リタル者マ、アリ不痛ト虽強ク推セバ痛
ク其フツトシタルコトハ未夕水也歷年モノ尙スルコトアリ痛スト云
レ必生ス生スルハ所ヲ不変ノ未ル此症謹テ針スベカラズ假令膿成
タリモ不針メ自潰ヲ待ベシ最初神内ヲ自若トメ用テ痛散セ
コトアリ自潰后ハ鷄卵左突ニ縫造分度ク刺スヘシ又下利自汗盜
汗乾吐咳嗽等ハ皆脱衣ト心得ベシ

乳癰

此ハ矢張り発背ノ如ク堅クシテ毛孔ヨリチヨチト露ノ如ク
膿出ル也サレバ眞ノ乳癰ト云ハ至テ希ク準繩云小兒乳哺之故其小

兒ノ胃抵ニヨツテ乳孔壅塞ノ内貯留凝結ノ発スト此吐乳也初ハ
湯根加石膏リ未ルハ托流ヲ役ス又堅キ凝リナクハツト凝未ルハ
煎瓜豆橘皮湯此症ヲ療リ未ルハ後瓜豆橘皮可也又一等毒猛
烈ナル症アリ午房子湯ニ宜シ是ヲ散ラズ療ハ托流ヲ使ヘシ備
外術ハ発背ノ如ク切レテ不可也膿管ツケハ能ク探リ隨分下劣膿
ノサハケヨキ所ヲサスヘシ此專要ナリ流注トハ達ヒ初言ヲ大キク
用ヘシ平症ニ破敵ヲ付ケテサスベシ多ハ灸スルコトナシサレバ至テ膏
リ強ケルハ灸スルコトモアリ極藥ハ麩散散金黃散宜シ膿管
能ク心ヲ用テ刺スヘシ若シ誤治スルハ乳漏トナリ左スルハ必脱状
ヲ顯ス者何レ補劑ヲ用ベシ小兒哺乳ヨリノ未ル癰大ナルハ皆
者也是吹乳也橘葉散ヲ服サシメ紫雲ヲ貼ス

乳岩 初起乳岩ノ徵ハ左ニ出来ルハ左脈必沈ル者也不然ハ癰也沈ルハ

多ク前症ヲ終シ殆ナルハ扱アリテ自潰セシトスル也出赤シ方肩
背癢ル者也是又岩ノ凡方也服藥ハ家方ノ仙方散聚湯加夏麻中
痛公英ニ消岩散一瓜ニ四ツク夏古草甘草二果ノ煎汁ニテ送下
下ノ儲術ヲ施シ後ハ金創ノ治術ニ從ヒ愈テ右モ能々養生サス
ス心シ入湯ノ節ハ能々瘡痕ヲ探カ宜キ也或ハ腋下ニ生スルコアリ
腋下ハ乳房ト違ヒ取ルサシ又六ケ鋪死ニ一婦人自潰シ大サ
大腕ノ如ククリ故取テ跡ヲ縫ヒ皮不足ノヨラサレ程ノ大患モ愈
タリ

乳核 乳中ニ核ヲ生スルニ岩ト核トノ別ナシ核ハ脈流ラス肩モ癢
ラス格別大キクナラヌ也岩ハ時々痛ク又推セハ腋下カ乳房カ何カ
引張痛ム又按ノ見ルニ底ニ付テ離シ不核ハ時々痛ク腋下肩背
ハ引張痛ムコトナク底ニ付テ離シ服藥ハ清肝解鬱湯ニ神功瓜呂散ニ

三ツ之餘リ自潰セヌ者也若自潰セハ扱取テ縫フニ岩ハ自潰
右モ臭氣強ク出血スル也核ハ臭氣少ナシ出血モセヌ又年六氣
遣ナキ者也

乳癰 乳岩ノ如クニテ軟カシ一人大癰ヲ患シコハ寸許リ切開キ手
ヲ入シテ探リ出セシニ事ナク皮ニ付テ出タリ其跡ヲ縫ヒ旬ヲ経テ収固
ス治ハ乳岩ニ等キ也 此症ハ乳ノ上ニ生スルニ非ス乳ノ中ニ出未テ
乳カ延ル也至テ軟カシ故ニ癰ノ名ヲ云ク

乳癰 形状癰癰ニ等シ余リ自潰セヌ多ク消散スルニ清肝解鬱
加石羔夏古中ヲ共ヘシ

乳癰 是ハ兒ノ乳癰トハ違ヒ橋皮散ヲ服シ瘡雲ヲ點ス此乳
癰ニツクト出来テ痒キ者ハ搔ケハ水出ル
附帶疽 流注ヨリ一尋堅キ者ハ流注ハ色ノ變スルコトアリ此色付

下ナシ又骨膜ヨリ生スル者故ニ至テ深キ者也流注ハ外襲ヨリ赤
フツトトシク赤ク収服膿頭杯ニ生スル其処ヨリ下ノ方必脱取
スルモノ生ヨリ膿潰スルニ至ル迄一月半或二月ナリ収針スルハ
先小豆色ノ出血ノ后膿出是骨膜ヨリ生スル故之流注ハ膿出而
血スル也外襲ノ故之何レ此症ハ骨ヨリ生スル故ニ夫ク表肉ハ
死セシモ同然之患知定知ナシ脈系ハ神内ニ宣シ針ノ位モ前方
ヲ用シ后大疔風ヲ共フ患知凸凹結毒状ノ如ナル中ニ圭水附ノ場合
也或ハ烏骨雞壳ヲ燒白湯送下ス

多骨疽 此症ハ附骨疽ト同症也但骨節多ク出ルヲ以テ各ク骨節
ヲ探ルニ骨節ナシハ探リ当リ貝合カナリト云様ナ骨ノ生骨
十ハ膜アレ故ニ音ナク手コクハ軟カク外術ハ乳岩杯ノ如ク切ルハ患
口ヨリコレメスヲ入レ中ヨリ引切レニ切レ也表ハ切ヌ様ニ中カラ廣

ク切ル之然ノ骨板ヲ以テ骨節ヲ板取兎角上愈セヌ様專要之
又肉ノ上リ兼ルニ雞肉ヲ味常漬ニシ食ハシム雞卵モ宜シ

鶴膝風

雀膝風歷節風痛風同病之痛風ハ一身走痛ノ定ル如ナシ

越水鳥ヲ共フ牽牛ニテ二三口下スベシ歷節風ハ其痛節ニ限ル之
毒節ニ付テ痛ム故ニ患知ヲ不轉痛風ハ歷節ノ初起之歷節風ニテモ
敗液油ルヲアリ痛風歷節ニ移ル寸ハオシモリト腫氣出ル之
圭芍知母湯宜シ敗液滯リ深地ニ至テハ千金ノ犀角湯一等痛
強キハ防己湯深骨ノ痛強キニ至テハ圭水鳥ノ角石宜シ痛風ヨリ
雀膝ニ移リ膿頭ニ痛三付タルハ烏頭湯ニ消毒凡一分烟疾ニ成テ
ハ烏頭湯功ナシト知ズレ一人此症ヲ患圭芍知母湯ノ附子ヲ烏
頭ニ代用影ク疼ヲ免セシ故浮萍加大黃ヲ投メ痛急ニ止ニ敗
液ス復圭芍知母湯ヲ共全愈ナリ又一人雀膝風ニテ犀角湯

ヲ用テ患起色付ニ故紫田ニ分ラ興其行滿散セリ
腸癰 大腸ニ附シ小腸ニハ付ス多ク惡血大腸ニ留滯ノ成ナリ
初起小塊出来テ塊ハ根カタラス故腹ニ腹微滿小便頻數腹
ヲ按セハ痛ニ免角疝毒上見違フアアリ患ル方ノ足ツルアアリ
腸回ルニ付ク掃コムアアリ外ニ拘挛ナシ大便秘ス初起脈弦ナリ
内ハ膿ナシ洪數ニナシ膿アリ大壯加急故虎杖而散セカシハ使
膿血ス伯州散兼用膿下シハ正宗ノ牡丹皮散ニ伯州散兼用而
ノ膿ナク血ノ三下リ塊消散セカシハ疝ノ見棄リ之下シハ愈ルニ
塊積リ強キハ外ハ潰ニ是ハ難症ニ十補加附子散セハ多ハ死ス
取中故ニ在ラ忌口ハ左突先鋒〇又腸外ノ腸癰アリ此症ハ
大壯ニテ下ラス外ハノ腹強シ遂ニ外ハ向ケテ管付ニ此症ハ
多ク臍ノ不潰必臍ノ兩傍或ハ臍下ニ附子糞米ノ自當ニ管付カハ

刺ベシ紐ハ淺クサスハシ又腸癰ハ運轉ナシ腸外癰ハ運轉
アリ大抵枚ヲモ思様ニ愈ヌモノニ塊枚ケテモ在ハヤハリ淺
クサシ膿ヲ能推出シ托流ニ左突先鋒〇準淺ニ腸外モ烟膜
ニ生スト云リ此腸外ノ説モ是ニ本ツリカ且腸内ノ症外ハ潰
ル寸ハ臍ハ潰ニ腸外ノ症ハ臍傷ハ潰ニ且腸内ハ生ル寸ハ外ハ
出ル理ナシ此症産后ニ多シ又産后敗血流注ノ變症ノ疝ト
ノ別々ハ腸癰ハ不物只女シ上下スルアアリ疝ハ塊積ヲ轉ル
癰毒 初起見分ケ殖シ肛門ノ内張キリク痛ニ種々後重ノ
氣味アリナリ或ハ世ノ臣モ大便秘ス夫ヨリ水交リ血下ルニ
内ニテ復シ故遂ニ大膿ニナル叔不大便乍痢疾ニ疑散スル
脈緊臭氣アリト痛ト寒熱往來トヲ目当トス初起ハ大壯膿出
ルハ黃連除濕ヲ使ベシ急症ハ四十日許リニ脱ス老人ハ三十日許リ

スル者之壯歳ノ者ハ二月或ハ百日位モ持コタヘル者アリ不齊
前大壯ニテ流散スルハヨシ胆門へ指ヲ入レ探リ見ルハ男女老
ラズ大壯加蓋以是ハ温ノ為ニ直腸ニ流注スル氣呆之膿至テ臭
既スルハ勞快ニ成テ死ス此時医王加赤石脂ヲ灸フ凡諸腫物ニ
ハ脈ハ洪敷ニナルモノ

痔漏 初起ニツアリ疣瘡ヨリ漏ニナル之疣瘡ヲ切シハ下ニ孔アリ
探リテ見ルハ根ヨリ肛門ノ中へ指程ノ管アリ是ハ膿前ノ後ニ
是実症之時々流注ノ如ク漫腫スルヲアリ頂丸ク痛難堪忍此
ニ管付テ来ルナリ管付ハ針スベシ臭氣甚キ者也此症多ク虚人
ニアリ叔堅腫ニテモ痔漏トナシハ是ハ流散セヌモノ也此時托而
膿出テヨリハ人禁湯宜シ此症探リヲ通セハ肛門へ通ス何レ
直ニ治療セヌカヨシ治ヲサシ底ヲ実シ補劑ヲ用ヒ込テヨリ治療ス

ベシ臭ノヨリ本管ヲ探リ拔毒紐ヲ指置フニ三日跡ハ破敵
ヲ三四日位刺ヲケハ孔大クナリ本管腐爛ス然レ後探リヲ通シ
糸ヲカケ療治ス是療治ノ支管ハ本管ヲ療治ノ后ニスベシ支管
ニ六枚ニ管ナキカ故之又管ノニツアル者アリ何レ管アルハ本管ニ
此因ハ湿氣ニ侵サシ湿氣ヲニ重皮ノ向ヘ受生スル之探リ探得
又一掃入流注陰門へスルアリ此症梅毒ヲ原ル者ニ多シ是ハ夫ナリ
ニノ置キ痔ヲ治スベシ丸スルハ閉門ハ治スル也痔ヲ治スルハ流注
モ治ス又閉門へ向ケテ腫来ルアリ外ヨリ針セヌ皮内ヨリ刺スヘシ
症ハ浅ク孔塞カカ爲ニサス之如此ルハ腫ハ消スル之又時々腫
ルナリ腫ル度毎ニ針ノ拔ベシ此症ハ麤的丸ヲ用ユ又性寒
寒批盜汗ヤトアリテ脱状ニ丸アリ脱スルハ症ノフナ卷込底ニ軟肉
出未テ生肉ヲアケヌ皮紫色ニナル此ニ雞肉味嚼汁採用ルナリ又

切又先実スハ蓋シ夕旅ニナル不実ハ難治ス

腸痔

俗ニ云脱肛痔之形腸ニ似タル故腸痔ト名ク時々脱血スル

アリ是ニ四物湯ニ地榆面青クナレ此症ハ勞ニ答ル氣遣ナレ治
ラ施可シ又痔毒ト云者アリ至テ堅シ腫シ中ニアリ此ヲ取ラ子ナラ

又之又出血シ暈倒シ面色青クナルアリ出血ハラクヨリスルハ飲ニテ
セシラ痔ハ白雲ニ血勝ヲ付推込脱肛本綿ヲ可施又蘆水メ止レ

又怨ラメ止ル又師家ノ秘系ニカナルヲ瘰ラスル或ハ脂ニ付端
切ル一時ニナスベカラス小便閉スル者之閉スレハカテイテラ可用

截断ハ三度位ニ切ベシ実スル者ハ加桑解毒ヒカヌ者ハ調和並南
シノ定又ト思ハ一糸ヲ刺スヘシ大キク急ニ瘰ラヌハ蜜陀糸ヲ

元痔

即此痔ノ糸ヲカケ可切去殊ニヨルト内ニ漏孔アル者之結々登ヲ可用

虫痔

肛門中濕熱アル故虫スル人多ハ小兒ニアリ金匱外テ蠶中湯与

又薑芥スヤシ余滯ニ思ラク是全固熱ニ積ス腹氣ノメグリ

脉痔

血痔牡痔酒痔同ニ肛門中破裂ノ出血ス加桑解毒ニ白雲

蝸牛油痔油之

透腸痔

瘡疹後ニ能登ス瘡后ニ登スルヲアリ肛門ノ四辺ハ痛シ痛シ

腹暴滿ノ痛ヲナス痔漏ニ見誤ルヲアリ疔ノ治ニ從フヘシ金ニカハル

梅痔

雞冠痔及花痔皆梅痔ノ大解毒ニ輕キハ中黃蜜キハ青蛇

蓮花痔ハ痔漏ノ誤リニ毫門凡ヲ掛テ下スベシ頑肉ハ加リ取ベシ

膿便毒

初起凝アツテ早ク膿来ルナリ或ハナリニ腐ルモノ之ニ反テ

痛ベシ

肉便毒

初起堅ク根脚深ク肉充滿セシ寸ハ上皮フクトシ紫

黒色ノ針スレハ凝血テ膿ナシ上皮ヲ缺ニテ切り破敵ヲ二音
貼シ糸ヲサス愈サレハ沸ヲ用ヒ腐肉ヲ取ベシ糸ノ刺様ハ腐塊
ハ三稜針ヲサシ其口ハ蜜陀糸ヲ三本佐刺三四日置ハ腐ルノ腐
ル速モ一時取ベカラス自然ニトル也后ハ破敵ヲ貼スル也

妬精瘡 ツクくトシタル者ハ陰莖ニ時々ムテ引込ム之龍胆瀉
肝ヲ可用並ハ中黄ノ

囊癰 此症ハ二紛ル一症アリ可考 初起囊ニ腫アツテ痛ム之濕
熱凝滯ノ陰囊ニ流注ス是ハ内托ニ伯州散ヲ可用膿アリハ針
メ左突先鋒杖毒多ク學凡ニツク者之又小腹ニサシ込死ニ紛ル
ハアリ併シ死ノ様ニ餘症ナキ改知ル也初囊ニ腫アツテ色付ル
ハ退心湯ヲ用此症腐リアリハ腐差ヲサス學凡ニアタラヌ様ニベシ
多ク及肉ノ者ハ清肝瀉濕湯ニ宜シ格別大ケ敷者ハ飛ス兎角學凡ニ

灸ヲ付ベシ

癰 會陰ニ生ス其形痛ノ如シ初起熱強シ此症維ヲサシテヨ
シ初癰ノ強キ前ハ大牡ヲ消散スルアリ 淋瀝ノ初起ト見誤ルコト
リ膿后ニハ托流ヲ與ベシ

淋病 會陰ニ惡毒濁滯リテ漏トナル之癰スル如癰瘰ト同ナク
能因ヲ向テ治療スハ初起癰ル者ハ大牡加薑蒜虎杖矢疰ノ
内ハ漬メモ良シ

石淋 陰莖ニモアリ會陰ニモアリ 何レモ切斷メ治スベシ蓋ニ
本未タルハ切斷メ石ヲ出ス尿管通ハ瘻ノ羽ノ管ヲサシ愈テ后枝
之切斷ノ法ハ下ノ方ヲキリニ針三針子リクリ原ニ縫之其脈
ヲニカト巻クク

腎癰 初起而症ノ者ハ癰疔ト異ナラス形粟粒ノ如シ治術延割

發背ニ因シ但屬瘡ハ多ハ瘻リ尻カラズ發背ノ治ヲ輕クスル
之正宗ニ下馬瘡坐馬瘡ト丸右トヨツテ名アレモ畢竟同物ナリ
一種屬瘡アリ準繩ニ脱疽トアリ一概ニ瘻ト限ルナシ瘻モアリ
瘻ハ瘻ノ治ニ從フベシ

楊梅瘡 綿花瘡砂仁瘡皆同シ初チ下疳ヲ患テ直ニハツト瘻シタ
ルハ大解加土膏皮膏門ニテ下ノヨシ又便毒引テ痛ヲ瘻シ夫ヨ
リ楊梅瘡ヲ瘻スルハ細ヤキ者ニシテ砂仁瘡ニ此瘻ヲ瘻セシト
ノ不瘻故ニ痛ヲ去ス上膏皮加遺糧ヲ用ヒ是ニテモ不瘻ナ
補湯ニ梅木遺糧兼用ニ三蛇散知酒ニテ送下ス此ニテ瘻シタ
十補湯ヲ止メ痛ノ治ラズベシ上ニ毒アレハ土膏皮加遺糧腰
下ナシハ赤電湯又肩背廻リ患キハ葛根水附之此瘻ハ腐數
化毒ノ症ナシ端的凡ハ倍飲用ヘシ叔大ニツグクト瘻シタルニ師家ニ

テ薑藥ヲ用シヒアマリ宜シカラヌ様ニ思
三蛇散 白蛇 烏蛇 及鱉

結毒 右三果各等分酒ニテ送下ス此系ヨク瘻スル之
梅毒酒疾ニ能殺ス所在不定見症不定腫ハリ不腫モ

アリ種々アリ瘻疾ノ如キアリ多ク口眼喎斜手足不遂而痛ス
ルアリ是ニ付故也至テ痛強キ者之主水附ニ膏毒一尋痛ニ
強ク毒深キ者ハ前方ニ化毒ニ分又毒脈弱ニツキ雀脈伏ニ成アリ
化毒ヲ共ヘシ若不應ハ天水丸如法天水丸ハ長ク服スルナラバ
瘻スル故ク脈強ニヨリシ瘻ハ此凡ニ急度治スルナラバ若又甚キハ
耳聾ニ成モアリ皆結毒ニ此ニハ加灸灸温服兼用初毒黃鐘打
上部ニ赤ハ心下悸スルナリ故ニ灸灸ヲ用ルノ輕キ症ハ治ス
レモ重キ症ハ大クニキ也多ク薑藥ヲ用之或ハ洗糸石硫ヲトキ

スホイトテ洗フ之此症ニ頭痛ヨリ耳聾ニ至ルアリ耳聾ニハ大三
五七故宜シ是亦長ク用雅シ又一種瘰癧ノ如ク是ヲ抓破ツテ
生テアリ又瘰癧ノ流注ノ如ク至テ空ク所在不定不腐ニハ生木
烏ニ消毒針ノ膿出テ愈ルモアリ不愈ノ病ニナリ切斷ノ愈レモアリ又
結毒モ流注ノアチニクニルリト至ル出未ル者アリ治法切斷破
敵或ハ腐リ取リ兼ルテアレハ枚毒又一種虎杖ニナリ骨痛スル者アリ
是ニハ云直散杉葉雞肉凡ヲ共ク是脱症之劇劑ハ用雅シ骨痛
テ治ハ奇良附ヲ用之

婦人陰瘡 男子下疳ニ同シ候シ毒ハ下疳程ハナキ毒ハ腐リカクル程
ノハ余リナキ毒也大解毒ニ中黄後衛治法男子ニ同シ

陰痔 初起赤リ白ハ紫也ニテリテ痛強ク交合出未カレ之假令ハ痔
ヲ痛ハ大成ハ糸ヲ切取リ小成ハ切斷ス之然シ出血多ト心痔ヘシ又

一種臭気強キアリ蛇床子湯ニテ洗ヘシ入湯候シ遂込ト口中臭
シ或ハ滯下毒ニテ臭キアリ

傷寒飛腫 即時毒也 傷寒后震后ニ發ス之初起紫舌加石膿ニシハ
枯流此症痛強キアリ又癩瘡モ同物之然レモ頭大ニブツト

腫ル

痢后風 痢疾后ニ浮腫ノ手足杯ニ生ス膿ヲモハハ此ヲ初起ニ

準繩ノ代令湯多ク此方ニテ治ス骨節疼痛ヲ兼見ニ越木烏

ヲ共不田ニ愈ク

痼疾 手ノ握リツメ足ノ踏ツメニ生未ル者之色ツカスニ痛アリ頭ハ

突起セヌ者之越木烏ヲ共フ膿潰シ之ハ托而時毒ノ毒ハ

瘰癧 正宗ニ定知分タストアリ多ハ十指ニ生スル者之是症ハ初メ

肉中赤ク色ツキフウワリトクシ未ソ痛ニ甚キ者之小ナル者ハ

豆或ハ粟粒様大ナル者ハ梅子様之多ハ初メ赤クシヨ白黒ク成者
之其内ニ筋帯積潤スル者也劇症ハ渴シ且謔語アリ治法初起見
付タラハ切テ腐肉ヲ取ベシ腐肉取レヌハ切口ニ瘡ノ如ク臭ク腐
肉尽テ灸ヲ止ム立物大魚腸ヲ共腐肉トシテ台痛強キ者アリ
此ハ凝血強キ故ニ正宗ノ乳布止痛散或ハ郭氏定痛托裏散
小腹瘰 正宗ハ暈アツテ瘰ノ様ニ云テアヒモ多クハ陽症ナルモノ之粟
粒ヲ飛ノ后ニ星色ニナル也此ハ腸ニ近キ故ニ皮肉切ベシ方ハ
神内十補之灸ハヒツコクスヘカラス脘上二寸ニ灸スルアリ中灸瘰瘰
瘰ト云正宗ニ脘下ニ灸スルヲ腹瘰トアリ矢張小腹瘰也
鶴口瘰 尾翳骨ノ上ニ生スル之初起ハ瘰ノ様ニ出未テ陰伏ナリ者
也痛シモ不甚シモ深ク腐ル者之瘰形大サクテモ瘰瘰ノ治法初起
ベシ多ク内ノ薄キ処ニ出未ル者之灸スベシ若年ノ者ハ生ク老人ハ

ハハ死ス正宗ニ漏ニ十九トアレヒ此ハ痔漏ノ誤リ之治方托内神内十

全内托或ハ十補附子

龍泉瘰 虎鬚毒 龍泉瘰人の中ニ出未ル虎鬚毒ハ瘰ニ灸ス

正宗ニ瘰トアルカヤハリ疔也治法前ノ如シ

石榴瘰 ヒジリリ寸ニ灸スルヲ云附台瘰トハ別ニ付治瘰ハ堅ク瘰

ヲ指先迄腫来ル也此ハ至テ陽伏ナル者之是ハ瘰之石榴瘰ハ初起

赤ク台黄色ニナル也次瘰ニ大ニナリ来ル者之正宗ニ灸スベシトア

シ氏灸ノ瘰ハナキ也故ニ針ノ中黄ヲ貼ス

穿踝瘰 足ノフトラヨリ灸スル者也骨膜ヨリ灸スル者故ニ骨ヲ

ツキトウス希シ矢張骨節之初ヨリ紫黑色ニナル者之浮萍並ニ

蒸スヘシ初起越木烏ニ紫丸又前散セヌ久敷スルト盜汗出テ

勞瘰様ニ十九者之治ヲ淺ク刺スベシ疔也ハ圭文加黄散

大麻風 補天丸脱疽ノ如ク痛強ク里腹ニナリハ水乃俾ラ果
凡トナレニ三分ツ用之

翻花瘡 正崇ニ一種ノ腫物ノ様ニアリ此諸腫物皆又花ス者
也其内肉痛治毒血瘧水及花シ易キ者也脱血シタル瘻瘻瘻テ

服養之ヘシ而心ノ内ニアマリカラスルトソ用シハ出血多シハ三ツコ
取カヨシ又竹筴鐵筴ニテコソケレハ生肉能別ツ者也

腋瘻 腋下ノ瘻也フツキタル者モアリ然カレ者モアリ針ノ后

托流ノ瘻ク切ニ及ハス
脇瘻 腋下ノ下ノ出赤ルニ是ハ陰症ナル者ハ羸瘦ノ勞状ニナリテ

死スル者アリ輕クシクムヘカラス瘻ヲ深ク指可ラス痛強ク針
毛膿ノ出又赤アリ

鼻痔 鼻茸ノ初起赤クヒラクナル者也是ハ鼻蒂赤ク流

シテシマウノアリ或ハ礪砂ヲ吹ベシ流シス大ニナレハ截断スベシ切ロ

ヨリ又出未ス瘻ニ礪砂ヲ吹ベシ方ハ辛夷清涼飲

骨痛風 齒ノ根ヨリ生スル者ハ齒ノ莖セテ居ル処カラ生ス口角

カヌノカ骨痛風ノ徴也膿ニ成リ腐ル也患キ齒アリハ枚ク也先

清陽散火湯ニテ帛拭ヲ解ノ后齒ヲスリ也輕キハ指ニテアケル又ハ

萬カニテアケル也齒ヲ枚齒ニ齒骨カ付ノ齒ヲ枚タル所ハ

取テ燒錢ヲアテル也又又ノ灸ヲスル燒錢ヲアテルモヨシ

牙槽風 上腭ニ出未ル者也外ハ鼻潰スル症ハ外ハ枚クニ毒ノ

強キハ外腭ノ骨迄付者又額骨迄付症モアリ痼疾ナレハ毒

木附翁的凡兼用牙痛風ハ齒ノ根ニ腫物出未テヤケル候ニ

痛ト一ヶ條ニアリ疑ニ干故此ニ識ス

宣露風

俗云齒中ノ清胃散老犀或ハ甘露飲蓄微露ニテ時々洗フ之金鎖七或ハ白龍散ヲ付ク格別痛ナリ齒

齒漏

宣露風ト毒ハ也宣露風ノ様ニ散漫セヌ之銀骨板ル者ニタトハハ齒齦岸ノ底見シタル様ナル者之清胃散三ハ膿少シ出ルカ軟肉ニテハ又ケヒレヤコレヲ燒酎ニテトキスホ

附牙癰

親知ラスノ処ハ癰多ク及肉ス齒ノ外ハ生ス初起赤ク凝テクル寸ハ血ヲトル也加果清胃散ニ老犀及肉ニセツトレヲ貼ス膏ル之初起頂ヲ生スル寸ハ利剪刀ヲ以テ截割スト未成及肉スレハ不治也

上齶漏

上齶癰ノ膏リ板タルヲ云之

舌疽

医宗金鑑云初起ハ舌ノ中ハ向テ堅ク成之漸々腫レテ潰ハ一度膿少シ出ル之瘡口ヲ閉キ遂ニ及肉ヲ出ス者之矣此ハ膏肉ノ上ニ核ノ聚ヲ敷テ其上ヲ燒鑊ニテ燒之又ハ昆布ヲレリ也蟾蜍ヲ水ニテトキ燒鑊ヲ當テ跡ハ付ル也竹茹魚連陽或ハ筆尾ノ甘露飲又肉ノ処セツトレニテ膏ラス一モアリ蓄微露ニ洗ヒ苦實散ヲ搗塗ベシ甘朮丸ヲ用エ初起塊ヲ結フ寸正中ヲ針ニテサス之凝血而散スル一モアリ一切金粉散ヲ以テ塗ス多ハ不治之準繩ノ牛黃散ヲ用テ可也竹葉ニテ服スル之

微毒舌疽

治毒ヨリ発スル症ハ同シ一多ク及花セスニ膏リ込希ナリ初メ膏リ込テ后ニ及肉スル者之治洗薑付茶等真ノ舌疽ニ女七異ナリナシ其内梅毒ノ薑葉ヲ用ル一モアリ異ナリ一舌強ラズ臭多ク或ハ舌疽程脱スル一ナシ甘朮丸咽症解毒或ハ

五宝丹消毒藥的凡ヲ用ル下アリ

舌痛 多ク切取レし肉痛之治無名異血勝ヲ雞卵ニ煉付ル
或ハ蟾蜍ヲ塗ル出血スル者之初ハ膏ハ手ヲ下ス可ラス

口痔 與定処鉄ニテ切リ去リ金鎖ヒラシク

重舌 切去リ后正宗ノ黃連湯ニ湯金鎖ヒ隨分本ヨリ切ル之及

肉セ又膏之

木舌 舌厚クナリ痺シ強ハル也故ニ言語ワカラス此症舌下ニ青紫

始アリ針刺シ血ヲ放之竹茹黃連湯

痰泡 初起舌下ハ腫ル而長ノアゴノ下ハ及フ者之舌下ニ腫ル

寸ハ舌下ニテ放ク舌下テ放テモ又滿ル故ニ頤下ニテ舌迄下ラ

ス之准ラサレ千金流氣飲或ハ托而

吻瘡 風寒ニ襲レテ血モ枯燥スルヨリ生ス心泉逆逆散荆艾地芎

皮美ハ中黃

滯頤 通心飲阿仙菜ノ末振カケ或ハ砂貼散餅カスト振撒ル之

此症遺毒アラハ日永丸兼用スベシ

繭唇 多ク上唇ノ硬クナル者之出血多クスル故切ラシス青蛇

ヲ貼久黃連解毒口中ニ血袋ノ様十餘物出未ルヲアリ毒ニ

針スハカラス血出テ止メ者之考ルニ急ニテクリ取カヨカラ手

藩唇 小兒疳疔遺毒ノ后ニ發スル者之此症ハ唇ヲシ爛テ膿

ノ出ル者之突大腫スル者ナシ毛繭唇ノ様二人中ハハ出未ス者

繭唇ハ痛ニ強キ者之藩唇ハ中者ヲ貼ス

腮腫 直ニ頸痛スル者其后ニ發スル者アリ極毒ヲ未ル臬

散散 腮腫ハ風熱ヲ引未ル毒疾清涼散黃鐘散極毒

有毛無毛消毒ヲ兼用ス之腮腫ハ臬瘰癧スル者之臬散

ハ輕キ症脇漏ハ重キ症之肥漏ニ西花ノ失能應スル之梅
氣アリ人鼻ヲ引膿ノ出ルヲアテハ此等古以石蓋ニテ夷

癰疽

一種行ナマツリ黒腐病ノ末ヲ酢ニテ割ニツテ午後陽
ニテ洗ヒ三四日ニテ愈ルノ黒キ毛治法同シ黒キ也正宗密
陀教牛黃散丸散録ニ出能キク

白駝風

癰ノ一種也

破傷風

剛症之打撲損傷アリ凡氣襲テ此症アリ之寒
戰振慄身背強舌強脈微濡瘡口乾燥スルカ此症ノ徵也
此症ニテ六口禁ノ前弓及張スル也前弓ノ症ハ先某ヨリ腹
鼓ヲ懸ヘシ其後合谷ニ針スベシ振慄寒振ノ強キハ當敵
四逆加虎杖無患子肩背強リ舌強リツヨキハ葛根加麻扶
風患子皮或ハ的里聖加サフヲ用ニ種瘡ヨリ水氣襲テ

腫痛ヲナス症アリ越木烏ニ中黃ヲ點スヘシ哮喘ニ云此旨

リ凡入テ破傷風濕入テ破傷風ト成トアリ破傷風ノ症

テ自行ノ出ルハ推症之師家云流注ト破傷ト其形相似

其因非之流注ハ破傷濕他症ニ流注スル也破傷濕ハ其場ニ

テ腫ル也

跌撲

氣絶シタルハ合谷ニ針シ清風ノ活ヲ入ベシ若高登ヨ

リ落テ陰囊ヲ打テ口ノカス者アリ是ハ口中萬カニテ号

アケテ固生散ヲ吹ヘシ骨ノ折タル処ヘハ能引延メ法ハ

ク楊柳散雞卵酢ニテ煉リ付ヘシ其上ヲ卷木綿シテ之

トニテ蒸ベシ一通リノ症ハ如淫陽ヲ用之又腰背ヲ打テ便秘

スル症ハ大成湯ヲ用ニ腹ニ瘀血ノ凝アルハ桃仁承氣湯

ヲ用夫ヲ倍置腹瘧ニナル者之凝血シタルハ針ノ血ヲ取

へし其跡ニ楊杞散或ハ妙散教ヲ付ルニ一徑腰杖打テ半
年モ一年モ痛ム症アリ是ハ敗血ニテ打撲ノ導滯湯用
杖瘡 杖ニテ打レタルヲ云凝血ニケル処ハフラシトテ蒸スヘシ劇
症ハ瘻リ救ルヲアリニ黄結痛湯ヲ用ユ

湯滌 火傷 二症氏ニケルノ知リ大赤之惣身モ焼ケルハ馬
ノ油ヲスリテ可シ柿ノ院ナド用ル人アリ是ハアシノ都テ洗糸
ハ患シハ瘻ヨリ屈シケル故ニ屈伸サスルトヨク心得ハシ又
内攻スル症アリ先四順清涼飲ニテ推ベシ若迫リ強ケレハサ
フラシラ童便ニテ用的里亞加ヲ用ルトモアリ

甲疽 俗ニ云ツマハラニ又瓜マリ氏云多ク瓜ノ板ケル者ハ瓜ノ
カラ及肉スル者也瓜ヲ取リ青乾ヲ貼スル也疔瘡内癩治湯
五物大黃湯準繩ニ瓜甲疽ノトニナアリ瓜甲疽ナレバ代柿ト同シ

丁ノ指頭五々共ニ灸スル者アリ敷疽ト云治疥甲疽ト同シ
嵌甲疽 竇端スレ湯火傷ノ如ク水泡ニ其水泡ヲ刺テ白雲
ヲ貼ス準繩ニ瓜甲疽トアリ嵌甲疽ノ疽ノ字瘻ニ依ルカ宜シ
カラニ字瘻ノ字ハアマリ仰山

眠疽 トコスレ此症気血仕ナル者ニテ長病而轉倒スルト不能
帯之血氣巡ラズ大皮ニ生ズルニ右ニ黒瘻ニナルアリ毒ハナケレ
殊ノ外瘻ル者ニ此症ヲ患ル者ニ全快スル者少シ然氏初起ニ
中黄ヲ貼シ置ケハ氣血巡リテ愈ルトモアリ黒瘻ニ成テハ准繩ニ

瘻瘻 后世俗ニ云積聚瘻之所養不定脚下一モ疔瘻ハモ未ル
外ハ瘻リ救ル者ニ非ス其塊ヲ推セハ大ニ痛アリ運轉スルモ之
上ハサシ込トアリ腹瘻ニケルノ様ナレハ小腹ハ瘻リコト者
三四年モノカラ膿ヲ瘻ストアリ血塊ト能効ルノ者ニ血塊ハ

不痛カ目的ニ血塊ヨリハ浅キ者ニ膿潰ノ外ハ後ニ必死ス預
言ニ大牡ヲ用テアルモハ物湯可ナラシカ此症ハ男子ニ限ラ
ス多ク在ノ方ニ從スレハ左ノ足カ痺ルトアリ正テユレハ圭木
烏ノ症ノ様トドヤハリ膿ニ目ヲ付ケ阿魏加皮散ヲ用テ
経閉ルル症ハ枳当丸或ハ兩塊凡ヲ用ルトアリ経閉ニ虎杖
根カ必附子割ヲ可用ラズ

天蛇毒 準繩ニ天蛇頭ト云指頭ニ出ルモノニ初起痛之甚
キ寸ハ針スベシ治方ハ五物大黃湯潰スレハ此所ニ

合谷毒 正宗ニ疔ノ類トアリヤハリ疔也準繩ニ虎口疔トアリ紅
糸ヲ引希也初起十疔毒紅糸ヲ引ニ至レハ疔瘡内ノ黄
連解毒ニ

牙縫出血 卒ニ齒クキヨリ出血スルニ血勝ニテ毛押ニ齒ノ痛疾

清胃泻火湯ニ黃加芒硝ヲ用テ或ハ縛血散ヲ用ルトアリ

血箭 毛孔ヨリ出血スルヲ云毛孔ニ限ラズ出ル者ト云或ハ灸

瘡ヨリ出ツ是ハ細ク糸ノ様ニ出ル者ニ多ク出血スレハ物湯ニ黃

加芒硝糸リ多ク出血スレハ死ス

血痣 所從不定多ク面部ニ聚スルモノニ小ク赤クイキゴノ様ニ出

来ルニ天窓杯ニ出未テ髮ソリニテ能ソルトアリ是ハ能及花スル者ニ

糸ニテ取テシ

驚掌風 手足ノ皮肉チク成テ皮ノ出ケル症アリ但名異白雲奇

點ハ尿通遙加荆艾地骨皮或ハ丹荅枯荅九倍子此付糸ハ爛

ヲノ愈ス為之又大楓子ノ皮ニテフスブルトアリ其跡ハ桐ノ油ヲ

塗込ニ如此スルト毎日常ニハ愈サレヌ者ニ長ク養生スベシ治スル

者ハ皮ノ厚キハヨクニメスニテテリトル下シ

腎囊風 猪苓湯一合方極盡ノヲルハ大解毒ニ付

系ハ大黃也此味子散ニ猪苓ヲ加テ洗フアリ

疥癬 此症ハ初メテ敷加大黃出兼ル者ニハ三蛇散ヲ用テ張ラツ

ケル也或ハ葷肉ヲ用テバツト出クル也テ從草解毒湯カセロ入

湯サズベシ又早ク出スニ猪苓又内攻ノ症ハ山脇ノ赤小豆湯

ヲ用テ是劇症ニハ能キクニ世ノ位ノ向ニボツク内攻スルアリ

是ハ緩症ニ此ニハ仙遺糧ヲ用テ内攻呼吸息迫ノ症治洗丹ニ

テ下スベシ此系ハ治洗丹ヨリ衝心ノ強キニ用テ急症ニハ灵砂

凡モ七外ヨリ一更適用ルニ右ノ症ニルニミタラハ仙遺糧ヲ用ヘシ

膿瘡 俗ニ云ハハ干瘡也一ニ催赤瘡ト云初起輕キ者ハ春秋出

ル也荆敗ニ紅ノ末ヲ加フ當飯粘痛湯楊梅刺反湯銀荆湯浮

萍加大黃湯出血ソエケヒレヤコレヲ付上皮ヲムクベシ其上付ベシ中

黄ヲ貼スヘキナレトモ黄ハ早キ也破敵ニ三遍モエケヒレヤコ

ニラ貼ソムクベシ若又此方ニテ治セカレハ蛇子ノ末ニテ洗ベシ劇

症ハ龍門丸ニテ下スベシ

血風瘡 血ホロセク一身ハコマカクハツト發スル者ニ色赤ク瘡ニ

アリ極ケハ黄水出ル也正宗ノ消風散平血飲防通散可撰用

膿窠瘡 手足遍身ニ生シ痒ミアリ極ケハ黄水出テ其水臭氣

アリ小兒遺毒ニ能アルモノ之血風瘡ノ様ニ赤シハナキ也寸見

ハ疥癬ノ様ニ現スル者也早ク愈ハス消風散或ハ浮萍加大

黄小兒十レハ大連克飲

凍風 霜笈之毒敗建中出血セハ中黄ニ烏頭並或ハ茹子ノカラニ

テ洗フアリ惡クスト脱疽ノ色ノ様ニ覆ル者アリ圭水烏ヲ与

火丹 風邪ニ侵サレ肌膚ニ粟起シ色白ク或ハ赤ク雲片ノ也ノ

上ツラ痒クノ痛アリイテスルニ発熱憎寒ニ甚キハ振慄不
十敗或ハ黄連加犀角中黄ヲ貼スベシ初心ノ内ハ漆瘡ト見誤
ルコトアリ此症所発不定ト云ヒ多胸乳ノ間杯ニ多シニ種腰ノ
辺ハ発シ発熱スルコトモアリ正宗ニ纏腰丹ト云又對口瘡ヲ準繩
ニ火帶瘡ト云此症ハ丹毒ニ纏腰丹ハ輕キ者ノ少ク赤色ヲ
水泡ヲ発スルコトアリ推テ不痛及テ着物ニサワシハ痛ハ水泡ヲ
ツケテ中黄ヲ貼スベシ荆敗ヲ用ニ準繩ニ赤游風白遊風ト云
アリ正宗ニ濕火丹ト云アリ痛少シ乾火丹一本抵強シ白膿ノ出
ル者ナリ火丹ハ膿カ黄ニナルニ白游風ハ濕火丹赤游風ハ火丹
ナリ治法同シ

天泡 水泡ノツケレタル様ナ物ニ水泡ハツケテ赤シ夏多キ者ニ起氣
皮膚内ニカクシモルコトヲ不得夫故ニ出未ルニ大ナル者ハ大矣

程アルニ清解ニ中黄涼劑ヲ用ベシ昔ハ涼膈散正宗ノ解毒瀉
心湯ヲ用ニ

沛風 面部ニ出未ルモノニ顔ノツケテ様ナ者ニ清解ヲ用フ
粉刺 ニキビニ防通散ヲ服シ天花粉ヲ又ルベシ瘡根ヲ能ク拔
レハ痕星クナルニ

酒皰瘻 格ノ出血ノ秋貼散ヲ貼シ上皮ノ星キ起ラムクニ防通

黄連抱子大黃湯

雀斑 ソハカスニ多ク女子ノ面ニ生ス正宗ノ玉容散ニテ可洗玉肌
散ヲ塗モヨシ

油風 衣氣ノ回リ悪キ故ニ多クハゲタルアリハゲテ直ニ治セハ易生

也久メハ不治海艾湯ニテ洗ベシヤクハニ成丸ヲ不治ニ

白屑風フケノコトニ種天窓ノ地カ赤リ成テフケノ出未ルアリ防

通ニ黄鐘散煎用スベシ

耳疾 傳耳 耳タレノトク 蔓荊子散ヲ與テ椰子油ヲ流シ込メ

ハ治ス

耳痔 目ニ見スル程ナレハ切トルベシ或ハ糸ヲ截テ切リ落スベシ

疥瘡 面部ヨリ四肢迄ハラウクト出テ寒熱振スルトモアリ湯モ

アリ是ニ先荊散ヲ与フベシ參蘇久ニ紫蘇ヲ倍加シ用ルツアリ

必愈シ若ク用エハカラス洗糸ハ荊蘇湯乾床子並ニ灰芒硝ヲ加

テ用ヘシ内攻セハ化斑化毒越婢湯ヲ用ヒ或ハ藍葉ヲ加ウ

此方ハ方彙ノ荊散ニアリフニヨルト一所ヨリテ瘡蓋ニナルトア

リ其上ニ紫雲ヲ貼ス

座席瘡 座ハ子ブト席ハアセホ正宗ニハアセホノミノトアリ此説

誤リ之浮萍或ハ天花粉西瓜汁モ佳ク

疥癩

天地不正ノ氣ヨリ来ルトアルカ飽食ノ膠胃ヲ傷シ

疥癩ノ為ニ発スル者之或ハ耳下ハモ及フ者之初起此甚キ者之

鬚搖杯スレトアリナ散或ハ柴石ヲ用エ併シ此症ニ厚風加石勝

ル方ハナレ外ハ半黄ヲ貼スベシ膿ニナレハ先鋒ヲ貼ス内托ス

ヘシ多ハ駐風加石ニテ消散スル者之初起毒強ケレハ紫凡ニテ下

スベシ

濕腫

破傷濕也破傷ニテ少ク腫漫ノ起々ニ流注スル者之是ハ

破傷流注ノ小ヤキ者ト思フ

咬傷

人ニカマシタルハヒドク熱ノ劇シキトアリ人ノ怨テカミレハ痛

強ニ棉帛咬シテ脱疽狀ニナリテ星屑皮ニナリ痛々清々出血スレハ

血勝傳血散痛ノ強キハハルサレヲ用ヘシ大根汁ニテ洗フモ可也下

散或ハ烏頭湯着天毒上攻ノ守甲杯亦リ成膏アリ能診シ破血ノ毒

扱ヲ竹クシニ其ハ中黄履六破敵此症能及及ニシガル者ナリ
治公及花瘡ニ同シ

凡大瘡 劇キ者ハ毒気ニ迫リ膿満ノ寒抵スル者アリ此症ニ黄
連解毒木鼈子ヲ多ク加ベシ眼腫ソ任ノ和リ成テアリハ毒
ノ散ルテアリ多ハ荆敷加雄黄紫丸ニテ下スベシ瘡口ニ人糞ヲ付テ
大灸スベシ是ハ糞ヲ焼込為之其糞ヲ取リ破敵雜冠雄黄ヲ
用ベシ一奇方防通ニ雄黄ヲ加用ヒ日々紫丸ニテ下スベシ三四日
注テ墨豆ヲ食ハシメ生臭キハ毒ノ抜タルニ毒ヲ尽サハ暎クナキモ
ノハ毒尽シハ瘡口潤テクル也脈ハ弦數ナル者ニ

鼠毒 十散茅根ヲ加用ベシ雄黄中黄ヲ貼ス又一方ニ香ヲ服シ夕
リ瘡口ハツケタリスルテアリ或ハ紫丹ニテ下スベシ兎角内攻セヌ
様スハニ別ニ青鷲ヲ燒食ハシム

蝮蛇傷 先瘡口ノ邊ヲ亂刺ス只雞冠中黄ヲ貼スルニ豕肝散
ニテ圍ムハニ内ハ烏頭湯腫強キハ十散及鼻散ヲ日ニ三々兼用
ス此症ハ毒ノ浅深ニヨラス紫丸ヲ多ク用ヘシ何カ出血ヲ多クハ
鈕叩風 指ノ腹ニ飛セヌ多ハ頸首項背ニ侵延スル者ニ飛シ様
カ痰癬ニ似タル者ナレモ痰癬ナレハ梅ニ飛スル也此症ヲ以分ツル
此症癩痒甚ク搔ケハ爛シテハヒコル也治公ハ痰癬ノ如クシテナリ
異之簡風散浮萍加大黄或ハ痰癬ノ湯茅モヨシ銀荆湯土天
黄並或ハ各散散ラ貼ス

枯筋筋初起粉刺ノ如クニ面赤暈アリ多ク胸乳ノ向ニ出ル者ニ
日久ノ潰爛ス其後魚ノ目ノ如ク赤色ニシテ光ル頑肉ニ其頑肉
次第ニ長大ニ成ス荆敷ニ薑蒜仁ニ果ヲ眼サト不治者ハ痒ク
頑肉ノ根ヲ切斷ス也切后青蛇ヲ貼ス隨テ生肉(カケテ)切ラテ

治公及花瘡ニ同シ

物也。内清解ヲ用ヒ劇キ症ハ竜門丸ニテ下スベシ

奶癬 小兒頭上三面コヌカノ如ク出来ル者之甚痒シカケ汁
出テ愈難キ者之連竟飲粉の凡外中黄或ハ紫雲ヲ貼スヤ
ハリ遺毒之

驚拱頭 一名腦猪準律ニ取節ト云俗ニハス子ト云或ハ頭分ト云
皆也小兒胎毒ニテ頭上ニ生メ多ク膿ニナル者之膿ヲ推セ直ニ
赤クナリ光リ出ル者之針ヲ破歛ヲ貼ス蓋差ニハ先鋒内會ハ
托而ヲ共ウ此症復月ニ多シ膿潰后ハ丸突ニ蛇皮ノ末ヲ煉
合セ貼スルハ瘡根出来又之

小兒遺毒爛斑 此胎毒之此症諸症ヲ顯スト云此多ク肝内陰
囊膜下眼目頭上各ニ瘡ヲ発シ爛ル者之大餅ニ粉の凡或ハ
連竟飲甘茶凡紫丹竜門丸ニテ時々下ベシ諸症治方多クト云此

羊之尽シ推シ故ニ畧之

蜈蚣串

初起肝門ノ白辺ト生ス痔漏ニ紛ル者之痔漏ハ本

管アリ此ハ本管ナシ尺四辺トケラ虫ノクノリ丸如ク漏ラナス
故ニ名ヲ内羊葛根加木附粉のヲ用ヘシ若脱症ヲ見ハサハ補
ハ物杯ヨシ各切斷シ破歛ヲ貼ス治法諸毒ノ如ク夜涼候論ニ
九漏ノ名アリ準律ニ久シキ漏瘡ノ諸漏ノ名アリナシ此流注
附骨疽其他諸瘡名ノ三イハス或ハ誤治又漏ヲナセリ瘡名
ノ九漏杯ト云テアリ此白ヲ以テ名ツク故ニ畧ス

小兒瘡風瘡

瘡后湯杯ニ厚ク付ルヲアリテ凡邪ヲ受ル故ニ瘡

瘡ノ如ク總身ハ油カナルモノ出ル之連竟飲浮萍湯持々茶

凡テ下ス下シ或ハ荆芥湯ヲ洗モヨシ格別ニ惡ベキ症ニテ

小兒赤游丹

此ハ三四歳ノ小兒ニ限ルト云リ周身ハ赤斑ヲ發シ

呼吸急迫之或ハ驚搐ス治ヲ速ニセカレハ傷亡ノ死スル之
委中尺沢ヨリ血ヲトリ毒ノ所在ヲ見定メテ血ヲ取ベシ方ハ
犀角消毒欠或ハ黃連解毒加犀角便秘スル者ハ紫雪或ハ
調胃承氣手ヲ下スルモアリ外其ノ紫雪撰用スル此症大人
ニ発セシト見タリ然レハ古今ノ説ナレハ先後テ矢張丹毒ヲ
治セリ此症多ク瘰癧附骨疽大流注等ノ治療中七八ノ過
テ多ク発スルヲアリ外其ノ根加犀角或ハ黃連解毒湯之準
履火丹門ニ小兒此症ヲ患ルハ危危ト云リ正宗六赤遊丹ハ
兒ニ限ルトアリ全ク不然治物ニテ能談スルハ小兒赤遊丹ハ
大人ハ丸丹ノ劇症ト同シ初起赤班ヲ發シ暈ノ如雲片此症
凝血甚メ右里ク瘰癧ル者アリ是ハ不治也
小兒走馬疳 初起一瘡ヲ生シ紫黑ニナリテ瘰癧ル之上アコトハ上

ア瘰癧ル劇キハ半面モ瘰癧ルモノ之方ハ清胃散ニ堯犀子治
キノ症之多症ナレハ一日ニ死ス緩症十ハ十日程迄ニ死スル之金
匙ト白毫散ニ姓ノ里需糸根ルニ大人ニモ此多ク瘰癧也
胎疔 中ハ敗液之正宗ノ五福化毒紫因ヲ用ルルトアリ上ニ青
蛇ヲ貼ス至テ軟カナル者之中ハ液ナリ也
瘰癧 瘰癧ノ疔餅毒聚リテ所在不定発スル之瘰癧ハ骨ヨリ
生スト云リ故ニ瘰癧リ骨ノ多ク骨ニ付テ瘰癧骨ニ成リ膿ヲ
リト見ハ早クサスベシ針ノ雞卵左突注ヲ十補ヲ貼ス此
症発スル死不定ト云レ多ク手足ニ發スル者ハ長ク愈サレ者ハ
必治ヲ強クスヘカラス
瘰癧 此瘰癧中ニ紫粒ノ如ク色紫黒ニシテ痛甚ニシク嫩熱シ瘰
腫ハ又赤之疔ノ治法ニ從ベシ凝血強シト見ハ破血ノ膏乾

ヲ船べし

黄水瘡 俗ニ云水瘡之頭面頰骨へ出テ黄水ハ流シ案
粒ノ如クツクノトノ一面ニ蔓ルモノ之瘡雲膚解情上防風

若粉散ヲ付ルモヨシ
大人口破 舌上及唇ニ小瘡ヲ生シ乾燥ノ破裂ス此治法也

門十兒粉瘡ト同シ

臭田螺 足ノウヒラノ上ヲリカバミノ処ニ生ヌ初起白ク腫テ

痒ニ甚シク破シテ脂水ヲ流ス其水臭文甚シ故床子並テ
洗ベシ此粉散ヲ付ルモヨシぬ十數臭水出ル一甚キ者ハ粉散

丸並用ス

牛程瘻 ソコモノノ大豆ノ大サノ瘻肉出来テ次第ニ大ニナリ

皮コルク成テ其瘻肉ト生肉ト一処ニナリ步行不能石杯ヲ踏テ

其瘻肉ヲ外ヨリ踏故ニ生肉ヲ瘻肉ニテツリ故ニ痛忍ベカラ

サレココロメスヲ以テ瘻肉生肉ノ界ヲ切取ヘシ白雲決勝

ニテヨシ或ハ瘻中歩行ノ湿氣ヲ各并ハ瘻肉ト生肉ト向

ニ水溜リ膿ニナレ故ニ痛強シ此時ハ針ヲヨリ膿ヲヌクベシ瘻肉

モ取ベシ

僵脚疔 モトフト之液杯ノ刺ヤウ忌キト漏ノヤウニナル者之治方

初起十數ヲ用ベシ又予ノ節ニ登スルアリ夜間ニ交テ節天

蛇ニ云辰蛇疔ニ云楠ノ横腹ニ出来ル之又楠ノ白ハ出来節

ヲ隔テ出来ルヲ疔ト云

虫蝕瘡 指頭腫シテ水泡スル者中ヨリ血交リ水出シ此瘡

糸ニ墨ヲツケテ引通スヘシ皮ハ入ラヌ様ニ刺ス之痛無止者

又是ハ墨ヲ水泡中ニ挿ス為也大瘻リノセヌモノ也中黄ニ五物查

虫本伝

湯

酸痛 口之手足二出来之 榮雲ヲスリ込ベシ花相付ヲスルモ

ヨシ劇キ膏散建中ヲ用

陰風 剛モニ生ズ風之白物ヲ塵リ込メハ死ス

葡萄痘 不時ニ流行スル毒之多ク小兒ニアリ初起寒熱甚ク

面部ツグクト集リ出テ水泡ヲ生ス右ニハ少ク爛ル者之針ノ

水ヲ取り中黄ヲ貼ス平血欠葛根加吉更此症正宗ニ天地不在

ノ天ヨリ発ストヨリ極スニ此症ヤハリ時毒ト思ハル也十數日宜シ

誤吞針鏡 骨硬咽候 眞骨ノ咽喉ニ三タルハ酢一合五勺

血ニ或ハ端破ホヲ白湯ニ送下ス竹木刺ニ肉中ニ有ヤ魯

疑ニキ症ハ危矣ニ鹿服ホヲ煉交セ貼ス神効アリ餅咽ニ

ツマリタルニ胡椒油一茶或ハ酢ヲ濃煎ノ服スルモヨシ又一術情

風ノ治可也針ノ咽ニタケタルニハ所在ヲ見定メ切破リ抜トル
下シ

中砒毒 毒ニマツテ惡寒發熱シ口燥劇シキ者ハ銜入スル之録

豆大黃 甘中右水煎或ハ黃連解毒ヲ用ルヲアリ

河豚魚毒 一奇方砒クソヲ塩湯ニテ飲スベシ或ハ橘樹散

白砂糖ヲ食ハシムヲアリ其他奇方多ト云凡吐劑ニシクハナシ

陰毒 至テ希也其初會陰ニ生ス甚キ者ハ小股迄モ瘡ハ希ナ

リ此症痛ニ強ク其時陰莖発起ス痛止メハ莖モ亦瘡ハ賜

ニテ蒸セハ暫痛ニ止ムサスレハ直ル之此ヲ鑿視スルニ會陰膿

管アラハ刺ノ膿ヲ取下シ多ク不化也初起大牡蠣后ハ物ヲ麗

草ニハ破敵此症潰后ト云凡膿満ル寸ハ陰莖発起ス膿ヲ又

ケハ又ナシル也

委中毒 初起寒甚痛強ク食可ニ成ス際頭次弟ニ重セ
委中四逆腫腫坚硬石ノ如ク日ヲ経テ里層ニナリ積積ノ出
血甚之右ハ膿ハ少シ免ホシ此次第ニ脱ノ臭氣不可近遂ニ
死ス治法大壯或ハ越木烏紫里良ハハ物湯此症初メ浮
萍並ヲ手強ク用ハ滿散スルトモアラズ欲未試

失策 地取ヲ別タズ石ノ様ニ堅キ毒ノ血痛ハ痛ナシ是痛アリ

右ハ紫里色ニナリ潰テ死スルニ流榮散堅陽天木凡ヲ用ハ
トアリ及花スル寸ハ脈強數ニナリ日哺漸熱ヲ發スルニ

瘧 一人夏月瘧ヲ患ヒ兼店ニテ截殺ヲ求テ急ニ服ス瘧速

ニ陥テ精神爽カク三日ヲ経テ精神昏冒ニ對々不食ス其
ヲ注テ左ノ脗上ニ一塊ヲ結ブ大サ拳如ニテ時々衝心ス此瘧
ノ痛ナシト瘧區此ニ寒熱ス脈強數ニテ時々發スルトアリ心下ヨリ

脇下腹ニ至逆微滿ニ眼目黃也將ノ上下ニ行ヲ發シ諸醫皆

瓜ナリトノ瘳スレト寸効ナシ予友行テ診セリ是亦疝トノ瘳

湯ヲ與フ則日更ヲ再診スルニ腸益甚ク小便頻ス大便ハ血ヲ下ス

仍テ師ニ告師歎ノ曰皆治ヲ誤シリ此症最早辰八九ヲ過シ

リ故ニ不治之先ニ方ヲ與ヘヨト長流水一分ヲ飲シメ則日黃

連解毒加錄豆ヲ冷服スニ日ヲ経テ塊七八ヲ減ス諸症漸

々ト退ト云此數日ニノ痛苦甚シ故ニ虛脱ノ死セリ可怖

辰半ニヲ治ヲ施サハ生ヲ得ルナラシ

71
4625

弘化丑戌申二月請復本氏書于
樂天齋海樞

春林軒燈下送談

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 春林軒燈下送談]

