

雜記

春林軒
雜記

橋田畔悅藏

雜記

眼疾

八 凡眼ノ初起ハ眼胞腫テ疼痛忍テハカリテ頭痛
劇クシク往來寒熱スル者也時以早ク治テ施セ
ハヨク愈

八 凡眼張破テ出血不止者犀角地黄湯三黄萍心湯
兼用メ治スルニ出血止テ后痛不止者通脉四逆
湯可ナリ外壅条ヲ施セハ可ナリ

八 天行凡眼疼痛ノ赤腫甚者四物加草决明効アリ
真ノ凡眼類凡眼アリ紫黑筋烏睛ニ入ル者也横
ノ方或下ヨリ出ルハ下劑ホニテ救ヘテ者アリ
上ヨリ下ル者ハ不治也脂突出ス

八 眼毛箇肉ノカミルナリテ氣ヲ俯ヘシ
一人眼ヲ突テ外ヨリ薄キ膜ノ珠ノ如クニ出タ
ルアリ小サキ口ヨリ鶏印ヨリ大ナレ物ノ出ル

ニ中々入カタキモノ也是ハ呼吸ニ從ヒ少々ツ

入一シ又眼ニ竹ノ五テ年ヲ経トモ知又者アリ唯眼病ノ様ニ思ヒシニ直ラズ故ニ切テ見ルハ五歩許ノ竹アリ

眼胞ノ病ニ前衛ヲ用ルキハキリシ血ノ赤ヲ加ヘ用ユ

友人ノ諸眼丹モ眼内ヨリサスヘシ凡テ内ヨリサ、ル、者ナレハ必内ヨリサスヘシ早クイマズヘシ口中ノ痰モ是ナリ又大人ナル者ハ切テ縫子ハ直ラズ一モアレヒ大抵自ラ経テ年ヲ成ル者ナリ菌毒モ披針ニテ切ヘシ是モ内ヨリ返シトルヘシ又菌ハ大豆ヨリソラ豆位ナリ其上ニ大ナレハ痛也内ヨリ粉瘤ノ様ナル物出ル也白眼申血絡ヲ切ルテアリ然シ胞血ヲ取タル后ナラ子ハ失張内痔蒼光ノスレ者ハ不治也白ク見ル者ハ又刺テ可治ニ其内刺テ直ニ見ヘサレ者ハトテモ不治ナリ

腫子有疵者神水不出不治神水出則失明腫子有疵者十日或十五日可使目不開也

目上ニ瘤ヲ生スル者ヲ療ス療常ニ目ヲ掩フテ不可見也以午之ヲアケレハ克物ヲ見リヲ以切割其核ヲ出大如桃愈后皮有余又不愈見余以一術縮皮而能見ルヲ得其核出ルニ及ヒ鉄唇ノ

恙ヲ用テ愈故胞ノ疵他恙ヲ不用鉄唇ノ恙ニ從眼迎或唇迎ニ塊アルハ内ヨリ取ルヘシ是

生ノ一術ナリ
眼胞菌毒ハ多クハ上胞ノ内ニ生ノ漸々大ニ成リ胞ヲ高ク瘤之如クナル最大ナル者ハ田螺ノ如ク目モ壓シテ高ク赤クナリ或ハ甚シキ者

眼目痛者也療白胞ヲ反シ見レハ裏ニアルヲ小反鉄ニテ切ナリ内ヨリ粉脂ノ如キ者出ル夫

克ク絞リ出スヘシ又大ナル者ハ反鉄ニカ、ラズ失張上ヨリ切ナリ跡ハ白雲ヲ貼ス

倒睫卷毛云破竹ヲ以テ眼ノ上下ヲ換ニ出シ
切リ斃ヲナリ

諸病

八癩病ノ水ヲ抜テ世医ノ克知ル也然モ一時ノ
快ヲトレノニテ全効ナシ且世医ハ管針ヲ以
テ水ヲ取是拙キ術ト云ヘシ長崎ニテ蘭人ノ教
ル処皆管針ナリ予是ヲ治スルハ一術有先輩也
ノ所在ヲ見突テ其サスヘキ所ヲ克見定テ披針
ヲ下其針ニ添テ糸毛引テ以テ針ヲ抜留水ヲ去
ヘシ然ラサレハ運轉ノ針ヲ失テ其留水尽テ
右左突維ヲサシ遊奕ヲ蓋ヒ膿ニナルヲ前十
日モ鳥頭湯ヲ用十分水氣隔シ時針ヲ下スヘシ
扱治ヲ施テ右一兩日経内ニ大熱譫語ヲ発シ囊
腫初ニ倍ス驚クヘカラス其時清汗滲濕ノ十ト
用レハ其熱解スル者ナリ又小紫胡加龍鱗ノ一
モアリ扱囊腫焮痛ヲ膿ニ成テ窺テ又毛引ヲ以

テ維ニ添テ入レ膿ヲ去ル也膿尽テ后又維ヲサ
シ置丸針ヲ右ハ囊癧ノ治法ニ隨ヒ清汗滲濕ノ
ニ轉スヘシ凡五六日ニシテ内膜化メ全愈

八癩病療ノ膿ニ成ント欲スル寸必大熱スル者也
此時余茶魚滲濕ノヲ用レハ熱サムル也効又鳥
頭湯ヲ用レハ其毒ヲ動ス為也

八癩病ヲ刺テ清水出ル者膿易ク治療得効也血水
交出ルハ必針口ヨリ黒腐ニナル筋ナリ若膿黒
腐ニナル者甚六ヶ敷大患也治法手段有全ク血
斗り出レ者ハ先縫合スヘシ

八癩病ニ針セントスル寸ハ先輩此ヲ盡ク離メ刺
ス寸ハ水出ルト少シ倒ヲサス寸ハ水出ルト多
シ月囊ヲ引上テウヲ上ヨリ水ヲ取也

八癩病ヲ試ルニ莖ノ本横骨ノ側之ヲ按スルニ穴
アル者指ヲ入テ深クナル者ハ囊ヲ按セハ囊中
ノ水脈中ニ入ルニハ囊緊縮也即腸ノ出ル者也

大二変スルハ囊ヨリ大使出ル者也是ハ浸ニ針
スハカラス即腸癰也可慎

陰狐病小腹逆モ上リ或指引ノ有ニハ芍薬甘草
附子湯ヨロシ又其症ニメ水ヲトリシカ其中ニ
膜アリ支ハ維ヲ以テ腐ラシ取ラ子ハ又再発ス
ルナリ

病ト腸癰トヲ見分ルハ先按脈シテ卒急同囊
ニ引痛ナリ腸癰ハ血塊ニ似テ運セズ上和下望
キ急有ナリ

癰病大サ南瓜ノ如ク堅ク凝リタルニ三角針ヲ
ニ寸許モ入レシニ凝血ニテ血出テ又囊ノ本少
シ和カナル処ヲ刺スニヤハリ血ナリ少シ薄キ
ノニ其餘維ヲサスヘシ暈倒スルヤウノ一モア
ルヘシヒリ、ヲ、畜ヘ其ヘシ

一種月狐病ニ似タルモノニ大腸ノ囊中へ脱シ
下ル一アリ其徴ハ囊ヲサシテ糞汁出テアリ此

症ハ必茎根ニ空凹ノ処アリ他ノ症ハ不然者也
阿炎ノ人ニ其凹処へ花キ珠ノ如キ者ヲコシラ
ハ其凹処ニ当テ禪ニテク、リテヲケハ其凹脱
シ不下ト云何レ難治也又月狐病ハ昏ハ出テ夜
ハ入也

水気ノアリテ出ルアリ出レハ六ヶ敷也其内癰
病月狐病トモ初起ニ丘令散ニ防牡苗ヲ加テ用
一有克消散スル一有癸シ小兒ノ内ノ一也癰病
ハ月茎囊中ニ入テアル者也

病ニテ囊ヨリ水ノ出ル一有リ小便ノ満ル也予
ニテシホルハ水出レ也水病ト云ヘキ者也

病ニテ脘傍絞痛スル者無患子甚効アリ

肥童ノ卵囊ノ偏大サニナル者ニハ其月茎ノ寸
ヲ取り月根ノ上ニアテ其極処ニ点シ兩傍へ開
ク一一寸ツ、灸スル一七日位ニテ愈ル一敷ニ
奇効ヲ奏ス若不効者ハ囊ニ針シテ維ヲサシ置

ケハ愈ル也シカシ其難ヲ刺ヲクト大熱ヲ発ス
ル者ニテ多クハ堪カスル也何ニモ命ニカ、ル
一ハナシ

△

一種血外ノ至タルコレハ至テ緊ク凝タル者也
疾ノ甚シキ者ニハ決メ刺ヘカラス一人針メ其
口ヨリ白ク爛レ反花メ發ニ死ニ至レ然レ何モ
針ノ誤ニ非ズ捨テ置タル故自然ニ膿潰メ死ス
ル者ニ薛ノ不治ニシカス及テ名汚ス者也

△

癩病ハ水血腐肉ノミアリ腐肉ノハ痛有者也針
スレハ水ノ如キ者出テ死ニ至ルニ夕トモ針セ
スモ自出ル様ニナル者又交リ出レ皮膚ノ血
力囊中ノ血力可合別針口ヨリ黒腐ニナルハ必
狂癩ヲ発スル也三合後命湯有効小兒ハ玉金鞋
丹ニテ治ス大人ノハ大ニナラス直ニ可治

△

血病ハマハリ癩病ノ類也世間ニ使毒ノ一名ヲ
血病ト云ト虽イハレナシ然レ病毒ニテ月囊ニ
入ス使毒処ニ有テ凝ル名付タル者也亦不可知
一人囊中大サ蒸露罐ノ如シ披針ニテ刺シクル
ハ血対出シ水ハサシ出ス夫ニ經ヲサシケル
格別クサラス漸々羸瘦メ后癩ヲ発スル也囊ハ
初メニ倍セリ何レ不治ノ者ト云

△

癩病ヲ療治セシム欲ハ先其難易ヲ知ヘシ月
囊偏墜自若トメ漸々腫大ナルハ治シ場シ術ヲ
施スヘシ月囊時アリテ消長痛小販ニ引首治易
按スルニ病毒小販ニ有リテ腸ヲ推ニヨリテ大
腸脹囊ヘ下座スル者ト見ユ予先年此症ニ術ヲ
施シ大便針ニ墮テ下リ臭氣堪ヘカク疾リシ

△

有必此病ニ術ヲ施ス勿レ腸中疵ヲ設ル故次
才ニ脱状ヲ見シ遂ニ命ヲ損スルニ至ル又一種
原偏墜ノ症ニメ瘰氣患ヒ遂ニ頑肉トナル者有
其頑肉ハ剪刀ニテ割或拔毒ノ類ニテ腐スルハ
治スル也其數ナレハ術ヲ以テ治テ施スヘシ然

△

治スル也其數ナレハ術ヲ以テ治テ施スヘシ然

此膏赤ノ甚ハ克暝眩スル処故毒ニ治ヲ施ハ誤
ト有慎ヘシ

雜症

△三木附 葛根木附ハ血ノ例テ循ラサル故血愈
タル也血凝結ヲ循ラヌ効アリ痛強ク牽急ホ

ヨコシ

△主木附ハ毒例テ氣循ラサルハ氣ノ循ラヌ処ヲ
循ラヌ効アリ故ニ麻痺癱瘓結毒ニ宜シ

△越木附ハ水濕ノ留滯ヲ解シ循ラヌ効アリ故ニ

風濕熱痛ニ宜シ考ヘシ

△主木附氣血比ニ凝リ危角氣ト血ト例テ不回ニ
或痛モアリ又痛メ此ル目的モアリ其痛メ

如是目的アリト云ハ予結毒ナトニテ頑肉トナ

ルヲ考フルニ人身中ニ血ト氣ト回リサヘスレ

ハ頑肉トナルトナシ然レニ頑肉トナルハ血氣
凝滯シテ不循ヲナス也先結毒ノ者ニ主木附ヲ

与差カノ及サレ処鉄ニテ割危シ破綻ナトト貼

シ頑肉ヲトリ血ト氣トヲ緩クスル寸ハ全ク人

トナルヤウナル者也且ク此ヲ考フヘシ予家所

謂三木附ハ皆代烏頭差効多シ

△痿弱ハ血氣ノ不和シテ氣循ラサルヨリ来ル者

也故ニ痛痺ハ和ケ比拳動ナリ難シ治術ハ血ヲ

和シ氣ヲ行ス様ニスヘシ主木附宜キ也

△牽急ハ痿弱ト反ヒリ故ハ氣ノ鴨サレヨリ来ス

ル者也故拳動ハ少シナレ比痛痺知ラサルト有

又痛痺克覺ト牽急ノ甚キモノアリ危此時服

部拘牽ノ痛ム処ニ引者也二症比二種々愛症有

ト虫大抵氣ト血ト克来ル者也牽急ハ芍甘附可

ナリ

△消渴病七味白朮散方中ハ瓜呂根知母麦門ヲ加

工黃連解毒ヲ兼用ノ食禁ヲ克クスレハ愈ナリ

又食用ニハ連根ヲ常食ニスヘシ飯ノ上仰ヲ三

挽程ツ、用ヲモ前方ヲ久服スレハ克ク愈ト云
リ消渴証ハ上焦渴中焦渴下焦渴アリ是ヲ克ク
案スヘシ

△不食癩ハ抑肝扶脾而柴胡ヲ倍シ三棱我木ヲ加
辰砂散或左金丸ノ疾兼用メ効アリ

△世ニ脹滿ト稱スル者一ノ蘭説アリ動脈ノ大管
ニ或内瘤杯ノ如キ物生シテ支ヨリノ四肢身体

ノ循環アリシクナル也故ニ分消而健胃並ノ莠ヲ
用ユ曾テ徽トスル者有リ脹滿ヲ患ルハ死メ火

奪ニメ一塊残りシ者アリ是ヲ見ルニ坚硬如石
此水ヲ以テ医者慮トスヘシ

△脹滿ハ実症ニメ劇劇ノ應スル処ノ目的ハ用テ
後其疾ヲス者ハ可治ノ兆也

△脹滿ヲ患ル者アリ仰臥セシメテニ間斗リ跡ヨ
リ見レハ腹大滿シテ頭見ヘカタシカタノ如ニ

大氣氣向六貼百ニテ治シタリ脹滿ハ水ノミニ
テ腫ヲナス者ニ兆ハ腸中ニ氣籠リテ腫ヲナス

也水ヲ含ミテ腫ヲナスハ治シ易キ也氣ヲ積テ
腫ヲ為ハ治シカタシ

△一男子腹滿ヲ患フ大氣氣向數十貼ヲ与ヘ益腹
滿ノ大便不通因テ塩湯ヲ以章門ノ辺ヲ蒸シ腹

ヲ按シ盤中ニテ又氣ヲ与ル丁ニ貼於是前用ニ
処ノ菜汁漸々回リ来頃刻ニメ大便快利ス兩未

此方ヲ処メ効効アリ是妊娠胎ノ不正針ノ小使
不利スル者ニ整胎ノ術ヲ施メ其後導利ノ劑ヲ

与レハ通ルノ理ト同シ一体大優ノ上口ハ輒ニ
メ縮張ノ自田ナル者也故ニ上口ニ燥采ノアル

者ハ担実厚朴ニメ氣ノ運動ヲ助ルトキハ皮厚
メ灌水古ヨリ其傳アリ子和其術ヲ行フ薩賜其

傳ナシ南越真村翁始テ其門人田中信藏其術ヲ
習テ施セリ世ニ云中寒時々下利腹痛ナトスル

者克効アリト云其法未詳尚誠者ノ傳ヲ待

△一男子并中ニ入并ヲサテエシニ折茹上ヨリ石
落カ、ル其人気利タル人ニテ早速左右ノ頻手
ニテ其石ヲ受留無何事上ニアカルニ忽猶氣困
憤ノ不知人事四肢痿弱スルカ如ク治ヲ南涯翁
ニ乞フ翁投スルニ桃核灸氣ヲ以テス類貼ニメ
神氣醒快諸患一掃セリ其意ヲ探スルニ是打撲
ニアラトス初ノ石ヲ受タル寸努力自経絡ヲ
損スル意アリ且其變動ニ因テ急ニ血経絡ニ回
リ是力為ニ四支痿弱スル者ナシニ凡テ桃核灸ノ
症血ノ経絡ニ回ル者也故ニ其餘ニ曰熱結膀胱
其人如狂血自下ル者自愈トアリ

△凡無形ノ者ハ舌胎ヲ見スナシ大養氣小養氣
有形ノ病也故ニ必胎黒黄ヲ見ス也大養氣ハ水
氣ノ變ニヨルモノ也故ニ脈滿ヲ見ス也此ホエ
因テ三養氣ヲ辨スヘシ也水氣ニ大養氣ヲ用レ
証アリ胸下或心下ニ当テ水塊ヲ結テ壅ニタリ

即其微也成シヤ、ニ至ノハ塊數十結クル者也成
スル寸ハ二三貼愈

△時疫ニテ下血シ狂言杯スル者桃核灸ノ証也是ハ
一夜ニ二三行位下ル者干姜芩連人參切ヲ兼用
シ一夜ニ某十二三貼ヲ腹スヘシ黄芩切ノ証ハ
敗血下ル也一夜ニ一度位若ニ度モ下ルト小腹
下陷ノ次才ニ脱スル也桃核灸ヲニ三貼用テ下
血少ニ止者ハ治スヘシ不止者難治止テモ又ニ
三日歴テ下血スル者ハ調合杯ノアシキ又桃
核灸ノ舌ハ赤メ無芒刺腫夕ヤウナリ又黄胎ニ
メ少シ黒ヲ帯ルモノ也

△痢病ハ初起烏根根ヲ用テ発表スルカ宜シ痢病
ハ兔角下ル者故ニ早ク発表イタサ子ハ熱内ニ
陷テ劇症ニ至ル者ナリ発表スルヤハ利救成ス
ルナリ

△刺病右梳兼或黃連解毒杯ノ証ニ至テ
者ニ梳子干姜肉ヲ兼用メ大

効アリ

黃疸ノ前兆ハ心下痞メ食不進小便赤濁食ハイ
キソクニメエカク又眼裏ヲ及テ見ニ黃色ヲ発
スル者也如是者早ク見ツケテ治ヲ施セハ某十
四五貼ヲスキズメ治也

△瘡水多出ル者ハ腕ル也又欲愈水出ル者アリ是
ハ水少ツ、出ル也又能ノ足ラスメ出ルモアリ

△葡萄疫ハ流行スル者也水泡ヲナシ寒熱ヲ発シ
固夏十ト班ヲ発シ班ヨリ血ノ出症アリ温疫ノ
症ニアリ血分ノ症也白虎ト発班ハ危篤ナル者
也又其班ノ至ナル症ハ舌或ハ齒根ヨリ出血ス
ルアリ

△目羊分見一耳鳴リ十トスル症ハ多ハ痲ノ瀝者
也カ、レ証ニハ小柴胡加茯苓牡蠣克應ス

△田火ニ府赤ノ叔方ノリ水方物振加將杯ツ發散
シヲキテカレ口敷茶ス

△浪華四十奈ノ男子久ク痲症ヲ患テアリシニ眼
瘡ヲ股ニ生セシヲ或医請旨瘡ト一様ニ見ナシ

テ灸ヲ進ムル故追々瘡テ鶏卵骨ヲテアラワレ
出シカバイヨクニ骨上ニ灸セシカト強テ止サ

リシカハ不得已茶ヲ与シニ不日シテ死スカ
ル誤治ヲ得テ死スル人モアリキト歎セリ橋本

宗吉ハ蘭家エテ名高キ人ナルニ其人スラカク
誤リシトモ有リ況マ其奈人共如何ナルヲカ

△霜燒ニハ蟠水ヲ傳クレハ愈後蟻咬傷
仕出スラト思ハル

△乳汁ヲ止ルニ十全大補加神曲麥芽妙也
△蘭人乳岩ヲ裂ニ鍛治ノ鉄ノ如キ者ヲ以て扱ヲ扱

ニ切取ルト云リ如是スレハ速ニ死スル也蘭人
ニモ大ニ虚言アリ

△自汗常ニ出テシタニニスル者旧虚也甚 者ハ
三年余モ出ル也

△脚気冲心セシトスル者ハ初ヨリ小腹脱ノアル
者也此症ハ必衝心スル者也氣ヲ付可知

△誤テ身体ヲ撲或勞碌ニ因テ腸中ヲ擦ナトイタ
シタル者右ニ病氣奈メ奈熱惡寒腹中酸痛如疫
或譫語狂乱如有神靈ノ証ニ加減ノ柴苓湯ヲ用
テ有神驗也

△一日先生招諸門生曰有一男子年七許脈緊數舌
乾燥口渴小便滿小使溺時ニ腰痛ノ証ヲ患フ某
者病塊ノ為所崇主支加烏頭ヲ用テ兼テ雲母煎

ヲ以テ益也塊漸々減テ似得知然レ方飭當セサ
ルヲ以テ全快セズ生等療之何ノ証ト為誤ニ方
ヲ處セヨ各為肺癰或為病終々處方一方其旨肇

ニ當テス因テ問之先生曰消渴ノ症ニ非ヌマ小
便ノ塊ハ全クホレノ塊ニ非ヌ水氣膀胱ニ充テ

如是故ニ午ヲ以テ撫之則小便少通ス前ニ主支
加烏頭雲母煎ヲ用テ塊減テ快者ハ方當ラスト

魚莖ル、因テ内キユルニ付テ小便モ通利シ塊
モ減スル也難治ナレヒ猪苓一黃連解毒一ヲ兼
用セハ効ヲ得ルモテラレカ

△傷寒論曰脈浮虛者汗スレハ表氣虚ノアル者
故奈汗スレハ愈虚スル故ニ汗ハ致サレ又者
也克察テ治療スレシ東垣浮虚者ニ益氣而ヲ用
テ効アリト云

△黃疸麻黃連克赤小豆加茵陳黃柏山梔子ニテ
克治スル者也頭痛呃氣アリテ涎沫ヲ吐スル者
ハ吳茱萸即主治スル也

△破傷湿ノ脈ハ沉澁ニナル者也克氣ヲ付ヘシモ
ト煩氣ナラサレ故ニ致ナリ弦脈ヲ見ハ下ユゾ

ニ痛処有者也引ハリテ痛故ニ此脈ヲ見ハ潮熱
ヲ奈テ大使溏スル者ハ黃芩湯ヲ用テ下利ヲ止

後二小紫胡一ヲ用也

△少月病発汗血ヲ勤メ九竅ヨリ血出ル者アリ口

ヨリ吐者ハ雅治是ニ三黄加地黄ヲ用者在然モ

少月病ハモトヨリ下利アル者ナリ故ニ大黃杯

ハ速愈スヘシ陶節庵力地黄ニ連湯ヨロシ以舌

赤黒キ也下利膿血心中煩不得臥黃連阿膠而血

コサレハ芩ヲ加フ血虚ニハ芍薬ヲ加フ後世何

膠一黄連阿膠危子黄柏 是モ右ノ証ニ用テ克

應スル方也

△老癯ハ痰心經ニ入テ発スル也清湿化痰一主之

△蝦蟆瘰十トテ咽中塞リテ飲食共ニ不下者ア

ンツノ霜或瓜蒂ノ霜ヒルノ霜白湯送ス

△一男子傷食ニテ脉緊腹堅滿大便秘塞不可堪教

医按方和劇乱不得其旨緊匿又投大承氣大便不

通以水銃灌肛門漸得通而諸症依然請治先生々

々診之按之察病處之所着處附子殺赤而用ニ貼

而大便秘通諸症羊碌焉先生曰是不堪劇劑而販

皮不煩ナリ

△脱疽ト瘰疽ト差別ハ何也ニ禁痛スレヒ瘰疽ハ

膿汁ヲ生シ脱疽ハ膿汁ヲ不生汚水ノニ出ル也

五六年以来月瘰ヌル者アリ圭支加竟骨牡蠣一

日ニ灸崔一羽ツ、食シテ飲メ即ニ挽ツ、用ニ

妙也

△毒箭ニ当リ或毒赤ヲ服タルニ其毒ヲ解スルハ

新汲水ニマサレテ十シ隨分多服サスヘシ其証

煩渴スル也毒箭ノ毒ハ冷水ニテ洗ヒ療スヘシ

△交接ノ代血出ル者補中益氣湯方中加鹿胎霜ヲ

克治スル也

△畜血下利ノ病ニ逐劑劑ヲ用ベカクサレモノア

リ服候及舌候等ニテ可考不知メ強テ藹藹劑ヲ

投スレハ死ニ至ルモノ也此症ニ千金ノ黄土一

ニ黄連解毒一ヲ兼用メ効アリ

△馬脾風痰盛應塞如何共久へキノ様ナキニ白物
 辰砂亦分煎茶汁或白湯ヲ以テ頻送下取全効
 △馬脾風呼吸促迫痰喘逆滿形驚風ノ如シ十歳以
 下ノ者ニ多シ大人ニハ無キ者也内茶ハ紫金丹
 平杏寸石トニ改食子佳也ト云へリ
 △氣腫ハ多ク腮ニ生ス潰テ膿ヲ流シ又口閉テ膿
 少ス如坎スルト七八度モアリ氣兼氣ニ杜仲ヲ
 加効アリ瘡口ノ明タルハ口中ヨリ指ヲ入レハ
 靨ヨリ筋ヲ引張り居ル也又ヲ剪カニテ切辰砂
 蜜煉付ケ外ニ后衛ヲ貼ス
 △癩癩ノ人他ノ病アル寸平茶ヲ用ルニ其後癩癩
 不起ト云リ中年ノ癩癩ハ難治也
 △癩癩ニ眼目緊縮スル者瞳子散大スル者不治也
 △解蠱ハ二三歳迄ニ多シ神經ノ病ニテ頭次才ニ
 大成者也初起搐搦ヲ悉シ愈テ後十四五日ノ内
 ニ大拍アリ青筋ハリテへルナリテ子ヲ

キツナリタカレンスナリタ杯ハナルヤウニ
 内ヨリ張者也但三ツナリタ開キタルハ不治也
 初起ニ葛根木附ニ紫圓兼用メヨシ但又背ヤ腰
 ナトニ解蠱ノ様ニ玲瓏タル水氣有テ腫ル者有
 矢張り解蠱ト同シ者也初起ノ者ハ凸ニ救人ヲ
 治シタリ七八年以前一人乞治膨スルニ頭蠱已
 ニ解ク目上蠱ニ勢救メヘカウ久故ニ治ス招メ
 ハ強メ針セレトク乞テ予辞メ曰今針刺ヲ試ヘ
 カラ久若是ニ針セハ死期ヲ促ン徒者曰匠ヲ轉
 スルト數人皆不治ト久先生是ヲ刺テ不治モ命
 也ト云テ強テ乞予遂ニ針スルト寸許ニメ廣水
 逆出メ勢少減スルト漸々脱状ヲ見テ故ニ急ニ
 飯ヲシム后二日ニメ遂ニ死タリ
 △頭痛経年不止者瓜蒂ノ末ヲ吹管ヲ以テ鼻中ニ
 吹入ル又刺太陽穴出血ス
 △真頭痛ハ芍芷香蘇散加石羔蘇芥細辛又瓜蒂辛

散ヲ用ニ頭痛ニ三等アリ水ニ屬スル者ハ桂支
加苓朮一或瓜蒂ニ橋鼻仰兼用也齒ニ屬スル者
者ハ黃鐘ヲ兼用又一種氣ニ屬スル者アリ暗日
ニ歩行スレハ痛ト云是甚難治其治法ヲ得ス一
日古林見宜ノ著書ヲ見ニ治目見火則痛者ト有
九味羌活一也此理ニ因テ天晴日ニ頭痛スル者
ニハ羌活切ヲ与テ効アリ後毎々驗アリ
△梅毒ニ因テ頭痛スル者ニハ先六物解毒一ツ与
雄黃一味ノ掛目一分ヲ七丸ト十シ一日ニ一丸
ツ、用ニ症ニ因テ隔日ニ用ニ大抵此四等ノ外
ニ不吹丸外症トトニ因テ頭痛スルハ此例ニ有
ス真頭痛ハ必吐ヲ兼ル者ニ即吳茱萸切ノ症也
水ニ屬スル頭痛ハ昏計痛血ニ屬スル頭痛ハ昏
夜ノ別ナク殊ニ夜甚キ也
△龜胸ニ小陷胸一加甘草一ヲ用テ効アリ
△狂乱ノ者ハ吐下灌水ノ術有り

△癩症ニテ髪ニテ毛頭冷惣身ハ汗出ル様ナル者
支加黃芪一ノ症也

△蕘毒ニ山欬一味水煎服
一方六物解毒一瓔珞躑躅一朮水煎兼用
蕘方 綿実一炙南黃一 方 右蕘瘡口

又方犀角瓔珞躑躅二朮細末白茅根煎汁送下
此方尤蕘毒瘡口久愈時々乾熱謔語至是

△腎囊風ハ經行之時ニ胎タル者ニ或病生ト云リ
禁殺生ニ曰經行ノ時ニ男女交合ヲナセハ其見
必顯トナレ失張汝意也或著滿ノ陰処ヨリ脊肩

迫モ有者アリ内朮銀朮一薄萍ヲ加ハ竜川丸ヲ
兼用消毒或若腦散土大黃膏ヲ付ヘリ

△溺死ハ心下膻中ノ当リニ瓊マリ有或呼吸線ノ
如ク通ル者ハ生ク先水ヲ克吐サセテ活ヲ入ル

之面色赤クナル者ニ細ニムケ橋上ニ食塩ヲ置
艾灸ヲ大キクメ燈ク可次背ニ灸覺レハ治之内

艾灸ヲ大キクメ燈ク可次背ニ灸覺レハ治之内

菜ハ茯苓尺深一ヨロシ何レ利水ヲスヘシ
小兒火丹五里ノ穴ヲ口ニテ吸血ヲ集メ針ニメ
刺一ニケ処ハカリ跡ニ中黄ヲ貼ス内菜ハ大連
竟文

△丹毒ハ乱刺メテリヤ一カヲ用ユヘシ
△疥赤掻丹毒ニ似クルモノアリ心ヲ付ケシ筋
ノ見スモノナリ

△小兒生テ虚弱死生不分明者アリ其時死生ヲ分
ント欲ハ先ツ將ノ祖ノ付根ヲシツト摘ニ候
フニ動氣アルハ生治スル也並胎ノ湿ニテ冷ヲ

帶テ可トス只將ノ動脈ヲ目的トスヘシ
△製磁砂法二十年モ経タル馬ノ尿ノ桶ヲ見ハ粉
夕マリ有クヌヲ取テ日ニ干シ直ニ水サシ入蒸

露ニテトルヘシ其後菜碗ニ入上ヨリ蓋ヲシ泥
封シ目張ヲシテ霜月ニ埋ニ埋ニ末三月ニ至
リ見レハ上ニ米ル者アリ却是也

△久咳粘痰ヲ吐スルニハ括呂枳實一ニ加竹瀝姜
汁効アリ
△又臥ヲ不起十トノ症ハ金匱ノ包莢丸三分撒核
柳三分ホトト用テオシ

△勞咳ノ急迫スル者茯苓甘草大棗一乳根ニ引ハ
リ痰沫ヲ吐スルニハ甘草干姜一

△脚氣在岸トノ不差一層甚シク衝心セント欲ス
ル時ハ諸方效アレハ格別ノ名方無キ者ニ右ノ
症起ント欲スル前ニ千金木茶一加石羔用可也

△肺癆臭氣不可近者或咳ト声啞者從症処方多有
此一奇方アリ厚白散方中加淫羊藿茅根三七斗
連服セシムヘシ福升能驗

△遺精不止者諸菜施之無効者屋根ノ尾ノ上ニ在
処猫糞ヲ取為末甘草赤少許加之一日ニニ斗

ツ、白湯送下有奇効
泉及佐野惟中方

△耳ノ中ニ豆ノ入テ難出者アリ製人彼是トスル

此段々下真ニ入テ甚ク數者也ヒツカケテ以テ手術ニテ耳中へ入レ出ス也

△男子ノ油風ハ難治也婦人ハ易治ト云主方防風

通聖散加側柏葉直症或正宗ノ神應養真丹ヲ用

之又効アリ油風ニテ小兒七八歳ノ時ヨリ頭髮

脱スルモ其時直ニ療治スルハ昭々日ヲ経レハ

難治也脱落甚者ハ一夜ノ内ニ大ニ脱海芥即ニ

テ洗ヒ養真丹ヲ用レハ治スル也

△或人曰凡世医所難ハ吐衄ノ劇症也隨其症投

小半夏加茯苓卒茯苓肝之劇而難奏効者吾師或

福井常ニ愁之有一奇方之謂三聖功主治痞沓胸

膈滯氣止吐衄克進飲食吐衄之聖劑也

△三聖功方 紅花 樞梲 荜根 右三味水煎或

直症加茯苓用乾口爛宜令服比湯奏効

△酒渣鼻ハ古人ノ説ニモ飲酒ノ人ニ在下云テア

レ也酒ノ人ニモアリ是赤ヲ形容スル故ニ酒

ノ字入タルモノトイヘリ酒查鼻ハ先乱刺メ瓜

蒂ノ赤ヲ水ニテ解敷ハシ汚水出テ愈ル也

△凡胎前ニ毒有者ハ脉数ヲ見ハス者也不可不知

大便月ニ兩三行ナル人アリ是ヲ除中下云必其

△人阴痿スルモノ也症ニ調胃養氣即ニ抵當丸ヲ

一日二三度宛用レハ愈タリ矣

△喘息ニ控涎丹五分ヲ与テ効アリ用テ二三日モ

照眩ノ食氣愈キハ不忘ナリ不可腹

△腐炭ノ照眩ハ渴ヲ生シ飲食不進惡寒危熱ホノ

症ヲ治スル也甚シキニ至テハ煩渴煩悶ヲ治ス

△毒心下ニ迫リテ遂ニ命ヲ損スル者也不可油所

早ク黃連解毒或耳連石羔加棗豆一抔ヲ用ヘシ

△痼疾ヲ治スルニ粉刺ヲ投セント欲セハ緩々ト

長服サスヘシ然ラバ上口走りノ効ナシ譬

シ但上ノ三潤テ夜及カタシ又壺ノ水冷シマク

ヲ以テ少シツ、地ニソ、グ寸ハ自然ニ潤ニ底
ニ透ル理ト同シ

△産後ノ弱滿急ニ不救レハ命ヲ損スルニ至ル也

早ク鹿胎霜ヲ白湯ニテ送リ下スヘシ每服五分

又一奇方アリ懸氣ノ腸ヲ空リ紅花ヲコメ為霜

△白湯ニチ用ト又克應スル也

ノ症ニメ白点ノ斑文アリ不可不知厥風ト俗方

異也

△医タル者ハ廣ク方尽ク不可涉獵然モ書モ讀ニ法

アリ儒者ノ歴史讀カ如クスレハ假令數百卷登

ヲ讀ツクスト魚尾治術ニ益ナシ先方其ヲ讀レ

ト欲セハ患診スルヲ度トスヘシ而仲景ノ書ヲ

規則トナシ千金ヨリ回春入門ホノ尽ニ至マテ

ヒ口ク涉獵スヘシ譬ヘハ今水腫ヲ患者俗ヲ求

ハ外臺千金ホノ水腫門ヲ引合ヒテ讀ヘシサス

レハ彼書ニハ如此論アリ此書ニハ又論アル

ヲ克記臆スルト多シ如此シテ數卷ノ昏ヲ読數

百人ノ患者ヲ診スレハ俗術ニ益アリ且其事ヲ

忘却スルト勿レ只歴史ヲ読如クスレハ此治方

アルト空看道ノ其的當ヲ知ラサルナリ然モ例

跋アルハ博覽ヲ勤メ異証ニ達ハ、其方症ヲ抄

写スヘシ是其大方ナリ

△凡外科ヲセント欲ヒハ先内科ヲ精セヘシ不然

ハ俗術ニ益ナシ今此ニ瘡瘍ヲ患レ者アリ診是

スル者アリ是レヲ診察ノ治術ヲ施且茶ヲ投ス

レハ其常ニ取スルト速ナリ若不知メ唯外科ノ

三ノ瘡瘍ヲ医スル寸ハ譬ハ日ヲ経レト魚尾愈

ルニ至ル者マムアリ医タル者其氣虚タル血虚

タルトテ診視ノ不可不知是ヲ知ニハ内科ヲ精

スルニ非レハ得カタシ

△産後小水自利スル者ハ神經ノ順環セサル故也

參芪加附子湯ヲ其一方中益智ヲ倍メ可也又一
奇方驚一羽腸ヲ食リ紅花ヲ以テ燒ノ性ヲ存シ
未トナシ固ニテ送下ス

△予緒張不自由故兼氣ノ疾ヲ用レハ無効スボイ
トニテ下ヨリ兼氣ヲ灌リニ其効密煎ニ勝レリ
上口下口其治方アリト云ハ中間ニ壅塞スル者
ハ赤カ及カタシト因以テ慰方通ヒシヲタリ

△神仙病古今治者ナシ香川子モ神仙病ハ病ニ非
ス草根木皮如何治ト云リ長尺赤間関村勝久
ニ女アリ姉ハ書工ナリ妹ハ画ニ工ナリ近国其
名高シ其姉ナル者曾患此症俱茶実ノミ食ス全
身羸瘦シ治ヲ四方ニ求ム村井氏ニ至リ治ヲ乞

フト羊年無効急并ニ至リ治ヲ受又惠養氏ニ至
リ乞治皆無効長尺福井田殿ハ赤馬関ヲ過トキ
其家治方ヲ問フ診ノ曰可治也ト乃下瘀血湯三
十貼ヲ与テ塾食少進六七貼ヲ服メ全快ヒリ

其所以テ問ヲ其版ヲ按スルニ二騎勝ニ粟子
ノ如キ魂アリ按スル寸ハ少痛又狂走スル有見
ニ少モ不動是金匱蠱虫凡余下ニアリ有乾血者

著騎下者也瘀血ハ克食スル者也論中曰人無表
裏熱七八日血脈浮疾者可下久假令已下脉数
不解合熱則脉數善鐵至六七日不大便有瘀血宜
抵當即女章以微スヘキ也是ヲ以其乾血ナルト

ヲ余ヲリ林某西樵ノ節其家談此事ニ及ヘリ大
夕大二感ノ飯因ノ節中川脩亭ニ告タリケレハ
西樵ノ土産此事ニテ足リト云テ早クコレヲ
賞譽ノ冬讀ヲ送リ村井氏ニモ此事ヲ談レケ

レハ前治ノ誤リタルヲ悔真工ナルヲ感シヲ
レタリ慶虫モト舶来ナカリシニ村井氏ノ世話
ニテ近來尺山ニ渡リ其用ヒ初ナタル人ハ心付
反テ其人治驗ニ及ヘリ頗ル長沙氏ノ昏ニ塾也

シ人ト云ヘシ

△予此方ヲ与テ癩人ヲ治シタリ

△狼毒ハ我國ニ十シ大棘草ヲ狼毒ニアツレ此

説不分明狼毒ト名ル程ノ極裂ノ者ニ非ク香月

牛山海人イテ狼毒ニアツレ此是又不可

胸中動悸アル者穀粉粥塗テ用テ効アリ

△癩或中風ニテ口眼喎斜スレ者不遂ノ方ハサカ

リ不遂セサレ方ハ引上ル者也

△月莖ヲ切テ手足先牽縮ノ屈伸不自由ナル者ハ

蚯蚓油ヲ塗テ垂木附テ用ヘシ然レ血氣ノ復セ

サル内ハアシ

△大頭瘟或蝦蟆瘟ニ小柴胡而加石羔ヲ用テ奇効

アリ傷寒論旧明篇ニ并ノ前後腫ル、症アリ予

本方ニ石羔ヲ加用ス

△吐蛇虫ヲ煎ル者麴胡菜油ヲ用テ効ナキ者ハ

竹茹石羔ノ効アリ

△林一鳥家方島水湯其方ハ名家方選ニ出一景加

味アリ則野薔薇実也此一名為水ト云是島水

ノ因也野薔薇ハ未熟者佳トス

△治遺精方酪川干牛右一味糊丸又久年足跡上時

ニ水急ヲ生スル者此方ヲ与テ愈ユ又直深中

ニモ遺精スル者ヲ治

△播州村上玄鑑克棒皮ヲ用ユ丸ヲ腹痛ニ用ユ三

和散煩氣和中向茨个金芽根散杯ニ加蛇虫ニテ

麴石菜ヲ受サレ者ニハ理中安蛇杯ニ加用胃中

ノ水飲ヲ避テ意アルカ惠義和中一ニハ棒皮ヲ

加テ癖囊ヲ治ス

△一胃子突然トノ指頭大二痛ヲ惹他証ナシ中

一殊濃煎ニノ与テ一匙ニノ愈タリ是急迫ニヨ

ル者ト見ヘタリ

△小産ト脱血トヲ差別スルニ一日經水止テモ誠

ノ妊娠ナレハ胎ノ目的アリ何トナレハ子宮ニ

先胞衣ト稱ハ一番出来ル也因テ脱血筋克々索

搜ノ尋見ハシ中ニ葡萄実ヲツツシタル如キ貝
ノ者アリ是ヲ引上見ルニ透明ナリ其ヨリ月ノ
童ルニ從テ右ノ如キ者段々大キクナル也娘ニ
アラサレハ唯血ノミニテ葡萄実ノ如キ者也血
塊ナキ血ハカリ下ル也
△勞虛難治ノ者補中益氣即加換掃此方炮姜ニ片
生一片煎シ露宿ノ暇セシム
△吐血急ナル者泊又藍后三畫而犀角地黃而合方
宜口シ
△泊又藍主治緩拘急止疼痛心氣益精氣使眼者覺
通利經肉兼有催生之巧此物專為胎藏之要藥
產后血暈戰慄萌血腹痛其効甚的罕可加
消毒中風癩症風邪狂亂眩暈頭痛小便澀滯
水不順自汗盜汗死胎諸數諸虫咬傷疮癩熱不
語起脹不快者右何ハ此大効有一支或ニ用
△牛角必犀角ノ効アル者也歷節風ノ差代用ス大

効驗アリ火ヲテ灸リ削リ用ス
△七景清脾湯ハ心下痞ノ時々痛ヲ目準トメ用ス
可小兒ノ小便頻數或爛眼障ヲノ症或咳嗽勞症
滋陰降火湯ノ場合ノ如キ者ニ用テ可也又時証
后余燈尽テ譫語或咳ヲ兼テ撮空シ諸茶無効者
ニ此方ヲ用テ効アリ是ニ虫証ヲ目的トスヘシ
東洞先生此方ヲ秘メ常ニ用シト也
△又小兒ノ小便數ニメ程ニナク牛膝スル者ニハ
參朮ヨロシ
△石羔ハ消散ノ効アリ瘰癧瘰癧流注亦ニ用テ散ス
ルニテ其効ヲ知ルヘシ
△沒食子ハ膠痰ヲ甘ハク故ニ喘咳ヲ治スル也
イブリスハ汚液ヲ去リ虫ヲ殺スノ効アリ
△荊芥ハ血分ノ邪ヲ去ル者也疫病等ニ用ルニテ
其効ヲ知ルヘシ
△荷葉ハ能火逆ヲ治スル者主治方ニ加ヘ可用

△十惠湯ヲ用テ不食ニナル者ハ百遂ノ暝眩也百
中深心湯ヲ与テケハ治スル也

△三浮心ハ下血ヨリ吐血ニ効アリ吐血下血此ニ
氣瀉節ヨリ生スル也生姜厚心ノ下利ハ水厚ノ
乾吐此ニナシ

△外陽散火切ノ症ハ舌黄苔ニノ中興少ニ滋ヒ板
柔ノ燥桑ナク猪衣摸康スル也

△黄連解毒ノ証ハ舌黑胎ニノ猪衣摸赤譫語スル
中ニ笑ヒ燥桑ナク或ハ失血ニ是熱心中ニ血ル
ノ症也様子ニ因テ此桑ニテ下ス下也

△瓜蒂散方中赤小豆ハ吐奇ニ非ス瓜蒂ノ性ヲ柔
ケルナルヘシ瓜蒂ノ暝眩ニハ水ヲ用ユ又射香
モヨロシ瓜蒂ヲ用テ不吐時ハ湯ヲ用テヨロシ

又不吐時鳥ノ羽ニテ探リ吐スヘシ用法ハ三分
或五分用ルトモアリ

△吐后ハ一切臭肉ヲ食スルヲ禁スルト也苦食ス

△ハ腹痛ヲ免ス又吐血十トノ死ス者也又以寒
ヲ堅ク可慎

△輕粉ヲ用テ浮腫スルハ粉ニ堪ヘサレ也暝眩ニ
ハ非ス防己茯苓湯効アリ

△托裏消毒散ハ赤膿則消毒ス既ニ膿スル者ハ潰
ト云ハ以前越水附ヲ用テ其毒ヲ大抵ニ折キ其
後ニ是ヲ用レハ赤膿ハ則消毒スル也既ニ膿ス

ル者ハ潰スル也
△薏苡仁ハ虎ニ一味ヲ用テ免消スル者也腸癰ニ
用ルモ効効ヲ以テ可考又排膿散効モアリ

△紫圓ハ睛上ニ撮ノ在ヲ準的トシテ可用也
△多寢ノ標準ハ小寢ヨリ睛ニカケテ痛ム茯苓寢
ハ心下疼ノ中ニ悸ヲ帶フ小寢中ハ腹中疼痛シ

テ無悸

△乾姜苓朮ハ腰辺カ冷ルカ目的也苓朮寸ハ眩
暈ヲアテハハ温徑益元ハ表虚惡寒危恐自汗

テ無悸

或盜汗スルニ用ユ

△甘麦大麦一ハ時疫解ノ后心気不定譫語妄語スルニ用ユ是所謂藏燥也

△芍药ハ腹中痛テ肩脊ハ凝ト云カ目的也

△玄直散ハ鳥頭ノ瞑眩也

△身良附ハ結毒屎状淡膿汁ヲ出スニ用ユ

△圭文加厚朴ノ喘ハ水気直ルニ非ス表証ヲ下スノ故之邪内ニ陷ラントスルノ喘ナリ

△苓圭水可ノ証ハ気沈ムニ因テ頭眩スル也故ニ凡テ頭眩ノ症ハ脉沉緊ナル者也若昏冒スル者脉浮ナレハ必死ス

△芍药附ノ症ハ脚掌急欲伸スレハ引ハリテ不伸膝痛也大惡寒アリ芍药草ノ証ハ掌急スレレ不痛又無惡寒

△凡テ苓散ノ舌ハ少滋アリテスノニトメ白胎ニ

ノ少ニ黄ヲ帯又譫語微和有リテ腹中雷鳴スル者ニ用テ知アリ

△圭水附ヲ用テ盜行或ハ下利スル者ハ用ユハカ

テ又必脱スル者也若又下利スル者ハ圭文加芍

药訶子ヲ加テ用ルト妙ニ止之

△吳萸菜一湯症ハ上逆メ吐シ頭痛ニ有リ然レモ

心下ニ少ク痞アル者此方ヲ用ユルノ秘事也

右ハ二三日後ノ不通者也或ハ小兒ニ紫圓十ト

テ用ルト不堪ノ沫ヲ吐スル者也是紫圓ノ瞑眩也

△黄連一痢疾口痢二十リテ升降蕩々ナリケルニ効アリ禁

於久利加年喜里小使不通淋疾小便不利右酒ニ

テ七分用ユ

△黄蘗ノ瞑眩ハ心下痞スル也凡テ劇ヲ用テ下ヲ

△紫胡石ハ狗胆ノ一ニ非ス頭痛目ノ病ニ三行也
紫胡ハ血凝気ノ聚ルヲ散ス石羔ハ伏ノ凝ヲ解
ス或解散ト云概ノ云ハ此方凝テ種ヲナクマ
ウノ処ヲ捌ク者也紫胡連壳ノ場合ニ似タレ此
連壳ハ血氣ノ凝テ嗽痛シ己潰膿ビレトスル処
ニエク也紫胡ハ此症ノ前ニヤル又紫胡ハ熱氣
ヲ主ル故ニ下部ノ病ニエカス多クハ上部ニエ
ク也小陰得ニ三日以上心中煩不得臥ト云ハ
黃連阿膠ノ主治ニ非ス心中煩ノ上ニ下利膿
血ノ四字脱スル也此方下利膿血ヲ主治ニヒ子
ハ効ナシ仲景氏再生シタリ此方説ニ從ハシ皆
畜血アリシ病人不利シ心中煩ノ不得眠或口中
乾燥スルニマリテ不日ニ愈タリ往々此症有
△小青竜ノ症ハ大ニ喘咳ヲ味スル也没食子ヲ加
ハテ用ユ又喘咳舌白胎ニノ咳止サレハ參蘇欠
加五景子

△蘇子降氣ノ証ハ頭ヲツキ上ツリニナリ足ナ
ト冷ルホノ証ニ効アリ

△泊夫藍ハ胸中葯痰ヲ解スルノ効アリ九テ血氣
上外ヲサハリ効アリ血症ノミニ用ルト思ハ
甚非也

△薑糧ハ燥血ノ茶也
△圭朮附ヲ用ル証ニ本盜汗咳利アレハ用ラレス
下利圭支ハ生姜ヲ以テ干姜ニ代ユ盜汗ニハ否
飯建中ヲ用ユ

△没食子ハ克胸中ノ膠痰ヲサハクモノ也小青竜
一或テ杏百石一杯ニ配シ投スレハ十貼ヲ過ス
ノ効アリ苦シ十貼ニノ効ヲ不見モノハ不症ニ
不可与

△淨府ノ取候ハ膀胱ニ拘奪アリテ前症ニ比ス
ハ刺痛甚ノ且心下反背ハ引テ痛ヲナシ其脈
毛芤芤ニ比スレハ望クノ小水赤淡或微渴ナト

不可与

ノ余証アリ

△白散ハ肺逆ノ痰ヲ吐ス紫金丹ハ肺中ノ痰ヲ吐

ス部位上下ノ莖ニ且深ノ別アリ

△甘伊干姜ハ毒心下ニ直リテ自汗盜汗出スル

モノニ用エ胸腹痛ヲナシ左ニ臥ハ左痛ニ右ニ

臥ハ右痛ムホノ証ヲ見スモノヲ治ス是皆毒心

胸ニ直テ所致也宜哉方ヲ與ヘシムヘシ世医安

方克斤ヲ治スルハ不知也安方ノ克斤ノ治ス

ル所以ハ毒ヲ内ヨリ外発サス故ナリ譬ヘハ旧

明病冒家病症ニ自汗盜汗ヲ治スルニ硝石大黃

ノ葷ニテ下ヲ得レハ其汗自止ノ理ト同シ安方

△伏竜肝ハ克血ヲ止ムル者也アルノニ口固ノ上

ニ代用エ

△黃土ハ血癆瘰癧ノ下血或吐血スル者ヲ治ス

三黃ハハ氣ヲ主トス故ニ其餘下ニ心下不安

アリ柏葉ハ血力主ナリ故ニ其餘下ニ下血不止

トアリ血ヲ主トメ氣ノ動搖スル勢ナリ是三方

ノ辨也

△鵝胡菜ノ証ニメ反テ吐逆ノ受サル者アリ硝一

ヒヲ加レハ菜汁ヲ受ルハ神妙ハ一見下利晝夜

ニ四五十行腹中物ナキカ如ク手足微冷頭暈脈

動速トヒトシカ来ス且口舌乾燥ス即ハ服ノ

莖ハ舌乾燥ナク脈必微細ナル者也又異状ノ脈

症ヲ見ハス症四ツアリ腹中ニ蛇虫生スル者胃

中ニ宿食滯スル者寒痰胸中ニ停滯スル者停又

中凡スル者前三十日ト藥スルニ坎四因ニ益

ス曾テ安事ヲ琴山翁ニ質ス其ミヲ是ナリトシ

中風前ノ事ヲ未誠ト云ヘリ

△鵝古菜ノ証ハ脈弱甚見者也服時傍ニ當テクス

ニトスルマウナモノアリ明微ナリ

△鷓古菜梅毒ノ解スル者ト按スルニ是ハ湿熱ヲ去ル物ヲ多クハ湿熱ニ因テ生スルモノ也
姜圭一糸下ニ心下滿微結トアリ滿スル者微結甚難窺如何シテ診シ得ニ曾テ琴山翁ニ復ス翁曰是甚難窺唯時ノ起ニ於テ動氣高キ者ハ其心下微結スル者也譬ハ河流ノ如シ其上ニ巨石杯アル寸ハ其下心微動ス其理ト相以タリ其象ヲ見ハス物ハ万病皆此方処シ効ヲ養ス梅毒久年不愈者杯草方ヲ用テ奇効得ル一輩テ教カクシ且世間ニテ風キウナト云ル者尤奇驗アリ
△当飯四逆一当飯庭中一当飯芍茶散攻三方ヲ三等ニ分ツ寸ハ当飯四逆ハ尤輕淺ニノ四肢廣痺杯スルニ應ス午足厥寒ト云処ヨリ証ヲ推ナリ
当飯庭中一ハ少腹拘急ニ因リテ四肢卒急ホヲ目的トナ用ユ当飯四逆ヨリ一ホ深キナリ当飯芍茶散ハ最モ深キ面色痿黃腹中如有物按之非

槐何トナク物ヲ包タル如クウリニトシタル処へ用テ甚奇効アリ畢竟血滯リ是カ為ニ水赤滯者也

△广佛ヲ用ント欲セハ先羊厚ノ羹ヲ用テ心下ヲスカシ右用ユル克應ル也

△产茶ハ散ニテ用レハ勢強ク瞑眩シ吐出スル者也煎湯ニノ用ユレハ瞑眩緩クノ壘ク吐出スル

一モナシ又一人ニヨリ瞑眩ノ壘速アリ大抵一リハニヌ用テ五時位モ醒ス三ヌ用レハ翌朝近モ不覺ニ瞑眩スルト脉必シマリ血ノ色黒ク粘

ルモノ也

△又曰散茶ハニヌ用テ克瞑眩ス煎服ハ散茶ヨリ瞑眩速キ故ニ分量モ異也

△产菜ハ諸書ニ出タレ用ル人少シ多始テ用覺タリ世医ニ事ニ心掛ウスキ故也

△广佛ヲ用ント欲セハ診察ヲヨクスハシ血氣不

爽物中滯痰宿水心下痞硬ノ者ハ決メ不可用先

版中ヲ療メ後々ハシ

△六佛印ハ気血経絡ヲ一時ニシメル也大抵十ノ

物五六分シノルト見ユ尽シメル寸ハ先

△六沸頭眩甚メ不醒者ハ藜香圓ヲ与テ大ニ効ア

△赤紫色ヲナシタルモ高ク凸起メ鶏ノトサカラ

見タルヤウノ者ハ治スル也其内紫色ナル者ハ

取レカタシ里色ニメ毛ナト生スル者ハ大カタ

高ク起リテアル者ニテ直リ易シ火傷ナトニテ

痕高クナル者有リ何レモ乱刺メ拔毒ヲ貼シ火

傷ハ大赤破敵ナトツクヘシ危直ル者也口

ンメ大ニテ削ルモ可也其腐タルヲ見ハ即愈シ

膏ヲ傳ヘシ

△凡刺膀胱者去脐下九也余一寸斗ハ脂皮間ニ

マリタル水ヲ取ル也四五歩ニテ水虫一寸位皮

薄キ処故ニ然リ

予リ家ノ蒸菜ハ其名唐ノ李靖ガ陳法ニ拠故所

各ノ意ヲ知レハ則膏ノ効亦自知ヘシ

△後衛ハ毒殘リテ欲愈不愈者ニ貼ス上ヨリ捍ス

効アリ

△青蛇ハシノレ効アリ左突ニ合スレハ危膿ヲ吸

効アリ

△中黄ハ解熱解毒ノ効アリ

△先鋒ハ熱ヲ解シ毒ヲ消散ス托膿ヒント欲スル

寸ハ中黄ニ左突ヲ付テ克軍ク膿者也

△白雲ハ新疵ニ用ユ火傷杯ハ牡蠣ヲ加フ

△大赤ハ專ラ火傷肉腐ニヨシ

△前衛ハ金創ニヨシ何レ新疵ニ貼ス内ヲ生ル也

△决勝ハ今用ルハ血竭一果或血竭魚名異ニ果芦

膏乳波ヲ畧ス

19
581

大玄ハ左突破敵ノ輕キハ推懸光破敵腐肉ノ有
ニヨシ旌突ニハ蓋美ハ愛血ヲ散ス
破敵ハ有塞肉者ニ貼ス無塞肉寸ハ肉ヲ生シム
ル故ニ凡突ヲ貼ス

花園春林軒
青洲翁雜記終

