

袖珍內外方叢

山物

一

同

二

本草綱目

袖珍內外方叢卷之一

藥品總目

卷之一

第一綱上 山物

第一目 可燃體

硫黃華 硫黃乳 木炭 燐素

第二目 酸類

硫酸 磷酸 鹽酸

蘇魯林水 哥寧極水 蒸餾水

酒石鹽 安息香萃 琥珀鹽

醋

青酸

茅三日

羅伍監

釐乙典坵羅伍

刺必斯加烏私整

礶砂加石灰精

石灰水

煨製麻伍涅失亞

卷之二

第一綱中

山物

茅四目

鹽類

酒石鹽

炭酸剝烏亞斯

餒蓬鹽

炭酸曹達

麻伍涅失亞

礶沙揮發華

礶砂精

鹿角揮發鹽

鹿角精

鹿瑞液

孕礬酒石

芒消

食鹽

煨精食鹽

礶砂

酒石葉

酒石葉液

酒石葉

民坵列里精

孕餒酒石

純精酒石

孕餒酒石

孕蓬酒石

蓬砂

結鹿土

麻伍涅失亞

瀉利鹽

明答

枯礬

鹽酸加禹基

鹽酸壘土

第五目

硫羅伍監

硫砒砂

硫水素礪

硫加爾基

硫剥篤亞斯

卷之三

第一綱 下 山物

第六目 金屬及其製

其一 銀

銀卷 刺必斯印歌甫那栗斯

其二 水銀

華涅滿溶汞水 赤降汞

越扶屋布斯密涅刺列 赤汞水

外汞 甘汞 白降汞

其三 銅

硫酸銅 礪銅卷

其四 鐵

精製鐵屑

越扶屋布斯末兒扶亞栗斯

格碌屈斯末爾扶斯

撒兒末爾扶斯

升鐵鹽

末爾扶斯鎮痛液

收斂鐵液

礪鐵華

卷之四

第二綱

收斂鐵液

礪鐵華

鐵丁幾劑用達方 榘楂加鐵丁幾劑

其五 錫

錫屑

其六 錫

密陀酥 羅獨窠篤甫

銘糖

其七

亞鉛華

其八

金硫黃

榘楂加鐵丁幾劑

錫

錫

錫

羅獨窠篤甫

銘糖

亞鉛

皓峇

安質沒担護

結甫茂斯密涅刺列

安質沒加甫基 越扶屋布斯安質沒担 安質沒酪

吐酒石 安質沒酒

其九 昆私繆篤

消酸昆私繆篤

其十 砒石

砒酸

卷之四

第二綱 植物

第一目

麻醉藥

其一 青酸麻醉藥

青酸 出于第一網中諸酸之部

老利兒結雷斯水

其二 苦味麻醉藥

番木鱉

其三 本性麻醉藥

失鳩答 阿芙蓉

刺伍默加非魯薩越我刺

底里答幾斯

菲阿斯夫亞密 荳蔻 蔓陀羅華

煙州葉 寶芝答利斯

其四 酷房揮發性麻醉藥

格爾夫屈謨 蘆蘆 薩拔實利

黑列撲利 雙鸞菊

彪兒薩室刺尼屈里宰斯 即白頭翁

斯大必私亞屈利亞 守末屈

卷之五

第二綱 植物

第二目 酷房藥

其三 浸蝕酷房藥

番柁 瑞香 龍骨木脂

其二 揮瓷酷厉藥

白苡子 沙蘿蔔 山芥菜

碎米薺 大蒜 葱 海葱

設需謨亞屈列

其三 胡椒性酷厉藥

胡椒 白枙 畢澄加

其四 華爾斯性酷厉藥

朴屈福烏篤 遠志

剝列乙瓦刺 亞末羅 濱瞿麥

山牛蒡 蜀羊泉 沙雨薩根

亞兒兀加 蘇詩百乙列篤律謨根

三色堇菜

卷之六

茅二綱 植物

茅三目 吐藥

杜根

茅四目 下菜

蘇旃那 大黃 葯刺巴

蘇甘沒扭謨 蘆會 格碌董篤

藤黃 瓦刺微阿刺 傑脛弗魯伊

卷之七

第二綱

植物

第五目

華雨斯性藥

尋常華雨斯

格碌波尼亞

麥雨

阿利拔奴謨

乳香

蘇合香

安息香

琥珀

第六目

拔雨撒謨性藥

拔雨撒謨字露

蘇合香油

的列並底那

拔雨撒謨格拜霍

波藥

越謨安波尼亞幾

卷之八

第二綱

植物

第八目

揮發油性藥

其一

的列並油

杜松實

杜松實油傑列乙

杜松實油

薩昆那

薩昆那油

其二

錫布羅性油藥

錫布羅

加耶普的油

迷迭香

刺賢怪兒 芥沃刺那 薄荷

面說基里私把 草零陵香

設訥利實烏謨

其三 土木香性油藥

土木香 阿而芷 味實羌活

攝再扁答里亞

其四 臭油藥

緬州 綿馬 攝絲施那

接骨木花 其五 甘油藥

玫瑰花 董菜花 歌而拔斯屈謨

蒼椴樹花

其六 香油藥

葛蒲根 益良姜 益智

其二 肉豆蔻 府利 必面託 丁子

洋芥子 葛縷子 格墨因

苗香子 過泥子 角苗香

百香蘭度苗謨 雜復蘭

以上十九品 本世香油藥

卷之九

第二綱

植物

加密列

加斯葛栗刺

橙皮

青橙

橙花

橙葉

西爾鮮

青蒿

菁草

以上九品苦味香油菜

第九目

若味藥

其一

本性苦味菜

蒲公英

葛爾儒乙別涅實屈蟄

珊篤里

健質亞那

睡菜

括失亞

西瑪甫板

其二

越謨性苦味藥

格綸僕

依蘭苔

其三

鮮熱性苦味藥

安恆斯點刺

幾那

第十目

水瀟菜

百藥煎

吉訥

榭皮

沒食子

榭實

烏爾面室刺

坎而設木

石榴皮

胡桃外皮

榆皮

烏白烏爾識

洞庭藍

七葉樹皮

白石餘

卷之十

第三綱 動物

第一目 疥癩藥 疥癩藥 疥癩藥

第二目 揮發藥 揮發藥 揮發藥

第三目 苦味藥 苦味藥 苦味藥

第四目 糖性藥 糖性藥 糖性藥

牛膽 牛膽 牛膽

蜂蜜 蜂蜜 蜂蜜

鹿角 鹿角 鹿角

魚膠 魚膠 魚膠

乳汁 乳汁 乳汁

第七目 脂性藥 脂性藥 脂性藥

酪 酪 酪

黃臘 黃臘 黃臘

其子墨 其子墨 其子墨

山物 山物 山物

附錄

其子墨 山物 山物

其子墨 山物 山物

倔	鞞	渴	趨	忽	放	刺	黜	拔	微
倔	鞞	渴	趨	忽	放	刺	黜	拔	微
麗	斯	兒	阿	弗	哈	放	噎	兒	爾
涅	的	拂	栗	滿	羅	退	軫	魯	朗
爾	爾	兒	斯		歌	涅	屈	烏	
	第								
	吉								

訖	亞	惡	蹙	扼	蓬	越	布	末	耶
訖	亞	惡	蹙	扼	蓬	越	布	末	耶
謨	大	計	兒	纒	屈	垓	歛	涓	姪
墨	兒	爾	概			螳	幾	西	祿
		滿	爾			屈			篤

懼	哥	央	私	沕	尼	羅	的	烏	屈
懼	哥	央	私	沕	尼	羅	的	烏	屈
兒	百		托	極	格	拔	朗	栗	亞
涅	兒		兒	爾	味	篤	百	弗	謨
篤			結				爾	篤	布
									弗

加	風	歇	拂	計	括	繆	胫	法	邁
加	風	歇	拂	計	括	繆	胫	法	邁
赫	的	兒	郎	列	隣	德	浪	弗	篤
西	爾	斯	屈	乙	田	涅	斯	列	末
爾				尼		兒		兒	火

袁 偃 滉 訶 阿 叱 肅 麗 蘇 火

袁 度 偃 亞 華 滉 弗 涅 訶 烏 列 雨 阿 失 安 姪 雨 叱 葛 歇 雨 肅 烏 亞 兒 株 麗 兒 蘇 屈 列 軫 傑 兒 火 鳩 伊 雨

思 滿 珩 燉 擗 西 鵝 丘 薛 剛

思 瓦 補 的 兒 滿 蘇 尼 珩 的 雨 弗 朗 屈 燉 列 乙 施 屈 擗 倫 度 西 勃 兒 篤 鵝 弊 賢 屈 丘 謨 蒲 列 屈 德 薛 兒 剛 釐 兒

幾 斯 協 支 失 賢 瞥 謬 聲 號

幾 利 墨 雨 斯 屈 列 傑 兒 協 雨 珉 度 支 葛 歇 兒 失 加 揉 弊 雨 篤 賢 揆 宋 瞥 私 宋 謬 爾 杏 聲 禹 號 毘 烏 私

蓄 颯 求 鬱 栗 茱 狹 鏡 華 哈

蓄 輪 吉 颯 普 求 僕 乙 斯 鬱 窮 龜 瞞 栗 屈 的 兒 茱 兒 鳩 私 狹 雨 屈 失 弗 鏡 瑱 里 篤 華 兒 列 私 哈 羅 歇

紅 比 怖 設 啞 勿 血 遇 葑 孤

紅亞鳥天利篤
比爾天蒲良土
怖盧鳥私
設見列
啞練滿
勿心見
血兒蓮斯晚度
遇野
葑乙屈的兒
孤碌斯

沃 祀 德 篤 須 蹙 屋 奴 噦 歌

沃私拂朗屈
祀篤
德路斯
篤謨
須微旬
蹙瓦甬的
屋地兒
奴弗歌甬
噦乙加甬度
歌伊設兒

百 乳 沒 浮 契 衰 鞅 過 質 併

百兒失華甬
乳滿
沒設私芟里非拔
浮甬的飲
契列私室尹
衰魯苦列私別乙
鞅兒帝刑
過甬謨私德怨屈
質祿烏
併密計兒

昉 儒 昆 室 鹵 古 依 格 跋 陞

昉墨
儒蘭埵
昆刺地
室卒德
鹵屈密篤
古甬黜謨
依百乙
格兒換
跋甬鐵兒斯
陞甬吉鳥私

術 位 弼 魯 遠 回 朱 物 守 列

術^レ位^レ弼^レ魯^レ遠^レ回^レ朱^レ物^レ守^レ列^レ
術^レ僕^レ乙^レ斯^レ 位^レ南^レ列^レ護^レ斯^レ 弼^レ失^レ幾^レ乙^レ兒^レ 魯^レ覺^レ見^レ多^レ 遠^レ突^レ鳥^レ 回^レ華^レ兒^レ儂^レ 朱^レ他^レ兒^レ 物^レ兒^レ魯^レ拂^レ 守^レ託^レ幾^レ里^レ弗^レ 列^レ墨^レ兒^レ

允 寶 個 麻 赫 揭 苦 奠 樞 弗

允^レ寶^レ個^レ麻^レ赫^レ揭^レ苦^レ奠^レ樞^レ弗^レ
允^レ寶^レ兒^レ墨^レ兒^レ 個^レ屈^レ林^レ 麻^レ健^レ地^レ 赫^レ列^レ涅^レ鳥^レ歌^レ 揭^レ列^レ私^レ珍^レ 苦^レ留^レ僕^レ 奠^レ乙^レ 樞^レ屈^レ拔^レ甬^レ記^レ 弗^レ甬^レ味^レ儂^レ

暹 邊

暹^レ邊^レ
暹^レ僕^レ列^レ兒^レ

第一細 山物

身一日 可性體

硫黃華

木炭

身二日 酸穀

硫酸

煤酸

蘇魯林水

甫

甫^レ僕^レ甬^レ

硫黃氣

煤酸

力酸

鹽酸

哥亭低水

蒸餾水

酒石鹽

安息香萃

琥珀鹽

青酸

第三目

羅極鹽

釐乙典埕羅極

刺必斯加烏私整

礪砂加各灰精

石灰水

煨製麻屈涅失亞

第一圖

某品註目

蘇氏內科方叢卷之一

袖珍內外方叢卷之一

括套

諸藥品次序從和蘭局方列之若其製劑各就其
本藥條或其製劑中為主品者舉之例如莨菪越
幾劑則從莨菪條如鉛硬膏則從酸化鉛條如蓬
酸鎮嘔散則從炭酸曹達條而舉烏等是也○加
近世新發明之藥品載在附錄

第一組

山物

從和蘭局方之例分之為六目一曰可燃體二

曰酸類三曰羅偃鹽四曰鹽類五曰硫羅偃鹽
第六曰金屬及其製劑

○第一目 可燃體

硫黃華

為散錠紙煉每服三片五片十片至三十片

第一方

硫黃華 紙精酒石 沙糖 或邊際子

右為散朝夕服一茶匙

第二方

硫黃華 乳糖

伊里斯弗魯連底那

右為散分十服每一時一服乳汁送下自三週至

一歲兒之服量

第三方

硫黃華 乳糖 甘草

伊里斯弗魯連底那

右為散每一時一茶匙冷水送下大人服量

第四方

硫黃華 甘草膏 沙糖

右作錠七十箇每一時服一箇二箇至四箇此劑

一沙糖子 蓄薇水煎
右調勻為吸劑每半時服一茶匕臨服宜振蕩之
為小兒服量一至二十分

木炭 カルバペケタビクス

為散及吸劑每服十匕至三十匕○外用為搽劑
磨盡散琵琶布軟膏

第一方因 治腐敗膽汁熱

木炭 四至至 六錢 羯布羅 二十至三十匕

右為散每半時服半茶匕以酒送下

第二方 治間歇熱

木炭子

右每一時服一二茶匕骨喜送下

第三方因 治腐敗性赤痢

木炭子 亞刺昆 亞蘆謨末煎 沙糖子

蒸餾水煎

右作吸劑每四分時服一食匕

外用

第一方

木炭 赤幾那末各一 煎藥

右合搽敷創上

第二方

木炭^半 赤幾那 沙糖 沒藥^{各二}

丁子油^{十五} 橙皮油^十

右為磨齒散

第三方

木炭 赤幾那 水楊皮 泥菖根^{各二}

右為散用酒作皂布微溫貼患處

第四方

木炭 家猪脂

右作軟膏

第五方

木炭 複方蘇合軟膏^{各一} 檀製法[○] 的列

一^一 越列密黃蠟^{各七} 右微火^解 挑油^十

加蘇合油^七 沸騰已^{更上} 微火^蒸 散水^下

右作軟膏

燐素

以亞的爾若油溶解每服十^分 瓜十^分 瓜八

分瓜錐多不過半瓜

一方

燐素^三 亞的爾若^半 鱗草油^或 實^及 馬

右溶解每服五湯十湯至三十湯用永半碗若沙
列布粘汁若酒送下日三四次
又方

燐素^二油^一三^三溶^一鮮^一亞刺^一昆^一亞^一護^一平^一

扁桃^二去^一皮^一覆^一盆^一子^一水^一三^一覆^一盆^一子^一舍^一利^一別^一三^一平^一

右研合為乳劑每一時半服一食心

外用

一方因治痛凡

燐素^二薩^一冕^一那^一油^一的^一列^一並^一油^一各^一半^一

硃砂加石灰精^三

右溶解擦關節腫

又方腫治疫咳

燐素^三錫布羅^十葛^一縷^一子^一油^三

右溶解擦胸及胃部有腫間日三次

第二目酸類

硫酸^二半^一錢^一至^一一^一錢^一為^一清^一劑^一若^一密^一屈^一劑^一或^一取^一半^一錢^一至^一三^一

錢^一和^一水^一一^一加^一覆^一盆^一子^一舍^一利^一別^一三^一為^一飲^一劑^一

第一方

硫酸^一或^一橙^一皮^一水^一

外用

一 右 芳 潤 每 蒸 餅 食 也
又 消 酸 半 一 弓

右 注 于 浴 湯 名 消 酸 浴 湯

又 方 取 子 舍 陰 保 汗 湯 水 半 碗 或 沙 列 布 粘 汁 火

酸 化 家 猪 脂 二 一 弓 圍 製 法 〇 家 猪 脂 十 六 弓 消

加 消 酸 用 硝 子 棍 不 休 手 攪 伴 試 投 刺 屈 謨 秘
紙 候 其 色 不 變 冷 定 固 封 暗 處 野

右 為 外 用

燐 酸

每 日 一 錢 至 二 錢 為 密 屈 割 若 湯 割 或 常 用 飲

一 方

燐 酸 一 匙 至 三 匙 水 或 橙 花 水 六 匙 益 子 舍 保 汗

覆 盆 子 舍 利 別 弓 十 弓 至 八 弓 十 湯 大 麥 水 一 盞

右 調 勻 每 一 時 服 一 食 匕 即 平 越 至 一 盞 每 即

又 方

燐 酸 五 蒸 餾 水 各 一 匙 湯 湯

右 十 湯 十 五 湯 二 十 湯 至 三 十 湯 大 麥 水 半 碗 和

用 日 三 次

外用

小 兒 應 用 方

一方 治腐骨

薩昆那煎 或揚皮 燐酸 一匙至

沒藥丁幾劑 或十劑至二十劑 大麥水半碗

右与射注劑或浸撒絲貼患處

監酸 アミチニ合ミニリカチ云

与密屈割若渴劑 每日服半錢至一錢或每服

五滴十滴至二十滴 少量水內點服

一方 監酸 水或橙皮 覆盆子舍利別子

右每半時若一時服一食匕 割若渴劑或常用飲

又方 監酸 蒸餾水 各一 玫瑰蜜

監酸 蒸餾水 各一

右每二時半若二時十滴至二十滴 大麥水一盞

點服 阿煎藥丁幾劑

外用

一方 監酸 十匙 桑椹舍利別子 右取硝子

阿煎藥丁幾劑 或一匙 一日入

右調白用毛筆或毛羽塗患處 若小兒應用方

蘇魯林水 ソロリヨ合キニカア一匙量 大若小兒應用方

蘇魯林水 每服一匙至二匙 量水若大麦水 和服

蘇魯林水 覆盆子水 或橙花水

右調勻 每半時一食 大麦水半碗 和服

外用

第一方 治頭瘡

蘇魯林水 一匙 至十滴 量水內 點服

右調勻

第二方 治齒齦失音 見陪苦

蘇魯林水 六 薔薇水 六 玫瑰蜜 二

右為含嗽劑 治驚口瘡

蘇魯林水 過見託里舍利別

右調勻 用毛羽塗舌

哥寧偓水

製法 消酸 監酸 右取硝子 置於冷水中 注兩酸 合和 蓋閉 靜定 一二日 入硝子 處冷地貯 唯浴湯脚湯用之

一方

哥寧偓水

右注于浴湯

又方

哥寧極水

右注于脚湯

蒸餛酢

外方 羊子用子至二子和水一此為飲劑

外用

第一方 治弱性白帶下

刺答厄煎

蒸餛酢

右射注于宮或鼻孔

第二方

撒甫非煎

蒸餛酢

右合為含嗽劑

第三方

酢水

右為灌腸劑冷用

第四方

燕麥水

右為灌腸劑微溫施之

第五方

香甯酢 圖二

右嗅之或洗顛顛

酒石酸 アレチ云。タルタリキ云

一錢至二錢為密屈劑或和水二匕為飲劑又取五匕至十匕為散

一方 和水一匕為飲劑

酒石酸 一毛至 橙花水 四至

覆盆子舍利別

右調勻每半時服一食匕
又方

酒石酸 一毛 沙糖 一 枸橼油 十

右為散每服取一茶匕水一盞酒盞和服以代用

里没奈埵 六箇 櫻桃 一箇 櫻桃 一箇 櫻桃 一箇

安息香華 アレチ云。ペンソニキ云

為散每服二匕五匕至十匕

一方 安息香華 茴香油糖 十 薑 一 薑 一 薑 一

右為散製劑六箇每一時取一劑菩提樹花泡劑

或和胞泡劑送下每一劑者一階味甜或階下

又方

安息香ハハ 錫布羅ハハ 過瓦子油糖ハハ

右為散製劑四箇每一時取一劑和胎泡劑送下

琥珀鹽

每服二ハ五ハ至十ハ和沙糖為散○大抵與

麝香ハハ 右私寫續謨錫布羅礪砂揮ハハ 等配合

一方團治寒壞疽ハハ 至十八

麝香ハハ 琥珀鹽ハハ 沙糖ハハ

右為散製劑六箇每一時半取一劑以酒送下

又方隨治惡性各瘍ハハ 加密列越幾劑ハハ 沙糖ハハ

琥珀鹽ハハ 加密列越幾劑ハハ 沙糖ハハ

右為散製劑五箇一日

青酸 アシナム、プリキシキム

每一時或一時半服ハハ 分滴若一滴至二滴一

日服量漸加至十二滴以二十滴為極度不見

一日服量一滴以六滴為極度作乳劑最佳

○第一方隨

青酸ハハ 蒸餾水ハハ 漿ハハ 或糖漿ハハ

右每一時服ハハ 食ハハ

○第二方隨

扁桃乳ハハ 青酸ハハ 瀉ハハ

右合每一時半服一二食也

○第三方痛

實菱シ答利カ私シ一錢一浸沸湯取適八宜手過冷

青酸二十滴至二亞刺昆亞護漿

○右合每一時服二食也

○第四方

依蘭苕放青酸八玫瑰舍利引

右調勻每一時一二食也

○第五方

治小兒瘧疾及疫咳

白鑿粟子錢

甘扁桃一

苗香水三

過兒託亞舍利引

右搗碎為乳劑加青酸四滴至六滴每一時服一食也

○第六方

青酸滴亞刺昆護漿

過兒託亞舍利引

右調勻每一時服一茶匕為大人服量

○第七目 羅屈鹽

藥ハ乙イ地テ羅ロ屈ク ホト子。リキニ

每服一湯至二湯加粘汁用之然供內服大抵

以刺必斯加烏私カウカスチ 蝨シ 溶劑代五ト

至一羊

刺必斯加烏私カウカスチ 蝨シ 屈私クシ

ホットアサヒ

每服半八ハ 一八ハ 至二八ハ 用永尋量ニ 溶解レ 肢ニ ○浴湯

加三ニ 莪ニ 至羊ヲ

○一方獨 治腺病

刺必斯加烏私カウカスチ 蝨シ

一錢以蒸餾水一ヲ溶解

右加水尋量ニ 至無浸蝕味朝ニ 饌後夕卧前服之○
肢量一歲至二歲者每日二滴至十五滴ニ 四歲至
八歲者一乃至羊ヲ 八歲至十五歲者一錢至一

弓餘

礮砂加石灰精アムモリキエイト

每服一滴三滴至十滴ニ 和粘汁ニ 與之ニ 或取一月

至羊ヲ 製蜜ニ 屈劑ニ 六羊ヲ

○一方 名礮砂加燒酒精

礮砂加石灰精ニ 再餾燒酒ニ

右調勻每後十滴二十滴至三十滴ニ 水或茶一碗和服
或取半莪ニ 至一莪ニ 羊ヲ 和密屈劑ニ 若並劑ニ 若

浸劑ニ 六羊ヲ 至八羊ヲ

○又方 名礮砂加過泥子精

○ 礮砂加石灰精并 再鑄燒酒并

過泥子油土法至

右合每服十滴二十滴至三十滴冷水點服或取

羊錢至二錢和飲刮六子至八子

外用

○ 第一方

礮砂加石灰精

右為嗅藥并 再鑄燒酒并

○ 第二方

礮砂揮發膏并

○ 第三方

礮驗揮發膏

錫布羅谷二錢
右重湯煇和

右每一時或一時半塗擦患處

○ 石灰水

一弓二弓至四弓一日二次乳汁若粘汁若方

○ 一方

石灰水十弓至

右每一時半取一食已至一碗一乳汁和服

外用

○第一方 治華齒屋兒謨 皮瘡之

石灰水 扁桃油 各二勺

右濕患部日一二次

○第二方 治火傷

石灰水 阿列襪油

阿芙蓉液

十滴至二十滴

右塗患處

○第三方

石灰水 八勺至十六勺

右洗患部或浸撒絲布之綁帶

製製麻 壓涅失亞 アキチア。エキ

為散若密屈別若加味藥 每服十人至二十人

小兒二瓜至五瓜 ○此藥禁下與金屬鹽混合例

加甘汞。鉛糖。吐酒石。丹礬。皓礬。綠礬。升鐵

鹽明礬。礪砂。純精酒石。是也

袖珍內外方叢卷之一終

○ 藥方 治 諸 症 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 效 驗 如 神

石 灰 水 一 斤 煎 地 油 五 斤

古 法 製 藥 日 一 二 次 服 之

○ 第 一 方 治 疔 癤

○ 藥 方 治 疔 癤 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 效 驗 如 神

○ 藥 方 治 疔 癤 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 效 驗 如 神

○ 藥 方 治 疔 癤 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 效 驗 如 神

○ 藥 方 治 疔 癤 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 效 驗 如 神

○ 藥 方 治 疔 癤 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 效 驗 如 神

袖珍內外方叢卷之二

藥品標目

第四目 鹽類

酒石鹽

鹼蓬鹽

麻屈涅夫亞

礪砂精

鹿角精

厚礬酒石

消石

鹽類

照類

炭酸剝篤亞斯

炭酸曹達

礪砂揮發華

鹿角揮發鹽

鹿瑞液

芒消

食鹽

煨製食鹽

酒石葉

酒石葉晶

孕鹼酒石

孕鹼酒石

蓬砂

結麗土

瀉利鹽

藥枯卷

蘇由長鹽酸重土

礪砂

酒石葉液

民埕列里精

純精酒石

孕蓬酒石

磷酸曹蓬

麻倭涅失亞

明卷

鹽酸加甫基

袖珍肉 第五目 硫羅倭鹽

硫礪砂

硫加甫基

硫水素礪

硫剝篤亞斯

酒石鹽... 酸... 第一方... 右調勻... 時服... 食... 每... 〇播... 每服十

假裝食鹽

酒石菜

酒石菜晶

季驗酒石

季驗酒石

季驗酒石

季驗酒石

季驗酒石

季驗酒石

季驗酒石

酒石菜液

氏拉列里精

氏拉列里精

氏拉列里精

氏拉列里精

氏拉列里精

氏拉列里精

氏拉列里精

氏拉列里精

袖珍內外方叢卷之六 第一 第二 第三 第四 第五 第六 第七 第八 第九 第十 第十一 第十二 第十三 第十四 第十五 第十六 第十七 第十八 第十九 第二十 第二十一 第二十二 第二十三 第二十四 第二十五 第二十六 第二十七 第二十八 第二十九 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

第四目 鹽類

酒石鹽 シユアカルボナスニホットアサ
即精製剥篤亞斯

酸敗液 每服二匁五匁至十匁 ○搗搗 每服十

匁至二十匁 共為溶劑

第一方

酒石鹽 一匁以蒸餾水 桂舍利別

右調勻 每一時服一食

第二方

酒石鹽 一匁以蒸餾水 桂舍利別

酒石鹽一 亞刺毘亞護謨漿一

雞子黃三 雨水三 舍利別一

右調勻每一時服一食一為小兒服量

第三方 治搖搦剛症牙關緊急

酒石鹽二 蒸餾水六

右溶和每一時若一時半服二食七

第四方

酒石鹽一 蒸餾水一

右溶和酸敗液每二時服十滴至二十滴搦剛

症牙關緊急每平時若一時取二十滴至四十滴

大麥水半碗點服

外用

第一方

酒石鹽一 至五

右為一點裹蠟紙與之○用法取二點溫湯溶解

以注于浴湯

第二方

煎酒釐乙典埵羅伍半

右用法同前

第三方

治曹墨兒弗刺見婦人額面

酒石鹽^三 食鹽^二 薔薇水 橙花水^各

右溶和為洗劑

炭酸剝篤亞斯カルボナス、ポトアサ

用法如炭酸曹連

蘇蓬鹽 シテカルボナス、ソーダ

服量同酒石鹽

一方

蘇蓬鹽^三

右分六服用列印設酒一小麦酒盞送下

又方

蘇蓬鹽^二 枸櫞汁^{新榨者為宜}

桂水^三 舍利別^半

右調勻每半時服一食匕

炭酸曹連^{カルボナス、ソーダ}

一方

蓬蘇鎮嘔散^三 醋製法^〇 蘇蓬鹽^品 石酸^一 糖^一 蘇蓬鹽^品 右各別上

微火乾之研

右分九服每四分時取一服冷水溶和頓服

麻偃涅失亞^{ニブカルボナス、マクシア}

用法同煨製麻偃涅失亞〇牡蛎蛎石亦同

礪砂揮莖華

シテカルボナス、アムモニア

取半钱加摸番扁答里纈草等浸劑然大抵以

礪砂精代也

礪砂精

シテカルボナス、アムモニア、リキニイヂム

每服十清至三十清或取一钱若二钱和密屈

劑若煎劑六乃至八

鹿角揮莖塩

シテカルボナス、アムモニア、ペイロ、アニマレ

每服二钱五钱至十钱加沙糖或乳糖為散若

丸

一方 治子宮衝逆

鹿角揮莖塩

阿魏

白石

纈草油

右調勻加健質亞那越幾劑適宜二钱為一丸硝

子罌固封貯每服五丸至八九日二次

鹿角精

シテカルボナス、アムモニア、ペイロ、アニマレ、リキニイヂム

每服十清二十清至三十清泡劑煎服或取一

钱至二钱和煎劑浸劑若密屈劑六乃至八

一方

鹿角精

海葱酢

玫瑰舍利別

舍電發謨阿芙蓉液

右每一時取二十五滴至五十滴杜松子泡劑點
服為利尿劑

又方

續草根 細到者 設訥剥實烏謨葉

右浸出瀘過取八分加鹿角精一匙至二匙亞的

兒二十滴每半時服一食

鹿瑞液 シクニヌアムニアロアニマレリキイ至

每服十滴十五滴至三十滴泡劑若滴劑點服

或取一匙至二匙和浸劑若密屈劑六分至八

一方

鹿瑞液 亞的兒 各二

右每一時十滴至五十滴冷水點服

孕蓉酒石 シクニヌアムニアロアニマレリキイ至

解凝及清涼劑每服十氏至二十氏雖多不過

一錢為下劑而及至六錢

一方

孕蓉酒石 牡蠣

右合分九服每一時一服

又方

厚蓉酒石戈 杜蘅根戈

右合每二時半服一小茶匕

芭消ニテハスツイ

解凝劑取凡化者五匁至一匁為散○下劑取結芭者半匁至一匁半水或稱那浸劑溶和

一方

扁桃油半一 亞刺昆亞蘆護水

右為密屈劑加芭消一匁若一匁半溶解每二時服一茶匕以至得下

又方

芭消六 蕉留水 枸橼汁新搾者

覆盆子舍利別一

右每半時服一茶匕以至得下

外用

消石ニテラス。ホットアサ。テヒユ。ク。云

每服五匁十匁至二十匁為散或取一錢至二錢和密屈劑若乳劑六匁至八匁

第一方

消石 亞刺昆亞蘆護 沙糖各一

右為散分六服每一時一服

第二方 各清涼散

消石 孕蓉酒石 牡蛎

右為散 每一時若一時半服半茶匕 若一茶匕或

代之以次方

第三方

鎮症散 酒石半 銀朱二 戎右研合

右每一時若一時半取半茶匕 冷水送下

第四方

邊兒託亞煎汁 硝石

邊兒託亞舍利別

右調勻每半時服一食匕

第五方

扁桃乳 消石

邊兒託亞舍利別

右調勻每半時服一食匕 臨用宜振蕩之

第六方

消石 亞刺昆亞護 蒸餾水

邊兒託亞舍利別 安質沒酒

右調勻每半時服一食匕

外用

第一方 德

大麥煎三四 桑椹舍利別 消石八十五

右溶和為含漱劑

第三方 藥

消石一錢半至 燕麥煎汁五 屋施茂爾一

右溶和微溫為灌腸劑

第三方

消石一錢半至 礶砂六

右研合取一食匕水適宜溶解蘸巾置患處

食鹽

每服一茶匕至一食匕日一二次

一方 圖 治完穀下利

枸橼汁新採者 食鹽枸橼汁飽和為度 橙花水十六

右合每二時若三時服一酒盞

外用

第一方 法 治灰白腫

食鹽一 雨水二十 燒酒或兩

右溫蘸毛布若綿布尉膝蓋

第二方 圖 治灰白腫

蒲里阿尼根一

右用_二水四_匕煮_二瀘_一過_二和_一酢三_匕食鹽_二適_一且調_二勻_一令
得_二可_一瓊_二之_一溫度_二蘸_一毛布_二慰_一膝_二蓋_一

第三方

加_二密_一列_二浸_一食鹽_二一_半至

亞_二麻_一仁_二油_一半_三至

右_二合_一作_二灌_一腸_二劑_一

煨製食鹽

增製法。取食鹽內磁器密封埋炭火至爆繁休或白末為度固封貯

外用

第一方_一治_二角_一膜_二斑_一點

煨製食鹽

牡_二蛎_一末

右_二為_一極_二末_一微_二濕_一筆_二端_一抹_二藥_一末_二以_一入_二眼_一中_二或_一用_二鷺_一翎

管_二吹_一入_二眼_一中

第二方

治_二粘_一液_二腫_一遷_二延_一水_二腫_一瘰_二癧_一

煨製食鹽

右_二吳_一熱_二柿_一布_二片_一置_二患_一處

第三方

羅_二治_一代_二指_一

右_二和_一雞_二子_一黃_二作_一軟_二膏_一塗_二指_一

確砂

日一二三六〇

五爪至十爪或間有平月至一月日二三次
取一錢二枚至三枚和密屈劑若浸劑六至

第一方 治遷延喘息經久淋疾

礪砂 甘草末

右為散分九服裏蠟紙與之每一時半一服

第二方

礪砂 錫布羅 亞甫尼加花

右為散入硝子罍與之每服一茶匕日三四次為

和胸及催生通經劑

第三方

礪砂 蒲公英越幾劑 邊兒託亞末

右二爪或三爪為一九衣桂末服五九至八九日

第四次

第四方

礪砂 甘草膏

接骨木花水 屋施茂馬

右先用接骨木花水溶和二味次加屋施茂馬調

勻每一時服一食匕

第五方 治間歇熱

古確砂 珊篤里越幾劑 至各一匙

蒲公英越幾劑 加蜜列水 八匙

右調勻 每一時服一食匕

第六方

確砂 亞刺昆亞獲謨 苗香水

沙糖

右調勻 每一時服半食匕 為小兒飲劑 或大人惡

甘草膏者亦宜此

外用

第一方

撒兒非亞葉 葵葉

右浸熱湯 適宜瀘過 取七了 加確砂二匙 蜜一了

為含漱劑

第二方 木名 諾瓦利斯 噴鹽

確砂 生石灰

右入硝子 罌粟之

第三方 熟地 三海 蘇合 降香 木香 山藥 以

右確砂 五兩 水 八升 酢 三升 浸之 隔日 煎取 一

右浸布片 慰患處

酒石葉 アセタス、ホトトギス

十匹二十匹三十匹至一戈為溶劑○或取一
錢二錢至三錢和密屈劑四至八此藥以
本易引濕氣不可為散丸

第一方 同 其五匹

接骨木花浸酒石葉 一戈至

海葱蜜 三

右調勻每服一食匕日三次 水散劑

第二方 同

酒石葉 一戈或酒石 洋芥水 三四

海葱越幾劑 十六 大黃舍利別 一服半

右溶和每二時服一食匕

第三方

酒石葉 半 再餽燒酒 半

右合每一時半取三十滴至五十滴冷水和服或

為密屈劑加藥 一六

第四方

大黃浸酒石葉 一

右溶和每一時半服半茶匕至一茶匕

酒石葉液 アセタス、ホトトギス、アサリキユイ、ギム

酒石葉液 一錢至半 用法加酒石葉

一方

酒石葉液 蘆根越幾劑 各一 至加密列水

甘消石精 丸

右調勻 每一時或一時半服 二食也

又方 圓

酒石葉液 半 再甘消石精 丸

格雷失屈 誤酢 密 或海葱

右調勻 每一時服 二食也

酒石葉晶 アセタス カリター

右為溶劑若散為散則常用 煨製者每服半 至

一錢 日一二次

一方

酒石葉晶 一錢 或 麻僮 涅失 亞 丸 沙糖 丸

右為散服 二食 七 日 三四次

民 堙 列 利 精 アセタス アマモニア カリキニ イナ

每一時一錢 至二錢 小兒二十滴 至三十滴 或

取半 和 搗骨木花泡 劑 臨卧 頓服 或 取半

至一 以上 和 浸劑 密屈劑 六 至 八

第一方

民埜列利精一至一安質沒担酒二錢二

接骨木花水三屋施茂兒三

右每平時或一時服一食七

第二方

纈草浸三民埜列利精一至一

鹿瑞精一錢五橙花舍利別一

右調勻每一時半服一食七

第三方

民埜列利精一橙花水或苦根水

麝香花舍利別一至一每服一至一

右調勻臨卧頃服次飲服接骨木花濃泡劑二碗

外用

一方

民埜列利精一至一蒸餾水三至一

右蒸紙貼患處乾則更換

孕驗酒石

一方固

孕驗酒石三大黃一至一硫黃乳二至一橙皮一

麻僣涅失一至一各一至一苗香油糖三

右調勻服一茶七日三次冷水送下

タルトラス、ホットアサヒ、エト、ワーダー、柏椶皮、油、糖、

治依、利、昆、埜、兒、

右為砥劑服一茶匕日二三次

孕齋酒石 即固又法孕齋酒石

羊子至二三以水溶解或為砥劑若散劑

第一方

孕齋酒石 枸椽皮油糖

右為散冷水頓服或每半時服一茶匕以至得下

第二方

孕齋酒石 薑 檳榔 那葉末

右為砥劑每三時服一茶匕以至得下

第三方

孕齋酒石 茴香水

枸椽汁舍利別或大黃

右調勻每半時服半碗以至得下

第四方 **墜** 初生兒下劑

孕齋酒石 乳糖 舍利別

茴香水

右每服一茶匕臨服宜振蕩之

孕蓬酒石

墜 製法 蓬砂 宜石 錫 置 注 熱 湯 十 倍 添 解 之 用 木 匕 不 休 午 授 樣 徐 々 投 一 純 精 酒 石 透 宜 令 際 木 寫 硝 子 四 或 磁 皿 靜 定 一 晝 夜 紙 爐 上 文 火 不 住 半 授 樣 蒸 散 水 氣 試 取 少 許 照 冷

右 慶候連凝結可為粉末乃下火撒紙上取
至六匙以水四至六匙滾鮮每一時服一食
○此藥以易引濕氣不可作散丸

一方 孕蓬酒石 五 滿公英越幾劑 五

右 白屈菜越幾劑 五 點粟蘆水 五

右 調勻每一時服一食

又方 孕蓬酒石 五 洋芥水 五

右 孕蓬酒石 五 洋芥水 五

第 三 海葱蜜子 一 甘海鹽精 五

蓬砂 為散或以水若舍利別滾解每一時五片十片

右 至二十片

外 第一方 臨產催生宜此方

蓬砂 雜腹蘭心 桂油

右 為散分三服每半時一服

第 二 方 同上

蓬砂 消石 沙糖

右 為散每半時服一茶匙

第 三 方 同上

蓬砂四分至

桂油糖又半

右為散製劑六箇每八分時若四分時服一劑冷
水送下

第四方 臨產兼症學者宜此方

蓬砂六分至

阿芙蓉四分至

桂油糖又

右為散製劑四箇每半時服一劑

第五方 治驚口瘡

蓬砂五分 玫瑰蜜五分

右作吸劑服一茶匕日四次每劑止力十分

第六方 治小兒驚口瘡

蓬砂一分至

苗香水五分

遇雨託亞舍利別

右每時服一茶匕

外用

第一方 治顏面小疱

蓬砂半

薔薇水

橙花水各半

右為洗藥

第二方

蓬砂半

越波里膏五分

右合每夕擦乳房

第三方 治鴛口瘡

蓬砂 麩 撒 甬 非 亞 水 沒 菜 丁 幾 劑 匙

蜂蜜

右調勻

第四方 治角膜斑點

蓬砂 沙糖 蘆會越幾劑

蓋薇水

右深和

燐酸曹達

增製法 〇 數骨燒為白色者極末四廿精製硫
酸 二七 二 三 加 水 二 十 四 廿 稀 軟 之 古 合 內 錫

鉢不在手攪和者一時下火靜定候生底
取上澄其坐數注水掠取餘酸更用錫板
之至無遺為集其所得之液即過之先盛
意之次移之隨子善煮之散水氣殆至其
間底逐便生酸隨分去勿有遺漏〇取其
酸液適宜以釀造鹽水徐滴下至飽和紙
上結其散水氣試過冷水石上而結也則
令結其殘鹵更煮結如法終至全不結
子盡集其封貯 解凝劑半錢至一錢〇緩下劑
半多至一多雖多不過十錢

第一方

燐酸曹達 府利油糖

右為散分二服肉羹汁溶解午餉前頓服

第二方 治小兒鴛口瘡

燐酸曹連一 玫瑰蜜三

右調勻每服一茶匕

第三方 初生兒下割一

燐酸曹連一 茴香水 過再託亞舍利別三

右調勻每服一茶匕臨服宜振蕩之

結麗土ケル シニテカニホナスニカルキス

以牡蛎蛸蛞蝓代之然用二 麻屈涅失亞一 殊居多

麻屈涅失亞一 シニテカニホナスニカルキス 原書重出今從其舊一

為散若愈屈割每服五匕至四十匕

第一方一 名乳母散一

麻屈涅失亞三 橙皮半 茴香 沙糖各一

右為散每服一茶匕日三次

第二方 酸敗液宜用之

麻屈涅失亞二 葛縷子油糖或桂糖一

右調勻每服一茶匕日二次○小兒製此量二分

之一若三分之一每服一小力尖

第三方

麻屈涅失亞一 薄荷水三 橙皮舍利別半

右調勻每一時服一食匕臨服宜振蕩之

第四方一 小兒酸敗液宜用之

麻屈涅失臣カニ 大黃末カ 苗香水一多

舍利別了半

右調勻每一時服一茶匙臨服宜振蕩之

濕利鹽シユルバズ マダ子シア

解凝劑每服半錢至二錢為散若溶劑○下劑六

半多至一多半○灌腸劑六半了至一多○用法

同色消

明卷

シユルバズハス。アリニナシ。エト。ホットアサ

為散九煉溶劑五八十八至二十五八

第一方

治白帶下因弛緩者上

明卷二 亞刺昆亞趨護半

右為散分四服每一時半一服

第二方 因治崩漏

明卷一 阿芙蓉四 桂皮カ

右為散分四服每一時一服

第三方

明卷半 刺答凡越幾劑二 葛蒲根一

右二八為一九每一時半服五九至十九

第四方

明卷半 亞刺昆亞趨護三

列印設酒

右溶和每一時服一茶匕

第五方 治南漏

明荅

十五

薄苛水

桂丁幾劑

橙皮舍利別或白罌粟合

右溶和每八分時若四分時若半時服一食匕

外用

第一方 治失苟兒陪苦

明荅

十

玫瑰蜜

百藥煎丁幾劑

右溶和用羽毛若毛筆塗齒齦

第二方

玫瑰花

煮取一斗水

明荅

玫瑰蜜

右溶和為含漱劑

第三方

檫皮

六錢以水

明礬

再餽燒酒

右溶和為含漱劑

第四方

檫皮煎

煮取一斗水

明荅

右溶和射注腔內

第五方 圓 治後淋

胡荽一 薔薇水二

右溶和射注尿道

第六方

明荅一 酪新鮮者

右調勻敷首痔縛帶之

第七方

明荅一 鉛糖半 薔薇水四

右溶和為眼水

枯荅 ニユルニルニス。アリユニナシ。エト。ボットアサシ。エキニツカキム

第一方 名收閉散 止出血

鹽 枯荅 亞刺昆 亞護謨各一

右為散搽之

茅二方 治眼中潰瘍

枯荅 沙糖各二

右為極末吹入眼中

茅三方

枯荅二

右末創肉努張者宜搽之

鹽酸加禹基ニニリアス。カルキマ

增製法之精製結晶土造宜鹽酸造宜飽和為
度右令之溶和抱合蘆造上火蒸散水氣乾之乘
目熟研子攪

一方

鹽酸加爾基水

右每一時半服三十滴○六歲小兒服量

又方

鹽酸加爾基水 苗香水

右立清至十滴大麥粘汁送下日二次

鹽酸重土

增製法之精製結晶土造宜鹽酸造宜飽和為
利為亞斯乾末硫酸重土自然生者極末造宜炭酸

鳥亞斯一倍三分右精細混和盛潤埋一千度
火煨之候差熱以木棍屢攪拌進火度至其
內通紅但切勿令至鍊銷煨通半時下火冷定
注多量熱湯沈淨之以去其可淡鮮之鹽上取
所餘白未酸重土徐之清下鹽酸加糖水等候其沸
騰止全飽和靜定沈渣上澄駕硝子更上
火蒸散水氣至全乾內掛煨過冷通紅至下毫
度蒸氣下火放冷注蒸餾水浸鮮之又上火蒸
散水氣至上面生膜置冷處全結
芒微紙上乾之硝子場固封貯
作深劑每服

一八三氏至五氏

第一方

鹽酸重土

右以蒸餾水一斗溶和三歲以下小兒每服五滴
至二十滴三歲以上十滴至三十滴大人四十滴

至八十滴大麥粘汁和服日三四次

第二方 鹽酸重土一老利兒結甬斯水一

石溶和每服十五滴大麥水和服日四次

第三方

升鐵鹽一鹽酸重土一橙花水一

右溶和每服二十滴至四十滴日四次

第四方

鹽酸重土一亞馬鮮越幾刺一

薄荷水一

右每服十二滴至六十滴日二次

外用

一方 治頭瘡

鹽酸重土一蕃薇水一

亞刺昆亞越護漿一

右合為洗藥

第五方 硫羅低鹽

硫磺

製法 生石灰六斤 硫磺一斤 硫磺砂二斤

右合急入硝子列多兒焦注水四斤 振蕩之 冷定取其液硝子環固封貯 際二滴四

清至六滴以水一二了稀釋之服日二次至四
次漸增其量

方

硫磺六滴至
煎粟蘆水二三至

右每服十滴至二十滴日三四次

又方名忽弗滿揮菱硫磺下幾劑

硫磺五滴
再留燒酒七滴

右每服三十滴至四十滴日三四次

外用

方

硫磺揮菱膏了
硫磺

右合為擦刮

硫水素硫

即固格碌屈私未再快斯
硫磺加石灰精造宜硫鐵這宜右先

管取入稀監酸則硫磺精成清澄黃金色液乃取
注之硝子壘是與硫磺無異唯比之硫磺其性為
固封貯
純精

硫加高基

一石加高基硫肝

增製法の硫磺一丸紙籠土二丸右合內
鍋搗固其上敷統蓋土厚一寸許上火煨過
通紅四分時下火放冷後去上面統藥土為丸
取其微黃色物硝子置固封貯

若溶劑每服二匁至十匁

一方 治肺勞

硫加南基 木炭 葛南儒 各一匁

右二匁為一丸每服十五丸至二十九丸日四次

又方 解金石毒

硫加南基 桂水 遇兒託亞舍利 各一匁

右調勻每半時服一食匁

外用

一方 人工硫黃泉

硫加南基 各一匁

右溫湯溶和注于浴湯○當患者在浴內取稀硫

酸少許時々注加之稀硫酸總量則發硫水素瓦

斯也

硫剝篤亞斯 一名亞兒加利硫肝 亞斯二匁右合內

製法 硫黃華一匁以微火斷進火度至二物流

動乘熱硝子寫硝子封貯 為丸若溶劑就中為丸

最佳小兒每二時半若二時服一匁至四匁大

人五匁至十匁

第一方 治肺勞

硫剝篤亞斯 木炭 葛南儒 越幾劑 各一匁

右二丸為一丸每服十五丸至二十九日四次

第二方 治膜樣咽喉焮衝

硫剝篤亞斯二 過兒託亞根末一

甘草膏二

右為六十九丸伊里斯非魯連底末為衣每一時或

半時服一丸小兒一歲至二歲者服量

第三方 同上

硫剝篤亞斯二 薔薇水一

右溶和每一時一茶匕大麥水和服

第四方

硫剝篤亞斯二 葛加阿酪二

沙糖三 扁桃油一

右調勻每服一茶匕

第五方 治皮膚病

硫剝篤亞斯二 白石鯨一

右為三十九丸每三時服三丸杜松實泡剖送下

外用

一方 治疥癬

硫剝篤亞斯三 白石鯨四

捲埕兒油一

右作軟膏朝夕取一

又方 治頭瘡

一 硫利篤亞斯

石鹼 石灰水

再餹燒酒

右合朝夕洗頭

...

...

神珍內外方叢卷之二

終

