

袖珍内外方叢

山物

三

植物

四

同

五

袖珍內外方叢卷之三

袖珍內外方叢卷之三

藥品標目

第六目 金屬及其製劑

其一 銀 末 兩 丹 煉 銀 丹 煉 銀 丹 煉 銀 丹

銀 礬 星 亦 煉 末 貝 壯 重 藥 煉

刺必斯印歇爾那栗斯

其二 水銀

華涅滿溶汞散 紅 藥 赤 降 汞

越扶屋布斯密涅刺列

赤汞水 斯 亦 煉 刺 列 外 汞 亦

野 蘇 吐 蘇 下 蘇 味

蘇 蘇 羊

末 面 壯 煉 蘇 蘇 刺

蘇 丹 煉 蘇 丹 煉

蘇 丹 煉

蘇 丹 煉

蘇 丹 煉

赤 降 汞

蘇 丹 煉

外 汞 亦

甘汞

白降汞

其三 銅

硫酸銅

礞銅卷

其四 鐵

精製鐵屑

越扶屋布斯末兒扶亞栗斯

格碌屈斯末甫扶斯 撒兒末甫扶斯

外鐵鹽 金 末甫扶斯鎮痛液

藥收斂鐵液 礞鐵華

鐵丁幾劑開連方 槓楂加鐵丁幾劑

其五 錫

錫屑

其六 鉛

密陀醋 羅獨窠篤甬

鉛糖 羅獨窠篤甬

其七 亞鉛

亞鉛華

皓荅

其八 質沒担謨

金硫黃 結甬茂斯密涅刺列

安質沒硫加再基

越拱屋布斯安質沒扭

安質沒酪質吐酒石

安質沒酒

其九 昆私繆篤

消酸昆私繆篤

其十 諸砒石

砒酸

其五 蘇開連方

其五 蘇開連方

袖珍內外方叢卷之三

第六目 金屬及其製劑

金屬有十種 一曰銀 二曰水銀 三曰銅 四曰鐵

五曰錫 六曰鉛 七曰亞鉛 八曰安質沒扭 九

又曰昆私繆篤 十曰砒石

其 一 銀

銀鑿

ニトラスアルゲニチ

為丸若溶劑 每服十分八分八分八分半八

一至一八

一方 春

銀卷

水少許以蒸和

格綸僕

遇泥子油

右調勻為四十九朝夕服一丸漸加量○一九中

含蓄銀卷八分

又方

銀卷

橙花水

右調勻

右溶和朝夕服一茶匕○又硝子器以黑紙封之

暗處貯

刺必斯印歇雷那栗斯 ニトラスアルゲニナヒユシユム

由銀與銀卷無異就中供內服銀卷為佳○外用腐

蝕劑以水些少濕之或溶之

第一方 圖 治遷延眼焮衝兼皆腫脹者

刺必斯印歇雷那栗斯 一八至 蒸餾水 三二

右溶和瀘過內硝子器以黑紙封之○滴入眼中

第二方 治遷延眼焮衝粘液滲出甚者

刺必斯印歇雷那栗斯 四二 蒸餾水 三一

右溶和內硝子器以黑紙封之○用毛筆滴入眼

中日一次

第三方 治創瘍弛弱內努張者

刺必斯印歇雷那栗斯 月半 蒸餾水 三三至

右溶和蘆撒絲點患處

其二 水銀

華涅滿溶汞散

プロットオキシガニムヘイダラルゲイリニトリコ、アムモニヤカレ

為散若丸每服四分ハ半ハ一ハ至二ハ

一方

華涅滿溶汞散ハ至沙糖ハ

右為一服朝夕一服冷水送下

又方

華涅滿溶汞散ハ甘草膏ハ

右為二十九朝夕服一九

外用

一方 治角膜斑點

華涅滿溶汞散ハ胡桃油ハ

右合取少許塗眼日二三次

又方

華涅滿溶汞散ハ酪ハ新鮮者ハ

右合為眼膏

赤降汞 デウトオキシガニムヘイダラルゲイリニトラテユム

為散若丸每服八分ハ四分ハ半ハ至一ハ

一方

赤降汞二 乳糖二

右調勻分八服朝夕飯後一服冷水送下

又方

赤降汞 阿芙蓉各四 玫瑰昆設雷串

甘草末各適

右合為十六丸每晚服一丸至四丸

外用 為散供腐蝕劑 ○作軟膏敷潰瘍或製眼膏

第一方

赤降汞 枯卷

右合為腐蝕劑

第二方

赤降汞 家猪脂一至

右合塗撒絲點患處

第三方

赤降汞 阿芙蓉 越幾六至

家猪脂 扁桃油 黃蠟各一

右合每夕取少許用指塗眼皆

第四方

赤降汞 葛加阿酪或牛酪

密陀醋 舍電 阿芙蓉液各半

右精細研合朝夕取林設大塗眼

第五方 治角膜星斑及角膜腫瘍

赤降汞十五 膽蓉十 羯布羅四 研和者扁桃

葛加阿酪五

右合用毛筆取少許塗角膜

越エ扶テ屋カ布ブ斯ス密ミ涅ニ刺チ列レ シユルヒニシテ云ヘイガラレガイリニグリユ

為散若九五八至二十八

第一方 治疥癬

越扶屋布斯密涅刺列

越扶屋布斯安奠波扭 硫黃華各二

右為散小兒服一小力大人半茶匕若一茶匕

日三次

第二方

越扶屋布斯密涅刺列 螻蛄石各一

橙皮半

右為散分十服日三服

第三方

越扶屋布斯密涅刺列二 白石鹼

朴屈福烏篤脂各一 紫莖越幾刺二

右二八為一丸朝夕服十九

赤汞水 ニトラスヘイダラルゲイリキユイヂニム

為丸若溶劑朝夕服二滴至四滴

一方

赤汞水十 蒸餾水一

右合朝夕飯後取二十滴冷水和服漸加至四十

滴

又方

赤汞水三十 白蒸餅心 沙糖各半

右二瓜為一丸朝夕飯後服一丸漸次增量

外用

一方 治疥癬及頭瘡

消毒銀脂膏圓半

右微溫塗患處

外用

為丸若溶劑每服四分瓜半瓜至一瓜○此藥

與亞刺昆亞趨謨沙列布榭樟粘汁等配合則

為是所分析晚其効力雖如白蒸餅亦尚然唯

如過兒託亞煎甘草膏分析之力為劣○為散

外用供腐蝕劑又作溶劑敷膏浴湯

第一方

升汞_二 蒸餾水_三

右溶和朝夕一食七過見託亞煎和服

第二方

升汞_一 亞的兒_一

右溶和每服十滴日二次

第三方

升汞_{十二} 以_二 蒸餾水_些 少_以 溶解

右為二百四十九隔日午飯後服之初日服四丸

後每服加二丸以至三十九丸_{三十九丸中會蓋} 以二

十八日為期限凡服藥中且兼用沙爾茂根煎_{以二}

催發蒸氣禁滋味飽餐

外用

第一方 腐蝕劑

升汞_半 亞刺昆亞_半 護謨_半

右為極末微濕撒絲抹藥末貼患處

第二方 治癰毒贅疣

升汞_半 錫布羅_一 再餾燒酒_一

右溶和清患部日一二次

第三方 治曹墨兒弗刺見

升汞_四 老利兒_一 結爾斯水_一

右溶和供用

第四方

亞栝扒瓦坭加四至

右敷縛帶用之

第五方

治眼嫩衝因瘰癧毒疥癬毒者上

外取一以微水

舍電阿芙蓉液日二

右調勻微溫蘸巾貼眼

第六方

治癩毒

外取

礶砂各一

家猪脂一

右研和十二時作軟膏○晚取半支擦右足踝骨

上十二分時次晚又擦左踝骨上如前如是每晚

左右交換施之漸增加至二錢

第七方

治癩毒皮病

外取

礶砂各二至八

右熱湯溶和注干浴湯

第八方

治白帶下後淋耳中潰瘍等

外取

礶砂各一以蒸餾水

阿芙蓉液一

右合為射注藥

第九方

治赤痢

尋常灌腸劑不

外取

蒸餾水

亞刺昆亞越讚漿 半一 阿芙蓉末 一

右調勻微溫灌腸

第十方 圖 治小兒蟻蟲蛇蟲

摸絲施那

二 浸湯 一 湯 一 湯

外取

四 分 一 分

亞刺昆亞越讚漿

二

右微溫方晚灌腸

甘汞

三 リアス 二 プロト 一 オキ 一 シ 一 へ 一 タ 一 ラ 一 ル 一 ケ 一 イ 一 リ

為散若丸每服半分一八二八至六八

第一方 治癩毒症遷延肝炊衝蛔蟲等

甘汞

一

沙糖

一

右為散製劑六箇若十二箇每夕或每朝夕取一

劑冷水送下

第二方 治急性炊衝諸病熱性水腫肝炊衝腸

炊衝膜樣咽喉炊衝等

甘汞

二

沙糖

二

右為散製劑十二箇每一時若一時半取一劑冷

水送下 ○ 小兒甘汞服量四分半八至六八

第三方 治肺及諸部炊衝若熱性赤痢等

甘汞

六

阿芙蓉

一

乳糖

一

右為散分六服每一時若一時半一服

第四方 名清血散 一兩半

甘汞 金硫黃 各六分 乳糖 一兩

麻僣涅先 各半 赤麻

右研末 一時半許 分六服 朝夕取一服 冷水送下 或日三四次

第五方 治蛔蟲粘液及水腫

甘汞 六分 藥刺巴 乳糖 各一分

右為散 分二服 先取一服 冷水送下 後四分時進 後服

第六方 治蛔蟲及粘液 每夜每服

甘汞 二分 藥刺巴 六分 乳糖 一分

右為散 分二服 先取一服 骨喜送下 後四分時進 後服 小兒二歲至十歲之服量

第七方 下劑 藥刺巴 一分 乳糖 一分

甘汞 二分 藥刺巴 一分 蒲公英 越幾利 送下

右煉為一塊 頓服 骨喜 送下

第八方 名清血丸 白

甘汞 金硫黃 各一分 此劑不合

右研合一時半許 加甘草膏二分 為一九朝

夕服二丸

第九方 緩下劑

甘汞 蘆會越幾斯 白石鹼 各一

右調勻二丸為一九方 魁服二三丸

第十方 下劑

甘汞 葯刺巴華雷斯 白石鹼 各一

右調勻二丸為一九 每服九九

第十一方 治遷延肝病

甘汞 白屈菜越幾劑 白石鹼 各二

右調勻二丸為一九 朝夕飯後服十九至十五丸

外用

第一方

甘汞 蘆會 沙糖

右為極末用鷲翎管吹入眼中或微濕筆抹藥末

塗眼

第二方 治癩毒諸症陰莖包皮箱窄及皮翻箱

窄者

甘汞 石灰水

右合洗患處或射注陰用宜振蕩之○此劑不含

蓄甘汞但含蓄酸化汞是甘汞既為石灰水所分

折故也

第三方

治眼焮衝因淋毒者

甘汞一

石灰水六

菲阿斯越幾劑半

薔薇水一

右溶和貼眼

第四方

治蟻蟲及直腸粘液壅塞

甘汞一

亞刺昆亞護末半

林藥末

纈草水一

右調勻為灌腸劑

第五方

甘汞一

伊里斯弗魯連底根

沙糖各

右末作噎劑

白降汞

今世唯供外用

第一方

白降汞半

家猪脂

或葛加阿

阿芙蓉四

右作眼膏

第二方

白降汞六

僕里亞兒昆半

未詳

折酪

右作眼膏

第三方 治疥癬

白降汞 羊脂

右石臼內研合取榛子大於爐邊擦腕臂膝脚

第四方 治疥癬

白降汞 升汞 家猪脂

右塗擦如前方

第五方 治疫咳傳麻多痛

白降汞 實艾答利斯膏

右合和塗擦患部以蠟布覆之日三四次以代吐

酒石膏

其三 銅

硫酸銅 即人エ膳卷

為散若丸每服四分半至二分〇吐劑三

分四八至八分為溶劑頓服然不可謾用

一方 治膜樣咽喉喉衝

硫酸銅 乳糖

右為散製劑十二箇每一時服一劑

又方 治勞瘵溶崩下利

銅 丁字

粘汁半碗送下漸加至四九若八九〇此藥最易
為沙糖所分析故弊連厨各代之以次方

礞銅卷十灰水少許以礞石加石過再託亞末二半

右為三十九朝夕服一丸漸加量

第三方 治舞蹈病

礞銅卷十灰水少許蒸餾水三半

右溶和每服五滴日三次每隔日增一滴

第四方 屈林氏安質密亞斯末扶加下幾劑

銅以精以礞石加石以精以礞石加石

右加鹽酸適宜至為綠色透明稠濃液

第五方 安質密亞斯末扶加水

安質密亞斯末扶加下幾劑蒸餾水二十

右溶和嬰兒一茶匙稍年長者一食匙食後服之

日二回次喫酒二匕

第六方 越阿栗斯氏安質密亞斯末扶加下幾

劑

礞銅卷十灰水少許蒸餾水三半

右溶和加鹽酸適宜至為綠色稠濃液

第七方

安質密亞斯末扶加下幾劑二第方

右用法如第五方

其四鐵

精製鐵屑

ハシリ云、ヒユルハ、于云

為丸散若酒浸每服一瓜二瓜至五瓜日二次

第一方

鐵屑

桂各十

沙糖

右為散分十二服日四服為小兒服量

第二方

治佝僂病

鐵屑

一

蜩蛸石

半

沙糖

右為散每服一茶匕日三四次日四次

第三方

鐵屑

二

健質亞那越幾劑

右二瓜為一丸云桂末每服六九日四次

第四方

鐵屑

三

橙皮末

半

桂

右合以列印設酒二升浸出十二時憶過每服一

小酒盞日二三次

第五方

鐵屑一 大黃末半 姜末一 列印設酒二

右浸出六時瀝過每服半茶碗若一茶碗日四次

越ニ扶屋布斯末ル兒扶テ亞栗斯フトオキシムハル

版量用法同鐵屑

格碌屈ル私末ル爾扶斯ニフカルガナスニハリ

為丸散每服三一五一至十五一四一

第一方圖

格碌屈私末爾扶斯四至一府利油糖一

右為散製劑十二箇每服一劑日四次

第二方圖

格碌屈私末爾扶斯半油糖半劑本脫菜各一

右為散領版日三次按服量忌

第三方圖

格碌屈私末爾扶斯二續草越幾劑半

右二一為一丸每服六一九一至十二一九一日三四次

撒兒末爾ル扶斯ニヒルルハスルハルル

為散丸煉紙溶劑每服一一二一至一一一

第一方圖治肺

撒兒末爾扶斯一至一吉訥六沙糖半

右為散製劑十二箇每一時若一時半服一劑

第二方 治粘液病 一丸至 桂末 沙糖
右為散製 剖六箇 服一劑 日二次

第三方

撒兒末 甫扶斯 沒菜 半
薄荷 昆設 甫弗 橙皮 舍利別
右合為 紙劑 每一時 服一茶 匕

右二丸為一丸 每服七丸 日四次

第四方

撒兒末 甫扶斯 沒菜 各
赤幾 那越 幾劑 桂油 八
右二丸為一丸 每服六丸 日二次

右二丸為一丸 每服六丸 日二次

第五方

撒兒末 甫扶斯 沒藥 越幾 劑
右合加 橙皮 舍利別 適宜 二丸為一丸 每一時 服

四九

第六方

撒兒末 甫扶斯 黃幾 那末
薄荷 昆設 甫弗 橙皮 舍利別

右合為 紙劑 每一時 服一茶 匕

外用

第一方 治角膜斑點

乾白撒兒末四錢 甬扶斯十錢 沙糖二錢

右為極末取少許用毛筆入眼中

第二方 治淋疾

撒兒末甬扶斯六錢至十二錢 蒸餾水六錢

右作射注劑或蘸巾貼眼

第三方 治眼中潰瘍及角膜翳

撒兒末甬扶斯八錢至一兩 蒸餾水三錢

右合點眼中

第四方 治鼻痔及腔內息肉

未消撒兒末甬扶斯半錢至一錢 蒸餾水一錢

右束撒絲作筆形蘸之挿鼻中

第五方 人工鐵泉小兒用方

撒兒末甬扶斯二錢至四錢

右沸湯溶解注于浴湯

第六方 人工鐵泉大人用方

撒兒末甬扶斯一錢至三錢

右沸湯溶解注于浴湯

外鐵鹽 ミナソルト

每服五匁十匁至十五匁常為溶劑用之此藥

引濕氣即化成流動故單用。少大抵與亞的兒
配合作末甬扶斯鎮痛液

一方 治衰弱下利

升鐵鹽 半 阿芙蓉液 二十

桂水 亞刺昆亞護漿 各三
至四

右溶和每服一食匕日二三次

又方 治腺病

升鐵鹽 一 蒸餾水 一

右溶和每服二十滴至四十滴日四次

末甬扶斯鎮痛液

アルフェルニユルヒニニアーテカマヘリ

每服十滴二十滴至三十滴日一二次

一方 治腺病

末甬扶斯鎮痛液 三 葛粉 多 見下幾劑 一

右合每一時半服三十滴

又方

末甬扶斯鎮痛液 一 桂水 三

橙花舍利別 三

右調勿每一時服半食匕 十 至 二十 〇

叔斂鐵液

ミナアスヘリリキユイゴム

此菜今世不供用但為止血劑。〇以鹽酸代之

可也

礞鐵華

ミヨリアスニハルロアムモニアカレ

為散丸煉溶劑每服五片十片至二十片○此

藥吮作煉藥最佳何者為散劑則易引濕氣作

溶劑則味不佳且如丸藥多加脂造之尚易

破碎故也

第一方 治間歇熱

黃幾那末 礞鐵華 桂末

右乃散製劑十二箇每服一多日三四次

第二方

礞鐵華

五片至十片

甘草膏 半刀

蒲公英越幾劑

右合作一塊煉藥每一時半若二時服一塊

第三方 治間歇熱

礞鐵華

五片

礞砂

十片

甘草膏 半刀

蒲公英越幾劑

右合作一塊煉藥每一時半若二時服一塊

第四方 同上

礞鐵華

五片

礞砂

十片

黃幾那末

半刀

蒲公英越幾劑

右合作二塊煉茶每二時服一塊

第五方 蒲兒墨氏稱用

礪鐵華明荅 黃幾那越幾割錢 各半

桂油計 桂末直

右二丸為一丸朝夕服五丸至十九

第六方 治弛弱性月經閉塞

礪鐵華一 蘆會五 荝六 雜腹蘭二十

尾甬拔奴 護三 拔甬微 護孝 露五

右二丸為一丸朝夕服五丸至十九

鐵丁幾割開連方ナニキナニク丸トナニクマツトアサリ、ハルリ

每一時半服二十清三十清至四十清或取一

錢至二錢加酒若桂水六至八每服一食

第七方

一方右 鐵丁幾割開連方二至四

右加白蒲桃酒一壺每服一食七日四次漸加至

一酒盞一

棋楂加鐵丁幾割子ニキナニク、ハルリ、セイドニアク

每一時半若二時服十清二十清至四十清桂

水若酒和服為根末

藥刺也根末

一方保新藥... 時服一...

榎楂加鐵丁幾劑... 桂水... 四十...

欒花舍利別... 越...

右調勻每一時半服... 半食... 一食...

又方... 身... 四...

榎楂加鐵丁幾劑... 變...

右加白蒲桃酒半壺每服半酒盞至一酒盞日四

次

其五 錫

錫屑

入夕ニムル...

...

圖製法... 錫炒海鹽各等分... 右先溫石白入... 海鹽搗碎為極末... 洗... 為紙若煉每日服一乃至一...

第一方

錫屑... 綿馬根末... 蜜...

右合作磁劑服一茶匕強日三次臨服宜振蕩之

第二方

錫屑... 藥刺巴末... 蜜...

右合作磁劑每二時服三茶匕骨喜... 送下

第三方

錫屑... 綿馬根末... 藥刺巴根末...

蜜這

右合作一塊煉藥早朝服二塊後平時又服一塊

蜜陀醋

アマス、アリス、ヒキ、キ、グ

第一方 治白帶下淋疾

右合為射匡副

第二方

蜜陀醋

契二

薔薇水

契四

阿芙蓉液

契早

右滋眼

第三方

蜜陀醋

信二

阿芙蓉液

信十

右點眼

第四方 治赤痢

蜜陀醋

契一

阿芙蓉

契一

加密列

右合為灌腸劑

第五方

治火傷芫菁膏痕瘡等

蜜陀醋膏

契二

機油

契三

蜜陀醋

契四

各等分

右

石

白

肉

研

和

右塗之縛帶

第六方

扶私屈謨膏 二多鹽 製法の精製家猪脂阿
此右上火煮 襪油各二此酪無鹽者白蠟各一
根下休午攪拌至溶 和更煮至成黒 福色木
右攤布片一點創上 羅獨窠篤爾 リキユナトニアアセタチスブリユムヤ

一方 此膏對新陳帶下淋疾

羅獨窠篤爾 ハ多至

右為冷慰劑或溫慰劑

又方

羅獨窠篤爾 三四 阿芙蓉液 一

右微溫蘸巾貼眼

鉛糖 アセタチスブリユムヤ

為丸散若溶劑每服四分五分至一分二分

右三次

第一方

鉛糖 六 阿芙蓉 三 乳糖 半

右為散分十二服朝夕一服冷水送下

第二方

健質 五 那越 一 健質 五 那越 一

健質 五 那越 一

右為六十九丸右松子末每服二丸至五丸日三

四次

第三方

右鉛糖一至

苗香水三

含電阿芙蓉液一

橙花舍利別一

右調勻每二時若一時半服一食七一小兒每服

一茶也

外用

一方

鉛糖二

薔薇水六至

阿芙蓉液一

右合為眼水

又方治淋疾

長用

鉛糖十

薰餛水三

右合為射注劑每一劑一日一劑一日一劑一

其七

亞鉛華

オキシゲンニシニキ

為散嬰兒每二時半若二時服四分一至一半一

大人每二時若一時半一至一二一至一二一

第一方

亞鉛華二至

桂油糖一至

右為散製劑十二箇每二時半服一劑一

第二方 罌粟十二箇 每一匙 七匙

正鉛華二 橙葉末 橙花末

桂油糖各二

右調勻每服一茶匕 日三次 小兒五分

茅三方 集治小兒搖擗 藥性難辨 宜早服

正鉛華三 麝香四

煨製麻 偃涅失八 乳糖四

右為散分八服 每一時若一時半一服

外用

第一方 散藥

正鉛華十 阿芙蓉六 家猪脂二

右合為眼膏

第二方 同上

正鉛華十 赤石脂一 家猪脂一

右合為眼膏

第三方 治足部創傷疼痛 若顏面潰瘍

正鉛華 石松子末各半 越皮里膏一

右貼患部 縛帶之

第四方 治白帶下

正鉛華半 水十二

右合為射注劑
皓礬 三五斤
為煉散若溶劑每服八分
吐劑四分六分

至十斤
一方峻吐劑
皓礬 十斤
乳糖 十二斤

右為散頓服
又方 同上
服法 一時若一時半一服

右作一塊煉茶衣甘草末頓服
蒲公英越幾劑

皓礬 十五斤
至
蒲公英越幾劑

外用

第一方
皓礬 一斤
以蒸餾水
阿芙蓉液 半斤

右調勻點眼
皓礬 一斤
以蒸餾水
阿芙蓉液 半斤

第二方
皓礬 三斤
薔薇水 三斤
櫻楂核粘汁 一斤

阿芙蓉液 半斤
右調勻取一湯匙點眼日二次

第三方
皓礬 各一斤
薔薇水 各一斤

右調勻微溫蘸巾貼眼或點眼中

第四方 治眼中潰瘍角膜斑點

皓卷五

酪新鮮者二

點

右作眼膏

第五方

治鵝口瘡及咽喉腫

皓卷十

撒兒非亞水三

右合為含嗽劑

第六方 圍

治疥癬

土木香

取一半水煎濃

皓卷二

右溶和微溫洗淨患部日二三次

第七方 圍治後淋白帶下

皓卷十

過兒託亞煎四

右溶和為射注劑

其八

安質沒

下

金硫黃

為丸散若密屈劑每一時若一時半若二時服

半斤

第一方

金硫黃

沙糖

下

右為散製劑六箇每一時若一時半服一劑

第二方

金硫黃八 何芙蓉三 錫布羅四

消石一 沙糖半

右為散分八服日四服冷水送下

第三方

金硫黃六 硫砂 甘草末各半

右為散分三服每二時一服冷水送下

第四方

清血散出干甘草條

第五方

金硫黃一 土木香越 剉寸

右合為三十九每二時半若二時服三九

第六方

清血丸出于甘草條五 剉具

第七方

金硫黃 雙鸞菊越 剉各一 朴屈福烏鴛脂 甘草膏各二

第八方

和胸劑 金硫黃 錫布羅各六 亞刺昆 亞越護

沙糖各一

右研末和茴香水六分每一時服一食匕臨飯回

為散若溶劑催嘔劑消飲劑每服八分或四分
至半或吐劑一或二或三或四或六或八或十

第一方治精神錯亂及心思爵憂病

吐酒石_四 蒸餾水_四

右每半時服一食也

第二方百私孫鮮煎劑

吐酒石_一 水_八 蒸餾水_三

白罌粟舍利劑

亞刺昆臣護

橙花水_{各半}

右調勻當免熱時先服一食也後半時服二食也
又過半時服三食也午飯後再自一食也始漸增

量如前

第三方^粥治肺嗽衝及脇痛

吐酒石_六 蒸餾水_六

右溶和每一時服一食也

第四方吐劑

吐酒石_一 吐根_十 沙糖_半

右冷水頓服

第五方小兒吐劑

吐酒石_一 蒸餾水_三

右先取共半頓服後每八分時服一食也以至得

吐夫... 治... 凡... 思... 病...

外用

第一方

吐酒石 六分以蒸餾 海慈蜜 二分

右合為灌腸劑冷用

第二方

吐酒石 六分 蘆會 各六分 沙糖 八分 薔薇水 二分

右合為眼水

第三方

吐酒石 一分 家猪脂 四分至八分

治疫嘔吐... 後半時服三食

右取榛子大塗心窩日三次用毛布覆之以至發

小疱

第四方

吐酒石 四分以蒸餾 家猪脂 一分至二分

右分為二十四塊取一塊腹脊股膊輸次擦之日

四五次

第五方

吐酒石 四分至一分 酪 新鮮 蓖麻油 各一分

右調和朝夕取林設大人眼中合驗自外摩擦區

中掩之

第六方 名吐酒石硬膏

吐酒石一匙至安沒瓦亞幾膏并了

膏二北黃蠟慈護安沒瓦亞幾膏并了
列並底那各三了右先膏與蠟燭并了
味微火焯之藥膏蠟未
冷合之如法作硬膏

右攤掌大軟華貼胸上若肩胛間

安質沒酒ヒニク、スチビア云

和胸劑菜汗劑每服二滴五滴十滴至二十滴

○吐劑小兒半匙至一匙大人至四匙○此劑

一合蓄吐酒石二尺

第一方 小兒吐劑

安質沒酒了早海葱蜜

遇甬託亞舍利別各

右調勻每八分時服一茶匕以至得吐

第二方 同上

安質沒酒了吐根十海葱蜜常本

覆盆子舍利別了各半

右調勻每八分時服一茶匕以至得吐臨服宜振

蕩之

第三方 和胸劑

安質沒酒 磁砂加過泥子精各

海葱蜜了半 過甬託亞舍利別了各一 茴香水了各一

右調勻每服一茶匕

第四方 發汗劑

式安質波酒氏 坭列利精了各半

過甬託亞舍利別了各一

右合每半時服一食匕服後即喫接骨木花飽劑

一碗

其九 毘私繆篤了各一

消酸 毘私繆篤

增製法 硝石精加水等分者這里毘私繆篤
這里為粗末右取毘私繆篤徐々湯下于消石

精全溶和終至全不溶和取毘私繆篤二三倍
水徐徐注加則生白塗於是傾去上清寫其塗
紙上更注水洗淨二三回暗處乾
硝子場固封用黑紙覆之暗處貯

第一方 治胃症有奇効

消酸 毘私繆篤了各一 煨製麻痺涅失亞了各一 牡蠣

白枳末了各一 葛縲子油糖了各一

右為散製劑十二箇每服一劑冷水送下日三四

次

第二方 治癩癩

消酸 毘私繆篤了各一 續草末了各一

續草油糖了各一

右為散製劑十二箇朝夕飯後服一劑

第三方 治間歇熱

消酸昆私膠篤三々至四々 薄荷油糖一

阿芙蓉四々

右為散製劑十二箇每一時半服一劑 可日三四

第四方 治癩癩

消酸昆私膠篤一 續草越幾劑一

續草油十層至十層 續草末豆

右合為六十九入硝子器與之每服六丸至十二

丸日三次

外用

一方 治疥癬

消酸昆私膠篤一 家猪脂二

右調勻塗患部

其十 砒石

砒酸 アセチン、ハルセニヨミム

為散丸若溶劑然作溶劑最佳小兒六歲至九

歲者每服三十分一至二十分一大人十二分

分至八分一

第一方 醫

砒酸 一極末 砒砂揮發華 四十

健雙垂那 好 甘草 一

右為散分六服 至小兒分三服 每朝食前一服

第二方

砒酸 二 阿芙蓉 四 白石鯨 四

右為十六丸每一時半服 二 丸

第三方

砒酸 一極末 黃幾那末 半

舍電阿芙蓉液 半 括失垂越幾刺 四

右合為四十九丸衣桂末當免熱時每一時服 二 丸

第四方

砒酸溶液 四十 候砒酸全溶解 冷定加刺賢

候砒酸全溶解 冷定加刺賢 候砒酸全溶解 冷定加刺賢

候砒酸全溶解 冷定加刺賢 候砒酸全溶解 冷定加刺賢

右當免熱時服十滴至六十滴日二次

第五方

砒酸溶液 一 桂水 半

極雨撒護篤露舍利別護篤露 一

護篤露 半 舍利別護篤露 一

右調勻每一時服一茶匙

外用

第一方

砒酸分十

銀朱分半

支涅利分二

蘇列分一

亞律分一

謨加分一

兒設分一

乙分一

血竭分四

右極末硝子器貯取分一半至分二和次軟膏一

或塗檄絲掩瘡腫樣創宜塗創圍外分一許

軟膏製法

拔雷檄謨字露

失鳩答分一半

各分一

鉛糖分一

舍電阿芙蓉液分半

膏分一右調勻

第二方

砒酸分十

銀朱分二

支涅利分一蘇列分一亞律分一謨分一

血竭分十

右極末和唾液若水用筆塗瘡腫樣創上用金箔

若軟革若布長若蜘蛛絲覆之

第三方

砒酸分半

銀朱分一

血竭分半

右極末和唾液塗患處

第四方

砒酸分四

阿芙蓉末分十

密陀醋膏分二

右塗撒絲點痘腫樣創上以此代第一方

第五方

砒酸 二氏至 蒸餾水 一

右外用

第六方

砒酸 六氏至 蒸餾水 一

右為洗藥

袖珍內外方叢卷之三 終

袖珍內外方叢卷之四

藥品標目

第二綱 植物

第一目 大麻醉藥

其一 青酸麻醉藥

青酸 出于第一綱中諸酸之部

老利兒結甬斯水

其二 油苦味麻醉藥

番木鱉

其三 木性麻醉藥

右金失鳩答 阿芙蓉

第五 刺屈黠加非魯薩越幾劑

右外 菲阿斯失亞密 荖茗

第六 蔓陀羅華 煙草葉

其四 實芟答利斯

右外 格爾失屈謨 藜蘆

第七 薩拔突刺 黑列僕利

雙鸞菊

魁兒薩室刺尼偃里罕斯

斯太必私亞偃利亞 守末屈

第三細 植物

此諸品依其性能分定為十七目 一曰麻痺藥

二曰酸屬藥 三曰吐藥 四曰下藥 五曰毒藥

性藥 六曰拔毒散藥 七曰趨藥 八曰毒藥

九曰揮發油藥 十曰苦味藥 十一曰收瀉藥

十二曰植酸藥 十三曰亞的兒性藥 十四曰糖性藥

十五曰殺菌性藥 十六曰油

袖珍内外方叢卷之四

第二綱 植物

此諸品從其性能分之為十七目 一曰麻醉藥
 二曰酷厲藥 三曰吐藥 四曰下藥 五曰葦爾斯
 性藥 六曰扳爾撒謨性藥 七曰趨謨華爾斯性
 藥 八曰揮兒油藥 九曰苦味藥 十曰叔瀟藥 十
 一曰植酸 十二曰亞的兒性藥 十三曰糖性藥
 十四曰趨謨性藥 十五曰穀粉性藥 十六曰油
 性藥 十七曰石鹼性藥

刺屈與加非魯薩越我刺
 菲阿斯夫五魯薩越我刺
 實美答利散
 黃四
 格爾夫在讓
 薩枝藥劑
 雙鸞
 德為益無刺
 煙草葉
 蘇盧
 黑列僕利

第一目 麻醉藥

麻醉藥有四種一曰青酸麻醉藥二曰苦味麻
醉藥三曰本性麻醉藥四曰酷厲揮發麻醉藥

其一 青酸麻醉藥

青酸 出于第一綱中諸酸之部

老利兒結甬斯水 アノ名ラウロケラニ

單用或作壓劑 每服十滴至六十滴 日三次

第一方

老利兒結甬斯水 阿芙蓉液 各一

右每一時半取十六滴冷水和服

第二方

刺屈點カ加非魯薩越幾劑 二十分至

老利兒結甬斯水 半

右合服二十滴至三十滴 日三三次

第三方 治氣管燉衝

老利兒結甬斯水 實芟答利斯丁幾劑 各二

右合每一時半服十滴至三十滴

第四方 治疫咳及勞瘵

白頭翁越幾劑 心 老利兒結甬斯水 各二

右疫咳服五滴至十滴 大人十滴至三十滴 日三

次在初服... 至十日... 大人... 十日... 三十日... 六十日... 九十日... 一百日...

第五方

老利兒結甯斯水二

桃花舍利別或白罌粟合十歲

右合每服一茶七日四次

第六方

括失丑越幾剖老利兒結甯斯水

桂水

右調勻每服一茶七日四次

第七方

治癩癧

鹽酸重土

右以老利兒結甯斯水一斗溶解每服十五滴日

三四次

外用

第一方 治胸症寧諸症及疫咳

老利兒結甯斯水一

右製三劑每用取一劑注熱鉢令噲其蒸氣十密

扭旬至十二密扭旬百二十分皇國一時

第二方

治清穀下利 漿粉以水溶和

右作灌腸劑

第三方 治顏面肉刺及鱗屑狀小疹

老利兒結甬斯水_三 薔薇水_三

右合為洗菜朝夕用之

第四方 同上

礪破_三 老利兒結甬斯水_三 薔薇水_三

右合用法同前

第五方

老利兒結甬斯水_三 薔薇水_三

右合為眼水若洗藥若冷慰劑

第六方 治療疔性眼嫩衝

失鳩答越幾劑_三 老利兒結甬斯水_三

薔薇水_三

右合為眼水

第七方

蒸餅心布_三 老利兒結甬斯水_三

右合和固封與之貼痔上

其二 苦味麻碎菜

番木鱉

為散若丸半_三 一_三 至二_三 漸加增其量 ○ 水

製越幾劑半分一分至三分作溶劑若丸○
番箇兒製越幾劑四分一分二分分至二分

第一方治癩癩及麻痺

番木鱉屑四分至五分冰糖一分

右搗碎極末製劑六箇朝夕服一劑

第二方治間歇熱

番木鱉屑四分至五分健實安那四分

冰糖四分

右搗碎極末分八服日三四次

第三方治頑固三日熱

番木鱉屑四分黃幾那末一分

右為散每一時半服一茶匙

第四方治麻痺一茶匙

番木鱉屑四分冰糖一分

右搗碎極末製劑六箇每服一劑日二次漸加至

三次四次五次或六次

第五方治赤痢

番木鱉屑四分冰糖一分

右搗碎極末加睡菜越幾劑適二分分為一丸每

服五丸至十九丸若二十九日二次

失鳩答越幾劑或老利兒結甬斯水引

右溶和每一時服三十滴漸加量引

第五方園治疫咳引

失鳩答越幾劑引安質沒担酒引

右合服二十滴至三十滴日三四次引

外用

第一方園治腺病引

失鳩答越幾劑引菲阿斯越幾劑引

菲阿斯葉引民埝列利精引

右煉至布稠取其半攤草皮貼患處引

第二方園治角膜斑點引

失鳩答越幾劑引律西引膽引

確砂揮發華引蒸餾水引

右供用引

第三方治子宮硬腫及癌腫引

失鳩答葉引

右水煎瀘過取十二寸加老利兒結甬斯水一寸引

為射注劑引

第四方園

失鳩答葉引亞麻子粉引

右加熱湯適宜煉為毳布調加羯布羅半錢貼眼

阿芙蓉 オビウム

為散丸或酒浸阿芙蓉或水浸水製越每服八分

瓜六分瓜四分瓜三分瓜半瓜至一瓜日一二

次○瘥暈諸病精神錯亂等每服一瓜二瓜三

瓜至四瓜

第一方 治精神錯亂

精製阿芙蓉 半瓜至 乳糖 刀一

右調勻製劑二箇臨卧取一劑冷水送下後四分

時未得睡者進後服

第二方

托歇兒ル私發汗散圖二

右製二劑用法同前

第三方 治赤痢

阿芙蓉 瓜三 吉納 刀二 桂末 刀四

右調勻分十二服每一時一服冷水送下

第四方

精製阿芙蓉 瓜五 甘草膏 錢二 蒸餾水 適

右合為六十九丸每一時半服四丸不寐症臨卧服

十丸

第五方

挖歇兒私發汗散日一 甘草膏日二 蒸餾水日三

右為三十九臨卧服十五九後四分時不得眠者

再服十五九惡散劑者以此代第四方

第六方 治赤痢

精製阿芙蓉日二 幾那越幾劑

刺答尼越幾劑日各二 篤兒面窒刺工日五

右調勻二日為一九每一時半服五九至十九以

此代第三方可

第七方

甘扁桃油日二 亞刺昆亞日二

精製阿芙蓉日二 或阿芙蓉日五

右調勻為乳劑日一凡製乳劑可以阿芙蓉越幾劑

代精製阿芙蓉

第八方

精製阿芙蓉日四 或阿芙蓉日二

阿亞刺昆亞護漿日三 橙花水日四

麗春花舍利別日半 藥膏日十

右為乳劑每一時服一食匕

第九方

阿芙蓉液三十 伊斯巴尼亞酒一

右每半時服二十滴 ○阿芙蓉液及舍電發謨阿

芙蓉液共服量二滴五滴至十滴此液十滴含蓄

阿芙蓉一瓜若欲和飲液用之則取十滴十五滴

二十滴至三十滴和飲液六至八

第十方

阿芙蓉液二十 甘消石精一

右合每半時若四分時若八分時取二十滴和沙

糖服之此劑二十滴含蓄阿芙蓉半瓜或四分瓜

第十一方 治尿閉因症者

阿芙蓉液三十 錫布羅十二

右每半時服二十滴

第十二方

阿芙蓉一 安質沒扭酒二

右每一時半服二十滴

第十三方

阿芙蓉液十 伊斯巴尼亞酒二

右合小兒三月至一歲者每一時服五滴至十滴

一歲至三歲者十滴至十五滴三歲至六歲者十

五滴至二十滴六歲至十二歲者二十滴至三十

清若專要催睡止痛之効則當四倍其量頓服

第十四方

阿芙蓉液清八舍利別彈

右合初生兒自十四日至六週者每服半茶匕至一茶匕六週至三月者一茶匕至二茶匕以代實無格日温

外用

第一方

精製阿芙蓉半加耶普底油二十

丁香油十鶴栗拔奴護芫菁丁幾刺適

右作軟塊搽齒

第二方

阿芙蓉越幾劑一 葶藶越幾劑半

右調勻和唾液擦顛顛及眼臉

第三方 治創傷膿潰疼痛者

阿芙蓉越幾劑三 蒸餾水六 燕麥粉適

右作毳布挿布間置創上

第四方

阿芙蓉越幾劑四 槓楂核漿五

接骨木花水三至六

右合為眼水或淋疾射注劑

第五方

阿芙蓉越幾劑六 錫布兒八 象猪暗二

右作眼膏

第六方

阿芙蓉液一 確砂揮發膏三

右作擦劑

第七方

阿芙蓉越幾劑二 漿粉四 以水溶和者六

右調勻為灌腸劑

亭曰或為兒某
性論所部部
底里發幾斯是十

刺

每服二二至十十日三次小兒半半至一一

第一方 治胸水氣管焮衝

刺屈點加菲魯薩五 沙糖四

實芟答利斯葉一 沙糖四

右為散一日服三四劑

第二方 治疫咳

刺屈點加菲魯薩五 沙糖四

右為散分十服每一時一服為二歲小兒服量

第三方

刺屈黥加菲魯薩卫キ又ハ

老利兒結爾斯水ヲ半

右溶和每一時若一時半服二十滴至四十滴

菲阿斯失亞ヒカスミアニユス

為散每服一ハ二ハ至四ハ然葉唯供外用○

越幾劑為散丸若溶劑每服半ハ至十ハ日三

四次○子實和乳劑及玫瑰昆設兒弗子實十

小至二十ハ和乳劑六ハ至八ハ

第一方國治胃症

菲阿斯越幾劑 亞鉛華各十

麻偃涅失亞半 乳糖半

右為散分十服每一時半一服

第二方越治痰咳

菲阿斯越幾劑ハ 安質没扭酒ハ

右溶和時々與五滴至十滴一歲兒一日服量非

阿斯至二ハ

第三方越同上

沙列布根末二羊錢以熱湯 菲阿斯越幾劑ハ

過爾託亞舍利別ヲ 橙花水ハ

右合時々與一茶匕

第四方 治吐血因症者

菲阿斯子 二十斤至 白罌粟子 六斤 泉水 六斤

邊兒託 亞舍利 別 研

右調勻為乳劑 每一時服一食匕

外用

第一方

菲阿斯葉 失鳩答葉 各半 亞麻子粉 二斤

右細研加乳汁蓋閉煮為稠厚 布片置患

部

第二方 治角膜創兼虹彩脫垂者

菲阿斯葉 一多 注熱湯 過 其密陀酢 剪 則 小

右蘸巾置眼上 每八分時更換 為 密陀酢 水 亦 宜

第三方

菲阿斯葉 半

右以乳汁煮瀘過 取六多至八多 為灌腸劑

第四方 菲阿斯浸油

菲阿斯葉 新解者 細 阿列磯油 六 朝夕一服

右微溫飽熱瀘過 為外用劑

第五方

菲阿斯浸油 六 密陀醋膏 六

右合塗痔上縛帶

第六方 菲阿斯硬膏

黃蠟 多 格碌波尼 阿列襪油 各半

菲阿斯葉 多

右作硬膏

莨菪 ベルラドンナ

為散若浸劑每服半匁一匁至二匁日二次小

兒一歲以下者朝夕服四分二歲至三歲者

半匁四歲至六歲者四分三如恐水病宜

大量用之莨菪根比之葉則其功最峻故須小

其量 一匁 一匁半 一茶匙

第一方 治癲癩癆狂神思爵悒病

莨菪葉 半匁至一匁 沙糖 一匁

右為散製劑六箇每服一劑日三次

第二方 莨菪根 三匁 沙糖 二匁

右為散分十二服小兒二歲至三歲者朝夕一服

一歲以下者減半漸加增其量二歲至三歲者一

日一匁半若二匁為極一箇日三次為小兒自四

第三方 治疫咳

芫荽根二 沙糖一

右為散製劑六箇每服一劑日三次為小兒自四

歲至八歲之服量上

第四方四 同上二 瀘過三 瀘過一

芫荽葉一 荖根半 荖一

右以水適宜浸出瀘過取八多加沙糖適宜為舍

利別每服一茶匕每服一茶匕

第五方四 同上二 瀘過三 瀘過一

芫荽根半 橙皮舍利別一

右每一時若一時半服一茶匕其功最峻故須小

第六方

芫荽葉或根半 桂水一

右合每一時半若二時服一食匕為大人服量

第七方四 治顏面痛

芫荽葉五 天黃三 沙糖半

右為散製劑八箇每隔夜服一劑

第八方阿 治頑固三日熱

芫荽葉二 黃幾那末四

右分四服每二時一服

第九方解 猩紅熱豫防劑

莨菪工牛又心桂水

右溶和小兒一歲者朝夕服二滴至三滴每長一歲增一清漸次加量可也然一次之量勿過十二滴

外用

第一方 治關節疼痛

莨菪根 半

右以水適宜蓋閉煮瀘過取汁為蒸溜劑

第二方 治子宮口閉縮因瘧者

莨菪越幾劑 熱湯 蠟

右射注腔內

第三方 治腫孔縮小或白內障眼施術前用之

莨菪越幾劑 蒸餾水

右為眼中

蔓陀羅華

越幾劑每服半人至一人日三次雖多勿過

昆傑魯烏白實末半人功力當越幾劑一人

○丁幾劑 製法 蔓陀羅實 伊新巴 每

本服六滴至二十滴

一方

一蔓陀羅華越幾劑心沙糖二

右為散分十二服朝夕一服

又方

蔓陀羅華越幾劑心或心至心沙糖二

蒸餾水心

右溶和每服一食七日三次

煙草葉ニコチン

作浸劑酒劑心幾劑

第一方法煙草浸劑

煙草葉心熱湯心

右盛磁壺蓋閉竈上浸出半時絞搾取心加燒

酒二心調勻每服四十滴至八十滴漸加五滴至

十滴終至二百滴日二次

第二方法煙草酒

煙草葉心伊斯巴尼酒心

右內磁壺蓋閉飽熟四日每服六十滴至百滴

第三方法煙草丁幾劑

煙草葉心再餾燒酒心

右作丁幾劑每服三十滴日二次

外用

長
第一方 治諸風頭瘡疥癬

煙草葉 二斤以雨水十斤

釐乙典怪羅偃 一

右溶和為洗劑

第二方

煙草葉 一

右以熱湯適宜浸出瀝過取八斤為灌腸劑

第三方 治頑固皮病

煙草紋汁 新鮮

黃蠟 各三

華爾斯 半一

的列並底

沒藥油 搗

右作膏塗之 緇帶

實艾答利斯

為散每服一八至二八日二次癡狂及神思昏

悞病每服三八至二八小兒每時八分

○浸劑葉一錢以液五斤至八斤浸之 ○煎劑

葉一錢至一錢半以水六斤至八斤煮之 ○丁

幾劑每服十滴二十滴至三十滴日二三

第一方 治心臟形器病

實艾答利斯葉 一八至二八

沙糖 一

右為散製劑十二箇每服一劑日二次

第二方 治胸水

第八方 治水腫

實芟答利斯葉一 加斯葛栗刺皮一

民垵列利精一 海葱越幾劑一

桂舍利別一

右先以水十斗煮上二味至八斗瀘過加餘藥每

二時半若三時服半食匕漸加至一食匕

第九方 實芟答利斯煎

實芟答利斯葉二

右以水十六斗煮取八斗聽用

第十方

實芟答利斯丁幾劑 叔歛亞的兒各一

右合每一時若一時半取十滴至二十滴冷水半

碗和服

第十一方 治胸水

實芟答利斯丁幾劑二

刺屈默加非魯薩越幾劑一 桂水一

右溶和每半時取三十滴以酒飲服臨服宜振蕩

之

第十二方 治胸水

實芟答利斯丁幾劑二 海葱一 廿又六 至十

桂水

右調勻每一時服三十滴至六十滴臨服宜振蕩之

外用

一方治皮病

實芟答利斯葉

右水煮瀘過取八多洗患部日二次

又方實芟答利斯軟膏

實芟答利斯

右徐徐煮蒸散水氣至軟膏之稠絞榨去滓供用

其四 酷厲揮發性麻醉藥

格爾失屈謨

格爾失屈謨根丁幾劑

右狀和再餉燒酒三每服二錢或二茶七○格

爾失屈謨根酒以伊新巴尼酒八多浸出

夕服六十滴至七十滴翌日又服前量一二次

○格爾失屈謨醋丁幾劑同每服二十滴至六十

滴○格爾失屈謨醋蜜白蜜二多調勻每服

二乃至半多

此球根以難得功力全者及新鮮者輒近撰用

格爾失屈謨子酒酒 尼酒 十五 子二 伊斯 巴
十日以紙漚過 每服一茶匕日一二次雖多一
研子壘固封貯 三裁 桂水橙花水等和服一 每服
日用 量不過三 裁 桂水橙花水等和服一 每服
 藜蘆 ハシホリユスアルヒニス 調 每服二十歲至六十

每日服半二 氏至二 氏漸加至五 氏市氏或二 十

氏〇 浸劑藜蘆半二 氏至一 氏以液四三 至六 氏

右浸之

一方〇

林爾藜蘆根半 裁以酢十 橙皮舍利別一

右合每一時若一時半服一食匕

薩拔實刺サバデラ

為散丸煉紙劑每服五二 氏至十 氏〇 浸劑取薩

拔實刺半二 氏以水若乳汁二 氏浸之

第一方〇

薩拔實刺子末 茴香糖油各 二〇

右為極末分四 服朝夕一 服乳汁送下

第二方〇

薩拔實刺子一 裁 蜜二 次

右為六 十九丸朝夕服十 五丸

第三方〇

薩拔實刺子月四

右浸熱湯九寸飽熟入少時瀘過每服二食七日

二次

外用

一方

薩拔實刺子

十二錢以蒸餾水

煮取五寸

牛乳三

右合為瀉腸劑

又方殺諸風

薩拔實刺子

水銀軟膏

家猪脂

右每夕擦頭

黒列僕利レボリ

為散然為浸劑者最優服量五匁至十匁

下劑十五匁至三十匁

○浸劑黒列僕利

二錢至半寸以液八寸浸之

○越幾劑為丸二

方

黒列僕利根二錢至半寸

熱湯八寸浸之

屋施茂兒

右合瀘過每服一食七日一二二次

又方

黒列波藥丸

增製法 黒列僕利越幾劑瀉藥

屈室葉未六多右調身為一塊置高兩倍對賣
燥慶至下可九之相一八為一丸
右朝夕服五丸至十九

外用

一方 黑列僕利根 二至三至

右以熱湯十手浸出為洗藥

又方 黑列僕利根 一家猪脂 二至三至

右研合為擦劑 隨青最數取量五六八 其相倍○可

雙鸞菊 刀丁二五公

為散若丸每服一八二八至十八○越幾劑為

最良每服半八二八五八至十八日一二二次

第一方 雙鸞菊越幾劑 沙糖 蜘蛛石 各半

右為散頓服日三次冷水送下

第二方 治痛風定時發歇者 雙鸞菊越幾劑 硫酸規尼扭 仁

桂油糖 刀

右為散製劑十二箇每服一劑日三次

第三方

雙鸞菊越幾劑二 金硫黃一 硫黃華

苗香油糖各半 右為散製劑十二箇每服一劑日三次

第四方 雙鸞菊越幾劑 金硫黃各十

朴屈福烏篤脂二 白石鯨宜

右合為九九服九九日三四次

第五方 雙鸞菊越幾劑半 甘汞五 十八日一二六

蒲公英越幾劑半 一錢 二入至十八日

右加牛蒡根未適宜為六十九朝夕服一丸

第六方 雙鸞菊越幾劑半 安質沒扭酒半

右溶和朝夕取十五滴至三十滴以水若酒飲服

第七方 雙鸞菊越幾劑半 鹿瑞精半

右溶和朝夕取十五滴至三十滴以酒和服

兒薩室刺尼三 伍里罕斯詳

取一錢至三錢以水一匕至一匕半浸出每服

二至四日三次

此草以乾括者効力甚

劣弱且和蘭地方無野生故當用獨乙國所貨
來之彪兒薩室刺越幾劑亦唯年々可撰其新
製者也○越幾劑為散丸若溶劑日服一丸至
六丸

第一方

彪兒薩室刺越幾劑一丸至

沙糖一

右為散製劑六箇朝夕服一劑

第二方 治眼盲

彪兒薩室刺越幾劑一

彪兒薩室刺葉末豆

右合為六十九朝夕服一丸漸加至七丸

第三方 同上

彪兒薩室刺越幾劑十

朴屈福烏篤揮蕪丁幾劑一

福烏篤增製法○朴屈

器用燒酒二十五度者溶鮮馬硝子壘加礮砂

右取二十滴至六十滴以酒和服日三次

第四方 治痰咳有律功

彪兒薩室刺越幾劑半安質波担酒半

右溶和每服二十滴至三十滴或其餘日三次

第五方 治肺勞

裏

彪兒薩室刺越幾劑

十五

老利兒結雨斯水

三

右溶和每服二十

清

至四十

清

清

清

清

斯

太

必

私

亞

伍

利

亞

子

詳

未

詳

未

此藥唯供外用

散劑

軟膏

若煎劑

散

第一方

治

小兒

頭

風

斯太必私亞伍利亞子

薩

拔

實

刺

各

六

分

右為散每晚取蕃薇軟膏塗頭

髮

取

此

散

少

許

撒

之即以帽子密裹頭部

第二方

同

上

法

同

上

法

同

上

法

同

上

斯太必私亞伍利亞子

二

煮

取

二

分

水

三

家猪脂

二

右合蒸散

水

氣

為

軟

膏

之

稠

五

日

三

次

第三方

蘭

揚

氏

所

稱

之

治

癬

方

末

煎

斯太必私亞伍利亞子

一

分

以

水

適

量

煎

其

量

一

日

阿芙蓉越幾劑

十

分

日

煎

其

量

一

日

煎

其

量

右合為洗劑

一

日

煎

其

量

一

日

煎

其

量

一

守末屈

リ

ス

ト

キ

シ

コ

ロ

ン

一

日

煎

其

一為散

若

丸

每

服

四

分

至

四

分

或

二

幾劑

為

丸

若

溶

劑

一

分

至

二

分

漸

加

至

一

分

若

一

日

煎

其

量

一

日

其餘

一方

守末屈越幾劑

加斯葛栗刺越幾劑

新式番柁仁末

桂末

右合二瓜為一九每服五丸日五次漸加增其量

又方

守末屈越幾劑

守末屈葉末

右合二瓜為一九每服一九至五九日三次漸加

增其量

袖珍內外方叢卷之四

終

袖珍內外方叢卷之五

三子薑菜

藥品標目

第二目 醋厲菜

黃羊菜

醋厲菜 其一 浸蝕醋厲菜

醋厲菜 其二 揮發醋厲菜

瑞香 屬藥番柁 蘇高漢醋厲菜

蘇高漢醋厲菜

龍骨木脂 青液地 蘇高漢

蘇高漢

其二 揮發醋厲菜

白芥子

沙蘿菴

山萸菜

碎米薺

大蒜

葱

海葱

設儒謨丑屈列

其三 胡椒性酷厲藥

胡椒

白胡椒

畢澄加

其四 木華雷斯性酷厲藥

朴屈福烏篤

遠志

剝列乙瓦刺亞未羅

濱瞿麥

山牛蒡

蜀羊泉

沙雷薩根

丑兒尼加

百乙列篤律謨根

三色莖菜

袖珍内外方叢卷之五

第二目 酷厲藥

酷厲藥有四种。一曰浸蝕酷厲藥。二曰揮發酷

厲藥。三曰胡椒性酷厲藥。四曰木華雷斯性酷厲

藥。

其一 固浸蝕酷厲藥

番椒 カプシキム、アニシム

為散丸每服二丸至六丸

一方 固治間日熱及三日熱

一番栴仁六老利兒實二

右為散分三服當發熱前惡寒初取一服包乾糊

香服之次日第三日與初日同時服之

又方 治頑固間歇熱又為再發豫防方

硫酸規尼末十二番栴仁末一

幾那越幾割半一黃幾那末適再旗那新膏

右合四丸為一九每服五丸日四次三日乾發新

瑞香 メセラム

取一戈至二戈水煎瀘過取二戈

一方代沙雨薩根三

瑞香皮戈沙雨薩根半

右以水適宜煮瀘過取八勺至十勺加甘草根二

錢浸出每一時若一時半服一食匕或朝夕在等

中服半茶碗至一茶碗

外用 直取此皮貼肌膚或作瑞香軟膏圍製法

上羊文火細判內磁印注水少許搗碎次加水三注勺和之加家猪脂五勺更上武火再搗碎又注絞過其脂溶解者一勺加白蠟一戈半調勻供用

龍骨木脂 エウホルヒウム

今世唯供外用作散若丁幾割硬膏

其二 揮毫醋屬藥

白芥子シナリス

為散若浸剉一錢至一兩半

第一方 治痲病

白芥子半一錢 良姜根一

治乙 逾氏複方丁幾剉一錢 圍製法○幾那橙

三味細到研末 汪燒酒十度者 四北浸漬四日

時々振蕩之 淨加刺賢 挂兒指

右先以熱湯四寸浸上二味飽熟四分時淨過合

餘藥每一時服半食心至一食心

第二方 治疫咳

白芥子末一 海葱蜜一

右合每半時服二茶心

第三方 治頑固間歇熱兼胃中粘涎者

白芥子末 黃幾那 府利油糖各半

右合每一時半服一茶心

外用

第一方

裸麥粉三 白芥子一 醋適

右作毳布貼腓腸或足脚下部至見赤色○此方

過強烈如婦人小兒不堪用故製後方代之

第二方 白芥子硬膏

裸麥粉一 白芥子半 香麝醋適

右調勻為琵琶布之稠攤掌大皮革揮布片貼足脚

下部或他部

第三方 強烈白芥子硬膏

蒸餅膨脹者 白芥子 泥菖根各一

海葱醋適

右為琵琶布

第四方 強烈白芥子硬膏

第五方 治非症卒厥眩暈

裸麥粉半 白芥子末半

礪砂加石灰精

右調勻為琵琶其性為最猛烈

沙蘿蔔 アルミレト

朝饌前及午餉時服一茶匕至一食匕絞汁

服半多至一多治胃中粘液及粘液咳冷浸

一剖取沙蘿蔔二多至四多以麥酒或醋一硝子

壇浸之每服一食匕日一二次治水腫外

草味或與白芥子合為琵琶布若脚湯凡一回脚

外用

湯内加十六錢至三十錢

一方

沙羅蔔絞汁

香竈醋

右浸出淨過每勉洗患部

山萸菜

ニシレアリ

大抵為絞汁若昆設番弗用之每日半多至一

多○山萸菜精每服三十滴至六十滴

第一方

山萸菜葉

ニシレアリ 浸出四時淨過

一 姜舍利別 蜜 適宜味可

右合每一時半服半茶碗

第二方

山萸菜昆設番弗

橙皮舍利別 適

右調勻為砥劑每一時半服半茶碗

第三方

山萸菜精

枸椽汁 氣榨者

山萸菜水 或橙花水

麗春花舍利別 各三

右合每一時半服一食匕

外用



一方

山萸菜精三 玫瑰蜜一 蘓魯林十滴至三十滴

右調勻為含漱劑

碎米薺ナスエリウム

碎米薺絞汁一 山萸菜絞汁一 橙汁ハ

右合取一茶一沙糖和服日一二次

大蒜トルリウム

絞汁每服半一至一至一〇浸劑蒜一至二至三

以醋若乳汁一至十至十浸之

一方治蛔蟲

大蒜球一到者 牛乳一

右浸出瀘過二歲兒與二一至二歲以上者與四一

朝餐前服之

文方治水腫

大蒜球一到者 醋一 香竈醋各半

右浸出一日瀘過每一時半取一食一沙糖和服

葱セバ

絞汁每服一一至二至三

一方治水腫

葱絞汁一 沙糖適量 為度

右合每服一食匕日三四次

海葱 シキルラ

為散丸每服半分至一分漸加至六分小兒六分至四分雖多不可過半分○海葱醋二分至六分或供外用○海葱蜜一茶匕或羊錢至一戈小兒吐割用羊子○海葱边幾割一分二分至十分為丸若溶劑

第一方 治水腫

海葱末一分 桂木一分 桂油糖一分
右為散朝夕一服

第二方 治水腫

海葱末一分 實芟答利斯一分 純精酒石一分

右調勻為散製劑十二箇每服一割日三次

第三方 治氣管及膀胱粘液

海葱末一分 護謨安波尼亞幾一分

板甬撒謨格淋霍一分

右調勻二分為一九服二九三九至五九日二三

次

第四方 治水腫

海葱越幾割一分

蘆會越幾割一分

健質丑那越幾劑二 杜松子油二十

杜松子末隨

右調勻二丸為一九每服十九日二三次

第五方 和朮劑

海葱越幾劑心 金硫黃四 苗香水六

沙糖二

右調勻每一時半服一食已隨服宜振蕩之

外用

一方 治腺病硬結腫水腫

海葱三

右加燉乙典垓羅伍適宜煮至成粘漿滷過加家

猪脂通宜作軟膏擦患處

設テ儒ニ謨ム丑ハ屈ク列レ

乾草每服六丸十丸二十丸至三十丸服後大

抵發吐下今時唯以此生草若其統計供外用

○其三 胡柀性酷屬菜

胡柀ヒルニクリ云

為散若浸剉每服五粒至十二粒或五丸至十

一方 治頑固三日熟

一胡枹ハ硫酸規尼ニ沙糖ハ

右調勻為散製劑六箇ニ煎熟前每一時ニ羊服一劑

又方治間歇熱

胡枹ハ飽ニ錢ニ浸ニ燒酒ニ過ニ挂水ハ

橙皮舍利別ニ

右每一時服ニ羊食ハ

白枹ハ

服量用法與胡枹同然比之胡枹其酷厲性差

方

畢澄加キムヘハ

為散丸每服一食ハ日三次四次五次至六次

一方圓治淋疾

畢澄加末ハ

右每服一茶ハ冷水送下日三次

又方

板角撒謨格淋霍ニ亞利昆ニ護ニ未ニ

右加水適宜為乳劑次加畢澄加末適宜ニ

丸為一丸服ハ九至十九日三次漸加增其量ニ

其四華甫斯性酷厲藥

朴屈福鳥篤ホククホウウト

木屑半斤至一斗以水二斗煮取一斗每服一
 碗○朴屈福烏鳥脂為散丸乳劑五人至十五
 人或以亞兒箇雨即朴屈福烏若礪砂加石灰
 猪揮即朴屈福烏溶解○朴屈福烏鳥丁幾劑
 鹽製法○朴屈福烏鳥脂五兩出六日每服六劑清至八
 十清○朴屈福烏鳥揮一斗幾劑增製法○朴
 一斗右內磁缸燒酒二十度者二斗溶和寫
 砂子壘加礪砂加石灰二斗浸出八日清過
 貯每服二十清四十清至八十清

第一方 治眩暈

朴屈福烏鳥房三斤日三次四次至六次

右以水二斗煮取一斗加甘草半斗飽熟清過每
 一時半一茶碗溫服

第二方 治眩暈

朴屈福烏鳥脂 純精酒石 錢各半
 硫黃華 十人至十五人

右為散製劑三箇每夜臨卧服一劑

第三方

朴屈福烏鳥脂 甘草

結兒茂斯密理刺列 紫堇 越幾 劑各一

右調勻二尺為一丸朝夕服四九

第四方

朴屈福烏篤脂

亞刺昆

亞護末

點栗薩水

橙皮舍利別

右作乳劑每一時服一食匕

第五方

脚痛凡奇方

朴屈福烏篤脂

糖製燒酒

一名留護上

增依百乙含密書酒條云粗糖好者一廿

與粘分飽合者甚易醉釀可以造酒然其味酷烈刺戟難為日用飲料也

右內磁壺微溫飽熟七日滷過每服一二茶匕日

三次

第六方

朴屈福烏篤揮癸下幾劑

安實波担酒

右合每夜於葶中服一茶匕次喫接骨木花泡劑

一疏

第七方

朴屈福烏篤揮癸下幾劑

續草下幾劑

右合每服四十滴至六十滴日四次

遠志

取二錢至半多以水十二至十六多煮減半

每一時服一食匕或作酒浸劑

一方 剝列乙瓦刺亞未羅

遠志根 過馬託亞舍利別

右以水適宜煮過取四勺每一時服一茶匕

又方 遠志根 伊斯巴尼亞酒

右飽熟三日瀝過每一時若一時羊取羊食之沙

糖和服

剝列乙瓦刺亞未羅

取一勺以水一坵煮減半每服一食匕

一方 治肺勞

剝列乙瓦刺亞未羅

右以水一坵煮取六勺每服一碗日四次至六次

濱瞿麥 取羊勺以水二十四勺煮減半每服羊茶碗

山牛蒡

服量同濱瞿麥

蜀羊泉

浸煮剝浸煮荃羊勺

每服十勺至三十勺

日四次為凡佳

每服十勺至三十勺日四次為凡佳

每服十勺至三十勺日四次為凡佳

沙爾薩根 サハルサ

煎劑根一多以水十六多者減半

一方圍治癩毒

置羊沙爾薩根

右以水三升煮取一升加甘草半多飽熟每服一

茶碗一晝夜服盡

亞兒尼加 アエニカ 以水二十四多煮取半每服半茶碗

浸劑花一錢至二錢以熱湯四多至六多浸之

每小時服一食匕至二食匕○根二錢至三錢

浸漬過取液四多至六多

蘇方代 スハフダイ

亞兒尼加花 アエニカハナ 過取液六多 錫布羅 スエブロ 十二

亞刺昆亞護 アサキアモ 漿

右合每半時服一食匕

又方圍治癩瘡

亞兒尼加根 アエニカネ 二錢至 白芥子 シロカイ 一錢至

右以熱湯四多浸之飽熟四半時過加收斂

的兒一錢至一錢半每小時服半食匕至一食匕

百列篤律謨根 ヒャクリツトク

為丸若祇劑十食匕至二十食匕○煎劑根二錢至

羊子水煎酒過取六子至八子無信肺二皮至

三色草菜ヤヒアヘバ

乾草一莖以乳汁煮一時朝夕服其并治小兒

頭瘡...

右五...

天...

...

...

...

袖珍内外方叢卷之五

...

