

袖珍内外方叢

植物

六

同

七

同

八

袖珍內外方叢卷之六

袖珍內外方叢卷之六

藥品標目

第三目 吐藥

吐根 吐根

第四目 下藥

梅那

第一方 藥刺巴

蘆會

藤黃

傑脛并魯伊

蘇甘沒扭謨

格碌董篤

瓦刺微阿刺

蘇合香散

蘇合

袖珍內外方叢卷之六

第三目 吐藥

吐根

每服六分至四分至三分至二分至一分至六分 吐劑大

人八分至二分至一分至六分

第一方

托歌兒秘發汗散 十八沙糖

右調勻每夜臨卧冷水頓服

第二方 治瘧瘵性帶下

吐根二 桂木 桂油糖各四

右為散分八服每半時一服

第三方 治下利

吐根二 阿芙蓉一 沙糖二

右為散分四服每一時若一小時半一服八

第四方 吐劑

吐根二 沙糖二

右為散頓服候生惡心乃與微温湯若加蜜列泡

劑

第五方 吐劑

吐根二 吐酒石 沙糖二

右為散頓服

第六方 吐劑

吐根二 吐酒石

右為散頓服

第七方 吐劑

吐根二 安質沒担酒 蒸餾水

右合先服其半後每八時服一食二以至得吐

請臨服宜振蕩之

第八方

吐根一錢

右以熱湯二升浸漬飽熟八分時瀘過加海葱蜜一升每十粒扭旬服一食白以至得吐

第九方

吐根酒二升增製法〇吐根極末一升白拂

右每八分時服一茶匕以至得吐

第十方 園治猩紅熱

吐根半 藥性生惡心乃與微溫湯若加煎列泡

右以熱湯適宜浸漬瀘過取一多半加覆盆子舍利別一多半每半時服一茶匕為小兒服量

第十一方 園小兒吐劑

吐根十 安質沒扭酒一 海葱蜜

覆盆子舍利別各半

右每八分時服一茶匕以至得吐臨服宜振蕩之

第十二方 小兒吐劑

吐根酒二

右每八分時服一茶匕以至得吐

第十四方 園下藥

梅

一三錢至四錢浸漬瀘過取液三多半至四多半

一方名緩下浸劑

蘇那葉半斤以水四孕餘酒石二滿那三

右溶和始服半食七後每半時服一食七以至得

下○小兒六歲至十二歲者每半時與一茶七以

至得下

又方

旃那加髓昆設爾弗子贈製法○旃那八

花菓答麻林度阿沒勒髓梅內各半七沙糖二

花菓右先研末上二味節取十其處淳合無

水氣至一七半水加沙糖煮為合利別之相符散

散下餘藥煉合吹投宜十茶為小兒服量

右每半時取一茶七若二茶七骨喜乳不送下或

朝夕服一茶七至二茶七

大黃

每服四分至十分○下劑為散丸浸煎劑半分

至一錢○暴烏兒儒私名曰大黃末二十四分

與一錢半為浸劑者同効○大黃酒小兒每服

二十滴至三十滴日二三次大人一錢至二錢

大黃丁幾劑每服四十滴六十滴至八十滴

日一二次大黃越幾劑每服五分至二十分

取下用一錢○大黃舍利別小兒每服一茶七

第一方 名解凝散 黃守 每服一茶匙

大黃 麻仁 涅失 亞 芒消 至而亦

橙皮黃 二匙 每服一茶匙

右為散每服一茶匙

第二方 名小兒散 大黃 既小兒每服

戶伊 涅失 亞 大黃末 白石 餘 各半 四

苗香 沙糖 一匙 每服一茶匙

右為散初生兒每服一小刀尖差長者每服半茶

匕至一茶匙

第三方 每服一茶匙

大黃末 純精酒 石 各二

右為散朝夕服一茶匙或每一時服一茶匙

劑下利之効大優於單用多量黃

第四方

煨製戶伊 涅失 亞 大黃末 每服一茶匙

葛縷子 油糖 或過泥子 油 每服一茶匙

右為散分二服冷水送下半時間服

第五方 每服一茶匙

大黃末 孕餘酒 石 各 每服一茶匙

右研合二公為一丸朝夕服七丸或每一時服五

九以至得下

第六方

大黃赤白石鯨

大黃赤白石鯨各半

右合二丸為一九朝夕服五丸至七丸若欲峻下

者直七丸至十九日三服黃赤白石鯨

第七方

大黃 瀉利鹽 茵香

右浸熱湯六頭淨過加滿那一錢溶和每服半劑

第八方 未名苦味大黃煎

大黃 二錢至 健質 亞那 一錢

右以水適宜煮四分時絞酒取四多加孕鯨酒石

錢薄荷水二勺每一時服一食匕

葯刺巴

下劑為散若欲劑小兒三四歲者每服四瓜至

八瓜六歲九歲者八瓜至十二瓜大人十五瓜

至三十瓜 葯刺巴華爾斯為散丸若氣劑小

兒每服半瓜至一瓜大人四瓜至六瓜此華爾

斯比之根未則服量少而効力多氣味亦不惡

葯鯨鯨 為丸若溶劑小兒每服二瓜至八

氏大人十氏至二十氏

第一方 藥刺巴根末 孕者酒石 遇泥子油

右為散分二服半時間服盡

第二方 藥刺巴根末 甘汞 薄荷油糖

右為散頓服

第三方 藥刺巴根末 純精酒石 海葱

接骨木傑列乙

右作紙劑每一時服三茶匕若四茶匕

第四方 藥刺巴華雨斯 甘汞 沙糖

第五方 藥刺巴華雨斯 雞子黃

右叮嚀研合加接骨木花水

二錢為乳劑頓服

第六方 藥刺巴華雨斯 甘汞 白石

右二氏為一九每日取十九頓服

第七方

藥 藥 藥

至十五

白石

大黃

未各半

右一丸為一九

衣銀箔

每服三丸

日三次

不油

第八方

藥 刺 巴 根 末

至六

甘 汞

至三

合

苗 香 油 糖

至十

右為散

早朝

頓服

小兒

四歲

至八歲

第九方

藥 刺 巴 華 甬 斯

至一

甘 扁 桃

去皮

沙 糖

各十

右研合

微溫

乳汁

送下

蘇 甘 沒 扭 謨

為散

丸若

乳劑

每服二

丸至

二十

用法

同藥

刺巴

華甬

斯

蘆 會

為丸

每服半

丸至

一丸

○緩

下劑

一丸

○峻

下劑

十丸

至二

○水

製越

幾劑

為丸

若溶

劑每服

二丸

至十

○丁

幾劑

每服十

五

滴至

二十

滴然

多供

外用

每服

十滴

至

第一方

廣

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

蘆會上好者白石鹼錢

右二氏為一九每服二九

第二方

水製蘆會越幾劑二甘汞〇白石鹼各

右合二氏為一九每晚服二九若三九

第三方

律比九料錢

右三氏為一九每朝服十九

第四方 峻下劑

哥西亞丸料半我〇製法〇蘆會越幾劑蘇

右一氏為一九每服二九至五九

外用

一方

蘆膽馳吳膏補

右取一二錢塗擦腹肚日四次

格碌董萬

每服八分一至一分〇峻下劑為散若煎劑三

分三至六分〇丁幾劑每服十滴二十滴至

三十滴以至得下

一方

傑脰弗魯伊皮

右以水適宜煮瀘過取八弓加橙花水一弓頓服

二十歲以下至十二歲者服三分之二十二歲以

下至六歲者服半分六歲以下至二歲者三分之

一

又方

傑脰弗魯伊末

右以水適宜煮取一坵半加傑脰弗魯伊子幾劑

一弓搗皮舍利別一弓半每一時服一茶匕

袖珍內外方叢卷之七

藥品標目

身五日 華西斯性藥

尋常華爾斯

瀟

門利托奴護

蘇合香

琥珀

第六目

袖珍內外方叢卷之六終

研碎研末水煎卷之三

保胎非魯伊皮

右以水適宜煎過取八分加橙花水一分後

二十歲以下至十二歲者服三分之

一至六歲者服中分六歲以下至三歲者三分之

一

候胎非魯伊末

右以水適宜煎取一此半加保胎非魯伊于幾刻

一以橙皮合刊別一分半每一時服一茶匙

袖珍內外方叢卷之七

藥品標目

第五目 華甬斯性藥

尋常華爾斯

格碌波尼

諸

麥爾

阿利拔奴謨

乳香

蘇合香

安息香

琥珀

第六目 拔甬撒謨性藥

拔甬撒謨字露

蘇合香油

一方

參茸

半一

百

蘭

獨

留

末

三

錢

遇

通

託

五

舍

利

別

宜

通

右為

九十九

衣

甘草

末

每服

五九

日

三次

阿利拔奴謨

唯供

外用

作

薰

劑

及

軟

硬

膏

乳香

今世

唯

供

外

用

作

薰

劑

咬

蘇合香

ステイラクス

唯供

外用

膏

三

錢

安息香

ベニソウ

方今

唯

供

外

用

為

丁

幾

劑

散

若

丸

每

服

五

九

至

十

一方

升

水

以

薤

薤

安

息

香

丁

右合

沾

顏

面

小

疹

日

二

三

又方

名

複

方

安

息

丁

幾

劑

安

息

香

蘇

合

香

一

半

三

拔

爾

撒

謨

字

露

再

餽

燒

右

硝

子

壘

固

封

浸

出

三

琥珀

今世唯供外用為薰劑

一方

琥珀 阿利拔奴謨 杜松子 各三次

右搗碎為薰劑

第六目

拔爾撒謨性藥

拔爾撒謨字露

バルサニニムヤルヒアニムニタリニム

每服十滴二十滴至三十滴以上日二三

次或取半錢至一錢作乳劑若丸

拔爾撒謨字露 並刺昆亞薩謨漿錢

橙花水 過爾託亞舍利別

古作乳劑每一時服一食

第二方

拔爾撒謨字露 葛爾儒越錢劑

過爾託亞根末

右為丸每服十九日四次

第三方

拔爾撒謨字露 拔爾撒謨的列並底 各半

右上火混合取八滴至十五滴乳汁或沙糖

端各七方右上文火攪拌焯之
油七方再文火煮候膠脹止水氣
不停手攪動
以至冷定

右攤綿布細帶手足凍瘡

的列茲底那

テレピンチナ

作煉紙丸劑然為乳劑居多每服五氏十氏至

二十氏日二三次

一方

的列茲底那 半錢至 雞子黃 個

加密列水 過甬託亞舍利別

右作乳劑每一時服一食匕亦為射注劑

又方治條蟲

的列茲底那 葯驗錠

菲阿斯先亞密越幾劑 四 甘萊

右合二氏為一九每一時半服四九

外用

第一方 單方解凝軟膏

的列茲底那 雞子黃

右作軟膏用之縛帶

第二方 解凝軟膏

的列茲底那 玫瑰蜜 各六

乙切草浸油一斗 蘆會了半

右作軟膏用之縛帶

第三方

越列密軟膏

四了子 製法曰越列密的列華底
那羊脂 各等分右文火烱
和以布片 過不
手攪動以至冷定

傑謨未剝彪利

詳未

唯供外用作軟膏

一方單方剝彪利軟膏

傑謨未剝彪利

酪新解者或家

右文火煮至軟膏

拔爾微謨格海霍

每服十滴二十滴四十滴至六十滴水或沙糖

和服或為丸然作乳劑最佳

第一方

拔爾微謨格海霍雞子黃個三 推水五

右如法作乳劑加桂水一 桂舍利別半 每一

時半服二茶匙

第二方

拔爾微謨格海霍一 亞刺昆五 蘆會二

右合加扁桃乳一匕半每服一茶匙

第三方 治後淋白帶下

都拔甬撒護格淋霍錢 亞刺昆亞越護末新

蒸餾水

右作乳劑加百藥煎末鐵屑健質亞那末各一錢
半二氏為一九每服八九日三次

第七日 越護華甬煎性藥

沒藥 キヨクノメイルラ

蘇補為散丸若乳劑每服二氏五氏至十氏〇越幾
古劑為丸散若溶劑二氏至十氏

第一方 治咽喉氣管粘液過多者

沒藥末 乳糖

右頓服不用飲液宜徐徐嚥下

第二方 治肺勞

沒藥錢 板甬撒護李露

阿芙蓉越幾劑

右二氏為一九每一時服二九

第三方 同上

沒藥越幾劑

撒兒末甬扶斯

蒸餾水

橙 舍利別

右分四服早朝一服晡時一服臨卧一服後隔一

日服其餘

護謨安波尼亞錢

カニモアムニアキ云

為丸乳劑或海葱醋若民持列利精溶解每服

五片十片至十五片日二三次

第一方

護謨安波尼亞錢

白石鱗

蒲公英越幾劑

右合二片為一丸每服十五九日三次

第二方

和胸劑

護謨安波尼亞錢 沒藥越幾劑 草頭

麻面羅歌 工本 各二 全硫黃錢

甘草膏

右合二片為一丸每服四九至六九日三次

第三方 治肺粘液及肺痿初起

護謨安波尼亞錢 黃一錢 雞子一個 肥束布水

海葱蜜 五陳 吳 五 勢 藍 漿

右合每半時服一食匕

第四方 和胸劑

護謨安波尼亞錢 一屋施幾面 外 詳 註 骨 本

右溶和加安實沒扭酒一錢民埵列利精接骨木
花浸各三多每一時服一食匕

第五方速治小兒痰咳後肺勞

護謨安沒尼亞幾二十五刺毘亞護謨漿

苗香水各四過再託五舍利別出多市水四

右合每服一食匕日三次

外用

一方治灰白腫

護謨安沒尼亞幾幾五五金黃

右海葱醋溶解煮至布之稠攤軟革貼之解凝

疏散之功尤偉

又方

護謨安沒尼亞幾末并蒸餅腸脹者

右作布微溫貼之消散寒腫有偉効

瓦カ膏ハ拔ハ奴ム護

為丸若乳劑或以海葱醋溶解每服五匕十匕

至二十日日二三次

第一方

瓦膏拔奴護白石餘各二黃鼠狒由十餘

右合二匕為一丸每服十九日二次

第_二方

瓦爾拔奴護錢三 蘆會月半 薩昆那油六 湯至

右合三爪為一九衣銀箔每服五九日四次

第_三方

瓦爾拔奴護錢三 葛私多樓護錢一

板爾撒護字露

石合一爪為一九每晚服八九或每服五九日三

次

第_四方

瓦爾拔奴護三 海葱醋

苗香水三

葛私多樓護丁幾劑半

舍電茂護阿芙蓉液二十 湯五 橙花舍利別

右調勻每半時若一時服一食匕

外用

一方化熟腫腺腫最良

瓦爾拔奴護硬膏圍 製法口 鉛硬膏草 零陵 雞

製 眼前

右敷患處每陽日撫之

阿魏

為丸若乳劑每服五爪十爪至二十爪日二三

次○丁幾劑十滴至四十滴

第一方

阿魏

葛私多儂謨

各半

續草越幾劑

右調勻二斤為一九

衣桂末

若銀箔

每服六九至

八九日三次

第二方

阿魏

牛膽

各二

大黃末

錢半

右調勻二斤為一九

每服十二九

日二三次

第三方

吐根

阿芙蓉

各二

阿魏

錢半

薄荷油

清

治尿閉

右調勻二斤為一九每服十九日三次

第四方

治依利昆

里及

韃私的

里症

鹿角鹽

錢半

阿魏

錢半

白石

鯨

續草油

右加健質

亞那越

幾劑

這宜

二斤為一九

硝子

器

固封藥之

每服五九

至八九日

三次

第五方

阿魏

亞利昆

亞護謨

雞子黃

錢

密列水

桂舍利別

右調勻為乳劑

每半時

若一時服

一食

心

臨服宜

振蕩之

第六方

阿魏

精一錢 氏挂列利

苗香水

確砂精

過泥子油

過甬託 亞舍利別

右合每一時若一時半服一食心臨服宜振蕩之

第七方 小兒應用方

阿魏

麝香

亞刺比 亞護漿

右研合加蒸餾水二錢半沙糖二錢每半時服一

茶心至二茶心

外用

神效

第一方

阿魏

阿列襪油

過甬託 亞膏

各一

阿芙蓉末

右作軟膏塗擦腹部及臍傍日三次

第二方

阿魏

亞刺昆

亞

雞子黃

加密列水

右作乳劑以其半供灌腸法

第三方 治小兒腸胃症學痛

阿魏

雞子黃

加密列水

加密列水

右合為灌腸劑每用半劑若一劑

古劑藥性以建其壯氣散寒

古劑藥性以建其壯氣散寒

古劑藥性以建其壯氣散寒

袖珍內外方叢卷之七終

袖珍內外方叢卷之八

藥品標目

第八目 揮發油性藥

其一 的列拉性油藥

的列拉油

杜松實傑列乙

薩昆那

其二 羯布羅性油藥

羯布羅

迷迭香

杜松實

特松實油

薩昆那油

加那普的油

刺賢堙兒

茉莉刺那

薄奇

面託基里私把

草零陵香

設訥剝實烏謨

其三 土木香性油藥

土木香

白芷

羌活

攝爾扁答里亞

其四

臭油藥

纈草

綿馬

攝懸施那

接骨木花

其五

甘油菜

玫瑰花

萱菜花

歇爾拔斯屈謨

菩提樹乾

其六 土香油藥

良姜

菖蒲根

益智

肉豆蔻

府刺

必面託

光利兒實

香屈林

洋芹

華尼利

格墨因

葛縷子

苗香子

過泥子

角苗香

百雨蘭度留護

雜腹蘭

以上十九品本性香油藥

桂

白桂

應的刺皮

薩沙弗刺斯

撒雨非亞

以上五品收瀋香油藥

加密列

加斯葛栗刺

橙皮黃

青橙

橙花

橙葉

亞雨鮮

蒼草

青蒿

以上九品苦味香油藥

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

袖珍內外方叢卷之八

第八目

揮發油性藥

揮發油有六種一曰的列茲性油二曰錫布羅

性油三曰土木香性油四曰臭油五曰甘油六

曰香油

其一的列茲性油

的列茲油

每服二滴五滴至十滴○驅蟲下劑二錢至一

引以上或以清數若食數服或為乳劑若欲

白胡椒

右早朝空心先喫大麥粘汁二碗次此油加水一
盞振蕩頓服

外用

第一方圍治尿閉因症瘰者

的列並油半雞子黃一

右搗合徐徐加薄荷水六分塗鼠蹊有偉効

第二方圍治頑固後淋

的列並油一雞子黃一蒸餾水一

右合為射注劑

第三方圍治螻蟲

的列並油一雞子黃一加密列水一

右作灌腸劑朝夕施之

杜松實

煎劑取半斤至一斤水煮熟瀘過取六分至八分

一方

杜松實一蒲公英根一甘草各三

右搗碎為泡劑

又方

杜松實一艾葉各半

右注熱湯一升半蓋閉飽熟三時瀘過每服一酒

蓋日三次

杜松實傑列乙

為舐劑若溶劑每服一錢至二錢

一方

杜松實傑列乙

幾那末

右合為舐劑每一時服一食

又方

杜松實傑列乙

洋芥水 甘海鹽精

右合每一時服一食

杜松實油

オレウム

每服一消至四消沙糖和服或為溶劑

一方

杜松實油

甘消石精

拔爾撒謨孛露

右今每一時半服三十消

外用

一方

杜松實油

的列茲油

右合為擦劑

薩昆那

薩昆那

藥為散每服半月至一日二次○浸劑取一
錢浸漬取液四勺○煎劑取一勺以水一匕煮
減半○昆設爾弗以新鮮者製之

第一方

薩昆那

右浸熱湯八勺加過爾託亞舍利別一勺每一時
若一時半服一食匕

第二方

薩昆那

右細剉加雨水一匕文火煮瀝過取六勺加桂舍

利別一勺每一時服半碗

第三方

薩昆那 新鮮者

右搗爛加沙糖一勺半為昆設爾弗分十二每二
時服其一

第四方

薩昆那昆設爾弗 橙皮舍利別

右合為祇劑每日服一茶匕至二茶匕

薩昆那油

每服一滴至四滴沙糖和服或為乳劑

一方

薩毘那油六

沙糖錢

右為散分六服日三服

又方凡和乳脂凡中凡

薩毘那油八

沙糖錢

雞子黃箇

接骨木花水三

右作乳劑每一時半服一食凡兩凡十二凡二

外用

一方圖治蛔蟲

薩毘那油一的列並油各半

各半過取六凡加桂凡

硃砂加石灰精

右合為擦劑

其二凡錫布羅性油藥

錫布羅

為散九乳劑飲劑或以酒燒酒亞的兒若醋溶

鮮每服一凡二凡四凡至六凡或一凡半錢

第一方

錫布羅心

沙糖半

消石十二

右為散製劑八箇每一時一劑冷水送下

第二方

汗劑

阿芙蓉 錫布羅 各一 吐根末 二 沙糖 半

右為散 頓服 接骨木花泡劑 送下

第三方

錫布羅 錢半 阿魏 半錢 亞刺昆 五ゴム 宜

右調勻為丸 十九 每一時半服 六丸

第四方

錫布羅 刀半 亞刺昆 五ゴム 一

外用 覆盒子 舍利別 研 藥

右調勻 每服一茶匕

第五方

錫布羅 一

右以亞刺昆 亞獲 謨漿 這 宜 溶解 和 扁桃乳 一 坩 每一時服一食匕

第六方

錫布羅 少半 錢加 燒酒 許 溶解

接骨木花水 六ゴム 至 橙花舍利別 研

白拂蘭斯酒 九

右瀘過 每半時服一食匕

第八方

錫布羅 刀半 甘消石 精 一

阿芙蓉液 二十滴至三十滴

右調勻每服十滴至二十滴沙糖和服

外用

第一方 各羯布羅油

羯布羅 細屑

右加扁挑油七錢溶解

第二方

礪餘揮堯膏 一加石灰精條

右為擦劑

第三方

礪餘揮堯膏 二 莞菁 一 幾劑 方二

右為擦劑

第四方

羯布羅 一 亞刺昆 二 亞獲謨 三

加密列冰 六 至

右合為灌腸劑

第五方

羯布羅 五

右加甘扁挑少許搗碎加泉水適宜作乳劑

取八分加含電發謨阿芙蓉液十二滴亞鉛華半

薩拔爾撒
刺賢埵兒
花
各
芸
杏
燒
酒
沃
刺
那
送
香

右為慰劑

刺賢埵兒

今世唯供外用同送香

茉沃刺那

供食膳辛料之外唯供外用

第一方

誘噫散

右為噫劑

第二方

名茉沃刺那浸油

茉沃刺那葉

新鮮者
阿列襪油
六溫者

右浸漬飽熟少時絞瀝供外用

第三方

名茉沃刺那乳

右以新鮮乳汁八勺煮至軟膏之稠淨過供外用

薄苛

浸劑乾草半勺浸漬淨過取六勺至八勺○薄

苛水每服一食勺為他劑加藥○薄苛油每服

草零一清至四清沙糖和服

面託基里私把一薄種

浸劑露水共同薄荷

草零陵香ノリロキス 煎餅味耶

今世唯供外用如草零陵香膏是也

設訥剥實烏護未詳 煎餅味耶

為散若浸劑泡劑每服一夕至一錢

一方條條煎餅味耶

設訥剥實烏護藥彈

右注熱湯八多蓋閉少時汗過每一時服一碗三

分之二煎餅味耶

其三煎餅味耶 土木香性油藥煎餅味耶

土木香ノリロキス 煎餅味耶

為散若散劑每服半錢至一錢○浸劑根半多

以水若酒浸漬取六多○煎劑根二錢水煮取

一八多

一方

土木香末半 蜂蜜或善舍利

右作散劑每服一茶匕日四次一餅一餅半煎

白芷アンゲリカ

浸劑根半多浸漬取四多至六多

羌活ノリロキス

煎餅味耶

為散或水浸酒浸劑每服十錢二十錢至三十

攝爾扁答里西

之○浸劑根二錢至三錢浸漬取液四錢至六

一方

幾那

右以水二地煮取九錢加攝爾扁答里西末半錢
飽熟絞瀝加橙皮舍利別一錢每平時服二食

其四 臭油藥 各依限

纈草

為散若欲劑每服一錢至二錢日四錢至六錢

○浸劑根半錢浸漬取液六錢○越幾劑為丸若

○丁幾劑三十清

○亞的兒製丁幾劑十五清至三十

清

一方 殺蟲故劑

纈草 攝絲施那 葯刺已根

孕荖酒石 海葱塞

綿馬末三錢

右早朝空心頓服後一時喫蓖麻油半勺後每
四分時喫半勺以至盡三勺

搗蘇施那三十一七

每服一錢至二錢小兒二十以下至三十以下或取

綿馬一茶匕至二茶匕以舍利別若壺和服

○浸劑浸二錢取液四勺

一方圓治祛弱小兒蛔蟲病

纈草各二錢 熟羊時冷定取四勺

胡桃越幾劑忽弗滿鎮痛液

橙皮丁幾劑各半錢 橙皮舍利別半勺

右調勻每一時服一茶匕

接骨木花サハヒユキ、フボレス

為浸劑若泡劑每服二錢至半勺○露水每服

一食匕又為蜜屈劑液料○傑烈乙每服半勺

至一勺○外用作漱劑若點眼水若蒸漏劑等

○其五 甘油藥

玫瑰花ロザリユ、フロレス

今世唯為昆設而弗及露水用之

莖菜花ヒオア、マルナア、フロレス

今世唯為舍利別用之小兒服一茶匕

歌ハル爾ハス拔ス斯ム屋ム護ム
ヘルバニフロリス

唯為泡劑漱劑或作灌腸劑

菩提樹花テリヤ、フロリス

今世唯為泡劑或製露水

○其六 香油葉

香油葉有三種一曰本性香油葉自昔浦

九 欵キ鼻ビ林リン油ユ根コン至シ雜ザ腹フ蘭ラン十ジュウ品ヒン屬リョク鳥ニ日ニチ收シュ潘パン香カウ油ユ葉エフ

自桂至檄齒非並五品屬鳥三曰苦味香

油葉自加察列至管草九品屬鳥

菖蒲根ガラシニス、アロマチキユス

為散每服半錢至一錢○浸劑根半寸浸漬淨

過取液六寸每半時服一食匕○外用三寸至

四寸加浴湯

良姜ガラシガ、ラデクス

為散每服十片至二十片或半錢至二刀為酒

浸

姜シキベリス、ラデクス

為散或以酒若麥酒浸之每服十片至二十片

○糖藏者一寸至二寸○舍利別一寸

一方

ビニカスラ 三香散 羊子 團製法 〇桂 益智 善各

右每服半茶匙以水若酒送下日三次

益智 カルダモミニム

每服二瓜四瓜至六瓜

肉豆蔻 ニクニク スモスカーク

為散若酒浸每服五瓜至二十瓜〇榨油内外

供用

一方 ニクニク スモスカーク 名揮發硬膏

肉豆蔻 榨油 丁子油 薄荷油 各一

龍涎香 每按爾撒謨索露

右合為擦藥

府利 リ 為散每服一瓜至十瓜〇有利蒸餾油一湯匙

四清沙糖和服或為油糖劑

唯供食膳辛料為散或以酒若麥酒浸之

心面託 ホ

丁子 カレ 為散若下幾割每服五瓜至十瓜〇丁子油香

常唯供外用 齒痛 之類

常唯供外用 齒痛 之類

常唯供外用 齒痛 之類

一方名揮發丁幾劑

桂子 丁香 益智 良姜 藜蘆 各半 子 或香

再留燒酒

右乾熟五服二十清三十清四十清五十清

百屈林

為散若丸每服半寸至半寸日一二次

一方治赤痢

阿芙蓉 蝟蛇若末

文亞刺毘亞越護末

右分十二服每一時一服若三服水若乳汁送下

△後

葛縷子

液六寸至八寸 露水每服一食

為散每服半錢至一錢 浸劑子 錢至四錢

浸水若麥酒取液六寸至八寸 葛縷子油

滴至五滴沙糖和服或作油糖劑外用為擦劑

苗香 外用搗爛加列印設酒及白蒸餅作布或

為灌浸劑供灌腸劑

格墨因

服量同葛縷子 格墨因油每服一滴至三滴

一方治胃痞子宮衝逆疝痛因風氣者

格墨因油錢 忽弗滿鎮痛液

葛私多兒丁幾剖

右每一時若一時半取二十滴加沙糖若酒少許

服之

苗香子

為散每服十粒至三十粒

錢浸漬取液六至八分或以乳汁煮之

香水每服一食匕小兒一茶匕

和沙糖一日為油糖劑

一方 羅仙和的尹複方苗香散食補益乳汁下

奇

又方 治白帶下

百屈林末 乳糖

右為散分六服日三服漸加增其量

老利兒實

每服半乃至一月

一方

老利兒實

右為散間歇熱病臨熱將發頓服

外用 老利兒撒爾弗

老利兒撒爾弗方

一名神經軟膏 製法 羊脂 油 十 列 並 油

華尼

和老利兒油合餘菜攪動至冷定
羊脂次
○
羊油

每服四錢至十三錢
○浸劑實二錢至四錢浸

漬取液八錢
○丁幾劑三十滴至四十滴
華尼

利末一錢
出

一方

華尼利丁幾劑
末爾扶斯鎮痛液

右合每服二十滴至三十滴
和酒用之日二次

洋芥子

為散每服一乃至二錢
○浸劑子二錢浸漬取

麻倭涅夫亞
茴香子
橙皮各

右為散每服一茶匙

遇泥子

為散每服五錢至二十錢
或取半錢至一

錢為浸劑加下劑
○遇泥子油每服四滴至六

滴
○鮮金石毒十五滴至二十滴
沙糖和服症

痛溶于甘消石精
易痛風加亞麻油
○加礮砂

加石灰精者各礮砂
加遇泥子精

角茴香

為散每服五錢至二十錢
○浸劑子二錢

浸漬取液六分至八分

一方

退雷訛亞子甘草角茴香各五分

右細剉注熱湯二升浸之漚過每服一茶碗

百兩蘭度苗謨ハルラヤリセ

為散每服十丸至二十丸或半錢若一錢日三

次○浸剉子半升浸漬取液六分

第一方

百兩蘭度苗謨ハルラヤリセ 亞刺昆亞樓謨ハルラヤリセ

乳糖ハルラヤリセ 沙糖ハルラヤリセ

右為散每服一茶匕日三四次

第二方

百兩蘭度苗謨ハルラヤリセ

右注熱湯一升浸之漚過每一時半取一茶碗乳

汁少許和服

第三方

百兩蘭度苗謨ハルラヤリセ 實支答里斯料 熱湯ハルラヤリセ

右浸漬漚過加甘硝石精一錢過雷訛亞子合利別

半升每一時服一食匕

第四方

赤幾那_子

右水煎_沙過取八_勺加百_火桑_交苗_覆半_勺飽_熟
瀘過和_白罌_粟殼_舍利_別一_勺每_一時_服一_食匕

雜_腹蘭_子

為_散或_取十_斤為_浸劑_若泡_劑每_服二_斤五_斤
至_十斤○_丁幾_劑二_十瀉_至三_十瀉

一方_國名_小兒_散

雜_腹蘭_心過_泥子_末半_斤麻_伍理_失亞
纒_草末_各一_斤伊_里斯_弗魯_連底_半斤

甘_草末_一斤

右為_散每_服小_刀尖_二三_抄日_二三_次

又_方圖

雜_腹蘭_刀葛_斯加_栗刺_越幾_劑

阿_利拔_奴謨_末甘_草膏_各五_錢

拔_雨撒_謨李_露斤

右_二斤為_一丸每_服四_丸至_八九_日二_次

外用

一方_國

白_蒸餅_心斤

右_加牛_乳這_宜煮_至罌_布之_稠加_雜腹_蘭半_錢粟

温挾布片掩眼

又方圖治眼翳衝

歌兒夜失屈護了

雞腹蘭

右加牛乳適宜徐徐煎之至羃布之稠用法同煎

桂

シニナモシブルラクス

為散每服五瓦至十五瓦以上○皮一錢

至二錢以水若白葡萄酒浸之取四至六

○露水每服一食匕○下幾劑十六瀉至二十

瀉漸加至三十瀉○油一瀉至二瀉沙糖加服

一方 治產婦白帶下

桂下幾劑見 收斂亞的見

含雷菟護阿芙蓉液タ

右每八分時若四分時若半時取十五瀉至二十

瀉冷冰點服

白桂

カ子ルラアルバ

為散每服十瓦至二十瓦或一錢以水若酒浸

之取液四

應的刺皮

コルテクス、カ子ルラアルバ

為散每服十瓦至二十瓦或半了以水若酒浸

薩沙弗刺斯

之取液六寸至八寸

浸刮根二錢至半寸以水半升至一升浸之○

煎刮二錢至半寸以水半升煮取一升

一方

薩沙弗刺斯皮或材屑半熟湯七

右飽熟三時每服一茶匙

撒爾非亞

浸刮葉半寸以熱湯若酒八寸浸之○煎刮葉半寸以沸湯或酒八寸煮之

第一方 國治脫汗

撒爾非亞半熟湯七

右飽熟四分時汗過取六寸加硫黃精一錢每半

時服半茶碗

第二方 園

撒爾非亞半熟湯七

右飽熟四分時瀘過冷定加酒半升每一時服半

碗或供含嗽刮

第三方 園 治盜汗甚者

撒爾非亞半燒酒七

右飽熟十二時臨卧服二食匕

外用

第一方

撒甫非亞

蜀葵葉

錢各一

右浸熱湯適宜淨過取七寸溶確砂二錢蜜一寸

為含漱劑

第二方

沒藥越錢劑

右以撒甫非亞水六寸浸之加玫瑰蜜一寸為含

嗽劑

第三方

撒甫非亞 一平寸至

右浸水九寸瀝過加明礬二寸玫瑰蜜一寸或二

寸為含漱劑

加密列

一為紙劑每服半錢至一錢○浸剉花四錢至六

錢浸漬取液六寸至八寸○露水每服一食匕

○外用水浸供含漱劑射注剉灌腸法或作草

枕子若巴布

一方

加密列末半 含電燈護阿芙蓉液半

外 橙皮舍利別鹽

右作越劑間歇熱病間日服盡之○薑煎而後朴草

外用○薑煎而後朴草○薑煎而後朴草

一方 園○薑煎而後朴草○薑煎而後朴草

加密列 亞麻仁各一

右以水適宜煮淨過取六分加亞麻油一分半海

鹽半分為灌腸劑○服者二下○煎藥一分過二

又方○薑煎而後朴草○薑煎而後朴草

加密列 接骨木花各一 羯布羅一

右作草枕子二個置眼上

加カ斯カ葛カ栗カ刺カ

為散丸若越劑○每服十分至三十分○煎劑

彼半分至一分以水十二分煮淨過取八分○

越幾劑為丸若溶劑五分至十分○丁幾劑三

十滴至四十滴

第一方 治間歇熱

加斯葛栗刺末半分至

右以熱湯五分浸之蓋閉飽熟八分時淨過取液

更以水適宜注其滓煮取三分合煎液和加斯葛

栗刺丁幾劑一錢或二錢五刺昆亞護漿一
子每一時服半茶碗開時藥八分粗

第二方

加斯葛栗刺越幾劑 格綸僕越幾劑各半一

薄苛水五桂丁幾劑一 橙皮舍利別一

右先以薄苛水溶上二味次加餘藥每一時服一
食七

第三方

加斯葛栗刺越幾劑一 的列亞底那半

大黃末五

右為九十九朝夕服十九

第四方

加斯葛栗刺丁幾劑半 橙皮丁幾劑一

忽弗滿鎮痛液三

右每服六十滴日三次

橙皮黃

アウラニチカリユニコルチキユスララヘ下

為散每服一乃至半錢一浸剝皮一錢至二錢

以水若酒浸之取液四三一剝皮二十滴至

四十滴一舍利別一為他飲剝六至加味

一方 忽弗滿越栗幾失雷一名苦味酒

橙皮黃各一 青橙各一 桂各一 剝為亞斯各一

燒酒四九 加斯葛栗刺越幾剝

亞爾鮮越幾剝 健質亞那越幾剝

睡菜越幾剝 洗獨魯油六詳

忽弗滿鎮痛液各一

右為越栗幾先爾每服六十滴至八十滴或一茶

匙

青橙

アウラニチカリユフリユク子ニエイトニチニ
未熟橙全葉乾固者

服量同橙皮黃

橙花

アウラニチカリユフリユク子ニエイトニチニ

為散每服五錢至十錢 ○浸劑花二錢至四錢
浸漬取液六錢至八錢 ○今世唯製露水舍利

別

橙葉

アウラニチカリユフリユク子ニエイトニチニ

為散或加橙皮舍利別為故剝每服半錢至一
錢日三四次 ○浸劑葉半錢至一錢浸漬取液

青高六錢至八錢

亞爾鮮アウラニチカリユフリユク子ニエイトニチニ

為散每服一錢至半錢 ○浸劑葉半錢以水若

麥酒若酒八錢浸之

7/33 49

袖珍内外方叢卷之八 終

一方 煎 湯 八 寸 是 也 煎 湯 一 寸 高 是 也

亞 爾 鮮 耶 一 日 煎 湯 一 寸 高 是 也 煎 湯 一 寸 高 是 也

五 右 注 熱 湯 八 寸 飽 熟 早 時 沖 過 加 列 印 設 酒 五 寸

青 蒿 アブロタニハル

為 散 若 欲 劑 每 服 二 十 氏 至 三 十 氏 ○ 浸 劑 葉

半 寸 至 一 寸 以 水 若 酒 浸 之 取 六 寸 至 八 寸

一 方

菁 蒿 無 爾 鮮 捲 坵 兒 薄 荷 各 一

葛 蒲 根 研 末 一 寸 至 八 寸 ○ 今 世 煎 湯 湯 水 合 條

右 細 剉 以 水 二 七 煮 注 干 浴 湯 湯 水 二 寸 至 四 寸

菖 草

ミルレホリシユムシクテス

二 錢 注 熱 湯 八 寸 為 泡 劑 ○ 新 鮮 絞 汁 每 服 一

茶 じ

