

袖珍內外方叢

植物

九

動物

十

附錄

袖珍内外方叢卷之九

藥品標目

第九目 苦味藥

其一 本性苦味藥

蒲公英

葛雨儒乙別涅實屈蟄

珊篤里

睡菜

西瑪雨拔

其二 趨謨性苦味藥

健質亞那

括夫亞

楊國真藍

刺蘇恩並根

百甜丹

黑西西靈陳

忽刺海羅痛液

清脂精

兒

兒

糖

苦

格綸僕

依蘭苔

其三 解熱性苦味藥

安屈斯默刺

幾那

第十目 收瀉性藥

百藥煎

吉訥

榭皮

沒食子

榭實

篤西面室刺

坎百設木

石榴皮

胡桃外皮

榆皮

烏白烏爾識

洞庭籃

七葉樹皮

楊皮

水楊梅根

刺答尼亞根

第十一目

植酸

出干山物之條

第十二目

亞的兒性藥

忽弗滿鎮痛液

亞的兒晒篤里屈私

甘消石精

甘海鹽精

邊設印亞的兒

第十三目

糖性藥

沙糖

乳糖

滿那

甘草

蘆根

第十四目

蘆護性藥

亞刺昆亞護護

過雨託亞根

亞麻仁

胡蘆巴仁

連刺侃篤

樞椰子

葵花及葵葉

第十五目

穀粉性藥

漿粉

第十六目

油性藥

阿列薇油

沙列布

甘扁桃

白嬰粟子

亞麻仁油

胡桃榨油

蓖麻油

葛加阿酪

石松子

第十七目

石鹼性藥

白百鹼

○其一本性苦味藥
○新鮮統計每服
○越歲劑為凡若透劑每服一錢至四

袖珍內外方叢卷之九

第九目 苦味藥

苦味藥有四種一曰本性苦味藥二曰護性
苦味藥三曰鮮熟性苦味藥四曰揮發苦味藥

出揮發
景之條

○其一 本性苦味藥

蒲公英

タラギク

煎劑二三以水三升煮減半○新鮮絞汁每服
二茶碗○越幾劑為丸若溶劑每服一錢至四

錢

一方園治水腫

蒲公英根 蘆根

失格列乙根

杜松木 各四

遠志

茴香

杜松實 各半

右合取二食

以水

一窄

名量煮瀘

過每

一時

半服

半茶碗

又方

蒲公英越幾利

各半

薄荷水

桂水

各三

右調勻每一時服一食 若二食

外用

一方

蒲公英根

蘆根

各三

纈草根

各二

葛雨儒葉

亞那瓦

里實

私葉

詳未

麻雨羅歇葉

亞兒尼

加葉

及花根

著草穗

加密列

歇再

校先

屈護

花各

右到水煮為灌腸劑

葛雨儒乙別涅實屈整

カルチンベ子チク天ハルバ

越幾利為丸若溶劑每服十氏至二十氏日二

三次
一方

葛甬儒越幾劑錢 確砂戈 加密列水

蘆根越幾劑

右調勻每一時服一食

珊篤里

一方

珊篤里越幾劑 孕鹼酒 薄苛水

蘆根越幾劑

右調勻每一時服一食

健質亞那

為散每服半月至半錢日二三次○浸劑根半

以水若酒浸之取八至十二○越幾劑

為丸若溶劑每服十至十五至二十○丁

幾劑六十滴至八十滴

第一方 治脚氣痛風 往昔剝雨 珊篤里 蘭土

健質亞那 圓根馬兜鈴

瓦滿埕兒穗及葉詳 加未必底阿斯詳

珊篤里 各等

右為散每朝取一錢以水若酒一盞送下用之三

月後取半錢照前服之半歲而後每隔日服半錢

第二方 篤

健質亞那越幾劑一 伊斯把尼亞酒三四

右溶和每一時服一食匕

第三方

健質亞那越幾劑三四 益智末四五

右二匕為一九午飯後一時及飽飯後一時服十

九至十五九

第四方

健質亞那越幾劑三四 艾丁幾劑

後字
○加取膏藥劑
工下各一錢
神下脫之膏

右調勻四十滴至六十滴酒點服日三次

第五方

加燒酒苦味酒六 樽製法○ 健質亞那半三四

燒酒十 度白蒲桃酒二 橙皮二 錢白桂一 我

野酒浸漬一 晝夜次 加蒲桃酒更浸漬四 日酒過

右服一盞日三次

睡菜

チリホリ六 ヒブリン三

浸刺葉一 浸漬取液六 新鮮絞汁每服

半三四 至一 越幾劑為丸若溶劑十 匕至三

十匕

栝失^二垂^一

為散每服一乃至半錢○浸劑材皮半寸以冷水熱湯若酒浸取十二寸○煎劑材皮二錢至半寸以水一斗煮減半此藥浸煎共易生微○水製越幾劑為丸若溶劑五斤至十斤

第一方 治痛^凡

朴屈福烏篤脂^半 栝失^二垂^一皮 鹼蓬鹽^各
苗香子^半 沙糖^一

右為散朝夕服一食^匕

第二方

栝失^二垂^一木屑^二 浸之^一 以冷水^八 時^二 滷^一 過 橙汁

姜舍利^別 各^一

右合每一時半服一食^匕

第三方

栝失^二垂^一木屑^半 桂^一 末^一 刺^七 設^二 尼^一 私酒^未 詳

右浸漬三時至四時滷過每服一錢

西瑪^二 雷^一 振^二

煎劑取半寸至一寸以水十二寸煮取八寸○外用為浸劑供灌膠劑

一方

西瑪西拔及 依蘭苔 各半

右以水適量煮瀘過取四勺若六勺加舍電癸護

阿芙蓉液 一乃至半錢 桂舍利別 半 每一時服一食

○其二 護謨性苦味涼

格綸僕 リ云ハ

一為散若丸每一時半若二時十三分至二十分

○浸刮根半勺以水若酒四勺至六勺浸之○

煎刮根半勺以水十二勺煮減半

第一方 治酸敗液症及惡阻

格綸僕 戈 煨製麻屈涅失亞

葛儂子糖油 各

右為散分十二服每一時半一服冷水送下

第二方 治下利及赤痢

格綸僕 戈 阿芙蓉 瓦 桂糖油 戈

右為散分六服日三四服冷水送下

第三方 治膽液虛乏

格綸僕 牛膽 各

右二丸為一丸服十九日五次

第四方

格綸僕羊

右以熱湯六勺或八勺浸之瀝過加麥酒石三
匙至六匙每一時服一食也

依蘭苔

リセニハイスラニデキニス

煎劑一勺以水十六勺煮淨過取十二勺每服
一茶碗○泡劑傑列乙每服一茶匕或為叔格
刺垣若乳劑散劑

第一方

依蘭苔三

右以水二十四勺煮八分時瀝過加甘草末二匙

乳糖一勺飽熟每服一茶碗一晝夜服盡

第二方

依蘭苔三 遠志

剝列乙瓦刺亞麻羅遠志之一種

甘草羊

右剝分四服泡出用

第三方

依蘭苔一 薤以水三 漿粉一 沙糖四

扁桃乳以廿扁桃六十箇合製者

右溶和以布瓦絞淨每服一茶匕

第四方

依蘭苔 煮八分以水一 扁桃油 半

橙花水 六

右為乳劑 每一時半服一食 臨用宜振蕩之

第五方 名依蘭苔 枳格刺 堊

依蘭苔 北

右內白搗碎為細末 加葛加阿實 各沙糖各四

沙列布末 三 如法調勻為錠 每服一食 用熱

湯一大椀 溶和服 勿煮之

第六方 圖

依蘭苔 三 亞刺昆 亞獲謨 沙糖 各一

右為散 每服一茶匕 以溫乳汁送下

○其三 鮮熱性 苦味藥

安偃斯 點刺

為散 每一時 十 至 二十 分 ○浸劑 皮 半 以

熱湯 六 至 八 分 浸之 ○煎劑 皮 半 以水 十

六分 煮瀘 過取 八 分 ○越幾劑 為丸 若溶劑 每

服 四 至 八 分

幾耶 フルテラスベルヒアニヌ

每服一月至一錢 方免熱時 服盡一分 ○為散

丸 若紙劑一分 半至二分 ○浸劑 皮一分 以冷

水若列印設酒若熱湯十二多浸之○煎刮皮
一多以水十二多至十六多煮減半○水製越
幾劑為丸若溶劑每服一錢至二錢○丁幾劑
每服六十滴至八十滴○複方丁幾劑每服六
十滴至八十滴日一二次○舍利別二錢至半
多日二次若四次為小兒服量

第一方

黃幾那末一 桂末一

右調勻每半時若一時取一茶匕若二茶匕以水
若酒送下或乾糊包服之

第二方

幾那或一末半錢 葛私加栗刺末半

橙皮舍利別直

右為一塊煉藥衣桂末熟末發前服之

第三方因 治癩癩

幾那末 纈草末 各二 獨活末一

舍利別直

右作紙刮每一時服二茶匕

第四方因

沙糖十二

此方在後...

右以水適宜煮為錠之稠加黃幾那極末三勺糖
藏橙皮到細一勺調和二錢為一塊每日服二三塊

第五方 肥

葛加阿實灸者六勺 幾那末三 沙糖八

板青撒謨亭露戈

右為散取二食匕加水若乳汁六食匕煮頓服

第六方

幾那末三 亞刺昆亞ゴム末 戈

右注水一匕搗和淨過加忽弗滿鎮痛液二錢橙

皮舍利別一勺調勻每一時服一二食匕

第七方 肥

黃幾那末三 煨製麻屈涅失亞 戈

右加熱湯少許研和四分時更注熱湯一匕飽熟

十二時淨過每一時服一二食匕○加麻屈涅失

亞者為奪幾那所含之沒食子酸也

第八方

幾那粗末三 列印設酒九 益智粗末二

右飽熟四日或六 瀘過每一時半服二食匕

第九方

黃幾那末三

右注水一匕搗和淨過加忽弗滿鎮痛液二錢橙皮舍利別一勺調勻每一時服一二食匕

右加綠荅精或海鹽精一錢水十二寸煮減半瀝
邊加幾那丁幾劑二錢橙皮舍利別一弓每半時
服一食匕

第十方 小兒羸弱削瘦者宜此方

赤幾那越幾劑一 桂水三 橙皮舍利別三

右調勻每服一茶匕日三四次

○第十目 叔潘性菜

百菜煎

為散若丸或燒酒溶和每服六分至十二分

第一方

百菜煎^{十五} 明荅^三 玫瑰昆設爾弗^半

白鑿粟舍利別^造

右為一塊頓服

第二方

百菜煎 赤石脂 拔爾撒謨^{各一} 露^{各一}

右三匕為一九每一時服八丸

第三方

百菜煎^二 吐根末^一 沙糖^三

亞刺昆亞^三 ゴム漿^造

右調勻作錠六十箇每日服一二箇

第四方 治虛症下利

米煮汁四十 百葉煎一匙至

右每服一食匕

第五方 治後淋

百葉煎丁幾劑

右每一時半服三十滴至五十滴

外用

一方

百葉煎 沒藥各一 板甬 撒謨亭露

右加山萸菜精再餉燒酒各三勺 溶和

詩訥

為散九若乳劑或燒酒溶和每服十勺二十勺

至三十勺 丁幾劑三十滴至五十滴

一方

吉訥半一 阿芙蓉十二 明蓉一 乳糖半

右為散分二十服每一時半一服冷水送下

又方 治吐水及水疝疝痛目

吉訥半一 阿芙蓉三 乳糖或桂油

右為散製劑十二箇每服一劑日三次冷水送下

外用

一方 治衄血

吉訥 亞刺昆 亞蘊 護 各一錢 日三次 食水送下

右為散吹入鼻中或搽蟻針創痕

檫皮シキマニシク

煎刮皮一弓以水二比煮減半大抵供外用

第一方

檫皮末弓 沒藥末戈

右調勻敷瘡地弱者搽之十餘日止

第二方

檫皮弓半

右水煮過取一弓加百葉煎下幾劑二錢麗

花舍利別半弓為漱劑

第三方

檫皮弓三

右蓋閉水煮一時加酒二十四弓靜定取上澄為

慰劑

第四方

檫皮弓二

右以水六弓煮取三弓加鉛醋三錢或四瀘過取

底塗加阿列襪油厚攤布片貼患處

第五方

槲皮剉

右盛布囊水煎注干浴湯

沒食子

供外用為煎剉或取搗末和脂作軟膏

槲實

浸剉實一錢至四錢以水六勺至八勺浸之

鷲馬面室刺

為散每服十匕二十匕至三十匕以上日三次

○煎剉根一勺以水一匕半煮漚過取八勺

坎百設木

煎剉材二錢至半勺以水十六勺煮減半

石榴皮

為散若浸剉煎剉每服半勺至二勺

一方

石榴皮三 亞刺昆亞護錢

右以水二匕煮取一匕漚過加桂水橙皮舍利別
姜舍利別各一勺每半時餘服半碗

胡桃外皮

煎剉皮一勺以水一匕煮八分時亦供外用

榆皮

ユルシヨコルタクスインテリオル

煎刮皮半弓至四弓以水二匕至三匕煮減半

亦供外用

烏白

ウハハルシヤハウルシホリア

為散每服十匕十五匕至二十匕日二三次○

浸刮葉一錢水二碗若三碗浸之或葉二莖以

水一匕浸之○煎刮葉半弓以水十弓煮減半

取八弓

洞庭籃

ヘロニカヘルバ

為泡刮或酒浸

七葉樹皮

ヒツホカヲタタニコルテクス

每半時服十匕○煎刮皮一弓以水十八弓煮

減半

楊皮

サリシス、コルテクス

為散然尋常多水煎或以水與燒酒煮之每服

一弓至一錢

水楊梅根

カレイオピルラターラヂキス

為散若紙刮每服半錢至一錢日二三次○浸

刮根半弓至一弓以水四弓至六弓浸之○煎

刮根一弓半以水十六弓煮減半

刺答尼亞根ラタナラチキス

每服十丸至三十丸日二三或六次
至十日日二次

第一方

刺答尼亞根末半 姜末一 橙皮舍利別直

右合為紙劑每半時服一茶匕

第二方 治白帶下

刺答尼亞根半 水二

右煮取半升酒過加醋二錢沙糖半分每半時服
二食匕或一頓服之

第三方 治飲食不化凡氣等症

刺答尼亞越幾劑一錢 蘇蓬鹽半

葛縷子油清 舍利別直

右合為三十九服二丸日三次

外用

一方

刺答尼亞根六 或三 越三 設心直 亞十 詳三

純精酒石 伊里斯弗魯連底各半

又方

刺答尼亞越幾劑四 水半 醋二

右合為合漱劑

茅十一目

植酸出干山物
酸類之條

茅十二目

亞的兒性菜

亞的兒

アデル、ニ元ニユリキユス

每服五滴十滴至十五滴量○二十滴三十滴

至六十滴量○一月至半錢加密屈劑四至

六至

忽弗滿鎮痛液

アデル、ニ元ニユリキユス、アルニキユス

每服十滴二十滴至三十滴○或一錢二錢至

三錢加密屈劑若浸劑煎劑六至八至

亞的兒アデル 暹篤里トリス 屈私キス

每服五滴十滴至十五滴或一月至半錢加密

屈劑四至六至

甘消石精

アデル、ニトリキユス、アルニキユス

每服八滴十滴至二十滴或一錢至二錢加密

屈劑若浸劑若煎劑六至八至

甘海鹽精

アデル、ニトリキユス、アルニキユス

服量同前

過設印亞的兒

アデル、アセチキユス

每服十滴十五滴至二十滴或半錢至一錢加

蜜屈割若浸割六弓至八弓

○第十三目 糖性茶

沙糖 サッカリ云。アムロ云。

草量半弓為散割加茶十斤至二十斤

割以糖一弓油十二滴許製之

○舍利別這諸茶之味取一弓加他茶六弓至八弓

或為紙割丸割罌割等之成形茶

一方

沙糖 三 雞子黃 一 加密列水 三

右微温供灌膠割

乳糖 サカリ云。ラクチン云。

一方 和胸散

乳糖 三 亞刺昆 五 ゴム 五 沙糖 三

右為散每服一茶匕

滿那

每服半弓至一弓為小兒下割熱湯若茶若骨

喜溶和

一方 名滿那舍利別

旃那葉 四 茴香子 三 沙糖 七 滿那 廿

右加法為舍利別每服一二茶匕

児用方

甘草 リキニイリキア

取一錢至二錢加他散劑一弓半每服五氏至

十氏〇二錢至半弓加他浸劑煎劑料三弓至

四弓〇甘草膏一弓至一錢加密屈劑

一方 和朮越栗矢甫

甘草膏 弓 茴香木 弓 硃砂加茴香精 弓

含電發謨阿芙蓉液 弓

右每一時服二十滴至四十滴 此劑一弓含阿芙蓉一氏

蘆根 ガシニス、ニキス

為煎劑每服一弓〇越幾劑二錢至半弓以水

四弓溶和每一時服一食

一方

蘆根 過禹託亞 各一 沙雨蘆根 弓

罗羊泉 射 甘草 射

右判為泡劑

第十四目 護謨性宗

亞刺昆亞ガム ガム、アラビキニ

一弓至二錢 按一日 為散若丸每服半弓至一

弓〇乳劑取四弓至二錢以水四弓至六弓製

之○護謨漿取一弓以水四弓溶解
連刺侃篤ダダガカニタリキニキ

為散丸每服一弓至一錢○溶劑取二錢以熱湯五弓溶解○凡丸劑用之製者乾固甚速故

不可多製

過雷託亞根アルターラキス

煎劑一錢至半弓水煮淨過取四弓至六弓○含利別半弓至一弓加他藥

樞梲子セイドニカリ云ニキ

子半錢加水一弓製樞梲漿此漿半弓加水四

弓可稀釋之

亞麻仁リニセニン

外用為毬布

葵花及葵葉マルバ、ワロレスキ、ヘルバ

花煎劑半弓水煮取三弓至八弓○葉煎汁供外用作漱劑蒸劑射注劑等

一方

葵葉 草零陵香葉 過雷託亞葉 各二

樞骨木花 加盧列花 各三 亞麻仁 各六

右為緩和毬布料

又方

葵葉 歌ハル雷バシ拔シ先キ屈ム護ム花ハ 加カ密シ列レ花ハ 各カ四ハ

無麻仁ムマニ

右為緩和灌腸劑料

胡蘆巴仁

アニカライシヤミナ

供外用仁一多以水十六多煮為蒸劑若灌腸劑

第十五目

穀粉性菜

漿粉 アノイリ云

每服十匁至二十匁為散加他藥

例加吐酒外

五香用為灌腸劑一合ハ至二合

沙列布 サレブ

一錢以熱湯八多煮之

○第十六目 油性菜

阿列機油

オリキ云、オレウム

白蠟中毒恐水疫蛔蟲病等每服一食匕他症二錢

至半多

甘扁桃

アノイダダニ、エリス

為散若乳劑加他藥 扁桃油每服一錢至一

一方

扁桃油 新搾者

亞刺昆 二 未 二

甘扁桃花水 六 白罌粟舍利別 三

右為乳劑 每半時服一食 匕

白罌粟子 ...

取半 ... 至一 ... 為乳劑

一方 ...

白罌粟子 ... 甘扁桃 ... 兩水

桃花水 各 白罌粟舍利別 ...

右為乳劑 每服一食 匕 至二食 匕

亞麻仁油 ...

每服一食 匕 至二食 匕

一方 ...

亞麻仁油 ... 亞刺巴末 ...

右領服代 蓖麻油 用之

胡桃榨油 ...

治條蟲 取五 ... 空心 領服後一時餘 喫亞刺巴

地酒 四 ... 一 ... 二 ... 次

蓖麻油 ...

每服半食 匕 至一食 匕

第一方 治疝痛因疝者

蓖麻油三 雞子黃一 右合和加薄荷水一 阿芙蓉液十 滴白罌粟舍
利別一 錢頓服

第二方

蓖麻油三 亞刺毘亞一 哥一 哥
過兒託亞煎汁半

右合為乳劑每半時服一茶匙

第三方 治條蟲

蓖麻油三

右取一食匙內美汁和服日三次

葛加阿酪 ビニテリ云テ、カカラ

每日一錢至二錢乳汁若肉美汁和服

外用 作眼膏等

一方

赤降汞六 葛加阿酪二 密陀醋

舍電發護阿芙蓉液十

右叮嚀研合作軟膏取林設葉 大朝夕塗眼

又方

葛加阿酪三 甘扁桃油一

石微温溶和加釐兒瓦ガ没大油十未詳十如法製蠟ワ割云

塗唇

石松子セシレイコノ子

為乳劑若發刺小兒每服十瓦至半瓦○外用

為搽菜若軟膏

一方治小兒尿閉

石松子子而冰子過甬託亞舍利別子

右調勻每一時服半食子

外用

一方

皓峇子石松子子

右細末為搽菜

又方

亞鉛華 石松子各一

薔薇軟膏

半子〇方見十家指
脂條〇或越没里膏

右作軟膏

○第十七目 石鹼性藥

白石鹼サホアルビユス

為丸每服五瓦至二十瓦○中毒取半子

以水一比溶和服○外用為塗菜如石鹼硬膏或燒

酒溶解如石鹼精或供灌腸劑一劑至或加浴湯三

至六 至六 每服五至十至二十至三十 〇 中毒五至

第一方

白石鹼一 蒲公英越幾劑

蘘護安沒尼亞幾各等

右合為丸

第二方

白石鹼十 麻屈涅夫亞

遇泥子末各一

右服豆大日四次

第三方

白石鹼一 薄荷水四

右溶和加覆盆子舍利別一每一時服二食一

外用

一方 名三石鹼精

白石鹼三

右以再餾燒酒六三玫瑰水二三溶解

又方

加密列浸劑三 白石鹼三 亞广仁油半

右溶和為灌腸劑

袖珍内外方叢卷之九終

味珍內外方叢卷之十

古家味為前朝傳

又古家味為前朝傳 白百舖味 一盤一

又古家味為前朝傳

古家味為前朝傳

古家味為前朝傳

古家味為前朝傳

長四

古家味為前朝傳

古家味為前朝傳

袖珍內外方叢卷之十

菜品標目未盡

第三綱

第一目 癸苑菜

荒菁

第二目 揮發菜

實百兒油

實百兒油

第三目 苦味菜

牛膽

葛私多儂謨

第四目 糖性菜

蜂蜜

第五目 膠性菜

鹿角

魚膠

第六目 蛋清性菜

乳汁

第七目 脂性菜

酪

家猪脂

斯百兒末攝的

黃蠟

袖珍内外方叢卷之十

第三綱

動物

属

動物之屬分之為七目一曰癩瘕菜二曰揮癩

菜三曰苦味菜四曰糖性菜五曰膠性菜六曰

蛋清性菜

○第一目 癩瘕菜

芫菁 カニクイデス

為散丸乳劑丁幾劑就中丸劑尤良每服四分

以半氏至一氏○丁幾劑每服五滴十滴二十

清至四十清四十清中合蓄蓄芫芫菁菁一一丸丸每每服服五五高高十十劑劑二十

第一方第一方連連刺刺侃侃蕉蕉末末沙沙糖糖各各一一匙匙

芫菁末芫菁末連刺侃蕉末連刺侃蕉末沙糖沙糖

右為散分十二服每一時一服大麥水送下

第二方

芫菁末芫菁末龍龍胆胆三三鮮鮮亞亞刺刺昆昆亞亞公公回回

右為四丸朝夕服一丸右為四丸朝夕服一丸

第三方第三方治治狂狂犬犬咬咬傷傷兼兼貼貼癩癩瘡瘡膏膏於於傷傷處處癩癩瘡瘡

之後貼解凝軟膏之後貼解凝軟膏網縛之網縛之

芫菁芫菁沙糖沙糖桂桂

玫瑰舍利別玫瑰舍利別

右為三十九一歲兒每一時服一丸四歲兒二丸

大人六丸

第四方第四方治治水水腫腫四四十十日日二二三三次次服服一一丸丸

阿芙蓉阿芙蓉連連刺刺侃侃蕉蕉漿漿回回

右為八九丸朝夕服一丸

第五方第五方

芫菁芫菁一一錢錢至至扁扁桃桃一一去去皮皮沙沙糖糖半半

右石臼內搗碎徐徐加加熱熱湯湯為為乳乳劑劑漚漚過過取取十十分分

不用不用枝枝探探每每一一時時服服一一食食匕匕

絞

第六方 因

芫菁下幾劑 含電祭護阿芙蓉液

垂的兒

右合每服十滴日二次乳汁一茶碗點服

第七方 治疫瘕

芫菁下幾劑 複方幾那下幾劑

右每服二十滴至四十滴日二三次至小便微淋 瀝而止

外用

第一方

芫菁末 家猪脂

右為軟膏取豌豆大塗擦日數次小兒或經久患
者用此代疥癩軟膏

第二方

疥癩軟膏

右攤革若布瓦貼之

第三方

芫菁下幾劑 硃砂揮疥膏

右振蕩混和為塗藥

第二目

揮疥藥

麝香

モスキユス、キニキユイ子ニ

為散丸若密屈刺每服一瓜二瓜至十瓜已上
○外用一月至一歲為灌腸刺嚙下因難者宜

第一方

麝香六〇至二〇

纈草油糖各一

右為散分六服每一時一服

第二方

麝香時 亞刺昆亞ゴム 漿各一

右為二十九丸每半時服三丸至六丸

第三方

麝香各一 亞刺昆亞ゴム

沙糖各一

右叮嚀槁和徐徐加橙花水六寸每半時服一食

第四方

麝香各一 亞刺昆亞各一 護漿各一

右覆盆子舍利各半

右調勻每半時若一時服一茶匕為小兒服量

葛私多 僕護

和沙糖為散或丸煉刺每一時若二時若三時

服二八五八至十八〇丁幾劑每服十五清二
十清至六十清〇亞的兒製丁幾劑增製法〇
謨一了以忽弗滿鎮每服十清至三十清〇外
痛液六了浸漬八日
用草味若加礪砂揮毫膏為灌腸劑

第一方

葛私多僂謨八四 纈草末 沙糖各一

右為散製劑六箇每服一劑

第二方

葛私多僂謨八六 大黃末 麻伍埋失各二

右為散頓服

第三方 治虛症瘥寧攝劑

葛私多僂謨八八 蘇蓬鹽各半 薄苛油糖各一

右為散分六服每一時一服

第四方

葛私多僂謨九一 礪砂揮毫華各五

右作煉藥頓服

第五方

葛私多僂謨九二 阿魏各一 加密列越幾劑

右調勻為百二十九硝子卷固封與之每一時半

服十九若十二九

第六方

葛私多僕護丁幾劑

右調白每一時服二十滴

第七方

葛私多僕護丁幾劑

舍電發護阿芙蓉液

薄苛水

右合每四小時一食

鹿^{鹿呼}瑞精^合

忽布滿鎮痛液

忽布滿鎮痛液

忽布滿鎮痛液

忽布滿鎮痛液

忽布滿鎮痛液

忽布滿鎮痛液

忽布滿鎮痛液

忽布滿鎮痛液

實百兒油

每服五滴十滴至四十滴

第一方 治神經症間歇熱

實百兒油 忽布滿鎮痛液

右調白發熱前四小時服三十滴至五六十滴

第二方 治癩癩

實百兒油

右每服三十滴至四十滴日二次

第三方 同前

實百兒油

丁香油

右調勻服二湯至十湯日三次

○第三目 苦味菜

牛膽 心タリ

新鮮者日服一錢至半多然尋常少供內服多

供外用○熬製者為丸若溶劑每服十五分至

二十分日一二次

第一方 國

牛膽 新鮮者一

桂水 半三

右分數服一日服盡

第二方 圃治遷延肝病

牛膽 熬製者

阿魏 各二

白屈菜越幾劑

大黃末 一

右調勻加橙皮黃末適宜二分為一九服十九日

一二次

第三方

牛膽 熬製者

大黃末 適

龍膽 工半又

健質 亞那工半又

右調勻二分為一九服七丸至十九日三次

外用

第一方 國 消腺腫

牛膽 海鹽 胡桃油 各適

右合為塗某之稠擦患處

第二方 園

邊甬訖亞膏 一 牛胆 三 白石 各二

刺賢埕兒油 清大十

右調勻每一時早取一茶匕 擦患處

第三方 團

濱瞿麥葉浸刮 三 牛膽 一

護謨安沒尼亞 以十

右合作射注劑洗耳孔

第四方 團

硃砂揮癸華 以十 牛膽 一 蜂蜜 去沫

石合作眼膏

○第四目 糖性菜

蜂蜜 以十

尋常唯供諸劑加菜

第五目 膠性菜

鹿角 以十

一方

複方麻角煎 二

右每服一茶匕
魚膠魚子才云

一方

魚膠魚子才云

右細剉汪水二弓上文火不住手攪擾者至溶解
加沙糖三弓熱湯六弓更煮令沸騰放冷加白葡
桃酒二十弓伊過去味冷定每服一茶匕至一食

○第六目 蛋漬性菜

乳汁ラク

一方 名酒石乳清

牛乳牛乳

右內磁器上火加純精酒石三錢煮至清濁分離
淨過放冷加蛋清二箇更煮少時伊過○每服一
茶碗

又方 名芥子乳清

牛乳牛乳 白芥子白芥子

右煮至清濁分離伊取乳清每服一茶碗

第七目 脂性藥

酪シライリム

唯供軟膏料就中製眼膏者最居多

一方 困名火傷軟膏

酪新鮮者 黃臘各

右煇鮮加蒸餾水少許作軟膏

又方 困

酪新鮮者

右以加密列浸刺八角溶解急振蕩之施灌腸法

家猪脂

唯供軟膏料

一方 困 名蕃薇軟膏

家猪脂三 白蠟三 蕃薇水三 橙花水三

刺賢垚兒油 設獨魯油各半

右作軟膏

斯百兒末搗的

為散若乳劑每服二十氏至三十氏然今世殆

無供內服

黃蠟

為乳劑若紙劑每服一乃至半錢○外用作軟

膏硬膏

一方 困 治赤痢

亞刺昆西丁△△

右入石臼以熱湯這宜溶解加黃蠟二勺搗合次
加蘆春花舍利別一勺收斂亞的兒這宜冷味養
黃好每服一食匕一晝夜服盡

又方同前

黃蠟半斤扁桃油半斤

右上文火煇鮮攪和玫瑰昆設兒弗二勺每一時

早晚二茶匕

袖珍內外方叢卷之十終

袖珍內外方叢附錄

某呂標目

其一 山物

石墨

蘇魯林加兒基

蘇魯列紐謨曹地利規需謨

蘇魯列紐謨亞烏里越焦曹地

硫酸加獨密

蘇魯列紐謨滿俺

其二 植物

艾根

失阿骨加根

實阿斯末葉

瓦列阿布失私葉

麥奴

越默室那

綿篤越幾利

伊屋陳

伊屋陳剝篤亞斯

沒甬必那

巴豆油

硫酸規尼那

○其三 動物類

也故里私亞設利油

Faint bleed-through text from the reverse side of the page.

神珍内外方叢附錄

近世新發明諸藥品

○其一 山物

石墨 セキトウ ガラヒテス

為滋煉丸若密屈剝每服六氏八氏至十氏

第一方

石墨 蜂密

右可寧混和作紙劑朝夕服一茶匕

○第二方

石墨 杜松實傑列乙

右調勻為煉菜製劑八箇朝夕服一劑

○ 第三方

石墨 三斤 橙皮 舍利別造

右調勻二斤為一九每服十五丸日二次

第四方

并乘心 石墨 過甬託亞舍利別造

右調勻二斤為一九衣朱朝餐後及勉服五九次

喫大麥水

第五方

外乘 一以至二以 石墨

過甬託亞舍利別造

右調勻日服半茶匕至一茶匕

蘇魯林加甬基

唯供外用

第一方 治壞疽

蘇魯林加甬基 蒸餾水

右臨用振蕩浸綿撒絲濕患處

第二方 治口內舌上潰瘍兼吐涎者

蘇魯林加甬基 蒸餾水

右合作漱劑

第三方 治頭瘡

蘇魯林加爾基 蒸餾水 亞仁油

右朝夕塗頭

蘇魯列 緹 謨 亞 烏 里 越 篤 曹 地

一方 治壞疽凍瘡潰破者

蘇魯列 緹 謨 曹 地 利 規 需 謨 蒸餾水

右外用

蘇魯列 緹 謨 亞 烏 里 越 篤 曹 地

每日服十二分 八十一分 至十分 漸加增

其量

一方

蘇魯列 緹 謨 亞 烏 里 越 篤 曹 地

伊里斯弗魯連末

右調勻 始分十二服 次分十一服 分十服 終分九

服 每日取一服 塗舌上及齒 齦 當再考

又方

蘇魯列 緹 謨 亞 烏 里 越 篤 曹 地 橙花水

右溶和 每一時服十滴 漸加至二十滴

外用

一方

蘇魯列細謨亞烏里越篤曹地ハ 蕃薇亭子

右調勻用之日一二次

硫酸

加獨密

シユルカドール

世亦發明之

按私私兒斂繆齒弗曰加獨密近世亦發明之

各之目三酸之令結密是唯供外用為眼藥方同

製法私末兒斂繆齒弗曰取酸化為丸若溶劑

蘇魯列細謨滿俺

每服三氏至五氏

ソロレキムコケ子三一

丸若溶劑

製法私末兒斂繆齒弗曰取酸化為丸若溶劑

滿俺溶干監酸蒸散水氣令結密

一方圖

蘇魯列細謨滿俺ハ 亞刺昆亞ブム

甘草末各一

右調勻二氏為一丸每二時服三丸

○其二 植物

艾根 オルヲミシア、ヒユルガリス

每服一錢

一方圖 治癩癩 壹頭ハ 每服二會日三次

艾根末艾

右臨卧以溫麥酒送下一錢

失阿骨加根カイニカールキス 每服一會日三次

浸劑根二錢浸漬取八分每服一食し

一方 失阿骨加根

右以水一升半煮取八分每服二食し日三次

實阿斯末葉 今オスミ、ケレチ、ホリア

為散或取二錢為浸劑每服半乃至一月

瓦列阿布失私葉 ガレオブレシス、オクレウカ

為泡劑每服二錢至半

麦奴 セカレ、コルニチ云

為散每平時服十乃至三十人雖多不可過九

十人〇浸劑一錢至二錢半浸漬瀘過取四分

第一方

麦奴 桂油糖

右為散製劑三箇始取一劑分二服半時間服盡未効者再服一劑或一劑半後半時尙不見効者更又服一劑

第二方

麦奴 或

右浸熱湯四分時戶過加桂油糖一錢

第三方

麦奴钱

右以水半升煮八分时为灌肠剂

越^工默^ナ室^干那^吐元^根素

为溶剂若錠吐剂每服四分〇和胎剂每半时

四分入至半入

第一方^固

越默室那^四橙菜浸剂^三橙花舍利^三

右调勻每四分時服一食匕以至得吐

第二方^固

越默室那^三沙糖^三

右如法作錠十八入为一箇小兒与一箇大人与

三箇以取吐

第三方^固名越默室那和胎錠

越默室那^四沙糖^三

右如法作錠九入为一箇每半時服一箇

綿馬越幾剂^{エキスタラチ云、シリクス、マリヌ、オレオリ、レシタニ云}

每服八入至三十入

一方^固驅條蟲有偉効

綿馬^工キス^三綿馬根末

亞刺昆^五ア^各フ^各ム^各這

右調勻為三十丸臨卧服十五丸後四分時再服十五丸

伊屋陳丁幾利 是一種元素海中所生之諸草燒

每服十筒糖水一麥而盡和服日三次後斷加

服二十筒日五次 此劑二十筒合一蓋

伊屋陳剥篤亞斯 下日イオタ之ホットアサ

伊屋陳剥篤亞斯 斯抱合成者 取二十四丸以蒸餾水一弓溶

解服十筒或二十筒雖多不可過二十五筒

一方

伊屋陳剥篤亞斯 四二八 蒸餾水一

右溶和服十筒日三次漸加至二十五筒

又方

伊屋陳剥篤亞斯 三六八 伊屋陳

蒸餾水 七

右硝子菴搗碎溶和每服十筒日三次漸加增其

量

外用

一方 治療癰腫

伊屋陳剥篤亞斯 料 家猪脂 一弓

右朝夕取半錢至一錢擦患部

没那必那阿芙蓉素製法詳

没那必那醋每服四分至一日服四

分

一方 各没那必那醋舍利别

没那必那醋四 舍利别

右调匀每一时半服一茶匕代寒亚格日温附之

又方 各没那必那醋液

没那必那醋十六 蒸餾水一 醇醋四

亚雷箇兒

右调匀每服六滴至二十四滴代阿芙蓉液用也

巴豆油巴豆油

每服一清雖多不可過二清加舍利别若粘汁

服之或加白蒸餅為丸○外用四清擦肚腹

硫酸規尼那註

為散丸若溶劑每服一分至二分雖多不可過

四分日一二次一晝夜服量六分至二十四分

第一方

硫酸規尼那分 沙糖

右调匀為散分六服每一時一服冷水送下

第二方

硫酸規尼那四二八 幾那越幾刮或葛私加利

右調勻四瓦為一丸 衣銀箔每一時服一丸

第三方

硫酸規尼那十二 橙花水 桂水各一四八

桂舍利別三

右調勻每一時服一食匕

其三 動物

也故里リ私テ亞セ設利油オレウム、ユリ、スアセリ、蘭、仔、瓦、タ、ラ、シ、ト

朝夕或三次服一食匕後以冷水蒲桃酒燒酒桂

水蒲苛水等漱口○小兒每服一茶匕日三次

或朝夕服半食匕○或加沙糖煉作小塊裏乾

糊燕下

袖珍内外方叢附錄

終

之在於碣港也與南洋讀書於大光寺之閣晨夕敲
之其持論確實不可奪予鉉槩之功多係南洋之資
丙申饑荒之變酒人雲散零落如雨一別之後各在
天一涯余歸鄉之後病魔固指蠢然將終季今及感
昔日驀受南洋之賜寧不忸怩於懷乎雖然得失素
有所定從今而後憤厲努力能繼前志則拔病鋤痼
之功冀憑此書而可望也然則於吾道之隆興未有
無小補是所以可拜受南洋之賜也天保十五歲在
關蓬軌徐秋七月識於小島鋤雲館鶴汗澤井桂

