

著者及書名
医学正傳
(古活字版)
虞摶 天民 編集
年
番
禁帯出



瘟疫附大頭天行病
斑疹
中暑
燥證
欝證
咳欬
瘧證
泄瀉
內傷
濕證
火熱
痰飲
哮喘
霍亂

佐山文庫
春翠文庫
佐山重致

新編醫學正傳卷之二目錄

○瘟疫門 三
論脉法 丹溪方法一條
陶氏治瘟疫法 三黃石膏湯 敗毒散
九味羌活湯 黑奴丸 神术散
附大頭天行病
丹溪方法一條 二黃湯
普濟消毒飲子 甘桔湯 蒌薤散
祖傳人蔘散 丹溪活套 已試醫驗一條
○斑疹門 四
論脉法 丹溪方法凡七條
消風散 葛根橘皮湯 陽毒升麻湯
玄參升麻湯 陽毒梔子湯 犀角消毒飲

解毒防風湯　升麻鼈甲湯　加味羌活散
調中湯　化斑湯　黑膏
大青四物湯　祖傳加味敗毒散

○內傷門五　論　脉法　丹溪方法一條

補中益氣湯　硃砂安神丸　調中益氣湯
當歸補血湯　升陽補氣湯
升陽順氣湯　升陽益胃湯　雙和散
木香化滯湯　枳實導滯丸
門冬清肺飲　寬中進食丸　白朮和胃丸
枳朮丸　草豆蔻丸
白朮丸　木香見睍丸　三稜消積丸
備急大黃丸　丹溪保和丸　加味二陳湯

紫雪　妙香丸　瀉心湯
麥門冬湯　梔子仁湯　當歸龍會丸
三黃丸　丹溪活套　祖傳人中白散

○鬱證門十　論　脉法　丹溪方法凡八條
越鞠丸　生韭飲　六鬱湯
升發二陳湯　升陽散火湯　火鬱湯
已試醫驗一條

○痰飲門十　論　脉法　丹溪方法凡十六條
燥濕痰星夏丸　中和丸　小胃丹
墜痰丸　青礞石丸　二陳湯

導痰湯　千緡湯　利膈化痰丸
滾痰丸　神朮丸　黃芩利膈丸
蠲飲枳實丸　十棗湯　三花神祐丸
控涎丹　半夏丸　取竹瀝法
取荊瀝法　丹溪活套　已試醫驗一條
○咳嗽門十二　論脉法　丹溪方法凡六條
嗽煙筒　喘嗽遇冬發方
寒嗽加味二陳湯　清金化痰丸
乾咳嗽治法　痰因火逆治法
補陰四物湯　四物合二陳湯
陰虛嗽紅治法　又丹溪方法凡二十三條
祖傳遡源散　參苓白朮散已試醫驗凡三條
○中暑門六　論脉法　丹溪方法凡二條
清暑益氣湯　白虎湯　益元散
香薷飲　黃連香薷飲　十味香薷飲
桂苓甘露飲　五苓散　大順散
生脉散　祖傳經驗方
○濕證門七　論脉法　丹溪方法凡四條
加味二陳湯　防已黃芪湯　甘草附子湯
加味五苓散　除風濕羌活湯　羌活勝濕湯
茯苓滲濕湯　茵蔯五苓散　經驗白朮酒
丹溪活套

○燥証門八　論　脉法　丹溪方法凡一條

瓊脂膏　瓊玉膏　天門冬膏

地仙煎　和血益氣湯　當歸潤燥湯

生津甘露湯　生津甘露飲　辛潤緩肌湯

潤燥湯　潤腸丸　活血潤燥丸

潤腸湯　通幽湯　生血潤膚飲

○火熱門九　論　脉法　丹谿方法凡二十一條

左金丸　大補丸　抑青丸

石膏丸　四物馬脛湯　又丹溪方法凡二條

火鬱湯　升陽散火湯　瀉陰火升陽湯

滋腎丸　凉膈散　三補丸

嗽失音潤肺散

嗽而有聲無痰方　嗽而無聲有痰方

寒熱交作痰嗽方　加味瀉白散

小陷胷湯　五味子湯

嗽分肺虛肺實方法　嗽用五味子方法

訶子收斂之功　瓊玉膏　九仙散

三拗湯　溫肺湯　杏穌飲

冊溪活套　祖傳經驗方　祖傳三聖丹

○哮喘門十三　論　脉法　丹溪方法凡十四條

葶藶大棗瀉肺湯　濟生葶藶散

瀉白散　祖傳治哮方凡四條　已試醫驗一條

○瘧證門十四 論 脉法 冊溪方法凡十六條
截瘧常山飲 截瘧七寶飲 東垣方法凡七條
白虎加桂枝湯 温脾散 冊溪活套
祖傳截瘧神方凡三條 已試醫驗一條
○霍亂門十五 論 脉法 冊溪方法凡七條
桂苓甘露飲 五苓散 半夏湯
理中丸 六和湯 漿水散
姜附湯 理中湯 灸法凡二條
洗法 冊溪活套
○泄瀉門十六 論 脉法 冊溪方法凡十二條
清六丸 温六丸 姜麴丸
止瀉方 脾泄丸 茯苓湯
黃芪補胃湯 升麻除濕湯 痛泄方
白朮芍藥湯 茯苓湯 蒼朮防風湯
防風芍藥湯 蒼朮芍藥湯 良方神朮散
胃風湯 冊溪活套
祖傳經驗方凡二條 已試醫驗凡二條

醫學正傳目錄卷之二終

新編醫學正傳卷之二

花谿恒德老人虞搏天民編集

姪孫虞守愚惟明校正

瘟疫 三 附大頭天行病 蝦蟇瘟

論

內經曰蒼天之氣清淨則志意治順之則陽氣固雖有賊邪弗能害也又曰冬不藏精者春必病瘟是以多感於房勞辛苦之人安樂者未之有也俗名瘟病醫書曰疫癘曰黃病嶺南閩廣等處曰瘴氣蓋指山嵐霧露煙瘴濕熱惡氣而名之也一皆觸冒四時不正之氣而爲病焉傷寒論曰春應溫

而反清夏應熱而反寒秋應凉而反熱冬應寒而反溫龐安常曰疫氣之發大則流行天下次則一方次則一鄉次則偏著一家悉由氣運鬱發有勝有復遷正退位之所致也視斯疾者其可不推運氣而治之乎陶氏曰夫疫氣之中人輕重不一仲景無治法後人用敗毒散治甚得理然亦有愈不愈者蓋疫氣有淺深資稟有壯怯怯而受癘氣之深者雖智者尚不能治況庸劣之士乎若資稟壯實所感又淺則庶幾可愈切不可作傷寒正治而大汗大下也但當從乎中治而用少陽陽明二經藥（少陽小柴胡湯陽明升麻葛根湯也）看所中陰陽經絡脉証而以

二方加減和治之殊爲切當學者宜詳察之毋忽

脉法

脉陽濡弱陰弦緊更遇溫氣變爲瘟疫

溫病二三日體熱腹滿頭痛食飲如故脉直而疾

八日死

溫病四五日頭痛腹滿而吐脉來細而強十二日死

溫病八九日頭身不疼目不赤色不變而反利脉來牒牒按之不鼓手時大心下堅十七日死

溫病汗不出出不至足者死厥逆汗自出脉堅強急者生虛軟者死

陶華字尚文号節菴餘杭名医

溫病下利腹中痛甚者死

方法

丹溪曰衆人病一般者此天行時疫也治有三法宜補宜散宜降用大黃黃芩黃連人參桔梗蒼朮防風滑石香附人中黃爲末神麯糊爲丸每服五七十丸氣虛以四君子湯下血虛以四物湯下痰多以二陳湯下熱甚者加童便（謂人中黃者人糞也今人多有以糞缸中清汁頓飲一二碗病隨愈然但恐畏其臭穢不能下咽耳故丹溪所取人中黃法於冬月以竹截筒刮去青兩頭留節一頭打通一竅以大甘草納入筒內以竹釘塞其竅投糞缸中二三箇月取出晒乾用）

○陶尚文治瘟疫法

若病只在少陽經者小柴胡加防風羌活微發之而愈若病兼陽明經者柴葛二方合服之（小柴胡對升麻葛根湯也）

若見太陽證便大便泄者以本方（小柴胡也）去黃芩對五苓散尤當看脉寒熱若無寒去桂留芩

若小便不利是膀胱本病本方加去桂五苓散

若入太陰經無熱證見者用理中湯此證必須腹痛而瀉明日瀉止痛止仍用小柴胡和之

若入少陰經及厥陰經用陰證傷寒傳經法治之

若初看未端的且先以敗毒散治之看歸在何

經再隨經施治無不効者

若發黃小柴胡合去桂五苓散未退茯苓滲濕湯

瘟疫作渴本方加石膏知母濕溫滑薯术白虎湯

瘟疫發狂不識人大柴胡湯加當歸如大便泄者三黃石膏湯柴苓湯

瘟疫胃脯滿悶本方中加枳殼橘紅黃連若大便不通大柴胡湯微利之

○三黃石膏湯

石膏三錢　黃芩　黃連　黃栢各一錢半

豉半合　麻黃一錢　梔子五枚

右細切作一服水二盞煎至一盞三分連進三五劑愈

○敗毒治瘟疫四時通用　散

羌活　獨活　前胡　柴胡

川芎　枳殼　桔梗　白茯苓

人參各等分　甘草減半

右為細末每服三錢加生薑三片水一盞半煎至一盞溫服或沸湯點服亦可此藥治傷寒瘟疫風濕風眩四肢痛憎寒壯熱頭強睛疼不問老人小兒皆可服或嶺南煙瘴之地或瘟疫時

行或人多風痰或處卑濕之地脚氣痿弱此藥不可缺也日三五服以知爲度一方加薄荷少許每服五錢加姜水煎服

○九味羌活湯 方見傷寒門 治瘟疫初感一二日間服之取汗而愈其效如神

○黑奴丸治溫毒發斑煩躁大渴及時行熱病六七日未得汗脉洪大或數面赤目眩身痛大熱狂言欲走渴甚又云五六日已上不解熱在胃中口禁不能言爲壞傷寒醫所不治棄爲死人精魄已竭心下尚溫捻開其口灌藥下咽則活

黃芩　釜底煤　芒硝
麻黃　梁上塵　小麥奴
竈突墨各一兩

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大新汲水化服飲水盡足當發寒寒已汗出乃差若時頃不汗再服一丸須見微利若不大渴不可與此藥

○大無神术散治四時瘟疫頭痛項強憎寒壯熱身痛專主山嵐瘴氣之妙劑也

陳皮二錢　蒼术　厚朴各一錢　甘草
藿香　石菖蒲各一錢半

右細切作一服加姜三片大棗一枚水一盞半

煎至一盞去相温服一方無葛蒲有香附一錢
名神术散氣散
附大頭天行病
丹溪曰大頭病乃濕熱在高巔之上用羌活及酒
炒黄芩酒蒸大黄隨病加減切不可用降藥
○東垣曰陽明邪熱太甚資實少陽相火而爲之也
濕熱爲腫太盛爲痛此邪見于頭多在兩耳前
後先出皆主其病也治法大不宜藥速速則過
其病所謂上熱未除中寒復生必傷人命宜用
緩藥緩服徐徐少與當視其腫勢在何部分隨
經處治之陽明爲邪首大腫少陽爲邪出於耳

前後也
○二黄湯治大頭天行疫病
黄芩酒炒製炎 黄連酒炒製炎 生甘草各等分
右細切每服三錢水一盞煎七分温服徐徐呷
之○如未退用鼻粘子不拘多少水煎入芒硝等分
亦時時小與母令飲食在後如未已只服前藥
取大便邪氣已則止○前方宜各少加引經藥
陽明渴加石膏少陽渴加瓜蔞根陽明行經升
麻芍藥葛根甘草太陽行經甘草荆芥防風並
與上藥相合用之或云頭痛酒芩口渴乾葛身
痛羌活桂枝防風芍藥俱宜加之

○普濟消毒飲子

泰和二年四月民多疫癘初覺憎寒壯熱體重次傳頭面腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭傷寒諸藥雜治終莫能愈漸至危篤東垣曰身半已上天之氣也邪熱客於心肺之間上攻頭面而爲腫耳須用下頭藥共爲細末半用湯調時時服之半用蜜丸嚥化服盡良愈活者甚衆時人皆曰天方謂天仙所製也遂刻諸石以傳永久

黃芩半兩製炒　黃連半兩製炒　人參三錢
陳皮去白二錢　甘草二錢　連翹一錢

玄參二錢　白殭蠶七分炒　升麻七分
柴胡五分　桔梗三分　板藍根一錢
馬勃一錢　鼠粘子一錢

右爲末服如上法或加防風川芎薄荷當歸身細切五錢水二盞煎至一盞食後稍熱服之如大便硬加酒蒸大黃一錢或二錢以利之腫勢甚者以砭鍼刺之

蝦蟇溫

○卅溪曰蝦蟇瘟癘風熱防風通聖散加減用之或用小柴胡加防風羌活荊芥薄荷桔梗煎服外以側栢葉搗汁調火煅蚯蚓糞付之或用丁香

尖附子尖南星醋調付之或五葉藤車前草皆可搗付之有効

○甘桔湯治冬瘟咽喉腫痛

甘草　桔梗各等分　右細切水煎時時頻呷之

○蒌蘞散治冬瘟頭面腫

蒌蘞二錢半　石膏一錢半　麻黃　白薇　川芎各半錢　乾菊花一半錢　羌活　杏仁　甘草　青木香

右細切作一服水二盞煎至一盞去柤日三服

○祖傳經驗秘方入黃散治四時疫癘大頭天行等病

病

糞缸岸置風露中言淺者佳水飛細研一兩重

甘草三錢　辰砂

右爲細末每服三錢煎薄荷桔梗湯送下日三五服煎藥甘草桔梗茯苓藁本白朮各半錢水煎服○疫癘夏感寒伏於少陰咽痛次必下利名曰腎傷寒宜用半夏桔梗甘草各一錢加薑五片煎服○大頭天行病從頤頷腫熱者又名頫頷瘟東垣有方用羌活酒炒黃芩酒蒸大黃加減水煎服十五六日服小柴胡湯不愈者仍用陳皮紫蘇發散而愈又法酒炒黃芩黃連爲

君炙甘草寫佐水煎細細呷之再加黍粘子酒
蒸大黃煎入巴硝亦細細頻與服之微利爲度
腫減後去後三味只服前藥如渴屬陽明加石
膏屬少陽加瓜婁根若陽明行經加升麻芍藥
葛根甘草太陽行經加羌活荆芥防風如頭痛
加黃芩渴加葛根身痛加羌活防風荆芥桂枝
芍藥隨宜用之入上藥相合煎服或時疫腫毒
疣瘡或藏府積熱發于頭項咽嗌填塞水漿不
下或面赤脉浮洪熱甚漏蘆湯治之升麻黃芩
大黃各一兩藍葉即大青葉玄參各二兩煎服
○丹溪治套云衆人病一般者乃天行時疫蓋冬月
閉藏之時反行春令濕勝於寒而發泄眞陰土
勝水虧矣所勝者妄行土有餘也所生者受病
所勝者侮之火土相合濕熱相聚故春來木長
之時無水滋生化源故人病瘟治有三法見前春
感清氣無汗惡寒爲疫癘通用升麻葛根湯○
春感清氣發熱而渴不惡寒宜解肌湯葛根黃
芩芍藥各一錢麻黃一錢半甘草桂枝各七分
半大棗一枚水煎服○春溫發熱咳嗽身疼口
燥渴脉浮洪熱甚宜小柴胡湯加桂枝治之咳
嗽加五味子渴去半夏加瓜婁根人參脉實渴
宜大柴胡湯下之渴加知母石膏○凡温病脉

尺寸俱浮素傷於風因而傷熱風熱相搏其證四肢不收身熱自汗頭痛喘息發渴昏睡或體重不仁慎勿發汗汗之則譫語煩躁目昧無睛光病在少陰厥陰二經宜萎蕤湯人參敗毒散葛根龍膽湯小柴胡湯甚者括蔞葛根湯脉浮身腫汗出漢防已湯誤汗者防已黃芪湯○四時傷寒疫癘或傷風有汗或風溫身腫體痛惡風口乾日晡潮熱脉實並用人參敗毒散○夏應熱而反寒夏及秋初而爲暴寒折於盛暑熱結四肢則壯熱頭痛或寒傷於胃下利膿血或水瀉脉實者宜下之安調中湯大黃三錢葛根黃芩等藥各二錢

○東陽李文會內子陳氏年二十九三月間得瘟疫証病三日經水適來發熱愈甚至七八日病劇胷中氣築作痛莫能卧衆醫技窮辭去黑夜來迎予診治病者以綿花袋盛托背而坐于床令婢磨胷不息手六脉俱微數極而無倫次又若鰕遊狀予問曰恐下早成結胷耳主人曰未曾下予再思之三日而經水適來致中氣虛與下同用黃龍湯四物湯小陷胷湯共合一劑加姜棗煎服主人曰此藥何名予曰三合湯也一服而諸病悉減遂能卧再服熱退而病全安愈後

又因食粥太多而病復熱又作內傷處治而用補中益氣湯出入加減調理而愈

斑疹 四 附冷 冊

論

內經曰少陰所至爲瘍疹夫少陰所至者言君火有餘熱令大行戊子戊午之歲也在人則心主之心火大過則制已所勝而燒爍肺金蓋肺主皮毛故紅點如蚤之狀見於皮膚之間心火侮而乘之之色也名曰癮疹或傷寒溫熱病而發斑斑如錦文者名曰發斑皆熱毒之所致也其證有陽毒有陰毒是皆冬應寒而反溫人受不正之氣故至春夏而發爲斑爛夫陽脉浮數而陰脉實大者名爲溫毒或爲內外結熱極深舌卷焦黑鼻若烟煤狂言見鬼面赤而斑爛者名爲陽毒如溫病下之太早熱氣乘虛入胃或下之太遲熱氣鬱積胃中或醫者誤用熱藥過多胃氣熱甚及內傷熱病虛火燔灼肺之間皆能成發斑也是故發赤斑者半生半死發黑斑者九死一生治法用化斑湯（即人參白虎湯）升麻葛根湯玄參升麻湯黑膏黑奴丸之類是皆正治之法也學者宜詳察而用之

脉法

脉陽浮而數陰實而大（火盛而表故陽脉浮數下焦實熱故陰脉實大）

脉多沉伏或細而散或絶無滑伯仁曰脉者血之波瀾故發斑者血散於肌膚故脉伏

方法丹溪方法凡七條

丹溪曰發斑屬氣熱挾痰而作自裏而發于外通聖散中消息用當微汗以散之下之非理也

○戴氏曰有色點而無顆粒者曰斑一云發斑似傷寒痰熱之病發于外也

○有屬裏者因胃熱助手少陰火入手太陰肺也故紅點如斑生於皮毛間耳白虎瀉心調胃承氣從長選用之

○内傷發斑者胃氣極虛一身之火遊行於外所致宜補以降之

○疹屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汗亦有可下者戴氏曰浮小有顆粒者是也隨出即沒而又出一云主乎解散汗之即愈通聖散中消息用之是也

○丹疹皆是惡毒熱血蘊畜於命門遇君相二火合起即發也如遇熱時以通聖等辛凉之劑解之寒月以升麻葛根等辛温之劑解之凡丹疹先從四肢起而後入腹者死

○有乳孩因胎毒兩腋生癤後腹脹發赤疹如霞片取剪刀草杵汁調原蠶沙付之而愈

○冷丹屬血風血熱用通聖散有痰血相搏用蟬退

殭蠶荊芥南星治之

○消風散

荊芥穗　甘草炙　陳皮去白　厚朴

白殭蠶炒去土　蟬蛻去土炒　人參　茯苓

防風　川芎　藿香　羌活各等分

右爲細末每服二錢煎荊芥湯或茶清調下

○元戎葛根橘皮湯治肌膚斑駁冬温始發欬而心悶但嘔清汁

葛根　橘紅　杏仁　知母

黄芩　麻黄　甘草各等分

右細切每服五錢水一盞半煎至一盞温服

○陽毒升麻湯治傷寒一二日間身發斑爛或吐下後變成陽毒腰背疼痛面赤狂言下利脉浮大咽痛方見傷寒門

○玄參升麻湯治發斑咽痛煩躁譫語方見傷寒門

○陽毒梔子湯治傷寒壯熱百節煩痛身發斑爛

升麻　梔子仁　黄芩　芍藥各一錢

石膏二錢　知母一錢半　杏仁七分半　柴胡一錢

甘草五分

右細切作一服入薑三片香豉一百粒煎服

○犀角消毒飲治發斑癮疹等證

牛旁子四錢　荊芥穗　防風去蘆三錢各　甘草一錢

和劑　仲景

犀角一錢半另鎊爲細末不入湯煎

右細切作一服水二盞煎至一盞調犀角末服

○解毒防風湯治發斑及癮疹痒痛

防風一錢半　地骨皮　黃芪　芍藥

荊芥穗　枳殼　牛旁子炒各七分半

右細切作一服水二盞煎至一盞去柤溫服

○升麻葛根湯治傷寒陽明實熱發斑方見傷寒門

○陰毒升麻鱉甲湯治陰斑

升麻二錢　當歸　甘草各一錢二分　蜀椒二十粒

鱉甲炙一錢　雄黃四分另研

右細切水二盞煎至一盞去柤調雄黃末服

○加味羌活散治感四時不正之氣發爲癮疹

羌活　前胡各一錢　人參　桔梗

甘草炙　枳殼麩炒黃色　川芎　天麻

茯苓各半錢　蟬蛻　薄荷各三分

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞

溫服

○調中湯治內傷外感所發陰斑

蒼朮一錢半　陳皮一錢　砂仁　藿香

芍藥煨　甘草炙　桔梗去蘆　半夏湯泡七次

白芷　羌活　枳殼各七分　川芎五分

麻黃去節　桂枝各三分

右細切作一服加生姜三片水二大盞煎七分
溫服

○化斑湯治傷寒汗吐下後發斑脉伏即傷寒門白
虎加人參湯也守其類萃又加白朮水煎時時
服之

○黑膏治溫毒發斑冬月大溫人受不正之氣至春發斑如錦文脉浮散屬陽沉伏屬陰用此以消疫毒之氣

生地黃半斤　香鼓一升

右二味細切以猪膏二斤合煎之取濃汁如膏
用雄黃射香如荳大內中攪和勻每服用彈子
大白湯化下

○大青四物湯治瘟疫發斑

大青四錢　阿膠炒成珠子　甘草炙各一錢　香豉一合

右細切作一服水煎服之

○祖傳經驗加味敗毒散治瘟疫及癮疹等證

羌活　獨活　前胡　柴胡
川歸　川芎　枳殼　桔梗
茯苓　人參各五分　甘草　薄荷各二分半
加白朮　防風　荊芥　蒼朮
芍藥　生地黃各五分

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水煎服
此因虛而感冒風濕以致發斑者服之良驗

論

內經曰陽者天氣也主外陰者地氣也主內故陽道實陰道虛犯賊風虛邪者陽受之食飲不節起居不時者陰受之是故陽受之則入六府陰受之則入五藏此內外陰陽府藏虛實之不同也舉世醫者但見惡寒發熱頭目沉重之證更不察內外虛實使作傷寒糢糊劑治輒用仲景汗下解利之法治之多死良可嘆哉我東垣先生憫生靈之夭枉著內外傷辨惑論脾胃論等書一皆以扶植胃氣爲本誠萬世不刊之妙典也其諄諄告誡之意屢以飲食失節勞役過傷爲言而立補中益氣湯爲主治若能確守其法而行之無有不驗惜乎今之醫者多承因習之弊懵然不識機變睥睨其書而不視間有讀者不明脉候虛實不偏於此則偏於彼或遇內傷挾痰與食清氣怫鬱于下濁氣填塞胃中之候驟以補中益氣等藥一試則氣滿痞塞遂謂補藥不宜於此證也決意改用汗下解利之法醫死而不之悔故王安道有內傷不足中有有餘之議此發東垣之所未發者耳學者宜潛心究察其虛實似是之非庶不夭人之天年也東垣辨內外虛實之法學者宜熟玩於胃中臨證之

際庶無魯魚亥豕之訛焉抑考辨惑論曰夫外傷風寒有餘之証其發熱惡寒寒熱併作其熱也拂拂發熱發於皮毛之上如羽毛之拂明其熱在表也其口鼻氣塞不通心中煩悶不安其惡風寒也稍似裸体便不能禁雖重衣厚幕逼近烈火終不能禦其寒一時一日增加愈甚必待邪傳入裏乃已語聲重濁前輕後重高厲有力腹中和口知穀味大小便如常筋脅疼痛不能動搖手背熱手心不熱是皆外感有餘之候也其內傷飲食勞役不足之證其發熱惡寒寒熱間作及熱也蒸蒸燥熱發於肌肉之間捫之烙手明其熱在內也其口鼻

中氣短少氣不足以息其惡風寒也居露地中遇大漫風起卽乃不惡惟門窓隙中些少賊風則大惡之亦必待其陰陽旣和汗出則已語言困倦前重後輕氣不相續腹中如刀劃之痛手心或閉或溏或心下痞悶或胃中如刀劃之痛手心熱手背不熱是皆內傷不足之候也以此辨之豈不如黑白之易見乎愚故略述東垣之言以爲後學之矜式耳臨證又當參攷其脉候求其有餘中之不足或不足中之有餘或外感挾內傷或內傷挾外感視其輕重而權宜用藥以施治之庶幾登東垣之堂而爲當世之司命矣

脉法

東垣曰右寸氣口脉大於人迎一倍過在少陰則二倍太陰則三倍（右手三部屬三陰少陰在關主脾太陰在寸主肺肌膚大熱故脾肺二藏之脉皆緊盛也）

右寸氣口脉急大而數時一代而澁（澁者肺之本脉代者元氣不相接續此飲食失節勞役過甚太虛之脉也）○右關脾脉大而數（謂独大於五脉也）數中顯緩時一大也（此不甚勞役之脉也）○右關胃脉損弱甚則隱而不見但內顯脾脉之大數微緩時一代（此飲食不節寒溫失所之脉也）○右關脉沉而滑（此宿食不消之脉也）

方法

丹溪曰東垣內外傷辨甚詳世之病此者爲多但有挾痰者有挾外邪者有熱鬱于內而發者皆當以補元氣爲主看所挾而兼用藥氣虛甚者必少加附子以行參芪之氣挾痰者補中益氣加半夏更以竹瀝姜汁傳送

戴氏曰凡內外兼證或內傷重而外感輕者爲內傷挾外感證治法宜先補益而後散邪或以補中益氣爲主治加散邪藥當以六經脉證參究各加本經藥治之或外感重而內傷輕者爲外感挾內傷證治法宜先散邪而後補益或以辛涼等解散藥爲君而以參朮茯苓芎歸等藥爲

臣使是其治也

○補中益氣湯

黃芪一錢　甘草炙五分或七分　人參病甚者一錢

白朮　當歸各七分　陳皮五分

升麻　柴胡各三分

右細切作一服水二盞煎至一盞去柤溫服

脾胃一虛肺氣先絕故用黃芪以益皮毛而閉腠理不令自汗也上喘氣短搶其元氣用人參以補之心火乘脾用炙甘草之甘溫以瀉火熱而補胃中元氣若脾胃急痛腹中急縮者宜多用之此三味除濕熱煩熱之聖藥也白朮苦甘溫除胃中熱利腰臍間血升麻柴胡苦平味之薄者升胃中之清氣又引黃芪甘草甘溫之氣味上升能補衛氣之散解而實其表又緩帶脈之縮急用當歸以和血脈橘紅以理胃中之氣又能助陽氣上升以散滯氣助諸甘辛爲用或少加黃柏以救腎水而瀉陰中之伏火也表熱者一二服氣和微汗而愈○如心刺痛乃血澁不足加當歸○如頭痛加蔓荊子痛甚少者加人參五味子○如頭痛加蔓荊子痛甚加川芎頂痛腦痛加藁本細辛○有痰加半夏生姜○如咳嗽夏加五味子麥門冬秋冬加連

節麻黃春加佛耳草欵冬花久咳肺中伏火去
人參○如食不下乃胷中有寒或氣澁滯加青
皮木香陳皮寒月更加益智草荳蔻夏月更加
芩連秋更加檳榔砂仁○如心下痞悶加芍藥
黃連○如腹脹加枳實木香砂仁厚朴天寒加
生姜肉桂○如腹痛加白芍藥甘草有寒加桂
心夏加黃芩甘草芍藥冬加益智草荳蔻半夏
○如脇痛或縮急加柴胡甘草○如臍下痛加
熟地黃不已乃是寒也加肉桂○如大便閉澁
加當歸大黃○如脚軟乏力或痛加黃栢不已
更加防已○如氣浮心亂以硃砂安神丸鎮固

之則愈
右此方加減法是飲食勞倦喜怒不節如病熱
中則可用之若末傳寒中則不可用也蓋甘酸
適足以益其病耳如黃芪人參甘草芍藥五味
子之類是也見脾胃論

○硃砂安神丸

黃連一錢五分　硃砂一錢　酒生地黃
酒當歸身　炙甘草已上各五分

右爲極細末湯浸蒸餅爲丸如黍米大每服十
五丸津唾嚥下食後服一方無地黃歸身用生甘草

○調中益氣湯

其脉弦洪緩而沉按之中之下得時一澁其証四肢倦怠肢節煩疼難以屈伸身體沉重煩心不安忽肥忽瘦口失滋味腹難舒伸太小便清利而數或上飲下便或大便澁滯不行一二日一見夏月飧泄米穀不化或便後見血或見白膿臀滿短氣腸嘻不通或痰嗽稠粘口中沃沫食入反出耳鳴耳聾目中溜火視物昏花努肉紅絲熱壅頭目不得安卧嗜卧無力不思飲食此藥主之

黃芪一錢　人參有嗽去之　甘草　蒼术各五分

柴胡此味為上氣不足胃氣與脾氣下溜乃補上氣從陰養陽也　橘紅妨腹中氣不得運轉更加一分　木香一分或二分　升麻各二分

右細切作一服水二盞煎至一盞去柤空心溫服寧心絶思藥必神効蓋病在四肢血脉空心在旦是也○如時顯熱躁乃下元陰火蒸蒸發也加生地黃二分黃柏三分○如大便虛坐不得或了而不了腹中逼迫血虛血澁也加當歸身三分○如身體沉重雖小便數多亦加茯苓二分蒼术一錢澤瀉五分黃柏三分○如胃氣不和加半夏五分生薑三片有嗽加生地黃二分以制半夏之毒○如痰厥頭痛非半夏不能除

此足大陰脾經邪所作也○如兼燥熱加黃栢生地黃各二分如無已上證只服前藥○如春夏腹痛加白芍藥二分○如惡熱而渴或腹痛者更加白芍藥五分生黃芩二分○如惡寒腹中痛加桂心三分去黃芩名桂枝芍藥湯○如冬月腹痛不可用芍藥蓋其性之大寒也只加乾姜二分或加半夏五七分以生姜製之○如秋冬之月胃脉四道爲衝脉所逆併胸下少陽脉二道而反上行病名厥逆內經曰逆氣上行滿脉去形明七神脊絕離去其形而死矣其正氣上衝咽不得息而喘息有音不得卧加吳茱萸五分或一錢湯泡去苦用觀厥氣多少而用○如夏月有此證爲大熱也蓋此病隨四時爲寒熱溫凉也宜以酒黃栢酒黃連酒知母各等分爲細末熟湯爲丸如梧桐子大每服二百丸白湯空心送下仍多飲熱湯服畢少時便以美膳壓之使不用胃中停留直至下元以瀉衝脉之邪也大抵治飲食勞倦所得之病乃虛勞七損証也當用溫平甘多辛少之藥治之是其本法也

○升陽順氣湯治因飲食不節勞役所傷腹胸滿悶短氣遇春則口淡無味遇夏雖熱猶有惡寒飢

則常如飽不善食冷物

黃芪一錢半　夏六分　甘草炙二分　草豆蔻四分

神麯炒三分　升麻　柴胡各二分　當歸身

陳皮各三分　黃柏一半分　人參三分

右細切作一服水二盞生姜三片煎至一盞去

柤食前溫服夫脾胃不足之證須用升麻柴胡

苦平味之薄者陰中之陽引脾胃中清氣行於

陽道及諸經生發陰陽之氣以滋春氣之和也

又引黃芪人參甘草甘溫之氣味上行充實腠

理使陽氣得衛外而為固也凡治脾胃之藥多

以升陽補氣名之者此也

○升陽補氣湯治飲食不時饑飽勞役胃氣不足脾

氣下溜氣短無力不能寒熱早飯後轉增昏悶

頻要眠睡怠惰四肢不收懶倦動作五心煩熱

厚朴姜製三分　升麻　羌活　白芍藥

獨活　防風

柴胡二錢一分　生地黃半錢　甘草炙　澤瀉各五分

右細切作一服生姜三片大棗二枚水二盞煎

至一盞去柤食前大溫服　如腹脹及腹中窄

狹加厚朴一倍　如腹中似硬加砂仁三分

○當歸補血湯治肌熱燥熱因渴引飲目赤面紅晝

夜不息其脉洪大而虛重按全無內經曰脉虛

血虛又云血虛發熱證像白虎惟脉不長實爲辨耳誤服白虎湯必死此病得之於飢困勞役

黃芪一兩　當歸酒洗二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服

○木香化滯湯治因憂食濕麪結於中脘腹皮抵痛心下痞滿不思飲食食之不散常常痞氣或胃脘當心而痛並皆治之

半夏湯泡洗一錢半　草荳蔻濕麪裹煨杵碎　甘草炙各七分半

柴胡去蘆六分　木香　橘紅各四分半

枳實麩炒黃色　當歸各三分　酒紅花一分

右細切作一服水二盞生姜五片煎至一盞去

柤熱服

○升陽益胃湯肺及脾胃虛則怠惰嗜卧四肢不收時值秋燥令行濕熱少退體重節痛口燥舌乾飲食無味大便不調小便頻數不欲食食不消兼見肺病洒淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益胃此藥主之

黃芪一錢　半夏　人參去蘆　甘草炙各五分

獨活三分　防風三分因秋旺故以辛溫瀉之　白朮二分

白芍藥何故秋旺用人參白朮芍藥之類反補肺蓋爲脾胃虛則肺最受邪故因時而補易爲力也　羌活各三分　橘紅二分半

茯苓二分小便利口不渴者勿用　柴胡去芦二分

澤瀉二分不淋者不可用　黃連一分

右細切作一服生姜五片大棗二枚水二盞煎至一盞去柤早飯後溫服

服藥後如小便罷而病加增劇是不宜利小便當去茯苓澤瀉○如方喜食一二日不可飽食恐胃再傷以藥力尚少脾胃之氣不得轉運升發也須滋味之食或美食助其藥力益升浮之氣而滋其胃氣慎不可淡食以損藥力而助邪氣之降沉也可以少役形體使胃與藥得轉運升發慎毋大勞役使氣復傷若脾胃得安靜尤佳若胃氣稍強少食加菓以助藥力經云五菓為助是也

○雙和散補血益氣治虛勞少力不熱不寒溫而有補

白芍藥一錢　黃芪　熟地黃　川芎

川歸各六分　甘草　肉桂各四分

右細切作一服生姜三片大棗二枚水一盞半煎至一盞溫服大病後血虛氣乏者以此調治

○門冬清肺飲治脾胃虛弱氣促氣喘精神短少或衄血吐血等證

紫菀茸一錢　黃芪　白芍藥

甘草炙各七分　人參　麥門冬

當歸身 各五分
右細切作一服水一盞半煎至一盞去柤食後温服

○寬中進食丸滋形氣喜飲食

麥蘗麪 一兩炒黃 半夏 猪苓 去黑皮各七錢 草豆寇 濕麪裹煨 神麯 炒各五錢 枳實 麪炒黃色 橘紅 各二錢 白朮 五錢 白茯苓 澤瀉 各三錢 砂仁 二錢 乾生姜 甘草 炙各二錢 木香 一錢 人參 青皮 各五錢

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服三十九温米飲送下食後服

○白朮和胃丸治病久厭厭不能食而臟腑或閉或溏此胃氣虛弱也常服則和中理氣去濕消痰和脾胃進飲食

白朮 一兩五錢 半夏 湯洗 泡 厚朴 姜製 各一兩 陳皮 去白八錢 人參 五錢 甘草 炙二錢 枳實 麪炒黃色 檳榔 各二錢半 木香 一錢半 乾生姜

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服五十九温米飲送下

○枳朮丸治痞滿消食強胃

白朮 二兩 枳實 麪炒黃色 一兩

右爲細末用沸湯泡青荷葉乾者亦可 頃間去葉用

湯浸晚粳米杵粉以原湯煮糊爲丸如梧桐子大每服五十丸多至七八十丸白湯送下○本方加橘紅一兩名橘皮枳术丸治元氣虛弱飲食不消心下痞悶○本方加炒神麯一兩炒麥蘗麪一兩名麯蘗枳术丸治飲食太過致心腹滿悶不快○本方加木香一兩名木香枳术丸能破滯氣消飲食開胃進食○本方加半夏一兩名半夏枳术丸治因冷食內傷○本方加酒炒黃連酒蒸大黃炒神麯淨橘紅各二兩黃芩四兩名三黃枳术丸治傷肉食濕麪辛辣味厚之物填塞悶亂不快

○草豆蔻丸治傷飲食卒心痛甚効或秋冬傷寒冷之物胃脘當心而痛上支兩脇痛膈噎不通食飲不下

草豆蔻（麪裹煨黃色）　枳實（麸炒黃色）　白术（各一兩）

麥蘗麪（炒黃色）　半夏（湯洗炮）　黃芩（去朽）

神麯（炒黃色各五錢）　乾生姜

青皮（各二錢）　炒鹽（五分）

橘紅

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如菉豆大每服五十丸白湯送下如冬月不可用黃芩歲火不及又傷冷物加以溫劑是其治也然亦有熱物傷者從權以寒藥治之隨時之宜不可不知也

○枳實導滯丸治傷濕熱之物不得施化而作痞滿悶亂不安

大黃一兩 枳實去瓤麩炒 神麯炒各半兩 茯苓去皮 黃芩去朽 黃連 或加木香檳榔各二錢名木香導滯丸

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服七八十丸溫水送下食遠量強弱加減丸數以利爲度

○白朮丸治傷荳粉濕麪油膩之物

白朮六兩 枳實炒 半夏湯洗 神曲炒各一兩 橘紅七錢 黃芩五錢 白礬枯三分

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服六七十九白湯送下量所傷加減丸數因素食多用椒姜故用黃芩以瀉之

○木香見睍丸治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛

神麯炒 京三稜煨各一兩 石三稜去皮煨 草荳蔻麪裹煨香附子各五錢 升麻 柴胡各三錢 木香一錢 巴荳霜五分

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服三十九白湯送下量所傷多少服之

○三稜消積丸治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

京三稜煨 廣木香炒 神麯炒各七錢 淨青皮

巴荳和皮炒焦黑去米及皮 苗香炒 陳皮去白各五錢 丁香益智去殼各三錢

右爲細末醋調麪糊爲丸如梧桐子大每服十丸加至二十丸生薑湯送下食前量虛實加減如更衣止後服

○脾急大黃丸治心腹諸卒暴痛

大黃 巴荳去皮及油膜 乾薑各等分

右爲細末煉蜜和搗爲丸如小荳大每服二丸以利爲度

○冊溪保和丸治一切飲食所傷胃腹飽悶不安或腹中有食積癖塊多服日漸消散脾胃虛者勿服

山楂肉五兩 神麯炒二兩半夏湯泡洗兩 茯苓 陳皮去白各一兩 蘿蔔子炒 連翹各一兩 麥蘗麪炒一兩

右爲細末別用生神麯五兩入生薑汁一小盞水調打糊爲丸如梧桐子大每服三五十丸白湯或清米飲送下○一方去麥蘗麪有白朮二兩名大安丸健脾胃消食積最効○一云脾虛者服之虛虛之禍疾如反掌或以四君子等作湯使送下蓋山查一物大能尅化食物若胃中無食脾虛不運不思食者服之則尅伐脾胃之

氣故云然也

○丹溪加味二陳湯導痰補脾消食行氣

橘紅　茯苓各七分　半夏湯泡洗一錢

甘草炙三分　川芎　蒼朮

白朮各八分　山查肉一錢五分　砂仁五分

神麯炒七分　香附子一錢　麥蘖麪炒五分

右件除神麯麥蘖麪細研炒別包餘細切作一服加生姜三片大棗一枚水二盞煎至一盞調神麯麥蘖入內服

○祖傳經驗遡源散

凡傷食物致惡寒發熱久不愈或傷寒後食諸物致食復潮熱不已必詢問其先食何物所傷或糍粽或肉食則以原食之物燒存性一兩重細研爲末別用生韭菜連根葉一握杵汁調服過一二時以東垣枳實導滯丸百餘粒催之其所傷之宿食即下熱退而愈

○參苓白朮散治脾胃虛弱飲食不進或嘔吐瀉利其大病後補助脾胃此藥極妙

人參　白朮　白茯苓

乾山藥　白扁豆去殼姜汁浸炒一兩半　甘草

桔梗去蘆　薏苡仁　連肉已上各一兩

家傳治禁口痢用石連肉又加石菖蒲一兩有

氣加木香半兩
右爲細末每服二錢棗湯調下禁口痢用粳米
湯休息痢用砂糖湯調下　別方有縮砂一兩
杜門付氏婦亨族姪女也年三十歲因勞倦傷食
致腹痛臍脹面黃十數日後求予治診得右手
氣口脉洪盛而滑右關脉浮診虛大而滑重按
則沉實左寸關亦弦滑而無力兩尺皆虛而伏
亨曰此中氣不足脾氣弱而不磨當補瀉兼施
而治初與補中益氣湯二服次日與枳實導滯
丸八十丸大便去二次次日又與補中益氣湯
如此補一日瀉一日二十日服補藥十數貼導

滯丸千數丸腹脹漸退而安

東陽盧廉夫善推明卅溪之醫學者也自病亦誤
治年四十五時正月間因往永康路途跋涉勞
倦發熱身體略痛而頭不痛自以爲外感而用
九味羌活湯三貼汗出熱不退前後又服小柴
胡湯五六貼熱愈甚經八日召予診視至卧榻
前見煎成湯飲一盞在案問之乃大承氣湯將
欲飲診其脉右三部浮洪略弦而無力左三部
略小而亦浮軟不足亨曰汝幾自殺矣此內傷
虛證服此藥大下必死伊曰我平生元氣頗實
素無虛損證明是外感無疑也亨曰將欲作陽

明內實治而下之數脉既不沉實而又無目疼鼻乾潮熱譫語等證將欲作太陽表實治而汗之數脉雖浮洪而且虛又無頭痛脊強等證今經八日不應仍在其表汝欲作何經而處治之乎伊則唯唯不語以補中益氣湯加附子三分作大劑與之是夜連進二服天明徃診脉略平和伊言尚未服仍謂前藥無効欲易外感退熱之藥予曰再飲前藥二服不効當罪我又如前二服脉証俱減半伊始曰我幾誤矣去附子再煎二服與之得熱退氣和而愈予則告回其熱雖退體猶困倦伊如前自合二十餘貼服後方得強健復元而安

上湖呂氏子年三十餘九月間因勞倦發熱醫作外感治用小柴胡黃連解毒白虎等湯反加痰氣上壅狂言不識人目赤上視身熱如火衆醫伎窮八日後召予診視六脉數疾七八至又三部豁大無力左略弦而乾予曰此病先因中氣不足又內傷寒涼之物致內虛發熱因與苦寒藥太多爲陰盛隔陽之証幸元氣稍充未死耳以補中益氣加制附子二錢乾姜一錢又加大棗生姜煎服衆醫笑曰此促其死也黃昏時服一劑痰氣遂平而熟寐伊父報曰自病不寐今

安卧鼾聲如平時至半夜方省始識人而諸病
皆減又如前再與一劑至天明時得微汗氣和
而愈

論

内經曰因於暑汗煩則喘喝靜則多言潔古曰靜
而得之爲中暑動而得之爲中熱中暑者陰證中
熱者陽證東垣曰暑熱之時無病之人或避暑於
深堂大厦得之者名曰中暑其病必頭痛惡寒身
形拘急肢節疼痛而煩心肌膚火熱無汗爲房室
之陰寒所遏使周身之陽氣不得伸越大順散等

熱藥主之若行人或農夫於日中勞役得之者名
曰中熱其病必苦頭痛發躁熱惡熱捫之肌膚大
熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃爲天熱外傷
肺氣蒼朮白虎等涼劑主之王安道曰暑熱之氣
一也甘夏月中傷其邪而爲病爲豈以一暑熱分
爲陰陽二證而名之耶其避暑於深堂大厦及恣
食藏氷瓜菓寒涼之物正經所謂口得寒物身犯
寒氣之病耳自當同秋冬即病陰證傷寒慶治不
可名中暑也此論固是抑亦有未悉之肯也與愚
按仲景傷寒論中一證曰中暑即中暑也盧而微
弱煩渴引飲體熱自汗此蓋得勞役體虛而暑邪

干衛之候是宜東垣清暑益氣湯等補益之劑治之而愈一證曰熱病即中熱也脉洪而緊盛頭疼身熱口燥心煩此蓋得之於冬感寒邪鬱積至夏而發乃挾暑而成大熱之候是宜黃連白虎解毒等湯清涼之劑調之而愈曰中暑者陰證內傷之為病也曰中熱者陽證外感之為病也曰陰曰陽豈不於斯而明辨之乎學者宜再思之

脉法

經曰脉虛身熱得之傷暑

脉弦細芤遲（許學士云傷暑其脉弦細芤遲何也內經曰寒傷形熱傷氣蓋傷氣而不傷形則氣消而脉虛所謂弦細芤遲皆虛脉也仲景以弦為陰而朱肱亦曰中暑脉虛細弱暑脉虛可知矣）

脉虛而微弱或浮大而散或隱不見（微弱隱伏皆虛類也）

方法（丹溪方法凡二條）

丹溪曰夏月陽氣盡出於地人之腹屬地氣陽氣於此時浮於肌表腹中之陰虛矣夏月伏陰在內此陰字有虛之義若作陰冷看誤矣古人治暑有用大順散等劑蓋以涼亭水閣寒涼氷雪之傷不用溫劑病何由安非為伏陰而用也火令之時流金爍石何陰冷之有孫眞人製生脉散令人夏月服之非虛而何

○暑證用黃連香薷飲清暑益氣湯五苓散等藥有

挾痰者加南星半夏之類挾虛者加人參黃芪之類

戴氏曰暑有冒有傷有中三者輕重之分或腹痛水瀉者胃與大腸受之惡心者胃口有痰飲二者冒暑也可用黃連香薷飲黃連退熱香薷消暑氣或身熱頭疼躁亂不寧者或身如針刺者此為熱傷在肉分也當以解毒白虎等湯加柴胡氣虛加人參或咳嗽發寒熱盜汗出不止脉微者熱在肺經火乘金也此為中暑宜用清肺湯柴胡天水散之類急治則可

○清暑益氣湯治長夏濕熱大勝人感之多四肢困倦精神短少懶於動作胷滿氣促肢節煩疼或氣高而短身熱而煩心下痞滿小便黃而數大便溏而頻或泄黃如糜或如泔色或渴或不渴不思飲食自汗體重或汗少者血先病而氣未病也其脉中得洪緩若濕熱相搏必加之以遲遲病雖互換少差其脉暑濕今則一也宜以清燥之劑治之

黃芪（汗少一錢） 蒼朮（各一錢半） 升麻（一錢） 人參

白朮 陳皮 神麯（炒） 澤瀉（各五分）

甘草（炙） 黃栢（酒浸炒） 川歸 青皮

麥門冬（去心） 乾葛（各三分） 五味子（九粒）

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○白虎湯治暑熱發渴

○益元散一名天水散一名六一散治中暑身熱煩渴小便不利此藥能燥濕分利水道實大腑化熱毒行積滯逐凝血補脾胃降火之要藥也方見利門

○香薷飲治一切暑熱腹痛霍亂吐利煩心等証

香薷二錢　厚朴姜制　白扁豆炒各一錢半

右細切作一服水二盞煎七分去粗溫服

○黃連香薷飲治證同前以前方去扁豆加黃連七分半也

○十味香薷飲

香薷一錢　人參　陳皮　白朮

白茯苓　白扁豆　黃芪　木瓜

厚朴姜炒　甘草炙各半錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○桂苓甘露飲治伏暑發渴脉虛

桂心　人參　黃芪　茯苓

白朮　甘草　葛根　澤瀉

石膏　寒水石各一兩　滑石二兩　木香一錢

右爲細末每服三錢白湯調下

○五苓散方見傷寒門本方加茵蔯名茵蔯五苓散治濕熱發熱黃證最捷

○大順散

甘草　乾姜　杏仁　肉桂　各等分

右先將甘草用白砂同炒次入薑郎下杏仁炒過篩去砂同桂研爲細末每服二錢白湯調下王安道曰大順散本爲胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕嘔吐水穀不分臟腑不調所立故甘草乾薑皆經火炒又肉桂而非桂枝蓋溫中藥也內有杏仁不過取其能下氣耳若以此藥治靜而得之之證吾恐不能解表反增內煩矣（愚按以先歲氣無伐天和其暑月豈可用此熱藥此方雖爲于此不可輕用）

○生脉散

人參　五味子　麥門冬　各等分

右細切水煎夏月時時代熱水飲之孫真人曰夏月必服五味子以補五藏氣東垣曰夏月服生脉散加黃芪甘草令人氣力湧出

○祖傳經驗秘方

凡人夏月衝斗道途或於田野中務農作勞或肥白氣虛之人不能抵當暑熱忽然昏悶運仆其氣將絕如在日中即當移病者於陰處徐徐以溫湯水灌之如未甦急灸氣海穴以復其元氣醒後以大劑滋補之藥補之切不可灌以涼水即死

愚按內經有曰陽氣者煩勞則張精絕辟積于夏使人煎厥目盲不可以視耳閉不可以聽憒憒乎若壞都汩汩乎不可止是則中暑運厥之候也

濕証 七

論

內經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰濕勝則濡泄地之濕氣感則害人皮肉筋脉原病式曰諸痙強直積飲痞膈中滿霍亂吐下體重腫肉如泥按之不起皆屬於濕夫濕之爲病所感不同有從外感而得之者有從內傷而得之者若居處卑濕之地與夫道途衝汗風雨或動作辛苦人汗沾衣皆濕從外感者也或恣飲酒漿醪醪多食柑橘瓜菓之類皆濕從內傷者也大抵宜發汗及利小便使上下分消其濕是其治也經又曰因於濕首如裹濕熱不攘大筋緛短小筋弛長緛短爲拘弛長爲痿因於氣爲腫四維相代陽氣乃竭丹溪釋曰濕者土之濁氣首爲諸陽之會其位高其氣清其體虛故聰明係焉濁氣薰蒸清道不通故沉重不利似乎有物蒙之失而不治濕變爲熱熱留不下熱傷血不能養筋故爲拘攣濕傷筋不能束骨故爲痿弱王註曰素靣氣疾濕熱加之氣濕熱爭故爲腫

也邪氣漸盛正氣漸微陽氣衰少致邪代正氣不宣通故四維發腫諸陽受氣於四肢也但今人見膝間關節腫痛全以爲風治者多誤矣學者詳之

脉法

脉經曰濕家爲病一身盡疼發熱而身已似薰黃也

脉浮而緩濕在表也脉沉而緩濕在裏也或弦而緩或緩而浮皆風濕相搏也

方法

丹溪曰六氣之中濕熱爲病十居八九濕在上宜微汗而解經曰濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗爲効而止也不欲汗多故不用麻黃乾葛等劑濕在中下宜利小便此淡滲治濕也一云濕在下宜升提之濕有自外而入者有自內得者陰雨濕地皆從外治宜汗散久則疎通滲泄之

蒼术治濕上下部都可用一云上焦濕用蒼术其功甚烈

○二陳湯加酒芩羌活蒼术木通散風行濕最妙

○金匱防已黃芪湯治風濕脉浮身重汗出惡風或周身疼痛

防已三錢　甘草一錢半　白术二錢　黃芪三錢半

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水二大盞煎至一盞去柤溫服○喘者加麻黃○胃氣不和加芍藥○氣上衝加桂枝○下有寒加細辛○濕勝身重陽微中風則汗出惡風故用黃芪炙甘草以實表防已白朮以勝濕

○甘草附子湯治風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫而痛者

甘草炙二錢　附子一錢半　白朮二錢　桂枝四錢

右細切作一服水煎金匱方桂枝加生姜大棗名白朮附子湯

○加味五苓散治濕勝身痛小便不利體重發渴者

本方中加羌活一倍是也

○除風濕羌活湯治風濕相搏一身盡痛

羌活七分　防風　升麻

柴胡各五分　藁本　蒼朮各一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去柤溫服

○羌活勝濕湯治肩背痛不可回顧此手太陽氣鬱而不行以風藥散之脊痛項強腰似折項似拔此足太陽經不通行此藥主之

羌活　獨活各一錢　藁本　防風

甘草炙　川芎各五分　蔓荊子三分

右細切作一服水二盞煎至一盞去柤大溫服食前　如身重腰痛沉沉然經中有寒濕也加酒洗漢防已五分輕者附子五分重者川爲五分

○茯苓滲濕湯治濕鬱成黃疸寒熱嘔吐而渴身體面目俱黃小便不利不思飲食莫能安卧

黃芩　黃連　梔子　防已
白朮　蒼朮　陳皮　青皮
枳實各四分　赤茯苓　澤瀉各五分　茵蔯六分
猪苓去黑皮一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去柤溫服

○茵蔯五苓散治濕熱大勝黃疸發熱五苓散內加茵蔯一倍即是也

○經驗白朮酒治中濕遍身疼痛不能轉側及皮肉痛難著蓆

白朮一兩

右細切作一服無灰老酒一盞半煎至一盞去柤溫服

丹溪活套云濕本爲土氣火熱則能生濕土故夏熱則萬物濕潤秋涼則萬物乾燥夫熱而怫鬱則生濕也因濕生痰故用二陳湯加酒芩羌活防風去風行濕蓋風藥能勝濕也大抵治濕宜

利小便爲上策故曰治濕不利小便非其治也
○如一身盡痛或無汗是濕流關節邪氣在表
宜五苓散加羌活蒼朮以微汗之不可太汗恐
汗去而虛濕仍在也若自汗多者宜白朮甘草
湯○若小便自利大便泄瀉身痛自汗此
爲寒濕宜五苓散加生附蒼朮木瓜○如風濕
身痛微腫惡風宜杏仁湯官桂五錢天門冬芍
藥麻黃各二錢半杏仁七箇水三盞姜十片煎
分二服○又治濕消腫脹利小便健脾胃葶藶
木香散葶藶子茯苓豬苓白朮各一兩木香澤
瀉木通甘草桂枝各半兩滑石三兩爲末湯調
服○然已上諸方乃略示其端倪耳全在活法
加減而用之不可執一論也夫治濕者固當以
參朮爲君以補脾爲主治然亦有濕盛氣滿腳
脘者又當以利水行氣爲先補脾藥又未可遽
用或以參朮爲君而利水藥爲臣使或以朮通
澤瀉葶藶車前子等利水藥爲君而以茯苓白
朮人參等補脾藥爲臣使有本而標之者亦有
標而本之者看緩急而施治則萬舉萬全之功
可立而待也

內經曰諸澁枯涸乾勁皴揭皆屬於燥原病式曰也寒燥濕同陰也又燥濕少異也然燥金雖屬秋陰而異乎寒濕故反同其風熱也故火熱勝則金衰而風生緣風能勝濕熱能耗液而反寒陽實陰虛則風熱勝于水濕而為燥也凡人風病多因熱甚而風燥者為其兼化以熱為其主也蓋肝主于筋而風氣自甚又燥熱加之則筋大燥也燥金主於收斂其脉緊澁故為病勁強緊急而口禁也或病燥熱太甚而脾胃乾涸成消渴者或風熱燥甚怫鬱在表而裏氣平者或善伸數欠筋脉拘急或時惡寒筋惕而搐又或風熱燥併而攣甚于裏故煩滿而或秘結也及風癇之發作者由熱甚而風燥為其兼化誕溢胃腸燥爛而瘈瘲脊冒僵仆也凡此諸證皆由熱甚而生風燥病各有異者由風熱燥各微甚不等故也所謂中風筋緩者因其風熱勝濕而為燥之甚也然筋緩不收而痿痺故諸臏病痿皆屬於肺金乃燥之化也如秋深燥甚則草木萎落而不收病之象也是以掌得血而能持足得血而能步夫燥之為病者血液衰少不能榮養百骸故若是也學者不可不知

脉法

脉緊而澁　或浮而弦　或乾而虛

方法

冊溪曰皮膚皴揭拆裂血出大痛或肌膚燥痒皆火燥肺金燥之甚也宜以四物湯去川芎加麥門冬人參天花粉黃栢五味子之類治之

○瓊脂膏治血虛皮膚枯燥及消渴等證

生地黃二十斤搗取真汁洗淨細去粗　鹿角膠一斤

白沙蜜二斤煎一二沸掠去其上沫　眞酥油一斤

生姜二兩搗取真汁

右先以文武火熬地黃汁數沸以絹攄取淨汁又煎二十沸下鹿角膠次下酥油及蜜同煎良久候稠如餳以磁器收貯每服一二匙空心温酒調下

○瓊玉膏治證同前及肺熱咳嗽甚者（方見咳嗽門）

○天門冬膏治血虛肺燥皮膚折裂及肺痿咳膿血

証

天門冬新掏者不拘多少

右一味淨洗去皮心細搗絞取汁澄清以布濾去粗滓用銀鍋或沙鍋熳火熬成膏每服用一二匙空心温酒調服

○地仙煎治諸燥證

山藥一斤拌細　杏仁一斤去皮尖　生牛乳汁二升

右件將杏仁研細入牛乳山藥拌勻絞取汁用新磁瓶窓封重湯煮一日一夜服一二匙空心溫酒或湯調下

○和血益氣湯治口燥舌乾便數舌上赤脉此藥生津液除乾燥生肌肉方見消渇門

○當歸潤燥湯治消渇大便秘澁乾燥結硬菲喜溫飲陰頭退縮舌燥口乾眼澁難開等證方見消渇門

○生津甘露湯一名清瘀飲子治消中能食而瘦口舌乾燥自汗大便結燥小便頻數方見消渇門

○生津甘露飲子治消湯諸燥證方見消渇門

○辛潤緩肌湯諸燥飢渇及皮膚燥澁等證方見消渇門

○潤燥湯治大便燥結腸胃枯涸等證

○潤腸丸治大便乾燥閉結不通潤燥和血

○活血潤燥丸治大便風秘血秘常常燥結

○潤腸湯治大便結燥不通

○通幽湯治大便結燥治在幽門以辛潤之已上五方並見

秘結門

子仲兄懷德處士年四十五平生體瘦弱血少值庚子年歲金太過至秋深燥金用事久晴不雨得燥證皮膚拆裂手足枯燥搔之屑起血出痛楚十指甲厚反而莫能搔痒予製一方名生血潤膚飲服數十貼其病如脫後治

十數人皆驗

○生血潤膚飲　川歸　生地黃　熟地黃

黃芪各一錢　天門冬一錢半　麥門冬去心一錢

五味子九粒　片芩去朽酒洗五分　括蔞仁五分

桃仁泥五分　酒紅花一分　升麻二分

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服如大便結燥加麻仁郁李仁各一錢

火熱 九

論

內經曰諸熱瞀瘈暴瘖冒昧躁擾狂越罵詈驚駭附腫疼痠氣逆衝上禁慄如喪神守嚏嘔瘡瘍喉痺耳鳴耳聾嘔湧溢食不下目昧不明暴注瞤瘈暴病暴死皆屬于火丹溪曰太極動而生陽靜而生陰陽動而變陰靜而合而生水火木金土各一其性惟火有二曰君火人火也曰相火天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而言形質相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無守位稟命因動而見故謂之相天主生物故恒於動人有此生亦恒於動其所以恒於動者皆相火之爲也云云又曰五者之性爲物所感不能不動謂之動者即內經五火也相火易起五性厥陽之火相扇則妄動矣火起於妄變化莫測無時

不有煎熬眞陰陰虛則病陰絕則死愚按心爲君火而又有相火寄於肝腎二藏即內經一水不能勝二火也五性之火爲物所感而動即內經一水不能勝五火也夫五行之理天人所同知乎此則造化陰陽洞明於胷臆之間又能灼知其火邪之虛實或補或瀉用藥以平之則愈疾之功如射之中鵠矣學者其可忽諸

脉法

脉浮而洪數爲虛火　脉沉而實大爲實火

洪數見於左寸爲心火見於右寸爲肺火見於左關爲肝火右關爲脾火兩尺爲腎經命門之火

男子兩尺洪大者必遺精陰火盛也

方法 丹溪二十一條 凡丹溪曰陰虛火動者難治

實火可瀉黃連解毒之類○虛火可補參朮生甘草之類 謂之實者邪氣實也 謂之虛者正氣虛也○虛火可發當看在何經○風寒外束者可發輕者可降重則從其性而升之

凡火盛者不可驟用寒涼必須溫散

火急甚者必緩之生甘草兼瀉兼緩參朮亦可

人壯氣實火盛顚狂者可用正治硝黃氷水之類

入虛火盛在者以生姜湯與之若投以永水之類正治立死

有補陰則火自降炒黃柏熟地黃之類

凡氣有餘便是火氣從邊左發者肝火也氣從臍下起者陰火也（愚按氣有餘者非真氣也五志厥陽之火動而爲邪氣也）

飲酒人發熱者難治飲酒人因酒發熱者亦難治

輕手按之熱甚重手按手不甚此熱在肌表宜清之地骨皮麥門冬竹葉之類

重手按之熱甚而烙手輕手按之不覺熱此病在肌肉之內宜發之東垣升陽散火湯火鬱湯之類

煩燥者氣隨火升也

木通下行瀉小腸火（亦是）人中白瀉肝火（屎盆岸也狄石）

黃芩黃連以豬膽汁拌炒能瀉肝膽之火

黃栢加細辛瀉膀胱之火

青黛能瀉五藏之鬱火玄參能瀉無根火遊火小便降火極速山梔子能降火從小便中泄去其性能屈曲下行入所不知

入有氣如火從脚下起入腹者此虛極也蓋火起於九泉之下也此病十不救一治法以四物

湯加降火藥服之外以附子末津調貼脚心湧泉穴以引火下行愚按此條言猶有未悉者如果勞怯陰虛之人有此固當作陰虛治若壯實之人有此則是濕鬱成熱之候也愚嘗冒雨徒行衣濕得此証以蒼朮黃栢加牛膝防已等藥作丸服之而愈後累醫數人皆驗若誤作陰虛治即成痿証劇矣

○左金丸一名回令丸 治肝火

黃連六兩 吳茱萸一兩湯泡浸半時許焙乾用

右爲細末粥丸煎白朮陳皮湯下

○大補丸治陰火

黃栢去麁皮細切用新瓦盛益酒炒褐色

右爲細末粥丸或水丸煎四物湯送下又云氣虛四君子湯血虛四物湯送下

已上見丹溪方東垣方

○抑青丸治肝火

黃連不拘多少 爲細末粥丸白湯送下

○石膏丸瀉胃火併食積痰火

石膏煅爲細末醋丸菉荳大清米飲送下

○四物湯加白馬脛骨降陰火代芩連用

○陰虛發熱四物湯加炒黃栢酒知母乃降火補陰之妙劑甚者加龜板兼氣虛加參芪白朮

○手心熱屬熱鬱當用火鬱湯或用梔子香附白芷半夏川芎麯糊爲丸服

○火鬱湯治四肢熱及五心煩熱因熱伏土中或血虛得之或胃虛多食冷物抑遏陽氣於脾土之

中

羌活　升麻　葛根　芍藥

人參各七分　柴胡　甘草生各三分　防風二分半

葱白五莖

右細切作一服水一盞半煎至一盞稍熱服

○升陽散火湯治男子婦人四肢發困熱筋骨間熱肌表熱如火燎捫之烙手此病多因血虛而得之或胃虛過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中火鬱則發之

升麻　葛根　芍藥

羌活　獨活

人參各六分

炙甘草一分　柴胡三分

生甘草二分　防風三分半

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞熱服忌生冷等物

○瀉陰火升陽湯治肌熱頭熱面赤食少喘咳痰盛右關脉緩弱或弦或浮而數

羌活　甘草炙　蒼术各一分

升麻八分　柴胡一錢半　黃芪　人參各七分

黃連酒炒五分　石膏五分冬勿用　黃芩各七分

右細切作一服水二盞煎至一盞温服

○滋腎丸降腎火

黃栢三兩酒拌陰乾　知母二兩去毛酒浸陰乾　肉桂一錢去麁皮

右上二味氣味俱陰以同腎氣故能補腎而瀉下焦火也桂與火邪同體故以寒因熱用凡諸病在下焦皆不渴也右爲細末以熟水丸百沸湯下

○京膈散

大黃　朴硝　甘草各半錢　連翹一錢

梔子　黃芩　薄荷各二分半　淡竹葉五片

右細切作一服水一盞煎至八分去柤入蜜一匙和勻服

○三補丸瀉三焦火

黃芩　黃連　黃栢

右爲細末新汲水丸服

○紫雪治內外煩熱不解口中生瘡顛狂叫走解諸熱毒邪熱小兒驚癇等証

黃芩百兩　寒水石　磁石　石膏

滑石各二斤研　已上用水一石煑至四斗去柤入下項藥　甘草炙八兩　青木香　生犀角屑

羚羊角屑　沉香各五兩　丁香一兩　升麻

玄參各一斤　已上再煑至一斗五升入下項藥

硝石二斤芒硝亦可　朴硝十斤擇淨者

已上入前藥汁中微火煎柳枝不

住手攪候有七介投放水盆中半日入下項藥攪令勻

硃砂三兩　當門子即射香一兩二錢半

右煎成霜雪紫色每服一錢或二錢涼水調下大人小兒臨時以意斟酌加減多寡服之並食後服

○妙香丸治時疫傷寒解五毒潮熱積熱及小兒驚癇等證

巴豆取淨三百五十粒　牛黃　片腦　膩粉

射香各七錢五分　辰砂九兩　金箔九十片

右研極細煉蠟六兩入蜜七錢半同煉令勻每兩作三十丸每服一丸小兒菉荳大二丸白湯下○拔萃方無金箔有水銀硇砂治久遠成積按硇砂不可輕用製煉不精則殺人慎之

○瀉心湯治心經蘊熱

右以黃連一味爲細末水調服之

○千金麥門冬湯治諸病後火熱乘肺欬唾有血胷脇脹滿上氣喘急羸瘦五心煩熱滑而煩悶

麥門冬　桑白皮　生地黃各七分　半夏

紫菀茸　桔梗　淡竹葉　麻黃各五分

五味子　甘草各三分

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一

盞溫服

愚按此方曰病後火熱乘肺麻黃其可用乎曰渴而煩悶半夏亦不可用也宜去此二味加貝母天門冬方爲穩當也

○梔子仁湯治發熱潮熱發狂煩躁面赤咽痛

梔子仁　赤芍藥　大青　知母各五分

升麻　黃芩　石膏各一錢　杏仁七分半

柴胡一錢二分　生甘草一錢　豆豉五十粒

右細切水二盞煎入分去柤溫服

○常歸龍薈丸治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋惕搐搦神昏不寧榮衛壅滯頭目昏眩肌肉瞤瘈胷膈咽嗌不利腸胃燥澁躁擾狂越罵詈驚駭火熱等証

當歸　草龍膽　梔子　黃連

黃栢　黃芩各一兩　大黃　青黛

蘆薈名半兩　木香一錢　射香五分

右爲細末煉蜜丸如小荳大每服三十丸姜湯送下

○三黃丸治三焦火盛消渴不生肌肉

大黃　黃連　黃芩

右爲細末煉蜜丸如小荳大每服五丸漸加至十丸白湯送下服至一月行及奔馬

丹溪活套云凡去上焦濕熱須酒洗黃芩以瀉肺火如肺有實熱宜用如虛熱而用黃芩則傷肺氣須先用天門冬保定肺氣然後用之○如去中焦濕熱與痛須用黃連以瀉心火若中焦有實熱宜用苦胖胃氣虛不得轉運及中焦有鬱熱者當用茯苓白朮黃芩葛根代之○如胃中煩熱須用梔子實熱者切當若虛熱須用補藥為主人參白朮黃芩芍藥茯苓麥門冬大棗之類○如下焦有濕熱腫痛併膀胱有火邪者須用酒洗防已草龍膽黃栢知母之類固是捷藥若肥白人氣虛者宜用白朮蒼朮南星滑石茯苓之類○如黑瘦之人下焦有濕熱腫痛者必用當歸紅花桃仁牛膝檳榔等藥○柴胡瀉肝火須用片芩佐之片芩又能瀉肺火須用桑白皮佐之若鼠尾者能瀉大腸之火○黃連瀉心火若用豬膽汁拌炒更以草龍膽佐之大能瀉膽中之火○白芍藥瀉脾火若冬月用必以酒浸炒蓋其性之酸寒也○知母黃栢瀉腎火又瀉膀胱之火○梔子瀉三焦之火在上中二焦連殼用在下焦須去殼水洗去黃漿炒焦色研細用之入中白非獨瀉肝火又能瀉三焦火及膀胱之火從小便中出蓋膀胱乃此物之故道

也

○祖傳經驗秘方人中白散治陰虛火盛其五心煩熱等證

人中白二兩　黃柏（鹽酒拌炒褐色）生甘草　青黛各五錢

右為細末每服二錢童子小便調服

○駱氏婦年四十餘夜間發熱早晨退五心煩熱無休止時半年後求予治六脉皆數伏而且牢浮取全不應予與東垣升陽散火湯四貼而熱減太半胃中覺清快勝前再與二貼熱悉退後以四物湯加知母黃柏少佐以炒乾姜服二十餘貼全安

論

內經曰木鬱達之火鬱發之土鬱奪之金鬱泄之水鬱折之張子和曰木鬱達之謂吐之令其條達也火鬱發之謂汗之令其疎散也土鬱奪之謂下之令無壅礙也金鬱泄之謂滲泄解表利小便也水鬱折之謂抑之制其衝逆也此治五鬱之大要耳我丹溪先生觸類而長之而又著為六鬱之証所謂氣血冲和百病不生一有怫鬱諸病生焉此發前人之所未發者也夫所謂六鬱者氣濕熱痰血食六者是也或七情之抑遏或寒熱之交侵故

爲九氣怫鬱之候或雨濕之侵凌或酒漿之積聚故爲留飲濕鬱之疾又如熱鬱而成痰痰鬱而成癖血鬱而成癥食鬱而成痞滿此必然之理也又氣鬱而濕滯濕滯而成熱熱鬱而成痰痰滯而血不行血滯而食不消化此六者皆相因而爲病者也是以治法皆當以順氣爲先消積次之故藥中多因香附撫芎之類至理存焉學者宜知此意

脉法

脉多沉伏　氣鬱則必沉而濇濕鬱則脉必沉而緩熱鬱脉必數痰鬱脉必弦滑血鬱脉必芤而結促食鬱脉必滑而緊盛鬱在上則見于寸鬱在中則見于關鬱在下則見于尺左右亦然　脉或結或促或代

滑氏診家樞要曰氣血食積痰飲一有留滯於其間脉必因之而止節矣但當求其有神何害之有夫所謂有神者即經所謂有中氣也

方法　丹溪方法凡八條

丹溪曰氣血冲和百病不生一有怫鬱諸病生焉其證有六曰氣鬱曰濕鬱曰熱鬱曰痰鬱曰血鬱曰食鬱

氣鬱　戴氏曰胸脇痛脉沉　香附　此味能橫行胸膈必用童便浸焙乾用否則燥

蒼术

撫芎即蘼蕪芎藭苗頭小塊也氣脉上行故能散鬱也

濕鬱戴氏曰周身走痛或關節痛遇陰寒則發脉沉

蒼朮　白芷　川芎　茯苓

熱鬱戴氏曰目瞀小便赤脉沉數

梔子　青黛　香附

蒼朮　撫芎

痰鬱戴氏曰動則喘寸口脉沉滑

海石　香附　南星

瓜蔞子

血鬱戴氏曰四肢無力小便紅脉沉

桃仁　紅花　青黛

川芎　香附

食鬱戴氏曰嚥酸腹肥不能食左寸脉平和右寸脉緊盛

香附　蒼朮　山查　神麯

針砂醋炒鈎畜　或保和丸

諸鬱藥春加防風夏加苦參秋冬加吳茱萸

凡藥在中焦以蒼朮撫芎開提其氣以升之假令食在氣上氣升則食降餘倣此

○越麯丸戴音戈細麪也一名芎朮丸　能解諸鬱

神麯炒　香附童便浸一宿　蒼朮　川芎　越梔炒

右爲細末水丸菉荳大每服五七十丸溫水下

○生韭飲治食鬱久則胃脘有瘀血作痛大能開提氣血

生韭葉一搗取自然汁一盞

右先以生桃仁連皮細嚼十數箇後以韭汁送

下

○六鬱湯解諸鬱

陳皮去白一錢　半夏湯泡七次　蒼朮米泔浸　撫芎各一錢

赤茯苓　梔子炒各七分　香附二錢　甘草炙半錢

砂仁研細五錢分

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞温服○如氣鬱加烏藥木香檳榔紫蘇乾姜倍香附砂仁○如濕鬱加白朮倍蒼朮○如熱鬱加黃連倍梔子○如痰鬱加南星枳殼小皂莢○如血鬱加桃仁紅花牡丹皮○如食鬱加山查神麯麥蘖麪

○升發二陳湯治痰鬱火邪在下焦大小便不利此藥能使大便潤而小便長

陳皮去白一錢　半夏一錢半　茯苓一錢　甘草半錢

撫芎一錢　升麻　防風　柴胡各半錢

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞温服

○升陽散火湯治熱鬱

○火鬱湯二方並見火門

一男子年二十九三月間房事後騎馬渡溪遇深淵沉没幸得馬徒無事連濕衣行十五里抵家次日憎寒壯熱肢節煩疼似瘧非瘧之狀一

醫作虛證治而用補氣血藥服月餘不効又易
一醫作勞瘵治用四物湯加知母黃栢地骨皮
之類及丹溪大補陰丸倍加紫河車服至九月
反加滿悶不食乃顧倩有乳婦人在家止吃人
乳汁四五杯不吃米粒召予診視六脉皆洪緩
重按若牢右手爲甚予作濕鬱處治用平胃散
倍蒼朮加半夏茯苓白朮川芎香附木通砂仁
防風羌活加姜煎服黃昏服一貼一更時又進
一貼至半夜遍身發紅丹如癮疹片時遂沒而
大汗索粥與稀粥二碗由是諸病皆減能食仍
與前方服三貼後以茯苓滲濕湯倍加白朮服

二十餘貼平安

痰飲 十一

論

內經曰諸氣憤鬱皆屬肺金蓋肺氣鬱則成熱熱
盛則生痰
丹溪曰自然成積自積成痰痰挾瘀血遂成窠囊
此爲痞爲痛爲嘔爲腸鳴翻胃之次第也王隱君曰痰
証古今未詳方書雖有懸飲留飲支飲痰飲諸飲
之異而莫知其爲病之源或頭風目昏眩運耳鳴
或口眼蠕動眉稜耳輪瘙痒或四肢遊風腫硬似
痛非痛或爲齒類痒痛牙床浮腫而痛痒不一或

噯氣吞酸嘈雜嘔噦或咽嗌不利咯之不出嚥之不下色似煤炲形如破絮桃膠蜆肉之類或心下如停氷雪心頭冷痛時作或夢寐奇怪鬼魅之狀或足腕痠軟腰背卒痛或四肢骨節煩疼並無常所乃至手麻臂痛狀若挫閃或脊中每有一掌如氷凍之寒痛者或渾身習習如虫行者或眼沿澁痒口糜舌爛甚爲喉閉等證又或遶項結核似癧非癧或胷腹間如有二氣交紐噎塞煩悶有如煙氣上衛頭面烘熱或爲失志顛狂或爲中風癱瘓或爲勞瘵荏苒之疾或爲風痺及脚氣之候或心下怔忡驚悸如畏人將捕或喘嗽嘔吐或嘔冷涎

綠水黑汁甚爲肺癰腸毒便膿攣跛其爲內外疾病非止百端皆痰之所致也蓋津液既凝爲痰爲飲而洶湧上焦故口燥咽乾流而之下則大小便閉塞面如枯骨毛髮焦乾婦人則經閉不通小兒則驚癇搐搦治法宜先逐去敗痰然後看虛實調理故製沉香滾痰丸爲通治三焦痰飲之要藥也愚竊以其論証固詳不問虛實而以一峻藥攻之恐未中乎肯綮也與蓋資稟有厚薄病邪有淺深一或失手何以收救故丹溪有曰治痰用利藥過多致脾氣虛則痰反易生而多矣又曰中焦有食積與痰而生病者胃氣亦賴所養卒不可便攻攻

盡則愈虛而病劇夫痰飲實痰積膠固爲病者若氣體虛弱之人決不可輕用也愼之愼之

脉法

要略云脉雙弦者寒飲也（或大下後善虛）其脉偏弦者飲也○脈飲不弦但苦喘短氣又云脉浮而細滑者傷飲○脉弦數有寒飲春夏難治

脉沉而弦者懸飲內痛

其人短氣四肢歷節走痛脉沉者有留飲

陳無擇云飲脉皆弦微沉滑

或云左右手關前脉浮弦大而實者膈上有稠痰也宜吐之而愈

病人百藥不効關上脉伏而大者痰也眼胞及眼下如煤煙薰黑者亦痰也

丹溪曰久得濇脉痰飲膠固脉道阻澁也卒難得開必費調理

方法（丹溪方法凡十六條）

丹溪曰有熱痰有濕痰有酒痰有食積痰有風痰有寒痰有老痰

○熱痰用青黛黃連及用青礞石丸最捷

○濕痰身多軟而重用蒼朮白朮又曰濕痰用黃芩

香附半夏貝母熟痰加瓜蔞青黛
○酒痰用瓜婁青黛蜜丸噙化
○食積痰用神麯麥蘗山楂或化痰丸消積藥攻之
○風痰用南星白附子
○寒痰用半夏(盧氏註曰凝結清谷其狀若寒非寒也然亦有用溫藥者蓋寒因熱用使引導無捍拒也)瓜蔞五倍子一云五倍子佐他藥大治頑痰
○老痰用海石香附半夏瓜蔞仁杏仁海石桔梗連翹少佐以朴硝之味瓜蔞仁杏仁海石桔梗連翹少佐以朴硝薑汁蜜丸噙化
○痰在肠下非白芥子不能達痰在四肢非竹瀝不行痰在腸胃間可下而愈痰之為物隨氣升降故無處不到
○脉浮當吐痰在膈上必用吐膠固稠濁必用吐痰在經絡中非吐不可吐中就有發散之義
○凡吐法宜先升提其氣用防風山梔川芎桔梗荊茶生薑之類或就以此藥探吐吐時須先以布勒腰腹而於不通風處行之
○吐法用蘿蔔子半升擂和以漿水一碗去相入少油與蜜温服或用鰕半斤入醬葱姜等物料水煮先吃鰕後飲汁少時以鵝翎探吐其鵝翎須

先以桐油浸而以皂角水洗晒乾待用如服瓜蒂藜蘆等藥不用探法自吐

○凡虛弱人中焦有痰胃氣亦賴所養卒不可便攻攻盡則愈虛治痰用利藥過多致脾氣虛則痰反易生而多

○許學士用蒼术治痰挾瘀血成窠囊行痰極効（即神术丸也）

○油炙半夏大治濕痰又治喘止心痛粥丸生薑湯下

○燥濕痰星下丸

南星 半夏 各一兩 海蛤粉三兩

右為細末薑汁浸蒸餅為丸青黛為衣如梧桐子大每服五七十丸白湯送下

○中和丸治濕痰氣熱

蒼术 黃芩 半夏 香附 各等分

右為細末薑汁調神麯糊為丸如梧桐子大每服三五十丸姜湯送下

○小胃丹上可取留膈之痰下可利腸胃之痰能損胃不食胃氣虛而少食者不可用

甘遂（麪裹煨熟去麪） 芫花（醋拌經宿炒黑勿焦） 大黃（酒拌濕紙裹煨熟焙乾再以酒炒潤一兩五錢） 黃柏（炒褐色二兩）

已上各一兩重

大戟（長流水煮一時許洗淨晒乾用）

右爲細末粥丸麻子大每服十丸溫湯送下

○墜痰丸能利痰從穀道中出

風化硝　枳實麩炒黃色　黑牽牛取頭末五錢

生白礬三錢　猪芽皂角去皮弦酥炙黃三錢

一本有貝母三錢

右爲細末蘿蔔汁丸如梧桐子大每服五十丸白湯下鷄鳴時服先見臭次見痰古方無硝枳而用水丸分兩亦不同

○青礞石丸能化痰降痰一云治食積去濕痰

風化硝三錢盆淨者冬月以前化之　茯苓　南星慢火煨裂　青礞石敲碎如骰子大以硝煨黃半夏湯泡七次去皮臍

黃芩各五錢

右爲細末神麯糊入姜汁爲丸如梧桐子大每服三五十丸姜湯送下此藥重在風化硝○一方加蒼术五錢滑石一兩○一方無南星有白术○一方有枳實倍青礞石

○枳實瀉痰能衝墻倒壁黃芩治痰假其下火也天花粉大能降上膈熱痰海粉熟痰能降濕痰燥頑痰能消

○人中青飯丸如菉荳大每服十數丸白湯送下能降陰火清痰又治食積

○痰因火盛逆上治火爲先白术黃芩石膏之類

○凡久病陰火上升津液生痰不生血宜補血制相火其痰自除血藥必用姜汁傳送

○痰成塊吐咯不出氣欝滯者難治

○脾虛者清中氣二陳湯加白朮之類兼用提藥

○實脾土燥脾濕是治其本

○二陳湯一身之痰都管治痰之要藥也欲下行加引下藥上行加引上藥引上柴胡升麻防風之類引下黃柏木通防己之又曰二陳加升提之藥能使大便潤而小便長

陳皮去白一錢　半夏湯泡七次二錢　茯苓一錢　甘草半錢

右細切作一服加生姜三片水一盞煎七分溫服

○導痰湯治風濕痰等証

半夏二錢湯泡七次　南星煨裂一錢　橘紅去白一錢　枳殼麩炒黃色一錢

甘草炙一錢　茯苓各一錢

右細切作一服加生姜五片水一盞半煎至一盞濾服如久嗽肺燥熟者去半夏加五味子九枚杏仁泥五分

○千緡湯治風痰壅盛

半夏湯泡七次七箇　皂角一寸去皮炒黃四破　甘草炙一寸

右細切作一服入生姜三片水一盞煎七分溫服

○利膈化痰丸

南星煨裂　蛤粉
瓜蒌仁去殼　香附童便浸去毛　皂角去皮　半夏湯泡　貝母去心
青黛各等分　杏仁去皮尖炒

右以前六味研爲細末却以皂角杵碎煎濃汁
擂杏仁如泥和以姜汁和蒸餅爲丸如菉荳大
青黛爲衣每服五十丸姜湯送下

○滾痰丸治濕熱食積成窠囊老痰

大黃酒拌蒸　黃芩去朽半斤　各
礞石硝煨黃金色一兩　沉香五錢

右爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服三五十

丸量人強弱加減丸數

○神朮丸治痰飲

蒼朮一斤米泔浸　生芝蔴五錢用水二小盞研細取漿
大棗十五枚煮肉研細

右以蒼朮焙乾爲末然後以芝蔴漿及棗肉和
勻丸如梧桐子大每服五七十丸溫湯下

○黃芩利膈丸除胃中熱利膈上痰

生黃芩　炒黃芩　各一兩　半夏　澤瀉
黃連各五分　天南星煨裂　枳殼麩炒　陳皮去白各三錢
白朮二錢　白礬五分

右爲細末湯浸蒸餅入姜汁和丸如梧桐子大

每服三五十丸食遠溫水下忌酒及濕麵

○燭飲枳實丸逐飲消痰導滯清腸

枳實麩炒 半夏泡 陳皮去白 黑丑半取頭末二兩

右爲末麪糊爲丸如梧桐子大每服五十丸姜湯下

○十棗湯治懸飲內痛

芫花 甘遂 大戟各等分

右爲細末以水一升半煮大棗十枚至八合去棗相調藥末強人一錢弱人半錢平旦服之不下更加五分下後以糜粥調養之河間曰芫花之辛以散飲二物之苦以泄水其甘遂直達水氣所結之處乃泄水之聖藥也然亦有大毒人虛者不可輕用

○三花神祐丸治一切濕熱燥鬱支體麻痺走注疼痛風痰涎嗽氣血壅滯不得宣通等証人壯氣實者可服

甘遂 大戟 芫花醋拌濕炒各半兩 黑丑二兩取頭末

大黃一兩煨一錢粉

右爲細末滴水爲丸如小菩大初服五丸每服加五丸溫水下日三服加至快利利後須服至病根盡除爲度痞悶極甚者若便多服則頓攻不開轉加痛悶則當初服二丸每服加二丸至

快利即止

○控涎丹治患胃脘肋頸項及手足腰膀隱痛不忍筋骨牽引鈎痛時時走易乃是痰涎在胃膈間隨氣升降於經絡中作楚而然或手足冷痺氣脉不通誤認爲癱瘓者

甘遂去心　白芥子主上氣發汗胸膈有痰　大戟去皮

右件各等分爲細末糊丸如梧桐子大每服五十丸淡姜湯下食後臨卧服量病人虛實加減丸數一方名妙應丸治驚痰加硃砂爲衣痛甚者加全蝎酒痰加雄黃全蝎驚氣痰成塊者加穿山甲酆甲玄胡索蓬莪朮辟痛加木鱉子霜桂心熱痰加盆硝寒痰加丁香胡椒肉桂

○半夏丸治肺熱痰嗽

瓜婁仁另研　半夏湯泡七次去皮臍焙乾各一兩

右爲細末和勻姜汁打糊爲丸服

○取竹瀝法　大治熱痰及能養血清熱有痰厥不省人事幾死者得竹瀝灌之遂甦誠起死回生藥也

用水竹旱筐竹俗名雷竹蘇東坡曰淡竹苦竹文耳除苦竹之外皆淡竹也我丹溪先生存日只用此二竹蓋取其爲諸竹中之最淡者以其笋味之甘淡也截長二尺許每段劈作四片以簿磚二塊排定

將竹庁架於磚上兩頭露一二寸下以烈火迫之兩頭以盆盛瀝六分中加姜汁一分服之痰熱甚者止可加半分耳

○取荆瀝法（能治熱痰功勝竹瀝但不補耳○黃荆截作短方炙取瀝同上法）

○丹溪治養云二陳湯一身之痰無所不治但在上加引上藥在下加引下藥如偏頭痛在右本方加川芎白芷防風荆芥薄荷升麻之類在左本方合四物湯亦加防風荆芥薄荷細辛蔓荆子柴胡酒庁芩之類頂痛者本方加川芎藁本升麻柴胡蔓荆子細辛薄荷羌藥如痰在腰胯膝下腫痛本方加蒼术防已木通黃柏萆薢川牛膝之類○如痰在胃腹中作痛或痞滿本方加白术神麯麥芽砂仁之類○如痰在肋下作痛或澼澼有聲本方加柴胡青皮川芎芍藥之類○如痰在經絡中或胃背手足臂膊作痛者在上加防風羌活蔵靈仙在下加防已牛膝木通之類冬月加烏附行經○如風痰壅盛喘急咳嗽不寧本方加防風羌活南星枳殼皂角之類○如熱痰爲病腹脹喘滿本方加黃芩黃連梔子瓜蒌子滑石石膏竹瀝之類○如濕痰身重倦怠本方加蒼术白术南星之類○如酒痰本方加葛根枳損砂仁神麯麥芽之類○寒痰本

方加乾薑附子益智草豆蔻之類○氣痰本方
加木香檳榔砂仁枳殼烏藥香附之類○燥痰
本方加瓜蔞仁杏仁貝母五味子之類○陰虛
咯血痰嗽本方加天門冬麥門冬知母黃栢貝
母款冬花紫菀馬兜鈴之類○如痰在中焦作
噯氣吞酸胃脘當心而痛或嘔清水惡心等証
本方多加白朮蒼朮神麯麥芽川芎砂仁草豆
蔻枳實豬苓澤瀉黃連吳茱萸梔子仁木香檳
榔之類作九服之
○予姪婦何氏在室時四月間因多食青梅得痰飲
病日間胃脘中大痛如刀錐至晚胃中痛止而

膝髀大痛蓋痰飲隨氣升降故也一醫作胃寒
治用乾薑良薑官桂烏附丁沉葦及黃胡椒粥
間與病日劇加之口渴小水淋澁求予治診其
六脉洪數而滑予作清痰熨治令其急烹竹瀝
服三日口不渴小水亦不淋澁但胃中與膝互
痛如舊用蘿蔔子研汁與半碗吐痰半升許至
夜痛尤甚而厥政卄潑所謂引動其猖狂之勢
耳次日用人參蘆一兩逆流水煎服不吐又次
日與苦參煎湯服又不吐又與附子尖桔梗蘆
皆不吐一日清晨藜蘆末一錢入射香少許酸
漿水調與始得大吐至次日天明吐方定前後

得頑痰及稠飲一小桶許其痛如脫後以軟粥將理而安

咳嗽 十二

論

內經曰五藏六腑皆令人嗽非獨肺也皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也五藏之咳久乃移於六腑河間曰咳謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而生痰也嗽嗽謂有痰而有聲蓋因傷于肺氣動于脾濕咳而爲嗽也脾濕者秋傷于濕積于脾也故內經又曰秋傷于濕冬必嗽嗽大抵素秋之氣宜清肅反動之氣必上衝而爲咳甚則動于脾濕發而爲痰焉又曰寒暑燥濕風火六氣甘令人咳惟濕病痰飲入胃留之而不行止入于肺則爲嗽嗽假令濕在心經謂之熱痰濕在肝經謂之風痰濕在肺經謂之寒痰濕在腎經謂之寒痰爲患不同宜隨証而治之是故嗽而無痰者以辛甘潤其肺夫欲治嗽嗽者當以治痰爲先治痰者必以順氣爲主是以南星半夏勝其痰而咳嗽自愈枳殼橘紅利其氣而痰飲自降痰盛而能食者小承氣湯微下之痰盛而不能食者厚朴湯疎導之夏月嗽而發熱者謂之熱嗽小柴胡加石膏知母冬月嗽而發寒

熱謂之寒欬小青龍湯加杏仁此治法之大要也
學者不可不知

脉法

關上脉微爲欬　肺脉微急爲咳而唾血
脉弦濇而欬爲少血　脉緊者爲肺寒
雙弦者寒　脉浮而緊者爲虛寒
脉浮而緩者傷風　脉細者濕　脉數爲熱
脉沉數爲實熱　脉弦爲水　偏弦爲飲
脉沉爲留飲　洪滑多痰
欬脉浮直者生　脉浮濡者生　脉緊者死
沉小伏匿者死　咳而羸瘦脉堅大者死
欬而脫形發熱脉小堅急者死
凡肌瘦脫形熱不去欬嘔腹脹且泄脉弦急者皆
死證也

方法 丹溪方法凡三十八條

丹溪曰欬嗽有風寒有火有勞有痰有肺脹
○風寒者舉發散行痰二陳湯加麻黃杏仁桔梗
之類戴氏曰風寒者鼻塞聲重惡寒是也
○風寒鬱熱于肺夜嗽者三拗湯加知母脉大而
浮有熱加黃芩生姜
○寒咳古方有以生姜切作薄片焙乾爲末糯米
糊爲丸如芥子大空心清米飲下三十九

○聲嘔爲寒（寒包熱也此言感寒而嗽者）宜細辛半夏生姜辛以散之

○風入肺久嗽者用鵝管石雄黃蔚金欵冬花爲末以生姜一片置舌上以藥末拌交於姜上灸之取烟入喉中愈一方有南星佛耳草無蔚金（此即烟筒法小異）

○治嗽煙筒用鵝管石雄黃欵花佛耳草爲末以鷄子清刷帋上捲藥末作筒燒煙以口啣吸煙入喉姜湯送下

○喘嗽遇冬則發此寒包熱也解表熱自除

枳殼　桔梗（各一錢）　麻黃　防風

甘草　陳皮　紫蘇　木通

黃芩（各等分）

如嚴寒去黃芩加杏仁半錢

○感冷則嗽膈上有痰二陳湯加炒枳殼黃芩桔梗蒼朮麻黃木通生姜

○火者主降火清金化痰黃芩海石瓜蔞青黛桔梗半夏香附訶子青皮之類（戴氏曰有聲痰少面赤是也）蜜丸噙化

○乾嗽咳者係火鬱之甚難治乃痰鬱火邪在肺中用苦梗以開之下用補陰降火不已則成勞須行倒倉法此証不得志者有之

○有痰因火逆上者必先治火然亦看痰火孰急若痰急先治痰而後降火也

○勞者主補陰清金四物湯加竹瀝姜汁（戴氏曰盞汁出）

○陰虛火動而嗽四物合二陳順而下之（加炒黃柏知母）

○陰虛喝嗽或吐紅者四物湯加知母黃柏五味子人參麥門冬桑白皮地骨皮

○好色之人元氣虛弱咳嗽不愈瓊玉膏最捷

○肺虛甚者人參膏以生姜陳皮佐之有痰加痰藥

此好色腎虛者有之

（多痰多作寒熱是也）

（尤佳）

○又嗽勞嗽用貝母知母各一兩以巴豆同炒黃色去巴豆用貝母白礬白芨各一兩爲末以生姜一斤蘸藥睡時嚼化藥盡嚼姜嚥之麥門冬陳皮阿膠珠各等分蜜丸嚼化又方有人參五味子

○欬嗽聲嘶者乃血虛受熱用青黛蛤粉蜜調服之

○醫說內一方治痰嗽用蚌粉新瓦上炒通紅拌入青黛少許以淡薑水滴入麻油數點調服

○痰者主豁痰（戴氏曰嗽動便有痰聲痰出嗽止是也）

○痰嗽用半夏瓜蔞子各五兩貝母桔梗各二兩知母一兩枳殼一兩半爲細末生姜汁浸蒸餅爲丸服

○一方黃芩一兩半酒洗白芥子去殼滑石各五錢貝母南星各一兩風化硝二錢半姜汁浸蒸餅爲丸青黛爲衣

○痰多喘嗽白朮半夏蒼朮香附杏仁各一兩黃芩五錢爲末姜汁調麪糊爲丸服

○痰嗽因酒傷肺瓜蔞仁杏仁（俱杵泥）黃連爲末以竹瀝入紫蘇葉煎開入韭汁調丸服○一方用青黛瓜蔞蜜丸嚥化以救肺

○久嗽有積痰留肺脘中如膠氣不能升降或挾濕與酒而作茜根（俗名過山龍）童便浸僵蠶炒海粉瓜蔞仁蜂房杏仁神麯爲末姜汁竹瀝調嚥化

○痰嗽氣急蒼朮三兩香附一兩半蘿蔔子蒸杏仁瓜蔞仁半夏各一兩黃芩茯苓各五錢川芎三錢九服

○嗽而有痰宜灸天突肺腧穴以泄火熱瀉肺氣

○食積痰嗽發熱半夏南星爲君瓜蔞蘿蔔子爲臣青黛海石石醯爲使姜汁浸蒸餅丸服

○食積痰嗽三補加二母炒爲末丸如椒核大以竹瀝藕汁吞之（三補芩連梔也二母知貝母也）

○肺脹者主收斂（戴氏曰動則喘滿氣急自重者是也）

○肺因火傷極遂成欝遏脹滿用訶子爲君佐以海粉香附青黛杏仁之類

○肺脹欝遏不得眠者難治

○凡嗽春是春升之氣夏是火炎於上秋是濕熱傷肺冬是風寒外來用藥發散之後必以半夏等藥逐去其痰庶不再作

○早晨嗽多者此胃中有食積至此時火氣流入肺中以知母地骨皮降肺火上半日嗽多者胃中有火知母石膏降之午後嗽多者屬陰虛四物湯加知母黃栢先降其火黃昏嗽多者火氣浮乘肺不宜用涼劑以五味五倍斂而降之

○嗽而脇痛宜以青皮疎肝氣後以二陳湯加南星香附青黛姜汁○一云實者白芥子之類

○嗽而心煩不安六一散加辰砂服

○嗽而失聲潤肺散

訶子肉　五倍子　五味子　黃芩

甘草各等分　右爲細末蜜丸噙化

○嗽而無聲有痰

半夏　白朮　五味子　防風

枳殼　甘草

○嗽而有聲無痰

生姜　杏仁　五味子　升麻

防風　桔梗　甘草

○嗽而有痰有痰

白朮　半夏　五味子　防風

久不愈加枳殼阿膠珠

○寒熱交作而痰嗽者小柴胡加知母之類一方加白芍藥五味子桑白皮

○陰氣在下陽氣在上欬嗽嘔吐喘促瀉白散加青皮五味子人參茯苓粳米

○熱嗽胃滿小陷胃湯方見傷寒門

○治嗽刼藥五味子湯

五味子五錢　甘草一錢半　五倍子　風化硝各一錢

右爲末蜜丸噙化或用訶子百藥煎荊芥穗蜜丸噙化

○治嗽最要分肺虛肺實若肺虛久嗽宜五味子款冬花紫菀馬兜鈴之類補之若肺實有火邪宜黃芩天花粉桑白皮杏仁之類以瀉之

○東垣曰治嗽必用五味子爲君然有外邪者驟用之恐閉住其邪氣必先發散之而後用之可也

○治嗽用訶子味酸苦有收斂降火之功五味子收肺氣乃火熱必用之劑杏仁散肺氣風熱然肺實有熱因於寒者爲宜桑白皮瀉肺氣然性不純良用之多者當戒

或用馬蔸鈴以其去肺熱補肺也多用生姜以其辛能發散也瓜蔞子甘能補肺潤能降氣胃

中有痰者以肺受火逼失降下之令今得甘緩潤下之助則痰自降宜其爲治嗽之要藥也

○瓊玉膏治虛勞乾欬嗽

人參十二兩　白茯苓去皮淨者二十五兩　白砂蜜五斤煎沸去沫　生地黃去蘆淨者十斤洗淨銀石器內杵細取自然汁大係鉄器　沉香五錢　琥珀五錢　臞仙曰今予所製此方加沉香琥珀二味其功効異於世傳之方

右以人參茯苓沉香琥珀俱爲細末先將地黃汁與白砂蜜攪勻用密絹攄去細柤入藥末攪勻入好磁瓶或銀瓶內用綿紙十數層外加箭箬包封扎瓶口入砂鍋內或銅鍋內以長流水

浸沒瓶頸用桑柴文武火煑三晝夜取出換蠟帋數重包扎瓶口浸沒井中半日以出火毒提起仍入前鍋內煑半日以出水氣然後收藏每日清晨及午前後取一二匙用溫酒一盞調服不飲酒人白湯亦可此法須用不聞鷄犬聲處煆煉之及不許孝子婦人見之

○九仙散治一切咳嗽久嗽乃擊其惰歸之藥也

人參　欵冬花　桑白皮　桔梗

阿膠炒成珠子　五味子各一錢　烏梅一箇　貝母半錢

罌粟殼去穰蒂蓋蜜炙二錢

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞

局方

温服

○三拗湯治風寒咳嗽喘急

麻黃不去根節　甘草生用　杏仁不去皮尖另研細各一錢半

右細切作一服加生姜五片棗二枚水一盞半煎至一盞温服痰滑乃止

局方

○温肺湯治肺感寒邪咳嗽吐痰

半夏泡　陳皮去白　五味子　乾姜泡

桂心各五分　杏仁去皮炒研五分　北細辛　阿膠炒成珠

甘草炙各二分半

右細切加生姜三片大棗二枚水一盞半煎至一盞去柤温服愚按此方乃冬月寒冷之時觸冒寒邪而未鬱熱者極効如久嗽鬱熱者切不可用

○杏蘇飲治上氣喘嗽面目浮腫

紫蘇葉七分　五味子　大腹皮酒洗淨

烏梅肉　杏仁泥各五分　陳皮去白

桔梗　麻黃去根節　桑白皮蜜炙

阿膠珠各二分半　紫菀茸二分半　甘草炙一分

右細切加生姜五片水一盞半煎至一盞温服

丹溪活套云二陳湯治欬嗽去痰伐病根之藥也除陰虛血虛火盛乾欬嗽者勿用○如血虛有痰者本方合四物湯加五味子麥門冬瓜婁仁之類

○如傷風邪咳嗽本方加南星枳殼防風荊芥前

胡細辛旋覆花之類○如傷寒邪欬嗽本方加麻黃杏仁桔梗乾姜桂枝之類○如傷熱邪咳嗽本方加黃芩苛薄知母石膏桔梗之類○如先傷風寒鬱熱久嗽不已欲成勞者本方加知母貝母款花紫菀五味子天麥二門冬馬兜鈴當歸生地黃之類○如傷風寒喘嗽並作本方加麻黃杏仁防風荆芥枳殼桑白皮桔梗地骨皮紫蘇之類○如欬嗽聲嘶引兩脇痛不可忍者本方加芎歸芩藥青皮柴胡草龍膽黃芩竹茹之類○如年久喘嗽遇風寒則發作者本方加紫菀款花桑白皮杏仁五味子知母石膏之類○不問風寒鬱熱勞欬久嗽曾先服麻黃杏仁防風等藥病雖退減而病根未除者本方加粟殼烏梅阿膠五味子瓜蒌仁之類可一服而愈○凡諸嗽須分氣虛氣實新久用藥如新欬欬挾虛者可用久嗽已鬱熱者切不可用人參反增喘滿欬劇如肺虛久嗽加五味子欵冬花紫菀茸馬兜鈴之類以補之若肺實而有火邪者宜桑白皮片黃芩天花粉杏仁枳殼桔梗之類以瀉之○祖傳經驗潤肺除嗽飲治遠年欬嗽如神

人參　杏仁　生甘草　薄荷　各三分
五味子九粒　欵花　紫菀茸　麻黃

陳皮去白　石膏粉　桔梗　半夏
桑白皮蜜炒　枳殼麩炒　烏梅　粟殼去穰蜜炙各五分
右細切加生姜三片細茶一撮水一盞半煎至
一盞服

○祖傳三聖丹治久嗽極効
天南星煨製一兩　半夏湯泡七次二兩　甘草生用半兩
先以星夏二味研爲細末用生姜自然汁拌勻
盦作麯春秋七日冬十日夏五日取出再同甘
草共研爲細末別取淡竹瀝一碗將前藥末用
竹瀝拌捏作餅子焙乾又將竹瀝沃濕又倍乾
如此沃焙十數次待竹瀝盡爲度研爲極細末
用白沙蜜調如餳每臨卧抄一時於口內噙化
下再用竹瀝漱口嚥之

哮喘　十三

論

內經曰諸逆衝上皆屬於火又曰夫起居如故而
息有音者此肺之絡脉逆也河間曰火氣甚爲夏
熱衰爲冬寒故病寒則氣衰而息微病熱則氣盛
而息麤又寒水爲陰主乎遲緩熱火爲陽主乎急
數是以寒則息遲氣微熱則息數氣麤而爲喘也
大抵哮以聲響名喘以氣息言夫喘促喉中如水
鷄聲者謂之哮氣促而連屬不能以息者謂之喘

雖然未有不由痰火內鬱風寒外束而致之者與外有陰虛發喘氣從臍下起直衝清道而上者又有氣虛發喘而炬氣不能以接續者是故知喘之為証有實有虛治法天淵之隔者也若夫損不足而益有餘者醫殺之耳學者不可不詳辨焉

脉法

喘急脉滑而浮者生　濇而數者死

脉宜浮遲不宜急數

脉數有熱喘咳吐血上氣不得卧者死

上氣面浮腫肩息脉浮大不治又加脹尤甚

上氣躁而喘者為肺脹欲作風水發汗則愈一云

咳而上氣肺脹其脉浮而濇

寸口伏留中有逆氣尺寸俱沉關上無有者苦心下喘

方法 丹溪方法凡十四條

丹溪曰喘急者氣為火所鬱而稠痰在肺胃也有痰者有火炎者有陰虛自小腹下火起而上逆者有氣虛而致氣短而喘者

○哮專主於痰宜用吐法亦有虛而不可吐者謹之

○治哮必使薄滋味不可純用寒涼藥必兼散表

戴氏曰痰者凡喘便有痰聲火炎者下進作退得食則喘大緊胃中有實火膈上有

稠痰得食墜下其痰喘則暫止稍久食已入胃反助其火痰再升上喘反大作俗不知此作胃虛治以燥熱之藥以火濟火也昔葉都督患此証諸醫作胃虛治之不愈後以導水丸利五六次而安氣短喘息者呼吸急促而無痰聲又有胃虛喘者攣肩拮肚喘而不休者是也

○痰者降痰化氣爲主　火炎者降心火清肺金

陰虛痰喘者補陰降火四物湯加枳殼半夏一云陰虛氣喘四物湯加陳皮甘草些少以降氣補陰白芍藥須以酒浸日乾忌火

○氣虛發喘以參芪補之而愈

○凡久喘未發時以抉正氣爲主已發以攻邪爲主

○喘急甚者不可用苦寒藥火盛故也宜溫劫之劫藥用椒目五七錢研爲極細末生姜湯調服喘止之後因痰治痰因火治火

○千緡湯治痰喘不得卧人抉而坐數日一服而安方見痰門

○一方用導痰湯合千緡湯服

○一方用蘿菔子二兩蒸熟皂角五錢燒存性瓜蔞仁海粉南星用白礬一錢半研細入水浸一宿曝乾各一兩爲末煉蜜爲丸噙化一方無南星瓜蔞海粉

○一方治喘而嗽用南星瓜蔞半夏香附橘紅蘿菔子青黛皂角爲末神麯糊丸姜湯送下一方有杏仁

○喘用阿膠須分虛實若久病發喘必是肺虛故用阿膠人參五味子之類補之若新病肺實而發

喘者宜桑白皮葶藶子麻黃杏仁之類瀉之東垣曰久嗽鬱熱在肺不用人參新病未成鬱熱者用人參未知孰是

○氣實人因服黃芪過多而喘者宜服三拗湯以瀉氣

○三拗湯治肺感風寒喘急不已方見咳嗽門

○葶藶大棗瀉肺湯治肺壅脹胷膈滿悶上氣喘急身體面目浮腫等証

○葶藶子不拘多少炒黃爲末煉蜜丸如彈子大

右以水三盞大棗十枚煎至二盞去棗入葶藶一丸再煎至一盞溫服之

○濟生葶藶散治過食煎煿或飲酒過度致肺壅喘不得卧及肺癰咽燥不渴濁唾腥臭

甜葶藶子炒　桔梗去蘆　瓜蔞子　升麻

薏以仁　桑白皮蜜炙　葛根各八分　甘草四分

右細切作一服加生姜五片水一盞半煎至一盞溫服

○瀉白散治大人小兒風寒傷肺喘急欬嗽

桑白皮一錢　地骨皮一錢　生甘草半錢

右細切作一服加姜水煎服　一方加防風荊芥各七分半又方加麻黃杏仁各半錢其効尤捷

○祖傳經驗秘方治遠年喘急

桑木內蠹虫糞一升炒　蘿菔子半升炒
杏仁半升不去皮尖炒　甘草二兩生
右爲極細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服
五七十丸淡姜湯送下
○又方治哮喘用苧麻根和砂糖爛煑時時嚼嚥下
求絕病根神効
○又方用猫兒頭骨燒灰酒調二三錢一服便止
○又方用郭公莓刺根煎服即止而不發
○東陽一羽士年五拾餘素有喘病九月間得發熱
惡寒証喘甚脉洪盛而似實一醫作傷寒治而
用小柴胡湯加枳殼陳皮等藥六日後欲行大
承氣一醫曰不可當作傷食治宜用枳實導滯
丸爭不決召予視之二醫皆曰脉實氣盛當瀉
予爲診後曉之曰此火盛之脉非眞實也觀其
短氣不足以息當作虛治而用補中益氣湯加
麥門冬五味子入附子三分煎服二貼脉收斂
四貼而病輕減六貼病痊安

瘧証 十四

論

內經曰夏傷於暑秋爲痎瘧又曰先寒而後熱者
名曰寒瘧先熱而後寒者名曰溫瘧其但熱而不
寒者名曰癉瘧丹溪曰痎瘧皆生於風痎瘧者老

瘧也以其隔二日一作纏綿不去古方多用峻劑恐非禀受怯弱與居養所移者所宜殆悟常山烏梅砒丹劫劑或誤投之輕病變重重者必危夫三日一作者邪入於三陰經也作於子午卯酉日者少陰瘧也作於寅申巳亥日者厥陰瘧也作於辰戌丑未日者太陰瘧也瘧得於暑當以汗解或因取涼太過汗欝成痰其初感也弱者即病胃氣強者伏而未動至於再感復因內傷其病乃作宜其難差夫感暑與風皆外邪也故非汗多不解今之遘此疾者已經再三劫試胃氣重傷何由得愈欲治此證必先與參朮等補劑爲君加柴葛芩發散藥漸而收汗得汗而虛又行補養下體屬陰最難得汗補藥力到汗出至足方是佳兆又有感病極深邪氣必自臟傳出至腑其發無時若發於午之後寅之前者血受病也爲易秋冬爲難大忌飽食遇發也治斯疾者春夏爲易秋冬爲難大忌飽食遇發日食飽病愈加重尤當以汗之難易較輕重也內經又曰瘧之且發也陰陽之且移也必從四末始陽已傷陰從之故先其時堅束其處令邪氣不得入陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之（用三稜針視孫絡出血）此直往而未得併者也故今人多以諸般草藥於臂膊內縛之即此遺意耳外有

陰虛證每日午後惡寒發熱至晚亦得微汗而解脉必虛濡而數且瘧脉弦而虛脉不大弦爲辨耳若誤作瘧治而用常山砒丹及柴胡乾葛等藥多至不救醫者宜以脉証參驗其虛實而療之毋縱巨膳以殺人也

脉法

要略曰瘧脉自弦弦數多熱弦遲多寒弦而小緊者下之瘥弦遲者宜温弦緊者可發汗鍼灸浮大者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之

脉經云瘧脉自弦微則爲虛代散則死

方法 丹溪方法凡十六條

丹溪曰有暑瘧有風瘧有濕瘧有痰瘧有食瘧三日一發者受病一年間日一發者受病半年一日一發者受病一月連發二日住一日者氣血俱受病俗名脾寒乃因名而迷其實也苟因飲食所傷而得之未必是寒況其他乎

○暑瘧宜人參白虎湯之類

○有痰者二陳湯加常山草菓柴胡黃芩

○不能食者必於飲食上得之當從食治

○虛者必用參朮一二貼托住其氣不使下陷後用他藥若無汗要有汗散邪無主帶補若有汗要無汗扶正氣爲主帶散

○數發之後便宜截而除之又則發得中氣虛弱病邪已深而難治世有砒丹等截藥有大毒不可輕用

○大渴大熱用小柴胡去半夏加知母麥門冬黃連黃栢梔子天花粉

○瘧渴用生地黃麥門冬天花粉牛膝知母炒黃栢乾葛生甘草

○又瘧二陳湯加川芎蒼朮柴胡葛根白朮一補一發藥也

○甚者發寒熱頭痛如破渴而飲水多汗可以參芪荇連梔子川芎蒼白朮之類治之

○痰滯胃滿熱多寒少大便燥實大柴胡利之愈

○又瘧不得汗以二陳湯倍加蒼朮白朮少加檳榔

○小兒瘧疾者有痞塊生地黃芍藥各一錢半陳皮川芎炒黃荇半夏各一錢甘草二分加生姜煎調醋炙鱉甲末

○瘧毋用九藥消導之醋鱉甲爲君三稜蓬朮香附海粉青皮桃仁紅花神麯麥芽隨證加減爲丸醋湯送下

○老瘧係風暑入在陰分宜用血藥引出陽分而散川芎撫芎當歸紅花蒼白朮白芷黃栢甘草煎露一宿服之

○痎瘧老瘧也三日一發陰經受病也夫瘧得於暑當以汗解或處涼冷汗不得泄鬱而成痰又復嗜慾縱飲及輕試刼藥胃氣大傷其病難愈必先與參朮陳皮芎藥等劑佐以本經引用之藥若得汗而體虛又須重補俟汗通身不過委中方是佳兆仍節飲食避風寒遠房勞無不愈者

○截瘧常山飲

川常山　草菓　檳榔　知母

炙甘草　烏梅　穿山甲（慢火煨胖）

右各等分細切每服五錢水酒各半盞煎至八分露星月一宿清晨冷服之欲吐則順之忌熱湯一日然常山性慕悍善驅逐痰飲大傷眞氣病人稍虛弱者戒勿輕用

○截瘧七寶飲

常山（一錢）　厚朴　青皮　陳皮

炙甘草　檳榔　草菓仁（各半錢）

右細切作一服酒水各半盞寒多加酒熱多加水煎八分露星月一宿空心冷服忌熱茶湯一日至午食溫粥

○東垣曰夏月天氣上行秋月天氣下行治者當順天道如先寒後熱太陽陽明病白虎加桂也此天氣上行宜用之若天氣下行則不宜瀉肺宜

瀉命門相火則可矣亦有內傷冷物而作者當
先調中後定瘧形治隨應見乃得康寧亦有久
卻疾此之謂也
太陽証令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熇
熇暴暴然熱止汗出難已羌活加生地黃湯
小柴胡加桂湯
陽明證令人先寒洒洒浙寒甚久乃熱熱去汗出
喜日月光火氣乃快然桂枝二白虎一湯黃
芩芍藥加桂湯
少陽證令人身體解佁寒不甚熱不甚惡見人

見人心惕惕然熱多汗出甚小柴胡湯
太陰證令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出
病至則善嘔嘔已乃衰小建中湯異攻散
少陰證令人悶嘔吐甚多寒熱熱多寒少欲閉
戶牖而處其病難已小柴胡加半夏湯
厥陰證令人腰痛小腹滿小便不利如癃狀數
便思恐懼氣不足腹中悒悒四物玄胡苦練
附子湯
○白虎加桂枝湯治溫瘧

知母 四錢　甘草一錢　石膏五錢　桂枝一錢
粳米一合

右以水三盞煎米至二盞去米入諸藥再煎至一盞溫服三服汗出愈

○溫脾散治久瘧不愈

紫河車俗名金線重樓 菉豆各一兩 甘草半兩

信砒一兩半研細

右爲細末入砒一處研勻每服半錢新汲水少許調下須於發日隔夜夜深服藥忌葷酒瓜菓生冷魚腥鷄肉等物三日孕婦勿服但至誠合此藥與人並不吐此雖有砒一味而有河車菉豆甘草三味及新汲水皆能解毒不妨

按已上二方刼病之捷勝於他方但虛弱或久病羸瘦之人終不可輕用如服上藥吐不止者以生菉豆細研新汲水調飲多即止

○丹溪活套云凡瘧証或連日或間日發作惡寒發熱腰背頭項俱痛此屬太陽經瘧也宜二陳湯加麻黃羌活藁本防風之類○如連日或間日發作先寒後熱或寒少熱多或但熱不寒目痛鼻孔燥此屬陽明經瘧也宜用二陳湯加乾葛升麻石膏知母白芷之類○如連日或間發作或先寒後熱或寒熱間作脇痛口苦或嘔吐惡心此少陽經瘧也宜二陳湯倍加柴胡及黃芩

入參青皮之類○如於子午卯酉日發寒熱嘔吐舌乾口燥此少陰經瘧也宜二陳湯加川芎黃栢黃連柴胡之類○如辰戌丑未日發寒熱嘔吐不嗜食或腹滿自利此太陰經瘧也宜二陳湯加蒼白术柴胡芍藥之類○如於寅申巳亥日發惡寒發熱寒多熱少或腰痛引陰如淋狀善恐此厥陰經瘧也宜用二陳湯加桂枝附子乾姜之類大抵瘧屬三陽宜汗宜吐麻黃葛根柴胡常山草葉烏梅之屬治之瘧屬三陰宜下宜温宜和大柴胡湯柴胡桂姜湯柴胡四物湯附子理中湯之類選而用之

○祖傳經驗截法神方

木通　秦艽　常山　川山甲醋炙黃各一錢

辰砂半錢另細　烏梅七箇　大棗七箇

右細切以水三盞煎至一盞先以棗和辰砂末食後服藥

○一方用常山草菓知母檳榔柳各一錢酒一盞浸一日臨發日早服

○又方治久瘧不愈一服便止永不發其効如神

常山一半錢　丁香半錢　烏梅一箇

右細切作一服用好酒一盞浸一宿臨發日清晨飲之

○予壯年過杭同舟有二男子皆年踰四十五各得
咳嗽三年矣俱發於寅申巳亥日一人晝發於
巳而退於申一人夜發於亥而退於寅予曰但
到杭可買藥俱與痊可晝發者乃陰中之陽病
宜補氣解表與小柴胡湯倍柴胡入參加白朮
川芎葛根陳皮青皮蒼朮夜發者爲陰中之陰
病宜補血疎肝用小柴胡合四物加青皮各與
十貼教其加姜棗煎於未發前二時服每日一
貼服至八貼同日得大汗而愈永不再舉

論

癨亂 十五

內經曰歲土不及風乃大行民病飧泄霍亂體重
腹痛筋骨經脇陳無擇曰霍亂者心腹卒痛嘔吐
下利憎寒壯熱頭痛眩暈先心痛則先吐先腹痛
則先利心腹齊痛吐利並作甚則轉火入腹即死
蓋陰陽反戾清濁相干陽氣暴升陰氣頓墜陰陽
否隔上下奔趨河間曰吐瀉不止者其本在於中
焦或因渴而大飲飲而過量或因飢而始食食而
過飽以致濕熱內甚故陰陽交錯而不和是爲吐
瀉仲景曰邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中
焦則既吐且瀉此爲急病也然吐利爲急十死其
一二如揮霍撩亂而不得吐瀉者此名乾霍亂也

多死法曰既有其入必有所出今有其入而不得其出者否塞也故轉筋吐瀉者其氣有三一曰火二曰風三曰濕大抵霍亂吐瀉之證皆風木濕熱之爲害耳治法宜分利陰陽散風行濕而降火也又當引清氣上升使濁氣下降無有不安仲景又曰熱多欲飲水五苓散寒多不飲水理中丸河間亦曰凡覺此証急用五苓益元散桂苓甘露飲乃吐瀉之聖藥也慎勿與粟米粥湯入胃必死丹溪曰內有所積外有所感陽不升陰不降垂隔而成非因鬼邪旨飲食所致此先哲確論也切勿與穀食雖米湯一呷下咽立死必待吐瀉止過半日飢甚乃可與稀粥少食以漸而將息也學者詳之

脉法

脉微而澁　或代而散　或隱而伏　或大而虛

脉右關滑爲霍亂吐瀉脉結促代皆不可斷以死

脉大者生　脉微弱漸遲者死

脉洪者爲熱　脉弦者爲飲

氣口脉弦滑膈間有宿食留飲宜順其性以鹽湯探吐之

方法 丹溪方法凡七條

丹溪曰大法生姜理中湯最好

有宜吐者雖自吐利還須以吐法提其氣用二

陳湯探吐或樟木層煎湯或塩湯皆可吐之

○一方蒼朮厚朴陳皮乾葛各一錢半水煎服

○或用姜湯下保和丸四五十粒

○轉筋屬血熱四物湯加酒芩紅花蒼朮南星煎服

○轉筋男子以手挽其陰女子以手牽乳兩傍此千金妙法也

○乾霍亂忽然心腹痛疠欲吐不吐欲瀉不瀉者是也俗名疠腸沙即是難治死在須臾升降不通故也宜吐以提其氣最是良法內有物所傷外爲邪氣所遏大法宜發汗有用吐法者即兼發散之義有用溫藥解散者二陳湯加川芎蒼朮防風白芷等解散藥也

○委中穴出血或十指頭出血皆是良法

○桂苓甘露飲五苓散二方並見中暑門

○半夏湯治霍亂轉筋吐瀉不止

半夏麯　茯苓　白朮各五錢　淡桂二錢半

炙甘草一錢

右爲細末每服二錢渴者以涼水調下不渴者以溫水調下不拘時候

○理中丸

白朮　人參　乾姜　甘草各等分

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸涼水化下

○六和湯治霍亂吐瀉不止

白朮　半夏　砂仁
杏仁　人參　甘草　各五分
赤茯苓　藿香
木瓜各一錢　香薷　白扁豆妾汁拌炒
右細切加生姜三片大棗一枚水二盞煎至一盞溫服　厚朴姜汁製炒各二錢

○漿水散治暴泄如水周身汗出盡冷脉弱不能言語甚而吐逆不止

半夏二錢　附子　乾生姜　炙甘草
桂心各半錢　良姜二分半

右細切作一服漿水煎服之

○姜附湯治霍亂吐瀉轉筋手足厥冷多汗方見傷寒門

○理中湯治過食生冷遂成霍亂吐瀉食不消心腹滿悶不快加青皮陳皮名治中湯更加丁香附子名丁香治中湯宜臨病斟酌施治方見傷寒門

○祖傳灸法治霍亂已死而胷中尚有暖氣者灸之立甦

其法以塩填滿臍孔灸之不計壯數

○又法治霍亂吐瀉不止灸天樞氣海中脘四穴立愈

天樞二穴在臍心兩傍各開二寸　氣海一穴

在臍下一寸半　中脘一穴在臍上四寸

○洗法治霍亂轉筋用大蓼一握水煮薰洗立効

○丹溪活套云凡霍亂不渴用生姜理中湯如渴用五苓散加五味子麥門冬滑石轉筋用四物湯酒芩紅花南星蒼朮又云冬月用理中湯夏月用黃連香薷散放井中浸水冷頓服乃効　一方治吐瀉用藿香蒼朮厚朴陳皮砂仁白芷甘草半夏茯苓人參炒神麯各等分水煎遇寒加乾姜寒甚加附子

泄瀉　十六

論

內經曰濕勝則濡泄又曰春傷於風夏必飧泄又曰暴注下迫皆屬於熱又曰諸病水液澄徹清冷皆屬於寒叔和云濕多成五液是故知風寒濕熱皆能令人泄瀉但濕熱良多而風寒差少耳原病式曰瀉白爲寒青黃赤黑爲熱也大抵瀉利小便清白不澁爲寒赤澁爲熱又大便完穀不化而色不變吐利不腥穢水液澄徹清冷小便清白不澁身冷不渴脉遲細而微者皆寒証也凡穀肉消化無問色及他證便斷爲熱夫寒泄而穀消化者未之有也或火性急速傳化失常完穀不化而爲飧泄者亦有之矣仲景曰邪熱不殺穀然熱得濕則

爲飧泄也噫寒熱二證永炭相反治之者差之毫
厘謬以千里者也醫者可不謹乎

脉法

内經曰脉細皮寒少氣泄利前後飲食不入是爲
五虛死其漿粥入胃泄注止則虛者活

脉經曰泄注脉緩時小結者生浮大數者死
又洞泄食不化不得留下膿血脉微小流連者
生勁急者死

脉訣云下利微小則爲生脉大浮洪者無差日

方法 丹溪方法凡十二條

丹溪曰泄屬氣虛有火有痰有食積者

戴氏曰凡瀉水腹不痛者濕也飲食入胃不住完穀不化者氣虛也腹痛瀉水腸鳴痛一陣瀉一陣者火也或瀉或不瀉或多或少者痰也腹痛甚而瀉瀉後痛減者食積也

○燥濕四苓散加蒼朮倍白朮甚者二朮炒爲末米
飲調服

○氣虛用人參白朮芍藥

○火宜伐火利小水四苓散加滑石黃芩梔子木通

○痰宜伐痰海石青黛黃芩神麯爲丸服或用吐以
提其清氣

○食積宜消導疎滌之神麯大黃枳實之類

○水瀉用蒼朮厚朴陳皮炒麯茯苓猪苓澤瀉地榆
甘草冬加乾姜等分煎服

○泄瀉水多者必用五苓散

○夏月水瀉桂苓甘露飲二方並見暑門

○治泄瀉諸藥多作丸子効

○脾胃不和泄瀉者胃苓湯五苓合平胃散是也

○世俗例用澁藥治瀉若病久而虛者或可若初得者必變他證爲禍不小殊不知瀉多因於濕分利小水爲上策也

○清六丸治泄瀉

六一散一料加紅麯伍錢

右爲細末湯浸蒸餅爲丸服

○溫六丸治泄瀉或兼嘔吐者

六一散加乾姜或生姜汁亦可蒸餅丸服

○姜麯丸治食積瀉

陳麯　茴香各五錢　生姜一兩

右爲細末蒸餅丸服

○止瀉方

肉豆蔻五錢　白滑石春冬一兩二錢半夏二兩五錢秋二兩

右爲細末姜汁調神麯作糊爲丸服

○脾泄丸

白朮　神麯　芍藥並炒各等分

冬加肉荳蔻去芍藥爲細末神麯糊爲丸服

○茯苓湯治因傷冷飲水泄瀉注下一夜十餘次變

作白痢或變赤白相雜腹中疠痛食減熱燥四肢沉困無力

生黃芩一半錢　當歸二錢　肉桂　炙甘草各二分半
猪苓　茯苓各三分　澤瀉五分　芍藥七分半
蒼术　生甘草　升麻　柴胡各一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞稍熱食前服

○黃芪補胃湯治一日大便三四次溏而不多有時作泄腸中鳴小便黃

黃芪　柴胡　當歸身　益智
橘紅各一錢半　升麻二錢　炙甘草半錢　紅花少許

右切細作一服水二盞煎至一盞稍熱食前服

○升麻除濕湯自下而止者引而去之

蒼术一錢　柴胡　羌活　防風
升麻　神麴　澤瀉　猪苓各五分
炙甘草　陳皮

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗空心服

如胃寒腸鳴加益智仁半夏各五分生姜三片大棗一枚同煎非腸鳴勿用

○劉草窗治痛泄要方

白术二兩炒　白芍藥二兩炒　陳皮一兩半　防風一兩

右細切分作八服水煎或丸服又瀉加升麻六錢

○白朮芍藥湯治太陰脾經受濕水泄注下體重微滿困弱無力不欲飲食水穀不化宜此和之身重暴下是大勢來亦宜和也

白朮　白芍藥各四錢　甘草二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

○茯苓湯治濕瀉又治食積濕熱作瀉

白朮　茯苓各五錢

右細切作一服水煎食前服一方有芍藥三味各等分名白朮散為末米飲調下

○蒼朮芍藥湯治証如前

蒼朮五錢　芍藥二錢半　黃芩一錢半　淡桂五分

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

○防風芍藥湯治飧泄身熱脉弦腰痛微汗

防風　芍藥　黃芩各二錢

右細切作一服水煎空心服

○蒼朮防風湯治泄瀉脉弦頭痛

蒼朮二錢　防風一錢　白朮四錢　麻黃一錢

右細切作一服加生姜五片水二盞煎至一盞食前服

○良方神朮散治春傷於風夏必飧泄之證

蒼朮一錢半　藁本　川芎各六分　羌活四分

甘草炙三分　細辛二分

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞
去柤温服如欲汗加葱白三莖
○胃風湯治證如前及治風冷衆虛入客腸胃米穀
不化泄瀉注下及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀
血或如魚腦日夜無度又不得愈者方見中風門
○舟溪居養云泄瀉注下如水用生料五苓散加蒼
朮車前子倍白朮爲末米湯調服○濕熱甚下
泄如熬湯者本方去桂加滑石黄芩梔子木通
之類○如腹中疼痛下泄清冷喜熱手盪熨口
不燥渴乃寒泄也本方倍桂加肉豆蔻有氣加
木香病甚者更加丁香附子依九服○如久泄

穀道不合或脫肛此元氣下陷及大腸不行收
令而然用白朮芍藥神麯陳皮肉豆蔻訶子肉
伍倍子爲梅爲九以四君子湯加防風升麻煎
湯送下○如食積時常腹痛瀉積先以木香檳
榔丸或東垣枳實導滯丸推逐之而後以四苓
加厚朴蒼朮神麯麥芽之類作九服之以安胃
氣○如瀉水腹不痛者屬氣虛宜四君子湯倍
白朮加黄芪升麻柴胡防風之類補以提之而
愈
○祖傳經驗秘方治暴泄注下用
車前子一兩微炒 右一味研 細末清米飲調服

62-73
53

○又方治腹痛泄瀉用

艾葉　車前葉各一掘陰乾

右先將二葉細切用水二盞煎至一盞去柤入

姜汁再煎一沸稍熱服立愈

一人泄瀉日夜無度諸藥不効偶得一方用針沙地龍猪苓三味共爲細末生葱搗汁調方七貼臍上小便長而瀉止

○一人吐瀉三日垂死囑付後事予爲灸天樞氣海

三穴立止

新編醫學正傳卷之二終