



醫學正傳卷之四目錄

陸文庫

春翠

陸文庫

○眩運門二十論

脉法

丹溪方法

凡三條

防風通聖散

半夏白朮天麻湯

加味六君子湯

六合湯 濟生玉液湯

芎朮湯

川芎散 丹溪活套

○頭痛門二十論

脉法

丹溪方法

凡七條

選奇湯

眉骨痛方 清空膏

半夏白朮天麻湯

安神湯 徹清膏

川芎散

白芷散 羌活清空膏

清上瀉火湯

細辛散 羌活湯

一粒金

羌活附子湯

麻黃附子細辛湯

吳茱萸湯

加味調中益氣湯

玉壺丸

川芎茶調散

元戎三陽頭痛方

如聖餅子

川芎神功散

三因芎辛散

小芎辛湯

寶鑑石膏散

三生丸

茯苓半夏丸

祖傳經驗方

又經驗敷貼方

丹溪活套

○胃脘痛門 三十論

脈法 丹溪方法 凡二十條

黃連六一湯

連附六一湯

草豈菝丸

麻黃豈菝丸

木香化滯湯

三因倉卒散

河間金鈴子散

神聖代鍼散

木附湯

丹溪活套

祖傳加味枳朮丸

已試醫驗一條

○腹痛門 三十論

脈法

丹溪方法 凡十五條

高良姜湯

草豈菝湯

益胃散

厚朴溫中湯

六合散

沒藥散

木香檳榔丸

枳實導滯丸

瓜蒂散

桂枝加芍藥湯

小建中湯

真武湯

霹靂散

酒萸當歸丸

黃連湯

芍藥甘草湯

加減小柴胡湯

四物苦棟湯

增損當歸丸

苦棟丸

一揔金散

丹溪活套

已試醫驗二條

○腰痛門三十論

脉法

丹溪方法凡七條

腎著湯

青娥丸

立安丸

補骨脂丸

東垣獨活湯

摩腰丹

煨腎丸

補腎丸

蒼朮湯

川芎肉桂湯

地龍散

粘痛湯

蒼朮復煎散

一粒金丹

加味四物湯

三因安腎丸

如神湯

獨活寄生湯

五積散

丹溪活套

○胸痛門三十論

脉法

丹溪方法三條

當歸龍薈丸

木氣實脇痛方

左金丸

破血行氣方

加味二陳湯

肝苦急方法

左脇痛方

控涎丹

欬嗽脇痛方

氣弱入脇痛方

去滯氣痛方

肥白人脇痛方

瘦黑人脇痛方

又丹溪方法凡五條

推氣散

枳芎散

異香散

分氣紫蘓飲

芎葛湯

丹溪活套

已試醫驗一條

○諸氣門三十論

脉法

丹溪方法凡五條

清膈丸

正氣天香湯

子和木香檳榔丸

蘓合香丸

蕪子降氣湯 異香散 沉香降氣湯

復元通氣散 木香流氣飲

丹溪活套

○疝氣門五十論 脉法 丹溪方法三凡十條

三因葱白散 又丹溪方法凡四條

疝氣神方 又治疝方 五葉湯

肥人腫疝方 吳茱萸湯 茴香棟實丸

蒺藜湯 木香散 香殼散

沉香桂附丸 加味五苓散

又茴香棟實丸 天台烏藥散

濟生葵子湯 丁香棟實丸

一揔金散 丹溪活套 祖傳馬蘭花丸

○脚氣門三十論 脉法 丹溪方法一條

治濕熱脚氣方 防已飲 健步丸

加味四物湯 治食積流注方

轉筋屬血熱方 羌活導滯湯

當歸粘痛湯 開結導引丸

麻黃左經湯 半夏左經湯 六物附子湯

換腿丸 五積散 導水丸

除濕丹 三花神祐丸

祖傳杉木節飲 又經驗勝濕餅子

○痛風門七十論 脉法 丹溪方法十凡一條

加味四物湯 又丹溪方法條六治上中下痛方

大羌活湯 四妙散 飲酒濕痰痛風方

凡因久痢脚疼方 氣血兩虛痛風方

肢節腫痛方 二妙散 潜行散

手臂痛方 加味二陳湯 治痛風神效方

治婦人胃背脇疔痛 治走注疼痛方

定痛丸 世用草藥獲効辨 黃芪酒

獨活寄生湯 防風天麻散 舒筋湯

祖傳九藤酒 經驗加味二妙丸

經驗川木通湯 經驗薰洗痛風法

○痿証門三十論 脉法 丹溪方法凡九條

濕痰加味二陳湯 血虛加味四物湯

氣虛加味四君子湯 又丹溪方法條二

治痿加味四物湯 東垣建步丸

大防風湯 祖傳經驗方 經驗鹿角膠丸

○諸虫門三十論 脉法 丹溪方法凡二條

治隱挑仁湯 雄黃銳散 寶鑑化虫丸

集効丸 萬應丸 白蠟塵丸

黑鉛檳榔散 化虫丸 苦棟湯

前胡湯 茱萸根湯 五膈下氣丸

千金散 三聖飲子 五鳳丸

雷公丸 瘡濟療蛔虫方 又治蛔虫方

祖傳攢柳丸

經驗陰蝕瘡方

附發砂論

醫學正傳卷之四目錄終

新編醫學正傳卷之四

花溪恒德老人虞搏天民編集

姪孫虞守愚惟明校正

眩運

二十

論

內經曰諸風掉眩皆屬肝木又曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄食減甚則忽忽善怒眩冒癩疾雖為氣化之所使然未必不由氣體之虛衰耳其為氣虛肥白之人為痰滯於上陰火起於下是以痰挾虛火上衝頭目正氣不能勝敵故忽然眼黑生花若坐舟車而旋運也甚而至於卒倒

無所知者有之丹溪所謂無痰不能作眩者政謂此也若夫黑瘦之人軀體薄弱真水虧欠或勞役過度相火上炎亦有時時眩運何濕痰之有哉大抵人肥白而作眩者治宜清痰降火為先而兼補氣之藥人黑瘦而作眩者治宜滋陰降火為要而帶抑肝之劑抑致內經有曰風勝則地動風木太過之歲亦有因其氣化而為外感風邪而眩者治法宜祛風順氣伐肝降火為良策焉外有因嘔血而眩冒者胃中有死血迷閉心竅而然是一行血清心自安醫者宜各類推而治之無有不痊者也

脈法

左手脈數熱多

脈澁而芤有死血

右手脈實有痰積

脈虛大必是久病

左手人迎脈緩而浮大者屬風

方法

丹溪方法  
凡三條

丹溪曰痰在上火在下火炎上而動其痰也此証

屬痰者多蓋無痰不能作眩也雖有因風者亦必有痰又曰火動其痰二陳湯加黃芩蒼朮羌活挾氣虛者亦以治痰為主兼補氣降火藥

○去血過多而眩運者芎歸湯

○眩運不可當者以大黃酒炒為末茶清調下急則治其標也

○防風通聖散治風熱眩運方見中風門  
 ○半夏白朮天麻湯治風痰眩運方見頭痛門  
 ○加味六君子湯治氣虛痰壅兼挾風邪眩運不休者

陳皮去白一錢 半夏湯泡透半錢 茯苓一錢 甘草炙半錢

荆芥穗半錢

右細切作一服加生薑三片大棗二枚水二盞煎至一盞去粗入竹瀝一大匙溫服

○六合湯治風虛眩運

四物湯加秦艽羌活為佐水煎服之

○玉液湯治七情感動氣鬱生涎隨氣上衝頭目眩

運心嘈公悸眉稜骨痛

大半夏湯泡七次去皮膈

右以一味薄切成片每服四錢加生薑十片煎入沉香磨水一呷服大効

○芎朮湯治冒雨中濕眩運嘔逆頭痛不食等證

川芎半夏泡 白朮各一分 甘草六分

右細切作一服加生薑七片水一盞半煎至一盞溫服

○川芎散治風眩運

山茱萸去核兩 山藥 甘菊花 人參

茯苓 小芎窮各半兩

右為細末每服二錢溫酒調下

○卅溪活套云眩暈者中風之漸也如肥白人氣虛而挾痰者四君子湯倍芩炙黃芪加半夏橘紅或少加川芎荆芥穗以清利頭目也○如痰盛而挾氣虛者二陳湯加人參白朮黃芪或少加炮附子煎入竹瀝姜汁服○如體瘦血虛而痰火兼盛者二陳湯合四物加片芩薄荷煎入竹瀝姜汁童便服○如諸般眩暈挾風則加防風荆芥天麻秦艽等藥挾熱加片芩黃連梔子之類挾寒加乾姜官桂附子之屬無有不妥者也

頭痛

九十二

論

內經曰新沐中風則為首風又曰首風之狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚頭痛不可以出內至其風日則病少愈東垣曰金匱真言論曰東風生於春病在肝膈在頸項故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽之脈病衝頭痛足少陽之脈病頭角頷痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在膈中過在手巨

陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上不下頭痛癩疾者  
下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭  
痛也如頭半寒痛者先取手少陽陽明後取足少  
陽陽明此偏頭痛也有真頭痛者甚則腦盡痛手  
足寒至節者死不治有厥逆頭痛者所犯大寒內  
至骨髓髓者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛也  
凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而言之也高  
巔之上惟風可到故味之薄者陰中之陽乃自地  
升天者也然亦有三陰三陽之異故太陽頭痛惡  
風脈浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為主少陽經  
頭痛脈弦細往來寒熱柴胡為主陽明頭痛自汗

發熱惡寒脈浮緩長實者升麻葛根石膏白芷為  
主太陰頭痛必有痰體重或腹痛為痰癖其脈沉  
緩蒼朮半夏南星為主少陰經頭痛三陰三陽經  
不流行而足寒氣逆為寒厥其脈沉細麻黃細辛  
附子為主厥陰頭痛或吐痰沫厥冷其脈浮緩吳  
茱萸湯主之血虛頭痛川芎為主氣虛頭痛  
人參黃芪為主氣血俱虛頭痛調中益氣湯少加  
川芎蔓荊子細辛其効如神白朮半夏天麻湯治  
痰厥頭痛藥也清空膏乃風濕熱頭痛藥也羌活  
附子湯治厥逆頭痛藥也如濕氣在頭者以苦藥  
吐之不可執方而治先師嘗病頭痛發時面頰青

黃暈眩目不欲開懶言身體沉重兀兀欲吐潔古曰此厥陰太陰合病名曰風痰頭痛以局方玉壺丸治之更灸俠溪穴即愈是知方者體也法者用也徒執體而不知用者弊體用不失可謂上工矣學者其可執一而不知變乎

### 脉法

內經曰寸口脉中短者頭痛也

脉經曰陽弦則頭痛又曰寸口脉浮中風發熱頭痛

脉緊頭痛是傷寒 脉緊上寸口者傷風頭痛

脉訣云頭痛短瀆應須死浮滑風痰皆易除

### 方法

丹溪方法凡七條

丹溪曰頭痛多主於痰痛甚者火多宜清痰降火  
○勞役下虛之人似傷寒發熱汗出兩太陽穴痛甚此相火自下衝上宜補中益氣湯加川芎當歸甚者加知母蔓荊子細辛

○諸經氣滯亦作頭痛宜分經理氣處治

○偏頭風在右屬痰屬熱痰用蒼朮半夏熟用酒制

片黃芩在左屬風及血虛風用荆芥薄荷或云

薄荷是頭痛要藥宜詳註加用血虛川芎歸芍藥酒黃柏諸家不分所屬故藥多不効少陽偏頭痛者多大便秘或可下之

○一方治風濕熱頭痛神効

片苓制一兩酒

蒼耳子三錢

細辛二錢

蒼朮

羌活

防風各五錢

右為細末以生姜一片搗細和藥末三錢搗勻

茶清調下一方有生甘草酒連川芎

○一方治少年強壯人氣實有痰或頭暈而重痛立

効大黃酒拌炒乾

右為細末湯清調下三錢立効

○一方治眉稜骨痛屬風熱與痰

白芷酒制 片苓酒制

右各等分為細末每服二錢茶清調下

○選奇湯治眉骨痛不可忍神効

羌活各二錢 防風各二錢

甘草一錢夏生冬炒

酒片苓一錢半冬不用熟甚者冬亦炒用

右細切作一服水一盞半煎至一盞食後服

○又方因風寒眉骨痛不止者

川烏各一錢已上二味俱用童便浸二宿炒用

細辛

羌活酒拌 片苓酒拌 甘草各半分

右為細末分二服茶清調下

○清空膏治偏正頭痛年深久不愈者善療風濕熱

頭痛上壅頭目及腦痛不止者除血虛頭痛不治

川芎五錢 柴胡七錢 黃連酒炒 防風去蘆

羌活各一兩 甘草各半片 黃芩三兩切片酒拌濕  
 右為細末每服二錢熱盞內入茶清少許湯調  
 如膏臨卧抹口內少用白湯送下如苦頭痛每  
 服加細辛二分如太陰脉緩有痰名痰厥頭痛  
 減羌活防風川芎甘草加半夏麩一兩五錢如  
 偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加  
 柴胡一倍如發熱惡熱而渴自陽明頭痛只服  
 白虎湯加香白芷立愈

○半夏白朮天麻湯治痰厥頭痛眼黑頭旋惡心煩  
 悶氣促上喘無力以言心神顛倒目不敢開如  
 在風雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不

得安卧

黃柏一分

乾姜一分

澤瀉

白茯苓

天麻

黃芪

人參

蒼朮各三分

神麩炒

白朮各五分

麥蘖麩

半夏湯去

橘紅各七分

右細切作一服水二盞加生姜三片煎至一盞  
 去粗稍熱服食前一服而愈此頭痛甚謂  
 之足太陰痰厥頭痛非半夏不能除眼黑頭旋  
 風虛內作非天麻不能療黃芪甘溫瀉火補氣  
 實長止汗人參甘溫瀉火補中益氣二木俱苦  
 甘溫除濕補中澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦

補

溫益氣調中神麩消食蕩胃中滯氣大麥蘖寬  
中助脾乾姜辛熱以滌中寒黃柏苦辛以療冬  
天小火在泉發燥也

○安神湯治頭痛頭眩眼黑

生甘草

炙甘草各二分

防風二分

柴胡

升麻

生地黄酒浸

知母酒浸

黃柏酒拌

羌活各一錢

黃芪一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞半加蔓荊子  
五分川芎三分再煎至一盞去粗臨卧稍熱服

補

○微青膏

蔓荊子

細辛各一錢

薄荷葉

川芎各三錢

補

生甘草

炙甘草各五錢

藁本一兩

右為細末每服二錢食後茶清調下

○川芎散治頭目不清利

川芎五錢

柴胡七錢

羌活

防風

藁本

生甘草

升麻各一兩

生地黄

各一兩半酒黃連少

酒片苓各二兩

右為細末每服二錢食後茶清調下

○白芷散一名藟

治諸熱苦頭痛

鬱金一錢

白芷

石膏各二錢

雄黃

芒硝

薄荷葉各三錢

右為細末口含水鼻內搗之

棟

○羌活清空膏

蔓荆子錢一

黃連錢三

羌活

防風

甘草錢四

片芩兩一

右為細末每服一錢茶清調下食後或臨卧服

棟

○清上瀉火湯昔有人年少時氣弱常於氣海三里

穴節次灸之至年老成熟厥頭痛雖冬天大寒

猶喜寒風風吹之頭痛即愈略來煖處或見煙

火其痛復作此灸之過也

荆芥穗

川芎錢二

蔓荆子

當歸身

蒼朮錢三

酒黃連

生地黄

藁本錢四

生甘草錢二

升麻錢三

防風錢半

酒黃柏

棟

○細辛散治偏正頭痛

炙甘草

黃芪錢五

酒黃芩

酒知母錢七

羌活錢八

柴胡錢一

細辛錢三

酒紅花錢少

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後稍

熱服

棟

○羌活湯治風熱壅盛上攻頭目昏眩

柴胡錢一

去蘆

酒黃連

川芎錢半

炒黃芩酒炒

甘草錢八

細辛

尾粉錢二

生黃芩

芍藥錢三

右細切作一服水一盞半煎至一盞食後服

炙甘草錢一分

澤瀉錢三

酒括萎根

白茯苓

藥

酒黃栢各四分 柴胡五分 防風 酒黃芩

酒黃連 羌活各六分

右細切作一服水二盞煎至一盞食後或臨卧服

○一粒金

草撥入一兩半以猪胆汁拌勻 玄胡索 青黛

白芷 川芎各一兩

右為細末無根水為丸每用一九以無根水化開搐鼻内外以銅錢二三文咬口内出涎

藥

○羌活附子湯治冬寒犯腦痛及齒亦痛名曰腦風

麻黃節不去 附子炮 防風 白芷 殭蠶

方景仲

黃栢各七分 羌活 蒼朮各半 升麻二分

黃芪三分 甘草二分 佛耳草三分無

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗温服

○麻黃附子細辛湯治三陰三陽經不流行而足寒

氣逆為寒厥頭痛其脉沉細

麻黃 細辛各六分 附子一箇去皮

右細切水三升三合先煮麻黃令沸減七合掠

去上沫納諸藥煎取一升去粗分三服

○吳茱萸湯治厥陰頭項強痛或吐痰沫厥冷其脉

浮緩

吳茱萸 生薑各半 人參二錢

活人

右細切作一服水二盞大棗一枚煎至一盞去粗溫服

○加味調中益氣湯治氣血俱虛頭痛其効如神

陳皮 酒炒各 升麻 去蘆各

人參 炙甘草 蒼朮 各六分 黃芪 錢一

川芎 六分 蔓荊子 三分 細辛 二分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服一方有木香二分無黃柏如大便虛坐不得或了而不了腹中逼迫此血虛血澁也加當歸身五分 愚按東垣謂此方治氣血俱虛頭痛本方加當歸一味雖無已上証亦恐不可缺也

○玉壺丸治風濕頭痛亦治痰患

雄黃 錢一 南星 煨裂 半夏 湯泡七次去皮

白朮 各二錢

右為細末姜汁浸蒸餅為丸服

○川芎茶調散治諸風上攻頭目昏痛鼻塞聲重

薄荷 四兩 荆芥穗 川芎 各二兩 羌活

白芷 各一兩 甘草 炙各一兩 細辛 兩半 防風 二錢

右為細末每服二錢食後茶清調下

○醫壘元戎治三陽頭痛方

羌活 防風 荆芥穗 升麻

葛根 白芷 石膏 柴胡

簡何

川芎

芍藥

細辛

葱白連鬚者

右各等分細切五錢水二盞煎至一盞溫服

○如聖餅子治風寒伏留陽經痰飲氣厥頭痛

防風

天麻

南星

乾姜

川芎

甘草

半夏

川烏去皮

右為細末蒸餅糊調捻作餅子如錢樣每用五

餅同荆芥末細嚼茶清送下

○川芎神功散治風熱上攻頭目令人偏正頭痛

川芎

川烏

白芷

南星

麻黃

各一錢

甘草

半錢

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞

鑑賣

氏嚴

半煎至一盞去粗食後溫服

○三因芎辛散治傷風寒生冷及氣虛痰厥頭痛如

破兼眩運嘔吐

附子

去皮臍生用

烏頭

去皮生用

南星

乾姜

甘草

多

川芎

細辛

各一錢

右細切作一服加生姜五片茶芽小許水二盞

煎至一盞去粗溫服

○小芎辛湯治風寒在腦或感邪濕頭重而疼眩運

嘔吐

川芎

二錢

細辛

白朮

各一錢

甘草

半錢

右細切作一服加生姜五片茶芽少許水煎服

○寶鑑石膏散治陽明經頭痛大効

川芎

石膏

白芷

各等分

右為細末每服四錢茶清調下

○三生丸治痰厥頭痛

半夏

白附子

南星

各等分

右為細末生姜自然汁浸蒸餅為丸如棗豈大每服四五十丸食後姜湯送下

○茯苓半夏湯治風熱痰逆嘔吐頭痛

半夏

茯苓

片黃芩

甘草

橘紅

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一

盞溫服

○祖傳經驗治頭風熱痛不可忍者

片黃芩

二兩酒拌濕炒再拌再炒如此三次不可令焦小川

白芷

細茶芽

荆芥穗

薄荷葉

右為細末每服二錢白湯或茶清調下

○又經驗敷貼頭風熱痛

朴硝

大黃

右為細末用深井底泥和捏作餅子貼兩大陽

穴神驗

○丹溪活套云凡治頭風必以二陳湯加川芎白芷

為主○如太陽經頭痛加羌活○陽明經加石膏白芷○少陽經加柴胡黃芩○太陰經加蒼朮○少陰經加細辛○厥陰經加吳茱萸○如肥人頭痛必是濕痰加半夏蒼白朮○如瘦人頭痛是熱上壅多加酒洗片黃芩○如因感冒而頭痛者宜加防風羌活藜蘆升麻柴胡葛根之類○如氣虛而頭痛者宜加黃芪人參東垣安神湯之類○如風熱在上而頭痛者加天麻蔓荊子台芎酒片芩之類○如苦頭痛者宜用細辛○如形瘦色弊而頭痛者是血虛宜用歸芎芍藥酒黃栢之類○如頂巔痛者宜藜蘆酒

炒升柴

胃脘痛

俗呼為心痛

三十

論

內經曰木鬱之發民病胃脘當心而痛上支兩脇痛膈噎不通食飲不下蓋木氣被鬱發則太過故民病有土敗木賊之候也夫胃為脾之府陽先於陰故藏未病而府先病也甚而至於脇下如刀剗之痛者已連及於藏矣古方名為脾疼者是也胃之上口名曰賁門賁門與心相連故經所謂胃脘當心而痛今俗呼為心痛者未達此義耳雖曰運氣之勝復未有不由清痰食積鬱于中七情九氣

觸于內之所致為是以清陽不升濁陰不降而肝木之邪得以乘機侵侮而為病矣更原厥初致病之由多因縱恣口腹喜好辛酸恣飲熱酒煎燂復食寒涼生冷朝傷暮損日積月深自鬱成積自積成痰痰火煎熬血亦妄行痰血相雜妨碍升降故胃脘疼痛吞酸噯氣嘈雜噯心皆膈噎反胃之漸者也俗醫不究其源例以辛香燥熱之劑治之以火濟火遂成危劇良可痛哉古方九種心痛曰飲曰食曰風曰冷曰熱曰悸曰虫曰疰曰去來痛夫所謂冷者惟一耳豈可例以熱藥治之乎詳其所由皆在胃脘而實不在於心也有真心痛者大寒觸犯心君又曰汚血衝心手足青過節者且發夕死夕發且死醫者宜區別諸證而治之無有不安之理也

脉法

脉經曰陽微陰弦則胃痺而痛責其虛也

今陽虛知在上焦所以胃痺心痛者以其脉陰弦故也

胃痺之病喘息欬唾胃痺痛短氣寸口脉沉而遲

關上小緊而數

心脉微急為痛微大為心痺引背痛

脉短而數者心痛 滿者心痛

脉浮大弦長者死

方法丹溪方卷九  
二十二條

丹溪曰：心痛即胃脘痛，須分久新。若明知身犯寒氣，口得寒物而病於初得之時，當用溫散溫利之藥。若病久則成鬱矣，鬱則成熱，原病式中備言之矣。若欲行溫散溫利，寧無助火添病耶？由是古方多用山梔子為君，熱藥為之嚮導，則邪易伏，病易退，病安之後，若縱恣不改前非，病必再作，難治矣。此病雖日久不食不死，又曰中宮有食積與痰而生病者，胃氣亦賴所養，卒不便虛，雖日數多不食不死，若痛方止即吃物，病必

復作，勿歸咎於醫也。必須再服三五服，藥後以漸而少食，方可獲全安。

○心膈大痛，攻走腰背，發厥嘔吐，諸藥不效者，就吐中以鵝翎探之，出痰積，碗許而痛即止。

○牀堅實不大便者，下之亦可。

○一方用黃荊子炒焦為末，米飲調服。一云：上可治心痛，下可治

帶白

○又方用藍葉搗細，取汁合姜汁服。

○又方用青黛以姜汁入湯調服。

○又方用海粉佐以香附末，以川芎山梔子煎湯入

姜汁調服。

○又方無藥處以鹽置刀頭燒紅淬入水中乘熱飲之吐痰而愈此法給絞腸沙大痛變死者立効

○又方治心痛輕者以麻黃桂枝之類散之或以韭汁開提之重者加石鹽

○又方痛甚者脉必伏宜溫藥附子之類不可用人參白朮等諸痛不可補氣故也

○又方治氣實者用牡蠣粉一二錢溫酒調下

○又方治濕痰作痛用白螺螄殼去泥沙火煨為細末每服方寸匕溫酒調下立止

○又方以物輕按而痛定者屬虛以二陳湯加炒乾姜末和之而愈

○又方山梔大者七枚或九枚炒焦黃用水一盞煎七分入生姜自然汁二三匙令粹熱飲之立止

○又方山梔子劫止之後復發者前藥必不効用玄明粉一錢匕白湯送下立止

○又方治平日喜好熱物致死血流於胃口而作痛者以桃仁承氣湯下之安

○又方治死血作痛證用玄胡索一兩半挂心紅花滑石紅麩各五錢桃仁三十箇蒸餅丸服効

○又方治虫痛者必面上有白斑唇紅能食時作特止用二陳湯加苦楝根煎服

○又方治痰積胃腕作痛白螺殼丸

白螺蛳殼煨火滑石炒 莪朮 山梔子

香附童便 南星一兩 枳殼炒 青皮

木香 半夏 砂仁各五

右為末春加川芎夏加黃連秋冬加吳茱萸用  
生姜汁浸蒸餅為丸如茱萸大每服五十丸

○黃連六一湯治多食煎炒或燒餅米泔等物致熱

鬱胃口而痛者甚効方見

○連附六一湯治胃脘痛甚諸藥不効者寒因熱用

方也

黃連六錢 附子炮去皮

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞

半煎至一盞去粗稍熱服

○草豈菟九治客寒犯胃作痛或因濕熱鬱結作痛  
亦可劫而止之又治氣弱心痛亦妙

草豈菟一兩 橘紅 吳茱萸湯泡 人參

白殭蠶 黃芪 益智仁各八錢 生甘草

炙甘草 當歸身 青皮各六錢

澤瀉小 便多 半夏各一兩 枳仁去皮 尖

麥蘖麵 神麩炒 柴胡不痛 姜黃各四錢

右為細末桃仁別研如泥入諸藥中和勻再研  
湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三十九白湯  
送下食遠

麻黃豈菟丸治客寒犯胃心頭大痛不可忍

木香

青皮

紅花

厚朴

姜制各二錢

蕪木三分

葶澄茄四分

升麻

半夏

湯泡七次

麥蘖麩

砂仁

黃芪

白朮

陳皮白去

柴胡

炙甘草

吳茱萸

當歸身各五分

益智仁六分

神麩炒一錢

麻黃

不去節二錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五

十九白湯下或細嚼白湯送下亦可

○木香化滯湯治因憂食濕麩結於胃腕腹皮抵痛

心下硬微滿不思飲食食之不散常常痞氣不

安方見卷

○三因倉卒散治氣自腰腹間攻心痛不可忍腹中

水冷自汗如洗手足孿急厥冷

山梔子

大者四十九枚連皮槌碎炒焦

附子

一枚炮去皮臍

右為末每服二錢酒一盞煎八分溫服

○金鈴子散治熱厥心痛

金鈴子

玄胡索

各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下白湯亦可

○神聖代鍼散治心腹諸痛

乳香

沒藥

當歸

白芷

川芎

各半兩

元青

一兩去翅足炒

右為細末每服一字病甚者半錢先點好茶

盞次摻藥末在茶上不得吹攪立地細細呻之心痛欲死者服之立効小腸氣搐如角弓膀胱腫硬一切氣刺虛痛併婦人血痺血迷血運血刺痛衝心胎衣不下難產但是一切因血作痛之疾服之大有神効

入活

○木附湯治寒厥暴痛牀微氣弱

附子炮五

白朮二

甘草一錢

右細切作一服水一盞半入生姜五片大棗二枚煎至一盞去粗溫服此藥又治風濕相搏身重煩疼不能轉側不嘔不渴大便堅實小便自利及風虛頭目眩暈不知食味煖肌補中助陽

氣止有汗之聖藥也

○丹溪活套云草苴寇一味性溫能散滯氣利膈上痰若胃脘果因寒而作痛用之如鼓應桴若濕痰鬱結成痛者服之多効若因熱鬱而痛者理固不常用此但宜以涼藥監制如芩連梔子之屬其功尤速東垣草苴寇丸寒熱心痛俱獲竒功但因熱者不可多服久服恐有積溫成熟之患耳若久病鬱熱已膠固者斷不可用此味也

○胃中若有流飲清痰作痛腹中漉漉有聲及手足寒痛或腰膝脊脇抽掣作痛者用小胃卅或三花神祐丸或控涎丹漸漸服之能徹去病

根即止

○祖傳經驗加味枳朮丸治清痰食積酒積茶積肉積在胃脘當心而痛及痞滿惡心嘈雜噯氣吞酸嘔吐脾疼等証其効如神

白朮三兩

枳實黃色炒

蒼朮米泔浸

猪苓去黑皮

麥蘖麵炒黃

神麴炒黃

半夏湯泡透

澤瀉毛去

赤茯苓皮去

川芎

黃連陳壁土炒去土

白螺螄殼煨各

草薢

黃芩陳壁土同炒

青皮白去

萊菔子炒

乾生薑各五錢

陳皮白去

香附米童便浸

瓜蒌子

厚朴姜汁制

檳榔各二錢

木香

甘草各二錢

吞酸加吳茱萸湯泡寒月五錢熱

月二錢半

久病挾風加入參白扁荳石蓮肉

各五錢○時常口吐清水加炒滑石一兩牡蠣

五錢○右為細末用青荷葉泡湯浸晚粳米研

粉作糊為丸如梧桐子大每服七十九多至一

百丸清米飲送下

○一男子年三十五胃脘作痛久矣人形黃瘦食少

而胃中常若食飽來求治與加味枳朮丸服不

効而日漸大痛叫號聲聞四隣別父世妻子屬

付後事欲自殺予與枕仁承氣湯作大劑與之

連二服大下瘀血四五碗許困倦不能言語者

三日教以稀粥少食漸漸將理病全安復壯如舊

腹痛 三十一

論

內經曰寒氣入經而稽遲泣通而不行客於脉外則血少客於脉中則氣不通故卒然而痛云云按內經舉痛論言寒邪外客而痛者甚為詳悉未能盡述學者自宜檢閱外有因虛因實因傷寒因痰火因食積因死血者種種不同亦當表而出之庶使學者易為參考焉東垣曰腹中諸痛皆由勞役過甚飲食失節中氣不足寒邪乘虛而客入之

故卒然而作大痛經云得炁則止此事難知集論曰傷寒中脘痛太陰也理中湯黃芪建中湯之類臍腹痛者少陰也四物湯真武湯附子湯之類小腹痛厥陰也重則正陽散回陽丹輕則當歸四逆湯之類太陰連少陰痛甚者當變為下利不止若夫雜病腹痛四物苦棟湯酒煮當歸丸之類夏月腹痛肌熱惡熱脉洪數屬手太陰足陽明黃芩芍藥湯主之秋月腹痛肌寒惡寒脉沉疾屬足太陰足少陰桂枝芍藥湯主之四時腹痛芍藥甘草湯主之原病武曰熱鬱于內則腹滿堅結而痛不可例言為寒也成無已曰陰寒為邪者則腹滿而吐

食不下自利益甚腹痛太陰証也發汗不解醫  
反下之因而腹滿時痛者屬太陽也桂枝加芍藥  
湯主之大實而痛者加桂加大黃湯主之又曰邪  
氣聚於下焦則津液不得宣通血氣不得流行或  
溺溢或血流滯於下而生脹滿硬痛也若從心下  
至小腹皆鞭滿而痛者是邪實也須以大陷胃湯  
下之若但小腹硬滿而痛小便利者則是蓄血之  
証小便不利者則為溺澀之証也其有血虛瘦弱  
之人津液枯涸傳送失常鬱火燥熱煎成結糞滯  
於大小腸之間阻氣不運而作痛者宜以枳實導  
滯丸備急大黃丸之類先通其滯止其痛然後用

四物等生血潤燥之劑以治其本外有卒然心腹  
大痛欲吐不得吐欲瀉不得瀉唇青厥逆死在須  
臾此內因食積外感寒邪是名乾霍亂之候也宜  
急以鹽湯灌之而以鵝翎探吐取涎而愈若夫清  
痰留滯于胃腹之間食積鬱結於腸胃之內皆能  
令人腹痛清痰作痛者控涎丹小胃丹之類食積  
為患者保和丸枳朮丸之類消之枳實導滯丸木  
香檳榔丸之類下之濁氣在上者湧之清氣在下  
者提之寒者溫之熱者清之虛者培之實者瀉之  
結者散之留者行之此治法之大要也學者詳之

脉法

脉經曰脉細小緊急病速進在中腹中刺痛

陰弦則腹痛 弦急小腹痛 尺脉緊臍下痛

尺脉伏小腹痛癥疝 尺脉實小腹痛當利之

心腹痛不得息脉細小遲者生脉大而疾者死

腹痛脉反浮大而長者死

方法 丹溪方注  
凡十五條

丹溪曰腹痛有寒有積熱有食積有痰有死血脉  
弦者多屬食宜溫散之蓋食得寒則滯得熱則  
行更宜以行氣滯氣藥助之無不愈者○脉滑  
者是痰痰因氣滯而聚阻礙道路氣不得宜通  
而痛宜導痰解鬱○凡痛必用溫散以其鬱結

不行阻氣不運故也○臍下忽大痛入中黑色  
者多死○腹中水鳴乃火擊動其水也

戴氏曰痛甚便欲大便去後則痛減者是食積  
也綿綿痛而無增減者是寒也時痛時止者是  
熱也其痛有常與而  
不殺動者是死血也

○治腹痛用台芎蒼朮香附白芷為末姜汁入湯調服

○白芍藥止能治血虛腹痛餘俱不治 以其酸寒  
散之功  
飲而別無溫  
者也

○如飲食過傷而腹痛者實木香檳榔下之

○如氣虛之人傷飲食而腹痛宜調補胃氣併消導  
藥用人參白朮山查神麩枳實麥芽木香砂仁

之類

○如腹中常有熱而痛此為積熱宜調胃承氣湯下之

○小腹實痛用青皮以行其氣

○小腹因寒而痛宜肉桂吳茱萸

○因寒氣作痛者宜小建中湯加乾姜官桂台芎蒼木白芷香附

○因熱而痛者二陳湯加黃芪黃連枳子痛甚者加炒乾姜從之

○若腹痛不禁下者宜川芎蒼木湯以治之川芎蒼木香附白芷茯苓滑石加姜水煎服

方溪冊皆上巳

垣東

○高良姜湯治因寒心腹大痛

高良姜錢二

厚朴制姜

官桂各一

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗稍熱服

垣東

○草薺菟湯治臍腹虛脹作痛

澤瀉錢一

木香分三

神麩分四

半夏

枳實錢一

草薺仁

黃芪分三

益知仁

甘草錢一

青皮

陳皮各六

川歸分六

茯苓分七

右細切作一服加生薑三片水一盞半煎至一盞溫服

○益胃散治因服寒藥過多致腹痛不止

人參 厚朴 甘草 白朮

薑黃 乾姜 砂仁 澤瀉已上各三分

益智分六 陳皮分七 黃芪分七

右細切作一服加姜水煎服

○厚朴溫中湯治胃虛寒脹滿疼痛

厚朴 陳皮各一分 茯苓

草薢 甘草 木香各半

乾姜三分 加姜水煎服之

○六合散又名金治一切燥熱鬱結汗後餘熱宜轉

不通併治小腸氣結心腹滿悶胃中痞結走注

疼痛

大黃一兩酒洗 白朮半兩 黑丑略 甘遂各半

檳榔生三錢 輕粉一錢

右為細末每服一錢蜜水調下量虛實加減服

○沒藥散治一切心腹疼痛不可忍者

沒藥另研 乳香另研各三錢 穿山甲五錢酒炙

木鱉子四錢去壳

右為細末每服半錢或一錢酒大半盞煎三五

沸服

○木香檳榔丸治食鬱氣滯作痛

木香三錢 檳榔三錢 青皮五錢 陳皮五錢

凍

入活

入活

入活

麥蘖麩沙七錢 枳實色六錢 白朮五錢 厚朴姜制四錢  
右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九丸溫水下食遠

○枳實導滯丸治食傷濕熱之物不得施化腹痛滿悶不安以利為度方見內傷門

○瓜蒂散治食傷太陰填塞悶亂不快甚則心胃大痛兀兀欲吐者方見中風門

○桂枝加芍藥湯治腹滿時痛脉弱此即傷寒門桂枝湯內加芍藥一錢

○小建中湯治傷寒陽脉濡陰脉弦腹中急痛者桂枝甘草各三分 白芍藥六分 大棗二枚

生姜二錢 阿膠炒合一 右剉水煎服

○真武湯治腹痛下痢四肢沉重 方見傷寒門

○霹靂散治腹痛脉微欲絕 附子一枚炮取出以冷灰瘧之去皮膚

右以一味取五錢重入真臘茶一錢同研細為末分作二服每服用水一盞煎七分去粗入蜜一匙稍冷服

○酒蕒當歸丸治小腹寒痛及婦人白帶疝癩大寒等証

茴香五錢 黑附子炮 良姜各七錢 當歸兩  
右四味細切以上好無灰酒一升半蕒至酒乾盡焙乾入後藥

間河 人活

垣東

炙甘草

苦棟用生

丁香各五錢

木香

升麻各一錢

柴胡二錢

炒黃鹽

全蝎各三錢

玄胡索四錢

右與前四味同研為細末酒煮麩糊為丸如梧  
桐子大每服五七十丸空心淡醋湯下忌油膩  
冷物及酒濕麩

○黃連湯治胃中有熱胃中有邪氣腹內痛甚時欲  
嘔吐此藥升降陰陽

黃連

甘草炙

乾姜

桂枝各五錢

人參二錢

半夏半合湯泡七次去皮臍

右細切入大棗二枚量水煎服

○芍藥甘草湯治四時腹痛

白芍藥

甘草炙

右等分每服五錢細切入生姜三片水一盞半  
煎至一盞溫服○醫壘元戎云腹痛脉弦傷氣  
用本藥○脉洪傷金加黃芩○脉緩傷水加桂  
枝○脉濡傷血加當歸脉遲傷寒加乾姜  
○加減小柴胡湯治寒熱脉弦腹痛本方去黃芩加  
白芍藥

○四物苦棟湯治臍下虛冷腹痛

四物湯六錢加玄胡索苦棟各一錢半  
右細切水二盞煎至一盞溫服

○增損當歸丸治三陰受邪心腹疝痛

四物湯各五 防風 獨活 全蝎各五 續斷

茴香各一 苦棟 玄胡索 木香各二

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九

白湯下

○苦棟丸治奔豚小腹作痛方見痛氣門

○一控金散治臍腹大痛及奔豚小腸氣等證

玄胡索 川棟子 全蝎去毒 茴香

右等分為細末每服二錢七熱酒調下神驗

○丹溪活套云凡腹痛多是血脈凝澁不行必用酒炒白芍藥惡寒而痛加桂惡熱而痛加黃栢○

如腹痛欲以物拄按者屬虛用人參白朮乾姜

官桂之類○如腹痛手不可按者屬實宜用建

中湯加大黃或調胃承氣湯加桂枝類下之而

愈○如因飲食過傷而作痛者必問因傷何物

如傷生冷硬物而作痛者東垣木香見睨丸三

稜消積丸之類如傷熱物而作痛者枳實導滯

丸三黃枳朮丸之類看強弱緩急用而下之○

如氣虛之人因飲食過傷而腹痛者宜補瀉兼

施用二陳湯加川芎白朮神麩麥芽人參蒼朮

之類或送下前推積等丸子以下之○如腹中

常覺有熱而暴痛暴止者此為積熱宜調胃承

氣湯之類下之○如因跌撲損傷而作痛者此  
瘀血證宜桃仁承氣湯抵當湯之類逐去其血  
即愈○如因事損傷或酒後涉水血凝腹痛者  
大承氣湯加桂

一黃芪婦年五十餘小腹有塊作痛二月餘一醫  
作死血治與四物加桃仁等藥不効又以五靈  
脂玄胡索乳香沒藥三棱莪朮等作丸服又不  
効召予治診其六脉皆沉伏兩尺絕無予曰乃  
結糞在下焦作痛耳非死血也用金城稻葉燒  
灰淋濃汁一盞服之過一時許與枳實導滯丸  
一百粒催之下黑糞如梅核者一碗許痛遂止

後與生血潤腸之藥十數貼調理平安

一壯年男子寒月入水網魚飢甚遇涼粥食之腹  
大痛二晝夜不止一醫先與大黃丸不通又與  
大承氣湯下糞水而痛愈甚召予治診其六脉  
皆沉伏而實面青黑色予曰此大寒證及下焦  
有燥屎作痛先與丁附治中湯一貼又灸氣海  
穴二十一壯痛減半繼以江子加陳皮木香作  
丸如菘荳大生姜汁送下五粒下五七次平安

腰痛

三十一

論

內經曰足太陽脉令人腰痛引項脊尻背如腫狀

少陽腰痛如以針刺其皮中循循然不可以悅仰  
不可以顧陽明腰痛不可以顧顧如有見者善悲  
足少陰腰痛痛引足內膝厥陰腰痛腰中如張弓  
弩弦太陰腰痛下如有橫木居其中甚則遺洩又  
曰太陽所至為腰痛巨陽虛則腰背頸項痛是動  
則病項如拔俠脊痛腰似折髀不可以曲又曰腰  
者腎之府轉搖不能腎將憊矣脉經曰凡有所用  
力舉重若入房過度汗出如浴水則傷腎腎脹者  
腹滿引背央央然腰髀痛又有腎著之病從腰以  
下冷腰重如帶五千錢若夫腰痛之証雖有六經  
見候之不同挫閃腎之或異或瘀血或風寒或濕

痰流注種種不一原其所由未必不因房室過度  
負重勞傷之所致也經曰邪之所湊其氣必虛是  
也治法虛者補之杜仲黃柏肉桂當歸五味兔絲  
子天門冬熟地黃之類風者散之麻黃防風羌活  
獨活之類寒者溫之肉桂乾姜附子之類挫閃者  
行之當歸蘓木乳香沒藥桃仁紅花之類瘀血者  
逐之大黃牽牛挑仁水蛭蚘虫之類濕痰流注者  
消導之蒼朮撫芎香附白芷枳實橘紅半夏茯苓  
之類宜各類推而治之不可執一論也

脉法

脉經曰尺脉沉腰背痛凡腰痛時時失精飲食減

少其脉沉滑而遲此為可治

腰痛之脉皆沉弦沉弦而緊者為寒沉弦而浮者為風沉弦而濡細者為濕沉弦而實者為挫閃丹溪曰脉必沉而弦沉為滯弦為虛瀯者是瘀血緩者是濕滑者伏者是痰大者是腎虛也

方法 丹溪方注凡七條

丹溪曰有腎虛有瘀血有濕熱有挫閃有痰諸腰痛不可用補氣藥亦不宜峻用寒涼藥

○腎虛腰痛用杜仲黃柏龜板知母枸杞子五味子猪脊骨髓丸服

○衰血宜行血順氣用補陰丸加桃仁紅花外用三稜針於委中穴出血以其血滯於下也

○濕宜燥濕行氣用黃柏杜仲蒼朮川芎之類

戴氏曰疼之不已為腎虛也日輕夜重者是瘀血也遇天陰及久坐而發者是濕也

○痰宜南星半夏加快氣藥佐之使痰隨氣運

○腰曲不能伸者針入中立愈

○腎著為病其體重腰冷如冰飲食如故小便自利腰以下冷痛而重治宜流濕兼用溫藥

○腎著湯治腎著腰痛

乾姜 炮 茯苓 各半 甘草 炙半 白朮 二錢

右剉每服四錢水煎空心服

○三因青娥丸治腎虛腰痛常服壯筋補虛

杜仲一斤

生半十兩

破故紙一斤

右為細末用胡桃肉一百二十箇湯浸去皮膜研為膏煉蜜些少丸如梧桐子大每服五十九益湯姜湯任下

○三因立安丸治五種腰痛常服温補腎元壯健腰脚

破故紙

乾木瓜各一兩

牛膝酒洗一兩

葶藶二兩

杜仲姜汁炒

續斷各一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九温酒下

○補骨脂丸治腎虛及寒濕一切腰痛

薛草

四兩 一兩用童便浸一兩用酒浸各浸一晝夜

杜仲

四兩 炒 補骨脂 三兩 香胡桃肉 八兩 浸去油

右以前三味細研為末不犯鐵器入胡桃肉用木杵搗千餘下以糯米糊為丸秋冬以煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心温酒下乾物壓之

○獨活湯治勞役腰痛如折

羌活

防風

獨活

澤瀉

肉桂

各三錢

大黃

酒浸 煨 甘草 各二錢

川歸

五錢

連翹

五錢

防己

酒炒

黃柏

酒炒 各二錢

桃仁

三十

每服一兩酒水煎服

○摩腰丹治寒熱腰痛

附子尖

烏頭尖

天南星

各二錢

硃砂

乾姜各一錢

雄黃

樟腦

丁香各半一錢

射香

當門子五粒

右為末蜜丸如龍眼大每用一丸生姜汁化開如厚粥樣烘熱置掌中摩腰上令盡粘著肉烘綿衣縛定腰熱如火間三日用一九妙或加具茱萸挂皮

○煨腎丸治腎虛腰痛

杜仲

三錢炒

右為細末以猪腰子一隻薄批作五七塊以椒鹽澆去腥水摻藥末在內以荷葉包裹更加濕紙二三重外包慢火煨熟食之無灰酒送下

○補腎丸治腎虛腰痛方見虛損門

○蒼朮湯治濕熱腰腿疼痛

防風

黃柏各一錢

柴胡二錢

蒼朮三錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

○川芎肉桂湯治瘀血在足太陽足少陰足少陽三

經腰痛

漢防已

防風

去蘆各三分

炒神麩

獨活各五分

川芎

柴胡

肉桂

當歸梢

炙甘草

蒼朮

各一錢

羌活半錢

桃仁

五筒去皮尖另研細

右細切作一服好酒三盞煎至一盞去粗稍熱服食遠

○地龍散治腰脊痛或打撲損傷或從高墜下惡血

在太陽經令人腰脊痛或髀股脛膈中痛不可

當歸梢二分 中桂 地龍各四分 麻黃五分

蕪木六分 獨活 黃柏炒酒 甘草各八分

羌活二分 挑仁六分去皮尖

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○粘痛湯治濕熱為病肩背沉重肢節腰脇疼痛胃

膈不利

白朮四分 人參去蘆 升麻 苦參酒炒

葛根 蒼朮各五分 防風去蘆 知母去毛

澤瀉 黃芩 猪苓去皮 當歸各六分

炙甘草 生黃芩酒洗 茵陳酒炒 羌活八分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○蒼朮復煎散治寒濕相合腦後痛惡寒填筋春骨

強肩皆膝眼痛腰痛膝膈痛無刀行步沉重

紅花一分 黃柏三分 柴胡去蘆 藁本 澤瀉

白朮 升麻名五分 羌活一分 蒼朮四分

右細切先以蒼朮一味用水二大盞煎至二盞

去粗入前藥復煎至一盞去粗空心稍熟服取

微汗為効忌酒及濕麪

○一粒金丹治腰膝走注疼痛如虎咬之狀不可忍

者

草烏頭

五靈脂各四兩

木鱉子

去壳

白膠香二兩

地龍去泥土一兩

京墨二錢

乳香二錢

當歸五錢

沒藥五錢

射香二分

右為細末再研千餘下糯米糊丸如梧桐子大每服一九或二九多至三九溫酒下服藥後微汗神驗

○元戎加味四物湯治瘀血腰痛

本方加桃仁泥酒紅花二味煎服

○三內安腎丸治腎虛腰痛

破故紙炒

胡蘆芭炒

茴香炒

川苦棟炒

續斷三兩

桃仁炒

杏仁炒

山藥

茯苓各二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九益湯下

○如神湯治挫閃腰痛甚者不過三服平安

川歸

肉桂

玄胡索各等分

右為細末每服二錢匕熱酒調下或細切酒煎亦可

○獨活寄生湯治因腎虛坐卧冷濕當風所得

獨活錢一

桑寄生

杜仲炒

細辛

牛膝

秦艽

茯苓

白芍藥

桂心

川芎

防風

炙甘草

人參 熟地黄 當歸各五  
右細切作一服水二盞煎至一盞去粗空心温服

○五積散治寒濕及清痰流注經絡腰膝背脇疼痛

白芷 川芎 桔梗 芍藥

陳皮 厚朴 茯苓 甘草

麻黃 乾姜 官桂 川歸

半夏 蒼朮 枳殼各五

右細切作一服加生薑三片水二盞煎至一盞温服

○丹溪活套云凡因房勞辛苦而腰痛者四物湯加

知母黃柏五味子杜仲之類吞補腎丸或大補陰丸○因風寒濕流注經絡而作痛者二陳湯加麻黃蒼朮川芎白芷防風羌活獨活之類○因挫閃跌撲致死血流于本經而作痛者四物湯加桃仁紅花蘇木之類脉實人壯盛者大承氣湯加桂下之安○有因醉飽入房太甚而酒食之積乘虛流入於本經致腰痛難以悅仰四物湯合二陳湯加麥蘗神麩杜仲黃柏官桂砂仁葛花枳梗之類

脇痛 三十三

論

內經曰肝病者兩脇下痛引小腹令人善怒虛則目眈眈無所見耳無所聞善恐如人將捕之又曰怒則氣逆虛則嘔血及飧泄故氣上矣蓋心出血肝納血因大怒而血不歸經或隨氣而上出於口鼻或留於本經而為脇痛又或歲木太過而本氣自甚或歲金有餘而木氣被鬱皆能令人脇痛經曰病脇下滿氣逆二三歲不已病名曰息積是亦肝木有餘之証也外有傷寒發寒熱而脇痛者足少陽膽足厥陰肝二經病也治以小柴胡湯無有不効者或有清痰食積流注脇下而為痛者或有登高墮仆死血阻滯而為痛者又有飲食失節勞役過度以致脾土虛乏肝木得以乘其土位而為胃脘當心而痛上支兩脇痛膈噎不通食飲不下之証醫者宜於各類推而治之母認假以為真也

### 脈法

脈經曰肝脈搏堅而長色不清當病墜墮若搏因血在脇下令人喘逆若輒而散輒轉用其色澤者當病溢飲溢飲者暴渴多飲而溢入於肌膚腸外也

肝脈沉之而急浮之亦然若脇下痛有氣古滿引小腹而痛時小便難苦目弦頭痛腰背痛足為逆寒時癢婦人月水不來時無時有得之少時

有所墜墮

脉雙弦者肝氣有餘兩脇作痛

方法丹溪方注

丹溪曰屬肝木氣實因怒氣大逆肝氣鬱甚謀慮

實故火盛肝氣急也

有死血因惡血停留於肝居於脇下而痛病則自肝痛甚按之益甚也

痰流注因痰積流注於厥陰之經亦能使痛病則咳嗽氣急引血痛

○當歸龍薈丸瀉肝火大盛之要藥因內有濕熱兩

脇痛甚伐肝木之氣肝實宜之

當歸 龍膽草 枳子仁 黃連

大黃酒濕燒 蘆薈 青黛各五錢 木香二錢

間河

射香五分另研

右為細末神麩糊丸如梧桐子大每服二十九

生薑湯下○一方加柴胡五錢青皮一兩熱甚

者烘熱服

○一方木氣實者用川芎蒼朮青皮芍藥柴胡甘草

龍膽草各等分水煎服

○左金丸瀉肝火行濕為熱甚之反佐

黃連六錢 吳茱萸一錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如棗豈大每服三五

十九淡姜湯下

○一方破血行氣治死血作痛之証

溪丹

溪丹

溪丹

桃仁去皮留尖另研 紅花酒拌焙乾 川芎 香附童便

青皮各分 右細切水煎服之

○加味二陳湯治濕痰流注脇內作痛

本方加 南星蒼朮川芎姜水煎服

○肝苦急急食辛以散之用撫芎蒼朮或用小柴胡

湯蓋本方為脇痛發寒熱者必用之要藥也

○左脇痛以柴胡為君加佐使藥川芎青皮草龍膽

之類

○兩脇走痛或用控涎丹因清痰流注作痛者可用蓋痰在脇下非白芥子不

能達方見痰門

○治欬嗽脇痛者二陳湯加南星青皮香附青黛姜

汁一云四物湯加青皮等藥以疎肝氣

○氣弱之人脇下痛脈細緊或弦多從勞役怒氣得

之八物湯加水香青皮或加桂心水煎服之

○去滯氣用青皮蓋青皮乃肝膽二經藥人多怒脇

下有鬱積固宜以解二經之實者若二經氣血

不足先當補血氣少加青皮可也此舉上條意思言也

○肥白人氣虛發寒熱而脇下痛用參芪補氣柴胡

黃芩退熱木香青皮調氣

○瘦黑人寒熱脇痛多怒者必有瘀血宜桃仁紅花

柴胡青皮大黃之類行之

○發寒熱脇痛似覺有積塊必是飲食太飽勞力所

溪冊

致必用龍膏丸治之

○解痛治標藥外用琥珀膏貼之○又方用芥葉子水研付○又方以吳茱萸醋研水調付○又方以韭菜葉搗細炒熱貼而以熨斗盛火熨之

○推氣散治右脇痛甚脹滿不食

片姜黃 枳殼炒 桂心各五錢 耳草炙三錢

右為細末每服二鐵姜湯調下水煎亦可

○枳芎散治在脇疼痛不可忍

枳實炒 川芎各五錢 甘草炙半錢

右為細末每服二錢姜棗湯或酒調下

○異香散治腹脇膨脹痞悶噎塞腹脇疔痛

蓬莪朮煨 益智仁 甘草

荆三稜各一錢 青皮 陳皮各五分

石蓮肉 厚朴半制各三錢

右細切作一服加生姜三片大棗一枚白鹽少許水一盞半煎至一盞去粗溫服

○分氣紫蘓飲治腹脇疼痛氣促喘急

五味子 桔梗去蘆 紫蘓葉

桑白皮蜜炙黃色 草薺仁 陳皮白

大腹皮酒洗淨 茯苓 甘草炙各半錢

右細切作一服加生姜三片白鹽少許水一大盞煎七分去粗空心溫服

○芍葛湯治脇下疼痛不可忍者

桂枝

川芎

細辛

乾葛

防風

去蘆各八分

芍藥

枳殼

麻黃

人參

甘草炙各四分

右細切作一服加生姜三斤水一盞半煎至一盞溫服

○丹溪活套云凡脇痛者多是肝木有餘也宜用小

柴胡加青皮川芎芍藥草龍膽甚者煎成正藥

入青黛射香 ○痰流注者本方倍半夏加橘

紅南星蒼白朮茯苓川芎之類 ○瘀血作痛者

小柴胡合四物湯加桃仁紅花或乳香沒藥煎

服痛甚而元氣壯實者桃仁承氣湯下之而愈

○性急多怒之人時常腹脇作痛者小柴胡加

川芎芍藥青皮之類煎服甚者以煎藥送下當

歸龍會丸其効甚速

○金氏子年四十餘因騎馬跌撲次年左脇脹痛醫

與小柴胡湯加草龍膽青皮等藥不効來求治

診其脈左手寸尺皆弦數而瀦關脈芤而急數

右三部惟數而虛予曰明是死血證用抵當丸

一劑下黑血二升許後以四物湯加減調理而

諸氣

三十四

論

內經曰百病皆生於氣也故怒則氣上喜則氣緩  
悲則氣消恐則氣下寒則氣收是則氣泄驚則氣  
亂憂則氣沉一曰勞思則氣結夫人身之正氣與  
血為配血行脈中氣行脈外一呼脈行三寸一吸  
脈行三寸氣血並行周流乎一身之中灌溉乎百  
骸之內循環無端運氣不悖而為生生不息之妙  
用也經曰一息不運則機絨窮一毫不續則窮壤  
判若內無七情之所傷外無六淫之所感何氣病  
之有哉其不善攝生者五志之火無時不起五味  
之偏無日而不傷是以釀成膠痰固積留滯於六  
府鬱火邪氣充塞乎三焦使氣血失其常候府藏  
不能傳導是故外邪得以乘虛而浸襲矣以致清  
陽不升濁陰不降而諸般氣痛朝輟暮作而為膠  
固之疾非良工妙手莫易治焉若夫為胸痛為心  
腹痛為周身刺痛甚則為反胃為膈噎等證即此  
之由也大抵男子屬陽得氣易散女人屬陰遇氣  
多鬱是以男子之氣病者常少女人之氣病者常  
多故治法曰婦人宜調其血以耗其氣男子宜調  
其氣以養其血此之謂也學者宜致思焉

脈法

脈經曰脈滑者多血少氣濡者少血多氣大者血  
氣俱多脈來大而堅者血氣俱實小者血氣俱

少

脈來細而緩者血氣俱虛 代者氣衰 細者氣少 浮而絕者氣欲絕 弦大而滑中有短氣

尺脈濡而堅為血實氣虛 尺脈細而微血氣俱不足也

劉立之曰下手脈沉便知是氣 沉極則伏

濡弱難愈其或沉滑氣兼痰飲病也

方法 丹溪方法 凡五條

丹溪曰周流乎一身以為生者氣也苟內無所傷外無所感何氣病之有今冷氣滯氣逆氣上氣

皆是肺受火邪氣得炎上之化有升無降薰蒸清道甚而轉成劇病 局方例用辛香燥熱之劑以火制火各將誰執又曰氣無補法世俗之論也以其為病痞滿壅塞似難於補不思正氣虛者不能運行亦滯著而不出所以為病 經曰壯者氣行則愈怯者著而為病苟或氣怯不用補法氣何由行又曰冷生氣者出於高陽生之謬言也病人自覺冷氣從下而上者非真冷也蓋上升之氣自肝而出中挾相火自下而上其熱為甚火極似水陽亢陰微又曰凡氣有餘便是火是皆為治之正論也可不究與

○調氣用木香然木香味辛氣能上升如氣鬱而不

達固宜用之若陰火衝上而用之則反助火邪

而病甚矣故當用黃栢知母而少用木香佐之

○稟受素壯而氣刺痛當用枳殼烏藥若因氣不舒

而刺痛當用木香調達之

○若肥白人氣刺痛者宜與人參白朮加枳殼木香

○一方解五藏結氣益少陰經血用拖子炒令將黑

為末以生姜汁入湯同煎飲之其効甚捷

○清膈丸治因濕熱氣滯

黃芩

黃連各五錢

香附一兩

蒼朮二兩

右為細末新取紅熟瓜萎去皮搗爛和丸如棗

豈大每服三五十丸白湯下

○正氣天香湯治婦人一切諸氣作痛或上澹心胃

或攻築脇肋腹中結塊發渴刺痛月水因之而

不調或眩暈嘔吐往來寒熱無問胎前產後一

切氣候並皆治之

烏藥一錢

香附六錢

陳皮

紫蘓

乾姜各六分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗稍熱

服

○子和木香檳榔丸此藥流濕潤燥推陳致新滋陰

抑陽散鬱破結活血通經治男子婦人嘔吐酸

水痰涎不利頭目昏眩併一切酒毒食積及米穀不化或下痢膿血大便秘塞風壅積熱口苦煩渴涕唾稠粘膨脹氣滿等證

木香

檳榔

青皮去穢

陳皮去白

黃栢

莪朮煨

枳殼

黃連

大黃

黑丑

香附各一兩

當歸一兩

右為細末滴水為丸加梧桐子大每服五七十丸溫水下以利為度

○藶合香丸大能順氣化痰併治傳屍骨蒸勞瘵卒

暴心痛小兒驚搐大人中風卒屍等證

沉香

射香另

訶子煨去核

丁香

木香

安息香另研為末用無灰

香附子另

葶撥

白朮

白檀香各二兩

薰陸香另

麝令油和入皮息膏內

龍腦另研各一兩

硃砂另研

烏犀角屑各五錢

右為細末研極勻入安息膏及煉蜜和勻丸如梧桐子大空心溫酒化下四九白湯亦可

○藶子降氣湯治氣不升降痰涎壅塞氣滿氣痛等

川歸去頭

甘草炙

前胡去蘆

厚朴姜制各半錢

肉桂去皮

陳皮去穢

半夏各半

紫蘘子另研各一錢

右細切作一服加生薑三片大棗一枚水一盞半煎至一盞去粗不拘時服

○異香散治胃氣不和飲食不化腹脇膨脹一切冷氣結聚作痛等証方見腸痛門

○沉香降氣湯治陰陽壅滯氣不升降胃膈痞悶噫醋吞酸

沉香四錢 砂仁五錢 甘草二錢 香附童便浸一兩  
右為細末每服二錢入鹽少許白湯調下

○復元通氣散治跌撲損傷或負重挫閃致氣滯於血分作痛併一切氣不宜通瘀血凝滯周身走痛等証

舶上茴香炒 穿山甲煨 木香各一兩 玄胡索各半  
白丑 甘草炙 陳皮去白各兩 當歸一兩

今加乳香 沒藥

右為細末每服二錢熱酒調下不飲酒入白湯下病在上食後病在下食前服

○木香流氣飲治諸氣痞塞不通胃膈膨脹面目虛浮四肢腫滿口苦咽乾大小便不利

藿香葉 木香不見 厚朴制 青皮去白  
香附去毛童便浸 麥門冬去心 白芷各七 甘草分五  
陳皮去白 大腹皮酒洗 乾木瓜 人參去蘆  
蓬莪朮煨 丁香皮不見 半夏湯泡各 赤茯苓去皮  
石菖蒲各三 草薢仁分五 紫蘇葉 檳榔  
白木 肉桂 木通各六 沉香七分

右細切分作二服每服加生薑三片大棗一枚水一盞半煎至一盞去粗服

○丹溪活套云蒼天之氣貴乎清淨若浩然充塞乎宇宙之間以為生生不息之運用者此一元之正氣也彼為雲為霧為風雹為雷霆鼓舞於天地之間者皆山澤濕熱鬱蒸之氣也在人者亦由是為其清純之元氣與血並行循環無端未嘗有盈虧也彼衝擊橫行于藏府之間而為痛為痞滿為積聚等証者亦由天地間雲雷之鼓舞因濕熱鬱蒸而發者也濕熱鬱蒸之久在天則為霖雨雹雪等物在人身者為積聚為痞瘕為痰氣痞滿之類治之之法在胃臆之間而為痞滿刺痛伏梁等証者二陳湯加枳實藿連桔梗瓜蒌仁木香之類在下焦而為奔豚七疝等証者本方加桃仁山查枵子枳核茴香川棟荔枝之類在兩脇攻築作痛者本方加青皮柴胡芍藥草龍膽之類在中焦而為痞滿脹急者本方加木香厚朴檳榔枳殼或用平胃散以平其敦阜之氣惟婦人胎前產後一切氣疾作楚者俱用四物湯為主治加疎利行氣之藥此治氣之大法也學者宜細詳之

論

內經曰肝脉大急沉皆為疝又曰三陽急為瘕三陰急為疝難經曰任脉之為病其內苦結男子為七疝夫所謂七疝者寒水筋血氣痲癩七者是也子和曰寒疝者囊冷結硬如石陰莖不舉或控畢丸而痛得之於坐卧濕地或寒月涉水或值雨雪或坐卧磚石或風冷處使內過房宜以溫劑下之久而無子水疝者其狀腎囊腫痛陰汗時出或囊腫狀如水晶或囊痒而搔出黃水或小腹按之作水聲得之於飲水醉酒使內過多汗出而遇風寒濕之氣聚於囊中故水冷令人為卒疝宜以逐水

之劑下之

外有漏針法  
忍誤不錄

筋疝者其狀陰莖腫脹或

潰而為膿裏急筋縮或莖中作痛痛極則痒或挺縱不收或出白物如精隨洩而下得之於房室勞傷及邪術所使宜以降心火之劑下之血疝者其狀如黃瓜在少腹兩傍橫骨兩端約絞中俗名便癰得之於重感春夏大燠勞於使內氣血流通溢滲入脬囊留而不去結成癰腫膿少血多宜以和血之劑下之氣疝者其狀上連腎脬下及陰囊多得於號哭忿怒則氣鬱之而脹號哭怒罷即氣散者是也有一治法以針出氣而愈然針有得失宜以散氣之藥下也或小兒亦有此疾俗名偏墜得之

於父已年老或年少多病陰痿精怯強力入房因而有子稟胎病也此證難治惟築賓一穴有灸之而愈者沈法宜狐疝者其狀如仰尾卧則入少腹行立則出腹入囊中如狐晝出穴而溺夜入穴而不溺此疝出入往來上下正與狐相類也亦與氣疝大同小異宜以逐氣流經之劑下之癩疝者其狀陰囊大如升斗不痒不痛者是也得之於地氣卑濕故江淮之間多有之宜以去濕之劑下之女子陰戶凸出雖亦此類乃熱則不禁固也不可便認爲虛寒而溫之補之本名曰瘕宜以苦藥下之以苦堅之愚按子和論七疝病源至爲詳悉但其

處方一以攻下之法爲主治不能使人無疑耳既曰多由房勞致虛而作其可一例施之以攻下之法乎大抵七疝爲病若非房勞所致即是遠行辛苦涉水復永熱血得寒而凝滯於小腸膀胱之分或濕熱乘虛而流入於足厥陰之經古方一以爲寒而純用烏附等熱藥爲治我卅溪先生獨斷爲濕熱此發古人之所未發者也夫熱鬱于中而寒束于外宜其有非常之痛故治法宜驅逐本經之濕熱消導下焦之瘀血而以寒因熱用之法立方處治即邪易伏而病易退也其攻下之法愚故未敢試而行之以俟識者再論學者宜致思焉

脉法

內經曰肝脉大急沉皆為疝心脉滑搏急為心疝  
肺脉沉搏為肺疝○又三陽急為瘕三陰急為  
疝○少陰脉滑則病肺風疝大陰脉滑則病脾  
風疝陽明脉滑則病心風疝太陽脉浮則病腎  
風疝少陽脉浮則病肝風疝  
脉經曰寸口脉弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行  
則惡寒緊則不欲食弦緊相搏則為寒疝  
跌陽脉浮而遲浮則為風壅遲則為寒疝繞臍痛  
若發則自汗出手足厥寒其脉沉弦者烏頭湯主  
之

方法

丹溪方法  
凡十三條

丹溪曰疝氣者畢九連小腹急痛也有痛在畢九  
者有痛在五樞穴邊者皆足厥陰之經也或無  
形或無聲或有形如瓜或有聲如蛙自素問而  
下皆以為寒蓋寒主收引經絡得寒則收而不  
行所以作痛然亦有踢水涉水終身不病此者  
無熱故也大抵此證始於濕熱在經鬱而至久  
又得寒氣外束不得疎散所以作痛若只作寒  
論恐為未備或曰厥陰經鬱積濕熱何由而致  
予曰大勞則火起於筋醉飽則火起於胃房勞  
則火起於腎大怒則火起於肝火積之久母能

令子虛濕氣便盛濁液凝聚併入血緣流于厥陰厥陰屬木係于肝為將軍之官其性急速火性又暴為寒所束宜其痛之太暴也有以烏頭枳子等分作湯服之其効亦捷後用此方隨形證加減與之無不驗但濕熱又當分多少而治濕則腫多癩病是也又有挾虛而發者當以參朮為君踈導藥佐之脾甚沉緊而豁大無力者是也其痛亦輕但重墜牽引耳專主肝經與腎經絕無相干切不可下劫藥神効蓋濕熱因寒鬱而作用枳子以降濕熱烏頭以破寒鬱况二物皆下焦之藥而烏頭為枳子之所引其性急速不容胃中停留也又謂按之不痛者屬虛須加肉桂以姜汁丸服

○一方定痾痛用海石香附為末姜汁調下

○又方治諸痾定痛速効用枳核枳子糖棗即山棗

萸各炒濕盛者加荔枝核炒為末九服或用長流水調末子空心服一二錢一本有川棟子

○又方治食積與瘀血成痛者一云少腹痛者有瘀血及有積熱者

枳子仁 桃仁 山楂 枳實 茱萸

右為末順流水入姜汁作湯調服

○又方治陽明經受濕熱傳入大腸惡寒發熱少腹連毛際結核悶痛不可忍用山枳桃仁枳核並

山查等分入姜汁煎熱服

○按之不痛者屬虛必用桂枝山梔子炒烏頭炮

右件為細末姜汁打糊丸為梧桐子大每服四五十九劫痛効

○一方治癩腰痛者一本腰不痛者一本治癩要藥蒼朮商星白芷

山楂半夏川芎枳實神麩糊丸服

○諸疝發時用海石香附二味為末生姜汁入湯調服亦治心痛因清痰而作痛者

○又治疝方橘核炒桃仁研梔子炒茺莖炒川烏炮水煎服

○小腸氣腎核脹痛蒼朮陳皮川棟子絡半一甘草半

紫蕪半一細切酒水各一盞連鬚葱白五莖煎服

○劫疝藥用烏頭梔子炒搗細順流水入姜汁調服

○陰囊腫脹大小便不通

白牽牛二桑白皮 白朮 木通去節

陳皮各半

右為細末每服二錢姜湯調下空心服

○凡疝氣挾虛者必以參朮為君佐以踈導之藥如

川棟子茴香枳實山查梔子之類

○三因葱白散治一切寒疝作痛

川芎 當歸 枳殼炒 厚朴炒

官桂 青皮 乾姜 茴香炒 茯苓 川練

麥蘖炒

神麩炒

三稜炮

莪朮炮

熟地黄

白芍藥

木香

人參各等分

右細切每服五錢加葱白三莖鹽少許水煎空心溫服

○又方桃仁十四箇枸橀子十四箇尾上炒山梔子

九枚去其茱萸七七粒山查子十四箇並炒生

姜一指大搗細以順流水一鍾盪起煎數沸連

相服

○又方治癩不痛用蒼朮神麩白芷山查川芎枳子

半夏入姜煎服

○凡癩證非痛斷房事與厚味不可用藥

○凡治七疳須先灸大敦穴

一名大腹在足大指離爪甲如韭葉大灸三

壯足厥陰井也

○治疝氣神方其病甚至氣上衝如有物築塞心臍

欲死手足冷者二三服除根

硫黃

不拘多少火中溶化即投木中出毒研細

荔枝核

為末炒焦黃色

陳皮

右三味各等分為末飯丸如梧桐子大每服十四五丸酒下其痛立止自己覺疼甚不能支持略用五六丸再不可多也

○又治疝方

蒼朮

香附各益

炒

黃柏

酒炒

青皮

去

玄胡索

益智

桃仁已上

為臣

茴香

集外

附子熇 甘草炙已上

右細切每服五錢順流水煎服

○五葉湯洗疝痛立効

枇杷葉 野紫菀葉 椒葉 蒼耳草葉

水晶蒲桃葉

右五味不拘多少量水煎湯浴洗

東

○一方肥人腫疝作痛發熱惡寒

五苓散加茴香煎服神驗

東

○吳茱萸湯治厥疝腹中冷痛積氣上逆致陰冷囊

寒

吳茱萸半 川烏頭皮去 細辛各七分 良姜

當歸 乾姜炮 官桂各二分

右細切作一服水一盞煎七分溫服日進三服

不痛

棟

○茴香棟實丸治控畢小腸痛結上而不下痛衝心

膈

茴香炒 棟實去核 食茱萸 陳皮各一

馬蘭花醋炒 芫花醋炒

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服十九至

二十九空心溫酒下

寶

○蒺藜湯治陰疝牽引小腹諸厥疝即陰疝也喜欲房勞痛不可忍

痰藜去刺

附子炮去

梔子仁各一

右細切作一服水一盞煎至六分食前溫服亦治前控畢證

○木香散治心疝小腹痛悶絕不已

木香 陳皮各半 良姜 訶子皮 赤芍藥

枳實炒各二 草薹菔 川芎 黑丑各二

右細切水一盞煎七分去粗溫服

○香殼散治小腸氣臍腹疔痛筋急陰股中痛悶暈不省人事

舶上茴香炒 枳殼炒各 沒藥兩半

右為細末每服一錢溫酒調下不拘時併進二

三服效

○寶鑑沉香桂附丸治中氣虛弱甚脾胃虛寒藏府積冷心腹疼痛手足厥逆冷便利無度七疝引痛喜熱物熨盪証

沉香 附子炮 川烏炮 乾姜炮

良姜 官桂 吳茱萸湯泡 茴香炒各

右為細末醋煮麩糊為丸如梧桐子大每服五十九至七十九空心米飲下

○元戎加味五苓散治疝氣卒腹痛小便秘澀本方加川棟子一分右為細末每服二錢空心米飲調下

○苗香棟實丸治陰疝痛不可忍及小腸氣痛

川棟子炒

苗香炒

山茱萸

食茱萸

吳茱萸

青皮

陳皮

芫花

方宜減半

馬蘭花

分各等

較之前方多吳茱萸青皮

右為細末醋糊丸如梧桐子大每服三十九空

心溫酒下

○天台烏藥散治小腸疝氣牽引臍腹疼痛

烏藥

木香

茴香炒

青皮

良姜

半炒各兩檳榔炒

川棟子炒

巴豆七枚

右先以巴豆微打破用川棟子麩炒黑去麩及

巴豆不用其餘藥同為細末每服一錢溫酒調

○濟生葵子湯治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾

燥膀胱作痛

赤茯苓

猪苓

冬葵子

枳實

瞿麥

木通

黃芩

車前子

滑石

各半

甘草二分

右細切作一服加生姜三片水煎空心服

○丁香棟實丸治男子七疝痛不可忍婦人瘦聚帶

下甘任脉所主陰經病也乃腎肝受邪故治同

法

當歸

附子炮

苗香炒

川棟子各一

右細切用好酒三升同煮酒盡為度焙乾為細末每末子一兩入

丁香

木香

各半

玄胡索

五錢 全蝎十枚

右為末與前藥同拌勻酒糊為丸如梧桐子大每服三十九加至一百丸空心温酒送下

○一捏金散治七疝及奔豚氣痛不可忍者神効

方見氣門

○卅溪活套云凡治七疝多用熱藥而獲効者即內經從治之法耳須用寒涼藥監制之不可純用大熱之劑如烏頭附子之類令人久服多服必變劇不可治矣但宜以二陳湯加枳實橘核枳

子山查等藥煎入生姜汁熱飲之○恐有瘀血作痛者本方加玄胡索桃仁泥○如有氣作痛者本方加木香茴香棟實等藥○如六脉沉細手足厥冷者本方加附子乾姜肉桂之類以佐之○如畢丸痛甚者加荔枝核乳香沒藥為細末調入本方煎藥內或別用順流水調服亦可○如水腎腫大如升斗者本方去甘草加海藥昆布荔枝核茴香川棟等藥為末順流水調服作丸子亦可

○祖傳經驗馬蘭花丸治七疝癩氣及婦人陰癩墜下小兒偏墜等證無有不効者

馬蘭花醋

川棟子

橘核

海藻

海帶

昆布

三味俱洗桃仁各一兩厚朴制

木通

枳實黃色

玄胡索

肉桂

木香

檳榔各半

脰沉細手足逆冷者加

川烏頭一箇

炮五錢

右為細末酒糊丸如梧

桐子大每服五七十九或酒或姜鹽湯送下

脚氣

六三十一

論

內經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰傷于濕者下先受之蓋脾主四肢足居於下而多受其濕濕鬱成熱濕熱相搏其病作矣是以先從氣衝穴隱核痛

起及兩足脛紅腫或惡寒發熱狀若傷寒筋掣掣痛是其候也或一旬或半月復作如故漸漸而致於足筋腫大如瓜瓠者多有之矣東南卑濕之地比比皆是西北高燥之方鮮或有之古方名為緩風繇宋元以來呼為脚氣原其所由非止一端有從外感而得者有從內傷而致者所感雖有內外之殊其為濕熱之患則一也故異法方宜論云北方者其地高陵居風寒水冽俗飲醴酪而肉食皆以飲多速飲為能經曰因而大飲則氣逆夫乳酪醇酒者濕熱之物飲之屬也加以奉養太過又滋其濕水性順下氣不能响故下注於足脛積久而

為腫滿疼痛此飲食下流之所致也東南地勢卑下濕氣迷滿山澤行履坐卧無處不有若稟壯而氣實者不能侵賊其氣虛血少之人或遇房勞及負重遠行衝冒雨雪寒濕乘虛而客襲於足而成此証是外感寒濕之所致也大抵病因有內外之殊而治法無表裏之異耳故為治者宜通用蒼朮白朮之類以治其濕知母黃柏條芩之類以去其熱當歸芍藥生地黃之類以調其血木瓜檳榔之類以行其氣羌活獨活以利關節而散風濕兼用木通防己川牛膝之類引藥下行及消腫去濕以為此證大法不過如此東垣曰濕淫所勝治以苦

溫以苦辛發之透關節勝濕為佐以苦寒泄之流濕清熱為臣故立當歸粘痛湯以治之其效捷如影響針經曰有道以來必有道以去治宜多以熇灸為佳以導引其濕熱之氣外出也學者宜詳究焉

### 脈法

脈弦者風濡弱者濕洪數者熱遲澁者寒微滑者虛牢堅者實結則因氣散則因憂緊則因怒細則因悲

### 方法

丹溪方  
法三條

丹溪曰脾氣從濕從下須提起其濕在下之藥隨

氣血用入心則恍惚謬妄嘔吐食不入眠卧不安左寸脉大右寸小或右寸有左無者死○入腎則腰脚腫小便不通呻吟目與額皆黑氣衝胃而喘左尺脉絕者死

○治濕熱脚氣方

紫蘊

黃栢益酒

芍藥

木瓜

澤瀉

木通

防已

檳榔

蒼朮

枳殼熱炒黃色

甘草炙

香附

羌活

痛加木香腫甚加大腹皮發熱加

黃連大黃

右細切水煎服痛除腫退則佳服

○防已飲

黃栢酒炒

蒼朮益水

白朮

防已各七分

生地黄

檳榔

川芎各半

犀角屑

甘草節

木通

黃連各三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗食前溫服○有熱加黃芩○熱甚及天令暄熱加石膏○有痰加竹瀝姜汁或南星○便秘加桃仁○小便秘澀加牛膝○如常腫者專主乎濕熱肥人加痰藥

○健步丸

蒼朮

當歸尾各一

生地黄

陳皮

芍藥 各一兩半 川牛膝 五錢

大腹子 三錢 茱萸

條芩 各五錢 桂心 二錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服一百丸白朮木通湯送下食前服

○加味四物湯治脚氣衝心

本方加炒黃柏煎服更於湧泉穴用附子末津調捏作餅子貼穴上以艾炷多灸以泄引其熱下行

○一方治食積流注用

蒼朮 防已 黃柏 酒炒 南星 川芎 白芷 犀角 檳榔

血虛加川牛膝龜板酒糊為丸服

○轉筋屬血熱四物湯加酒芩紅花煎服○有筋動於足大指上至大腿近腰結了此奉養厚因風寒而作又當加蒼朮南星

○羌活導滯湯治脚氣初發一身盡痛或肢節腫痛便溺阻隔先以此藥導之後用當歸粘痛湯以徹其邪

羌活 獨活 各一分 防已 當歸尾 各七分

大黃 二分 枳實 五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗空心溫服

○當歸粘痛湯治濕熱脚氣為病肢節煩疼肩背沉重胃脘不利兼遍身疼痛下注足脛腫痛脚膝生瘡赤腫及裏外生瘡膿水不絕或痒或痛並宜服之

羌活錢一

人參

苦參

升麻

葛根

蒼朮各四

甘草炙

黃芩酒炒

茵陳酒炒各錢一

防風

當歸身酒洗

知母去毛酒制

澤瀉

猪苓去皮

白朮各半

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗空心溫服臨卧再進一服

○開結導引丸治脚氣飲食不消心下痞悶

白朮

橘紅

澤瀉

茯苓

神麴炒

麥芽麴炒

半夏炮七次各一兩

枳實炒

巴豆霜各二錢半

青皮

乾生姜各五錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九或七八十九溫水下

○麻黃左經湯治風寒濕流注足太陽經腰脚攣痺

關節重痛增寒壯熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛脚軟等証並皆治之

麻黃

乾葛

細辛

白朮

茯苓

防己

肉桂

羌活各半

甘草

防風去蘆各二分半

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水煎服

○半夏左經湯治足少陽經為風寒濕流注發熱腰

脇疼痛頭目眩暈嘔吐不食熱悶煩心腿解緩

縱不能行步

半夏

乾葛

細辛

白朮

麥門冬

茯苓

肉桂

防風

乾姜

黃芩各半

小草

甘草

柴胡各三分

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞

半煎至一盞溫服如熱悶加竹瀝喘急加杏仁

桑白皮

三

○六物附子湯治四氣流注於足大陰經骨節煩疼

四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫

附子炮

肉桂

防已各一分

甘草炙五分

白朮

茯苓各七分

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一

盞溫服

○肩方換腿丸治足三陰經為四氣所乘發為攣痺

緩縱上攻胃脇肩背下注脚膝疼痛足心發熱

行步艱難

薏苡仁炒

南星炮

石南葉

石斛

檳榔

草薺

川牛膝洗酒

羌活

防風

木瓜各四兩

黃芪

當歸尾

天麻

續斷各一兩

右細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九益湯下

○五積散治寒濕流注經絡脚膝腫滿疼痛等證

方見腰痛門

○導水丸治脚氣跗腫疼痛或發熱惡寒濕熱大盛者

大黃

黃芩各二兩

黑丑取頭末

滑石各四兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服四五十

九溫水送下以利為度

○除濕丹治諸濕病腰膝腫痛足脛浮腫筋脉勁急

津液凝澁便溺不利等證

檳榔

甘遂

歲靈仙

赤芍藥

澤瀉

葶藶子各二兩

沒藥各一兩

黑丑兩半

大戟炒三兩

陳皮四兩

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服五十九溫水下以利為度

○三花神祐丸治濕熱流注足膝浮腫肢節煩疼行

步重墜等證方見痿飲門

○祖傳經驗杉木節飲治脚氣發作惡寒發熱兩足

腫大心煩體痛垂死者

杉木節四兩檳榔七枚大腹皮酒洗青橘葉四片

右細切作一服用順流水三升煎至一升分作三服一日服盡如大便通利黃水其病除根未愈過數日再煎一劑服之病根去為度外以杉木橘葉不拘多少煎湯洗之神效

○又經驗勝濕餅子治遠年脚氣足脛腫如瓜瓠者

黑丑一兩取頭末五錢白丑一兩取頭末五錢甘遂連珠者五錢

右三味再同研極細外用蕎麥麩一兩半連藥末和勻水調捏為餅子折如三錢大放飯上蒸熟每服一餅空心嚼茶清送下以利為度未利

又服一餅忌甘草菘菜生冷油膩魚腥等物

**痛風**古名痛痺 七十

論

內經曰諸風掉眩強直支痛痲戾裏急筋縮皆足厥陰風木之位肝膽之氣也又曰風寒濕三氣雜至今而為痺其風氣勝者為行痺寒氣勝者為痛痺濕氣勝者為著痺以冬遇此為骨痺以春遇此為筋痺以夏遇此為脉痺以至陰六月也遇此為肌痺以秋遇此為皮痺夫古之所謂痛痺者即今之痛風也諸方書又謂之白虎歷節風以其走痛於四肢骨節如虎咬之狀而以其名名之耳丹溪

曰大率因血虛受熱其血已自沸騰或加之以涉水受濕熱血得寒汚濁凝滯不得運行所以作痛夜則痛甚行於陰也治以辛溫監以辛涼流散寒濕開通鬱結使血氣行更能慎口節慾無有不安者也

### 脉法

脉經曰脉溢而緊者痺 少陰脉浮而弱弱則血不足浮則為風風血相搏則疼痛如掣  
或人脉瀦小短氣自汗出歷節疼不可屈伸此皆飲酒汗出當風所致也

寸口脉沉而弦沉則主骨弦則主筋沉則為腎弦

則為肝汗出入水中因水傷心歷節痛而黃汗出故曰歷節風也

味酸則傷筋筋傷則緩名曰泄味鹹則傷骨骨傷則痿名曰枯枯泄相搏名斷泄榮氣不通衛不獨行榮衛俱微三焦無御四屬斷絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出脛冷假令發熱變為歷節風疼痛不可屈伸

### 方法

丹溪方法  
凡一十條

丹溪曰因濕痰濁血流注為病以其在下焦道路遠非烏附氣壯不能行故用為引經若以為主治之非惟無益而有殺人之毒此病必行氣流

濕舒風導滯血補新血降陽升陰治有先後須  
明分腫與不腫可也不可食肉肉屬陽大能助  
火素有火盛者小水不能制若食肉厚味下有  
遺溺上有痞悶須將魚腥麩醬酒醋皆斷去之  
先以二陳湯加酒浸白芍藥少佐以黃連降心  
火看作何應又為嘔處也

○大法用蒼朮南星川芎白芷當歸酒蒸在上者加  
羌活桂枝桔梗蕨靈仙在下者加牛膝防已木  
通黃栢

○加味四物湯治白虎歷節風證本方加

桃仁 牛膝 陳皮 茯苓

甘草 白芷 草龍膽

如痛在上者屬風加羌活桂枝蕨靈仙○在下  
者屬濕加牛膝防已木通黃栢○氣虛者加人  
參白朮龜板○有痰者加南星半夏生姜○血  
虛者倍川歸川芎佐以桃仁紅花水煎服之

○因痰者二陳湯加酒洗黃芩羌活蒼朮

○因濕者用蒼朮白朮佐以竹瀝姜汁及行氣之藥

○或曰有濕鬱而周身走痛或關節間痛遇陰寒即

發當作濕鬱治或用白朮一味酒煎服之其痛立愈

○肥人多是濕與痰飲流注經絡脈必滑瘦人多是

血虛與熱脈必澀

○下部有濕腫痛用防已龍膽草黃柏知母固是捷

藥若肥人病此宜蒼朮白朮南星滑石茯苓之

類瘦人宜用當歸紅花桃仁牛膝檳榔等藥

○薄桂味淡者能橫行手臂領南星蒼朮等藥至痛

處

○葦靈仙治上體痛風人虛弱勿用

○一方治上中下痛風

黃柏酒炒 蒼朮米泔浸 南星各二 神麩炒

合芎各一 防已 白芷 桃仁各五

葦靈仙酒炒 桂枝橫行 羌活各三 草龍膽一分

酒紅花五分

右為細末神麩糊丸如梧桐子大每服一百丸

空腹服

○大羌活湯治風濕相搏肢節疼痛

羌活 升麻各一 獨活炒 蒼朮

防已 葦靈仙 白朮 川歸

茯苓 澤瀉各五

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗空腹

溫服

○四妙散治走注疼痛

葦靈仙酒浸 羌活各五 獨活炒 羌朮 蒼耳子半

白芥子半

○一方治飲酒濕痿痛風  
右為細末每服一錢匕姜湯調下

黃柏酒炒

葳靈仙

酒炒各五錢

蒼朮

米泔浸一宿

羌活

各三錢

甘草

炙三錢

陳皮

白去

芍藥

各一錢

右為細末每服一錢匕生薑湯調下

○凡因久痢後兩脚痠軟疼痛或膝腫如鼓槌者此

亡陰也宜以芎歸熟地黃等補血藥治之自愈

挾氣虛者加參芪挾風濕者加羌活防風白木

之類切不可純作風治反燥其血終不能愈

○氣血兩虛有痰濁陰火痛風

人參

山藥

海石

商星

各一兩

白朮

熟地黃

黃柏

酒炒

龜板

酥炙各二兩

乾姜

燒存性

瑣陽

各五錢

右為末酒糊為丸服

○肢節腫痛痛屬火腫屬濕兼受風寒而發動於經

絡之中濕熱流注於肢節之間而無已也

麻黃

去根節

赤芍藥

各一錢

防風

荆芥

羌活

獨活

白芷

蒼朮

葳靈仙

片苓

酒浸

枳實

桔梗

葛根

川芎

各半錢

甘草

當歸梢

升麻

各三分

下焦加酒黃柏

○婦人加酒紅花

○腫多加攢柳大腹皮澤瀉更加沒藥一錢定痛

尤妙○一云脉溢數者有瘀血宜用桃仁紅花

芎歸加大黃微利之

○二妙散治脚氣下焦濕熱成痛

黃栢酒浸二兩 蒼朮米泔浸一宿二宿冬

右為細末沸湯入姜汁調服或用蒸餅為丸姜  
鹽湯送下二味皆有雄壯之氣表實氣實者加  
酒少許佐之有氣加氣藥血弱加補血藥痛甚  
者加生姜汁熱服

○潛行散用黃栢一味酒浸曝乾為細末每服方寸  
匕煎四物湯調下治血虛陰火痛風藥也多服  
貼數取效

○手臂痛是上焦濕痰橫行經絡中作痛也

半夏

酒芩

白朮

南星

香附各一錢

陳皮

茯苓各五分

蒼朮一錢

葳靈仙三錢

甘草三分

右細切作一服加生姜五片水二盞煎至一盞  
食後服

○加味二陳湯治臂痛

本方加酒芩羌活葳靈仙入姜水煎食後溫服

○一方治痛風神効

赤芍藥

青皮各半

紫威

台芎各七分

葳靈仙

木鱉子各半

防風七分

甘草五分

右細切作一服酒煎服之

○治婦人胃背脇疔痛

赤芍藥錢一

桂枝

蒼朮

各半

香附

炒黃柏錢一

歲靈仙

七錢半酒拌濕炒

甘草五分

右細切作一服水二盞煎至一盞服

○治走注疼痛方

歲靈仙

蒼朮

桂枝

川歸

桃仁

去皮尖炒各一錢

生桃仁七

甘草二錢

川芎一錢

右細切作一服加生姜五片水二盞煎至一盞

入童便竹瀝各半盞再煎至一盞熱服忌猪羊

鷄肉魚腥濕麩

○定痛丸治風濕一切痛

乳香

沒藥

金星草

地龍

五靈脂

木鱉子

去壳

右各等分爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一

丸溫酒磨化下或只作小丸溫酒送下亦可

○世俗有用草藥而獲速効者如用石綠以爲之君

過山龍等以爲之佐皆性熱而燥者不能養筋

滋陰但能燥濕病之淺者濕痰得燥而開瘀血

得熱而行故有速効若病之深而血少者愈劫

愈虛而病愈深矣戒之戒之

○黃芪酒治風寒濕痺身體頑麻皮膚燥痒筋脉攣

急語言蹇澁手足不遂等証

黃芪

防風

桂枝

天麻

草薺

石斛

虎脰骨炙

白芍藥

當歸

雲母粉

白朮

茵芋葉

木香

仙靈脾

甘草

川續斷各一兩

右細切以生絹袋盛用無灰好酒一斗以麩罐浸之包封罐口勿令泄氣春五夏三秋七冬十日每服一盞溫飲之不拘時候

方局

○獨活寄生湯治肝腎虛弱感冒風濕致痿痺兩足

緩縱軟弱不仁方見腰痛門

○防風天麻散治風濕麻痺肢節走注疼痛中風偏

枯或暴暗不語內外風熱壅滯昏眩

防風

天麻

川芎

羌活

白芷

草烏頭

白附子

荆芥穗

當歸

甘草炙各兩白滑石二兩

右為細末每服半錢加至一錢熱酒化蜜少許調下覺藥力運行微麻為度或煉蜜為丸如彈子大每服半丸至一丸熱酒化下白湯亦可此藥散鬱開結宜風通氣之妙劑也

方局

○舒筋湯治臂痛不能舉蓋是氣血凝滯經絡不行

所致一名通氣飲子一名五痺湯其效如神

片子姜黃二錢

甘草炙

羌活各半錢

海桐皮去外

當歸頭去

赤芍藥

白朮各一

右細切作一服加生薑三片水一盞半煎至一盞去粗磨沉香少許入內溫服凡腰已上痛食後腰以下痛食前服

○祖傳經驗九藤酒治遠年痛風及中風左癱右瘓筋脉拘急日夜作痛叫呼不已等証其功甚速

青藤

釣鈎藤

紅藤脚理省

丁公藤又名風藤

桑絡藤

兔絲藤脚無根藤

天仙藤即青木香也

陰地蕨名地茶取根各四兩

五味子藤俗名紅

忍冬藤各二兩

右細切以無灰老酒一大斗用磁罐一箇盛酒

其藥用真綿包裹放酒中浸之密封罐口不可泄氣春秋七日冬十日夏五日每服一盞日三服病在上食後及卧後服病在下空心食前服○經驗加味二妙丸治兩足濕痺疼痛或如火燎從足跗熱起漸至腰胯或麻痺痿軟皆是濕為病此藥主之

蒼朮四兩米泔浸

黃柏二兩酒浸日乾

川牛膝一兩去蘆

當歸尾一兩酒洗

川草薢一兩

防已一兩

龜板酥炙一兩

右為細末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服一百凡空心姜盞湯下

○經驗川木通湯一男子年四十歲因感風濕得白  
虎歷節風証變身抽掣疼痛足不能履地者三  
年百方不効身體羸瘦骨立自分於死一日夢  
與木通湯服愈遂以四物湯加水通服不効後  
以木通二兩剉細長流水煎汁頓服服後一時  
許變身痒甚上體發紅丹如小荳大粒舉家驚  
惶隨手没去出汗至腰而止上體不痛矣次日  
如又於前煎服下體又發紅丹方出汗至足底汗  
乾後通身舒暢而無痛矣一月後人壯氣復步  
履如初後以此法治數人皆驗故錄於此以示  
後學

○經驗薰洗痛風法治手足冷痛如虎咬者

用樟木屑一斗以急流水一担熬沸以樟木屑  
置於大桶內桶邊放一兀窠用前沸湯泡之桶  
內安一矮窠子令人坐桶邊放脚在內外以草  
薦一領圍之勿令湯氣入眼恐壞眼其功甚捷

痿証 八三十

論

內經曰肺熱葉焦五藏因而受之發為痿躄心氣  
熱為脉痿則經縱而不任地肝氣熱為筋痿故筋  
急而攣脾氣熱為肉痿則胃乾而渴肌肉不仁腎  
氣熱為骨痿則腰膝不舉骨枯而髓減又曰治痿

者獨取陽明一經陽明者五藏六府之海主潤宗筋能束骨而利機關也衝脉者經脉之海也主滲灌谿谷與陽明合於宗筋陰陽總宗筋之會會於氣衝而陽明爲之長皆屬於帶脉而絡於督脉故陽明虛則宗筋弛縱帶脉不引故足痿不用也治法各補其榮而通其腧調其虛實和其逆順筋脉骨肉各以其時受月言治諸痿宜調補各藏以待其旺月而病安也丹溪曰內經謂諸痿起於肺熱又謂治痿獨取陽明一經蓋肺金體燥居上而主氣畏火者也脾土性濕居中而主四肢畏木者也火性炎上若嗜慾無節則水失所養火寡于畏而侮所勝肺得火邪而熱

下

矣木性剛急肺受熱則金失所養木寡于畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管攝一身脾傷則四肢不能爲用而諸痿作矣瀉南方則肺金清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿之法無出於此雖然天產作陽厚味發熱凡病痿者若不淡薄食味吾知必不能保其安全也又曰內經論風論痿各有篇目源流不同治法迥異局方以治風之藥通治諸痿何其謬哉按丹溪此論一出掃盡千古之弊學者睨而不視則爲曠者之雷霆瞽者之日月耳夫醫爲

人之司命其可不盡心於此乎

脉法

脉經曰肺痿脉必浮而弱其入欲效不得效效則出乾沫久久則小便不利

寸口脉不出反為發汗陽脉早索陰脉不澁三焦踰入而不出陰脉不澁身體反冷其內反煩多唾唇燥小便反難此為肺痿傷于津液便如爛瓜亦如豚膏但因誤發汗故也

方法丹溪方法凡九條

丹溪曰有濕熱有痿有血虛有氣虛亦有死血者有食積妨碍升降者盧氏曰上文論痿起於肺熱實痿之本論治法之大

要也而此云然者蓋以其發而為病所因所挾或有不同而主治亦當各著其所重也

○東垣取黃柏為君黃芪等補藥為輔佐以治諸痿無一定之方有兼痿積者有濕多者有熱多者有濕熱相半者有挾氣者臨病制方其善於治痿者乎

○濕熱用東垣健步丸加燥濕降火之劑黃柏黃芪蒼朮之類

○濕痰用二陳湯加蒼朮白朮黃芪黃柏之類入竹瀝薑汁

○血虛用四物湯加蒼朮黃柏下補陰丸

○氣虛用四君子湯加蒼朮黃芪黃柏

○黃栢蒼朮治痿之要藥也

○虎潛丸補腎丸皆可治痿

○加味四物湯治諸痿四肢軟弱不能舉動

當歸身錢一 熟地黃錢三 白芍藥 川芎各七分

五味子錢九 麥門冬錢一 人參錢半 黃栢錢一

黃連錢半 知母錢三 杜仲半斤七分 牛膝足三分

軟者不用 蒼朮錢一

右細切作一服水二盞煎至一盞空心溫服酒

糊為丸服亦可一云血虛者以四物湯加黃栢

蒼朮下補陰丸

○健步丸治膝中無力屈伸不便腰背腿脚沉重行

步艱難

羌活 柴胡 滑石炒 甘草炙

瓜蒌根酒洗 肉桂各五分 防風 澤瀉各三錢

防己酒洗 川烏炮 苦參酒浸各

右為細末湯煮麩糊為丸如梧桐子大每服七

十九煎愈風場下湯一云荆芥湯下按荆芥

○大防風湯治兩足痿弱或沉重麻痺不能行動兩

膝虛腫名曰鶴膝風等證方見中

○祖傳經驗治兩足痿弱軟痛或如火焙從足踝下

上衝腿膝等證因濕熱所成者

蒼朮米泔浸 黃栢酒浸 牛膝去芦 龜板炙

虎脛骨雞

防已各一兩

當歸尾兩

右為細末，麩糊為丸，如梧桐子大，每服十七丸，或一百丸，空心姜盞湯下，一方加炮附子五錢。

○又經驗鹿角膠丸治血氣虛弱兩足痿軟不能行動，又卧床褥之證，神效。

鹿角膠斤一

鹿角霜

熟地黃各半斤

川牛膝

白茯苓

兔絲子

人參各二兩

當歸身四兩

白朮

杜仲各二兩

虎脛骨雞

龜板酥炙各一兩

右為細末，別將鹿角膠用無灰酒二盞烱化為丸，如梧桐子大，每服一百丸，空心姜盞湯下。

論

諸虫附發砂三十九

內經曰：腸胃為市，無物不受，無物不包。又曰：飲食自倍，腸胃乃傷。若夫飲食不能謹節，則朝損暮傷，自傷成積，積又成熟，濕熱相生，而諸般奇形之虫，各從五行之氣而化生矣。若腐草為螢之類是也。外臺秘要所謂九虫者，皆能食人府藏。一曰伏虫，長四寸許；二曰蛔虫，長尺許；三曰白虫，長四五尺，餘四曰肉虫，狀若爛杏；五曰肺虫，其狀如蠶；六曰蝟虫，狀如蝦蟇；七曰弱虫，又名膈虫，狀如瓜瓣；八曰赤虫，狀如生肉；九曰蟯虫，狀如菜虫，形至細微。

其伏虫又為諸虫之主也蛔虫生虫生發多則貫心即殺人白虫虫生子相生其形轉大而長亦能殺人肉虫食人令人煩滿肺虫令人欬嗽蝟虫令人嘔吐欬逆喜噦弱虫令人多唾赤虫令人腸鳴蟻虫居廣腸多則為痔劇則為癩因入瘡處以生諸癰疽癬癩疔齧蝕若虫之類無所不為人亦不必盡有亦不必甚多或偏有或偏無皆能為害者也凡此諸虫依附腸胃之間若元氣尚實未為大害稍有虛損遂能侵蝕隨其虫動而變生諸病也若夫膈噎勞瘵癩風蠱脹狐惑傷寒等証無不生虫又如蟻鼠應聲虫之類未易悉舉醫者宜於各

類推而治之可也

### 脉法

脉沉實者生虛大者死尺脉沉而滑者為寸白虫蠱蝕陰疔脉虛小者生緊急者死  
外臺云虫脉當沉弱而弦今反洪大即知蛔虫甚也

### 方法

丹溪方法  
凡二條

丹溪曰濕熱之生虫藏府虛則侵蝕上半月虫頭

向上易治下半月虫頭向下難治已上二月字

字蓋虫無半月一轉頭之理也先以蜜或砂糖少引虫頭向

上然後用殺虫藥

人活

○腹内熱腸胃虛虫行求食上唇有瘡曰感虫食其  
藏下唇有瘡曰狹虫食其肛

○治蜜桃仁湯治狐惑唇口生瘡上唇虫食其藏下  
唇虫食其肛

桃仁

槐子

艾各五錢

大棗十五枚

右用水二盞半煎至一盞半分二服

人活

○雄黃銳散治前證

雄黃

青箱子

苦參

黃連各二錢

桃仁錢一

右為末搗新艾汁和捏如小指頭大納穀道中  
治虫蝕其肛也

寶鑑

○寶鑑化虫丸治諸虫

鶴虱去土

檳榔

苦楝根東引不  
出土者

胡粉炒各  
一兩

明白礬括二  
錢半

右為細末米糊為丸如梧桐子大一歲兒服五  
九量入大小加減丸數溫漿水入生麻油三四  
點打勻送下清米飲亦可不拘時候其虫細小  
者皆化為水大者自下

○集効丸

木香

鶴虱炒

檳榔

訶子麩裏煨  
去核

燕萸炒

附子炮去  
皮臍

乾姜各七  
錢半 大黃一兩  
半

烏梅十四箇  
去核

右為末煉蜜丸如麻子大陳皮湯或醋湯下一方加黃連黃栢各七錢半

○萬應丸

檳榔五兩

大黃八兩

黑丑四兩已上  
三味為末

皂莢十錢不  
蛙者苦棟根皮斤一

右先以皂莢苦棟用水二大碗熬成膏一處搜和藥末為丸如梧桐子大又以沉香木香雷丸各一兩為末為衣先以沉香衣次用雷丸衣又次用木香衣每服三九四更時用砂糖水送下

○一方用鷄子炒白蠟塵酒糊丸服治寸白虫

○一方黑鉛炒成灰檳榔末等分和勻米飲調下

○化虫丸能化虫為水

硫黃兩一

木香五錢

蜜陀僧

附子一枚炮  
另為末

右先以附子末醋一盞熬膏餘藥研為細末以附子膏和勻丸如菘苳大每服二十九荆芥茶清下

○一方用苦棟根檳榔鶴虱三味濃煎湯飲之

○前胡湯治脾勞身熱內有白虫在脾為病令人好嘔而胃中欬嘔而不出

前胡

白朮

赤茯苓

細辛

杏仁去皮尖

草龍膽

常山各二錢

枳實

松蘿各七

旋覆花分五

竹葉分

右細切作一服水二大盞煎至一盞去粗溫服  
○若腹中熱滿悶加芒硝半錢梔子黃芩苦參  
各半錢加水煎忌桃李雀肉醋生葱菜等物

○茱萸根湯治脾勞熱內有白虫食脾為病與前證  
同

茱萸根東引者一錢 火麻子八錢 陳皮半一兩

右三味細切水煎服或下虫或下黃汁凡合此  
藥禁聲勿語虫覺便無效此方治虫甚驗

○五膈下氣丸治肺勞熱瘦損內有肺虫在肺為病  
令人咳逆氣喘或為憂忿氣膈寒熱皆從勞之  
所生名曰膏盲疾針灸不著

麥門冬五兩去心 蜀椒炒出汗一兩 遠志肉 附子各半

乾生薑兩半 甘草炙半兩 人參七錢

桂心二錢 百部 白朮 黃芪各半

杏仁去皮尖及双仁者二十四粒 細辛兩半

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸徐徐嚼  
化嚥汁忌猪肉冷水海藻菘菜生葱桃李雀肉  
等物

○千金散療腎勞熱四肢腫急蟻虫生於腎中為病

貫衆三兩炒 乾漆二兩炒 蕪荑 胡粉

槐白皮各一兩 吳茱萸五十粒 杏仁四十五粒

右為細末平且以井花水調服方寸匕增之以

病瘥止

外臺

○三聖飲子治勞熱生虫在肺為病

茱萸根

東引者五兩

桑白皮

東引者一兩

狼芽子

三兩

右三味細切以酒七升煮取一升半平且服盡

外臺

○五鳳丸治肝勞熱生長虫在肝為病令人恐畏不安眼中赤壅

烏鷄卵

五枚去黃

東引茱萸根

外切三兩

黃蠟

乾漆

四兩兩炒

粳米粉

外半

右五味以茱萸根乾漆并為細末和入銅銚中火煉可丸如小豈大隔宿勿食後飯清晨以米飲下一百二十九丸小兒五十九丸虫即爛盡

外臺

○雷公丸治心勞發熱心中有長虫名曰蠱虫長一尺許貫心即死

雷丸

炒五

陳皮

桃仁

各一兩二錢半去皮尖另研

貫衆

蕪荑

青箱子

乾漆

各一兩

亂髮

如鷄子大塊燒存性 殭蠶

十四枚炒

右為細末煉蜜丸如小豈大空心溫酒送下二十九日三服自前胡湯以下七方俗五藏勞虫方也當與前勞極方互用

外臺

○廣濟療蛔虫方

酸石榴根

引者二斤

檳榔

十枚細切

右二味以水七升煮取二升半去粗以粳米煮稀粥平且空腹食之小間虫並死快利神効

○又治蛔虫方

用苦楝根生子者剥引刮去外藤皮取内白皮  
二兩以水三碗煮取一碗半去粗用晚粳米三  
合煮糜粥空心先以炒肉一二片吃引虫向上  
然後進藥粥一二口少頃吃一二口漸漸加至  
一碗或二碗其虫盡下而愈

○祖傳經驗橫柳丸治小兒疳積氣塊痛腹大有  
虫等證

三稜用切醋炒莪朮細切醋炒橫柳一两枳實去穰炒黃色  
陳皮去白各半蕪荑二錢雷丸五錢鶴虱三錢  
訶漆五錢木香三錢良姜二錢

砂仁去壳麥蘖炒胡黃連炒

甘草炙神麩黃色炒

右為細末醋米糊為丸如葶藶大每服三五十  
丸空心淡姜湯下今加史君子肉五錢尤妙

○又經驗治婦人陰蝕瘡陰戶中有細虫其痒不可

忍食入臟腑即死令人發寒無與勞証相似  
先用蛇床子煎湯洗淨搥乾付後藥梓樹皮不

右焙乾為末入枯礬四分之一射香少許付之  
立効

○予曾治一婦人因採桑見桑有金虫如蠶者被

毒謂之金蠶毒腹中疝痛欲死召予治予以  
木屑濃煎湯與之大吐吐出有金絲如亂髮者  
一塊腹痛減十分之七八又與甘草湯連進二  
三盞而安

新編醫學正傳卷之四終

6275  
53

