

醫學正傳卷之七目錄

安順

春翠

○婦人科上經

論 脉法

文庫


子

佐山
重致

固經丸

六

三



延胡

入參補氣湯

增味四物湯

才附

黃

補經

溫胃補血湯

四聖散

挑仁

立

益

經下取

文

小膠丸
按
又膠艾丸
妊一
娠下血如月信來方
胎孕無
胎動衝心煩悶方
娠因

丹溪東胎丸

丹溪達生散

臨月養胎方

催生散

紅苋馬齒莩胎說

雜

當歸散

子

傳經驗秘方

下方

祖傳治月衣不下三

○婦人科

產後

論 脉法

丹溪方法十一條

嚴氏清菟散

愈風湯

姪娠遺尿失禁方

子煩方

治子煩犀角散

治子煩當歸飲

治子煩竹瀝湯

產寶澤瀉散

張仲景方

木通散

金生白朮散

鯉魚湯

紫菀飲

天仙藤散

安榮散

地膚子湯

治子淋方

冬葵子散

車前散

忘憂散

葛根湯

防已湯

消風散

天門冬飲

百

緩息汁

八味丸

卅

丹溪轉胞論

安胎散

加味四物湯

苧根湯

羚羊角散

歸宗節命散

白扁豆散

芎藭補中湯

當歸芍藥湯

芎木香連丸

姙娠泄瀉方

芎藭散

升麻六州

姙娠傷寒體痛方

傷寒安胎

又姙娠傷寒方

催生散

姙娠咳嗽方

姙娠嗽紅痰方

小產下血不止方

小產後心腹痛方

安榮湯

兒在腹中叫哭方

又治鳴胎方

新產不可用芍藥

產後乳汁不通方

產後泄瀉痢方

乳母小水短少說

產婦損破尿脬

黑神散

芎藭方

醫學正傳卷之七目錄終

新編醫學正傳卷之七

花溪恒德老人虞搏天民編集

姪孫虞守愚惟明校正

婦人科 上月經

論

內經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月
其傳為風消為息奔者死不治難經曰心出血汗
納血肺出氣腎納氣蓋婦人百病皆自心生如五
志之火一起則心火亦從而燔若夫經閉不通之
証先因心事不足由是心血虧耗故乏血以歸肝
而出納之用已竭經曰母能令子虛是以脾不磨

而食亦少所謂二陽之病發心脾者此也二陽者陽明也因食少故肺金亦失所養而氣滯不行則無以滋腎陰况月經全藉腎水施化腎水既乏則經血日以乾涸以致或先或後淋瀝無時若不早治漸而至於閉塞不通甚則為癥瘕血膈勞極之證不易治也又如崩漏不止之證先因心火亢甚於是血脈泛溢以致肝實而不納血出納之道遂廢經曰子能令母實是以肝腎之相火挾心火之勢亦從而相扇所以月水錯經妄行無時而泛溢也若不早治漸而至於崩中不息甚則化為白濁白淫血枯發熱勞極之證不可治矣經曰邪氣盛則實正

氣奪則虛所謂心血不足者正氣奪也心火亢甚者邪氣盛也邪氣者木火也丹溪曰天非此火不能生物人非此火不能有生但貴乎適中凡動必聽命乎心君則無已上諸證大抵經閉不行與夫經漏不止其初皆由心事不足以致月經不調早不調治直至危篤求醫雖妙手莫能為矣東垣經閉不行有三論崩漏不止亦有三論學者宜參究其論以治之不可拘泥也

脉法

○脉經曰寸口脉微而瀯微則衛氣不足瀯則榮氣無餘衛不足其息短其形燥血不足其形逆榮衛

俱虛言語謬誤跌陽脉微而瀦瀦則胃氣虛虛則短氣咽燥而口苦胃氣瀦則失液少陰脉微而遲微則無精遲則陰中寒瀦則血不來此為居經三月一來

○脉微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利為可不考此為居經三月一來

○脉微弱而溢年少得此為無子中年得此為絕產
○寸口脉沉而遲沉則為水遲則為寒寒水相搏跌陽脉伏水穀不化脾氣衰則驚漉胃氣衰則身體腫少陽脉卑少陰脉細男子則小便不利婦人則經水不通經為血不利則為水名曰水分

○寸口脉沉而數數則為出沉則為入出則為陽實入則為陰結跌陽脉微而弦微則無胃氣弦則不得息少陰脉沉而滑沉則為在裏滑則為實沉滑相搏血結胞門其藏不瀉經絡不通名曰血分○經水前斷後病水名曰血分此病難治先病水後經斷名曰水分此病易治

○婦人帶下六極之病脉浮則為腸鳴腹滿緊則為腹中痛數則為陰中疼痛則生瘡弦則陰戶掣痛
○婦人帶下脉浮惡寒漏下者不治
○婦人寸口脉浮而弱浮則為虛弱則為血浮則短氣弱則有熱而自汗出

○跌陽脉浮而濡浮則氣滿濡則有寒喜噫吞酸其氣時下小腹則寒

○少陰脉滑而數者陰中生瘡

○少陰脉數則氣淋陰中生瘡

○少陰脉弦者白腸必撻核

○少陰脉浮而動浮則為虛動則為痛婦人則脫下

○婦人漏血下赤白日下血數升脉急疾者死遲生者

○婦人漏下赤白不止脉小虛滑者生大緊實數者

死

○婦人疝瘕積聚脉弦急者生虛弱小者死

○小陰脉浮而緊緊則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮

則亡血惡寒絕產

○肥人脉細胞中有寒故令少子其色黃者胃上有寒

○婦人月經一月再來者經來其脉欲自如常而反微不利不汗出者其經二月必來

方法丹溪方凡三條

丹溪曰經候有枯閉不通者有不及期與過期者有妄行者有色紫黑及淡者有成塊者有作疼者夫經不通或因墮胎及多產傷血或因久患潮熱銷血或因久發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而不生血或因痢疾失血治宜生血補血除熱

調胃之劑隨證用之或因七情傷心心氣停結故血閉而不行宜調心氣通心經使血生而經自行
○虛中有熱月事不來以四物湯加黃芩治之
○常過期者血少也以芎歸參朮兼痰藥治之
○過期紫黑有塊作痛血熱也以四物湯加香附黃連

○過期色淡挾痰者以二陳湯加芎歸

○常不及期者血熱也以四物湯加黃芩黃連香附肥人多兼痰藥治之

○血枯經閉者以四物湯加紅花桃仁

○痰多佔住血海地位因而下多者目必漸昏肥人

多有之以南星蒼朮川芎香附作丸服之

○肥人軀脂滿經閉者以導痰湯加芎歸黃連不可服地黃泥膈故也如用必以姜汁炒肥人少子亦由痰多脂膜閉塞子宮不能受精而施化也宜服上藥

○瘦人子宮無血精氣不聚亦令無不以四物湯養血養陰等藥

○經水未行臨經將來作疼者血實也一曰瘀血鬱滯也以四物湯加桃仁香附黃連紅花或加玄胡索莪朮木香有熱加柴胡黃芩

○經水行後而作疼者氣血俱虛也以八物湯加減

煎服

○夫血為氣之配因氣而行成塊者氣之凝將行而痛者氣之滯行後作痛者氣血虛也色淡者亦虛也而有水以混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱黑則熱之甚也今人悉指為風冷而行溫熱之劑禍不旋踵

○調經散治經水或前或後或多或少或踰月不至或一月兩來皆可服

川歸酒洗一錢半

麥門冬去心二錢

吳茱萸擇去閉目者沸湯泡七次焙乾半錢

人參去蘆一錢

半夏湯泡七次一錢

白芍藥一錢

川芎一錢

牡丹皮去心一錢

肉桂半錢

阿膠珠

甘草各七分半

右細切作一服水二盞加生姜三片煎至一盞

空心稍熱服

○月經過期不行宜服

當歸一錢

川芎半錢

熟地黃一錢

白芍藥一錢

桃仁三十箇去皮尖研

紅花三分

香附米一錢

熟桂半錢

蓬莪朮一錢

蘓木一錢

水通分八

右細切作一服水一盞半煎至一盞空心溫服

○月經先期而來宜服

歸身半一錢

川芎半錢

白芍藥分八

生地黄錢一

阿膠珠半錢

艾葉半錢

條芩錢一

甘草半錢

香附錢一

黃柏半錢

知母半錢

黃連錢八分

右細切作一服水煎空心服

○經不通用馬鞭草杵汁熬膏為丸或燒存性為丸

紅花當歸煎湯送下

○固經丸治經水過多不止

黃芩

龜板

白芍藥各一

樗根白皮半錢 黃柏錢三

香附童便浸一宿

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十九

白湯下

○崩漏有虛有熱虛則下溜熱則流通急則治其標

用白芷煎湯調下百草霜服或棕攪灰或狗頭

骨燒存性或五靈脂半生半炒俱以酒調服後

以四物湯加乾姜調補之緩則治其本四物湯

加芩連參芪香附乾姜之類

○四物湯加荆芥穗條芩止血神效

○崩漏多因氣所使而下香附末一錢炒黑歸身一

錢白芍藥一錢酒炒熟地黄一錢川芎黃芪蒲

黃地榆人參各半錢白朮一錢升麻三分煎服

甚者加棕摺灰為末酒調服

○婦人血病宜用當歸若肥白人與人參黃芪同用
瘦黑人宜與生地黃香附同用

○帶下是濕熱為病白屬氣赤屬血以二陳湯加蒼
朮治濕為主氣虛人參朮血虛入芎歸

○帶下是胃中痰積流下滲入膀胱當升之無人知
此以二陳湯加蒼白朮升麻柴胡甚者上用吐
法以提其氣下用二陳加二朮仍用尾壟子以
燥其濕痰

○肥人帶下多是濕痰用海石半夏南星黃柏蒼朮
川芎香附樗皮冬加乾姜瘦人少有此病有者
是熱以滑石樗皮川芎海石青黛丸服

○結痰帶下以小胃丹津液嚥下數丸候積下後以
補藥調治

○一方治白帶

樗白皮

山茱萸

苦參

香附

各五錢

龜板

枳子

各二兩

黃柏

乾姜

貝母

白芍藥

各二錢半

右為細末酒糊為丸服

○又方

白芷

四兩以石炭半斤淹三宿漉去灰以
白芷炒焦為末清米飲調空心服之

○又方以黃荊子一味炒焦為末米飲調服止可治
心痛不可治白帶以其能燥濕痰也

○羅先生治帶用十棗湯神祐丸玉燭散此法實者可用虛者不可峻攻

○帶下必須斷厚味凡用藥寒月少加姜附臨機應變用之

○一入上有頭風鼻涕下有白帶用南星蒼朮酒芩辛夷川芎黃柏焦炒滑石半夏牡蠣粉丸服

○四物湯乃婦人衆疾之捻司也

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃

右細切等分水煎服

○東垣治崩漏帶下多主於寒學者宜再思之不可一途而論經曰陰虛陽搏謂之崩觀此可知

○東垣曰葵花白者治白帶赤者治赤帶用之果驗

○東垣調經升陽除濕湯治女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆因飲食不節勞倦所傷或素有心氣不足致令心火乘脾必怠惰嗜卧困倦乏力氣短氣急脾主滋榮周身者也脾胃虛而心胞乘之故漏下月水不調也况脾胃為血氣陰陽之根蒂也當除濕去熱抑風氣上伸以勝其濕又云火鬱則發之

當歸酒洗 獨活各半 蔓荊子七分 防風

炙甘草 升麻 藜本各一 柴胡

羌活 蒼朮 黃芪各半

右細切作一服水五盞煎至一盞去粗空心温服少時以早飯壓之可一服而已○如灸足太陰脾經中血海穴三七壯亦已○此藥乃從權之法因風勝濕為胃氣下陷而氣迫於下以救其血之暴崩也住後必須服黃芪人參炙甘草當歸之類數服以補之於補氣升陽湯中加和血藥便是也若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此湯一服立止

○涼血地黃湯治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守胞絡相火故血走而崩也

黃芩 荆芥穗 蔓荆子各半 黃柏

知母 薑本 細辛 川芎各二分

黃連 羌活 柴胡 升麻

防風各三分 生地黄 當歸各半 甘草一分

紅花許少

右細切作一服水三大盞煎至一盞去粗空心稍熱服

疎

○酒煮當歸丸治癩疔白帶下疰脚氣腰以下如在米雪中居火炕以厚衣重蓋猶寒肌肉消瘦小便與白帶長流而不禁固面白目青目眈眈無所見身重如山行步欹側腿膝枯細大便閉澁心下痞悶懊懷食不下而垢背寒此上中下三

陽俱虛脉沉緊而澁按之空虛洪而無力尤為中寒之證乃氣血俱虛之極也

茴香錢五 黑附子炮 良姜各七錢 當歸兩一

右四味細切以好酒一升半煮至酒盡焙乾

炙甘草 苦棟用生 丁香各半錢 木香

升麻各半錢 柴胡一錢 炒葶藶 全蝎各三錢

玄胡索四錢

右與前四味同研為細末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服五七十九空心淡醋湯送下忌油膩冷物及酒濕麩等

○固真丸治白帶又下不止臍腹冷痛陰中亦痛目

中溜火視物昏花齒惡熱飲但喜乾食此皆寒濕乘於胞內肝經陰火上溢故目中溜火其惡熱飲者陽明經中伏火也法當大瀉寒濕以此丸治之

黃栢酒洗 白芍藥各半錢 柴胡

白石脂各一錢火煨水飛研 白龍骨酒煮水飛日乾為末

當歸酒洗各一錢 乾姜四錢炮

右除龍骨石脂水飛日乾別研外餘共為細末麩糊為丸如鷄頭仁大日乾空心白湯下少時以早飯壓之是不令熱藥犯胃也忌生冷硬物酒濕麩

東垣

○烏藥湯治婦人血海疼痛

當歸錢一

甘草

木香各五分

烏藥半錢

香附子錢二

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服

○助陽湯治白帶下陰戶中痛空心面急痛身黃皮

緩身重如山陰寒如水

生黃芩

橘紅各五分

防風

高良姜

乾姜

郁李仁

甘草各一錢

柴胡二錢

白葵花錢三

右細切分作二服每服水二盞煎至一盞去粗

食前稍熱服

東垣

東垣

○丁香膠艾湯治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲

食不節新得其脉兩尺俱弦緊洪按之無力自

覺臍下如冰冷白帶及白滑之物多間有如屋

漏水下時或有鮮血右尺脉時或浮洪

熟地黃

白芍藥各三錢

川芎

丁香各四分

阿膠珠錢六分

生艾葉錢一

當歸二錢

右以川芎地黃丁香別為細末其當歸芍藥艾

葉各細切連前共六味入水五大盞煎至一盞

半去粗入阿膠再上火煎至一大盞稍熱空服

○水府卅治婦人久虛積冷經候不行癥瘕痞塊腹

中暴痛面有黧黯黎黑羸瘦

方

礪砂紙隔沸湯 江豆已上各 桂心另為
 木香 乾姜各一 砂仁兩 花蕊石煨研一
 斑猫去頭足 生地黄汁 童子尿各一
 臘月狗膽七 元靖二百筒去頭足糯米
 右九味為細末同三汁熬為膏和丸如鷄頭實
 大碌砂為衣每服一九食前細嚼溫酒送下米
 飲亦可

○黃芪當歸人參湯治婦人經水暴崩不止先因損
 身失血自後一次縮一十日而來其後暴崩不
 止蓋因其人心窄性急多驚而心氣不足及飲
 食不節得之診得掌中寒脈沉細而緩帶數九

竅不利四肢無力上喘氣促口鼻氣不調脾胃
 虛弱胃腕當心而痛左脇縮急富臍有動氣腹
 鳴下氣大便難宜先治其本餘証可去安心定
 志和脾胃益元氣補血養神以大熱劑去其寒
 少加生地黄去命門相火不令四肢痿弱

黃連二分 生地黄三分 炒神麩
 橘紅 桂枝各五分 草薹菟六分
 黃芪 人參 麻黃各一錢

當歸身一錢 杏仁五枚另
 右細切作一服水二盞半先煎麻黃令沸掠去
 沫煎至一盞下諸藥同煎至一盞食前服立止

又以草薏寇九十五丸以止胃脘客寒之痛再
與肝積之藥除其病根

○當歸芍藥湯治婦人經水漏下不止其色鮮紅時
值炎月先因勞役脾胃虛弱氣短氣逆自汗不
止身熱悶亂不思飲食四肢困倦大便時泄後
復因心氣不足經水暴下不止微覺氣下行氣
逆氣短懶於語言此藥主之

柴胡分二 炙甘草 生地黃分各三 黃芪錢一

陳皮白連 熟地黃分各五 蒼朮米泔 白朮

川歸 白芍藥錢各半一

右細切作一服水二盞煎至一盞空心溫服

○柴胡調經湯治經水不止其色鮮紅項筋急腦痛
脊骨強痛不安

炙甘草 當歸身 葛根分各三 獨活

藁本 升麻錢各半 柴胡分七 羌活

蒼朮錢各一 紅花錢少

右細切作一服水二盞煎至一盞空心溫服取
微汗立止

○益胃升陽湯治婦人經候凝結黑血成塊左廂有
血痕水泄不止食有時不化後血塊暴下并水
泄俱作是前後二陰有形血脫竭於下既久經
候猶不調水泄日三四行食罷煩心飲食減少

人形瘦弱血脫益氣古聖人之法也先補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸甘藥為之先務蓋甘能生血陽生陰長之理也人身以穀氣為寶故先理胃氣為要

柴胡 升麻各五分 炙甘草 當歸身酒洗

陳皮各一分 人參有嗽不用 炒神麩各一分 錢

黃芪半錢 白朮錢二 生黃芪分二

右細切作一服水二大盞煎至一盞去粗熱服
○如腹中痛加白芍藥三分中桂少許○如渴或口乾加葛根三分不拘時服

垣東

○升陽舉經湯治經水不止右尺脉按之空虛是氣

血俱脫大寒之證輕手其脉數疾舉指弦緊或溢皆陽脫之證陰火亦亡見熱證於口鼻眼或渴此皆陰躁陽欲先去也當溫之舉之升之浮之燥之此法乃大升浮血氣補命門之下脫

肉桂夏月不用 白芍藥各二分 紅花分半 細辛分三
人參 熟地黃 川芎各半 獨活根
黑附子炮 炙甘草各七分 羌活 藁本
防風各一分 白朮 當歸 黃芪
柴胡各一分 挑仁泥許少

右細切分作二服每服用水二大盞煎至一盞空心熱服

○常歸附子湯治臍下冷痛赤白帶下

當歸分四 炒鹽分三 蠍稍 升麻各五

甘草分六 柴胡分七 黃柏引用

附子炮一 乾姜炮 良姜各八

右細切作一服水三盞煎至一盞去粗稍熟服
或為細末酒麩糊為丸亦可

○調經補真湯冬後一月微有地泥水泮其白帶下
陰戶中寒一服立止

獨活 乾姜炮 藁本 防風

蒼朮各二 麻黃節不去 炙甘草 人參去蘆

當歸身 白朮 生黃芩 升麻各五

黃芪分七 良姜 澤瀉 羌活各一

柴胡分四 杏仁研二枚 桂枝計少

白葵花七朵去萼

右細切作一服除黃芩麻黃別外先以水三大
盞煎麻黃一味令沸掠去沫入餘藥同煎至二
盞再入生黃芩煎至一盞空心服之候一時許
可食早飯

○柴胡丁香湯治婦人年三十歲左右臨經先腰臍
痛甚則腹中亦痛經縮三二日

生地黃分五 丁香分四 當歸身 防風

羌活各一 柴胡二分 全蝎一枚

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食前稍熱服之

○延胡苦棟湯治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下

黃栢分一 延胡索 苦棟子分各二 附子炮

肉桂分各三 炙甘草分五 熟地黄錢一

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服

○桂附湯治白帶腥臭多悲不樂大寒證

黃蘗鵝引 知母分各五 肉桂分五 附子炮三

右細切作一服水二盞煎至一盞空心溫服○

如少食常飽腹中滿悶加白芍藥半錢○如不

思飲食加五味子二十箇○如煩惱面上如虫

行乃胃中元氣極虛加黃芪一錢半人參七分
炙甘草升麻各半錢

○人參補氣湯治四肢懶倦自汗無力

丁香末分二 生甘草 炙甘草分各三 生地黄

白芍藥錢各半 熟地黄分六 人參去蘆 防風去蘆

羌活 黃栢 知母 當歸身

升麻分各七 柴胡錢一 黃芪半一錢 全蝎箇一

五味子箇二十

右細切作一服水二大盞煎至一盞空心稍熱服

○黃芪白朮湯治婦人四肢沉重自汗上至頭頸惡

風頭痛躁熱

細辛分二

吳茱萸

川芎

分各三

柴胡

升麻分各四

當歸身分六

黃柏酒洗

炙甘草

羌活分各八

五味子分一

白朮

人參各一分

黃芪二分錢半

右細切作一服水二大盞生姜五片煎至一盞

去粗食前稍熱服

○增味四物湯治婦人血積血瘦

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

京三稜

乾漆

炒相盡另研

肉桂

去身皮

廣茂各等分

右細切每服五錢水二大盞煎至一盞去粗空

東垣

心溫服

○補經固真湯治婦人白帶下流不止其心胞尺脉

微細蓋始病血崩久則血少復亡其陽故白滑

之物下流不止所謂崩中日久為白帶也乃本

經血海枯竭津液復亡不能滋養筋骨以本部

行經藥為引用以大辛甘油膩之藥潤其枯而

滋津液以大辛熱之藥補其陽道生其血脉以

苦寒之藥泄其肺而救上熱傷氣以人參補之

以微苦溫之藥為佐而益元氣

白葵花研爛四分

陳皮五分不白

生黃芩別入研

郁李仁去皮尖研如泥

炙甘草

柴胡各一分

東垣

乾姜細末 人參二錢
右細切除黃芩外以水三盞煎至一盞半入黃芩同煎至一盞去粗空心熱服少時以早飯壓之

○溫胃補血湯治婦人耳鳴鼻不聞香臭口不知穀味胃氣不快四肢困倦行步歌側髮脫落食不下膝冷陰汗帶下喉中吟吟不得卧口燥咽乾太息頭不可以回顧項筋緊急脊骨強痛頭旋眼黑頭痛噴嚏

生地黄 白朮 藿香 黃柏各二分
牡丹皮 蒼朮 王瓜根 陳皮

東垣

吳茱萸各三分 當歸身四分 柴胡 人參
炙甘草 地骨皮各五分 升麻 生甘草各六分
黃芪錢一 丁香筒一 挑仁三 白葵花

○立効散湯婦人血崩不止
當歸 蓮花心 白綿子 紅花
菊花已上各一兩
右剉如豆大白紙包裹泥固火煨存性為細末每服三錢○如乾血氣研血竭為引溫酒調服或加輕粉半錢如血崩甚不止加射香為引溫酒調服

陳

○四聖散治婦人赤白帶下

川烏炮

生白礬各一

紅娘子三

斑蝥十

右爲細末煉蜜爲丸如皂子大綿裹塞陰戶中
○溫經除濕湯治婦人值冬月四肢無力乃痿厥濕
熱在下焦也醋心者是濁氣不下降欲爲中滿
也合眼麻木作者陽道不行也惡風寒者上焦
之分皮膚中氣不行也開目不麻者陽道少行
而陰寒之氣暫退也頭眩目眩者風氣下陷於
血分不得伸越而作也近火則有之

黃連分二

柴胡

草豈菘

神麩炒

木香各三分

麻黃不去根節獨活

當歸身

黃柏

升麻

羌活各半

炙甘草

人參

白朮

猪苓

澤瀉各七分

黃芪

陳皮

蒼朮各一錢

白芍藥一錢

右細切作一服水二大盞煎至一盞食遠服治
肢節疼痛無力之勝藥也

寶

○桃仁散治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來
狀如瀉水虛弱不進飲食腹中堅痛不可行動
月水或前或後或經月不來舉體沉重惟欲眠
卧多思酸物

桃仁去皮尖甘草炙

半夏各三分

赤芍藥

生地黃各一錢

澤蘭葉

川牛膝

當歸

挂心

牡丹皮

人參

蒲黃

川芎各七分

右細切作一服加生薑三片水二盞煎至一盞空心溫服

○通經下取方曾經試驗神効

海蛤粉兩

苦葶藶

牙皂各二錢半

巴豆略去油

天花粉

苦丁香

紅娘子各半錢射香

右為細末每用一錢葱涎同搗為丸薄綿裹以五寸竹管納陰戶中候熱時先通黃水次則經行

○通經丸治婦人室女月經不通或成血瘕疼痛

挂心

青皮

大黃酒濕紙裹煨

川椒

莪朮

乾姜

川烏炮去皮

乾漆碎炒相盡

當歸

桃仁去皮尖炒研如泥各等分

右為細末將四分之一以米醋熬成膏和餘藥末成劑日中杵勻丸如梧桐子大每服二十九空心淡醋湯下漸加至三四十丸溫酒亦可下天性畏漆者入雞子清和藥內

○膠艾湯治勞傷氣血衝任虛損月水過多淋瀝止不

阿膠炒成珠

川芎

甘草炙各半錢

當歸

艾葉各半

熟地黃

白芍藥各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服○一

方加地榆黃芪見胎前門

○加減四物湯治經候微少漸致不通手足煩疼形瘦潮熱脉息微數

本方去地黃川芎加澤蘭葉三倍甘草半分如經候過多本方去熟地黃加生地黃如經行身熱脉數頭昏本方加柴胡黃芩如經行微少或脹或痛四肢疼痛本方加延胡索沒藥白芷共為末以淡醋湯調下如經候不調心腹疴痛只用芎歸二味煎服名君臣散以歸倍於芎也

○元戎加味四物湯因氣衝經脉故月事頻併臍下多痛本方加白芍藥○如經欲行臍腹疴痛本

方加玄胡苦棟檳榔木香○如經水過多本方加黃芩白朮○如經水澁少本方加葵花紅花○如經水適來適斷或往來寒熱宜先服小柴胡湯以去寒熱然後以四物湯和之或以二方併服名柴胡四物湯

○香附一物丸治經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭眩惡心崩漏帶下並宜治之

香附子

杆去皮毛不拘多少米醋浸一日夜用尾銼炙令熟焙乾

右為細末醋糊為丸如梧桐子大日乾每服五十丸淡醋湯下

○艾附丸治證如前

香附子一斤

醋炙

艾葉四兩

兩

當歸二兩

兩

右為細末醋糊為丸服

○地黃通經丸治婦人經候不行結成血瘕在臍下如覆杯

熟地黃三兩

去頭

水蛭兩

糯米同炒

挑仁各五

十箇

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸

空心溫酒下未知加至七八十九

○益母丸治婦人赤白帶惡露時下不止及治婦人胎前產後及經中諸般奇病無所不療

益母草一斤

一名荒蔚子

紫花方莖俗名野天麻

五月

採陰乾磨為細末勿犯鐵器煉蜜為

丸如彈子大每服一丸用熱酒加童便化下兼

氣者木香湯化下或只以末子每服二錢或酒

或童便謂下此婦人之仙藥也

○苦棟丸治赤白帶下最妙

苦棟碎酒浸

茴香炒

當歸各等

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸

空心溫酒送下

丹溪活套曰

凡婦人經候不調皆當以四物湯為主治○如經候過而腹中作痛綿綿無休息者屬血虛本方倍當歸熟地黃兼氣虛者本方加人參黃芪挾寒者加乾姜○如經候將來腹中陣陣痛乍作乍止者血氣實也本方用生地黃加黃連香附桃仁紅花

玄胡索牡丹皮之類○如經水常不及期而行者
血熱也本方用生地黃加黃連黃芩白芷之類○
如經水常過期而來者瘦人多應是血少本方倍
當歸熟地黃加黃芪甘草少佐以紅花桃仁泥以
爲生血之引用也○肥人大槩是氣虛挾痰阻滯
升降然也本方去地黃加參芪甘草茯苓半夏陳
皮香附等藥○常過期而紫黑成塊者血熱也多
作腹痛本方用生地黃加香附黃連玄胡索五靈
脂乳香沒藥之類○過期而血淡色者痰多血少
也本方用生地黃合二陳湯煎服○肥盛婦人或
三二箇月一行者痰成而軀脂閉塞經挾以導痰

湯加芎歸香附蒼白朮之類○如經水適來適斷
往來寒熱如癰者本方合小柴胡煎服○如經行
過三五日腹中綿綿定痛者此血行而滯氣未盡
行也本方加木香檳榔煎服立愈

○祖傳經驗秘方治婦人室女月經不通漸成脹滿
及治男子墜馬跌撲損傷以致瘀血停積欲成
血蠱病者悉皆治之名曰桃奴飲子

桃奴桃樹上嫩桃乾朽不猴鼠糞兩頭尖者是

玄胡索 肉桂 香附米 五靈脂已上各炒

砂仁 桃仁去尖

右各等分爲細末每服三錢空心溫酒調下

○一方治月經不通只以鼠糞一合略炒研細溫酒調下立效

○又方治婦人血崩不止用蒼耳草燒存性好酒調服立止或入四物湯中亦效

○一老婦人年五十三血崩久不止諸藥不効予以椽斗蒼耳草根二物燒存性用四物湯加白芷茅花乾姜煎湯調服其經血自此而止再不行矣

婦人科中胎

論

內經曰陰搏陽別謂之有子謂陰脈搏手其是為血氣和平陽施而陰化也蓋為人之夫婦猶天地

天地之道陰陽和而後萬物育夫婦之道陰陽和而後男女生是故欲求嗣者先須調其婦之經脈經脈既調則氣血和平氣血和平則百病不生而樂乎有子矣脈經曰診其手少陰之脈動甚者姪子也蓋手少陰心脈也心主血脈故也又腎為胞門子戶尺中腎脈按之不絕當姪子也又曰婦人姪娠一月之時足厥陰脈養之二月足少陽脈養之三月手少陰脈養之四月手少陽脈養之五月足太陰脈養之六月足陽明脈養之七月手太陰脈養之八月手陽明脈養之九月足少陰脈養之十月足太陽脈養之是以諸經脈各養三十日也

若夫至期當養之經虛實不調則胎孕為之不安甚則下血而墮矣夫手足十二經氣血盈虧不同如手足厥陰太陽少氣多血手足太陰少陰少血多氣手足少陽氣多血少手足陽明氣盛血多安胎之法宜各按月依經視其氣血虛實而調之固無胎墮之患其或感冒風寒別生異証又宜各按法而調治之機要曰治胎產之病當從厥陰經論之世犯胃氣及上二焦謂之三禁不可汗不可下不可利小便若發汗者如傷寒下早之證利大便者則脈數已動于脾利小便者則內亡津液胃中枯燥刺方之法能不犯三禁則榮衛自和而寒熱

止矣皆醫者之繩墨也其為妊娠之婦早當絕去嗜慾安養胎元性宜靜而不宜躁體宜動而不宜安味宜涼而不宜熱衣宜溫而不宜寒母又立母又坐母又行母又卧又宜却去一切肥甘煎燂油膩辛粹醎酸水果魚鱉狐兔鴿雀之類即無胎漏胎痛胎動下血子腫子癩等證及橫產逆生胎死腹中之患矣丹溪曰難產之婦皆是八九箇月內不能謹慾以致氣血虛故也傳曰古者婦人妊子寢不側坐不邊立不蹀不食邪味割不正不食席不正不坐目不視邪色耳不聽淫聲口不出傲言夜則令警誦詩道正事則生子形容端正才過人

矣古所謂胎教也。妊娠之婦可不慎歟。

附期嗣論

夫人欲求嗣必先視其婦之經脈調否。其或未調必以藥而調之。經脈既調宜以人事副之。按其法而行之庶不失其候也。訣云三十時中兩日半二十八九君須筭落紅滿地是佳期。金水過時空霍亂。霍亂之時枉費工。樹頭樹底覓殘紅。但解開花能結子何愁丹桂不成叢。此蓋婦人月經方絕金水纔生此時子宮正開乃受精結胎之候。妙合太和之時過此佳期則子宮閉而不受胎矣。然男女之分各有要妙存焉。如月候方絕一日三日五日

交會者成男。二日四日六日交會者成女。過此則不孕矣。又云陰血先至陽精後衝縱氣來乘血開。累精陰外陽內則成坎卦之象而為男。若陽精先入陰血後參橫氣來助精開。累血陰內陽外則成離卦之象而為女。若胎成三月之內男女未分之時亦有轉女為男之術。其法以鉄斧一柄置於姪婦床蓆之下勿令人見知。更佩雄黃一二兩於姪婦身左。或佩萱花亦可。已上三法皆驗不可輕忽。傳曰不孝有三無後為大。古詩云無官一身輕。有子萬事足。誠哉是言也。無子者宜深思之。無怠。

脉法

脉經曰婦人三部脉浮沉正等按之無絕者妊娠也○妊娠初時寸微小呼吸五至至三月而尺數也○脉滑疾重以手按之散者胎已三月也脉重手按之不散但疾不滑者五月也○妊娠四月脉左疾為男右疾為女俱疾為生二子○又法得太陰脉為男得太陽脉為女○又法左手沉實為男右手浮大為女左右手俱沉實猥生二男左右手俱浮大猥生二女○又法尺脉左偏大為男右偏大為女左右手俱大生二男大者如實壯○又法左右尺俱浮當作為生二男不當作為生二女不

余則男作女生也此男女兼形之說也

○婦人懷娠脉離經而浮設腹痛引腰脊為欲生也○又法婦人欲生其脉離經半夜覺日中即生也○懷娠六七月脉實大牢強弦緊者生沉細者死○懷娠至六七月暴下斗餘水其胎必倚而墮此非時孤墮預下故也○寸口脉洪而瀦洪則為氣瀦則為血氣動丹田其形則溫瀦在於下胎冷若冰陽氣胎活陰氣必終洪則為氣瀦則為血若杯陰為死胎陽為蓄血問婦人雙胎其一獨死其一獨生醫為下其死者其病則愈然後竟免軀其脉

何以別之師曰寸口脉衛氣平調榮氣緩舒陽
施陰化精盛有餘陰陽俱盛故知雙軀今少陰
微緊血則濁凝經養不周胎則偏大少腹冷滿
膝臏疼痛腰重起難此為血理若不早去害母
失胎○婦人經自斷而有軀其脉反弦恐其後
必大下不成胎也大下謂大下血也

方法

丹溪方法凡四條

丹溪曰婦人無子者多由血少不能緝精俗醫悉
謂子宮虛冷投以辛熱之藥煎熬藏府血氣沸騰
禍不旋踵或服艾者不知艾性至熱入火灸則下
行入藥服則上行多服則致毒咎將誰執

○瘦怯婦人子宮乾澁宜滋陰養血四物加香附黃
芩之類肥盛者乃軀脂滿溢閉塞子宮宜行濕燥
痰南星半夏川芎滑石防風羌活一本有蒼朮活無防風羌活或
導痰湯之類

○墮胎乃血氣虛損不能榮養胎元而自墮耳猶枝
枯則果落榦萎則花墜也又因恚怒傷情內火便
動亦能墮胎猶風撼其木人折其枝也火能銷物
造化自然病源乃謂風冷傷於子藏未得病情者
也大抵屬虛屬熱二者又當視其輕重而治之
○一婦有胎即墮其脉左大無力重取則瀦乃血少
也以其少年只補中氣使血自榮濃煎白朮湯

調黃芩末一錢服之至三四兩得保全而生

○固胎飲

熟地黃 歸身尾 人參 白芍藥

白朮 川芎 陳皮 甘草

桑樹上羊兒藤七葉圓者愚恐當作如檢桑葉圓者即俗名桑絡也

真兼寄生尤妙

少加黃連黃柏入糯米五七十粒煎服血虛不

安者加阿膠珠胎氣痛者加縮砂

○安胎飲孕成之後覺胎氣不安或腹微痛或腰間

作疼或飲食不美宜服或至五六箇月常服數

貼甚好

白朮 當歸 白芍藥 熟地黃各一錢

人參 川芎 條黃芩 陳皮各半錢

甘草 砂仁 紫蘊各三分

右細切作一服亦加生姜三片水煎服

○安胎丸

白朮 條芩 神麴炒各等分

右爲細末粥丸每服五十九清米湯下蓋白朮

條芩乃安胎之聖藥也

○丹溪曰天行不息所以生生而無窮荒蔚子活血

行氣有補陰之妙命名益母以其行中有補也

故曰胎前無滯產後無虛○條芩白朮乃安胎

之聖藥俗以黃芩為寒而不用反謂溫熱藥能

養胎殊不知胎孕宜清熱養血使血循經而不

妄行乃能養胎黃芩必取細挺沉實者用之

○縮砂安胎以其止痛行氣故也砂仁非八九月

用多

○懷妊嗜物乃一藏之虛如受酸物乃肝藏正能養

胎而虛也

○胎動者因火逼動胎逆上作喘急用條芩香附之

類

○胎漏謂有胎而血漏下也屬血虛有熱用四物湯

加阿膠珠白朮條芩縮砂炒香附加糯米

白水煎服

○又方治胎漏下血

條芩錢五 白朮兩一 砂仁炒 阿膠炒成珠各三錢

右為細末每服二錢煎艾湯調服水煎服亦可

又方

枳殼炒 黃芩各半兩 白朮兩一 水煎食前溫

服

○胎痛宜用當歸地黃湯

當歸錢一 熟地黃錢二

右細切水一盞半煎至一盞溫服

○心腹諸痛凡妊婦偶有所傷腹痛不安或從高墜

寶產

下重物所壓觸動胎元痛不可忍及下血者甚砂仁不拘多少和皮略炒勿令十分焦黑去皮取仁為末熱酒調服不飲酒者米飲或艾湯益湯皆可調服如覺胎中熱其胎即安矣此方即驗大抵妊婦不可缺此常服安胎易產

○凡妊婦二三箇月忽心腹疔痛不安用

當歸三錢 阿膠炒二錢 甘草炙二錢 葱白四錢根

右細切分作二服每服用水二盞煎至一小盞溫服

○凡妊婦四五箇月忽心腹疔痛

大棗十四枚 鹽一錢燒令赤

寶產

寶產

右為末取一撮許酒調服之立愈

○治妊婦心腹大痛氣欲絕者

川芎 川歸 茯苓 製朴各一兩

右細切作一服用水三升煎至一升分二服立服而愈

○川芎散治婦素有冷氣冲心如刀刺者

川芎一錢 人參 吳茱萸各半錢 茯苓

桔梗各四分 當歸一錢 制朴半錢 芍藥七分

枳殼 炙甘草各三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞稍熱服

○妊婦腰痛如折不能轉側

寶產

鹿角兩半

右以火燒令赤酒淬再燒再淬以碎為度細末酒調服

○治妊娠腰脚腫痛

白茯苓 白朮 乾姜 甘草各一錢

杏仁三錢去皮尖研

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○胎腫謂有胎或手足或頭面通身浮腫者是也屬

濕多或用山梔子一合炒為末米湯調下丸服

亦可

○惡阻乃有孕而惡心阻其飲食者是也多從痰治

漢丹

漢丹

用二陳湯之類○又方以白朮為丸服一日服

瘦人是熱

○半夏茯苓湯治惡阻不食吐逆頭眩四肢怠惰煩

疼惡寒自汗

半夏湯泡七次洗過心 生姜各一錢 茯苓七分

熟地黃 陳皮去白 桔梗 旋覆花無嗽不用

人參 芍藥 甘草炙 川芎各半錢

右細切水煎空心服○千金方有紫蘊細辛各

半錢

○一婦人孕兩月嘔吐頭眩醫以參朮川芎陳皮茯苓服之愈重脉弦左為甚此惡阻病必怒氣所

按醫案

方良

激問之果然肝氣既逆又挾胎氣參朮之補大非所宜以茯苓湯下抑青丸二十四粒五服稍安脉略數口苦乾食即口酸噫其膈間滯氣未盡行以川芎陳皮枳子生薑茯苓煎湯下抑青丸十五粒而愈但口酸易飢此肝熱未平以熱湯下抑青丸二十粒愈後兩手脉平和而右甚弱其胎必墮此時肝氣既平可用參朮以防之服一日而胎自墮矣

○參朮散治妊娠三月內惡阻吐逆不食或心虛煩

悶

橘紅

茯苓各一錢

麥門冬

白朮

厚朴

制

甘草

各半錢

右細切作一服加生薑三片竹茹一錢或加入參一錢水一盞煎七分溫服

○小膠艾湯治妊婦因頓仆挫跌胎動不安或胎搶上逼心或腹痛血下

阿膠

炒成珠

艾葉

二兩

指迷方加秦艽

兩

右細末用水三升煎至一升半分三服

○膠艾湯不問月數淺深安胎極妙

熟地黃

艾葉

當歸

甘草

炙

川芎

阿膠

各半錢

黃芪

二分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○治妊娠下血不止胎上冲心四肢厥冷悶仆欲死

阿膠炒 艾葉各一兩 竹茹如拳 白砂蜜合二

右用水二升煎至一升入蜜更煎一二沸分服

○治妊娠下血如月信來者若致胞乾非特損子亦能損母

熟地黃 乾姜炮各一兩

右為細末每服三錢一日夜三四服

○治胎孕無故下血腹痛不可忍或下黃汁如漆如水如豆汁者

野苧根炒 金銀各一兩 一根

右用水酒各一盞煎至一盞去粗分作二服下

拘時服

○胎動冲心煩悶欲死安胎止痛

當歸洗酒 川芎 人參 阿膠炒

甘草炙各一兩 葱白切一

右用水七升煎至三升分三服

○妊娠因舉重仆跌損傷胎氣不安或子死腹中

川芎一兩

右為細末每服一匕連進三服死胎即下

○治妊娠遺尿失禁

白薇 白芍藥各等分

右為細末酒調方寸匕日三服

○子煩 姪娠苦煩悶不安又曰心煩熱悶謂之子

煩

麥門冬 茯苓 防風 知母各一

右細切作一服用水二盞煎至一盞入竹瀝一
二匙服

○犀角散治子煩

犀角屑 地骨皮 條芩

麥門冬 赤茯苓各一 甘草半

右細切作一服水一盞半煎至一盞入竹瀝一
合溫服

○當歸飲治子煩

當歸半一錢 川芎 阿膠珠

豆豉 桑寄生各半 葱白七

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○竹瀝湯治子煩

竹瀝合 防風 黃芩 麥門冬各一

白茯苓半一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗入竹
瀝再煎數沸溫服

○產寶澤瀉散治姪娠氣壅身體腹脇浮腫喘急氣
促小便閉澁不利謂之子滿

澤瀉 桑白皮 枳殼炒

金匱

良方

檳榔 木通 赤茯苓各等分
右細切每服四錢加生姜五片水一盞煎八分
溫服

○張仲景曰婦人本肌肉肥盛頭舉自滿今反羸瘦
頭舉中隆胞系了矣亦多致此病但利小便即
愈宜服腎氣丸蓋藥中有茯苓故也地黃為君
功在補胞

○木通散治妊娠身體浮腫四肢脹急小便不利謂
之子腫

木通錢一 木香 訶子皮各三分 香薷錢一
枳殼炒半錢 檳榔半錢 桑白皮錢一 徐苓半錢

紫蘊蒸葉錢一

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一
盞溫服

○全生白朮散治妊婦面目虛浮肢體腫脹名曰子
腫

白朮兩一 生姜皮 大腹皮 陳皮
茯苓各半兩 指迷方用茯苓皮多桑白皮無木
右為細末每服二錢米飲調下

○鯉魚湯治妊娠腹脹滿或通身浮腫小便不利或
胎死腹中此方甚驗

當歸 白芍藥各一錢 白茯苓半錢

寶產

寶產

白朮二錢 橘紅半錢 鯉魚一尾不
 右細切作一服將鯉魚去鱗腸白水煮熟去魚
 用汁一盞半生姜七片煎至一盞空心服當見
 胎水下如水去未盡或胎死腹中脹悶未除再
 合一劑服之永盡脹除為慶

○紫蘓飲治胎氣不和湊上心腹脹滿疼痛謂之子

懸

大腹皮

川芎

白芍藥

陳皮

紫蘓葉

當歸

各六分

人參

甘草

各三分

右細切作一服加生姜三片葱五莖水煎服

○天仙藤散治姙娠三月成胎之後兩足自脚面漸

腫至膝行步艱難喘悶妨食若水腫甚至足指
 間有黃水出者謂之子氣

天仙藤

洗淨略炒即青木香藤也

陳皮

甘草

烏藥

木香

各等分

右細切每服三錢加生姜三片紫蘓五葉水煎

日三服腫消止藥

○安榮散治姙娠小便澀少遂成淋瀝謂之子淋

麥門冬

通草

滑石

當歸

燈心草

甘草

各五錢

人參

川芎

各一兩

右為細末每服二錢煎麥門冬湯調下○此方
 恐滑石太重而滑胎若胎臨月可用若六七箇

月已前俱不可輕用宜去此味或加梔子蒲蓄
白榆之類最穩瞿麥亦恐損胎不可用也

○地膚子湯治子淋小便澀數

地膚草

與芥菜相似俗名白地草 車前子 各一錢

知母 去毛

黃芩

赤茯苓

白芍藥

枳殼

麩炒黃色各七分

升麻

通草

甘草

各三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○又方治子淋

地膚草兩右以水四升煮取二升分三服或新

取地膚草搗取自然汁服亦可不獨治子淋凡

小便淋閉服之無不効驗

○冬葵子散治子淋小腹疼痛胎動不安

冬葵子

炒

柴胡

去蘆

桑白皮

赤茯苓

赤芍藥

當歸

各等

右細切每服四錢水一盞半加姜三片葱白七

寸煎至一盞去粗溫服

○車前散治子淋或小便不通下焦有熱

檳榔

木通

陳皮

去白

赤茯苓

車前子

赤芍藥

當歸

滑石

石薺

炙去毛

右各等分每服五錢水一盞半煎至一盞溫服

其外

○忘憂散治妊婦心經蘊熱小便赤澁不利淋瀝作痛

琥珀不拘多少

萱草根握一

右以琥珀研為細末每服半錢濃煎

○葛根湯治妊娠臨月忽發風痙悶亂不省人事吐

逆眩倒少時醒後復發謂之子痲

貝母去心

葛根

牡丹皮

防已

防風

當歸

川芎

桂心蒸

白茯苓

澤瀉各半

甘草炙二分

獨活

石膏

人參各半

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服日三服

方局

其貝母令人易產未臨月者以升麻代之忌菘菜

○防已湯治妊娠中風口禁四肢強直角弓反張

防已五錢

羌活一錢半

右為細末別用黑豆一合炒焦黑投好酒中沸

定去豆調藥末擗開口灌之稍醒再灌有效

○消風散治妊娠頭旋目眩視物不見顛頰腫核

石膏煨

甘菊花去萼

防風去蘆

荆芥穗

羌活

羚羊角鎊

川芎

大豆黃卷炒

當歸酒浸洗

白芷各半

甘草二分

右細切作一服加芽茶半錢水一盞半煎至一

蓋食後溫服

○天門冬飲治姙娠外感風寒久嗽不已謂之子嗽

天門冬

紫苑茸

知母去毛酒洗

桑白皮蜜炙各一錢

五味子

桔梗去蘆各半錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞嗽血者加

阿膠半錢大便溏者加苦亭歷子半錢

○百合散治姙娠欬嗽心煩不欲飲食

百合

紫苑茸

麥門冬

桔梗去蘆

桑白皮各一錢 甘草半錢

竹茹一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞入蜜半匙

再煎二三沸去粗溫服

○緩息丹

○八味丸治姙娠小便不通名曰轉胞亦治子淋此

腎氣丸加桂心附子炮各一兩是也

○丹溪參朮飲治姙娠轉胞

四物湯加人參白朮半夏湯泡 陳皮甘草

右細末加姜水煎服

○丹溪曰轉胞之證胎婦之稟受弱者憂悶多者性

急躁者食味厚者庸或有之古方皆用滑利藥

鮮有應效因思胞不自轉為胎所壓轉在一邊

胞系了矣不通耳胎若舉起居於其中胞系自

疎水道自利夫胎之墜下必有其由吳宅寵人

患此兩手脉似瀉重按似弦左稍和予曰此得之憂患瀘為血少氣多則胎氣弱而不能舉弦為有飲血少則胎弱氣多有飲中焦不清而隘則胞知所避而就下乃以已上藥與服隨以指探喉中吐出藥汁候少頃氣定又與之次早亦然至八點安猶恐此法偶中後又治數人亦效

○安胎散治妊娠胎寒腹痛胎熱多驚舉動腰痛腹滿胞急卒有所下或因頓仆閃胸或食毒物或感冒時疾寒熱往來致傷胎藏並皆治之

川芎 枳殼 熟地黃 糯米
各錢半 各錢三 合

右細切作一服水一盞半生姜三片大棗一枚

更加金銀三五錢同煎至一盞溫服

○如聖散治妊娠腹痛胎動不安

鯉魚皮 當歸 熟地黃 阿膠炒成
 白芍藥 川芎 川續斷酒浸 甘草炙各

右細切每服四錢水一盞半生姜三片苧麻根半錢許煎至一盞溫服○一方加乾姜竹茹無續斷

○加味四物湯治妊娠下血不止

本方加艾葉三 阿膠珠一
片 錢

右細切每服四錢水一盞半加烏梅肉少許同煎至一盞熱服連進三四服即止

方良

○芎根湯止血安胎

野芎二兩用酒水各一盞入金銀同煎至一盞
温服

○桑寄生散治妊娠下血不止胎動不安

桑寄生 川歸 川續斷 川芎 香附子
阿膠炒 茯神 白朮 人參 甘草各半

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一
盞温服

方良

○羚羊角散治妊娠中風頭項強直筋脉攣急言語

蹇澁痰涎壅盛或時發搐不省人事謂之子癇
羚羊角錢 獨活 酸棗仁炒 五加皮各八分

寶產

薏苡仁

防風

當歸

川芎

茯神

杏仁各四分

木香

甘草各二分

右細切作一服加生姜三片水煎服

○歸京節命散治妊娠面赤口苦舌乾心煩腹脹等証

川芎 芎根 白芍藥 麥門冬 川歸
白朮 糯米 荆芥穗 甘草各半

右細切作一服水一盞半煎至一盞入密一匙
服

○白扁豆散治妊娠誤服草藥及諸般毒藥毒物

白扁豆生去皮

右為細末清米飲調方寸匕神效

○芎藭補中湯養新血去瘀血補虛扶危

阿膠珠 五味子 乾姜各四 黃芪炙

川歸酒 白朮 川芎 赤芍藥各七

人參 杜仲炒 甘草各三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服後有

一方名同多木香治小產

○當歸芍藥湯治妊娠下痢赤白腹中疝痛

白芍藥錢一 當歸 白茯苓 澤瀉

白朮 條芩各半 甘草 黃連

木香 檳榔各三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服 如

○芎朮香連丸治證同前

白痢腹痛甚者恐有寒也去芩連加乾姜三分

阿膠珠 白朮各五 乳香 木香各二

枳殼炒 乾姜炮各二 黃連一兩 炒

砂仁炒 川芎各五

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十九

白湯下

○治妊娠泄瀉兩脇虛鳴臍下冷痛由食瓜果生冷

等物及當風取涼所致者

訶子皮煨 白朮各一 陳皮 良姜炒

木香 白芍藥酒炒 炙甘草各半

方

肉豆蔻麩裏煨

右細切加生姜五片水一盞半煎至一盞溫服

○芍藥散治妊娠外感風寒渾身壯熱頭目眩運

紫蘗葉 川芎 白芍藥 白朮

麥門冬 陳皮 乾葛各六分 甘草三分

右細切作一服加生半五片葱白三寸水一盞半煎至一盞溫服不拘時候

方

○升麻六物湯治妊娠六七箇月傷寒壯熱或發赤斑變異瀉血

升麻三錢 梔子 杏仁 大清草

少草 甘草各一錢

人活

右細切作一服加葱白三寸水一盞半煎至一盞溫服

○妊娠傷寒百節疼痛壯熱不急治即落胎

柴胡 乾葛 知母 石膏各六錢

大青八錢 梔子兩一 升麻八錢 葱白十莖

右細切用水七盞煎至三盞半分四服

人活

○傷寒安胎

白朮 黃芩各等分新瓦上炒令香

右細切每服三錢加生姜三片水煎服

人活

○治妊娠傷寒

柴胡一錢 前胡 當歸各七分 人參四分

寶

芍藥 生地黄各六分 甘草三分
右細切作一服加生姜三片葱白三莖水一盞
半煎至一盞去粗溫服

○催生散治妊娠傷寒熱病胎死腹中身冷唇青不能自出

蒼木錢一 桔梗錢半 橘紅三分 白芷

桂心皮去 甘草炙各一分 當歸酒洗 乾姜炮

厚朴 芍藥 半夏炮 川芎

枳殼炒各二分 南木香 杏仁炒另研

右細切作一服水一盞半加生姜三片大棗一枚煎至一盞溫服未下再進一服

寶

○治妊娠欬嗽

紫苑茸 麥門冬各錢半 桑白皮炙

杏仁炒去皮 炙甘草各一分 桔梗去蘆炒

右細切加生姜三片竹茹一塊彈子大用水一盞半煎至一盞去粗入白蜜一蛤殼許再煎數

沸溫服

○妊娠痰嗽見紅

歸身 熟地黄 天門冬 麥門冬

紫苑各半 桑白皮炙 杏仁 炙甘草

桔梗 片黃芩 五味子 阿膠炒成珠各二分半

右細切作一服痰盛加竹茹一團水煎入小煎

汁同服

○小產後下血不止

人參

黃芪

當歸

白朮

白芍藥

艾葉

甘草炙

阿膠炒

川芎

青皮

香附

砂仁

右各等分白水煎服

○小產後心腹疼痛

當歸

川芎

熟地黃

白芍藥各一錢

玄胡索分七 桃仁研細

去皮尖 紅花各三分

香附子

青皮炒

黑 澤蘭

牡丹皮

各半錢

右細切水一盞半入童便酒各半盞煎至一盞

溫服

○安榮湯治胎氣不固時常小產宜預服此以固胎

元

四物湯加阿膠珠香附子白朮條芩砂仁糯米
桑寄生白水煎服

○治兒在腹中叫哭

用多年空屋下鼠穴中土一塊令妊婦噉之即
止

○又方用黃連三五錢濃煎汁時時呷下自止

一云臍帶上疙瘡乃兒口中含者因妊婦登高
取物脫出兒口以此作聲令妊婦曲腰向地拾

物使兒復得含入口中即止

○丹溪東胎丸至七八箇月內服之

黃芩炒夏一兩春秋七錢冬五錢 白朮二兩 茯苓七錢

陳皮三兩不見火

右為細末粥丸如梧桐子大每服三四十九白

湯下

○達生散孕至八九箇月內服十數貼甚好易產腹

少痛

大腹皮原本三錢恐太多今用一錢先扯技令淨用酒洗晒乾再用烏豆汁洗淨方可

用忍鳩毒害人 人參 陳皮 紫蘓連莖葉各半錢

白芍藥 白朮 當歸各一錢 甘草炙二錢

○臨月用以養胎方

右細切作一服外入黃楊腦七箇食少胎瘦用者不須葱五葉夏加黃芩黃連五味子春加川芎防風秋加澤瀉冬加砂仁或通加枳殼砂仁胎動不安加金銀三五錢野苧麻根一錢氣上逼心加紫蘓地黃性急加柴胡多怒或加黃芩佐之食少加砂仁神麩渴加麥門冬黃芩能食倍加黃楊腦此物能瘦胎不長有痰加半夏黃芩

當歸 川芎 黃芩 陳皮

白朮 香附各一錢 白芷半錢 甘草二分

右細切水煎調益元散一錢服虛者加入參七

分

○催生散

白芷炒焦

百草霜

白滑石各等

右為細末煎芎歸湯調下二三錢

○紅苋菜及馬齒苋俱能墮胎妊婦切忌臨產用以
催生煮食亦效

○難產多是氣血虛亦有氣血凝滯而不能轉運者
亦有因八九箇月內不能謹慾者

○難產多見於安逸鬱悶之人富貴奉養之婦其貧
賤者未之有也古方瘦胎飲本為湖陽公主設
蓋以其奉養厚而氣實故為此方以耗其氣使

氣血和平而易產耳非至論也

○金匱當歸散安胎養血清熱孕婦時常宜服

當歸

川芎

芍藥

白朮

條芩各等

右為細末每服二錢溫酒或湯調服

○金液丸治橫生倒產

飛生毛火燒腋下

血餘無病女人

公吐羊糞已上各半

伏龍肝一

黑鉛三錢用錐子火上錐投水銀

右為細末用粽子尖為丸如菘葢大遇難產以
順流水送下五丸兒身自順而正產子母俱活

矣

○催生鈔丹治橫生逆產

黑鈔一錢

右以小鈔子火上鎔化投入水銀二錢急攪結成砂子傾出用熟絹紐作丸子如菘葶大臨褥以香水送下立產

○如神丹治難產用巴豆三枚草麻子七枚各去壳研

入射香少許捏作餅子貼臍

詩曰巴三草七脫衣裳 細研如泥入射香

捏作彈丸臍下貼 須臾子母便分張

○催生如聖散用黃蜀葵子不拘多

右為細末每服二錢熱酒調下如不飲酒熱湯

調亦可或以蜀葵花焙乾熱酒調下一錢亦效

詩曰黃葵子炒百餘粒 研爛酒調濟窘急

若還臨危難產時 免得全家俱哭泣

○香桂散下死胎

射香半錢 官桂三錢

右件和勻作一服溫酒調下須臾即下

○來甦散治孕婦欲產未產之時忽然暈悶不省人事

木香不見火 神麴炒 陳皮白 麥蘖炒

黃芪去蘆 生薑切碎 阿膠珠 白芍藥各半

糯米合半 苧根一 甘草三
右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗幹開
口灌下未醒再煎一服連接灌之即甦

○霹靂奪命丹治臨產未產之時目翻口禁面黑唇
青口中沃沫子母俱殞命在須臾若兩臉微紅
子死母活急用此藥救之

蛇退中一 條 瓶

千里馬一 路上 左 足 草 鞋 雙 燒 灰 一 錢 雙

金銀箔各 七

髮灰一 蠶退紙一 燒 灰 一 錢

乳香另 五 錢

黑鉛一 錢 半 用 水 一 錢 半 炒 成 砂

右共為細末以獾猪心血和丸如梧桐子大每
服二九倒流水送下如灌不下化開灌之脩合

此藥時勿令婦人孝子雞犬見之

○無憂散治分免難產及胞衣不下等證孕婦臨月
預服此藥日進二服則子易生而胞易落也

當歸酒

川芎 白芍藥各 七

木香不 見

甘草各 五

枳殼炒 麩 色 炒

乳香各 一 錢 餘 灰 分 四

右為細末分作二服水一盞煎八分瀝去粗濕
服不拘時

○催生奪命如神丹

牡丹皮

枳殼炒 麩

赤芍藥各 一

蛇退二

青皮

阿膠珠

甘草炙

五加皮

芸臺子

貫衆

馬鳴退炙 焦 各 半 錢

花藥石火煨

乳香一字

右為細末煉蜜丸如彈子大臨產細嚼一九棗湯送下未產小頃又嚼一九以產為度

昔歸湯一名佛手散治妊娠因事跌仆子死腹中惡露妄下疼痛不已口禁欲絕用此藥探之若子死腹中立便逐下若腹痛隨止子母俱安又治臨產難生胞衣不下及產後血暈不省人事狀如中風血崩惡露不止腹中血刺疔痛血滯浮腫入心經語言顛倒如見鬼神血風相搏身熱頭痛或似瘧非瘧一切胎前產後危急狼狽垂死等證並皆治之

當歸酒洗去蘆一兩

右細切分作四服每服用水一盞煎水將乾投酒一盞半煎五七沸溫服如口禁幹開灌之如人行五里許再灌盡此四服便省立產神驗

○奪命丹治胞衣不下蓋兒之初生惡血流入衣中衣為血所脹塞故不得下須更冲上逼心即死急服此藥

黑附子炮半兩 牡丹皮兩一 乾漆二錢半研細炒相盡為度

右為細末用米醋一升大黃末一兩同煮成膏和前藥末為丸如梧桐子大每服五七丸溫酒下

○黑龍州治難產及胞衣不下血迷血暈等證

當歸 五靈脂 川芎 良姜

生地黄 已上各二錢細切入雞子壳內
紙筋益泥固濟火煨入後藥

百草霜 兩一 硫黃 乳香 各二錢 琥珀

花藥石 各一錢 菜

右件連前藥共為細末酒米糊為丸如彈子大
如用時將一二丸仍用火煨紅為末以童子小
便合酒調灌下垂死者灌三四丸即活其功不
可盡述

○一方治胞衣不下

川牛膝 二錢 當歸 半一錢 木通 三錢 滑石 四錢半

黃葵子 半二錢

右用水煎連進三四服立下

○枳殼散妊娠八九箇月內胎氣壅滿常宜服之滑

胎易產安和子藏益血舒氣

枳殼 五兩麩炒黃色 粉甘草 炙一兩 香附子 炒一兩

右為細末每服二錢空心沸湯點服日進三服
一方加糯米炒同為末白湯點服令兒易產初
生胎氣微黑百日後肥白此為古方之冠若妊
婦稍弱者單衣恐胎寒腹痛胎弱多驚於內加
當歸一兩木香半兩不見火如此用之則陽不
致強陰不致弱二氣調和有益胎嗣

○自妊娠初得以至臨月藥石禁忌歌

歌曰 虻斑水蛭及蝨虫 烏頭附子與天雄

野葛水銀并巴豆 牛膝薏苡連蜈蚣

三稜代赭芫花射 大戟蛇蛻黃雌雄

牙硝芒硝牡丹桂 槐花牽牛皂角同

半夏南星與通草 瞿麥乾姜蟹甲瓜

礪砂乾漆兼桃仁 地膽茅根莫用好

○飲食禁忌

雞肉合糯米食令子生寸白虫○食犬肉令子

無聲○鮎鯉同鷄子食令子生疔蝕瘡○食兔

肉令子缺唇○食羊肝令子多厄難○食鱉肉

令子項短縮頭○鴨子與桑椹同食令子倒生

心寒○鮮魚同田鷄食令子瘡癰○雀肉同豆

醬食令子面生雀卵斑點○食螃蟹橫生○食

姜牙令子多指○食冰漿令絕產○食雀肉飲

酒令子多淫無耻○食茨菰消胎氣○食驢馬

肉過月難產○豆醬合霍菜食墮胎○食山羊

肉令子多病○食鰕鱗無鱗魚難產○食諸般

菌生子驚風而大○食雀腦令子患雀目○勿

妄服湯藥勿妄亂針灸勿過飲酒漿勿舉重登

高陟險心有大驚子必癩癩勿多睡卧須時時

少步動和血脉勿勞力過傷使腎氣不足子必

解顛腦破不合○衣母太溫食母太飽若脾胃不和榮衛虛損子必羸瘦多病戒之戒之

○臨產須知

○一臨月不可洗頭以免橫生逆產

○一懷妊十月已滿陰陽氣足忽然臍腹陣痛胎孕偏陷腰間重脹穀道挺迸漿水淋下其兒遂生此乃正產若當生自有其時如瓜熟蒂懸粟熟自落之類

○一凡臨產宜擇年高有識穩婆及純謹婦人三四入扶持一應外來閑雜之人喪服穢濁之婦預宜杜絕勿令觸犯胎氣致產不利產後客氣

犯兒亦主傷害

○凡臨產房中不得喧鬧宜緊閉門戶靜以待生一歲月滿足方覺腹痛不可驚動太早早則舉家霍亂卜筮問神巫覡之流稱說鬼神多方哄嚇謀利產婦聞之恐怖夫恐則氣怯氣怯則上焦閉下焦脹氣乃不行以致難產如犯此急宜服紫蘇飲以寬其氣

一凡臨月忽然腹痛或作或止或一日二日三五日胎水已來腹痛不密者名曰弄痛非常產也又有一月前忽然腹痛如欲便產却又不產者名曰試月非富產也不問胎水來與不來俱不

妨事但當寬心候時若果當產時腰腹痛極不
已穀道挺迸眼中火出其時便產豈有或痛不
痛欲產不產之候耶人多於此胡行亂做枉了
性命可不慎歟

一凡初覺腹痛而腰不甚痛者未產也且扶行熟
忍若行不得則凭物而立行得又行

一世人不識但見腹痛纔作便謂生產坐婆踈狂
者不候時至便言試水試水併胞漿先破風入
產戶以致腫脹門戶狹小乾澁難產

一將產之時產母甚痛不肯舒伸行動固執曲腰
眠睡胎元轉動尋到生門已被遮閉又轉又尋

再三胎已無力決至難產

一初覺不痛且當任意坐卧勉強飲食母致臨產
乏力

一凡產母初覺欲生便須惜力調養不可妄亂用
力兒身方轉便被用力一逼令兒錯路以致橫
逆須待臨到產門用力一逼兒即下生此所當
用力也譬如登廁時候未至用力何益

一凡產母如覺心中憤悶可取白蜜一匙溫水調
服

一產母如覺饑餓可進以軟白粥不令飢渴以致
乏力亦不可食硬飯糍粽恐產後有傷食之病

一未產之先或煩渴欲飲水只可與清米飲飲之為佳

一凡產不可服催生符水况血得寒即凝血一凝則胎滯而反致難產夫催生符水蓋是野道士求食謀利之設有何益哉

一凡產婦胞漿未下但當穩守無妨胞漿既破一二時後不生便當服催生藥要緊夫胞漿者本胞內養兒之水也兒既折胞其水既下胎隨水而下則為易生胎元無力轉頭遲慢漿下即血來閉塞道路令子無路可通故難產也如用蜀葵子等破血之藥逐去惡血令兒得路而生故

曰催生藥也

一凡催生多用滑利迅速之藥如

兔腦 筆頭灰 努牙 蛇退之類是也

二凡催生若見水血先下子道乾澁不能下者如

猪脂 油 蜜 酒 葱白

葵子 牛乳 榆白皮 滑石之

類是也

三凡催生若稽停勞力之久風冷乘虛入於子宮使氣血凝滯而難產者如

牛膝 葱 桂 五積散 順元散之類

四凡催生有觸犯惡氣心煩燥悶難產者如

射香

朱砂

乳香

青竹茹之類

○夫產育之難者皆由產婦不曾預聞講說生育道理臨事倉惶用力失宜遂有難產之危是故有逆產者則先露足有橫生者則先露手坐產者則先露其臂此皆用力太早之過夫當臍腹疼痛之初兒身纔轉而未順用力一逼遂致橫逆若手足先露者用細針刺兒手足心一二分深三四刺之以益塗其上輕輕送入兒得痛驚轉一縮即順生之矣或兒脚先下者謂之踏蓮花生急以鹽塗兒脚底又可急搔之併以鹽摩母腹上則正生矣

娘

娘

○灸法治難產及胞衣不下急於產卅右脚小指尖頭上灸三壯炷如小麥大立產

○凡橫倒難產用蛇蛻一條全者蠶退紙一張右以二物入新瓷瓶中益泥固濟燒存性為末煎榆白皮湯入乳香同調服下則順生

○又方治橫生先露手足

阿膠

滑石

冬葵子

酥油

每服四錢水一大盞煎至七分連進二三服

○又方治橫逆不順子死腹中用

伏龍肝

土

紅

右為細末温酒調下一二錢其

兒頭戴土而出甚驗

○礙產

凡兒身已順門戶俱正兒已露頂而不能生此因兒身回轉肚帶攀住兒肩不能下也治法急令產母仰卧輕輕推兒向上徐徐引手以中指按兒肩下其臍帶仍須候兒身正順令產母用力一逼兒即下生○又法令穩婆款款分開臍帶外將紙撚

○凡兒身向未順生路未正被產母用力一逼令兒偏生或左腿或右腿或臀或左右額角雖兒身已逼產門而不能下但云兒已露頂非煩也治法當令產母仰卧看生人輕輕推兒近上以手

正其頭用力一逼即下若是頭之後骨偏柱穀道兒則露額當令看生人以綿衣炙令溫煖裘手急於穀道外傍輕輕推兒頭令正然後用力一逼兒即下生此名偏產

○治盤腸產法

有臨產則子腸先出甚可驚恐治法以盆盛溫水溫潤其腸令產母仰卧且以言語安慰其心却用好米醋半盞和新汲水七分攪勻忽喚產母面或背則打頓而收每一喚令一縮三喚三縮腸則盡收矣合用參芪歸芎等大劑補藥加升柴防風之類以升舉之未有不安者也○又法急以草麻子去殼研細貼產母

顛頂上即收

○一方治產難數日子死腹中不出母氣欲絕

瞿麥兩六

通草兩三

桂心兩三

牛膝兩四

榆白皮兩四

一方無榆白皮有天花粉四兩大

能墮胎

右細切用水九升煎取三升去粗

分三服頓飲即下

○又方牛膝丸下死胎

杜牛膝兩三

紫金藤錢七

肉桂錢二

當歸錢四

蜀葵根錢七

射香錢半

右為末米糊為丸如梧桐子大硃砂為衣每服

五十九丸乳香湯送下

○又方治子死腹中不出

用黃牯牛屎不拘多少塗母腹上立出○一云

以牛屎炒令大熟入醋半盞以青布包裹於母

臍上下熨之立下

○又治子死腹中用雞子黃一箇生姜自然汁一合

調勻頓服分免後用芸臺粥補之

○生子下血過多子死腹中增寒手指甲青面色黃

黑胎上搶心悶亂欲死冷汗自出喘滿不食或

食毒物或誤服草藥傷胎下血不止胎尚未損

可安若已死即下極妙

丹皮

赤芍藥

桂心

桃仁

茯苓

右各等分為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼淡醋湯送下連服數丸立驗

○一方治胞衣不下

川牛膝錢三

當歸身尾錢二

木通錢三

滑石錢四

冬葵子半錢

右細切水煎連進二三服即下

○丹溪活套

凡婦人胎前諸疾只須以四物湯為主治看證加減調治○如覺腹中煩悶口苦厭食不問月數多少本方加白朮條芩砂仁煎服○如五六箇月後胎動不安或逆搶逼心本方加阿膠艾

葉砂仁枳殼條芩白朮野苧根入金銀同煎服

○如氣血虛心煩脉虛大無力或怔忡手戰及時有微熱本方加人參白朮黃芩甘草酸棗仁遠志麥門冬地骨皮等藥○如五六箇月前無故下血或因事下血謂之漏胎本方加條芩白朮甘草白芷芩根地榆桑寄生之類○如七八箇月前後面目及四肢浮腫本方加茯苓澤瀉白朮條芩炒梔子厚朴甘草梢麥門冬之類○如孕中忽然口噤吐沫不省人事言語錯亂本方合二陳湯加麥門冬竹茹遠志石菖蒲之類如感冒風寒頭痛發熱或身體疼痛本方合

柴胡湯或更加細辛白芷防風羌活等藥○
如二三箇月內嘔吐惡心不納飲食謂之惡阻
本方去地黃加陳皮半夏麩砂仁神麩藿香麥
茶陳倉米白朮之類○或因事動胎致胎不安
動撞不已及下血欲墮本方加入參白朮白朮
苓條芩白芷桑寄生砂仁阿膠珠甘草等藥○
或時有白濁白帶本方加白朮芩陳皮蒼朮半
夏麩牡蠣龍骨之類○如無故腹痛瀉利清水
或發熱胎動不安本方加白朮茯苓猪苓澤瀉
蒼朮訶子皮砂仁神麩乾姜之類

○祖傳經驗秘方治難產溼漿胞乾胎不得下用香
油蜂蜜各一碗和勻用銅銚慢火煎一二沸掠
去沫調白滑石末一兩重攪勻頓服外以油蜜
於母腹臍上下摩之立產

○又方催生曾試甚驗用兔頭骨家猫頭骨各一箇
烈火煨地上出火毒研為極細末每服二三錢
濃煎芎歸湯調下即產

○又方治胞衣不下三退飲

蛇退

一條
全者

蠶退

紙方

蟬退

四箇

用瓷瓶盛燒存性細研順流水調服立下

婦人科 下產後

曰一息不運則機絨窮一毫不續則穹壤判
所謂氣血周流循環無端少有不續則身危矣若
夫妊娠之婦子在腹中母子一氣流通全賴漿水
滋養十月數足血氣完全形神俱備忽如夢覺自
能用手折胞求路而出既出胞外母子分體呼吸
殊息其可以羈於內而使其氣化不運不續哉夫
胎元壯健者胞既折即隨漿而下故易產也其困
弱者轉頭遲緩胞漿既乾汚血來塞道路凝滯是
以橫生逆產子死腹中而產母之命死在須臾可
不畏乎凡見將生之際胞漿既下踰時尚未分免
便當傍惶設計用藥逐去惡血使子路通暢而無

難產之患豈可袖手以待斃哉是故催生之藥即
芎歸益母草冬葵子之類皆使之逐去汚血者也
若腰腹未甚痛漿水少淋瀝而下名為試漿實非
胞內真漿也且宜寬心守待切不可輕易便令穩
婆接取產母用力逼胎太早多致橫逆不順切須
謹慎其或先見手足不順者額偏露者但當以手
輕輕撥正以待其自下可也若分免之後胞衣未
下者猶為可懼宜多方用藥逐下甚不可令粗率
之婦摘取嘗見有搯破尿管致終身之害者有取
下肝葉而產母隨時殞命者可不謹與若夫難產
皆是產前恣慾所致非獨難產且產後諸疾

是而生焉或有乍寒乍熱似瘧非瘧或大熱
頭疼體痛如傷寒狀或卒中口禁如瘞如癩或左
癱右瘓角弓反張或妄言見鬼心神懼惑或耳目
口鼻忽覺黑氣如烟薰之狀或腹中作痛綿綿不
絕已上諸証若非惡露未盡即是勞傷血氣大虛
之證丹溪曰凡產前當清熱養血為主產後宜大
補氣血為要雖有雜證以末治之此萬世不易之
確論也雖然亦有離褥太早或澡浴身垢以致感
冒風濕或多啖雞子糍粽難消之物皆能惡寒發
熱變證多端醫者宜潛心診察脉候以扶危極急
不可苟且妄治以夭折人之天年也

脉法

脉經曰新產婦人有三病一者病瘞二者病鬱胃
三者大便難云師曰亡津液胃燥故大便難產
婦鬱胃其脉微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出
所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗
出以血虛下厥孤陽上出故但頭汗出所以產婦
喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃
復所以便堅者嘔不能食也小柴胡湯主之病解
能食七八日而更發熱者此為胃熱氣實承氣湯
主之

後七八日無太陽證小腹堅痛此為惡露不

五日不大便跌陽脈微實再倍其人發熱日
晡所煩躁者譫語不能食利之即愈宜承氣湯以
熱在裏結在膀胱也

按此漢曰產後宜大補氣血為主雖有雜証以
未治之又曰產後不可汗下叔和以仲景治傷
寒法用承氣小柴胡等藥欲退產後之熱忍非
至到可法之語姑述於此以與賢者共議而採
擇之可也

卅溪曰產前脈細小產後脈洪數皆死又曰產前脈
當洪數既產而洪數如故豈得不死此亦大醫言
之今見產後

豈無脈洪
數而生者

方法卅溪方
凡十六條

卅溪曰產後當大補氣血為主雖有雜證以末治

之

○產後補虛用參朮黃芪陳皮歸身尾川芎炙甘草
如發熱輕則加茯苓淡滲之其熱自除重則加乾
姜或云大熱而用乾姜何也曰此熱非有餘之邪
熱乃陰虛生內熱耳蓋乾姜能入肺分利肺氣又
能入肝分引眾藥生血然必與補陰藥同用之此
造化之妙非天下之至神其孰能與於此哉

○產後發熱惡寒或口眼喎斜等証皆是血氣虛甚
當以女用氣血治左手脈不足補血藥多於
氣藥多於補血藥切不可

不滿者非

○是露下盡八... 見桃痛用五靈脂香附為末醋糊丸甚者加留尖桃仁一云用神麩糊丸白木陳皮湯下氣虛者四君子湯下

○治血刺痛用當歸乃和血之法若因積血而刺痛者宜桃仁紅花當歸頭之類血在下焦當用歸尾

○產後血運用韭葉細切盛於有嘴瓶中以滾醋沃之急封瓶口以瓶嘴納產婦鼻中即甦或用秤燒及磚石燒

紅樓中藥之亦良法也

○又方用鹿角一段燒存性出火毒為末酒調灌下

即醋

○血運因氣血俱虛痰火汎上作運二陳導痰隨氣血加減硃砂安神丸亦可服以麥門冬湯下

○一方治血運

人參兩一

紫蘘兩半

右細切童便酒水三物

同煎服

○嚴氏清菟散治產後血運昏不知人

澤蘭葉

人參各一兩

荊芥穗兩四

甘草錢八

川芎仁

芍藥各一兩

每服二錢溫酒入童便

醋炭更服此藥

不足瘕瘕角

右產婦... 意淋酒調下童便亦可○

意淋酒用大黑豆不拘多少炒焦投好酒中

○新產後不可用芍藥以其酸寒能伐發生之氣也

○產後乳汁不通用通草七分瞿麥柴胡天花粉各

一錢桔梗二錢青皮白芷木通赤芍藥連翹甘

草各半錢作一貼水煎食後細細飲之更摩乳

房或無子食乳者要消乳用麥蘗二兩炒分作

四服白湯調下

○產後泄瀉利用陳皮白朮茯苓川芎酒炒芍藥黃

芩滑石炙甘草煎服立効○一方無甘草有乾

姜按二物皆不可缺

○凡乳母但覺小水短少即是病生便須服藥調治

蓋兒飲母乳吐安兒安防患未形治法之善者

也

○有產婦因收生者不謹損破尿管而致淋瀝不禁

因思肌肉破尚可完補診其脉虛甚蓋難產因

氣血虛故產後猶憂但後有...

乾姜 炮

廿一

白

分兩

濟生方無蒲黃有附子

右為細末每服二錢童便和酒調服

○人參當歸散治產後去血過多血虛則陰虛陰虛

生內熱令人心煩短氣自汗頭痛

熟地黃

人參

當歸身

肉桂

麥門冬

白芍藥

炒各一錢

右細切作一服入淡竹葉五片生姜三片水煎服

○當歸黃芪湯治產後失血過多腰痛身熱自汗

當歸身 三錢

黃芪 二錢

白芍藥 一錢半炒

右細切作一服水一盞半加生姜三片煎至一

盞溫服

○失笑散治產後心腹疴痛欲死及兒枕痛

蒲黃 炒

五靈脂 各等分

右為細末每服二錢熬成膏白湯化下

○三聖散治兒枕痛

七

右細切作一服 生

○當歸羊肉湯治產後發熱自汗肢體疼痛日久不愈名曰褥勞

當歸身

人參 各七

黃芪 兩一

生姜 兩半

右細切用羯羊肉一斤煮取清汁五大盞去肉粗入煎藥慢火煮取四盞分六服徐徐飲之

○茯苓散治產後心虛怔忡不定言語錯亂

人參

甘草

山藥

當歸 各一

遠志

茯苓

桂心

麥門冬 各半

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞半煎至一盞去粗溫服

○當歸散治產後氣血俱虛恐增客熱宜服此以去

惡露

當歸

白芍藥

川芎

黃芩 各一

白朮 兩半

右為細末每服一錢五便

人參 兩下

方良

當歸

川芎

右細切每服五錢

半煎至一盞溫服

○四物一黃散治產後腹中血塊作痛

當歸炒

川芎炒

熟地黃

白芍藥

炒各半兩

蒲黃炒二錢半

右為細末每服二錢空心溫酒調下

○產寶黑龍丹治產後一切血疼垂死者但灌藥得下無有不安者

五靈脂

生地黃

當歸

川芎

高良姜各二錢

右細切用砂鍋一箇盛藥外以赤石脂為細末

醋調封縫又以紙筋益泥固濟文武火煨過置

地上出火毒研細入後藥

硫黃一錢半

花蕊石另煨一錢

乳香另研一錢

琥珀另研一錢

右同前藥共為一

三錢

月弓七知單子六

漸厥竭 亂髮

當歸去蘆 肉桂去皮

鯉魚鱗燒存性

芍藥 延胡索

右各等分為細末每服二錢溫酒調下

○調經散治產後虛浮蓋敗血乘虛停積府藏流注
肌肉腐壞成水令人面目四肢浮腫切不可用
導水泄利之藥是謂重虛其虛多致大亡此藥
主之

沒藥一錢另研 琥珀一錢另研 桂心 赤芍藥

當歸各一兩 細辛半兩 射香半錢另研

右為細末每服一錢七姜汁溫酒童便和調服
之

○正脾散治產後通身浮腫及治婦人大病後脾氣
虛弱中滿腹脹等病

蓬莪木炮 香附 茴香 甘草炙

陳皮 右
每服二錢溫酒調下

右各等分細切
子黃汁二盞煎藥

云羊心及粗溫服不

拘時

○琥珀散治產後瘀血攻心迷悶妄言見鬼

琥珀

鐵粉各一兩

人參

茯苓

生地黄

阿膠珠各七錢半硃砂五錢

甘草

射香各一盞

右為細末和勻每服一錢用金銀煎湯調下

○交感地黃煎丸治產後舌強不語眼見黑花或發

狂見鬼及胞衣不下心腹脹滿等証

生地黄

新搗

生薑

各二斤各用石臼杵細以布絞去汁留粗以新瓦各炒乾

當歸去蘆

延胡索炒

蒲黃炒

琥珀另研

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九煎當

歸湯化下食前服

○七珍散治產後不語

人參

石菖蒲

方

琥珀也

蓋溫服

○定痛散治產後惡血

中作痛

當歸

芍藥

各二錢

肉桂

一錢

右細切作一服酒水合一盞半生姜五片煎至

一盞服

○麻仁丸治產後大便秘結

麻仁去殼

枳殼

人參

大黃

當歸

各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九

白湯下未通漸加丸數以便潤為度

○羊肉湯治產後腹中虛扁氣血不足羸弱力倦及

寒月中生產寒氣入

張特

犯此寒病也此藥主之

精羯羊肉

四兩

當歸

右細切水三碗酒一

加葱鹽亦可

○玄易五仁丸治室

○固經丸治產後血崩
致血暴崩或淋瀝

沒藥 赤石脂

附子一雙炮去皮臍

右為細末米糊為丸

溫酒下或陳米飲

○熟乾地黄散治證同前
不止頭目沉重

又人一切崩中下血

五味子 茯苓

半夏麩 荊芥

右細切作一服加

半煎至一盞去粗

○四神散治產後留血不

利不止

常歸 蘆 乾姜

右為細末每服

寶

馬米沙白丁

○猪腎子飲治產後

體瘦腹中疝痛

猪腰子作一對切

右以當歸芍藥二

去粗將腰子切碎

粳米一合香豉

腹食之日進

蒲黃半錢 蟹瓜

膠一錢 尤炒得

布一男


旋覆

半

多


杏仁
去皮尖
研

三



陰戶中宮脫下也

人參各二錢



6277
53

