



醫學正傳卷之八

陸文庫

春翠
文庫

佐山
重致

小兒科

急慢驚風

發搐

五癩

諸疰

吐瀉

附証

痘疹

醫學正傳卷之八目錄

○小兒科

論

又變蒸論

小兒脉法總論

三關脉法形狀

湯氏察形色總斷

面上諸候形證歌凡七首

內八段錦凡四首

外八段錦凡十首

○急慢驚風門一論

脉法

丹溪方法凡二條

東垣治驚風論

東垣黃芪湯

東垣益黃散

錢氏安神丸

錢氏白朮散

又治驚風方

急慢驚風方

又急慢驚風方

又治慢驚風方

鎮驚丸

奪命丹

利驚丸

瀉青丸

抱龍丸

千金龍膽湯

宜風散

五福化毒丹

金鉞丸

釣藤飲

溫白丸

涼驚丸

○發搐門二

男發搐

女發搐

早晨發搐

日午發搐

日晚發搐

夜間發搐

傷風發搐

傷食發搐

百日内發搐

補腎地黃丸

瀉青丸

導赤散

涼驚丸

益黃散

大青膏

牛黃膏

甘露飲

白餅子

塗顛法

浴體法

○五癩門三

論五癩形証

五色丸

○諸痺門四

論

地黃丸

神丸

益黃散

又名補脾散

木香丸

胡黃連丸

蘭香散

白粉散

如聖丸

香蟾丸

蘆薈丸

治痺積腹大方

又治小兒痺方

祖傳經驗秘方

○吐瀉門五

論

脈法

方法

錢氏方法

木瓜丸

兒生三日內吐瀉

兒生三日至十日吐瀉

五月二十五日已後吐瀉

玉露散

六月十五日已後吐瀉

七月七日已後吐瀉

八月十五日已後吐瀉

吐瀉泄黃傷熱乳病 溫中丸

虛弱脾胃不和 吐瀉調脾平胃散

治吐瀉黃疸方

夏月吐瀉用益元散極效說

附証

腹脹論

腹脹搗氣丸

小兒腹虛脹方

又治腹脹方

腹痛傷食法

又腹痛方法

白餅子

白朮散

消積丸

心腹痛方法

安虫散

集効丸

治虫痛方 治蛇虫痛方 小兒吃粽腹痛方

又治小兒腹痛 小兒夜啼方

治夜啼花火膏 治小兒驚啼方

小兒風痰壅盛 小兒痰熱骨蒸方

又治前證方 小兒解顛方法 小兒吃泥方法

小兒脫囊方 小兒脫肛方 又治脫肛方

又治前證方 小兒赤瘤方法

白玉散 臍中汁出方 小兒癩頭方

又治癩頭方 丹溪醫按一條

小兒尾間骨痛 小兒弄舌 瀉黃散

小兒龜胃 瀉白散 龜背

重舌木舌

又治前證方

又治木舌方

小兒口瘡方

鵝口瘡方

又治鵝口瘡方

又治小兒口瘡方

又口瘡方

小兒頰上生瘡

小兒走馬牙疳

又治牙疳方

小兒臍風撮口方

○痘疹門 六

論

丹溪方法總論

丹溪方法 凡三十條

○痘瘡初發五藏形證 一

○痘瘡五藏形色 二

○斑痘所發之源 三

○斑內外因 四

王氏惺惺散

升麻葛根湯

木香參朮飲

四君子湯

和中散

紫霜丸

○辨形氣病 五

補肺散

解毒防風湯

當歸丸

十奇散

○辨三陰三陽經候 六

荆芥甘草防風湯

連翹防風湯

升麻葛根湯

升麻湯

理中湯

木香散

異功散

○辨三陽證治 七

犀角地黃湯

解毒丸

宜風散

百祥丸

龐氏地黃膏

黃栢膏

玉露散

甘露飲子

猪心龍腦膏

○辨三陰證治法八

調中丸

○辨形氣不足九

芎歸湯

○辨表裏虛實十

消毒飲

葛根升麻加芍藥湯

活血散

勻氣散

二物湯

百花膏

○平治諸方十一

三荳湯

油飲子 鳳龍膏

錢氏惺惺散

解毒防風湯

四物解肌湯

○瘡出不快十二

活血散加防風湯

龐氏紅花湯

紫草湯

四聖散

樺皮飲子

五積散

正氣散

調解散

展砂五苓散

小柴胡湯

人參白虎湯

人參竹葉湯

肉荳蔻丸

絲瓜湯

阮氏萬全散

湯氏安斑湯

透肌散

如聖湯

○辨外證逆順三

○辨外證輕重四

○辨初末形證五

○辨不藥而愈六

○辨五不治證七

○辨疹有陰陽二証八

○傷寒時氣發斑附九

玄參升麻湯

荆防敗毒散

化斑湯

龐氏石膏湯

陽毒升麻湯

○辨瘡後餘毒仁

消毒飲

十六味流氣飲

必勝膏

蜆子水

五福化毒丹

如聖湯

雄黃解毒丸

黃連阿膠丸

駐車丸

決明散

蜜蒙花散

撥雲散

蛤粉散

祖傳經驗秘方

又痘後不大便方

○古人極治痘瘡要法方論二十

陷伏倒靨黑陷證

不換金正氣散

辟穢丹

再懸散

猪尾膏

白龍散

敗草散

馮氏天花散

旱胎散

猶聖散

安胎散

醫學正傳卷之八目錄終

新編醫學正傳卷之八

花溪恒德老人虞搏天民編集
姪孫虞守愚惟明校正

小兒科

論

嘗聞小方脉科古人謂之啞科最費調治誠哉是言也蓋以嬰之流難問証難察脉耳抑且臟腑脆嫩而孟浪之劑與夫峻寒峻熱之藥俱不可輕用試詳論之夫孺子之在襁褓中也內無七情六慾之交戰外無大風大寒之相侵奚其幼科之疾若是之繁且其與抑考其證大半胎毒而少半傷食也其外感風寒

之證什一而已曰變蒸曰痘疹曰斑爛曰驚悸曰風
痲曰發搐曰痰壅曰赤瘤曰白禿曰解顛曰重舌木
舌已上諸証豈非孕母不謹胎毒之所致與夫小兒
之在胎也母飢亦飢母飽亦飽辛癖適口胎氣隨熱
情慾動中胎息輒躁或多食煎燂或恣味辛酸或嗜
慾無節或喜怒不常皆能令子受患其為母者胎前
既不能謹節產後又不能調護是以惟務姑息不能
防微杜漸或未滿百晷而遂與醜酸之味或未穀週
歲而輒與肥甘之物百病由是而生焉曰吐瀉曰黃
疸曰五疳曰腹脹曰腹痛曰水腫曰癰曰痢曰痰喘
豈非吃食過傷調養失宜之所致與先正所謂古者

婦人妊子寢不側座不邊立不蹕不食邪味等語厥
有旨哉其餘飲食男女養胎幼幼之法必深得造化
生生不息之意故古人多壽考兒少夭折者即此之
由也嘗見今有稟性溫良之婦有娠不嗜慾從口生
子少病而痘疹亦稀亦可以為師法夫為兒醫者臨
證之際宜察色觀容不可鹵莽假如額赤知為心熱
鼻紅知為脾熱左腮青知為肝有餘右頤白知為肺
不足頰白知為腎虛之類更參之以虎口三關之脈
其少兒之病情斯過半矣傳曰幼吾幼以及人之幼
仁人之心斯言其可忽諸

又論變蒸夫小兒之初生血氣未足陰陽未和臟腑

未實骨格未全有變蒸之後每三十二日一發熱或吐或汗或呻吟不食此為長血脈全智意之常候不須治而自愈按諸家所論皆謂乃小兒長骨脈藏府與神志也自生之日始每三十二日一變凡人有三百六十五骨除手足四十五碎骨外正有三百二十骨自生下骨而上一日十骨三十二日乃為一變骨氣始全一變生一藏或一府十變則藏府始足每變發為虛熱諸證亦有胎氣壯實暗變而無發熱證者此骨節藏府由變而全胎毒亦因變而散也為兒醫者可不審乎

脉法總論

詔
命入聲
訣則定長弱

按古法曰凡小兒證候難以手太陰尺寸脉診如一歲至六歲曰嬰孩惟以男左女右手次指三關之脉以為驗病輕重死生之訣第一節名風關無脉則無病有脉則病輕第二節名氣關脉見則病重尚可以藥治而已第三節名命關脉見則病劇乃九死一生之惡候也多不可治七歲八歲曰齒九歲十歲曰鬢始可以一指探掌後尺寸三部之脉而以一息七八至為無病之常脉十一歲至十肆歲曰童非而以一息五六至為常脉也數則為熱遲則為寒浮則為虛為風沉則為實為積為痛浮而數者為乳痈驚悸虛而軟者為慢驚瘈瘲緊而實者為風癰牢而革者為

軟目較
瘈瘲
和桂

倫
昆
次
也

便秘沉而弦者為食積為腹痛緊而弦者為氣急為風寒洪數者為熱伏結為傷食軟細者為虫疳若氣促脈代散亂無倫次者死在須臾而不治也業勿科者其可不盡心於此乎

今將手指三關之脈繪圖分注開列于後



一風關易治

二氣關病重

三命關死候

三關青是四足驚 三關赤是水驚 三關黑是人驚 如有此三關通度脈候是極重之証必死餘並可治 山風關青如魚刺易治乃初驚之候也黑色難治

氣關青如魚刺主痺勞身熱易治

命關青如魚刺主虛風邪傳脾難治

一風關青黑色如懸針主水驚易治

氣關赤色如懸針主痺病兼肺藏積熱尤為可治

命關凡有此脈不問五色皆是死候

又三關通度如懸針者主慢驚風難治

川風關如水字主驚風入肺咳嗽面赤

氣關如水字主膈上有涎并虛積停滯

命關如水字主驚風痺極夾驚候不拘五色三關

通度者不治

乙風關如乙字主肺藏驚風易治

氣關如乙字主驚風病重

命關如乙字青黑色主慢驚風難治

風關如曲虫主疳積聚胃前如橫排筭子肚皮如吹豚猪猡

氣關如曲虫主大腸有穢積

命關如曲虫主心痛傳肝難治

風關如環主肝藏有疳積積聚

氣關如環字疳入胃吐逆不治

命關如環惡候不治

黥此紋若在風氣二關易治若在命關通度難治

此紋若在手或面上或左右腹脇上或在左右

臉邊皆死候

乙脉曲向裏者是氣疳 了脉曲向外者是風疳

脉斜向右者是傷寒身熱不食無汗

脉斜向左者是風傷身熱不食有汗

雙鉤脉者是傷寒 三曲如長虫者是傷硬物

兩曲如鉤者是傷冷物

一頭如環有獨脚者是傷冷

面上有此點子必是再發之候

凡頭面上或肚腹上有大脉併青筋如此者並是

食毒物及驚積難治

參脉如亂虫是常疳亦有虫疳蛇疳食積之疳皆可

治

凡脉微細不足者並是風氣俱宜消痺然後取虫積肥孩兒是良法也

○附湯氏察小兒神色總斷

○凡看小兒病宜先觀形證神色然後察脉假如肝之為病則面青心之為病則面赤脾之為病則面黃肺之為病則面白腎之為病則面黑先要分別五藏形證次看稟受盈虧胎氣虛實明其標本而治之無不可者

○面上諸候形證歌凡七

○痢疾眉頭皺驚風面頰紅渴來唇帶赤毒熱眼蒙

臃

又一首

○山根若見脉橫青此病明知兩度驚赤黑困疲時吐瀉色紅啼夜不曾停

又

○青脉生於左太陽須驚一度見推詳赤是傷寒微燥熱黑青知是乳多傷

又

○右邊青脉不須多有則頻驚恚柰何紅赤為風抽眼目黑青三日見閻羅

又

○指甲青兼黑暗多唇青惡逆病將瘥忽作鴉聲心氣急此時端的命難過

又

○蛇虫出口有三般口鼻中求大不堪如或白虫兼黑色靈丹縱眼病難安

又

○四肢瘡痛不為祥下氣冲心兼滑腸氣喘汗流身不熱手拿胃臍定遭殃

○內八段錦凡四首

○紅淨為安不用驚若逢紅黑便難寧更加紅亂青尤甚取下風痰病立輕

○赤色輕微是外驚若如米粒勢難輕紅散多因乘怒亂更加搐搦實難平

○小兒初誕月腹痛兩眉顰是號盤腸氣時啼哭又呻如反日仰視者天吊風也

○小兒初誕月肌體瘦厓羸髮禿毛稀少元因鬼王胎

○外八段錦凡十首

○先望孩兒眼色青次看背上冷如水陽男搐左無妨事搐右令人甚可驚女搐右邊猶可治若逢搐左疾非輕歪斜口眼終無害縱有仙丹也莫平

○眼中赤脉實難量大數元來一不祥最怕亂文鋪
目下更嫌赤脉貫瞳光

○顛門腫起定為風此候應知最是凶忽陷成坑如
盞足未過七日命須終

○鼻門黑燥渴難禁面黑唇青命莫存肚大青筋俱
惡俱更嫌腹有直身紋

○忽見眉間紫帶青看來立便見風生青紅碎雜風
將起必見疝癥膈氣形

○亂紋交錯紫嫌青急急求醫免命傾盛紫再加身
體熱須知藏府惡風生

○紫小紅多六畜驚紫紅相等即疝成紫點有形如

米粒傷寒夾食證堪評

○紫散風傳脾藏間紫青口渴是風癩紫隱深沉難
治療風痰祛散命須還

○黑輕可治死還生紅赤傷寒痰積停赤青脾受風
邪證青黑脾風作慢驚

○紅赤連兮赤藥輕必然乳世不相應兩手忽然無
脉見定知衝怒犯神靈

急慢驚風

論

內經曰諸風掉眩皆屬肝木夫小兒八歲已前曰純
陽蓋其真水未旺心火已炎故肺金受制而無以平

木故肝木常有餘而脾土常不足也為父母者而有失於保養其或衣服寒暄不調以致外邪侵襲或飲食之飢飽失節以致中氣損傷是故急慢驚風之候作矣夫惟急驚屬肝木風邪有餘之證治宜清涼苦寒瀉氣之藥慢驚屬脾土中氣不足之候治宜中和甘溫補中之劑若夫急驚之候因聞不常之聲或遇驢馬禽獸之吼以致面青口噤或啼嘶而厥發過則容色如故良久復作其身熱面赤引飲口鼻中氣熱大小便黃赤色惺惺不睡蓋熱甚則生痰痰盛則生風偶因驚而發耳宜用錢氏利驚丸瀉青丸抱龍丸宜風散伍福化毒丹等藥慢驚之證多因飲食不節

損傷脾胃以致吐瀉日久中氣大虛而致發搐發則無休止時其身冷面黃不渴口鼻中氣寒大小便青白昏睡露睛自上視手足痠痿筋脉拘攣蓋脾虛則生風風盛則筋急俗名天吊風者即此候也治宜東垣黃芪湯錢氏釣藤丸溫白丸丹溪參朮湯送下硃砂安神丸之類錢氏謂急驚為無陰之證因心經實熱而因不能以配陽是為陽盛陰虛之候也謂慢驚為無陽之証因脾土虛甚而陽不能以勝陰是為陰盛陽虛之候也愚按小兒急慢驚風之証其虛實寒熱如天淵之隔故急驚者十生一死慢驚者十死一生俗醫多不諳此理混為一途而治誤人多矣業幼

科者宜推幼幼及人之心為心庶免斯世無大枉之
赤子矣幸甚

方法丹溪方法
凡二條

脉訣並見前
劫章

丹溪曰錢氏方乃小兒科之祖其立例極妙若能
增損而用之無不驗也

又曰驚風有二慢驚屬脾虛所主多死宜溫補一
云當養脾用參朮煎湯下安神丸○急驚屬痰
熱宜涼瀉一云用養血藥作湯下降火清痰丸
子抱龍丸之類世以一藥通治二證甚謬

○東垣治驚論曰外物驚宜鎮心以黃連安神丸若
氣動所驚宜寒水石安神丸大忌防風丸治風
辛溫之藥必殺人何也辛散浮溫熱者火也因
驚而泄青色先鎮肝以硃砂之類勿用寒涼之
氣大禁涼驚丸風木旺必克脾胃當先實其土
後瀉其木閻孝忠編集錢氏方以益黃補土誤
矣其藥有丁香辛熱助火火旺土愈虛矣青橘
皮瀉肺金丁香辛熱大瀉肺與大腸脾實當瀉
子今脾胃虛反更瀉子而助火重虛其土殺人
無疑矣其風木旺證右關脉洪大掌中熱腹皮
熱豈可以助火瀉金如寒水來乘脾土其病嘔
吐腹痛瀉痢青白益黃散聖藥也今立一方先
瀉火補金大補其土是為神治之法

○黃芪湯

治慢驚風之神藥也

黃芪錢二

人參錢一

炙甘草錢半

加白芍藥錢一

右細切作一服水一大碗煎至半盞去粗食遠服

上三味皆甘溫能助元氣甘能瀉火內經云熱淫于內以甘瀉之以酸收之白芍藥酸寒寒能瀉火酸味能瀉肝而大補肺金所補得金土之位大旺火虛風木何由而來尅土然後瀉風之邪○又曰夫益黃散理中丸養神丸之類皆治脾胃寒濕天盛神品之藥也若得脾胃中伏熱勞役不足之證及服熱藥巴豆之類致胃虛而

○益黃散治胃中風熱

黃芪錢二

陳皮錢一

人參錢一

白芍藥錢七

生甘草

炙甘草

各五分黃連少許

右為細末分三服每服用水一盞煎至半盞食

前服

○錢氏安神丸治邪熱驚啼心痺面黃頰赤壯熱

麥門冬心去 馬牙硝 白茯苓 乾山藥

寒水石 甘草炙各半兩 硃砂兩一 龍腦字一

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服半丸砂糖
水磨化下慢驚用參朮煎濃汁化下

○錢氏白朮散治積痛和胃生津止瀉頻瀉利將欲

成慢驚風者服之訣刻

人參 白朮 木香 白茯苓皮去

甘草炙 藿香各一錢 乾葛二錢

右細切分二服每服水一盞煎至半盞溫服○

丹溪加山藥白扁豆炒 肉豆蔻煨 用姜一片

煎○若慢驚已作加細辛天麻各一錢 全蝎三枚

去稍毒 白附子八分 麩裏煨 同煎服不拘時候

○一方治驚風用母丁香一粒細嚼人中白小許以
其母中指取血調擦牙上即斃

○急慢驚風發熱口瘡手心煩熱痰熱痰軟痰喘並

用湯法重劑用瓜蒂散輕劑用苦參赤小豆末

以酸棗汁調服吐之吐後稍定更用防風通聖

散為末蜜丸服之間以桑羊乾為末米飲調服

以平其風氣

○又方治急慢驚風

薄荷葉

寒水石

各半兩

青黛

白殭蠶

硃砂

各一錢

全蝎

二枚

猪牙皂角

槐角

各半錢

右為細末燈草湯和乳汁調時時灌之

○又方治慢驚風子母俱服

人參

白朮

各一錢

茯苓

陳皮

各半錢

甘草

薄荷

各二分

半夏

天麻

各七分

細辛

三分

全蝎

去毒炒一枚

右細切作一服加姜三片水一盞煎至七分服

○鎮驚丸鎮驚寧神退心熱夜啼化痰止咳

珍珠

一錢

琥珀

天竺黃

雄黃

各三錢

金鉞片

一錢

膽星

五錢

牛黃

射香

半錢

硃砂

三錢半

右為細末麥麩糊為丸如梧桐子大每服五六

丸薄荷姜蜜湯化下

○奪命丹治急驚不省人事目定直視牙關不開唇

白或黑者

南星

半夏

各四錢

為末以生薑汁捏和作餅子焙乾

珍珠

新白者二錢

巴豆

去油淨一錢

硃砂

四錢

金鉞

銀鉞

各十片

輕粉

各半錢

射香

各半錢

右為細末麵糊丸如黍米大每一歲兒一九燈

心湯化下

○利驚丸治急驚風神效

氏錄

天竺黃二錢半

輕粉

青黛各一錢

黑丑

頭末半兩生用

右研勻煉蜜丸如梧桐子大一歲兒一九三歲兒二九五歲兒三九溫薄荷水下食後服

○瀉青丸又名瀉瀉丸治肝熱急驚搐搦等証

羌活

川大黃

濕帝畏腰一本無大黃

川芎

梔子仁

草龍膽

當歸

防風

去蘆各等分

右為細末煉蜜丸如芡實大每服半丸至一九煎淡竹葉湯同砂糖溫水化下

氏錄

○抱龍丸治傷風瘟疫身熱昏睡氣麓風熱痰實壅嗽又治驚風潮搐及蠱毒中暑沐浴後並可服壯實小兒宜時與服之則免痰熱驚悸之証

雄黃二錢半

飛

展砂

另研五錢

天竺黃

兩一

天南星

煨為粉四兩

兩如無

只將生乾者

去皮臍炒熟

及膽星

射香

半兩另研恐入多今用二錢半

用熱不

右為末煮甘草膏和丸如皂子大溫水化下百

日兒每丸分作三服一歲兒半丸五歲兒二九

童非三五九室女白帶伏暑用益小許細嚼一

二九新汲水送下臘月用雪水煮甘草和丸尤

佳一法用漿水或新水浸南星三日煮三五沸

去皮取白肉切焙炒黃色為末每八兩以甘草

二兩半拍破用水二碗慢火煎至半碗去粗旋

旋洒入南星末徐徐研之令甘草水淨入餘藥

○千金龍膽湯治嬰兒出腹血脉實盛寒熱交作四肢驚掣併諸疳驚等證

草龍膽

釣鈎藤

柴胡

黃芩

挂枝

芍藥

茯苓

甘草

螳螂

大黃

右細切用水一升煮至五合徐徐服之

○宜風散治急驚風搐搦不定

檳榔

陳皮

甘草

黑丑

右為細末二三歲兒蜜湯調下半錢已上一錢

食前服

○五福化毒丹治急驚風痰熱搐搦等證

桔梗

玄參

青黛

牙硝

人參

茯苓

甘草

銀鉞

金鉞

射香

右為細末入研藥拌勻煉蜜丸每兩分作拾貳

丸一歲兒每一丸分四服用薄荷水化下瘡疹

餘毒上攻口齒涎血臭氣以生地黃自然汁化

一九以鷄翎刷口內

○金鉞丸治急慢驚風痰涎壅盛

半夏

天南星

白附子

防風

雄黃

硃砂

生犀末

牛黃

龍腦

射香

金鉞

右為細末姜汁調麩打糊為丸如麻子大每服三五九至一二九入參湯下慢驚去龍腦

○釣藤飲治吐利脾胃氣弱虛風慢驚

釣鉤藤錢半

蟬蛻

防風去蘆

人參

麻黃去節

白殭蠶炒

天麻

蝎尾去毒炒

甘草炙

川芎各半

右為細切作一服水一盞煎至六分溫服量入

大小加減分數與之虛寒者加附子末半分

○溫白丸治小兒脾氣虛弱泄瀉瘦怯冷痺洞泄及

吐瀉久病轉成慢驚身冷瘈瘲等證

天麻兩半

白殭蠶炒

白附子生

全蝎去毒炒

天南星湯泡七次焙各二錢五分

右為細末湯浸寒食麵為丸如菘荳大每服五

七九至二三十九空心姜米湯下

○京驚丸治驚疳

草龍膽

防風去蘆

青黛各三錢

釣藤二錢

黃連二錢

龍腦一錢

牛黃

射香各一字

右為細末麥麵糊凡如黍米大每服三五九至

一二十九煎金銀湯送下

發搐

○男發搐目左視無聲右視有聲

○女發搐目右視無聲左視有聲 相勝故也更看

所發時候

○早晨發搐因寅卯辰時潮熱目上視手足動搖口流涎涎頸筋急此肝木大旺當補腎抑肝補腎地黃丸抑肝瀉青丸主之

○日午發搐因巳未時潮熱心神驚悸目上視白睛赤色牙關緊急口流涎手足動搖此心火大旺也當補肝瀉心補肝地黃丸瀉心導赤散涼驚丸主之

○日晚發搐因申酉時潮熱搐而喘日微斜視睡則露睛手足冷大便下薄淡黃水此是肺病當補而脾抑心肝補脾益黃散抑心導赤散抑肝瀉

青丸主之

○夜間發搐因亥子丑時潮熱不堪搐而卧不穩身體濕無壯熱目睛斜視喉中有痰大便銀褐色乳食不消多睡不醒當補脾抑心補脾益黃散抑心導赤散涼驚丸主之

○傷風發搐口中氣出熱呵欠煩悶手足動搖當發散大青膏主之小兒稟賦素怯者多病此

○傷食發搐身體溫多睡多唾或吐不食而搐當先定搐搐退用白餅子後服安神丸

○百日内發搐有真假二證真者不過三二次必死假者發頻不為重真者内生驚癇假者外傷風

冷蓋血氣未實不能勝邪乃發搐也奚如假者口中氣出熱也治之宜發散大青膏主之及用塗顛法與沐體法

○補腎地黄丸見疴病門瀉青丸見前風門

○導赤散治心熱

生乾地黄 木通 甘草炙各分等

右細切每服三錢水一盞入淡竹葉七片同煎至半盞食後溫服一本無片草有黃芩

○涼驚丸方見前益黃散方見疴病門

○大青膏治小兒傷風吐瀉心溫不涼不熱

天麻 青黛各一錢白附子半錢蝎尾去

烏蛇肉酒浸焙乾硃砂 天竺黃 射香各一字

右為細末生蜜和成膏每服半皂子大或一皂子大月中兒粳米大同牛黃膏溫薄苛水化一

處服之五歲已上同甘露飲服錢本有天麻無大青按此知闕

○牛黃膏治熱及傷風壯熱引飲

雄黃 甘草 甜硝 寒水石生各二錢半

蔚金錢一 菴荳粉錢五 腦子錢一 右為細末和勻蜜和成膏薄苛水化下半皂子

大食後服

○甘露飲治心胃熱咽痛口舌生瘡併瘡疹已發未

發皆可服又治熱氣上攻牙齦腫牙齒動搖含嗽併服方見瘡疹門

○白餅子餅子名玉治小兒腹中有癖但飲乳軟而生痰

滑石 輕粉 半夏湯泡七次 南星各一錢

巴豆二十四粒去皮膜用水二分煮水盡為度一作水三分

右研勻巴豆後入衆藥以糯米飯為丸如菘苳大揔作餅子三歲已上兒三五餅已下一二餅煎薄荷湯下臨卧服

○塗顛法

射香 蜈蚣末 牛黃末 青黛末各一錢

蝎尾去毒為末半錢 薄荷葉半錢

右同為細末研勻熟棗肉劑為膏新綿上塗勻貼顛上四方可出一指許火上炙手頻熨百日裏外兒可用此及浴法

○浴體法治肥胎併胎怯胎熱

烏蛇肉酒浸焙為末 白礬 青黛各二錢 天麻二錢

蝎尾去毒為末 硃砂各半錢 射香一字

右同研為細末每服用三錢水三碗帶葉桃枝一握同煎至十數沸溫熱浴之勿浴背

五疳

○凡治小兒五疳皆當隨藏治之每藏各有一獸所

屬如犬癩反折上竄犬叫肝也○牛癩目直視
腹滿牛叫脾也○鷄癩驚跳反折手縱雞叫肺
也○猪癩如尸吐沫猪叫腎也○羊癩目瞪吐
舌羊叫心也○五癩重者死病後甚者亦死治
法並用五色丸主之

○五色丸

磁砂研

珍珠末各五

水銀作二錢半一

雄黃作一兩一

黑鉛二兩同水銀熬○按用黑

為是無
疑矣

右煉蜜丸如麻子大每服三四丸煎金銀薄荷
湯下

諸疳証四

論

內經曰數食肥令人內熱數食甘令人中滿蓋其病
因肥甘所致故命名曰疳若夫襁褓中之乳子與四
五歲之孩提乳哺未息胃氣未全而穀氣尚未充也
父母不能調攝惟務姑息滋犢之愛遂令恣食肥甘
與夫瓜果生冷及一切烹飪調和之味朝食暮食漸
成積滯膠固以致身熱體瘦面色痿黃或肚大青筋
虫痛瀉利而諸疳之証作矣錢仲陽曰小兒病疳多
因大病後或吐瀉後以藥下之致脾胃虛損亡津液
而成蓋此證實由愚醫之所害耳斯言也特一端耳

未可悉以為然其所謂大病吐瀉豈非飲食之所致
與夫仲陽為兒醫之祖豈有誤耶其所論諸症形證
治法斑斑可攷學者不可不審如痺在肝則白膜遮
睛法當補肝地黃丸主之痺在心則面頰赤身體壯
熱法當補心安神丸主之痺在脾則體黃腹大好食
泥土法當補脾益黃散主之痺在肺則氣喘口鼻生
瘡亦當補脾益黃散主之此虛者補其虛也痺在腎
則極瘦而身生瘡疥法當補腎地黃丸主之筋痺則
瀉血而瘦當服補肝地黃丸骨痺喜卧冷地當服補
腎地黃丸內痺則目腫腹脹利色無常或沫青白漸
而瘦弱此冷證也宜服木香丸外痺鼻下赤爛自揉

鼻頭有瘡不結痂遠目而生當用治瘡爛蘭香散白
粉散等藥法曰諸痺皆依本藏而補其母則子自安
假令日中潮熱是心經虛熱也肝為心之母宜先補
肝肝實而後瀉心心得母氣則內平而潮熱愈矣餘
皆倣此大抵痺病當辨冷熱肥瘦而治其初病者為
肥熱痺久病者為瘦冷痺冷則用木香丸熱則當用
胡黃連丸冷熱痺並宜用如聖丸之類惟小兒之府
藏柔弱不可痛擊大下必亡津液而成痺證為兒醫
者常當以匆匆之心為心而善調之母縱巨膽妄為
施治以絕人之嗣續幸甚

疥法

並見前
劫率

方法

○地黃丸補肝腎治肝痺白膜遮睛筋痺瀉血腎身

瘦瘡疥骨痺喜卧冷地又治胃快不言解顯小

兒年長不能行者專服神效

熟地黃酒浸 山茱萸 乾山藥 澤瀉

牡丹皮 白茯苓各三錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大三歲以下兒

三九至五九熟水空心化下年長者量增丸數

○安神丸治邪熱驚啼心痺面黃頰赤壯熱方見驚風門

○益黃散又名補脾散治小兒脾胃虛寒脾痺體黃腹大

好食泥土肺痺氣喘口鼻生瘡等証

陳皮錢一 青皮 訶子皮 甘草炙各半錢 丁香二分

右作一服細切水一盞煎至六分溫服愚每於本方加

參朮各一錢効

○木香丸治瘦冷痺

木香 青皮 檳榔

肉苳蔻各二錢半 射香一錢 續隨子一兩去油

蝦蟇大壯者一名蟾酥俗名風雞三箇燒存性

右為細末煉蜜丸如菉苳大每服三五丸至一

二十九薄荷湯送下

○胡黃連丸治肥熱痺

胡黃連 宜黃連各半兩 硃砂二錢半另研

右為細末和勻填入獾猪膽內用淡漿煮以紋子加銚子上用線釣之勿著底候一炊時取出研入蘆薈射香各一分飯丸如麻子大每服五七丸至一二十九米飲下○一方去足蝦蟇半兩焙乾不燒

○蘭香散治外疔鼻下赤爛

蘭香葉

菜名二錢燒存性

銅青

輕粉各半

右為細末乾付之

○白粉散治痔瘡

烏賊魚骨末

七錢

白芨末

三錢

輕粉

一錢

右為拌和勻先用清漿水洗瘡拭乾付之

○如聖丸治冷熱痔瀉

史君子

去一兩

胡黃連

川黃連

白蕪荑

去皮炒各二兩

射香

半錢另研

乾蝦蟇

五筒酒煮成膏

右為細末以蝦蟇膏和丸如麻子大二三歲兒

五七丸已上十九至十五丸入參湯下不拘時

服

○香蟾丸治疔消食積虫積肉積及治腹脹大

三稜

蓬莪朮

青皮

陳皮

神麴

炒

麥蘖曲

炒

草龍膽

檳榔

各五錢

木香

二錢

川棟子

去核

史君子

胡黃連

川黃連

各四錢

白朮

一兩

乾蟾

筒五

右以白朮以上藥俱研為細末以乾蟾用醋煮爛成膏和藥如乾再加醋糊為丸如麻子大每服十五丸清米湯送下

○蘆薈丸治小兒疳積腹脹骨熱

蘆薈 木香 檳榔各二錢 蝦蟇酒浸炙

黃連各一兩 蕪荑去皮 青皮 陳皮各五錢

巴豆三七粒去殼同

右為細末猪膽汁丸如小荳大三歲兒二十九米湯下

○又方治疳積腹大

胡黃連去果 阿魏醋浸去肉

射香當門子 川黃連炒去熱積

神麴炒去食積

右為細末猪膽汁和丸如麻子大每服三十九白朮湯送下○一方有蘆薈半錢

○又方治小兒疳病

黃連 白朮 山查肉各五錢 胡黃連

蘆薈各三錢 蕪荑二分 神麴二錢

右為細末猪膽汁為丸如麻子大量兒大小加減丸數與之

○祖傳經驗秘方檳榔丸小兒疳病積氣成塊腹大有虫等證其效如神

檳榔兩一

三稜煨去毛

蓬莪朮醋炒各

青皮

去穢焚 陳皮去白各

蕪荑水洗淨

雷丸

去殼 鶴虱略炒

乾漆無烟炒

木香

三錢不見火 良姜二錢東壁

砂仁一錢

麥蘖麩

五錢 胡黃連三錢

甘草三錢

神麩

五錢 山查肉五錢

右為細末醋糊為丸如葶苈大每服三五十九

空心淡姜湯送下

吐瀉 五

論

內經曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱又曰濕勝則

濡泄夫小兒之吐瀉皆由乳食過度傳化失常蓋食

鬱則成熱熱鬱則成酸酸而成吐成瀉此必然之理

也又曰食滯於胃口者為吐食滯於大小腸者為瀉

有生下而遂吐不休者胞胎中穢惡流於腸胃而為

吐也卅溪曰錢氏五補五瀉之法俱可選用謹遵而

依法具錄如左

脈法並見前

方法

錢氏曰小兒初生下吐蓋拭掠兒口中穢惡不盡

入喉中故吐木瓜丸主之

凡生子於未發聲之先

其令淨後以黃連甘草二味等分煎汁灌一二匙

則無已上等病出痘疹亦稀少若啼聲一發則熯

下矣亦當用黃連其
草汁飲之不可忽也

○木瓜丸

木瓜末

木香末

射香末

膩粉即輕粉也

檳榔末各一

右并研勻麩糊為丸如黍米大每服三二九其

草湯送下

○初生三日內吐瀉壯熱不思乳食大便乳食不消

或白色知是傷食當下之而後和胃不用白餅

子和胃用益黃散上二方俱見前

○初生三日已上至十日吐瀉身不熱或乍熱乍涼

不思乳食大便青白色乳食不消此上實下虛

也更有五藏兼見證宜詳○肺病則睡天露睛

喘氣○心則驚悸飲水○脾則困倦饒睡○肝

則呵欠煩悶○腎則不語畏明當先見貌兼藏

補脾益黃散主之 此二證多病於夏秋也當先

見貌兼藏其義未詳恐
有脫簡以俟知者正之

○五月二十五日以後夏至後十日也吐瀉身壯熱此熱乃

藏府中十分中九分熱也或因傷熱乳食吐乳

不消瀉深黃色玉露散主之

○玉露散一名甘露散

石膏

寒水石各半

生甘草二錢半

右為細末每服一字或半錢溫水調下

○六月十五日以後大暑後吐瀉身溫似熱藏府六分熱四分冷也嘔吐乳食不消瀉黃白色似滑或食乳或不食食前少服益黃散食後多服玉露散

按丹溪用去桂五苓散倍白朮加蒼朮甚者二朮炒用或入益元散和勻米湯調下甚效

○七月七日以後立秋後吐瀉身溫涼七分熱也不能食乳多似睡悶亂哽氣長出氣睡露睛唇白多噦欲大便不渴食前多服益黃散食後少服玉露散

○八月十五日以後秋分後吐瀉身冷無陽也不能食

乳乾噦瀉青褐水當補脾益黃散主之不可也下

○吐瀉泄黃傷熱乳也吐瀉瀉青傷冷乳也皆當下白餅子主之傷熱乳者玉露散傷冷乳者益黃散溫中丸並於下後服之亦有不須下但服此藥愈者

○溫中丸

人參

甘草炙

白朮各一兩

右為細末姜汁麩糊為丸如菘荳大每服一二十丸粳米飲下

○虛弱脾胃不和不能食乳致肌肉消瘦亦有因大病後或吐瀉後脾胃尚弱不能傳化穀氣也有

冷者時時下利唇口青白有熱者身溫壯熱肌
肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香丸夏月不可
服亦須少熱者胡黃連丸冬月不宜服
有証須少服木香丸胡
黃連丸二方並見前

○吐瀉調脾平胃散入熟蜜和蘓合香丸名萬安膏
米飲調服

○一方治吐瀉黃疸

三稜

莪朮

青皮

陳皮

神麴炒

麥蘖炒

黃連

甘草炙

白朮

茯苓等分

右為細末溫水調服傷乳食吐瀉加山查時氣

吐瀉加滑石發熱加薄荷

○夏月吐瀉用益元散極効常表而出之

○附證

愚按小方脈科惟急慢驚風與夫痘疹等證最
為酷疾以其急凶反掌生死須臾故也次則五
疳吐瀉為証不一亦不可以易而治也已上四
證各立篇目辨論詳明外其餘一切小疾繁瑣
多端一一不能詳盡故各附於吐瀉之後以備
檢閱參用云爾

一腹脹

二腹痛

三夜啼

四痰熱

五解顛

六吃泥

七脫囊

八脫肛

九赤瘤

十臍汁出

十一頭瘡

十二尾骨痛

十三弄舌

十四龜背龜背

十五重舌木舌

十六鵝口口瘡 十七走馬牙疳 十八臍風撮口

○腹脹條

夫腹脹由脾胃虛氣攻作也亦有實者必悶亂喘滿可下之宜用紫霜丸白餅子不喘滿者虛也不可下若誤下致脾虛氣上附肺而行肺與脾子母皆虛肺主目胞腮之類脾主四肢母氣虛甚則目胞腮腫也色黃者屬脾也治用搗氣丸漸消之未愈漸加丸數不可以丁香木香桂皮荳蔻大溫散藥治之蓋脾虛氣未出腹脹而不喘者可以溫散藥

治使上下分消其氣則愈也若虛氣已出附肺而行則脾胃內弱每生虛氣入於四肢面目矣小兒易為虛實脾虛不受寒溫服寒則生冷證服溫則生熱證當識此不可也胃久虛熱多生疳病或引飲不止脾虛不能勝濕隨肺之氣上行於四肢若水狀濕氣浸浮於肺則大喘也此當服搗氣丸而愈

○搗氣丸治小兒虛脹如腹大者加蘿蔔子名搗氣子

胡椒兩一

蝎尾去毒兩半

一方二味各四十九箇

右為細末麵糊為丸如粟米大每服五七丸至

一二十九陳米飲下無時○一方有木香一錢
○治小兒腹虛脹先服搦氣丸不愈腹中有食積結
糞小便黃微喘脉伏而實時欲飲水能食者可
下之宜消積丸紫霜丸蓋脾初虛而後結有積
所治宜先補脾而後下之後又補脾則愈也不
可補肺恐生虛氣

○一方腹脹

蘿蔔子

紫蘊梗

乾葛

陳皮各等

甘草少許

右為切水煎服食少者加白木

○腹痛多是飲食所傷

白木半一錢

陳皮去

青皮去穢各七分

山楂去核

神麴炒

麥芽炒

砂仁各一錢

甘草炙半錢

有寒加藿香吳茱萸

有熱加黃芩

○腹痛口中氣溫面黃色目無精彩或白睛多及多
睡畏食或大便酸臭者當磨積宜消積丸甚者
用白餅子下之後和胃用白木散

○白餅子方見發
搗條下

○白木散方見醫
風門

○消積丸

丁香九粒

砂仁十二

巴豆二箇去皮心膜及去油

右為細末麩糊為丸如黍米大三歲已上三五丸已下一二丸溫水下

○心腹痛面皛白口中沃沫及清水出發痛有時當作虵虫治又曰凡積痛食痛寒痛虫痛大同小異惟虫痛者當口淡而沫自出小兒本怯故胃寒冷則虫動而心頭痛與癩略相似但目不斜而手不搯耳安虫散主之

○安虫散齊鑑用米糊為丸名安虫丸

胡粉炒黃

檳榔

川棟子去核

鶴虱各二兩

白礬二錢半火枯

右為細末每服一字大者半錢或壹錢溫米飲下臨痛時服

○集効九治虫痛

木香

鶴虱炒

檳榔

訶子煨去核

蕪荑

附子去皮

乾姜各二兩

大黃兩

烏梅去核二錢半

右為細末煉蜜九陳皮湯下或醋湯下一方加

黃芩黃連

○一方治虫用鷄子炒白蠟塵酒糊丸服一寸云治虫
○一方治虵虫作痛用二陳湯加苦棟根煎服或只以苦棟根向東南生不出土者刮去麤皮取白

皮細切濃煎汁一盞徐徐飲之不可飲多先以糖蜜或炒肉食之引涎頭向上然後服之看兒大小斟酌與之

○小兒吃粽腹痛用白芍藥加黃連末合研湯調服之即愈

○一方治小兒腹痛

甘草

乾姜

伏龍肝

人參

茯苓

百草霜

白朮

右為末粥丸梧桐子大每服三五十九陳皮湯下

○小兒夜啼作心經有熱有虛治

人參

黃連

薑汁

甘草

竹葉

右為細切分作二貼每貼如生姜一片水煎服

一本無人參

○錢氏曰小兒夜啼者脾藏冷而痛也當以溫中之

藥宜益黃散及以法穰之花火膏之類

脾寒未知名熱是主

○花火膏

燈花三顆以乳汁調抹兒口或抹母乳上令兒

吮之

○治驚啼邪熱乘心也安神丸主之

○小兒風痰壅盛用

南星

以白礬湯泡晒乾

白附子

右二件共為末麩糊為丸如芡實大每服一九
姜蜜薄荷湯化下

○小兒痰執骨蒸用

二陳湯兩半 加升麻二錢 葛根 白芍藥各一錢半

人參一錢 五味子三十粒

右細切分三貼加姜棗水煎服

○又方治前証用

胡黃連 檳榔各一錢 陳皮 雷丸各一錢半

神麩 半夏麩 史君子 白花蓼各二錢

右為細末麩糊為丸如黍米大每服三五十九
白湯下

○小兒解顛頭縫不 因母氣虛與熱多也錢氏曰生

下而顛不合腎氣未成也雖長必少笑更有目
白睛多面皯白色瘦者多愁少喜也丹溪用四
君子湯合四物湯有熱加黃連酒炒煎服更以
帛緊束及以白斂末付之

○小兒吃泥胃氣熱也用軟石膏黃芩陳皮茯苓白

朮煎服○小兒脫囊陰囊腫大墜下而不收木

通甘草黃連當歸黃芩煎服囊爛者以野紫蘓
葉面青背紅者是為末香油調付皮脫兩丸露者外以

青荷葉包之付藥後自生皮

○脫肛肛門大腸下也用東壁土泡湯先薰後洗

○又方治前證用五倍子為細末付而頻托入之

○又方治前證用驚頭燒存性香油調付一云以此物燒相薰

之良又自托

○小兒赤瘤俗名赤也此蓋熱毒氣客於腠理搏於血氣發於皮外赤如腫也用

生地黃 木通 刺芥一本有芍藥批仁

若寒帶表之藥外以芒硝泡湯洗之又以芭蕉油塗之錢氏用白玉散付之皆効

○白玉散

白堊即白善土也五錢 寒水石一兩

右為細末米醋或汲水調

○小兒臍中汁出併痛用白礬火煨枯乾付或用黃栢末付之

○癩頭用通聖散酒拌除大黃別用酒炒共為末再以酒拌焙乾每服一錢水煎服外以白炭燒紅淬入水中乘熱洗之更以胡多子伏龍肝懸龍尾黃連白礬為末油調付之

○又方治癩頭以松樹厚皮燒存性二兩黃丹火飛一兩白礬火枯黃連大黃各五錢白膠香火飛傾石上一兩輕粉四盞共為末熱香油調付

○丹溪治一小兒二歲滿頭生瘡一日瘡忽自平遂患痰喘知其為胎毒也詢其母孕時多食辛熱

物遂以人參連翹黃連甘草陳皮川芎芍藥木
通濃煎入竹瀝與之數日而安

○尾骨痛屬陰虛有痰

陰虛用四物湯加炒黃栢酒知母小用桂為引
或以前胡木香為引如痛不止加乳香沒藥○
痰用二陳湯加知母黃栢瀉瀉必用前胡木香
為引蓋陰虛故痰盛也如痛不止亦加乳香沒
藥○二法必先以玉燭散或通經散痰小胃丹
大下後用之或神祐九十棗湯皆可與治帶同
○小兒弄舌因脾藏有微熱令舌絡微脹時時虛舌
舐之勿用冷藥及下之少與瀉黃散徐徐服之

有欲飲水者非熱也脾胃中津液少也不可下
若大病後弄舌者凶

○瀉黃散

藿香葉七分

梔子一分

石膏半

甘草七分

防風四分

右細切作一服用蜜酒炒香熟以水一盞煎至
半盞去粗時時與之

○龜胃乃肺熱脹滿攻於胃膈即成龜胃又乳母多
食五辛熱物亦成此證宜瀉白散加黃芩

○瀉白散

桑白皮蜜水拌炒

黃芩一分

地骨皮一分

甘草一分

加黃芩一

右作一服水煎

○龜背兒生下客風入脊逐於骨髓即成龜背治之以龜尿點骨節即平○取龜尿法用蓮葉置龜於上尿自出

○重舌木舌乃小兒舌下生舌也

用三稜針於舌下紫脉刺之出惡血即愈

○又方用竹瀝調滿黃末付舌上神効

○又方治小兒木舌塞口欲滿者用紫雪二錢竹瀝半合細研和均頻付口即愈

○治小兒口瘡用塩白梅燒存性紅棗連枝燒存性鉛丹飛

人中白飛

龍腦許

共為細末服之神効

○治小兒鵝口瘡因白屑滿舌及兩腮故名鵝口用

髮纏指頭蘸井花水拭口令淨又用濃煮粟米汁以綿纏筋頭拭之更以煨過黃丹摻之即愈

○又方治鵝口瘡不能食乳用地鷄搗水塗瘡即愈

地雞即匾虫也人家磚石下多有之

○治小兒口瘡瀉心湯用黃連為細末蜜水調服

○治小兒口瘡用黃栢細辛各等分為細末付之

○治小兒頰上生瘡痛痒難忍用白楊木枝燒於刀上出瀝付之及治鵝口瘡神効

○治小兒走馬牙疳方其効如神

白礬枯

黃丹飛

京棗連枝燒存性

共為末付之

○又方治牙疳用白礬置於五倍子內煨過為末付之

○治小兒臍風撮口因臍斷傷風或尿在胞中遂成臍風發熱面赤啼聲不出名曰撮口風

赤脚金頭蜈蚣條一

瞿麥錢半

蝎梢四箇

殭蠶七箇

右末鵝毛管吹些少入鼻中如噴嚏叫聲可治後用薄荷汁調與服之

痘疹

六

論

內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火夫小兒痘疹之證最為酷疾不日之間死生反掌蓋因胎毒藏於命門遇歲火太過熱毒流行之年則痘毒因之而發作矣一發則出於心肝脾肺四藏而腎無留邪者為吉若初發便作腰痛見點則紫黑者多死蓋毒氣留於腎間而不發越故耳錢氏雖有百祥丸大下之法然活者十無一二大抵痘瘡之法多歸重於脾肺二經蓋脾主肌肉而肺主皮毛故遍身為之斑爛也其為証也宜發越不宜鬱滯宜紅活凸綻不宜紫黑陷伏瘡出之後醫者當察色詳證以辨表裏虛實用藥其吐瀉不能食為裏虛不吐瀉能食為裏實灰白色陷頂多

汗為表虛紅活凸綻無汗為表實又諸痛為實諸痒為虛外快內痛為內實外虛外痛內快為內虛外實裏實而補則結癰毒表實而復用實表之藥則潰爛不結痂也如表虛者瘡易出而難靨表實者瘡難出而易收裏實則出快而輕裏虛則發遲而重表實裏虛則陷伏倒靨裏實表虛則發慢收遲治之之法三日已前未見紅點必用升麻湯參蘂飲之類以發其表務令微汗為度若未汗如表猶未解雖略見紅點隱約於肌肉間而升散開發之劑尚未可除凡見出遲發慢者根窠欠紅活者便當憂慮調攝切勿袖手待斃夫古人用藥寒熱迥別主意不同醫者再宜臆

度寒暄推詳運氣而治如陳文中之木香散異功散用丁附姜桂等峻熱之藥而與內經病機不合丹溪特發揮其誤亦有用得其當者屢獲捷効若劉河間張子和輩悉用芩連大黃等寒涼之劑丹溪亦曰酒炒芩連各解痘毒依法用之而獲安者亦不少也今之醫者往往不同依陳氏而行者多用熱藥宗劉張而治者多用涼劑是故不偏於熱則偏於寒此刻舟求劍之道也愚按內經有曰寒者熱之熱者寒之微者逆之甚者從之又曰逆者正治從者反治從少從多觀其事也陳氏用從治之法權也劉張用正治之法常也然皆不外乎參朮苓草芎歸芪芍藥等補

氣血藥為主治焉亦當看時令寒熱緩急施治固不可執一見也楊氏曰痘瘡發於肌肉陽明胃氣主之脾土一溫胃氣隨暢決無陷伏之患湯氏曰如庖人籠蒸之法但欲其鬆耳滄淵翁曰復折衷衆說著方立論適中用藥寒熱攻補斟酌時宜未嘗執一治也學者能遵守其法而行之庶無一偏之患矣

○丹溪治小兒痘瘡方法

凡三十條

夫小兒痘瘡大抵與傷寒相似發熱煩躁臉赤唇紅身痛頭疼乍寒乍熱噴嚏呵欠喘嗽痰涎始發之時有因傷風傷寒而得有時氣傳染而得有因傷食發熱嘔吐而得有因跌撲驚恐畜血而得或爲目竄驚

搐如風之證或口舌咽喉肚腹疼痛或煩躁狂悶昏睡或自汗或下利或發熱或不發熱證候多端卒未易辨必須以耳冷尻冷驗之蓋瘍疹屬陽腎藏無證其耳與尻俱屬腎故腎之所部獨冷又不若視其耳後有紅脉赤縷爲之真如此可以稽驗矣治療之法首尾俱不可妄下但溫涼之劑兼而濟之解毒和中安表而已虛者益之實者損之寒者溫之熱者清之是爲權度昔人有喻云如庖人籠蒸之法但欲其鬆耳蓋毒發於表如苟妄汗則榮衛益虛重令開泄轉增瘡爛由是風邪乘間變證者多矣毒根於裏如苟妄下則內氣益虛毒不能出而返入焉由是土不勝

水變黑歸腎身體振寒耳尻反熱眼合肚脹其瘡黑陷十無一生汗下二說古人深戒以此觀瘡疹證狀雖與傷寒相似而其治法實異傷寒從表入裏瘡疹從裏出表故也解肌之法葛根升麻紫蘊之類可也其或氣實煩躁熱熾大便秘結則與犀角地黃湯或人參敗毒散又或紫草飲多服亦能利之故雖云大便不通者少與大黃尤宜仔細斟酌不可妄用猛浪如小便赤澀者分利小便則熱氣有所滲而出凡熱不可驟遏但輕解之若無熱則瘡又不能發也

○凡痘疹春夏為順秋冬為逆

○凡痘疹分入清濁就形氣上取勇怯

○凡痘疹但覺身熱証似傷寒疑似未明便當先與惺惺散或參蘊飲熱甚者升麻葛根湯人參敗毒散若見紅點便忌葛根湯恐發得表虛也

○凡痘瘡初欲出時身發熱耳尻冷呵欠咳嗽面赤必是出痘之候便宜服升麻葛根湯加山查大力子其瘡出必稀少而易愈

○凡痘瘡初出時或未出時宜服後藥多者可少少者可無重者可令輕也方以絲瓜俗名近葉三天蘿寸連皮子燒存性細研砂糖拌乾吃入硃砂尤妙○又方以硃砂一味為細末看兒大小或半錢或一錢蜜水調服亦云多者可少少者可無

○凡痘瘡發熱之時更以惡實子為末蜜調貼顛門
上免眼障之患

○凡痘瘡初出之際須看胃前若稠密急宜服消毒
飲加山楂黃芩酒洗紫草減食者加入參

○凡痘瘡初出之時色白者便當大補氣血參朮芪
芎升麻乾葛甘草香薷香酒當歸白芍藥茹
大便泄加訶子肉豈菘

○凡痘瘡初起發時自汗不妨蓋濕熱薰蒸故也甚
者當以參芪等實表之藥以防其難靨也

○凡痘瘡初起發時煩躁譫語狂渴引飲若飲水則
後來靨不齊急以涼藥解其標如益元散之類

○凡痘瘡已出可少與化毒湯出不快者加味四聖
散紫草飲子紫草木香湯快斑散絲瓜湯之類

○凡痘瘡出稠密甚者人參敗毒散犀角地黄湯

○凡痘瘡疎則毒少密則毒甚宜以清涼之藥解之
酒炒芩連之類雖數服亦不妨庶無害眼之患

○凡痘瘡爐灰色白淨者作寒紫黑色者齊湧者煩
躁者作熱看黑屬血熱涼血為主白屬氣虛補
氣為主中黑陷而外白起得遲者則相兼而治

○凡痘瘡當分表裏虛實吐瀉少食為裏虛不吐瀉
能食為裏實裏實而補則結癰毒陷伏倒靨灰
白色者為表虛紅活凸綻者為表實表實而復

實其表則潰爛不結痂也表虛不起發者或用
燒人屎驗

○凡痘瘡須分氣虛血虛用補藥氣虛者人參白朮
加解毒藥血虛者四物湯加解毒藥酒炒芩連
各解毒蓋芩連為瘡家之要藥加以酒炒以制其峻寒之性獨存清涼解毒之能是故
痘瘡之症當用以殺其毒耳

○凡痘瘡雖分氣血虛實大抵多屬氣血不足然當
於不足中以別其優劣而以補氣血藥中分輕
重為用以平為期耳有挾外邪而實者少加防
風等藥

○大法活血調氣安表和中輕清消毒溫涼之劑兼
而治之此平治之法也溫如黃芪當歸木香輩
涼如前胡乾葛升麻輩佐之以川芎白芍藥枳
殼桔梗羌活木通紫草之屬則可以調適矣

○黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡出者酒炒黃芪
紫草人參等藥

○凡黑陷甚者亦用燒人屎別用無病小兒糞燒存
性蜜水調服一方用人猫猪犬四糞於臘月燒
灰名萬金散

○痒塌者於形色脉上分虛實實則脉有加氣壯虛
則脉無力氣怯痒以實表之劑加涼血藥實痒
如大便不通者以大黃等寒涼之藥少與之下

其結糞氣怯輕者用淡蜜水調滑石末以鵝翎
刷瘡上潤之

○瘡乾者宜退火止用輕清之劑荊芥薄荷升麻乾
葛之類

○瘡濕者肌表間有濕氣也宜瀉濕藥白芷防風之
類蓋風藥能勝濕也

○咽喉痛者如聖散鼠粘子湯

○喘滿氣壅者麻黃黃芩湯

○煩渴者甘草散烏梅湯

○下利嘔逆者木香理中湯

○顏色正者以前法平治則安將欲成就脚色淡者

宜助血藥用當歸川芎酒芍藥之類或少加紅
花以潤血色將成就之際脚色紫者屬熱用涼
藥解其毒升麻葛根湯炒芩連及連翹之類甚
者必用犀角蓋犀角大解痘毒

○將靨時金白色如豈殼者蓋因初起時飲水多其
靨不齊名曰倒靨不好宜服實表之藥及消息
大小便何如大便秘宜利大便小便秘宜利小
便如小便赤澁時大連翹湯甘露飲大便秘結
內煩外熱者小柴胡湯加枳殼最穩當或小服
四順清涼飲子

○夫瘡疹用藥固有權度大小二便不可不通其大

便看所下黃黑色其毒氣已盛不可多與熱劑
但小用化毒湯可也或不用亦可若大小二便
一有秘結則腸胃壅遏脉結氣滯毒氣無從發
泄目閉聲啞肌肉鰓黑不旋踵而變矣陷入者
加味四聖散更以胡荽酒薄付其身厚付其足
噴其床帳衣被併以厚綿衣蓋之若未起獨聖
散入木香煎服若其瘡已黑乃可用宣風散加
青皮錢氏云黑陷青紫者百祥丸下之不黑者
慎勿下余知其所下者瀉膀胱之邪也又云下
後身熱氣溫欲飲水者可治水焮不消或寒戰
者爲逆余知其脾強者土可以制水也百祥丸

恐太峻當以宣風散代之瀉後溫脾則用人參
茯苓白朮等分厚朴木香甘草各減半爲妙蓋
瘡發肌肉陽明主之脾土一溫胃氣隨暢獨不
可消勝已泄之腎水乎此錢氏不刊之秘旨也
○其壞瘡者一曰內虛泄瀉二曰外傷風寒三曰變

黑歸腎

○近時治痘瘡者悉宗陳文中木香散異功散殊不
知彼立方之時必運氣在寒水司天之令及值
嚴冬大寒爲因氣鬱遏痘瘡不得起發紅綻故
用辛熱之劑發之其宜也今人不分時令寒熱
一槩施治誤人多矣或有雖值溫熱之時山野

農家貪賤之人其或偶中一二不可以為常法也

○愚按陳氏木香散異功散二方乃素問從治之法又謂之熱因熱用者也蓋痘瘡熱毒怫鬱于內而不得起發故用了附木香桂心荳蔻等辛散劫鬱之劑一二服劫而開之使鄉之鬱于內者盡因藥氣而發越乎外故痘子陷伏灰白色者皆翕然紅活凸綻而內無遺邪矣切勿過劑如一二服後劫不起者亦不可多與多則反助其毒轉增黑爛咽閉聲沉而死近世儒醫悉引內經病機諸痛痒瘡瘍皆屬心火之語以正陳氏

之失此知常而不知權之論也故使後學狐疑不決當用而不敢用是以袖手待斃哀哉

○痘瘡初發時五藏形證

面及腮頰赤噴嚏肺屬呵欠頓悶肝屬時發驚悸

○痘瘡五藏形色二

肝藏發水疱色微青以液為淚故

肺藏發膿疱色多白以液為涕故

脾藏發疹或脾為裏如糖其形小如斑

心藏發斑其形小次於水疱

腎藏君下獨不受穢毒故無候但耳尻冷耳若痘瘡黑陷耳及尻反熱者為逆

○斑痘所發之源三

夫嬰兒之胚暉也必資胎養以長其形焉緣母失節慎縱欲恣食感其穢毒之氣藏之臍府近自孩提遠至童叟值寒暄不常之候瘡疹由是而發因其所受淺深而為稀稠焉其原實系於心一云相火之氣所為故入於肺則成膿胞俗名豌豆亦名麻荳以相火乘金故破肌也入于肝則成水疹俗名麩瘡入于脾則成癩疹入于心則成斑以火處于子母之分不傷皮手彰君之德也或云瘡發焮腫於外者屬少陽三焦火也謂之斑色小紅而行于皮膚中出者屬少陰

君火也謂之疹楊氏曰痘瘡發於肌肉陽明胃氣主之脾土一溫胃氣隨暢土可勝水決無陷伏之患

○辨內外因四

凡瘡欲出而未出因發搐者是外感風寒之邪而內發心熱也宜王氏惺惺散或升麻葛根湯木香參蘓飲凡瘡欲出未出而吐利者是中焦停寒或挾宿食也宜四君子湯加砂仁陳皮或和中散如挾宿食者用紫霜丸

○王氏惺惺散

白朮

桔梗去蘆

細辛

人參

茯苓

甘草

括萎根

各三分

右細切作一服入薄荷葉三片水一盞煎七分時時與之

○升麻葛根湯

葛根

升麻

芍藥

甘草

炙各一錢

右細切作一服水一盞煎七分溫服無時

○木香參蘘飲

人參

蘘葉

桔梗

乾葛

三分

陳皮

茯苓

各半錢

枳殼

炒三分半

木香

半夏

右細切作一服加生姜三片水一盞煎七分溫服

○四君子湯

人參

白朮

茯苓

各一錢

甘草

半錢

右細切水一盞煎六分食前溫服加縮砂陳皮名六君子湯

○和中散

厚朴

姜汁制一錢

白朮

半錢

乾姜

炮

甘草

炙各三錢

右細切作一服加生姜一庁水一盞煎六分熱服

○紫霜丸

杏仁

五枚去皮尖

赤石脂

另研一兩

巴豆

三十粒去膜油

代赭石

煨研碎

煨研碎

右各別研為末和均湯浸蒸餅為丸如黍米大

三歲以下兒二三九八歲以上十數九食前米飲或乳汁送下

○辨形氣病 五

如瘡已出而聲不變者形病也瘡未出而聲變者氣病也宜補肺散加生黃芪○瘡出而聲不出者形氣俱病也形病身溫者宜解毒防風湯大便閉者宜當歸丸○形氣俱病小兒稟賦素弱者宜豫服十奇散倍歸散少木香煎服

○補肺散

阿膠 一錢半 炒成珠 牛旁子 炒三分 馬兜鈴 半錢
甘草 二分 杏仁 三粒 去皮 糯米 一錢 炒

加生黃芪 錢半

右為末分二服水一小盞煎六分食後時時與之

○解毒防風湯

防風 六分 一錢 地骨皮 生黃芪
芍藥 荆芥穗 鼠粘子 炒各半錢

右細切作一服水煎或為細末溫水調服亦可

○當歸丸

當歸 兩半 黃連 一錢半 炒 大黃 二錢半 甘草 一兩 炙
右先以當歸熬成膏以下三味研為細末以膏和為丸如胡椒大三歲以下兒十九七八歲兒

二十九食前清米飲下漸加至以利為度

○十奇散即托裏十補散又名宜散出和劑方

黃芪

人參

當歸各二

厚朴制

桔梗

去蘆各

桂心三分

川芎

防風去蘆

甘草

白芷各一

右為細末每服一錢或二錢溫酒調下細切水煎亦可

○辨三陰三陽經候六

太陽病寒身熱小便赤澀出不快宜荊芥甘草防風湯少陽病乍寒乍熱出不快宜連翹防風湯

陽明病身熱目赤大便閉實瘡遍肌肉出不快宜升麻葛根湯加紫草

太陰病自利四肢逆冷宜附子理中湯木香散少陰痺瘡黑陷口舌燥宜四物湯加紫草紅花厥陰病舌卷卵縮時發厥逆宜異功散

三陰病法當救裏故宜以溫劑助之

○荊芥甘草防風湯

荊芥

薄荷

牛旁子

防風

甘草

炙各六分

右細切作一服水一盞煎六分食前溫服

○連翹防風湯

續命湯

續命湯

續命湯

連翹

防風

瞿麥

荊芥穗

木通

車前子

當歸

柴胡

赤芍藥

白滑石

蟬蛻

黃芩

紫草茸各三

甘草

右細切作一服水一盞煎七分隨時大小量數
輕重與之大小便自利者不宜用

○升麻葛根湯前方見條每服加粳米五十粒紫草半錢

煎

○又一方升麻湯治斑在面

升麻錢一

犀角

射干

黃芩酒浸
焙乾

人參

甘草各半

右細切作一服水一盞煎六分食前溫服

○理中湯

人參

甘草炙

白朮

乾姜炮各
八分

右細切作一服加炮附子三分甚者五分量兒
大小加減水煎食前稍熱服

○木香散

木香

大腹皮酒洗

人參

桂心

青皮

赤茯苓

前胡

訶子煨去
核

半夏姜

丁香

甘草各三
分

右細切作一服加生薑三片棗一枚水煎量大
小加減分數與之

○異功散

木香

當歸酒洗去蘆

挂心

白朮炒

茯苓

陳皮

厚朴制姜

人參

肉苁蓉煨裏

丁香

半夏湯泡七分附子炮各三分

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水煎服

○辨三陽証治七

凡痘疹春夏為順當陽之時也古人治法與傷寒同

足脛熱

兩腮紅

大便秘

小便澀

渴不止

上氣急

脉洪數

已上七證

不宜服熱藥

瘡疹一發便密如蠶種布或如糖粃者合清表宜連翹升麻湯或未出而先發搯是兼外感風

寒之邪宜茶湯下解毒丸及犀角地黄湯瘡出不快清便自調知其表當微發散升麻葛根湯若瘡青乾黑陷身不大熱大小便澀滯是熱蓄於內宜煎大黃湯下宜風散若表大熱者不可下黑陷甚者百祥丸○若瘡已發稠密微喘渴欲飲水宜微下之當歸丸及龐氏地黃膏外以黃栢膏塗面佳
值盛夏暑熱正熾適瘡大發煩渴大便實者宜玉露散及甘露飲子或昏冒不知人時作搐搦瘡倒靨黑陷者宜猪心龍腦膏

○連翹升麻湯連翹一分是也

○犀角地黄湯

犀角鎊 生地黃 牡丹皮 赤芍藥各等分
右細切水煎服

○解毒丸

寒水石研 石膏研各 青黛研
右以二石細研如粉入青黛和均湯浸蒸餅為丸如芡實大每服一九食後新汲水化下或細嚼姜水下亦可三歲兒服半九量歲數加減服之

○宜風散

檳榔二 陳皮 甘草各半 黑丑四兩取頭末一兩

右為末量兒大小以蜜湯調服

○百祥丸

紅牙大戟不拘多少陰乾漿水煮極軟去骨日中曝乾復納汁中煮汁盡燥乾為細末
右一味以湯浸蒸餅為丸如粟米大每服三十丸研赤芝麻湯下量兒大小加減丸數與之

○龐氏地黄膏

生地黃四兩 荳豉半 雄黃一錢 射香半錢
右以猪膏一升和均露一宿煎五六沸令三分去一絞去下雄黃射香攪均稍稍飲之毒從皮膚中出即愈

○黃栢膏

黃栢一

黃栢皮一兩去粗 藜蘆去一兩 甘草兩
右為細末以生芝蔴油調從耳前至眼眶並厚
塗之日三二次如用早能令瘡不至面縱有亦
稀少

○玉露散方見前

王海藏云非腎熱相火盛者不宜服此藥利此
方

○甘露飲子

生地黄 熟地黄並用酒洗 天門冬去心 麥門冬去心
枇杷葉炙去毛 枳殼炙 黃芩 石斛去蘆
山茵陳 甘草炙

右細切作一服水一盞煎六分食後溫服

○猪心龍腦膏

梅花腦子研一字

右取新宰猪心血一箇為丸如芡實大每服
一九或半九量兒大小與之紫蘘湯下或井花
水化下亦可

○辨三陰證治

凡瘡發於秋冬為
逆當發陰之時也

足脛冷	腹脹	糞青色	面皸白
嘔乳食	目睛青	脈沉微	已上七證
不宜服寒藥			

瘡瘡盛出四肢逆冷或自利係在太陰脾經宜

急溫之用異功散附子理中湯調中丸○痘瘡
平塌灰白色不澤此是正氣不足宜十補托裏
散倍黃芪加熟附子○或四肢厥逆時作搐搦
係在厥陰宜溫之異功散加防風青皮或和中
散去乾葛藿香加附子肉桂心

○調中丸

白朮

半兩 人參

半兩 甘草

炙 乾姜

炮 乾姜

炮 乾姜

右為細末煉蜜為丸如棗豈大每服多不過二
十九丸溫水食前送下

○辨形氣不足丸

肺主氣氣不足則致後三證

自汗聲不出 瘡頂陷塌 不綻肥

並宜十奇散

自汗倍黃芪倍

心主血血不足則致後三證

灰白色

根窠不紅

不光澤

並宜芎歸湯加芍藥紫草紅花良驗

○芎歸湯

川歸

川芎

右細切水煎服

○辨表裏虛實

表裏俱實其瘡難出而易靨
表裏俱虛其瘡易出而難靨

諸痛為實內快外痛為外實內虛

諸寒為痛凡瘡發身痛不為外寒所折則肉膜

或所折而肉體有熱宜木香參蘇飲輕者消毒飲

均氣

諸痺為虛凡血氣不足多痺此証所謂諸痺為

香官桂胃主肌肉尤宜四君子湯加芎歸木香

紫草煎服或患者不能忌口因食毒物兒作痺

者二物湯加解毒藥

○消毒飲

牛旁子三錢炒一名鼠粘 荆芥一錢 甘草半錢

防風去蘆半錢

右細切作一服水煎加生犀角尤妙

○葛根升麻加芍藥湯外麻若根湯倍芍藥是也

○活血散

白芍藥 右為細末每服一錢溫水調下止痛

用酒調尤驗王海藏云四肢出不快加防風一

方用赤芍藥

○勻氣散即濟生方八味服氣散加木香也

白朮 白茯苓 青皮 白芷

陳皮 烏藥 人參各半 甘草炙二分

木香一分

右細切作一服水一盞煎七分服或細末酒調

亦可

○二物湯

蟬蛻洗淨二甘草一右為末水煎時時服之

○百花膏

石蜜不拘多少略用湯和時時以

○平治諸方一以平為期萬不失一

石壁胡氏曰小兒難任非常之熱亦不可任非常之冷如熱藥太過輕則吐利腹脹重則陷伏倒靨是宜溫涼適中可也仁齋楊氏曰諸熱不可驟去宜輕解之蓋痘瘡無熱則不能起發史氏曰比之種痘值天時暄煖則易生

○凡值天時不正鄉隣痘瘡盛發宜服禁方不出方

三荳湯

油飲子

鳳龍膏

○凡初覺痘瘡欲發當先解利與傷寒相類疑似之間兼用解表胡氏云非微汗則表不解解表當於紅斑未見之時宜用

王氏惺惺散 錢氏惺惺散 張氏防風湯

升麻葛根湯 張氏四物解肌湯 參蘓飲

○三荳湯

赤荳 大黑荳 藁荳各一 甘草三

又以三荳淘淨用水八升煮荳熟為度逐日空心任意飲荳汁七日求不出

○油飲子

...

真麻油外 逐日飲盡求不出

已上三方出扁鵲 倉公方

○鳳龍膏

烏鷄卵一箇

地龍一條活者

右以雞卵開一小竅入地龍在內夾皮紙糊其竅飯鍋上蒸熟去地龍與兒食之每歲立春日食一枚終身不出痘瘡覺隣里有此證流行時食一二枚亦好

○錢氏惺惺散

方見前條與王氏同但一方有防風川芎減半

○解毒防風湯

方見前

○四物解肌湯

白芍藥

黃芩

升麻

葛根

各七分

右細切作一服水一盞煎六分溫服不拘時

○瘡出不快

○活血散加防風湯

○龐氏紅花湯

紅花子合

右以水半升煎百沸服之

○紫草湯治瘡出不快及大便自利

一名紫草木香湯

紫草

木香

茯苓

白朮

各一錢

甘草

半錢

右細切作一服入糯米百粒水一盞煎六分食

服前

○四聖散

紫草

木通各一

甘草

枳殼麩炒黃色各半錢

右細切作一服水一盞煎七分溫服不拘時

○樺皮飲子

樺木皮二 用水一升煮取半升時時細飲

○凡痘瘡出不快者有五証臨病審兒調之

一證天特嚴寒為寒所折不能起發宜散寒溫表冬

三月寒甚紅斑初見宜五積散正氣散參蘓飲

楊氏調解散陳氏木香散

○五積散

白芷 川芎各三 桔梗法去蘆一分 芍藥

茯苓 甘草炙 川歸 肉桂去粗皮

半夏各二分 陳皮白法 枳殼去麩麩炒 麻黃去根節各半錢

蒼朮米泔浸一錢 乾姜炮四分 厚朴姜制四分

右除肉桂枳殼二味別為麤末外一十三味細切慢火炒令轉色攤冷次入二味末令均作一服水一盞半入生姜三片煎至一盞去粗稍熱服

○正氣散

甘草炙三分 陳皮 藿香去梗 白朮各半錢

厚朴姜制各半錢 半夏姜制各半錢

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水煎服

○調解散

五積散

青皮

陳皮

枳殼炒

桔梗去蘆

人參

半夏炮七

川芎

木通

乾葛

各四分

甘草

紫蘘各二分

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水煎服

一方加紫草糯米

一證炎暑隆盛煩渴昏迷瘡出不快且辰砂五苓散

煎生地黃麥門冬調服身熱甚者小柴胡加生

地黃煩渴而便實者白虎加入參湯輕者人參

竹葉湯加生地黃煎服

○辰砂五苓散

五苓散加辰砂細研為末是也

○小柴胡湯○人參白虎湯○人參竹葉湯方並見

一証服涼藥損傷脾胃或胃虛吐利當溫中益氣宜

理中湯吐利甚者加附子或陳氏異功散木香

豈菟丸

○肉苳菟丸

木香

砂仁

白龍骨

訶子肉各半

赤石脂

枯白礬

各七

肉苳菟

半兩濕麩裏煨熟

右為細末麩糊為丸如黍米大每服三十九至

五十九煎異功散送下

一證或成血瘕一半尚是紅點此毒氣發越不透必

不能食大便如常者宜半溫裏半助養之劑用

四聖散加減及紫草木香湯絲瓜湯阮氏萬全

散湯氏安斑湯

○四聖散

紫草木香湯方並見前

○絲瓜湯

絲瓜不拘幾箇

右連皮子燒存性為末每服一抄時時用米湯

調服

此物發痘瘡最妙或以紫草甘草煎湯調服尤佳

○阮氏萬全散治痘瘡出不紅潤

防風

人參

蟬蛻各等分

右細切每服四錢水一盞入薄荷三葉煎六分

溫服熱而實者加升麻

○湯氏安斑湯

一證外實之人皮膚厚肉腠密毒氣難以發泄因出不快宜消毒飲透肌散如大便秘實於消毒飲內加大黃梔子仁煎服瘡出大稠宜犀角地黃湯張氏解毒防風湯血氣不足宜十奇散咽嗑不利宜如聖湯加薄荷枳殼口中氣熱咽痛口舌生瘡宜甘露飲子驚風搐搦宜抱龍丸煩渴宜獨參湯黃芪六一湯

○透肌散

紫草茸

綠升麻

粉甘草各一錢

右細切水煎服或與消毒飲同煎服尤妙

○如聖湯

桔梗二錢

甘草一錢

一方加牛旁子

麥門冬各一錢

右細切水煎時時服之

○抱龍丸見驚風門

○辨外證逆順十三

身體溫煖者順

寒涼者逆

能食大便秘者順

不能食大便利者逆

○辨外證輕重十四

輕者作三次出耳中無

大小不一根窠紅活

頭面稀少肥滿光澤

重者一齊並出瀉利而渴

如蠶種布身溫脹脹

灰白色頭溫足冷

○辨痘瘡初末形證十五

微者其邪在腑發為細疹狀如蚊蜈所螫點點赤色俗名麩瘡○甚者其邪在藏為痘瘡狀如豌豆根赤頭白穴出膿水俗名疱瘡二三日始見微微欲出如粟如黍或如葦莖或如水珠光澤明淨者佳四日大小不等根窠紅光澤者輕如稠密陷頂併瀉者重六日七日瘡形肥紅光澤者輕如身熱氣喘口乾腹脹足指冷者重八日九日長足紅滿瘡蠟色者輕如寒戰悶亂腹脹煩渴氣急咬牙者重之至也十日十一日瘡

當結靨痂欲落之時將愈十二三日當靨而不靨者為逆身稍熱利之以防其餘毒身不壯熱或腹脹或瀉渴用十二味異功散救之

○辨不藥而愈_{六十一}

痘脚稀疎

根窠紅綻

不瀉不渴

乳食不減

四肢溫和

身無大熱

已上六證並不須服藥惟宜善加調護須使房室溫盍屏諸穢氣忌見外人世犯房色及往來婦人月水併腋臭者皆不可近惟宜燒大黃倉朮以辟惡氣勿宜燒沉檀降真乳香腦射樟帳之內宜懸胡荽或以胡荽漬酒噴床帳併燒木

香為佳夫痘瘡之毒最怕穢惡之氣觸犯切不可信僧道看經解穢况無纖毫之力而返恐被其穢惡之氣觸犯亦不可恃其能解而不預防戒之戒之

○辨五不治證_{七十二}

痒塌寒戰咬牙渴不止

痘紫黑色喘喝不寧

灰白色陷頂腹脹

頭溫足冷悶亂飲水

氣促泄瀉渴

○辨疹有陰陽二證_{八十一}

赤疹屬陽遇清涼而消

白疹屬陰遇溫煖而

減

○傷寒時氣發斑附九

溫毒發斑宜玄參升麻湯重用荆防敗毒散

胃爛斑因陽明胃實失下或下之太早所致宜化斑

湯龐氏石膏湯○時氣斑宜石膏湯○湯毒斑

胃實之人誤服熱劑或加以風暑宜陽毒升麻

湯

○玄參升麻湯

玄參洗去苗

升麻

甘草各半

○荆防敗毒散

柴胡

甘草

人參

桔梗

川芎

茯苓

枳殼

前胡

羌活

獨活

荆芥穗

防風

各四分

右細切作一服水一盞煎七分溫服或加薄荷

五葉

○化斑湯即白虎湯

○龐氏石膏湯

香鼓合一

葱白五錢

石膏兩

梔子一錢

生薑兩

大青

升麻

芒硝各一錢半

右細切作一服水一升半煮取七合去粗下芒

硝放溫徐徐服之

○陽毒升麻湯

升麻

犀角鎊

射干

黃芩

人參

甘草各一

○辨瘡後餘毒
右細切作一服水一盞半煎至一盞食前溫服

一毒氣流於太陰脾經則癰發四肢手腕併膝
臏腫痛宜消毒飲重者十六味流氣飲加附子
或酒浸大黃煎服及必勝膏蜺子水等付之

○消毒飲方見

○十六味流氣飲

川芎

川歸

芍藥

防風

人參

木香

黃芪

桂心

桔梗

白芷

檳榔

厚朴

烏藥

甘草

紫蘊

枳殼各四分

右細切作一服水一盞煎七分服氣血虛而自
利者加熟附子大便實加大黃

○必勝膏

馬齒莧汁

猪膏脂

石蜜

右以三味共熬為膏塗腫處

○蜺子水

蜺子

不拘多少治者以水養五日旋
取此水洗手面漸生肉無癩痕

一毒氣留于太陰肺經則臍內併手腕腫流為赤
癰盡宜消毒飲如聖湯五福化毒丹雄黃解毒
丸利之氣血虛者十補湯加桔梗枳殼犀角煎

脹咽喉不利或腫痛宜薄荷如聖湯

○五福化毒丹 方見驚風門

每兩分作十二丸一歲兒一丸分作四服用薄荷水化下瘡餘毒上攻口齒涎血臭氣以生地黃自然汁化一丸用翎刷入口內

○如聖湯 方見前

○雄黃解毒丸

雄黃 研飛各一錢半 巴豆 去皮膜油四十粒

右為細末醋煮麩糊為丸如菘荳大每服二三丸熱茶清下量兒大小與之

一毒氣流入大腸則便膿血或下腸垢或大便秘

結耳犀角地黃湯身煩熱渴宜黃連解毒湯熱勢盛者小承氣湯下利者黃連解毒湯黃連阿

膠丸駐車丸

○黃連阿膠丸

黃連 三兩 阿膠 子炒成珠一兩 茯苓 去皮一兩

右以黃連茯苓同為細末水調阿膠末搜和為丸如梧桐子大每服二十九溫米飲送下

○駐車丸

阿膠 炒成珠 當歸 去蘆各十五兩 黃連 三十兩

乾姜 炮

右為末以阿膠膏和成餅丸如梧桐子大每服

二十九食前清米飲下日三服小兒九如麻子
大量兒大小加減

一痘瘡入眼且决明散蜜蒙花散撥雲散蛤粉散

○决明散

草决明

赤芍藥

天花粉

甘草

右各等分爲細末每服半錢匕食後茶清調下

○蜜蒙花散

蜜蒙花

青箱子

决明子

車前子

右各等分爲細末用羊肝一片破而爲三摻藥
入肝內令均却仍舊合爲一以酒水濕帛七重
包裹於糖灰中煨熟勿令焦焙乾研末入射香

少許每服二錢重食後米飲調下

○撥雲散

羌活

防風

柴胡

甘草

各等分

右爲細末每服二錢水一盞煎七分食後卧服
薄荷汁茶清或菊花苗煎湯調皆可忌藏益蘇
醬濕麩炙燂炊氣及一切發風動火之物

○蛤粉散

穀精草

海蛤粉各等

右爲細末每服二錢匕用獾猪肝二兩許以竹
刀批開摻藥在內捲了外以青箭箬包裹麻線
扎縛定用水一碗煮令熟入小口瓶內薰眼候

溫取食之日一服不過十服遂退

一熟毒流於三陽之後經則腮項結核腫痛宜荆
防敗毒散十補湯減桂服消毒飲倍加忍冬藤
煎服

○荆防敗毒散

十補托裏散

即十奇消毒飲方並見前

○祖傳經驗秘方凡痘後不問癰毒發於何經初起
紅腫時却用黑棗赤三豈以酸醋浸研漿時時
以鵝翎刷之隨手退去其効如神

一小兒痘後二十日不大便其糞燥作痛垂死曾
用大黃芒硝枳殼巴豆等藥及用蜜導法及服

香油一碗許俱不通愚令一婢以真麻油含口
內用小竹筒一箇納殼道中吹油入腸內須臾
即通真良法也

○古人極治痘瘡要法二十

王氏指迷云痘瘡亦特氣之一端一人受正傳
染其餘又云瘡疹有熱則易出一出遍及於肌
膚○張氏喚曰痘子氣均則出快蓋血隨氣行
氣逆則血滯○王氏疹者脾所生脾虛肝旺乘
之木能勝土熱動心神而生驚○錢氏曰肝風
心火二藏交爭而致搐又曰痘症未形而先搐
大忌涼心蓋瘡屬心心主血心寒則血不能行

痘欲出而不可得也切須慎之大抵治驚惟平
肝利小便均氣最妙仁齋楊氏曰大熱當利小
便宜五苓散導赤散小熱當解毒宜消毒飲四
聖散

○陷伏倒靨黑陷

一證變壞歸腎黑陷宜錢氏百祥九宣風散
一證外感風寒所致冬時宜五積散減麻黃加桂
心紫草春時不換金正氣散加川芎白芷防風
或風邪所襲宜消風散加紫草兼服
一證乳食所傷內氣壅遏宜楊氏調解散或四君
子湯加縮砂木香川芎紫草大便自利且附子

理中湯

一證或因父世不謹犯房事月水及乳母腋氣穢
濁諸忤所致宜阮氏辟穢丹焚而薰之仍以胡
荈酒嚙幃帳及懸胡荈於床帳中甚者以胡荈
湯化下蘓合香丸兼塗薰亦妙聖制再懸散神
一證毒氣入裏黑陷宜猪尾膏神驗

○不換金正氣散

厚朴姜制

藿香去

甘草

半夏

湯泡七次
去皮臍

蒼朮

米泔浸

陳皮

各半

右細切作一服加生姜三片棗二枚水一盞煎
七分服

○辟穢丹

蒼朮

北細辛

甘松

川芎

乳香研

降真香

右為細末烈火焚之

今世俗例以黃茶燒烟

薰之最好

○再甦散治痘瘡觸犯毒氣入內

明白礬

地龍去土炒
各一兩

右為末每服半錢用猪尾血一椀斗許用新汲水少許調下不拘時

○猪尾膏即前龍腦膏錢氏用小獾猪尾取血研用之

凡痘瘡膿汁不乾蓋瘡出太盛表虛難靨以致膿水粘衣著席濕痛不能轉側宜白龍散敗草散等付之

○白龍散

黃牛糞日乾火煨成灰取心中白者為末帛裏撲之

○敗草散

用蓋屋及墻背上遠年腐草洗淨焙乾為細末帛裏撲之及鋪床席上佳

○馮氏天花散治痘後失音

天花粉

桔梗

白茯苓去

訶子肉

石菖蒲

甘草各等分

右為末用水調半匙在碗內外以小竹七莖黃荆七條縛作一束點火在碗內煎臨卧服

凡孕婦身發痘瘡宜馮氏單胎散若胎動不安宜獨聖散安胎飲身熱甚且木香參稱飲或瘡稠密宜十奇散倍芍藥當歸減桂加香附烏藥如胎已五月則半夏桂心之屬俱不必禁

○單胎散

赤茯苓

白朮

川歸

白芍藥

赤芍藥

北柴胡

乾葛

人參

桔梗

條芩

防風

陳皮

荆芥

枳殼

紫草

阿膠

糯米

白芷

甘草

川芎

縮砂

大熟加爵金各三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞乾柿蒂七箇野苧根七寸甜瓜蒂一箇用銀器煎以荷葉解定熬至八分去粗仍用荷葉蓋覆空心濕服

○獨聖散用連殼縮砂慢火炒去殼為末每服半匙
○煎酒調下胎動則服服後覺胎熱則安矣

○安胎散

大腹皮

酒洗極淨焙乾
再用烏薑汁洗

人參

陳皮

白朮

白芍藥

川歸

川芎

香附米童子砂仁

紫蘓

茯苓

甘草各半

右細切作一服水一盞半燈草七莖糯米一撮煎一盞食前溫服

滄洲翁先生跋云凡乳嬰之與童非當歧為兩途以治之乳嬰當兼治乳母俾其氣血清和飲食有節投以調氣通榮之劑以釀其乳使兒飲之則其瘡心肥滿光澤無陷伏之憂童非之子必當備切其脉審其表裏虛實以汗下之苟不實不虛則但保其冲和使脾氣流暢則肺金藉母之助易如灌膿速於成痂無倒塌之患或至壯盛而膚腠厚密尤須預為汗解或大便結與洩泄者尤宜下之利之庶無患也餘證則當於藥內倍其分兩百無一失學者宜致思焉

醫學正傳卷之八終

醫學正傳後再叙

天有六氣曰陰曰陽曰風曰雨曰晦曰明淫則爲菑
有寒疾熱疾末疾腹疾感疾心疾而人之氣血流注
有循有經有至有抵有會有過有行有達而又有所
謂三百六十有五之絲絡六百四十有七之隧穴醫
非淺於其學者之所能盡其秘也今天下之言醫者
衆矣安得有如至靈默契陰陽之大小明決六脉二
經之周流變化者而與之論素問諸經方藥之宜攻
補之功虛實之變鍼灸之法耶蓋嘗思其人不可作
矣以醫名多以名醫名少也醫學正傳侍御東崖虞
公叔祖恒德老人所著也觀其書可以知其人矣東

崖即其書校之侍御枳田蔣公序之予喜其書而閱
之以爲得其人矣閱之且久以爲非恒德老人所著
也老人之志欲自附於名家之後故其書集諸家之
成而會之一者也夫天下之事皆可以試其能而醫
則有不可以自用其明者自義農至今不知歷幾千
百代及幾人之手而其書始大行皆相祖述傳習增
減異同殆未有自售其能者故曰醫不三世不服其
藥是書也使其盡出於恒德老人之手則發揮出於
胃憶湯液持以已見予未敢以爲盡然也惟其參之
諸家之秘而斷之以聰明之真則所以握氣機佐陰
陽疏脉絡者皆有所受而立言垂後可與諸經並傳

無疑也醫學正傳子固喜其學之博而擇之精也學
 之博則有所據擇之精則有所見有所據則方藥必
 求其當有所見則攻療必速其功天下之病率不能
 出其範圍之內而世之習其書傳其方者未有不收
 十全之功矣則是書可以傳矣東崖屬予言予為之
 書其槩以質于今之醫之名者
 嘉靖辛卯仲春之吉莆田史梧識

嘉靖癸丑夏月日重校改誤

京都市右京區大森安井車道町十七番地

佐

山

醫

重

院

醫學博士

佐

山

重

致

電話五五〇三二二八番

新編醫學正傳

八卷八冊

明虞博編集

虞博撰校正

慶長二年刊

整八寸六分

橫六寸四分

匡郭四圍双也

有界

印面整八寸七分

横八寸七分

頁十二行

註文双行 行二十字

欄外上層ニ標目文字アリ 漢文

版心ニ留

正傳一四行及卷數清數

注字方凡三令五重

刻得粗疎 注字

版初期、製カテ思ハシ

卷一、首ニ正徳乙亥正月之望虞博ノ序(二卷)

凡例(二十半)卷二目錄(二卷)

卷八、尾ニ嘉靖辛卯仲春之吉史梧ノ序

正傳後叙(二卷半)アリ其後ニ嘉靖癸丑夏月日重校改誤トアリ

卷八、末ニ九一理版改誤

扶桑國平安城西洞院居住甫庵 道喜 尚以

愚意刊一々之板而印茲書故又刊三韓之

西本宗其正也雖然中字可多并差若有

博覽之妙手斷泥者幸甚

京都市右京區大森安井車道町十七番地

院 重 山 佐

醫學博士 佐山重致

電話 壬生 三二二八番

新編醫學正傳

八卷八冊

明虞博編集

虞博撰校正

慶長二年刊

堅八寸六分

幅六寸四分

匡郭四圍双也

右界 印面堅八寸七分

横凡五寸七分

頁十三行

註文双行 行二十字

欄外上層ニ標目文字アリ

漢文

版心ニ醫

台正傳、四卷及卷數清敷

注字方凡三ヶ分五厘

刻梓粗疎 注字

版初期、製シテ思ハシ

卷一之首ニ正徳乙亥正月之望虞博ノ序(二卷)

凡例(二十半) 卷二目錄(二卷)アリ

卷八ノ尾ニ嘉靖辛卯仲春之吉史栢一醫

正傳後叙(一巻半)アリ

其後ニ嘉靖癸丑夏月日重校改設トアリ

卷八ノ末ニ九ノ理版跋語アリ

扶桑國平安城西洞院居住甫庵 道喜 尚以

愚意刊一々之板而印茲書故支那三韓之

西本宗其正也 雖世中文字可多并差若有

博覽之妙手 斷泥者幸甚

京都市右京區大森安井車道町十七番地

佐

山

醫

院

醫學博士 佐

山

重

致

電話 壬生 三二二八番

此書右取諸目如十瀬直喜、刊行ニ於テ同人、文祥五年、我國最
初、活字本、標題徐悦、補蒙、オウ、オウ、人ナリ、本書、其、オ、活版事業
ニ係リ、其、オ、刊行後、翌年、過オ、ガ、シ、ト、モ、活字及版式、於テ、一段、進歩、ヲ、示、ス、
要、ス、シ、活字版、ヲ、再、向、ニ、テ、創、始、シ、人、ノ、手、成、シ、ヘ、リ、シ、テ、本、書、持、殊、ノ、雅、致
ヲ、有、ス、ニ、似、タ、リ

大阪府立図書館蔵

和田吉吉著

古活字本研究資料

昭和九年

二七七一六八頁

本書、オ、一、卷、ヲ、缺、キ、八、卷、尾、ノ、跋、ヲ、缺、テ、リ

無疑也醫學正傳子固喜其學之博而擇之精也學
之博則有所據擇之精則有所見有所據則方藥必
求其當有所見則攻療必速其功天下之病率不能
出其範圍之內而世之習其書傳其方者未有不收
十全之功矣則是書可以傳矣東崖屬予言予爲之
書其槩以質于今之醫之名者

嘉靖辛卯仲春之吉莆田史梧識

嘉靖癸丑夏月日重校改誤

6278
53

