

香林軒禁方録卷之四

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

視力之弱病論

晴疋利亞

ヨラニステヘニクニ

著

和蘭

ライスセニ

沃

牙一偏

論視力之弱病症候及原因

ハクソ此病ハ外ヨリ見テ以テ明カニ診定スルコトナリ難ク何者信膜ノ
脈絡盈脹スルコトナクモ餘ハルキルキリ明カニ變化ヲ失ワス事モ
損傷ノミルヘキナケレハナリ

惟此病ノ明徴トスヘキ証候ハ眼目ノ知覚太リ敏捷ニメ支氣及
ヒ外来ノ刺戟ニ堪ヒテラユサル者ナリ則チ其証支氣赫灼ナル

者ニ向ハ患者勿ニ疼痛ヲ奈ニ稍重痛ナル者ニ至テハ太陽ノ光
像ヲシテ眼ニ入ハ疼痛スルヲ殊ニナリシク其疼痛眼底ノ一部ニ至
テ牽張壓迫困重ヲ童子外ヨリ之ヲ推セハ殊ニスラニ見フ故ニ
光氣明亮ノ病室アル中ハ其疼痛益増進ス

患者之カガニ光像ノ正直ニ来ルヲサリトノ知ラス自ラ眉ヲヒソメ
テ下ニ推シ或ハ手ヲ前頭ニオキ平岡ノ状ヲ以テ物ヲ眺視ス
〔註〕スタイチエ用ノ人其地ニ水山雪野等ニ有テ其反光ノ劇
甚ナルカ故ニ正視スルヲ克クス皆視視ノ癖アリ其形状恰ニトコ
ノ患者ト一歟ナリ

患者流書ロトシ若シハ微々ノ者或ハ光輝アル者ヲミニトスル中
ハ視瞻速ニ能キトシテ錯乱ニ次テ疼痛牽張ヲ奈ニ以テ速カニ
其ノヲ瘥セサルヲラエサルニ至ル
虹彩ノ運動モ又尤敏銳ニシテ光像洞膜ニ徹スル中ハ瞳孔直ニ縮
小スルヲ太リシ之ニ又此病ノ明徴ナリ
光氣ノ眼ヲ刺戟スルヲ已甚ナル中ハ偏涙液分泌損スルヲアリ然
レニ是ハ太リ稀ナルヲニメテクハ涙液分泌増進スル者ナリ
向ソ此病ヲ誘発セル所ノ遠回ハ假令必シモ常ニ然ルニ非ストモ
大卒皆全身ノ衰弱ナリ
是故ニ此病ニカハル所ノ人ハ病后及ヒ筋力乏シク弛緩セル人ニシテ
又男女比ニシテ病ハト雖尤婦人ニ多シ

凡ク眼焮瀉ハ急性ノモノ慢性ノモノニ拘ラス治法必ス僅微ノ刺戟
ニ在フト虽忽々病ヲ痊シ易キノ癖ヲ疾ス其他久シク眼ヲ劇シキ
光氣若クハ反支ニ暴触シ或ハ流書シ或ハ微激ノ物品ヲ見テ以テ
眼カラ賈純スルハ皆此病ノ因トナル
以病ノ近因ハ余カ按ニ曰テ之ヲコレニ是眼目一部ノ衰弱ニ非ズメ
反テ洞膜ノ感觸非常ニ増進スルナリ而モ其感觸増進ハ洞膜若クハ
肺絡膜ノ破瀉ニ由テ其脈絡ノ盈脹スルヨリ起ス身ノ洞膜ノ中何
レカ一膜ニ破瀉アルハ他ノ一膜モ亦必ス受ル一トヲ得サルカ故ニ以
病ニ於テハ大抵洞膜共ニ破瀉スル者ナリ

夫レ寒冷ナル氣ハ運康ナル肺臟ニ吸入スルハヨク其運動ヲ促進

スト虽モ洞膜破瀉スル者若クハ然ラスモ牽張シテ感觸ニ易
キ中是ニ抵觸スルハ忽々因重ニ侵蝕スルカ如キ感觸即視力
弱クテ起スル是其光線ノ刺戟血液ヲシテ既ニ非常ニ盈脹セル
脈絡ニ瀉入セシムルハ
日常ノ疾験ニ由テ之ヲコレニハソノ身体一部刺戟ヲ受ルトアルハ
ハ諸液コトニ運動輻湊スル者ニ
又コタルレニハノ液ニ云ク凡ソ諸液度ヲ差テ一部ニ盈脹スルハ
手タクハ其侷積ノ虛弱ナル者ナリ
ニ夕生活侷ノ纖維牽張スルトアレハ愧テ物ニ如何ノ症ヲカ起
セシニコレ疾疢ニアラスヤ而メ疾疢ノ強弱ハ必ラス其質纖維

知所

ノ剛柔ト其部感觸ノ銳鈍ニ関心スル者ナリ字者此三件ニヨツ
テ以テ工夫セハ明ニヨリ此病ノ本性ヲ察スルニ足ニ視力乏弱
病ノ真性ニ網膜ノ後性燭性燭傷病ニ關係スル者ナルトハ亦内
部頭水病ノ初発ニ於テ之明ヲ忌避スルノ症ヲ以テモ確知スヘ
シソレ此病即頭水病始メ脳内ノ燭傷ヨリ発スル者ニメ其燭傷視神
經ヨリ網膜ニ施及スト虽其始ニ於テハ此ニモ眼ノ燭傷ノ候ヲ見ツサ
ス結膜ノ脈絡盈脹セス実ニ此漏ノ初ニ萃ル諸症ト分明ニ其致
ヲ一ニス

白内匠ヲ曳出スル件毀傷スル所アルニ由テ深クアル処ノ膜ニ後性
ノ燭傷ヲ起シ由テ以テ屢々発スル所ノ視態妨碍ノ症ヲ以テモ

此病ノ本症ヲ明徴スルコトヲウヘシ

〔注〕サウニデルム即サウニデルム曾テ発明セル所ノ白内匠方術ハ古来曾
テアル所ノ者ト大ニ異ニメヨリ如女危篤ノ症ヲ受ルニ適吉
ス自ラ屢ニテ試ルニモ後ルコトナシステヘシソニ即味書ノ著者カ白
内匠著書ニサウニデルムノ尺牘ヲ載タリ其言ニ云ク余カ
術ヲ施スヤ其始先ツ衰若ノ落劑ヲ用テ十分ニ瞳孔ヲ開カシ
メヘルリールズクテ止蓋ニ眼ヲ保持スル
所ニ置キテハナリ若シクハ自ニ指
ヲ以テ其眼ヲ保持シタルヲ運轉スルコト毎ラシメテ所向ニ
シテ行フニ而シテ針ヲ眼ニ入ルノ目的ハ大抵水晶叢水昆液
ノ前面ニ於テ截断ニアリ然レニ水晶液ハ其中央凸起セルカ

故ニ必ス女シク水晶液ヲ貫カサルコトヲエスト至心ヲ用テナルヲ
ケ針ヲ囊ニ近接ス是故ニ針ニ尤細クメ扁ク両开アル者ヲ
要ス実験ニ由テ之ヲコレニコレカレ^人及ヒコト^人エ^人ホカ用所
ノ針ノ如キハ水晶作^{海ト囊トヲ}ヲニテ動カスノコトメ利貫
スルコト毎ク之ヲ虹彩ニ遇迫セシメテヨク破衝ヲ登スルコト至
余カ用ル所ノ針ハ鏡ニメ至剛ノ水晶作ニヨク利貫スルカ故ニ未
ク嘗テ如女ノ害アルヲニス而メ水晶液^{実作ノ方術ニ至テハ}取
ノ宜キニ随テ斟酌スルニハ唯其^實負ヲ載破ルノコトメ拵下^介
コトヲ要セサルコトアリ

針ニ宜クモ様^鞆帯後一分許ノ処ヨリ剛膜ヲ貫テ水晶液^作上

部尤柔軟ナル処ニ達セシム水晶囊ヲ截分フヘキ症ニアフテハ其
囊ヲ截分フ前若クハ後ニ^医ノ但懺自ラ^迄解スルコトアリ^而ニ
其囊ニ何レノ病ヲ拵テモ必ス截分ラシムハアラス向テ水晶液^囊ニ
負ニ拵レル者ニ就テハ余ハ^心意ヲ勞セス時トメ^心其自ラ^出
ルニ任セテ其液ノ^分ヲ前室^{即角膜虹彩}ニ流^注セシムル
アリ然レモ拵下スルコトハ虹彩ヲ壓迫スルノ^恐レアルカ^ヲ取
テ之ヲセス

生レテカラ病^所ノ白内^医ハ通例水晶液^囊ニ在テ^{即囊}水晶液^液
ノ^実作ハ胎内ニアル^ト既ニ早ク自ラ^脈絡ヨリ^吸收シトラル
者ナリ余カ^此症ニ^施ス所ノ^方術ハ^前ニ^採ル者ト^異ナルコト

ナク加之ニ具規則大抵水晶作匠ニ於ルカ如ク具目的ハ唯具
 中央ニテクノ孔ヲ開テ光線ノ射入ニ妨碍ナカラシム哉或ハ具
 匠水様液中ニ溶解消去スヘキヲ預メ察スルハ此ヲ微塵ニ
 破碎スルニアリ故ニ此ヲ術ハ以前ノ者ニ比スルハ針ノ運轉作
 用ニテ容易ナリルノ尺牘以上ヲウシテ
 ステヘソニ其法ニ從テテ術ヲ施スト至精盡フ処アリ即術后
 ニ刺戟物ヲ以テ匠ヲ吸收セシムト針ヲ短フメ佃カラシムトコ
 レニ此針ハ近傍ノ部分ニ毀傷疼痛如衝ヲ起スト益ニニメ具フ
 具下ノ凹キカ為ニ針孔間隙ナクメヨク水様液及硝子液ノ滲ミ
 ラ停リ然レトモ此針モ一ツ至剛ナル表匠ヲ截分フニハキメ十分

ナラサルカ為ニ彼自ラ又一種ノ佃刀ヲ發明ス其刀ノ長サ一寸許リ
 ニメ以端曲レリ其曲レル所四分許リ兩刀ヲ汝ケ具部ノ幅大抵五
 重許ニメ末ニ至ルニ從テ漸ク太トカラシムベシソールスリシラレ
 前ノ製モヌリヌク女ノ具眼收ニ抵ル処ヲ大ニ一部ノ堅
 直ラナストヌクニ眼球ノ保持益堅固ナラシム
 右件ノ諸命ニ由テ之ヲミルニ視力至弱ノ原目ハ眼内ニ於ルニ膜ノ如
 衝子視神經ニ依テ眼ノ網膜ニ波及スル所ノ脳間如衝子或ハ白内
 匠ノ施術后ニ発スル眼内ノ如衝ニメ皆其症ノ外部ニ見レサル者
 之至劇ノ支障モス眼ニテ同種ノ症ヲ発スル者カ又然ラサルカ
 下条ノ解説ニ由テ之ヲシヨ

過度ノ支線実ニ洞膜脈絡ヲ盈脹セシメテ以テ疾疢破衝失明
ヲ起ス^{未詳蓋ニ}ハアルヒス^{兩人名ニ}就テ明ニ徴スルニ足ル

其眼^{即ア眼}ノ感觸尤敏銳ナル^ハ皆人ノ知ル所^ノメ^ニ其眼中魚
海ノナキカ故ニ支線ヲ吸收スル^ハナク直ニ剥露セル洞膜ニ暴觸セ
ム^ル由ル^ハ疑ナシ

コカ為ニ支線非常ノ射入只ニ控疔ヲ起ス^ノミナラス血線ヲ盈脹セ
メテ以テ眼底^ニ澱^江色若シ^ハ鉄色ヲ見ワス^而メ^其射^ハ長ク保
続ス^ルハ其血^は倍^ニ血液ノ之積^ハ盈脹ス^ルハ愈増進^メ遂^ニ急性盲
ヲ発ス^ルニ至ル

〔注〕フリユメニバツク^人ノ書中ニ曰クアルビノスノ眼具虹彩

及瞳孔内ニ江色ヲ見シテ其感觸^ハ太^リ敏銳ナル者ハ蓋シ
魚^和液ノ全ク^ハ缺^{ニス}ルニヨル者ナリ
其書中又^ハボ^ニリ^エウス^人ノ説ヲ引テ曰^ク一^盲目^自其^眼ノ
内^膜魚^和液^缺ニ^シ由^テ感^觸劇^シク^支輝^ノ刺^戟ニ^テヘ^ス
テ^發セル^者ヲ^コタ^リ

夫レ破地ヲキ南方ノ国及^ニ干^年汗^リモ^白雪^ニ掩^ハル^ハハ^方ノ^地
ニ於^テニ^盲者^ノ殊^ニチ^キハ^亦日^之ノ^反照^ニヨ^ルニア^スス^ヤ
〔注〕之輝強キ物品ヲ^コル^ハノ^已ム^ラエ^{サル}ヨ^リ眼^ニ至^大ノ
害^ヲウ^ケル^ハ尤^明ナル^例ト^スヘ^キ者^ハ車^田ノ^盲人^ニト^ムソ^ニ
人^曰ク^地ノ^人ハ^日之^ノ高^ク眼^ニ照^スラ^サケ^ニカ^ガニ^下視^シテ

却テ更ニ蒸氣ノ蒸弁ト劇ニキ反照トニ具眼ヲ損傷セラ
ルニ者ナリ

赤帶以下ニ住ル処ノ至細至人ハ昼間瞳子ヲ眼内ニカリコテ
唯白膜ノミヲ見スカ故ニ破上ニ映スル日支ノ反照ニ具眼ヲ害セ
ラレス白雪ヲキル地ニ於テハ盲目ヲ以テ取テ非常ノ病ト
セス又「正キセニホニ」人ノ語ニ云ク「セイリユス」ナル人軍ヲ曾
テ他國ニ送ルハ数日間深雪ノ山中ヲ行カシメ軍卒皆白雪
ノ光輝ニ具眼ヲ侵サレ或ハ全ク明ヲ失セル者アリト最故ニ意ヲ
用ル旅客ハ劇ニキ反照ノ害ヲ防ニカニ常ニ祖備ヲ眼上ニ掩

〇第二編

論視力之弱病年他病之區別

ヒツボカラテス人カ所謂ルアムブレイオスモスアニターウス人カ

滑所アムブレイテスアーナウス人カ所謂ヒエスヘビチユトニ

揮良斯人カ所謂ヒエゴヒエセイバイブレフセテラヒエエ及ヒニウ

ハイセホハ皆其書ニ論スル所ノ視力之弱病ト同一ノ病ナリ

視力遲鈍病ト視力之弱病トハ人ノ常ニヨリ相混メ錯誤スル

本ヲマキカ故ニ今又両病ノ區別ハ明ニ解説セサルヲラス

視力遲鈍病ハ其病獨膜感融ノ過度ニ非スメ実ニ其感融ノ缺ニ

係ル

此病ニ於ル症候ノ尤顯著ナル者ハ唯此コリ距離セル処ニ於テ明ニ
 物ヲ辨スルノ難キノミナラス又隨時隨処ニ於テトモ視瞻錯乱ス
 ルコトイフス
 眼目ヲ使フテ強ケレハ勿ク速ニ疲勞シ又同眼ヲトナテ麻擦スル
 ニ非レハ再ヒ整復スルコト克ワス
 瞳孔ヲ散大シ強烈ノ光輝ニ逢フト虽只僅ニ運動シ或ハ全ク然セ
 ス然レトモ取テ別ニ光輝ノ妨害ヲ免ハス此病ハ中年ヲ過ルルニ至リ
 且ツ眼鏡ヲ過用スルカ若クハ誤用シテニ至ルニ身作ヲ衰弱セシ
 ムルコトアルヨリ余ス所メ其病通例同症ニ冬ニ於テモ症ニ由テハ且
 増進ナリ速カニメ早ク十分ノ盲眼トナルコトアリ

女病 視力違

ノ瘡法ハ諸家種々ノ論説アツテ各相違フト虽今

コノニ一ノ牧草スルニ違アラス

且瘡法ノ尤知ラサルヘカラサレ者ハナルヲ務テ静止ナラシムルト

此病ヲ誘発シ易キ諸因ヲ表クルトナリ

余自ラ実験ニ由テ之ヲ此ルニ此症ヲクハ難治ノ者ニメ余カ此症

ニ用テヨク功ラサル所ノ瘡法ハ眼目一部ノ刺戟ナリ其法ハ則チ

エシキテールカルバニアテル及チ番椒浸劑或ハ桑赤劑ヲ眉ニ施ス

ホシ此諸劑ヲ以テ真ノ視力之弱病ニ施ストキハ其功ナキノミナラ

ス或ハ却テ至害ヲナスコトアリ

解疑ノ諸果ヲ平テ屢切ラユリ
又両面凸起ノ眼鏡ハヨク支障ヲ輻差セシムルカ故、此病ニ用テヨク
視瞻ノカラ助ク

〔注〕余曾テ実ニ真ノ盲眼トスヘキ者ヲ真ノ視力遲鈍病トメ
正シキテル及ヒカルハニラ施シ以テ大ニ切ラ正シテアリ

或後ニ云フ盲眼ノ一種視神經ノ麻痺ヨリ起シテ其麻痺唯腸
胃ノ汚物ヨリ波及スルコトアリ故ニ唯汚物ヲ疎修メテ之ノ快暢
ヲウルト

又ソフ一書中ニ種ノ眼病ヲノセタリ即其言ニ云ク眼日衰弱
メ一症較著ノ原由ナク唯コレニ強烈ノ刮壁言ハハ□カ地ヨリ取

來ル所ノ故兒撒漢ロニトニ地製ノ亞的尔單果ニテ用或同量
テ大切ヲ長スル者アリト又曰此病時トコテハ他ノ刺戟劑ヲ用テ
劇ニキ歟衝ヲ登セシ由テ以テ始テ眼内諸部ノ衰弱ヲ整復スル
コトヲウル者アリト

視力遲鈍病トカラウマムノ灰白眼トモ亦大ニ羞フ視力遲鈍病ニ
於テハカラウマムノ如ク深ク眼底ニコレニ灰白色ト支派アル真珠
色ト共ニコレ毎ケレハナリ又歟痒衝眼ノ較症ニ看眼ヲ以テハ実
ニ視力多弱病ト同一病ナルカ如キ者アリ「人」名此両症ヲ以
テ同一病トセルカ故ニ余今テ此両症ハ証候ト及治法相異ナルト
ヲ詳カニ説テ以テ明カニ其全ク別アルコトヲ示サスニハアラス

此ヲ以テ今更ツワリヒカモ線病ニ於ル命夜ヲ辱テ次ニ余カ夜
 ラ演ヘ以テ妾ク之ヲ命定セシトス即ワリヒカモ線痒破眼ハ屢
 具眼内及眼睫ニ些ク破衝ヲモ見ス一毎キ者アリ余如此症ヲ
 コルヲ女ナカラス具実験ノ事キト諸患者ノ言トニ由テ明ニ此病
 ノ本性ヲ知ルヲ要タリ余親シク之ヲコレニ患者眠ルホノ事件
 ニ由テ眼睫ヲ閉ルヲ有ハ眼者互ニ相回着シ場クカツ夜間
 ニ於テハ眼睫ニ困重ヲ覺ヘコレカガニ睡眠ヲ催スモノモアラス亦刺
 戟物ノ眼ニ入ルニモ非ス人患者知ラス自ラ眼睫ヲ閉ルニ至ル此ニ因
 テ此症ハ三ニモ線ノ分泌一種ノ疾病ニ係ル者ナルヲ察セリ故ニ
 清毒銀脂名物考水銀ノ条ニ出ツヲ用ルニ其功ヲ奏スル一実ニ此症ノ外

部ニ見ハヒテ爛傷赤色ノ眼睫ニ発スル者ニ於ルカ如シ

然レ此モ線病ト視カニ弱病ト互ニ相異ナル徴候太メナシ

視カニ弱病ニ於テハ一トボム線其ニ一トボム線ハ膜ノ内面ニアル清
液分泌ニ出ス者ナリコノ夜ヨルモ

毛線ト云モノハ即チメーボム
線ト同物ナルカトシ 女ニ妨害ナク具極細ヲ進フスルカ故ニ夜

間眠リヲ催スニモ非ス又僅微ノ害モアルニアラスメ唯眼睫困重ヲ覺

テ蓋シテ且ツ腫潤ニ眼膜ノ固着スル患害ホアルヲナシ

故ニ水銀劑痒破衝益ハ
中ヲ委スル者 膜縁ニ施シメタシモアアルヲ毎ク却テ屢

危害ヲ招クヲ要シ加シニ支線ノ射入ニ由テ発スル所ノ劇症ハ

痒破衝眼ニ絶テコレ毎キ処ニメ実ニ両証互別ノ一大証徴ナリ

或ハ痒眼破衝ノ重症ニ於テハ屢ク視カニ弱ヲ極度ノ症ヲ重ル

者アリ医ノヨク心ヲ注カサルヘカラサル者ナリ
 然レニモ如此重症トナルニ至テハ皆破衝眼既ニ看クモ涙ノ必分
 液酷而トナリテ刺戟スルカガニ益々ハレキ破衝ヲ発シ其破衝脈縁
 ヲリ漸ク結膜ニ及ヒ施ラ逐ニ角膜ニ至ル
 余以為此症ニ於ル光輝ノ妨害ハ唯淚及ニヨルカ若クハ角膜感觸ノ至
 劇ナルニ曰ル者ニメ真ニ洞膜ノ疾病ヨリ発スル者ニアラス夫レ角膜
 常ニ感觸連鈍トシ破衝ニ由テハ極度ノ感觸ヲウルニ至ルテ行テ勤
 帯軟骨ハ常ニ知覺ナシトシ疾病ニ由テハ劇甚ノ疼痛ヲ発スルニ至ル
 ト同一般ナル者ナリ

〔注〕余ヨリ之ヲコレニ此命ハ尚感觸極ト物ニフテ疼痛感觸極
 ヲ覺ルル極限

物ニフテ運動ヲ
 発スルノ極限ノ區別ヲ設クテ詳カナラサルニ似タリ夫レ角膜ノ破衝
 ハモ様伴脈絡膜及虹彩ノ破衝トモニ感觸極ノ症ニ屬スル者ニメ如
 矢ニ洞膜視神經ホノ如キ感觸器ノ破衝ヲ發ルニ非レハ始ヨリ感
 觸極ニ屬スルノ症ヲ発スヘキ者ニアラス凡ソ諸器ノ生活及其精カハ
 ミナ此兩極ノ内合ニ入ルル者ニメ其均合度ヲ変スルテ有レハ必ス疾
 病ヲ発スルメ其発スルヤ侵サル部ノ異ナルニ心メ極内何レカ先ツ
 強テ他ノ一極ニ変ラ生ス故ニモニ感觸極進テ極度ニ至ルハ先
 ツ疼痛疼痛ヲ發シ其發シノ感觸極ヲ増進セシメ而シテ終ニ其
 益ヲメ死産セシムルニ至ル而シテ感觸極ニツ増進スルハ血液直ニ其
 部ニ輻湊充積ス然レトモキリ疼痛ヲ發スルテ毎ニ若シ血液輻湊

増進ニ由テ感觸極ヲ刺戟スル中ハ前症終ニ歟衝ニ至ス是於テハ
 両極互ニ増進スルカ故ニ唯赤色腫疔ヲ發スルノミナラス痒疔及具
 它ノ感觸極ノ諸疔ヲ起シ因テ痒癢及諸液分泌ノ發ヲ生スルニ至ル
 其命ヨリ中ハ視力之弱病脈絡膜歟衝病及ヒカトカ書中ニミセル
 外候ナキ眼歟衝ホノ病理自ラ明ナルニシ且諸眼病療法ニ於ル利
 益又オナカラス尙オベ子ニク上カハ書中ニ詳命アリ就テ之ヲミヨ
 且ツ此症ニ在テハ長時間ノ視察ナリ著ナルト有ルカ故ニ又真ノ視力
 之弱トナスヘカラサルト明ケシ然レ前ニ云ルカ如キ痒歟衝眼ニ視力之
 弱ヲ令伝スル者全クナシ伝フニアラス余モ又自ラ其症ヲ目撃セルト
 屢アリ但シ此令伝ハ唯眞症ノ実ニカトカ説ノ如ク兩病同者

ニ非ス両症相異ナル所以ノ征徴尤モ輕著ナル者ハ眞ニ此ノ網膜
 感觸ノ疔兩ヲ同療法ヲ以テ治スノ克ニサルナリ即候縁腺毛腺ハフ
者ト同物
 如ルカノ輕歟衝ニ切アル者ハ必ラス視力之弱病ニ害アリ

〔注〕余嘗テ親母兄ノ此令伝ノ病ニカルラシル其始メ先フ埋針法
 シ下腺ニ施シ之ニ眞ニ他ノ強壯性過度ナラサル滋養劑ヲ与テ視
 カ之弱速ニ治シ次テ水銀劑ヲ著ニ施メ毛腺ノ病状痊エ由テ以
 テ十分ノ快復ヲモタリ

右件ノ諸命ニ由テ余今視力之弱ノ眞症ト混雜錯雜ニ易キ諸
 病ノ區別ニ於テ要ナル者ハ殆ト皆之ヲ尽セリ故ニ次編ニ於テ
 ハ將ニ余カ実験ニ由テ自得セシ此ノ遺奇ノ療法ヲモサントス

○牙三偏

○論視力之弱病之療法

余カ以視力之弱病ヲ始テ此ノ患者ハ其作癩極テ軟弱其病
ヲウルヤ文字至細ノ書ヲ読テ非常ニ視カラ賈シ習字ヲ研精シテ
屢夜ノ深キニ至リヨリスル者シ

是ニ於テ余以テ此ノ症ニ於テ其網膜感納ノ非常ナルハ是レ神經
カノ虛脱ヨリ發スル者シト

故ニ鎮痙收斂ノ劑ヲ外用シ強壯神經劑ヲ内用メ之ヲ併カント
ス然ルニ其劑印ナキノミナラス反テ害アルヲモル

單ニ刻苦ニテ種々ノ療法ヲ行フト至クモ一モ印ラレトノ毎カリシ

カ故ニ始メテ從來定メル迄回ノ考按當ラサルコトヲ疑ヒ再ニ思

惟メ以テ此ノ病ニ於テ非常ノ感納ハ實ニ網膜若シクハ脈絡膜ノ線

燭燭カ或ハ然ラスモ其血絡ノ盈脹ニヨル者ナラント考按ラ以

テサウシテルルニ適當ノ療法ヲ回フニ彼モ亦未ク實驗ナキカ故

ニ明ニ答ルコトヲエス是ニ於テ再ヒ先ノ考按ニ由テ以テ其療法

妄リニ冷性收斂ノ劑ヲ外用シ強壯劑ヲ内用メ眼ノ精カラエ

ヘカラス唯且シク眼ノ内膜ニ於ル血絡盈脹ヲ減退シ且テ網膜ノ

感納非常ナルヲ鎮靜セスニハアルヘカラスト所レモ其患者已ニ辟去

ルヲ以テノ故ニ終ニ此考按ノ當否ヲ試ルコトヲエス

其旨日ナラスノ同症ノ一患婦ニ招カル往テ之ヲモルニ他匠已ニ強

此劑ヲ用テ切ラエサル者シ
此件衰弱已ニ殆ニト碍大及ヒ尋常ノ日影ラニルト至大害ナキ
ヲエス

其病ノ始ヲ尋ルニ自ラ常ニ碍下ニ書ヲヨシ画ヲ習ヒ針縫ヲ
事トスルヨリ登スル者ナリ

此トキタニモ痒破瘻眼ニ頃クノ侯ナクニ夕結膜ノ血絡毫モ盈脹ス
丁毎ク其發中半シト至其作質嫩汚加之ニ屢分扱セルト種

疾病ニカルトニ由テ大ニ肌瘦セリ

強壯劑ハ他医已ニ其配合及ヒ分量ヲ種々ニ用ヒ居セシモ
切ラウルノ毎リニカ故ニキメ治例ヲシスト至余カ考按ノ旨否

ヲ試是セシカ為ニ種ノ療法ヲ施セリ其法先フ蟬針ニ箇ヲトシテ

下脰ニ吸貼セシメ夜間ニカロメシヤ汗ヲ午ハ翌朝下劑ヲ飲シ

メ朝ソノ加密列盤乘菜ニ早ノ侵劑ヲ以テ眼ヲ温シヨク拭ヒ去

テ阿芙蓉液製法及用法
第五篇ニシツヲ治飢ニ昼間ハ鉛糖製法及用法
オニ篇ニシツ

ノ魚眼水ヲ以テ眼ヲ掩フテ之氣ヲサケ清涼緩和ノ境生法ヲナシ

蟬針ニ由テトシ所ノ血太メ僅微シト至患者衰弱ヲ覺ハ翌日下劑ニ

登スル所ノ下劑適宜ニト至衰弱ヲ覺ルニスルニ是ニ是具體

復ノ薄弱ナルニヨリ

然レトモ下劑治患者自ラ眼中ニ輕快ヲ覺ハ尙且ツ強烈ノ之氣
ニモタヘルヲ得ルニ至ル

〔自注〕或眼科家ノ説ニ如以眼ニ近接メ錐針ヲ施ス_トラ禁セル
 者アリ且後ニ云ク錐針法ハ 著ク眼眩ノ腫脹ヲ起シ施后
 暫時ニメ反テ眼ノ刺戟ヲニス_トアリ之ヲ防カニ為ニ宜ク之ヲ
 顛顛ニ行フトヘシト云ルニサワニテルス_ル及余カ之ヲ眼眩ニ施セル
 諸症ニ於テハ切ラ混ル者毎ク尙且ツ玫瑰色ノ破衝ニ委ロトス
 ル劇キ症ニ於テモ芟菁_ニ同切ラ_ニ委スル_ヲコメリ加之_ニ眼
 破衝ニ於テナル_ヲ止_リ之ヲ眼眩ニ施スト顛顛ニ施スト且切ラ_ニ
 軋スルニ具優_レル_ト遠_ニ殊_ニ眼眩ノ_班或ハ_一特ノ_{失色}ニ_施后
 速ニ_{破衝}精_ニ阿芙蓉_ト水_ト加テ_洗ハ_具功_尤著_シ
 如此余カ新療法ノ適當セル_ト愈明ナル_カ故ニ尙カ_ロム_ル及_レ下

劑ヲ三四日毎ニ服用シ且_フ其他ノ_諸業_皆懈怠ス_ヘカラ_{ナル}ト_ラ命
 シ由テ_視力_ニ弱_速ニ_治セ_リ且_後只_{阿芙蓉}液_ヲ以テ_洗サ_レメ_強壯
 劑ヲ_与ヘ_特ク_催下_ノ氏_某
大黃 青 會 石 餘
ニ 兼 以 テ 製 ス
 ヲ_与テ_飲ニ_全治_ヲウル_ニ至_レリ_且后
 一婦人來テ治_ヲレ_フ具_診ニ_五才_許具_作煩_軟弱_ニシ_テ感_動コ_易
 ク一二月前ヨリ_ニ弱_ノ劇_症ニ_カル_且病_ノ始_ヲ尋_ルニ_久ク_微密
 ノ_針筵_ヲ事_トス_ルト_碇下_ニ流_書ス_ルト_ノ事_キヨ_リ奈_スル_者シ
 〔註〕ロウ_ノイ_ノ人_ノ書_中ニ_云ク_一患_者針_筵ヲ_事ト_スル_ノ太_キヨ_リ
 瞳孔縮_閉ヲ_奈メ_盲ト_{ナル}者_ニコ_シ銅_膜ノ_感觸_増進_スル_ヨル
 者_ニメ_且虛_脱ニ_ヨル_者ニ_アラ_ス何_者銅_膜虛_脱ス_レハ_瞳孔_必ス

脹大なる者ナレハハシクノ如ク微細事業ハ大ニ眼ヲ刺戟メ血
海ノ輻湊ヲ増進スル者ニト

テレニカ人^名白ク一牡羊燭下ニ流書スルノ太キヨリ刺戟ノ眼燭
ヲ祭メ清美^名印ナク^名飲ニ生命ヲ墮セル者アリト

此症^名上^名前ノ患者ト同症ナルカ故ニ同一ノ療法ヲ施サニト欲スト至其
体質薄弱ニメ神經ノ感動強キカ故ニ取テニヲナシテス^名試ニ強

壯收欵ノ劑ヲ与ルニタシモ印ヲ棄セス^名是ニ於テ意ヲ決メ^名針四箇ヲ
眼^名施シ^名前ノ^名与フ

此療法ニ由テ諸症ノ減退スル^名前ノ患者ニ於ルカ如ク其功優ル
モ^名方^名ラス

患者自ラ云フ^名針ノ功^名美ニ^名神ノ如ク^名次^名前^名支^名氣^名ニ^名向テ^名質^名ハ^名所ノ^名劑

疔^名唯^名一^名回^名ニ^名輕^名快^名スル^名十^名ノ^名八九^名ニ^名至^名レリト^名故ニ^名余^名再^名ニ^名之^名ヲ^名施^名サス

朝^名夕^名阿^名芙蓉^名散^名ノ^名治^名劑^名ヲ^名用^名レ^名メ^名点^名眼^名水^名ヲ^名与^名フ^名特^名ニ^名催^名下^名ノ^名氏^名ヲ^名

服^名セ^名メ^名日^名ナ^名ラス^名メ^名余^名症^名亮^名ク^名消^名散^名ス^名是^名ニ^名於^名テ^名尚^名具^名再^名登^名ヲ^名防^名ニ^名為

ニ^名強^名壯^名性^名ノ^名点^名眼^名水^名ト^名吉^名那^名ノ^名内^名服^名ヲ^名ナ^名サ^名レ^名ム^名后^名一^名月^名ニ^名メ^名来^名リ^名報

曰^名視^名瞻^名ニ^名十^名全^名健^名康^名ヲ^名エ^名リ^名ト

女^名両^名疔^名ニ^名由^名テ^名ニ^名ラ^名コ^名ル^名ニ^名日^名常^名種^名ノ^名方^名法^名ヲ^名施^名メ^名治^名シ^名易^名キ^名諸^名病^名モ
又^名浮^名血^名下^名劑^名ニ^名由^名テ^名如^名ク^名峻^名切^名ヲ^名得^名タル^名者^名有^名ニ^名モ^名知^名ル^名ハ^名カ^名ラス
實^名ニ^名此^名兩^名疔^名ニ^名於^名ル^名カ^名如^名ク^名峻^名切^名ヲ^名エ^名ル^名ト^名ハ^名余^名輩^名ノ^名治^名ニ^名於^名テ^名未^名曾^名有^名事
件^名ナ^名リ

然トモ若シ実ニ網膜ノ虚脱ヨリ発スル症ニ於テ此療法ヲ施サハ又
 物サニ如何ノ大害ヲカシニ宜ク戒慎セヨ
 而ルニ此症ニ於テハ其実ニ精カラ脱セムヘカラサル如キ薄弱ノ作
 廢ニノ此過ニ心セルカ故ニ余今此病ノ症回ヲ明ニ徴セシカガニ又薄
 弱ナラサル作廢ニ於テモ此療法ノ過ニ心スヘキ者ナカラサル治例
 ヲ設テセトス
 作廢健強ニメ排泄劑ハ浮血下劑ヲ用ト虽容易ニ衰弱スヘカラサル
 今ニ於ル同種ノ視力乏弱ヲ同種ノ瘵肉ニ由テ具功ヲエシト
 一般ナル者ナリトナシ
 今一ヲ具功ヲシル者牧岸スルハ却テ毎益ノ贅言ニ屬スルカ故ニ

唯個ノ例ヲ岸テ之ヲ示サントス
 千八百九年十二月一廿年獨莫太ハラ生業トスル者来テ余ニ治ラレ
 フ其眼視力大ニ乏弱メ日支燭下終テ之氣ノ強キ者ニ向ヘハ疼痛太
 メシク其來病發後已ニ二週ヲヘタリ
 余評ニシテ診スルニ其眼中ヤモ破傷ナク毫モ毛線ヲノ症候アル
 ナレヨク諸症ヲ比較スルニ作廢精薄弱ニト虽健康毎恙ナルカ故ニ此
 病ハ全ク是只一部ニ限レルノ者ナルヲ察ス
 是ニ於テ以為即是視力乏弱ヲノ症ニメ其回莫太ハラ造ルニ視カラ
 賈スニ因テ網膜若シクハ脈絡膜ノ血管ニ血ノ輻聚スルヨリ発セル
 者ニト是故ニ先ツ錐針ニ個ヲ下眼ニ施シ夜ニ入テカロメル由リ

ラ子(聖)朝催下ノ敬奉ヲ用ニ朝夕先フ喫ニキホトノ担湯ヲ以
テ眼ヲ洗ヒ次テ阿芙蓉液ヲ許ラ以テ治シ昼間一二回星ノ鉛浴
水水ノ一為押即鉛ヲ滴入シ具生業ヲヤメシメ肉食飲酒ホテ禁シ縁
魚ノ類ヲ以テ眼ヲ掩ハシム

患者其教ヲウケ去リ后一周ニメ再ヒ来テ云フ指刺皆大ニ切ラニ去ス
殊ニ蟬針ハ施后直輕快ヲ覺ヘ今諸症大ニ減退ロリト是ニ於テ余再ヒ
飯カロメルト下劑ヲ用シメ尚且ツ動脈ノ運動ヲ降鎮メ病勢ヲ腹
部ニ導カガカハ吐酒石ノ溶液ニ指ニ里斯厚利塩ヲ加テ隔日ニ飲
服セシメ其他ノ療法ハ此ノ前ニ同フス
其後十四日ヲヘテ又来リ謝メ曰フ視態大ニ明カナルト常ノ如ク之氣

ニ向ヘモ害モ害ヲ覺ヘス取テ疹ヲセス
是ニ於テ強壯性ノ点眼水ヲ手ヘ己前ノ方法ニ代ルニ昔那ノ内服ト
滋養ノ摂生ヲト時々催下ノ氏業ヲ用ルテ命ス后遂ニ他ノ方法ヲ
用ルト毎ク不日ニ全ノ快復ヲエタリ

次ニ奉ル所ノ治例ハ益ヨク此病ノ症候ト療法トヲ明ルニ足ルヘシ
一壯年視カ至弱ヲ病ム由テ十八百十年來テ治ラレフ此中己ニ疹戸
本ツラメ事業皆瘵スルに至リ
自ラ云フ兒タル中痘ヲ患ヒヨリ以來時ニ此病ノガハリ今時ハ其瘵スル
丁巳ニ二月汗收斂劑及ヒ水銀劑ヲ外用シ種々ノ方法ヲ施スト虽
皆功アルト云ク口トニ地ノ一眼科ニ溲ルニ此痘瘵復眼ノ即眼膜ノ一種

ニメ下法ヲ授ク用テ皆功ナシ

年カニラコトニ燭下向ハ疾疔ナリシリ淚液大ニ流出シ日支ラシハ
尤則シク虹彩ノ運動ナク敏捷ニ強ク身伴他ノ疾病ナク眼中毫
モ破傷ノ候ヲ見サス又毛腺ナク疔ニテ故ニ余以テコト明ニ視カシ
弱ノ真疔ナリト

〔自注〕年カニ所ノ視カシ弱ノ患者ニテ燭下ニテヨリ日支ニテ元
ヲ難コトス是怪シムヘキニ非スコウセル人ノ算ニヨルニ日支ノカノ
燭下ニテ元ト一テナク信ナハ者ナレハナリ

是ニ直ニニ類針ニ個ヲ下腹ニ施シ夜ニ入テカロメルヲ年ハ翌朝
下劑ヲ用シメ朝メ眼ヲ洗淨シテ阿芙蓉液沾粘シ翌日キノ事件ヲ

止メ洗薄清涼ノ搨生法ヲナシム昼間ニ綠色ノ翳ヲ被ラシメ頻リニ
濕ナル鉛劑ノ点眼水ヲ用シム

后三日患者未漸日ク革切ナク較著ニメ速疾ニ疾疔殆ト消去
シ支氣ニテ元ト一テ容易ニメ好害ヤク諸疔取テ翌日ノビミアスト
又日類針ノ功殊ニ尤モ著ク其施ス件下テ輕快ヲ覺ヘタリ

是ニ於テ年再ヒカロメルト下劑ヲ年ハ且ツ病疔ヲ腹部ニ導カ
ニカガニ吐酒石ノ溶液ニ純精酒石ヲ加テ日ニ三次用シム

后四日彼又來テ日支氣ナリ強キニ非レハ已ニ毫モ疾疔ヲ奈スル
ナシト年ニテ疹スルニ虹彩ノ運動殆ト常ニニテ前ノ如ク劑ニカラス
此トキ年將ニ旅行セトス故ニ患者ニ教ルニ下劑ノ下テ以テス次ノ

一週間尚オ一回カロメルト下劑ヲ用ヒ具時間絶ヘス尚催下ノ
温劑即此酒石浴液ニ也ヲ服シ其後若強キ先氣毛全ク疾症
ヲ寛ヘサルニ至テハ方ヲ変メ收斂劑ノ点眼水ヲ用ヒ滋養ノ抵抗
法ヲナシテ舌那ヲ内服セシム

右一週ニメヌテコレニ快復セリトキ約メ日ク再発スルコト有ラ
ハニテ来ルヘシト而ルニ血脈ニ來ラス因テ思フニ具十分ノ全治ヲ立
コト疑ナシ矣ニ附録メ尙學者ニホスヘキコトアリ強壯ノ患者ニ於テ
ハ下劑浮血ノ量宜ク衰弱ノ人ニ於ルキリヲナカルヘシ衰弱ノ患者ニ於
テハ之ニ反スヘシ燼燼ノ度ニ至テハ浮血僅微ニト雖コレニ他ノ病
勢ヲ他部ニ導ク即下劑ヲ宜テ十分ノ治ヲウルコトアリ

凡ソ浮血下劑ハ度ヲスキテ量ナルヘカラス宜ク唯先氣ノ害ノ止ムヲ
以テ度トスヘキコト

第四編

揚子症候療法之正誤

余今ワローレカ昏中ニスル処ノ此ナト全ク明ニ同一ナルカ治例ニ種
ヲ引テ矣ニ揚子セハ余カ実験施治メ灼リナキヲ証スルミナルヘシ
何者且症候原因余カコレ所ノ者ト同一ニメ療法モ亦施ス所ノ
者ニ異ナラサレハナリ

余カ今コレ引ク所ノ第一種ハ其書中ニスル所ノオセ種ニメ題ス
ルニ次數語ヲ以テス病性全ク眼燼燼ヨリ發スル者ト同リメ明ナル外

候ナリ 蟬針法ニ由テ大切ラシク所ノ視力ニ弱ニ病

一婦人年三十四年七十七年車印度ヨリ來テ視力大ニ衰弱スルカガ

ニ余ニ治ラセテ婦人久シク恐國ニ住テ蚊ニスルノ太リキキニ由テ

且作廢太リ痛セリ 痒ニシラ疹スルニ両眼モモ病状ヲ見ハサス

以カヲリコニ線多必液ノ酷厉トナルヨリ答セシ者シト故ニエニシラ

エニトシトリニム 取ラ両背ニ施サシムルニ三日瘡法尋常ノ痒

歟 瘡眼ニ於ルカ如此然レニ病状タニモ減良セス

是ニ於テ痒ニ具平生ノ瘡生ホラ問フニ知ルトキ以此疾ニカカリ

蟬針ニ由テ大ニ輕快ラエトテラ覺フ由フ

是故ニ余其衰弱ノ太キト歟 瘡ノ瘡候ナキニ拘ラス誠ニ蟬針ニ

個ヲ両眼額ニ施シ三四日毎ニ答泡ヲ耳后耳上ニ貼シ且ツ冷水ノ

流劑會アルトテラ覺シカ故ニ朝メカニル浸劑ヲ布疋ニ浸シ眼ヲ

掩シ又間拭ヒ去テ接骨木花浸劑ニ毫脳精ヲ加テ前頭及ヒ

額額ヲ洗ハシム

患者以テララケ去テハムブスヒ 地ニ至リ後一月許リニ余瘡

ヲ贈テ白ク蟬針ニ即切アルカ故ニ數次之ヲ用ヒ加密例抵浸劑太

々快テラ覺ヘ今兩眼共ニ昏闇好ケナリ唯強劑ノ支氣ニ向フ件ハ

婦下ニ流書ホラナス件ハ視カマニ弱キヲ覺フノモ

按ニ此疾ハ明カニ視力ニ弱ナリ真疾ニメ具回突ニ血液ノ眼ニ滲

スルヨリ答スル者シ若シ然ラズニハ患部ノ浮血直ニ切ラ去セルノ理ナ

知スヘカラス

次ニ卒ル所ノ者ハ其書中第十種ノ症ニ題スルニ左ノ教言ヲ以テス頭痛ト上脰垂下トヲ蓋テ燠衝ノ外候ナリ蛆蛆法ニ由テ切ラタル所ノ視カシ弱病

一二年以前女子年二十未テ治ラセテ其視カ大ニ衰弱ノ日支母大ニ患ミルヲナリ難ク眼脰弛垂メ指ヲ以テ搦ルニ非レハ角膜ヲ見クヲエス之ニ蓋シテ頭痛同初ナク其症殊ニ前頭ニ是レ所メ此件具衰弱疾疔共ニ保徳セリ一ニ過ナリ蓋シテ女子ハ名譽ノ重キ故ニ余以爲ク此病ハ其画ヲ研精スルニ眼カラ賈セルヨリ登スル者ニト

具外眞眼脰ノ垂下ノ外十全健康ナルカ如ク反表一モ疾病ノ候ニテ脈動常ノ如ク清排泄大十便百十全ナリ試ニコニグウニテユムニトリ軟名ヲ用ルニ蓋モ切アルト豆クエレキテルハ太リ和カニ施スト虽却テ衰弱頭疔ヲ増進シ強壯劑ハ内外共他医己ニテ用ヒ余モ亦年テ僅微ノ輕快ヲモセス

是ニ於テ余以爲ラク其病頭中ニ在テ其波及眼ノ如ク症ヲ起ス者ナラニト曰テサウニテルス名ニ導テ共ニ試ニ前頭疼痛疔尤劇甚ナル処ヲ山ク截定テ瘡口ノ太サ治ニトコロニ鐵貨ノ平命并ニト虽頭蓋骨脳膜瘻共ニ甚モ疾病ノ状ヲ見ス処ナシ然レトモ術后大ニ輕快ヲ覺ヘ眼脰自ラ完テ芝氣ノ漸入ニ前ノ如クニ

疼疔ヲ起サス

如此治愈ラサル者一週ニメテ再発シ疼疔衰弱全ク前ノ如ク
此疔以テ前日外科術ニ由テウルルハ輕快ハ蓋シ失血ノナス所ナラ
ニト故ニ試ニ蝟蝨三四個ヲ頭額ニ吸貼セシムルニ速切アリ之ニ由テ病
患衰クテ二日又頭疔再発メ其強キテ前日ニ異ナラス故ニ又蝟蝨
六個ヲ前額ニ吸貼セシメテ大切アリ

治切ニテ患部ノ止痛ニ施ケル浮血ノ一回ルカ故ニ尔後或ハ二
個或ハ三個時トメ八個ノ蝟蝨ヲ前額ニ吸貼セシメ或ハ頭額ニ
ス者一週間ニ二回如クスルテ十週許施ス毎ニ輕快著ク頭部ノ
疼疔視カノ衰弱及眼瞼ノ諸症漸次ニ減退シ三月間ニメ全治

ラエリ

按ニ此疔ハ内部眼瞼疔ノ一種ニメテ上瞼疔ト頭疔トハ其眞疔
ニテ眼目ヲ過度ニ使役スルハ血液ヲ其部ニ輻湊充積セシメテ
神経截傷ヲ牽張セシメテ疔ヲ發スルテ突ニコレ當然ノ必
理ニメテ即生活力固有ノ性ナリ

又其頭疔ト眼瞼疔垂トハ明ニ血絡ノ充張ニヨリテ疑ナシ余モ
又嘗テ同回疔ノ者ニハラ見タリ

又其強壯劑ノ内外相用テ全ク切ナキ者モ其病其部ノ弛緩衰
弱ヨリ發スルニ非スメテ其回疔ニ眼窠内ノ破傷ニアルノ明徴シ
是故ニ患部ノ浮血直ニ諸疔ヲ減退セリ

〔註〕 蠅針法ノ視力之弱ニ即切アルヲ又按和蘭ノ眼科医「メニセル」ト実験セル治例アリ又「テ」トスヘシ即其法曰

女壯ノ一因暮士作廢健強ニノマ血一三年前左眼ニ視力之弱ヲ患ヘ過古ノ療治ニ由テ治ラセ後一年ヲヘテ

更ニ又視力ノ衰弱ト具感融非常ニ大ニキトヲ患フ然レ疾疴アルト益ク而ノ其諸症精細ノ伎備ニ眼自ヲ使役スル子曰

ニ向フ件ハ本々増進ス

余此ノ施スニ尋常以疾ノ諸症ニ切アル諸劑ヲ以テシ強壯衝動性ノ益眼水ヲ午へ揮登ノ精劑ヲ外用シ之ニ益ルニ催嚏劑ヲ施シ登泡ニ耳后ニ貼シ然テ眼カノ使ヲサレシムト虽一モ切ナリ

却テ諸症増進シ瞳孔變動ノ縮張度ナク圓形ヲ失ノ非常ニ張大シ角膜具透明ヲ失スルニ至シ是ニ於テ余更ニ「法」ヲ換ヘ縁布ヲ眼ニ掩ヒ「ステ」ヘソニ即「書」ノ「法」ニ從テ蠅針法ヲ行フニ切アリテ終ニ十分ノ全治ヲエタリト

右件掲示スルノ諸說明ニ以テ余カ此病ノ症因ヲ以テ眼内ニ於ル血絡ヲ膜ノ破傷眼ニアリトスルノ考探ヲ記スルニ是レリ

余又「ア」ヒ「コ」テ「カ」眼病ノ諸症ヲ察集セル一昏ヲ「ア」テ「ヨ」ムニ其昏中又幸ニ余カ考探ヲ記スヘキ一症アリ云ク

五才許ノ一男則ニ「キ」傷冷毒ニ由テ重症ノ疾病ニカ「リ」益テ右眼ヲ病ム其眼眼中前「疾」共ニ「疾」疴則ニ「ク」老氣ノ漸入大ニ好

害アルヲ覺フ瞳孔強ク縮閉ス然レモ其外異常ノ如ク女モ破
 傷ノ候ナク且死スルノ前ニ目ニ至テ角膜始テ透明ヲ失ヒ曇
 褐色トナリ剛膜微ニ破傷ヲ起セルノニ其死スル中其病ノ真症
 ナラ明ニセシカカニシテ解剖シルニ角膜ヲハキキノ右剛膜一部破
 傷メ血液溢サシ脈絡膜微ク腫脹メニ化濁セシトセルヲ此
 此病且初起ニ於テ微毫モ外候安毎クメ視瞻感觸本是ニク視
 カ尤モ至弱メ全身ノ衰弱ヲ感ルカ故ニ自ラ是視神経ノ衰弱
 ノ感觸非常ナルヨリ察スルノ膿痲ヲ生セシト至死後解剖ヨリ
 其痲ノ不着ナルヲ示シ明カニ其病ノ本性脈絡膜ノ破傷ヨリ察
 スル者ニメ外部ニ其候ヲ見ハザル者ナレトテ証セリ

其病中ノ症候死後ノ解剖豈斷余カ者痲ノ視カ至弱病ハ唯
 網膜ノ感觸病ノニテラス又眼内一部ノ破傷病ヨリ察スルノ明
 徴トナスニ足ニヤ

實ニ此病ハ一部ノ疾病ナルカ故ニ独リ患者ヲ死セシムルノ毎キヲ
 以テ如死後ニ解剖メ其病ノ位置ト本性トヲ明証セル他ノ例
 ナラ見ハス

ハイリリト名ノ昏中人身ノ諸病ニ於テ解剖セル実験ヲノス
 ルコトヲ尋ナシト至モ眼病ニ於ル事件ヲカキ且醫ノモルカクニ人
 ノ後ニ白ク

余死屍ニ於テハ未ダ曾テ内部破傷眼ノ症ヲ見コトナシ唯一次

盲六ノ眼ニ於テ之ヲミコトアリ具網膜血色ニメ殆ニト黒色ヲ帯
ヒ具状治モ脈絡膜ニ於ルカ如ク脈絡膜及葡萄膜ハ血絡太リ
トテナリカ故ニ健康ノ人ニ於テモ特トトハ血色ナリ者アリ
以上余カ所後ノ者如ト虽撤メ同病ニナレモ唯浮血ニ由テノ
治スル者シト決定スルコト勿レ

〇第五編

論下利

夫レ患部ニ施ス所ノ浮血ノ以病ニ於ケルヤホリ速切アルコト実ニ他
ノ諸瘰癧ニ卓絶シテ且ツ余カ施ス所ノ瘰癧ニテ以テ主トスレ
カ故ニ今他ノ瘰癧ヲ復クニ免テ尙一回具切カラテコトス

余己ニ二年ヲ経ルノ前症ト虽蝨針法ヲ施メ直ニ切ラ得ル者大
タヤナカラス然レトモ明ナル外候ナリメナ任再持久ナル眼病ニ只
蝨針法ヲ施メ速切アリトスレハ或ハ奇トシ信セサルノ人有ニ
余カ以症ニ浮血ヲ施ス所以ノ者ハ唯眼内ノ血絡充脹メ後性ノ破傷ニ
カレト尙才偶結膜ニ後性ノ破傷ヲ登メ具切官筋ヲ変スルコトナリ在
再持久ナル者ナルカ如ク一般ニトスルニアルコト

又血脈病ノ症候モコレヲ記スルニ何トナレハ具脈大ニ充盈膨脹
スト至蒂ニ較著ノ患害ナク唯之ヲメ著ク具膨脹ヲ増進セシム
ル所ノ刺戟物アレハ具膨脹ノ度ト具部ニ循ルニ神経ノ再々ト
ニメ再々ノ刺戟ヲ登スルニナレハナリ

憶フニキリ蟬針ノ功カラ明ニ知ラサルノ徒ハ或ハ云ニ全身ニ生カ
 強壯ノ候ナク眼ノ外部ニ破傷ノ疔ナク結膜ノ血絡充脹スハ何
 ノ毒ニ蟬針ヲ施メ血ヲ減スルノ理アラント
 然レモ実験ニ由テミラヒルニ以病ニ於テハ宜ニク外候ニ於テ
 治法ヲ謬ルヘカラサル者ニ
 向ノ以病ニ於テ蟬針ヲ用エキ毎ニノ徵候ハ老氣ノ漸々由テ
 登スル所ノ眼底ノ疼痛ナリヨニ常ニ之ヲ用テ輕快ヲ覺ハ宜具
 切アルノ証ニアラスヤ
 假令徵候トモモ蟬針ヲ用テ輕快ヲ覺ルヘアラハ必ス預メ具切ヲ斷
 言スヘク患者其病ノ必復治スヘキヲフケテ觀喜セムヘシ

然レモ其蟬針及眼翳ニ角法ノヨリ切アルニ習テ刺烙ヲナス
 勿レ刺烙ハ全身ノ血液ヲ減ニスルカ故ニ危篤ノ衰弱ニ進ム恐アレハ
 ナリ
 下劑ノ眼破傷ニ於ルニ大貴羊ニメ具用テ廣ク古今一般眼科
 家ノ実ニ貴フ所ナリ
 ヒツボカラテスツ言リ「下劑善治眼破傷ト云テ實ニ可ク不傷
 ノ論ニメ自ラ実験ニ由テミラヒルニ自然ニ登スル者ト云テ其者
 トニ拘ラス皆必定ノ偉切アリ
 學者ヨリ腸胃ト眼目ト互ニ相関心スルヘク假令ハ小兒ニ於テ飲
 食不消化或ハ蛔虫ヨリ一種ノ眼破傷ニ生ラズ眼
 破傷ト云クテ登スルヘク有

ルホノ例ヲ考ヘ諸下劑ノヨリ諸病ヲ導去スルト具ヨリ腸胃ニ節
蓄セル汚物ヲ掃除シ血ヲ乳糜ノ吸收ヲ妨ケ腸門ノ蒸氣及ヒ諸
分泌ヲ催進スルニ由テ全身血液ノ量ヲ減損スルノ理ヲ思ハ、具
ヨリ眼内ニ滲透スル血ヲニテ消散セシムヘキノ理亦昭々リラン
又血液ノ頭部ニ到リテ衝正スル痛症ニ於テ下劑ハアラサレハ取
テ之ヲ鎮静スヘキ者ナキハ各人ノヨリ知ル所ナラスヤ然レテ或
ハ若唇ノ匠筆ニテ眼病ニ功ナシトシテ信用セサル者有ルハ又何
ノ理ソ

トトリカ昏中ニ云ク「ケイフセ眼焮衝」眼焮衝ノ一極ナリニ於テハ
下劑造テ「アアル」毎レタトトヒ他手ノ缺ルノ途フニ取テ之ヲ用

ル「勿レト然」トモ傳染性ノ眼焮衝病ニ於テハ自然ニ痊スルノ下劑
ト術ニ由テ催進スル者トニ拘ラス具功下劑ニ優ル者毎レ「
母」トツカ下劑功ナシハ「者」ハ「慢」ニ不当道ノ抵性下劑ヲ手ルニ
ヨル者ニ何ト「レ」ハ抵性ノ下劑ハ血液ノ運行ヲ催進メ具運動ヲ強
シ却テ刺戟ノ性ヲ増進スルナリ

是故ニ下劑ヲ用ルニ當テモ又其方法宜シク戒慎スニアルベカラス
右來諸医ノ内外眼焮衝ニ尋常施用スル所ノ下劑ハ「
其」用量ニ
於テモ回数ニ於テモ「
ハ」宜ク尋量ニシテ用テ過度ノ下劑ヲ起サシムヘク其功ヲ「
度」ニ心メ數回ニテ於スヘシ患者ノ体質強壯ナル者ニハ先ツカロメ

止ニ女黄没扭ノ末ヲ加テ寸量ニシテ午ハ其後一時ヤラフ。公
 未遠宜ニ同量ノ他精酒石ヲ加ヘ薄湯水若シクハ大妻水ヲ以テ
 送下セシムヘシ其功ヨリ稀薄ノ大便ヲ過クテニ排泄シ著シク血行
 ノカヲ抑製ス
 作黄薄弱ノ人ニ於テハ宜シクカロメルノ量ヲカフニヤラフ。ハ
 ニ付ルニ同量ノ浮利塩ヲ海那葉ノ浸劑ニ加ヘ用ヒシムヘシ但シ度
 劑ハ香寧水薄湯水ヲ以テ製スルヲ佳トス
 今実験ニ由テシラコレニ劑シキ熱性ノ下劑ハ不適キト云々ナリ
 緩性ニ過ル中ハ又切ナシ故ニ峻功ヲモトスル中ハ宜シク強カラシムヘシ
 且ツ白テ下劑ヲ用ルニハ初施ノ後ニ三日ヲ経テ其功カノ全ク

尽ル中ニ至ラサシハ再用セサルニ若俗ノ曰俗ナルカ故ニ余ハ患者ノ便
 ルニ心メ常ニ一頓ニ寸量ヲ用ルニシラス
 六ツ下劑ヲ用ル標的ハ唯全身血液ノ量ヲ減スルニアルノコナラス
 又血液ノ管内細絡充積盈脹スルヲ防リニ在ルカ故ニ宜ク同時ニ
 清涼緩和ノ摂生ヲ施スニアルハカラス然レモ清涼稀釈ノ飲液
 ヲ過度ニ用ルテハ之ヲ禁ス又右件ニ準ル下劑ニ相交換メタ
 量ノ吐酒石ニ緩下ノ塩劑ヲ加ル者屢回復メ用ヒ以テ不新
 適宜ノ通利ヲエセシムヘシ
 以瘰癧ニヨルヤ眼内ノ嫩膜若シクハ其脈絡ノ充脹スル諸症大抵復
 治セサル者無キト是余カ実験ニ由テ明ニ知ル所ナリ

人或以爲ラク眼嫩濁ノ諸症但こ皆偉切下劑ノ優ル者無コト虽
具學衰弱虛脱ヲ起スコト実ニサリハカラサルカ故ニ又恐怖セスハ
アラスト而シテ其衰弱虛脱ハ尤も想像病ノメ具害実ノ具本病
ノ長ク保続スルカ如キ太コキ者ニアラス余カコレノ視カ至弱ノ
真症ニハ殊ニ然ルコトヲ実験セリ

又此病ニ於テ或ハ血浮ノ量ヲタリ微ニシ全ク益ナシトスレ後ノ如キハ其
日ヲ同メ術スヘカラス若シ患者タリ則針ヲ忌嫌スルカハ浮血ヲ施ス
難ク而シテ病勢過度ニ太シカラサルハ偶具下劑ヲ少量ニ用ルニ回
テ減退スル者アリ然レトモ其切浮血ノ如ク迅速ナラス又其例一症
アリ之ヲ凡ニ罕ク

高貴ノ加コト其羊也ハ視カ至弱ニテ輕症ニカマリ来テ治ラ余
ハフ其来ル件久シク病メリ且ツ自ラ云フ曾テ抵用ニアル件重症
ノ間歇抵ヲ患テヨリ此病ヲエリリトハ則則ニ病メ
余之論スルニ蟻針ヲ直ニ下脈ニ吸知セシムキコトヲ以テス然レ他人ノ
之ヲ後テ益ナシトスル者アルト且ツ之ヲ蟻患スルノ太コキカハ再ヒ
来テ他ノ療治ヲ求ム

余是ニ於テ此ニテ唯下劑ノコト用テ切アルヤ否ヤヲ試ニカガニ夜ハ
カロメルヲ量ヲ用ヒ翌朝ヤラツバト純精酒石トノ峻下劑
ヲ服スルコト一週間ニニ回ナラシメ朝ノ服ヲ治コト此些々ノ蔬
食ヲナシカ所及ツトメテ鮮明ノ芝気ヲナクヘキコトヲ教ユ

右ハ白ニメ来ル其時限ノ感融著ク減退メ自ラ輕快ヲ覺フ余仍
テ同療法ヲ用ヒル一十日逐ニ強劑ノ支氣ニ向フト至ルヤノ如害
ヲ覺ヘサルニ至テ苦味劑ニ下劑ヲ施テ飲服セシメ収斂ノ魚眼
水ヲ与フ

疔名ノ誤認ヨリ其療法ヲ誤テ危馬ニ至ル者メナカラス何トナハ
視力至弱ノ名ニ拘テ其疔ヲ一部ノ弛緩若クハ衰弱ニアリトシ
ノ徒アルハシ又是故ニサシ以テ精カヲ強シ運動ヲ杜ニスルノ
劑ヲ与ヘ其眼ヲ洗淨スルニ冷水ヲ以テメ温湯ヲ禁スコ温湯ハ
弛緩セシメ冷水ハ收斂スレハシ
然レモ実験ニヨリ然ラス冷水ニ由テ輕快ヲウルト有ルハ只是一時ノ

輕快ニメ真ノ仮治ニアラス是其脈絡ヲ收縮メ融動極ヲ抑制
シ疼痛ニ女問ノ休ヲナシルノ故ニ其水ヲメ患者ノタユル
汗リノ程度ナラシメ其蒸漏ニ一朝夕十分收一收百千分ヲ一
加収ト云フ
餘ニ至ルハ患者愈快緩和ノ感ヲ覺ヒト久クテ眼内ノ感大ニ
輕解ス

余此病ニ温蒸漏劑ト眼上ニ施ス処ノ者ノ或ハ麝香粟米或ハカニ
ルニ或ハ白虎茶或ハハラーゲニトロースト詳或ハ迷迭香ホ
レ
ノ侵劑ナリ然レモ此諸藥實ニ切アル字キリテラ明ニスルトテエス
但ニ温湯ノ切ハ較著シメ實ニ缺クヘカラス只諸藥ヲ加ルト加ヘ
サルハ宜ク患者ノ推シヨルハシ

「シキタリス」ハ此諸薬ノ如ク忽ニ患フト勿レ其侵劑ノ実ニヨク
視瞻感納ノ強劑ナルヲ鎮靜減却スル「阿芙蓉劑」優ル者ニ
キメ曾テ此劑ノ害アルヲシテ「阿芙蓉劑」ハ佛ニ害ヲナスコト有リ
ト虽單味ノ温湯若クハ之ニ草葉ヲ加ヒ温蒸扇劑ハ固ヨリ此
ニ倖アル「」已ニ前ニ云ルカ如クト虽然「」モ又下ニ卒ル「阿芙蓉液」
具功カラ助ル「」ヲ実験ス但シ「シキタリス」ハ鎮痛ノ功カ
尤モ強大ナル故ニ之ヲ用ル件ハ取テ此劑ヲ用ル「」ヲセス

阿芙蓉液方

阿芙蓉 他碎者

雜腹瀉 各ニセ

燒酎以白酒良野酒
製者一多

蒸餾水七セ

右調勻シ密閉セル器中ニオシ「」六日「」過メ液「」ヲトル
此劑ヲ用ルノ標的ハ其鎮痛ノ功カニ由テ眼目感動ノ過度ナルヲ
試却スルニ在リ「」ナ「」ニノ眼ニ切アルヤ「」ニラ温浸劑トメ眼上ニ
施スニ筋疼痛ヲ日加シテ度ノ感觸ヲ鎮靜スル「」屢試テ知ル
所ニ「阿芙蓉」ノ切アル「」ハ古来皆人ノ用テヨク知ル所ナルカ
故ニ之ヲ贅セス

阿芙蓉雜腹瀉ニ味ノ治眼劑ハ古人モ徃々之ヲ用ル者有テ「
ルニユス」ハカ点眼水劑ノ「」唇中ニ「」嚙栗亮ノ倖切アル「」

ヲトキ又アアラニテ加テ用ルノ劑ヲセセリ

此諸藥ヲ取テ或ハ各別ニ用ヒ或ハ數種相配合メ用ヒ種々之ヲ試ルニ視カシ弱キニ於テハ一モ前ニ準ル阿夫客液ノ如キ傳功ノモノアラス又劑ハ之ヲ用ル右々時間ニ依テ眼中之病ヲ瘳ス

虽次テ必輕快ヲ覺ヘ眼ノ運轉自在ナルコトヲウレ又次劑ハ再歸燒酒ニ代ルニ白梅良斯燒酎ヲ以テセルガ故ニ太

夕緩ニメ刺戟スルコトノヤキヲコレ偶以劑ヲ用ルニ次テ淚液過多ニ流シシ微シク白膜ニ赤色ヲ發スルコトアルニ尋常ハ然ルト毎クメ其功ヲ奏スル者シ又其疾固

阿夫客液一樽ハ其劑中杏澤劑ヲ加ルト阿夫

客ノヨリ量テルト蒲桃酒ニ由テ刺戟スルト強ク

亦阿夫客液一樽アリ

亦アルコトニテ加ルニ由テ害アリ此ヲニ於テ其感觸殊ニ尤

些微ノ刺戟ニモ難堪者ハ此劑ヲ用ルニ宜ク戒慎メ注意セサルナリ

今其法ヲヒニ示ス患者ヲ仰以セシメテハシク頭ヲ高フニ眼

ヲ閉サシメ此液又許ヲトリテ内資ニ注キ頭ヲ傾ケテ兩眼ノ間ニ

流シメ眼瞼ヲ上下ニ動搖セテ其内ニ滲入セシム但シ其瞼ヲヒラキヤ

宜シク戒慎注意メ急卒ナラサラシムヘシ

又駝毛ノ筆ヲ以テ施用スルノ法アリヒノ如シ

医一子ノ兩指ヲ以テ輕ク患者ノ下瞼ニメ押下シ以テマシク反張セシメ他キ筆ヲ取テ其液ヲ浸シ横ニ其内面ニ引キ直ニ指ヲ

故予年々如く困すに云へし

如此ノ法ヲ用ル者ハ是唯角膜ノ刺戟ヲサレニカガナリ而メ
此西法ヨリヤ其液ヨリ眼球ノ前面ニ普達メ疾スルナリ

余カ此液ヲ用ルヤ其量ノ多クナリトテ直ニ角膜ニフルニ非レハ未嘗テ
一モ疾戸刺戟ヲ起ス者アルヲリス

人或云ニ余カ此液用法ヲ示スヤ実ニ唯蛇足ニ屬スルノこと然レモ余屢
其用法ヲ知ラサル患者ニ此劑ヲ与ヘ彼自ラ眼ヲヒラキナカラ角膜上ニ

滴入シ由テ以テ疼痛増進シタニ其功カラ害スルヲナカラル故ニ其
スル者ナリ

其病日時ヲ経ルル太リ久キ者ニ於テハ屢前ニ示ル所ノ指法

法切ヲ奏セサルコトアリ

如此非常ニ頑固ナル病ニ在テハ皮ツ浮血下劑ヲ用テ芟菁ニテ頭
上耳位或ハ眉中ニ貼スルニ其刺戟回耐毎クメヨク津液ヲ滲サセシ

ムルカ故ニ眼ノ病勢ヲ奪フヲ以テ偉功又毎ビナリ

余カ親友曾テ習字ヲ研精メ夜學スルノ太キヨリ此法ヲエテ因
苦スルト曰サシニ匠之ニ強壯劑ヲ用テ久日更メス疴候ニスル増

進ス是ニ於テ彼其匠ノ瘡由ラステ自ラ久ク暗室ニ入り二月間
カハス芟菁ニテ背ニ貼メ愈ストナク回テ以テ遂ニ全治ヲ
得シコトアリ

○天

〇第六編

〇命点眼水

世に眼目ニ外用スル薬方及瘡法ヲミルニ膠漆ヲナス者太リマナ
カラス故ニ余今ホソシ人ノ老疾ニ憑テ論説ヲ改テ以テ字者ニホ
サントス

夫レ眼破傷ノ初発ニ於テ收斂性ノ洗劑ヲ用ルトハ世人ノ一般ニスル
処ナリト雖大ニ膠漆ヲナス故ニ破傷疼痛兩ツナカラ共ニ劑シク増
進ス然レモ其初発ノ時限ヲ述テ右ニシテ用ルルハ必ス其俾切アル
ヲ以前ノ害ニ反スル者ナリ

眼破傷ノヤキク時自ラニテ強壯劑適宜ノ特ニ用ルガ故ニ其印カ
奇俾ナリトラタル者ナリ

世又ニテ醫布トメ用ルルハ害ナシトス然レモ余自ラ眼破傷ニシテ用テ
其印ヲ強ル者アルヲミルニ太リマナカラス或ハニカカニ腫脹ヲ角膜
ノ膜間ニ發メ不透明トナリ不治盲ニ陥リ或ハ角膜ノ急性ノ腫瘍ヲ
發シ破裂メ蒲桃膜腫脹セル者ホアリシテ總ルニ眼劑ハ其時限ニ注
意セスメ安ニシテ用ルルハ必治ノ症ヲモ不治ニ陥ラシムル者ニ豈或メ
ナルハケニヤ是故ニ余白如クノ瘡法ヲ行テ不害ヲ請言リ寧ク其手メ
其眼ヲ全フセヨ

凡ソ收斂性ノ眼劑中其功效最ニ如ク者ナシ故ニ若ク眼破傷ハ其部ノ弛

和断

弱ヨリ登スラノ臆新ニ由テ收欬劑ヲ適当ニトスルハ眼劑ハ唯
 是一事ニメ足ルヘシ然レニ屢実験ノ以テ之ヲミルニ先ツ^{排泄劑}
 ヲ用テ血絡盈脹ノカラ減スルニ非ハ必ス害有テ殊ニ視力至弱ノ
 症ニ尤モ然ルコトヲミル
 若シ收欬劑ヲ用テサレテエナル症アルハ余ハ唯其血脈ノカラ減メ
 疼止ラ鎮メ置テヨリ收欬ノ功アル者ヲ与フ即チ^{是ナリ}
 鈹糖一々 右様花水一多ニ溶シ蓋錫錯ニ清テ加テ清澄ナラシメ用
 ルニ當テ又并テ一ハ蓋ニ入レ且蓋ヲ沸湯中押シ温メテ以テ用ヘシ
 〔连接花水ハ大抵清膏水ト同シ今用ヘキハ蓋錫酢仁様ハ固シ
 前ニ言ヒ如リ冷火病ハ大害アリ已蓋蓋氣化ノ以欬ノ閉塞

眼球上面ノ血ヲ馳逐メ以テ充脹セル内部ノ血絡ヲメ益ク充脹セシム
 レハナリ
 若シ之ヲ用テ却アルヘキコトヲ察スルハ宜クヨク數次回返ノ之ヲ用ヘシ
 世ニ魚眼水ノ種多クアリテ其製造種々アリ或ハ酸化金屬鈹^鈹
 酸^酸ヲ製シ或ハ刺戟解疑メ却アル散^散ヲ以テ之ヲ製シ或
 ハ或ハ液^液ヲ配合メ之ヲ製ス然レニ夜^夜柔^柔偶々各自ニ之ヲ見ルハ
 清澄透明ナレシヲ合スルハ飽和メ其性ヲ衰ヒ重濁ノ液トナ
 リテ或ハ全ク功カラ失スル者アリ
 世ニ一般ニ鈹糖ヲ常ニ溶メ魚眼水トスト虽其液烟濁ニメ鈹^鈹
 手クハ速ニ沈シ石灰状ノ沈下ナルモモコノ粗糲ナル沈下眼ニテ角膜

又印カ高才之ニ優レト所ノ下アリ

録香油一升 蒸餾水一斗

右ヨリ混和シ醋三升ト燒酎半升ヲ加フ

又下

刺必斯印散刺那刺斯 半升或一升 蒸餾水一斗

硝石精 半升或一升 右調勻強壯性前ノ下ニテテラス

此諸点眼水ハ皆宜リ日ニ三四回用スルヲ佳トス

〇第七編

〇論刺症除去右之療法

視力之弱病ノ原因ト療法トニ年ニシテ檢定セリ然レテハ

ホスキアリ且眼力之衰ハ始善ヲ覺ル間ハ患者ノ作廢精カト且症候ノ微是トシ從テ少量ノ熟食ヲ野酌ノ手ハ全ク刺戟有寧ノ飲液ヲ禁スルコト

然レニ已ニ眼力強壯性ノ弱ヲ外用スルノ時限ニ至テハ宜ク直ニ療法ヲ轉メ強壯劑ノ食料ヲ用ヒシメ若クハ強壯劑ヲ内服セシメテ之ニ宜シク身休ヲ遠征ニ運動セシメ冷浴若シクハ海浴ヲナサシメ十分ノ沐浴ヲ得ルコト尤モ要ス

眼目乾燥スルコト太クメ眼室内ニ痒キ因直ヲ覺ルコトアルハテキタリスキノ嚏刺スルコト若クハテキタリスニ葉細末ニ味ホ命ノ嚏刺大ニ挫快ヲ覺ルコト者シコトヨク鼻所膜ノ分泌ヲ催

ナルハ施スルノ療法違フノ功ヲ奏セス
且ツ其病尚ス日ヲハルヘト由シカラス其日唯習慣守ルノ過度ノ支
氣ヨリ發スルノミナリト大母ノ遺毒アルニモアラス又前々ラレハ眼病ア
ルニモアラサルハ唯其毒發ノ日ヲ除去スルノミナリト十年ノ後治ラウ
ル者屢コレアリ

余頃日一少冊子ヲ得テ之ヲヨムニ例トスヘキ者ニ疔アリ疔ヲ以徴トス
一女子故ト由舎ニ生レ故有テ都下ニ移ス疔眼内疾疔ヲ發シ視力
減耗シ其疾疔石壁ニ反映スル日支ヲコレ毎ニ必ス増進スコレ其
患者ノ患トス此所ノ者即其病ノ本因ニ何者其眼故ト郊野ノ瘴
ヲタルニ慣レシニ今始テ都下ノ石壁ニ映スルノ日支非常ナルヲ

ヨリ發スル者ナレハ故ニ窓前ノ小檜樹ヲ植ヘシメ返照ノ支氣ヲ
遮リ掩ハシム其眼疾ハ盲タラントセリト雖唯此一節ノミナリ他ノ
瘴法ヲ施スト毎ク卒ニ全治ヲモリ

若シ其疔ニ於テ其源ヲコレト毎ク患者尙久レク支氣ニ是ハ觸セハ
其血ノ眼内ニ衝スルト益ニ是ノ卒ニ以書ノ始ニ瘴ル如キ瘴療
法ヲ尽スニ非レハ治ラユサルニ至ルハコレ所ルヲ幸ニ早ク支氣ノ是ハ觸
ラサレシカ故ニ後治ラユシ者ナリ

一儼者果シルニ此ノ地ノ北西ニ住ス其居室ニク日中ノ支氣ニ向イ
右室ハ窓外ニ高墻アリテ室内太リ暗シ彼室ニ入室中ニ昏冥
コレ只食時毎ノ前室ニ出テ鮮明ノ支氣ニ向フ

且視瞻漸ク衰弱ノ眼ヲハス疾疔ス故ニ彼自ラ眼鏡ヲ用イ
 眼科医ニ謀テ療治ヲ用ニテ切テ而メ其症常ニ前至ニシ
 ル殊ニ日中ニ於テ増進スルカ故ニ自ラ其目ノ光アルヲ察シ
 速ニ居テ他ニ移レテ且ツ場下ニ昏浮スルヲ去ク是レ由テ其
 治セリ
 又字者ノ尤モ憶フヘキ例ニメ世人皆其トヲ知レ其理ヲ知ラザル者
 アリ往々我部下ノ衆馬盲トナル者太リテ其ト當特ノ人以為是
 レ其眼ノ暗処ニアルヨリ発スル者之暗ハ眼ヲ害ス宜ク明処ニ移ス
 ント逐ニ去メ右盲馬ヤレ其利今ニ施及セリコト即慣レザル
 支氣ニフレテ其眼ヲ害スルニ由ルヲスヤ而ルヲ去ク

ラスニ吾徒ノ人モ亦知ラスメ意ヲ以テ用ヒス自ラ眼ヲ損害スル者
 多キハ何ソヤ
 如キノ不意ノ由ヨリメ視カニ弱シラウテ或ハ全ク明ヲ失スル者
 太リヤナカラス
 而メ其トナシ生シ劣メ治シ難キカ故ニ杖臺モ視瞻ノ害アル
 ナ覺ル所ハ且ク配意戒慎メ儘クモ眼ノ害アラトスル所者ハ
 カ所及恐レサクヘシ
 向ソ視瞻ヲヨクノ保持セトスルノ徒ハ読書習字針縫ハ其他ヤム
 ラエスメ微細ノ支氣アル者ラコレトアル所ハ務テ其明ヲ遠直メ
 強カラシメス弱カラシメス殊ニ暗明急卒ノ交換ナカラシムヘシ

身夫弱之ノ害ハ強之ノ害ニ比スハ大ナク只其害不明ノ処ニ
 視カヲ弱メ物ヲ見ルニアルノ如ク強之ノ害ノ具害ヲ久ク或ハ
 全ク明ヲ失セシムルに至ルナリ
 視力差弱キ人ト云フ件ハ或ヨリ慎守スル件ハ生涯尙才十分ノ
 明ヲ有ツヘキニ或ハ之ヲ守ラス加之黄昏ノ件ハ
 者テトヲナシ終ニ早ク明ヲ失フ者ヲ云フ可ク不慎哉
 然レニ患者去テラスノ間新ナク其眼目ヲ使ハサル可ラサル件
 ハ宜ク明暗共ニ過度ナラサル室ヲ扱ヒ且ツ具ヲナス間施ス
 所所謂御鏡ノ用ヘシ緑鏡ヲ用ルルハ其由テ來ル所久メ具
 眼ニ利切アリトスルト実ニ古来一般人ノ云フ所ナリ

夫レ春日輝野ヲ望ムト夏日ノ破地を日ノ雪中ノ反照ニ向フ
 ト眼中ニ覺ル疾快其レ疾レカ優ル矣ノ草木ヲニテ緑色ナラ
 シムルハ是レ造物者ノ賜ナリ
 然レニ縁ヲ此ト縁ヲ母實テ此ト大ナル別アリ學不可不知ニ
 今縁鏡ヲ用ルルハ即縁ヲ此レシ以テヨルヤ其物色較然リヤル
 カ故ニ視カヲ費スト実ニ白鏡ヲ用ルヨリ大ナル疑トナシ
 且ツ之ヲ除キ去ルニ当テヤ眼ニハルノ光氣度ヲ違フト又大ニ
 ナカラス
 猶且ツ之ニ加ルニ今用ル所ノ縁鏡ハ其面ノ凸ナルカ為ニ光線
 ナ眼内ニ聚入スルヲ手メ視瞻ヲ害スルト余自ラ屢試テ明

ニ知レテ之
 是故ニ眼鏡ハ唯赫灼ナル日支ノ劑甚ナルヲ掩フノ器ニ付ル
 足ルノ器トモ是ニハ相宜ノ器アリ何ソ付用ノ者ヲ求ル
 ナセニ
 唯其眼過度ノ刺激非常ニ視カラ賈ストヨリ真ニ衰弱スル
 ノ已是ナル者ニ於テハ以テ眼鏡トス
 向ノ視力之弱ニ付テハ眞病ニ於テ用フヘキ眼鏡ニ宜ク用ル
 ニ於テモ之ヲ去ルノ向ニ於テモ些々ノ疾戸モ発ス又疾戸状
 ノ感觸ヲモ起サル者ヲ佳トス
 總テモ之ヲ大ナラシムルノ鏡ハ用ルルヲ禁スコト具銅膜ハ感觸

過度ニメ光線ノ強ク聚合シ來ルニ堪ヘサハ是故ニ余ハ唯
 平面ノ白鏡ヲ以テ云フ

近來視学家亦一種ノ眼鏡ヲ發明ス之レ綠白ニ鏡ヲ用ル者
 ニメ其製巧機ヲ尽シヨリ劑甚ノ光輝ニ向フニモ疾戸太キ
 眼ニモ些々ノ妨害アルト云フ

此層ノ著ヤ余自ラ実験シ考據スル所ノ者ヲ以テ廣ク學者
 ニサント欲スルノ老眼ニ付リタルニ近頃聞ク弟七枚ヲ鑄行メ
 セルヨリ以來四方ノ學者幸ニ取テ信用スル者サント余カ歡
 喜宣偉ナラニヤ

學者ヨク此層中ニ記載スル所ノ症治ト経験ニ由テ參考ス

夫セハヨリ眼病治療ノ誤謬錯舛ヲ免ルコトヲウヘシ
ハノ眼疾ヲ療セトスル中ハ常ニ必ス精詳ニ注意メヨク候源
因ヲ穿鑿メ以テ治法ヲ得テラサルトヲ要スヘシ

夫レ他ノ諸病ニ於ル程治ハ尙才早ク其法ヲ改革メヨクカラサ
ハ幸ニ後治スル有レハ眼疾ニ至テハ一ト其治ヲ得ルコトアルハ生
活不治ノ疾ニ陥ル者具例メナカラス學者之ヲ慎メヨ

此書ヤ実ニ其論說狹隘シト虽古今未ク全備ノ医学ニ於テ思
クハタニノ缺ヲ補フコトアルヘリ且又世人眼疾ヲ患ル人ヲメ毎世
ノ庸医販医ノ徒ニ具眼ヲ奪テテ危險ヲ招クノ災害ヲ免レ
ルムルニ足ラン

視力之弱病論終

天久元年三月十四日辛酉東浦山人曾取山此抄

老人ノ疾ニ^否ヲ以テ無^キトモアリ良シ老人ニ在テハ否
ノ象カ具^ク当然ナレハナリ又老^ニ當^ルニ^重坤ヲ以テ益^ヲ俾^ト見^ルコ
トアリ是モ坤ハ太陰ニメ老^ニ當^ルニ^重坤ヲ以テ益^ヲ俾^ト見^ルコ

向^クテ^乾之^卦ニ^乾カ^坤カラ告^ケテ^ハ必^ズ驚^危ノ^兆トス
向^クテ^乾ノ^疾ニ^乾ナ^トニ^師豫^比剝^ホノ^一陽^五陰^ノ陰^ノ裏^卦ヲ^得タリ

トモ必ス^シモ^ク兆^凶トスヘカラス是^レモ^ハ坤^地脾胃^ノ中^ニ陰^ノ毒^ア
ル^{コト}ヲ告^ケテ^ハ者^ナリ具^一陽^又ノ^上下^{セル}ハ^且毒^ノアル^所ニ^ヨル^ニ
故^ニ下^劑ヲ^早テ^効ヲ^得ル^{コト}ナ^カラ^ザル^ナリ又^重坤ヲ^得タリ

リトモ并^ク尽^ク凶^トスヘカラス脾胃^ノ食^毒ハ^重坤ヲ^以テ^告ル^{コト}
アル^ハナ^リノ^又ハ^覺ノ^ミハ^限ラ^ス大^人ニ^重坤ヲ^得タリ^モ亦^尽

凶坂トスガラスナリ。曰。脾胃ニアル者ハコレヲ疎通メ愈ユルハ凶ノ
 告ケニ坤ヲ以テ示シモフナモ有レハナリ。良卦ヲ以テ脾胃ノ
 凶ノ卦トシテ重乾ヲ得タルトモ亦凶兆トセサルコトアリ。其重賦ニ陽氣
 偏勝シタル人思慮過度ナルハ重坤ノ卦ヲ得ルコトアレハシ
 凶ノ怪症ニメ明夷之象ヲ得タルハ必ス速ニ愈ユルキ象トス。曾熱
 タレハ石運黃連ナトヲ以テ解熱スルハハ陽變メ乾トナリテ又大
 地天泰ノ象事ト連ニ復スルト云フノ義ナリ。又大
 疔ニメ此卦ヲ得タルハ是レ必死ノ凶兆アリ。コレ陽ノ心坤ノ太陰ノ下
 消テ乾ノ元トナルト。凶ノ幸否豫師トシテ費ノニ卦ニテ塚墓
 云ノ凶兆ナリ。ノ卦ト称ス是ヲ以テ太陰ニメ此六卦ヲ得タルハ危ツ谷易ナラサル
 知ルヘシ又明夷。盡。逐。漁。解。睽。夫。革。鼎。訟。トノ十卦太陰ニメコレ

得タルハ危ツ卦名ヲ以テ不吉ヲ知ルヘシ。既濟未濟ノニ卦モ
 難治ノ兆トス。解毒ノ物ニ附テ用ルル吾門ノ秘ナリ。又主トメ附子
 ヲ用ルルモ必ス大黃ヲ加ルナリ。又解熱劑ヲ主トスルハ石運。芩。連。ナ
 ト主タルト勿命ニメ必ス大黃ヲ加テ引導ノカラガ為ルルコト秘
 傳ナリ。又附子主トメ用テ其功不見トキニハ必ス石運ヲ加
 加フヘシ。又石運ヲ主トメ用テ功ナキハ必ス附子ヲ加テ其功
 ノ如キ者ナリ。

痘瘡

痘瘡ニ本卦ニ泰ヲ得タルニハ危ツ危篤ノ告ケトス。尚其之卦
 ヲ見テ野酌スルト勿命ナレトモ危ツ本卦ニ泰ヲ以テ告ケ玉フコト

業大已十分ニ骨作ラ焼キ升ルノ垢燻テルノ卦象タレハ氣早治術
有ルコ無シトヌロ傳○

梅毒空白

ハソ病入且外症及四疹ノ上テ何トモナ名モ決定シ難キ者ニ逢
テ是ラ空メ盡ラ得タル者ハ是梅毒ノ象タリ又飯妹ヲ得
タルニ梅毒アリ感モ亦然リ

清芝院口授

ナリ

本草綱目



150
5216

天
宗
卷

