

視力之弱論

完

視力乏弱論

第一千八百十六年發行

暗厄利亞

和蘭

備中

第一篇論視力乏弱之證候及原因

允ソ此症ハ外ヨリ見テ以明カニ診スルト甚難

シ何者結膜ノ脈絡盈脹スルヲナリ毛腺脈原合

ルキリル蓋ニ緑ニ在ル腺也 眩明カニ變テ見ワカハル毫毛

損傷ノ見可キモノ無ケレハナリ〇唯此病ノ明

徴トスヘキ症候ハ眼目ノ知覺甚敏捷ニ先氣

訣稿

訣註

凡テ外来ノ刺戟ニ堪ユルヲ得サル者也○即
其病光氣赫灼タルモノニ向ヘハ乍々疼痛スル
ヲ殊ニ甚シク其疼痛処眼底ノ一部ニ在テ牽張
壓迫因重ヲ其疼痛ヨリ此ヲ推セハ殊ニ其増ヲ
覺フ故ニ光氣明亮ノ室中ニ在片ハ其病益増進
ス○患者此力為ニ光線ノ正直ニ来ルヲ避ント
ノ知ラズ自ラ聲ノ或ハ手ヲ前頭ニ置キ半閉ク
睜ヲ以テ物ヲ視視ス

註 スウ作テ了因ノ人其地ニ氷山雪野常ニ此
レ有テ其反光ノ劇甚ナル力故正視スルヲ能

ハス皆視ノ癖アリ其状殆ニト此患者ト一般
ナリ患者讀書セシトシ若クハ微小ノ者或ハ
光輝アル者ヲ見ントスル凡ハ視瞻速力ニ其
手トナリテ錯乱ニ次テ疼痛牽張ヲ發シ以テ
速力ニ其支ヲ療セサルヲ得サルニ至ル
○虹彩ノ運動モ又最モ敏銷ニメ光線網膜ニ徹
スル片ハ瞳孔直ニ縮小スルヲ甚シ是レ又流液
缺損メ乾燥スルヲ了リ然レモ甚々稀ナリ
メ多クハ涙液分泌丈ニ増進スル者也凡ソ此病
ヲメ誘發セシムル所ノ遠因ハ假令必シモ常ニ

皆然ルニ非スト、虫に大卒全身ノ衰弱ナリ。〇是故ニ此病ニ罹ル所ノ人ハ病後及ヒ筋織維ノ弛緩セル人ニ最モ婦人ニ多シ。〇凡テ眼嫩衝ハ急性ノ者緩性ノ者ニ拘ラズ、治後必ス僅微ノ刺戟ニ逢フト、虫に忽チ此病ヲ榮シ、易キノ癖ヲ残ス、其他久シク眼ヲ劇甚光氣若ク、反亮ニ暴触シ、或ハ讀書シ、或ハ微渺ノ物品ヲ見テ以テ強ク眼力ヲ費耗スルハ、ミナ此病ノ因トナル。

註 予自ラ実験スルニ、麻疹痘瘡ヲナシテオ
 一ダオニトステリキニ、
 一ク眼嫩衝モ又治後

ヨク此病ノ因ヲ残スト、屢々之ニアリ、視力之弱病ノ近因ハ予カ按ニ由テ之ヲ見ルニ、是眼目一部ニ限ルノ衰弱ニ非ス、却テ網膜ノ感觸非常ニ増進スル也、而シテ其感觸増進ハ網膜若クハ脈絡膜ノ嫩衝ニ由テ其脈絡ノ盈脹スルヨリ榮ス、且ツ其兩膜ノ中、美レ刀ニ膜ニ嫩衝了ルトキハ他ノ一膜モ又夕必ス免ル、言テ得ヤルカ故ニ此病ニ於テハ大抵兩膜共ニ嫩衝スル者ナリ、夫レ寒冷ノ氣ハ健康ニ肺藏ニ吸入スレハ、

少其運動ヲ催進スト虽若シ肺臟嫩衝スル寸ハ
咳嗽ヲ發シ刺戟ヲ増カ如ク光線モ又々適宜ノ
量ヲ以健康無恙ノ微スルハ毫モ害ナシト虽ト
モ若シ細膜嫩衝スルカ或ハ然ラズ牽張シテ動
シ易キモ此ニ抵触スルハ乍午門重ニメ侵蝕ス
ル如キ感覺即視力之弱ヲ發ス是レ其光線ノ刺
戟血液ヲメ既ニ盈脹セル脈絡ニ衝入セシメテ
益々盈脹セシムルナリ○日常ノ實驗ニ由テ之
ヲ見ルニ身体ノ部刺戟ヲ受ルナラズハ諸液
爰ニ衝動輻湊スル者也○又々引スルレ之各ノ

説ニ云ク凡ソ諸液度ヲ差テ一部ニ盈脹スレハ
多ク其体質ノ虚弱ナリニ由ル者也ト○又々生
活活体ノ纖維張スルナラズハ統テ將ニ如何ノ症
ヲ發セニ正ニ是疼痛ニアラスヤ而メ疼痛ノ強
弱ハ必ズ其質纖維ノ剛柔ト其部感觸ノ銳鈍ニ
係ル者也學者茲ニ件ニ由テ以テニ夫セハ朋カ
ニ能ク此病ノ本性ヲ察スルニ足ルナリト云
視力之弱病ノ真症ハ實ニ細膜ニ於ケル緩性嫩
衝病ナルト亦内部頭水病ヲ初發ニ於テ光氣ヲ
忌避スルノ症ヲ發スルヲ以テ確微ト云可ク之

病頭ニ水ハ其始眩暈ノ燄衝ヨリ發スル者ニメ其
燄衝視神全ヨリ網膜ニ施及スト至其始ノニ於
テハ少モ眼ニ燄衝ノ候ヲ見サス筈膜ノ脈絡盈
脹セズ實ニ坎扁^ノ始ニ奉ル諸症ト分明ニ其致
ヲ一ニス〇白内翳ヲ剔ヤセルモ^毀千傷フル也
アルニ由テ深ク眼内ニアル所ノ膜ニ緩性ノ燄
衝ヲ起シ由テ以テ屢々發スル所ノ視瞻妨碍ノ
症ヲ以テモ又々坎病ノ本性ヲ明徹タルヲ得可
^註サウニテ^ルス^ルカ^カ曾^テ發^明セル^所ノ^白内^翳
方術ハ古未嘗テ在ル所ノ者ハ大ニ異ニメ

ク如坎キ危害ノ症ヲ免ルニ適當ス予自ラ
屢々之ヲ試ルニ一モ其効ヲ誤ルコトシ〇^トス
ニヘニリ^ニ著^者ヲカ^白内^翳ノ著書ニ^テウ^ニ
テ^ルス^ノ尺^牘ヲ載セタリ其言ニ曰予カ術
ヲ施スヤ其始メ先葭苕^{原名ハルテノ溶液ヲ}
用テ十分ニ瞳孔ヲ開カシメ^ハル^リル^ス也
列^テク^ル置^棧若クハ自己ノ指ヲ以テ其眼ヲ
保持シカ所及運轉スルヲ莫ラシメ而シテ后
ニリ^ノ術ヲ施ス而^テ其針ヲ入ル^ノ目的ハ先
ツ唯水具ト囊ト水具液ノ前面ニ施テ截開ク

ニ在リ而ルニ水是液ハ其中央凸起スルカ故
ニ必ス少シク水是液ヲ貫カサルヲ得スト
虽トモ心ヲ用テカ所及ニ其針ヲ囊ニ近接ス
是故ニ針ハ最モ鈍クハ偏ク而カハアル者ヲ
要ス実験ニ由テ之ヲ見ルニ「シカル」人等カ
用ユル所ノ針ノ如キハ水是体液ト囊トノ
ヲ押シ動カスノミニメ刺貫スルヲサテ却テ
坎ヲ虹彩ニ逼血セシメテ能ク嫩衝ヲ免スル
ト多ト虽予カ用ユル所ノ針者鋭ニメ至剛ノ
水是体モ能ク刺貫スルカ故ニ未タ如坎ノ害

アルヲ見ス而シテ水是液実體ノ方術ニ至テハ
此ノ宜ニ隨テ針酌ス稀ニハタシ其實質ヲ載
破ルノミニメ下スルヲ要セサテ在○針
ハ宜ク毛様靱帯後一分許ノ處ヨリ剛膜ヲ貫
ヒテ水是体ノ上部最モ柔軟ナル所ニ達セシ
ム可シ水是囊ヲ載分ツ可キ症ニ在テハ間ハ
ヨク其囊ノ実質已ニ自ラ溶解スルヲアサ而
レモ其囊ハ何レノ症ニ在テモ必ス載分タス
ニハアラス○先天ノ白内翳ハ通例水是液実
体ハ胎内ニ在ヒ已ニ自ラ脈絡ヨリ吸収取テ

ル、モノニ予カ状症ニ施ス所ノ方術ハ前ニ
拳ルモノト異ナルヲナク其主トスル所ハ唯
其醫ノ中央ニ十分ノ孔ヲ開テ光線ノ射入ニ
妨碍ナカラシムル手或ハ其醫ノ水良液中ニ
溶解消散ス可キヲ預メ察スル眩ハ状ヲ微
塵ニ破碎スルニアリ故ニ状方術ハ状前ノモ
ノニ比スルニ針ノ運轉作用甚々容易ナリ以
テウニノ尺隨[○]ステヘニ^フニ^人状法ニ從テ方
術施スト虽稍差フ所アリ即チ術後醫ノ吸収
遲鈍ナルモノハ^ハ刺戟^劑ヲ用ヒ運動ヲ益シテ

新其吸収ノ力ヲ強カラシムルト其針ヲ短クメ
針^細ヲスルト是ニ此針ハ近傍ノ部ニ毀傷疼痛
ニ^ハ嫩衝^ヲ起スト益稀ニメ且其本ノ^四多且ツ大
期キカクメニ其針ノ周圍少シモ^間隙^際無ノ水膜
液盈チ硝子液ノ溢出ヲ防ク然レモ針毛又
甚々至厚ナル囊^醫ヲ截分ツニハ尚未タ十分ナ
ラサルカ為メニ彼レ自ラ又々一種ノ^細ユヲ
發明ス其刀ノ長ハ一許ニメ半ハ以^端曲レリ
リノ曲レル方四分許ノ間ニ又^ヲ設其幅大抵
五厘許ニメ本ニ至ルニ從ヒ漸ク大カラシム

○「ハ」ルリトルスリヒテル前ノ製元又々少シ
ク衰メ其眼瞼ニ抵ル処ヲ大ニシ一部ノ壓迫
ヲナスコトヲ少シク眼球ノ保持益々堅固ナラ
シム

右件ノ論ニ由テ此ヲ見ニ視力之弱病ノ原因ハ
眼内ニ於ケル一膜ノ嫩衝乎視神至ニ依眼ノ網
膜ニ被及スル所ノ脳間嫩衝ニメ皆其症ノ外部
ニ見レサル者ニ至劇ノ光線モ又々眼ニ入テ同
種ノ症ヲ起スモノ手將久然ラサル力下條ノ解
説ニ由テ之ヲ見ヨ過度ノ光線實ニ網膜ノ脈絡

ヲ盈脹セシメテ以テ疼痛嫩衝失明等ノ症ヲ起
スコトハアル也未詳蓋シニ就テ明力ニ微
スルニ是○其眼ハアルレハ眼ノ感觸最モ敏銳
ナルコトハミナ人ノ知ルトコトニ是其眼中黒
液ノ棄カ故ニ光線ヲ吸収スルコトナク直ニ剥露
セル網膜ニ暴觸セシムルニ因ルコト疑フナシ
○コレカ為ニ光線非常ノ射入唯ニ疼痛ヲヲコ
スルコトナラス血浴ヲ盈脹スルコト愈々増進メ遂
急旨源各トシトシテ急昇スルニ至ル註アリ
ユメシバツ各トシトシテ急昇スルニ至ル註アリ

彩及亡瞳孔内ニ紅色ヲ見ハノ其感觸甚敏銳ナ
ルモノハ黒粘液ノ全ク缺乏スルニ由ルモノニ
○其書中又々「ホニ夕エウスノ説ヲ引テ曰ク一
盲者其眼ノ内膜黒粘液缺乏ニ由テ其感觸劇ノ
光輝ノ刺戟ニ堪ヘヌメ癸セルモノヲ見タリト夫
砂地多キ南方ノ国及ヒ白雪ニ掩ハルニ北赤ノ
地ニ於テ盲者ノ殊ニ多キハ又是日光及照ニ由
ニアラスヤ其眼ノ内膜黒粘液ノ全ク缺乏スル
ニ由ルモノニ由テ其感觸劇ノ光輝強キ物品ヲ視
止ムルヲ不能トシテ得
光ノ力ヨリ眼ニ至テ大害ヲ受ルノ最モ明ナ

例

ルトスヘキ物ハ東国ノ盲人也下ムリシ人
曰坎地ノ人六日光ノ高ク眼上ニ照スヲ避ケシ
刀若ニ下視メ却テ更ニ水気ノ蒸外ト劇ニキ
及照トニ其眼ヲ損傷セラレトモナリト○
赤道下ニ住ム所ハ至細人ハ昼間瞳子ヲ眼瞼
内ニ隠メ唯白膜ノミヲ見ハス力故ニ砂上ニ映
スル日光ノ及照ニ其眼ヲ害セラレヌ又白雪
多キ北地ニ於テハ盲目ヲ以テ常病トス又二
キセノボシ人ノ話ニ曰クセイリコヌタル人
曾テ軍靴ヲ他国ニ送ル片断深雪ノ山中

ヲ行カシメ軍卒ミナ白雪光輝ニ其眼ヲ侵サ
レ或ハ全ク明ヲ失セルモノアリト是故ニ意
ヲ用ユル旅客ハ劇キ及照ノ眼ヲ害スルヲ防
カニカ為ニ常ニ粗絹ヲ眼上ニ掩フ

第二篇論視力之弱病与他病之區別

曰ホカラテス^{各人}カ所謂ル^{各人}アムコレイオスモス
アタ^{各人}ト^{各人}区所謂アル^{各人}ウ^{各人}ス^{各人}カ所謂ル^{各人}ロシ
ステ^{各人}ヒリスブル^{各人}ハト^{各人}レ^{各人}ヒシユスヘビ^{各人}チ
止拂良斯人カ所謂^{各人}ヨ^{各人}コ^{各人}ニセイハイケ^{各人}レツ
セテ^{各人}ラ^{各人}ヒス^{各人}ラヨ^{各人}ヒマ^{各人}フ^{各人}ハイセ^{各人}等^{各人}ハ皆^{各人}扶書ニ論

スル処ノ視力之弱病ト同一ノ病ナリ視力遲鈍
スル^{各人}ト甚多キ^{各人}カ故ニ今此兩病ノ區別ヲ明カニ
解脫セサルヲ得ス○瞳孔散大メ強烈ノ光輝
ニ逢フト虽モ運動甚微ナリ或ハ全ク終セズ然
レ散ニテ別ニ光輝ノ妨害ヲ覺ス^{訣者^{各人}特ニ^{各人}組膜}
ナル症ニ於テ瞳孔散大スルモノ有テハ光輝ノ
妨害最モ甚クメ實ニ耐忍^{各人}フ可カラサルナリ
○此病ハ大抵中年ヲ過クル人ニ多ク且ツ眼鏡
ヲ過用スル乎若シクハ誤用^{各人}之ニ兼ルニ身体
衰弱セシムル人因アルヨリ發明メ其病通例固
庭ニ止ル^{各人}ト久シ^{各人}而セ^{各人}レ^{各人}症ニ由テ^{各人}間々^{各人}又其増進

甚々速ニメ早ク十分ノ盲眼トナル者アリ此病
視カ鈍ノ療法ハ諸家種々ノ論説有各々相違ス
ト也今爰ニ一々枚挙スルニ違アラス○其療法
ノ最モ知テサル可カラサル者ハ患者ハカ処及
静止ナラシムト此病ヲ誘發シ易キ諸因ヲ遠サ
クルトナリ○予自ラ実験ニ由テ之ヲ見ルニ此
症多クハ難治ノモノニメ予カ此症ニ用テ効ヲ
得ル処ノ療法ハ眼目一部ノ刺戟ナリソノ法ハ
即チ越列吉的兒尾甫把厄亜的兒及ヒ蕃椒浸劑
或發赤劑ヲ眉ニ施ス等之類諸劑ヲ以テ真ノ視

カ乏弱病ニ施スモハ唯ニ功無ノミナラス或ハ
却テ至害ヲナスアリ○内服劑ハ水銀劑ヲ用
テ吐涎スルニ至ル兼テ血兒厄加及ヒ鮮凝ノ諸
薬ヲ与テ屢々功ヲ得タリ○又々西面凸起ノ眼
鏡視瞻ノカヲ助ク

註子曾テ實ニ真ノ盲眼モトス可モノヲ真ノ視
カ遲鈍病ニト察メ越列吉的兒及ヒ尾尔把厄
ヲ施シ以大ニ功ヲ得ルアリ○或説ニ云ク
盲眼ノ種視神全ノ麻痺ヨリ發シ其麻痺々々
腸胃ノ汚物ヨリ波及スル者アリ故ニ唯其汚

物ヲ疏滌メ十分ニ快復ヲ得ルト昌按脱奇賜
胃ニ粘稠汚物ヲ畜積スル又ツトレ人カ書中
ニ由テ癸スレ明ケシ
二一種ノ眼病ヲ載セタリ即其言ニ云ク眼目
衰弱ノ一症較著ノ原因ナク唯コレニ性気強
烈ノ剝磨各カ地ヨリ敗来処ノ板原撒マク
口シト各地セスノ亜的児單兼ニ用ヒ或ハ目
加テヲ用テ大初ヲ養スルモノアリト又曰ク
疾病敗トメハ他ノ刺戟劑ヲ用テ劇キ嫩衝ヲ
癸セシメ由テ塊以テ眼内諸部ノ衰弱ヲ整復ス
ルトヲ得ルアリト○視力遲鈍病トカラウエ

マ灰白眼トモ又大ニ差フ視力遲鈍病ニ於テ
ハカヲウエマノヤク深ク眼底ニ見ハル灰色
ト光澤アル真珠色ト云ニ塊無レハ之「又痒嫩
衝眼讀者按即千ノ控一着ヲ以テハ実ニ視
力之弱病ト同一ナルカ如キモノアリツト
人コノ両症ヲ同シ一病トセルカ故ニ予今塊
両病ノ症候及ヒ治方ヲ相異ナルヲ詳カニ説
テ明カニ其全ク別アルコトヲ示サスニハアラス
是ヲ以テ今先ツ「上」カ論説ヲ挙テ次ニ予
カ説ヲ演ベ以テ委ク是ヲ論定セシトス即千

可レカ言ニ云ク痒嫩衝眼ハ屢々其眼目及
ヒ眼眩ニ些少ノ嫩衝ヲモ見ツス7ナキ者ア
リ予坎ノ如キ症ヲ見ル7少カラス其実験ノ
多キト諸患者ノ言トニ申テ明カニ坎病ノ本
性ヲ知ル7ヲ得タリ予親ク之ヲ見ルニ患者
曠ル等ノ事件ニ由テ眼眩ヲ閉ツル7アルハ
眼符真ニ相固着シ易ク且ツ夜間ニ於テ眼眩
ニ困重ヲ覺ユ坎レカ為ニ睡眠ヲ催スニモ非
ス又刺戟物ノ眼ニ入ニモ非ス夕患者知ラズ
自ラ眼眩ヲ閉ルニ至ル坎ニ由テ之ヲ觀レハ

坎症ハ正ニ毛線ノ分泌一種ノ疾病ニ係ル者
ナル7ヲ察セリ故ニ消毒銀睛膏名物考水銀
ヲ用フルニソノ効ヲ奏スル7實ニ坎症ノ外
部ニ見レテ赤色爛傷ヲ眼眩ニ發スル者ニ於
ケルカ如シト而ルニ坎毛腺病ト視カク弱病ト
互ニ相異ナル徵候甚々多シ
○視カク弱病ニ於テハ1ホ1ム腺少モ妨
害ナリ其機能ヲ逞フスルカ故ニ夜間眠ヲ催ス
ニモ非ス又夕僅微ノ害モ有ニ非メ唯眼眩ニ困
重ヲ覺フ闔閉シ且ツ睡眠ニ眼眩ノ固着スル志

害等絶ヲ故有ルナシ○故ニ水銀劑ニ痒嫩衝眼
効ヲ奏ラ賧縁ニ施メ少シモ功アルナク却テ
屢々危害ヲ招ク多シ○加之ニ光線ノ射入ニ
因テ癢スル処ノ劇刺ハ痒嫩衝眼ニ絶テコレ無
キ処ニメ西病ニ別ノ一ニ大証徴ナリ
或云ク痒嫩衝眼ノ重症ニ於テハ屢々視力之弱
病極度ノ症ヲ兼ルモノアリ医ノ能ク重症トナ
スニ至テハ皆ノ痒嫩腫脹己ニ著ク毛腺ノ分泌
液酷屑トナリ刺戟スルカ為ニ益々劇キ痒嫩衝
起ニ具痒嫩賧縁ヨリ漸ク結膜ニ及ビ施テ遂ニ

角膜ニ至ル○予以為此症ニ於ケル光線ノ妨害
ハ唯ニ波及ニ由ルカ若クハ角膜感觸ノ至劇ナ
ルニ由ル者ニメ真ニ網膜ノ疾病ヨリ癢スルニ
非ス夫角膜常ニ感觸遲鈍トシテ虫ニ痒嫩衝ニ由テ
ハ極度ノ感觸ヲ得ルニ至ルナラバ猶軟帶軟骨ハ常
ニ知覺ナシトシテ虫疾痛ニ由テハ劇甚ノ疼痛ヲ癢
スルニ至ルコトアルト同一般ナルモノナク且
此症ニ在テハ少時間ノ視瞻甚々著明ナルナ
ルカ故ニ又々真ノ視力之弱病ト為ス可ラサル
ナラバ明ケシ○而レトモ前ニ言ルカ如キ痒嫩衝眼

ニ視力之弱病ヲ全ク合併スルモノナシト云フ
ニ非ス予モ又々自ラ其症ヲ目撃セルト屢々ア
リ〇但シ此合併ハ唯兼症ニメ実ニ「ワレ」カ説
ノ如ク両病同一ノ者ニハ非ス
而証相異ナル処以テ證候最モ軟手タルモノハ
其兼ル処ノ細膜感觸ノ症ヲ同療治法ヲ以テ治
スルト能ハサレハナリ即驗縁曠ノ怪嫩衝ニ効
アルモノハ必ス視力之弱害アリ
註 予嘗テ一女兒ハ此合併病ニ罹ルヲ見ル其
始メ先ツ螟蛇法ヲ下驗ニ施シ此ニ兼ルニ他

ノ強壯過度ナラサル滋養劑ヲ与ヘテ視力之
弱ノ症速ニ治シ次ニ水銀劑ヲ皆ニ施メ毛線
ノ病能癒ユ由テ以テ十全快復ヲ得タリ
一右件ノ諸論ニ雜銷外シ易ニ諸病ノ區別ニ於
テ緊要ナルモノハ殆ト皆之ヲ尽セリ故ニ次篇
ニ於テハ將ニ予實驗ニ由テ自ラ得ル処ノ通者
ハ療法ヲ示サントス
才三篇視力之弱病ノ療法論ス
予カ此視力之弱病ヲ始メテ見ス所ノ患者ハ其
体質極メテ軟弱且ツ其病ヲ得ルヤ文字至細ノ

書ヲ讀テ非常ニ視力ヲ費シ習字ヲ研精ノ處々
夜ノ深キニ至ルヨリ癸スル者ニ〇是ニ於テ以
為リ此症ニ於テ其網膜感觸ノ非常ナルハ是レ
神圣力ノ虚脱ヨリ癸スルモノニト〇故ニ鎮症
収斂劑ヲ外用シ強壯神圣劑ヲ内用メ之ヲ防カ
シトス然ルニ其劑唯ニ効チキノミニアラス却
テ害アルヲ見ル
章心刻苦種々ノ療治ヲ施スト虽終ニ一モ功ヲ
得ルトノ無リシハ故ニ近因ノ考按當ラサルト
ラ疑ニ再ニ思惟メ以為ク此病ニ於ル非常ノ感

觸ハ実ニ網膜若クハ脈絡膜ノ緩衝力或ハ然
ラストモ其絡ノ盈脹ニ因ルモノナラント〇此
考按ヲ以テサウシテハ適当ノ療法ヲ問フ
ニ波レモ又未夕実験ナキ故ニ明ニ答フルヲ
得ス〇是ニ於テ再ニ考按シ依テ以為リ其療法
慢ニ収斂劑ヲ外部ニ令用シ強壯劑ヲ内用メ眼
ノ精カラ増ニアラス唯ク眼ノ内膜ニ於ケル血
絡盈脹ヲ減退シ兼テ網膜ノ感^非常ナルヲ鎮靜セ
スニハアル可ラスト而シテ其患者已ニ辞去ル
カ故ニ絡ニ於考按ノ常否ヲ試ルヲ得ス

○其後十日ナラスメ同症ノ一患婦ニ招アル性
テ之ヲ見ル他己ニ強壯劑ヲ用テ功ヲ得サル者
○此病其視力ノ衰弱己ニ殆ト甚シ燭火及ヒ尋
常日影ヲ見ルニ自ラ常ニ燭下ニ書ヲ讀ミ画ヲ
習ヒ及ヒ針灸ヲ更トスルヨリ免スル者○此
眩少シモ痒嫩衝眼ニ頗クノ候ナク又夕若膜ノ
血絡毫毛盈脹スルナク其齡中年ニト虽モ其
体質晚薄加之ニ妥介婉スルナク種々ノ疾病ニ罹
レルトニ由テ大ニ羸瘦セリ
強壯劑ハ他医己ニ其配合及ヒ分量ヲ種々ニメ

用ヒ尽セシニ一モ功ヲ得ルナク無リシカ故ニ未
タ治例ヲ見スト虫予カ考按ノ否否ヲ試定セン
カ為ニ一種ノ癩治ヲ施セリ○其法先ツ蜘蛛六
個ヲ取テ下睨ニ吸貼セシメ夜間ニ加羅蔞見少
許ヲ与ヘ翌朝下劑ヲ飲セシメ朝夕加蜜列蠶菜
壳ニ味ノ浸劑ヲ以テ眼濕シ能ク拭ヒ去テ阿芙
蓉液製法及用法
共ニ二篇出ヲ沾貼シ昼間鉛糖ノ點眼水六
篇ニヲ以テ洗ハシメ眼ヲ掩テ光氣ヲ避ケ清涼
緩和ノ食用ヲナサシム○又夕其眼ノ乾ケルカ
タメニ碓砂精ヲ後ニオセ七篇ニ拳ル法ノコトク

シテ用ヒシム○螟蛉ニ由テ取ル所ノ血甚々僅
微也ト虽トモ患者衰弱ヲ覺ヘ翌日下利ニ由テ
發スル所ノ下利適宜ナリト虽モ疲勞ヲ覺ユル
ト益々甚々シ是其体质薄弱ナルニ由ル○然レ
下利後患者自ラ眼中ニ怪状ヲ覺ヘ尚ラ且ツ
稍強烈ノ充氣ニモ堪ズルニ至レリ
自註或眼科書ノ説ニ如ク眼ニ近接ス螟蛉法
ヲ施ス下ラ禁セルモノアリ其説ニ云ク螟蛉
取トメハ著キ眼瞼ノ腫脹ヲ起シ施後暫眩ニ
メ却テ眼ノ刺戟ヲ増ス下ラリ坎ヲ防カニカ

為ニ宜シク之ヲ顛顛ニ施ス可キ下而ルニ用
ウニテル各人及ヒ予之ヲ眼瞼ニ施セル諸症ニ
其於テハ皆功ヲ誤ルモノナリ尚且ツ玫瑰色ニ
變セニトスル燦衝ノ劇症ニ於テモ芫菁膏ト
同攻ヲ奏スルヲ見タリ加之眼燦衝ニ於テカ
所及近ク之ヲ眼傍ニ施スト顛顛ニ施スト其
効ヲ比較スルニ其優レルト遙カニ遠シ殊ニ
眼瞼ノ青斑或ハ一時ノ天色ニハ施後速カニ
碯砂精ニ芫菁膏ト水ト下ラテ洗ヒハ其効最
著ニ○如坎ク予カ新々ニ發セル療法適当

セルヲ愈々明テルカ故ニ尚ラカロトメル及
下劑ヲ三四日毎ニ服用シ且ツ其他ノ諸薬シ
テ解急スヘカヲサルトテテ視力乏弱
速ニ治セリ其後唯阿芙蓉液ヲ以テ治ヤシメ
又強壯劑ヲ与ヘ時ニ催下ノ丸薬大黃芦薈石
餘ノ三味ヲ以テ製ヲ用シメ皓蒼ノ點眼水ヲ
与ヘテ終ニ全治ヲ得ルニ至レリ
其後一婦人未テ治ヲ請フ其齡ニ十五歳許其体
質軟弱ニメ感動シ易ク一二月前ヨリ視力乏弱
メ劇症ニ罹ル其病ノ始ヲ尋ルニ久シク緻密

針縫ヲ事トスルト燭下ニ讀書スルノ人多キ
ヨリ癸スル者也註口ウレト人ノ書中ニ曰ク一
患者針縫ヲ事トスル人甚シキヨリ瞳孔縮閉ヲ
癸シテ昏トナル者アリ是細膜増進スルニ因ル
者ニメ其虚脱ニ用ルモノニ非ス何者細膜虚脱
スレハ瞳孔必ス散大スルモノナレハナリ凡ソ
此ノ如キ精細ノ事等ハ大ニ眼ヲ刺戟メ血液ノ輻
湊ヲ將大進スル者ナリト○テレニカ人云ク一
壯年燭下讀書スル人甚キヨリ劇甚ノ眼眩衝ヲ
癸メ諸薬効ナリ終ニ生命ヲ隨セル者アリト云

病殆下前ノ患者ト同症ナルカ故ニ同一ノ療法
ヲ施サント欲スト余モ其体負薄弱ニメ神全ノ
感動強キリ故ニ敢テ以テ為シ得ス先ツ試ニ強
壯ニ叔欽劑ヲ与フルニ毫毛功ヲ奏セズ是ニ於
テ意ヲ叔メ蝶蝨四個ヲ眼瞼ニ施シ前ニ奉久ル
諸劑ヲ与フ○此療法ニ因テ諸症ノ減退スルヲ
前ノ患者ニ於ケルカ如ク其功最モ著シト○患
者自ラ云ク蝶蝨ノ攻実ニ神ノ如シ以前先氣ニ
白テ覺ヘシ所ノ劇痛唯一回ニメ軟快スルヲ十
久八九ニ至レリト故ニ予再々之ヲ施サス○朝

夕阿芙蓉液ノ法劑ヲ用ヒシメ點眼水ヲ与ヘ
ルニ催下ノ丸蒸ヲ服セシメ日下ヲスメ余症尽
ク消散ス是ニ於テ劇々其再發ヲ防カシカ為強
壯性ノ點眼水ト機那ノ内服ヲナサシム後予一
ニ日ニメ未報メ曰視瞻已ニ十全ノ健康ヲ得タ
リト○此西症ニ由テ之ヲ視ルニ日常種々ノ方
法ヲ施メ治シ難キ諸病モ又夕海魚下劑ニ由テ
如何ノ峻功ヲ得ル者アランモ知ル可ラス○実
ニ此西症ニ於ルカ如キ峻功ヲ得ルトハ予輩治
術ニ於テ未ダ嘗テ有サレノ事件之○而レ此モ

シ直症ノ細膜虚脱ヨリ発スル症ニ於テ此療法
ヲ施サハ又夕將ニ如何メ大害ヲ延ニ且ク戒慎
セズニハ有ヘカラス
而ルニ此療法此病ニ於テハ唯実ニ精カク脱
セシム可ラス故如薄弱ノ体质ニノニ適應セル
力故ニ予今尚此病人近因ヲ明カニ徹セシカ為
ニ又薄弱ヲ示サレるる体质ニ於テモ此療法ノ適症
不可キモノ少ナカラサル治列ヲ説示サントス
○ 体質健強ニメ挑池血液下ヲ用ユト虽モ容易
ニ衰弱ス可ラサル人ニ於ル同種ノ視力之弱病

ヲ同療法ニ由テ同一ノ功ヲ得シモノ甚々多シ
キ之
今一々其功ヲ得ル者ヲ枚挙スルハ却テ無益ノ
贅言ニ属スルカ故ニ其個々例ヲ挙テ之ヲ主ト
ナス○ 十八百九年十一月一壯年翁莫大小ヲ生
業トスルモノ来テ予ニ治ヲ請フ其眼視力大ニ
乏弱ニ日克触先總テ充氣強キ者ニ白ハハ疼痛
甚々其永ルヤ病發後已ニ長ニ週ヲ経タリ○ 予
詳ニ之ヲ診スルヤ其眼中少シモ破衝ノ外較ナ
ク又毫毛腺病人病候アルヲナシヨク諸症ヲ比

較スルニ体質稍薄弱ヤト虽モ健康矣恙ナルカ
故ニ其病ハ全ク是唯一部ニ限レル者ナルヲ
察セリ○是ニ於テ以為ク是レ視力乏弱病ノ真
症ニメ其因緒莫大小ヲ造ルニ視力ヲ費スヨリ
メ網膜若クハ脈絡膜之知絡ニ血夜ノ輻湊スル
ヨリ発スル者ト○其故ニ先ツ螟蛉六個ヲ下
賧ニ施ス夜ニ入テ加羅蔭兒四匹ヲ与ヘテ翌朝
催下ノ散茶ヲ用ヒシメ朝夕先ツ堪ユルホトノ
糞湯ヲ以テ眼ヲ洗ヒ次ニ阿芙蓉液少許ヲ以テ
シ尽間ニニ回置ナル
鉛溶水 鉛精ニ即テ滴入

ニ其生茶ヲ止メ肉食飲酒等ヲ禁シ緑色ノ物ヲ
以テ眼ヲ掩ヒ○患者其教ヲ受テ去後十ニ
週ニメ再ヒ来テ云ク諸劑ニ十ニ効ヲ奏ス殊
ニ螟蛉ノ後直ニ軽キヲ覺ヘ且ツ今諸患己ニ大
ニ減退セリト○是ニ於テ予再ヒ又々加羅蔭兒ノ
下劑ヲ用ヒシメ尚ヲ且ツ動脈ノ運動降鎖メ病
勢ヲ腹部ニ導ニカ為ニ吐酒石ノ溶液ニ暗厄斯
浮利塩ヲ加テ隔日ニ飲服セシメ其他ノ療法ハ
ニ十前ニ同シ○其後十四日ヲ経テ又々来テ謝
メ云フ視瞻甚々明カナルヲ常ノ如ク光氣ニ向

テ毫毛害ヲ覺ヘズ又夕疼痛スルヲナシ〇見
ニ於テ強壯性ノ點眼水ヲ与ヘ已前ノ方法ニ代
フルニ炭那ノ内服滋養ノ撰生方ト眩々催下ノ
丸茶ヲ用ユ可キヲ諭ス後午終ニ他ノ方法ヲ
用ユルヲナク不問ニ又十全快復ヲ得ル於テ奉
タル所ノ治例ハ益々能ク快病人ノ症候療法ヲ明
ムルニ豆ル可シ

一壯年視力之弱ヲ病ム收ニ千八百十年八月迄
ヲ予ニ請フ己疼痛甚シク事ヲ瘥スルニ至ル〇
自ラ云フ兎々ル 眩痘瘡ヲ患ニヨリ以來快病ニ

羅レリ今收ハ其發スルヲ己ニ一月許收斂劑
及ニ水銀劑ヲ外用シ種々ノ方法ヲ施スト虽モ
一功功アルコトナク〇トニ^{各地}ハ一眼医ニ謀ル
是痒嫩衝眼ノ一種之ト方法ヲ授ク用ユルニ又
功ナシト〇予力之ヲ診スルニ其眼ノ感動最モ
強ク充氣アルモニ殊ニ燭火ニ向ヘハ疼痛甚ク
涙液大ニ流レシ日充ヲ見レハ殊ニ最モ劇ク虹
彩ノ運動甚ク敏捷ニ又強ク身体他ノ疾病ナク
眼中毫毛嫩衝ノ候ヲ見ハサズ又毛腺病ノ症モ
ナキ故ニ予以為ク是レ明力ニ視力之弱病ノ真

症也ト「自註」予カ見ル所ノ視カ乏弱病ノ患者ニ
ナ燭火ニ堪ユルヨリ日光ニ堪ユルヲ難シトス
是怪ム可キニ非ス「五ウ」ル各算ルニ日光ノ燭
火ニ勝ル「一」万千六百六十倍ナルモノナレハ
也是故ニ真ニ螟蛉六個ヲ下賧ニ施シ夜ニ入テ
加羅菱兒ヲ与ヘ翌朝峻下劑ヲ用ヒシメ朝夕洗
淨メ阿芙蓉液ヲ沾貼シ習字学ノ事件ヲ止メ淡
薄清凉ノ棲生法ヲ為サシメ尽間ハ緑色ノ清ヲ
被ラシメ頻々温ナル鉛劑ノ點眼水ヲ用ヒシム
後三日患者未謝メ曰茶効甚ク較著ニ疾速ニ

疼痛殆ト消散シ充氣ニ堪ユルヲ甚ク容易ク
メ妨害少ナク諸症故テ前日ノ比ニ下ラスト又
曰ク螟蛉ノ妨最モ著其施ス凡ハ乍午怪快ヲ覺
フ○是ニ於テ予再ニ加羅菱兒ト下劑ヲ与ヒ且
ツ病勢ヲ喉部ニ導カシカニ為ニ吐酒石ノ溶液ニ
純精酒石ヲ加テ日ニ三次用ヒシム彼四日彼レ
又夕未テ日光甚ク強キニ非レハ少シモ疼痛
ヲ癸スル「一」ト予之ヲ診スルニ虹彩ノ運動
強ニト常ニ後メ其感動前ノ如ク敏捷ナラス○
狀收予將ニ施行セ「一」トス故ニ患者ニ教ユルニ

下條ノヲヲ以テス次ノ一週間高ヲ一回加羅淺
児ト下劑トヲ用ヒ其收斂ヘス尚催下ノ塩劑即
吐酒石ノ落液ニ純ヲ版シ其後モシ強キ克氣ニ
精酒石ヲ用フル者モ全ク疼痛ヲ覺ヘサルニ至テハ方ヲ變シ收斂
性ノ斂眼水ヲ用ヒ滋養ノ撰生法ヲナシテ幾那
ヲ内服ス可シ○後一二週ニメ彼レヲ見ルニ已
ニ快後セリ坎斂約メ曰再發スルヲアラハ又久
未ル可シト而ルニ又終ニ未ラズ因テ懷フニ其
十分ノ全治ヲ得シヲ疑ヒナシ爰ニ附録メ尚ラ
學者ニ示ス可キヲアリ強壯ノ患者ニ於テハ下

利溲血ノ量宜ク衰弱ノ患者ニ於ケルヨリ多カ
ル可シ衰弱ノ人ニ於テハ之ニ及ス可シ燂衝ノ
爰ニ依テハ溲血僅微ニト虽モ之ニ他ノ病勢ヲ
他部ニ導ク劑下利ヲ兼テ十分ノ治ヲ得ルヲア
リ○凡坎溲血下劑ハ度ニ過テ多量ナルヘカラ
ズ宜唯元氣ノ害ヲ止ムヲ以テ度トス可キ也

第四篇揭示症候療法証拠

予今口レレノ書ニ載スル所ノ坎病ト全ク同
一ナル症ノ治例ニ種ヲ別テ爰ニ揭示ス予カ実
驗ト施治ト伴リ無ク證スルニ是可シ何トナレハ

其症候原因予カ見ル所ノモノト同一ニメ療法
又メ予カ施ス所ノ者ニ異ナラサルナリ○今爰
ニ引ク所ノ第一種ハ其書中ニ載スル所ノ亦七
種ニメ題スルニ坎類澄ヲ以ス
病性全ク眼欲衝ヨリ発スル者ト相似テ明ナル
也外候ナク螟蛉法由テ大効ヲ得ル所ノ視カ乏
弱病而メ其言ニ云フ
一婦人年三十許記元千七百九十七年東印度ヨ
リ来テ視カ大ニ衰弱スルカ為ニ来テ治ヲ請フ
坎ハ久ク熱國ニ住テ晩産スルノ甚ク多キニ

因テ其体質甚ク羸弱セリ詳カニ之ヲ診スルニ
両眼毫モ病状ヲ見サス○以為ク是レ毛腺分泌
液ノ酷屑トナレルヨリ発セル者ト故ニ云ニ
グウエニトシトリエムノ軟膏ヲ両皆ニ施サシム
ルヲ三日療法尋常ノ痒欲衝ニ於ケルカ如不然
ルニ病勢少シモ减退セス○是ニ於テ詳カニ其
平常ノ撰生等ヲ問フニ幼ナル氏曾テ坎病疾云
○是故ニ予其衰弱ノ甚キト欲衝ノ症候ナキ週
毎ニ發泡膏ヲ耳後其上ニ貼シ且ツ冷水ノ害ヲ
ルヲラ寛ヘシカ故ニ朝ニ四密列漫劑ヲ布氏ニ

ニ浸メ眼ヲ掩ヒ少間メ拭ヒ去リテ接骨木花浸
劑ニ就腦精ヲ加工テ前頭及ヒ顛顛ヲ洗ハシム
○患者坎方ヲ受去テハムフムヒト_名ニ至リ
後一月許書ヲ予ニ贈テ云ク螟蝨ハ速ニ効アリ
シカ故ニ教次之ヲ用ヒ如窓列ノ樊浸劑甚夕快
キヲ覺ヘテ今而眼共ニ昏濁妨ケ棄ク唯強劇ノ
光輝ニ白フ斤ハ燭火ニ讀書ホノ事件ヲナスレ
ハ之カ微ク弱キヲ覺フノミト_名
梅ニ坎症ハ明ニ視力乏弱病ノ直症ニメ其固実
ニ血液ノ眼内ニ輻湊スルヨリ發ス者也若シ然

ラスニハ患部ノ淳血真ニ功ヲ奏セルノ理辨知
ス可ラス次ニ拳ル所ノ者ハ其書中第十種ノ症
ニニテ題スルニ友ノ教語ヲ以テス○頭痛ト上
脞垂下トヲ兼テ嗽衝メ外候ナク螟蝨法ニ由テ
治ヲ得ル所ノ視力乏弱症即チ其言ニ云ク
一女子年二十未テ治ヲ清フ其視力大ニ衰弱メ
日光燭火共ニ視ルル甚夕難ク眼脞弛垂メ指ヲ
以テ掲クルニ非レハ角膜ヲ見ハス_一ヲ得ス之
ニ兼ルニ頭痛洞断ナク其痛殊ニ前頭ニ甚シ○
其衰弱疼痛共ニ已ニ保統セル_一ニ週也蓋シ

此女子ハ名譽ノ画工ナリシ故ニ以為ク是レ画
ヲ研精スルニ眼力ヲ費セルヨリ癆スル者ニト
〇其外貌眼瞼垂下ノ他十全健康ナルカ如ク皮
表一モ疾病ノ候ナク脈動常ノ如ク諸排泄大便小便
皆十全也試ニ「五」クウエニ「六」ムシリニ
「五」ム軟膏ヲ施用スルニ毫モ効アルナク越別
吉的兒ハ甚々和ラカニ施スト虽モ却テ衰弱頭
痛ヲ増進シ強壯劑ハ内外共ニ他医已ニ之ヲ用
ヒ予モ又々与テ僅微ノ軽快ヲモ見ス〇是ニ抗
テ予以為ク是其病ニ頭中ニ在テ其波及眼坎ノ如

キ症ヲ起ス者ナラント因テ「ア」ウニ「ル」込人ニ
謀テ共ニ試ニ「前」頭痛ノ最モ劇キ処ヲ圖ク
截開テ腦ニ至ル其截開クヤ創口ノ大ヤ殆ント
司口トニ錢ノ半分斗也ト虽モ頭蓋骨腦々膜及
ニ腦質共ニ毫モ疾病ノ状ヲ見ス所ナシ〇然レ
凡術後大ニ軽快ヲ覺ヘ眼瞼自ラ開テ充氣ノ射
入前ノ如クニ疼痛ヲ起サス〇如坎ノ治癒ヲ得
ル者一週ニメ又々再癆シ疼痛衰弱全ク前ノ如
シ坎狀以為ク前日外科術ニ由テ得ル所ノ軽快
ハ蓋シ失血ノナス所ナラント故ニ試ニ蝶針ニ

四個ヲ顛割ニ吸貼セシムルニ果々速々ニ功アリ之ニ由テ病速退久ク三日又頭痛再発メ其強キヲ前日ニ異テテス故ニ又々蟻蚘六個ヲ前頭ニ吸貼セシメテ大効アリ○治功ニテ唯患部ノ近傍ニ於ケル浮血ニノ三回レルカ故ニ尔后或ハ六個或ハ八個取トメ八十個ノ蟻蚘ヲ或ハ前頭ニ吸貼セシメ或ハ顛顛ニ施ステ一週間ニ一ニ回如坎スルヲ十週半施ス毎ニ怪怯著シク頭部々々疼痛視力ノ衰弱及ヒ眼瞼ノ諸症漸次ニ減退シ三月間ニメ全治ヲ得タリ○按ニ坎症ハ

内部眼瞼衝ノ一症ニメ上瞼弛垂ト頭痛ハ其兼症也○凡ソ眼目ヲ過度ニ役使スルハ血液ヲ其部ニ輻湊充積セシメテ神圣織維ヲ牽脹セシメ以テ劇痛ヲ発スルヲ實ニ是レ坎當然ノ必理ニメ即生治力固有ノ性ナリ○又々其ノ頭痛トナシ予モ又々嘗テ同因病ノモノニ人ヲ見タリ○又其強壯劑ノ内外相用テ全ク切テキ者モ坎病其部ノ弛緩衰弱ヨリ発スルニ非スメ而レモ其因實ニ眼窠内ノ眼衝タルヲ明カニ徵スルニ是レ是故ニ患部ノ多血直ニ諸症ヲ減退セリ

註 螟蝨法ノ視力乏弱病ニ速効アルヤ又我國
和ノ眼科医ノリシセルトシカ実験セル治例ア
リ又々以テ證トス可シ即其語ニ云ク少壯ノ
一團基士体質健強ニメ多血一二年前凡眼ニ
視力乏弱ヲ患ヘ適當ノ療法ニ由テ治ラ得後
一年ヲ経テ十八百十更ニ又々視力ノ衰弱ト
其感觸ノ非常ニ甚シキトヲ患フ而レ凡疼痛
アルトナシ而メ又諸因精細ノ伎倆ニ眼目ヲ
使役スル身日光ニ向フ片ハ甚々増進ス予此
類ノ諸症ニ功アル諸劑ヲ以テニ強壯劑衝動

ノ藥眼水ヲ与ヘ揮発ノ精劑ヲ外用ニ之ニ兼
ルニ催嚏劑ヲ施シ発泡音ヲ耳後ニ貼シ總テ
眼力ニ使役ヲ避シムト虽一モ功ナク却テ諸
症増劇シ瞳孔變動メ縮張度ナク四形ヲ失シ
テ非常ニ張大シ角膜其透明ヲ失スルニ至ル
是ニ於テ予更ニ方法ヲ換ヘ緑布ヲ眼ニ掩ヒ
ス即如書ノテヘニリ之著者ニ方法ニ從テ螟蝨法ヲ
施スニ速効アリテ終ニ十分ノ全治ヲ得タリ
右件揭示スルノ諸説明カニ以テ予カ疾病ノ
近因ヲ以テ眼内ニ於ケル血絡多キ膜ノ嫩衝

腫脹ニ在リトスルノ考按ヲ證スルニ足レリ
○予又「ア」イシ「シ」ハ刀眼病ノ諸症ヲ纂集セ
ル一書ヲ得テ之ヲ讀ムニ其書中又々辛ニ予
考按ヲ證ス可キ一症アリ曰ク〇五十歳許人
一男子劇キ傷冷毒ニ由テ重症ノ疾病ニ罹リ
兼テ右眼ヲ病ム其症眼内前頭ニ疼痛劇キ光
氣ノ射入大ニ妨害アルヲ覺ヘ瞳孔強ク縮閉
ス而レテ其外貌常ノ如ク少シク嫩衝ノ候ノ
ク唯死スルノ前二日ニ至テ角膜始テ透明ヲ
失シ曇濁色トナリ剛膜少シク嫩衝ヲ起セル

ノミ死スレバ其病ノ真性ヲ明カニセシカ為
メニ之ヲ解剖シ見ルニ角膜ヲ剥キ去ル後チ
剛膜ノ一部嫩衝メ血液溢ルニ脈絡摸微シク
腫脹メ已ニ化骨セシトスルヲ見ル〇此病其
初起ニ於テ毫毛外候ニ変ナクシテ視瞻ノ感
觸已ニ甚ク視力最モ衰弱メ全メ身ノ衰弱ヲ
兼ルカ故ニ自ラ是レ視神全ノ衰弱メ感觸非
常ナルヨリ癸スルノ膜按ヲ生セシムト至
死後ノ解剖ヨリ其按ノ不當ナルヲ示シ明カ
ニ其病ノ本特脈絡膜嫩衝ヨリ癸スル者ニメ

外部ニ其候ヲ見サ、ル者ニ「」ヲ證セリ。○其
病中ノ症候死後ノ解剖豈能予カ考按ノ視力
之病ハ唯ニ網膜ノ感觸病ナルノミナラス又
眼内一部ノ嫩衝病也トスルノ明證トスルニ
是ラスヤ。○實ニ其病ハ一部ノ実病ナルカ故ニ
独リ患者ヲメ死セシム「」ノナキヲ以テ如ク
死後ニ解剖ノ其病ノ位置ト本性トヲ明證ス
ル処ノ他例ヲ見ス。○「」ハイルリト欲ノ書中人
身ノ諸病ニ於テ解剖スル実験ヲ載ル「」其々
多シト虽モ眼病ニ於ケル事件ヲ缺キ且ツ各

譽ノ「」ルカ「」ノ説ニ曰ク予死屍於テハ未
久曾テ内部嫩衝眼ノ症ヲ見ルコトナシ唯一
回盲大ノ眼ニ於テ之ヲ見ル「」アリ其細膜血
色ニメ殆ニト黒色ヲ帯ヒ其状性モ脈絡膜ニ
於ケルカ如シ脈絡膜及ヒ葡萄膜血絡ノ甚キ
故ニ健康ノ人ニ於テモ取トメハ血色ナル者
アリ。○以上予カ流ク所者如此シト虽モ概シ
テ同病同症ニナ必スニモ唯海血ニ由テ治ス
ル者也ト決定スル「」勿レ

第五篇 論方則

夫レ患部ニ施ス所ノ血液ノ此病ニ於ケルヤ其
速効アルヲ實ニ他ノ諸療法ニ卓絶メ且ツ予カ
施ス所ノ療法ニナクシテ以テ主トスルカ故ニ
今他ノ療法ヲ説クニ先テ尚一回其効カラ示サ
ントス○予己ニ一二年ヲ経ルノ症ト雖モ螟蝻
ヲ施メ速効アリトスルヲハ或ハ奇トメ信セサ
ルノ人アラシク○予カ此症ニ血液ヲ施ス所ノ者
ハ唯眼内ノ血絡充脹メ緩性之焮衝ニ罹ルヲ尚
ヲ偶々結膜ニ緩性ノ焮衝ヲ察シテ其形状官能

ヲ變スルヲナク茲持久ナルモノアルカ如ク
一般也トスルニアルノミ○又々血液ニ其
脈大ニ盈脹ストモ常ニ較著ノ患害ナク唯之ヲ
メ著ク其膨脹ヲ増進セシムル所ノ刺戟物アレ
ハ其膨脹ノ度ト其部ニ依リテ神聖ノ多少トニ
依メ多少ノ劇痛ヲ察スルノミナシハナリ○憶
フニ未タ螟蝻ノ効カラ明カニ知ラサル徒ハ或
ヒハ云ク全身ニ精力強壯ノ候ナク眼ノ外部ニ
焮衝ノ症ナク結膜ノ血液充張セズニハナリ漫
ニ螟蝻ヲ施メ血ヲ減スルヲ理ラント○然レ

此実験ニ由テ之ヲ見ルニ此病ニ於テハ匡外
候ニ拘テ治方ヲ謬ル可クナルモノニ○凡ソ此
症ニ於テ螟蝨ヲ用テ可キノ微候ハ光氣ノ射入
ヲ困テ殺スル所ノ眼底ノ疼痛ニ已ニ常ニ之
ヲ用テ其症減スル豈其効ナシトセシヤノ假令
微ナリト虽モ若螟蝨ヲ用テ狂扶ヲ覺スルヲ有
ラハ必ス預メ其効ヲ前言ス可ク患者ニ其病ノ
必ス又久治ス可キヲ告テ觀喜セシム可シ○
而レ此其螟蝨及ヒ顯顯ノ角法ヨク効アルニ習
テ刺絡ヲナスト勿ル可シ刺絡ハ全身ノ血液ヲ

減亡スルカ故ニ危篤ノ衰弱ニ進ム恐レズニハ
アラサルナリ○下劑眼癩衝ニ於テ一大貴某ニ
シテ其用甚久廣ク今古一般眼科家ノ俱ニ貴ヲ
所ニ○「ヒツホカヲテ込ノ語ニ云ク下劑善ク治
眼癩衝ヲトヤ実ニ萬古不易ノ論ニメ自ラ實驗
ニ由テ此ヲ見ルニ自ラ殺スル者トシテ必ズ定メ
俾効アリ○學者ヨク腸胃ト眼目ト互ニ相關係
スルヲ假令ハ小兒ニ於テ飲食不消化或ハ蛔虫
ヨリ一種ノ眼癩衝癩衝ト云ヲ殺スルヲ有等
ノ例ヲ考ヘ諸下劑ノヨク諸病ヲ導去スル可其

能ク腸胃ニ蓄蓄セル汚物ヲ掃除シテ魚テ乳糜
ノ吸収ヲ妨ケ腸内ノ蒸気及ビ諸分泌ヲ催進ス
ルニ因テ全身諸液ヲ量ヲ減損スルノ理ヲ思ハ
、其能ク眼内ニ輻湊スル血ヲメ消散セシム可
キノ理又夕照々々ラシニ○又夕血液ノ頭部ニ劇
ク逆衝スル諸症ニ於テ下劑ニ非スニハ敢テ之
ヲ鎮靜スヘキモノ歟キハ名人ノ能知ル所ナラ
ス而ルニ或ハ各醫ノ醫輩之ヲ眼病ニ効ナシト
メ信用セシキ者アルハ又何ノ理ソヤ○
種ハ書中曰ク「種」イブ也眼疾衝ノ眼疾衝ノ
種ニ於テ

ハ下劑ヲ施シテ効アルヲ勿レト然レハ清潔性
ノ眼疾衝病ニ於テハ自ラ發スルノ下劑ノ術ニ
由テ催進スル者トニ拘ラズ下劑ノ功ニ優ルモ
ノナシト云リ○按スルニ「種」下劑効無ト云
ヘルモノハ是レ謾ニ不適當ノ熱性下劑ヲ与フ
ルニ因ル者也如何熱性下劑ハ血液ノ運行催進
メ其運動ヲ強シ却テ刺激ノ性ヲ増進スレハ也
○是故ニ下劑ヲ用ユルニ當テモ又夕其方法正
ク戒慎セスニハ「種」可カラズ○古未諸医ノ内外
眼疾衝ニ尋常施用スル所ノ下劑ハ「種」其用量ニ於

テモ四教ニ於テモ甚々僅微也○而レハ預メ必
ス其効アルヲ察セハ宜ク多量ニ之ヲ用テ過
度ノ下利ヲ起サシム可ク其効ヲ奏スル度ニ反
メ數回之ヲ施ス可シ○患者ノ体質強壯ナル者
ニハ先ツ加羅蔘見ニ安貞摸扱ノ末ヲ加テ多量
ニ之ヲ与ヘ其右一匙ヲ経テ药刺已ノ亦適宜ニ
同量ノ純精酒石ヲ加ヘ薄芎水若クハ大麦水ヲ
以テ送下セシムベシ其功ヨク稀薄ノ大使ノ過
多ニ排拙シ著シク血行ノ力ヲ抑制ス○体質薄
弱ノ人ニ於テハ宜ク加羅蔘見ノ量ヲ少クシ药

刺已ニ代フルニ同量ノ浮利塩ヲ麻那葉ノ浸劑
ニ加テ用ヒシハ可シ但シ此浸劑ハ香竈水薄芎
類ヲ以テ製スルヲ佳トス予實驗ニ由テ是ヲ觀
ルニ劇キ熱性ノ下劑ハ固ヨク不適當ナリト云
モ而レモ甚々實性ニ過ルルハ又々効ナシ故ニ
峻功ヲ得ニトスル片ハ宜ク強カラズニハアア
ス○且ツ凡テ下劑ヲ用エルニハ初施ノ後ニ
三月ヲ経テ其功カノ全ク尽ルルニ至ラサルハ
再施セサルナ也俗ノ舊習ナルカ故ニ予ハ患者
ノ堪ユルニ反メ常ニ一頓ニ多量ヲ用フルヲ

ナス〇凡リ下劑ヲ用ユルノ標的ハ唯ニ全身血
液ノ量ヲ減スルニ至ルヲミテラズ又々血液ノ
復タレ眼内細絡ニ充積盈脹スルヲ防クニ在ル
カ故ニ宜ク同時ニ清凉緩和ノ其主亦蘇子スニ
ハ了ラズ然レ片清凉稀釈ノ飲液ヲ過量ニ用ル
コハ之ヲ禁ス〇又々右件ニ挙クル所々下劑ニ
相交横メ少量ノ吐瀉石ニ緩下ノ塩劑ヲ加ラレ
モノヲ屢々回夜々用ル以テ不断適宜ノ通利ヲ
得セシムヘシ〇坎熯法ニ由ルヤ眼内ノ嫩衝若
クハ其脈絡ノ充脹スル諸症大抵治セザルモノ

無キテ是レ予ノ實驗ニ由テ明カニ知ル所也
〇人或ハ以テ眼嫩衝ハ諸症但ニ三ノ偉効下
劑優ルモノ無シト云モ其弊衰弱虚脱ヲ起ス実
ニ避ク可ラサルカ故ニ又々恐怖セスハ非ス
ト而レ片其衰弱虚脱ハ唯是レ想像病ニメ其害
實ニ其本病ノ長ク続保スルカ如ク甚シキモノ
ニ非ス予ノ觀ル所ノ視力之弱病又眞症ニ於テ
ハ殊ニ然ルヲ實驗セリ〇又々坎病ニ於テ或
ハ浮血ノ量ヲ甚々微ニシ或ハ全ク益ナシトス
ル徒ノ如キハ共ニ日ヲ同メ論不可ラズ若シ患

者甚々螟蛉疔忌嫌スルカ為ニ再血ヲ施ス下難
ク而メ病勢過度ニ甚シカラサルニハ偶々其下
劑ヲ多量ニ用ヒサルニ由テ減退スルモノアリ
然レ其其海血ノ如ク迅速ナラズ其列一症アリ
之ヲ丸ニ奉ク
○高貴ノ如比卅某年三十六視力乏弱病ノ怪症
ニ罹リ来テ治ラ予ニ請フ其来既既己ニ久シク
病メリ且ツ自ラ云フ曾テ樊国ニアル片重症ノ
劑取換ヲ患テヨリ其病ヲ得タリト○予坎ニ論
スルニ螟蛉ヲ下賤ニ吸貼セシム可キヲ以テ

ス然ルニ他人之ヲ譏テ益オシトスル者アルト
自ラ嫌忌スルノ甚シキカ為ニ再ニ他ノ療法ヲ
求ム○予坎ニ於テ坎病唯下劑ノミ用テ効アル
ヤ否ヤヲ試ニカ為ニ夜ハ如羅漢見多量ヲ用ヒ
聖朝葯刺巴ト純精酒石トノ峻下劑ヲ服ス一
一週間ニニ三回ナラシメ朝夕眼ヲ洗淨メ阿芙蓉
液ヲ沾貼シ毎日一ニ回ナル鉛水ヲ以テ眼ヲ
洗シ唯些少ノ蔬食ヲナシカ所及務テ鮮明ノ光
輝ヲ避ク可キコトヲ教ユ○後八日ニメ来ル其
眩眼ノ感觸著シク減退メ自ラ怪快ヲ覺エ予依

テ同療法ヲ用シムルヲ十日終ニ強劑ノ充氣ニ
向フト虽モ些少ノ妨害ヲ覺ハサルニ至テ若味
劑ニ峻下劑ヲ兼テ飲服セシムル飲性ノ點服水
ヲ与フ病名ノ誤認ヨリ其療法ヲ謬テ危篤ニ至
ルモノ少カラズ何者視力之弱ノ名ニ拘ラズ病
ヲ一部ノ死緩若クハ衰弱ニ在下スルノ徒ナレ
ハ也是故ニ人多ク疾病ニ精シカラズ強テ運動ヲ
杜ニスルハ利ヲ与ヘ其眼ヲ洗浄スルニ冷水ヲ
以テメ温湯ヲ禁ス是レ温湯ハ弛緩セシメ冷水
ハ収斂スル者ナレハ之の然レハ實驗ニ由ルニ

而ラズ冷水ニ由テ怪快ヲ得ルヲアルハ唯是レ
一取ノ怪快ニメ真ノ眼治ニ非ス是レ其脈絡ヲ
収縮メ触動機ヲ抑制シ疼痛ニ少劑ノ体止ヲ
サシムルノ事故ニ其水ヲメ患者ノ堪ユル許ノ
強度ヲラニメ柔漏スルヲ朝夕十介取ニ一分
取ト云余ニ至ルハ患者愈快緩和ノ感ヲ覺ル
テ久シクテ眼内ノ感觸大ニ怪快ニ予疾病ニ
温蒸漏劑トメ眼上ニ施ス所ノモノハ或ハ誅或
迷迭番芫ノ浸劑ニ然レハ此諸葉更ニ功アル乎
唯湯ノ功アル乎未之ヲ明ニスルヲ得ズ但シ

温湯ノ功ハ較著ニメ莫ニ缺クヘカラスタバ諸
薬ヲ如フルト也ヘサルトハ宜ク医者ノ權ニ由
ル可シ○莫芟荅利斯ハ以諸薬ノ如ク忽々ニ思
フナ勿レ其浸劑ノ実ニ能ク視瞻感触ノ強劇ナ
ルヲ鎮静減却スルナ阿芙蓉劑ニ優ル者ニメ未
タ曾テ其劑ノ害アルヲ見ス阿芙蓉ハ隔々
害ヲナスナ有單味
ノ温湯若クハ急之レニ蒸草ヲ如フル温蒸湯劑ハ
固ヨリ其病ニ僅効アルナ已ニ言ヘルカ如ト全
モ而レモ又々下ニ奉クル阿芙蓉液ヨク其ノ効
力ヲ扶クルナヲ實驗ス但シ莫芟荅利斯ハ鎮痛

ノ功カ最モ強キカ故ニ之ヲ用ユル片ハ故テ其
ノ劑ヲ用ユルナラセス
○間ニ又其劑ヲ用ユルニ次テ痰液過多ニ流シ
シ微ク結膜赤色ヲ發スルナアレモ尋常ニ然ル
ナリ其病ナ於テ其感觸殊ニ最モ甚々些微ノ刺
戟ニモ堪ヘ難キモノハ其劑ヲ用ユルニ宜ク戒
慎メ注意セサル可ラサル○今其用治ヲ示
ス○患者ヲ仰臥セシメテ少シク頭ヲ高クシ
眼瞼ヲ閉シメ其液少许ヲ取ツテ内眥ニ注キ頭
ヲ傾ムケテ面瞼ノ間ニ流レシメ眼瞼ヲ上下ニ

動搖メソノ内ニ滲入セシメタ、シソノ膜ヲ割ラ
クヤ宜ク戒慎注意メ急卒ナラシム可カラス
駝毛ノ筆ヲモツテ施用スルノ法アリ花ノコト
シ医一午ノニ指ヲ以テ輕ク患者ノ下膜ヲ押可
シモツテ微シク反張セシメ他ノ手ニ筆ヲ取り
其液ヲ浸キ横ニ其ノ膜ノ裡面ニ引キ直ニ指
ヲ放テ故ノ如ク崩サシム可シノ如斯ノキ法ヲ
用エルモノハ是レ唯角膜ノ刺戟ヲ避ケシカク
メ之而シテ坎面法ニ由ルヤ其液ヨリ眼球全前
面ニ普達メ残ス所ナシ予カ坎液ヲ用ルヤ其量

ノ多少ニ拘ラズ直ニ角膜ニ触ルニ非サレハ
未タ膏テ一毛疼痛刺戟ヲ起スモノアルヲ見ス
○人或曰予カ此施用法ヲ示スヤ莫ニ蛇豆ニ屬
スル人ミト而レモ予屢々其用法ヲ知ラサル
患者ニ坎劑ヲ与ヘ彼自ラ眼ヲ閉キテカク角膜
ニ滴入シ由テ以テ疼痛増劇シ大ニ其功カラ
害スルヲ見ルノ少カラサルカ故ニ爰ニ贅言ス
ル也其病月眼ヲ経ルノ甚々久シキ者ニ於テハ
前ニ舉ル諸療法ヲ全ク功ヲ奏セザルニ屢々是亦
○坎ノ如非膏ニ頑固ナル症ニ於テハ先排液劑

ヲ用テ芫菁膏ヲ頭上身後或ハ肩胛ニ貼ス可
其刺戟劇断ナクメ能津液ヲ滲ヤセシムルカ故
ニ病勢ヲ導クヲ以テ偉効スク莫比也○予カ親
友某曾テ習字ヲ研精シテ夜学スル人甚キヨリ
以病ヲ得テ困苦スルヲ久シ一医之ニ強壯劑ヲ
用ヒテ久日更ニ復治セズ症候益々増重ス是ニ
於テ彼レ其医ノ癥法ヲ捨テ自ラ久ク暗室ニ入
リ一二月間絶ス芫菁ヲ背ニ貼ス癥スナナリ因
テ以テ終ニ全治ヲ得ルヲアリ
世医ノ眼目ニ外用スル薬方及ニ癥法ヲ見ルニ

謬誤ヲナスモノ甚々少ナカラス故ニ予今「ホツ
」マニ各ノ考按ニ憑テ論流ヲ設ケ以テ学者ニ
示サントス○夫レ眼癥衝ノ初癆ニ於テ收斂性
ノ洗劑ヲ用ユルヲ世人ノ一般ニスル所也ト至
モ大ニ謬語スル故ニ余今癥衝疼痛而ナカラ共
ニ劇ク増進ス而レモ其初癆ノ眩眼ヲ過テ後ニ
之ヲ用ユル可ハ必ス其偉効アルヲ全ク以前ノ
害ニ及スル者也○世ニ秘薬ト称メ販ク所ノ收
斂性ノ一眼劑アリ其称譽甚々高シ是レ眼癥衝
ノ少ク眩目ヲ経テ強壯劑的當ノ時限ニ用ユルカ

故ニ其効力偉トシテ得ル者也○世又々坎
ヲ懸布トメ用ユル所ハ害ナシトスト雖モ予自
ラ眼嫩衝ノ初發ニ之ヲ用テ其功ヲ溘レル者有
ルヲ見ルト甚々少カラズ或ハ坎カ為ニ膿腫ヲ
角膜ノ膜間ニ發メ不透明トナリ終ニ不治ノ盲
ニ陥リ或ハ角膜ニ急性ノ腫瘍ヲ發シ破烈メ蒲
桃膜腫脹セル者等アリ之ヲ終ルニ眼劑ト其眩
限ニ注意セズメ漫ニ之ニ用ユル所ハ必治ノ症
ヲモ不治ニ陥ラシムル者也豈或メ甘ル可ケシ
ト是故ニ予曰フ如ク坎ノ療法ヲ施メ大害ヲ誘

ニヨリハ寧ト拱弁メ其眼ヲ全フセヨ○凡リ収
ニ眼性ノ眼劑中其効能善ニ若クモノナシ故ニ若
シ眼嫩衝ハニテ其部ノ弛弱ヨリ發スト云フノ
臆斷ニ由テ唯収斂劑ヲ的當トスル所ハ眼劑
ハ唯坎一系ニメ足ルヘシ而レモ屢々實驗メ之
ヲ見ルニ先ツ枇杷劑泄血下ヲ用テ血絡盈脹ノ
カヲルニ非レハ必ス害有テ殊ニ視力之弱
ノ症ニ在テハ最モ然ルヲ見ル○若シ収斂劑
ヲ用ヒサルヲ得サル症アル所ハ予ハ唯其血
絡ノカヲ減メ疼痛ヲ鎮メ兼テ能ク収斂ノ功ヲ

アルモノヲ与へ即左ノニハ是也

鉛糖一ム

右接骨木花水一与ニ溶カシ蒸餾醋一二滴ヲ加
ヘテ清澄ナラシメ用ユルニ当テ少許ヲ一小盃
ニ入レ其盃ヲ沸湯中ニ挿シ温メ用ユ可シ前ニ
モ云ヘル如ク冷水ハ扶病ニ大害アリ是レ角膜
ノ蒸発気孔ヲ収斂メ閉塞セシメ眼球一面ノ血
ヲ内部ニ驅逐シ以テ既ニ充脹セシムレハ之〇
故ニ温メテ用ヒシム其功アルヲ察メ或眼ハ
恒ク日ニ數次回復メ之ヲ用ユヘニ世ニ點眼水

ノ種類甚々多シ其製造種々アリ或ハ酸化金屬

鉛糖鉛糖ヨリ製シ或ハ刺戟鮮疑ノ功アル散薬

ヲ以テ之ヲ製シ或ハ液薬ヲ配合メ之ヲ製シ而

ニ液薬偶々各自ニ之ヲ見レハ清澄透明ナリ

之ヲ合スル片ハ飽和メ其性ヲ變シ重濁ノ液ト

ナリテ或ハ全ク其功ヲ失スル者アリ〇世医一

般ニ鉛糖ヲ常水ニ溶化メ點眼水トナスト蛋ニ

其液潤濁ニメ鉛質多クハ速ニ波ミ石灰状ノ塗

トナル若シ此粗糙ナル泥塗眼ニ入テ角膜ニ蝕

レハ其害豈ニ砂塵ニ同シカラヤ〇眼ト

メハ阿芙蓉液ニ水ヲ加テ點眼水トセルモ
於テ阿芙蓉ノ毒見所特リ滲和セズ眼内以一部
ニ固着シテ劇甚ノ刺戟ヲ發スルヲアリ又質
ニ至微トナルト雖モ其疼痛極メテ劇ク之ヲ除去
スルニ非レハ必ス鎮靜セサル者之予又極未ト
セル實芙蓉刺戟ノ浸劑ヲ布片ニテ濾過スル
ヲ急ルニ由テ如共至劇ノ害ヲ受ルモノヲ見ル
テアリ之ヲ要スルニ凡ソ點眼水ハ三丁五
情澄ナルハキ之ヲ清澄ナラシムルニ法アリ
其ハ紙ヲ用テ濾過スルニアリ其ハ各的當

ノ溶解茶ヲ加フル之 如鉛糖水ノ加フル所ノ醋ノ
其容解茶ハ宜ク其本劑ノ功カニ妨害ナリ却テ
善ク扶助不可キモノヲ撰用ス可シ己ニ點眼水
ノ一方鉛糖水ヲ示スト雖モ是唯其細膜ノ感觸
仍ヲ非毒ニ強クメ排泄劑前テヲ用ユハキ乾潤
ニ要ナルノニ若其療法相通應メ病勢己ニ減退
スル片ハ宜ク其脈絡ノ機能ヲメ故ニ復セシメ
之カ若ニ稍強キ収斂劑ヲ用セズニハアラス
若然セザル片ハ其脈絡己ニ久ク盈張セルニ由テ
弛緩スルカ故ニ血液再ニ充精又再發スル

人恐レアレハナリ爰ニ的當セル點眼水ノ予力
毎ニ用エル所ノ者ハ皓卷ノ落水ナリソノ方皓
卷ノ取テ之ヲ竜胞水ニ溶化シ或ハ之ヲ玫瑰水
ニ溶化メ用過ニ用エ○又効力之ニ優レ所ノ
一ナリアリ
綠卷ニハ蒸餾水一ナリ
右能ク混和ニ皓卷ニハ上燒酒杯ニ少シク加フ
又方其用又百葉ニハ熱風ニ吹テ之ヲ蒸餾水
刺必斯印歌尔那栗斯羊瓜或ハ蒸餾水一ナリ
硝石半湯或一湯

右濁目ノ強壯性前ノニ方ニ少カラズ其限ニ在
テハ尋常ノ井水モ又夕効ナキナリ
○但ニ埃渚點眼水ハ三ナ宜ク日ニ三四回令用
スルヲ佳トス

第七篇論癩法ノ餘義

視力之弱病之原因ト癩法トハ予已ニ之レヲ論定
セリ而ルニ今尚ヲ説示ス可キナリ又ノ眼仍
ヲ光氣ノ妨害ヲ覺コル間ハ宜ク患者ノ体質精
カト其症候ノ微甚トニ從テ少量ノ蔬食ヲ斟酌

メ年へ全ク刺戟香竈ノ餘食ヲ禁ス可シ而レハ
己ニ強壯性ノ劑ヲ外用スルノ眩限ニ至テハ
ク直ニ撰生方ヲ轉メ強壯滋養ノ食料ヲ用兼ル
ニ身体ヲ適宜ニ運動セシメ冷水若クハ海浴ヲ
テアシメ以テ十全ノ復治ヲ得セシムル丁最モ
緊要ナリ○眼目乾燥スルト是々眼窠内ニ怪キ
困重ヲ覺ルコトアルハ実芫荽荊私未ノ嚏劑若
クハアリメム細未チキタリス菜細等分メ嚏
劑大ニ怪快ヲ覺ヘシムル者也是レ能ク鼻涕膜
ヲ分泌ヲ催進ニ兼テ大ニ眼固ヲ細絡閉達スル

効力アルニ因ル而ルニ古未未々曾テチキタリ
スヲ嚏劑トスルノ例ナキ者ハ蓋ニ此實ニ此偉
効アルコトヲ知ラサル者アリ○実験ニ由テ之ヲ
見ルニ此劑ハ能ク其眼ヲ失ハスニテ施用スル
片ハ腫脹ヲ催起スルコトクメ強ク稀薄ノ鼻涕
ヲ分泌セシム○眼目ニ外用スル所ノ諸茶其種
甚ク多シ就中硝砂精ハ角膜ニ功ヲナス丁最モ
強ニ其施用法ハ口狹キ長堰ニ熱湯ヲ入レ此レ
ニ次一精一茶ヒヲ加ヘ頭ヲ其上ニ俯シテ以テ
文蒸氣ヲ眼ニ受テシメ或ハ口堰チ硝子堰ニ此

精一ニ兮ヲ入テ坎ヲ焚湯中ニ挿ニ其壘口ヲ眼
ニ接セシムルナリ○其蒸氣登々メ直ニ眼ニ触
ル、片忽テ劇キ刺戟ヲ覺ヘテ淚液夥シク流レ
シ随テ眼中ニ著キ爽快ヲ覺ユ○頑固ノ症ニ在
テハ四羅茲兒ハキハ或ハキハ許ヲ尔敬兒ハキハ許ノ丸某又
々偉効ヲ奏スルナリ是レヨク鉤絡ノ閉塞ヲ
開達メ其中ニ驚滯スル毒ヲ挑除スルニ由
ル但シ坎丸系ヲ用ユルノ劑ハ宜ク眩々下劑
ヲ兼用メ吐逆ヲ防ク可シ○予尚ヲ坎篇ニ於テ
贅沅セサル可ラサル最モ大ノ要事ハ凡テ坎病

ヲ誘發スルノ諸因ヲ避ク可キナリ即チ讀書習
字針縫ハキハ日光燭火白雪ノ及光ホ其他凡テ未々
十分ニ全治整復セサルノ眼目ニ刺戟ヲ起ス可
キノ要件ハ皆之ヲ避ケシム可シ○劇症ニ在テ
ハ唯ニ坎事件ノミナラス光輝アル者ハ宜クミ
ナ全ク之ヲ避ク可シ然セサル片ハ施ス所ノ療
法適当ノ功ヲ奏セス○且ツ其病尚ラ日経ル
久シカラズ其因唯常ニ習慣セサル過度ノ光氣
ヨリ發スルノミナズ又父母ノ遺毒ニモアラズ又
前ハキハ以テ眼病有ルニモ非サル片ハ唯其誘發ノ因

ヲ除去スルノミニメ十全ノ復得ルモノ屢々之
レアリ予頃一小冊子ヲ以テ徵トス〇一女子故
田舎ニ生レ故アリテ居テ都下ニ移ス寸眼内痛
ヲ癸ニ視力減耗メ石壁ニ及影スル日光ヲ視ル
毎ニ其疼痛必ス増進ス是レ其患者ノ患トスル所
ノモノ即今其病ノ本因也何者其眼故ト効野ノ
蒼青トルニ慣テ今始テ都下ノ石壁ニ映スル日
光ノ非常ナルニ途ヨリ癸スル者ナレハ之故ニ
其窓前ニ小橙樹ヲ植ヘシメ及照メ光氣ヲ遮リ
掩ハシム其眼實ニ七日ヲラスト虽唯其一方ノミ

ニメ他ノ癩法ヲ施ス_一ナク率ニ全治ヲ得タリ
〇若シ坎症ニ於テハ其原因ヲ知ル_一ナリ患者
尚_一ク久シク光氣ニ暴触セハ其血ノ眼内ニ衝入
スル_一益々已ニ甚クメ率ニ坎書ノ始メニ舉ル
如キ諸癩法ヲ尽スニ非レハ治ヲ得サルニ至
ル可シ而ルヲ幸ニ早ク光氣ノ暴触ヲ避ケシカ
改ニ改ニ復治ヲ得_一モノニ
次ニ舉クルノ症ハ尚_一ク益々微澄トスルニ是レ
リ
一儒者其_一ハルニヤ_一上_一地ノ北ニ住ス其家正ク日

中ノ陽光ニ白ク後室ハ窓外ニ高騰アリテ室中
甚夕暗シ彼レ常ニ坎室中ニ書写ホノ事件ヲナ
シ唯食取毎ニ前室ニヤテ鮮明ノ光氣ニ白ク
其視瞻漸ク衰弱メ眼内断ヘス疼痛ス故ニ彼レ
自ラ眼鏡ヲ用ヒ眼科医ニ謀テ療法ヲ用ユミナ
功ナシ而メ其症毎ニ前室ニヤル收殊ニ目中ニ
於テ増進スルカ故ニ彼レ自ラ其因ノ坎ニ在ル
トヲ察シ速ニ居ラ他ニ移シテ且ツ燭下ニ書写
スルトヲ止ム是ニ由テ其病速ニ全治セリ
又一學者ノ最ニ注意ス可キ例ニメ世人ミテ其ハ

コトヲ知レ其理ヲ知ラズ者アリ往年吾都下
ノ衆盲トナルモノ甚夕多シ当眼ノ人以為ク是
レ其厥ノ暗処ニ移ス可シト遂ニ然メ後盲少ナ
ク其利ニ施及セリ是即常ニ暗処ニ在テ光氣ニ
慣レス偶々卒ニ光氣ニ触ルヨリメ然ルニア
ラスヤ而ルヲ今世俗ノミナラス吾徒ノ人モ知
ラスメ意ヲ坎ニ用ヒス自ラ眼ヲ損害スルモノ
多キハ何リヤ如坎ノ不用意ノ因ヨリメ視力之
弱病ヲ受或ハ終ニ全ク明ヲ失スルニ至ルモリ
甚夕少カラスノ病患アルトヲ覺ル寸ハ互ク配

意慎戒メ僅少モ眼害アラントスル一所ノ者ハ刀
所及恐テ避ク可キナリ○凡ソ視瞻ヲ能ク保固
セントスルノ徒ハ讀書習字針縫等其他止ム
ヲ得スメ微賤ノ光氣アル者ヲ視ル_ルアリ_ルハ
務テ其明ヲ適宜ニメ強カラシメス弱カラシメ
ス殊ニ明暗急卒ノ变换ナカラシム可シ○且夫
レ弱光ノ害ハ強光ノ害ニ比スルニ甚々少ナク
唯其害不明ノ処ニ視カ_ルヲ竭メ巨細ノ物ヲ見ル
キニアル_ルニ而レ_レ強光ハ常ニ其害多ク或ハ
全ク明ヲ失セシムルニ至ルモノアリ○視力差

弱キ人ト至モ右件ノ戒ヲ差ク守ル_ルハ生涯尚
ヲ十分ノ明ヲ保ツ可ニ或ハ之ヲ守ラス如クニ
黄昏ノ暇少シノ余暇ヲ吝テ事ヲ成シ終ニ早ク
明ヲ失スル者多シ豈慎セサル可クニヤ然レ_レ疾
患者止ム_ルヲ得ス_ル間断ナク其眼ヲ使役セサル
可_ルナル_ル中_中ハ宜ク明明暗共ニ過度_トラサ_ルル_ル空
ヲ擇ミ且ツ其事ヲナス_ル間絶ヘス_ル所謂_ル禦鏡
原各バ_バール_ルアリ_ルレ_レニ_ニ喜_喜ヲ用ユヘシ録鏡ヲ用
ラ_ラ崇ク_クノ眼鏡ト云_フ義_義ヲ用ユヘシ録鏡ヲ用
ユ_ユル_ルハ其由_由テ未_未ル_ル処_処久_久クメ_メソ_ソノ眼ニ利功_功ア
リトスル_ルハ實ニ古来_来一般_般人_人ノ言_言フ_フ処_処ナ_レレ_レ實

ニ然ラス
夫レ春日緑野ヲノリムト夏日ノ砂地冬日ノ山
雪日中ノ日照ニ向フ眼中ニ覺ユル処ノ爽快
其レ爰レカ優レル實ニ草木ヲメ緑色ナラシム
ルハ是レ造物者ノ賜モノニ○而ルニ緑色ヲ視
ルト緑ヲ費テ見ルト大ナル別アリ学者固ク知
ラサル可ラサル之○今綠色鏡ヲ用ユルハ即緑
ヲ費テ視ルナリ故ニ鏡ニ由ル其物色較然タラサ
ルカ故ニ視カラ費スヲ實ニ白鏡ヲ用ユルヨリ
大ナルト因ヨリ疑ヒナク且ツ之ヲ除キ去ルニ

當テヤ眼ニ入ルノ光線度ノ違フ又々甚タ少
カラス○尚且ツ加之ニ今用ユル所ノ緑鏡ハ其
面ノ凸ナルカ為メニ光線ヲ眼内ニ聚入スル多
クメ視瞻ヲ害スル予自ラ屢々試テ明カニ知
ル処ニ○是故ニ故ニ故ニ故ニ故ニ故ニ故ニ故ニ
ナルヲ掩フノ器ニ代フルニ是レノミ然レハ故
レニハ相与ノ器アリ何リ代用ノ者ヲ求ムル
ラセシ○唯其眼過度ノ刺戟ト非常ニ視カラ費
ストヨリ真ニ衰弱スルノミ甚キモノニオイト
ハ故ヲ以テ禦鏡トス可シ○凡ソ視力乏弱病

ノ真症ニ於テ用ユヘキ眼鏡ハ且ツ之ヲ用ユルノ
間ニ於テモ之ヲ去ルノ後ニ於テモ然少ノ痛モ
察セス又夕疼痛状ノ感觸ヲモ起サ、ルモノヲ
位トス

○總テ視ルノ大ナラシムルノ鏡ハ用ユルヲ
禁ス是レ網膜ノ弱過度ニメ光線ノ弛ク聚合シ
来ルニ堪エサレハ之ニ是故ニ予ハ唯正面平ノ白
鏡ヲ用ユ近來視學家又夕一種ノ索鏡ヲ發明
ス是レ綠白ニ鏡ヲ用ユルモノニメ其製功機ヲ
尽シヨク劇甚ノ光氣ニ向テモ疲勞甚シキ眼ニ

モ些少ノ妨害アルヲナシ其書ノ著ヤ是レ予カ自
ラ実験シ考按スル処ノ者ヲ以テ度ク學者ニ示サ
ントスルノ老嫗必之而ルニ近頃聞ク予カ第一
板ヲ鑄行メ出セルヨリ以來四カノ學者幸ヒニ
取テ信用スル者多シト予カ歎ヒ豈僅少ナカラ
シヤ○學者ヨリ其書中ニ記載スル処ノ症治ト
経験トニ由テ参考ニ失セハ能ク眼病治癒ノ誤
謬錯舛ヲ免ル、ヲ得ヘシ○凡リ眼内病ヲ癒
セントスル片ハ常ニ必ス精詳ニ注意シテヨリ
症候原因ヲ穿鑿シ以テ治方ヲ誤サラニテ要

22
1204

スヘシの夫レ他ノ諸病ニ於ル誤治ハ尚ヲ早ク
其方ヲ改革シテ能クカヲ竭サハ幸ニ復治スル
ヲアレヒ眼目ノ疾病ニ至テハ一タヒソノ治ヲ
誤ルヲアレハ生涯不治ノ病ニ陷ル者其例少カ
ラス学者其レ之ヲ慎ヨ哉
此書ヤ実ニ其論說使隘也ト虽モ当今未全脩ノ
医者ニ於テ恐リハ少シク鉄ヲ補フヲアル可ク
且ツ世間眼疾ヲ患フルノ人ヲメ藥劑ノ庸医販
賣ノ徒ニ其眼ヲ委子テ危除ヲ招クノ災害ヲ免
レシムルニ足ラン也
視力之弱病論大尾

